

**PENGARUH KONSENTRASI ETANOL TERHADAP  
PENJERAPAN NIFEDIPIN PADA FORMULA  
*ETHOSOME***



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih  
Gelar Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi  
Fakultas Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar**

**Oleh**

**RIZAL  
NIM: 70100108073**

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
2012**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 24 Juli 2012

Penyusun,

**Rizal**  
NIM. 70100108073

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Pengaruh Konsentrasi Etanol terhadap Penjerapan Nifedipin pada Formula *Ethosome*” yang disusun oleh Rizal, NIM: 70100108073, mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam Ujian Sidang Skripsi yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2012 bertepatan dengan 4 Ramadhan 1433 H dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Makassar, 24 Juli 2012 M  
4 Ramadhan 1433 H

### DEWAN PENGUJI:

**Ketua** : Dr. dr. H. Rasjidin Abdullah, MPH., MH. Kes. (.....)  
**Sekretaris** : Drs. Wahyudin G, M.Ag. (.....)  
**Pembimbing I** : Isriany Ismail, S.Si., M.Si, Apt. (.....)  
**Pembimbing II** : Gemy Nastity Handayani, S.Si, M.Si., Apt. (.....)  
**Penguji I** : Surya Ningsi, S.Si., Apt. (.....)  
**Penguji II** : Drs. Dudung Abdullah, M.Ag. (.....)

Diketahui oleh:  
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

**Dr. dr. H. Rasjidin Abdullah, M.PH., MH. Kes**  
**NIP. 19530119 198110 1 001**

## KATA PENGANTAR



### **Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah swt., Tuhan semesta alam yang telah memberi banyak berkah kepada penyusun, diantaranya keimanan dan kesehatan serta kesabaran sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Hanya kepada-Nyalah penyusun menyerahkan diri dan menumpahkan harapan, semoga segala aktivitas dan produktivitas penyusun mendapatkan limpahan rahmat dari Allah swt.

Salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad saw., keluarga, para sahabat yang telah memperjuangkan agama Islam dan Ummat yang mengikuti ajaran-Nya hingga akhir zaman.

Skripsi ini merupakan salah satu bagian dari ilmu pengetahuan yang menunjukkan kemampuan penyusun dalam khazanah keilmuan terealisasi dalam bentuk skripsi sebagai pedoman untuk menambah wawasan keilmuan kedepannya. Penyusun sangat menyadari bahwa apa yang terurai sangat sederhana dan masih jauh dari kesempurnaan.

Terima kasih yang tak terhingga kepada Ibundaku Roslah dan Ayahandaku Bahtiar, S.Ag, yang setiap saat melantunkan do'a, bimbingan, curahan kasih sayang, serta motivasinya yang senantiasa mengiringi penyusun dalam setiap langkah. Terima kasih pula kepada saudara-saudaraku Rusdiawandi, dan Sri Wahyuni serta keluarga besarku atas segala perhatian dan dukungannya selama ini.

Terima kasih pula kepada :

1. Prof. Dr. H. A. Qadir gassing HT., MS sebagai pimpinan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan dukungan demi selesainya skripsi ini.
2. Dr. dr. H. Rasjidin Abdullah, M.PH., MH.Kes, Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar sebagai pimpinan Fakultas atas dukungan dan arahnya.
3. Ibu Gemy Nastity Handayani S.Si M.Si., Apt., selaku Ketua Prodi Farmasi sekaligus pembimbing kedua yang telah banyak berkontribusi besar dalam menyelesaikan skripsi.
4. Ibu Haeria, S.Si., M.Si., sebagai sekretaris Prodi Farmasi yang memberikan dukungan, saran, dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Isriany Ismail S.Si., M.Si., Apt sebagai pembimbing pertama atas segala arahan dan bimbingannya yang tidak bisa dinilai dengan materi dan telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam membimbing penyusun sampai selesainya penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Surya Ningsi, S. Si., Apt dan selaku penguji kompetensi atas saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.
7. Bapak Drs. H. Dudung Abdullah, M.Ag., sebagai penguji agama atas saran-saran konstruktif tentang keagamaan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Ibu Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, M.Si., Apt, sebagai kepala laboratorium terpadu FIKES UIN Alauddin Makassar atas izin penelitian, bimbingan, dan arahnya hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

9. Bapak Muh. Fitrah S.Si., Apt., dan seluruh dosen staf Jurusan Farmasi atas curahan ilmu pengetahuan dan segala bantuan yang diberikan kepada penyusun sejak menempuh pendidikan farmasi, melaksanakan penelitian hingga selesainya skripsi ini.
10. Suherni, S.Farm., yang selalu memberikan motivasi dan do'a.
11. Terima kasih atas saran, bantuan dan ilmunya untuk laboran, saudara-saudara (i) emulsi 2008, Barsa community, Kakak-kakak Farmasi 05, 06, 07, adik-adik 09, 010, dan 011 atas bantuan dan kerjasamanya selama penyusun melaksanakan pendidikan.

Akhirnya kepada Allah jualah penyusun memohon agar kiranya perjuangan penyusun dalam penyelesaian skripsi ini dapat menjadi amal saleh dan diberikan pahala yang berlipat ganda. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya, namun besar harapan, kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat untuk kebaikan Ummat. Semoga Allah swt., selalu melindungi kita semua. Amin ya Rabbal A'lamin.

Makassar, 24 Juli 2012

Penyusun,

**Rizal**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
<i>A. Latar Belakang</i> .....	1
<i>B. Rumusan Masalah</i> .....	4
<i>C. Tujuan Penelitian</i> .....	5
<i>D. Manfaat Penelitian</i> .....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. <i>Kulit</i> .....	6
1. Anatomi kulit.....	6
2. Absorpsi perkutan.....	10

B. <i>Penghantaran Obat melalui Kulit</i> .....	13
1. <i>Topical delivery</i> .....	14
2. <i>Regional delivery</i> .....	14
3. <i>Systemic delivery (Transdermal delivery)</i> .....	15
C. <i>Metode Peningkatan Penetrasi dengan Vesicle</i> .....	19
1. <i>Liposom</i> .....	20
2. <i>Ethosome</i> .....	30
D. <i>Uraian Umum Nifedipin</i> .....	41
1. <i>Sifat fisika kimia</i> .....	41
2. <i>Farmakologi</i> .....	42
E. <i>Tinjauan Agama</i> .....	45
1. <i>Manusia sebagai hayawanun nutqhy</i> .....	45
2. <i>Islam dan pengobatan</i> .....	62

### BAB III METODE PENELITIAN

A. <i>Alat dan Bahan</i> .....	66
B. <i>Metode Kerja</i> .....	66
1. <i>Rancangan formula</i> .....	66
2. <i>Pembuatan ethosome</i> .....	67
3. <i>Penentuan % obat terjerap (PDE)</i> .....	67
4. <i>Pengujian karakteristik ethosome yang terbentuk</i> .....	68

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. <i>Hasil Penelitian</i> .....	69
1. Kurva baku nifedipin.....	69
2. Penjerapan obat dalam <i>ethosome</i> .....	70
3. Karakteristik <i>ethosome</i> .....	70
B. <i>Pembahasan</i> .....	71
BAB V PENUTUP	
A. <i>Kesimpulan</i> .....	76
B. <i>Saran</i> .....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	93

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Formula <i>Ethosome</i> .....	66
2. Penjerapan Obat dalam <i>Ethosome</i> .....	70
3. Absorbansi Nifedipin pada Beberapa Konsentrasi.....	82
4. Penjerapan Nifedipin pada <i>Ethosome</i> .....	85

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Penampang Melintang Kulit.....	7
2. Bentuk Sel Penyusun Epidermis.....	9
3. Rute Absorpsi Perkutan.....	13
4. Liposom.....	22
5. Struktur Vesikel.....	25
6. Mekanisme Pembentukan Liposom.....	27
7. Struktur kolesterol.....	28
8. Mekanisme Penetrasi <i>Ethosome</i> pada Kulit.....	32
9. Mekanisme Penetrasi <i>Ethosome</i> pada Kulit.....	33
10. Skema Pembuatan <i>ethosome</i> .....	34
11. Skema Pembuatan <i>Ethosome</i> Metode Dingin.....	35
12. Skema Pembuatan <i>Ethosome</i> Metode Panas.....	35
13. Struktur Fosfatidilkolin.....	38
14. Struktur Etanol.....	40
15. Struktur Nifedipin.....	42
16. Kurva Baku Nifedipin.....	69
17. Bentuk <i>Ethosome</i> MLV dan MVV.....	70
18. Skema Pembuatan <i>Ethosome</i> dan Karakterisasi.....	81
19. <i>Ethosome</i> 1.....	86
20. <i>Ethosome</i> 2.....	87

21. <i>Ethosome</i> 3.....	88
22. <i>Ethosome</i> 4.....	89
23. <i>Ethosome</i> 5.....	90
24. <i>Ethosome</i> Ukuran Terkecil.....	91
25. <i>Ethosome</i> Ukuran Terbesar.....	92

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Pembuatan <i>Ethosome</i> dan Karakterisasi.....	81
2. Perhitungan Penjerapan/ <i>Percent Drug Entrapment</i> (PDE).....	82
3. Gambar Bentuk <i>Ethosome</i> .....	86
4. Gambar Ukuran <i>Ethosome</i> .....	91

## ABSTRAK

Nama : Rizal  
NIM : 70100108073  
Judul Skripsi : Pengaruh Konsentrasi Etanol Terhadap Penjerapan  
Nifedipin pada Formula *Ethosome*

---

Telah dilakukan penelitian tentang pengaruh konsentrasi etanol terhadap penjerapan nifedipin pada formula *ethosome*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi etanol terhadap penjerapan, bentuk dan ukuran dari *ethosome*, untuk menentukan konsentrasi etanol yang optimum membentuk *ethosome* dengan persen penjerapan terhadap nifedipin tinggi, dan untuk mengetahui karakteristik *ethosome* yang terbentuk. Formulasi *ethosome* dilakukan dengan metode panas, dengan menggunakan etanol dan fosfatidilkolin. *Ethosome* diformulasi dengan memvariasikan konsentrasi etanol, fosfatidilkolin 1,5% dan nifedipin 0,05%. Kadar nifedipin yang terjerap pada *ethosome* diukur dengan menggunakan spektrofotometri UV-VIS pada panjang gelombang 336 nm, bentuk dan ukuran *ethosome* ditentukan menggunakan mikroskop. *Ethosome* dengan persen obat terjerap tertinggi diperoleh pada formulasi yang menggunakan etanol 50% dengan jumlah obat terjerap 71,440%. *Ethosome* yang terbentuk adalah *Multy Lamelar Vesicle* (MLV) dan *Multy Vesicular Vesicle* (MVV) dengan ukuran berkisar 1  $\mu\text{m}$  sampai 15  $\mu\text{m}$ .

## ABSTRACT

Name : Rizal  
NIM : 70100108073  
Title of Research : The Influence of Ethanol Concentration with Entrapment  
of Nifedipin in Ethosome Formula.

---

Researched about the influence of ethanol Concentration with entrapment of nifedipin in ethosome formula. This Research suppose to know about the influence of etanol concentration in entrapment, form and size of ethosome, to decide the optimal of etanol concentration forming ethosome with percent drug entrapment in high nifedipin, and to know the formed ethosome characteristic. Ethosome formula made in by hot method, using variation concentration of ethanol, phosphatidilcholin 1,5% and nefidepin 0,05%. Nifedipin content that entrapment in ethosome measured by using spektrofotometri UV-VIS at wavelength 336 nm, form and ethosome size fixed by using microscope. Ethosome with high percent drug entrapment token from formula by using ethanol 50% with entrapment 71,440%. The formed ethosome is Multy Lamerall Vesicle (MLV) and Multy Vesicular Vesicle (MVV) with the size about 1  $\mu\text{m}$  until 15 $\mu\text{m}$

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang***

Perkembangan zaman yang semakin hari terus menantang manusia untuk berpikir searah yang disuguhkannya, setiap disiplin ilmu pengetahuan semakin hari terus menampakan kepiawaiannya. Menjawab tantangan ini tentunya sebagai Khalifah di muka bumi, harus senantiasa menjadi insan yang kreatif dan inovatif sesuai keahlian masing-masing untuk memberikan perubahan pada Bangsa dan Agama.

Salah satu inovasi buah pikiran dalam disiplin ilmu farmasi beberapa tahun terakhir ini menjadi sesuatu yang menarik untuk dikembangkan yakni desain sistem penghantaran obat (*Drugs Delivery System*) yang menggunakan gelembung (*vesicles*). Sistem penghantaran obat ini dapat digunakan secara, oral, topikal ataupun secara transdermal.

Tujuan dasar desain bentuk sediaan obat adalah untuk mengoptimumkan *bioavailabilitas* obat, yang bergantung pada sifat kimia fisika zat obat terutama kelarutannya dalam lemak, derajat ionisasi, dan ukuran molekul yang menentukan absorpsi, distribusi, dan laju eliminasi suatu obat (Ansel, 2008:110; Lachman *et al*, 2008).

Senyawa aktif yang terbatas kelarutannya dalam air dan memiliki bioavailabilitas yang rendah, memerlukan suatu sistem pembawa yang menjamin molekul fungsional dapat mencapai sisi target untuk dapat

menimbulkan efek yang optimal (Blazek *et al*, 2001; Mahdi, 2004). Suatu pendekatan untuk mengatasi masalah ini adalah menggunakan gelembung (*vesicles*). berupa liposom, niosom, transferosom, dan *ethosome*. Penggunaan liposom sebagai pembawa obat dalam farmasi baru direalisasikan pada pertengahan tahun 1990an (Gregoriadis, 2007).

Gelembung (*vesicles*) merupakan partikel koloid yang berisi air, diformulasikan dengan cara mendispersikan suatu lipid, ke dalam media cair. Terdiri dari molekul ampifilik yang membentuk struktur bilayer. Obat-obat yang hidrofilik akan terjerap pada kompartemen air, sedangkan obat yang bersifat ampifilik akan tersebar pada bilayer (Pirvu *et al*, 2010; Jufri, 2004; Morrow *et al*, 2007; Kozubek *et al*, 2000). Liposom telah dibuktikan secara klinik dapat menghantarkan beberapa senyawa aktif seperti, amikacin (MiKasome<sup>®</sup>), amphotericin B (AmBiosome<sup>®</sup>), doxorubicin (Doxil<sup>®</sup>), vincristin (Vincaxosome<sup>®</sup>), dan lain-lain (Kozubek, 2000; Gregoriadis, 2007; Ranade, 2003; Uchegbu, 2003).

Penggunaan obat secara topikal untuk tujuan sistemik (*transdermal*) masih relatif baru dan penggunaannya terus bertambah oleh karena beberapa keuntungan seperti menghindari gangguan gastrointestinal dan metabolisme lintas pertama (*first past effect*) obat, meningkatkan kenyamanan pasien dalam pemberian obat, serta kemampuan untuk memodifikasi sifat biologi penyusun untuk dapat diabsorpsi. Kulit memiliki banyak halangan untuk obat dapat berpenetrasi sampai ke sistem transpor karena struktur penyusunnya, mengatasi hal ini digunakan beberapa teknik untuk dapat menembus *stratum*

*corneum*, metodenya dapat secara fisika ataupun kimia seperti *iontophoresis*, *sonophoresis*, *electroporation*, dan sistem gelembung (*vesicles*) (Wahid *et al*, 2011; Tiwari *et al*, 2010; Kumar *et al*, 2009; Kavitha *et al*, 2010).

Dalam Maurya *et al* (2011), sistem penghantaran obat secara topikal dengan menggunakan liposom konvensional patut dipertimbangkan karena hanya sedikit bahkan tidak ada zat aktif yang dapat berpenetrasi secara mendalam pada kulit tapi hanya berada diatas lapisan *stratum corneum*, untuk mengatasi masalah ini Cave *et al* dan Touitou *et al*, memperkenalkan sistem *vesicle ethosome* yang merupakan modifikasi dari liposom, terdiri dari hidroalkohol atau hidro/alkohol/glikolik fosfolipid dengan konsentrasi etanol yang tinggi, bersifat lembut, merupakan gelembung yang lunak, dan sesuai untuk meningkatkan penghantaran zat aktif (Cave *et al*, 2004; Touitou *et al*, 2000; Kumar R *et al*, 2010: 3; Maurya *et al*, 2011: 34; Dave *et al*, 2010: 81).

Konsentrasi etanol yang tinggi menyebabkan ukuran partikel menurun, karena etanol menurunkan tegangan permukaan dan memberikan tingkat stabilisasi sterik (Maurya *et al*, 2011:36; Girhepunje *et al*, 2010:363). Efisiensi PDE (*Percent Drug Entrapment*) dari *ethosome* sebanding dengan konsentrasi etanol, karena *vesicle lipid bilayer* lebih renggang sehingga obat dapat terjerap pada lipid bilayer dan *core ethosome* (Dave *et al*, 2010:82). Etanol mengurangi kerapatan *stratum corneum* kulit, menjadikan *vesicles* lebih lembut sehingga permeasinya lebih mudah mencapai sistem sirkulasi (Maurya *et al*, 2011: 36; Dave *et al*, 2010:82)

Nifedipin dengan penggunaan secara oral lebih dari 80% diabsorpsi dari usus, akan tetapi ketersediaan hayatinya lebih rendah hanya sekitar 60% karena mengalami *first pass effect*. Waktu paruh plasma sekitar 3 – 5 jam, ikatan protein plasma sekitar 90 %. Sifat nifedipin ini dapat dijadikan sebagai indikator bahwa nifedipin membutuhkan suatu sistem penghantaran obat agar dapat meningkatkan efikasinya, yakni dengan menggunakan *ethosome*.

Obat dalam bentuk *vesicles (ethosome)* dapat ditingkatkan penyerapannya dengan cara memvariasikan bahan pembawanya (lipid, fosfatidilkolin), jumlah obat, dan pelarut yang digunakan (etanol). Dalam Nurasih H (2011), *ethosome* nifedipin dibuat dengan konsentrasi etanol 30% dan nifedipin 0,05 % tiap formula, dengan variasi fosfatidilkolin. Penyerapan optimum nifedipin diberikan pada etosom dengan penyusun *vesicles* fosfatidilkolin 1,5 %. Optimasi penyerapan nifedipin kemungkinan masih dapat dilakukan dengan memvariasikan jumlah etanol yang digunakan.

### ***B. Rumusan Masalah***

1. Bagaimana pengaruh konsentrasi etanol terhadap karakteristik *ethosome* yang terbentuk?
2. Berapa konsentrasi etanol yang optimal terhadap penyerapan nifedipin dalam formula *ethosome* ?
3. Apakah *ethosome* yang menyerap nifedipin memiliki karakteristik yang sesuai?

### ***C. Tujuan Penelitian***

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh konsentrasi etanol terhadap penjerapan, bentuk dan ukuran dari *ethosome*.
2. Untuk menentukan konsentrasi etanol yang optimum membentuk *ethosome* dengan persen penjerapan terhadap nifedipin tinggi.
3. Untuk mengetahui karakteristik *ethosome* yang terbentuk.

### ***D. Manfaat penelitian***

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Diperoleh formula *ethosome* yang optimal menyerap zat aktif nifedipin sebagai obat hipertensi dan angina.
2. Dengan diperolehnya data ilmiah tentang penjerapan obat yang optimal dalam *ethosome* dapat menunjang pengembangan dan pemanfaatannya.
3. Dapat digunakan untuk pengembangan *drugs delivery system* (sistem penghantaran obat).
4. Dengan *ethosome*, meningkatkan efisiensi penggunaan obat dan tingkat kenyamanan pasien dalam hal penggunaan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### ***A. Kulit***

Kulit adalah organ terbesar dalam tubuh manusia dengan luas permukaan antara 1,5 - 2 m<sup>2</sup>, berat sekitar 3 kg atau lebih dari 10% berat badan. Aliran darah disekeliling kulit 3 mL/h/cm<sup>3</sup>, total luas permukaan pembuluh darah intrakutan untuk jalan obat ke dalam sirkulasi sistemik berjumlah 100% - 200% dari area kulit (Grassi *et al*, 2007: 53).

Kulit merupakan salah satu bagian tubuh yang paling banyak berkontak dengan lingkungan dan berperan sebagai lapisan pelindung tubuh terhadap pengaruh dari luar baik pengaruh fisik (benturan, lecet, patah) maupun kimia (asam, basa), penghalang dehidrasi, melindungi tubuh dari invasi bakteri, radiasi ultraviolet, berperan dalam pengatur temperatur dan sintesis vitamin D dari molekul kolesterol (Light, 2004: 93).


#### **1. Anatomi Kulit**

Kulit manusia terdiri dari tiga lapisan yaitu epidermis, dermis, dan endodermis atau jaringan subkutan.

##### **a. Epidermis**

epidermis tersusun atas empat tipe sel yang tersusun kedalam empat lapisan yang disebut strata, hampir semua tipe selnya berupa *keratinocyt* yang terbentuk dari protein fibrous (keratin), epidermis

merupakan lapisan terluar kulit yang mempunyai ketebalan sekitar 50  $\mu\text{m}$  – 1,5 mm (Light, 2004: 94; Grassi *et al*, 2007: 53).



Gambar 1. Penampang Melintang Kulit (Light, 2004: 95)

Epidermis terdiri dari empat lapisan, dari luar ke dalam berturut-turut : stratum korneum, stratum lusidum, stratum granulosum, stratum spinosum, stratum basal/ *germinativum* (Grassi *et al*, 2007).

### 1) Stratum Korneum

Stratum korneum merupakan lapisan paling atas, ketebalannya berkisar 1% - 10 % dari total lapisan kulit (10 – 20  $\mu\text{m}$ ). Lapisan ini sangat kering mengandung  $\leq 15\%$  air dan terdiri dari beberapa lusin sel-sel mati berbentuk gepeng yang tersusun tumpang tindih yang disebut korneosit, mengandung sekitar 65% keratin yaitu suatu protein yang dihasilkan selama proses deferensiasi. Sel-sel stratum korneum

saling berdempet satu dengan yang lain dan bagian ini merupakan penghalang yang paling penting dari kulit terhadap masuknya benda-benda asing (Grassi *et al*, 2007: 53 – 56).

## **2) Stratum Lucidum**

Stratum lucidum terdiri dari tiga sampai empat lapis sel mati yang rata. Lapisan ini hanya terdapat pada telapak tangan dan kaki, dikenal sebagai “kulit tebal” (Light, 2004: 96).

## **3) Stratum granulosum**


Stratum granulosum tersusun atas tiga sampai lima lapis sel yang mengandung *keratohyalin*, bagian ini yang berperan dalam pembentukan keratin. Semua sel diatas lapisan ini mati karena terlalu jauh dari kapiler dermal untuk memperoleh cukup nutrisi (Light, 2004: 96).

## **4) Stratum spinosum**

Stratum spinosum tersusun atas beberapa lapis sel kobuidal, yakni sel yang mampu membentuk bagian sel secara cepat, dengan sel melanin yang tersebar dan sel langerhan's (Light, 2004: 96).

## **5) Stratum basal**

Stratum basal berupa satu baris sel kobuidal, satu sampai lima lapis sel ini berupa *melanocyt* dan biasanya terdapat merkel sel (Light, 2004: 96).



Gambar 2. Bentuk sel Penyusun Epidermis (Walters, 2002).

## b. Dermis

Lapisan ini terletak lapisan kulit yang terletak antara epidermis dan jaringan lemak subkutan. Tebalnya 0,1 – 0,5 cm, dermis ini mengandung jaringan padat dari serabut protein, seperti kolagen (75%). Selnya berupa fibroblast yang diproduksi jaringan serabut kolagen, laminin, fibronectin, dan vitronectin (Walters, 2002).

Dermis mempunyai dua lapisan, lapisan *papillary* yang berupa jaringan ikat dengan kolagen dan serabut elastis, lapisan ini terdapat banyak reseptor sentuhan dan nyeri. Lapisan *reticular*, terdiri atas jaringan ikat padat berupa kombinasi kolagen dan serabut elastis pada matriks ekstra seluler. Lapisan *reticular* berisi pembuluh darah, kelenjar keringat dan minyak, dan reseptor perasa (Light, 2004: 98).

Kelenjar sebacea terdapat pada bagian leher tiap folikel. Kelenjar ini mensekresikan material minyak dengan komposisi: trigliserida 57,5%; ester-ester lilin 26%; squalene 12%; ester-ester kolesterol 3%; kolesterol 1,5%. Sebum ini menyebabkan terbentuknya lapisan tipis diskontinyu bahan lipofil pada beberapa permukaan kulit, karenanya sebum dapat merupakan rute absorpsi obat untuk obat-obat yang larut lemak (Ismail, 2009: 25 – 26)

### **c. Endodermis (Hipodermis)**

Lapisan ini merupakan sel-sel lemak (sekitar 50% berat lemak tubuh) yang bersambung dengan dermis, sel utama lain hipodermis adalah fibroblast dan makrofag. Tebalnya 0,5 – 2 cm tergantung pada umur, ras, dan daerah tubuh. Hipodermis kaya akan jaringan penghubung yang mengandung beberapa serat elastik dan terdapat jaringan adipose. hipodermis merupakan penghubung antara dermis dengan jaringan lain dibawahnya seperti otot (Walters, 2002; Grassi *et al*, 2007: 58).

## **2. Absorpsi perkutan (Ismail, 2009: 26 – 27)**

Absorpsi perkutan dapat didefinisikan sebagai absorpsi obat ke dalam stratum korneum (lapisan tanduk) dan selanjutnya obat menembus lapisan dibawahnya dan akhirnya obat masuk dalam sirkulasi darah.

Kulit relatif impermeabel untuk sebagian besar senyawa, untuk itu perlu banyak pertimbangan untuk pemberian obat-obatan melalui kulit untuk efek sistemik. Prasyarat untuk absorpsi obat transdermal adalah

bahwa obat dapat melintasi lapisan-lapisan dari epidermis dan masuk ke dermis, sehingga obat dapat mencapai kapiler pembuluh darah. Pengujian absorpsi perkutan secara *in vitro* menunjukkan bahwa stratum korneum merupakan sawar utama untuk banyak senyawa. Stratum korneum impermeable terhadap molekul-molekul hidrophilik dan sangat permeable untuk molekul lipofilik. Hal ini dikarenakan sel-sel penyusun stratum korneum yang terdiri dari lemak dan protein keratin serta susunannya yang padat.

Untuk pengobatan setempat sering diperlukan penembusan zat aktif ke dalam struktur kulit yang lebih dalam, hal tersebut penting dilakukan bila diperlukan konsentrasi dalam jaringan yang terletak di bawah daerah pemakaian yang cukup tinggi agar diperoleh efek yang dikehendaki dan sebaliknya penyerapan oleh pembuluh darah diusahakan agar seminimal mungkin sehingga terjadinya efek sistemik dapat dihindari.

Akan tetapi pada pemakaian topikal sediaan untuk efek sistemik, zat aktif harus masuk ke dalam peredaran darah dan selanjutnya dibawa ke jaringan yang kadang-kadang terletak jauh dari tempat pemakaian dan pada konsentrasi tertentu dapat menimbulkan efek farmakologik.

Penyerapan perkutan merupakan gabungan fenomena penembusan suatu senyawa dari lingkungan luar ke bagian kulit sebelah dalam dan fenomena penyerapan dari struktur kulit ke dalam peredaran darah atau getah bening. Istilah 'perkutan' menunjukkan bahwa proses penembusan

terjadi pada lapisan epidermis dan penyerapan terjadi pada lapisan epidermis yang berbeda.

Kulit merupakan perintang yang efektif terhadap penetrasi perkutan obat atau senyawa eksternal. Absorpsi obat perkutan dipengaruhi oleh sifat fisikokimia obat dan pembawa serta kondisi kulit. Pada pemakaian obat secara topikal, obat berdifusi dalam pembawanya dan kontak dengan permukaan kulit (stratum korneum dan sebum) serta selanjutnya menembus epidermis.


Penetrasi obat melewati kulit dapat terjadi dengan dua cara (Walters, 2002) :

1. Rute transepidermal, yaitu difusi obat menembus stratum korneum. Terdiri dari rute *trans-seluler* dan rute *intra-seluler*. Rute trans-seluler merupakan jalur terpendek dimana bahan obat melewati membran lipid maupun korneosit, tetapi rute ini memiliki resistansi yang besar terhadap penetrasi. Rute yang lebih umum adalah melalui rute inter-seluler. Bahan obat melintasi membran lipid antara korneosit.
2. Rute transfolikular (*trans-appendageal*), yaitu difusi obat melewati pori kelenjar keringat dan sebum. Rute yaitu melalui kelenjar dan folikel rambut memiliki kontribusi yang kecil terhadap penetrasi perkutan.

Peningkat penetrasi melalui *barier* epitel, dapat dilakukan dengan cara (Touitou *et al*, 2007: 204) :

1. Meningkatkan fluiditas membran sel.
2. Mengekstraksi lapisan lipid bagian luar dan dalam.

3. Memodifikasi struktur lipid, seperti melarutkan dengan membentuk micell.
4. Mengubah protein seluler.
5. Meningkatkan aktifitas termodinamik obat (difusi pasif).
6. Memodifikasi penghalang enzimatik, khususnya peptida dan protein obat.
7. Mengubah aliran tegangan permukaan mucin.



Gambar 3. Rute Absorpsi Perkutan (Benson, 2005).

### **B. Penghantaran Obat Melalui Kulit** (Ismail, 2009: 27 – 29)

Penggunaan obat di kulit dapat ditujukan untuk mengobati kelainan dermatologis (*topical delivery*), pengobatan jaringan lebih dalam seperti otot dan vena (*regional delivery*) dan lebih jauh penetrasi obat ke sirkulasi sistemik (*transdermal delivery*).

### **1. Topical delivery**

Sasaran dalam penghantaran topikal adalah merancang penampung obat (*drug reservoir*) di kulit. Penetrasi molekul aktif ke lapisan kulit yang lebih dalam atau hingga ke sistem sirkulasi tidak diperlukan. Ditujukan untuk penggunaan secara langsung di kulit pada kerusakan lapisan kutan (ct. akne) atau pada manifestasi kutan akibat penyakit (ct. psoriasis), dengan maksud untuk membatasi efek farmakologi atau efek lain pada permukaan kulit atau pada kulit. Absorpsi sistemik mungkin tidak dapat dihindari. Formulasi semi solid, dan jenisnya mendominasi sistem untuk penghantaran topikal.

### **2. Regional delivery**

Penggunaan obat di kulit untuk mengobati penyakit atau mengurangi gejala di jaringan yang lebih dalam dibawah tempat pemberian. Sasarannya adalah efek atau aksi farmakologis pada otot, vaskular, persambungan dan lainnya yang terletak di bawah atau disekitar tempat pemberian. Aksinya lebih sedikit dibawah pemberian sistemik. Aktivitas ini memerlukan absorpsi perkutan dan penumpukan. Pengambilan sistemik dari substansi mungkin terjadi, meskipun tidak disukai, hal ini tidak dapat dihentikan. Meskipun demikian, konsentrasi region lebih tinggi dari pada pemberian sistemik pada total tubuh yang sama terpapar obat. Memfokuskan obat pada jaringan yang dikehendaki, sulit untuk dibuktikan dengan tegas. Hal ini menjadi pertimbangan untuk validitas dari terapi regional. Formulasi

yang digunakan untuk tujuan ini antara lain adalah *ointment*, krim, *adhesive patch*, dan plester.

### 3. *Systemic delivery (Transdermal delivery)*

Penghantaran transdermal merupakan pemberian obat di kulit untuk pengobatan penyakit sistemik melalui penetrasi obat ke sirkulasi sistemik dan ditujukan pada pencapaian kadar aktif sistemik dari obat. Meskipun bentuk sediaan ointment diterapkan pada jenis terapi ini, (ct. nitrogliserin ointment), *adhesive system* dengan ukuran yang tepat dapat digunakan. Disini, absorpsi percutan dengan akumulasi obat sistemik yang cukup besar sangat mutlak diperlukan. Idealnya tidak ada akumulasi lokal obat tetapi hal tersebut tidak bisa dihindari. Obat dipaksa untuk melintas dengan kecepatan difusi yang relatif kecil dari luas area tertentu dari *patch*, akibatnya besar potensi terjadinya iritasi atau sensitasi akibat konsentrasi obat pada jaringan dibawah *patch*.

Dari karakteristiknya, kulit menjadi populer sebagai sisi yang potensial untuk penghantaran obat tujuan sistemik (*systemic drug delivery*), karena:

- a. Terhindar dari masalah lambung kosong, efek pH, dan deaktivasi oleh enzim sehubungan dengan lintasan di gastrointestinal. Beberapa fenomena yang mempengaruhi absorpsi melalui gastrointestinal untuk sediaan oral dapat dihindari, seperti terurainya obat dalam lingkungan asam lambung, obat-obat contohnya yang tergolong dalam AINS, dapat

menyebabkan perdarahan dan iritasi pada gastrointestinal, tercampurnya obat dan makanan dalam lambung.

- b. Terhindar dari metabolisme lintas pertama di hati. Tidak terjadinya lintas pertama di hepar (*first pass hepatic*), meminimalkan metabolisme lintas pertama seperti untuk sediaan oral, dimana hal ini yang menyebabkan terbatasnya efikasi sediaan oral.
- c. Senyawa dengan indeks terapi yang sempit dapat digunakan dengan lebih mudah.
- d. Keluhan pasien karena frekuensi penggunaan obat-obat dengan waktu paruh yang singkat dan trauma akibat pemberian parenteral dapat dihindari.
- e. Secara teori, tidak ada masalah dengan waktu penghantaran seperti yang mungkin terjadi pada jalur gastrointestinal, dimana dalam keadaan tunak penghantar obat dapat dipertimbangkan dengan kadar plasma yang konstan.
- f. Resiko over dosis dan efek samping ketika obat masuk ke sirkulasi dapat dihentikan karena pengobatan dapat dimulai dan diakhiri kapan saja melalui penggunaan plester (*patch*), memungkinkan pengontrolan input, misalnya dengan penghentian hantaran melalui penghilangan alat/sediaannya.

Dalam prakteknya, penghantaran zat terlarut melintasi kulit berhubungan dengan beberapa kesulitan seperti :

- a. absorpsi perkutan bervariasi tergantung pada daerah kulit yang diberikan, kerusakan kulit, umur dan perbedaan spesies.
- b. Efek metabolisme tingkat pertama kulit (*skin's first-pass metabolic*).
- c. Kapasitas *reservoir* di kulit.
- d. Iritasi dan toksisitas lain yang disebabkan oleh produk topikal.
- e. Keragaman dan sebab dari kulit termasuk pergantian kulit dan metabolisme.
- f. Penjelasan yang tidak cukup terhadap kriteria bioequivalen.
- g. Tidak lengkapnya pemahaman terhadap teknologi yang digunakan untuk memfasilitasi atau memperlambat absorpsi perkutan.

Bagaimanapun, kontrol penghantaran zat terlarut melintasi kulit menjadi hal yang menarik, lebih lanjut, berkembang teknologi untuk mendukungnya, seperti peningkatan penetrasi kimia (*chemical penetration enhancement*), sonophoresis, transferosomes dan elektroforasi.

Sifat *barrier* dari lapisan subkutan menyebabkan tidak efektifnya penetrasi molekul ionik dan senyawa yang sangat polar. Penetrasi molekul lipofilik mudah menembus barrier tersebut, akan tetapi penetrasinya dicegah oleh bagian hidrofilik dari kulit (epidermis dan dermis). Molekul kecil amfifilik dengan titik lebur yang rendah dan kelarutannya dalam minyak (subkutan) dan air (epidermis dan dermis) memiliki kesempatan untuk melintasi kulit. Molekul besar seperti peptida dan protein sangat sulit untuk dihantarkan, oleh karena itu jumlah produk transdermalnya dipasaran sangat terbatas.

Mengingat banyaknya bahan obat yang diperuntukkan bagi penggunaan topikal, regional atau bahkan transdermal, maka perlu diimplementasikan suatu metoda yang dapat meningkatkan ketercampuran dengan molekul penyusun subkutan. Sejauh ini empat pendekatan dalam meningkatkan permeasi molekul melintasi kulit telah diteliti yaitu: *electrically assisted enhancement, vesicular carriers, chemical enhancement, dan microinvasive delivery*. Pengembangannya saat ini disebut *velocity-based techniques*.

Beberapa pendekatan untuk menyediakan sistem penghantaran obat melalui rute transdermal melewati jaringan subkutan (Patel, 2005; Morrow *et al*, 2007: 39) :

a. Interaksi obat dan pembawa

- 1) Pemilihan obat yang tepat.
- 2) Penyesuaian sifat kimia.
- 3) Pasangan ion dan kompleks koaservasi.
- 4) Sistem eutektikum.

b. Modifikasi stratum korneum

- 1) Hidrasi.
- 2) peningkat penetrasi kimia.

c. Menghilangkan stratum korneum

- 1) Menggunakan *microneedle*.
- 2) Abrasi stratum korneum.
- 3) Sistem pembawa *folicular*.

d. Bantuan metode elektrik

- 1) *Ultrasound (phonophoresis, sonophoresis).*
- 2) *Iontophoresis.*
- 3) *Electroporation.*
- 4) *Magnetophoresis.*
- 5) Gelombang fotomekanik.

e. Gelembung dan partikel

- 1) Liposom.
- 2) Niosom.
- 3) Transferosom.
- 4) *Ethosome.*

**C. Metode Peningkatan Penetrasi dengan Vesicles (Gelembung)**

Beberapa tahun terakhir, sistem gelembung telah diperkenalkan sebagai sistem pelepasan obat secara terkendali, karena beberapa keuntungannya seperti kurang toksitas, biodegradasi, kemampuannya dalam mengenkapsulasi obat yang bersifat hidrofilik atau lipofilik, mampu memperlama obat dalam sistem sirkulasi karena enkapsulasinya dalam gelembung, mampu menargetkan obat pada organ dan jaringan, kemampuan dalam mengurangi toksisitas obat dan meningkatkan bioavailabilitas (Pirvu *et al*, 2010: 129).

Salah satu cara mengubah interaksi obat dengan host yaitu membatasi molekul obat kedalam bungkusan gelembung atau vesicle kecil seperti liposom, tujuannya membungkus kemudian mengontrol penyampaian ke target obat (Uchegbu, 2003).

Gelembung merupakan partikel koloid yang berisi air. Terdiri dari molekul ampifilik (lipid dan surfaktan) yang membentuk bilayer. Dalam kelebihan air pada molekul ampifilik dapat membentuk gelembung unilamellar atau multilamellar bilayer. Obat-obat yang hidrofilik akan terjerap pada kompartemen dalam air, sedangkan obat yang bersifat ampifilik akan tersebar pada bilayer (Pirvu *et al*, 2010: 130).

Umumnya, gelembung terdiri dari fosfolipid dan surfaktan nonionik. Alasan digunakannya gelembung dalam penghantaran obat secara transdermal adalah karena komposisinya yang mampu berpenetrasi melalui kulit, berdasarkan fakta ini maka gelembung dapat dijadikan sebagai pembawa obat untuk mengantarkan obat yang terjerap melewati kulit. Olehnya itu, gelembung juga dijadikan sebagai depot untuk pelepasan terkendali dari bahan aktif dalam formulasi topikal. Formulasi liposomal dapat diklasifikasikan dalam dua kategori, yaitu gelembung yang keras kaku seperti liposom dan niosom serta gelembung yang elastis seperti transferosome dan ethosome (Pirvu *et al*, 2010: 130).

Vesicles dapat berupa liposom, niosom transferosom dan *ethosome*, yang membedakan secara mendasar yakni struktur penyusun dari tiap *vesicles*.

### **1. Liposom**



Liposom atau gelembung lemak adalah partikel koloid yang stabil secara termodinamik yang dapat dibuat dari turunan molekul fosfolipid baik dari sumber alam maupun sintetik, berbentuk vesikel spheris mikroskopik, tersusun oleh satu atau lebih lapisan lipid yang dipisahkan oleh lapisan

kompartemen berair. Pertama kali diperkenalkan oleh Bangham pada tahun 1960 (Jufri, 2004: 59; Pirvu *et al*, 2010: 130; Morrow *et al*, 2007: 41; Kozubek *et al*, 2000: 639).

Liposom adalah *Vesicles* yang bersifat mikroskopis yang dibentuk dari fosfolipid dengan atau tanpa kolesterol dalam media berair, menghasilkan struktur bilayer yang tertutup, hidrofilik di bagian kepala dan hidrofobik di bagian ekor, terbentuk secara spontan ketika fosfolipid dihidrasi dengan sejumlah air. Fosfolipid yang paling umum digunakan adalah fosfatidilkolin dari kacang kedelai atau kuning telur, dengan kolesterol yang berfungsi untuk menstabilkan sistem. Liposom yang digunakan sebagai pembawa obat, dapat membawa substansi hidrofilik dalam inti airnya. Substansi amfifilik dan lipofilik dapat diinkorporasikan pada lapis ganda lipid. Untuk bahan obat yang bersifat lipofilik, bentuk liposom multilamellar merupakan pilihan utama, karena jumlah obat yang akan dibawa dan yang terikat pada membran akan lebih banyak. Untuk bahan yang bersifat hidrofilik, besarnya vesikel liposom, yang umumnya hanya terdiri atas satu lapis membran, menentukan jumlah obat yang akan dibawa. Seperti halnya tradisional liposom telah dikembangkan *Vesicles* dengan struktur yang sama seperti *transferosome*, *niosom* dan *ethosome*. (Abdassah, 2011: 1; Vijay *et al*, 2010: 7; Morrow *et al*, 2007: 41).

Liposom telah dicoba untuk dapat menghantarkan beberapa senyawa aktif fisiologis seperti vaksin, antimikroba, anti tumor, antiviral, hemoglobin sebagai pembawa oksigen, serta radiolabel, yang berdasarkan jenis

fosfolipidnya mampu ditujukan ke jaringan yang dikehendaki (sel target)  
(Gregoriadis, 2007; Ranade *et al*, 2004)



Gambar 4. Liposom (Gregoriadis, 2007: 30; Ranade *et al*, 2004)

Liposom secara umum didefinisikan sebagai lemak lapis ganda (*lipid bilayer*) pada ruang berair, secara umum dikelompokkan berdasarkan pada jumlah lapisan (*lamellar*), terdiri atas (Kozubek *et al*, 2000: 640; Rosen *et al*, 2005; Verma *et al*, 2010: 499; Abassah, 2004: 4 – 5) :

### a. *Unilamellar Vesicles*

*Unilamellar Vesicles* hanya berupa satu lapisan lemak tunggal. Liposom unilamellar dapat digunakan untuk menjerap obat-obat larut air ke dalam ruang dalam molekul cairan.

#### 1) *Small Unilamellar Vesicles (SUV)*

Dikelilingi oleh lapisan lemak tunggal, diameternya berkisar 25 – 50 nm (beberapa mengatakan hingga 100 nm). Preparasi *SUV* melalui *Probe Sonicator* menggunakan logam yang dicelup pada suspensi liposom dan akan menggetarkan dispersi. Namun logam kemungkinan akan mengkontaminasi dispersi liposom itu sendiri. Proses sonikasi juga harus dilakukan diatas temperatur transisi lipid yang digunakan. Bila dipanaskan di bawah temperatur tersebut akan menyebabkan agregasi dan terjadi kerusakan pada lipid lapis gandanya.

#### 2) *Large Unilamellar Vesicles (LUVs)*

Merupakan kelompok paling heterogen dari jenis gelembung, sama dengan *SUV*, dikelilingi oleh 1 lapis lemak lapis ganda diameternya berkisar 100 – 1000 nm, dan  $LUV > 1000 \text{ nm} - 100 \mu\text{m}$  disebut Giant Unilamellar Vesicles (*GUV*).

Vesikel *LUV* dibentuk dari emulsi fosfolipid dalam dapar dengan kehadiran fase pelarut organik, diikuti dengan penguapan pelarut organik tersebut di bawah tekanan vakum. Proses ini disebut metode Evaporasi fasa Balik. Liposom *LUV* yang dihasilkan dengan

cara ini disebut REV (*Reverse Evaporation Vesicle*). Vesikel ini mempunyai volume fasa air yang lebih besar dibanding SUV

*b. Multilamellar Vesicles (MLV)*


Mengandung beberapa (hingga 14) lapis lemak lapis ganda, (tersusun seperti bawang merah), dipisahkan satu dengan lainnya oleh lapisan larut air.

Liposom *MLV* dapat dikatakan sebagai bentuk awal liposom. Pertama kali diterangkan oleh Bangham pada tahun 1965. Preparasi *MLV* dapat dibuat dengan cara yang sederhana dengan peralatan laboratorium yang biasa. Lipid akan terdeposit dari pelarut organik dalam bentuk lapis tipis pada permukaan dinding labu dengan menggunakan alat rotari evaporator vakum. Sejumlah larutan dapat ditambahkan dan lipid akan terhidrasi pada temperatur diatas temperatur transisi lipidnya. Untuk meningkatkan ukuran *MLV* yang reproduibel perlu dipertahankan waktu hidrasi dan agitasi. Faktor yang paling penting dalam preparasi *MLV* adalah waktu, proses hidrasi, ketebalan lipid lapis tipis, konsentrasi, komposisi lipid dan volume dapat. Untuk memperkecil dan menyeragamkan ukuran liposom dapat dilakukan dengan pengocokan suspensi liposom dengan vortex, sonikasi atau ekstrusi melalui membrane filter polikarbonat. Teknik ekstrusi yang paling baik untuk menyeragamkan distribusi ukuran liposom.

Liposom multilamellar dapat digunakan untuk obat-obat hidrofobik atau lipofilik yang terpartisi ke dalam fase lemak.

c. *Multivesicular Vesicles (MVV)*

Terbentuk ketika Vesicles atau gelembung kecil terjat dalam gelembung yang besar, kompleks pembentukan ini disebut sebagai Multivesicular Vesicles.



Gambar 5. Struktur Vesikel (Leekumjorn, 2004: 4)

Bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan liposom yakni fosfolipid dengan atau tanpa kolesterol.

a. Fosfolipid

Fosfolipid merupakan komponen yang umum terdapat dalam membran yang digunakan untuk membentuk liposom. Fosfolipid berbentuk pipa yang memiliki dua rantai asil yang bersambung dengan kepala yang polar dan dalam hidrasi. Ada dua jenis fosfolipid yaitu

fosfodiglisericide dan spingolipid bersama dengan produk hidrolisisnya.


Klasifikasi fosfolipid antara lain :

- 1) Netral, contoh spingomialin, fosfatiletanolamin, fosfatidilkolin.
- 2) Negatif, contoh fosfatilidil dipalmitat, asam dipalmitat fosfatidil, fosfatidilkolin distearat, diolet fosfatidilkolin.
- 3) Positif, contoh 1,2 diheksadesil N, N-dimetil-N- trimetil amin metil etanolamin (Vijay *et al*, 2010: 11).

Fosfolipid adalah suatu senyawa ampifilik yang mempunyai struktur dasar gliserol, terdiri dari bagian kepala yang polar (gugus fosfat) dan bagian hidrofobik (satu atau dua molekul asam lemak). Senyawa ini bermuatan netral sampai sedikit negatif. Fosfatidilkolin adalah salah satu fosfolipid yang paling banyak digunakan dalam sistem liposom, terbuat dari telur atau kedelai dan sekarang tersedia dalam bentuk sintetisnya sehingga komposisi asam lemak dari fosfatidilkolin ini dapat diketahui dengan jelas (Abdassah, 2004: 2).

Telah terbukti bahwa fosfolipid secara spontan membentuk struktur yang tertutup ketika terhidrasi dalam air. Karena fosfolipid memiliki sifat ampifatik (hidrofilik dan lipofilik). Sifat termodinamik dan *self-assembly*-nya yang mengarahkan bagian hidrofobik membentuk gelembung bilayer. Aksi *self assembly* dari fosfolipid pada lembaran bilayer menyebabkan turunnya interaksi yang kurang baik antara pelarut dan rantai hidrokarbon panjang lemak sehingga diperoleh energy yang rendah dan stabilitas yang hampir maksimum. Lebih lanjut untuk memperoleh keadaan yang sempurna,

lembaran bilayer mulai melipat atau melekok ke bawah dengan sendirinya membentuk gelembung yang tertutup dimana bagian air berada pada inti. Fenomena ini dapat dipahami secara kuantitatif dengan mempertimbangkan *critical micelle concentration (CMC)* dari fosfatidilkolin dalam air (Vijay *et al*, 2010: 9).




Gambar 6. Mekanisme Pembentukan Liposom (Vijay *et al*, 2010: 7)

Pada stabilitas liposom ada dua jenis utama penyebab dekomposisi lipid yang mungkin terjadi pada lipid lapis ganda adalah reaksi oksidasi dan reaksi hidrolisis. Reaksi oksidasi bisa terjadi pada rantai asam lemak tidak jenuh dari molekul fosfolipid. Jadi harus diperhatikan pada saat preparasi dan cara penyimpanan liposom. Pada proses preparasi dan penyimpanan liposom harus selalu dialiri gas nitrogen atau argon di atasnya dan atau ditambahkan anti oksidan seperti alfa tokoferol ke dalam formulanya. Seleksi fosfolipid dapat dilakukan untuk meminimalisasi proses oksidasi (Abdassah, 2004: 3).

b. Kolesterol

Kolesterol ( $C_{27}H_{45}OH$ ) memiliki berat molekul 386,67, berwarna putih dan sedikit kuning, hampir tidak berbau, bentuk bulat, jarum, serbuk atau granul. Ketika lama terpapar oleh cahaya dan udara maka akan menjadi kuning sampai menjadi gelap. Mudah larut dalam benzene, kloroform, larut dalam aseton (Rowe *et al*, 2009: 178).



Gambar 7. Struktur Kolesterol (Rowe *et al*, 2009: 178)

Kolesterol sering ditambahkan ke dalam komposisi liposom, terakomodasi diantara molekul fosfolipid pada membran lipid lapis ganda liposom dengan perbandingan 1:1. Pengaruh kolesterol terhadap stabilitas liposom adalah untuk pengepakan barisan molekul fosfolipid pada lipid lapis ganda liposom. Jadi molekul protein tidak mudah berpenetrasi ke permukaan liposom (Gregoriadis *et al*, 1984).

Keuntungan dari Liposom (Verma *et al*, 2010: 499):

1. Liposom adalah biokompatibel, biodegradable, tidak beracun, fleksibel dan nonimmunogenik untuk administrasi sistemik dan non-sistemik.

2. Liposom meningkatkan efektivitas dan indeks terapi obat (misalnya actinotherapi-D).
3. Liposom memiliki kemampuan untuk melindungi obat yang dienkapsulasi dari lingkungan eksternal dan bertindak sebagai depot *sustained release* (misalnya propranolol, Cyclosporin).
4. Liposom dapat dibuat dalam bentuk suspensi, sebagai aerosol, atau dalam bentuk setengah padat seperti gel, krim dan lotion.
5. Liposom dapat diberikan melalui mata, paru-paru, hidung, oral, intramuskular, subkutan, topikal dan intravena.
6. Liposom memiliki sisi lipofilik dan air dalam satu sistem dan oleh karena itu cocok untuk pengiriman obat hidrofobik, amfifilik dan hidrofilik.
7. Liposom dapat membungkus tidak hanya molekul kecil tetapi juga makromolekul seperti superoksida dismutase, hemoglobin, erythropoietin, interleukin-2 dan interferon-g.
8. Liposom mengurangi toksisitas dan peningkatan stabilitas obat yang terperangkap melalui enkapsulasi (mis. Amfoterisin B, Taxol).
9. Liposom membantu mengurangi paparan jaringan yang sensitif terhadap obat beracun.
10. Mengubah farmakokinetik dan farmakodinamik obat (mengurangi eliminasi, meningkatkan waktu sirkulasi).

Kekurangan liposom (Verma *et al*, 2010: 500) :

1. Tingginya biaya produksi
2. Kebocoran dan fusi obat enkapsulasi / molekul.
3. Kadang-kadang mengalami oksidasi fosfolipid dan hidrolisis
4. Waktu paruh yang pendek
5. Kelarutan yang rendah
6. Kurang stabil

## **2. *Ethosome***

*Ethosome* merupakan bentuk modifikasi dari liposom yang mengandung etanol yang tinggi. Sistem ethosom terdiri dari fosfolipid, ethanol dan air. *Ethosome* dapat berpenetrasi melalui kulit dan meningkatkan penghantaran obat sampai pada kulit terdalam strata dan sistem sirkulasi (Kumar R *et al*, 2010: 3). *Ethosome* merupakan gelembung pembawa yang terdiri dari hidroalkohol atau hydro/alkohol/glykolik fosfolipid dimana konsentrasi alkohol atau kombinasinya relatif tinggi. Secara khas, ethosom dapat memiliki beberapa fosfolipid dengan struktur kimia yang berbeda seperti fosfotidilkolin, fosfotidilkolin terhidrogenase, asam fosfotidic, fosfotidil serin, fosfotidil etanolamin, fosfotidil gliserol (Kumar *et al*, 2010: 112).

*Ethosome* adalah sistem gelembung yang menarik dan inovatif dalam teknologi farmasi dan penghantaran obat dalam tahun belakang ini, yang menarik dalam pembawa ini adalah kemampuannya untuk berpenetrasi sempurna melalui kulit manusia. *Ethosome* bersifat lembut, gelembung yang

lunak sesuai untuk meningkatkan penghantaran zat aktif. Karakteristik fisika kimia ethosom telah memperlihatkan bahwa gelembung pembawa ini dapat membawa bahan aktif lebih efektif melalui stratum korneum sampai ke lapisan paling dalam kulit dibandingkan dengan liposom. Aspek inilah yang sangat penting dalam desain pembawa yang digunakan secara topikal ataupun pemberian obat secara sistemik (Dave *et al*, 2010: 81; Maurya *et al*, 2011: 34).

*Ethosome* telah digunakan dalam beberapa aplikasi seperti farmasi, bioteknologi, kosmetik dan nutrisi. Gelembung lembut ini menghadirkan pembawa baru dalam meningkatkan penghantaran melalui kulit. Ukuran dari gelembung *ethosome* dapat diatur dari 10 nanometer sampai mikron (Tiwari *et al*, 2010: 449).

#### **a. Keuntungan *Ethosome***


Keuntungan *ethosome* (Singh *et al*, 2010: 63; Wahid *et al*, 2011: 973; Tiwari *et al*, 2010: 450) :

- 1) Ethosom dapat meningkatkan permeasi melalui kulit untuk transdermal dan dermal.
- 2) Ethosom merupakan pembawa dalam penghantaran beberapa obat (peptide dan molekul protein).
- 3) Komposisi ethosom aman dan komponen-komponen ini dapat digunakan dalam farmasi dan kosmetik.
- 4) Tingkat kepatuhan pasien yang tinggi, bentuk ethosom dapat diberikan secara semisolid ( dalam bentuk gel atau krim).


- 5) Tingkat pemasaran yang menarik karena memiliki teknologi yang tinggi. Relatif sederhana dalam pembuatan karena tidak membutuhkan teknik yang khusus.
- 6) Dapat digunakan dalam farmasi, dan kosmetik

#### b. Mekanisme Penetrasi *Ethosome*

Peningkatan penghantaran obat menggunakan *ethosome* dapat digambarkan sebagai interaksi ethosom dengan lipid kulit. Mekanisme interaksi ini telah dikemukakan. *Ethosome* melalui bagian pertama dari mekanisme ini disebut sebagai Efek etanol, dimana interaksi etanol pada lipid interseluler meningkatkan cairan lipid dan mengurangi kerapatan lapisan-lapisan lipid. Kemudian diikuti dengan efek *ethosome*, dimana efek ini memasuki penetrasi lipid interseluler dan permeasi dengan membuka jalan kecil karena kelunakannya dan melakukan fusi pada bagian kulit, sebagai hasil pelepasan obat pada bagian terdalam kulit (Anitha *et al*, 2011: 19; Tiwari *et al*, 2010: 449; Akiladevi *et al*, 2010: 1).



Gambar 8. Mekanisme Penerasi Ethosom pada Kulit ( Kumar R *et al*, 2010: 4)



Gambar 9. Mekanisme Penerasi *Ethosome* pada Kulit (Maurya *et al*, 2011:42)

**c. Metode Pembuatan *Ethosome*** (Wahid *et al*, 2011: 973; Maurya *et al*, 2011: 209)


Ethosom dapat diformulasi dengan dua metode yakni dengan metode panas dan dingin.

1) Metode dingin


Metode ini merupakan metode umum yang digunakan dalam pembuatan ethosom. Dalam metode ini, fosfolipid, obat, dan lipid lainnya dicampur. Propilen glikol atau poliol lainnya ditambahkan ketika sedang diaduk. Campuran ini dipanaskan sampai suhu 30° C dalam penangas. Air dipanaskan sampai 30°C dalam tempat yang berbeda kemudian ditambahkan dalam campuran tadi, kemudian diaduk selama 5 menit dalam keadaan tertutup.

## 2) Metode panas


Dalam metode ini fosfolipid didispersikan dalam air dengan pemanasan dengan menggunakan penangas pada suhu 40°C sampai terbentuk larutan koloid. Pada tempat yang lain ethanol dan propilen glikol dicampur dan dipanaskan sampai suhu 40°C. Secara bersamaan keduanya dicampur pada suhu 40°C, fase organik ditambahkan pada fase air. Obat yang dilarutkan dalam air atau ethanol tergantung dalam sifat hidrofilik/ hidrofobik. Ukuran dari formula ethosom dapat dikurangi dengan menggunakan sonikasi atau ekstruksi.



Gambar 10. Skema Pembuatan *Ethosome* (Wahid *et al*, 2011: 973)



Gambar 11. Skema pembuatan *Ethosom* Metode Dingin (Wahid *et al*, 2011: 973)



Gambar 12. Skema pembuatan *Ethosome* Metode Panas (Wahid *et al*, 2011: 974)

**d. Metode karakterisasi *ethosome*** (Wahid *et al*, 2011: 974; Kumar R *et al*, 2010: 4; Girhepunje *et al*, 2010: 361)

- 1) *surface morphology*: *Trannmission Electron Microscope* (TEM) dan *Scanning Electron Microscope* (SEM) dapat digunakan untuk mengetahui bentuk Vesicle dan *surface morhology*. TEM dapat menggunakan asam phosfotungistic sebagai kontrol negatif.
- 2) Ukuran Vesicle dan kadar yang terdistribusi: Dapat diketahui dengan metode *Dinamic Light Scattering* (DLS), menggunakan sistem pendeteksian secara komputerisasi
- 3) Efisiensi penjerapan: Kemampuan ethosom dalam menjerap obat ke bagian hidrofilik dan lipofilik dapat diukur dengan menggunakan tehnik ultrasentrifugasi dan fluoresensi spektrofotometri.
- 4) Suhu transisi: Suhu transisi dari sistem vesikular lipid dapat ditentukan dengan metode *Differential Scanning Calorumetry* (DSC)
- 5) Aktifitas tegangan antar muka: Dapat diukur di dalam larutan berair dengan tensinometer de Nouy.
- 6) Turbiditas: Diukur dengan nephalometer
- 7) Interaksi antara vesicle dengan kulit: Dapat diuji dengan transmisi mikroskopi elektron atau *Confocal Laser Scanning Microscope* (CSLM) atau fluoresensi mikroskop atau *hematoxylin staining* (eosin). Untuk fluoresensi mikroskop, ethosom harus di fluoresensikan seperti dengan rhodamin

- 8) Penentuan derajat deformabilitas atau elastisitas: elastisitas membran *vesicles* ethosom dapat ditentukan dengan metode ekstruksi. Formula ethosom di ekstruksi melewati membran filter (diameter pori 50 nm) menggunakan filter dari *stainless steel*, dengan tekanan 2,5 bar.
- 9) Zeta potensial: Zeta potensial dapat diukur dengan zeto meter atau dengan metode *Dinamic Light Scattering* (DLS).
- 10) Interaksi fosfolipid – etanol: Dapat diukur dengan  $^{31}\text{P}$  NMR atau dengan *Differential Scanning Calorimeter* (DSC)
- 11) Kadar obat: Diukur dengan teknik *High Performance Liquid Chromatographic* (HPLC)
- 12) Stabilitas: *Dinamic Light Scattering* atau *Transmission Electron Microscope* dapat digunakan untuk mengetahui stabilitas ethosom
- 13) Penetrasi dan penyebaran: Kedalaman penetrasi dari ethosom dapat ditentukan dengan *Confocal Laser Scanning Microscope* (CLSM)
- 14) Penyebaran pada kulit (*in vitro*): Karakteristik penyebaran secara *in vitro* dari formula ethosom dapat dilakukan dengan menggunakan franz difusi sel dengan tiruan atau dialisis bag diffusion atau membran biologi seperti epidermis manusia, kulit abdomen mencit, kulit abdomen tikus, kulit kelinci.

**e. Bahan-bahan yang digunakan dalam *ethosome***

*Ethosome* utamanya terdiri dari fosfatidilkolin, hidroalkohol, glikol dengan konsentrasi yang tinggi, dan air. Fosfatidilkolin yang



atau lebih membran kosentris, masing-masing mengelilingi bagian air).

Lipid lapis ganda terbentuk karena sifat termodinamika fosfolipid, terjadi transisi struktur lipid lapis ganda dari fasa gel (padat) menjadi fasa kristal cair karena pengaruh perubahan temperatur. Hal ini berkaitan erat dengan penggunaan liposom sebagai penghantar obat dalam proses preparasi dan pemilihan jenis fosfolipid. Sifat termodinamika yang harus diperhatikan pada fosfolipid adalah fasa transisi dan interaksi molekular dari fosfolipid (Abdassah, 2004: 2). Dalam hal ini, maka pemilihan metode pembuatan ethosom juga sangat diperhatikan. Temperatur yang digunakan dalam pembuatan ethosom adalah 30°C dan 40°C tergantung dari suhu transisi fosfolipid yang digunakan. untuk membentuk gelembung dengan penjerapan obat yang optimal.

## 2) Etanol

Etanol dengan konsentrasi yang berbeda luas digunakan dalam formulasi farmasi dan kosmetik. Walaupun etanol utamanya digunakan sebagai solven, ini juga digunakan sebagai disinfektan, dalam beberapa larutan digunakan sebagai pengawet. Secara topikal, larutan etanol digunakan dalam pengembangan sistem penghantaran obat secara transdermal sebagai peningkat penetrasi. Etanol juga telah digunakan dalam pengembangan sediaan transdermal sebagai kosurfaktan (Rowe *et al*, 2009: 17).



Gambar 14. Struktur Etanol (Rowe *et al*, 2009: 17)

Touitou menemukan dan menyelidiki sistem gelembung lipid yang ditambahkan alkohol dengan konsentrasi relatif tinggi dan dinamakan ethosom. Perbedaan mendasar pada liposom dan ethosom terletak pada komposisinya. Efek sinergik dari kombinasi etanol dengan konsentrasi yang tinggi 20-50% dalam gelembung membentuk ethosom telah disarankan sebagai alasan utama untuk kemampuan yang lebih baik dalam permeasi kulit. Konsentrasi etanol yang tinggi 20- 50% dalam formulasi ethosomal mengganggu aturan lipid bilayer kulit. Oleh karena itu, ketika terintegrasi ke dalam gelembung membran, ini akan memberikan kekuatan terhadap gelembung untuk berpenetrasi ke stratum korneum. Sejauh ini dalam kaitannya dengan konsentrasi etanol yang tinggi, membran lipid ethosomal telah dikemas lebih renggang dibanding dengan gelembung konvensional tetapi memiliki stabilitas yang sama. Inilah yang membuat strukturnya lebih lembut dan lunak yang memberikan kebebasan yang lebih dan stabil pada membran, yang mana akan menyelip masuk melalui lipid stratum korneum yang diintegrasi (Kumar *et al*, 2010: 112).

Dalam Anitha, *et al* (2011), Etanol diketahui bahan kimia peningkat penetrasi dapat mengurangi penghalang dari stratum korneum. Sebagai bahan pelarut, etanol dapat digunakan untuk

meningkatkan kelarutan obat. Etanol akan hilang dari formula sehingga menjadi sistem yang tersaturasi yang akan mempengaruhi obat terus menerus melewati membran, penambahan etanol akan mengubah sifat kelarutan stratum korneum. Etanol telah diujikan sebagai peningkat penetrasi pada levonogesterol, hidrokortison dan 5-florouracil pada kulit binatang (Williams AC, 2003) dan estradiol pada kulit manusia secara *in vivo* (Friend D, 1988), mereka menyelidiki pengaruh etanol pada kulit dan menyimpulkan bahwa dengan konsentrasi etanol yang tinggi dapat mendehidrasi kulit.


Konsentrasi etanol yang tinggi menyebabkan ukuran partikel menurun, ketebalan membran berkurang karena adanya interaksi dengan rantai hidrokarbon (Maurya *et al*, 2011:36; Girhepunje *et al*, 2010:363). Etanol menurunkan tegangan permukaan dengan merubah muatan total dari sistem menjadi lebih stabil sehingga ukuran partikel menjadi kecil, ukuran partikel bertambah dengan pengurangan konsentrasi etanol (Dave *et al*, 2010:82). Efisiensi penyerapan dari *ethosome* tergantung dari konsentrasi etanol, konsentrasi etanol yang tinggi sebanding penyerapan obat (Dave *et al*, 2010:82)

#### ***D. Uraian Umum Nifedipin***

##### **1. Sifat Fisika Kimia**

Nifedipin adalah obat hipertensi golongan *Calcium Chanal Bloker* (CCB), dengan rumus kimia  $C_{17}H_{18}N_2O_6$  dan nama kimia Dimethyl 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate. Berat

molekul nifedipin 346,3. Nifedipin berupa serbuk kristal berwarna kuning, terurai oleh cahaya langsung dengan titik leleh 172 sampai 174. Nifedipin praktis tidak larut dalam air, sedikit larut dalam ethanol, larut dalam aseton dan kloroform, memiliki koefisien partisi log P (oktanol/air) 2,2 dan memiliki panjang gelombang spektra UV pada larutan asam 238 nm ( $A^1_{1}=595b$ ) dan 338 nm ( $A^1_{1}=165b$ ) (Sweetman, 2009: 811; Dirjen POM, 1995: 611-613; Moffat *et al*, 2005: 1337).



Gambar 15. Struktur Nifedipin (Sweetman, 2009: 811).

Ketika terpapar sinar matahari atau cahaya dengan panjang gelombang buatan akan berubah menjadi derivat nitrofenilpiridin, paparan sinar UV berperan penting dalam terbentuknya derivat nitrofenilpiridin. Bentuk larutannya dibuat pada tempat yang gelap atau dengan cahaya yang mempunyai panjang gelombang lebih besar dari 420 nm. Digunakan segera setelah pemakaian pertama. Terlindung dari cahaya (Sweetman, 2009: 811).

## 2. Farmakologi

Nifedipin termasuk senyawa kelompok 1,4-dihidropiridin dengan gugusan fenil pada posisi *para*, merupakan antagonis kalsium yang digunakan untuk pengobatan angina dan hipertensi, yang khasiat utamanya

berupa vasodilatasi. Pada penggunaan secara oral lebih dari 80 % diabsorpsi di usus, akan tetapi ketersediaannya hayatnya lebih rendah sekitar (40-60 %) karena adanya *first pass effect* (Mutschler, 1999: 477). Waktu paruh plasma sekitar 2 – 6 jam, ikatan protein plasma sekitar 92 – 98 % (Moffat *et al*, 2005: 1337).

#### a. Hipertensi

Dalam sel normal, kadar ion kalsium bebas lebih rendah daripada ruang ekstrasel. Perubahan atau pengaturan dapat dilakukan dengan pembukaan atau penutupan saluran kalsium, pembebasan atau pengikatan kalsium intrasel serta oleh pompa ion kalsium yang terdapat dalam membran sel dan dalam membran intrasel (Mutschler, 1999: 475). Antagonis kalsium menghambat masuknya kalsium ke dalam sel-sel otot polos koroner jantung. Menghambat influks kalsium pada sel otot polos pembuluh darah dan miokard. Di pembuluh darah, antagonis kalsium terutama menimbulkan relaksasi arteriol, sedangkan vena kurang dipengaruhi (Gunawan, 2007: 358). Hal ini menurunkan resistensi perifer dan menyebabkan penurunan tekanan darah karena konsentrasi ion kalsium (bebas) intrasel menentukan keadaan kontraktibilitas sel otot polos pembuluh, jelaslah bahwa antagonis kalsium bekerja sebagai vasodilatasi (Mutschler, 1999: 489). Sifat antagonis kalsium adalah :

- 1) Golongan dihidropiridin (nifedipin, nikardipin, isradipin) bersifat vaskuloselektif yang menguntungkan karena menurunkan resistensi perifer tanpa penurunan fungsi jantung yang berarti dan relatif aman dalam kombinasi dengan  $\beta$ -bloker.

- 2) Bioavailabilitas oral relatif rendah, disebabkan karena eliminasi presistemik (metabolisme lintas pertama) yang tinggi di hati.
- 3) Kadar puncak tercapai dengan cepat, hal ini menyebabkan tekanan darah turun dengan cepat dan ini dapat mencetuskan iskemia miokard atau serebral.
- 4) Waktu paruh umumnya pendek/sedang, sehingga kebanyakan harus diberikan 2 atau 3 kali sehari.
- 5) Semua antagonis kalsium dimetabolisme di hati, penggunaannya pada sirosis hati dan usia lanjut harus dilakukan dengan sangat hati-hati.

Efek penurunan tekanan darah akan makin besar, jika tekanan darah awal makin tinggi. Pada orang dengan tekanan darah normal, pada penggunaan obat dengan dosis terapeutik, tekanan darah hampir tidak berubah (Mutschler, 1999: 489). Pada pasien hipertensi, dalam suatu penelitian retrospektif menunjukkan bahwa penggunaan penyekat kanal kalsium kerja singkat terutama dengan dosis tinggi berhubungan dengan peningkatan bahaya infark jantung.

Nifedipin kerja singkat paling sering menyebabkan hipotensi dan dapat menyebabkan iskemia miokard atau serebral. Refleks takikardia dan palpitasi mempermudah terjadinya serangan angina pada pasien PJK. Hipotensi sering terjadi pada pasien usia lanjut. Nifedipin lepas lambat dengan mula kerja yang lambat menimbulkan efek samping yang lebih jarang dan lebih ringan (Gunawan, 2007: 359).

## b. Angina

Antagonis kalsium memblok kanal kalsium tipe L yang sensitif terhadap tegangan pada otot polos arteri, menyebabkan vasodilatasi. Nifedipin kurang mempengaruhi kinetik kanal kalsium, sehingga tidak tergantung pada frekuensi stimulasi dan tidak mempengaruhi konduksi jantung tetapi mempunyai efek yang lebih kuat terhadap otot polos dari otot jantung atau sistem konduksi (Gunawan, 2007: 370). Nifedipin diberikan oral dan mempunyai waktu paruh lebih pendek (kira-kira 4 jam) sehingga perlu dosis berulang. Efek vasodilatasi nifedipin berguna dalam pengobatan angina yang disebabkan spasme koroner spontan. Efek samping disebabkan karena vasodilatasi berlebihan yang dapat menyebabkan penurunan tekanan darah yang tidak diinginkan, kenaikan frekuensi jantung reflektoris, sakit kepala, pusing, mual, gangguan saluran cerna, kemerahan kulit dan urtikaria pada kaki (Mutschler, 1999: 477). Kontraindikasinya pada aritmia dan hipotensi parah (Gunawan, 2007: 359).

## ***E. Tinjauan Agama***

### **1. Manusia Sebagai *Hayawanun Nuthqi***

Manusia adalah makhluk Allah yang tersusun dari unsur roh dan unsur tubuh (jasad). Roh itu adalah suatu unsur *Ilahy*, yaitu sesuatu yang hanya Allah sajalah yang mengetahui akan hakikat dan rahasianya, tiada seorang pun yang bercokol di dunia ini berhak untuk mengetahuinya dan bahkan tidak diberi kesanggupan oleh Allah untuk memahaminya. Roh itu

tidak terdiri dari kumpulan benda (materi) sebagaimana jasad dan benda-benda lain yang dapat dilihat dengan pancaindera kita ini (Ahnan, - :15).

Unsur roh inilah yang menyebabkan daging, tulang darah, kulit, rambut, sel-sel dapat berkembang dan tumbuh, dan menyebabkan tubuh itu hidup dan bergerak, berketurunan dan berkembang biak. Dengan unsur roh inilah yang menyebabkan manusia dapat melihat, mendengar, merasa, berpikir, bergembira, berduka cita, mempunyai rasa benci, rasa marah, susah, senang, bahagia, dan lain-lain. Dan dengan unsur roh ini pula menjadikan manusia makhluk pemalu, bermoral, sosial, dan susila atau menjadi makhluk yang tidak tahu malu, amoral, asusila atau asosial (Ahnan, - :15).

Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk (kejadian), diberinya akal, agar dia dapat memikirkan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang dapat mendatangkan manfaat dan madhlarat, mana yang halal dan haram. Dilengkapinya dengan nafsu, alat untuk mendorong gairah hidup supaya mempunyai keinginan-keinginan, agar hidupnya meningkat, berprestasi dan maju terus. Bilamana anugerah Allah itu dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan tempatnya, alangkah bagus dan tingginya derajat manusia itu. Dan bilamana anugerah Allah (akal dan nafsu) disalah gunakan, tidak pada tempatnya, akalnya dipakai untuk merusak sehingga orang lain menderita karenanya. Begitupula nafsunya yang mendorong dirinya untuk berbuat jahat dan keji, niscaya hina

dinalah nilai manusia bahkan lebih hina dari binatang ternak. Dalam alqur'an At-Tiin (95) : 4 – 5, Allah berfirman:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ  
أَسْفَلَ سَافِلِينَ ﴿٥﴾

Terjemahannya:

Sesungguhnya kami Telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya (Departemen Agama RI, 2009: 708 jilid 10).

Dengan berdalilkan ayat diatas, jelaslah bahwa manusia itu lebih kejadiannya dari mahluk (benda yang maujud) yaitu mahluk benda yang tidak mempunyai akal dan nafsu. Nasib jumud (yakni benda yang tidak mempunyai akal dan nafsu) itu hanya menerima takdir saja, apa yang didatangkan kepadanya, tidak ada baginya protes, usul, sanggahan dan sebagainya.

Menurut ilmu manthiq (logika) manusia dirumuskan sebagai “*hayawanunnutqhy*” artinya mahluk yang berpikir. Berpikir inilah yang menjadikan perbedaan antara manusia dengan hewan secara menyeluruh, walaupun manusia dan hewan sama-sama menikmati fungsi pancaindera. Namun manusia tetap berbeda dan lebih unggul dari hewan, karena akal budi yang dianugerahkan Allah dan kemampuan berpikir yang memungkinkannya untuk mengadakan tinjauan dan pembahasan terhadap berbagai masalah dan peristiwa. Kemampuan berpikir inilah yang membuatnya patut diberi kewajiban untuk melaksanakan berbagai ibadah

dan memikul tanggung jawab pemilihan dan kehendak. Dengan akal inilah manusia ditempatkan dalam status istimewa, pengatur alam ini dan sekaligus sebagai khalifah *fil ardlī* (Ahnan, - : 20).

Manusia adalah makhluk yang dilengkapi Allah sarana berpikir. Namun sayang, kebanyakan mereka tidak menggunakan sarana yang teramat penting ini sebagaimana mestinya. Bahkan pada kenyataannya sebagian manusia hampir tidak pernah berpikir. Sebenarnya, setiap orang memiliki tingkat kemampuan berpikir yang seringkali ia sendiri tidak menyadarinya. Ketika mulai menggunakan kemampuan berpikir tersebut, fakta-fakta yang sampai sekarang tidak mampu diketahuinya, lambat-laun mulai terbuka di hadapannya. Semakin dalam ia berpikir, semakin bertambahlah kemampuan berpikirnya dan hal ini mungkin sekali berlaku bagi setiap orang. Harus disadari bahwa tiap orang mempunyai kebutuhan untuk berpikir serta menggunakan akalnya semaksimal mungkin (Yahya, 2000: 10).

Kebanyakan manusia tidak berpikir sebagaimana seharusnya mereka berpikir dan tidak mengembangkan sarana dan potensi berpikir mereka. Namun ada satu hal lagi yang penting untuk dijelaskan di sini. Tidak dapat dipungkiri bahwa hal-hal tertentu selalu terlintas dalam benak manusia setiap saat sepanjang hidupnya. Hampir tidak ada masa, kecuali ketika tidur, dimana pikiran manusia benar-benar kosong. Sayangnya, sebagian besar dari pikiran-pikiran ini tidak berguna, "sia-sia" dan "tidak perlu", sehingga

tidak akan bermanfaat di akherat kelak, tidak menuntun ke arah yang benar dan tidak mendatangkan kebaikan kepadanya.

Seperti halnya membuang waktu dengan melakukan pekerjaan yang sia-sia dalam kehidupan sehari-hari, manusia adakalanya pula menghabiskan waktunya secara sia-sia dengan terbawa oleh pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat. Dalam ayat: "*Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman ... yaitu ... (dan) orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna*" (QS. Al-Mukminun, 23: 1&3), Allah mengajak manusia agar bersungguh-sungguh dalam masalah ini. Sudah pasti bahwa perintah Allah di ayat tersebut juga berlaku dalam hal berpikir. Sebab pikiran-pikiran yang tidak terkendali akan terus-menerus mengalir dalam benak seseorang. Seseorang dengan sadar mengalihkan pikirannya dari satu hal ke hal lain. Ketika sedang dalam perjalanan pulang ke rumah, seseorang memikirkan rencana untuk berbelanja. Mendadak kemudian ia berpikir tentang hal lain, yakni apa-apa yang pernah dikatakan temannya satu atau dua tahun yang lalu. Pikiran yang tidak terkontrol dan tidak berguna ini dapat berlangsung terus-menerus sepanjang hari. Padahal, yang kuasa mengontrol pikiran-pikiran tersebut adalah dirinya sendiri. Setiap orang memiliki kemampuan untuk memikirkan sesuatu yang dapat memperbaiki keadaan dirinya; meningkatkan keimanan, kemampuan berpikir, perilaku, serta memperbaiki keadaan sekelilingnya (Yahya, 2000: 25).

Ada banyak sebab yang menghalangi manusia untuk berpikir. Satu, atau beberapa, atau semua sebab ini dapat mencegah seseorang untuk berpikir dan memahami kebenaran. Oleh karena itu, perlu kiranya setiap orang mencari faktor-faktor yang menyebabkan mereka berada dalam kondisi yang kurang baik tersebut, dan berusaha melepaskan diri darinya. Jika tidak dilakukan, ia tidak akan mampu mengetahui realitas yang sebenarnya dari kehidupan dunia yang pada akhirnya menghantarkannya kepada kerugian besar di akhirat.

Kelumpuhan mental akibat mengikuti kebanyakan orang, satu sebab yang membuat kebanyakan orang tersesat adalah keyakinannya bahwa apa yang dilakukan "sebagian besar" manusia adalah benar. Manusia biasanya lebih cenderung menerima apa yang diajarkan oleh orang-orang disekitarnya, daripada berpikir untuk mencari sendiri kebenaran dari apa yang diajarkan tersebut. Ia melihat bahwa hal-hal yang pada mulanya kelihatannya janggal seringkali dianggap biasa oleh kebanyakan orang, atau bahkan tidak terlalu dipedulikan. Maka setelah beberapa lama, ia kemudian menjadi terbiasa juga dengan hal-hal tersebut (Yahya, 2000: 29).

Kemalasan mental, Kemalasan adalah sebuah faktor yang menghalangi kebanyakan manusia dari berpikir. Akibat kemalasan mental, manusia melakukan segala sesuatu sebagaimana yang pernah mereka saksikan dan terbiasa mereka lakukan. Untuk memberikan sebuah contoh dari kehidupan sehari-hari: cara yang digunakan para ibu rumah tangga dalam membersihkan rumah adalah sebagaimana yang telah mereka lihat

dari ibu-ibu mereka dahulu. Pada umumnya tidak ada yang berpikir, "Bagaimana membersihkan rumah dengan cara yang lebih praktis dan hasil yang lebih bersih" dengan kata lain, berusaha menemukan cara baru. Demikian juga, ketika ada yang perlu diperbaiki, manusia biasanya menggunakan cara yang telah diajarkan ketika mereka masih kanak-kanak. Umumnya mereka enggan berusaha menemukan cara baru yang mungkin lebih praktis dan berdaya guna (Yahya, 2000: 30).

Anggapan bahwa berpikir secara mendalam tidaklah baik, ada sebuah kepercayaan yang kuat dalam masyarakat bahwa berpikir secara mendalam tidaklah baik. Mereka saling mengingatkan satu sama lain dengan mengatakan "jangan terlalu banyak berpikir, anda akan kehilangan akal". Sungguh ini tidak lain hanyalah omong kosong yang didengung-dengungkan oleh mereka yang jauh dari agama. Yang seharusnya dihindari bukanlah tidak berpikir, akan tetapi memikirkan keburukan, atau terjerumus dalam keragu-raguan, khayalan-khayalan atau angan-angan kosong (Yahya, 2000: 32).

Berlepas diri dari tanggung jawab melaksanakan apa yang diperoleh dari berpikir, kebanyakan manusia beranggapan bahwa mereka dapat mengelak dari berbagai macam tanggung jawab dengan menghindarkan diri dari berpikir, dan mengalihkan akalnya untuk memikirkan hal-hal yang lain. Dengan melakukan yang demikian di dunia, mereka berhasil melepaskan diri mereka sendiri dari beragam masalah. Satu diantara banyak hal yang sangat menipu manusia adalah anggapan bahwa mereka akan dapat

membebaskan diri dari kewajiban mereka kepada Allah dengan cara tidak berpikir. Inilah sebab utama yang membuat mereka tidak berpikir tentang kematian dan kehidupan setelahnya. Jika seseorang berpikir bahwa ia suatu hari akan mati dan selalu ingat bahwa ada kehidupan abadi setelah mati, maka ia wajib bekerja keras untuk kehidupannya setelah mati. Tetapi ia telah menipu dirinya sendiri ketika berkeyakinan bahwa kewajiban tersebut akan lepas dengan sendirinya ketika ia tidak berpikir tentang keberadaan akhirat. Ini adalah kekeliruan yang sangat besar, dan jika seseorang tidak mendapatkan kebenaran di dunia dengan berpikir, maka setelah kematiannya ia baru akan menyadari bahwa tidak ada jalan keluar baginya untuk meloloskan diri (Yahya, 2000: 33).

Tidak berpikir akibat terlenakan oleh kehidupan sehari-hari, kebanyakan manusia menghabiskan keseluruhan hidup mereka dalam "ketergesa-gesaan". Ketika mencapai umur tertentu, mereka harus bekerja dan menanggung hidup diri mereka dan keluarga mereka. Mereka menganggap hal ini sebagai sebuah "perjuangan hidup". Dan, karena harus bekerja keras, jungkir balik dalam pekerjaan, mereka mengatakan tidak mempunyai waktu lagi untuk hal-hal yang lain, termasuk berpikir. Akhirnya mereka pun terbawa larut oleh arus ke arah mana saja kehidupan mereka ini membawa mereka. Dengan demikian, mereka menjadi tidak peka lagi dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar (Yahya, 2000: 34).

Melihat segala sesuatu dengan "penglihatan yang biasa", sekedar melihat tanpa perenungan, ketika melihat beberapa hal yang baru untuk

pertama kalinya, manusia mungkin menemukan berbagai hal yang luar biasa yang mendorong mereka berkeinginan untuk mengetahui lebih jauh apa yang sedang mereka lihat tersebut. Namun setelah sekian lama, mereka mulai terbiasa dengan hal-hal ini dan tidak lagi merasa takjub. Terutama sebuah benda ataupun kejadian yang mereka temui setiap hari sudah menjadi sesuatu yang "biasa" saja bagi mereka (Yahya, 2000: 36).

Dalam alqur'an, Allah menyatakan bahwa orang-orang yang beriman memikirkan dan merenungkan secara mendalam segala kejadian yang ada dan mengambil pelajaran yang berguna dari apa yang mereka pikirkan. Dalam alqur'an Ali Imran (3) : 190-191 Allah berfirman:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ  
 لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا  
 وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ  
 رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطِيلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan Ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, Maka peliharalah kami dari siksa neraka (Departemen Agama RI, 2009: 95 jilid 2).

Ayat di atas menyatakan bahwa oleh karena orang-orang yang beriman adalah mereka yang berfikir, maka mereka mampu melihat hal-hal yang menakjubkan dari ciptaan Allah dan mengagungkan kebesaran serta kebijaksanaan Allah.

Islam memerintah dan mengharuskan supaya kita suka memikirk-mikirkan, mengag-nagkan kepada kerajaan langit dan bumi ini, sebab berpikir itu memang pekerjaan otak. Dengan otak itulah manusia dapat dibedakan dari makhluk yang lain-lain seperti binatang atau tumbuh-tumbuhan. Jadi jikalau otak sudah tidak digunakan menurut tugas yang sewajarnya, tidak dipakai sebagaimana mestinya, maka keistimewaan yang dimiliki oleh seseorang itu menjadi lenyap dan tidak berarti sama sekali, tidak pula akan bertugas sebagai pendorong kemajuan umat atau keluhuran dalam kehidupan ini (Ahnan, - : 27).

Rasulullah dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, bersabda:

تَفَكَّرْ سَاعَةً خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ

Artinya:

“berpikir sesaat (sejenak) itu lebih baik daripada beribadah satu tahun”

Imam syafi'i berkata: “Mintalah pertolongan untuk berbicara itu dengan berdiam diri dan untuk mengambil ketentuan atau keputusan itu dengan berpikir”, Hatim berkata: “Dari perumpamaan (contoh) bertambahlah ilmu pengetahuan, dari mengingat-ingat bertambahlah kecintaan dan dari

berpikir bertambalah ketakutan pada Tuhan”, dan Umar bin Abdul Aziz menegaskan: “Berpikir tentang karunia Allah, adalah ibadah paling utama” (Ahnan, - : 38,39).

‘Athak bercerita: “pada suatu hari aku dan ‘Ubaid bin Umair berkunjung ketempat ‘Aisyah (Isteri Rasulullah) dan beliau berbicara kepada kami dibalik tirai pembatas, ujar beliau: Hai ‘Ubaid, kenapa anda tidak datang-datang mengunjungi kami? Ada apa dan mengapa? Jawabku: Disebabkan suatu sabda Rasulullah, kunjungan yang jarang itu menambah sayang. ‘Ubaid lalu bermohon: Sudilah Ibu (‘Aisyah) memberitahukan hal yang paling ajaib tentang perilaku Rasulullah.

Mendengar ini ‘Aisyah pun berlinang air mata, dan ujar beliau: semua hal ihwal Rasulullah adalah ajaib. Suatu ketika giliran dirumahku beliaupun datang, dan kami tiduran sehingga kulitku bersentuhan dengan kulit beliau, dan beliau bersabda: “Biarkanlah aku beribadah kepada Allah, lalu beliau tegak menuju ke tempat air lalu berwudu”, kemudian berdiri melakukan sholat seraya menangis tersedu-sedu sehingga janggut beliau basah, beliau sujud sehingga air matanya membasahi lantai. Seterusnya beliau berbaring menyisi sampai datang Bilal memberitahu untuk sholat Subuh (melakukan azan). Bilal bertanya: Ya Rasulullah, kenapa anda menangis juga, padahal Allah telah mengampuni dosa anda yang telah lalu maupun yang akan datang? Jawab beliau: “Wahai Bilal yang malang, tidak ada alasan bagiku uncut tidak menangis, sedang dimalam tadi Allah telah menurunkan ayat: Sesungguhnya dalam kejadian langit dan bumi, dan

pergantian malam dan siang mengandung berbagai tanda, ayat-ayat untuk orang-orang yang berpikir/ berakal. Lalu ujar beliau lagi: Sungguh celaka orang-orang yang membaca ayat ini, namun tiada bertafakkur/ merenungkannya !” (Ahnan, - : 39). Salah satu implementasi dari ayat yang dimaksud, dalam bidang farmasi, salah satunya dengan menggunakan akal pikiran menemukan terobosan baru, alternatif pengobatan yang terbaik dalam hal pengobatan hipertensi/ penyakit darah tinggi yang penggunaannya dikembangkan dari sistem peroral (diminum) menjadi sistem transdermal (pengobatan melalui kulit).

Seluruh ahli berpikir berpendapat, bahwa kemajuan ummat itu terletak pada kemajuan berpikir. Inilah rahasianya, oleh sebab itu islam datang dengan membawa ajaran yang terpenting yakni membebaskan akal tiap manusia dari belenggu perbudakannya, ditinggalkanlah semua sisa-sisa kebekuan otak itu, sekalipun belenggu-belenggu mengikatnya bertahun-tahun bahkan berabad-abad lamanya. Dalam hal ini Allah dalam alqur'an Yunus (10) : 101, berfirman:

قُلْ أَنْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ  
وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ

Terjemahnya:

Katakanlah: "Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman" (Departemen Agama RI, 2009: 368 jilid 4).

Dalam ayat ini, banyak yang dapat diperhatikan, satu diantaranya saja, bila menggunakan akal yang dianugerahkan Allah, sudah cukup untuk mengantar manusia beriman dan menyadari bahwa Allah Mahakuasa, Dia Maha Esa dan Dia membimbing manusia antara lain melalui perantaraan para Nabi guna mengantar manusia ke jalan bahagia (Shihab, 2010: 515 jilid 4).

Dan dalam Al-A'rof (7) : 185, firman-Nya:

أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجْلُهُمْ ۖ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ

بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿١٨٥﴾

Terjemahnya:

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala sesuatu yang diciptakan Allah, dan kemungkinan telah dekatnya kebinasaan mereka? Maka kepada berita manakah lagi mereka akan beriman sesudah alqur'an itu” (Departemen Agama RI, 2009: 534 jilid 3).

Berdasarkan ayat-ayat di atas, dapat memberikan gambaran kepada ummat manusia bahwa kemajuan ummat terletak pada cara berpikirnya, dan berdasarkan ayat ini juga menjadi landasan bagi kita untuk meneliti, menemukan, dan mencetuskan gagasan baru untuk kemajuan Bangsa dan Agama seperti halnya dibidang farmasi, salah satunya, dengan menemukan alternatif-alternatif pengobatan yang terbaik.

Islam tidak memberikan batas sama sekali dalam persoalan kemerdekaan berpikir ini. Akal harus digunakan untuk berpikir digiatkan

untuk melaksanakan tugasnya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Baqoroh (2) : 219 :

... كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Terjemahnya:

“. . . Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir” (Departemen Agama RI, 2009: 320 jilid 1).

Hanyalah satu yang dilarang oleh Islam untuk dipikirkan atau diperdalam cara pemecahannya, yaitu dalam hal Dzatullah sendiri, sebab dzat Allah itu pasti tidak akan dapat dijangkau oleh otak dan pikiran manusia manapun juga.

Orang yang tidak mau menggunakan akalinya untuk memikirkan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Tuhan sehingga hatinya beku, matanya buta dan telinganya pekak terhadap *Al-Haq* (kebenaran), martabat dan kedudukannya jatuh ketempat yang paling rendah, lebih hina dari binatang yang merayap di bumi ini. Dalam alqur'an Al-Anfal (8) : 22 berfirman :

﴿ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ ﴿٢٢﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya binatang (mahluk) yang seburuk-buruknya pada sisi Allah ialah orang-orang yang pekak dan tuli, yang tidak mengerti apa-apapun” (Departemen Agama RI, 2009: 592 jilid 3).

Dan firman-Nya lagi dalam Al-Furqon (25) : 44 :

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ إِنَّ هُمْ إِلَّا  
 كَالْأَنْعَامِ ۗ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٤٤﴾

Terjemahnya:

“Atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami. mereka itu tidak lain, hanyalah seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya (dari binatang ternak itu) (Departemen Agama RI, 2009: 26 jilid 7).

Ayat-ayat ini menjelaskan ganjaran bagi orang yang tidak mau berpikir untuk menggunakan akal pikirannya khususnya dalam hal memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah, yang kedudukan bagi orang-orang tersebut sederajat dengan binatang dan makhluk yang buruk di mata Allah.

Kepada orang-orang yang tidak mau memikirkan rahsia kekuasaan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan alam semesta ini, Allah mengancamnya dengan siksa yang menghinakan yakni menjadi pengisi neraka jahannam, dan mereka kekal didalamnya, alqur'an Al-A'rof (7): 179:

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ ۗ لَهُمْ  
 قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَهُمْ  
 ءَاذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا ۗ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ ۗ بَلْ هُمْ أَضَلُّ  
 ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١٧٩﴾

Terjemahnya:

“Dan Sesungguhnya kami jadikan untuk (isi neraka Jahannam) kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. mereka Itulah orang-orang yang lalai” (Departemen Agama RI, 2009: 526 jilid 3).

Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa balasan bagi orang yang tidak mau memikirkan kekuasaan Ilahi yang telah menganugerahi akal, qalbu, dan indera akan tetapi tidak digunakannya maka ganjarannya adalah neraka Jahannam.

Dalam hal menuntut dan mengembangkan ilmu pengetahuan, tidak ada satu ajaran agamapun yang mementingkannya kecuali agama Islam. Dan karena pentingnya peranan bahwa ilmu pengetahuan maka ajaran Islam telah menetapkan bahwa kewajiban pertama dan utama bagi setiap Muslim sebelum melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya adalah kewajiban menuntut ilmu pengetahuan sebab ilmu merupakan imannya segala amal. Dan menuntut ilmu harus sudah dimulai sejak dalam buaian ibu hingga akhir hayat. Inilah asas pendidikan seumur hidup (*life a long education*) menurut ajaran Islam (Ahnani, - : 32).

Dalam Alqur'an Al-Mujadalah (58) : 11, Allah berfirman:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ  
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Terjemahnya:

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Departemen Agama RI, 2009: 22 jilid 10).

Ayat ini menjelaskan bahwa Islam menempatkan orang-orang yang berilmu pengetahuan pada tempat dan kedudukan yang tinggi. Ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan sangat penting arti dan perannya bagi kehidupan umat manusia.

Terhadap ilmu pengetahuan yang diperlukan untuk pengolahan alam semesta dalam rangka memakmurkan bumi sebagai realisasi sebagai tugas kekhalifahan, ajaran Islam telah mendorong manusia agar dapat mengembangkan pengetahuannya yang kreatif dan konstruktif untuk menciptakan kebudayaan, mengolah potensi alam dan menggali kekayaan alam yang masih terpendam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, betapa pentingnya ilmu pengetahuan ini sehingga Rasulullah telah menganjurkan terhadap ummatnya agar tekun menuntut ilmu walaupun kenegara Cina yang sangat jauh letaknya serta berbeda keyakinan dan agamanya (Ahnani, -: 35).

Karena pentingnya ilmu pengetahuan ini, Rasulullah telah memperingatkan, bahwa hari-hari yang dilalui selama hidup ini akan tetapi tidak memberikan tambahan ilmu pengetahuan, maka akan sangat rugilah hidup manusia ini. Rasulullah bersabda:

إِذَا آتَىٰ عَلَيَّ يَوْمٌ لَّا أَزِدَادُ فِيهِ عِلْمًا يُقْرِبُنِي إِلَى اللَّهِ  
عَزَّ وَجَلَّ فَلَا يُوْرِكُ لِي فِي طُلُوعِ شَمْسِ ذَلِكَ الْيَوْمِ

Artinya:

“Apabila datang kepadaku suatu hari yang tidak bertambah ilmuku yang mendekatkan diriku kepada Allah Azza Wajalla, maka aku tidak dikaruniai keberkatan dalam terbitnya matahari pada hari itu” (Ahnan, - : 35).

Dalam hal menuntut ilmu, tidak memiliki batasan, dengan tujuan dapat memberikan manfaat dan mendekatkan diri kepada Allah dan hadist ini mempertegas bahwa agama Islam telah memberikan dasar yang kuat bagi kemajuan manusia baik dalam kemajuan berpikir dan mengembangkan ilmu pengetahuan, maupun kemajuan dalam menciptakan peradaban dan kebudayaan manusia sesuai dengan kedudukan dan perannya sebagai pengemban amanat dimuka bumi ini.

## 2. Islam dan Pengobatan

Obat atau syifa merupakan zat yang berfungsi untuk memberikan suplemen bagi tubuh untuk meregenerasi sel yang rusak dan menyembuhkan penyakit. Islam sangat menganjurkan untuk memperhatikan tentang pengobatan baik itu dari segi keharusan berobat dan hukum bahan-bahan yang digunakan dalam berobat serta penggunaan obat yang tidak menimbulkan kerugian pada orang yang mengkonsumsi obat. Firman Allah yang menyebutkan agar tidak menjerumuskan diri kedalam kerugian dalam Al Baqarah (2) : 195 :

... وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ

مُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya :

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik (Departemen Agama RI, 2009: 286 jilid 1).

Dari ayat ini Allah memberikan peringatan kepada manusia untuk tidak menjatuhkan dirinya ke dalam kebinasaan. Sama halnya dari segi pengobatan, apabila obat yang dikonsumsi untuk tujuan pengobatan pada penyakit tertentu dalam proses sampainya obat pada reseptor atau tempat kerja obat menimbulkan kerugian maka dapat dikategorikan sebagai menjatuhkan diri dalam kebinasaan. Oleh karena itu, untuk mencari alternatif lain dalam pengobatan.

Dalam ayat lain Allah berfirman dalam Al-Mulk (67) : 2 :

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

Terjemahnya:

Yang menjadikan mati dan hidup, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun (Departemen Agama RI, 2009: 220 jilid 10).

Firman-Nya: ( اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ) *ayyukum ahsanu 'amal(an)/ siapa yang lebih*

*baik amalnya* tentu saja mengandung pengertian bahwa Allah mengetahui siapa yang baik amalnya karena tidak dapat diketahui siapa yang terbaik bila tidak

mengetahui secara menyeluruh semua yang baik dan tidak dapat diketahui siapa yang terburuk bila tidak diketahui siapa yang buruk amalnya. Ayat diatas tidak menyebut siapa yang terburuk untuk mengisyaratkan bahwa sebenarnya berlomba dalam kebaikan itulah yang seharusnya menjadi perhatian manusia (Shihab, 2010:198). Hidup di dunia ini harus berlomba-lomba dalam memperbuat amal kebaikan, maka akan menjadi yang terbaik, yang dimaksud dengan amal kebaikan bukan saja ibadah seperti salat, bahkan termasuk mencari nafkah halal, membangaun mesjid, madrasah, bahkan menyingkirkan duri dari jalanan termasuk amal kebaikan (Yunus, 2004: 841). Kehidupan duniawi adalah untuk menguji manusia yang selalu menggunakan akal pikirannya memahami agama Allah dan memilih perbuatan yang paling baik dikerjakannya sehingga perbuatan itu diridhoi Allah (Departemen Agama RI, 2009: 220).

Kaitannya dalam hal pengembangan cara pengobatan, seperti dalam penelitian ini, yakni mengembangkan kemampuan berpikir dengan menemukan terobosan baru untuk mencari alternatif pengobatan dengan mengembangkan cara pengobatan yang telah umum digunakan yakni menggunakan obat dengan cara peroral sehingga dapat berefek sistemik dikembangkan menjadi penggunaan topikal akan tetapi mempunyai efek yang sama bahkan lebih baik dikarenakan bioavailabilitas obat lebih baik pula, sehingga dapat kita ketahui pengobatan yang paling baik diantara yang terbaik untuk digunakan dalam pengobatan hipertensi.

Bagi para Farmasist Islam dituntut untuk mencari obat yang dapat memberikan kesembuhan tanpa ada efek samping yang merugikan karena setiap penyakit yang ada di dunia ini, Allah telah menyediakan obatnya. Allah sebagai

Tuhan yang mempunyai tanda-tanda ketuhanan-Nya berupa hasil-hasil ciptaan-Nya, berupa langit dan bumi, apa yang ada di antara keduanya. Termasuk juga kejadian-kejadian yang berlangsung dalam makhluk-Nya tersebut seperti Allah menciptakan penyakit dan juga menciptakan obatnya. Hal ini sesuai hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Abu Zubair, dari Jabir bin Abdillah, dari Nabi Muhammad saw. :

رِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ دَاءٍ  
ذَا أُصِيبَ دَوَاءٌ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (رواه مسلم)

Artinya :

Dari Jabir dari Rasulullah saw. bersabda Masing-masing penyakit pasti ada obatnya. Kalau obat sudah mengenai penyakit, penyakit itu pasti akan sembuh dengan izin Allah Azza wa jalla (Almanth, 1991).

Dari hadits diatas dapat disimpulkan bahwa kehidupan manusia tidak terlepas dari penyakit. Penyakit yang dialami manusia terdiri dari penyakit rohani dan penyakit jasmani. Olehnya itu, sebagai khalifah di muka bumi ini harus senantiasa mengembangkan pikir, sesuai disiplin ilmu masing-masing, untuk kemaslahatan ummat yang merupakan salah satu perwujudan mahluk yang berpikir (*hayawanun nutqhy*).

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Alat dan Bahan

##### 1. Alat

Alat-alat gelas yang biasa digunakan di laboratorium, Timbangan Analitik (*Kern ALJ 220-4 NM*), Spektrofotometer UV-VIS (*Genesys*), sentrifus (*PLC Series*), mikroskop (*Zeiss dan Krüs*), magnetik stirrer (*Heidolph*).

##### 2. Bahan

Nifedipin (*Bayer*), etanol p.a (*Merk*), air suling, L- $\alpha$ -phosphatidylcholine (*Sigma Aldrich*).

#### B. Metode Kerja

##### 1. Rancangan Formula

Formula *ethosome* dibuat dengan menggunakan metode panas, dengan variasi konsentrasi etanol.

Tabel 1. Formula *Ethosome*

Formula	Komposisi ( b/v %) dalam 20 ml		
	Nifedipin	Fosfatidilkolin	Ethanol
Etho. 1	0.05	1.5	10
Etho. 2	0.05	1.5	20
Etho. 3	0.05	1.5	30
Etho. 4	0.05	1.5	40
Etho. 5	0.05	1.5	50

## 2. Pembuatan *Ethosome* Metode Panas ( Kumar *et al*, 2010: 113)

Dalam metode ini fosfatidilkolin didispersikan dalam air dengan pemanasan pada suhu 40°C sampai terbentuk larutan koloid. Pada tempat yang lain etanol dipanaskan sampai suhu 40°C dan nifedipin dilarutkan di dalamnya. Kemudian larutan obat dicampur kedalam campuran fosfatidil pada suhu 40°C dengan menggunakan *magnetic stirrer* pada 700 rpm selama 30 menit. Ethosom disimpan 12 jam pada suhu 4°C dan disentifus selama 2 jam pada 15.000 rpm.

## 3. Penentuan % Obat yang Terjerap (PDE)

### a. Pembuatan kurva baku nifedipin

1) Dibuat satu konsentrasi nifedipin dengan cara:

a) Dibuat larutan stok nifedipin baku 500 bpj, dengan menimbang 25,0mg nifedipin dicukupkan 50,0mL etanol p.a, diencerkan untuk membuat konsentrasi 10 bpj dengan memipet 200,0 $\mu$ L stok baku nifedipin dicukupkan 10,0mL etanol p.a.

b) Ditentukan panjang gelombang maksimum nifedipin dengan spektrofotometer UV-VIS pada panjang gelombang 336 nm.

2) Dibuat satu seri konsentrasi nifedipin 10 bpj, 15 bpj, 20 bpj, 25 bpj, dan 30 bpj dengan mengencerkan stok baku nifedipin pelarut etanol p.a lalu diukur serapannya pada spektrofotometer UV-VIS pada panjang gelombang yang telah ditentukan, kemudian dibuat persamaan kurva bakunya.

- b. Konsentrasi nifedipin bebas ditentukan dari Supernatan hasil sentrifugasi
- B.2. Supernatan disaring dengan menggunakan kertas saring whatman nomor 42, hasil saringan supernatan dicukupkan sampai 50,0mL atanol p.a, kemudian dipipet 1,0mL, dicukupkan 10,0mL atanol p.a dan diukur absorbansinya dengan menggunakan spektrofotometer UV-VIS pada panjang gelombang 336 nm.

Persentase obat terjerap (PDE) dihitung dengan rumus :

$$\% \text{ PDE} = [ (T - C) / T ] \cdot 100\%$$

T = total jumlah obat yang ditambahkan dalam formula.

C = jumlah obat yang terdeteksi pada supernatan (tidak terjerap).

#### **4. Pengujian karakteristik *ethosome* yang terbentuk**

Pengamatan bentuk dan ukuran *ethosom* dilakukan menggunakan mikroskop. Suspensi *ethosom* disebarkan di atas kaca objek. Bentuk vesikel diamati dengan mikroskop optik hingga perbesaran 100 kali. Hasil pengamatan direkam oleh kamera. Ukuran *ethosome* ditentukan dengan menggunakan mikroskop berskala pada pembesaran lensa objektif 100 kali dan skala okuler 10 kali.


**BAB IV**  
**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**A. Hasil Penelitian**

**1. Kurva Baku Nifedipin**

Pembuatan kurva baku nifedipin dilakukan menggunakan spektrofotometer UV VIS pada panjang gelombang maksimum 336 nm. Kurva baku nifedipin menunjukkan hubungan linear antara absorbansi (y) dan konsentrasi nifedipin (x) dalam pelarut etanol p.a, Persamaan regresi linear kurva baku nifedipin :

$$Y = 0.01606x + 0.1116$$



Gambar 16. Kurva Baku Nifedipin


## 2. Penjerapan Obat dalam *Ethosome*

Tabel 2. Penjerapan Obat dalam *Ethosome*

Formula	Nifedipin (%)	Fosfatidilkolin (%)	Etanol (%)	Penjerapan (%)
Etho 1	0,05	1,50	10	40,923
Etho 2	0,05	1,50	20	48,187
Etho 3	0,05	1,50	30	51,716
Etho 4	0,05	1,50	40	51,750
Etho 5	0,05	1,50	50	71,440

## 3. Karakteristik *Ethosome*

*Ethosome* yang dihasilkan memiliki ukuran 1  $\mu\text{m}$  sampai 15  $\mu\text{m}$ , sedangkan bentuknya adalah *Multy Lamellar Vesicles* (MLV) dan *Multy Vesicular vesicles* (MVV).



Gambar 17. Bentuk *ethosome* MLV dan MVV

## B. Pembahasan

Penggunaan obat secara topikal untuk efek sistemik (*transdermal*) merupakan hal yang inovatif dan menjadi menarik untuk dikembangkan karena beberapa keuntungan, terhindar dari masalah lambung kosong, efek pH, deaktivasi enzim sehubungan dengan lintasan gastrointestinal, terhindar dari metabolisme lintas pertama di hati, senyawa dengan indeks terapi sempit dapat digunakan, dan dalam hal kenyamanan pasien. Teknologi sediaan farmasi yang dimaksud untuk hal ini adalah pengembangan obat dengan sistem gelembung (*vesicles*), salah satunya adalah *ethosome*.

*Ethosome* merupakan modifikasi dari liposom, yang tersusun dari hidroalkohol atau hidro/alkohol/glikolik fosfolipid dengan konsentrasi etanol yang tinggi sehingga dapat menghantarkan obat sampai sistem sirkulasi, bersifat lembut, merupakan gelembung yang lunak, dan sesuai untuk meningkatkan penghantaran zat aktif (Kumar R *et al*, 2010: 3; Kumar *et al*, 2010: 112; Maurya *et al*, 2011: 34; Dave *et al*, 2010: 81).

Prof. Elka Touitou menemukan dan menyelidiki sistem gelembung lipid yang ditambahkan alkohol dengan konsentrasi relatif tinggi disebut *ethosome*. Etanol dengan konsentrasi yang tinggi 10 – 50% (Maurya *et al*, 2011: 35; Dave *et al*, 2010: 82). Konsentrasi etanol tinggi dipilih dalam formulasi *ethosome* karena Efisiensi PDE (*Percent Drug Entrapment*) sebanding dengan konsentrasi etanol, *vesicle lipid bilayer* lebih renggang dengan peningkatan konsentrasi etanol sehingga obat dapat terjerap pada lipid bilayer dan *core ethosome* (Dave *et al*, 2010:82). Etanol mengurangi kerapatan *stratum*

*corneum* kulit, menjadikan *vesicles* lebih lembut sehingga permeasinya lebih mudah mencapai sistem sirkulasi (Maurya *et al*, 2011: 36; Dave *et al*, 2010:82)

Etanol secara topikal digunakan dalam pengembangan sistem penghantaran obat secara transdermal sebagai peningkat penetrasi, sebagai kosurfaktan, sebagai bahan pelarut untuk meningkatkan kelarutan obat sehingga memungkinkan dalam melintasi perintang kulit (*stratum corneum*). Pada *ethosome*, etanol menjadi sistem yang tersaturasi pada formula dan mempengaruhi obat melewati membran dengan mengubah sifat kelarutan *stratum corneum*.

Konsentrasi etanol yang tinggi, membran lipid *ethosome* akan lebih renggang dibanding dengan gelembung konvensional (liposom) tetapi memiliki stabilitas yang sama (Maurya *et al*, 2011: 36). Membran lipid yang renggang memungkinkan obat akan lebih mudah terperap pada lipid bilayer dan *core ethosome* (Girhepunje *et al*, 2010: 363; Maurya *et al*, 2011: 36; Dave *et al*, 2010: 82). Etanol juga membuat struktur *ethosome* lebih lembut dan lunak yang memberikan kebebasan lebih baik dan stabil dalam membran, sehingga memudahkan permeasi pada kulit dengan cara menyelip diantara sel-sel *stratum corneum* yang kehilangan lipidnya menuju ke dalam lapisan yang lebih dalam hingga ke sirkulasi sistemik seperti mekanisme yang tampak pada gambar 8 (Anitha *et al*, 2011: 19; Tiwari *et al*, 2010: 449; Akiladevi *et al*, 2010: 1).

*Ethosome* dapat dibuat dengan menggunakan metode dingin dengan suhu 30°C dan metode panas menggunakan suhu 40°C (Kumar *et al*, 2010:

113). Fosfolipid ketika terhidrasi secara spontan akan menghasilkan gelembung karena bersifat termodinamik dan *self-assembling*, sifat inilah yang mengarahkan bagian hidrofobik membentuk gelembung. Dengan kata lain, terjadi interaksi yang kurang baik antara molekul lipid dan air (tidak dapat bercampur). Sifat termodinamik dan *self-assembling* dari fosfolipid menyebabkan turunya interaksi yang kurang baik ini, sehingga terjadi penurunan energi dan stabilitas yang hampir sempurna. Untuk menjadi lebih sempurna, lapisan bilayer mulai melekok atau melipat ke bawah membentuk gelembung yang tertutup (Vijay *et al*, 2010: 9). Adapun bentuk gelembung yang terbentuk pada pembuatan *ethosome* ini adalah *multi lamelar vesicles* (MLV) dan *multi vesicular vesicles* (MVV) seperti yang terlihat pada gambar 17. Untuk membentuknya menjadi vesicles yang lebih kecil (SUV), dapat dilakukan ekstruksi ataupun sonikasi.

*Ethosome* merupakan gelembung yang bersifat amfipatik, karena sifat ini, *ethosome* sangat efektif digunakan pada obat yang bersifat lipofilik, hidrofilik maupun amfifilik. obat-obat yang bersifat lipofilik akan terjerap pada kompartemen lipofilik, obat hidrofilik akan terjerap pada kompartemen hidrofilik, sedangkan obat-obat yang bersifat amfifilik akan tersebar pada lipid bilayernya (Pirvu *et al*, 2010; Jufri, 2004; Morrow *et al*, 2007; Kozubek *et al*, 2000). Nifedipin merupakan obat yang tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik non polar dengan koefisien partisi log P (*octanol/water*) 2,2, dengan sifat ini maka nifedipin akan terjerap pada bagian lipofilik lipid bilayer dari *ethosome*.

Dalam penelitian ini digunakan konsentrasi fosfatidilkolin 1,5% dan nifedipin 0,05% dengan variasi konsentrasi etanol mulai dari 10% sampai 50% untuk mendapatkan konsentrasi etanol yang optimal menyerap nifedipin. Penyerapan obat dalam *ethosome* dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti variasi penggunaan konsentrasi etanol dan fosfatidilkolin, pada beberapa penelitian dengan penambahan konsentrasi etanol penyerapan obat juga meningkat dan ukuran partikel akan berkurang dengan penggunaan konsentrasi etanol yang tinggi. Etanol juga dimaksudkan sebagai peningkat penetrasi pada kulit dan fosfatidilkolin merupakan komponen utama pembentuk gelembung (*vesicles*) pada *ethosome*, gelembung inilah yang akan menyerap obat.

Hasil pengukuran kadar nifedipin yang menyerap dalam *ethosome* menunjukkan bahwa peningkatan konsentrasi etanol yang digunakan sebanding dengan peningkatan penyerapan nifedipin. Konsentrasi etanol 10%, 20%, 30%, 40%, 50% berturut-turut dapat menyerap nifedipin sebesar 40.923%, 48.187%, 51.716%, 51.750%, 71.440%. Bentuk *vesicles ethosome* yang terbentuk pada konsentrasi etanol 10%, 20%, dan 30% adalah MLV (*Multy Lamelar Vesicles*) sedangkan pada konsentrasi etanol 40% dan 50% bentuk MLV (*Multy Lamelar Vesicles*) dan MVV (*Multy Vesicular Vesicles*). Ukuran *vesicles ethosome* konsentrasi etanol 10% dan 20% lebih besar dibandingkan dengan *ethosome* pada konsentrasi etanol 30%, 40% dan 50%, ini terbentuk karena konsentrasi fase pendispersi lebih besar sehingga menyebabkan pengurangan ukuran *vesicles*.

Pada penelitian ini, konsentrasi etanol 50%, fosfatidilkolin 1.5%, memberikan penyerapan optimal nifedipin sebesar 71.440%. Tingkat optimal nifedipin yang terjerap di dalam *ethosome* ditentukan oleh seberapa kecil ukuran *ethosome* yang terbentuk dan besarnya obat yang terjerap. Penambahan konsentrasi etanol menyebabkan pengurangan ukuran *vesicles* yang memungkinkan obat terjerap lebih tinggi, *vesicles* lebih renggang, dan kelarutan nifedipin lebih tinggi sehingga obat akan lebih mudah terjerap pada lipid bilayer dan *core ethosome*.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

1. Peningkatan konsentrasi etanol sebanding dengan penyerapan nifedipin.
2. Sistem penghantaran obat *ethosome* yang terbentuk dari etanol dan fosfatidilkolin menyerap nifedipin dengan penyerapan optimal sebesar 71,440% pada penggunaan etanol 50%.
3. *Ethosome* yang terbentuk memperlihatkan vesikel multilamellar (MLV) dan vesikel multivesikular dengan ukuran berkisar 1 $\mu$ m sampai 15 $\mu$ m.

#### ***B. Saran***

1. Perlu diadakan penelitian tentang optimasi penyerapan nifedipin pada etosom dengan memvariasikan jumlah nifedipin yang digunakan.
2. Perlu diadakan penelitian tentang bioavailabilitas *ethosome* nifedipin dalam bentuk sediaan transdermal.

## Daftar Pustaka


- Abdassah, Marline. 2004. *Liposom sebagai sistem penghantar obat kanker (review altikel)*. Jurusan farmasi UNPAD.
- Akiladevi, D., Sachinandan Basak. 2010. *Ethosomes – A Noninvasive Approach For Transdermal Drug Delivery*. Internatoinal Journal of Current Pharmaceutical Research, Vol 2, Issue 4.
- Ahnan, Maftuh. *Berfikir, Imam Alghazali*.
- Al math, M. Faiz. 1991. *1100 Hadits Terpilih Sinar Ajaran Muhammad*. Gema Insani Press. Jakarta.
- Anitha, P., et al. 2011. *Ethosomes - A noninvasive vesicular carrier for transdermal drug delivery*. Int. J. Rev. Life. Sci., Vol 1 (1).
- Ansel, Howard C, 2008. *Pengantar Bentuk Sediaan Farmasi edisi IV*. UI Press. Jakarta.
- Bangham AD.1993. *Liposome*. The Babraham Connection Chem Phys Lipids 64: 275 -285.
- Benson, Heather A. E., 2005. *Transdermal Drug Delivery: penetration Enhancement Tehniques*. Western Australian Biomedical Research Institute, School of Pharmacy, Curtin University of Technology. Western Australia. Page 25
- Cave G. 2004. *Lipid Vesicles and Other Colloids as A Drug Carrier on The Skin*. Adv. Drug Deliv. Rev. 56: 675-711.
- Dave, Vivek., et al. 2010. *Ethosome for Enhanced Transdermal Drug Delivery of Aceclofenac*. International Journal of Drug Delivery 2.
- Departemen Agama RI. 2009. *Al-Qur'an dan Tafsirnya, jilid 1 – 10*. Lembaga percetakan Al-Qur'an Departemen Agama RI. Jakarta
- Dirjen POM. 1995. *Farmakope Indonesia, Edisi IV*. Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta.
- Friend D, Catz P, Heller J, Reid J, Baker R. 1998. *Transdemal Delivery of Levonorgesterol I. Alkanols as Permeation Enhancers*. J Control Rel, 7: 243-50.
- Girhepunje, Kundlik., et al. 2010. *Ethosomes: A Novel Vasicular Carrier for Enhanced Dermal Delivery of Ciclopirox Olamine*. Scholar Research Library. Vol 2 Issue 1.

- Grassi, Mario., *et al.* 2007. *Understanding Drug Release and Absorption Mechanisms*. Taylor & Francis Group. London.
- Gregoriadis, Gregory. 2007. *Liposome Technology; Liposome Preparation and Related Techniques*. Third Edition, Vol I, Informa Healthcare USA, Inc. 21-32
- Gregoriadis, Gregory. 2007. *Liposome Technology; Entrapment of Drug and Others Material into Liposome*, Third Edition, Vol II. Informa Healthcare USA, Inc.
- Gunawan, Sulistia Gan. 2007. *Farmakologi dan Terapi edisi V*. UI Press. Jakarta.
- Ismail, Isriany. 2009. *Strategi Penggunaan Obat Melalui Kulit, Tinjauan Pemilihan Bentuk Sediaan Farmasi*. Jurnal Kesehatan, Volume II No 3. Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin, Makassar.
- Jufri, Mahdi. 2004. *Arah dan Perkembangan Liposom Drugs Delivery System*. Majalah Ilmu Kefarmasian. Vol I (2).
- Kavitha K., *et al.* 2010. *Chemical Permeation Enhancers for Transdermal Drug Delivery*. Scholars Research Library. 2 (6).
- Kozubek, Arkadiusz., *et al.* 2000. *Liposomal drug delivery, a novel approach: PLARomes*, Acta Biochimica Polonica, Vol 47(3).
- Kumar, Pvan K., P.R Radhika, T. Sivakumar. 2010. *Ethosomes - A Priority in Transdermal Drug Delivery*. International Journal of Advances in Pharmaceutical Sciences. Volume 1.
- Kumar R., *et al.* 2009. *Ethosomes: Novel Vesicular Carriers in The Transdermal Drug Delivery*. Journal of Global Pharma Technology. Rev. 2 (6).
- Lachman, Leon. 1994. *Teori dan Praktek Farmasi Industri, Edisi 3*. UI Press, Jakarta.
- Lasic DD. 1998. *Novel Application of liposomes*. Trend Biotechnol 16: 307 – 327.
- Leekumjorn, Sukit. 2004. *Synthesis and Characterization of Potensial Drug Delivery Systems using Nonionic Surfactant "Niosom"*.
- Ligth, Douglas. 2004. *Cell, Tissues, and Skin*. Chelsea House Publisher, Philadelphia.
- Moffat, Antony C., M David Asselton, Brian Widdop. 2005. *Clarke's Analysis of Drugs and Poisons*. Pharmaceutical Press. Royal Pharmaceutical Society of Great Britain

- Maurya, Sheo Datta., *et al.* 2011. *Enhancement of Transdermal Permeation of Indinavir Sulfate via Ethosome Vesicles*. The African Journal of Pharmaceutical Sciences and Pharmacy. Volume 2 (1).
- Morrow, D.I.J., 2007. *Innovative Strategies for Enhancing Topical and Transdermal Drug Delivery*. Bentham Science Publisher Ltd.
- Mutscher, Ernst, 1999. *Dinamika Obat edisi V*. Penerbit ITB. Bandung.
- Nurasiah H. 2011. *Formulasi dan Karakterisasi Sistem Penghantaran Obat Ethosom yang Mengandung Nifedipin*. Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin. Makassar
- Patel, Piyush K. 2005. *Preparation and Evaluation of Topical Enalapril Maleate Ethosomes as An Alternative to Oral Route*. Rajiv Gandhi University of Health Sciences. Mangalore. Page 4.
- Pirvu, Cristina Dinu., *et al.* 2010. *Elastic Vesicles as Drugs Carriers Through The Skin*. Farmacia Vol.58 Issue 2.
- Ranade, Vasant V., Manfred A Hollinger. 2003. *Drugs Delivery system edisi 2*. CRC Press Pharmacology & toxicology series. University of California
- Rosen, Mayer R. 2005. *Delivery System Handbook for Personal Care and Cosmetic Products., Tecnology, Application, and Formulation*. William Andrew Publishing. Norwich, New York., U.S.A. Page 286
- Rowe C, Raymond. 2009. *Handbook Of Pharmaceutical Excipient*. Edisi VI. Pharmaceutical Press. London
- Singh, Anjali., Priyanka Rathore, Meenakshi Shukls and Statish Nayak. 2010. *Comparative Studies on Skin permetion of Miconazole Using Different Novel Carrers*. IJSPR, Vol. 1 Issue 9.
- Shihab, Quraish. 2010. *Tafsir Al- Misbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al-qur'an*, Cetakan III. Lentera hati. Jakarta
- Sweetman, Sean C. 2009. *Martindale The Complete Drugs*, Edisi 36. Pharmaceutical Press. London
- Toutou, Elka., Brian W Barry.2000. *Enhancemen in Drug Delivery*. CRC Press Taylor & Francis Group, LLC.
- Toutou E., Godin B, Weis C. 2000. *Enhanced Delivery of Drug into and Across the Skin by Ethosomal Carrier*. Drug Deliv. Res. 50.

- Tiwari, Raj Kumar., Nitesh S Chaunan, Yogesh HS. 2010. *Ethosome: A potential Carries for Transdermal Drug Delivery*. International Jurnal of Drug Development & Research. Vol 2 Issue 2.
- Uchegbu, Ijeoma F., and Schatzlein Andreas G. 2003. *Generic Manufacturers Should Exploit Drug Delivery Technology for Improved Therapeutics*. Business Briefing : Pharmatech. Page 203.
- Verma, Surender S K., Singh Navneet S, P Mathur, V Valecha. 2010. *Nanoparticle Vesicular System: A versatile Tool for Drug Delivery*. J. Chem. Res. Vol 2 (2).
- Vijay, Sharma K., Mishra D N, Sharma A K and Srivastava B. 2010. *Liposomes: Present Prospective and Future Challenge*. Iinternational Journal of Current Pharmaceutical Review and Research., Vol. 1 Issue 2.
- Wahid, Ambekar Abdul., Nagaraju Ravouru and Swan ramesh Lakshman. 2011. *Ethosom: A Tool for Transdermal Drug Delivery*. Current Trends in Biotechnology and Pharmacy. Vol. 5 (1).
- Walters, K. 2002. *Dermatological and Transdermal Formulation*. Marcel Dekker Inc., New York.
- Williams AC. 2003. *Transdermal and Topical Drug Delivery*. Pharmaceutical Press. London.
- Yahya, Harun. 2001. *Bagaimana Seorang Muslim Berpikir, Deep Thinking*. Robbani press. Jakarta.
- Yunus, Mahmud. 2004. *Tafsir Alqur'an Karim, Cetakan 73*. PT Hidakarya Agung. Jakarta.

### Lampiran 1. Pembuatan Ethosome dan Karakterisasi



Gambar 18. Skema pembuatan *ethosome* dan karakterisasi

## Lampiran 2. Perhitungan Penjerapan/ *Percent Drug Entrapment (PDE)*

a. Absorbansi nifedipin pada beberapa konsentrasi

Tabel 3.  
Absorbansi nifedipin pada beberapa konsentrasi

Konsentrasi (bpj)	Absorbansi
10	0,274
15	0,351
20	0,431
25	0,514
30	0,594

b. Perhitungan % Penjerapan Nifedipin (Formula *Ethosome 1* – fomula *ethosome 4*)

1) Perhitungan obat yang tidak terjerap

Supernatan nifedipin yang tidak terjerap dicukupkan 25,0mL kemudian dipipet 1,0 mL dan dicukupkan 10,0 mL, diukur serapannya pada spektrofotometer pada panjang gelombang 336nm. Absorbansinya 0,489. persamaan garis linear  $Y = 0,01606x + 0,1116$ . dimana  $Y =$  absorbansi,  $x =$  Konsentrasi.

$$Y = 0,01606x + 0,1116$$

$$0,489 = 0,01606x + 0,1116$$

$$0,01606x = 0,489 - 0,1116$$

$$0,01606x = 0,3774$$

$$x = 23,4994 \text{ bpj}$$

$$V_1 \cdot N_1 = V_2 \cdot N_2$$

$$1\text{ml} \cdot N_1 = 10\text{ml} \cdot 23,4994$$

$$N_1 = 234,994 \text{ bpj}$$

## 2) Perhitungan Obat yang Terjerap (PDE)

$$\text{PDE} = [ (T - C) / T ] \cdot 100\%$$

T = total jumlah obat yang ditambahkan dalam formula

C = jumlah obat yang terdeteksi pada supernatan (tidak terjerap)

$$\begin{aligned} \text{PDE} &= [ (400\text{bpj} - 234,4994\text{bpj}) / 400\text{bpj} ] \cdot 100\% \\ &= [ 165,0062\text{bpj} / 400\text{bpj} ] \cdot 100\% \\ &= 0,41252 \cdot 100\% \\ &= 41,252 \% \end{aligned}$$

c. Perhitungan % Penjerapan Nifedipin (Formula *Ethosome 5*)

## 1) Perhitungan obat yang tidak terjerap

Supernatan nifedipin yang tidak terjerap dicukupkan 50,0 mL kemudian dipipet 1,0 mL dan dicukupkan 10,0 mL, diukur serapannya pada spektrofotometer pada panjang gelombang 336nm. Absorbansinya 0,207. persamaan garis linear  $Y = 0,01606x + 0,1116$ . dimana Y = absorbansi, x = Konsentrasi.

$$Y = 0,01606x + 0,1116$$

$$0,207 = 0,01606x + 0,1116$$

$$0,01606x = 0,207 - 0,1116$$

$$0,01606x = 0,0954$$

$$x = 5,9402 \text{ bpj}$$

$$V_1 \cdot N_1 = V_2 \cdot N_2$$

$$1\text{ml} \cdot N_1 = 10\text{ml} \cdot 5,9402$$

$$N_1 = 59,402 \text{ bpj}$$

## 2) Perhitungan Obat yang Terjerap (PDE)

$$\text{PDE} = [ (T - C) / T ] \cdot 100\%$$

T = total jumlah obat yang ditambahkan dalam formula

C = jumlah obat yang terdeteksi pada supernatan (tidak terjerap)

$$\text{PDE} = [ (200\text{bpj} - 59,402 \text{ bpj}) / 200\text{bpj} ] \cdot 100\%$$

$$= [ 140,598\text{bpj} / 200\text{bpj} ] \cdot 100\%$$

$$= 0,70299 \cdot 100\%$$


$$= 70,299 \%$$


Tabel 4. Penjerapan Nifedipin pada *Ethosome*

Formula	Absorbansi			PDE ( % )			Rata-rata PDE (%)
	1	2	3	1	2	3	
Eth. 1a	0,489	0,487	0,488	41,252	41,563	41,407	41,407
1b	0,497	0,498	0,498	40,006	39,851	39,851	39,902
1c	0,488	0,487	0,488	41,407	41,563	41,407	41,459
Eth. 2a	0,448	0,447	0,447	47,634	47,790	47,790	47,738
2b	0,447	0,445	0,446	47,790	48,101	47,945	47,945
2c	0,439	0,440	0,441	49,035	48,879	48,724	48,879
Eth. 3a	0,425	0,423	0,422	51,214	51,526	51,681	51,474
3b	0,423	0,421	0,421	51,526	51,837	51,837	51,733
3c	0,420	0,421	0,420	51,993	51,837	51,993	51,941
Eth. 4a	0,415	0,418	0,418	52,771	52,304	52,304	52,460
4b	0,424	0,425	0,424	51,370	51,214	51,370	51,318
4c	0,421	0,423	0,423	51,837	51,526	51,526	51,629
Eth. 5a	0,207	0,206	0,206	70,229	70,610	71,610	70,506
5b	0,202	0,201	0,201	71,856	72,167	72,167	72,063
5c	0,203	0,202	0,202	71,544	71,856	71,856	71,752


Formula	PDE ( % )			PDE Rata-rata ( % )
	1	2	3	
Eth. 1	41,407	39,902	41,459	40,923
Eth. 2	47,738	47,945	48,879	48,187
Eth. 3	51,474	51,733	51,941	51,716
Eth. 4	52,460	51,110	51,318	51,750
Eth. 5	70,506	72,063	71,752	71,440

Keterangan: - Eth. 1 = *Ethosome* dengan konsentrasi etanol 10%  
 - Eth. 2 = *Ethosome* dengan konsentrasi etanol 20%  
 - Eth. 3 = *Ethosome* dengan konsentrasi etanol 30%  
 - Eth. 4 = *Ethosome* dengan konsentrasi etanol 40%  
 - Eth. 5 = *Ethosome* dengan konsentrasi etanol 50%

**Lampiran 3. Gambar Benentuk *Ethosome***a. Formula *ethosome* 1Gambar 19. *Ethosome* pembesaran 100x


b. Formula *Ethosome* 2Gambar 20. *Ethosome* pembesaran 100x

c. Formula *Ethosome* 3




Gambar 21. *Ethosome* pembesaran 100x

d. Formula *Ethosome* 4



Gambar 12. *Ethosome* pembesaran 100x


e. Formula *Ethosome* 5



Gelembung  
*ethosome*



Gelembung  
*ethosome*




Gelembung  
*ethosome*

Gambar 23. *Ethosome* pembesaran 100x

#### Lampiran 4. Gambar Ukuran *Ethosome*

##### a. *Ethosome* ukuran terkecil



Gambar 24. Ukuran *Ethosome* Pembesaran 100X

Keterangan:  *Ethosome*

Skala objektif pada pembesaran 100 yaitu 1,25

Skala okuler pada pembesaran 10 yaitu 12,5

$$\text{Ukuran skala} = 0,01 \times \frac{1,25}{12,5}$$

$$= 0,001 \text{ mm}$$

$$= 1 \mu\text{m}$$

$$\text{Pembacaan Skala} = 1 \mu\text{m} \times 1$$

$$= 1 \mu\text{m}$$

b. *Ethosome* ukuran terbesarGambar 25. Ukuran *Ethosome* Pembesaran 100X

Keterangan:  *Ethosome*

Skala objektif pada pembesaran 100 yaitu 1,25

Skala okuler pada pembesaran 10 yaitu 12,5

$$\text{Ukuran skala} = 0,01 \times \frac{1,25}{12,5}$$

$$= 0,001 \text{ mm}$$

$$= 1 \mu\text{m}$$

$$\text{Pembacaan Skala} = 1 \mu\text{m} \times 15$$

$$= 15 \mu\text{m}$$



**Rizal**, lahir di Sinjai 27 Syawal 1410 H (23 Mei 1990 M) dari ibu **Roslah** dan ayah **Bahtiar, S. Ag** yang selalu mengirim Do'a, memberikan cucuran kasih sayang, bimbingan, didikan, ajaran untuk terus mendekatkan diri pada sang Khalik, dan dorongan melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk kemaslahatan Ummat.

Jenjang pendidikan formal berawal di SD Negeri No. 13 Sereng-Sinjai, kemudian ke SSN SLTP Neg. 3 Bulupoddo-Sinjai, dan SSN SMA Neg. 1 Sinjai. Melanjutkan ke Perguruan Tinggi tepatnya Farmasi UIN Alauddin Makassar.

Selama menempuh masa kuliah aktif di beberapa organisasi yaitu Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Farmasi periode 2009-2010, Ketua Bidang III Badan Eksekutif Mahasiswa FIKES periode 2010-2011 dan aktif di Ismafarsi 2008-2012.

Karya tulis yang pernah disusun: Pemamfaatan Pati Sagu (*Metroxylon sp*) Terpregelatinasi sebagai expipient dalam Pembuatan Tablet Kempa Lansung, Formulasi Permen *Gummy* dari Pegagan (*Centella aciatica L. Urban*) sebagai Penambah Nafsu Makan dan Peningkatan Kemampuan Kognitif Belajar pada Anak-anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dalam Mengolah Limbah Cangkang Udang Menjadi Kitosan sebagai Makanan Penyerap Kolesterol (Juara 1 LKTI UIN Alauddin 2011).

Alamat: Sereng Desa Duampanuae, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Email (rizal\_alzanzhy@yahoo.co.id).