

**HUBUNGAN *PERSONAL HYGIENE* DAN KEBIASAAN JAJAN
TERHADAP KEJADIAN DEMAM *TYPHOID* PADA ANAK**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Keperawatan Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

HASLINDA
NIM.70300112077

**PROGRAM STUDI S1 KEPERAWATAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2016**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas berkah dan inayah-Nya penulisan proposal ini dapat dirampungkan. Sholawat dan salam dihaturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW karena perjuangan beliau kita dapat menikmati iman kepada Allah SWT.

Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan prposal yang berjudul “**Hubungan Personal *Hygiene* dan Kebiasaan Jajan Terhadap Kejadian Demam *Typhoid* Pada Anak**” ini dapat terselesaikan.

Selesainya proposal ini berkat bimbingan dan dorongan moril dari berbagai pihak oleh karena itu sepantasnya penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua saya **Haris dan Darmawati** yang telah membimbing dan selalu memberi saya dukungan motivasi penggerak selama hidup saya, mereka yang telah membimbing saya sampai sekarang ini dan telah memberikan segalanya untuk saya. Selanjutnya saya menyampaikan rasa terima kasih yang kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, MSi** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh staf akademik atas bantuannya selama penulis mengikuti pendidikan.
2. Bapak **Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M. Sc, P.hd** selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh staf akademik yang telah membantu selama penulis mengikuti pendidikan.
3. Bapak **Dr. Anwar Hafid, S. Kep, Ns, M. Kes**, selaku ketua jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam

Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh staf akademik yang telah membantu selama penulis mengikuti pendidikan.

4. Ibu **Arbianingsih S. Kep. Ns. M. Kes.**, selaku Pembimbing I dan Ibu **A. Adriana Amal S. Kep. Ns. M. Kep.**, selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan serta arahan guna penyempurnaan penulisan skripsi ini.
5. Ucapan terima kasih pula kepada Ibu **Dr. Nur Hidayah, S. Kep. Ns, M. Kes** selaku Penguji I dan Bapak **Dr. Misbahuddin, S. Ag, M. Ag** selaku Penguji II karena berkat kalian penulis bisa mengetahui sejauh mana pengetahuannya dan memberikan pembelajaran untuk lebih memperbaiki proposal kearah yang lebih baik.
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang telah menyumbangkan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis.
7. Seluruh Bapak dan Ibu staf akademik yang telah membantu dalam urusan persuratan.
8. Kepala Puskesmas Samata serta pegawai yang telah memebantu penulis dalam menyelesaikan penelitiannya.
9. Kepala sekolah, pegawai serta staf SD Negeri Samata yang dengan tangan terbuka menerima peneliti selama melakukan penelitian serta adik-adik siswa-siswi SD Negeri Samata yang telah bersedia menjadi responden dan berbagi pengalaman dengan peneliti.
10. Ucapan terima kasih pula saya hanturkan kepada sahabat - sahabatku **Nurhasanah, Nur Ifdatul Jannah, Nur Hikmah** serta teman seangkatan 12ONTGEN yang telah memberikan dukungan mulai dari penyusunan proposal, saat penelitian sampai penyelesaian skripsi ini.

11. Pihak - pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari masih sangat banyak kekurangan dan keterbatasan dalam proposal ini, oleh karena itu kritik dan saran untuk kesempurnaan proposal ini sangat diharapkan.

Penulis berharap semoga proposal ini dapat bermanfaat, baik itu bagi penulis pribadi, dunia keperawatan, dunia pendidikan dan masyarakat pada umumnya. Aaamiiiiin.

Wabillahitaufiq walhidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Gowa, Agustus 2016

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1-13
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Hipotesis	5
D. Defenisi Operasional	5
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Tujuan Penelitian	12
G. Manfaat Penelitian	13
BAB II TINJAUAN TEORITIS	14-32
A. Demam <i>typhoid</i>	14
B. <i>Personal Hygiene</i>	24
C. Kebiasaan Jajan	28
D. Kerangka Teori.....	31
E. Kerangka Konsep	31
F. Kerangka Kerja	32
BAB III METODE PENELITIAN	33-41
A. Desain Penelitian.....	33
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	33
C. Populasi dan Sampel	34
D. Pengumpulan Data	36
E. Instrumen Penelitian.....	36

F. Pengolahan dan Penyajian Data.....	37
G. Analisis Data	38
H. Etika Penelitian	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42-47
A. Hasil Penelitian	42
B. Pembahasan	47
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Defenisi Operasional.....	5
Tabel 1.2	Kajian Pustaka.....	8
Tabel 3.1	Penentuan <i>Odds Ratio</i>	38
Tabel 4.1	Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden berdasarkan Kelompok Umur, Jenis Kelamin, dan IMT (Indeks Massa Tubuh) di Puskesmas Samata dan SD Negeri Samata.....	43
Tabel 4.2	Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan <i>Personal Hygiene</i> pada Anak di Puskesmas Saamata dan SD Negeri Samata	44
Tabel 4.3	Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Kebiasaan Jajan pada Anak di Puskesmas Samata dan SD Negeri Samata	45
Tabel 4.4	Hubungan <i>Personal Hygiene</i> pada Anak di Puskesmas Samata dan SD Negeri Samata	48
Table 4.5	Hubungan Kebiasaan Jajan pada Anak di Puskesmas Samata dan SD Negeri Samata.....	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Teori	31
Gambar 2.2 Kerangka Konsep	31
Gambar 2.3 Kerangka Kerja	32

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Permohonan sebagai responden penelitian

Lampiran 2 Persetujuan menjadi responden penelitian

Lampiran 3 Identitas Responden

Lampiran 4 Kuesioner

Lampiran 5 Dokumentasi

Lampiran 6 Master Tabel

Lampiran 6 SPSS

Lampiran 7 Permohonan Izin Pengambilan Data Awal

Lampiran 8 Pemohonan Izin Penelitian

Lampiran 9 Izin Penelitian

Lampiran 10 Rekomendasi Penelitian

Lampiran 11 Surat Keterangan Telah Selesai Meneliti di Puskesmas Samata

Lampiran 12 Surat Keterangan Telah Selesai Meneliti di SD Negeri Samata

Abstrak

Nama : Haslinda

Nim : 70300112077

Judul : Hubungan *Personal Hygiene* dan Kebiasaan Jajan Terhadap Kejadian Demam *Typhoid* Pada Anak.

Salah satu penyakit yang banyak menular di lingkungan sekolah adalah demam *typhoid*. Demam *typhoid* adalah penyakit yang menyerang saluran pencernaan, yang sangat berbahaya karena bisa merenggut nyawa manusia jika terlambat ditangani. Penyakit ini terjadi akibat *personal hygiene* yang rendah, sanitasi lingkungan yang kumuh serta kebiasaan jajan yang buruk. Penelitian ini bertujuan untuk diketahuinya hubungan *personal hygiene* dan kebiasaan jajan terhadap kejadian demam *typhoid* pada anak. Metode penelitian menggunakan survey analitik dengan pendekatan *case control*. Dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan jumlah sampel 25 orang kasus dan 25 orang kontrol. Penelitian ini dilaksanakan di Puskesmas Samata dan SD Negeri Samata. Sampel dalam penelitian ini adalah semua anak yang berusia 8-12 tahun yang memenuhi kriteria inklusi. Kemudian diberikan kuesioner yang selanjutnya data diedit, diolah dan ditabulasi kemudian data tersebut dianalisis menggunakan Uji *Chi-square* dengan tingkat kemakna $<0,05$ dan di uji kembali menggunakan *odds ratio* dengan interval kepercayaan (CI)=95%. Hasil menunjukkan ada hubungan antara *personal hygiene* dengan kejadian demam *typhoid* ($p=0,021$, OR=0,248) sedangkan untuk kebiasaan jajan ($p=0,015$, OR= 0,206) yang artinya ada hubungan kebiasaan jajan dengan kejadian demam *typhoid*. Kesimpulan dari penelitian ada hubungan antara *personal hygiene* dan kejadian demam *typhoid* pada anak. Saran kepada penderita demam *typhoid* diharapkan untuk lebih meningkatkan kesadaran terhadap *personal hygiene* dan kurangi konsumsi makanan di luar rumah. Bagi Puskesmas Samata agar lebih meningkatkan perannya dalam memberikan pendidikan kesehatan kepada masyarakat mengenai demam *typhoid*. Bagi SD Negeri Samata sekiranya memberikan pendidikan kesehatan untuk siswa melalui kegiatan rutin seperti penyuluhan gizi, terutama zat-zat yang dibutuhkan tubuh, manfaat membawa bekal serta bahaya membeli makanan jajanan.

Kata Kunci: Demam *Typhoid* ,*Personal Hygiene*, Kebiasaan Jajan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terdapatnya suatu penyakit di suatu daerah tergantung pada terdapatnya manusia yang peka dan kondisi lingkungan yang sesuai bagi kehidupan mikroorganisme penyebab penyakit. Derajat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor tersebut tidak hanya berasal dari sektor kesehatan melainkan juga dipengaruhi oleh faktor pengetahuan. Melalui pendidikan, akan meningkatkan pengetahuan yang berkontribusi terhadap perubahan perilaku kesehatan (Kemenkes RI, 2010).

Daerah pertanian, peternakan, kebiasaan menggunakan tinja untuk pupuk, kebersihan lingkungan hidup, sanitasi dan *hygiene* perorangan yang buruk serta kemiskinan merupakan faktor-faktor yang dapat meningkatkan penyebaran penyakit. Penelitian-penelitian epidemiologi yang banyak dilakukan di Indonesia menunjukkan bahwa penyakit menular masih merupakan penyebab kematian yang penting di Indonesia. Kurangnya sarana air bersih, sempitnya lahan tempat tinggal keluarga, kebiasaan makan dengan tangan yang tidak dicuci lebih dulu, pemakaian ulang daun-daun dan pembungkus makanan yang sudah dibuang ke tempat sampah, sayur-sayur yang dimakan mentah, penggunaan air sungai untuk berbagai kebutuhan hidup (mandi, mencuci bahan makanan, mencuci pakaian, berkumur, gosok gigi, yang juga digunakan sebagai kakus), dan penggunaan tinja untuk pupuk sayuran, meningkatkan penyebaran penyakit menular yang menyerang sistem pencernaan (Soedarto, 2009).

Salah satu penyakit yang bisa menyerang sistem pencernaan adalah penyakit demam *typhoid*. Demam *typhoid* juga merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya karena bisa merenggut nyawa manusia jika terlambat

ditangani. Kenali gejala demam *typhoid* (*thypus abdominal* atau *typhoid fever*) yang tergolong berat dan berbahaya. Gejala awal pada penyakit ini perlu dikenali sebelum terlambat diobati, biasanya ditandai dengan demam lebih dari seminggu serta flu. Demam *typhoid* umumnya muncul pada sore dan malam hari, demam biasanya disertai nyeri kepala hebat dan susah buang air besar. Pada *parathypus* jenis *thypus* yang lebih ringan mungkin sesekali mengalami buang air besar. Jika diamati, lidah tampak berselaput putih susu, bagian tepinya merah terang, bibir kering, dan kondisi fisik tampak lemah, serta nyata tampak sakit. Jika sudah lanjut, mungkin muncul gejala kuning, sebab pada *typhoid* organ hati bisa membengkak seperti gejala hepatitis (Anonim, 2009).

Demam *typhoid* juga merupakan penyakit endemik di Indonesia. Penyakit ini merupakan penyakit menular yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 1962 tentang wabah. Kelompok penyakit menular ini dapat menyerang banyak orang sehingga bisa menimbulkan wabah. Demam *typhoid* menyerang penduduk Asia dengan pravelensi sekitar 900/10.000 penduduk pertahun. Meskipun demam *typhoid* menyerang semua umur, namun golongan terbesar tetap pada usia kurang dari 20 tahun (Widoyono, 2011).

Badan Kesehatan Dunia (*World Health Organisation*) tahun 2009 memperkirakan jumlah orang yang menderita demam *typhoid* di seluruh dunia mencapai sekitar 17 juta orang dengan insidensi 600.000 kasus kematian tiap tahun. Tingginya kejadian penyakit infeksi di negara berkembang khususnya demam *typhoid* dihubungkan dengan masih rendahnya status sosial ekonomi dan rendahnya tingkat pengetahuan yang dimiliki kebanyakan masyarakat. Masyarakat yang berstatus sosial ekonomi rendah, keadaan gizinya rendah, pengetahuan tentang kesehatannyapun rendah sehingga keadaan kesehatan lingkungannya buruk dan status kesehatannya buruk (Meylie, 2010).

Demam *typhoid* merupakan permasalahan kesehatan penting di banyak negara berkembang, diperkirakan 17 juta orang mengidap penyakit ini tiap tahunnya. Indonesia diperkirakan insiden demam *typhoid* adalah 800 penderita per 100.000 penduduk pertahun, dengan angka kematian 2% (Widoyono, 2011).

Hubungan demam *typhoid* yang berperan antara lain sanitasi lingkungan yang buruk (tidak menggunakan jamban saat buang air besar, kualitas sumber air bersih buruk), *hygiene* perorangan yang buruk (tidak mencuci tangan sebelum makan). Dari penelitian yang dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa kebiasaan tidak mencuci tangan dengan sabun dan air yang bersih merupakan hubungan terjadinya demam *typhoid* (Whidy, 2012).

Demam *typhoid* ditemukan di masyarakat Indonesia, yang tinggal di kota maupun di desa. Penyakit ini sangat erat kaitannya dengan kualitas perilaku hidup bersih dan sehat, sanitasi dan lingkungan yang kurang baik. Selain masalah di atas ada beberapa masalah lain yang akan turut menambah besaran masalah penyakit demam *typhoid* di Indonesia diantaranya adalah angka kemiskinan di kota dan desa Indonesia yang mencapai 11,66 % yaitu sekitar 28.594.060 orang (Susenas, 2013).

Penyakit yang cukup mengganggu dan menjadi persoalan utama sekaligus berpotensi mengakibatkan keadaan bahaya (mengancam jiwa) adalah penyakit menular pada anak sekolah. Sekolah merupakan sumber penularan penyakit pada anak sekolah. Sebab, dalam interaksi antar anak banyak terjadi kontak langsung maupun tidak langsung, yang menyebabkan terjadinya penyebaran dan penularan penyakit. Bagi penyakit yang menular di lingkungan sekolah antara lain demam berdarah dengue, campak, rubella (campak jerman), cacar air, gondongan dan demam *typhoid* (*tifus abdominalis*) (Mufidah, 2012).

Demam *typhoid* merupakan salah satu dari penyakit infeksi terpenting. Penyakit ini di seluruh daerah provinsi merupakan penyakit infeksi terbanyak keempat yang dilaporkan dari seluruh 24 kabupaten. Sulawesi Selatan melaporkan demam *typhoid* melebihi 2500/100.000 penduduk (Rahayu, 2012 dalam Masriadi, 2013).

Situasi demam *typhoid* di Sulawesi Selatan dalam lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Jumlah kasus demam *typhoid* di Sulawesi Selatan tahun 2011 sebanyak 18.661 kasus (*Case Fatality Rate* 0.03%) dan mengalami peningkatan pada tahun 2012 yaitu sebanyak 30.338 kasus tanpa kematian, dengan *insiden rate* (IR) 3.87%. Tahun 2013 jumlah kasus *typhoid* mengalami penurunan menjadi 17.287 kasus (*Insiden Rate* 2.07/100 penduduk, *Case Fatality Rate* 0.16%). Pada tahun 2014 jumlah kasus *typhoid* kembali mengalami peningkatan, dengan jumlah kasus sebanyak 24.998 kasus (*Insiden Rate* 3/1000 penduduk, *Case Fatality Rate* 0.02%). Tahun 2015 jumlah kasus demam *typhoid* juga mengalami kenaikan dengan jumlah kasus sebanyak 31.633 (*Insiden Rate* 3.8%, *Case Fatality Rate* 0.03)

Berdasarkan laporan yang diterima oleh Subdin P2&PL Dinkes Prov. Sulawesi Selatan dari beberapa kabupaten yang menunjukkan sakit demam *typhoid* tertinggi yakni kota Pare-pare, Kota Makassar, Kota Palopo, Kab. Enrekang dan Kab. Gowa tercatat jumlah penderita sebanyak 16.909 dengan kematian sebanyak 11 orang (*Case Fatality Rate* 0,07%) dan sebaran sakit demam *typhoid* tertinggi di Kab. Gowa, Kab. Enrekang, Kota Makassar dan Kota Pare-pare (Julaiha, 2012 dalam Masriadi, 2013).

Berdasarkan data dari Puskesmas Samata jumlah penderita demam *typhoid* tahun 2015 yaitu sebanyak 338 orang untuk semua kelompok usia, di mana terdapat 150 orang laki-laki dan 188 orang perempuan. Kemudian untuk data 3

bulan terakhir (Januari-Maret 2016), yang menderita demam *thypoid* yaitu sebanyak 106 orang. Dari 106 orang yang menderita demam *thypoid* ditemukan sebanyak 67 orang termasuk dalam kelompok usia anak (63,2%). Sedangkan untuk data bulan April tercatat sebanyak 31 orang penderita demam *typhoid* termasuk dalam kelompok umur anak.

Melihat data yang didapatkan dari Puskesmas Samata serta beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kejadian demam *typhoid* maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai Hubungan *Personal Hygiene* dan Kebiasaan Jajan Terhadap Kejadian Demam *Typhoid* Pada Anak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut: “Bagaimanakah Hubungan *Personal Hygiene* dan Kebiasaan Jajan Terhadap Kejadian Demam *Typhoid* Pada Anak?”

C. Hipotesis

Hipotesis penelitian:

1. Ada hubungan antara *personal hygiene* dengan kejadian demam *typhoid* pada anak.
2. Ada hubungan kebiasaan jajan dengan kejadian demam *typhoid* pada anak.

D. Defenisi Operasional

No	Variabel	Defenisi Operasional	Alat Ukur	Hasil Ukur	Skala
1.	<i>Personal hygiene</i>	Adalah suatu tindakan untuk memelihara dan menjaga kebersihan dan kesehatan diri	Kuesioner sebanyak 9 item		Ordinal
No	Variabel	<p>Defenisi Operasional</p> <p>untuk mendapatkan kesejahteraan</p> <p>fisik dan psikis ,dengan cara, mencuci tangan, mandi, perawatan kaki dan kuku, serta kebersihan mulut.</p>	Alat Ukur	<p>Nilai tertinggi + Nilai terendah</p> $\frac{2}{2}$ <p>Sumber: Fadila Galema (2014)</p> <p>- Baik: > 22 - Buruk: ≤ 22</p> <p>Hasil ukur</p>	Skala
2.	Kebiasaan jajan	Adalah kebiasaan dan perilaku yang berhubungan dengan makan dan makanan seperti frekuensi makan,cara pemilihan makanan tempat membeli makanan dan jenis makanan.	Kuesioner sebanyak 7 item	<p>Nilai tertinggi + Nilai terendah</p> $\frac{2}{2}$ <p>- Baik: >17 - Buruk: ≤17</p>	Ordinal
3.	Demam <i>typhoid</i>	Diagnosis dokter yang diperkuat	Anak yang terdiagnosa dan tercatat	1. Kasus 2. Kontrol	Nominal

		dengan hasil laboratorium uji widal pada penderita <i>typhoid</i> .	dalam buku rekam medik		
4	Umur	Usia anak 8-12 yang dihitung dari tanggal lahir hingga hari dilakukan pengambilan data.	Kuesioner	Dinyatakan dalam tahun	Rasio
No	Variabel	Defenisi operasional	Alat Ukur	Hasil ukur	Skala
5	Jenis Kelamin	Kategori seks yang dinyatakan dengan laki-laki atau perempuan	Kuesioner	1. Laki-laki 2. Perempuan	Nominal
6	IMT (Indeks Massa Tubuh)	Metode yang digunakan untuk menilai status gizi seseorang	Kuesioner	1. Tinggi Badan 2. Berat Badan	Ordinal

Tabel 1.1 Defenisi Operasional

E. *Kajian Pustaka*

No	Peneliti	Judul	Metode	Hasil	Perbedaan dengan Penelitian Sekarang
1.	Nurvina Wahyu Artanti	Hubungan antara sanitasi lingkungan, <i>hygiene</i> perorangan,	Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara sarana	Penelitian sekarang memfokuskan pada <i>Personal hygiene</i> dan

		dan karakteristik individu dengan kejadian demam <i>typhoid</i> di wilayah kerja Puskesmas Kedung-mundu Kota	kontrol.	pembuangan tinja ($p=0,047$, $OR=5,333$), kebiasaan mencuci tangan sebelum makan ($p=0,006$, $OR=11,111$), kebiasaan	kebiasaan jajan serta perbedaan pada kriteria inklusi dan eksklusi pada sampel
	Peneliti	Judul	Metode	Hasil	Perbedaan Dengan Penelitian Sekaragh
		Semarang tahun 2012		makan di luar rumah ($p=0,005$, $OR= 12,375$), jenis kelamin ($p=0,018$, $OR=7,500$), tingkat sosial ekonomi ($p=0,016$, $OR=8,800$), dan tidak ada hubungan antara sarana air bersih ($p=0,234$), kebiasaan mencuci tangan setelah buang air besar ($p=0,107$), kebiasaan mencuci bahan makanan mentah yang	

				akan dimakan langsung ($p = 0,116$), umur ($p = 0,420$) dengan kejadian demam <i>typhoid</i> .	
2	Eunike Risani Seran,	Hubungan <i>personal hygiene</i>	Penelitian ini menggu	Hasil menunjukkan ada hubungan	Penambahan variabel kebiasaan

No	Peneliti	Judul	Metode	Hasil	Perbedaan dengan penelitian sekarang
	Henry Palandeng, Vandry D.Kallo	dengan kejadian demam <i>typhoid</i> di wilayah kerja puskesmas tumaratas	kan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan kasus kontrol	antara kebiasaan mencuci tangan sebelum makan ($p= 0,029$), kebiasaan mencuci bahan mentah langsung konsumsi ($p=0,029$) dan kebiasaan makan di luar rumah ($p=0,031$) dengan kejadian demam <i>typhoid</i> . Sedangkan kebiasaan mencuci tangan setelah BAB tidak ada hubungan dengan kejadian demam tifoid ($p=0,160$).	jajan pada penelitian sekarang, perbedaan kriteria inklusi pada sampel penelitian, penambahan pengolahan data dengan menggunakan <i>odds ratio</i> pada penelitian sekarang.

No	Peneliti	Judul	Metode	Hasil	Perbedaan dengan penelitian sekarang
	Abram Babakal	dengan kejadian demam tifoid di wilayah kerja puskesmas tumaratas	pendekatan <i>cross section</i>	Hasil <i>Exact Chi-square</i> yang mendapatkan hasil nilai $\rho=0,047 < 0,05$ berarti ada hubungan antara pengetahuan orang tua tentang demam tifoid dengan kebiasaan jajan pada anak.	penelitian sekarang

Tabel. 1.2 Kajian Pustaka

F. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengetahui hubungan *personal hygiene* dan kebiasaan jajan terhadap kejadian demam *typhoid* pada anak.

2. Tujuan Khusus

- a. Diketuainya hubungan *personal hygiene* dan kejadian demam *typhoid* pada anak.
- b. Diketuainya hubungan kebiasaan jajan dan kejadian demam *typhoid* pada anak.
- c. Diketuainya manakah yang lebih berpengaruh antara *personal hygiene* dan kebiasaan jajan terhadap kejadian demam *typhoid* pada anak.

B. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Menjadi pengalaman berharga dalam memperluas wawasan keilmuan, cakrawala pengetahuan dan pengembangan keterampilan serta sebagai ajang pengembangan diri.

2. Bagi Responden

Responden bisa mendapatkan informasi mengenai cara menjaga *personal hygiene* dan jajan yang sehat untuk mencegah terjadinya penyakit *typhoid*.

3. Bagi Institusi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kepustakaan, dapat menjadi salah satu bahan bacaan yang bermanfaat dan dapat menjadi sumber motivasi bagi mahasiswa-mahasiswi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar khususnya Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Demam Typhoid

1. Pengertian Demam Typhoid

Demam *typhoid* atau *thypus abdominalis* merupakan penyakit infeksi akut pada saluran pencernaan yang disebabkan oleh *Salmonella typhi* (Akhsin, 2010). Demam *typhoid* merupakan penyakit infeksi akut pada usus halus dengan gejala demam lebih satu minggu atau lebih disertai gangguan pada saluran pencernaan dengan atau tanpa gangguan kesadaran (Rampengan, 2007). Dalam masyarakat penyakit ini dikenal dengan nama *tipes* atau *thypus*, tetapi dalam dunia kedokteran disebut *typhoid fever* atau *thypus abdominalis* karena berhubungan dengan usus di dalam perut. Penyakit demam *typhoid* merupakan penyakit yang ditularkan melalui makanan dan minuman yang tercemar oleh bakteri *Salmonella thyposa*, (*food and water borne disease*). Seseorang yang menderita penyakit tifus menandakan bahwa ia sering mengkonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri ini (Akhsin, 2010).

2. Etiologi

Penyakit demam *typhoid* disebabkan oleh infeksi kuman *Salmonella typhosa* atau *Ebethella typhosa* yang merupakan kuman gram negatif, motil dan tidak menghasilkan spora. Kuman ini dapat hidup baik sekali pada suhu tubuh manusia 16 maupun suhu yang sedikit lebih rendah, serta mati pada suhu 70°C ataupun oleh antiseptik. Sampai saat ini, diketahui bahwa kuman ini hanya menyerang manusia (Rampengan, 2007).

Penyebab demam *typhoid* adalah *Salmonella typhi*, terdapat di seluruh dunia dengan reservoir manusia pula. *Salmonella* keluar bersama tinja atau urine,

memasuki lingkungan dan berkesempatan menyebar. Kuman *typhus* dapat bertahan cukup lama di dalam lingkungan air (Juli, 2006).

3. Epidemiologi

Demam *typhoid* menyerang penduduk di semua negara. Seperti penyakit menular lainnya, *typhoid* banyak ditemukan di negara berkembang di mana *hygiene* pribadi dan sanitasi lingkungannya kurang baik. Prevalensi kasus bervariasi tergantung lokasi, kondisi lingkungan, setempat, dan perilaku masyarakat. Angka insidensi di seluruh dunia sekitar 17 juta per tahun dengan 600.000 orang meninggal karena penyakit ini. WHO (*World Health Organisation*) memperkirakan 70% kematian berada di Asia. Indonesia merupakan negara endemik demam *typhoid*. Diperkirakan terdapat 800 penderita per 100.000 penduduk setiap tahun yang ditemukan sepanjang tahun (Widoyono, 2011).

Di negara yang telah maju, *typhoid* bersifat sporadis terutama berhubungan dengan kegiatan wisata ke negara-negara yang sedang berkembang. Secara umum insiden *typhoid* dilaporkan 75% didapatkan pada umur kurang dari 30 tahun. Pada anak-anak biasanya di atas 1 tahun dan terbanyak di atas 5 tahun dan manifestasi klinik lebih ringan (Depkes RI, 2006). Demam *typhoid* merupakan penyakit endemik di Indonesia. Penyakit ini termasuk penyakit menular yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 1962 tentang wabah. Kelompok penyakit menular ini merupakan penyakit-penyakit yang mudah menular dan dapat menyerang banyak orang, sehingga dapat menimbulkan wabah. Di Indonesia demam *typhoid* jarang dijumpai secara epidemik, tetapi lebih sering bersifat sporadis, terpencar-pencar di suatu daerah, dan jarang menimbulkan lebih dari satu kasus pada orang-orang serumah. Insiden tertinggi didapat pada remaja dan dewasa muda. Sumber penularan biasanya tidak dapat ditemukan. Demam *typhoid* ditemukan di masyarakat Indonesia, yang tinggal di

kota maupun desa. Penyakit ini sangat erat kaitannya dengan kualitas perilaku hidup bersih dan sehat, sanitasi dan lingkungan yang kurang baik. Selain masalah di atas ada beberapa masalah lain yang akan turut menambah besaran masalah penyakit demam *typhoid* di Indonesia diantaranya adalah angka kemiskinan di kota dan desa Indonesia yang mencapai 11,66% yaitu sekitar 28.594.060 orang (Susenas, 2013).

4. Sumber Penularan dan Cara Penularan

Sumber penularan demam *typhoid* atau tifus tidak selalu harus penderita tifus. Ada penderita yang sudah mendapat pengobatan dan sembuh, tetapi di dalam air seni dan kotorannya masih mengandung bakteri. Penderita ini disebut sebagai pembawa (*carrier*). Walaupun tidak lagi menderita penyakit *typhoid*, orang ini masih dapat menularkan penyakit *typhoid* pada orang lain. Penularan dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, biasanya terjadi melalui konsumsi makanan dari luar, apabila makanan atau minuman yang dikonsumsi kurang bersih (Addin, 2009).

Di beberapa negara penularan terjadi karena mengonsumsi kerang-kerangan yang berasal dari air yang tercemar, buah-buahan, sayur mentah yang dipupuk dengan kotoran manusia, susu atau produk susu yang terkontaminasi oleh *carrier* atau penderita yang tidak teridentifikasi (James, 2006). Prinsip penularan penyakit ini adalah melalui *fekal-oral*. Kuman berasal dari tinja atau urin penderita atau bahkan *carrier* (pembawa penyakit yang tidak sakit) yang masuk ke dalam tubuh manusia melalui air dan makanan. Di daerah endemik, air yang tercemar merupakan penyebab utama penularan penyakit. Adapun di daerah non-endemik, makanan yang terkontaminasi oleh *carrier* dianggap paling bertanggung jawab terhadap penularan (Widoyono, 2011). *Typhoid carrier* adalah seseorang yang tidak menunjukkan gejala penyakit demam *typhoid*, tetapi mengandung

kuman *Salmonella typhosa* di dalam sekretnya. Mengingat *carrier* sangat penting dalam hal penularan yang tersembunyi, maka penemuan kasus sedini mungkin serta pengobatannya sangat penting dalam hal menurunkan angka kematian (Rampengan, 2007).

Penularan *typhoid* dapat terjadi melalui berbagai cara, yaitu dikenal dengan 5F yaitu *food* (makanan), *fingers* (jari tangan/ kuku), *fomitus* (muntah), *fly* (lalat), dan *feses*. *Feses* dan muntah dari penderita *typhoid* dapat menularkan *Salmonella thypi* kepada orang lain. Kuman tersebut dapat ditularkan melalui minuman terkontaminasi dan melalui perantara lalat, di mana lalat akan hinggap pada makanan yang akan dikonsumsi oleh orang sehat. Apabila orang tersebut kurang memperhatikan kebersihan dirinya seperti mencuci tangan dan makanan yang tercemar kuman *Salmonella thypi* masuk ke tubuh orang yang sehat melalui mulut, selanjutnya orang sehat akan menjadi sakit (Akhsin, 2010).

Menurut Depkes RI (2006) beberapa kondisi kehidupan manusia yang sangat berperan pada penularan demam *typhoid* adalah:

a. *Hygiene* perorangan yang rendah.

Personal hygiene yang rendah dalam kehidupan sehari-hari seperti tidak mencuci tangan setelah buang air besar, tidak mencuci tangan sebelum makan serta kebiasaan tidak mencuci bahan makanan mentah yang akan dimakan langsung. Tujuan mencuci tangan adalah membersihkan tangan dari segala kotoran, mencegah penularan penyakit, dan melatih kebiasaan yang baik (PMI, 2006) sedangkan *hygiene* makanan dan minuman yang rendah merupakan faktor yang paling berperan pada penularan *typhoid*. Banyak sekali contoh untuk ini diantaranya: makanan yang dicuci dengan air yang terkontaminasi (seperti sayur-sayuran dan buah-buahan), sayuran yang dipupuk dengan tinja manusia, makanan yang tercemar.

- b. Sanitasi lingkungan yang kumuh, dimana pengelolaan air limbah, kotoran, dan sampah, yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan.

Sanitasi adalah usaha pencegahan penyakit dengan cara menghilangkan atau mengatur faktor-faktor lingkungan yang berkaitan dengan rantai perpindahan penyakit tersebut. Air limbah, kotoran, serta yang sampah yang berserakan di mana-mana akan menjadi sumber penyakit karena menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk dan lalat. Menurut WHO (*World Health Organisation*), sanitasi lingkungan adalah upaya pengendalian semua faktor lingkungan fisik manusia yang mungkin menimbulkan atau dapat menimbulkan hal-hal yang merugikan bagi perkembangan fisik, kesehatan, dan daya tahan hidup manusia (Winarsih, 2008).

- c. Penyediaan air bersih untuk warga yang tidak memadai.

Air minum adalah air yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan, dapat langsung diminum, terbebas dari bibit penyakit dan zat kimia berlebihan, tidak bersifat asam maupun basa. Air minum dapat menularkan penyakit, air yang terkontaminasi tinja sering mengakibatkan epidemik yang eksplosif. Penyakit menular yang disebarkan melalui air secara langsung di masyarakat seringkali dinyatakan sebagai penyakit bawaan air atau *water borne disease*. Penyakit-penyakit ini dapat menyebar apabila mikroorganisme penyebabnya dapat masuk ke dalam sumber air yang digunakan manusia dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Sebelum dikonsumsi air minum harus direbus terlebih dahulu hingga mendidih, disimpan dengan tertutup rapat dan sebaiknya tidak lebih dari 24 jam setelah dimasak (PMI, 2006).

- d. Jamban keluarga yang tidak memenuhi syarat.

Pembuatan jamban atau kakus merupakan usaha manusia untuk memelihara kesehatan dengan membuat lingkungan tempat hidup yang sehat (Winarsih,

2008). Dalam perencanaan pembuatan jamban, perhatian harus diberikan pada upaya pencegahan keberadaan vektor perantara penyakit demam *typhoid* yaitu pencegahan perkembangbiakan lalat. Peranan lalat dalam penularan penyakit melalui tinja (*fekal-borne diseases*) sangat besar. Tinja penderita yang dihinggapi kecoak, lalat atau semut, siap disebarkan ke mana saja kecoak, lalat atau semut itu pergi. Kalau merayap di piring, pada makanan, kue, sayuran dan lain-lain, bisa menular kepada orang lain, yang menggunakan piring atau memakan makanan-makanan tersebut (Ircham, 2008). Lalat rumah selain senang menempatkan telurnya pada kotoran kuda atau kotoran kandang, juga senang menempatkannya pada kotoran manusia yang terbuka dan bahan organik lain yang sedang mengalami penguraian. Pengelolaan kotoran manusia yang tidak memenuhi syarat dapat menjadi sumber penularan penyakit yang mengancam kesehatan masyarakat banyak. Oleh karena itu kotoran manusia perlu ditangani dengan seksama (Depkes RI, 2006).

e. Pasien atau karier *typhoid* yang tidak diobati secara sempurna.

Carrier adalah manusia tempat berdiamnya agent menular spesifik, dengan adanya penyakit yang secara klinis tidak terlihat nyata, tetapi dapat bertindak sebagai sumber infeksi yang cukup penting (Nasry, 2006). *Carrier* atau pembawa *Salmonella typhi* merupakan orang yang tidak menampakkan gejala demam *typhoid* mereka merasa dirinya sehat, tetapi kotorannya mengandung kuman *Salmonella*. Tinja *carrier* merupakan sumber kontaminasi yang penting pada kasus klinis setelah infeksi subklinis, beberapa individu melanjutkan untuk mempertahankan *Salmonella* dalam jaringan tubuh selama waktu yang bervariasi (Jawetz, 2006).

f. Belum membudaya program imunisasi untuk *typhoid*.

Selain pencegahan yang dilakukan dengan menjaga kebersihan makanan dan minuman serta mengobati *carrier* yang berpotensi menjadi sumber penularan penyakit selain itu juga perlu dilakukan imunisasi dengan memberikan vaksin monovalen *Salmonella typhi* namun hingga sampai sekarang ini belum ada juga pencegahan terhadap penularan demam *typhoid* dengan pemberian vaksin tersebut (Radji, 2010).

5. Patogenesis

Kuman *Salmonella* masuk bersama makanan atau minuman. Setelah berada dalam usus halus, kuman mengadakan invasi ke jaringan limfoid usus halus (terutama plak payer) dan jaringan *limfoid mesenterika*. Setelah menyebabkan peradangan dan *nekrosis* setempat kuman lewat pembuluh limfe masuk ke darah (bakteremia primer) menuju organ *retikuloendotelial system* (RES) terutama hati dan limpa. Di tempat ini, kuman difagosit oleh sel-sel fagosit RES dan kuman yang tidak difagosit akan berkembang biak. Pada akhir masa inkubasi, berkisar 5-9 hari, kuman kembali masuk darah menyebar ke seluruh tubuh (bakteremia sekunder), dan sebagian kuman masuk ke organ tubuh terutama limpa, kandung empedu yang selanjutnya kuman tersebut dikeluarkan kembali dari kandung empedu ke rongga usus dan menyebabkan reinfeksi usus. Dalam masa bakteremia ini, kuman mengeluarkan endotoksin yang susunan kimianya sama dengan antigen somatic (lipopolisakarida), yang semula diduga bertanggung jawab terhadap terjadinya gejala-gejala dari demam *typhoid*. Demam *typhoid* disebabkan oleh *Salmonella typhosa* dan endotoksinya yang merangsang sintesis dan pelepasan zat pirogen oleh leukosit pada jaringan yang meradang. Selanjutnya zat pirogen yang beredar di darah mempengaruhi pusat termoregulator di hipotalamus yang mengakibatkan timbulnya gejala demam (Rampengan, 2007).

6. Tanda dan Gejala

a. Masa Inkubasi

Masa inkubasi dapat berlangsung 7-21 hari, walaupun pada umumnya adalah 10-12 hari. Pada awal penyakit keluhan dan gejala penyakit tidaklah khas, berupa:

- 1) Anoreksia
- 2) Rasa malas
- 3) Sakit kepala bagian depan
- 4) Nyeri otot
- 5) Lidah kotor
- 6) Gangguan perut (Haryono, 2012).

b. Gambaran klasik demam *typhoid* (Gejala Khas).

Gambaran klinis klasik yang sering ditemukan pada penderita demam *typhoid* dapat dikelompokkan pada gejala yang terjadi pada minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga dan minggu keempat sebagai berikut:

1) Minggu Pertama (awal infeksi)

Demam tinggi lebih dari 40°C, nadi lemah bersifat dikrotik, denyut nadi 80-100 per menit.

2) Minggu Kedua

Suhu badan tetap tinggi, penderita mengalami delirium, lidah tampak kering mengkilat, denyut nadi cepat. Tekanan darah menurun dan limfa teraba.

3) Minggu Ketiga

Keadaan penderita membaik jika suhu menurun, gejala dan keluhan berkurang. Sebaliknya kesehatan penderita memburuk jika masih terjadi delirium, stupor, pergerakan otot yang terjadi terus-menerus, terjadi inkontinensia urine atau alvi. Selain itu tekanan perut

meningkat. Terjadi meteorismus dan timpani, disertai nyeri perut. Penderita kemudian mengalami kolaps akhirnya meninggal dunia akibat terjadinya degenerasi miokardial toksik.

4) Minggu Keempat

Penderita yang keadaannya membaik akan mengalami penyembuhan (Soedarto, 2009).

7. Diagnosis

Untuk menegakkan diagnosis demam *typhoid*, dapat ditentukan melalui tiga dasar diagnosis, yaitu berdasar diagnosis klinis, diagnosis mikrobiologis dan diagnosis serologis.

a. Diagnosis Klinis

Diagnosis klinis adalah kegiatan anamnesis dan pemeriksaan fisik untuk mendapatkan sindrom klinis demam *typhoid*. Diagnosis klinis adalah diagnosis kerja yang berarti penderita telah mulai dikelola sesuai dengan *managemen typhoid* (Depkes RI, 2006).

b. Diagnosis Mikrobiologis

Metode ini merupakan metode yang paling baik karena spesifik sifatnya. Pada minggu pertama dan minggu kedua biakan darah dan biakan sumsum tulang menunjukkan hasil positif, sedangkan pada minggu ketiga dan keempat hasil biakan tinja dan biakan urine menunjukkan positif kuat.

c. Diagnosis Serologis

Tujuan metode ini untuk memantau antibodi terhadap antigen O dan antigen H, dengan menggunakan uji aglutinasi widal. Jika titer aglutinin 1/200 atau terjadi kenaikan titer lebih dari 4 kali, hal ini menunjukkan bahwa demam *typhoid* sedang berlangsung akut (Soedarto, 2009).

8. Penatalaksanaan

Penatalaksanaan demam *typhoid* ada tiga, yaitu:

a. Pemberian antibiotik

Terapi ini dimaksudkan untuk membunuh kuman penyebab demam *typhoid*.

Obat yang sering dipergunakan adalah:

- 1) Kloramfenikol 100mg/kg berat badan/hari/4 kali selama 14 hari
- 2) Amoksilin 100 mg/kg berat badan/hari/4 kali.
- 3) Kotrimoksazol 480 mg, 2x2 tablet selama 14 hari
- 4) Sefalosporin generasi I dan III (ciprofloxacin 2x500 mg selam 6 hari, ofloxacin 600 mg/hari selama 7 hari, ceftriaxone 4 gram/hari selama 3 hari).

b. Istirahat dan perawatan

Langkah ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya komplikasi. Penderita sebaiknya beristirahat total di tempat tidur selama 1 minggu setelah bebas dari demam. Mobilisasi dilakukan secara bertahap, sesuai dengan keadaan penderita. Mengingat mekanisme penularan penyakit ini, kebersihan perorangan perlu dijaga karena ketidakberdayaan pasien untuk buang air besar dan air kecil.

c. Terapi penunjang dan diet

Agar tidak memperberat kerja usus, pada tahap awal penderita diberi makanan berupa bubur saring. Selanjutnya penderita dapat diberi makanan yang lebih padat dan akhirnya nasi biasa, sesuai dengan kemampuan dan kondisinya. Pemberian kadar gizi dan mineral perlu dipertimbangkan agar dapat menunjang kesembuhan penderita (Widoyono, 2011).

9. Pencegahan

Usaha yang bisa dilakukan untuk mencegah penyakit ini adalah :

- a. Dari sisi manusia
 - 1) Vaksinasi untuk mencegah agar seseorang terhindar dari penyakit ini dilakukan vaksinasi, kini sudah ada vaksin tipes atau *typhoid* yang disuntikan atau diminum dan dapat melindungi seseorang dalam waktu 3 tahun.
 - 2) Pendidikan kesehatan pada masyarakat: sanitasi lingkungan dan *personal hygiene*.
- b. Dari sisi lingkungan hidup
 - 1) Penyediaan air minum yang memenuhi syarat kesehatan.
 - 2) Pembuangan kotoran manusia yang *hygienis*.
 - 3) Pemberantasan lalat.
 - 4) Pengawasan terhadap masakan di rumah dan penyajian pada penjual makanan (Akhsin, 2010).

B. *Personal Hygiene*

1. Definisi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2016), *hygiene* diartikan sebagai ilmu yg berkenaan dengan masalah kesehatan dan berbagai usaha untuk mempertahankan atau memperbaiki kesehatan. *Personal hygiene* berasal dari bahasa Yunani yaitu *personal* artinya perorangan dan *hygiene* berarti sehat. *Hygiene* perorangan adalah tindakan memelihara kebersihan dan kesehatan seseorang untuk kesejahteraan fisik dan psikis (Tarwoto dan Wartonah, 2006).

Hygiene perorangan merupakan ciri berperilaku hidup sehat. Beberapa kebiasaan berperilaku hidup sehat antara lain kebiasaan mencuci tangan dengan sabun setelah BAB dan kebiasaan mencuci tangan dengan sabun sebelum makan.

Peningkatan *hygiene* perorangan adalah salah satu dari program pencegahan yakni perlindungan diri terhadap penularan *typhoid* (Depkes RI, 2006).

Kegiatan-kegiatan yang mencakup *personal hygiene* adalah:

a. Mandi

Menurut Irianto (2007), mandi merupakan bagian yang penting dalam menjaga kebersihan diri. Mandi dapat menghilangkan bau, menghilangkan kotoran, merangsang peredaran darah, memberikan kesegaran pada tubuh. Sebaiknya mandi dua kali sehari, alasan utama adalah agar tubuh sehat dan segar bugar. Mandi membuat tubuh kita segar dengan membersihkan seluruh tubuh kita. Urutan mandi yang benar adalah seluruh tubuh dicuci dengan sabun mandi. Oleh buih sabun, semua kotoran dan kuman yang melekat mengotori kulit lepas dari permukaan kulit, kemudian tubuh disiram sampai bersih, seluruh tubuh digosok hingga keluar semua kotoran atau daki. Keluarkan daki dari wajah, kaki, dan lipatan-lipatan. Gosok terus dengan tangan, kemudian seluruh tubuh disiram sampai bersih sampai kaki.

b. Perawatan mulut dan gigi

Mulut yang bersih sangat penting secara fisik dan mental seseorang. Perawatan pada mulut juga disebut *oral hygiene*. Melalui perawatan pada rongga mulut, sisa-sisa makanan yang terdapat di mulut dapat dibersihkan. Selain itu, sirkulasi pada gusi juga dapat distimulasi dan dapat mencegah halitosis. Maka penting untuk menggosok gigi sekurang-kurangnya 2 kali sehari dan sangat dianjurkan untuk berkumur-kumur atau menggosok gigi setiap kali selepas kita makan. Kesehatan gigi dan rongga mulut bukan sekedar menyangkut kesehatan di rongga mulut saja. Kesehatan mencerminkan kesehatan seluruh tubuh. Orang yang giginya tidak sehat, pasti kesehatan dirinya berkurang. Sebaliknya apabila gigi sehat dan terawat baik, seluruh dirinya sehat dan segar bugar. Menggosok

gigi sebaiknya dilakukan setiap selesai makan. Sikat gigi jangan ditekan keras-keras pada gigi kemudian digosokkan cepat-cepat. Tujuan menggosok gigi ialah membersihkan gigi dan seluruh rongga mulut. Dibersihkan dari sisa-sisa makanan, agar tidak ada sesuatu yang membusuk dan menjadi sarang bakteri.

c. Cuci tangan

Tangan adalah anggota tubuh yang paling banyak berhubungan dengan apa saja. Kita menggunakan tangan untuk menjamah makanan setiap hari. Selain itu, sehabis memegang sesuatu yang kotor atau mengandung kuman penyakit, selalu tangan langsung menyentuh mata, hidung, mulut, makanan serta minuman. Hal ini dapat menyebabkan pemindahan sesuatu yang dapat menjadi penyebab terganggunya kesehatan karena tangan merupakan perantara penularan kuman.

1) Kebiasaan mencuci tangan dengan sabun setelah buang air besar

Tangan yang kotor atau terkontaminasi dapat memindahkan bakteri atau virus patogen dari tubuh, *feses* atau sumber lain ke makanan. Oleh karenanya kebersihan tangan dengan mencuci tangan perlu mendapat prioritas tinggi, walaupun hal tersebut sering disepelekan (Fathonah, 2005).

Kegiatan mencuci tangan sangat penting untuk bayi, anak-anak, penyaji makanan di restoran, atau warung serta orang-orang yang merawat dan mengasuh anak. Setiap tangan kontak dengan feses, urine atau dubur sesudah buang air besar (BAB) maka harus dicuci pakai sabun dan kalau dapat disikat (Depkes RI, 2006). Pencucian dengan sabun sebagai pembersih, penggosokkan dan pembilasan dengan air mengalir akan menghanyutkan partikel kotoran yang banyak mengandung mikroorganisme (Fathonah, 2005).

2) Kebiasaan mencuci tangan sebelum makan

Kebersihan tangan sangatlah penting bagi setiap orang. Kebiasaan mencuci tangan sebelum makan harus dibiasakan. Pada umumnya ada

keengganan untuk mencuci tangan sebelum mengerjakan sesuatu karena dirasakan memakan waktu, apalagi letaknya cukup jauh. Dengan kebiasaan mencuci tangan, sangat membantu dalam mencegah penularan bakteri dari tangan kepada makanan (Depkes RI, 2006). Budaya cuci tangan yang benar adalah kegiatan terpenting. Setiap tangan yang dipergunakan untuk memegang makanan, maka tangan harus sudah bersih. Tangan perlu dicuci karena ribuan jasad renik, baik flora normal maupun cemaran, menempel di tempat tersebut dan mudah sekali berpindah ke makanan yang tersentuh. Pencucian dengan benar telah terbukti berhasil mereduksi angka kejadian kontaminasi dan KLB (Arisman, 2008).

Cara mencuci tangan yang benar adalah sebagai berikut:

- 1) Cuci tangan dengan air yang mengalir dan gunakan sabun. Tidak perlu harus sabun khusus antibakteri, namun lebih disarankan sabun yang berbentuk cairan.
- 2) Gosok tangan setidaknya selama 15-20 detik.
- 3) Bersihkan bagian pergelangan tangan, punggung tangan, sela-sela jari dan kuku.
- 4) Basuh tangan sampai bersih dengan air yang mengalir.
- 5) Keringkan dengan handuk bersih atau alat pengering lain.
- 6) Gunakan tisu atau handuk sebagai penghalang ketika mematikan keran air (Atikah, 2012).

Penularan bakteri *Salmonella typhi* salah satunya melalui jari tangan atau kuku. Apabila orang tersebut kurang memperhatikan kebersihan dirinya seperti mencuci tangan sebelum makan maka kuman *Salmonella typhi* dapat masuk ke tubuh orang sehat melalui mulut, selanjutnya orang sehat akan menjadi sakit (Akhsin, 2010).

Kebersihan itu sendiri telah dijelaskan dalam Al-qur'an karena kebersihan itu bersumber dari iman dan merupakan bagian dari iman. Dalam Al-qur'an pun telah dijelaskan tentang pentingnya kebersihan, sehingga orang yang membersihkan diri atau mengusahakan kebersihan akan dicintai oleh Allah SWT, sebagaimana firman-Nya dalam Q.S Al-Baqarah/2: 222 yang berbunyi :

... إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

Terjemahannya :

“...Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan / membersihkan diri”.

Dari ayat di atas sudah dapat disimpulkan bahwa kebersihan memang penting untuk setiap orang karena selain untuk mencegah datangnya penyakit juga bisa bernilai ibadah karena itu sering juga dipakai kata “bersuci” sebagai padanan kata “membersihkan/ melakukan kebersihan”. Di dalam tafsir Al-azhar ayat ini menjelaskan tentang mensucikan diri, bagi wanita yang telah berhenti haid baik dari dari kotoran lahir maupun dari kotoran batin. Dari Kotoran lahir hendaklah mensucikannya dengan cara mandi wajib, berperilaku bersih dalam kehidupan serta menggunakan pakaian yang bersih yang dalam beribadah sedangkan kotoran batin hendaklah disucikan dengan cara lebih mendekat diri kepada-Nya (Hamka, 2012).

C. Kebiasaan Jajan

Sebagai pendamping saat anak melakukan aktivitasnya setiap hari, para orang tua dan guru seharusnya menjadi sosok yang sangat penting dalam menjaga kesehatannya. Peranan mereka sangat dominan dan menentukan kualitas hidupnya di kemudian hari. Sehingga, sangatlah penting bagi mereka diketahuinya dan memahami permasalahan beserta gangguan kesehatannya, terutama pada usia sekolah, yang cukup luas dan kompleks. Secara epidemiologis, penyebaran

penyakit berbasis lingkungan dikalangan anak sekolah di Indonesia tergolong sangat tinggi. Terjadinya infeksi, seperti demam berdarah *dengue*, diare, cacingan dan demam *thypoid* (*tifus abdomalin*), sanitasi dan keamanan pangan, masih banyak ditemui dalam kehidupan sehari-hari.

Penyakit yang cukup mengganggu dan menjadi persoalan utama sekaligus berpotensi mengakibatkan keadaan bahaya (mengancam jiwa) adalah penyakit menular pada anak sekolah. Sekolah merupakan sumber penularan penyakit pada anak sekolah. Sebab, dalam interaksi antar anak, banyak terjadi kontak langsung maupun tidak langsung, yang menyebabkan terjadinya penyebaran dan penularan penyakit. Bagi penyakit yang menular di lingkungan sekolah antara lain demam berdarah *dengue*, campak, rubella (campak jerman), cacar air, gondongan dan demam *thypoid* (tifus abdomalin) (Mufidah F, 2012).

Pada orang yang miskin bila sakit tidak berobat kesarana kesehatan medis hal ini dikarenakan masalah biaya, sehingga bila mereka menjadi penjamah makanan maka mereka akan menjadi sumber penularan penyakit kepada masyarakat yang menjadi pembeli jajanan tersebut. Risiko penularan melalui penjual makanan di jalanan yang kebersihannya buruk memperbanyak jumlah kasus demam *typhoid* (Anonim, 2009).

Penyakit infeksi *tifus abdominalis* atau demam *typhoid* ditularkan melalui makanan dan minuman yang tercemar kuman *Salmonella typhi* (WHO, 2009). Demam *typhoid* ditandai dengan gejala demam satu minggu atau lebih disertai gangguan pada saluran pencernaan dengan atau tanpa gangguan kesadaran (Soedarto, 2009).

Secara umum, untuk memperkecil kemungkinan tercemar *Salmonella thyphi*, maka setiap individu harus memperhatikan kualitas makanan dan minuman yang mereka konsumsi demi menjaga kesehatan diri sendiri. Allah Swt.

pun telah menghimbau agar kita memakan makanan yang sehat lagi halal sebagaimana yang telah dituliskan Allah Swt. dalam Q.S Al-Baqarah/2: 172 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاَشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ﴿١٧٢﴾

Terjemahannya:

“ Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”

Menjaga kebersihan makan sangatlah penting karena penularan penyakit dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, biasanya terjadi melalui konsumsi makanan di luar rumah atau di tempat-tempat umum, apabila makanan atau minuman yang dikonsumsi kurang bersih. Dapat juga disebabkan karena makanan tersebut disajikan oleh seorang penderita tifus laten (tersembunyi) yang kurang menjaga kebersihan saat memasak. Seseorang dapat membawa kuman tifus dalam saluran pencernaannya tanpa sakit, ini yang disebut dengan penderita laten. Sumber penularan utama demam *typhoid* adalah penderita itu sendiri dan *carrier*, yang mana mereka dapat mengeluarkan berjuta-juta kuman *Salmonella thypi* dalam tinja, dan tinja inilah yang menjadi sumber penularan. Debu yang berasal dari tanah yang mengering, membawa bahan-bahan yang mengandung kuman penyakit yang dapat mencemari makanan yang dijual di pinggir jalan. Debu tersebut dapat mengandung tinja atau urin dari penderita atau karier demam *typhoid*. Bila makanan dan minuman tersebut dikonsumsi oleh orang sehat terutama anak-anak sekolah yang sering jajan sembarangan maka rawan tertular penyakit infeksi demam *typhoid*. Infeksi demam *typhoid* juga dapat tertular melalui makanan dan minuman yang tercemar kuman yang dibawa oleh lalat. Penderita ini dapat menularkan penyakit tifus ini ke banyak orang, apalagi jika dia

bekerja dalam menyajikan makanan bagi banyak orang seperti tukang masak di restoran (Addin A, 2009).

1. Jenis-jenis Makanan Jajanan

Jenis-jenis jajanan menurut Direktorat Bina Gizi (2011):

- a. Makanan utama yang disiapkan di rumah terlebih dahulu atau disiapkan di tempat penjualan seperti, gado-gado, nasi uduk, siomay, bakso, mie ayam, lontong sayur dan lain-lain.
- b. Makanan cemilan, yaitu makanan yang dikonsumsi diantara dua waktu makan. Makanan cemilan terdiri dari:
 - 1) Makanan cemilan basah, seperti pisang goreng, lempeng, lumpia, risoles dan lain-lain. Makanan cemilan ini disiapkan terlebih dahulu di rumah sebelum dibawa ke tempat penjualan.
 - 2) Makanan cemilan kering, seperti keripik, biskuit, kue kering dan lain-lain. Cemilan ini semula diproduksi oleh industri pangan baik industri besar, industri kecil ataupun industri rumah tangga.
- c. Kelompok minuman yang biasa dijual meliputi:
 - 1) Air minum, baik dalam kemasan maupun yang disediakan sendiri.
 - 2) Minuman ringan, biasa dijual dalam kemasan seperti minuman teh, minuman sari buah, minuman berkarbonasi dan lain-lain.
 - 3) Minuman campur seperti es buah, es cendol, es doger, dan lain-lain.

Jenis makanan atau minuman yang disukai anak-anak adalah makanan yang mempunyai rasa manis, enak dengan warna-warni yang menarik, dan bertekstur lembut. Jenis makanan seperti coklat, permen, jeli, biskuit, makanan ringan (*snack*) merupakan produk makanan favorit bagi sebagian besar anak-anak. Minuman yang berwarna-warni (air minum dalam kemasan maupun es sirup tanpa label), minuman jeli, es susu, minuman

ringan (*sot drink*) dan lain-lain merupakan kelompok minuman yang disukai anak-anak (Nuraini 2007).

2. Fungsi Makanan Jajanan

Makanan jajanan selain berfungsi sebagai makanan selingan, berperan juga sebagai sebagai peningkatan gizi masyarakat. Makanan jajanan berfungsi untuk menambah zat-zat makanan yang tidak atau kurang pada makanan utamadan lauk-pauknya. Selain itu makanan jajanan juga berfungsi, antara lain:

- a. Sebagai sarapan pagi
- b. Sebagai makanan selingan yang dimakan di antara waktu makan makannan utama
- c. Sebagai makan siang terutama bagi mereka yang tidak sempat makan di rumah
- d. Sebagai produk yang mempunyai nilai ekonomi bagi para pedagang

3. Dampak Makanan Jajanan

Adapun dampak makanan jajanan menurut Febry (2010), yaitu:

- a. Bagi anak-anak sekolah, makanan jajanan merupakan perkenalan dengan beragam jenis makanan sehigga menumbuhkan kebiasaan peranakanagaman sejak kecil
- b. Makanan jajanan yang kurang memenuhi syarat kesehatan (termasuk dalam hal cara pengolahan makanan jajanan, penggunaan zat pewarna yang bukan pewarna makanan, cara penyajian, dan lain-lain), sewaktu-waktu dapat mengancam kesehatan anak.
- c. Mengakibatkan berkurangnya nafsu makan anak di rumah

4. Makanan jajanan aman

Makanan jajanan aman adalah makanan jajanan yang tidak mengandung bahaya keamanan pangan, yang terdiri dari cemaran biologis/mikrobiologis, kimia dan fisik yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Makanan aman juga harus terjamin *hygiene* dan sanitasnya selaman proses penanganan makanan, mulaindari persiapan, pembuatan, hingga penyajian makanan. Hal ini bertujuan untuk menghindari penyakit infeksi atau penyakit lainnyaa. Selain menimbulkan keracunan makanan, makanan yang tidak aman atau makanan yang menggunakan pewarna, pemanis, penambah cita rasa, dan peningkat tekstur dapat membuat imunitas tubuh seseorang menurun (Direktorat Bina Gizi, 2011).

5. Sumber atau Penyebab Pangan Tidak Aman

Direktorat Bina Gizi (2011) menyebutkan sumber atau penyebab pangan tidak aman dapat berasal dari 3 cemara, yaitu cemaran fisik, cemaran kimia, dan cemaran biologis.

a. Cemaran fisik

Cemaran fisik dapat berupa rambut yang berasal dari pembuat makanan yang tidak menggunakan penutup kepala saat bekerja, potongan kayu, potongan bagian tubuh serangga, pasir, batu, dan lainnya. Cemaran fisik ini dapat mencemari makanan pada tahapproses pemilihan, penyimpanan, persiapan, pemasakan bahan pangan, pengemasan, penyimpanan dan pendistribusian makanan matang serta pada saat makanan dikonsumsi.

b. Cemaran kimia

Cemaran kimia dapat berasal dari lingkungan yang tercemar limbah industri, radiasi, serta penyalahgunaan bahan berbahaya yang dilarang untuk pangan yang

ditambahkan kedalam pangan. Contoh bahan yang termasuk bahan berbahaya adalah formalin, *rhodamin B*, *Iboraks*, dan *Imethanii yellow*.

Selain penyebab tersebut, cemaran kimia dapat juga berasal dari racun alami yang terdapat dalam bahan pangan itu sendiri. Seperti halnya cemaran fisik. Cemaran kimia dapat mencemari makanan pada saat tahap proses pemilihan bahan baku, penyimpanan bahan, persiapan dan pemasakan, pengemasan, penyimpanan makanan jadi, pendistribusian serta pada saat makanan dikonsumsi.


c. Cemaran biologis

Cemaran biologis umumnya disebabkan oleh rendahnya kebersihan dan sanitasi. Contoh cemaran biologis yang umum mencemari makanan seperti:

- 1) *Salmonella* pada unggas. *Salmonella* dapat ditularkan dari kulit telur yang kotor.
- 2) *E coli* O157-H7 pada sayuran mentah. Kontaminasi dapat berasal dari kotoran hewan maupun pupuk kandang yang digunakan dalam proses penanaman sayur.

Cemaran biologis ini dapat mencemari makanan pada berbagai tahapan, mulai dari tahap pemilihan pangan, penyimpanan bahan pangan, persiapan dan pemasakan bahan pangan, pengemasan makanan matang, penyimpanan makanan matang dan pendistribusiannya serta pada makanan dikonsumsi.

D. Kerangka Teori



Sumber : Depkes RI (2006)

Sumber: Kemenkes 2003

Gambar 2.1 Kerangka Teori

E. Kerangka Konsep


Variabel independen:

1. *Personal Hygiene*
 - a) Mandi
 - b) Perawatan mulut dan gigi
 - c) Cuci tangan
2. Kebiasaan Jajan
 - a) Jenis-jenis makanan jajanan
 - b) Fungsi makanan jajanan
 - c) Dampak makanan jajanan
 - d) Makanan jajanan aman
 - e) Sumber atau penyebab pangan tidak aman.

Variabel Dependen

Demam *typhoid*

```
graph LR; A["1. Personal Hygiene  
a) Mandi  
b) Perawatan mulut dan gigi  
c) Cuci tangan  
2. Kebiasaan Jajan  
a) Jenis-jenis makanan jajanan  
b) Fungsi makanan jajanan  
c) Dampak makanan jajanan  
d) Makanan jajanan aman  
e) Sumber atau penyebab pangan tidak aman."] --> B["Demam typhoid"];
```

F. Kerangka Kerja

Gambar 2.3 Kerangka Kerja

BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Desain Penelitian*

Jenis penelitian yang digunakan metode *survey* analitik dengan menggunakan pendekatan *Case Control*. *Case Control* dapat dipergunakan untuk mencari hubungan seberapa jauh faktor risiko mempengaruhi terjadinya penyakit. Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif korelasional di mana metode ini bertujuan untuk mengetahui hubungan personal hygiene dan kebiasaan jajan terhadap kejadian demam *typhoid* pada anak.

B. *Lokasi dan Waktu Penelitian*

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dilakukannya penelitian lokasi ini sekaligus membatasi ruang lingkup penelitian tersebut (Notoatmodjo, 2010). Lokasi penelitian dilakukan di Puskesmas Samata untuk responden kasus karena berdasarkan dari data awal yang diperoleh banyak anak yang pernah mengalami demam *typhoid* yang telah tercatat dalam buku rekam medik sedangkan untuk reponden kontrol data diambil dari SD Negeri Samata.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian adalah waktu penelitian tersebut akan dilakukan (Notoatmodjo, 2010). Penelitian ini akan dilaksanakan pada tanggal 1 Juni-18 Juni 2016.

C. *Populasi dan Sampel*

1. **Populasi**

Populasi merupakan keseluruhan subjek atau objek dengan karakteristik tertentu yang akan diteliti. Bukan hanya objek atau subjek yang dipelajari saja tetapi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki subjek atau objek tersebut (Hidayat, 2008). Populasi yang menjadi fokus penelitian ini adalah populasi kasus yaitu pasien demam *typhoid* yang tercatat dalam rekam medik pada bulan April 2016 sebanyak 31 pasien, sedangkan populasi kontrol adalah sisw-siswi SD Negeri Samata.

2. **Sampel**

Sampel adalah sejumlah anggota yang dipilih atau diambil dari suatu populasi. Dalam penelitian keperawatan, kriteria sampel meliputi kriteria inklusi dan eksklusi, di mana kriteria itu menentukan dapat dan tidaknya sampel tersebut digunakan. Dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin (Tiro, 2009) sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{N \cdot d^2 + 1}$$

Keterangan:

N = jumlah sampel

N = jumlah populasi

d^2 = presisi (ditetapkan 10% dengan kepercayaan 95 %)

Berdasarkan rumus tersebut diperoleh jumlah sampel berikut:

$$n = \frac{N}{N \cdot d^2 + 1}$$

$$n = \frac{31}{31 \cdot (0,1)^2 + 1}$$

$$n = \frac{31}{1,31}$$

$$n = 23,66 \text{ di bulatkan menjadi } 24$$

Jadi sampel dalam penelitian ini yang didapatkan peneliti menggunakan rumus Slovin adalah sejumlah 24 orang dan juga memenuhi kriteria inklusi dan eksklus. Dengan perbandingan 1:1 untuk kelompok kasus dan kelompok kontrol, maka besar sampel penelitian ini adalah 24 sampel kasus dan 24 sampel kontrol. Jadi jumlah sampel secara keseluruhan sebesar 48 sampel.

3. Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan secara *non probability sampling* dengan jenis *purposive sampling* yaitu suatu teknik penetapan sampel dengan cara memilih sampel diantara populasi sesuai dengan yang dikehendaki peneliti (tujuan/masalah penelitian), sehingga sampel tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang telah dikenal sebelumnya (Nursalam, 2013).

a. Kriteria inklusi:

1) Kasus

- a) Bersedia menjadi responden
- b) Usia anak 8-12 tahun
- c) Anak dengan diagnosa demam *typhoid* yang diambil dari buku rekam medik puskesmas Samata.

2) Kontrol

- a) Bersedia menjadi responden
- b) Usia anak 8-12 tahun
- c) Anak yang berada di lokasi penelitian saat penelitian berlangsung.

b. Kriteria eksklusi :

1) Kasus

- a) Anak yang tidak berusia 8-12 tahun
- b) Anak yang tidak bersedia menjadi responden
- c) Orang tua yang tidak bersedia anaknya menjadi responden.

2) Kontrol

- a) Anak yang tidak berusia 8-12 tahun
- b) Anak tidak bersedia menjadi responden.

D. Pengumpulan data

1. Data primer

Data primer merupakan data sumber pertama data yang diperoleh langsung dari responden dengan menggunakan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya dalam bentuk kuesioner oleh peneliti.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain, dalam hal ini peneliti mengambil data dari Puskesmas Samata serta literatur-literatur dari buku mengenai demam *typhoid*.

E. *Instrument penelitian*

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk menjawabnya (Sugiyono, 2006). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kuesioner yang telah diuji tingkat validasi dan reliabelnya. Pertanyaan tentang *personal hygiene* terdiri dari 9 item yang telah dinyatakan valid karena hasil dari *cronbach alfa* 0,838 yang berarti 83,3% dari varians alat ukur ini merupakan *true varians* dari 16,2% merupakan *error varians*. Nilai ini menunjukkan bahwa alat ukur *personal hygiene* memiliki nilai reabilitas yang baik. Sehingga 9 item pertanyaan tersebut dinyatakan reliabel.

Dan untuk pengukuran kebiasaan jajan *hygiene* terdiri dari 7 item yang telah dinyatakan valid karena hasil dari *cronbach alfa* 0,781 yang berarti 78,1% dari varians alat ukur ini merupakan *true varians* dari 21,9% merupakan *error varians*. Nilai ini menunjukkan bahwa alat ukur untuk kebiasaan jajan memiliki nilai reabilitas yang dapat diterima. Sehingga 7 item pertanyaan tersebut dinyatakan reliabel.

F. *Pengolahan dan Penyajian Data*

1. *Editing*

Editing adalah upaya untuk memeriksa kembali kebenaran data yang diperoleh atau dikumpulkan. Editing dapat dilakukan pada tahap pengumpulan data atau setelah data terkumpul.

2. Coding

Pemberian nilai atau kode pada pilihan jawaban yang sudah lengkap, diberi skor (4) untuk jawaban Selalu, skor (3) untuk pilihan jawaban yang Sering, skor (2) untuk pilihan jawaban Jarang, dan skor (1) untuk jawaban Tidak Pernah.

3. Tabulating

Pengolahan dan penyajian data dalam bentuk tabel deskriptif sederhana. Bertujuan untuk mempermudah analisa data dan pengolahan data serta pengambilan kesimpulan, data dimasukkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi.

G. Analisis Data

1. Analisa Univariat

Analisis univariat yang dilakukan terhadap variabel hasil penelitian pada umumnya dalam analisis hanya menggunakan distribusi dan presentase dari tiap variabel (Notoadmodjo, 2010). Variabel dalam penelitian adalah *personal hygiene* dan kebiasaan jajan.

2. Analisa Bivariat

Analisis bivariat dilakukan dengan menggunakan uji *Chi-square* (χ^2) Dengan menggunakan $\alpha=0,05$ dan *Confidence Interval* (CI) sebesar 95%, estimasi besar sampel dihitung dengan menggunakan *Odds ratio* (OR). Dalam penelitian ini, uji statistik yang digunakan adalah *Chi-square* karena untuk mengetahui hubungan.

a. Analisis *Chi-square*

Setelah diolah, kemudian dianalisis dengan uji statistik *Chi-square test* untuk membuktikan adanya hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat.

b. Penentuan *Odds Ratio* (OR)

Odds Ratio (OR) yaitu penilaian berapa sering terdapat paparan pada kasus dibandingkan pada kontrol. *Odd Ratio* (OR) menunjukkan besarnya peran faktor risiko yang diteliti terhadap terjadinya penyakit (Sastroasmoro dan Ismail 2011). Penghitungan analisis hasil studi kasus kontrol dapat dilakukan dengan melihat proporsi masing-masing variabel bebas yang diteliti pada kasus dan kontrol dilakukan analisis variabel dengan cara memasukkan setiap variabel yang diduga berisiko dengan kejadian demam *typhoid* di wilayah kerja Puskesmas Samata ke dalam tabel dengan menghitung *Odd Ratio* (OR) dan CI 95% dengan kemaknaan $p=0,05$. *Odd Ratio* (OR) digunakan untuk mengetahui seberapa besar peran faktor risiko terhadap terjadinya penyakit demam tifoid dinilai seberapa sering pajanan pada kasus dibandingkan pada control dapat di lihat pada table berikut:

		Kasus	Kontrol	Jumlah
Faktor risiko (+)	Ya	a	b	a+b
Faktor risiko (-)	Tidak	c	d	c+d
Jumlah		a+c	b+d	a+b+c+d

Sumber: Sastroasmoro dan Ismail, 2011.

Tabel 3.1 Penentuan *Odds Ratio*

Keterangan :

A = Kasus yang pernah mengalami paparan

B = Kontrol yang mengalami pajanan

C = Kasus yang tidak mengalami pajanan

D = Kontrol yang tidak mengalami pajanan

Untuk menilai *Odds Ratio* (OR) atau seberapa sering terdapat pajanan pada kasus dibandingkan pada kontrol yaitu: $OR = \frac{\text{Odds pada kasus}}{\text{Odds pada kontrol}}$.

Interpretasi *Odd Ratio* (OR) dan 95% *CI*

- a. $OR > 1$, dan 95% *CI* tidak mencakup angka 1, menunjukkan bahwa faktor yang diteliti merupakan faktor risiko timbulnya penyakit.
- b. $OR > 1$, dan 95% *CI* mencakup angka 1, menunjukkan bahwa faktor yang diteliti belum merupakan faktor risiko timbulnya penyakit.
- c. $OR = 1$, dan 95% *CI* mencakup angka 1 atau 95% *CI* mencakup angka 1, menunjukkan bahwa faktor yang diteliti bukan merupakan faktor risiko timbulnya penyakit.
- d. $OR < 1$, dan 95% *CI* tidak mencakup angka 1, menunjukkan bahwa faktor yang diteliti merupakan faktor protektif yang dapat mengurangi resiko terjadinya penyakit.
- e. $OR < 1$, dan 95% *CI* mencakup angka 1, menunjukkan bahwa faktor yang diteliti belum tentu merupakan faktor protektif yang dapat mengurangi terjadinya penyakit (Sastroasmoro dan Ismael, 2011). Variabel kategorik dengan kategorik (Riyanto, 2009).

Aturan pengambilan keputusan:

- 1) Jika $p \text{ value} \geq \alpha$ (0,05) maka H_0 diterima
- 2) Jika $p \text{ value} < \alpha$ (0,05) maka H_0 ditolak

Syarat Uji *Chi-square* adalah tidak ada sel yang nilai *observed* nol dan sel yang *expected* (E) kurang dari 5 maksimal 20% dari jumlah sel. Jika tidak memenuhi syarat maka uji alternatifnya adalah Uji Fisher (Sopiyudin, 2011).

H. Etika Penelitian

Masalah etika dalam penelitian keperawatan merupakan masalah yang sangat penting, mengingat penelitian kebidanan berhubungan langsung dengan manusia, maka segi etika penelitian harus diperhatikan. Menurut Hidayat (2008) masalah etika yang harus diperhatikan antara lain adalah sebagai berikut.

1. *Informed consent*

Informed consent merupakan bentuk persetujuan antara peneliti dengan memberikan lembar persetujuan. *Informed consent* tersebut diberikan sebelum penelitian dilakukan dengan memberikan lembar persetujuan untuk menjadi responden.

Tujuan *informed consent* adalah agar subjek mengerti maksud dan tujuan peneliti, mengetahui dampaknya. Jika subjek bersedia, maka mereka harus menandatangani lembar persetujuan. Jika responden tidak bersedia, maka peneliti harus menghormati hak pasien. Beberapa informasi yang harus ada dalam *informed consent* tersebut antara lain: partisipasi pasien, tujuan dilakukannya tindakan, jenis data yang dibutuhkan, komitmen, prosedur pelaksanaan, potensial masalah yang akan terjadi, manfaat, kerahasiaan, informasi yang mudah dihubungi, dan lain - lain.

2. *Anonimity (Tanpa Nama)*

Masalah etika merupakan masalah yang memberikan jaminan dalam penggunaan subjek penelitian dengan cara tidak memberikan atau mencantumkan nama responden pada lembar alat ukur dan hanya menuliskan kode pada lembar pengumpulan data atau hasil penelitian yang disajikan.

3. Confidentiality (Kerahasiaan)

Masalah ini merupakan masalah etika dengan memberikan jaminan kerahasiaan hasil penelitian, baik informasi maupun masalah-masalah lainnya. Semua informasi yang telah dikumpulkan dijamin kerahasiaan oleh peneliti, hanya kelompok data tertentu yang akan dilaporkan pada hasil riset.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *survey* analitik dengan pendekatan *Case control*, di mana rancangan penelitian yang digunakan adalah deskriptif korelasional untuk mengetahui hubungan antara *personal hygiene* dan kebiasaan jajan terhadap kejadian demam *typhoid* pada anak. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 01 Juni-18 Juni 2016 di Puskesmas Samata dan SD Negeri Samata. Jumlah responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini sebanyak 50 orang, yang terdiri dari 25 orang kasus dan 25 orang kontrol. Penetapan sampel menggunakan metode *purposive sampling* di mana sampel diambil diantara populasi yang memenuhi kriteria inklusi. Penetapan responden pada kelompok kasus lebih dahulu dilakukan sebelum menetapkan sampel pada kelompok kontrol karena dilakukan *matching* antara kasus dan kontrol pada karakteristik umur dan jenis kelamin. Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang diambil langsung dengan menggunakan kuesioner yang diberikan kepada responden. Selanjutnya dilakukan pengolahan data yang dimulai dari *editing*, *coding*, dan *tabulating* yang akan dianalisis secara univariat dan bivariat.

1. Analisa Univariat

a. Karakteristi Responden

Pada kelompok kasus anak yang memiliki IMT (Indeks Massa Tubuh) dengan frekuensi tertinggi adalah anak dengan BB kurang yaitu sebanyak 17 orang anak (68%) dan frekuensi terendah adalah anak dengan *overweight* dan *obesitas* yaitu masing-masing hanya 1 orang anak saja (4%). Sedangkan pada kelompok kontrol

anak yang memiliki IMT (Indeks Massa Tubuh) dengan frekuensi tertinggi adalah anak dengan BB normal yaitu sebanyak 11 orang anak (44%) dan frekuensi terendah adalah anak dengan *overweight* yaitu 2 orang anak saja (4%). Berdasarkan uji *Kolmogorov-smirnov* yang telah dilakukan maka didapatkan hasil p value= 0,468 lebih dari α (0,05), maka H_0 diterima yang artinya tidak ada hubungan antara IMT (Indeks Massa Tubuh) dengan kejadian demam *typhoid* pada anak. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel 4.1, sebagai berikut:

Tabel 4.1
Distribusi Frekuensi IMT (Indeks Massa Tubuh) pada Anak di Puskesmas Samata dan SD Negeri Samata (n = 50)

IMT	Demam <i>Typhoid</i>				ρ
	Kasus		Kontrol		
	n	%	n	%	
BB Kurang	17	68	11	44	0,468
BB Normal	6	24	12	48	
<i>Overweight</i>	1	4	2	8	
<i>Obesitas</i>	1	4	0	0	
Total	25	100	25	100	

*Uji *Kolmogorov-Smirnov*

Sumber : Data Primer 2016

b. Personal Hygiene

Pada kelompok kasus anak dengan *personal hygiene* yang buruk memiliki frekuensi yang lebih tinggi yaitu sebanyak 14 orang anak (56%) dibandingkan anak dengan *personal hygiene* yang baik yaitu sebanyak 11 orang anak (44%). Sedangkan pada kelompok kontrol anak dengan *personal hygiene* yang baik memiliki frekuensi yang lebih tinggi yaitu sebanyak 19 orang anak (76%) dibandingkan anak dengan

personal hygiene yang buruk yaitu sebanyak 6 orang anak saja (24%). Selanjutnya dapat dilihat pada tabel 4.2, sebagai berikut:

Tabel 4.2
Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan *Personal Hygiene* pada Anak di Puskesmas Samata dan SD Negeri Samata (n=50)

<i>Personal Hygiene</i>	<i>Demam Typhoid</i>			
	Kasus		Kontrol	
	n	%	n	%
Baik	11	44	19	76
Buruk	14	56	6	24
Total	25	100	25	100

Sumber : Data Primer 2016

c. Kebiasaan Jajan

Pada kelompok kasus anak dengan kebiasaan jajan yang buruk memiliki frekuensi yang lebih tinggi yaitu sebanyak 21 orang anak (84%) dibandingkan anak dengan kebiasaan jajan yang baik yaitu sebanyak 4 orang anak saja (16%). Sedangkan pada kelompok kontrol anak dengan kebiasaan jajan yang baik memiliki frekuensi yang lebih tinggi yaitu sebanyak 13 orang anak (52%) dibandingkan anak dengan kebiasaan jajan yang yaitu sebanyak 12 orang anak (48%). Selanjutnya dapat dilihat pada tabel 4.3, sebagai berikut:

Tabel 4.3
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kebiasaan Jajan pada Anak
di Puskesmas Samata dan SD Negeri Samata (n= 50)

Kebiasaan Jajan	Demam <i>Typhoid</i>			
	Kasus		Kontrol	
	n	%	n	%
Baik	4	16	12	48
Buruk	21	84	13	52
Total	25	100	25	100

Sumber : Data Primer 2016

2. Analisa Bivariat

Untuk menilai Hubungan antara *Personal Hygiene* dan Kebiasaan Jajan Terhadap Kejadian Demam *Typhoid* pada anak di Puskesmas Samata dan SD Negeri Samata, maka dilakukan analisa bivariat dengan menggunakan uji statik *Chi-square* dengan tingkat kemaknaan α (0,05), maka ketentuan bahwa ada Hubungan antara *Personal Hygiene* dan Kebiasaan Jajan Terhadap Kejadian Demam *Typhoid* Pada anak dikatakan mempunyai hubungan yang bermakna jika ρ value $< \alpha$ (0,05).

a. Analisa Hubungan *Personal Hygiene* dengan Kejadian Demam *Typhoid* Pada Anak di Puskesmas Samata dan SD Negeri Samata

Terdapat dua kategori pada *personal hygiene* yaitu baik dan buruk dan untuk demam *typhoid* terdapat kategori kelompok kasus dan kelompok kontrol. Pada kelompok kasus, anak yang memiliki memiliki *personal hygiene* baik sebanyak 11 orang anak (44%) sedangkan anak yang memiliki *personal hygiene* buruk sebanyak 14 orang anak (56%). Sedangkan pada kelompok kontrol anak yang memiliki *personal hygiene* yang baik sebanyak 19 orang anak (76%) sedangkan anak yang memiliki *personal hygiene* yang buruk sebanyak 6 orang anak saja (24%).

Berdasarkan nilai hasil uji *Chi-square* diperoleh nilai p value=0,021 yang berarti kurang dari α (0,05). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ada hubungan bermakna antara *personal hygiene* dengan kejadian demam *typhoid* pada anak. Perhitungan *risk estimate* didapatkan *Odds Ratio* (OR)=0,248 dengan interval kepercayaan 95% CI=0,074-0,833 yang artinya *Odds Ratio* (OR)<1 dan 95% CI tidak mencakup angka 1 yang dapat menunjukkan bahwa faktor yang diteliti merupakan faktor *protektif* yang dapat mengurangi resiko terjadinya penyakit (Sastroasmoro dan Ismael, 2011), dengan kata lain *personal hygiene* adalah faktor *protektif* (pelindung) yang dapat mengurangi resiko terjadinya penyakit demam *typhoid*. *Personal hygiene* yang baik memiliki kecenderungan 0,248 kali untuk melindungi dan mengurangi resiko terjadinya penyakit demam *typhoid* dibandingkan dengan *personal hygiene* yang buruk. Nilai interval kepercayaan 95% CI=0,074-0,833 adalah batas bawah (*lower*) dan batas atas (*upper*), yang artinya *personal hygiene* yang baik memiliki sekurang-kurangnya 0,074 kali untuk mengurangi resiko terjadinya demam *typhoid* dan tingkat maksimal 0,833 untuk mengurangi resiko terjadinya demam *typhoid*. Selanjutnya dapat dilihat pada table 4.4, sebagai beriku:

Tabel 4.4
Hubungan *Personal Hygiene* dengan Kejadian Demam Typhoid pada Anak di Puskesmas Samata dan SD Negeri Samata (n=50)

<i>Personal Hygiene</i>	Demam <i>Typhoid</i>				<i>p</i>	OR	95%CI
	Kasus		Kontrol				
	n	%	n	%			
Baik	11	44	19	38	0,021	0,248	0.074 -0,833
Buruk	14	56	6	12			
Total	25	100	25	100			

*Uji *Chi - Square*

Sumber: Data Primer 2016

b. Analisa Hubungan Kebiasaan Jajan dengan Kejadian Demam *Typhoid* Pada Anak di Puskesmas Samata dan SD Negeri Samata

Terdapat dua kategori pada kebiasaan jajan yaitu baik dan buruk dan untuk demam *typhoid* terdapat kategori kelompok kasus dan kelompok kontrol. Pada kelompok kasus, anak yang memiliki kebiasaan jajan baik sebanyak 4 orang anak saja (16%) sedangkan anak yang memiliki kebiasaan jajan buruk sebanyak 21 orang anak (84%). Sedangkan pada kelompok kontrol anak yang memiliki kebiasaan jajan yang baik sebanyak 12 orang anak (48%) sedangkan anak yang memiliki kebiasaan jajan yang buruk sebanyak 13 orang anak (52%).

Berdasarkan nilai hasil uji *Chi-square* diperoleh nilai p value=0,015 yang berarti kurang dari α (0,05). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ada hubungan bermakna antara kebiasaan jajan dengan kejadian demam *typhoid* pada anak. Perhitungan *risk estimate* didapatkan *Odds Ratio* (OR)=0,206 dengan interval kepercayaan 95% CI=0,555-0,777 yang artinya *Odds Ratio* (OR)<1 dan 95% CI tidak mencakup angka 1 yang dapat menunjukkan bahwa faktor yang diteliti merupakan

faktor *protektif* yang dapat mengurangi resiko terjadinya penyakit penyakit (Sastroasmoro dan Ismael, 2011), dengan kata lain kebiasaan jajan adalah faktor *protektif* (pelindung) yang dapat mengurangi resiko terjadinya penyakit demam *typhoid*. Kebiasaan jajan yang baik memiliki kecenderungan 0,206 kali untuk melindungi dan mengurangi resiko terjadinya penyakit demam *typhoid* dibandingkan dengan kebiasaan jajan yang buruk. Nilai interval kepercayaan 95% CI=0,555-0,777 adalah batas bawah (*lower*) dan batas atas (*upper*), yang artinya *personal hygiene* yang baik memiliki sekurang-kurangnya 0,555 kali untuk mengurangi resiko terjadinya demam *typhoid* dan tingkat maksimalnya 0,777 untuk mengurangi resiko terjadinya demam *typhoid*. Selanjutnya dapat dilihat pada table 4.5, sebagai berikut:

Tabel 4.5
Hubungan Kebiasaan Jajan dengan Kejadian Demam Typhoid pada Anak di Puskesmas Samata dan SD Negeri Samata (n = 50)

Kebiasaan Jajan	Demam Typhoid				<i>p</i>	OR	95% CI
	Kasus		Kontrol				
	n	%	n	%			
Baik	4	16	12	48	0,015	0,206	0,055-0,777
Buruk	21	84	13	52			
Total	25	100	25	100			

*Uji *Chi-Square*

Sumber: Data Primer 2016

B. Pembahasan

1. Karakteristik Responden

Berdasarkan analisa bivariat karakteristik IMT (Indeks Massa Tubuh) diperoleh hasil dengan nilai *p value* (0,468) > (0,05) sehingga dapat dikatakan bahwa

tidak ada hubungan antara IMT (Indeks Massa Tubuh) dengan kejadian demam *typhoid* pada anak.

Penelitian ini tidak sejalan dengan yang dilakukan oleh Anandi Iendha Retnani (2007), di mana pada penelitiannya didapatkan hasil *p value* untuk asupan energi dari makanan rumah sakit dengan perubahan status gizi sebesar $(0,00) < \alpha (0,05)$ yang artinya ada hubungan antara IMT (Indeks Massa Tubuh) dengan kejadian demam *typhoid* pada anak. . Penyakit demam *typhoid* dapat menimbulkan komplikasi berat ataupun menyebabkan *host*nya menjadi karier apabila tidak diterapi adekuat dan tepat. Hal ini dapat terjadi bila seseorang dalam keadaan status gizi yang kurang atau buruk, imunitas jelek dan hidup di lingkungan padat dan sumber air yang tercemar. Oleh karena itu, selain deteksi dini dan terapi adekuat, penting untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat demi memutus rantai kehidupan kuman ini (Widoyono, 2011).

Penderita demam *typhoid* umumnya mengalami penurunan nafsu makan karena penderita merasa mual, muntah, lidahnya kotor, dan rasa pahit pada waktu makan. Hal ini menyebabkan asupan makanan tidak adekuat, sedangkan kebutuhan gizi pada penderita penyakit infeksi (*typhoid*) cenderung meningkat di rumah sakit. Konsumsi makanan yang kurang akan menurunkan keadaan umum dan status gizi penderita dan memperlama proses penyembuhan juga dapat berdampak pada IMT (Indeks Massa Tubuh) yang dapat mengalami perubahan(Sudoyo, 2007)

Berdasarkan hasil survey di lapangan frekuensi tertinggi adalah anak dengan BB kurang yaitu sebanyak 17 orang anak (68%) dan frekuensi terendah adalah anak dengan *overweight* dan *obesitas* yaitu masing-masing hanya 1 orang anak saja (4%). Sedangkan pada kelompok kontrol anak yang memiliki IMT (Indeks Massa Tubuh)

dengan frekuensi tertinggi adalah anak dengan BB normal yaitu sebanyak 11 orang anak (44%) dan frekuensi terendah adalah anak dengan *overweight* yaitu 2 orang anak saja (4%). Dari penelitian di atas peneliti berasumsi, bahwa IMT (Indeks Massa tubuh) memang tidak berpengaruh terhadap kejadian demam *typhoid* karena setiap penyakit menyerang siapa saja, tergantung dari individu yang mempunyai kebiasaan kurang bersih. IMT (Indeks Massa Tubuh) anak tidak akan mengalami perubahan setelah terserang penyakit demam *typhoid* ketika asupan energi dan protein terpenuhi. Dalam hal kesehatan anak tidak lepas dari pengawasan orang tuanya. Orang tua berperan penting dalam menjaga kesehatan, baik di rumah maupun di lingkungan sekitarnya.

2. Hubungan *Personal Hygiene* dan Kejadian Demam *Typhoid* Pada Anak

Berdasarkan nilai hasil uji *Chi-square* diperoleh nilai p value=0,021 yang berarti kurang dari α (0,05). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ada hubungan bermakna antara *personal hygiene* dengan kejadian demam *typhoid* pada anak. Perhitungan *risk estimate* didapatkan *Odds Ratio* (OR)=0,248 dengan interval kepercayaan 95% CI=0,074-0,833 yang artinya *Odds Ratio* (OR)<1 dan 95% CI tidak mencakup angka 1 yang dapat menunjukkan bahwa faktor yang diteliti merupakan faktor *protektif* yang dapat mengurangi resiko terjadinya penyakit (Sastroasmoro dan Ismael, 2011), dengan kata lain *personal hygiene* adalah faktor *protektif* (pelindung) yang dapat mengurangi resiko terjadinya penyakit demam *typhoid*. *Personal hygiene* yang baik memiliki kecenderungan 0,248 kali untuk melindungi dan mengurangi resiko terjadinya penyakit demam *typhoid* dibandingkan dengan *personal hygiene* yang buruk. Nilai interval kepercayaan 95% CI=0,074-0,833 adalah batas bawah (*lower*) dan batas atas (*upper*), yang artinya *personal hygiene* yang baik memiliki

sekurang-kurangnya 0,074 kali untuk mengurangi resiko terjadinya demam *typhoid* dan tingkat maksimalnya 0,833 untuk mengurangi resiko terjadinya demam *typhoid*. *Personal hygiene* yang buruk merupakan faktor terjadinya penularan demam *typhoid*, salah satunya adalah kebiasaan mencuci tangan yang buruk di mana penularan bakteri *Salmonella typhi* melalui jari tangan atau kuku yang kotor. Apabila orang tersebut kurang memperhatikan kebersihan dirinya seperti mencuci tangan sebelum makan maka kuman *Salmonella typhi* dapat masuk ketubuh orang sehat melalui mulut, selanjutnya orang sehat akan menjadi sakit (Akhsin, 2010).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Eunike Risani Seran (2015) yang berjudul hubungan *personal hygiene* dengan kejadian demam *typhoid* di Puskesmas Tumaratas dengan hasil menunjukkan ada hubungan antara kebiasaan mencuci tangan sebelum makan dengan kejadian demam *typhoid* ($p=0,029$). Sedangkan kebiasaan mencuci tangan setelah BAB tidak ada hubungan dengan kejadian demam *typhoid* ($p=0,160$). Kebiasaan yang kurang baik ketika mencuci tangan sebelum makan di mana mereka tidak mencuci tangan dengan sabun dan menggosok sela-sela jari dan kuku sehingga kuman *Salmonella typhi* ini bisa saja masih ada di bagian tersebut. Padahal, menurut Proverawati (2012) mencuci tangan yang benar haruslah menggunakan sabun, menggosok sela-sela jari dan kuku dengan menggunakan air mengalir. Menurut Rakhman dkk (2009) mencuci tangan dengan air dan sabun dapat melarutkan lemak dan minyak pada permukaan kulit serta menggosoknya akan menurunkan jumlah kuman yang ada di tangan. Kuman *Salmonella thypi* penyebab penyakit demam *typhoid* ini, dapat ditularkan melalui makanan dan minuman sehingga apabila seseorang kurang memperhatikan

kebersihan dirinya seperti mencuci tangan maka kuman *Salmonella typhi* dapat masuk ke dalam tubuh selanjutnya akan menyebabkan sakit (Akhsin 2010).

Menurut Siti Fathonah (2005) menyatakan bahwa tangan yang kotor atau terkontaminasi dapat memindahkan bakteri atau virus patogen dari tubuh, *feses* atau sumber lain ke makanan. Oleh karenanya kebersihan tangan dengan mencuci tangan perlu mendapat prioritas tinggi, walaupun hal tersebut sering disepelekan. Pencucian tangan dengan sabun sebagai pembersih, penggosokkan dan pembilasan dengan air mengalir akan menghanyutkan partikel kotoran yang banyak mengandung mikroorganisme. Hal ini juga diperkuat oleh teori yang dikemukakan oleh Arisman (2008), bahwa budaya cuci tangan yang benar adalah kegiatan terpenting. Setiap tangan yang dipergunakan untuk memegang makanan, maka tangan harus sudah bersih. Tangan perlu dicuci karena ribuan jasad renik, baik flora normal maupun cecair, menempel di tempat tersebut dan mudah sekali berpindah ke makanan yang tersentuh.

Mencuci tangan setelah BAB juga tak kalah pentingnya karena virus, kuman, atau bakteri bisa menular jika BAB benar-benar mengandung *Salmonella typhi* yang hidup dan dapat bertahan, serta dalam jumlah yang cukup untuk menginfeksi dan kuman tersebut benar-benar masuk ke dalam tubuh (*World Health Organization*, 2009). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Karim, dkk (2015) yang berjudul hubungan *personal hygiene* dengan kejadian demam tifoid pada anak di Puskesmas Galut di mana *personal hygiene* berhubungan dengan kejadian demam *typhoid* pada anak, dengan hasil menunjukkan bahwa ada hubungan antara kebiasaan cuci tangan sebelum makan ($p=0,006$) dan kebiasaan cuci tangan setelah buang air besar ($p=0,014$) dengan kejadian demam *typhoid*.

Selain mencuci tangan, *personal hygiene* yang lain juga bisa mempengaruhi terjadinya demam *typhoid* seperti mandi yang teratur, menjaga kebersihan mulut dan menjaga kebersihan kuku kaki dan tangan. Penyakit demam *typhoid* dapat menimbulkan komplikasi berat ataupun menyebabkan *hostnya* menjadi karier apabila tidak diterapi adekuat dan tepat. Hal ini dapat terjadi bila seseorang dalam keadaan status gizi yang kurang atau buruk, imunitas jelek dan hidup di lingkungan padat dan sumber air yang tercemar. Oleh karena itu, selain deteksi dini dan terapi adekuat, penting untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat demi memutus rantai kehidupan kuman ini (Widoyono, 2011).

Menjaga kebersihan diri sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari, apalagi kita sebagai umat Islam wajiblih dalam keadaan bersih ketika akan beribadah sebagai salah satu persyaratan agar ibadah kita diterima oleh-Nya. Pernyataan tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S At-Taubah/9: 108 yang berbunyi :

لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ مُّحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ

Terjemahannya:

“Janganlah engkau berdiri di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang di bangun atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih patut kamu berdiri di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang senang menyucikan diri. Dan Allah menyukai orang-orang yang menyucikan diri”.

Di dalam tafsir Al-Misbah ayat di atas memuji jamaah masjid Quba’, yang selalu menjaga kebersihan diri. Dalam arti menyucikan diri dari segala kotoran dan najis. Diriwayatkan oleh Abu Daud bahwa Nabi Saw. bertanya kepada mereka bahwa Allah memuji mereka menyangkut penyucian mereka setelah buang air besar dan

kecil serta menjaga kesucian dari dosa dan pelanggaran, karena menurutnya hanya kesucian dari dosa dan pelanggaranlah yang dapat mengantarkan mereka lebih mendekati diri kepada Allah Swt. (Shihab, 2009). Maka dari itu sebagai umat Islam kita wajiblah menjaga kebersihan diri secara lahir dan batin.

Hasil survey di lapangan didapatkan pada kelompok kasus anak dengan *personal hygiene* yang buruk memiliki frekuensi yang lebih tinggi yaitu sebanyak 14 orang anak (56%) dibandingkan anak dengan *personal hygiene* yang baik yaitu sebanyak 11 orang anak (44%). Anak dengan *personal hygiene* yang baik juga bisa terpapar penyakit demam *typhoid* melihat kembali cara penularan demam *typhoid* yang tidak hanya menular lewat *personal hygiene* yang buruk tapi banyak faktor lain yang bisa mempengaruhi terjadinya penyakit ini, diantaranya adalah sanitasi lingkungan yang kumuh, penyediaan air bersih yang tidak memadai, jamban yang tidak memenuhi syarat, serta belum membudayakan program imunisasi untuk *typhoid* itu sendiri (Depkes RI, 2006)

Anak yang termasuk dalam kelompok kasus dengan *personal hygiene* yang buruk biasanya mencuci tangan tapi jarang menggunakan sabun, mandi 2x sehari tapi tidak menggosok lipatan-lipatan badan serta jarang menyikat gigi sebelum tidur. Orang tua para responden biasanya memandirikan anaknya untuk mandi, menyikat gigi, serta menjaga kebersihan kuku kaki dan tangan anak. Padahal anak yang masih dini memerlukan pengawasan dari orang tua dalam hal *personal hygiene* anak tersebut. Agar anak melakukannya dengan teratur, baik dan benar.

Dari uraian di atas peneliti berasumsi, bahwa *personal hygiene* yang buruk dapat menyebabkan terjadinya demam *typhoid* karena kuman *Salmonella typhi* ini menular melalui *oro-fekal* artinya kuman masuk melalui makanan atau minuman

yang tercemar oleh feses yang mengandung *Salmonella typhi*. Dalam kondisi anak yang senang bermain, tapi jarang mencuci tangan, jarang membersihkan kuku kaki dan tangan serta jarang mandi setelah beraktifitas dapat menjadi salah satu alternatif bagi kuman *Salmonella typhi* untuk masuk kedalam saluran pencernaan dan menimbulkan penyakit demam *typhoid*. Akan tetapi dengan tubuh yang bersih meminimalkan risiko seseorang terhadap kemungkinan terjangkitnya suatu penyakit terutama penyakit yang berhubungan dengan kebersihan diri. Pada keadaan *personal hygiene* yang buruk akan mempermudah tubuh terserang berbagai penyakit, salah satunya adalah demam *typhoid* itu sendiri.

3. Hubungan Kebiasaan Jajan dan Kejadian Demam *Typhoid* Pada Anak

Berdasarkan nilai hasil uji *Chi-square* diperoleh nilai p value=0,015 yang berarti kurang dari α (0,05). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ada hubungan bermakna antara kebiasaan jajan dengan kejadian demam *typhoid* pada anak. Perhitungan *risk estimate* didapatkan *Odds Ratio* (OR)=0,206 dengan interval kepercayaan 95% CI=0,555-0,777 yang artinya *Odds Ratio* (OR)<1 dan 95% CI tidak mencakup angka 1 yang dapat menunjukkan bahwa faktor yang diteliti merupakan faktor *protektif* yang dapat mengurangi resiko terjadinya penyakit penyakit (Sastroasmoro dan Ismael, 2011), dengan kata lain kebiasaan jajan adalah faktor *protektif* (pelindung) yang dapat mengurangi resiko terjadinya penyakit demam *typhoid*. Kebiasaan jajan yang baik memiliki kecenderungan 0,206 kali untuk melindungi dan mengurangi resiko terjadinya penyakit demam *typhoid* dibandingkan dengan kebiasaan jajan yang buruk. Nilai interval kepercayaan 95% CI=0,555-0,777 adalah batas bawah (*lower*) dan batas atas (*upper*), yang artinya *personal hygiene* yang baik memiliki sekurang-kurangnya 0,555 kali untuk mengurangi resiko

terjadinya demam *typhoid* dan tingkat maksimalnya 0,777 untuk mengurangi resiko terjadinya demam *typhoid*. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurvina Wahyu Artanti (2013) dengan judul Hubungan antara sanitasi lingkungan, *hygiene* perorangan dan karakteristik individu dengan kejadian demam tifoid di wilayah kerja Puskesmas Kedungmundu kota Semarang dengan hasil penelitian menggunakan uji *Chi-square* diperoleh nilai $p\text{ value } (0,005) < \alpha (0,05)$ yang artinya ada hubungan antara kebiasaan jajan terhadap kejadian demam *typhoid*.

Menurut pendapat Addin A (2009), yang menyatakan bahwa penularan tifus dapat terjadi dimana saja dan kapan saja, biasanya terjadi melalui konsumsi makanan di luar rumah atau di tempat-tempat umum, apabila makanan atau minuman yang dikonsumsi kurang bersih. Dapat juga disebabkan karena makanan tersebut disajikan oleh seorang penderita tifus laten (tersembunyi) yang kurang menjaga kebersihan saat memasak. Seseorang dapat membawa kuman tifus dalam saluran pencernaannya tanpa sakit, ini yang disebut dengan penderita laten. Penderita ini dapat menularkan penyakit tifus ini ke banyak orang, apalagi jika dia bekerja dalam menyajikan makanan bagi banyak orang seperti tukang masak di restoran.

Menurut Rakhman dkk (2009) kebiasaan jajan makanan di luar rumah menjadi salah satu faktor resiko kejadian demam *typhoid*. Makanan jajanan banyak dijumpai di lingkungan sekitar sekolah dan rutin dikonsumsi sebagian besar anak sekolah. Makanan jajanan sekolah cenderung menggunakan bahan pengawet, pewarna, aroma penyedap dan pemanis sehingga mengancam kesehatan anak, persoalan ini merupakan masalah keamanan dimana masih ditemukannya produk keamanan yang menyebabkan banyak kasus keracunan makanan. Disamping masih

rendahnya pengetahuan pangan dan tanggung jawab produsen serta rendahnya pengetahuan konsumen tentang mutu dan keamanan pangan .

Selain itu juga, ketika makan di luar apalagi di tempat-tempat umum biasanya terdapat lalat yang beterbangan di mana-mana bahkan hinggap di makanan. Lalat-lalat tersebut dapat menularkan *Salmonella thyphi* dengan cara lalat yang sebelumnya hinggap di feses atau muntah penderita demam tifoid kemudian hinggap di makanan yang akan dikonsumsi (Padila, 2013).

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuna (2013), dengan judul penelitian hubungan kebiasaan makan dengan kejadian demam *typhoid* pada anak di RSUD Labuang Baji Makassar dengan hasil penelitian yang dilakukan dengan uji *Chi-square* dan didapatkan hasil dengan *p value* $(0,023) < \alpha (0,05)$ yang artinya ada hubungan antara kebiasaan makan di luar rumah dengan kejadian demam *typhoid* pada anak. Penyakit yang ditimbulkan oleh makanan yang terkontaminasi disebut penyakit bawaan (*food borned diseases*), salah satu diantaranya adalah demam *typhoid*. Jajanan kaki lima dapat menjawab tantangan masyarakat terhadap makanan yang murah, mudah, menarik, dan bervariasi. Kebiasaan jajan atau makan di luar penyediaan rumah berarti mengkonsumsi makanan atau minuman yang bukan buatan sendiri. Dengan demikian, pembeli sebagian besar tidak mengetahui cara pengolahan bahan baku makanan menjadi bahan yang siap santap yang dilakukan oleh penjamah makanan. Dengan kata lain, perilaku penjamah makanan ikut berperan dalam menentukan suatu makanan sehat atau tidak. Perilaku penjamah makanan juga dapat menimbulkan risiko kesehatan, dalam arti perilaku penjamah makanan yang tidak sehat akan berdampak pada higienitas makanan yang disajikan. Sebaliknya, perilaku penjamah makanan yang

sehat dapat menghindarkan makanan dari kontaminasi atau pencemaran dan keracunan (Adam & Moetarjemi dalam Maarisit 2014).

Kebiasaan jajan pada siswa sekolah merupakan fenomena yang menarik untuk ditelaah karena berbagai hal: merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan energi karena aktivitas fisik di sekolah yang tinggi (apalagi bagi siswa yang tidak sarapan pagi), pengenalan berbagai jenis makanan jajanan akan menumbuhkan kebiasaan penganekaragaman pangan, memberikan perasaan meningkatkan gengsi siswa dimata teman-teman di sekolahnya dan juga dipengaruhi oleh godaan dari media massa tentang makanan *junk food* yang sangat bervariasi. Selain itu banyak jajanan yang kurang memenuhi syarat kesehatan dan sangat beresiko terjadi pencemaran biologis, kimia dan mengandung zat tambahan berbahaya yang mengganggu kesehatan, misalnya pada penelitian yang dilakukan di Bogor telah ditemukan *Salmonella parathypi* di 25-50% pada sampel yang dijual di kaki lima (Winnarny, 2007). Standarisasi makanan jajanan yang baik meliputi makanan yang sehat yaitu makanan yang memenuhi triguna makanan, makanan yang bersih adalah makanan yang bebas dari lalat, debu, dan serangga lainnya. Makanan yang aman adalah makanan yang tidak mengandung bahan berbahaya yang dilarang untuk makanan, seperti zat pewarna dan zat pengawet yang diperuntukkan bukan untuk makanan dan tidak tercemar oleh bahan kimia yang membahayakan manusia, makanan yang halal adalah makanan yang tidak bertentangan dengan agama yang dianut oleh siswa (Handini, 2009). Allah SWT. pun meyerukan kita agar mengkonsumsi makan yang sehat dan halal, pernyataan tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S An-Nahl /16: 114 yang berbunyi:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ



Terjemahannya:

“Maka makanlah dari apa yang direzkikan oleh Allah kepada kamu dalam keadaan halal lagi baik dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepada-Nyalah saja menyembah”

Dalam tafsir Al-Misbah ayat di atas menjelaskan tentang orang beriman yang harus berhati-hati dalam memilih makanan. Mengonsumsi makanan dalam keadaan halal lagi baik, lezat dan bergizi serta berdampak positif bagi kesehatan serta mengsyukuri segala nikmat Allah yang telah diberikan, sehingga makanan tersebut akan menjadi berkah lagi bermanfaat bagi kita (Shihab, 2009).

Usaha-usaha yang dilakukan untuk pencegahan dan pengendalian yang efektif terhadap penyakit dipelajari mekanisme interaksi antara *agens* penyakit (*agent*), manusia (*host*) dan lingkungan (*environment*) yaitu interaksi *agens* penyakit dan lingkungan yang merupakan suatu keadaan saat *agens* penyakit langsung dipengaruhi oleh lingkungan dan menguntungkan *agens* penyakit itu serta terjadi pada saat prepatogenesis dari suatu penyakit, contohnya tumbuhnya bakteri *Salmonella* dalam makanan akibat kontaminasi, interaksi manusia dengan lingkungan yang merupakan suatu keadaan pada saat manusia langsung dipengaruhi oleh lingkungannya dan terjadi pada saat prepatogenesis dari suatu penyakit, contohnya kebiasaan membuat dan menyediakan makanan, interaksi manusia dan *agens* penyakit yaitu suatu keadaan saat *agens* penyakit menetap, berkembang biak, dan merangsang manusia untuk membentuk respon berupa tanda-tanda dan gejala penyakit, contohnya perubahan fisiologis seperti demam, mual dan muntah, interaksi *agens* penyakit, manusia, dan lingkungan yang merupakan suatu keadaan saat *agens* penyakit, manusia, dan lingkungan bersama-sama saling mempengaruhi dan memperberat satu

sama lain sehingga *agens* penyakit baik secara langsung maupun tidak langsung mudah masuk ke dalam tubuh manusia, contoh pencemaran makanan oleh bakteri *Salmonella* juga pencemaran air oleh kotoran manusia (Chandra, 2007).

Hasil survey di lapangan didapatkan pada kelompok kasus anak dengan kebiasaan jajan yang buruk memiliki frekuensi yang lebih tinggi yaitu sebanyak 21 orang anak (84%) dibandingkan anak dengan kebiasaan jajan yang baik yaitu sebanyak 4 orang anak saja (16%). Anak dengan kebiasaan jajan yang baik bisa pula terkena penyakit demam *typhoid* melihat kembali cara penularan bakteri *Salmonella typhi* yang beragam yang dikenal dengan 5F yaitu *food* (makanan), *finger* (jari tangan/kuku), *fomitus* (muntah), *fly* (lalat), dan feses (Akhsin, 2010). Orang tua dari para responden mengatakan mereka kurang bisa mengontrol jajanan anak mereka apalagi jika anak ada sedang dalam lingkungan sekolah. Anak akan lebih cenderung melakukan kebiasaan jajan buruk di mana mereka membeli jajanan di pedagang keliling atau pinggir jalan yang tempatnya bersampingan dengan tempat pembuangan sampah seperti halnya pada lokasi penelitian. Sebagian besar dari anak yang menjadi responden juga sering membeli makanan yang tidak terbungkus plastik seperti somay, batagor, es cendol, *nungget*, dan bakso.

Dari uraian di atas peneliti berasumsi bahwa kebiasaan jajan yang buruk dapat menyebabkan terjadinya demam *typhoid*, dimana kebiasaan makan anak dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya dan orang tua. Banyak anak yang lebih memilih makanan jajanan dibanding makanan yang sudah disajikan di rumah. Kegiatan di sekolah menyita waktu yang lebih banyak daripada aktifitas keseluruhan anak sehari-hari termasuk aktifitas makan. Kebiasaan makan anak di sekolah tidak dapat dipantau oleh orang tua, maka dari itu anak bebas memilih makanan yang mereka mau tanpa

memikirkan resiko terhadap kesehatannya. Makanan siap saji yang disajikan di luar rumah belum tentu terjamin kebersihannya, baik itu kebersihan alat masaknya maupun kebersihan penjama makanannya. Makanan yang disajikan di luar rumah atau jajanan sangat beresiko terjadi cecaran biologis atau kimiawi yang bisa mengganggu kesehatan.

C. Keterbatasan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini tidak luput dari keterbatasan sang peneliti. Di mana penelitian ini menggunakan studi *case control* maka dapat ditemukan *recall* bias pada saat dilakukan pengumpulan data. Hal tersebut terjadi karena responden hanya mengandalkan daya ingat dalam mengisi kuesioner, apalagi penelitian ini berlangsung pada saat bulan puasa dimana sebagian responden sedang menjalankan ibadah puasa. Kejujuran responden dalam hal pengisian kuesioner juga merupakan keterbatasan dalam penelitian ini, sehingga penulis harus melakukan pendekatan secara personal pada saat pelaksanaan wawancara dalam hal mencari informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari hubungan *personal hygiene* dan kebiasaan jajan terhadap kejadian demam *typhoid* pada anak, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Ada hubungan antara *personal hygiene* terhadap kejadian demam *typhoid* pada anak.
2. Ada hubungan antara kebiasaan jajan terhadap kejadian demam *typhoid* pada anak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diajukan sebagai berikut:

1. Bagi Penderita Demam *typhoid*

Diharapkan untuk lebih meningkatkan kesadaran terhadap *personal hygiene* dan kurangi konsumsi makanan di luar rumah untuk mencegah penularan penyakit demam *typhoid*.

2. Bagi Puskesmas Samata

Sebagai bahan masukan bagi Puskesmas agar lebih meningkatkan perannya dalam memberikan pendidikan kesehatan kepada masyarakat mengenai demam *typhoid*, cara pencegahan penyakit, dan memberikan informasi tentang cara penularan demam *typhoid* itu sendiri.

3. Bagi SD Negeri Samata

Sebagai bahan masukan untuk SD Negeri Samata sekiranya memberikan pendidikan kesehatan untuk siswa melalui kegiatan rutin seperti penyuluhan

gizi, terutama zat-zat yang dibutuhkan tubuh, manfaat membawa bekal serta bahaya membeli makanan jajanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al- Qur'an dan terjemahnya. *Departemen Agama Republik Indonesia*. Jakarta. 2012.
- Addin, A. *Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit*. Bandung: PT. Puri Delco, 2009.
- Akhsin, Zulkoni. *Parasitologi*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2010.
- Anonim. *Tingkat Pengetahuan Siswa Madrasa Tsanawiah (mts) Al-Sa'dah Pondok Jaya Terhadap Demam Tifoid*, 2009.
- Arisman. *Keracunan Makanan*, Jakarta: EGC, 2008.
- Artanti, Nurvina Wahyu. *Hubungan Antara Sanitasi Lingkungan, Higiene Perorangan, Dan Karakteristik Individu Dengan Kejadian Demam Tifoid Di Wilayah Kerja Puskesmas Kedungmundu Kota*. 2013
- Atikah, Proverawati dan Eni Rahmawati. *Perilaku Hidup Bersih & Sehat (PHBS)*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2012.
- Chandra, Budiman. *Pengantar kesehatan Lingkungan*. Jakarta : EGC. 2007
- Christanti, Lidya M, dkk. *Hubungan Pengetahuan Orang Tua Tentang Demam Tifoid Dengan Kebiasaan Jajan Pada Anak Di Wilayah Kerja Rsud Mala Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud*, 2014.
- Depkes RI. *Pedoman Pengendalian Demam Tifoid*. Jakarta: Direktorat, 2006.
- Dinkes. *Profil Kesehatan Sulawesi Selatan*. Makassar; 2015
- Direktorat Bina Gizi. "*Pedoman Keamanan Pangan Sekolah Dasar*". Kementerian Kesehatan RI Bitjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak. Jakarta. 2011
- Fathonah, Siti. *Higiene dan Sanitasi Makanan*. Semarang: UNNES Press, 2005.
- Febry. F. *Kebiasaan Jajan Pada Anak*. Jurnal Ilmu Kesehatan Vol. 1. 2010
- Hamka, Buya. *Tafsir Al – Azhar* . jakarta: Pustaka Panjimas. 2012.
- Handini, Sofiani. *Tingkat Pengetahuan Siswa Madrasah Tsanawiah (Mts) Al - Sa'adah Pondok Jaya Terhadap Demam Tifoid*. 2009

- Haryono, Rudi. *Keperawatan Medikal Bedah Sistem Pencernaan*, Yogyakarta : Gosyen Publishing, 2012.
- Hidayat. A.Aziz Alimul. *Riset Keperawatan dan Teknik Penulisan Ilmiah*; Jakarta: Salemba Medika, 2008.
- Ircham, Machfoedz. *Menjaga Kesehatan Rumah dari Berbagai Penyakit*. Yogyakarta: Fitramaya, 2008.
- Irianto, Koes. *Menguak Dunia Mikroorganisme*. CV. Yrama Widya. Bandung. 2006
- James, Chin. *Manual Pemberantasan Penyakit Menular*. Jakarta: CV Info Medika, 2006.
- Jawetz, Melnick dan Adelbergs. *Mikrobiologi Kedokteran*. Jakarta: Salemba Medika, 2006.
- Juli, Soemirat. *Epidemiologi Lingkungan*. Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2006.
- Karim, Zelyayani A. Arsunan Arsin, Jumriani Ansar. *Hubungan Personal Hygiene Dengan Kejadian Demam Tifoid Pada Anak Di Puskesmas Galut*. 2015.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: WALI, 2012.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Profil kesehatan Indonesia*, Jakarta, 2010.
- KBBI. Pengertian hygiene. (<http://kbbi.web.id/hygiene>). Di akses tanggal 9 Maret 2016.
- Maarisit, Christanti Lidya Sisfiani Sarimin, Abram Babakal. *Hubungan Pengetahuan Orang Tua Tentang Demam Tifoid Dengan Kebiasaan Jajan Pada Anak Di Wilayah Kerja Rsud Mala Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud*. 2014.
- Masriadi. *Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian demam tifoid Pada Rumah Sakit Umum Salewangan*. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tamalate Makassar. 2013.
- Meylie. *Pengaruh Sosial Ekonomi Terhadap Demam Tifoid*. Universitas Diponegoro Semarang, 2010.
- Mufidah F, *Ceramti Penyakit– Penyakit Yang Rentan Diderita Anak Usia Sekolah*. FlashBooks: Jakarta Selatan, 2012.

- Nasry, Nur. *Pengantar Epidemiologi Penyakit Menular*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Notoadmodjo, Soekidjo. *Metodologi penelitian Kesehatan*. Jakarta. Rineka. 2010.
- Nursalam. *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan, Pedoman Skripsi, Tesis, dan Instrumen Penelitian Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika. 2013.
- Nuraini. H. *Memilih dan Membuat Jajanan Anak yang Sehat dan Halal*. Qultum Media. Jakarta. 2007
- Padila. *Asuhan Keperawatan Penyakit Dalam*. Yogyakarta: Nuha Medika. 2013.
- PMI. *Pedoman Perawatan Keluarga*, Jakarta: PMI, 2006.
- Proverawati, A. & Rahmawati, E. *Perilaku Hidup Bersih & Sehat (PHBS)*, Yogyakarta: Nuha Medika. 2012
- Radji, M. *Buku Ajar Mikrobiologi: Panduan Mahasiswa Farmasi dan Kedokteran*. Jakarta: EGC, 2010.
- Rakhman, A. Rizka, H. & Dibyo, P. *Jurnal Faktor-faktor Resiko yang Berpengaruh terhadap kejadian Demam Tifoid pada Orang Dewasa*. 2009
- Rampengan T.H. *Penyakit Infeksi Tropik pada Anak*. Jakarta: EGC, 2007.
- Retnani, Anandi Iedha. *Hubungan Asupan Makanan Dari Rumah Sakit Dengan Perubahan Status Gizi Pada Pasien Anak Penderita Demam Tifoid Di Rumah Sakit*. 2007
- Seran, Eunike Risani. *Hubungan Personal Hygiene Dengan Kejadian Demam Tifoid Di Wilayah Kerja Puskesmas Tumaratas*, 2015.
- Riyanto, Agus, *Pengolahan dan Analisis Data Kesehatan*, Yogyakarta: Nuha Medika. 2010.
- Sastroasmoro, Sudigdo dan Ismail Sofyan. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Klinis*, Jakarta: CV. Sagung Seto. 2011.
- Shihab, Muhammad Quraish Al – *Labab*, Tangerang: Lentera Hati, 2009.
- Siti Fathonah, *Higiene dan Sanitasi Makanan*, Semarang: UNNES Press. 2015
- Sudoyono. *Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam Edisi 4. Jilid 1*. Jakarta: Departemen Penyakit dalam FKUI. 2007

- Soedarto. *Penyakit Menular di Indonesia*. Jakarta: CV Sagung Seto, 2009.
- Sugiyono. *Statistika Untuk Penelitian*; Bandung: Alfabeta, 2006.
- Susenas. *Badan Pusat Statistik dalam Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan*. Semester 1, 2013.
- Sopiyudin Dahlan, *Statistika untuk Kedokteran dan Kesehatan Edisi 5*, Jakarta: Salemba Medika. 2011.
- Tarwoto dan Wartolah. *Kebutuhan Dasar Manusia dan Proses*, 2006.
- Tiro, MA. *Penelitian Skripsi, Tesis dan Disertasi*; Makassar: Andra Publisher, 2009.
- Wahyuna. *Hubungan Kebiasaan Makan Dengan Kejadian Demam Typhoid Pada Anak Di RSUD Labunag Baji Makassar*. 2013
- Whidy, Y. *Diagnosis Dan Penatalaksanaan Demam Tifoid*. Jakarta: EGC, 2012.
- WHO. *Typhoid Treatment Guidelines, Including New Recommendation For The Us Of ORS and Zinc Supplementation For Clinic-Based Health Workers*. 2009.
- Widoyono. *Penyakit Tropis*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Winnarny, Anny. *Hubungan antara kebiasaan jajan dengan status kesehatan SMP*. Laporan penelitian. Fakultas Ilmu Keperawatan Depok. 2007
- Winarsih, Sri. *Pengetahuan Sanitasi dan Aplikasinya*. Semarang: CV Aneka, 2008.

LAMPIRAN 1

PERMOHONAN SEBAGAI RESPONDEN PENELITIAN

Kepada

Yth : **Responden Penelitian**

Di tempat

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Haslinda

NIM : 70300112077

Status :Mahasiswa Program Sarjana (S1) Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar

Bermaksud mengadakan penelitian tentang “Hubungan *Personal Hygiene* dan Kebiasaan Jajan Terhadap Kejadian Demam *Typhoid* Pada Anak. Penelitian ini tidak menimbulkan akibat yang merugikan bagi Saudara sebagai responden dengan berpartisipasi menjawab pertanyaan yang telah disediakan. Untuk itu, saya mengharap kesediaan Saudara secara sukarela untuk menjadi responden dalam penelitian saya.

Atas bantuan dan kesediaan Saudara menjadi responden, saya ucapkan terima kasih.

Peneliti

Haslinda

LAMPIRAN 2

PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Umur :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya secara sukarela bersedia menjadi responden dalam penelitian ini. Saya akan berpartisipasi dalam penelitian ini dari awal penelitian hingga penelitian ini selesai.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun.

Samata, Juni 2016

Responden

(.....)

LAMPIRAN 3

KUESIONER PENELITIAN
HUBUNGAN PERSONAL HYGIENE DAN KEBIASAAN JAJAN
DENGAN KEJADIAN DEMAM TYPHOID PADA ANAK

Nomor Responden :
Tanggal :
Kelompok : Kasus/Kontrol (coret salah satu)

Daftar pertanyaan ini bertujuan untuk mengumpulkan data tentang hubungan personal hygiene dan kebiasaan jajan terhadap kejadian demam typhoid pada anak. Hasil dari penelitian ini akan dipergunakan sebagai saran-saran dalam meningkatkan program pencegahan Demam Typhoid terutama pada anak

Identitas Responden :

- 1. Nama (Inisial) :
- 2. Alamat :
- 3. Tanggal lahir :
- 4. Umur : tahun
- 5. Jenis Kelamin :
- 6. BB :
- 7. TB :

LAMPIRAN 4

KUESIONER PENELITIAN HUBUNGAN *PERSONAL HYGIENE* DAN KEBIASAAN JAJAN DENGAN KEJADIAN DEMAM *TYPHOID* PADA ANAK

1. Pertanyaan tentang Personal Hygiene

Catatan: Berilah tanda ceklis pada pertanyaan di bawah ini (√) sesuai dengan kegiatan sehari-hari anda !

No	Pertanyaan	Jawaban			
		Selalu	Sering	Jarang	Tidak pernah
1.	Saya mencuci tangan sebelum makan				
2.	Saya mandi setelah beraktifitas (bermain)				
3.	Saya mencuci tangan menggunakan sabun				
4.	Saya membersihkan kuku kaki dan tangan setiap mandi?				
5.	Saya mencuci tangan setelah buang air besar				
6.	Saat mandi saya menggosok lipatan-lipatan seperti ketiak, sela-sela jari, belakan telinga,dll				
7.	Saya mencuci tangan setelah bermain				
8.	Saya menggosok gigi sebelum tidur				
9.	Saya memperhatikan kebersihan kaki dan kuku				

2. Pertanyaan tentang Kebiasaan Jajan

Catatan: Berilah tanda ceklis pada pertanyaan di bawah ini (√) sesuai dengan kegiatan sehari-hari anda !

No	Pertanyaan	Jawaban			
		Selalu	Sering	Jarang	Tidak Pernah
1.	Saya sarapan pagi sebelum berangkat ke sekolah				
2.	Saya membeli jajanan yang terbungkus plastik				
3.	Saya membeli jajanan di pinggir jalan atau pedagang keliling				
4.	Saya membeli jajanan yang terbuka di sekolah				
5.	Saya membeli makanan di kantin sekolah				
6.	Saya membeli makanan dekat dari pembuangan sampah				
7.	Saya makan cemilan >2 kali sehari.				

*Apa saja jenis jajanan yang sering anda konsumsi?

-

-

-

LAMPIRAN 5 MASTER TABEL

KELOMPOK KASUS

N o.	Inisial	Umur	JK	BB	TB	IMT		DT	Personal Hygiene										Kebiasaan Jajan									
									P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9	Σ	K O	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	Σ	K O
1	An.MS	8	1	22	120	15,2	1	1	2	2	3	3	4	2	2	1	1	20	2	4	3	1	1	2	2	1	14	2
2	An.RZ	8	1	18	105	16,3	1	1	3	2	3	2	2	4	3	2	4	25	1	3	4	3	4	3	2	3	22	1
3	An.MN	8	1	32	110	26,4	4	1	2	3	4	2	3	2	2	2	2	22	2	2	3	1	2	3	3	1	15	2
4	An.MF	8	1	20	119	14,1	1	1	2	2	1	3	4	3	3	3	1	22	2	3	3	1	2	2	2	1	14	2
5	An.KM	8	2	20	130	11,8	1	1	4	2	3	1	4	3	3	2	2	24	1	4	2	1	2	4	3	1	17	2
6	An.PV	8	2	20	133	11,3	1	1	2	3	2	1	4	2	2	2	1	19	2	2	3	1	2	2	3	1	14	2
7	An.MH	9	1	32	137	17,1	1	1	3	3	4	2	4	1	2	2	3	24	1	3	3	1	1	3	2	1	14	2
8	An.F	9	1	23	115	17,4	1	1	2	2	3	1	4	2	1	2	2	19	2	4	3	1	2	3	3	1	17	2
9	An.HK	9	1	19	122	12,8	1	1	1	2	3	1	3	3	3	4	4	24	1	1	2	3	2	3	2	3	16	2
10	An.S	9	2	25	140	12,7	1	1	2	3	3	2	4	2	2	2	1	21	2	1	3	1	2	2	2	1	12	2
11	An.MU	10	1	25	130	14,7	1	1	2	2	3	2	4	2	2	3	1	21	2	4	3	1	1	1	2	1	13	2
12	An.FH	10	1	22	127	13,6	1	1	2	3	4	4	3	2	1	1	3	24	1	1	2	3	3	2	2	2	15	2
13	An.SW	10	2	38	140	19,3	2	1	4	2	1	1	4	4	2	2	3	23	1	4	3	1	1	3	3	1	16	2
14	An.D	10	2	28	110	23,1	3	1	2	3	3	2	3	1	2	2	1	19	2	2	3	2	2	4	3	2	18	1
15	An.MY	10	2	30	140	15,3	1	1	3	3	4	2	4	3	4	3	2	28	1	3	4	3	2	4	3	1	20	1
16	An.RT	11	1	30	138	15,7	1	1	2	3	2	3	2	4	2	1	1	20	2	2	3	2	2	2	1	2	14	2
17	An.AP	11	2	29	135	15,9	1	1	3	3	2	3	2	3	2	2	1	21	2	2	3	2	3	2	2	2	16	2
18	An.ER	11	2	26	115	15,1	1	1	2	2	3	3	4	2	3	2	3	24	1	2	3	1	2	4	1	1	14	2
19	An.J	12	1	28	128	17,1	1	1	3	2	2	2	3	2	1	2	1	18	2	2	4	1	2	3	3	1	16	2
20	An.M	12	1	32	121	21,9	2	1	4	3	3	2	3	1	2	2	1	21	2	3	2	2	2	2	3	1	15	2
21	An.DP	12	2	38	133	21,3	2	1	4	3	4	2	4	4	4	3	2	30	1	3	3	1	1	4	2	1	15	2
22	An.AF	12	2	42	140	21,4	2	1	4	3	3	2	4	4	3	4	2	29	1	4	3	1	2	2	2	1	15	2
23	An.MT	12	2	37	140	18,8	2	1	2	1	3	3	2	1	2	4	2	20	2	4	2	2	2	3	2	1	16	2
24	An.AS	12	2	25	120	17,3	1	1	2	3	2	2	1	2	3	2	2	19	2	2	3	2	2	3	2	2	16	2
25	An.SS	12	2	28	123	18,5	2	1	2	3	2	3	3	2	3	2	3	23	1	2	3	4	3	3	3	3	21	1

Ket jenis kelamin:
1 = laki -laki
2 = perempuan

Ket IMT :
1 = < 18,5 (BB kurang)
2 = 18,5 – 22,9 (BB Normal)
3 = 23,0 – 24,9 (overweight)
4 = 25,9 – 29,9 (Obesitas)

Ket KO personal hygiene :
1 = > 22 (Baik)
2 = ≤ 22 (Buruk)

Ket KO kebiasaan jajan :
1 = > 17 (baik)
2 = ≤ 17 (Buruk)

KELOMPOK KONTROL

N o.	Inisial	Umur	JK	BB	TB	IMT		TD T	Personal Hygiene										Kebiasaan Jajan									
									P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9	Σ	K O	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	Σ	K O
1	An.AJ	8	1	19	110	15,8	1	2	3	4	2	4	4	2	2	1	3	25	1	4	4	3	1	4	2	1	18	1
2	An.MR	8	1	23	110	19,0	2	2	4	4	3	2	4	3	3	1	4	28	1	4	4	2	2	4	4	1	21	1
3	An.MD	8	1	27	129	16,2	1	2	4	3	2	3	4	3	4	2	1	26	1	4	3	2	3	3	4	1	20	1
4	An.AT	8	1	30	122	20,2	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2	16	2	3	2	3	2	3	2	1	16	2
5	An.KS	8	2	37	129	22,2	2	2	4	3	4	2	3	2	1	3	4	26	1	4	1	2	2	4	3	2	20	1
6	An.SA	8	2	39	127	24,2	3	2	4	3	2	3	4	1	3	2	4	26	1	4	3	2	3	3	4	2	21	1
7	An.AA	9	1	28	129	16,8	1	2	2	3	4	4	4	3	4	2	4	30	1	4	3	1	2	4	3	2	19	1
8	An.AY	9	1	22	123	14,5	1	2	4	3	2	3	4	2	4	2	2	26	1	2	3	2	1	3	1	1	13	2
9	An. FJ	9	1	27	113	21,2	2	2	1	2	3	3	2	2	1	1	2	17	2	3	2	3	2	2	2	2	16	2
10	An.NS	9	2	25	137	13,3	1	2	4	4	3	3	4	2	3	4	2	29	1	3	4	2	2	3	3	1	18	1
11	An.MI	10	1	32	133	18,1	1	2	4	3	4	2	4	4	3	4	3	31	1	4	3	1	2	4	2	1	17	2
12	An.AZ	10	1	37	129	22,2	2	2	2	3	2	1	4	3	4	4	4	27	1	2	3	2	1	3	1	1	13	2
13	An.RN	10	2	20	110	16,5	1	2	4	3	4	3	4	4	2	2	4	30	1	4	4	2	1	3	2	1	17	2
14	An.HF	10	2	31	127	23,6	3	2	4	4	4	3	4	3	4	4	2	32	1	3	4	3	3	3	3	1	20	1
15	An. YG	10	2	29	114	22,4	2	2	3	3	4	4	2	2	2	1	1	22	2	2	2	3	4	3	2	3	19	1
16	An. KK	11	1	34	122	22,9	2	2	2	3	3	2	2	2	3	3	3	23	1	1	2	2	3	4	2	1	15	2
17	An.AS	11	2	25	123	16,5	1	2	4	4	3	3	4	4	4	3	4	33	1	3	4	2	1	4	2	1	17	2
18	An.MF	11	2	39	139	20,2	2	2	4	4	4	3	3	3	4	4	2	31	1	4	3	2	1	3	2	1	16	2
19	An. YI	12	1	28	122	18,9	2	2	2	3	3	2	1	2	3	2	3	21	2	1	2	3	3	3	3	3	18	1
20	An. NS	12	1	33	124	21,5	2	2	3	2	3	2	2	3	4	1	1	21	2	2	1	2	3	4	3	2	17	2
21	An.AM	12	2	30	134	16,7	1	2	2	2	2	1	4	3	3	2	2	21	2	2	2	3	3	2	2	2	16	2
22	An.AP	12	2	32	128	19,6	2	2	3	4	3	4	4	4	2	4	4	32	1	4	4	2	1	4	2	1	18	1
23	An.SF	12	2	25	140	12,7	1	2	4	2	2	4	4	4	4	4	3	31	1	4	3	2	2	2	2	1	16	2
24	An.PA	12	2	25	135	13,7	1	2	2	2	1	4	4	3	2	2	3	23	1	1	3	1	3	2	2	1	13	2
25	An.FD	12	2	38	131	22,2	2	2	4	3	2	2	4	3	3	2	1	24	1	4	4	2	2	1	2	3	18	1

Ket jenis kelamin:
1 = laki –laki
2 = perempuan

Ket IMT :
1 = < 18,5 (BB kurang)
2 = 18,5 – 22,9 (BB Normal)
3 = 23,0 – 24,9 (overweight)
4 = 25,9 – 29,9 (Obesitas)

Ket KO personal hygiene :
1 = > 22 (Baik)
2 = ≤ 22 (Buruk)

Ket KO kebiasaan jajan :
1 = > 17 (Baik)
2 = ≤ 17 (Buruk)

LAMPIRAN 6

SPSS

Analisa univariat

Frequencies

Umur_Kasus

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
8	6	24,0	24,0	24,0
9	4	16,0	16,0	40,0
10	5	20,0	20,0	60,0
11	3	12,0	12,0	72,0
12	7	28,0	28,0	100,0
Total	25	100,0	100,0	

Umur_kontrol

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
8	6	24,0	24,0	24,0
9	4	16,0	16,0	40,0
10	5	20,0	20,0	60,0
11	3	12,0	12,0	72,0
12	7	28,0	28,0	100,0
Total	25	100,0	100,0	

Jenis_kelamin_kasus

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Laki_laki	12	48,0	48,0	48,0
Valid Perempuan	13	52,0	52,0	100,0
Total	25	100,0	100,0	

Jenis_kelamin_kontrol

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	12	48,0	48,0
	Perempuan	13	52,0	100,0
	Total	25	100,0	100,0

IMT_kasus

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	BB kurang	17	68,0	68,0
	BB Normal	6	24,0	92,0
	Overweight	1	4,0	96,0
	Obesitas	1	4,0	100,0
	Total	25	100,0	100,0

IMT_kontrol

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	BB Kurang	11	44,0	44,0
	BB Normal	12	48,0	92,0
	Overweight	2	8,0	100,0
	Total	25	100,0	100,0

Personal hygiene kasus

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Baik	11	44,0	44,0	44,0
Buruk	14	56,0	56,0	100,0
Total	25	100,0	100,0	

Personal hygiene kontrol

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Baik	19	76,0	76,0	76,0
Buruk	6	24,0	24,0	100,0
Total	25	100,0	100,0	

Kebiasaan jajan kasus

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid baik	4	16,0	16,0	16,0
Buruk	21	84,0	84,0	100,0
Total	25	100,0	100,0	

Kebiasaan jajan kontrol

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid baik	12	48,0	48,0	48,0
Buruk	13	52,0	52,0	100,0
Total	25	100,0	100,0	

Analisa bivariat Crosstabs

[DataSet0 HASLINDA]

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Personal_Hygiene * Demam_typhoid	50	100.0%	0	0.0%	50	100.0%

Personal_Hygiene * Demam_Typhoid Crosstabulation

			Demam_Typhoid		Total
			Kasus	Kontrol	
Personal_Hygiene	Baik	Count	11	19	30
		% within Personal_Hygiene	36.7%	63.3%	100.0%
		% within Demam_Typhoid	44.0%	76.0%	60.0%
		% of Total	22.0%	38.0%	60.0%
	Buruk	Count	14	6	20
		% within Personal_Hygiene	70.0%	30.0%	100.0%
		% within Demam_Typhoid	56.0%	24.0%	40.0%
		% of Total	28.0%	12.0%	40.0%
	Total	Count	25	25	50
% within Personal_Hygiene		50.0%	50.0%	100.0%	
% within Demam_Typhoid		100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	50.0%	50.0%	100.0%	

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	5.333 ^a	1	.021		
Continuity Correction ^b	4.083	1	.043		
Likelihood Ratio	5.451	1	.020		
Fisher's Exact Test				.042	.021
Linear-by-Linear Association	5.227	1	.022		
N of Valid Cases	50				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10.00.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Personal_Hygiene (Baik / Buruk)	.248	.074	.833
For cohort Demam_typhoid = Kasus	.524	.302	.909
For cohort Demam_typhoid = Kontrol	2.111	1.025	4.349
N of Valid Cases	50		

Crosstabs

[DataSet0 HASLINDA]

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Kebiasaan_Jajan * Demam_typhoid	50	100.0%	0	0.0%	50	100.0%

kebiasaan_jajan * Demam_Typhoid Crosstabulation

			Demam_Typhoid		Total
			Kasus	Kontrol	
kebiasaan_jajan	Baik	Count	4	12	16
		% within kebiasaan_jajan	25.0%	75.0%	100.0%
		% within Demam_Typhoid	16.0%	48.0%	32.0%
		% of Total	8.0%	24.0%	32.0%
	Buruk	Count	21	13	34
		% within kebiasaan_jajan	61.8%	38.2%	100.0%
		% within Demam_Typhoid	84.0%	52.0%	68.0%
		% of Total	42.0%	26.0%	68.0%
	Total	Count	25	25	50
% within kebiasaan_jajan		50.0%	50.0%	100.0%	
% within Demam_Typhoid		100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	50.0%	50.0%	100.0%	

Square Tests Chi-

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	5.882 ^a	1	.015		
Continuity Correction ^b	4.504	1	.034		
Likelihood Ratio	6.086	1	.014		
Fisher's Exact Test				.032	.016
Linear-by-Linear Association	5.765	1	.016		
N of Valid Cases	50				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8.00.

b. Computed only for a 2x2 table

Rsk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Kebiasaan_Jajan (Baik / Buruk)	.206	.055	.777
For cohort Demam_typhoid = Kasus	.405	.166	.985
For cohort Demam_typhoid = Kontrol	1.962	1.175	3.274
N of Valid Cases	50		

IMT

Chi square

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
IMT * Demam_typhoid	50	100.0%	0	0.0%	50	100.0%

IMT * Demam_typhoid Crosstabulation

		Demam_typhoid		Total	
		kasus	kontrol		
IMT	BB kurang	Count	17	11	28
		Expected Count	14.0	14.0	28.0
		% within IMT	60.7%	39.3%	100.0%
		% of Total	34.0%	22.0%	56.0%
	BB normal	Count	6	12	18
		Expected Count	9.0	9.0	18.0
		% within IMT	33.3%	66.7%	100.0%
		% of Total	12.0%	24.0%	36.0%
	Overweight	Count	1	2	3
		Expected Count	1.5	1.5	3.0
		% within IMT	33.3%	66.7%	100.0%
		% of Total	2.0%	4.0%	6.0%
Obesitas	Count	1	0	1	
	Expected Count	.5	.5	1.0	
	% within IMT	100.0%	0.0%	100.0%	
	% of Total	2.0%	0.0%	2.0%	
Total	Count	25	25	50	
	Expected Count	25.0	25.0	50.0	
	% within IMT	50.0%	50.0%	100.0%	
	% of Total	50.0%	50.0%	100.0%	

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	4.619 ^a	3	.202
Likelihood Ratio	5.061	3	.167
Linear-by-Linear Association	1.003	1	.317
N of Valid Cases	50		

a. 4 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .50.

KARENA EC ADA <5 MAKA DI UJI DENGAN TABEL 2Xk KOLMOGOROF SMIRNOV

Frequencies

	Demam_typhoid	N
	kasus	25
IMT	kontrol	25
	Total	50

Test Statistics^a

		IMT
	Absolute	.240
Most Extreme Differences	Positive	.240
	Negative	-.040
Kolmogorov-Smirnov Z		.849
Asymp. Sig. (2-tailed)		.468

a. Grouping Variable: Demam_typhoid

umur

Test Statistics^a

	Umur kasus
Mann-Whitney U	312,500
Wilcoxon W	637,500
Z	,000
Asymp. Sig. (2-tailed)	1,000

a. Grouping Variable: Umur kontrol

Jenis kelamin

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Responden Kasus *	25	100,0%	0	0,0%	25	100,0%
Responden Kontrol						

Responden Kasus * Responden Kontrol Crosstabulation

Count

		Responden Kontrol		Total
		Laki-laki	Perempuan	
Responden Kasus	laki-laki	12	0	12
	Perempuan	0	13	13
Total		12	13	25

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	25,000 ^a	1	,000		
Continuity Correction ^b	21,154	1	,000		
Likelihood Ratio	34,617	1	,000		
Fisher's Exact Test				,000	,000
Linear-by-Linear Association	24,000	1	,000		
N of Valid Cases	25				

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,76.

b. Computed only for a 2x2 table

Test Statistics^a

		Responden kasus
	Absolute	,114
Most Extreme Differences	Positive	,114
	Negative	,000
Kolmogorov-Smirnov Z		,272
Asymp. Sig. (2-tailed)		1,000

a. Grouping Variable: Responden kontrol

LAMPIRAN 6

DOKUMENTASI



RIWAYAT HIDUP



Penulis di lahirkan di Takalar Sulawesi Selatan tanggal 04 Mei 1994 dari Ayah yang bernama Haris dan Ibu yang bernama Darmawati. Penulis merupakan anak tunggal. Penulis memulai pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri Su'rulangi pada tahun 2000 dan lulus pada tahun 2006. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SLTP Negeri 5 Takalar dan tamat pada tahun 2009. Penulis melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 2 Takalar dan lulus pada tahun 2012. Setelah tamat SMA, penulis kembali melanjutkan pendidikan di Universitas Negeri Alauddin Makassar dengan Program Studi S1 Keperawatan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Pada tanggal 29 Agustus 2016 penulis Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan kuliahnya tepat waktu selama empat tahun.

Berkat rahmat Allah SWT. dan iringan doa dari orang tua dan saudara, keluarga, dan dukungan dari teman-teman seperjuangan, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Alauddin Makassar dengan skripsi yang berjudul “Hubungan *Personal Hygiene* dan Kebiasaan Jajan Terhadap Kejadian Demam *Thypoid* pada Anak” dan berhasil memperoleh gelar Sarjana Keperawatan.