

**GAMBARAN REAKSI HOSPITALISASI TERHADAP KECEMASAN
ANAK USIA PRA SEKOLAH DI RUANG AR RAHIM
RSUD HAJI MAKASSAR**



Skripsi

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Keperawatan Jurusan Keperawatan pada
Fakultas Ilmu Kesehatan UIN
Alauddin Makassar**

Oleh

MUH. IRWAN IRHAM

NIM 70300107118

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2013**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, Agustus 2013

Penyusun,

Muh.Irwan Irham
NIM: 70300107118



PENGESAHAN SKIRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Gambaran Reaksi Hospitalisasi Terhadap Kecemasan Anak Usia Pra Sekolah di Ruang Ar Rahim RSUD Haji Makassar**” yang disusun oleh Muh. Irwan Irham, Nim, 70300107118, Mahasiswa Prodi Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan. Telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Rabu 17 April 2013, bertepatan dengan 15 Ramadhan 1431 H dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Keperawatan (dengan berbagai perbaikan).

Makassar, 17 April 2013 M

5 Jumadil Akhir 1433 H

DEWAN PENGUJI

UIN ALAUDDIN
MAKASSAR

Ketua : Risnah, SKM, S.Kep.Ns.M.Kes. (.....)

Sekretaris : Mulyadi Muhidin, S.Kep, Ns (.....)

Penguji I : Dr. Nur Hidayah, S.Kep.Ns.M.Kes. (.....)

Penguji II : Drs. H. Supardin, M.Hi (.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan

UIN Alauddin Makassar

Dr. dr. H. Rasjidin Abdullah, MPH., MH. Kes.

NIP. 19530119 198110 1 001

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat dan atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang selalu eksis membantu perjuangan beliau dalam menegakkan Dinullah di muka bumi ini.

Terselesainya skripsi ini tentunya tak lepas dari dorongan dan uluran tangan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih buat kedua orang tua dan saudara-saudaraku atas bantuan baik berupa materi maupun dukungannya, serta penghargaan yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof.Dr.H.A.Qadir Gassing HT, MS selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Dr.dr.H.Rasjidin Abdullah, MPH., M.Kes selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Ibu Dr. Nur Hidayah, S.Kep.,Ns.,M.Kes selaku ketua prodi Jurusan Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin

Makassar dan selaku penguji I serta sebagai Ibu yang selalu memberikan motivasi dan pengetahuan yang luas kepada kami anak didiknya.

4. Ibu Risnah, S.Kep.,Ns.,SKM.,M.Kes selaku sekretaris prodi Jurusan Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan selaku Pembimbing I serta sebagai ibu yang selalu memberikan motivasi yang kuat terhadap kami utamanya saya dalam penyelesaian akhir studi saya.
5. Bapak Mulyadi Muhidin, S.Kep.,Ns. selaku pembimbing II yang telah memberikan petunjuk, arahan, dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Drs. H. Supardin, M.Hi. selaku Tim Penguji Agama sekaligus pembimbing dalam penyusunan skripsi ini.
7. Dosen serta staf Program Studi Keperawatan yang telah memberi bantuan dan bimbingan selama peneliti mengikuti pendidikan.
8. Teristimewah buat seluruh keluargaku, khususnya ayah dan ibu serta kakaku yang tercinta atas dukungan, jerih paya serta doa restunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabatku Udhy A'im, Chaerullah, Jalal, Idcuq, Zulfikar, dan seluruh teman teman keperawatan '07 serta adik adik angkatanku yang tak sempat ku sebut namanya terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini.

10. Specially for Lhina Rasya yang jadi semangat hidupku dan buatku tersenyum, skripsi ini kupersembahkan buat kamu sebagai bukti janjiku kalau saya pasti sarjana “*I Always Love You Forever, Lhyn*”.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati penulis bersedia menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun sebagai upaya penyempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih atas segala kebaikan dan bantuan yang diberikan semoga mendapat balasan yang setimpal disisi Allah swt. Amin.

Makassar, 2013

Penulis

DAFTAR TABEL

Tabel

- Tabel 2.1 Respon tubuh fisiologis terhadap kecemasan.
- Tabel 2.2 Respon perilaku, kognitif dan afektif terhadap kecemasan.
- Tabel 5.1 Distribusi frekuensi Responden berdasarkan kelompok umur di
RSUD Haji Makassar Tahun 2013
- Tabel 5.2 Distribusi frekuensi responden berdasarkan jenis kelamin di
RSUD Haji Makassar Tahun 2013
- Tabel 5.3 Distibusi frekuensi responden berdasarkan lama rawat inap di
RSUD Haji Makassar Tahun 2013
- Tabel 5.4 Distribusi frekuensi responden perpisahan di RSUD Haji Makassar
Tahun 2013
- Tabel 5.5 Distribusi frekuensi responden berdasarkan kehilangan kendali di
RSUD Haji Makassar Tahun 2013
- Tabel 5.6 Distribusi frekuensi responden berdasarkan trauma fisik dan nyeri
di RSUD Haji Makassar Tahun 2013

ABSTRAK

Nama Penyusun : Muh. Irwan Irham
NIM : 70300107118
Judul Penelitian : Gambaran Reaksi Hospitalisasi Terhadap
Kecemasan Anak Usia Pra Sekolah Di Ruang Ar
Rahim RSUD Haji Makassar
Pembimbing : Risnah, S.KM, S.Kep, Ns, M.Kes dan Mulyadi,
S.Kep, Ns

Hospitalisasi pada anak merupakan proses karena suatu alasan yang berencana atau darurat mengharuskan anak untuk tinggal di rumah sakit menjalani terapi dan perawatan sampai pemulangan kembali kerumah. Selama proses tersebut, anak dapat mengalami berbagai kejadian yang menunjukkan pengalaman yang sangat trauma dan penuh dengan kecemasan. Perasaan cemas merupakan dampak dari hospitalisasi yang dialami oleh anak karena menghadapi stressor yang ada dilingkungan rumah sakit. Pada umumnya reaksi anak terhadap sakit adalah kecemasan karena perpisahan, kehilangan, trauma fisik dan rasa nyeri.

Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan reaksi hospitalisasi terhadap kecemasan anak usia Pra Sekolah di ruang Ar Rahim RSUD Haji Makassar. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 25 februari sampai dengan 25 maret 2013, populasi dalam penelitian ini adalah anak usia pra sekolah (3-6 tahun) yang sedang menjalani Hospitalisasi. Sampel yang diambil sebanyak 30 responden anak usia pra sekolah. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan metode pengambilan sampel secara purposive sampling. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Analisa data yang dilakukan adalah analisa univariat.

Berdasarkan hasil penelitian, variabel yang diteliti merupakan gambaran reaksi hospitalisasi dari anak pra sekolah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 93,3% hospitalisasi pada anak pra sekolah menggambarkan perpisahan akibat kecemasan, diikuti oleh kehilangan kendali 90,0%, trauma fisik dan nyeri 96,7%.

Oleh karena itu, disarankan kepada institusi kesehatan agar meningkatkan pelayanan dan fasilitas sesuai perkembangan anak selama perawatan demi menurunkan stressor dan kecemasan anak akibat hospitalisasi. Dan juga kepada keluarga dan perawat, supaya memperhatikan kebutuhan anak baik fisik maupun psikologi.

Kata Kunci : Hospitalisasi, Kecemasan, Anak Pra Sekolah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Tinjauan Umum tentang Hospitalisasi	6
1. Pengertian.....	6
2. Reaksi anak terhadap proses hospitalisasi	6
3. Reaksi orang tua terhadap hospitalisasi anak.....	7
4. Reaksi saudara kandung terhadap hospitalisasi anak.....	8
5. Perubahan yang terjadi akibat hospitalisasi	9
6. Faktor yang mempengaruhi hospitalisasi pada anak.....	10
7. Kecemasan anak pada saat hospitalisasi	14

8. Pengaruh pembacaan doa terhadap kecemasan saat hospitalisasi	17
B. Tinjauan Umum tentang Kecemasan	21
1. Pengertian.....	21
2. faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan.....	24
3. Faktor predisposisi kecemasan.....	27
4. Tingkat kecemasan.....	28
5. Respon tubuh terhadap kecemasan	30
6. Penatalaksanaan kecemasan.....	31
BAB III KERANGKA KERJA PENELITIAN.....	36
A. Kerangka Konsep.....	36
B. Variabel Penelitian	38
C. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif	38
BAB IV METODE PENELITIAN	40
A. Desain Penelitian.....	40
B. Populasi dan Sampel	40
C. Tehnik Sampling	41
D. Pengumpulan Data	42
E. Pengelolaan Data dan Analisis Data	46
F. Jadwal Penelitian.....	47
G. Etika Penelitian	48

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Hasil penelitian.....	49
B. Pembahasan.....	54
BAB VI PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Sakit merupakan suatu keadaan yang tidak menyenangkan yang menimpa seseorang sehingga menimbulkan gangguan aktivitas sehari-hari. Pasien bersama keluarganya yang masuk rumah sakit akan mengalami perasaan cemas atau yang sering disebut *anxietas*. Pada saat masuk rumah sakit pasien dihadapkan pada situasi baru, yaitu tenaga kesehatan dan klien lain, situasi ruang dan lingkungan rumah sakit, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap pasien, peraturan-peraturan rumah sakit yang berbeda dengan kebiasaan klien di rumah. Anak yang sakit dan harus dirawat di rumah sakit akan mengalami masa sulit karena tidak dapat melakukan kebiasaan seperti biasanya. Dirawat di rumah sakit merupakan sumber utama stress dan kecewa, termasuk kecemasan perpisahan. (Nelson, 2000)

Bukti ilmiah menunjukkan bahwa lingkungan rumah sakit merupakan penyebab stress bagi anak, baik lingkungan fisik rumah sakit seperti bangunan atau ruang rawat, alat-alat, bau yang khas, pakaian putih petugas kesehatan maupun lingkungan social, seperti sesama pasien anak, ataupun interaksi dan sikap petugas kesehatan itu sendiri. Perasaan, seperti takut, cemas, tegang, nyeri, dan perasaan yang tidak menyenangkan lainnya, seringkali dialami anak. (Brennan, 1994 dalam Supartini, 2004)

Penelitian membuktikan bahwa hospitalisasi anak dapat menjadi suatu pengalaman yang menimbulkan trauma baik pada anak maupun orang tua sehingga menimbulkan reaksi tertentu yang akan berdampak pada kerja sama anak dan orang tua dalam perawatan anak di rumah sakit. (Brennan, 1994 dalam Supartini, 2004)

Reaksi anak di rumah sakit dan dirawat di rumah sakit berbeda-beda tergantung pada perkembangan usia, support system, keterampilan koping dalam menangani stress, serta pengalaman sakit dan dirawat di rumah sakit. (Windari, 2009)

Anak usia pra sekolah, biasanya mengalami *separation anxiety* atau kecemasan perpisahan. Kecemasan merupakan hasil keraguan atas kemampuan untuk menangani situasi yang menyebabkan stress.. Jumlah anak usia pra sekolah yang dirawat di Ruang Ar Rahim RSUD Haji Makassar selama 3 bulan terakhir adalah sebanyak 102 anak, menurut data yang diambil pada bulan Juli 2012. Kecemasan dirasakan oleh sebagian besar anak usia pra sekolah selama dirawat di rumah sakit akibat perpisahan dengan orang tua, menurut perawat Ruang Ar Rahim RSUD Haji Makassar.

Proses perawatan di rumah sakit sering kali mengabaikan aspek-aspek psikologis sehingga menimbulkan berbagai permasalahan psikologis bagi pasien yang salah satunya adalah kecemasan. Kecemasan merupakan perasaan yang paling umum dialami oleh pasien yang dirawat di rumah sakit, kecemasan yang sering terjadi adalah apabila pasien yang dirawat di rumah sakit harus menjalani pengobatan.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan hospitalisasi dalam menyikapi arus hospitalisasi dan dampak yang menyertai baik bagi anak maupun orang tua, antara lain:

- a. Melibatkan orang tua dalam mengatasi stress anak dan pelaksanaan asuhan keperawatan
- b. Membina hubungan saling percaya antara perawat dengan anak dan keluarga
- c. Mengurangi batasan-batasan yang diberikan pada anak
- d. Memberikan dukungan pada anak dan keluarga.

Upaya-upaya tersebut diharapkan mampu meminimalkan dampak yang timbul akibat proses hospitalisasi, terutama pada anak usia pra sekolah.

B Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka ditetapkan rumusan masalah sebagai berikut: “Bagaimana Gambaran Reaksi hospitalisasi terhadap Kecemasan anak usia pra sekolah ?”

C Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui gambaran Reaksi Hospitalisasi terhadap kecemasan anak usia Pra Sekolah di Ruang Ar Rahim RSUD Haji Makassar.

2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui gambaran reaksi perpisahan terhadap kecemasan anak usia Pra Sekolah di Ruang Ar Rahim RSUD Haji Makassar.
2. Untuk mengetahui gambaran reaksi kehilangan kendali terhadap kecemasan anak usia Pra Sekolah di Ruang Ar Rahim RSUD Haji Makassar.
3. Untuk mengetahui gambaran reaksi trauma fisik dan nyeri terhadap kecemasan anak usia Pra Sekolah di Ruang Ar Rahim RSUD Haji Makassar.

D Manfaat Penelitian

1. Institusi Pendidikan

- a. Diharapkan penelitian ini menambah khasanah ilmu pengetahuan dan menjadi bahan bacaan tentang gambaran reaksi hospitalisasi terhadap kecemasan pada anak usia pra sekolah.
- b. Sebagai bahan atau sumber data penelitian berikutnya dan mendorong bagi pihak yang berkepentingan untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

2. Instansi Pelayanan Kesehatan

Meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan khususnya tenaga perawat untuk mengetahui dan meningkatkan kualitas asuhan keperawatan serta memberikan masukan tentang dampak hospitalisasi terhadap anak usia pra sekolah.

3. Peneliti

Merupakan pengalaman yang sangat berharga dan sebagai bahan pertimbangan dalam mengembangkan penelitian tentang gambaran reaksi hospitalisasi terhadap tingkat kecemasan pada anak usia pra sekolah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Hospitalisasi

1. Pengertian hospitalisasi

Hospitalisasi adalah bentuk stressor individu yang berlangsung selama individu tersebut dirawat dirumah sakit. Hospitalisasi merupakan pengalaman yang mengancam bagi individu karena stressor yang dihadapi dapat menimbulkan perasaan tidak aman dan nyaman, seperti:

1. Lingkungan yang asing
2. Berpisah dengan orang yang berarti
3. Kurang informasi
4. Kehilangan kebebasan dan kemandirian
5. Pengalaman yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan , semakin sering berhubungan dengan rumah sakit, maka bentuk kecemasan semakin kecil atau malah sebaliknya.
6. Perilaku petugas Rumah Sakit. (Dian, 2012)

2. Reaksi anak usia pra sekolah terhadap hospitalisasi

Pada umumnya, reaksi anak terhadap hospitalisasi adalah kecemasan karena perpisahan, kehilangan kontrol, trauma fisik dan rasa nyeri.

1. Reaksi terhadap perpisahan

Di tunjukkan dengan menolak makan, sering bertanya, menangis walaupun secara perlahan, dan tidak kooperatif terhadap petugas kesehatan.

2. Kehilangan kontrol/kendali

Perawatan di rumah sakit mengharuskan adanya pembatasan aktifitas anak sehingga anak merasa kehilangan kekuatan diri. Perawatan di rumah sakit sering kali di persepsikan anak pra sekolah sebagai hukuman sehingga anak akan merasa malu, bersalah, dan takut.

3. Trauma fisik dan rasa nyeri

Ketakutan anak terhadap perlukaan tubuh muncul karena anak menganggap tindakan dan prosedurnya mengancam integritas tubuhnya. Oleh karena itu, hal ini menimbulkan reaksi agresif dengan marah dan berontak, ekspresi verbal dengan mengucapkan kata-kata marah, tidak mau bekerja sama dengan perawat, dan ketergantungan pada orang tua. (Supartini, 2004)

3. Reaksi orang tua terhadap hospitalisasi anak

3.1 Perasaan cemas dan takut

- a. Perasaan cemas dan takut : mendapat prosedur menyakitkan
- b. Cemas paling tinggi : menunggu informasi tentang diagnosa penyakit anaknya
- c. Takut muncul : takut kehilangan anak pada kondisi sakit terminal

- d. Perilaku : sering bertanya / bertanya tentang hal yang sama secara berulang-ulang pada orang yang berbeda, gelisah, ekspresi wajah tegang dan marah

3.2 Perasaan sedih

- a. Muncul pada saat anak dalam kondisi terminal
- b. Perilaku : isolasi, tidak mau didekati orang lain, tidak kooperatif terhadap petugas kesehatan

3.3 Perasaan frustrasi

- a. Putus asa dan frustrasi : anak yang telah dirawat cukup lama dan tidak mengalami perubahan, tidak adekuatnya dukungan psikologis
- b. Perilaku : tidak kooperatif, putus asa, menolak tindakan, menginginkan pulang paks. (Widyawati, 2010)

4. Reaksi saudara kandung terhadap hospitalisasi anak

Reaksi saudara kandung terhadap hospitalisasi anak yaitu perasaan dan pikiran negatif Anak yang lebih kecil merasa dan berpikiran negatif : kebutuhan diprioritaskan→ pada anak yang sakit .Reaksi yang muncul : marah, cemburu, benci dan rasa bersalah

- a. Marah : jengkel pada orang tua yang dinilainya tidak memperhatikannya
- b. Cemburu : orang tua lebih mementingkan saudaranya yang sakit
- c. Benci : situasi yang dinilainya Sangay tidak menyenangkan

- d. Rasa bersalah : anak berpikir mungkin saudaranya sakit akibat kesalahannya
- e. Takut dan cemas : ketidaktahuan tentang kondisi saudaranya
- f. Kesepian : situasi rumah dirasakannya tidak seperti biasanya penuh kehangatan, bercengkrama dengan orang tua dan saudaranya.

(Widyawati, 2010)

5. Perubahan yang terjadi akibat Hospitalisasi

Perubahan yang terjadi akibat hospitalisasi adalah :

1. Perubahan konsep diri.

Akibat penyakit yang di derita atau tindakan seperti pembedahan, pengaruh citra tubuh , perubahan citra tubuh dapat menyebabkan perubahan peran , idial diri, harga diri dan identitasnya.

2. Regresi

Klien mengalami kemunduran ketinggian perkembangan sebelumnya atau lebih rendah dalam fungsi fisik, mental, perilaku dan intelektual.

3. Dependensi

Klien merasa tidak berdaya dan tergantung pada orang lain.

4. Dipersonalisasi

Peran sakit yang dialami klien menyebabkan perubahan kepribadian, tidak realistis, tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan, perubahan identitas dan sulit bekerjasama mengatasi masalahnya.

5. Takut dan Ansietas

Perasaan takut dan ansietas timbul karena persepsi yang salah terhadap penyakitnya.

6. Kehilangan dan perpisahan

Kehilangan dan perpisahan selama klien dirawat muncul karena lingkungan yang asing dan jauh dari suasana kekeluargaan, kehilangan kebebasan, berpisah dengan pasangan dan terasing dari orang yang dicintai. (Widyawati, 2010)

6. Faktor-faktor yang mempengaruhi hospitalisasi pada anak

Faktor-faktor stressor yang utama dan sering terjadi pada anak yang menjalani perawatan di rumah sakit adalah perpisahan, kehilangan control, trauma fisik dan nyeri serta penyakit fisik yang dialaminya (wong's & whaley, 1999)

1) Perpisahan

Respon anak terhadap perpisahan adalah kecemasan karena perpisahan dengan orang tua, meliputi:

a) Fase protes

Pada fase protes akan berlangsung dalam beberapa jam sampai beberapa hari dengan menunjukkan perilaku sebagai berikut:

(1) Menangis kuat, akan berhenti bila capek

(2) Menjerit mencari orang tua dengan pandangan mata

(3) Menolak dan menghindari orang yang tidak di kenal cara menendang, menggigit, memukul, mencakar, memeluk orang

tua, dan tidak memperbolehkan orang tua dan meminimalkan tindakan yang menyakitkan, untuk menghindari reaksi protes yang lebih keras dari anak.

b) Fase putus asa (*despair*)

Pada fase ini anak akan menunjukkan perilaku sebagai berikut :

- (1) Anak akan berhenti menangis
- (2) Tidak aktif
- (3) Menarik diri terhadap orang lain
- (4) Sedih, tidak interest dengan lingkungan
- (5) Tidak mau berkomunikasi
- (6) Tingkah laku kembali pada perkembangan sebelumnya seperti menghisap ibu jarinya.
- (7) Anak akan menolak makan, minum, dan beraktivitas.

Pada fase ini perawat lebih banyak melibatkan peran dan dukungan orang tua. Pendekatan terhadap orang tua terlebih dulu, menyapa mainan anak, baru ke anak. Berbicara dan berkomunikasi terapeutik dengan posisi dan jarak yang menyenangkan bagi anak.

c) Fase menyesuaikan diri (*detachment*)

Setelah mengalami perpisahan beberapa waktu dengan orang tua, maka anak akan menunjukkan perilaku sebagai berikut:

- (1) Rasa interest dengan lingkungan meningkat.
- (2) Mau berinteraksi dengan orang tua yang tidak di kenal atau pembeli pelayanan.

(3) Anak tampak lebih gembira

Pada fase ini anak mulai menerima rasa perpisahan dengan orang tuanya atau keluarganya. Peran perawat menerima perubahan dan mempertahankannya.

2) Kehilangan kendali (*loss of control*)

Penyebab utama kehilangan kendali adalah keterbatasan fisik karena keterampilan yang disukainya tidak dapat dilakukan, perubahan dari aktifitas rutin seperti bermain dengan teman sebaya, proses pengikatan karena tindakan tertentu, dan tingkat ketergantungan anak terhadap orang tuanya. Tindakan keperawatan yang dilakukan dengan mengurangi hal hal prosedur pengikatan, libatkan orang tua peer group dalam merawat anak, memperbolehkan teman sepermainan dan saudara untuk berkunjung, ajak anak untuk mengunjungi tempat bermain di rumah sakit.

3) Trauma fisik dan nyeri

Respon anak terhadap trauma fisik dan nyeri akibat prosedur tindakan medic maupun keperawatan anatara lain:

- a) Meringis
- b) Mengatup mulut
- c) Membuka mata lebar lebar
- d) Marah atau bertingkah laku agresif seperti menggigit, menendang. Memukul dan berusaha untuk lari.

Tindakan keperawatan yang tepat dilakukan perawat adalah dengan memberikan perhatian khusus terhadap respon sakit dan nyeri, dan mengajak anak untuk mengkomunikasikan rasa sakit dan nyeri yang mereka rasakan, serta menjelaskan sebelum prosedur tindakan di berikan.

4) Penyakit fisik

Penyakit fisik juga menjadi stressor bagi anak, maka respon anak terhadap penyakit sering di tunjukkan dalam manifestasi klinis seperti anak menjadi cengeng, gelisah, sakit yang di tunjukkan dengan menangis keras, tidak mau makan, dan tidak mau berpisah dari orang tua. Peran perawat adalah bersifat empati, membina hubungan saling percaya, membantu dalam pemenuhan kebutuhan fisiologis, dan melibatkan orang tua dalam perawatan dan pengobatan.

Faktor stressor lainnya adalah:

- 1) Fantasi-fantasi dan *unrealistic anxieties* tentang kegelapan, diawali oleh situasi yang menyeramkan, seperti monster, pembunuhan, dan binatang buas dan asing.
- 2) Gangguan kontak sosial jika pengunjung tidak di ijin menjenguk.
- 3) Prosedur yang menyakitkan
- 4) Takut akan cacat atau mati.

7. Kecemasan anak pada saat hospitalisasi

Sakit dan hospitalisasi menimbulkan krisis pada kehidupan anak. Di rumah sakit anak harus menghadapi lingkungan yang asing, pemberian asuhan yang tidak dikenal, dan gangguan pada gaya hidup mereka sehingga anak dapat mengalami kecemasan akibat perubahan, baik pada status kesehatan maupun lingkungan dalam sehari-hari. Kecemasan adalah respon emosional terhadap penilaian. Kecemasan adalah respon emosi tanpa objek yang spesifik yang secara subjektif dialami dan dikomunikasikan secara interpersonal. (Suliswati,2005)

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Imran/3: 139

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزِنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾

Terjemahan:

Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, Padahal kamulah orang-orang yang paling Tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman.

Dari ayat di atas di jelaskan bahwa mereka di perintahkan untuk berjalan di bumi mempelajari bagaimana kesudahan merekayang melanggar dan mendustakan ketetapan Allah. Namun demikian, mereka tidak perlu berputus asa. Karena itu,janganlah kamu melemah, menghadapi musuhmu dan musuh Allah,kuatkan mentalmu mengapa kamu lemah atau bersedih, padahal kamulah orang yang paling tinggi drajatnya di sisi Allah, di dunia dan akhirat, di dunia karena apa yang kamu perjuangkan adalah kebenaran dan di akhirat kerena kamu mendapat surge. Mengapa kamu bersedih sedang yang gugur di anantara kamu menuju surga dan yang luka mendapat pengampunan illahi, ini jika kamu orang

orang mukmin, yakni jika benar-benar keimanan telah mantap dalam hatimu. Memang, dalam perang uhud, ada di antara kamu yang gugur, ada juga yang luka, maka janganlah kamu bersedih atau merasa lemah. Karena sesungguhnya kelompok kaum kafir yang menyerang kamu itupun pada perang badar atau perang uhud juga mendapat luka yang serupa.

Dapat pula dilihat dari sisi jalan dan hasil perang itu. Ketika mereka taat kepada Rasul para pemanah tidak meninggalkan posisi mereka, mereka berhasil menang dan menjadikan kaum musyirikin kocar-kacir, bahkan membunuh dua orang lebih dari mereka. Tetapi ketika mereka melanggar perintah Rasul saw, justru mereka yang kocar-kacir sehingga pada akhirnya gugur tujuh puluh orang lebih. Setelah perang berakhir, dan kaum muslimin kembali berkumpul mengikuti tuntunan Rasul, semua yang terlibat dalam perang uhud itu, tanpa menambah kekuatan, kecuali seorang yang sangat mendesak untuk ikut, yaitu Jabir Ibn Abdillah kembali mengejar kaum musyirikin yang ternyata telah bergegas kembali ke Makkah, setelah mendengar bahwa Rasul saw datang untuk menyerang mereka. Demikian terlihat bahwa kamulah orang-orang paling (tinggi derajatnya), jika orang-orang beriman (Tafsir Al-misbah, volume 2, hal 278-280.)

Menurut pendapat penulis, ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa apabila kita mendapatkan masalah maka janganlah terlalu larut dalam kesedihan tersebut karena setiap masalah ada hikmanya.

Kecemasan dalam diri anak dapat diduga dan normal pada tahap tertentu. Kecemasan yang terjadi pada anak selama hospitalisasi dapat disebabkan karena:

a. Perpisahan

Respon terhadap perpisahan yang ditunjukkan anak usia prasekolah adalah dengan menolak makan, sering bertanya, menangis walaupun secara perlahan, dan tidak kooperatif terhadap petugas kesehatan.

b. Kehilangan kontrol/kendali

Perawatan di rumah sakit mengharuskan adanya pembatasan aktivitas anak, sehingga anak merasa kehilangan kekuatan diri. Ketergantungan merupakan karakteristik dari peran sakit. Anak akan bereaksi terhadap ketergantungan terutama anak menjadi cepat marah dan agresif. Jika terjadi ketergantungan dalam waktu lama (karena penyakit kronis) maka anak akan kehilangan otonominya dan pada akhirnya anak menarik diri dari hubungan interpersonal.

c. Perlukaan tubuh dan rasa sakit atau nyeri

Kecemasan terhadap luka pada tubuh dan rasa sakit atau nyeri biasanya terjadi pada anak-anak. Konsep tentang citra tubuh (body image), khususnya pengertian mengenai perlindungan tubuh (body boundaries), sedikit sekali berkembang pada usia prasekolah. Menurut nursalam apabila dilakukan pemeriksaan

telinga, mulut atau suhu pada anus akan membuat anak menjadi sangat cemas. Respon anak terhadap tindakan yang tidak menyakitkan sama seperti respon terhadap tindakan yang sangat menyakitkan. Anak akan berespon terhadap nyeri dengan menangis, mengatupkan gigi, menggigit bibir, membuka mata dengan lebar atau melakukan tindakan yang agresif seperti menggigit, menendang, memukul atau berlari ke luar. (Suliswati, 2005)

8. Pengaruh pembacaan doa terhadap kecemasan saat hospitalisasi

Organisasi kesehatan dunia (WHO) telah menetapkan unsur spiritual sebagai salah satu dari empat unsur kesehatan. Keempat unsur itu adalah sehat fisik, psikhis, social dan spiritual (Hawari, 2006). Larson (1992) dalam penelitiannya sebagaimana termuat dalam Religious Commitment and Health menyatakan bahwa komitmen agama amat penting dalam pencegahan agar seseorang tidak mudah jatuh sakit, meningkatkan kemampuan mengatasi penderitaan saat sakit serta mempercepat penyembuhan selain terapi medis yang diberikan.

Berdoa adalah bagian dari terapi spiritual yang merupakan tindakan untuk mengurangi kecemasan. Keyakinan kepada Yang Maha Kuasa bisa ampuh mengobati seperti halnya obat obatan (Pusdiknakes, 1989). Bukti penelitian yang telah dilakukan menyatakan, bahwa aktifitas berdoa/ mendoakan merupakan sumber yang efektif untuk mengatasi stres dan kecemasan yang ditandai dengan fungsi kardiovaskuler yang stabil,

relaksasi otot serta suasana hati yang lebih damai dan tenang (Turner & Clancy, 1986 dalam Potter & Perry, 1997).

Dalam keyakinan agama Islam doa merupakan permohonan dari seorang hamba baik dalam keadaan sehat maupun sakit yang ditujukan kepada Alla SWT sebagai komunikasi untuk menumpahkan perasaan dan keinginannya sehingga memperoleh ketenangan jiwa. Karena doa merupakan daya prefentif sebelum sakit dan menghilangkannya apabila sudah terjadi sakit. Al-Munajjid (2010) dalam bukunya berjudul terapi kecemasan mengatakan bahwa doa itu sangat bermanfaat. Ada yang untuk pencegahan (prefentif) dan yang untuk pengobatan (terapi). Adapun untuk pencegahan adalah seorang muslim hendaknya berlindung kepada Allah dan berdoa menundukan diri kepada-Nya agar Dia melindunginya dan menjauhkannya dari kesedihan dan kecemasan. Ketika kesedihan dan rasa sakit menimpa seseorang, pintu doa selalu terbuka baginya. Bila seseorang mengetuk pintu-Nya dan meminta kepada-Nya maka Dia akan memberi dan mengabulkannya. Dan Dia akan mengubah kesedihan menjadi suka cita dan kegembiraan.

Kekuatan doa sebagai penyembuhan yang disertai keyakinan, kesabaran dan keridhaan menjadi sebab kesembuhan, bahkan doa itu merupakan sebab kesembuhan yang paling kuat (Mahadi & Muadzin, 2009).

Terdapat satu ayat dalam Al Qur`an yang menegaskan, dzikrullah (berdzikir kepada Allah, mengingat Allah) dapat menenteramkan hati. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam QS Ar-ra'ad:28:

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾

Terjemahan:

"(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka menjadi tenteram dengan berdzikir (mengingat) kepada Allah. Ingatlah, hanya dengan berdzikir (mengingat) kepada Allah-lah, hati akan menjadi tenteram".

Berkaitan dengan ayat ini, Imam Ibnu Katsir menjelaskan :
"Maksudnya, hati akan menjadi baik dan menjadi senang ketika menuju ke sisi Allah. Hati menjadi tenang ketika mengingat Allah, dan hati merasa puas ketika merasa bahwa Allah adalah Pelindung dan Penolongnya".

Sementara, Syaikh Abdur Rahman bin Nashir as Sa'di rahimahullah, seorang ulama besar dunia yang hidup antara tahun 1307 H – 1376 H menjelaskan lebih rinci ayat di atas. Beliau mengatakan:
"Nyatalah, hanya dengan berdzikir mengingat Allah (hati menjadi tenteram), dan sewajarnya hati tidak akan tenteram terhadap sesuatupun kecuali dengan mengingat Allah. Sebab, sesungguhnya tidak ada sesuatupun yang lebih lezat dan lebih manis bagi hati dibandingkan rasa cinta, kedekatan serta pengetahuan yang benar kepada Penciptanya. Sesuai dengan kadar pengetahuan serta kecintaan seseorang pada Penciptanya, maka sebesar itu pula kadar dzikir yang akan dilakukannya. Ini berdasarkan pendapat yang mengatakan, bahwa dzikir kepada Allah ialah

dzikirnya seorang hamba ketika menyebut-nyebut Rabb-nya dengan bertasbih, ber-tahlil (membaca Laa ilaaha Illallah), bertakbir dan dzikir-dzikir lainnya.

Namun ada yang berpendapat, yang dimaksudkan dengan dzikrullah (dzikir pada ayat di atas) ialah KitabNya (al Qur`an) yang diturunkan sebagai pengingat bagi kaum Mukminin. Berdasarkan pendapat ini, maka makna 'hati menjadi tenteram dengan dzikrullah' ialah, manakala hati memahami makna-makna al Qur`an serta hukum-hukumnya, hati akan menjadi tenteram. Sesungguhnya makna-makna serta hukum-hukum al Qur`an memberikan bukti tentang kebenaran yang nyata, didukung dengan dalil-dalil dan petunjuk-petunjuk yang jelas. Dengan cara demikianlah hati menjadi tenteram. Sesungguhnya hati tidak akan tenteram, kecuali ketika mendapatkan keyakinan dan ilmu. Itu semua hanya ada dalam Kitab Allah yang tertuang secara sempurna. Adapun kitab-kitab lain selain Kitab Allah yang tidak bisa dijadikan rujukan, maka tidak akan menjadikan hati tenteram. Bahkan kitab-kitab lain itu akan senantiasa menimbulkan kebingungan-kebingungan, karena dalil-dalil serta hukum-hukumnya saling bertentangan".

Dari dua keterangan ulama besar di atas, ketenteraman hati yang hakiki hanya diperoleh ketika seseorang berdzikir kepada Allah secara benar dan memahami makna-makna serta hukum-hukum yang ada dalam al Qur`an secara benar pula. Itulah ketenteraman hati yang sesungguhnya.

B. Tinjauan Umum tentang Kecemasan

1. Pengertian kecemasan

Kecemasan adalah respon psikologik terhadap stress yang mengandung komponen psikologik dan fisiologik. Perasaan takut atau tidak tenang yang sumbernya tidak dikenali (Barbara C Long, 1996).

Kecemasan adalah respon emosional terhadap penilaian yang berkaitan dengan perasaan tidak pasti dan tidak berdaya. Keadaan emosi ini tidak memiliki objek yang spesifik. Kecemasan berbeda dengan rasa takut, yang merupakan penilaian intelektual terhadap sesuatu yang berbahaya (Stuart & Sundeen, 1998).

May mendefinisikan sebagai keprihatinan yang terus menerus yang tidak jelas secara alami dan berhubungan dengan perasaan ketidakpastian dan keputusasaan (Stuart, Gail W; Laraia, Michele T, 1998).

Kecemasan dapat menimbulkan adanya perubahan secara fisik maupun psikologis yang akhirnya sering mengaktifkan syaraf otonom dimana detak jantung menjadi bertambah, tekanan darah naik, frekuensi nafas bertambah dan secara umum mengurangi tingkat energi pada klien, sehingga dapat merugikan individu itu sendiri (Rothrock, 1999).

Berdasarkan konsep psikoneuroimunologi kecemasan merupakan stressor yang dapat menurunkan sistem imunitas tubuh. Hal ini terjadi melalui serangkaian aksi yang diperantarai oleh HPA-axis (Hipotalamus, Pituitari dan Adrenal). Stress akan merangsang hipotalamus untuk

meningkatkan produksi CRF (*Corticotropin Releasing Factor*). CRF ini selanjutnya akan merangsang kelenjar pituitari anterior untuk meningkatkan produksi ACTH (*Adreno Cortico Tropin Hormon*). Hormon ini yang akan merangsang kortek adrenal untuk meningkatkan sekresi kortisol. Kortisol inilah yang selanjutnya akan menekan sistem imun tubuh (Guyton & Hall, 1996).

Kecemasan memberikan stimulasi system saraf otonom untuk bereaksi menyebabkan gejala tertentu misalnya dengan manifestasi peningkatan irama pernafasan (Kaplan, H., 1997).

Perasaan takut atau tidak tenang yang sumbernya tidak jelas akan dapat mengancam kepribadian seseorang baik secara fisik maupun secara psikologis. Reaksi fisiologis dapat berupa palpitasi, keringat dingin pada telapak tangan, tekanan darah meningkat, respirasi meningkat, peristaltik usus meningkat, sedangkan reaksi psikologis dapat berupa gugup, tegang, rasa tidak enak, dan lekas terkejut (Long, 1996). Kecemasan muncul bila ada ancaman ketidak berdayaan, kehilangan kendali, perasaan kehilangan fungsi-fungsi dan harga diri, kegagalan pertahanan, perasaan terisolasi (Hudak dan Galo, 1994)

Islam sangat memperhatikan faktor kejiwaan. Islam mengobati jiwa yang goncang dan kacau. Faktor terpenting untuk mengobati dan mencegah penyakit jiwa ialah keimanan kepada Allah SWT, bertaqwa, dzikir, dan shalat. Jika segi ini benar-benar diamalkan dengan kesungguhan hati maka insya Allah dapat mengatasi dan menyembuhkan

kebanyakan penyakit jiwa. Keimanan kepada Allah SWT, bila dibarengi dengan amal shaleh dapat menyajikan kehidupan yang baik kepada manusia.

Sebagaimana dijelaskan didalam Al-Qur'an surah Yunus ayat:57

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا
فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

Terjemahan:

“Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman”.

Ayat tersebut diatas menjelaskan bahwa memberi petunjuk ajaran agama Islam mempunyai aspek terapeutik bagi gangguan jiwa, sebagaimana telah diungkapkan oleh jam'ah seseorang yang mengalami gangguan jiwa, pengobatannya dengan jalan psiko-terapi yaitu suatu pengobatan kerohanian dengan tanpa obat-obatan yang biasanya dilakukan melalui ajaran agama, seperti muhadjadah, shalat, berdo'a, membaca Al-Quran dan sebagainya.

Dan juga tegaskan bahwa Al-Quran adalah obat bagi apa yang terdapat didalam dada. Al-Quran adalah wahyu Allah yang berfungsi menyembuhkan penyakit-penyakit rohani seperti ragu, dengki, takabur, dan sebagainya.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan

Menurut Barbara C. Long (1996) kecemasan yang terjadi akan direspon secara spesifik dan berbeda oleh setiap individu. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor yaitu:

1. Perkembangan Kepribadian (*Personality Development*)

Perkembangan kepribadian seseorang dimulai sejak usia bayi hingga 18 tahun dan tergantung dari pendidikan orang tua (psiko-educatif) di rumah, pendidikan disekolah dan pengaruh sosialnya serta pengalaman-pengalaman dalam kehidupannya. Seorang menjadi pencemas terutama akibat proses imitasi dan identifikasi dirinya terhadap kedua orang tuanya daripada pengaruh keturunan (genetika). Atau kata lain “ *Parental example* “ daripada “ *Parental genes*”

2. Maturasional

Tingkat maturasi individu akan mempengaruhi tingkat kecemasan. Pada bayi kecemasan lebih disebabkan oleh perpisahan, lingkungan atau orang yang tidak kenal dan perubahan hubungan dalam kelompok sebaya. Kecemasan pada remaja lebih banyak disebabkan oleh perkembangan seksual. Pada dewasa kecemasan berhubungan dengan ancaman konsep diri, sedangkan pada lansia kecemasan berhubungan dengan kehilangan fungsi.

3. Tingkat pengetahuan

Individu yang tingkat pengetahuannya lebih tinggi akan mempunyai coping yang lebih adaptif terhadap kecemasan daripada individu yang tingkat pengetahuannya lebih rendah.

4. Karakteristik stimulus

Karakteristik stimulus terdiri dari :

4.1 Intensitas Stressor

Intensitas stimulus yang semakin besar maka semakin besar pula kemungkinan respon yang nyata akan terjadi. Stimulus hebat akan menimbulkan lebih banyak respon yang nyata daripada stimulus yang timbul secara perlahan – lahan. Stimulus yang timbulnya perlahan-lahan selalu memberi waktu bagi seseorang untuk mengembangkan coping.

4.2 Lama Stressor

Stressor yang menetap dapat menghabiskan energi seseorang dan akhirnya akan melemahkan sumber-sumber coping yang ada.

4.3 Jumlah Stressor

Stressor yang ada akan lebih meningkatkan kecemasan pada individu daripada stimulus yang lebih kecil.

5. Karakteristik individu

Karakteristik individu terdiri dari :

5.1 Makna stressor bagi individu

Makan stressor bagi individu merupakan satu faktor utama yang mempengaruhi respon stres. Stressor yang dipandang secara negatif mempunyai kemungkinan besar untuk meningkatkan cemas.

5.2 Sumber yang dapat dimanfaatkan dan respon koping

Seseorang yang telah mempunyai ketrampilan dalam menggunakan koping dapat memilih tindakan-tindakan yang akan memudahkan adaptasi terhadap stressor baru. Seseorang yang telah berhasil menangani stressor-stressor di masa lampau akan mempunyai ketrampilan koping yang lebih baik dan dapat menangani secara efektif bila krisis terjadi.

5.3 Status kesehatan individu

Jika status kesehatan buruk, energi yang digunakan untuk menangani stimulus lingkungan kurang, akan dapat mempengaruhi respon terhadap stressor. Khususnya nutrisi yang kurang akan menjadikan seseorang mempunyai resiko yang lebih tinggi untuk berespon secara maladaptif.

3. Faktor predisposisi kecemasan

Berbagai teori telah dikembangkan untuk menjelaskan asal ansietas:

3.1 Dalam pandangan psikoanalitik ansietas adalah konflik emosional yang terjadi antara dua elemen kepribadian id dan superego. Id mewakili dorongan insting dan impuls primitif seseorang, sedangkan superego mencerminkan hati nurani seseorang dan dikendalikan oleh norma-norma budaya seseorang. Ego atau Aku berfungsi mengentasi tuntutan dari dua elemen yang bertentangan, dan fungsi ansietas adalah mengingatkan ego bahwa ada bahaya.

3.2 Menurut pandangan interpersonal ansietas timbul dari perasaan takut terhadap tidak adanya penerimaan dan penolakan interpersonal. Ansietas juga berhubungan dengan perkembangan trauma, seperti perpisahan dan kehilangan, yang menimbulkan kelemahan spesifik. Orang dengan harga diri rendah terutama mudah mengalami perkembangan ansietas yang berat.

3.3 Menurut pandangan perilaku ansietas merupakan produk frustrasi yaitu segala sesuatu yang mengganggu kemampuan seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pakar perilaku lain menganggap ansietas sebagai suatu dorongan untuk belajar berdasarkan keinginan dari dalam untuk menghindari kepedihan pakar tentang pembelajaran meyakini bahwa individu yang terbiasa dalam kehidupan dirinya dihadapkan pada ketakutan yang berlebihan lebih sering menunjukkan ansietas pada kehidupan selanjutnya.

3.4 Kajian keluarga menunjukkan bahwa gangguan ansietas merupakan hal yang biasa ditemui dalam suatu keluarga. Ada tumpang tindih dalam gangguan ansietas dan antara gangguan ansietas dengan depresi.

3.5 Kajian biologis menunjukkan bahwa otak mengandung reseptor khusus untuk benzodiazepines. Reseptor ini mungkin membantu mengatur ansietas. Penghambat asam aminobutirik-gamma neroregulator (GABA) juga mungkin memainkan peran utama dalam mekanisme biologis berhubungan dengan ansietas, sebagaimana halnya dengan endorfin. Selain itu, telah dibuktikan bahwa kesehatan umum seseorang mempunyai akibat nyata sebagai predisposisi terhadap ansietas. Ansietas mungkin disertai dengan gangguan fisik dan selanjutnya menurunkan kapasitas seseorang untuk mengatasi stressor (Stuart & Sundeen, 1998).

4. Tingkat kecemasan

Stuart & Sundeen (1998) mengidentifikasi tingkatan kecemasan dapat dibagi menjadi :

4.1 Kecemasan ringan

Pada tingkat ini kecemasan yang terjadi pada kehidupan sehari-hari dan kondisi membantu individu menjadi waspada dan bagaimana mencegah berbagai kemungkinan.

4.2 Kecemasan sedang

Pada tingkat ini individu lebih memfokuskan hal penting saat ini dan mengesampingkan yang lain sehingga mempersempit lahan persepsinya.

4.3 Kecemasan berat

Pada tingkat ini lahan persepsi individu sangat menurun dan cenderung memusatkan perhatian pada hal-hal lain, semua perilaku ditujukan untuk mengurangi kecemasan, individu tersebut mencoba memusatkan perhatian pada lahan lain dan memerlukan banyak pengarahan.

4.4 Panik

Keadaan ini mengancam pengendalian diri, individu tidak mampu untuk melakukan sesuatu walaupun dengan pengarahan. Panik melibatkan disorganisasi keperibadian yang ditandai dengan meningkatnya kegiatan motorik, menurunnya respon untuk berhubungan dengan orang lain, *distorsi* persepsi dan kehilangan pikiran yang rasional. Tingkah laku panik ini tidak mendukung kehidupan individu tersebut.

5. Respon Tubuh Terhadap Kecemasan

Stuart & Sundeen (1998) memberikan suatu penilaian respon fisiologis dan respons perilaku, kognitif dan afektif terhadap kecemasan meliputi:

1. Respon tubuh fisiologis

Tabel 2.1 Respon tubuh fisiologis terhadap kecemasan

Sistem Tubuh	Respons
<i>Kardiovaskular</i>	<i>Palpitasi</i> , jantung berdebar, tekanan darah meninggi, rasa mau pingsan, pingsan, tekanan darah menurun, denyut nadi menurun.
<i>Pernafasan</i>	Nafas cepat, nafas pendek, tekanan pada dada, nafas dangkal, pembengkakan pada tenggorokan, sensasi tercekat, terengah-engah.
<i>Neuromuskular</i>	Refleks meningkat, reaksi lanjutan, mata berkedip-kedip, insomnia, tumor, <i>rigiditas</i> , gelisah, wajah tegang, kelemahan umum, kaki goyah, gerakan yang penggal.
<i>Gastro Intestinal</i>	Kehilangan nafsu makan, menolak makanan, rasa tidak nyaman pada abdomen, mual, rasa terbakar pada jantung, diare.
<i>Traktus Urinarius</i>	Tidak dapat menahan kencing, sering berkemih.
<i>Kulit</i>	Wajah memerah, berkeringat setempat (telapak tangan), gatal, rasa panas dan dingin pada kulit, wajah pucat, berkeringat seluruh tubuh.

2. Respon perilaku, *kognitif* dan *afektif* terhadap kecemasan.

Tabel 2.2 Respon perilaku, *kognitif* dan *afektif* terhadap kecemasan.

Sistem Tubuh	Respons
Perilaku	Gelisah, ketegangan fisik, tumor, gugup, bicara cepat, kurang koordinasi, cenderung mendapat cedera, menarik diri dari hubungan interpersonal, menghalangi, menarik diri dari masalah, menghindar.
<i>Kognitif</i>	Perhatian terganggu, konsentrasi buruk, pelupa, salah dalam memberikan penilaian, <i>preokupasi</i> dan hambatan berfikir, bidang persepsi menurun, beraktivitas menurun, produktivitas menurun, bingung, sangat waspada, kesadaran diri meningkat, kehilangan objektivitas, takut kehilangan kontrol, takut pada gambaran <i>visual</i> , takut cedera atau kematian.
<i>Afektif</i>	Mudah terganggu, tidak sabar, gelisah, tegang, nervous, ketakutan, alarm, terror, gugup.

6. Penatalaksanaan kecemasan

a. Penatalaksanaan Farmakologi

Pengobatan untuk anti kecemasan terutama benzodiazepine, obat ini digunakan untuk jangka pendek, dan tidak dianjurkan untuk jangka panjang karena pengobatan ini menyebabkan toleransi dan ketergantungan. Obat anti kecemasan nonbenzodiazepine, seperti buspiron (Buspar) dan berbagai antidepresan juga digunakan (Isaacs, 2005).

b. Penatalaksanaan non farmakologi

1). Distraksi

Distraksi merupakan metode untuk menghilangkan kecemasan dengan cara mengalihkan perhatian pada hal-hal lain sehingga pasien akan lupa terhadap cemas yang dialami. Stimulus sensori yang menyenangkan menyebabkan pelepasan endorfin yang bisa menghambat stimulus cemas yang mengakibatkan lebih sedikit stimuli cemas yang ditransmisikan ke otak (Potter & Perry, 2005).

Salah satu distraksi yang efektif adalah dengan memberikan dukungan spiritual (membacakan doa sesuai agama dan keyakinannya), sehingga dapat menurunkan hormon-hormon stressor, mengaktifkan hormon endorfin alami, meningkatkan perasaan rileks, dan mengalihkan perhatian dari rasa takut, cemas dan tegang, memperbaiki sistem kimia tubuh sehingga menurunkan tekanan darah serta memperlambat pernafasan, detak jantung, denyut nadi, dan aktivitas gelombang otak. Laju pernafasan yang lebih dalam atau lebih lambat tersebut sangat baik menimbulkan ketenangan, kendali emosi, pemikiran yang lebih dalam dan metabolisme yang lebih baik.

2). Relaksasi

Terapi relaksasi yang dilakukan dapat berupa relaksasi, meditasi, relaksasi imajinasi dan visualisasi serta relaksasi progresif (Isaacs, 2005)

Kecemasan dapat diekspresikan secara langsung melalui perubahan fisiologis dan perilaku dan secara tidak langsung melalui timbulnya gejala atau mekanisme koping untuk melawan kecemasan. Intensitas perilaku akan meningkat sejalan dengan peningkatan tingkat kecemasan.

Menurut Ader & Cohen (1991) gejala kecemasan antara lain didapati adanya sifat-sifat yang kompulsif dari pasien neurosa cemas. Gerakan yang tidak normal seperti tarikan bila pasien tidur pergerakan-pergerakan mendadak dari mata serta twicting dari otot mata dan mulut. Tingkah laku canggung, berat badan turun, otot tegang, tidak mampu rileks dan kalau payah, kepayahan itu tidak bisa hilang dengan istirahat.

Menurut Hawari (2001) instrumen lain yang dapat digunakan untuk mengukur skala kecemasan adalah *Hamilton Anxiety Rating Scale* (HARS) yaitu mengukur aspek kognitif dan afektif yang meliputi:

- (1) Perasaan cemas, ditandai dengan : cemas, firasat buruk, takut akan pikiran sendiri, mudah tersinggung,
- (2) Ketegangan yang ditandai oleh : merasa tegang, lesu, tidak dapat istirahat tenang, mudah terkejut, mudah menangis, gemetar, gelisah, mudah terkejut,

- (3) Ketakutan ditandai oleh: ketakutan pada gelap, ketakutan ditinggal sendiri, ketakutan pada orang asing, ketakutan pada binatang besar, ketakutan pada keramaian lalu lintas, ketakutan pada kerumunan orang banyak,
- (4) Gangguan tidur ditandai oleh: sukar masuk tidur, terbangun malam hari, tidur tidak nyenyak, bangun dengan lesu, mimpi buruk, mimpi yang menakutkan,
- (5) Gangguan kecerdasan ditandai oleh: sukar konsentrasi, daya ingat buruk, daya ingat menurun,
- (6) Perasaan depresi ditandai oleh: kehilangan minat, sedih, bangun dini hari, kurangnya kesenangan pada hobi, perasaan berubah sepanjang hari,
- (7) Gejala somatik ditandai oleh: nyeri pada otot, kaku, kedutan otot, gigi gemeretak, suara tidak stabil,
- (8) Gejala Sensorik ditandai oleh: tinitus, penglihatan kabur, muka merah dan pucat, merasa lemah, perasaan ditusuk-tusuk,
- (9) Gejala Kardiovaskuler ditandai oleh: takikardia, berdebar-debar, nyeri dada, denyut nadi mengeras, rasa lemas seperti mau pingsan, detak jantung hilang sekejap,
- (10) Gejala pernafasan ditandai oleh: rasa tertekan atau sempit di dada, perasaan tercekik, merasa nafas pendek/ sesak, sering menarik nafas panjang,

(11) Gejala Gastrointestinal ditandai oleh: Sulit menelan, mual, perut melilit, gangguan pencernaan, nyeri lambung sebelum atau sesudah makan, rasa panas di perut, perut terasa kembung atau penuh, muntah, defekasi lembek, berat badan menurun, konstipasi (sukar buang air besar),

(12) Gejala Urogenital ditandai oleh: sering kencing, tidak dapat menahan kencing, amenorrhoe, menorrhagia, masa haid berkepanjangan, masa haid amat pendek, haid beberapa kali dalam sebulan, frigiditas, ejakulasi prekok, ereksi melemah, ereksi hilang, impoten,

(13) Gejala Otonom ditandai oleh: mulut kering, muka merah kering, mudah berkeringat, pusing, sakit kepala, kepala terasa berat, bulu-bulu berdiri,

(14) Perilaku sewaktu wawancara, ditandai oleh: gelisah, tidak tenang, jari gemetar, mengerutkan dahi atau kening, muka tegang, tonus otot meningkat, nafas pendek dan cepat, muka merah.

BAB III


KERANGKA KERJA PENELITIAN

A. Kerangka Konsep


Proses hospitalisasi atau masuk rumah sakit merupakan hal yang sering dialami oleh seseorang dan ini dapat menyebabkan timbulnya kecemasan bagi klien terutama anak usia pra sekolah. Hospitalisasi anak dapat menjadi suatu pengalaman yang menimbulkan trauma pada anak sehingga menimbulkan reaksi tertentu yang akan berdampak pada kerja sama anak selama proses perawatan anak di rumah sakit. Perasaan cemas merupakan dampak dari hospitalisasi yang dialami oleh anak karena menghadapi stressor yang ada dilingkungan rumah sakit. Pada umumnya reaksi anak terhadap hospitalisasi adalah kecemasan karena perpisahan, kehilangan kendali, trauma fisik dan nyeri. Dan untuk menjelaskan dasar pemikiran penulis dalam membuat penelitian ini, maka dapat digambarkan sebagai berikut :

Variabel Independen

Variabel Dependen



Keterangan:

: Variabel Independen yang diteliti

: Variabel Independen yang tidak diteliti

B. Variabel Penelitian

a. Klasifikasi Variabel Penelitian

1. Variabel Independen : perpisahan, kehilangan kendali, Trauma Fisik & Nyeri, ancaman penyakit yang serius, dan pengobatan.
2. Variabel Dependen: kecemasan anak usia pra sekolah.

C. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif

1. Perpisahan adalah reaksi klien setelah masuk rumah sakit dan dirawat, dengan menolak makan, menangis dan merengek dengan suara kencang dan tidak kooperatif terhadap petugas kesehatan.

Kriteria Objektif:

Ada : Bila responden memperoleh nilai $\geq 62,5\%$ pada kuesioner

Tidak ada : Bila responden memperoleh nilai $< 62,5\%$ pada kuesioner

2. Kehilangan kendali adalah reaksi klien setelah masuk dan dirawat di rumah sakit, klien merasa kehilangan kekuatan diri karenan adanya pembatasan aktivitas di lingkungan ruang perawatan rumah sakit.

Kriteria Objektif :

Kehilangan kendali : Bila responden memperoleh nilai $\geq 62,5\%$ pada kuesioner.

Tidak kehilangan kendali : Bila responden memperoleh nilai $< 62,5\%$ pada kuesioner.

3. Trauma Fisik dan Nyeri adalah reaksi klien setelah masuk dan dirawat di rumah sakit, bahwa tindakan dan prosedur yang dilakukan oleh dokter/atau perawat menimbulkan rasa ketakutan sehingga menimbulkan reaksi agresif pada anak dengan marah dan berontak.

Kriteria Objektif

Ada : Bila responden memperoleh nilai $\geq 62,5\%$ pada kuesioner.

Tidak ada : Bila responden memperoleh nilai $< 62,5\%$ pada kuesioner.

4. Kecemasan adalah ungkapan serta reaksi klien bahwa klien merasa cemas karena takut atas tindakan pengobatan dan lingkungan yg asing selama proses pengobatan di rawat di rumah sakit.

BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *metode deskriptif*. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang di dalamnya tidak ada analisis hubungan antar variabel, tidak ada variabel bebas dan terikat, bersifat umum yang membutuhkan jawaban di mana, kapan, berapa banyak, dan analisis statistik yang digunakan adalah deskriptif. Pendekatan yang digunakan pada desain penelitian ini adalah *Cross Sectional study* di mana data yang dikumpulkan pada satu waktu tertentu. (Aziz, 2008)

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran reaksi hospitalisasi terhadap kecemasan anak usia pra sekolah di ruang Ar Rahim RSUD Haji Makassar.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pasien di Ruang Ar Rahim RSUD Haji Makassar. Setelah dihitung rata-rata populasi anak usia pra sekolah setiap bulan dari bulan Mei sampai Juli 2012 didapatkan hasil 40 pasien

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini yaitu anak usia pra sekolah. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 30 responden sesuai dengan jumlah minimal sampel yang diperbolehkan menurut Nursalam (2003).

C. Tehnik Sampling

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *Purposive sampling*, yaitu suatu teknik penetapan sampel dengan cara memilih sampel diantara populasi sesuai dengan yang dikehendaki peneliti (tujuan/masalah dalam penelitian) (Nursalam, 2003).

Kriteria dalam penelitian ini adalah:

- a. Kriteria inklusi:
 - 1) Bersedia menjadi responden
 - 2) Anak yang berusia 2-5 tahun yang sedang menjalani perawatan minimal 1x 24 jam dan maksimal 3x 24 jam
 - 3) Orang tua klien yang dapat membaca dan menulis
- b. Kriteria eksklusi:
 - 1) Anak yang menderita retardasi mental
 - 2) Tidak bersedia menjadi responden
 - 3) Anak yang menderita penyakit kronis dan terminal

D. Pengumpulan Data

1. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang merupakan alat ukur untuk hospitalisasi dan tingkat kecemasan yang berisi beberapa pertanyaan.

Jenis kuisisioner yang digunakan adalah kuesioner untuk kategori perpisahan yang terdiri atas 4 pertanyaan. Penilaian dilakukan dengan skala likert dengan nilai:

4 = Selalu

3 = Kadang-Kadang

2 = Pernah

1 = Tidak Pernah

$$\begin{aligned}\text{Skor tertinggi (x)} &= 4 \times 4 \\ &= 16 (100 \%)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Skor terendah (y)} &= 4 \times 1 \\ &= 4 (25 \%)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Range (R)} &= x - y \\ &= 100 \% - 25 \% \\ &= 75 \%\end{aligned}$$

$$K = 2$$

$$\begin{aligned}\text{Interval} &= R / K \\ &= 75 \% / 2\end{aligned}$$

$$= 37,5 \%$$

$$\text{Skor standard} = 100 \% - 37,5 \%$$

$$= 62,5 \%$$

Kategori kehilangan kendali diukur dengan menggunakan kuesioner yang berisi 5 pertanyaan menggunakan skala Likert dengan nilai:

4 = Selalu

3 = Kadang-Kadang

2 = Pernah

1 = Tidak Pernah

$$\text{Skor tertinggi (x)} = 4 \times 4$$

$$= 16 (100 \%)$$

$$\text{Skor terendah (y)} = 4 \times 1$$

$$= 4 (25 \%)$$

$$\text{Range (R)} = x - y$$

$$= 100 \% - 25 \%$$

$$= 75 \%$$

$$K = 2$$

$$\text{Interval} = R / K$$

$$= 75 \% / 2$$

$$= 37,5 \%$$

$$\text{Skor standard} = 100 \% - 37,5 \%$$

$$= 62,5 \%$$

Kategori perlukaan dan rasa nyeri diukur dengan menggunakan kuesioner yang berisi 4 pertanyaan menggunakan skala Likert dengan nilai:

4 = Selalu

3 = Kadang-Kadang

2 = Pernah

1 = Tidak Pernah

$$\begin{aligned}\text{Skor tertinggi (x)} &= 4 \times 4 \\ &= 16 (100 \%)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Skor terendah (y)} &= 4 \times 1 \\ &= 4 (25 \%)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Range (R)} &= x - y \\ &= 100 \% - 25 \% \\ &= 75 \%\end{aligned}$$

$$K = 2$$

$$\begin{aligned}\text{Interval} &= R / K \\ &= 75 \% / 2 \\ &= 37,5 \%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Skor standard} &= 100 \% - 37,5 \% \\ &= 62,5 \%\end{aligned}$$

Pada saat pengumpulan data, peneliti mendampingi responden dalam pengisian kuisisioner sehingga apabila responden kurang jelas dengan maksud pertanyaan, bisa langsung bertanya pada peneliti.

2. Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diambil secara langsung dari objek yang akan diteliti dengan menggunakan kuesioner yang berisikan tentang identitas responden dan daftar pertanyaan. Data dikumpulkan dengan prosedur sebagai berikut:

- 1) Peneliti mengajukan permohonan izin penelitian dari institusi yaitu Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ke Gubernurnuran khususnya pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Linmas untuk ditujukan kepada Pimpinan RSUD Haji Makassar agar bersedia dan memberikan izin menjadi lokasi/ tempat diadakan penelitian.
- 2) Setelah mendapat izin dari instansi tersebut, maka peneliti mengadakan pendekatan dengan calon responden, kemudian memberikan penjelasan tentang penelitian ini. Dan jika calon responden setuju menjadi responden, maka peneliti akan mempersilakan menandatangani lembar persetujuan responden.

3) Setelah responden menandatangani lembar persetujuan, maka lembaran kuesioner dibagikan kepada responden kemudian dipersilakan untuk menjawab pada waktu itu juga

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari ruang Ar Rahim RSUD Haji Makassar mengenai jumlah kunjungan pasien anak usia pra sekolah selama 3 bulan terakhir

E. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Adapun prosedur pengolahan data yang dilakukan melalui tahap sebagai berikut:

1. Editing

Setelah lembar kuesioner dan observasi diisi kemudian dikumpulkan dalam bentuk data, maka data tersebut diedit atau dicek kembali atau dikoreksi kembali dengan maksud memeriksa kelengkapan data, melengkapi data yang mungkin masih kurang atau ada data yang tidak lengkap.

2. Koding

Dilakukan koding atau pemberian kode pada opsi-opsi yang sudah lengkap dengan maksud agar data-data tersebut mudah diolah

atau dianalisis yaitu dengan cara semua jawaban atau data disederhanakan dengan memberikan symbol-simbol dalam bentuk angka maupun alphabet pada nomor daftar pernyataan, nomor variabel.

3. Tabulasi

Data ditabulasi atau dikelompokkan ke dalam suatu table kerja menurut sifat-sifat yang dimiliki dengan menggunakan skala *Likert*, kemudian dilanjutkan dengan analisa data secara statistic melalui perhitungan persentase dan hasil perhitungan dijumlah.

b. Analisa Data

Setelah dilakukan tabulasi data, data tersebut kemudian diolah dengan menggunakan metode uji statistik.

a. Analisis Univariat

Analisis univariat dilakukan terhadap setiap variabel dari hasil penelitian. Analisis ini akan menghasilkan distribusi dan persentase dari tiap variabel yang diteliti. Pengelolaan data dalam penelitian ini menggunakan metode statistik program SPSS versi 17.

F. Jadwal Penelitian

Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Ruang Ar Rahim RSUD Haji Makassar

b. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan januari – maret 2013.

G. Etika Penelitian

Dalam melakukan penelitian, peneliti perlu mendapat rekomendasi dari institusi dengan mengajukan permohonan izin kepada instansi atau lembaga tempat penelitian. Setelah mendapat persetujuan, maka kegiatan penelitian ini dimulai dengan menekankan masalah etika yang meliputi:

1. Lembar persetujuan (*Informed Consent*)

Peneliti memberikan lembar persetujuan kepada responden yang akan diteliti agar responden dapat mengerti maksud dan tujuan dalam penelitian ini. Bila responden menolak, maka peneliti tidak akan memaksa dan tetap menghormati hak-hak responden.

2. Tanpa nama (*Anonymity*)

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti akan menjaga kerahasiaan identitas responden dan hak-hak dari responden. Untuk menjaga kerahasiaan peneliti tidak akan mencantumkan nama responden, tetapi lembar tersebut diberikan kode.

3. Kerahasiaan (*Confidentiality*)

Kerahasiaan informasi responden dijamin oleh peneliti dan hanya kelompok data tertentu yang akan dilaporkan sebagai hasil penelitian.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Ruang Ar Rahim RSUD Haji Makassar yang terletak di jln. Dg. Ngeppe No. 14 yang dilaksanakan pada tanggal 25 february sampai dengan 25 maret 2013, yang bertujuan untuk mengetahui gambaran reaksi hospitalisasi terhadap kecemasan anak usia pra sekolah. Subjek dalam penelitian ini adalah anak usia pra sekolah dengan teknik pengambilan sampel secara *Proposive Sampling* yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Besar sampel yang di teliti sebanyak 30 responden yang semuanya telah memenuhi kriteria yang telah di tentukan. Data dari responden di peroleh melalui kuesioner. Untuk mengidentifikasi kecemasan anak usia pra sekolah melalui daftar pertanyaan berupa kuesioner dan lembar observasi.

Data hasil penelitian ini diolah dengan menggunakan program analisis statistik dan selanjutnya hasil penelitian ini secara lengkap disajikan secara sistematis dalam bentuk tabel data disertai narasi.

1. Karakteristik Responden

a. Berdasarkan kelompok Umur

Tabel 5.1
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kelompok Umur
Di RSUD Haji Makassar

Kelompok Umur (Tahun)	Frekuensi (f)	Persentase (%)
3 Tahun	8	26,7
4 Tahun	8	26,7
5 Tahun	7	23,3
6 Tahun	7	23,3
Total	30	100.0

Sumber: Data primer, Maret Tahun 2013

Pada tabel 5.1 menunjukkan bahwa dari 30 responden, berumur 3 tahun sebanyak 8 responden atau (26,7 %), berumur 4 tahun sebanyak 8 responden atau (26,7%), berumur 5 tahun sebanyak 7 responden atau (23.3%), berumur 6 tahun sebanyak 7 responden atau (23,3%)

b. Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 5.2
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Di RSUD Haji Makassar

Jenis Kelamin	Frekuensi (f)	Persentase %
Laki-laki	12	40,0
Perempuan	18	60,0
Total	30	100.0

Sumber: Data primer, Maret Tahun 2013.

Pada tabel 5.2 menunjukkan bahwa dari 30 responden diperoleh sebagian besar responden yang berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 18 responden atau (60,0%) responden, sedangkan yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 12 responden atau (40,0%).

c. Berdasarkan Lama Rawat Inap

Tabel 5.3
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Lama Rawat Inap
Di RSUD Haji Makassar

Lama Rawat	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1 Hari	6	20.0
2 Hari	7	23.3
3 Hari	11	36.7
4 Hari	6	20.0
Total	30	100 %

Sumber: Data primer, Maret Tahun 2013.

Pada tabel 5.3 menunjukkan bahwa dari 30 responden diperoleh sebagian besar responden yang di rawat inap selama 4 hari sebanyak 6 responden atau (20,0%), Rawat Inap 3 hari sebanyak 11 responden atau (36,7%), Rawat Inap 2 Hari sebanyak 7 responden atau (23,3%), dan Rawat Inap 1 Hari sebanyak 6 responden atau (20,0%).

1. Analisa Univariat

Analisa univariat dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat distribusi frekuensi dari karakteristik subjek penelitian yaitu perpisahan, kehilangan kendali, trauma fisik dan nyeri. Adapun hasil analisis univariat tersebut dapat dilihat pada tabel :

a. Jumlah Responden Berdasarkan Perpisahan

Tabel 5.4
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Perpisahan
Di RSUD Haji Makassar

Perpisahan	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Tidak Ada	2	6.7
Ada	28	93.3
Total	30	100.0

Sumber: Data primer, maret Tahun 2013.

Pada tabel 5.4 menunjukkan bahwa dari 30 responden diperoleh sebanyak 2 responden atau (6.7%) tidak ada perpisahan, sedangkan responden dengan ada perpisahan sebanyak 28 responden atau (93.3%).

b. Jumlah Responden Berdasarkan Kehilangan Kendali (*Loss of Control*)

Tabel 5.5
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kehilangan Kendali
Di RSUD Haji Makassar

Kehilangan Kendali	Frekuensi (f)	Persentase (%)
T.Kehilangan kendali	3	10.0
Kehilangan Kendali	27	90.0
Total	30	100.0

Sumber: Data primer, maret Tahun 2013.

Pada tabel 5.5 menunjukkan bahwa dari 30 responden diperoleh 3 responden dengan tidak mengalami kehilangan kendali atau (10.0%) sedangkan responden yang mengalami kehilangan kendali sebanyak 27 responden atau(90.0%).

c. Jumlah Responden Berdasarkan Trauma Fisik dan Nyeri

Tabel 5.6
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Trauma Fisik dan Nyeri
Di RSUD Haji Makassar

Trauma Fisik & Nyeri	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Tidak Ada	1	3.3
Ada	29	96.7
Total	30	100.0

Sumber: Data primer, maret Tahun 2013.

Pada tabel 5.6 menunjukkan bahwa dari 30 responden diperoleh 1 responden dengan tidak mengalami trauma fisik dan nyeri atau (3.3%) sedangkan responden yang mengalami trauma fisik dan nyeri sebanyak 29 responden atau(96.7%).

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian dengan membandingkan teori yang ada , maka dikemukakan bahwa:

1. Gambaran Reaksi Perpisahan terhadap Kecemasan Anak Usia Pra Sekolah Di Ruang Ar Rahim RSUD Haji Makassar.

Data dari hasil penelitian yang dilakukan di Ruang Ar Rahim RSUD Haji Makassar 2013 menunjukkan bahwa dari 30 responden yang dinyatakan mengalami perpisahan, 28 responden atau 93,3% diantaranya itu mengalami kecemasan. Sedangkan 2 responden atau 6,7 % tidak mengalami kecemasan.

Berdasarkan dengan penelitian yang di lakukan oleh hockenberry & Wilson (2009), bahwa stres karena penyakit biasanya membuat anak pra sekolah menjadi kurang mampu menghadapi perpisahan, akibatnya anak banyak menunjukkan perilaku cemas meskipun lebih samar dari pada anak usia toddler. Hal ini membuat anak usia pra sekolah memperlihatkan kecemasan akibat perpisahan melalui penolakan makan, sulit untuk tidur, bertanya terus menerus tentang keberadaan orang tuanya atau menarik diri dari orang lain.

Hal tersebut sesuai dengan teori Mendez et al (2008) yang mengatakan bahwa kecemasan pada anak yang terjadi akibat perpisahan dengan orang tua atau orang yang menyayangi merupakan sebuah mekanisme pertahanan dan karakteristik normal dalam perkembangan anak. Pada usia ini perkembangan psikososial yang terjadi adalah adanya rasa otonomi yang mempengaruhi perkembangan rasa percaya diri dan harga diri.

Hubungan dengan orang lain bersifat egosentris, sehingga perpisahan merupakan penyebab terjadinya cemas pada anak yang dirawat, sebab pada masa ini anak mempunyai sifat ketergantungan yang besar terhadap orang tua.

Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa bagi anak usia prasekolah, sakit adalah sesuatu yang menakutkan karena mendapatkan lingkungan baru yang asing baginya, Selain itu, perawatan di rumah sakit dapat menimbulkan cemas karena anak merasa kehilangan lingkungan yang dirasakannya aman, penuh kasih sayang, dan menyenangkan. Anak juga harus meninggalkan lingkungan rumah yang dikenalnya, permainan, dan teman sepermainannya. Beberapa hal tersebut membuat anak menjadi stres atau tertekan, Sebagai akibatnya, anak merasa gugup dan tidak tenang, bahkan pada saat menjelang tidur.

Asumsi peneliti bahwa, Salah satu tindakan yang dapat dilakukan untuk meminimalkan efek dari hospitalisasi pada anak yang mengalami perpisahan adalah dengan cara melibatkan keluarga dalam perawatan anak selama dirumah sakit. Peran perawat dalam memberikan asuhan keperawatan pada anak hendaknya menyadari pentingnya keberadaan keluarga untuk terlibat secara aktif dan bekerja sama dengan petugas kesehatan. Keterlibatan keluarga khususnya orang tua dalam perawatan sangatlah penting. Dalam asuhan keperawatan anak, keluarga dapat memiliki peran untuk merawat fisik anak, mendidik anak, dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan psikologis dan emosional.

2. Gambaran Reaksi Kehilangan Kendali terhadap Kecemasan Anak Usia Pra Sekolah di Ruang Ar Rahim RSUD Haji Makassar.

Data dari hasil penelitian yang dilakukan di Ruang Ar Rahim RSUD Haji Makassar 2013 menunjukkan bahwa dari 30 responden yang dinyatakan mengalami kehilangan kendali, 27 responden atau 90,0% diantaranya itu mengalami kecemasan. Sedangkan 3 responden atau 6,7 % tidak mengalami kecemasan.

Sebagaimana dalam penelitian yang di lakukan oleh Bowdeen & Greenberg (2008) kehilangan kontrol akibat adanya pembatasan fisik pada anak, menyebabkan perasaan tidak berdaya pada anak sehingga akan memperdalam kecemasannya.

Hal tersebut didukung oleh teori Hockenberry & Wilson (2009) yang mengatakan bahwa Pada anak usia prasekolah, kehilangan kendali disebabkan oleh pembatasan aktifitas fisik, perubahan rutinitas dan adanya ketergantungan. Egosentris dan pemikiran magis menyebabkan mereka tidak mampu mengerti tentang hal-hal yang terjadi secara rasional, karena mereka menterjemahkan menurut pandangan sendiri. Salah satu khayalan khas untuk menjelaskan alasan sakit atau hospitalisasi adalah menganggap proses penyakit dan hospitalisasi merupakan hukuman sehingga anak merasa takut, bersalah dan malu.

Kehilangan kendali akan meningkatkan persepsi terhadap ancaman dan dapat mempengaruhi kemampuan coping dari anak. Walaupun stimulasi sensori yang biasa berkurang, stimulasi tambahan dari rumah sakit, seperti :

sinar, bunyi-bunyian dan bau-bauan yang berlebihan mungkin akan meningkatkan kehilangan kendali pada anak yang dirawat.

Dalam sebuah penelitian Kedokteran Islam Amerika Utara 1984, Al-Qur'an mampu mendatangkan ketenangan dan meminimalkan kecemasan sampai 97% bagi mereka yang mendengarkannya (Fillah Azzam A, 2008).

Dengan hanya mendengar lantunan Juz Amma saja sudah mampu untuk memberi ketenangan karena kita akan merasa bahwa kita selalu dilindungi Allah SWT (Rohim, 2008).

Asumsi peneliti bahwa, kehilangan kendali akibat adanya perawatan di rumah sakit mengharuskan adanya pembatasan terhadap pergerakannya, anak akan kehilangan kemampuannya untuk mengontrol diri dan anak menjadi tergantung pada lingkungannya. Hal itu menyebabkan anak semakin menunjukkan kecemasan dengan prosedur yang dilakukan terhadap dirinya. Masalah tersebut akan berpengaruh pada pelayanan keperawatan yang akan diberikan, karena cenderung tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan di rumah sakit. Hal ini tentu saja akan menyebabkan terganggunya interaksi baik dari perawat maupun tim medis lain di rumah sakit.

3. Gambaran Reaksi Trauma Fisik & Nyeri terhadap Kecemasan Anak Usia Pra Sekolah di Ruang Ar Rahim RSUD Haji Makassar.

Data dari hasil penelitian yang dilakukan di Ruang Ar Rahim RSUD Haji Makassar 2013 menunjukkan bahwa dari 30 responden yang dinyatakan mengalami perpisahan, 29 responden atau 96,7% diantaranya itu mengalami kecemasan. Sedangkan 1 responden atau 3,3 % tidak mengalami kecemasan.

Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Murriss dan Broeren (2009) yang menjelaskan bahwa pada anak yang masih berusia pra sekolah, rasa cemas terhadap sesuatu yang tidak di ketahui (*anxiety of unknown*) lebih tinggi intensitasnya di banding dengan anak usianya yang lebih besar. Kecemasan terhadap sesuatu yang tidak di ketahui berkaitan dengan hospitalisasi dapat di akibatkan oleh tindakan medis atau keperawatan, petugas kesehatan, dan adanya rasa nyeri akibat perlukaan.

Pendapat tersebut juga di perkuat oleh penelitian yang di lakukan oleh Ollendick et al (2001) menyatakan bahwa kejadian buruk dalam kehidupan anak (*negative live event*) dapat merupakan sebuah stressor yang bila terjadi secara berulang akan membuat anak semakin menjadi rentan untuk mengalami trauma ketika berhadapan dengan pengalaman lainnya. Kejadian buruk dalam kehidupan ini biasa di dapatkan dari seorang anak yang pernah di rawat sebelumnya di rumah sakit.

Sebagaimana dalam teori yang di jelaskan oleh mitchel dan whitney (2001) bahwa selama dalam masa perawatan, anak akan mendapatkan berbagai tindakan medis dan keperawatan. Injeksi atau pemberian suntikan

merupakan salah satu prosedur invasive yang menyebabkan ketidaknyamanan, trauma fisik dan nyeri pada anak selama proses hospitalisasi. Nyeri dan ketidaknyamanan secara fisik yang terjadi pada anak yang mengalami hospitalisasi merupakan salah satu kondisi yang akan di hadapi selain perpisahan dan kehilangan kontrol, Pilliteri (2009).

Berdasarkan hal tersebut membuktikan bahwa ketakutan akan trauma fisik dan nyeri sering sekali terjadi pada anak, utamanya usia pra sekolah yang dimanifestasikan dalam bentuk ekspresi verbal lebih dapat diungkapkan,tetapi anak mungkin mengungkapkannya secara kasar, menangis kuat dan menjerit jerit, menghindari stimulus eksternal sebelum sampai kepada dirinya, memohonkan dukungan emosi pada orang tuanya seperti minta dipeluk.

Asumsi peneliti, bahwa Trauma Fisik dan Nyeri di sebabkan karena adanya persepsi yang tidak menyenangkan tentang rumah sakit yang mungkin didapatkan dari pengalaman sebelumnya atau pengalaman orang lain. Untuk mencegah supaya masalah hospitalisasi teratasi maka peran perawat adalah tetap memberikan dukungan (support) dan dorongan kepada anak yang efektif agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan tetap menjaga kepercayaan klien agar klien tidak merasa takut akan tindakan yang akan dilakukan oleh perawat.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan didapatkan hasil bahwa gambaran reaksi hospitalisasi terhadap kecemasan anak usia pra sekolah meliputi perpisahan, kehilangan kendali, trauma fisik dan nyeri.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan hasil penelitian tentang gambaran reaksi perpisahan terhadap kecemasan anak usia pra sekolah, dari 30 responden sebanyak 93,3 % di antaranya telah mengalami kecemasan. Hal ini menunjukkan bahwa pada umumnya hospitalisasi pada anak usia pra sekolah mengalami kecemasan akibat perpisahan.
2. Berdasarkan hasil penelitian tentang gambaran reaksi kehilangan kendali terhadap kecemasan anak usia pra sekolah, dari 30 responden sebanyak 90,0 % di antaranya telah mengalami kecemasan. Hal ini menunjukkan bahwa pada umumnya hospitalisasi pada anak usia pra sekolah membuat anak menjadi cemas dan kehilangan kendali.
3. Berdasarkan hasil penelitian gambaran reaksi perpisahan terhadap kecemasan anak usia pra sekolah, dari 30 responden sebanyak 96,7 % di antaranya telah mengalami kecemasan. Hal ini menunjukkan bahwa pada umumnya hospitalisasi pada anak usia pra sekolah mengalami kecemasan akibat trauma fisik dan nyeri.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan kesimpulan yang diperoleh, maka dapat diberikan beberapa saran berupa :

1. Bagi Institusi Pelayanan Kesehatan

Diharapkan agar menjadi rekomendasi bagi institusi untuk meningkatkan pelayanan dan fasilitas sesuai perkembangan anak selama perawatan demi menurunkan stressor dan kecemasan anak akibat hospitalisasi.

2. Bagi Institusi Pendidikan

Diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi kegiatan penelitian selanjutnya, serta memberi masukan bagi peningkatan dan pengembangan asuhan keperawatan khususnya pada anak usia pra sekolah yang mengalami hospitalisasi. Serta terinspirasi terhadap kenyataan yang ada di lapangan dan sumber informasi bagi institusi agar dijadikan sebagai dokumentasi ilmiah demi perkembangan ilmu keperawatan.

3. Bagi Profesi Keperawatan

Meningkatkan mutu pelayanan asuhan keperawatan terutama ditujukan dalam perawatan anak usia pra sekolah yang mengalami hospitalisasi.

4. Bagi pandangan Islam

Diharapkan dapat menjadi sumber informasi mengenai kaitan antara islam dan kesehatan khususnya pandangan islam dalam kejadian hospitalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an

Ader, Albert (1996) *Psichoneuroimmunology*, Philadelphia, J.B Lippincott Company.
Hal : 15.

Ader & Cohen (1991). *Psichoneuroimmunology*, Academic Press Inc 2nd edition.
New York

Al-Munajjad., M, (2010). *Terapi Kecemasan*. Solo: PT Aqwam media profetika

Barbara C. Long, (1996 : 131 – 132), *Perawatan Medikal Bedah (Suatu Pendekatan Proses Keperawatan)*, Yayasan IAPK Pajajaran . Bandung.

Bowdeen & Greenberg (2008). Alih bahasa : F.X. Budiyanto dkk. *Perkembangan dan Kepribadian Anak*. ARCAN : Jakarta.

Dian.2012. Keperawatan anak 1.in [www. dianhusadaifah.blogspot.com/p/pengertian-hospitalisasi.html](http://www.dianhusadaifah.blogspot.com/p/pengertian-hospitalisasi.html). Last Update 27 Juli 2012

Fillah, Azzam (2008). *Al-Qur'an dan Fakta Medis*. [http://ukhtifillahimakumullah.](http://ukhtifillahimakumullah.com/khazanah/dirosah-hikmah/al-qur-an-dan-fakta-medis.html)

[com/khazanah/dirosah-hikmah/al-qur-an-dan-fakta-medis.html](http://ukhtifillahimakumullah.com/khazanah/dirosah-hikmah/al-qur-an-dan-fakta-medis.html). Last Update 1 April 2013

Guyton & Hall (1996), *Fisiologi Kedokteran*, Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC.

Hawari, Dadang. 2001. *Manajemen Stress, Cemas, dan Depresi*. Jakarta:FKUI

Hawari D, 2006, *Manajemen Stress, Cemas, Depresi*, Jakarta, FKUI

Hockenberry & Wilson, D. (2009). *Wong's nursing care of infants n children*. (8th ed).
St. Louis: mosby Elsevier.

Hudak & Gallo (1994), *Keperawatan Kritis: Pendekatan Holistik Edisi VI, Vol. I*, Phyladelphia, J.B. Lippincolt.

Isaack, Ann . (2005). *Keperawatan Kesehatan Jiwa Psikiatri*. Edisi 3. Jakarta : EGC

- Kaplan and Sadock (1997), *Sinopsis Psikiatri: Ilmu Pengetahuan Perilaku Psikiatri Klinis*, Edisi Ketujuh, Jakarta : Penerbit Binarupa Aksara. Hal : 7
- Mendez et al, (2008). After your child hospitalization, <http://www.massgeneral.org/children/patientsandfamilies/yourvisit/post-hospitalization.aspx>. di akses tanggal 1 april 2013
- Mitchel & whitney. (2001). Editor : Ni Luh Gede Yasmin Asih, SKp. Alih bahasa :R.F. Maulany. Psinsip Keperawatan Pediatrik, Edisi 2. EGC : Jakarta.
- Muhadi & Muhadzin. (2009). *Semua penyakit ada obatnya*. Jakarta: PT Buku kita
- Muris, P., & Broeren, S. (2009). *Twenty-five years of research on childhood anxiety disorders: Publication trends between 1982 and 20*. Journal of Child and Family Studies, 18, 388-395.
- Nelson. 2000. Ilmu Kesehatan Anak, volume 2. Jakarta: EGC
- Ollendick et al (2001). *Helping children handle stress and anxiety*. In Session: Psychotherapy in Practice, 3, 89–102.
- Pilliteri (2009). Editor : Esti Wahyuningsih. Alih bahasa : Alfrina Hany. *Keperawatan Pediatrik (Pediatric Nursing)*. EGC : Jakarta.
- Potter, P. A. & Perry, A. G., (1997). *Fundamental of nursing: concepts, process, and practice*. 4/E. Mosby -year Book Inc
- Potter, P.A, Perry, A.G. (2005). *Buku Ajar Fundamental Keperawatan : Konsep, Proses, dan Praktik*. Edisi 4. Volume 2. Alih Bahasa : Renata Komalasari, dkk. Jakarta: EGC.
- Pusdiknakes RI., (1989). *Perawatan penyakit dalam dan bedah*. Jakarta: pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan
- Rohim, Kholilul (2008). *Terapi Juz Amma*. Hikmah : Jakarta.
- Rothrock, Jane C (1999) *Perencanaan Asuhan Keperawatan Perioperatif*, Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran, EGC. Hal : 65.
- Stuart , G. W. (1995). *Principals and Practice of Psychiatri Nursing*. St . Louis Missouri Mosby. Hal : 27.

- Stuart, G.W & Sundeen, S. J. (1998). *Buku Saku Keperawatan Jiwa*. Edisi 3. Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC. Hal : 175, 177, 178, 181.
- Suliswati.2005. *Konsep Dasar Keperawatan Kesehatan Jiwa*. Jakarta: EGC
- Supartini yupi. 2004. *Konsep dasar keperawatan anak*. Jakarta:EGC
- Supartini, Putri. 2008. Teori Perkembangan Kognitif.in www.id.wikipedia.org. Last Update 27 Juli 2012
- Widyawati. 2010. Dampak Hospitalisasi pada Anak.in www.widyainternet.blogspot.com/2010/01/dampak-hospitalisasi-pada-anak.html. Last Update 27 Juli 2012
- Windari, Putri. 2008. Teori Perkembangan Kognitif.in www.id.wikipedia.org. Last Update Juli 2012
- Wong's & Whaley. 1999. *Nursing Care of Infant & Children*, 6th edition. Mosby: Louis Missori

Lampiran 1

LEMBAR PENJELASAN RESPONDEN

Kepada Yth.
Bapak/Ibu
Di –
Tempat

Dengan hormat,

Saya bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muh.Irwan Irham
N I M : 70300107118
Alamat : Jl. Abdullah Dg. Sirua No.22G

Adalah mahasiswa program pendidikan S-1 Keperawatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang akan mengadakan penelitian tentang “ **Gambaran Reaksi Hospitalisasi terhadap Kecemasan Anak Usia Pra Sekolah di Ruang Ar Rahim RSUD Haji Makassar** ”.

Saya sangat mengharapkan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara(i) dalam penelitian ini demi kelancaran pelaksanaan penelitian.

Saya menjamin kerahasiaan dan segala bentuk informasi yang Bapak / Ibu /Saudara(i) berikan, dan apabila ada hal-hal yang masih ingin ditanyakan, saya memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya untuk meminta penjelasan dari peneliti.

Demikian penyampaian dari saya, atas perhatian dan kerjasamanya saya mengucapkan terima kasih.

Makassar,.....2013

Peneliti,

(Muh. Irwan Irham)

Lampiran 2

LEMBAR PERSETUJUAN RESPONDEN

Saya bertanda tangan dibawah ini menyatakan untuk berpartisipasi sebagai responden pada penelitian yang dilaksanakan oleh :

N a m a : Muh. Irwan Irham
N I M : 70300107118
A l a m a t : Jl. Abdullah Dg. Sirua No.22G

Judul Penelitian : **Gambaran Reaksi Hospitalisasi terhadap Kecemasan Anak Usia Pra Sekolah di Ruang Ar Rahim RSUD Haji Makassar.**

Saya menyadari bahwa saya menjadi bagian dari penelitian ini dan akan memberikan informasi yang sebenar-benarnya yang dibutuhkan oleh peneliti.

Saya mengerti bahwa penelitian ini tidak merugikan saya dan saya telah memberikan kesempatan oleh peneliti untuk meminta penjelasan sehubungan dengan penelitian ini.

Saya mengerti bahwa hasil penelitian ini akan menjadi bahan masukan bagi Rumah Sakit Haji Makassar utamanya di Ruang Sayang Duafa demi peningkatan status kesehatan anak dan keluarga di masa-masa yang akan datang.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menandatangani lembar persetujuan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar,..... 2013

Responden,

(_____)

Lampiran 3

KUESIONER

A. Gambaran Reaksi Hospitalisasi terhadap Kecemasan Anak Usia Pra Sekolah di Ruang Ar Rahim RSUD Haji Makassar

B. Petunjuk Pengisian

1. Isilah terlebih dahulu biodata Bapak/Ibu pada tempat yang telah disediakan.
2. Bacalah dengan seksama setiap pertanyaan sebelum Bapak/Ibu menjawabnya.
3. Mohon dijawab pada kolom yang tersedia dengan cara memberi tanda
4. Mohon diteliti ulang agar jangan sampai ada pertanyaan yang terlewatkan untuk dijawab.

C. Biodata Responden

1. Nama (Inisial) :
2. Umur :
3. Hubungan dengan pasien :
4. Jenis kelamin : Laki-laki Perempuan
5. Lama rawat inap :

D. Hospitalisasi

Keterangan : TP : Tidak Pernah
 J : Jarang
 AK : Ada Kalanya
 SL : Selalu

No	Reaksi Hospitalisasi	SL	AK	J	TP
Perpisahan					
1.	Saya melihat anak saya tidak ada selera makan selama berada di ruangan ini.				
2.	Saya melihat anak saya gugup saat berbicara dengan orang yang asing bagi dirinya.				
3.	Saya melihat anak saya sedih dan menangis saat saya pergi meninggalkannya.				
4.	Saya melihat anak saya tidak senang karena harus menginap dan berada diruangan dimana dia di rawat.				
Kehilangan kontrol/kendali					
1.	Anak saya sering gemetar dan gelisah menghadapi perawat di ruangan ini.				
2.	Anak saya enggan dan tidak dapat berinteraksi dengan teman sekamarnya.				
3.	Anak saya mengatakan tidak dapat tidur karena bau obat dan bahan-bahan medis di sekitar ruangan.				
4.	Anak saya lemas dan tidak berdaya selama berada di ruangan ini.				
5.	Anak saya mengatakan dia takut karena tidak mengenal dokter dan perawat yang merawatnya.				

Trauma Fisik & Nyeri

.1.	Saya melihat wajah anak saya pucat ketika perawat memberikan tindakan pengobatan terhadap dirinya.				
2.	Anak saya takut dengan pengobatan dan perawatan yang diberikan.				
3.	Anak saya mengatakan terganggu dengan tindakan pengobatan dan perawatan yang diberikan oleh dokter dan perawat kepada dia.				
4.	Anak saya sering menangis dan berteriak saat perawat atau dokter mendekatinya.				

RIWAYAT HIDUP



MUH. IRWAN IRHAM, lahir di PALOPO pada tanggal 29 September 1989, penulis adalah anak kedua dari empat bersaudara, buah kasih sayang dari Irhamuddin Idris S.pd M.pd dan A.St. Nurnaningsih.

Penulis menempuh pendidikan dasar diawali pada Sekolah Dasar yakni SDN 212 Belopa pada tahun 1995 dan tamat pada tahun 2001. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikannya ke jenjang SLTP Negeri 1 Belopa dan tamat pada tahun 2004. Kemudian, penulis melanjutkan ke SMA Negeri 1 Belopa dan berhasil lulus pada tahun 2007. Pada tahun 2007 penulis memasuki bangku kuliah di Perguruan Tinggi Negeri melalui jalur UML di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan menjadi mahasiswa pada Fakultas Kesehatan, Jurusan Keperawatan Program Studi Keperawatan S1. Meski sempat *down* dalam mengikuti perkuliahan tapi Syukur Alhamdulillah berkat ridho Allah SWT, perjuangan keras yang disertai iringan doa dari orang tua, saudara, serta Sahabat terdekatku akhirnya penulis dapat berhasil menyelesaikan studi dengan tersusunnya skripsi yang berjudul : **“Gambaran Reaksi Hospitalisasi Terhadap Kecemasan Anak Usia Pra Sekolah Di Ruang Ar Rahim RSUD Haji Makassar”**