

**PENGARUH PENGGUNAAN *FULL FAT SOYA (FFS)* SEBAGAI
SUBSTITUSI BUNGKIL KEDELAI TERHADAP
PERFORMA BROILER**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Peternakan pada Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar**

Oleh :

**HASRIANI BUDI
60700112078**

**JURUSAN ILMU PETERNAKAN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR**

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

1. Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hasriani Budi

Nim : 60700112078

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

- a. Karya skripsi yang saya tulis adalah asli
- b. Apabila sebagian atau seluruhnya dari karya skripsi ini, terutama dalam Bab Hasil dan Pembahasan, tidak asli atau plagiasi maka bersedia dibatalkan dan dikenakan sanksi akademik yang berlaku.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Samata, 24 November 2016


Hasriani Budi
60700112078


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Hasriani Budi, NIM: 60700112078, Mahasiswa jurusan peternakan pada fakultas sains dan teknologi UIN Alauddin Makassar. Setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul **“Pengaruh Penggunaan *Full Fat Soya (FFS)* Sebagai Subtitusi Bungkil Kedelai Terhadap Performa Broiler”**, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses lebih lanjut.


Gowa, 24 November 2016

Pembimbing I




Khaerani Kiramang, S.Pt.,M.P.
Nip. 197308282006042001

Pembimbing II



Muh Nur Hidayat, S.Pt.,M.P.
Nip. 197509092009121001

Mengetahui
Ketua Jurusan Ilmu Peternakan



Dr. Ir. Muh. Basir Paly, M.Si
Nip. 195907121986031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **“Pengaruh Penggunaan Full Fat Soya (FFS) Sebagai Substitusi Bungkil Kedelai Terhadap Performa Broiler ”** yang disusun oleh HASRIANI BUDI, NIM: 60700112078, mahasiswa Jurusan Ilmu Peternakan pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah di uji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 24 November 2016, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Peternakan Jurusan Ilmu Peternakan.

Gowa, 24 November 2016
24 Shafar 1438 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. Wasilah. S.T., M.T.	(.....)
Sekretaris	: Irmawati, S.Pt., M.P.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Ir Muh Basir Paly, M.Si	(.....)
Munaqisy II	: Rusny, S.Pt., M.Si	(.....)
Munaqisy III	: Dr. Muh Sabri AR., M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Khaerani Kiramang, S.Pt., M.P.	(.....)
Pembimbing II	: Muh. Nur Hidayat, S.Pt., M.P.	(.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.
NIP. 19691205 199303 1 001

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan Hidayah-Nya pada kita semua, shalawat dan salam tak lupa penulis hanturkan atas junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang senantiasa menuntun kita dari jalan yang gelap gulita ke jalan yang terang benderang.

Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik berkat bantuan dan sumbangsih dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. **Ayahanda tercinta Budi** dan **Ibunda Hernawati** yang senantiasa mendoakan, membesarkan dan mendidik dengan penuh kesabaran dan kasih sayang yang tulus.
2. Penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada Ibu **Khaerani Kiramang, S.Pt., M.P** yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan pengalaman selama penulis melaksanakan penelitian. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada Bapak **Muh Nur Hidayat, S.Pt., M.P** selaku pembimbing kedua yang dengan tulus membimbing dan mengarahkan hingga selesainya skripsi ini.
3. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak **Dr. Ir Muh Basir Paly, M.Si** selaku penguji I yang telah memberikan kritik dan saran. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu **Rusny, S.Pt., M.Si** selaku penguji II yang ikut juga memberikan kritik dan saran. Penulis juga mengucapkan


terima kasih kepada Bapak **Dr Muh Sabri AR, M.Ag** selaku penguji III yang memberikan kritik dan saran terutama tentang kajian islam sehingga skripsi ini lebih sempurna.

4. Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Direktur CV Bijaksana FeedMill Bapak **Abdul Alim Yamin, S.Pt.,M.Si**, serta karyawan-karyawannya yaitu Bapak **Darwis**, Bapak **Saharuddin Baba**, Bapak **Jamal**, dan Bapak **Anda** yang ikut membantu dalam proses penelitian.
5. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Kakak **Andi Afriana SE** selaku pegawai di jurusan yang membantu dalam pengurusan berkas. Terima kasih pula kepada Ibu **Drh Aminah Hajah Thaha** selaku kepala laboratorium ilmu peternakan, Kakak **Muh Arsan Jamili S.Pt** dan **Hikmawati S.Pt** selaku laboran jurusan ilmu peternakan yang ikut membimbing, memberi kritik, dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
6. Buat patner selama Praktek Kerja Lapang (PKL) sampai penelitian yaitu **Muh Asbar Samsa** dan **Akhmad Arista**. Penulis banyak terima kasih kepadanya karena dengan kerja keras dan bantuan dari mereka sehingga penelitian berjalan dengan lancar. Tak lupa pula penulis banyak berterima kasih kepada **Aswar Anas** karena dengan bantuan ilmu dan tenaganya selama ini sehingga penelitian ini berjalan dengan lancar.
7. Buat teman-teman seangkatananku **2012** terutama kelas C, terima kasih atas bantuan, kebersamaan dan canda tawanya yang selama ini terjalin dan buat Adik-adik **2013-2016** serta kakak-kakak **Angkatan 2005-2011**.

8. Teman-teman **KKN-Reguler Angkatan 51 Kec. Bajeng Barat, Kab. Gowa** khususnya **Desa Bontomanai**.
9. Teman-teman **Leade12 (Alumni SMAN 1 Kahu Angkatan 2012)**, terutama kelas **XII IPA 3** khususnya teman-temanku tercinta yang selalu memberiku motivasi yaitu Purnama Sari Afriana, Nurhikma Muslimin, Numaulida Yasin Jamal, Fitriani, Fitriana, Nurulfiana, Hasriani Nasir, dan masih banyak lagi yang tidak bisa di sebut satu persatu.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Samata, 24 November 2016



Hasriani Budi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	x
ABSTRAK	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan... ..	4
D. Manfaat.....	4
E. Hipotesis	4
F. Defenisi Operasional.....	5
G. Kajian Terdahulu.....	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Gambaran Umum Broiler.....	7
B. Sistem Pemberian Pakan.....	10
C. Gambaran Umum Kedelai.....	26

D. Gambaran Umum Bungkil Kedelai.....	32
E. Tinjauan Al-Qur'an Tentang Binatang Ternak dan Tumbuhan....	34
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Tempat	37
B. Alat dan Bahan Penelitian	37
C. Rancangan Penelitian	38
D. Prosedur Penelitian.....	40
E. Parameter yang Diamati	42
F. Analisis Data	43
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil	45
B. Pembahasan	45
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	54
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN	60
RIWAYAT HIDUP	82

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Kebutuhan Nutrisi Ransum Broiler Pada Periode Starter Dan Periode Finisher.....	12
2. Kebutuhan Nutrisi Ransum Broiler Umur 0-35 Hari.....	12
3. Frekuensi Pemberian Pakan	18
4. Kebutuhan Ransum Ayam Broiler Selama 1–6 Minggu	21
5. Standar Bobot Badan Ayam Broiler Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Umur 1–6 Minggu	22
6. Konversi Ransum Ayam Broiler Selama Masa Pemeliharaan 1–6 Minggu	24
7. Rataan Pertambahan Bobot Badan Ayam Broiler (g/ekor/minggu) Setiap Perlakuan Selama Penelitian	31
8. Komposisi Ransum Ayam Broiler umur 0-28 hari	39
9. Kandungan Nutrisi Antara <i>Full Fat Soya</i> (FFS) dan Bungkil Kedelai.	39
10. Data Hasil Penelitian	45

Nama : Hasriani Budi

Nim : 60700112078

Jurusan : Ilmu Peternakan

**Judul Skripsi : Pengaruh Penggunaan *Full Fat Soya* (FFS) Sebagai Substitusi
Bungkil Kedelai Terhadap Performa Broiler**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui pengaruh penggunaan *full fat soya* (FFS) sebagai substitusi bungkil kedelai terhadap performa broiler, (2) Untuk mengetahui *Income Over Feed Cost*. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode eksperimen, penelitian ini dilakukan dalam Rancangan Acak Lengkap dengan 5 perlakuan dan 5 ulangan. Materi menggunakan 75 ekor DOC ayam pedaging (strain *Cobb 500 Patriot*), timbangan, kandang lantai litter, tempat pakan, tempat air minum, ember, gayung, gasolek, koran, lampu pijar 11 watt 2 buah, pisau, talenan, dan ransum lokal. Parameter yang diamati adalah konsumsi ransum, penambahan bobot badan (PBB), konversi ransum, mortalitas, dan *Income Over Feed Cost*. Data yang diperoleh dianalisis dengan ANOVA dari RAL yang menunjukkan bahwa penggunaan *full fat soya* (FFS) sebagai substitusi bungkil kedelai tidak berpengaruh nyata terhadap konsumsi ransum ($P>0,05$) kecuali P2, tidak berpengaruh nyata terhadap penambahan bobot badan (PBB) ($P>0,05$) kecuali P2, tidak berpengaruh nyata terhadap konversi ransum ($P>0,05$), tidak berpengaruh nyata terhadap mortalitas ($P>0,05$), dan tidak berpengaruh nyata terhadap *Income Over Feed Cost* ($P>0,05$) kecuali P2.

Kata Kunci: Performa, Broiler, dan *Income Over Feed Cost*.

Name : Hasriani Budi
Nim : 60700112078
Major : Ilmu Peternakan
Title Of Research : The Effect of Full Fat Soya (FFS) as Substitution Soybean Meal to Broiler Performance

ABSTRACT

This study aims to (1) To determine the effect of the use of full fat soya (FFS) as a substitute for soybean meal on broiler performance, (2) To determine the Income Over Feed Cost. The method used in this study is an experimental method, this research was conducted in a completely randomized design with 5 treatments and 5 replications. Material used 75 tails DOC broiler (strain Cobb 500 Patriot), scales, cage floor litter, where food, drinking water, buckets, dipper, gasolek, newspapers, incandescent 11 watt 2 pieces, knives, cutting boards, and rations locally. The parameters measured were feed intake, body weight gain (UN), feed conversion, mortality, and Income Over Feed Cost. Data were analyzed with ANOVA of RAL which shows that the use of full fat soya (FFS) as a substitute for soybean meal did not affect feed intake ($P > 0.05$) except P2, no significant effect on body weight gain (UN) ($P > 0.05$) except P2, did not affect feed conversion ($P > 0.05$), no significant effect on mortality ($P > 0.05$), and no significant effect on Income Over Feed Cost ($P > 0.05$) except P2.

Keywords: Performance, Broiler, and Income Over Feed Cost.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan jumlah penduduk Indonesia dari tahun ke tahun berdampak pada peningkatan konsumsi produk peternakan (daging, telur, susu). Meningkatnya kesejahteraan dan tingkat kesadaran masyarakat akan pemenuhan gizi khususnya protein hewani juga turut meningkatkan angka permintaan produk peternakan. Daging banyak dimanfaatkan oleh masyarakat karena mempunyai rasa yang enak dan kandungan zat gizi yang tinggi. Salah satu sumber daging yang paling banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia adalah ayam. Daging ayam yang sering dikonsumsi oleh masyarakat diperoleh dari pemotongan ayam broiler, petelur afkir, dan ayam kampung (Ginting, 2013).

Performa broiler adalah suatu tingkat pencapaian hasil terhadap ternak tersebut, misalnya pencapaian pada berat badan, konsumsi ransum, dan konversi ransum. Broiler (ayam pedaging) merupakan jenis ternak yang banyak dikembangkan sebagai sumber pemenuhan kebutuhan protein hewani. Ayam broiler merupakan ternak ayam yang paling cepat pertumbuhannya, hal ini karena ayam broiler merupakan hasil budidaya yang menggunakan teknologi peternakan, sehingga memiliki sifat-sifat ekonomi yang menguntungkan dengan pemeliharaan yang sangat cepat dan siap potong dengan umur yang relatif muda.

Broiler merupakan salah satu penyumbang terbesar protein hewani asal ternak dan merupakan komoditas unggulan. Industri ayam broiler berkembang

pesat karena daging ayam menjadi sumber utama menu konsumen. Daging broiler mudah didapatkan baik di pasar modern maupun tradisional. Produksi daging broiler lebih besar dilakukan oleh rumah potong ayam modern dan tradisional. Proses penanganan di RPA merupakan kunci yang menentukan kelayakan daging untuk dikonsumsi. Perusahaan rumah potong ayam (RPA) atau tempat pendistribusian umumnya sudah memiliki sarana penyimpanan yang memadai, namun tidak dapat dihindari adanya kontaminasi dan kerusakan selama prosesing dan distribusi (Ginting, 2013).

Bahan pakan untuk ternak unggas menjadi kendala karena sebahagian besar bahan pakan untuk unggas ini masih merupakan bahan impor seperti bungkil kedelai, jagung dan tepung ikan. Bahkan Departemen Pertanian Amerika Serikat memperkirakan harga jagung dan bungkil kedelai masih akan terus naik. Dengan demikian bisa kita proyeksikan pula bahwa harga pakan ternak dan produk unggas masih akan mengalami kenaikan bila bahan baku pakan ternaknya sebagian besar masih diimpor. Untuk itu perlu dicari bahan alternatif pengganti dari bahan-bahan impor tersebut agar biaya ransum untuk unggas dapat ditekan. Ditambahkan juga bahwa salah satu kebijaksanaan Pemerintah adalah perlunya penelitian dan pengembangan lebih lanjut untuk bahan baku yang saat ini masih 100% impor seperti bungkil kedelai dengan bahan baku yang bisa diproduksi lokal setidaknya efek kenaikan harga bisa dikurangi (Muis dkk, 2010).

Salah satu bahan yang dapat dimanfaatkan adalah kedelai utuh (*Fullfat Soya*). Kedelai utuh (*Fullfat Soya*) merupakan hasil sortir dari kedelai impor yang dapat memproduksi dalam 1 tahun sekali dapat mencapai kurang lebih 2 ton, yang

masih memiliki kandungan protein yang tinggi berkisar antara 30-40%. Mengikat laju pertumbuhan yang cepat pada ayam pedaging selalu diikuti perlemakan yang cepat, dimana penimbunan lemak yang cenderung meningkat sejalan dengan meningkatnya bobot badan. Pertumbuhan yang cepat pada ayam pedaging yang sering diikuti pelemakan yang tinggi. Dengan pemberian ransum yang berupa tepung kedelai utuh (*Full Fat Soya*) akan memiliki lemak tinggi yang dapat mempercepat pertumbuhan ayam broiler. Menurut Prasetyono (2008), bahwa tepung kedelai mempunyai kandungan protein yang tinggi yaitu sebesar 37,7% dan sangat mudah mengalami degradasi di dalam lambung. Selain itu juga sebagai sumber lemak, vitamin, mineral, dan serat. Kandungan karbohidrat berkisar 34,8%, lemak 18,1% dan masih banyak kandungan yang lain sehingga cukup baik dalam memenuhi kebutuhan sebagai pakan ternak.

Berdasarkan hal tersebut, perbaikan dan peningkatan pertumbuhan ayam khusus ayam pedaging dan pemanfaatan tepung kedelai utuh (*Full Fat Soya*) sebagai sumber protein yang sangat penting sehingga perlu dikaji lebih dalam uji penelitian yang berjudul “Pengaruh Penggunaan *Full Fat Soya* sebagai Substitusi Bungkil Kedelai Terhadap Performa Broiler”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah penggunaan *Full Fat Soya* sebagai substitusi bungkil kedelai dapat memperbaiki performa broiler?
2. Bagaimana *Income over feed costnya*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan kedelai utuh (*full fat soya*) sebagai substitusi bungkil kedelai terhadap performa broiler
2. Untuk mengetahui *Income over feed cost*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai bahan informasi bagi mahasiswa, pemerintah, maupun pihak-pihak yang terkait dalam bidang peternakan mengenai pengaruh penggunaan tepung kedelai utuh (*full fat soya*) sebagai substitusi bungkil kedelai terhadap performa broiler.

Pemerintah dapat mengembangkan dan melakukan penyuluhan kepada para peternak untuk meningkatkan pengetahuan bagi peternak sehingga peternak dapat lebih mengutamakan penggunaan produk lokal dibandingkan dengan produk impor yang lebih unggul dan berkualitas.

Hasil penelitian juga diharapkan dapat digunakan sebagai data dasar untuk menunjang penelitian lain dan memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

E. Hipotesis

Diduga dengan penggunaan tepung kedelai utuh (*full fat soya*) dapat mensubstitusi bungkil kedelai dengan melihat performa broiler.

F. Definisi Operasional

Performa broiler adalah suatu tingkat pencapaian hasil ternak unggas tersebut, misalnya pencapaian pada berat badan, konsumsi ransum, dan konversi ransum.

Ayam broiler merupakan ternak ayam yang paling cepat pertumbuhannya, hal ini karena ayam broiler merupakan hasil budidaya yang menggunakan teknologi peternakan, sehingga memiliki sifat-sifat ekonomi yang menguntungkan dengan pemeliharaan yang sangat cepat dan siap potong dengan umur yang relatif muda.

Mortalitas merupakan angka kematian dalam pemeliharaan ternak. Ada banyak hal yang berpengaruh terhadap mortalitas dalam pemeliharaan unggas. Misalnya, adalah karena penyakit, kekurangan pakan, kekurangan minum, temperatur, sanitasi, dan lain sebagainya.

Income Over Feed Cost (Pendapatan Kotor) dapat diketahui dari selisih antara total pemasukan dengan total pengeluaran.

G. Kajian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rohmad (2014), tentang “Nilai Nutrisi Tepung Gaplek- Kedelai Sebagai Pengganti Jagung Dalam Ransum Ayam Pedaging Periode Starter.” Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa nilai nutrisi tepung gaplek- kedelai sebagai pengganti jagung sebesar 0, 25, 50, 75, dan 100 persen memberikan perbedaan hasil yang nyata ($P < 0,05$) terhadap konsumsi pakan, penambahan bobot badan (PBB). Hasil analisis statistik dengan sidik ragam didapatkan bahwa pengaruh perlakuan terhadap penambahan bobot badan

menunjukkan perbedaan yang nyata ($P < 0,05$). Berdasarkan hasil penelitian terlihat ada kecenderungan penurunan pertambahan bobot badan, yang disebabkan turunnya konsumsi pakan, sehingga konsumsi zat makanan yang dipergunakan untuk pertumbuhan semakin turun dan akibatnya pertumbuhan ayam semakin rendah. Menurut Wahyu (1997), jika konsumsi energi turun, akan menyebabkan pertumbuhan berkurang dan jika terjadi penurunan konsumsi protein mengakibatkan penurunan pertumbuhan sesuai dengan besarnya penurunan konsumsi protein tersebut.

Penurunan pertambahan bobot badan juga disebabkan oleh asam sianida pada tepung galek, dimana menurut Bahri dan Tarmudji (1984) bahwa untuk mendetoksikasi asam sianida diperlukan asam amino yang mempunyai atom sulfur (S) seperti metionin, sistin, dan sistein. Hasil dari detoksikasi adalah asam sianida berubah menjadi tiosianat dan asam amino tersebut kehilangan fungsinya dalam pembentukan jaringan tubuh, akibatnya pertumbuhan ayam semakin turun.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Broiler

Broiler merupakan hasil teknologi yaitu persilangan antara ayam *Cornish* dengan *Plymouth Rock*. Karakteristik ekonomis, pertumbuhan yang cepat sebagai penghasil daging, konversi pakan rendah, dipanen cepat karena pertumbuhannya yang cepat, dan sebagai penghasil daging dengan serat lunak (Murtidjo, 1987). Menurut Northe (1984) penambahan berat badan yang ideal 400 gram per minggu untuk jantan dan untuk betina 300 gram per minggu.

Menurut Suprijatna dkk (2005), ayam broiler adalah ayam yang mempunyai sifat tenang, bentuk tubuh besar, pertumbuhan cepat, bulu merapat ke tubuh, kulit putih dan produksi telur rendah. Dijelaskan lebih lanjut oleh Siregar (1980), bahwa ayam broiler dalam klasifikasi ekonomi memiliki sifat-sifat antara lain ukuran badan besar, penuh daging yang berlemak, temperamen tenang, pertumbuhan badan cepat serta efisiensi penggunaan ransum tinggi. Menurut Rasyaf (1995), ayam broiler memiliki sifat-sifat yang menguntungkan, baik bagi para peternak maupun para konsumen. Adapun sifat-sifat baik yang dimiliki ayam broiler adalah dagingnya empuk, kulit licin dan lunak; tulang rawan dada belum membentuk tulang yang keras, ukuran badan besar, dengan bentuk dada yang lebar, padat dan berisi, efisiensi terhadap pakan cukup tinggi dan sebagian besar dari makanan diubah menjadi daging, pertumbuhan atau penambahan berat badan sangat cepat pada umur 5–6 minggu ayam bisa mencapai berat ± 2 kg.

Broiler adalah ayam tipe pedaging yang telah dikembangkan secara khusus untuk pemasaran secara dini. Ayam pedaging ini biasanya dijual dengan bobot rata-rata 1,4 kg tergantung pada efisiensinya perusahaan. Menurut Rasyaf (1992) ayam pedaging adalah ayam jantan dan ayam betina muda yang berumur dibawah 6 minggu ketika dijual dengan bobot badan tertentu, mempunyai pertumbuhan yang cepat, serta dada yang lebar dengan timbunan daging yang banyak (Anonim, 1994).

Broiler merupakan jenis ayam jantan atau betina yang berumur 6 sampai 8 minggu yang dipelihara secara intensif untuk mendapatkan produksi daging yang optimal. Broiler dipasarkan pada umur 6 sampai 7 minggu untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan permintaan daging. Broiler terutama unggas yang pertumbuhannya cepat pada fase hidup awal, setelah itu pertumbuhan menurun dan akhirnya berhenti akibat pertumbuhan jaringan yang membentuk tubuh. Ayam broiler mempunyai kelebihan dalam pertumbuhan dibandingkan dengan jenis ayam piaraan dalam klasifikasinya, karena broiler mempunyai kecepatan yang sangat tinggi dalam pertumbuhannya. Hanya dalam tujuh atau delapan minggu saja, ayam tersebut sudah dapat dikonsumsi dan dipasarkan padahal ayam jenis lainnya masih sangat kecil, bahkan apabila ayam broiler dikelola secara intensif sudah dapat diproduksi hasilnya pada umur enam minggu dengan berat badan mencapai 2 kilogram per ekor (Anonim, 1994).

Mendapatkan bobot badan yang sesuai dengan yang dikehendaki pada waktu yang tepat, maka perlu diperhatikan pakan yang tepat. Kandungan energi pakan yang tepat dengan kebutuhan ayam dapat mempengaruhi konsumsi

pakannya, dan ayam jantan memerlukan energi yang lebih banyak daripada betina, sehingga ayam jantan mengkonsumsi pakan lebih banyak, (Anggorodi, 1985). Hal-hal yang terus diperhatikan dalam pemeliharaan ayam broiler antara lain perkandangan, pemilihan bibit, manajemen pakan, sanitasi dan kesehatan, recording dan pemasaran. Banyak kendala yang akan muncul apabila kebutuhan ayam tidak terpenuhi, antara lain penyakit yang dapat menimbulkan kematian, dan bila ayam dipanen lebih dari 8 minggu akan menimbulkan kerugian karena pemberian pakan sudah tidak efisien dibandingkan kenaikan/penambahan berat badan, sehingga akan menambah biaya produksi (Anonim, 1994).

Tiga tipe fase pemeliharaan broiler yaitu fase *Starter* umur 0 sampai 3 minggu, fase *grower* 3 sampai 6 minggu dan fase *Finisher* 6 minggu hingga dipasarkan. Broiler ini baru populer di Indonesia sejak tahun 1980-an dimana pemegang kekuasaan mencanangkan panggalakan konsumsi daging ruminansia yang pada saat itu semakin sulit keberadaannya. Hingga kini ayam broiler telah dikenal masyarakat Indonesia dengan berbagai kelebihanannya. Hanya 5-6 minggu sudah bisa dipanen. Dengan waktu pemeliharaan yang relatif singkat dan menguntungkan, maka banyak peternak baru serta peternak musiman yang bermunculan diberbagai wilayah Indonesia (Daghir, 1998).

Banyak strain ayam pedaging yang dipelihara di Indonesia. Strain merupakan sekelompok ayam yang dihasilkan oleh perusahaan pembibitan melalui proses pemuliaan untuk tujuan ekonomis tertentu. Contoh strain ayam pedaging antara lain CP 707, *Starbio*, *Hybro* (Suprijatna dkk, 2005).

B. Sistem Pemberian Pakan

Ayam broiler sebagai bangsa unggas umumnya tidak dapat membuat makanannya sendiri. Oleh sebab itu ia harus makan dengan cara mengambil makanan yang layak baginya agar kebutuhan nutrisinya dapat dipenuhi. Protein, asam amino, energi, vitamin, mineral harus dipenuhi agar pertumbuhan yang cepat itu dapat terwujud tanpa menunggu fungsi-fungsi tubuhnya secara normal. Dari semua unsur nutrisi itu kebutuhan energi bagi ayam broiler sangat besar (Rasyaf, 1994).

Suprijatna dkk (2005), pakan adalah campuran dari berbagai macam bahan organik maupun anorganik untuk ternak yang berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan zat-zat makanan dalam proses pertumbuhan. Ransum dapat diartikan sebagai pakan tunggal atau campuran dari berbagai bahan pakan yang diberikan pada ternak untuk pemenuhan kebutuhan nutrisi ternak selama 24 jam baik diberikan sekaligus maupun sebagian. Rasyaf (1994) menyatakan ransum adalah kumpulan dari beberapa bahan pakan ternak yang telah disusun dan diatur sedemikian rupa untuk 24 jam.

Ransum memiliki peran penting dalam kaitannya dengan aspek ekonomi yaitu sebesar 65-70% dari total biaya produksi yang dikeluarkan. Pemberian ransum bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok, pertumbuhan, pemeliharaan panas tubuh dan produksi. Pakan yang diberikan harus memberikan zat pakan (nutrisi) yang dibutuhkan ayam, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral, sehingga penambahan berat badan perhari (*Average Daily Gain/ADG*) tinggi. Pemberian pakan dengan sistem ad libitum (selalu

tersedia/tidak dibatasi). Apabila menggunakan pakan dari pabrik, maka jenis pakan disesuaikan dengan tingkat pertumbuhan ayam, yang dibedakan menjadi 2 (dua) tahap. Tahap pertama disebut tahap pembesaran (umur 1 sampai 20 hari), yang harus mengandung kadar protein minimal 23%. Tahap kedua disebut penggemukan (umur diatas 20 hari), yang memakai pakan berkadar protein 20 %. Jenis pakan biasanya tertulis pada kemasannya. Efisiensi pakan dinyatakan dalam perhitungan FCR (*Feed Conversion Ratio*). Cara menghitungnya adalah, jumlah pakan selama pemeliharaan dibagi total bobot ayam yang dipanen (Fadilah, 2004).

Ransum untuk ayam pedaging dibedakan menjadi dua macam yaitu ransum untuk periode *starter* dan periode *finisher*. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kebutuhan nutrisi ransum sesuai dengan periode pertumbuhan ayam (Rasyaf, 1994). Amrullah (2004) mengungkapkan bahwa khusus untuk ransum broiler, maka ransum hendaklah memiliki nisbah kandungan energi-protein yang diketahui. Kandungan protein yang tinggi untuk mempercepat pertumbuhan ayam broiler dan mengandung energi yang lebih untuk membuat ayam broiler dipanen cukup mengandung lemak.

Kebutuhan nutrisi ransum untuk ayam broiler dari *Day old chicken* (DOC) sampai umur potong dibagi dalam dua bagian yaitu *starter* (umur 0-3 minggu) dan *finisher* (umur 3-6 minggu) seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Kebutuhan nutrisi ransum broiler pada periode starter dan periode finisher

Nutrien	Periode <i>Starter</i>	Periode <i>Finisher</i>
Protein Kasar (%)	21-23	18-20
Energi Metabolisme (kkal/ kg)	2800-2900	3000-3200
Kalsium (%)	1,00	1,25
Fosfor (%)	0,50	0,40

Sumber: Yuwanta (2000).

Kebutuhan nutrisi ransum untuk broiler dari umur 0-35 hari adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Kebutuhan nutrisi ransum broiler umur 0-35 hari.

Protein (%)	Energi Metabolisme (Kkal/kg)
21	2800
21.7	2900
22.5	3000
23.2	3100
24	3200
24.8	3300

Sumber :Scott *et al.*, (1982)

1. Pemberian Pakan Lebih Awal

Program komersial broiler telah menekankan seleksi yang ketat untuk mencapai pertumbuhan secara genetik yang cepat per unit waktu pada umur muda mungkin. Berat awal *Day old chicken* (DOC) broiler sekitar 45-50 gram, menunjukkan peningkatan mencapai 40-45 kali pada umur 40 hari. Pertumbuhan yang begitu spektakuler ini menyebabkan setiap hari begitu berharga untuk memonitor potensi genetik yang penuh dari ayam tersebut. Sesaat setelah anak ayam menetas hingga mendapatkan nutrisi pertama kali merupakan periode kritis dalam membentuk pertumbuhan yang baik bagi broiler. Beberapa laporan menunjukkan bahwa sisa kuning telur digunakan untuk kelangsungan hidup sebagai energi eksogenous yang berguna untuk pertumbuhan. Pertumbuhan awal pada anak ayam dapat ditingkatkan dengan pemberian nutrisi lebih awal. Pemberian pakan lebih awal dapat memberikan efek yang baik terhadap pertumbuhan broiler yang baru menetas. Pemberian pakan lebih awal ini dapat mempercepat penyerapan kuning telur, meningkatkan berat badan, dan mempercepat perkembangan saluran pencernaan pada *Day old chicken* (DOC)

broiler. Untuk mendapatkan nutrisi lebih awal, 24 jam setelah proses pencernaan berfungsi atau 24 jam setelah menetas penundaan terhadap asupan nutrisi dapat memperlambat perkembangan saluran pencernaan dan sistem kekebalan, sehingga penambahan berat badan awal dan daging dada yang dihasilkan rendah (Ardana, 2009).

Pada perkembangan embrio kuning telur merupakan sumber energi. Selama penetasan, kuning telur terdiri dari 20% berat badan anak ayam dan mengandung 20-40% lemak serta 20-25% protein. Menjelang berakhirnya masa inkubasi sisa kuning telur terkumpul di dalam rongga abdominal. Bagi anak ayam yang baru menetas kuning telur tersedia sebagai energi, sedangkan protein untuk kelangsungan hidup dan pertumbuhan. Sisa kuning telur cukup untuk kelangsungan hidup anak ayam hingga umur 3-4 hari tanpa diberikan pakan, tetapi tidak dapat mendukung perkembangan saluran pencernaan dan sistem kekebalan, ataupun pertumbuhan berat badan. Selanjutnya kebanyakan protein berisi berbagai biomolekuler berharga seperti maternal antibodi yang digunakan untuk kekebalan pasif yang berguna daripada sebagai sumber asam amino. Pecahan lipid dari kuning telur sebagian besar berisi *Triglycerida*, *Phospholipid* dan sejumlah kecil *Ester kolesterol* serta asam lemak tidak bebas. Pada saat penetasan anak ayam, kuning telur dimanfaatkan baik oleh endositosis dari kandungan kuning telur ke dalam usus halus. Pergerakan antiperistaltik mentransfer kuning telur ke usus halus dimana *Acyl-lipid* dicerna oleh enzim lipase dari pankreas dan diserapnya (Ardana, 2009).

Pemberian pakan yang lebih awal dapat mempercepat penyerapan kuning telur. Sisa kuning telur pada umumnya akan habis hingga 4 hari setelah menetas. Studi terbaru mengindikasikan bahwa sisa kuning telur digunakan lebih cepat oleh anak ayam yang sudah mendapatkan pakan lebih awal dibandingkan pada anak ayam yang dipuasakan hingga 48 jam. Berat sisa kuning telur pada anak ayam broiler saat menetas adalah 6,5 gram yang berkurang menjadi 0,4 gram dalam waktu 96 jam pada anak ayam yang diberi pakan segera setelah menetas, tetapi berat kuning telur yang tersisa pada anak ayam yang dipuasakan 24 jam dan 48 jam adalah 0,7 gram dan 1,5 gram setelah 96 jam. Hal ini disebabkan karena gerakan antiperistaltik yang mentransfer kuning telur hingga ke duodenum karena dirangsang dengan kehadiran makanan di dalam saluran usus. Tetapi pada proses penetasan anak ayam diperunggasan komersial, anak ayam akan ditransfer dari inkubator ketika sebagian besar telah terlepas dari kerabang telur. Diikuti dengan proses selanjutnya seperti sexing, vaksinasi, dan pengemasan yang dilakukan sebelum dimasukkan ke dalam box untuk dikirim. Jadi dalam kenyataannya, anak ayam seringkali tidak mendapatkan air minum dan pakan yang menyebabkan kelangsungan hidup dan pertumbuhan terlambat. Oleh karena segera setelah penetasan merupakan periode kritis untuk perkembangan dan kelangsungan hidup bagi anak ayam (Ardana, 2009).

2. Pemberian Pakan pada Broiler

Temperatur lingkungan terutama dimusim kemarau merupakan permasalahan yang menjadi perhatian bagi peternak karena temperatur lingkungan yang tinggi dapat meningkatkan *feed conversion rate* (FCR) dan kematian.

Temperatur dalam kandang terutama sistem *Open House* sangat dipengaruhi oleh lokasi kandang. Lokasi tersebut harus memiliki sumber air yang mudah diperoleh serta perlu juga diperhatikan kecepatan angin dalam kandang (Ardana, 2009).

Ayam merupakan hewan *Homeothermis* atau berdarah panas dengan temperatur tubuhnya 40,6°C-41,7°C. Temperatur tubuh yang tinggi ini membuat ayam memiliki kemampuan terbatas dalam menyesuaikan diri dengan temperatur lingkungan. Oleh karena itu, ayam akan merasa sangat tertekan jika suhu lingkungan lebih tinggi dari temperatur ideal baginya yaitu 19-27°C. Ayam memiliki kemampuan terbatas dalam mengurangi panas tubuhnya. Pengeluaran panas dilakukan melalui sistem respirasi karena ayam tidak memiliki kelenjar keringat, sehingga kerja jantung dan angka respirasi akan menjadi lebih tinggi (biasa disebut dengan panting). Stres panas ini juga bisa mempengaruhi fungsi fisiologis tubuh ayam. Perubahan fungsi fisiologis ini dapat berupa adaptasi ayam terhadap temperatur lingkungan yang ekstrim, contohnya ayam akan mengurangi konsumsi pakan dan meningkatkan konsumsi air minum (agar produksi panas dalam tubuhnya/*Heat Increment* berkurang sehingga dapat membuang panas dengan jalan panting). Sekitar 60% panas tubuh akan dibuang melalui mekanisme panting. Mekanisme panting ini akan dilakukan ayam terutama pada kandang yang kelembabannya rendah. Jika temperatur lingkungan terlalu panas maka ayam akan mengurangi aktivitasnya, sayap menjadi lunglai dan akan terjadi perubahan keseimbangan hormon. Salah satu konsekuensi akibat stress panas maka ayam akan menurunkan konsumsi pakan, sehingga konsumsi nutriennya (asam amino, lemak, mineral, dan vitamin) juga akan turun. Oleh karena itu, perlu menyiasati

agar ayam dapat tercukupi kebutuhan nutriennya pada kondisi lingkungan yang panas (Ardana, 2009).

Puasa ayam disiang hari secara fisiologis akan lebih baik dilakukan juga dengan pemberian air minum secara *adlibitum*. Interval puasa dapat dilakukan 6-8 jam sebelum terjadinya awal stress panas, kemudian terjadi lagi stress panas selama 6 jam sesudahnya, sehingga total interval puasanya menjadi 12 jam (masih dapat ditolelir). Pemberian pakan pada siang hari kurang efisien karena hasil metabolisme zat makanan pada jumlah tertentu harus dibuang. Pemberian vitamin C dan elektrolit (6 jam sebelum awal terjadinya stress panas) juga sangat dianjurkan serta dapat dilakukan juga penyiraman atap kandang dengan air atau dengan menambah kipas (Ardana, 2009).

3. Frekuensi Pemberian Pakan

Pakan adalah campuran berbagai macam bahan organik dan anorganik yang diberikan kepada ternak untuk memenuhi kebutuhan zat-zat makanan yang diperlukan bagi pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi (Suprijatna dkk, 2005). Pemberian pakan pada periode starter pada minggu pertama dilakukan secara *adlibitum* yaitu pemberian pakan secara terus-menerus. Pemberian pakan ini dilakukan sesering mungkin dengan jumlah sedikit demi sedikit. Anak ayam pada periode ini masih dalam tahap belajar dan adaptasi dengan lingkungan sehingga pemberian pakan dalam jumlah sedikit demi sedikit dimaksudkan agar tidak banyak terbuang dan tidak tercampur dengan kotoran ayam (Fadilah dkk, 2007).

Berbagai tingkat pembatasan pemberian pakan akan memberi pengaruh yang berbeda terhadap penampilan ayam dan penghematan pakan (Fuller *et al.*, 1993). Frekuensi atau waktu pemberian pakan pada anak ayam biasanya lebih sering sampai 5 kali sehari. Semakin tua ayam, frekuensi pemberian pakan semakin berkurang sampai dua atau tiga kali sehari (Suci dkk, 2005). Hal yang perlu mendapat perhatian dari segi waktu pemberian pakan adalah ketepatan waktu setiap harinya. Ketepatan waktu pemberian pakan perlu dipertahankan, karena pemberian pakan pada waktu yang tidak tepat setiap hari dapat menurunkan produksi. Pakan juga dapat diberikan dengan cara terbatas pada waktu tertentu dan disesuaikan dengan kebutuhan ayam, misalnya pagi dan sore. Waktu pemberian pakan dipilih pada saat yang tepat dan nyaman sehingga ayam dapat makan dengan baik dan tidak banyak pakan yang terbuang (Sudaro dan Siriwa, 2007).

Pola pemberian pakan yang baik akan membantu meningkatkan konsumsi pakan minggu pertama. Pemberian pakan sedikit demi sedikit, tetapi sesering mungkin sangat dianjurkan.

Tabel 3. Frekuensi Pemberian Pakan

Umur	Frekuensi Pemberian Pakan
Minggu I (1-7 hari)	9 kali tiap 2 jam (mulai 06.00-23.00)
Minggu II (8-14 hari)	5 kali tiap 3 jam (mulai 07.00-19.00)
Minggu III (15-21 hari)	4 kali tiap 4 jam (mulai 07.00-19.00)
Minggu IV (22-28 hari)	3 kali tiap 4 jam (mulai 07.30-15.00)
Minggu V (29-35 hari)	2 kali tiap 6 jam (mulai 07.30-15.00)
Minggu VI (36-42 hari)	2 kali tiap 6 jam (mulai 07.30-15.00)

Sumber: (Ardana, 2009)

Kualitas dan kuantitas pakan broiler yang diberikan dibedakan berdasarkan fase pertumbuhan broiler yaitu fase *Starter* (umur 0-4 minggu) dan fase *Finisher* (4-6 minggu) (Ardana, 2009).

a. Kualitas dan Kuantitas Pakan Fase *Starter*

Pada fase *Starter*, kualitas atau kandungan zat gizi pakan terdiri dari protein 22-24%, lemak 2,5%, serat kasar 4%, kalsium (Ca) 1%, fosfor (P) 0,7-0,9%, ME: 2800-3500 kkal/kg makanan. Sedangkan kuantitas pakan terbagi/digolongkan menjadi empat golongan, yaitu:

- 1) Minggu ke-1 (1-7 hari) 17 gram/ekor/hari
- 2) Minggu ke-2 (8-14 hari) 43 gram/ekor/hari
- 3) Minggu ke-3 (15-21 hari) 66 gram/ekor/hari
- 4) Minggu ke-4 (22-28 hari) 91 gram/ekor/hari

Keseluruhan jumlah pakan yang dibutuhkan tiap ekor sampai pada umur 4 minggu sebesar 1.520 gram (Ardana, 2009).

b. Kualitas dan Kuantitas Pakan Fase *Finisher*

Pada fase *finisher* kualitas atau kandungan zat gizi pakan terdiri dari protein 18,1-21,2%; lemak 2,5%, serat kasar 4,5%, kalsium (Ca) 1%, fosfor (P) 0,7-0,9%, dan energi (ME): 2900-3400 kkal/kg. Sedangkan kuantitas pakan terbagi/digolongkan dalam empat golongan umur, yaitu:

- 1) Minggu ke-5 (29-35 hari) 111 gram/ekor/hari
- 2) Minggu ke-6 (36-42 hari) 129 gram/ekor/hari
- 3) Minggu ke-7 (43-49 hari) 146 gram/ekor/hari
- 4) Minggu ke-8 (50-56 hari) 161 gram/ekor/hari

Keseluruhan jumlah pakan per ekor pada umur 29-56 hari adalah 3.829 gram pakan (Ardana, 2009).

4. Konsumsi Ransum

Konsumsi ransum adalah banyaknya ransum yang dikonsumsi setiap ekor ayam broiler dalam waktu tertentu. Wahyu (1997) menjelaskan bahwa konsumsi ransum merupakan jumlah ransum yang diberikan dikurangi dengan sisa ransum. Bila ransum diberikan tidak terbatas atau *ad libitum*, ayam akan makan sepuasnya hingga kenyang. Rasyaf (1992) menyatakan bahwa konsumsi ransum merupakan sejumlah nutrisi yang ada di dalam ransum yang tersusun dari berbagai bahan ransum untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ternak.

Ayam mengkonsumsi ransum terutama dalam rangka memenuhi kebutuhan energinya. Konsumsi akan meningkat bila ayam diberikan ransum dengan kadar energi rendah (Wahju, 1997). Laju ransum dalam alat pencernaan dapat mempengaruhi jumlah ransum yang dikonsumsi, makin cepat aliran ransum dalam alat pencernaan maka makin banyak pula jumlah ransum yang dikonsumsi. Faktor lain yang mempengaruhi konsumsi adalah palatabilitas dan selera. Palatabilitas dipengaruhi oleh bau, rasa, tekstur, dan suhu dari ransum yang diberikan. Selera merupakan faktor internal yang merangsang rasa lapar. Faktor lain yang juga mempengaruhi konsumsi adalah ternak, lingkungan, dan stres karena penyakit (Wahju, 1997).

Ransum yang dikonsumsi ternak sebagian dicerna dan diserap tubuh. Sebagian yang tidak dicerna akan diekskresikan dalam bentuk ekskreta. Hal ini dipertegas Murtidjo (1987) bahwa komposisi makanan ternak yang mengandung

serat kasar tinggi, akan menyebabkan lebih banyak serat kasar dikeluarkan lewat ekskreta (kotoran) sehingga kesempatan efisiensi yang diperoleh dari ransum yang dikonsumsi akan hilang. Hal tersebut menyebabkan ternak unggas memproduksi dan bertumbuh tidak optimal.

Serat kasar dalam ransum yang tinggi dapat menyebabkan ayam mengkonsumsi ransum dalam jumlah sedikit karena ayam akan merasa cepat kenyang. Semakin tinggi serat kasar dalam ransum menyebabkan jumlah konsumsi ransum semakin menurun, karena ransum bersifat “*bulky*” sehingga ransum yang dikonsumsi terbatas (Cherry, 1982). Menurut Rizal (2006), unggas mengkonsumsi ransum kira-kira 5% dari bobot badannya.

Adapun kebutuhan ayam broiler secara kuantitatif selama pemeliharaan 1–6 minggu, dapat dilihat pada Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4. Kebutuhan ransum ayam broiler selama 1–6 minggu

Usia (Minggu)	Kebutuhan Ransum (gram/ekor)	
	per-hari	Kumulatif
1	13	91
2	33	322
3	48	658
4	65	1113
5	88	1729
6	117	2548

Sumber : Murtidjo, 1987

5. Pertambahan Bobot Badan

Pertambahan bobot badan mempunyai definisi yang sangat sederhana yaitu peningkatan ukuran tubuh. Pertambahan bobot badan juga dapat diartikan sebagai perubahan ukuran yang meliputi pertambahan bobot hidup, bentuk dimensi linier dan komposisi tubuh termasuk komponen-komponen tubuh seperti otak, lemak,

tulang, dan organ-organ serta komponen-komponen kimia terutama air dan abu pada karkas (Hunton, 1995).

Pertambahan bobot badan diperoleh melalui pengukuran kenaikan bobot badan dengan melakukan penimbangan berulang-ulang dalam waktu tiap hari, tiap minggu atau tiap bulan (Tillman dkk, 1991). Kecepatan pertumbuhan mempunyai variasi yang cukup besar, keadaan ini bergantung pada tipe ayam, jenis kelamin, galur, tata laksana, temperatur lingkungan, tempat ayam tersebut dipelihara, kualitas dan kuantitas ransum (Anggorodi, 1980).

Pada masa pertumbuhan, ayam harus memperoleh ransum yang banyak mengandung protein, zat ini berfungsi sebagai pembangun, pengganti sel yang rusak dan berguna untuk pembentukan telur. Kebutuhan protein perhari ayam sedang bertumbuh dibagi menjadi tiga bentuk kebutuhan yaitu protein yang dibutuhkan untuk pertumbuhan jaringan, protein untuk hidup pokok dan protein untuk pertumbuhan bulu (Wahju, 2004).

Keseimbangan zat-zat nutrisi terutama imbang energi dan protein penting karena nyata mempengaruhi pertumbuhan. Pada umumnya semua ternak unggas, khususnya ayam broiler (pedaging) termasuk golongan yang memiliki pertumbuhan cepat. Pertumbuhan ayam pedaging sangat cepat dan pertumbuhan dimulai sejak menetas sampai umur 8 minggu, setelah itu kecepatan pertumbuhan akan menurun (Scott *et al.*, 1982).

Standar bobot badan ayam broiler berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini :

Tabel 5. Standar bobot badan ayam broiler berdasarkan jenis kelamin pada umur 1–6 minggu.

Umur (minggu)	Jenis Kelamin	
	Jantan (g)	Betina (g)
1	152	144
2	376	344
3	686	617
4	1085	965
5	1576	1344
6	2088	1741

Sumber : NRC, 1994

Anggorodi (1995) menjelaskan bahwa pertumbuhan berlangsung secara perlahan-lahan pada awalnya, kemudian cepat dan pada tahap terakhir perlahan-lahan kembali dan kemudian berhenti sama sekali. Dijelaskan lebih lanjut dalam beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ayam broiler antara lain faktor nutrisi yang meliputi energi, protein, vitamin, mineral dan kalsium. Pertumbuhan ayam broiler dipengaruhi oleh faktor genetik, dimana masing-masing ternak mempunyai kemampuan tumbuh yang berbeda-beda (Suprijatna dkk, 2005).

Menurut Tillman dkk, (1991) pertumbuhan ayam broiler dapat dilihat pada kenaikan bobot badan yang diperoleh dengan cara menimbang secara harian, mingguan ataupun menurut periode waktu tertentu. Pertambahan bobot badan erat kaitannya dengan konsumsi ransum yang mencerminkan pula gizinya, sehingga untuk mencapai pertumbuhan yang optimal dibutuhkan sejumlah zat-zat makanan yang bermutu, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

6. Konversi Ransum

Konversi ransum diperoleh dari perbandingan ransum yang dikonsumsi dengan pertambahan bobot badan dalam waktu pemeliharaan tertentu. Konversi ransum adalah perbandingan jumlah konsumsi ransum pada satu minggu dengan pertambahan bobot badan yang dicapai pada minggu itu, bila rasio kecil berarti pertambahan bobot badan ayam broiler memuaskan atau ayam makan dengan efisien. Hal ini dipengaruhi oleh besar badan dan bangsa ayam, tahap produksi, kadar energi dalam ransum, dan temperatur lingkungan (Rasyaf, 2000).

Nilai suatu ransum selain ditentukan oleh nilai konsumsi ransum dan tingkat pertumbuhan bobot badan juga ditentukan oleh tingkat konversi ransum, dimana konversi ransum menggambarkan banyaknya jumlah ransum yang digunakan untuk pertumbuhannya (Wiradisastra, 1986). Semakin rendah angka konversi ransum berarti kualitas ransum semakin baik. Anggorodi (1980) menyatakan bahwa nilai konversi ransum dapat dipenuhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah suhu lingkungan, laju perjalanan ransum melalui alat pencernaan, bentuk fisik, dan konsumsi ransum. Adapun, konversi ransum ayam broiler selama pemeliharaan, dapat dilihat pada Tabel 6 berikut ini:

Tabel 6. Konversi ransum ayam broiler selama masa pemeliharaan 1–6 minggu

Usia (Minggu)	Konversi Ransum
1	0,925
2	1,410
3	1,535
4	1,705
5	1,885
6	2,060

Sumber : Murtidjo, 1987

Nilai konversi ransum berhubungan dengan biaya produksi, khususnya biaya ransum, karena semakin tinggi konversi ransum maka biaya ransum akan meningkat karena jumlah ransum yang dikonsumsi untuk menghasilkan bobot badan dalam jangka waktu tertentu semakin tinggi. Nilai konversi ransum yang tinggi menunjukkan jumlah ransum yang dibutuhkan untuk menaikkan bobot badan semakin meningkat dan efisiensi ransum semakin rendah (Card dan Nesheim, 1982).

7. Mortalitas

Mortalitas merupakan angka kematian dalam pemeliharaan ternak. Ada banyak hal yang berpengaruh terhadap mortalitas dalam pemeliharaan unggas. Misalnya, adalah karena penyakit, kekurangan pakan, kekurangan minum, temperatur, sanitasi, dan lain sebagainya. Penyakit didefinisikan sebagai segala penyimpangan gejala dari keadaan kesehatan yang normal. Tingkat kematian yang disebabkan oleh penyakit tergantung dari jenis penyakit yang menyerang unggas. Dalam pemeliharaan petelur yang berhasil, tingkat kematian 10 sampai 12% dianggap normal dalam satu tahun produksi. Dalam kelompok pedaging, kematian maksimum per tahun normalnya adalah sekitar 4%. Setiap kematian yang melebihi angka tersebut harus dianggap sebagai kondisi yang serius yang harus mendapat perhatian segera dari peternak yang bersangkutan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menekan angka kematian adalah mengontrol kesehatan ayam, mengontrol kebersihan tempat pakan dan minum serta kandang, melakukan vaksinasi secara teratur, memisahkan ayam yang terkena penyakit

dengan ayam yang sehat, dan memberikan pakan dan minum pada waktunya (Fadillah dkk, 2007).

Menurut Wahyono (2009), faktor penyebaran penyakit pada unggas dapat terjadi secara vertikal dan horizontal yang memerlukan pengawasan yang ketat dan perlu perhatian yang lebih jika terjadi infeksi (penyakit). Beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam pengobatan meliputi umur ayam, jenis dan dosis antibiotik yang digunakan untuk mengobati ayam. Pemeliharaan ayam broiler dinyatakan berhasil jika angka kematian secara keseluruhan kurang dari 5%. Angka mortalitas dipengaruhi oleh umur. Ayam broiler umur 5-8 minggu memiliki tingkat mortalitas yang lebih tinggi dibandingkan umur 2-4 minggu (Bell dan Weaver, 2002).

8. *Income Over Feed Cost (Pendapatan Kotor)*

Pendapatan menjadi hal penting dalam usaha peternakan ayam broiler, karena pendapatan merupakan proses akhir dari produksi yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan suatu usaha. Peternak dalam memasarkan hasil produksinya dapat dilakukan secara langsung kekonsumen atau melalui perantara untuk dapat sampai kekonsumen. Beberapa masalah lain yang timbul dalam pendistribusian ayam broiler yaitu harga ayam broiler yang sering berfluktuasi yang menyebabkan ketidakstabilan pendapatan produsen, lokasi produsen dan konsumen yang terpencar sehingga diperlukan sarana transportasi dan banyaknya lembaga pemasaran yang terlibat yang menyebabkan pemasaran semakin tinggi serta mempengaruhi efisiensi pemasaran ayam broiler (Alfa dkk, 2016),

Modal sendiri, yaitu modal yang diperoleh dari pemilik usaha itu sendiri yang terdiri dari tabungan, sumbangan, hibah dan lain sebagainya. Modal adalah harta yang dimiliki untuk digunakan dalam menjalankan kegiatan usaha dengan tujuan memperoleh laba yang optimal sehingga diharapkan bisa meningkatkan pendapatan (Mardiyatmo, 2008).

C. Gambaran Umum Kedelai

Kedelai merupakan tanaman pangan berupa semak yang tumbuh tegak. Kedelai jenis liar *Glycine ururiencis*, merupakan kedelai yang menurunkan berbagai kedelai yang kita kenal sekarang (*Glycine max* L Merril). Berasal dari daerah Manshukuo (Cina Utara). Di Indonesia, yang dibudidayakan mulai abad ke-17 sebagai tanaman makanan dan pupuk hijau. Penyebaran tanaman kedelai ke Indonesia berasal dari daerah Manshukuo menyebar ke daerah Mansyuria, Jepang (Asia Timur) dan ke negara-negara lain di Amerika dan Afrika. Pada awalnya, kedelai dikenal dengan beberapa nama botani, yaitu *Glycine soja* dan *Soja max*. Namun pada tahun 1948 telah disepakati bahwa nama botani yang dapat diterima dalam istilah ilmiah, yaitu *Glycine max* L Merill (Adisarwanto, 2005).

Sistematika kedelai menurut Adisarwanto (2005), diklasifikasikan sebagai berikut:

Kingdom : Plantae
Divisi : Spermatophyta
Sub-divisi : Angiospermae
Kelas : Dicotyledoneae
Ordo : Rosales

Famili : Leguminoceae
Subfamili : Papilionaceae
Genus : Glycine
Species : *Glycine max* L Merill

Kedelai (*Glycine max* L Merill) merupakan sumber protein yang paling baik serta sebagai sumber lemak, vitamin, mineral dan serat. Kandungan protein berkisar 30-40%, karbohidrat 34,8%, lemak 18,1% dan masih mengandung zat gizi yang lain sehingga mempunyai potensi yang cukup baik untuk memenuhi kebutuhan gizi ternak, khususnya kebutuhan protein. Kedelai merupakan sumber protein nabati yang efisien, dalam arti bahwa untuk memperoleh jumlah protein yang cukup diperlukan kedelai dalam jumlah 20 yang kecil. Selain mengandung protein, kedelai juga mengandung zat besi, kalsium, vitamin A dan vitamin B1. Protein kedelai merupakan satu-satunya leguminosa yang mengandung semua asam amino esensial. Asam amino tersebut tidak dapat disintesis oleh tubuh, jadi harus dikonsumsi dari luar tubuh. Meskipun kadar minyaknya sekitar 18%, tetapi ternyata kadar lemak jenuhnya rendah dan bebas terhadap kolesterol serta rendah nilai kalorinya (Adisarwanto, 2005).

Menurut Pendapat Dourado *et al.*, (2011), bahwa anti nutrisi yang terkandung pada kedelai utuh (*Full fat soya*) ini adalah saponin, tanin, oligosakarida non pati dan polisakarida dan fitat. Antinutrisi ini dapat menekan konsumsi pakan, perumbuhan, dan pencernaan nutrisi (Valencia *et al.*, 2009). Salah satu cara untuk menghilangkan faktor-faktor antinutrisi dan meningkatkan nilai gizi dari kedelai mentah yaitu dengan cara melakukan pemanasan terlebih dahulu

(Qin *et al.*, 1996;. Machado *et al.*, 2008.). Ekstrusi sebagai cara pemanasan dapat menginaktivasi tripsin dan mendenaturasi sebagai protein asli (Perila *et al.*, 1997).

Kandungan protein kedelai cukup tinggi sehingga kedelai termasuk ke dalam lima bahan makanan yang mengandung berprotein tinggi diantaranya adalah gandum, kedelai, beras, bayam, dan kacang hijau. Kacang kedelai mengandung air 9%, protein 40%, lemak 18%, serat 3,5%, gula 7% dan sekitar 18% zat lainnya. Selain itu, kandungan vitamin E kedelai sebelum pengolahan cukup tinggi. Vitamin E merupakan vitamin larut lemak atau minyak. Kebutuhan protein kedelai sebesar 55 g per hari dapat dipenuhi dengan makanan yang berasal dari 157,14 g kedelai (Adisarwanto, 2005).

Salah satu senyawa yang terkandung dalam kedelai adalah isoflavon. Senyawa isoflavon merupakan senyawa metabolit sekunder yang banyak disintesa oleh tanaman. Namun, tidak sebagai layaknya senyawa metabolit sekunder karena senyawa ini tidak disintesa oleh mikroorganisme. Kandungan *Isoflavon* pada kedelai berkisar 2–4 mg/g kedelai. Senyawa *Isoflavon* ini pada umumnya berupa senyawa kompleks atau konjugasi dengan senyawa gula melalui ikatan glukosida. Jenis senyawa isoflavon ini terutama adalah *Genistin*, *Daidzin*, dan *Glisitin*. Bentuk senyawa demikian ini mempunyai aktivitas fisiologis kecil. Selama proses pengolahan, baik melalui proses fermentasi maupun proses non-fermentasi, senyawa *Isoflavon* dapat mengalami transformasi, terutama melalui proses hidrolisa sehingga dapat diperoleh senyawa *Isoflavon* bebas yang disebut aglikon yang lebih tinggi aktivitasnya. Senyawa aglikon tersebut adalah *Genistein*, *Glisitein*, dan *Gaidzein*. Kacang kedelai mentah tidak dianjurkan untuk

dipergunakan sebagai pakan ayam karena kacang kedelai mentah mengandung beberapa tripsin, yang tidak tahan terhadap panas, karena itu sebaiknya kacang kedelai diolah lebih dahulu (Anonim, 2010).

Hasil analisis tepung kedelai menunjukkan 3 macam senyawa *Isoflavon* utama yaitu *Daidzein*, *Glisitein* dan *Genistein*. Hasil analisis *Kromatogram* menunjukkan bahwa senyawa *Isoflavon* yang paling dominan pada tepung kedelai adalah daidzein dan genistein. Kandungan genistein dalam tepung kedelai 65,15 mg/kg bk. Selain sebagai bahan pembuat tempe dan tahu, kacang kedele mentah mengandung penghambat tripsin yang harus dihilangkan oleh pemanasan atau metoda lain, sedangkan bungkil kacang kedelai, merupakan limbah dari proses pembuatan minyak kedelai. Faktor pembatas pada penggunaan kedelai ini adalah asam amino metionin (Anonim, 2010).

Penggunaan 10-20% kedelai utuh (*Full fat soya*) akan meningkatkan konsumsi pakan dan berat badan pada unggas. Oleh karena itu, pemanfaatan 20% kedelai utuh (*Full fat soya*) menyebabkan peningkatan kinerja pada unggas. Percobaan menegaskan bahwa menambahkan ekstrusi kedelai penuh lemak (*Full fat soya*) pada unggas telah mempengaruhi pada parameter biokimia darah, sehingga mengurangi kolesterol, trigliserida dan LDL pada lipid serum pada unggas. Ini disarankan untuk digunakan hingga 20% kedelai diekstrusi pada unggas (Alsaftli *et al.*, 2015).

Kedelai *Full fat* lokal bisa menjadi ekonomis dan memberikan keuntungan bagi industri unggas di wilayah Kurdistan, serta secara keseluruhan Irak dengan pakan alternatif berbahan lokal dan diproses untuk digunakan sebagian oleh

produsen sebagai pakan broiler bukan pakan impor seperti bungkil kedelai (Sardar, 2009).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Muis dkk, (2010) bahwa rataan pertambahan bobot badan ayam broiler pada masing-masing perlakuan dapat dilihat pada Tabel 7. Rataan ini berkisar dari 312,23 sampai dengan 371,27g/ekor/minggu. Pada Tabel 7 dapat dilihat rataan pertambahan bobot badan tertinggi terdapat pada perlakuan A dan yang terendah terdapat pada perlakuan E. Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa dengan pemberian tepung kedelai dalam ransum memberikan pengaruh berbeda sangat nyata ($P < 0,01$) terhadap pertambahan bobot badan (PBB) ayam broiler (pedaging). Berdasarkan uji Beda Nyata Terkecil, ternyata perlakuan A, B, C, dan D berbeda tidak nyata ($P > 0,05$) tetapi berbeda sangat nyata dengan perlakuan E.

Tabel 7. Rataan Pertambahan Bobot Badan Ayam Broiler (g/ekor/minggu) Setiap Perlakuan Selama Penelitian.

Perlakuan	PBB
A	371,27 ^a
B	355,51 ^a
C	355,51 ^a
D	352,04 ^a
E	321,23 ^b

Keterangan : Superskrip yang berada pada kolom yang sama menunjukkan pengaruh yang berbeda sangat nyata ($P < 0,01$).

A : 0% kedelai fermentasi + 100% bungkil kedelai

B : 25% kedelai fermentasi + 75% bungkil kedelai

C : 50% kedelai fermentasi + 50% bungkil kedelai

D : 75% kedelai fermentasi + 25% bungkil kedelai

E : 100% kedelai fermentasi + 0% bungkil kedelai

Berbeda tidak nyatanya perlakuan A, B, C, dan D terhadap PBB disebabkan konsumsi ransum masing-masing perlakuan juga berbeda tidak nyata sesuai dengan pendapat Wahyu (1997) bahwa PBB dipengaruhi oleh jumlah

ransum yang dikonsumsi dan kualitas dari ransum. Selanjutnya Siregar (1980) menyatakan bahwa pertambahan bobot badan dipengaruhi oleh jumlah ransum yang dikonsumsi, semakin tinggi tingkat konsumsi ransum, semakin tinggi pula pertambahan bobot badan yang dihasilkan dan sebaliknya semakin rendah konsumsi maka semakin rendah pula pertambahan bobot badan. Dijelaskan lebih lanjut bahwa kualitas, kuantitas dan cara pemberian pakan juga mempengaruhi berat badan.

Berbeda tidak nyata Pertambahan Bobot Badan perlakuan A, B, C dan D disebabkan penggunaan kedelai yang telah mengalami fermentasi, sesuai dengan pendapat Winarno dan Fardiaz (1980) yang menyatakan bahwa bahan yang mengalami fermentasi kualitasnya akan lebih baik. Ditambahkan oleh Saono (1988) yang menyatakan bahwa bahan yang mengalami fermentasi memiliki daya cerna yang tinggi dan menghilangkan senyawa racun. Untuk itu perlakuan yang menggunakan produk fermentasi ini mudah diserap oleh ternak terlihat dari Pertambahan Bobot Badan yang tidak berbeda dengan Pertambahan Bobot Badan ransum kontrol.

D. Bungkil Kedelai (Soybean Meal (SBM))

Bungkil kedelai merupakan limbah pembuatan minyak kedelai, mempunyai kandungan protein $\pm 42,7\%$ dengan kandungan energi metabolisme sekitar 2240 kkal/Kg, kandungan serat kasar rendah, sekitar 6%. Tetapi kandungan methionin rendah. Penggunaan bungkil kedelai dalam ransum ayam dianjurkan tidak melebihi 40%, sedang kekurangan methionin dapat dipenuhi dengan tepung ikan atau methionin buatan pabrik (Sutardi, 1997).

Bungkil kedelai adalah produk hasil ikutan penggilingan biji kedelai setelah diekstraksi minyaknya secara mekanis (*Ekspeller*) atau secara kimia (*Solvent*). Bungkil kedelai yang dihasilkan secara mekanis lebih banyak mengandung minyak dan serat kasar, serta lebih sedikit kandungan proteinnya dibandingkan dengan bungkil kedelai yang dihasilkan dengan menggunakan larutan hexan (Sutardi, 1997). Bungkil kedelai dihasilkan dari gilingan ampas kedelai setelah diambil seluruh minyaknya. Komposisi nutrisi bungkil kedelai sangat beragam tergantung pada jumlah hull atau serpihan kulit ari (sekam) yang ditambahkan kembali kedalam ampas kedelai serta sisa minyak yang masih tertinggal (Julisti, 2010).

Bungkil kedelai ini mensuplai hampir 25% kebutuhan protein pada unggas. Dibandingkan dengan sumber protein nabati lainnya kedelai mengandung lisin yang tinggi, namun memiliki pembatas tripsin yang oleh banyak ahli dipandang sebagai inhibitor proteolitik yang paling penting dalam pakan unggas karena menyebabkan ketersediaan beberapa asam amino esensial terutama lisin dan argin menjadi berkurang (Renner *et al.*, 1993).

Sekitar 50 % protein untuk pakan unggas berasal dari bungkil kedelai dan pemakaiannya untuk pakan ayam pedaging berkisaran antara 15–30%, sedangkan untuk pakan ayam petelur berkisaran antara 10-25% (Wina, 1999). Kandungan protein bungkil kedelai mencapai 43–48% bungkil kedelai juga mengandung zat antinutrisi seperti tripsin inhibitor yang dapat mengganggu pertumbuhan unggas, namun zat anti nutrisi tersebut akan rusak oleh pemanasan sehingga aman untuk digunakan sebagai pakan unggas (Boniran, 1999).

Bungkil kedelai mempunyai sumber protein yang cukup tinggi terutama untuk protein kasarnya, sehingga kurang baik jika diberikan terlalu banyak. Kedelai mentah mengandung beberapa penghambat tripsin. Penghambat tripsin ini (antitripsin) tidak tahan panas, sehingga bungkil kedelai yang mengalami proses pemanasan terlebih dahulu tidak menjadi masalah dalam penyusunan ransum untuk unggas. Kualitas bungkil kedelai ditentukan oleh cara pengolahan. Pemanasan yang terlalu lama dapat merusak kadar lisin (Cisarua, 2009).

E. Tinjauan Al-Quran Dalam Binatang Ternak Dan Tumbuhan

Ternak hewan piara yang kehidupannya yakni mengenai tempat, perkembang biakan serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia dan pemelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia (UU pokok kehewan No 6, 1967). Binatang ternak merupakan binatang yang istimewa bahkan Allah juga mengistimewakan binatang ternak. Hal tersebut dapat dilihat bahwa ayat-ayat yang berhubungan dengan ternak banyak disebutkan dalam Al-quran, salah satunya dalam QS. Al-Mukminum ayat 21 yang berbunyi:

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۚ نُسَقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنفَعٌ كَثِيرٌ ۖ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

Terjemahnya:

“Dan Sesungguhnya pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu, Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan (juga) pada binatang-binatang ternak itu terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian daripadanya kamu makan.”

Ayat diatas menjelaskan bahwa sesungguhnya pada binatang-binatang terdapat ibrah bagi manusia. Ibrah dapat ditafsirkan sebagai pelajaran atau tanda

bagi manusia. Hal ini berarti bahwa kita sebagai manusia mengeksplorasi segala sesuatu yang ada pada binatang ternak melalui pengamatan dan pemanfaatan binatang-binatang ternak tersebut manusia dapat memperoleh kekuasaan Allah dan karunia-Nya. (Departemen Agama RI, 2002).

Segala bentuk makhluk ciptaan Allah SWT baik itu ternak maupun tumbuh-tumbuhan yaitu tidak sia-sia diciptakan melainkan dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat manusia. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Asy-Syu'ara' ayat 7 yang berbunyi:

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿٧﴾

Terjemahnya:

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?”

Ayat diatas menjelaskan kepada kita agar mensyukuri nikmat Allah SWT karena dialah yang menurunkan air hujan dan langit yang memberi manfaat bagi manusia maupun binatang ternak ataupun makhluk lainnya untuk menghilangkan rasa haus dan dahaganya. Sebagian lainnya dapat menyiram tumbuh-tumbuhan, agar tanaman tersebut dapat tumbuh dengan subur dihampanan muka bumi ini. Sehingga dari tanaman dan tumbuh-tumbuhan, manusia dapat memanfaatkan sebagai makanan dan sebagian lainnya digunakan untuk binatang ternak sebagai bahan baku pakan ternak. Salah satu bahan baku yang digunakan pada penelitian ini adalah tepung kedelai (Departemen Agama RI, 2002)

Allah SWT juga berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 142

sebagai berikut:

وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرَشَاتٌ ۚ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ
الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٤٢﴾

Terjemahnya:

“Dan di antara hewan ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang untuk disembelih. makanlah dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.”

Dijelaskan dalam ayat ini bahwa sedikitnya ada dua fungsi pada binatang ternak (Al-An'am) yaitu pertama binatang ternak sebagai alat angkut atau alat transportasi (Hamulatan) seperti kuda, sapi, dan keledai. Fungsi yang kedua yaitu binatang ternak sebagai bahan makanan (Farsya). Kata (Farsya) yang dimaknai sebagai ternak-ternak kecil karena tubuhnya hampir menyentuh dengan tanah, dan dapat disembelih yaitu seperti kambing, domba dan sapi. Sejalan dengan penafsiran yang dikemukakan dalam penjelasan di atas, bahwa ayam termasuk kategori farsya karena dapat disembelih dan dagingnya dapat dimakan (Departemen Agama RI, 2002).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus-09 September 2016, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif karena penelitian dilakukan secara ilmiah, berdasarkan fakta, serta menggunakan hipotesis. Penelitian ini dilakukan selama 4 minggu yang bertempat di Laboratorium Unggas Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

B. Bahan dan Alat

1. Bahan

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah ayam broiler berumur sehari (*Day Old Chicken*) strain *Cobb 500* di produksi oleh PT Satwa Indo Perkasa sebanyak 75 ekor. Vaksin starain ND *Hitchner B1*, serbuk gergaji dan desinfektan prima *Cuats-30*. Ransum yang digunakan dalam penelitian ini adalah ransum dari 0-28 hari dalam bentuk tepung.

2. Alat

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini, ember, gasolek, lampu pijar 11 watt, lap, sapu, semprotan, tabung gas, tempat ransum, tempat air minum, termometer, timbangan 5 kg dan timbangan 20 kg.

3. Kandang

Kandang yang digunakan adalah kandang sistem *litter* (beralaskan sekam padi), yang terdiri dari 25 petak yang berukuran 60cm x 60cm x 70 cm (panjang x lebar x tinggi) per petaknya dan pada setiap petak diisi 3 ekor ayam. Setiap petak kandang dilengkapi dengan satu tempat pakan, tempat air minum dan pemanas (*brooder*) yang digunakan pada penelitian ini adalah gasolek. *Brooder* digunakan sampai ayam berumur 10 hari.

C. Perancangan Penelitian

1. Rancangan Penelitian

Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL). Perlakuan dilakukan sebanyak 5 kali dengan pengulangan sebanyak 5 kali sehingga terdapat 25 unit percobaan. Setiap unit percobaan (tiap kandang) diisi 3 ekor ayam. Setiap perlakuan dalam penelitian dirancang dengan rancangan sebagai berikut :

Perlakuan 1 (P_1) : Ransum campuran 80 % + SBM 20% + FFS 0%

Perlakuan 2 (P_2) : Ransum campuran 80 % + SBM 15% + FFS 5%

Perlakuan 3 (P_3) : Ransum campuran 80 % + SBM 10% + FFS 10%

Perlakuan 4 (P_4) : Ransum campuran 80 % + SBM 15% + FFS 5 %

Perlakuan 5 (P_5) : Ransum campuran 80 % + SBM 0% + FFS 20 %

Adapun komposisi ransum ayam broiler yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Komposisi Ransum Ayam Broiler umur 0-28 hari.

Bahan Pakan	Perlakuan (%)				
	P1	P2	P3	P4	P5
Jagung	55	54	54	54	53
Polard	6	6	6	6	5
Bungkil Kelapa	4	4	4	4	6
Tepung Ikan	5	5	5	5	4
Tepung Daging dan Tulang	8	9	9	9	10
Minyak	1	1	1	1	1
SBM	20	15	10	5	0
FFS	0	5	10	15	20
Premix	1	1	1	1	1
PK (%)	21,79	21,88	21,56	21,23	21,11
EM (kkal/kg)	2882,9	2902,2	2930,2	2958,2	2965,5
LK (%)	5,33	6,26	7,14	8,02	9,00
SK (%)	3,67	3,65	3,64	3,63	3,74
Ca (%)	1,28	1,38	1,37	1,36	1,40
P (%)	0,84	0,87	0,84	0,81	0,79

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian, 2016.

Adapun kandungan nutrisi pada kedelai utuh (*full fat soya*) dan bungkil kedelai adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Kandungan Nutrisi Antara *Full Fat Soya* (FFS) dan Bungkil Kedelai

Kandungan Nutrisi	Bahan Baku	
	<i>Full Fat Soya</i> (FFS)	Bungkil Kedelai
Protein (%)	36.08	42.7
Serat Kasar (%)	5.76	6
Lemak (%)	18.46	0.9
EM (kkal/kg)	2800	2240

Sumber: Yuwanta, (2000)

2. Tahapan Pembuatan KDSG

Proses pembuatan tepung kedelai dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Memilih biji kedelai yang kualitasnya lebih baik seperti berukuran besar, tidak cacat, berwarna seragam (putih, kekuning-kuningan). Menurut anonim (2012), Biji kedelai terdiri dari 7,3% kulit, 90,3% kotiledon (isi atau daging kedelai) dan 2,4% hipokotil.
- b. Melakukan terlebih dahulu proses penggorengan/menyangrai biji kedelai tersebut selama \pm 2 jam agar kandungan anti tripsinnya hilang yang dapat mengganggu kerja enzim.
- c. Kemudian didinginkan beberapa jam, lalu melakukan proses penggilingan sehingga menghasilkan tepung kedelai.

D. Prosedur Penelitian

Dalam tahapan penelitian terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan meliputi, persiapan, pemeliharaan dan panen. Persiapan yang dilakukan pada penelitian ini adalah pembuatan tepung kedelai dan pembersihan kandang. Proses pembuatan tepung kedelai disesuaikan dengan tahapan pembuatan kedelai di atas.

Sebelum *Day old chicken* (DOC) masuk, terlebih dahulu seluruh bagian kandang dibersihkan dengan sapu dan disiram dengan air deterjen. Air deterjen ini berfungsi untuk melarutkan sisa-sisa kotoran kandang. Kandang diberi kapur, pengapuran kandang bertujuan untuk mengurangi kelembaban dan mencegah tumbuhnya jamur. Selanjutnya kandang disucihamakan dengan desinfektan prima *Cuats-30* dengan cara disemprotkan untuk membunuh

bibit penyakit dan bakteri patogen yang ada dalam kandang. Dosis desinfektan adalah sebanyak 1 sendok takar (10 ml) dalam 5 liter air.

Kandang ditaburi sekam dengan ketebalan 5-7 cm kemudian pemasangan tirai di sekeliling kandang. Peralatan kandang yang dipersiapkan sebelum anak ayam datang adalah tempat makan, tempat air minum, dan pemanas. Pemanas yang digunakan adalah gasolek dan lampu pijar 11 watt sebanyak 2 buah dipasang diatas kandang. Gasolek digunakan hingga anak ayam berumur 0-10 hari dan lampu pijar digunakan anak ayam sampai berumur 28 hari, pemanas dinyalakan hanya pada malam hari. Penentuan kelompok ayam dan penentuan letak kandang dilakukan secara acak dan untuk memudahkan pencatatan masing-masing kandang diberi tanda sesuai dengan perlakuan yang diberikan.

Anak ayam yang baru datang diberi minum air gula yang telah disiapkan selama dua jam pertama sebagai sumber energi untuk memulihkan kondisi anak ayam akibat stres pengangkutan. Anak ayam kemudian ditimbang dan dikelompokan dengan cara pengacakan berdasarkan bobot badan awal. Sebelum anak ayam dimasukkan kedalam kandang perlakuan, pastikan *Brooder* sudah dipasang dan lampu pijar sudah dinyalakan. Setelah itu, anak ayam yang sudah ditimbang dimasukkan ke dalam kandang perlakuan. Beberapa jam kemudian, anak ayam diberi ransum perlakuan sedikit demi sedikit yang ditaburkan di atas koran selama tiga hari agar anak ayam mulai mengenal ransum. Sampai dengan umur satu minggu (7 hari) pakan diberikan melalui nampan. Pakan diberikan *ad libitum* (sesuai kebutuhan)

dengan pola pemberian bertahap (sedikit demi sedikit). Menginjak minggu kedua, ayam sudah mulai dilatih menggunakan tempat pakan gantung.

Ransum dan air minum diberikan secara *ad libitum* selama 3 kali sehari, pagi pada pukul 07.00 WITA, siang pukul 12.00 WITA dan sore pukul 16.00 WITA. Untuk pencegahan penyakit ND, dilakukan vaksinasi dengan menggunakan vaksin starain ND *Hitchner* B1 melalui tetes mata pada umur tiga hari. Vaksin starain ND *Hitchner* B1 diberikan pada umur lima belas hari melalui air minum. Setelah pemeliharaan berlangsung, pengambilan data dilakukan tiap minggu dengan mengukur konsumsi ransum, penambahan berat badan, konversi pakan, dan mortalitas. Jadi, total data yang didapat adalah empat karena pemeliharaan berlangsung selama 4 minggu.

E. Parameter Diamati dan Diukur

Parameter yang diamati dan diukur dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Konsumsi Ransum

Konsumsi ransum dihitung dengan menimbang ransum yang diberikan dan sisa ransum setiap minggu. Konsumsi ransum per ekor per minggu dihitung dengan rumus sebagai berikut (Haerunnisa, 2008):

$$\text{Konsumsi pakan (gr/ekor/minggu)} = \frac{\text{Ransum diberikan (gr)} - \text{Ransum disisa (gr)}}{\text{jumlah ayam}}$$

2. Pertambahan Bobot Badan

Pertambahan bobot badan setiap minggu diukur dengan menimbang ayam pada akhir minggu. Pertambahan bobot badan per ekor per minggu dihitung dengan rumus sebagai berikut (Haerunnisa, 2008):

$$PBB = BB_t - (BB_{t-1})$$

Keterangan :

PBB = Pertambahan bobot badan

BB_t = Bobot badan akhir minggu

BB_{t-1} = Bobot badan awal

3. Konversi Ransum

Perhitungan konversi ransum dihitung dengan rumus adalah sebagai berikut (Haerunnisa, 2008):

$$\text{Konversi ransum (gr/ekor/minggu)} = \frac{\text{konsumsi ransum (gr/ekor)}}{\text{pertambahan bobot badan (gr/ekor)}}$$

4. Mortalitas

Perhitungan mortalitas dihitung dengan rumus adalah sebagai berikut (Haerunnisa, 2008):

$$\text{Mortalitas (\%)} = \frac{\text{Jumlah ayam yang mati}}{\text{jumlah total yang di pelihara}} \times 100$$

5. Income Over Feed Cost (Pendapatan Kotor)

Perhitungan pendapatan kotor dihitung dengan rumus adalah sebagai berikut (Muis dkk, 2010):

$$\text{Pendapata kotor (Rp)} = \text{Total Pemasukan (Rp)} - \text{Total Pengeluaran (Rp)}$$

F. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan sidik ragam (ANOVA) berdasarkan rancangan acak lengkap (RAL) dengan model matematika sebagai berikut (Hanafiah, 2004) :

$$Y_{ij} = \mu + \tau_i + \varepsilon_{ij}$$

Keterangan :

Y_{ij} = Hasil pengamatan dari perubahan pada penggunaan *full fat soya* (FFS) sebagai substitusi bungkil kedelai ke-i dengan ulangan ke-j

μ = Rata-rata pengamatan

τ_i = Pengaruh perlakuan i

ϵ_{ij} = Pengaruh galat percobaan dari perlakuan ke-i dan ulangan ke-j

dimana :

i = 1, 2, dan 3

j = 1, 2, dan 3

Apabila terdapat perbedaan antar perlakuan dari data yang dianalisis maka diuji lanjut dengan Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) taraf 5% (Hanafiah, 2004).

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Hasil penelitian selama 28 hari yang mencakup konsumsi ransum, penambahan bobot badan, konversi ransum, dan mortalitas pada ayam broiler adalah Tabel 10 sebagai berikut:

Tabel 10. Data Hasil Penelitian

Parameter yang Diukur	Perlakuan				
	P1	P2	P3	P4	P5
Rataan Konsumsi Ransum(gr/ekor/minggu)	580.08 ^a	315.33 ^b	488.16 ^a	509.16 ^a	500.75 ^a
Rataan Pertambahan Bobot Badan (gr/ekor/minggu)	279 ^a	149 ^b	266.5 ^a	242.15 ^a	279.5 ^a
Rataan Konversi Ransum(gr/ekor/minggu)	2.08 ^a	2.12 ^a	1.83 ^a	2.10 ^a	1.79 ^a
Rataan Mortalitas (%)	2.67 ^a	0.00 ^a	0.00 ^a	1.33 ^a	0.00 ^a
Rataan Pendapatan Kotor (Rp)	3,215 ^a	-198 ^b	3,384 ^a	2,550 ^a	4,775 ^a

Keterangan: Huruf yang berbeda (a,b) pada baris yang sama menunjukkan perbedaan yang nyata ($P < 0,05$).

P1 (Ransum 80% + SBM 20% + FFS 0%)

P2 (Ransum 80% + SBM 15% + FFS 5%)

P3 (Ransum 80% + SBM 10% + FFS 10%)

P4 (Ransum 80% + SBM 5% + FFS 15%)

P5 (Ransum 80% + SBM 0% + FFS 20%)

B. Pembahasan

1. Konsumsi Ransum

Rataan konsumsi ransum (gram/ekor/minggu) tertinggi diperoleh dari P1 (580.08) kemudian diikuti berturut-turut perlakuan P4 (509.16), R5 (500.75) dan R3 (488.16), dan P2 (315.33). Analisis sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan berpengaruh nyata terhadap konsumsi ransum broiler ($P < 0,05$).

Perbedaan antara perlakuan diuji dengan uji beda nyata terkecil taraf 5%, yang disajikan pada Tabel 10.

Hasil uji BNT menunjukkan bahwa P1 (Ransum campuran 80% + SBM 20% + FFS 0%), P3 (Ransum campuran 80% + SBM 10% + FFS 10%), P4 (Ransum campuran 80% + SBM 5% + FFS 15%), dan P5 (Ransum campuran 80% + SBM 0% + FFS 20%) tidak terdapat perbedaan yang nyata. Sedangkan P1 (Ransum campuran 80% + SBM 20% + FFS 0%), P3 (Ransum campuran 80% + SBM 10% + FFS 10%), P4 (Ransum campuran 80% + SBM 5% + FFS 15%), dan P5 (Ransum campuran 80% + SBM 0% + FFS 20%) terdapat perbedaan yang nyata dengan P2 (Ransum campuran 80% + SBM 15% + FFS 5%).

Berdasarkan data dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa konsumsi ransum P1 (Ransum campuran 80% + SBM 20% + FFS 0%) tidak berbeda nyata dengan perlakuan P4 (Ransum campuran 80% + SBM 5% + FFS 15%), P5 (Ransum campuran 80% + SBM 0% + FFS 20%), dan P3 (Ransum campuran 80% + SBM 10% + FFS 10%). Sedangkan P1 (Ransum campuran 80% + SBM 20% + FFS 0%), P4 (Ransum campuran 80% + SBM 5% + FFS 15%), P5 (Ransum campuran 80% + SBM 0% + FFS 20%), dan P3 (Ransum campuran 80% + SBM 10% + FFS 10%) jika dibandingkan dengan perlakuan P2 (Ransum campuran 80% + SBM 15% + FFS 5%) menunjukkan perbedaan yang nyata. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan ransum campuran 80% + SBM 15% + FFS 5% dalam ransum dapat menurunkan konsumsi ayam broiler.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa P1 (Ransum campuran 80% + SBM 20% + FFS 0%) relatif lebih banyak dikonsumsi oleh ayam broiler. Hal ini diduga

karena pengaruh kandungan energi metabolisme pakan yang lebih rendah dibandingkan dengan perlakuan lainnya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan energi, ayam berusaha meningkatkan konsumsi pakan. Hal ini sesuai dengan pendapat Wahyu (1997), bahwa ayam cenderung meningkatkan konsumsi pakan, jika diberi ransum yang kandungan energinya diturunkan. Ayam mengkonsumsi ransum terutama dalam rangka memenuhi kebutuhan energinya. Konsumsi akan meningkat bila ayam diberikan ransum dengan kadar energi rendah. Laju ransum dalam alat pencernaan dapat mempengaruhi jumlah ransum yang dikonsumsi, makin cepat aliran ransum dalam alat pencernaan maka makin banyak pula jumlah ransum yang dikonsumsi.

Rendahnya konsumsi pada P2 (Ransum campuran 80% + SBM 15% + FFS 5%) dengan rata-rata (315.33 gram/ekor/minggu) hal ini disebabkan karena adanya bau/aroma pada P2 yang berbeda dengan perlakuan lainnya sehingga dapat mempengaruhi tingkat palatabilitas pada ayam. Hal ini sesuai dengan pendapat Kamal (1997), yang menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya konsumsi pada broiler adalah palatabilitas, pakan yang tercemar jamur akan berlainan dengan konsumsi pakan yang tidak tercemar. Pendapat tersebut didukung pula oleh Wahyu (1997), bahwa faktor lain yang mempengaruhi konsumsi adalah palatabilitas. Palatabilitas dipengaruhi oleh bau, rasa, tekstur, dan suhu dari ransum yang diberikan.

2. Pertambahan Bobot Badan

Rataan pertambahan bobot badan (gram/ekor/minggu) tertinggi diperoleh dari P5 (279.5) kemudian diikuti berturut-turut perlakuan P1 (279), R3 (266.5)

dan R4 (242,15), dan P2 (149). Analisis sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan bobot badan ayam broiler ($P < 0,05$). Perbedaan antara perlakuan diuji dengan uji beda nyata terkecil taraf 5%, yang disajikan pada Tabel 10.

Hasil uji BNT menunjukkan bahwa P1 (Ransum campuran 80% + SBM 20% + FFS 0%), P3 (Ransum campuran 80% + SBM 10% + FFS 10%), P4 (Ransum campuran 80% + SBM 5% + FFS 15%), dan P5 (Ransum campuran 80% + SBM 0% + FFS 20%) tidak terdapat perbedaan yang nyata. Sedangkan P1 (Ransum campuran 80% + SBM 20% + FFS 0%), P3 (Ransum campuran 80% + SBM 10% + FFS 10%), P4 (Ransum campuran 80% + SBM 5% + FFS 15%), dan P5 (Ransum campuran 80% + SBM 0% + FFS 20%) terdapat perbedaan yang nyata dengan P2 (Ransum campuran 80% + SBM 15% + FFS 5%).

Berdasarkan data dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa penambahan bobot badan P5 (Ransum campuran 80% + SBM 0% + FFS 20%) tidak berbeda nyata dengan perlakuan P1 (Ransum campuran 80% + SBM 20% + FFS 0%), P3 (Ransum campuran 80% + SBM 10% + FFS 10%), dan P4 (Ransum campuran 80% + SBM 5% + FFS 15%). Sedangkan P5 (Ransum campuran 80% + SBM 0% + FFS 20%), P1 (Ransum campuran 80% + SBM 20% + FFS 0%), P3 (Ransum campuran 80% + SBM 10% + FFS 10%), dan P4 (Ransum campuran 80% + SBM 10% + FFS 10%) jika dibandingkan dengan perlakuan P2 (Ransum campuran 80% + SBM 15% + FFS 5%) menunjukkan perbedaan yang nyata. Hal ini diduga bahwa penambahan ransum campuran 80%

+ SBM 15% + FFS 5% dalam ransum dapat menurunkan pertambahan bobot badan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa P5 (Ransum campuran 80% + SBM 0% + FFS 20%) pertambahan bobot badannya lebih tinggi. Hal ini diduga karena dari hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa konsumsi pakan tertinggi yaitu pada P1 (Ransum campuran 80% + SBM 20% + FFS 0%), namun tidak berbeda nyata dengan P5 (Ransum campuran 80% + SBM 0% + FFS 20%). Tingginya konsumsi pakan pada ayam maka akan meningkatkan pula pertambahan berat badannya.

Hal ini sesuai pendapat Wahyu (1997), bahwa Pertambahan berat badan dipengaruhi oleh jumlah ransum yang dikonsumsi dan kualitas dari ransum. Ditambahkan oleh Ichwan (2004), bahwa pertambahan bobot badan dipengaruhi oleh jumlah konsumsi ransum yang dikonsumsi oleh ayam broiler. Selanjutnya Siregar (1980), menyatakan bahwa pertambahan bobot badan dipengaruhi oleh jumlah ransum yang dikonsumsi, semakin tinggi tingkat konsumsi ransum, semakin tinggi pula pertambahan bobot badan yang dihasilkan dan sebaliknya semakin rendah konsumsi maka semakin rendah pula pertambahan bobot badan. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Subuh *et al.*, (2002), yang menyatakan bahwa penggunaan kedelai utuh (*Full fat Soya*) dari perlakuan kontrol sampai pada perlakuan menggunakan 20% *Full fat Soya* berat badan broiler terus meningkat.

Rendahnya pertambahan bobot badan pada P2 (Ransum campuran 80% + SBM 15% + FFS 5%) dengan rata-rata (149 gram/ekor/minggu) hal ini

kemungkinan disebabkan karena penggunaan kedelai utuh (*Full fat soya*) yang terlalu rendah yaitu 5%. Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Alsaftli *et al.*, (2015), bahwa penggunaan 10-20% kedelai utuh (*Full fat soya*) akan meningkatkan konsumsi pakan dan berat badan pada unggas. Oleh karena itu, pemanfaatan 20% kedelai utuh (*Full fat soya*) menyebabkan peningkatan kinerja pada unggas. Percobaan menegaskan bahwa menambahkan ekstrusi kedelai penuh lemak (*Full fat soya*) pada unggas telah mempengaruhi pada parameter biokimia darah, sehingga mengurangi kolesterol, trigliserida dan LDL pada lipid serum pada unggas. Ini disarankan untuk digunakan hingga 20% kedelai diekstrusi pada unggas.

Hal ini didukung oleh Wahyu (2004), bahwa ada masa pertumbuhan, ayam harus memperoleh ransum yang banyak mengandung protein, zat ini berfungsi sebagai pembangun, pengganti sel yang rusak dan berguna untuk pembentukan telur. Kebutuhan protein perhari ayam sedang bertumbuh dibagi menjadi tiga bentuk kebutuhan yaitu protein yang dibutuhkan untuk pertumbuhan jaringan, protein untuk hidup pokok dan protein untuk pertumbuhan bulu.

Hal diatas dipertegas pula oleh Scott *et al.*, (1982), bahwa keseimbangan zat-zat nutrisi terutama imbangannya energi dan protein penting karena nyata mempengaruhi pertumbuhan. Pada umumnya semua ternak unggas, khususnya ayam broiler (pedaging) termasuk golongan yang memiliki pertumbuhan cepat. Pertumbuhan ayam pedaging sangat cepat dan pertumbuhan dimulai sejak menetas sampai umur 8 minggu, setelah itu kecepatan pertumbuhan akan menurun.

3. Konversi Ransum

Rataan konversi ransum (gram/ekor/minggu) yang baik diperoleh dari P5 (1.79) kemudian diikuti berturut-turut perlakuan P3 (1.83), P1 (2.08) dan P4 (2.10), dan P2 (2.12). Analisis sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan tidak berpengaruh nyata terhadap konversi ransum broiler ($P > 0,05$).

Berdasarkan data dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa perlakuan P5 (Ransum campuran 80% + SBM 0% + FFS 20%), P3 (Ransum campuran 80% + SBM 15% + FFS 5%), P4 (Ransum campuran 80% + SBM 5% + FFS 15%), P2 (Ransum campuran 80% + SBM 15% + FFS 5%), dan P1 (Ransum campuran 80% + SBM 20% + FFS 0%) tidak terdapat perbedaan yang nyata. Rataan konversi P5 lebih rendah dibandingkan perlakuan lainnya dengan nilai 1,79. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan ransum campuran 80% + SBM 0% + FFS 20% lebih efisien digunakan dalam ransum karena dapat menurunkan konversi ayam broiler. Hal ini juga dapat dipengaruhi oleh tingkat pencernaan ayam broiler yang cukup baik terhadap ransum yang diberikan. Hal ini diduga bahwa kedelai utuh (*Full fat soya*) memiliki daya cerna yang baik. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Ruitz *et al.*, (2004), bahwa terdapat efek yang positif dari proses ekstrusi pada pencernaan asam amino. Sedangkan penelitian yang telah dilakukan Michele *et al.*, (1999), bahwa adanya suhu yang tinggi selama ekstrusi, koefisien asam amino dicerna meningkat, hal ini menunjukkan penghancuran terhadap inhibitor tripsin dan faktor antinutritisi lain yang dapat mempengaruhi penyerapan asam amino. koefisien asam amino cerna

untuk kedelai bebas liktin cenderung konsisten lebih tinggi dari kedelai konvensional tetapi perbedaannya tidak signifikan.

Hal ini sesuai dengan pendapat Anggorodi (1980), menyatakan bahwa nilai konversi ransum dapat dipenuhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah suhu lingkungan, laju perjalanan ransum melalui alat pencernaan, bentuk fisik, dan konsumsi ransum. Hal ini di dukung oleh Wiradisastra (1986), bahwa nilai suatu ransum selain ditentukan oleh nilai konsumsi ransum dan tingkat pertumbuhan bobot badan juga ditentukan oleh tingkat konversi ransum, dimana konversi ransum menggambarkan banyaknya jumlah ransum yang digunakan untuk pertumbuhan ayam broiler.

4. Mortalitas

Tingkat kematian pada penelitian ini yang baik diperoleh pada P2 (0.00%), P3 (0.00%), dan R5 (0.00%) kemudian diikuti berturut-turut perlakuan dan P4 (1.33%), dan P1 (2.67%). Analisis sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan tidak berpengaruh nyata terhadap mortalitas broiler ($P > 0,05$).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa tingkat mortalitas yang baik adalah berturut-turut pada P2 (0.00%), P3 (0.00%), P5 (0.00%), P4 (1.33%), dan P1 (2.67%). Hal ini secara keseluruhan tingkat mortalitas selama penelitian adalah 4% dapat dikatakan bahwa penelitian ini berhasil karena tingkat kematiannya berada pada batas normal. Hal ini sesuai dengan pendapat Bell dan Weaver (2002), yang menyatakan bahwa pemeliharaan ayam broiler dinyatakan berhasil jika angka kematian secara keseluruhan kurang dari 5%. Angka

mortalitas dipengaruhi oleh umur. Ayam broiler umur 5-8 minggu memiliki tingkat mortalitas yang lebih tinggi dibandingkan umur 2-4 minggu.

5. *Income Over Feed Cost* (Pendapatan Kotor)

Pada Table 10 dapat dilihat *Income Over Feed Cost* P5 (Rp 4,775) lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan P3 (Rp 3,384), P1 (Rp 3, 215), dan P4 (Rp 2,550) namun tidak berbeda nyata. Tetapi jika di bandingkan dengan P2 (Rp -198) terdapat perbedaan yang nyata ($P < 0,05$). Hal ini disebabkan karena di dalam ransum P5 (Rp 4,775) menggunakan kedelai utuh (*full fat soya*) pengganti bungkil kedelai yang memberikan performa yang tinggi atau memberikan berat badan yang tinggi sehingga memberikan nilai jual ayam yang tinggi. Harga kedelai utuh (*full fat soya*) jauh lebih murah dibandingkan harga bungkil kedelai sehingga harga ransum akan lebih murah dan *income over feed cost*nya juga lebih tinggi. Rendahnya *income over feed cost* pada P2 disebabkan karena berat badan rendah yang tersusun dari bahan pakan yang harga satuannya tinggi dan konsumsi ransumnya lebih rendah sehingga total harga ransum P2 lebih rendah.

Hal ini sesuai dengan pendapat Sardar (2009), yang menyatakan bahwa kedelai *Full fat* lokal bisa menjadi ekonomis dan memberikan keuntungan bagi industri unggas di wilayah Kurdistan, serta secara keseluruhan di Irak dengan pakan alternatif berbahan lokal dan diproses untuk digunakan sebagian oleh produsen sebagai pakan broiler bukan pakan impor seperti bungkil kedelai.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

1. Bungkil kedelai dapat di substitusi dengan tepung kedelai utuh (*Full Fat Soya*) karena dapat dilihat dari performa broiler bahwa tidak berpengaruh nyata ($P>0,05$) kecuali pada P2.
2. Hal ini juga dapat dilihat dari hasil *Income over feed cost* menunjukkan bahwa tidak berpengaruh nyata ($P>0,05$) kecuali pada P2.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan untuk menggunakan kedelai utuh (*Full Fat Soya*) dalam ransum broiler hingga 20%.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisarwanto. 2005. *Budidaya Dengan Pemupukan yang Efektif Dan Pengoptimalan Peran Bintil Akar Kedelai*. Jakarta. Penebar Swadaya.
- Alsaftli, Z.A, Alsaadi, M.A, and Subuh ,A.M. 2015. *Effect of Using Extruded Full-Fat Soybean on Performance and Carcass Characteristics in Female Turkeys*. Asian Journal of Animal Sciences, 9: 198-207.
- Amrullah, I. K. 2004. *Manajemen Ternak Ayam Broiler*. Bogor. IPB-Press.
- Anggorodi, R. 1980. *Ilmu Makanan Ternak Umum*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- _____. 1985. *Ilmu Makanan Ternak Unggas*. Jakarta. UI-Press.
- _____. 1995. *Ilmu Makanan Ternak Unggas*. Kemajuan Mutakhir dalam Ilmu Makanan Ternak Unggas. Jakarta. Penerbit Universitas Indonesia.
- Anonim. 1994 *Pendahuluan*. <http://micksihite.blogspot.com/p/laporan-semester-praktikum-produksi.html>. Diakses pada tanggal 07 Januari 2016.
- _____. 2010. *Memilih kedelai yang baik*. <http://dewey.petra.ac.id>. Diakses 07 Januari 2016.
- _____. 2012. *Kandungan Nutrisi Tepung Kedelai*. [http:// digilib. unila.ac. id/1308/8/BAB%20II.pdf](http://digilib.unila.ac.id/1308/8/BAB%20II.pdf). Di akses tanggal 21 Januari 2016.
- Ardana, I. B. K. 2009. *Ternak Broiler*. Edisi I., Cetakan I. Denpasar. Swasta Nulus.
- Bahri, S. dan Tarmudji. 1984. *Keracunan Sianida pada Ternak dan Cara Mengatasinya*. Wartzoa Vol 1 No 3. Bogor. Hal : 61-64.
- Bell, D. D. and W. D. Weaver Jr. 2002. *Commercial Chicken Meat and Egg Production. 5th Ed.* Springer Science Business Media, Inc., New York.
- Boniran, S. 1999. *Quality Control Untuk Bahan Baku dan Produk Akhir Pakan Ternak*. Kumpulan Makalah Feed Quality Management Workshop American Soybean Association dan Balai Penelitian Ternak. hlm 2-7.
- Card, L. E and Nesheim. 1982. *Poultry Production*. 7 th Ed. New York. Lea and Febinger, Philadelphia.

- Cherry. 1982. *Turmeric (Curcuma longa) Root Powder And Mannan oligosaccharides as Alternatives to Antibiotics in Broiler Chicken Diets. J Anim Sci* 16(10):1495-1499.
- Cisarua. 2009. *Bungkil Kedelai*. <http://cisaruafarm.com/posting/bahan-baku-pakan/bungkil-kedelai/> . Di akses 07 Januari 2016.
- Daghir, N. J. 1998. *Poultry Production in Hot Climates*. CAB International, Wallingford. 4, 68, 72. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- Departemen Agama RI. 2002. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta Utara. CV Darus Sunnah.
- Dourado, L. R. B., Pascoal, L. A. F., Sakomura, N. K., Costa, F. G. P., Biagiotti, D. 2011. *Soybeans (Glycine max) and Soybean Products in Poultry and Swine Nutrition*. p. 175 – 190. In
- Fadilah. 2004. *Beternak Ayam Broiler*. Jakarta. Penebar Swadaya.
- Fadillah, R., A. Polana., S. Alam., & E. Parwanto. 2007. *Sukses Beternak Ayam Broiler*. Jakarta. Agromedia Pustaka.
- Fuller, H. L., W.M. Kirland, & L.W. Chaney. 1993. *Method of Delaying Seksual Maturity of Pullets Restricted Energy Consumption*. *Poult.Sci.* 53:229-236.
- Ginting, K. 2013. <http://kartianiginting.co.id/2013/05/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.html>. Diakses 07 Januari 2016.
- Gomez, K. A dan A. A Gomez. 1995. *Prosedur Statistik untuk Penelitian Pertanian. Edisi Kedua*. Jakarta. Universitas Indonesia Press.
- Haerunnisa, A.S. 2008. *Performa Broiler yang Mendapat Ransum Bersuplemen Cr Organic dan Dipelihara pada Kepadatan Kandang yang Berbeda*. Skripsi Peternakan. Program Strudi Ilmu Nutrisi dan Makanan Ternak, Fakultas Peternakan. Institut Pertanian Bogor.
- Hanafiah A. K. 2010. *Rancangan Percobaan. Teori dan Aplikasi*. Palembang. Rajawali Press.
- Hunton, P. 1995. *Poultry Production. Enviromental Factor Involved in Growth and Develompment*. Amsterdam. Elsevier.

- Julisti, B. 2010. *Pengujian Mutu Bungkil Kedelai*. <http://btagallery.blogspot.com/2010/04/pengujian-mutu-bungkil-kedelai.html>. diakses 07 Januari 2016.
- Kamal, M., 1997. *Kontrol Kualitas Pakan Ternak. Laboratorium Makanan Ternak Jurusan Nutrisi dan Makanan Ternak*. Yogyakarta. Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada.
- Machado, F. P. P., Queiroz, J. H., Oliveira, M. G. A., Piovesan, N. D., Peluzio, M. C. G., Costa, N. M. B., Moreira, M. A. 2008. *Effects of Heating on Protein Quality of Soybean Flour Devoid of Kunitz Inhibitor and Lectin*. *Food Chemistry*, 107: 649–655.
- Michele, W. D, Parson, C. M., Hymowitz, T. (1999): *Nutritional Evaluation of Lectin-Free Soybeans for Poultry*. *Poultry Science*, 78: 91–95.
- Muis. H. I. Martaguri dan Mirnawati. 2010. *Teknologi Bioproses Ampas kedelai Untuk Meningkatkan Daya Gunanya* . Artikel PenSebagai Pakan Unggas. Laporan Penelitian Fundamental DIKTI 2010.
- Murtidjo, B.A. 1987. *Pedoman Beternak Ayam Broiler*. Yogyakarta. Kanisius
- Northe. 1984. *Sedimen Analysis*. In: Holme NA, McIntyre AD, editors. *Methods*.
- NRC. 1994. *Nutrient Requirement of Poultry*. 9thEd. National Academy of Science. Washington DC.
- Perilla, N.S., Cruz, M.P., De Belalcazar, F., Diaz, G. J. (1997): *Effect Of Temperature of Wet Extrusion on the Nutritional Value of Full-Fat Soyabeans for Broiler Chickens*. *British Poultry Science*, 38: 412-416.
- Prasetyono, B.W.H.E. 2008. *Rekayasa Suplemen Protein pada Ransum Sapi Pedaging Berbasis Jerami dan Dedak Padi*. Bogor. Program Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor, (Disertasi Doktor Peternakan).
- Qin, G., ter Elst, E. R., Bosch, M. W., van der Poe, A.F.B. 1996. *Thermal Processing of Whole Soya Beans: Studies on the Inactivation of Antinutritional Factors and Effects on Ileal Digestibility in Piglets*. *Animal Feed Science Technology*, 57: 313-324.
- Rasyaf, M. 1992. *Beternak Ayam Petelur*. Jakarta . Penebar Swadaya.
- _____ 1994. *Bahan Makanan Unggas di Indonesia*. Cetakan ke-9. Yogyakarta Penerbit Kanisius.
- _____ 1995. *Menajemen Beternak Ayam Broiler*. Jakarta. Penebar Swadaya.

- _____. 2000. *Beternak Ayam Pedaging*. Jakarta. Penebar Swadaya.
- Renner, R., D.R. Clandinin, and A.R. Robblee. 1993. *Action of Moisture on Damage Done During Over-Heating of Soybean Oil Meal*. Poultry Sci. 32: 582-585.
- Rizal, Y. 2006. *Ilmu Nutrisi Unggas*. Padang. Andalas University Press.
- Rohmad. 2014. *Nilai Nutrisi Tepung Gaplek-Kedelai Sebagai Pengganti Jagung dalam Ransum Ayam Pedaging Periode Starter*. Jurnal Cendekia Vol 12 No 2 Mei 2014.
- Ruiz, N., de Belalcázar, F., Díaz, G. J.(2004): *Quality Control Parameters for Commercial Full-Fat Soybeans Processed by Two Different Methods and Fed to Broilers*. J. Appl. Poult. Res., 13: 443–450.
- Saono, S. 1988. *Pemanfaatan Jasad Renik dalam Hasil Sampingan atau Sisa-sisa Produk Pertanian*. Berita LIPI. 18 (4) : 1-11.
- Scott, M. L., M. C. Nesheim & R. J. Young. 1982. *Nutrition of the Chicken*. 3rd Ed. ML. Scott and ASS, Ithaca.
- Siregar, 1980. *Pemanfaatan Bahan Non Konvensional Sebagai Pakan Ayam Broiler*. Jakarta. PT. Kanisius.
- Subuh, A.M.H., M.A. Motl, C.A. Fritts and P.W. Waldroup, 2002. *Use of Various Ratios of Extruded Fullfat Soybean Meal and Dehulled Solvent Extracted Soybean Meal in Broiler Diets*. Int. J. Poult. Sci., 1: 9-12.
- Suci, D. M., E. Mursyida, T. Setianah, & R. Mutia. 2005. *Program Pemberian Makanan Berdasarkan Kebutuhan Protein dan Energi pada Setiap Fase Pertumbuhan Ayam Broiler*. Med. Pet. 28:70-76.
- Sudaro, Y. & A. Siriwa. 2007. *Ransum Ayam dan Itik*. Cetakan IX. Jakarta. Penebar Swadaya.
- Suprijatna, E. U, Atmomarsono. R, Kartasudjana. 2005. *Ilmu Dasar Ternak Unggas*. Jakarta. Penebar Swadaya.
- Sutardi, T. 1997. *Peluang dan tantangan pengembangan ilmu – Ilmu Nutrisi Ternak*. IPB. Makalah orasi ilmiah sebagai guru besar tetap Ilmu Nutrisi Ternak pada Fakultas Peternakan.

- Tillman, A. D., H. Hartadi, S. Reksohadiprodjo, S. Prawirokusumo & S. Lehdosoekojo. 1991. *Ilmu Makanan Ternak Dasar*. Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada Press.
- Valencia, D.G., Serrano, M.R., Lazaro, R., Jiménez-Moreno, E., Mateos, G. G. 2009. *Influence of Micronization (Fine Grinding) of Soya Bean Meal And Full-Fat Soya Bean on the Ileal Digestibility of Amino Acids for Broilers*. *Animal Feed Science and Technology*, 150: 238-248.
- Wahju, J. 1985. *Ilmu Nutrisi Unggas*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- _____1997. *Ilmu Nutrisi Unggas*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta
- _____2004. *Beternak Ayam Pedaging*. Edisi Revisi. Jakarta. Penebar Swadaya.
- Wahyono, A. 2009. *Optimalkan Program Kesehatan Unggas, Investasi Aman Peternak Senang*. <http://www.vet-indo.com>. Di akses tanggal 14 Maret 2016.
- Wina. 1999. *Kualitas Protein Bungkil Kedelai: Metode Amnalisa dan Hubungannya dengan Penampilan Ayam*. Kumpulan makalah feed Quality management workshop.american soybean associationdan balai penelitian ternak.hlm 1-3.
- Winarno, F.G, Fardiaz, D. Fardiaz, 1980. *Pengantar Teknologi Pangan*. PT. Gramedia. Jakarta
- Wiradisastra, M.D.H. 1986. *Evektivitas Keseimbangan Energi dan Asam Amino dan Efisiensi Absorpsi dalam Menentukan Persyaratan Kecepatan Tumbuh Ayam Broiler*. Bogor. Disertasi, Institut Pertanian Bogor.
- Yuwanta, T. 2000. *Bahan Ajar Dasar Ternak Unggas*. Yogyakarta. Fakultas Peternakan UGM.

**L
A
M
P
I
R
A
N**

Lampiran 1. Berat Badan Ayam Selama Penelitian

1. Berat Badan (gr) Minggu I

ULANGAN	P1	P2	P3	P4	P5
I	135	135	165	165	155
II	215	165	165	200	165
III	120	110	175	215	165
IV	205	130	220	160	180
V	215	120	130	130	155
RATA-RATA	178	132	171	174	164

2. Berat Badan (gr) Minggu II

ULANGAN	P1	P2	P3	P4	P5
I	440	315	400	430	310
II	450	280	440	410	470
III	340	290	395	400	360
IV	405	270	500	450	510
V	440	210	360	390	440
RATA-RATA	415	273	419	416	418

3. Berat Badan (gr) Minggu III

ULANGAN	P1	P2	P3	P4	P5
I	895	550	805	650	710
II	800	350	695	640	850
III	650	290	760	655	660
IV	650	460	750	730	870
V	900	240	640	500	740
RATA-RATA	779	378	730	635	766

4. Berat Badan (gr) Minggu IV

ULANGAN	P1	P2	P3	P4	P5
I	1300	700	1220	1000	1095
II	1280	510	1000	1000	1245
III	1090	500	1140	1060	1060
IV	920	740	1140	1055	1300
V	1160	700	1000	900	1060
RATA-RATA	1150	630	1100	1003	1152

Lampiran 2. Uji SPSS Versi 16 Pengaruh Penggunaan *Full Fat Soya (Ffs)* Sebagai Substitusi Bungkil Kedelai Terhadap Konsumsi Ransum

Konsumsi Ransum (gr/ekor/minggu)

ULANGAN	P1	P2	P3	P4	P5
I	787.92	359.17	511.67	689.17	455.83
II	536.67	312.5	480	470.83	535
III	609.17	290.83	495	478.33	456.67
IV	455	332.5	515	490	563.75
V	511.67	281.67	439.17	417.5	492.5
RATA-RATA	580.086	315.334	488.168	509.166	500.75

Descriptives

HASIL

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
P1	5	5.8009E2	128.69835	57.55565	420.2859	739.8861	455.00	787.92
P2	5	3.1533E2	31.45635	14.06771	276.2758	354.3922	281.67	359.17
P3	5	4.8817E2	30.76726	13.75954	449.9654	526.3706	439.17	515.00
P4	5	5.0917E2	104.39341	46.68615	379.5445	638.7875	417.50	689.17
P5	5	5.0075E2	47.88261	21.41375	441.2959	560.2041	455.83	563.75
Total	25	4.7870E2	115.31089	23.06218	431.1028	526.2988	281.67	787.92

Test of Homogeneity of Variances

HASIL

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
2.338	4	20	.090

ANOVA

HASIL					
	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	192357.968	4	48089.492	7.587	.001
Within Groups	126760.478	20	6338.024		
Total	319118.447	24			

HASIL

	PERLA KUAN	N	Subset for alpha = 0.05	
			1	2
Duncan ^a	P2	5	315.3340	
	P3	5		488.1680
	P5	5		500.7500
	P4	5		509.1660
	P1	5		580.0860
	Sig.		1.000	.108

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 5.000.

Multiple Comparisons

Dependent Variable:HASIL

	(I)	(J)	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
						Lower Bound	Upper Bound
LSD	PERLA KUAN	P2	264.75200*	50.35086	.000	159.7219	369.7821
		P3	91.91800	50.35086	.083	-13.1121	196.9481
		P4	70.92000	50.35086	.174	-34.1101	175.9501
		P5	79.33600	50.35086	.131	-25.6941	184.3661
	PERLA KUAN	P1	-264.75200*	50.35086	.000	-369.7821	-159.7219
		P3	-172.83400*	50.35086	.003	-277.8641	-67.8039
		P4	-193.83200*	50.35086	.001	-298.8621	-88.8019
		P5	-185.41600*	50.35086	.001	-290.4461	-80.3859
	PERLA KUAN	P1	-91.91800	50.35086	.083	-196.9481	13.1121
		P2	172.83400*	50.35086	.003	67.8039	277.8641
		P4	-20.99800	50.35086	.681	-126.0281	84.0321
		P5	-12.58200	50.35086	.805	-117.6121	92.4481
	PERLA KUAN	P1	-70.92000	50.35086	.174	-175.9501	34.1101
		P2	193.83200*	50.35086	.001	88.8019	298.8621
		P3	20.99800	50.35086	.681	-84.0321	126.0281
		P5	8.41600	50.35086	.869	-96.6141	113.4461
	PERLA KUAN	P1	-79.33600	50.35086	.131	-184.3661	25.6941
		P2	185.41600*	50.35086	.001	80.3859	290.4461
		P3	12.58200	50.35086	.805	-92.4481	117.6121
		P4	-8.41600	50.35086	.869	-113.4461	96.6141

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Lampiran 3. Uji SPSS Versi 16 Pengaruh Penggunaan *Full Fat Soya* (FFS) Sebagai Substitusi Bungkil Kedelai Terhadap Pertambahan Berat Badan

Pertambahan Bobot Badan (gr/ekor/minggu)

ULANGAN	P1	P2	P3	P4	P5
I	316.5	166.5	296.5	241.5	265.25
II	311.5	119	241.5	241.5	302.75
III	264	116.5	276.5	256.5	256.5
IV	221.5	176.5	276.5	255.25	316.5
V	281.5	166.5	241.5	216	256.5
RATA-RATA	279	149	266.5	242.15	279.5

Descriptives

hasil								
	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
P1	5	2.7900E2	38.72983	17.32051	230.9106	327.0894	221.50	316.50
P2	5	1.4900E2	28.83141	12.89380	113.2011	184.7989	116.50	176.50
P3	5	2.6650E2	24.23840	10.83974	236.4041	296.5959	241.50	296.50
P4	5	2.4225E2	16.09542	7.19809	222.2649	262.2351	216.50	256.50
P5	5	2.7950E2	28.15415	12.59092	244.5420	314.4580	256.50	316.50
Total	25	2.4325E2	56.26042	11.25208	220.0268	266.4732	116.50	316.50

Test of Homogeneity of Variances

hasil

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
1.551	4	20	.226

ANOVA

hasil	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	60083.750	4	15020.938	18.916	.000
Within Groups	15881.875	20	794.094		
Total	75965.625	24			

hasil

perlakuan	N	Subset for alpha = 0.05	
		1	2
Duncan ^a P2	5	149.0000	
P4	5		242.2500
P3	5		266.5000
P1	5		279.0000
P5	5		279.5000
Sig.		1.000	.068

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 5.000.

Multiple Comparisons

Dependent Variable: hasil

	(I)	(J)	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
						Lower Bound	Upper Bound
LSD	P1	P2	130.0000*	17.82239	.000	92.8232	167.1768
		P3	12.50000	17.82239	.491	-24.6768	49.6768
		P4	36.75000	17.82239	.052	-.4268	73.9268
		P5	-.50000	17.82239	.978	-37.6768	36.6768
	P2	P1	-130.0000*	17.82239	.000	-167.1768	-92.8232
		P3	-117.5000*	17.82239	.000	-154.6768	-80.3232
		P4	-93.25000*	17.82239	.000	-130.4268	-56.0732
		P5	-130.5000*	17.82239	.000	-167.6768	-93.3232
	P3	P1	-12.50000	17.82239	.491	-49.6768	24.6768
		P2	117.5000*	17.82239	.000	80.3232	154.6768
		P4	24.25000	17.82239	.189	-12.9268	61.4268
		P5	-13.00000	17.82239	.474	-50.1768	24.1768
	P4	P1	-36.75000	17.82239	.052	-73.9268	.4268
		P2	93.25000*	17.82239	.000	56.0732	130.4268
		P3	-24.25000	17.82239	.189	-61.4268	12.9268
		P5	-37.25000*	17.82239	.050	-74.4268	-.0732
	P5	P1	.50000	17.82239	.978	-36.6768	37.6768
		P2	130.5000*	17.82239	.000	93.3232	167.6768
		P3	13.00000	17.82239	.474	-24.1768	50.1768
		P4	37.25000*	17.82239	.050	.0732	74.4268

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Lampiran 4. Uji SPSS Versi 16 Pengaruh Penggunaan *Full Fat Soya* (FFS) Sebagai Substitusi Bungkil Kedelai Terhadap Konversi Ransum

Konversi Ransum (gr/ekor/minggu)

ULANGAN	P1	P2	P3	P4	P5
I	2.49	2.16	1.73	2.85	1.72
II	1.72	2.63	1.98	1.95	1.77
III	2.31	2.49	1.79	1.84	1.78
IV	2.05	1.88	1.86	1.92	1.78
V	1.82	1.69	1.82	1.93	1.92
RATA-RATA	2.078	2.17	1.836	2.098	1.794

Descriptives

HASIL

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
P1	5	2.0780	.32368	.14475	1.6761	2.4799	1.72	2.49
P2	5	2.1700	.39642	.17729	1.6778	2.6622	1.69	2.63
P3	5	1.8360	.09343	.04179	1.7200	1.9520	1.73	1.98
P4	5	2.0980	.42246	.18893	1.5735	2.6225	1.84	2.85
P5	5	1.7940	.07470	.03341	1.7012	1.8868	1.72	1.92
Total	25	1.9952	.31542	.06308	1.8650	2.1254	1.69	2.85

Test of Homogeneity of Variances

HASIL

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
3.219	4	20	.034

ANOVA

HASIL					
	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	.569	4	.142	1.564	.222
Within Groups	1.819	20	.091		
Total	2.388	24			

HASIL

		N	Subset for alpha = 0.05
PERLA KUAN			
Duncan ^a	P5	5	1.7940
	P3	5	1.8360
	P1	5	2.0780
	P4	5	2.0980
	P2	5	2.1700
	Sig.		.090

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 5.000.

Multiple Comparisons

Dependent Variable:HASIL

	(I)	(J)	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
						Lower Bound	Upper Bound
LSD	PERLA KUAN	PERLA P2	-.09200	.19072	.635	-.4898	.3058
		PERLA P3	.24200	.19072	.219	-.1558	.6398
		PERLA P4	-.02000	.19072	.918	-.4178	.3778
		PERLA P5	.28400	.19072	.152	-.1138	.6818
	P2	P1	.09200	.19072	.635	-.3058	.4898
		P3	.33400	.19072	.095	-.0638	.7318
		P4	.07200	.19072	.710	-.3258	.4698
		P5	.37600	.19072	.063	-.0218	.7738
	P3	P1	-.24200	.19072	.219	-.6398	.1558
		P2	-.33400	.19072	.095	-.7318	.0638
		P4	-.26200	.19072	.185	-.6598	.1358
		P5	.04200	.19072	.828	-.3558	.4398
	P4	P1	.02000	.19072	.918	-.3778	.4178
		P2	-.07200	.19072	.710	-.4698	.3258
		P3	.26200	.19072	.185	-.1358	.6598
		P5	.30400	.19072	.127	-.0938	.7018
	P5	P1	-.28400	.19072	.152	-.6818	.1138
		P2	-.37600	.19072	.063	-.7738	.0218
		P3	-.04200	.19072	.828	-.4398	.3558
		P4	-.30400	.19072	.127	-.7018	.0938

**Lampiran 5. Uji SPSS Versi 16 Pengaruh Penggunaan *Full Fat Soya* (FFS)
Sebagai Substitusi Bungkil Kedelai Terhadap Mortalitas
Mortalitas (%)**

ULANGAN	P1	P2	P3	P4	P5
I	1.33	0	0	1.33	0
II	0	0	0	0	0
III	1.33	0	0	0	0
IV	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0
RATA-RATA	0.532	0	0	0.266	0

Descriptives

HASIL

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
P1	5	.5320	.72847	.32578	-.3725	1.4365	.00	1.33
P2	5	.0000	.00000	.00000	.0000	.0000	.00	.00
P3	5	.0000	.00000	.00000	.0000	.0000	.00	.00
P4	5	.2660	.59479	.26600	-.4725	1.0045	.00	1.33
P5	5	.0000	.00000	.00000	.0000	.0000	.00	.00
Total	25	.1596	.44111	.08822	-.0225	.3417	.00	1.33

Test of Homogeneity of Variances

HASIL

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
15.238	4	20	.000

ANOVA

HASIL					
	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	1.132	4	.283	1.600	.213
Within Groups	3.538	20	.177		
Total	4.670	24			

HASIL

	PERLA KUAN	N	Subset for alpha = 0.05
			1
Duncan ^a	P2	5	.0000
	P3	5	.0000
	P5	5	.0000
	P4	5	.2660
	P1	5	.5320
	Sig.		

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 5.000.

Multiple Comparisons

Dependent Variable:HASIL

	(I)	(J)	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
	PERLA KUAN	PERLA KUAN				Lower Bound	Upper Bound
LSD	P1	P2	.53200	.26600	.059	-.0229	1.0869
		P3	.53200	.26600	.059	-.0229	1.0869
		P4	.26600	.26600	.329	-.2889	.8209
		P5	.53200	.26600	.059	-.0229	1.0869
	P2	P1	-.53200	.26600	.059	-1.0869	.0229
		P3	.00000	.26600	1.000	-.5549	.5549
		P4	-.26600	.26600	.329	-.8209	.2889
		P5	.00000	.26600	1.000	-.5549	.5549
	P3	P1	-.53200	.26600	.059	-1.0869	.0229
		P2	.00000	.26600	1.000	-.5549	.5549
		P4	-.26600	.26600	.329	-.8209	.2889
		P5	.00000	.26600	1.000	-.5549	.5549
	P4	P1	-.26600	.26600	.329	-.8209	.2889
		P2	.26600	.26600	.329	-.2889	.8209
		P3	.26600	.26600	.329	-.2889	.8209
		P5	.26600	.26600	.329	-.2889	.8209
	P5	P1	-.53200	.26600	.059	-1.0869	.0229
		P2	.00000	.26600	1.000	-.5549	.5549
		P3	.00000	.26600	1.000	-.5549	.5549
		P4	-.26600	.26600	.329	-.8209	.2889

Lampiran 6. Income Over Feed Cost (Pendapatan Kotor)

Pendapatan Kotor (Rp)

ULANGAN	P1	P2	P3	P4	P5
I	5,205	-533	5,123	2,226	2,226
II	4,633	-2,833	1,439	2,261	5,476
III	4,343	-2,101	4,007	3,322	4,509
IV	21	1,570	3,138	2,711	5,534
V	1,873	2,905	3,214	2,231	3,005
RATA-RATA	3,215	-198	3,384	2,550	4,775

Descriptives

HASIL

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
P1	5	3.2150E3	2193.50222	9.80964E2	491.4073	5938.5927	21.00	5205.00
P2	5	-1.9840E2	2420.29395	1.08239E3	-3203.5919	2806.7919	-2833.00	2905.00
P3	5	3.5242E3	1363.67250	6.09853E2	1830.9769	5217.4231	1439.00	5123.00
P4	5	2.5502E3	477.53607	2.13561E2	1957.2607	3143.1393	2226.00	3322.00
P5	5	4.7746E3	1072.45200	4.79615E2	3442.9750	6106.2250	3005.00	5534.00
Total	25	2.7731E3	2271.68178	4.54336E2	1835.4158	3710.8242	-2833.00	5534.00

Test of Homogeneity of Variances

HASIL

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
4.020	4	20	.015

ANOVA

HASIL					
	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	6.725E7	4	1.681E7	6.061	.002
Within Groups	5.547E7	20	2773728.300		
Total	1.227E8	24			

HASIL

	PERLA KUAN	N	Subset for alpha = 0.05	
			1	2
Duncan ^a	P2	5	-198.4000	
	P4	5		2.5502E3
	P1	5		3.2150E3
	P3	5		3.5242E3
	P5	5		4.7746E3
	Sig.		1.000	.066

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 5.000.

Multiple Comparisons

Dependent Variable:HASIL

	(I)	(J)	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
						Lower Bound	Upper Bound
LSD	PERLA KUAN	PERLA P2	3413.40000*	1.05478E3	.004	1213.1627	5613.6373
		PERLA P3	-309.20000	1.05478E3	.772	-2509.4373	1891.0373
		PERLA P4	664.80000	1.05478E3	.536	-1535.4373	2865.0373
		PERLA P5	-1559.60000	1.05478E3	.155	-3759.8373	640.6373
	PERLA KUAN	PERLA P1	-3413.40000*	1.05478E3	.004	-5613.6373	-1213.1627
		PERLA P3	-3722.60000*	1.05478E3	.002	-5922.8373	-1522.3627
		PERLA P4	-2748.60000*	1.05478E3	.017	-4948.8373	-548.3627
		PERLA P5	-4973.00000*	1.05478E3	.000	-7173.2373	-2772.7627
	PERLA KUAN	PERLA P1	309.20000	1.05478E3	.772	-1891.0373	2509.4373
		PERLA P2	3722.60000*	1.05478E3	.002	1522.3627	5922.8373
		PERLA P4	974.00000	1.05478E3	.367	-1226.2373	3174.2373
		PERLA P5	-1250.40000	1.05478E3	.250	-3450.6373	949.8373
	PERLA KUAN	PERLA P1	-664.80000	1.05478E3	.536	-2865.0373	1535.4373
		PERLA P2	2748.60000*	1.05478E3	.017	548.3627	4948.8373
		PERLA P3	-974.00000	1.05478E3	.367	-3174.2373	1226.2373
		PERLA P5	-2224.40000*	1.05478E3	.048	-4424.6373	-24.1627
PERLA KUAN	PERLA P1	1559.60000	1.05478E3	.155	-640.6373	3759.8373	
	PERLA P2	4973.00000*	1.05478E3	.000	2772.7627	7173.2373	
	PERLA P3	1250.40000	1.05478E3	.250	-949.8373	3450.6373	
	PERLA P4	2224.40000*	1.05478E3	.048	24.1627	4424.6373	

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

**Lampiran 7. Perhitungan Untuk Mendapatkan *Income Over Feed Cost*
(Pendapatan Kotor)**

URAIAN	P1	P2	P3	P4	P5
I. Pemasukan					
a. Harga jual (Rp/kg)	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
b. Berat akhir ayam (kg/ekor)	1,150	0,630	1,100	1,003	1,152
A. Total Pemasukan (Rp) (IaxIb)	26,450	14,490	25,300	23,069	26,496
II. Pengeluaran					
a. Harga ransum (Rp/kg)	11.230	11.090	10.865	10.640	10.495
b. Konsumsi ransum (kg/ekor)	2,01	1,26	1,95	1,86	2,00
c. Vaksin (Rp)					
B. Total Biaya Pengeluaran (Rp) (IIaxIIb)+IIc	700	700	700	700	700
III. Pendapatan Kotor (Rp) (A-B)	3,215	-198	3,384	2,550	4,775

Lampiran 7. Pakan Yang Digunakan Selama Penelitian



Lampiran 8. Kandang Penelitian



Lampiran 9. Umur Ayam Sudah 3 Hari



Lampiran 10. Proses Pencampuran Vaksin untuk Pemberian Vaksin Tetes Mata Pada Umur 3 Hari



Lampiran 11. Umur Ayam 1 Minggu



Lampiran 12. Umur Ayam Sudah Masuk Minggu Ke-2



Lampiran 13. Umur Ayam 4 Minggu



Lampiran 14. Penimbangan Minggu Ke-4



RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Hasriani Budi. Lahir di Bone, tepatnya di Batu-Batu Desa Biru Kecamatan Kahu Kabupaten Bone pada tanggal 15 November 1994. Penulis adalah anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan suami istri Budi dan Hernawati Pendidikan yang ditempuh yaitu Sekolah Dasar 282 Biru, masuk tahun 2000 dan tamat tahun 2006. Melanjutkan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Kahu masuk tahun 2006 dan lulus tahun 2009. Penulis melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Kahu masuk tahun 2009 dan lulus pada tahun 2012. Pada tahun 2012, penulis diterima di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar melalui jalur UMM sebagai mahasiswa program Strata 1 (S1) Pada Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Ilmu Peternakan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.