

**APLIKASI BAKTERI ASAM LAKTAT (*Pediococcus acidilactici*) ASAL WHEY DANGKE PADA  
PENGAWETAN BAKSO**



**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains  
Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

**YAYU ANRIANA**  
NIM. 60300111071

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
2015**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuyu anriana  
NIM : 60300111071  
Tempat/Tgl. Lahir : Ujung pandang/4 September 1993  
Jur/Prodi : Biologi  
Fakultas : Sains dan Teknologi  
Alamat : Borong raya baru 1 Lr. B No. 4  
Judul : Aplikasi Bakteri Asam Laktat *Pediococcus acidilactici* Asal  
*Whey* Dangke pada Pengawetan Bakso

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 31 Agustus 2015  
Penyusun,

Yuyu anriana  
NIM: 60300111071

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Aplikasi Bakteri Asam Laktat *Pediococcus acidilactici* Asal *Whey* Dangke Pada Pengawetan Bakso”, yang disusun oleh Yuyu anriana, NIM: 60300111071, mahasiswa jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 11 September 2015, bertepatan dengan 27 Dzulkaidah 1436 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam ilmu Sains dan Teknologi, Jurusan Biologi (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 11 September 2015  
27 Dzulkaidah 1436 H

### DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof.Dr.H.Arifuddin.M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Dr.Cut Muthiadin,S.Si.,M.Kes	(.....)
Munaqisy I	: Dr.Mashuri Masri,S.Si.,M.Kes	(.....)
Munaqisy II	: Ar.Syarif Hidayat,S.Si.,M.Kes	(.....)
Munaqisy III	: Dr.Mustari Mustafa,S.Ag.,M.Pd	(.....)
Pembimbing I	: Fatmawati Nur,S.Si.,M.Si	(.....)
Pembimbing II	: Hafsan,S.Si.,M.Pd	(.....)

Diketahui oleh:  
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. H. Arifuddin.M.Ag  
NIP. 19691205 199303 1 001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penyusunan skripsi yang berjudul “Aplikasi Bakteri Asam Laktat *Pediococcus acidilactici* Asal Whey Dangke pada Pengawetan Bakso” dapat diselesaikan dengan baik dan dalam waktu yang diharapkan

Terselesaikannya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak. Oleh karenanya, ungkapan terima kasih khusus penulis persembahkan untuk kedua orang tua, Ayahanda Rahman dan Ibunda Nurida. Terima kasih atas segala do'a dalam setiap langkah, semangat disetiap perjuangan, dan motivasi dikala lengah. Terima kasih yang tak terhingga atas kasih sayang, pengorbanan, dan ketulusannya dalam mendampingi penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan ridho-Nya kepada keduanya. Teruntuk nenek Hj. Bau, nenek Hj. Asse, kakak Frengky Tahab, dan seluruh keluarga yang tidak sempat penulis tuliskan namanya, terima kasih atas dukungan moril dan materinya selama ini.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada:

1. Prof. Dr. H. Musafir Pabbabari, M.Si, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar beserta pembantu Rektor I, II dan III.
2. Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Alauddin Makassar beserta wakil Dekan I, II, dan III.
3. Ibu Fatmawati Nur, S.Si., M. Si selaku pembimbing I, Bunda Hafsan, S.Si., M.Pd selaku pembimbing II.

4. Dr. Mashuri Masri, S.Si., M.Kes, Ar. Syarif Hidayat, M.Kes, Dr. Mustari Mustafa, S.Ag., M.Ag. selaku penguji I, II dan III. Terima kasih telah memberikan begitu banyak saran dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Dr. Cut Muthiadin, S.Si., M.Si., Baiq Farhatul Wahidah, S.Si., M.Si., dan Muh. Rusydi Rasyid, S.Ag., M.Ag selaku penguji komprehensif.
6. Staf dosen Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu selama perkuliahan. Terkhusus Ibu Eka Sukmawati, S.Si., M.Si selaku pembimbing spesial. Terima kasih telah sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi.
6. Kakanda Zulkarnain, S.Si., M.Kes selaku laboran jurusan biologi Fakultas Sains dan Teknologi.
7. Kakanda Hasanah Aprilia selaku staf jurusan. Terima kasih atas bantuannya selama ini, telah menjadi teman, sahabat sekaligus kakak yang selalu asyik diajak bercanda.
8. Kak Fitri dan kak Safri selaku staf Laboratorium Rumah Sakit Pendidikan Unhas Makassar. Terima kasih telah bersabar mendampingi dan memberi bekal ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Untuk sahabat terkasih sejak maba hingga sekarang dan semoga akan menjadi selamanya, “TRIO DODOL”. Rahmania sari “kenyo”, Windy sahar “windol” dan Vivi A. Tumengkol “pipoy”, yang selalu memberikan keceriaan, do’a, senyuman, dan kekuatan dalam bingkai ukhawah. Kalian adalah sahabat-sahabat luar biasa, ana ukhibukki fillah, sukses selalu dalam mengejar mimpi kita masing-masing.
10. Sahabat DGDK, Dian, Else, Uni, Hikma, Uni calleda dan Nunu. Terima kasih atas do’a dan semangatnya selama ini. Meski kesibukan hendak menenggelamkan

kebersamaan, ketahuilah bahwa persahabatan bukan hanya dalam ingatan, tapi dari dalam hati. I love you guys!

11. Muh. Fajar Eka Putra Abdullah, pria yang selalu menemani selama ini. Terima kasih atas kesetiaan dan kesabarannya.

12. Keluarga besar SINAPS11S Biologi UIN 011, terima kasih untuk kebersamaannya selama ini. Apa yang terjadi selama 4 tahun perkuliahan akan selalu menjadi pengalaman yang dikenang. Karena sejak hari ini dan seterusnya kita adalah keluarga. Terkhusus untuk Nurkumala dewi, Nurfitri arfani dan Nurapni hiyadah, terima kasih atas kebersamaannya, semoga perjuangan kita mendapat berkah dari Allah Swt.

13. Dan kepada pihak-pihak lain yang telah begitu banyak membantu namun tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya bagi kita semua, terima kasih untuk bantuannya selama ini, semoga juga dapat menjadi amal ibadah di hadapan-Nya. Amin.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kesalahan dalam penyusunan skripsi ini, oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan di kemudian hari. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Makassar, 11 September 2015

Penulis

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	vi
DAFTAR ILUSTRASI .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
ABSTRAK .....	ix
ABSTRACT .....	x
BAB I       PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Ruang Lingkup Penelitian .....	3
D. Kajian Pustaka / Penelitian Terdahulu .....	4
E. Tujuan Penelitian .....	4
F. Kegunaan Penelitian .....	5
BAB II       TINJAUAN TEORITIS .....	6
A. Bakteri Asam Laktat .....	6
B. Tinjauan Umum Dangka .....	19
C. Pengawetan .....	20
D. Bakso .....	23
E. Bakteri Patogen dan Bakteri Pembusuk .....	26
F. Bakteri <i>Escherichia coli</i> .....	30
G. Pengamatan Visual pada Produk Bakso .....	31
H. Ayat yang Relevan .....	33
I. Hipotesis .....	35
J. Kerangka Pikir .....	36
BAB III       METODOLOGI PENELITIAN .....	37
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	37
B. Variabel Penelitian .....	37
C. Defenisi Operasional Variabel .....	37
D. Metode Pengumpulan Data .....	38
E. Instrumen Penenelitian (Alat dan Bahan) .....	38
F. Prosedur Kerja .....	39
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	41

BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN .....	43
	A. Hasil Penelitian .....	43
	B. Pembahasan .....	46
BAB V	PENUTUP.....	62
	A. Kesimpulan .....	62
	B. Implikasi Penelitian (Saran) .....	62
KEPUSTAKAAN.....		63
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....		70
ALUR KERJA .....		74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Kombinasi perlakuan antara kadar bakteriosin dan masa simpan .....	42
Tabel 4.1. Jumlah koloni kultur kerja BAL .....	43
Tabel 4.2. Hasil analisa total mikroba bakso sebelum masa simpan .....	44
Tabel 4.3. Hasil analisa total mikroba setelah masa simpan .....	44
Tabel 4.4. Hasil analisis total <i>E. coli</i> setelah masa simpan .....	45
Tabel 4.5. Pengamatan visualisasi bakso selama masa simpan .....	45

## DAFTAR ILUSTRASI

Gambar 2.1 <i>Eschericia coli</i> .....	31
Gambar 2.2 Bentuk <i>Eschericia coli</i> .....	31
Gambar 4.1 Analisis pH kultur .....	43
Gambar 4.2. Struktur bakso setelah penyimpanan 2 hari pada suhu ruang .....	45

## ABSTRAK

**Nama** : Yuyu Anriana  
**NIM** : 60300111071  
**Judul Skripsi** : Aplikasi Bakteri Asam Laktat (*Pediococcus acidilactici*) asal Whey Dangka pada Pengawetan Bakso

---

---

Bakso adalah produk makanan yang dibuat dari campuran daging ternak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh aplikasi kultur bakteri asam laktat (BAL) terhadap masa simpan bakso. Penyimpanan bakso dilakukan pada suhu ruang (25°C) selama 2 hari. Hasil analisis mikrobiologi menunjukkan bahwa pada hari sebelum penyimpanan, total mikroba pada bakso kontrol yaitu  $1,6 \times 10^5$  cfu/g dan total mikroba bakso dengan *Pediococcus acidilactici* yaitu  $4,1 \times 10^4$  cfu/g. Sebelum masa simpan, tidak ditemukan pertumbuhan *Escherichia coli* pada bakso. Setelah masa simpan, total mikroba pada bakso kontrol meningkat menjadi  $1,8 \times 10^5$  cfu/g sedangkan total mikroba pada bakso dengan BAL jumlahnya tereduksi menjadi  $3,2 \times 10^4$  cfu/g. BAL dapat menghambat pertumbuhan bakteri pada bakso. Hasil analisis total *E. coli* pada bakso kontrol yaitu  $2,6 \times 10^5$  cfu/g sedangkan pada bakso dengan BAL sebanyak  $5,1 \times 10^2$  cfu/g. Tumbuhnya *E. coli* disebabkan oleh kontaminasi baik melalui udara maupun saat proses pengolahan bakso. Setelah penyimpanan, bakso kontrol telah membusuk dengan penampakan kapang berwarna putih, struktur berlendir dan bau yang membusuk. Sedangkan bakso dengan perendaman memiliki struktur yang masih baik.

Kata kunci : *Pediococcus acidilactici*, bakso, pengawetan.

## ABSTRACT

**Name** : Yayu Anriana  
**NIM** : 60300111071  
**Thesis Tittle** : **Application of Lactic Acid Bacteria (*Pediococcus acidilactici*)  
from *Whey Dangke* on Preservation of Meatballs**

---

---

Meatballs is a food product made from a mixture of beef cattle. This study aims to determine the effect of the application of lactic acid bacteria (BAL) cultures on the shelf life of the meatballs. Meatballs storage is done at room temperature (25°C) for 2 days. The results of microbiological analysis showed that on the day prior to storage, the total microbial control meatballs that is  $1.6 \times 10^5$  cfu/g and total microbial meatballs with *Pediococcus acidilactici* is  $4.1 \times 10^4$  cfu/g. Prior to the store, there were no growth of *Escherichia coli* in meatballs. After the save, the total microbial control meatballs increased to  $1.8 \times 10^5$  cfu/g, while total microbial meatballs with BAL amount is reduced to  $3.2 \times 10^4$  cfu/g. BAL can inhibit the growth of bacteria on the meatballs. Results of analysis of total *E.coli* in control meatballs that is  $2.6 \times 10^5$  cfu/g while the meatballs with BAL much as  $5.1 \times 10^2$  cfu/g. Growing *E. coli* contamination caused by either over the air or when the processing of meatballs. After storage, the controls have been decaying meatball with white mold appearance, structure and smell of rotting slimy. While meatballs with immersion has a structure that is still good.

Keywords: *Pediococcus acidilactici*, meatballs, long experienced wetan.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang***

Menurut SNI No. 01-3818-1995, bakso merupakan produk makanan berbentuk bulatan atau lain yang diperoleh dari campuran daging ternak dengan kadar daging tidak kurang dari 50%. Sedangkan menurut Widyaningsih dan Murtini (2006) bakso merupakan produk gel dari protein daging baik daging sapi, ayam, ikan maupun udang.

Pada tahun 2005, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BB POM) telah melakukan uji laboratorium pada 761 sampel makanan di beberapa kota besar Indonesia. Hasilnya beberapa jenis bahan makanan olahan yang menggunakan bahan pengawet kimia yaitu mie basah, bakso, tahu, dan ikan asin (Widyaningsih, 2006).

Pengawet kimia jika tertelan, dalam jangka pendek tidak menyebabkan keracunan, tetapi jika tertimbun di atas ambang batas dapat mengganggu kesehatan. Ambang batas yang aman adalah 1 mg perliter (Broto, 2006). *International Programe on Chemical Safety* menetapkan bahwa batas toleransi yang dapat diterima dalam tubuh maksimum adalah 0,1 mg perliter. Bahaya pengawet kimia dalam jangka pendek adalah apabila tertelan maka mulut, tenggorokan dan perut terasa terbakar, sakit jika menelan, mual, muntah dan diare, sakit perut yang hebat dan sakit kepala. Bahaya jangka panjang adalah iritasi saluran pernafasan, kerusakan jantung,

hati, otak, limpa, pankreas, sistem saraf pusat dan ginjal hingga menyebabkan kanker (Min dan Yon, 2010).

Penggunaan bahan alami sebagai bahan pengawet pada produk makanan mulai mendapat perhatian karena semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif penggunaan pengawet makanan misalnya formalin terhadap kesehatan karena dapat bersifat toksik (Pandey *et al*, 2001).

Pemanfaatan BAL oleh manusia telah dilakukan sejak lama, yaitu untuk proses fermentasi makanan. BAL merupakan kelompok besar bakteri menguntungkan yang memiliki sifat relatif sama. Saat ini BAL digunakan untuk memperbaiki tekstur dan cita rasa bahan pangan (Silalahi, 2000).

BAL memiliki aktivitas antimikroba karena memproduksi asam-asam organik (asam laktat, asam asetat, asam formiat), diasetil, hidrogen peroksida dan bakteriosin. BAL sebagai pengawet hayati makan (*food biopreservative*) dapat mengendalikan mikroorganisme pembusuk dan patogen pada penyimpanan maupun produk olahan pangan. Efektivitas BAL dalam menghambat bakteri pembusuk dipengaruhi oleh kepadatan BAL, strain BAL, dan komposisi media (Jay, 1996).

Senyawa antimikroba yang ditambahkan pada makanan untuk mengawetkan harus mempunyai beberapa kriteria ideal, antara lain memiliki aktivitas antimikroba, aman untuk dikonsumsi oleh manusia, ekonomis, tidak menyebabkan kualitas makanan menurun, memiliki aktivitas antimikroba yang baik pada kondisi lingkungan makanan, efektif pada dosis kecil, serta bersifat membunuh daripada menghambat pertumbuhan mikroba (Ray, 2008). Pemilihan senyawa antimikroba

pangan yang baik didasarkan pada kemampuan menghambat jenis-jenis mikroba. Biasanya senyawa antimikroba yang lebih banyak dapat menghambat bakteri, baik bakteri pembusuk ataupun patogen (spektrum penghambatan yang luas) lebih diharapkan (Branen, 1993).

Berdasarkan alasan diatas, penulis tertarik untuk mengaplikasikan BAL dibidang pangan dengan judul Aplikasi Bakteri Asam Laktat *Pediococcus acidilactici* asal Whey Dangka pada Pengawetan Bakso.

### **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah mengenai bagaimana pengaruh BAL terhadap lama penyimpanan bakso?

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini dibatasi lingkupnya mengenai aplikasi bakteri asam laktat (BAL) pada pengawetan bakso.

1. Bakteri Asam Laktat (BAL) adalah bakteri yang bersifat heterogenus, Gram positif, anaerob, tidak berspora, dan merupakan bakteri yang tahan terhadap asam. Kultur BAL *Pediococcus acidilactici* diperoleh dari koleksi Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Sains dan Teknologi.
2. Pengawetan bakso: Pengawetan adalah suatu aktivitas yang dilakukan untuk memperpanjang masa simpan, untuk mencegah kebusukan dan keracunan oleh mikroorganisme pada bahan pangan. Pengawetan bakso dilakukan dengan perendaman pada kultur bakteri asam laktat *Pediococcus acidilactici* selama 1 jam dengan masa simpan selama 2 hari pada suhu ruang yaitu 25°C. Bakso dibuat dari

daging dan bahan-bahan lainnya yang diperoleh dari pasar tradisional kerung Makassar.

3. Uji Mikrobiologi meliputi total mikroba dan total *Escherichia coli*. Total mikroba dilakukan untuk mengetahui tingkat keamanan pangan yang disesuaikan dengan standar nasional yang telah ditentukan. Menurut SNI 01-0366-2000 jumlah mikroba pada produk daging yaitu  $1 \times 10^5$  cfu/g. Dan persyaratan maksimum cemaran bakteri *E. coli* yang direkomendasikan SNI yaitu  $1 \times 10^2$  cfu/g. Penelitian ini dilakukan pada Juli 2015 di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Makakassar.

#### **D. Kajian Pustaka / Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian telah dilakukan mengenai aplikasi bakteri asam laktat terhadap pengawetan pangan. Anton (2005) menemukan bahwa *Lactobacillus brevis* dapat meningkatkan keamanan dan memperpanjang umur simpan buah apel. Lebih lanjut, Atifah (2000) mengaplikasikan kultur campuran BAL yaitu *Lactobacillus plantarum* dan *Lactobacillus lactis* pada pengawetan pindang ikan kembung. Ikan pindang kembung yang direndam pada kultur campuran BAL dapat meningkatkan mutu simpan dan keamanan mikrobiologi pindang ikan kembung.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh aplikasi kultur bakteri asam laktat (BAL) terhadap lama penyimpanan bakso.



## **F. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat, yaitu:

1. Untuk memberikan pengetahuan bahwa bakteri asam laktat *Pediococcus acidilactici* berpotensi sebagai preservasi alami.
2. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat mengkaji permasalahan yang relevan dengan mengembangkan variabel berbeda.

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORITIS**

#### ***A. Bakteri Asam Laktat***

##### **1. Tinjauan Umum Bakteri Asam laktat**

Awalnya istilah bakteri asam laktat dibawa oleh seseorang yang bekerja di perusahaan susu fermentasi untuk menunjukkan bahwa terdapat suatu spesies atau strain yang dapat menghasilkan asam laktat dari proses metabolisme laktosa dalam jumlah yang banyak. Bakteri ini lebih dikenal secara umum dengan istilah kultur starter yang biasa digunakan untuk memulai suatu proses fermentasi. Kelompok yang telah diketahui sebagai Bakteri Asam Laktat (BAL) saat ini adalah termasuk kedalam genus *Lactococcus*, *Streptococcus* (hanya satu spesies saja), *Enterococcus*, *Pediococcus*, *Tetragenococcus*, *Aerococcus*, dan lainnya (Axelson, 1998).

Kemudian dari waktu ke waktu, kedua istilah tersebut digunakan dalam proses fermentasi bahan pangan hasil ternak yakni susu dan daging, serta digunakan untuk sayuran dan untuk produk fermentasi lainnya (Ray dan Miller, 2003). Sejak manusia mengonsumsi hasil metabolisme dari bakteri tersebut selama beberapa lama tanpa efek yang merugikan yang ditimbulkan, bakteri kultur starter kini dipertimbangkan sebagai bahan pangan yang aman, bermutu baik, dan bahkan memiliki beberapa keuntungan bagi yang mengkonsumsinya. Saat ini, yang dikenal dalam pangan fermentasi hanyalah beberapa spesies dari *Lactococcus*, *Leuconostoc*,

dan *Pediococcus* saja, serta beberapa spesies dari *Lactobacillus* dan *Bifidobacterium* yang memiliki manfaat pada saluran pencernaan manusia (Ray, 2000).

Nama BAL diperoleh dari kemampuannya dalam memfermentasi gula menjadi asam laktat. BAL juga terdapat dalam tubuh manusia sebagai flora normal tubuh (Prescott *et al.*, 2002). Selain pada manusia, bakteri ini juga dapat ditemukan pada produk sayuran dan susu.

Bakteri ini terdiri atas beberapa filum *Firmicutes*. Genera tersebut adalah *Aerococcus*, *Enterococcus*, *Melisococcus*, *Weisella*, *Vagococcus*, *Tetragenococcus*, *Streptococcus*, *Pediococcus*, *Oenococcus*, *Lactobacillus*, *Lactococcus*, *Lactosphaera*, *Leuconostoc* dan *Carbobacterium*. Genus *Bifidobacterium* yang sering digolongkan dengan kelompok *Lactobacillus*, secara filogenik tidak memiliki hubungan dengan BAL dan memiliki cara tersendiri untuk memfermentasi gula. Klasifikasi BAL dalam berbagai genera terutama didasarkan pada perbedaan morfologi, cara fermentasi glukosa, pertumbuhan pada beberapa temperatur yang berbeda, konfigurasi asam laktat yang dihasilkan, kemampuan untuk tumbuh pada lingkungan yang memiliki konsentrasi garam yang tinggi dan toleransi terhadap lingkungan asam atau basa (Salminen *et al.*, 2004).

*Pediococcus acidilactici* adalah spesies kokus gram positif yang sering ditemukan berpasangan atau tetra. *Pediococcus acidilactici* adalah bakteri homofermentatif yang dapat tumbuh di berbagai tekanan pH, suhu dan osmotik, sehingga mampu menjajah saluran pencernaan. *Pediococcus acidilactici* telah muncul sebagai probiotik potensial yang telah menunjukkan hasil yang menjanjikan

pada hewan percobaan dan manusia, meskipun beberapa dari hasilnya terbatas. Mereka umumnya ditemukan dalam sayuran difermentasi, produk susu fermentasi dan daging. *Pediococcus acidilactici* adalah anaerob fakultatif dengan sensitivitas yang lebih rendah untuk oksigen. *Pediococcus* mengerahkan antagonisme terhadap mikroorganisme lainnya, termasuk patogen enterik, terutama melalui produksi asam laktat dan sekresi bakteriosin dikenal sebagai pediocin. *Pediococcus acidilactici* memiliki berbagai manfaat potensial yang masih sedang dipelajari. Meskipun digunakan sebagai suplemen probiotik dalam mengobati sembelit dan diare, *Pediococcus acidilactici* juga dikenal dapat menghambat pertumbuhan bakteri patogen pada usus seperti *Shigella*, *Salmonella*, *Clostridium difficile* dan *Escherichia coli* (Schved *et al.*, 1993).

## **2. Sifat Bakteri Asam Laktat**

Umumnya BAL merupakan bakteri yang hanya dapat tumbuh dengan baik pada media yang kompleks dan melimpah (*fastidious*). Oleh sebab itu produksi bakteriosin dari BAL membutuhkan media fermentasi yang kompleks. Selain itu, produksi bakteriosin oleh BAL juga ditentukan oleh faktor lain seperti pH dan temperatur fermentasi (Vuyst dan Vandamme, 1994).

BAL bersifat heterogenus, Gram positif, anaerob, tidak berspora, dan merupakan bakteri yang tahan terhadap asam. BAL dapat memfermentasikan berbagai jenis zat gizi baik secara homofermentatif maupun heterofermentatif terutama menghasilkan asam laktat, selain itu juga dapat menghasilkan asam asetat, asam format, etanol dan CO<sub>2</sub>. BAL secara alami ditemukan pada tanaman, daging,

susu dan hasil olahannya serta fermentasi sereal yang sudah lama digunakan dalam industri makanan dalam skala besar atau industri rumah tangga, serta makanan hasil fermentasi. BAL digunakan sebagai starter untuk fermentasi sayur atau daging. Bakteri ini juga dapat mengendalikan pertumbuhan bakteri patogen dengan memproduksi asam organik, hidrogen peroksida, diasetil dan bakteriosin (Januarsyah, 2007).

Ditinjau dari hasil metabolisme glukosa, BAL terbagi menjadi dua golongan, yaitu homofermentatif dan heterofermentatif. BAL homofermentatif mengubah 95% glukosa atau heksosa lainnya menjadi asam laktat serta sejumlah kecil CO<sub>2</sub> dan asam-asam volatile (Rahayu *et al.*, 1992). BAL heterofermentatif menghasilkan asam asetat, asam laktat, CO<sub>2</sub> dan etanol dalam jumlah yang sangat besar.

Sharpe (1979) membagi BAL menjadi empat genus, yaitu *Streptococcus* bersifat homofermentatif, *Leuconoctoc* bersifat heterofermentatif, *Pediococcus* dan *Aerococcus* bersifat homofermentatif dan *Lactobacillus* bersifat homofermentatif dan heterofermentatif.

Sifat terpenting dari BAL adalah kemampuannya untuk merombak senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana sehingga dihasilkan asam laktat. Produk asam oleh bakteri asam laktat berjalan secara cepat, hal ini dapat menyebabkan pertumbuhan mikroba lain yang tidak diinginkan dapat terhambat. Bakteri patogen seperti *Salmonella* dan *Staphylococcus aureus* yang terdapat pada suatu bahan pangan akan dihambat pertumbuhannya jika dalam pangan terdapat

kelompok bakteri lainnya yang tergolong bakteri asam laktat yaitu golongan *Lactobacillaceae* (Fardiaz, 1992).

Karakteristik lainnya yakni kemampuannya dalam menghasilkan antimikroba. Beberapa dari mereka telah diketahui karakterisasinya, tetapi juga masih banyak yang diidentifikasi dari spesies atau strain dan kandungan nutrisi, sifat fisik, dan suasana kimia dari tempat tumbuh. BAL berperan sebagai penghasil senyawa antimikroba melalui hasil metabolitnya seperti asam organik, bakteriosin, H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, CO<sub>2</sub>, serta diasetil (Vuyst dan Vandamme, 1994). Antimikroba ini dapat mencegah atau membunuh mikroorganisme yang menjadi target seperti jamur, kapang, bakteri vegetatif, spora, dan bahkan virus. Aktivitas antimikroba bervariasi tergantung dari hasil metabolismenya masing-masing.

Antimikroba adalah suatu antibodi yang dapat bereaksi dengan toksin dan menetralkan toksin. Zat antimikroba bersifat bakterisidal (membunuh bakteri), bakteristatik (menghambat pertumbuhan bakteri), fungisidal (membunuh kapang), fungistatik (menghambat pertumbuhan kapang) dan germisidal (menghambat germinasi spora bakteri) (Fardiaz, 1992).

Efektivitas BAL dalam menghambat bakteri pembusuk dipengaruhi oleh kepadatan BAL, strain BAL, dan komposisi media. Selain itu, produksi substansi penghambat dari BAL dipengaruhi oleh media pertumbuhan, pH, dan temperatur lingkungan (Jay, 1996).

BAL mengalami peningkatan pertumbuhan dengan meningkatnya waktu inkubasi yang berlangsung secara logaritmik. Meningkatnya jumlah biomassa

menyebabkan jumlah antimikroba yang dihasilkan semakin meningkat kemudian tetap setelah mencapai fase stasioner (Boe, 1996).

BAL merupakan kelompok bakteri yang paling banyak menghasilkan bakteriosin. Secara umum, bakteriosin yang disekresikan oleh BAL merupakan peptida kationik kecil dengan 30 sampai 60 residu asam amino dan tahan terhadap pemanasan (Balasubramanyam *et al.*, 1995).

Pemanfaatan BAL oleh manusia telah dilakukan sejak lama yaitu untuk proses fermentasi makanan. BAL merupakan kelompok besar bakteri menguntungkan yang memiliki sifat relatif sama. Saat ini bakteri asam laktat digunakan untuk memperbaiki tekstur dan citarasa bahan pangan (Silalahi, 2000).

Dalam proses fermentasi, bakteri diperlukan untuk tujuan mengembangkan rasa dan bau harum, serta menghasilkan beberapa asam tertentu seperti asam laktat dan asam asetat yang dapat bersifat mengawetkan produk (Winarno, 1993: 6-7).

BAL merupakan mikroba yang aman ditambahkan dalam makanan karena sifatnya yang tidak toksik dan tidak menghasilkan toksin sehingga banyak digunakan sebagai starter makanan (Garver dan Muriana, 1993; Gilliland 1988; dan Ruiz-Barba *et al.*, 1994 dalam Nurliana, 1997).

Peranan BAL dalam bahan pangan lebih banyak menguntungkan dari pada merugikan. Bakteri Asam Laktat yang aktif dalam fermentasi makanan memberikan daya awet produk yang baik. Daya awet tersebut khususnya disebabkan oleh asam laktat serta senyawa asam lainnya sebagai hasil metabolisme BAL. Selain menghasilkan senyawa-senyawa organik tersebut beberapa galur BAL menghasilkan

senyawa protein yang bersifat bakterisidal terhadap bakteri Gram positif dan bakteri Gram negatif yang disebut bakteriosin (Tahara *et al.*, 1996 dalam Januarsyah, 2007).

Penggunaan BAL dalam pangan adalah untuk memperpanjang waktu simpan, meningkatkan kualitas dan mengontrol pertumbuhan mikroba patogen dan perusak (Holzapfel, *et a.*, 1995). Sifat tersebut didapat dari zat metabolit yang dihasilkan BAL yang bersifat antibakterial baik bakteriostatik maupun bakterisidal terhadap semua bakteri (Winkowski dan Montville, 1992; Barefoot dan Nettles, 1993 dalam Nurliana, 1997).

Selain dimanfaatkan dalam bidang pangan, BAL juga memberikan efek fisiologis bagi kesehatan yaitu sebagai suplemen (pada makanan dan minuman), obat-obatan (seperti antibiotik alami), efek terapi (seperti hipokolesterol, antihipertensi, pencegah diare). BAL ini disebut sebagai probiotik. Probiotik adalah mikroorganisme hidup yang mana dikonsumsi dalam jumlah yang cukup memberi manfaat kesehatan terhadap inangnya (FAO/WHO, 2001 dalam Velez *et al.*, 2007).

### **3. Antimikroba Bakteri Asam Laktat**

Senyawa antimikroba adalah senyawa biologis atau senyawa kimia yang digunakan dengan tujuan untuk mencegah ataupun menghambat pertumbuhan dan aktivitas mikroba (Ray, 2008). Senyawa antimikroba ini terdapat di dalam bahan pangan dengan berbagai cara. Beberapa diantaranya terdapat secara alamiah, ditambah dengan sengaja, ataupun terbentuk selama proses pengolahan pangan atau oleh mikroorganisme yang tumbuh selama fermentasi (Fardiaz, 1992). Dalam bidang pangan, senyawa antimikroba umumnya digunakan sebagai senyawa aditif untuk



mencegah pembusukan makanan karena adanya pertumbuhan mikroba (Branen, 1983).

Fardiaz (1992) menyatakan bahwa zat antimikroba bersifat bakterisidal (membunuh bakteri), bakteristatik (menghambat pertumbuhan bakteri), fungisidal (membunuh kapang), fungistatik (menghambat pertumbuhan kapang), dan germisidal (menghambat germinasi spora bakteri). Kemampuan suatu zat antimikroba dalam menghambat pertumbuhan bakteri dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni (1) konsentrasi bahan pengawet, (2) waktu penyimpanan, (3) suhu lingkungan, (4) sifat-sifat mikroba (jenis, umur, dan konsentrasi).

Secara umum mekanisme kerja antimikroba dalam menghambat pertumbuhan mikroba adalah: (1) bereaksi dengan membran sel, (2) inaktivasi enzim esensial, dan (3) mendestruksi atau menginaktivasi fungsi dari materi genetik (Branen, 1983).

Masing-masing senyawa antimikroba memiliki mekanisme yang berbeda-beda dalam menghambat pertumbuhan mikroba. Sebagian besar mekanisme senyawa fenolik sebagai antimikroba adalah dengan mempengaruhi membran sel (Branen dan Davidson, 1983). Hal ini didukung juga oleh pernyataan Williams *et al.*, (1996) yang menyebutkan bahwa komponen fenol dapat mempengaruhi membran sel bakteri. Menurut Branen dan Davidson (1983), komponen fenol dapat merusak membran sitoplasma mikroba dan menyebabkan kehilangan komponen sitoplasma. Branen dan Davidson (1983) juga menyebutkan bahwa komponen fenolik dapat menyebabkan kerusakan fisik pada membran sel ataupun pada penahan permeabilitas. Komponen fenol juga dapat mendenaturasi enzim yang bertanggung jawab terhadap germinasi

spora atau berpengaruh terhadap asam amino yang terlibat dalam proses germinasi (Nychas dalam Ardiansyah, 2001).

Suatu preservatif untuk memperpanjang masa simpan produk pangan, terutama daging, harus memenuhi kriteria antara lain tidak mengubah flavor, bau dan tekstur bahan pangan; aman bagi konsumen dan efektif sebagai preservatif atau aman untuk dikonsumsi selama masa simpan tertentu; preservatif harus mudah dikenali dan kadarnya dapat dipastikan secara pasti serta harus memenuhi kebutuhan yang diizinkan; kualitas bahan pangan tidak merugikan konsumen; ekonomis (Soeparno, 2005); dan tidak menyebabkan timbulnya galur resisten dan diutamakan bersifat membunuh daripada hanya menghambat pertumbuhan mikroba (Frazier dan Westhoff, 1998). Beberapa senyawa antimikroba yang dapat dihasilkan oleh BAL antara lain asam organik, bakteriosin,  $H_2O_2$ ,  $CO_2$ , serta diasetil (Vuyst dan Vandamme, 1994).

#### a. Asam Organik

Asam organik merupakan substansi alami dari berbagai jenis makanan. Aksi antimikroba dari asam organik berdasarkan pada kemampuannya untuk menurunkan pH dalam pangan yang berfase air. Asam organik dalam pangan dapat berfungsi sebagai asidulan atau pengawet, sementara garamnya atau ester dapat menjadi antimikroba yang efektif pada pH mendekati netral. Asam laktat adalah produk utama pada pangan hasil fermentasi. Asam asetat, propionat, malat dan asam-asam lainnya dengan konsentrasi yang beragam juga dihasilkan tergantung jenis produk dan mikroorganisme yang digunakan (Sudirman, 1993).

Penghambatan pertumbuhan pada mikroba yang disebabkan oleh asam organik diakibatkan adanya pelepasan proton ke dalam sitoplasma sehingga pH pada membran sel menjadi sangat asam secara mendadak. Akan tetapi hipotesis tersebut dibantah oleh peneliti lain yang menyatakan bahwa penyebab dari penghambatan pertumbuhan oleh asam organik bukanlah karena adanya translokasi proton tetapi karena adanya akumulasi anion. Anion menyebabkan berkurangnya kecepatan dari sintesis makromolekul dan mempengaruhi transportasi antar membran sel. Bakteri asam laktat dan juga bakteri lain meniadakan efek dari akumulasi anion dengan cara mengurangi pH pada sitoplasma (Quwehand dan Vesterlund, 2004). Perubahan permeabilitas membran akan menghasilkan efek ganda, yaitu mengganggu transportasi nutrisi ke dalam sel dan menyebabkan metabolit internal keluar dari sel.

#### b. Hidrogen Peroksida

BAL memproduksi hidrogen peroksida dibawah kondisi pertumbuhan aerob, dan karena berkurangnya katalase selular, pseudokatalase atau peroksidase. BAL mengekskresikan  $H_2O_2$  tersebut sebagai alat pelindung diri yang mampu bersifat bakteriostatik maupun bakterisidal. Hidrogen peroksida merupakan salah satu agen pengoksidasi yang kuat dan dapat dijadikan sebagai zat antimikroba melawan bakteri, fungi dan bahkan virus (Ray, 2008). Kemampuan bakterisidal dari  $H_2O_2$  beragam tergantung pH, konsentrasi, suhu, waktu dan tipe serta jumlah mikroorganisme. Pada kondisi tertentu, spora bakteri ditemukan paling resisten terhadap  $H_2O_2$ , diikuti dengan bakteri Gram positif. Bakteri yang paling sensitif

terhadap H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> adalah bakteri Gram negatif, terutama koliform (Quwehand dan Vesterlund, 2004).

Branen (1983) berpendapat bahwa hidrogen peroksida (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>) merupakan oksidator, *bleaching agent* dan anti bakteri. Hidrogen peroksida murni tidak berwarna, berbentuk cairan seperti sirup dan memiliki bau yang menusuk. Kemampuan H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> untuk mengoksidasi menyebabkan perubahan tetap pada sistem enzim sel mikroba sehingga digunakan sebagai antimikroba. Selain itu, senyawa ini juga dapat terdekomposisi menjadi air dan oksigen. Perubahan kondisi lingkungan seperti pH dan suhu mempengaruhi kecepatan dekomposisi. Peningkatan suhu dapat meningkatkan keefisienan dalam menghancurkan bakteri, selain itu kecepatan proses terdekomposisinya senyawa tersebut juga semakin cepat.

### c. Bakteriosin

Bakteriosin adalah istilah yang pertama kali ditemukan oleh A. Gratia dari Bakteri Asam Laktat (BAL) pada tahun 1925, yang dinamakan *colicine* karena zat tersebut memiliki kemampuan membunuh *E. coli*. Substansi sejenisnya dapat diproduksi oleh berbagai strain BAL (Yulneriwarni 2006 dalam Hafsan 2014, 175–184).

Bakteri asam laktat (BAL) digunakan dalam fermentasi pangan karena BAL dapat mengurai gula menjadi asam organik, dan juga dapat menghambat kerusakan pangan yang disebabkan oleh aktivitas mikroorganisme pembusuk. Diantara bermacam-macam bahan pengawet yang dihasilkan oleh BAL, bakteriosin adalah salah satu antimikroba alami yang digunakan sebagai pengawet bahan pangan.

Bakteriosin adalah protein bakterisidal atau peptida yang mempunyai daya tarik yakni dapat melawan spesies-spesies yang dapat menyebabkan kerusakan pangan dan penyakit (Gonzales *et al.*, 1996). Bakteriosin merupakan substrat protein antimikroba yang dapat mencegah strain-strain yang sensitif yakni bakteri Gram negatif dan Gram positif (Savadogo *et al.*, 2004).

Bakteriosin adalah komponen protein antibakterial yang merupakan peptida-peptida antimikroba hasil sintesis oleh ribosom (Vuyst dan Vandamme, 1994). Savadogo *et al.* (2004) juga menyatakan bahwa umumnya bakteriosin tersebut adalah peptida-peptida kationik yang terdapat dalam bentuk substansi bersifat hidrofobik atau amphifilik dan membran bakteri merupakan target atau sasaran utama dari aktivitas yang dilakukan oleh bakteriosin tersebut, yakni aktivitas penghambatan terhadap pertumbuhan bakteri perusak dan pembusuk. Jack *et al.* (1995) menyatakan bahwa senyawa antimikroba khususnya bakteriosin merupakan substansi protein yang diproduksi oleh banyak strain bakteri dan dapat menghasilkan aktivitas penghambatan secara bakterisidal terhadap organisme yang berkerabat dekat.

Menurut (Jimenez *et al.*, 1993) bakteriosin dikelompokkan menjadi empat jenis yaitu:

- a. Lanbiotik, merupakan bakteriosin yang mengandung cincin lantionin dalam molekulnya, contohnya nicin, lacticin 481, lacticin S, streptococcin SA-FF22
- b. Bakteriosin kecil (<10kDa), relatif tahan panas, peptida pada sisi aktifnya tidak mengandung lantionin, kelompok kedua ini dibagi lagi dalam subkelas. Kelas IIa mempunyai peptida sekuen N-terminal: Tyr-Gly-Asn-Val-X-Cis. Kelas IIb adalah

kelompok bakteriosin yang biasanya membentuk kompleks berpori dengan aktivitas dua peptida yang berbeda. Kelas Iic adalah bakteriosin yang memerlukan peptida teraktivasi-tiol untuk mengurangi residu dalam aktivitasnya.

c. Bakteriosin bermolekul protein besar (>30kDa) dan tidak tahan panas, contohnya Helvotin J dan Brevicin 27.

d. Bakteriosin yang mengandung protein kompleks, terdiri atas komponen karbohidrat atau lipid, contohnya plantarisin S yang mengandung glikoprotein.

Banyak bakteriosin dapat secara bakterisidal melawan spesies-spesies dan strain yang berkerabat dekat dengan bakteriosin tersebut, namun ada beberapa dapat secara efektif melawan banyak bakteri dari spesies dan genus yang berbeda (Ray dan Bhunia, 2008). Satu strain bakteri dapat menghasilkan lebih dari satu macam bakteriosin, dan banyak strain dari spesies yang berbeda dapat memproduksi bakteriosin yang sama atau dapat juga berbeda (Ray dan Bhunia, 2008)

Pemberian BAL dapat menurunkan pH bahan pangan, Penurunan pH tersebut dapat memperlambat pertumbuhan mikroorganisme pembusuk (Buckle *et al.*, 1987). Keadaan asam akibat penurunan pH akan menghambat pertumbuhan bakteri pembusuk (Ilyas, 1983).

#### **4. Mekanisme Aktivitas Antimikroba**

Aktivitas senyawa antimikroba dapat dilihat dengan adanya mekanisme penghambatan pertumbuhan bakteri patogen dan pembusuk. Mekanisme tersebut dilakukan oleh senyawa antimikroba dengan cara merusak dinding sel mikroba sehingga sel yang sedang tumbuh akan terlisis atau terurai, protein sel juga

terdenaturasi dan terjadi perusakan sistem metabolisme di dalam sel dengan cara menghambat kerja enzim intraseluler (Pelczar dan Chan, 1986).

Beberapa cara antimikroba dalam aksinya melawan mikroorganisme yaitu memberikan efek bakteriostatik, bakterisidal ataupun bakterilisis. Sifat bakteriostatik akan menghambat pertumbuhan dan replikasi mikroorganisme, namun tidak menyebabkan kematian. Sifat bakterisidal berhubungan dengan kemampuan senyawa untuk menyebabkan kematian mikroorganisme, sedangkan sifat bakterilisis akan menyebabkan lisis sel mikroorganisme (Gonzales *et al.*, 1996).

### **B. Tinjauan Umum Dangke**

Dangke merupakan makanan tradisional penduduk di Kecamatan Anggeraja, Alla, dan Baraka Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Dangke dikenal sejak zaman kolonial Belanda yaitu sebelum tahun 1905, nama dangke berasal dari bahasa Belanda yang didengar oleh rakyat setempat pada saat orang menerima makanan yang terbuat dari susu sapi atau susu kerbau dengan mengucapkan “*Dank U Well*” yang berarti terima kasih. Kata inilah yang digunakan untuk nama dangke hingga sekarang (Djide, 1991).

Dangke dibuat dari susu sapi atau kerbau yang merupakan makan khas Sulawesi Selatan. Dangke tergolong keju lunak berwarna putih dan bersifat elastis (Ridwan, 2004).

Pada proses pemanasan pengolahan dangke, protein dapat mengalami denaturasi, artinya strukturnya berubah dari bentuk ganda yang kuat menjadi kendur dan terbuka sehingga memudahkan bagi enzim pencernaan untuk menghidrolisis dan

memecahkannya menjadi asam-asam amino. Koagulasi dapat ditimbulkan karena menggunakan enzim (Winarno, 1993).

*Whey* susu didefinisikan sebagai serum atau bagian air dari susu yang tersisa setelah pemisahan *curd* dan merupakan hasil koagulasi protein susu dengan asam atau enzim proteolitik (Panesar *et al.*, 2007). Staszewski and Jagus (2008) menyatakan bahwa pengolahan limbah *whey* dibutuhkan sebagai solusi terhadap pencegahan pencemaran lingkungan dan sekaligus dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesehatan manusia. Teknologi pengolahan biologi sangat membantu dalam pengamanan limbah *whey*.

*Whey* dangke merupakan limbah dangke, yang belum banyak dimanfaatkan. Dangke merupakan produk sejenis keju tanpa fermentasi. *Whey* dangke dipisahkan dari *curd* menggunakan getah buah pepaya sebagai sumber enzim. *Whey* memiliki kandungan laktosa dan komponen nutrisi lainnya yang dibutuhkan untuk pertumbuhan mikroorganisme (Gallardo-Escamila dkk., 2007).

Getah pepaya yang digunakan pada pembuatan dangke selain memiliki aktivitas proteolitik juga diketahui mempunyai kemampuan sebagai bahan antibakteri dan anti-inflamasi (Aravind *et al.*, 2013).

### ***C. Pengawetan***

#### **1. Bahan Pengawet**

Pangan sangat mudah rusak secara alami, dimana perubahan dapat terjadi pada makanan selama pengolahan dan penyimpanan. Untuk memperpanjang umur simpan produk pangan dapat dilakukan pengawetan, misalnya pengolahan dengan



panas seperti pasteurisasi dan sterilisasi, penambahan bahan pengawet, dan pengawetan dengan pendinginan dengan tujuan untuk mencegah, menghilangkan atau menghambat aktivitas mikroorganisme atau enzim yang tidak diinginkan. Bahan pengawet termasuk ke dalam bahan aditif, yaitu bahan yang ditambahkan dan dicampurkan sewaktu pengolahan makanan untuk meningkatkan mutu. Selain pengawet, yang termasuk bahan aditif antara lain pewarna, pemanis, penyedap rasa dan aroma, pemantap, antioksidan, pengemulsi, antigumpal, pemucat, dan pengental (Winarno, 1993).

Bahan pengawet atau disebut juga senyawa antimikroba didefinisikan sebagai bahan tambahan makanan untuk mencegah kebusukan dan keracunan oleh mikroorganisme pada bahan pangan. Antimikroba merupakan senyawa biologis atau kimia yang dapat menghambat pertumbuhan dan aktivitas mikroba (Wijaya, 2006).

Bahan pengawet umumnya digunakan untuk mengawetkan pangan yang mempunyai sifat mudah rusak. Bahan ini dapat menghambat atau memperlambat proses fermentasi, pengasaman, atau penguraian yang disebabkan oleh mikroba. Akan tetapi tidak jarang produsen menggunakannya pada bahan pangan yang relatif awet dengan tujuan untuk memperpanjang masa simpan atau memperbaiki tekstur (Cahyadi, 2008: 5).

Pengawet berfungsi untuk memperpanjang umur simpan suatu produk pangan, dalam hal ini bekerja menghambat pertumbuhan mikroba. Oleh karena itu sering pula disebut sebagai senyawa antimikroba (Wijaya, 2006). Penggunaan bahan alami sebagai bahan pengawet pada produk makanan mulai mendapat perhatian

karena semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif penggunaan pengawet makanan misalnya formalin terhadap kesehatan karena dapat bersifat toksik (Pandey *et al*, 2001).

Bakso yang rentan terhadap kerusakan mikrobiologis dapat diperpanjang masa simpannya dengan penambahan bahan-bahan pengawet. Bahan pengawet merupakan salah satu kelompok dari sejumlah besar bahan kimia yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam bahan pangan atau ada dalam bahan pangan sebagai akibat dari perlakuan prapengolahan, pengolahan atau penyimpanan (Buckle *et al.*, 1987).

## **2. Teknik Pengawetan**

Secara garis besar teknik pengawetan dapat dibagi dalam tiga golongan yaitu pengawetan secara alami, pengawetan secara biologis, dan pengawetan secara kimia (Pratiwi, 2008).

### **a. Pengawetan Secara Alami**

Proses pengawetan secara alami meliputi proses pemanasan dan pendinginan. Teknik liofilisasi atau teknik pengeringan beku yang diperkenalkan oleh Perlman dan Kikuchi (1977) dan Heckly (1978) merupakan teknik *preservasi* (pengawetan) yang sangat terkenal dan biasa digunakan untuk mikroorganisme dengan kisaran yang luas.

### **b. Pengawetan Secara Biologis**

Proses pengawetan secara biologis dapat dilakukan dengan fermentasi (peragian), yaitu proses perubahan karbohidrat menjadi alkohol. Zat-zat yang bekerja

pada proses ini adalah enzim yang dibuat oleh sel-sel ragi. Lamanya proses peragian tergantung pada bahan yang akan diragikan.

#### c. Pengawetan Secara Kimia

Pada proses pengawetan secara kimia, digunakan bahan-bahan kimia yang bersifat dapat mencegah pertumbuhan mikroorganisme. Sebagai contoh adalah penggunaan gula pasir, garam dapur, nitrat, nitrit, natrium benzoat, asam propionat, asam sitrat, garam sulfat, dan lain-lain. Proses pengasapan juga termasuk cara kimia, sebab bahan-bahan kimia dalam asap dimasukkan ke dalam bahan makanan yang akan diawetkan.

#### **D. Bakso**

Daging merupakan semua jaringan hewan beserta produk hasil pengolahannya yang dapat dimakan dan tidak menimbulkan gangguan kesehatan bagi yang memakannya. Otot hewan berubah menjadi daging setelah pemotongan karena fungsi fisiologisnya telah berhenti. Otot merupakan komponen utama penyusun daging. Daging juga tersusun dari jaringan ikat, epitel, jaringan-jaringan saraf, pembuluh darah dan lemak (Soeparno, 2005).

Bakso ditemukan pertama kali di daerah Cina pada 3000 SM. Bahan-bahan bakso terdiri atas bahan utama dan bahan tambahan. Bahan utama dari produk bakso ini adalah daging, sedangkan bahan tambahan yang digunakan adalah bahan pengisi, garam, es atau air es, bumbu-bumbu seperti lada serta bahan penyedap (Sunarlim, 1992).

Bakso daging menurut SNI No 01-3818-1995 merupakan produk makanan berbentuk bulatan atau bentuk lain yang diperoleh dari campuran daging (kadar daging tidak kurang dari 50%) dan pati atau serealialia dengan atau tanpa bahan tambahan makanan yang diizinkan (DSN, 1995).

Terdapat beberapa metode yang dikenal dalam pembuatan bakso, namun secara garis besar prinsipnya sama yaitu meliputi tahap penghancuran daging, pembentukan adonan dan pemasakan. Penghancuran daging dapat dilakukan dengan mencacah atau mencincang (*chopping*) ataupun menggiling (*grinding*). Selain itu membentuk adonan dapat dilakukan dengan mencampur bahan secara keseluruhan baru dilakukan penghancuran atau dapat pula dengan menghancurkan daging terlebih dahulu, baru setelah itu ditambahkan bahan-bahan lainnya (Pandisurya, 1983).

Pembuatan bakso pada prinsipnya terdiri atas empat tahap yaitu (1) penghancuran daging, (2) pembuatan adonan, (3) pencetakan dan (4) pemasakan. Bakso sendiri terdiri dari daging dan bahan tambahan lain seperti tepung, garam, es, STPP dan bumbu penyedap (Indarmono, 1987).

Bahan baku bakso terdiri dari bahan utama dan bahan tambahan. Bahan utamanya adalah daging, sedangkan bahan tambahannya adalah bahan pengisi (tepung), garam, es atau air es, bumbu-bumbu seperti lada serta bahan penyedap (Sunarlim, 1992).

Umumnya daging yang digunakan dalam pembuatan bakso berada dalam kondisi segar (*pre-rigor*) tanpa mengalami tahap penyimpanan sebelumnya, sehingga dapat dihasilkan sifat kekenyalan bakso yang diharapkan (Pandisurya, 1983).

Daging dengan kadar lemak terlalu tinggi kurang baik digunakan dalam pembuatan bakso. Lemak dalam bakso akan mencair pada waktu pemasakan dan keluar bersama air perebusan. Keluarnya lemak tersebut akan mempengaruhi permukaan produk yaitu menjadi tidak rata (berlubang-lubang) sehingga dapat mengurangi penerimaan konsumen (Elviera, 1998).

Tepung yang umum digunakan untuk pembuatan bakso adalah tepung tapioka yang jumlah penambahannya tidaklah pasti karena tergantung pada harga jual yang diinginkan (Pandisurya, 1983).

Penambahan tepung dalam bakso maksimal adalah 50%. Maksud penambahan tepung pada produk daging olahan adalah untuk: (1) memperbaiki stabilitas emulsi; (2) meningkatkan daya ikat air produk daging; (3) meningkatkan *flavor*; (4) mengurangi pengerutan selama pemasakan; (5) meningkatkan karakteristik isiran produk; dan (6) mengurangi biaya formulasi (Forrest *et al.*, 1975).

Pada pengolahan daging, air berfungsi dalam pendistribusian bahan, melarutkan protein daging, mengontrol suhu, memperbaiki berbagai perlakuan sensori dan mengurangi biaya. Penambahan air yang diikuti dengan penambahan garam dapat memperbaiki ekstraksi protein larut garam (Claus *et al.*, 1994).

Garam yang ditambahkan pada daging yang digiling akan meningkatkan protein miofibril yang terekstraksi. Protein ini memiliki peranan penting sebagai pengemulsi. Fungsi garam adalah menambah atau meningkatkan rasa dan memperpanjang masa simpan (*shelf-life*) produk (Aberle *et al.*, 2000).

Bahan penyedap dan bumbu mempunyai pengaruh pengawetan terhadap produk daging olahan karena mengandung lemak. Beberapa bumbu mempunyai sifat sebagai antioksidan. Penambahan bahan penyedap dan bumbu terutama ditujukan untuk menambah atau meningkatkan *flavor* (Soeparno, 2005).

Merica adalah buah dari tanaman *Piper nigrum*. dan memiliki rasa yang sangat pedas (*Pungent*) dan berbau harum (*aromatik*). Rasa pedas dihasilkan oleh zat *piperin* dan aroma sedap dihasilkan oleh terpen. Merica mengandung minyak essensial 1%-2,7%. Bawang putih adalah umbi dari tanaman *Allium sativum* dan memiliki rasa pedas (*pungent*). Bawang putih dapat digunakan sebagai pengawet karena bersifat bakteriostatik yang disebabkan oleh adanya zat aktif *allicin* yang sangat efektif terhadap bakteri (Hitokoro *et al.*, 1990). Bawang putih mengandung sekitar 0,1%-0,25% zat volatil, yaitu alil sulfida yang terbentuk secara enzimatik ketika butiran umbi bawang putih dihancurkan atau dipecah, bawang putih juga mengandung S-(2-propenil)-L-cistein sulfoksida yang merupakan prekursor utama dalam pembentukan alil thiosulfat (*allicin*) (Reinenccius, 1994).

#### ***E. Bakteri Patogen dan Bakteri Pembusuk***

Selain dapat menyebabkan perubahan yang menguntungkan dan diinginkan seperti perbaikan bahan pangan secara gizi, daya cerna, maupun daya simpan. Pertumbuhan mikroorganisme dalam bahan pangan juga dapat berakibat pada perubahan fisik dan kimia yang tidak diinginkan sehingga bahan pangan tersebut menjadi tidak layak untuk dikonsumsi. Bakteri yang tumbuh dalam bahan pangan terbagi menjadi bakteri pembusuk yang dapat menyebabkan kerusakan makanan dan

bakteri patogen penyebab penyakit pada manusia. Jumlah bakteri pembusuk umumnya lebih dominan dibandingkan dengan bakteri patogen (Fardiaz, 1992). Penyakit yang ditularkan melalui makanan hanya berhubungan dengan sejumlah kecil bakteri patogenik tertentu. Makanan atau bahan pangan tersebut digunakan sebagai substrat pertumbuhan bakteri patogen.

Bakteri tersebut dapat hidup tergantung kepada kebutuhan nutrisinya, yaitu aw (kadar air), ketersediaan oksigen, pH dan temperatur yang sesuai untuk tumbuh (Buckle *et al.*,1987). Menurut Frazier dan Westhoff (1988), beberapa genus bakteri yang umumnya dapat ditemukan pada daging adalah *Pseudomonas*, *Achromobacter*, *Streptococcus*, *Sarcina*, *Leuconostoc*, *Lactobacillus*, *Flavobacterium*, *Proteus*, *Bacillus*, *Clostridium*, *Escherichia*, dan *Salmonella*. Menurut BSN-01-6366-2000 batas cemaran Angka Lempeng Total Bakteri (ALTB) untuk daging segar adalah  $1 \times 10^6$  cfu/gr.

Menurut Lawrie (1995), mikroorganisme pada daging yang berasal dari kontaminasi pekerja diantaranya adalah *Salmonella*, *Shigella*, *Escherichia coli*, *Bacillus proteus*, *Staphylococcus albus*, dan *Staphylococcus aureus*. Kapang dan khamir juga terdapat dalam daging. Berbeda dengan bakteri, kapang dan khamir hanya terdapat pada permukaan daging karena sifatnya aerobik. Mikroorganisme yang merusak produk olahan daging dapat tumbuh pada suhu rendah meskipun suhu optimumnya pada temperatur ruang. *Pseudomonas* dapat tumbuh pada permukaan daging yang telah mengalami pendinginan (*chilling*). Kelompok bakteri ini dapat tumbuh baik pada suhu 0°C padahal suhu minimum untuk pertumbuhannya

ditentukan oleh reduksi aw dan jumlah air yang terdapat dalam daging. Bakteri yang dapat hidup pada suhu rendah dinamakan bakteri psikrofilik (Buckle *et al.*, 1987). Bakso memiliki masa simpan maksimal satu hari pada suhu kamar, maka diperlukan penambahan bahan pengawet (Wibowo, 2005).

Waktu generasi menurut Fardiaz (1992) adalah waktu yang dibutuhkan oleh suatu populasi bakteri untuk bertambah jumlahnya menjadi dua kalinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri dalam daging menurut Soeparno (1994) dan Jay (2000), dibedakan menjadi:

- 1) faktor intrinsik, meliputi nilai nutrisi daging, kadar air, pH, potensi oksidasi-reduksi, ada tidaknya substansi penghambat
- 2) faktor ekstrinsik, meliputi suhu, kelembaban relatif, ada tidaknya oksigen, serta bentuk dan kondisi daging misalnya karkas atau potongan karkas, daging cacahan atau daging giling.

Pertumbuhan bakteri dibagi ke dalam beberapa fase (Fardiaz, 1992) yaitu

- 1) fase adaptasi adalah fase penyesuaian diri dengan substrat dan kondisi lingkungan disekitarnya. Pembelahan sel belum terjadi karena beberapa enzim mungkin belum disintesis
- 2) fase pertumbuhan awal adalah fase pada saat sel mulai membelah dengan kecepatan yang masih rendah karena baru selesai tahap penyesuaian diri
- 3) fase pertumbuhan logaritmik adalah fase pada saat bakteri membelah dengan cepat dan konstan, penambahan jumlahnya mengikuti kurva logaritmik. Sel paling sensitif terhadap keadaan lingkungan



- 4) fase pertumbuhan lambat adalah fase pada saat pertumbuhan populasi bakteri diperlambat karena nutrisi medium sudah sangat berkurang dan adanya hasil-hasil metabolisme yang mungkin dapat menghambat pertumbuhan bakteri
- 5) fase pertumbuhan statis adalah fase pada saat populasi sel tetap karena bakteri mengalami pertumbuhan yang tetap pada fase ini. Karena kekurangan nutrisi, sel kemungkinan mempunyai komposisi berbeda dengan sel yang tumbuh pada fase logaritmik. Sel-sel menjadi lebih tahan terhadap keadaan ekstrim seperti panas, dingin, radiasi, dan bahan kimia
- 6) fase menuju kematian adalah fase pada saat sebagian populasi bakteri mulai mengalami kematian
- 7) fase kematian adalah fase pada saat laju kematian bakteri semakin meningkat yang terjadi karena nutrisi dalam medium sudah habis dan energi cadangan dalam sel habis

Bakteri patogen menyebabkan penyakit pada manusia melalui dua cara yaitu infeksi dalam kasus ini bakteri patogen berkembang biak dalam alat pencernaan manusia dan menghasilkan racun sedangkan intoksikasi adalah bakteri patogen menghasilkan racun dalam bahan pangan dan bahan pangan tersebut dikonsumsi oleh konsumen (Buckle *et al.*, 1987). Mikroba yang dapat menyebabkan keracunan dan infeksi saat ikut dikonsumsi disebut mikroba patogen. Beberapa bakteri yang merupakan bakteri patogen diantaranya adalah famili *Enterobacteriaceae* yaitu *Salmonella*, *Escherichia coli*.

## **F. Bakteri *Escherichia coli***

*Escherichia coli* terdapat secara normal dalam alat-alat pencernaan manusia dan hewan. Bakteri ini adalah Gram negatif, bergerak, berbentuk batang, bersifat fakultatif anaerob dan termasuk golongan Enterobacteriaceae. Suatu serotip tertentu bersifat enteropatogenik dan dikenal sebagai penyebab diare pada bayi. Beberapa galur lainnya juga sebagai penyebab diare pada orang dewasa. Organisme ini berada di dapur dan di tempat-tempat persiapan bahan pangan melalui bahan baku dan selanjutnya masuk ke makanan yang telah dimasak melalui tangan, permukaan alat-alat, tempat-tempat masakan dan peralatan lainnya. Masa inkubasi adalah 1-3 hari dan gejalanya menyerupai gejala-gejala keracunan bahan pangan yang tercemar oleh *Salmonella* atau disentri (Buckle *et al.*, 2007).

Strain ini dapat tumbuh secara efektif dalam media yang sederhana maupun yang kompleks dan kebanyakan di dalam makanan. Pertumbuhannya antara suhu 10-50°C, dengan suhu yang optimum adalah 30-37°C. Beberapa strain dapat tumbuh pada suhu di bawah 10°C. Pertumbuhan cepat terjadi pada keadaan di bawah suhu optimum. Pertumbuhan dapat terhambat apabila dalam keadaan media yang memiliki pH rendah (di bawah 5,0) dan aw yang juga rendah (di bawah 0,93). *E. coli* sensitif terhadap suhu rendah, seperti suhu pasteurisasi (Ray dan Bhunia, 2008). Bakteri ini dapat tumbuh optimum pada pH 7,0-7,5 dengan pH minimum 4,0 dan pada pH maksimum 8,5 (Frazier dan Westhoff, 1988).

Tortora *et al.*, (2006) menyatakan bahwa, kehadiran *E. coli* dalam air ataupun pangan merupakan indikasi dari *fecal contamination* atau disebut sebagai

indikator sanitasi. Bakteri ini tidak selalu patogen, akan tetapi dapat menjadi penyebab dari infeksi saluran urin, serta beberapa strain memproduksi enterotoksin yang menyebabkan penyakit diare dan juga penyakit keracunan makanan serius lainnya.



Gambar 2.1 *Escherichia coli*



Gambar 2.2 Bentuk *Escherichia coli*

### ***G. Pengamatan Visual pada Produk Bakso***

Penilaian terhadap kualitas daging salah satunya dilakukan secara organoleptik atau sensorik dengan menggunakan uji hedonik terhadap penampilan

umum. Rahayu (1998), menyatakan bahwa indra yang paling berperan dalam penilaian palatabilitas antara lain indra penglihatan, penciuman, pencicipan, dan perabaan. Warna, tekstur, rasa dan aroma memegang peranan penting dalam menentukan daya terima suatu produk pangan.

Warna yang dapat dilihat mata merupakan kombinasi beberapa faktor yaitu panjang gelombang radiasi cahaya, khroma, atau intensitas cahaya dan refleksi cahaya. Sifat-sifat produk pangan yang paling menarik perhatian pada konsumen dan paling cepat pula memberi kesan disukai atau tidak adalah sifat warna (Soekarto, 1990). Warna dapat memberi petunjuk mengenai perubahan kimia yang terjadi pada produk pangan. Warna makanan memiliki peranan utama dalam penampilan makanan, meskipun makanan tersebut lezat, tetapi bila penampilan tidak menarik waktu disajikan akan mengakibatkan selera orang yang akan memakannya menjadi hilang (Soeparno, 2005). Warna bakso dipengaruhi oleh warna daging segar, yaitu tipe molekul mioglobin, status kimia mioglobin, dan kondisi kimia serta fisik komponen lain dalam daging mempunyai peranan besar dalam menentukan warna daging (Lawrie, 1995). Selain itu warna bakso juga dipengaruhi oleh bahan yang ditambahkan ke dalam bakso (Soeparno, 2005).

Kekenyalan mempengaruhi palatabilitas seseorang terhadap suatu produk. Kekenyalan disebut juga daya elastis suatu produk. Semakin tinggi kekenyalan suatu produk maka produk tersebut semakin elastis. Menurut Pandisurya (1983), kekenyalan bakso dipengaruhi oleh jumlah tepung yang ditambahkan ke dalam adonan bakso. Penambahan es atau air es mempengaruhi kekenyalan bakso. Semakin

banyak penambahan es maka kekenyalan bakso semakin berkurang. Hal tersebut terjadi karena peningkatan kadar air yang menyebabkan bakso menjadi lembek (Indarmono, 1987).

Tekstur produk pangan berhubungan dengan sifat aliran dan deformasi produk serta cara berbagai unsur struktur dan unsur komponen ditata dan digabung menjadi mikro dan makro struktur. Lemak berperan dalam penambahan kalori serta memperbaiki tekstur dan citarasa bahan pangan. Kandungan lemak pada daging sapi segar adalah 1,3%-13%. Lemak banyak mempengaruhi flavor daging (Winarno, 1997).

**H. Ayat yang relevan**

Beberapa pengawet alami berasal dari tumbuhan, hewan ataupun mikroba, umumnya bersifat halal. Allah berfirman dalam QS Al-Baqarah/2: 168.



Terjemahnya:

*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.*

Setelah Allah Swt. menjelaskan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia dan bahwa hanya Dialah yang menciptakan segalanya, maka Allah Swt. menjelaskan bahwa Dialah yang memberi rezeki semua makhluk-Nya. Untuk itu Allah Swt.

menyebutkan sebagai pemberi karunia kepada mereka, bahwa hanya Dia yang memeperbolehkan mereka makan dari semua apa yang ada di bumi yaitu yang dihalalkan bagi mereka lagi baik dan tidak membahayakan tubuh serta akal mereka. Allah melarang mereka mengikuti langkah-langkah setan yakni jalan yang digunakan untuk menyesatkan para pengikutnya (Bhreisy dan Bahreisy, 2002: 316).


Pengawet makanan yang bersumber dari barang yang haram akan bersifat haram, bahan pengawet makanan apabila berupa hewan yang halal jika disembelih dengan tidak menyebut nama Allah pun bersifat haram. Allah menghalalkan kita mengonsumsi segala sesuatu yang diciptakanNya, kecuali yang diharamkanNya kepada kita. Yang termasuk makanan ataupun minuman yang memiliki efek bahaya bagi fisik manusia adalah yang bersifat racun misalnya pengawet kimia yang digunakan untuk mengawetkan makanan. Makanan yang sehat adalah makanan yang memiliki zat gizi yang cukup dan seimbang. Dalam Al-Quran disebutkan sekian banyak jenis makanan yang sekaligus dianjurkan untuk dimakan, misalnya pangan hewan. Banyak sekali yang terkandung dalam tumbuhan atau hewan yang mempunyai sifat sebagai pengawet antara lain bawang putih, jahe, belimbing wuluh, daun jati dan lain-lain, khususnya senyawa antimikroba yang dihasilkan oleh bakteri asam laktat. Semua yang telah diciptakanNya tiada yang sia-sia karena semua ada manfaatnya tergantung bagaimana manusia mengolahnya. Namun, sejauh ini manusia telah menerapkan ilmu pengetahuan untuk memanfaatkan apa yang telah Allah berikan untuk memenuhi dan memperbaiki kebutuhan hidup. Zaman sekarang telah banyak inovasi baru yang dapat menguntungkan manusia. Hal ini menunjukkan

bahwa semua makhluk yang diciptakanNya tiada yang sia-sia, sebagaimana contoh aplikasi bakteri asam laktat yang dimanfaatkan sebagai pengawet alami dalam bidang pangan. Demikian sedikit dari banyak petunjuk Al-Quran tentang makanan. Kita dapat menyimpulkan bahwa Al-Quran memerintahkan kepada kita untuk makan yang *halal* dan *thayyib*, serta yang lezat tapi baik akibatnya bagi kesehatan tubuh.

### **I. Hipotesis**

Hipotesis dari penelitian ini adalah bakteri asam laktat dapat mengawetkan bakso.

**J. Kerangka Pikir**





## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan berupa eksperimental, yaitu melihat struktur bakso dan mengamati mikroba pada bakso sebelum dan setelah diberi perlakuan yaitu perendaman pada kultur bakteri asam laktat *Pediococcus acidilacti* selama 1 jam. Penelitian dilakukan pada bulan Juli sampai Agustus 2015 di Laboratorium Mikrobiologi Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Makassar.

#### ***B. Variabel Penelitian***

Variabel pada penelitian ini terdiri atas:

1. Variabel terikat (*dependent variabel*)

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah lama penyimpanan bakso.

2. Variabel bebas (*independent variabel*)

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah bakteri asam laktat *Pediococcus acidilactici*.

#### ***C. Definisi Operasional Variabel***

1. *Pediococcus acidilactici* adalah spesies kokus gram positif yang sering ditemukan berpasangan atau tetra. Starter adalah biakan pemula

BAL yang digunakan pada tahap selanjutnya. Starter yang digunakan sebanyak 10% (v/v) dari jumlah kultur kerja yang akan digunakan.

3. Lama simpan adalah kurun waktu ketika suatu produk makanan akan tetap aman, mempertahankan sifat sensori, kimia, fisik, dan mikrobiologi tertentu. Masa simpan bakso tanpa pengawet yaitu satu hari pada suhu ruang.
4. Bakso ayam adalah bakso yang terbuat dari daging ayam yang telah digiling bersama dengan rempah-rempah yang dibutuhkan.
5. Total mikroba atau *total plate count* merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk menghitung jumlah mikroba dalam bahan pangan.
6. *Escherichia coli* merupakan bakteri yang digunakan sebagai indikator sanitasi. Terdapatnya cemaran *E. coli* merupakan salah satu indikator penerapan sanitasi yang buruk pada pangan.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi yang merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap penelitian yang sedang berlangsung. Observasi ini dilakukan secara sistematis, yaitu mulai dari persiapan penelitian hingga pengamatan penelitian.

#### **E. Instrumen Penelitian (Alat dan Bahan)**

Alat-alat utama dalam penelitian ini adalah *food processor*, peralatan dapur, autoklaf, inkubator, cawan petri, pipet mikro, tip, neraca analitik.

Bahan yang digunakan adalah bakso, isolat BAL yang digunakan yaitu *Pediococcus acidilactici*, media skim modifikasi, media *deMan Rogosa and Sharpe Agar* (MRSA), media *Methylen Blue Agar* (EMBA), media *Plate Count Agar* (PCA), dan NaCl fisiologis 0,85%.

## **F. Prosedur Kerja**

### **1. Pembuatan starter bakteri asam laktat**

Satu ose BAL diinokulasi ke dalam 10 mL media skim modifikasi lalu diinkubasi pada suhu 37°C selama 2 hari.

### **2. Pembuatan kultur kerja**

Sebanyak 10% (v/v) starter diinokulasikan ke dalam media skim modifikasi lalu diinkubasi selama 2 hari pada suhu 37°C. Sebelum digunakan nilai pH dan jumlah BAL pada kultur kerja diukur terlebih dahulu.

a. Sebanyak 1 mL kultur BAL diencerkan dengan larutan garam fisiologis (NaCl 0,85% (b/v)) hingga pengenceran  $10^{-8}$ . 1 mL kultur pada pengenceran  $10^{-6}$  hingga  $10^{-8}$  diinokulasi ke dalam cawan petri steril kemudian dituangkan ke media MRSA. Cawan digoyang mendatar, lalu dibiarkan beberapa saat, selanjutnya diinkubasi selama 2 hari pada suhu 37°C. Jumlah BAL dihitung dan dinyatakan dalam CFU/mL.

$$\text{Jumlah sel/ml} = \text{Jumlah koloni} \times 1/\text{faktor pengenceran}$$

### **3. Penyimpanan**

Bakso yang telah dibuat, didiamkan selama  $\pm 30$  menit kemudian direndam selama 1 jam dalam kultur kerja. Bakso ditiriskan lalu dipindahkan ke dalam wadah. Bakso disimpan selama 2 hari pada suhu kamar (25°C).

#### 4. Analisis Mikrobiologi

Pengujian yang diukur meliputi analisis mikrobiologi dan uji kualitas organoleptik. Analisis kualitas mikrobiologi dilakukan dengan pengujian TPC/total mikroba dan total *E. coli*. Data yang diperoleh dari pengujian ini kemudian dibandingkan dengan kualitas SNI untuk menentukan mutu bakso. Sedangkan uji kualitas organoleptik meliputi tekstur, penampakan dan aroma. Pengujian yang diamati pada analisis mikrobiologi bakso dilakukan pada sebelum penyimpanan dan setelah penyimpanan (hari ke-2), sedangkan pengamatan visual aplikasi kultur BAL pada bakso diamati setiap hari.

##### a. Total Mikroba (Dewan Standardisasi Nasional, 1995)

Sebanyak 5 gram sampel bakso yang telah dicincang ditambahkan 45 mL NaCl 0,85% steril, kemudian dihomogenkan. Sampel ini kemudian diencerkan dengan NaCl 0,85% hingga pengenceran kelima ( $10^{-5}$ ). Sampel dipipet secara aseptik pada pengenceran  $10^{-3}$  sampai  $10^{-5}$  dan sebanyak 1 mL dipipet ke dalam cawan petri steril dan tuang media *plate count agar* (PCA). Inkubasi dilakukan selama 48 jam pada suhu  $37^{\circ}\text{C}$ . Jumlah bakteri ditentukan dengan metode hitungan cawan. Menurut SNI 01-0366- 2000, batas maksimal batas total mikroba produk bakso adalah  $1 \times 10^5$  cfu/g.

##### b. Analisis Total *Escherichia coli*

Sebanyak 5 gram sampel bakso yang telah dicincang ditambahkan 45 mL NaCl 0,85% steril, kemudian dihomogenkan. Sampel ini kemudian diencerkan dengan NaCl 0,85% hingga pengenceran kelima ( $10^{-5}$ ). Sampel dipipet secara aseptik pada

pengenceran  $10^{-1}$  sampai  $10^{-3}$  dan sebanyak 1 mL dipipet ke dalam cawan petri steril dan tuang media *eosyn methylen blue agar* (EMBA). Inkubasi dilakukan selama 48 jam pada suhu  $37^{\circ}\text{C}$ , koloni *E. coli* yang tumbuh berwarna biru keunguan dan memancarkan warna hijau metalik. Menurut SNI 01-0366-2000, batas maksimal batas total populasi *E. coli* produk bakso adalah  $1 \times 10^2$  cfu/g (Badan Standardisasi Nasional, 2000).

#### e. Pengamatan Visual Pada Produk Bakso

Tahap aplikasi pada produk bakso daging dilakukan dengan dua perlakuan yaitu dengan perendaman bakso pada kultur BAL selama 1 jam dan tanpa perendaman. Perendaman pada kultur BAL menjadi bahan pengawet alami pada bakso. Bakso kemudian diamati secara visual selama 2 hari pada penyimpanan suhu ruang. Tahapan ini dilakukan untuk mengetahui perlakuan mana yang dapat memperpanjang umur simpan bakso secara kualitatif. Beberapa parameter yang menunjukkan mutu bakso tergolong buruk adalah berlendir, tekstur lunak, adanya kapang, dan berbau menyimpang dari keadaan normal.

#### **G. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data**

Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian aplikasi BAL pada produk bakso adalah rancangan acak lengkap (RAL) faktorial dengan pola  $2 \times 2$  dengan dua faktor dan dua kali ulangan. Faktor pertama adalah bakso dengan perendaman BAL dan tanpa perendaman BAL. Faktor kedua adalah pengamatan bakso sebelum dan setelah masa simpan (2 hari) pada suhu ruang ( $25^{\circ}\text{C}$ ). Faktor pertama adalah perendaman dan tanpa perendaman diantaranya sebagai berikut:

A = sampel kontrol (tanpa perendaman)

B = sampel dengan perendaman BAL

Faktor kedua adalah masa simpan diantaranya sebagai berikut:

MS0 = hari ke-0 (sebelum penyimpanan)

MS1 = hari ke-2 (setelah masa simpan)

Tabel 3.1. Kombinasi Perlakuan antara Sampel dan Masa Simpan

Sampel	Masa Simpan (MS)	
	MS0	MS1
A	AMS0	AMS1
B	BMS0	BMS1

Analisis data uji kualitas mikrobiologis dan pengamatan visual bakso disajikan dalam bentuk deskriptif.

**BAB IV**  
**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**A. Hasil Penelitian**

**1. Analisis pH Kultur Bakteri Asam Laktat**



pH 4

Gambar 4.1 Analisis pH kultur

**2. Analisis Total Koloni Kultur Bakteri Asam Laktat**

Tabel 4.1 Jumlah koloni kultur kerja BAL

Pengenceran	Jumlah koloni	CFU/mL
$10^{-6}$	234	$2,34 \times 10^8$
$10^{-7}$	140	$1,4 \times 10^9$
$10^{-8}$	73	$7,3 \times 10^9$

### 3. Analisis Mikrobiologi Bakso

#### a. Analisis Total Mikroba sebelum masa simpan

Tabel 4.2. Hasil analisa total mikroba bakso sebelum masa simpan

Sampel	Total mikroba (cfu/g)	Standar (cfu/g)	Keterangan
Kontrol	$1,6 \times 10^5$	$1 \times 10^5$	TMS
Bakso perendaman BAL	$4,1 \times 10^4$	$1 \times 10^5$	MS

Standar menurut SNI No. 01-3553 tahun 2006

Keterangan :TMS (Tidak Memenuhi Syarat)

MS (Memenuhi Syarat)

#### b. Analisis Total Mikroba setelah masa simpan

Tabel 4.3. Hasil analisa total mikroba setelah masa simpan

Sampel	Total mikroba (cfu/g)	Standar (cfu/g)	Keterangan
Kontrol	$1,8 \times 10^5$	$1 \times 10^5$	TMS
Bakso Perendaman BAL	$3,2 \times 10^4$	$1 \times 10^5$	MS

Standar menurut SNI No. 01-3553 tahun 2006

Keterangan :TMS (Tidak Memenuhi Syarat)

MS (Memenuhi Syarat)



b. Analisis Total Mikroba setelah masa simpan

Tabel 4.4. Hasil analisis total *E. coli* setelah masa simpan

Sampel	Total <i>E.coli</i> (cfu/g)	Standar (cfu/g)	Keterangan
Kontrol	$2,6 \times 10^5$	$1 \times 10^2$	TMS
Bakso Perendaman BAL	$5,1 \times 10^2$	$1 \times 10^2$	TMS

Standar menurut SNI No. 01-3553 tahun 2006

Keterangan :TMS (Tidak Memenuhi Syarat)

**4. Pengamatan Visual Bakso**



Gambar 4.2. Struktur bakso setelah penyimpanan 2 (48 jam) hari pada suhu ruang

Tabel 4.5. Pengamatan visualisasi bakso selama masa simpan

Parameter	Bakso tanpa perendaman			Dengan Perendaman BAL		
	Hari-0	Hari-1	Hari-2	Hari-0	Hari-1	Hari-2
Tekstur	Empuk	Empuk	Lembek	Empuk	Empuk	Empuk
Penampakan	Kering	Mulai basah	Berlendir dan mucul kapang	Kering	Kering	Kering
Aroma	Daging	Daging	Busuk	Daging	Daging	Daging

## **B. Pembahasan**

*Pediococcus acidilastici* ditumbuhkan dalam media skim yang dimodifikasi dengan 10% susu skim + 2% ekstrak khamir/*yeast* + 2% glukosa + 1% pepton (b/v). Modifikasi dilakukan berdasarkan penelitian Jenie *et al.*, (1999). Modifikasi ini dilakukan sehubungan dengan pengaplikasian kultur BAL pada produk pangan untuk memperkaya nutrisi media dengan memenuhi kebutuhan nutrisi BAL yang kemoorganotrofik dan kompleks.

Susu skim digunakan sebagai sumber substrat. Susu skim mengandung protein tinggi sekitar 3,7% dan lemak sekitar 0,1% (Jay, 1996). Susu skim mengandung kasein yang dapat dipecah oleh mikroorganisme proteolitik menjadi senyawa nitrogen terlarut sehingga pada kultur terdapat area bening yang menunjukkan bahwa dari kejadian tersebut mikroba mempunyai aktivitas proteolitik (Fardiaz, 1992).

Ekstrak khamir/*yeast* dan pepton menurut Smith *et al.*, (1975) merupakan sumber asam amino dan nitrogen yang berfungsi untuk merangsang pertumbuhan BAL. Gandreau *et al.*, (1997) menemukan bahwa suplementasi ekstrak khamir sebanyak 70 g/l pada media YPC (*yeast permeate citrate*) dapat memicu produksi asam laktat dan diasetil pada *Lactococcus lactis* subsp. *lactis*. Akan tetapi, penambahan ekstrak khamir yang berlebihan, sebanyak 100 g/l juga justru dapat menghambat pertumbuhan BAL. Glukosa berfungsi sebagai sumber C (karbon), merupakan substrat monosakarida yang akan dipecah BAL menjadi asam laktat dan

metabolit lainnya. Kecepatan pertumbuhan BAL dalam proses fermentasi sangat ditentukan oleh kesesuaian kandungan nutrisi yang terdapat dalam media fermentasi.

### **1. Analisis pH media kultur Bakteri Asam Laktat**

Nilai pH menunjukkan konsentrasi ion  $H^+$  yang berada dalam larutan. Jika nilai pH semakin tinggi, maka semakin banyak ion  $H^+$  yang berada dalam larutan. Nilai pH yang semakin rendah merupakan faktor daya fermentasi BAL. Susu skim sebagai media fermentasi merupakan makanan bagi bakteri asam laktat, yang selanjutnya diubah menjadi asam laktat. Kondisi yang anaerobik mutlak diperlukan agar fermentasi berjalan dengan baik. Analisa pH dimaksudkan, untuk mengetahui pengaruh pH terhadap pertumbuhan bakteri asam laktat selama fermentasi. Perubahan nilai pH pada kultur kerja dapat dilihat pada gambar 4.1.

Pada gambar 4.1. terlihat bahwa pH media kultur kerja dari media skim modifikasi menunjukkan pH 4. pH ini menunjukkan tumbuhnya bakteri asam laktat, sehingga keadaan fermentasi menjadi asam dan menurunkan nilai pH. Menurut Suharto, (1991) bahwa *Pediococcus* akan menghasilkan asam lebih banyak sampai jumlah tertentu, selama pembentukan asam tersebut pH akan menurun. Juga didukung bahwa asam laktat yang dihasilkan BAL dapat memberikan efek bakterisidal untuk bakteri lain karena pH lingkungan dapat turun menjadi 3-4,5.

Asam laktat yang dihasilkan dapat menyebabkan terjadinya penurunan pH lingkungan. pH yang rendah dapat menghambat kontaminasi mikroba pembusuk dan mikroba patogen (Sperling, 1968 dalam Suriawiria, 1983). Penurunan pH disebabkan karena adanya asam-asam organik yang dihasilkan oleh BAL. Media skim

modifikasi yang ditambahkan starter *Pediococcus acidilactici* mampu membentuk asam laktat, asam asetat dan asam butirat. Selain asam organik, BAL juga dapat menghasilkan senyawa antimikroba lain seperti bakteriosin dan hidrogen peroksida (Suriawiria, 1983).

Pengujian terhadap kemampuan produksi asam dilakukan dengan mengukur perubahan pH pada media yang digunakan untuk inokulasi BAL. Semakin rendah pH maka semakin tinggi konsentrasi asam. Asam yang dihasilkan dalam proses fermentasi sebagian besar merupakan asam laktat yang dihasilkan dari pemecahan glukosa (Suriawiria, 1983). Semakin lama waktu inkubasi maka asam laktat yang dihasilkan juga semakin besar, asam laktat tersebut akan terakumulasi pada media sehingga terjadi penurunan pH media.

Semakin rendah nilai pH pada media, akan mengakibatkan semakin sedikit mikroba lain yang dapat bertahan hidup pada media tersebut. Jumlah proton yang tinggi pada media menyebabkan proton tersebut akan masuk ke dalam sitoplasma sel mikroba. Proton tersebut harus dikeluarkan oleh mikroba tersebut untuk menyeimbangkan konsentrasi di dalam dan luar sel. Oleh karena itu, mikroba memerlukan energi yang tinggi untuk mengeluarkan proton tersebut, sehingga proses metabolisme mikroba akan terganggu dan dapat menyebabkan kematian terhadap mikroba tersebut (Hames *et al.*, 2003).

Nilai pH pada isolat bakteri asam laktat tersebut masih merupakan pH optimum bagi aktivitas BAL. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian (Djaafar dkk.,1996) bahwa derajat keasaman (pH) yang optimum bagi aktivitas bakteri asam

laktat berkisar antara pH 3–8. Sedangkan pH optimum untuk *Pediococcus acidilactici* yaitu 4. Nilai pH tersebut dapat mendukung kemampuan BAL dalam menghambat bakteri pembusuk.

## **2. Analisis Total Bakteri Asam Laktat**

Starter adalah biakan pemula BAL yang digunakan pada tahap selanjutnya. Starter yang digunakan sebanyak 10% (v/v) dari jumlah kultur kerja yang akan digunakan. Starter diinkubasi selama 48 jam pada suhu 37°C. Setelah itu starter ditambahkan pada kultur kerja. Sebelum digunakan, jumlah BAL pada kultur kerja dianalisis terlebih dahulu dengan menggunakan metode hitungan cawan.

Perhitungan total BAL bertujuan untuk melihat kemampuan isolat untuk tumbuh pada media skim modifikasi dengan memanfaatkan nutrisi yang ada pada media selama inkubasi 48 jam. Adapun hasilnya dapat dilihat pada tabel 4.1.

Rumus:

$$SPC = 1/\text{faktor pengenceran} \times \text{jumlah koloni}$$

Penggunaan medium susu skim menghasilkan jumlah BAL hingga konsentrasi  $10^9$  cfu/mL. Suspensi diencerkan hingga  $10^{-8}$ ,  $10^{-7}$  dan  $10^{-6}$  cfu/mL dengan menambahkan larutan garam fisiologis. Tujuan dari pengenceran bertingkat yaitu mengurangi jumlah mikroba yang tersuspensi dalam cairan. Perbandingan 1 : 9 digunakan untuk sampel dan pengenceran pertama dan selanjutnya, sehingga pengenceran berikutnya mengandung 1/10 sel mikroorganisme dari pengenceran sebelumnya. (Pelczar, 1986). Setelah melakukan pengenceran, suspensi bakteri selanjutnya dapat dibiakkan. Membiakkan mikroorganisme dapat dilakukan dengan

berbagai cara, salah satunya dalam metode cawan. Pengembangbiakan dalam media cawan Petri ini terdiri dari beberapa metode, salah satunya adalah metode cawan tuang (*pour plate*) (Setiyono,2013). Kultur BAL diserap oleh bakso selama masa perendaman 1 jam.

Total BAL cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya proporsi susu skim yang ditambahkan. Hal ini diduga karena semakin banyak nutrisi yang tersedia bagi pertumbuhan BAL. Peningkatan jumlah BAL (*Pediococcus acidilactici*) karena BAL dalam medium akan memfermentasi atau menghidrolisis gula menjadi komponen yang lebih sederhana menjadi asam laktat, asam organik, CO<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>O dan energi (Charterist *et al.*, 1998).

### **3. Analisis Mikrobiologi**

#### **a. Analisis Total Mikroba**

Kuantifikasi populasi mikroorganismenya sering dilakukan untuk mendapatkan jumlah kuantitatif mikroorganismenya. PCA atau yang juga sering disebut dengan *Standard Methods Agar* (SMA) merupakan sebuah media pertumbuhan mikroorganismenya yang umum digunakan untuk menghitung jumlah bakteri total (semua jenis bakteri) yang terdapat pada setiap sampel seperti makanan, produk susu, air limbah dan sampel-sampel lainnya. *Plate Count Agar* (PCA) pertama kali dikembangkan oleh Buchbinder, Baris, dan Universitas Sumatera Utara Goldstein pada tahun 1953 atas permintaan dari *American Public Health Association* (APHA) (Stanier *et al.*, 1980).

Komposisi PCA dapat bervariasi, tetapi biasanya mengandung : 0,5% tripton, 0,25% ekstrak ragi/*yeast* 0,1% glukosa, 1,5% agar. PCA mengandung glukosa dan ekstrak ragi yang digunakan untuk menumbuhkan semua jenis bakteri. PCA mengandung nutrisi yang disediakan oleh tripton, vitamin dari ekstrak ragi, dan glukosa yang digunakan sebagai sumber energi bagi mikroorganisme sehingga mendukung pertumbuhan dari bakteri. PCA bukan merupakan media selektif karena media ini tidak hanya ditumbuhi oleh satu jenis mikroorganisme tertentu (Stanier *et al.*, 1980).

Metode hitungan cawan didasarkan pada anggapan bahwa setiap sel yang dapat hidup akan berkembang menjadi satu koloni. Jadi jumlah koloni yang muncul pada cawan merupakan suatu indeks bagi jumlah organisme yang dapat hidup yang terkandung dalam sampel, dan mencawakan hasil pengenceran tersebut. Setelah inkubasi, jumlah koloni masing-masing cawan diamati. Untuk memenuhi persyaratan statistik, cawan yang dipilih untuk penghitungan koloni ialah yang mengandung antara 30 sampai 300 koloni.

Menurut Jutono, dkk., (1973), perhitungan dengan cara ini diperlukan beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1. Jumlah bakteri tiap cawan antara 30-300 koloni, jika memang tidak ada yang memenuhi syarat dipilih yang jumlahnya mendekati 300.
2. Tidak ada koloni yang menutup lebih besar dari setengah luas petridish, koloni tersebut dikenal sebagai *spreader*.

3. Hasil yang dilaporkan hanya terdiri dari dua angka, yaitu angka pertama didepan koma dan angka kedua dibelakang koma.
4. Jika semua pengenceran yang dibuat menghasilkan angka kurang 30 koloni pada cawan petri, hanya jumlah koloni pada pengenceran terendah yang dihitung. Hasil dilaporkan sebagai kurang dari 30 dikalikan dengan besarnya pengenceran, tetapi jumlah yang sebenarnya harus dicantumkan dalam tanda kurung.
5. Jika semua pengenceran yang dibuat menghasilkan lebih dari 300 koloni pada cawan petri, hanya koloni pada pengenceran tertinggi yang dihitung. Hasilnya dilaporkan sebagai lebih besar dari 300 dikalikan dengan besarnya pengenceran, jumlah yang sebenarnya harus dicantumkan dalam tanda kurung.

Keuntungan dari metode pertumbuhan agar atau metode uji total mikroba adalah dapat mengetahui jumlah mikroba yang dominan. Keuntungan lainnya dapat diketahui adanya mikroba jenis lain yang terdapat pada cawan. Adapun kelemahan dari metode ini menurut Buckle (1987) adalah:

1. Kemungkinan terjadinya koloni yang berasal lebih dari satu sel mikroba seperti pada mikroba yang berpasangan, rantai atau kelompok sel. Kemungkinan ini akan memperkecil jumlah sel mikroba yang sebenarnya.
2. Kemungkinan adanya jenis mikroba yang tidak dapat tumbuh karena penggunaan jenis media agar, suhu, pH, atau kandungan oksigen selama masa inkubasi.
3. Koloni dari beberapa mikroorganisme terutama dari contoh bahan pangan, kadang-kadang menyebar di permukaan media agar, sehingga menutupi pertumbuhan dan perhitungan jenis mikroba lainnya



4. Penghitungan dilakukan pada media agar yang jumlah populasi mikrobanya antara 30–300 koloni. Bila jumlah populasi kurang dari 30 koloni akan menghasilkan penghitungan yang kurang teliti secara statistik, namun bila lebih dari 300 koloni akan menghasilkan hal yang sama karena terjadi persaingan diantara koloni.
5. Penghitungan populasi mikroba dapat dilakukan setelah masa inkubasi yang umumnya membutuhkan waktu 24 jam atau lebih.

#### 1) Analisis Total Mikroba Bakso Sebelum Masa Simpan

Total jumlah mikroba perlu diketahui untuk memastikan suatu bahan pangan apakah layak atau tidak untuk dikonsumsi. Log total mikroba dipengaruhi secara nyata oleh metode perendaman BAL. Total mikroba yang dihasilkan oleh bakso tanpa perendaman jauh lebih banyak dibanding bakso dengan perendaman BAL. Bakso tanpa perendaman BAL yang dianalisis sebelum mengalami masa penyimpanan menghasilkan 164 koloni mikroba dengan satuan  $1,6 \times 10^5$  cfu/g. Sedangkan bakso dengan perendaman BAL menghasilkan 41 koloni atau senilai  $4,1 \times 10^4$  cfu/g. Bakso dengan perendaman BAL masih sesuai dengan SNI. Menurut SNI 01-0366-2000, batas maksimal batas total mikroba produk bakso adalah  $1 \times 10^5$  cfu/g. Data analisis mikrobiologi pada bakso menunjukkan total mikroba pada bakso kontrol melebihi batas maksimal SNI. Banyaknya cemaran mikroba ini disebabkan tempat pengolahan yang kurang higienis, kontaminasi dari pembuat bakso, air, lantai, udara, dan alat-alat yang digunakan.

Menurut SNI 01-0366-2000, dinyatakan bahwa mikroba yang melebihi batasan normal dapat disebabkan oleh daging yang digunakan memiliki jumlah

mikroba di ambang batasan normal dan terjadi kontaminasi dari alat-alat yang digunakan (Badan Standardisasi Nasional, 2000). Fardiaz (1992), mengatakan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan mikroba diantaranya ketersediaan nutrisi, pH, aktivitas air, ketersediaan oksigen, dan potensi oksidasi reduksi. Total mikroba dipengaruhi juga oleh lamanya penyimpanan. Semakin lama masa simpan maka semakin meningkat pula pertumbuhan mikroba pada bakso tersebut.

## 2) Analisis Total Mikroba Setelah Masa Simpan

Setelah masa simpan selama 2 hari atau 48 jam pada suhu ruang, sampel kembali dianalisis. Sampel bakso tanpa perendaman menghasilkan koloni sebanyak  $1,8 \times 10^5$  cfu/mL dan sampel bakso dengan perendaman BAL menghasilkan mikroba sebanyak  $3,2 \times 10^4$  cfu/mL. Total mikroba pada sampel bakso kontrol, meningkat jumlahnya dari  $1,6 \times 10^5$  cfu/ml menjadi  $1,8 \times 10^5$  cfu/mL. Bakso kontrol mengalami peningkatan jumlah total bakteri yang melebihi batas yang ditentukan SNI. Sedangkan pada sampel bakso dengan perendaman BAL, total mikroba tereduksi dari  $4,1 \times 10^4$  cfu/mL menjadi  $3,2 \times 10^4$  cfu/mL. Menurut Prescott *et al.*, (2003), penghambatan terhadap bakteri dapat bersifat bakterisidal ataupun bakteristatik. Bakteristatik artinya dapat menghambat pertumbuhan secara cukup signifikan dan bila bahan penghambat dihilangkan maka bakteri akan pulih dan dapat tumbuh kembali. Sedangkan bakteristatik artinya data membunuh bakteri secara signifikan. Dari pengujian kedua sampel diketahui bahwa jumlah cemaran mikroba pada bakso dengan perendaman BAL masih dalam ambang batas SNI, sedangkan cemaran

mikroba pada bakso kontrol telah melebihi batas ambang maksimal SNI. Dalam tingkat masa simpan, sampel bakso dengan perendaman BAL jauh lebih awet dibanding sampel bakso tanpa perendaman.

Di dukung oleh hasil penelitian Oktaviani (2004), menyatakan bahwa filet nila merah yang direndam dengan larutan *Lactobacillus plantarum* sebanyak  $10^8$  cfu/mL selama 15 menit mampu mencapai masa simpan hingga hari ke-9. Hal tersebut disebabkan oleh pertumbuhan bakteri pembusuk yang menjadi lebih lambat karena terjadi persaingan antara BAL dengan bakteri pembusuk dalam memperebutkan nutrient pada filet. Adanya proses persaingan serta terbatasnya jumlah nutrient pada medium filet menyebabkan pertumbuhan bakteri pembusuk menjadi terhambat (Jenie *et al.*, 1999). Bakso dengan perendaman BAL sebanyak  $7,3 \times 10^9$  cfu/mL menghasilkan penyimpanan yang lebih lama. Sesuai yang dikemukakan oleh Winarno (1993) bahwa bakso tanpa pengawet hanya mampu bertahan maksimal satu hari pada suhu kamar. Dengan demikian berarti bahwa bakso yang direndam bakteri asam laktat (BAL) jenis *Pediococcus acidilactici* memiliki masa simpan satu hari lebih lama bila dibandingkan dengan bakso yang tidak diberi BAL.

### 3) Analisis total *E. Coli*

Pada hari sebelum masa simpan, baik bakso yang direndam maupun bakso tanpa perendaman, tidak terdapat pertumbuhan *E. coli*. Hal dikarenakan bakso telah mengalami masa pematangan yang menyebabkan bakteri *E. coli* pada bakso menjadi mati. *Escherichia coli* relatif peka terhadap panas, segera hancur oleh suhu

pasteurisasi dan pemanasan. Sedangkan proses pembekuan ( $0^{\circ}\text{C}$ ) tidak akan membinasakan bakteri ini, sehingga dapat hidup dalam suhu yang rendah dalam jangka waktu relatif panjang (Volk dan Wheeler, M. 1984). Namun setelah penyimpanan 2 hari, *E. coli* mulai mengalami pertumbuhan. Melalui proses pematangan pada suhu sekitar  $80$  hingga  $100^{\circ}\text{C}$ , bakteri *E. coli* yang terdapat pada bakso tersebut menurun. Namun, jumlah tersebut meningkat setelah penyimpanan 2 hari atau 48 jam.

Pengaruh perendaman bakso dengan kultur BAL dan tanpa perendaman setelah masa simpan 2 hari pada suhu ruang dapat dilihat pada tabel 4.4. *E. coli* merupakan bakteri Gram negatif, tumbuh optimal pada suhu  $37^{\circ}\text{C}$ , tetapi dapat tumbuh pada kisaran suhu  $15-45^{\circ}\text{C}$  (Supardi dan Sukanto, 1999). Menurut SNI 01-0366-2000, batas maksimal batas total populasi *E. coli* produk bakso adalah  $1 \times 10^2$  cfu/g (Badan Standardisasi Nasional, 2000). Berdasarkan tabel 4.4. terlihat bahwa pertumbuhan *E. coli* sangat besar pada bakso tanpa perendaman BAL. Hasil analisisnya sebesar  $2,6 \times 10^5$  cfu/mL, sehingga populasi *E. coli* pada bakso tanpa perendaman telah melebihi ambang batas maksimum yang ditetapkan dalam SNI. Terlihat pula bahwa perendaman pada kultur BAL mampu menghambat pertumbuhan *Escherichia coli* pada bakso dibandingkan kontrol. Hal ini terlihat pada analisis BAL hanya sebanyak  $5,1 \times 10^2$  cfu/mL. Sesuai dengan Arief *et al.* (2008) yang menyatakan bahwa BAL menghasilkan zat antimikroba yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri Gram negatif. Hasil analisis populasi *E. coli*

pada bakso yang direndam maupun pada bakso yang tanpa perendaman keduanya tidak memenuhi syarat SNI.

*E. coli* merupakan bakteri yang digunakan sebagai indikator sanitasi. Terdapatnya *E. coli* merupakan salah satu indikator penerapan sanitasi yang buruk. Metode analisis total *E. coli* menggunakan medium selektif EMB Agar. Media EMBA adalah medium selektif dan diferensial digunakan untuk mengisolasi *coliform fecal*. Eosin dan metilen blue adalah pewarna indikator pH yang bergabung untuk membentuk endapan ungu gelap pada pH rendah (asam), mereka juga berfungsi untuk menghambat pertumbuhan organisme yang paling Gram positif. Sukrosa dan laktosa berfungsi sebagai sumber karbohidrat dapat difermentasi yang mendorong pertumbuhan *coliform*. Fermentor yang kuat dari laktosa atau sukrosa akan menghasilkan jumlah asam yang cukup untuk membentuk kompleks warna ungu tua. Pertumbuhan organisme ini akan muncul berwarna ungu tua sampai hitam. Pada *Escherichia coli*, suatu fermentor yang kuat, sering menghasilkan warna koloni hijau metalik. Fermentor lambat atau lemah akan menghasilkan koloni merah muda mukoid atau berlendir. Biasanya koloni berwarna atau tidak berwarna menunjukkan bahwa organisme fermentor laktosa atau sukrosa tersebut bukan merupakan *coliform fecal* (Cheeptham,N, 2012).

Berdasarkan teori menyebutkan bahwa pada tahap pengolahan makanan besar kemungkinan terjadinya kontaminasi makanan disebabkan oleh faktor fisik, kimia dan biologi. Pada saat pengolahan makanan perlu diperhatikan penggunaan perlengkapan dan peralatan masak agar tidak mencemari makanan yang telah diolah.

Pada saat mencicipi makanan sebaiknya menggunakan alat yang bersih sehingga makanan tidak terkontaminasi oleh kuman yang mungkin ada ditangan (Depkes, 2006)

Lama penyimpanan memiliki peran yang penting terhadap total *E. coli*, hal ini dapat terlihat dari jumlah mikroba yang meningkat seiring dengan semakin lama waktu penyimpanan pada suhu ruang ( $\pm 28^{\circ}\text{C}$ ) yang menguntungkan bakteri untuk dapat tumbuh dan berkembang pesat. Menurut Fardiaz (1992) suhu dimana suatu makanan disimpan sangat besar pengaruhnya terhadap jasad renik yang dapat tumbuh serta kecepatan pertumbuhannya. Jenis bakteri yang dapat tumbuh pada suhu ruang adalah bakteri mesofilik, menurut Suparno (1998) bakteri ini dapat tumbuh baik pada temperatur 25-40°C.

#### **4. Hasil Pengamatan Visual Selama Penyimpanan**

Kerusakan bahan pangan dapat diidentifikasi dengan beberapa cara, yang pertama adalah dengan uji organoleptik yaitu dengan melihat tanda-tanda kerusakan seperti perubahan tekstur atau kekenyalan, warna, bau, pembentukan lendir, dll. Pengamatan dilakukan setiap hari meliputi pengamatan subyektif (tekstur dan penampakan) selama penyimpanan dua hari. Hasil pengamatan uji organoleptik sampel bakso secara visual pada dua perlakuan yaitu bakso dengan perendaman BAL dan tanpa perendaman BAL dapat dilihat pada tabel 4.5.

Hasil pengamatan subyektif pada penyimpanan hari ke-0 yang meliputi tekstur dan aroma, bakso menunjukkan bahwa sampel dengan semua perlakuan masih dalam kondisi normal. Begitu pun dengan penampakannya yang masih dalam

kondisi normal yang ditandai dengan tidak ditemukannya miselium kapang dan lendir.

Penyimpanan hari pertama, bakso tanpa perendaman mulai mengalami kerusakan sedangkan sampel yang diberi perlakuan perendaman BAL belum menunjukkan kerusakan.. Penampakan bakso tanpa perendaman mulai basah.

Selanjutnya pada pengamatan hari ke-2, sampel bakso tanpa perendaman sudah memasuki kategori busuk dan tidak aman untuk dikonsumsi. Terdapat beberapa parameter yang sudah rusak seperti munculnya bau busuk pada sampel bakso serta ditemukannya miselium kapang dan lendir pada permukaan sampel bakso. Menurut Buckle *et al.* (2007), pertumbuhan bakteri pada permukaan yang basah seperti daging dapat menyebabkan bau yang menyimpang serta pembusukan bahan pangan dengan pembentukan lendir. Dari pengamatan yang dilakukan, penyimpangan tersebut menunjukkan bahwa produk sudah memasuki kategori rusak dan tidak dapat dikonsumsi. Secara organoleptik, tanda-tanda yang dapat diamati untuk mengetahui terjadinya kerusakan bakso antara lain timbulnya bau masam hingga busuk, permukaan bakso berlendir dan ditumbuhi miselium kapang, warna, dan penampakan menjadi tidak cerah. Berdasarkan pengamatan antara bakso dengan perendaman BAL dan tanpa perendaman didapatkan data bahwa perendaman BAL mampu memperlambat laju kerusakan sampel bakso terhadap pertumbuhan mikroorganisme.

Jika tumbuh pada bahan pangan, bakteri dapat menyebabkan berbagai perubahan pada penampakan maupun komposisi kimia dan cita rasa bahan pangan

tersebut. Perubahan yang dapat terlihat dari luar yaitu perubahan warna, pembentukan lapisan pada permukaan makanan cair atau padat, pembentukan lendir, pembentukan endapan atau kekeruhan pada minuman, pembentukan gas, bau asam, bau alkohol, bau busuk dan berbagai perubahan lainnya (Fardiaz, 1992).

Syarif dan Halid (1993) menyatakan bahwa identifikasi jenis bakteri berdasarkan sifat morfologi, biokimia, fisiologi dan serologi adalah sebagai berikut:

1. Bakteri gram positif

a. Kokus: *Staphylococcus*, *Streptococcus*, *Leuconostoc*, *Pediococcus*.

b. Batang: *Clostridium botulinum*, *Lactobacillus*, *Propionic bacterium*, *Bacillus*

2. Bakteri gram negatif

a. Fermentatif ( Batang ): *Proteus*, *Escherisia coli*, *Enterobacter*.

b. Non fermentatif ( spiral / batang ): *Pseudomonas*, *Aclaligenes*.

Kerusakan bahan pangan dapat disebabkan oleh faktor–faktor sebagai berikut: pertumbuhan dan aktivitas mikroba terutama bakteri, kapang, khamir, aktivitas enzim–enzim di dalam bahan pangan, serangga, parasit dan tikus, suhu termasuk oksigen, sinar dan waktu. Mikroba terutama bakteri, kapang dan khamir penyebab kerusakan pangan yang dapat ditemukan dimana saja baik di tanah, air, udara, di atas bulu ternak dan di dalam usus (Muchtadi, 1989 ).

Tumbuhnya bakteri, kapang dan khamir di dalam bahan pangan dapat mengubah komposisi bahan pangan. Beberapa diantaranya dapat menghidrolisa pati dan selulosa atau menyebabkan fermentasi gula sedangkan lainnya dapat menghidrolisa lemak dan menyebabkan ketengikan atau dapat mencerna protein dan



menghasilkan bau busuk atau amoniak. Bakteri, kapang dan khamir senang akan keadaan yang hangat dan lembab. Sebagian besar bakteri mempunyai pertumbuhan antara 45–55°C dan disebut golongan bakteri thermofilik. Beberapa bakteri mempunyai suhu pertumbuhannya antara 20–45°C disebut golongan bakteri mesofilik, dan lainnya mempunyai suhu pertumbuhan dibawah 20°C disebut bakteri psikrofilik (Muchtadi, 1989).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Aplikasi bakteri asam laktat (BAL) *Pediococcus acidilactici* mampu memperpanjang masa simpan bakso yang disimpan pada suhu ruang (25-30°C) dibandingkan dengan kontrol selama dua hari penyimpanan. Perendaman bakso dengan menggunakan BAL tidak menimbulkan perubahan karakteristik fisik pada bakso baik sebelum maupun setelah penyimpanan. BAL berpotensi sebagai preservatif alami pada produk bakso.

#### **B. Implikasi Penelitian (Saran)**

1. Perlu penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi senyawa antimikroba BAL yang dapat dimanfaatkan sebagai preservatif alami.
2. Perlu dilakukan penelitian untuk mencari cara yang lebih efektif dan ekonomis agar dapat diaplikasikan kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdelbasset M and Kirane Djamila. "Antimicrobial activity of autochthonous lactic acid bacteria isolated from Algerian traditional fermented milk Raïb" *African Journal of Biotechnology* Vol. 7 (16), pp. 2908-2914 (18 August, 2008) <http://www.academicjournals.org/AJB> ISSN 1684-5315 ©2008 Academic Journals (Diakses pada 19 Januari 2015).
- Aberle, H. B. Forrest, J. C., E. D. Hendrick., M. D. Judge & R. A. Merkel. *Principle of Meat Science 4th Edit.* Iowa: Kendal/Hunt Publishing, 2000.
- Aravind G, Bhowmik D, Duraivel S, Harish G.. *Traditional and Medicinal Uses of Carica papaya*. J Med Plant Stu 1:7-1, 2013.
- Ardiansyah. "Teknik ekstraksi komponen antimikroba andaliman (*Zanthoxylum acanthopodicum*) dan antarasa (*Litsea cubeba*)". *Skripsi*. IPB: Fakultas Teknologi Pertanian, 2001.
- Arief I. I., RRA Maheswari & T. Suryati. "Isolasi dan Karakterisasi Bakteri Asam Laktat dari Daging Sapi Lokal di Pasar Tradisional Daerah Bogor". *Skripsi*. Bogor: IPB, 2008.
- Axelsson, L. *Lactic Acid Bacteria: Classification and Physiology*. In: Roller, S. (Ed.). *Natural Antimicrobials for The Minimal Processing of Food*. Wyoming: University of Wyoming CRC Press, 1998.
- Balasubramanyam, B.V. and Varadaraj, M.J. "Antibacterial Effect of Lactobacillus Spp. on Foodborne Pathogenic Bacteria in an Indian Milk Based Fermented Culinary Food Item". *Cultured Dairy Product J.*, 30 : 22-24, 26-27, 1995.
- Bhreisy dan Bahreisy. *Terjemahan Singat Tafsir Ibnu Katsir*. Surabaya: Bina Ilmu, 2002.
- Bhunja, AK., Jhonson MC, Ray B. "Purification, Characterization and Antimicrobial Spectrum of a Bacteriocin Produced by *Pediococcus acidilactici*". *J. Appl. Bacteriol.* 65 : 261-268, 1988.
- Boe, Joe Young. "Evaluation of Optimum Production for Bacteriocin from Lactobacillus sp JB 42 Isolation from Kimichi". *Korea: J Microbioal Biotech* 6: 63-67. 1996.
- Branen, A. L. and P. M. Davidson. *Antimicrobials in food*. New York: Inc.,1983.
- Broto, L. *Formalin Bukan Formalitas*. Makassar: Harian Kompas, 5 Januari 2006.
- Buckle, K. A., R. A. Edwards, G. H. Fleet & M. Wootton. *Ilmu Pangan. Terjemahan H. Purnomo dan Adiono*. Jakarta: Universitas Indonesia Press,1987.

- Buckle, K. A., R. A. Edwards, G. H. Fleet & M. Wootton. 2007. *Ilmu Pangan. Terjemahan H. Purnomo dan Adiono*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007.
- Cahyadi, Wisnu. *Analisis Aspek Kesehatan Bahan Tambahan Pangan Edisi Kedua*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Chandra, Budiman Dr. *Pengantar Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta: EGC, 2005.
- Claus, R.J., Jhung-Won Colby, and George J. Flick. *Processed Meats / Poultry / Seafood*. New York: Inc., 1994.
- Cleveland, J., T. J. Montville, I. F. Nes, & M. L. Chikindas. "Bacteriocins : Safe, Natural Antimicrobials For Food Preservation". *International J. Food Microb.* 71: 1-20, 2001.
- deMan. J. M. *Kimia Makanan Terjemahan K. Panduwinata*. Bandung: ITB Press, 1997.
- Dewan Standarisasi Nasional (DSN). SNI 01-3775-1995. *Corned Beef dalam Kaleng*. Jakarta: Standar Nasional Indonesia, 1995.
- Djide, M. N. "Analisa Mikrobiologi Dangke Asal Kabupaten Enrekang". *Laporan penelitian*. Makasar: Fakultas MIPA Universitas Hasanuddin, 1991.
- Djide, M. N. "Pengaruh Penambahan Getah Pepaya Dan Beberapa Macam Pengawet Pada Pembuatan Dangke". *Laporan Penelitian*. Makassar: Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin, 1991.
- Dullah, A. "Pengembangan Teknologi Proses Dan Peningkatan Mutu Dangke". *Laporan penelitian*. Makassar: Departemen Perindustrian dan Perdagangan, 1995.
- Elegado, F. B., M. A. R. V. Guerra, R. A. Macayan, H. A. Mendoza, & M. B. Lirazan. "Spectrum of bacteriocin activity of *Lactobacillus plantarum* BS and fingerprinting by RAPD-PCR". *Inter. J. of Food Microbiol.* 95 : 11-18, 2004.
- Elviera, G. Pengaruh Pelayuan Daging Sapi Terhadap Mutu Bakso Sapi. *Skripsi*. Bogor: Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor, 1998.
- Fardiaz, S. *Mikrobiologi Pangan. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Pusat Antar Universitas Pangan dan Gizi*. Bogor: Institut Pertanian Bogor, 1989.
- Fardiaz, S. *Mikrobiologi Pangan I*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Frazier, W. C. & O. C. Westhoff. *Food Microbiology*. New York: Tata Mc Graw Hill, 1988.
- Forrest, J. C., E. D. Aberle, H. B. Hedrick, M. D. Judge & R. A. Merkel. *Principle of Meat Science*. San Fransisco: Freeman & Co., 1975.

- Gallardo-Escamilla, F.J., Kelly, A.L. dan Delahunty, C.M. "Mouthfeel And Flavour Of Fermented *Whey* With Added Hydrocolloids". *International Dairy Journal* **17**: 308-315, 2007.
- Gandreau, H., C. P. Champagne, J. Guolei dan J. Conway. "Lactic Fermentation of Media Containing High Concentration of Yeast Extract". *Jurnal Food sci*, 1997.
- Gálvez A., Abriouel H., R. L. López & N. B.Omar. "Bacteriocin-Based Strategies For Food Biopreservation". *Inter. J. of Food Microbiol* **120**: 51–70, 2007.
- Gonzales, B. E., F. Glaasker, F. R. S. Kunji. A. J. M. Driessen, J. E. Suarez, and W. N. Konings. "Bactericidal Mode of Action of Plantaricin". *Journal. Appl. Environ. Microbiol.* **62**:2701-2709, 1996.
- Hafsan. "Bakteriosin Asal Bakteri Asam Laktat Sebagai Biopreservatif Pangan". *Jurnal TeknoSains Volume 8 Nomor 2, Juli 2014, hlm. 175 – 184*. Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2014.
- Hancock R.E. and Chapple D. S. Peptide Antibiotics. *Antimicrob. Agent Chemoter.*, **46** : 1322-1323, 1999.
- Hata, T., R. Tanaka., & S. Ohmomo. "Isolation and Characterization Of *Plantaricin* ASM1: A New Bacteriocin Produced by *Lactobacillus plantarum* A-1". *J. Food Microb.* **137** : 94-99, 2010.
- Holzappel, W. H., Geisen, R and Schillinger, U. "Biological Preservation of foods With Reference to Protective Cultures Bacteriocins and Food Grade Enzymes". *Int J. Food Microbiol.* 1995.
- Indarmono, T. P. "Pengaruh Lama Pelayuan Dan Jenis Daging Karkas Serta Jumlah Es Yang Ditambahkan Ke Dalam Adonan Fisikokimia Bakso Sapi". *Skripsi*. Bogor: Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor, 1987.
- Jack RW, Tagg JR dan Ray B. "Bacteriocins of Gram-positif Bacteria". *Microbiol Rev J.* **59**: 171–200, 1995.
- Januarsyah, T. "Kajian Aktivitas Hambat Bakteriosin dari Bakteri Asam Laktat Galur SCG 1223". *Jurnal*. Bogor: Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian, 2007.
- Jawetz E. Adelberg EA and Melnick J. *Mikrobiologi Kedokteran*. Terjemahan Enugroho E & Maulana RF. Edisi ke-20. Jakarta: EGC, 1996.
- Jay, M. James. *Modern Food Microbiology Fifth edition*. Chapman and Hall. New York: USA, 1996.
- Jenie, B.S.L dan W.P. Rahayu. *Penanganan Limbah Industri Pangan*. Yogyakarta: Kanisius, 1993.

- Jenie, B. S., Suliantari dan P. Suryadi. "Aplikasi Kultur Campuran Bakteri Asam Laktat dalam Pembuatan Pindang Ikan Kembung Rendah Garam". *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Pangan*. Jakarta, 12-13 Oktober 1999, 1999.
- Jimenez-diaz, R. "Plantaricin S And T, Two New Bacteriocins Produced By *Lactobacillus plantarum* LPC010 Isolated From A Green Olive Fermentation". *J. Appl. Environ. Microbiol.* 59:1416-1429, 1993.
- Jimenez-Diaz R, Rios-Sancherz RM, Desmazeaud M, Ruiz-Barba JL dan Piard JC. "Plantaricin S and T; Two New Bacteriocins Produced by *Lactobacillus plantarum* LPCO10 Isolated from A Green Olive Fermentation". *App and Env Microbiol.* 59: 1416–24, 1993.
- Kusmiati, & A. Malik. "Aktivitas Bakteriosin Dari Bakteri *Leuconostoc Mesenteroides* Pbac1 Pada Berbagai Media Jurnal Makara Seri Kesehatan". *Jurnal Ilmiah UI (Sijuri)*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2002.
- Lawrie, R. A. *Meat Science 3rd Eds*. Oxford: Pergamon Press, 1995.
- Marzoeki, A.A.M., A. Hafid, M. Jufri, Amir dan Madjid. "Penelitian Peningkatan Mutu Dangke". *Jurnal*. Ujung Pandang: Balai Penelitian Kimia Departemen Perindustrian, 1978.
- Min, Sunwoo dan Yoon, P. *Formaldehyde In Drinking Water*. Regul. Toxicol. Pharmacol. J. Am. Ind. Hyg. Assoc 1:20-236, 2010.
- Misgiyarta dan S. Widowati. *Seleksi dan Karakterisasi Bakteri Asam Laktat (BAL) Indigenus*. Di dalam : Prosiding Seminar Hasil Penelitian Rintisan dan Bioteknologi Tanaman, 2003.
- Muchtadi. *Teknologi Proses Pengolahan Pangan*. IPB: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Pusat Antar Universitas Pangan dan Gizi, 1989.
- Mukono, H.J. *Prinsip Dasar Kesehatan Lingkungan*. Surabaya: Airlangga University Press, 2000.
- Neetles, C.G. and Barefoot, S.F. "Biochemical And Genetic Characteristic Of Bacteriocins Of Food-Associated Lactic Acid Bacteria". *J. Food Prot.*, 56 : 338-356, 1993.
- Nurliana. "Pengaruh Penambahan Bakteriosin Dan Gabungan Bakteriosin Produksi Bakteri Asam Laktat Terhadap Jumlah Bakteri Dalam Susu Pasteurisasi". *Tesis*. Bogor: Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, 1997.
- Oakey L., Carroll K., McClean S., Keller F., Costello M., Behan J. *Antimicrobial peptide-alternative to antibiotics*. Institute of Technology Tallaght, 2000.

- Ockerman, H. W. "Chemistry of Meat Tissue 10th Edition". *International Journal*. Department of Animal Science. Ohio: The Ohio State University and The Ohio Agricultural Research and Development Center, 1983.
- Oktaviani, Dini. "Efektivitas Bakteriosin dari *Lactobacillus plantarum* terhadap Masa Simpan Filet Nila Merah pada Suhu Rendah". *Skripsi*. Jatinagor: Unpad, 2004.
- Pandey CK, Agarwal A, Baronia A, Singh N. "Toxicity Of Ingested Formalin And Its Management". *Human & Experimental Toxicology* 19(6): 360-366, 2001.
- Pandisurya, C. "Pengaruh Jenis Daging Dan Penambahan Tepung Terhadap Mutu Bakso". *Skripsi*. Bogor: Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor, 1983.
- Pelczar, M. J. dan E. C. S. Chan. *Dasar-dasar Mikrobiologi 2*. Terjemahan R. S. Hadioetomo, T. Imas, S. S. Tjitrosomo, dan S. L. Langka. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Pratiwi, S.T. *Mikrobiologi Farmasi*. Yogyakarta: Erlangga Medical Series, 2008.
- Prescott, L.M., J.P Harley, & D. Aklein. *Microbiology Fifth edition*. Boston: McGrawHill Companies Inc, 2002.
- Rahayu, W. P. "Penilaian Organoleptik. Jurusan Teknologi Pangan dan Gizi". *Laporan Penelitian*. Bogor: Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor Press, 1998.
- Rahayu R D, Chairul dan Harapini M. Penelitian fitokimia dan efek antimikrobia ekstrak srikaya terhadap pertumbuhan *Escherichia coli*. *Prosiding seminar hasil litbang SDH LIPI*. Jakarta: LIPI, 1992.
- Rahmawati, R.D. "Studi Viabilitas dan Aktivitas Antimikrobia Bakteri Probiotik (*Lactobacillus acidophilus*) dalam Medium Fermentasi Berbasis Susu dan Bekatul Selama Proses Fermentasi". *Skripsi*. Malang: Jurusan THP Universitas Brawijaya, 2006.
- Ray, B. & A. Bhunia. *Food Biopreservatives of Microbial Origin*. 4th ed. Boca Raton: CRC Press, 2008.
- Ridwan, M. "Analisis Kinerja Kualitas Industri Kecil Makanan Khas Tradisional Dangke di Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan". *Tesis*. Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2004.
- Rukmana, H.R. *Yoghurt dan Karamel Susu*. Jogjakarta: Kanisius, 2001.
- Salminen, S. dan Atte von Wright. *Lactic Acid Bacteria. Microbiology and Functional Aspects. 2nd Ed, Revised and Expanded*. New York: Marcell Dekker, Inc., 1998.

- Savadogo, A., C. A. T. Ouattara, I. H. N. Bassole, & A. S. Traore. "Antimicrobial activities of lactic acid bacteria strains isolated from burkina faso fermented milk". *Pakistan J. Nutrition* 3 (3): 174-179, 2004.
- Scott, R. *Cheesemaking Practise*. 2<sup>nd</sup> Ed. London dan New York: Elsevier Applied Science, 1986.
- Schved F., Lalazar A., Henis Y. and Juven B.J. "Purification, partial characterization and plasmid-linkage of pediocin SJ-1, a bacteriocin produced by *Pediococcus acidilactici*". *J. Appl. Bacteriol.* 74, 67-77, 1993.
- Sharpe, M.E. Identification of The Lactic Acid Bacteria. In: Identification Methods For Microbiologists 2nd ed (Eds. FA. Skinner, Loveloskl DW). *International Jurnal*. Press Soc. Appl. Bact. Techn. 14: 233-259, 1979.
- Silalahi, J. Hypocholesterolemic Factors in Foods. *A Review Indonesian Food Nutrition Progress*. 7(1):26-36, 2000.
- Smith, J. S., A. J. Hiller, G. J. Less. "The Nature of The Stimulation of The Growth of *Streptococcus lactis* by Yeast Extract". *Jurnal Daily Res.* 42: 123-138, 1975.
- Soekarto, S. T. *Penilaian Organoleptik untuk Industri Pangan dan Hasil Pertanian*. Jakarta: Bharata Karya Aksara, 1990.
- Soeparno. *Ilmu dan Teknologi Daging*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 2000.
- Soeparno. *Ilmu dan Teknologi Daging*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Suardana, W. "Isolasi dan Identifikasi Bakteri Asam Laktat dari Cairan Rumen Sapi Bali sebagai Kandidat Biopreservatif". *Jurnal Veteriner Vol.8 No.4*:155-159, 2007.
- Sudirman. I., F. Mateu., M. Michel dan Lefebure. "Detection and properties of curtvaticin 13, a bacteriocin produce by *Lactobacillus curvatus* SB 13". *Journal Microbiol.* 27 : 35-40, 1993.
- Suharto. *Teknologi Pengawetan pangan*. Jakarta: Rineka Tjipta, 1991.
- Sunarlim, R. "Karakteristik Mutu Bakso Daging Sapi Dan Pengaruh Penambahan Natrium Klorida Dan Natrium Tripolifosfat Terhadap Perbaikan Mutu". *Disertasi*. Program Pasca Sarjana. Bogor: Institut Pertanian Bogor, 1992.
- Suriawiria, Unus. *Pengantar Mikrobiologi Umum*. Bandung: Angkasa, 1983.
- Stanier, R. Y., E. A. Adelberg, JL. Ingraham. *The Microbial Word*. New Jersey: Hall Inc, 1980.



- Steel, R. G. D. & J. H. Torrie. *Prinsip dan Prosedur Statistika*. Terjemahan: Bambang S. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Tagg, J. R., A. S. Dajani dan L. W. Wannaker. "Bacteriocins of Gram positive Bacteria". *International Journal Bacteriol. Rev.* 11 : 722-756, 1976.
- Tortora G. J., B. R. Funke, & C. L. Case. *Microbiology an Introduction. 9th Edition*. San Fransisco: Pearson Education Inc., 2006.
- Vinderola, C.G., Gueimonde, M., Delgado, T., Reinheimer J. A. and de los Reyes-Gavilan, C.G. "Characteristics Carbonated Fermented Milk And Survival Of Probiotik Bacteria". *Internasional Dairy Journal*, 10-213-220, 2000.
- Vuyst, L.D. & E.J. Vandamme. Lactic acid bacteria and bacteriocins : their practical importance. In: Vuyst, L.D. & E.J. Vandamme (editors). "Bacteriocins of Lactic Acid Bacteria". *Microbiology, Genetic and Application*. London: Blakie Academic and Profesional, 1994.
- Wibowo S. *Pembuatan Bakso Daging dan Bakso Ikan*. Jakarta: Penebar Swadaya, 2005.
- Widyaningsih T D dan Murtini. *Alternatif Pengganti Formalin Pada Produk Pangan*. Bogor: Trubus Agrisarana, 2006.
- Wijaya, C.H. "Teknologi Aditif Pangan". *Skripsi*. Bogor: Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor, 2006.
- Williams, R. A. D., P. A. Lambert dan P. Singleton. "Detection antimicrobial activity of a bacteriocin produced by *Lactobacillus plantarum*". *Food Sci. Biotechnol.* 10: 335-341, 1996.
- Winarno, F.G. *Kimia Pangan dan Gizi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1984.
- Winarno, F.G. *Pangan Gizi, Teknologi, dan Konsumen*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Winarno, F.G. *Kimia Pangan dan Gizi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Wiryanawan, K.G & A. S. Tjakradidjaja. "Produksi biopreservatif atau *feed supplement* (bakteriosin) dari Bakteri Asam Laktat". *Skripsi*. Bogor: Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor, 2001.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



Media susu skim




Kultur Kerja BAL



Alat dan bahan yang digunakan



Persiapan penelitian



Isolat *Pediococcus acidilactici*



Perendaman bakso pada kultur kerja



Penyincangan bakso



Pemipetan larutan NaCl fisiologis



Inokulasi sampel



Bakso tanpa perendaman (kontrol)



Bakso dengan perendaman BAL



Cawan analisa total BAL pada kultur kerja



Cawan analisa total mikroba



Cawan analisa total *E. coli*



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di kota Ujung pandang pada tanggal 4 September 1993 dari ayah yang bernama Rahman dan ibu bernama Nurida. Penulis merupakan anak sulung dari tiga bersaudara. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri Borong. Kemudian Penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 19 Makassar. Penulis melanjutkan pendidikannya di SMAN 12 Makassar. Setelah lulus, penulis diterima di Fakultas Sains dan Teknologi Program Studi S1 Jurusan Biologi. Penulis menyelesaikan Kuliah Kerja Nyata Profesi (KKNP) di desa Bontompo. Selanjutnya, penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kota Makassar.

