

**ISOLASI DAN KARAKTERISASI BAKTERI ASAM LAKTAT
DARI USUS ITIK (*Anas domestica*)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains
Jurusan Sains Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Oleh

HARLINA
NIM : 60300110015

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2014

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Isolasi dan Karakterisasi Bakteri Asam Laktat Dari Usus Itik (*Anas domesticus*)”, yang disusun oleh Harlina, NIM: 60300110015, mahasiswa Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2014, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Sains dan Teknologi, Jurusan Biologi (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 19 Februari
2014.

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Dr. Andi Suarda, S.Pt., M.Si (.....)
Sekretaris : Mashuri Masri S.Si., M. Kes (.....)
Munaqisy I : Dr. Muhammad Khalifah Mustami, M.Pd (.....)
Munaqisy II : Fatmawati Nur, S.Si, M.Si (.....)
Munaqisy III: Muh. Rusyidi Rasyid, S. Ag., M.Ag., M.Ed (.....)
Pembimbing I: Hafsan, S.Si., M.Pd (.....)
Pembimbing II: Cut Muthiadin, S.Si., M.Si (.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar,

Dr. Muhammad Khalifah Mustami, M.Pd

NIP. 19710412 200003 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 18 Februari 2014
Penyusun,

Harlina
NIM: 60300110015

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, dan hidayah-NYA kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan judul “Isolasi dan Karakterisasi Bakteri Asam laktat dari Usus Itik (*Anas domesticus*)”, dan dapat menyusun serta menyelesaikan skripsi. Pembuatan skripsi ini ditujukan untuk mendapatkan gelar sarjana sains pada Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT., M.S beserta seluruh jajarannya.
2. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, Dr. Muh. Khalifah Mustami, M.Pd beserta seluruh jajarannya.
3. Ketua Jurusan Biologi, Fatmawati Nur, S.Si., M.Si beserta seluruh dosen dan staf Jurusan Biologi.
4. Hafsan, S.Si., M.Pd selaku pembimbing I dan Cut Muthiadin S.Si., M.Si selaku pembimbing II atas saran dan bimbingannya selama ini.
5. Joharsan, S.Farm selaku Kepala Instalasi Mikrobiologi Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) Makassar beserta seluruh jajarannya atas bimbingannya saat penelitian.

6. Orang tua tercinta beserta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan moral dan materi kepada penulis.
7. Teman-teman seperjuangan dalam penelitian, Ija Mustikasari, Fatimasari, A. Te'ne Hasriana, Hafizhah Al Amanah, Devi Armita dan Nur Jannah yang telah banyak membantu penulis dalam penelitian ini.
8. Seluruh teman-teman IKASMANTAB yang turut membantu dalam persiapan penelitian.
9. Kepada kakanda Andi Irwan yang selalu setia membantu dan mendukung penulis selama penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir.
10. Kakak-kakak senior yang selalu memberi motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
11. Teman-teman "OSMOSIS 2010" atas semangat, doa dan bantuannya selama ini penelitian.
12. Seluruh pihak yang telah banyak membantu penulis dalam seluruh rangkaian pengerjaan skripsi ini.

Penulis berharap, semoga karya ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan terutama bagi rekan sejawat.

Makassar, 19 Februari

2014

Penulis

Harlina
NIM: 60300110015

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Tinjauan Umum bakteri Asam laktat	6
B. Tinjauan Umum Itik (<i>Anas domesticus</i>)	18
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Variabel Penelitian	37
C. Defenisi Operasional Variabel	37
D. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian	37
E. Alat dan Bahan	38
F. Prosedur Penelitian	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	43
A. Hasil Penelitian	43
B. Pembahasan	46
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	61
A. Kesimpulan	61

B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	79

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Karakteristik morfologi koloni bakteri asam laktat dari usus halus itik ...	44
Tabel 4.2. Karakteristik morfologi sel bakteri asam laktat dari usus halus itik dengan pewarnaan Gram.....	45
Tabel 4.3. Hasil Uji biokimia dari usus itik	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Itik Muscovi yang dipelihara oleh peternak itik.....	21
Gambar 2.2. Itik Alabio adalah salah satu itik Mallard	24
Gambar 4.1 Isolat a dan b Bakteri Asam Laktat dari Usus Itik	44

ABSTRAK

Nama Penyusun : Harlina
NIM : 60300110015
Judul Skripsi : “Isolasi dan Karakterisasi bakteri Asam Laktat dari Usus
itik
(*Anas domesticus*)”

Bakteri asam laktat merupakan salah satu bakteri alami yang menghuni saluran pencernaan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bakteri asam laktat yang terdapat pada usus Itik (*Anas domesticus*) dan karakterisasi dari bakteri asam laktat pada usus itik tersebut. Itik yang digunakan sebagai sumber bakteri asam laktat adalah jenis itik alabio sejumlah dua ekor itik. Karakterisasi bakteri asam laktat meliputi pengamatan morfologi dan uji biokimiawi. Pengamatan morfologi meliputi pengamatan morfologi koloni dan pengecatan gram, sedangkan pengamatan dengan uji biokimia terdiri dari uji KIA, uji motilitas, uji indol, uji sitrat, uji metil red, uji Voges Proskauer, uji fermentasi karbohidrat, uji lisin, dan uji katalase.

Dari usus itik didapatkan 2 isolat yang menunjukkan karakteristik bakteri asam laktat. Seluruh isolat merupakan bakteri Gram positif berbentuk batang mampu tumbuh pada medium MRSA, memiliki bentuk bulat, tepi rata, permukaan cembung dan warna putih susu. Berdasarkan uji biokimiawi, ke-2 isolat bersifat non-motil dan mampu memfermentasi karbohidrat terutama glukosa dan sukrosa. Hasil negatif pada uji indol, uji lisin, uji sitrat, uji urease ditunjukkan oleh kedua isolat. Hasil positif pada uji MR sedangkan pada uji VP semua isolat menunjukkan hasil negatif begitu pula pada uji katalase, semua isolat tidak dapat mengkatalisis H₂O₂. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa semua isolat menunjukkan karakteristik bakteri asam laktat yang diduga kuat sebagai genus *Lactobacillus*.

Kata kunci : bakteri asam laktat, usus itik, karakterisasi bakteri asam laktat.

ABSTRACT

Name : Harlina
Student Identification Number : 60300110015
Thesis' Title : "Isolation and Characterization of Lactic
Acid Bacteria from the Intestine of Duck (*Anas
domesticus*)"

Lactic acid bacteria is one of the naturally occurring bacteria that inhabit in the gastrointestinal tract. The purposes of this research is to identify lactic acid bacteria that found in the intestine of duck (*Anas domesticus*) and the characterization of lactic acid bacteria in the intestine of the duck. The ducks that are used as the sources of the lactic acid bacteria are two Alabio ducks. Characterization of lactic acid bacteria included morphology observation and biochemistry tests. Morphology observation included morphology observation of the colony and Gram staining, while observation with biochemistry tests includes KIA test, motility test, indole test, citric acid test, methyl red test, Voges Proskauer test, carbohydrate fermentation test, lysine test and catalase test.

From ducks' intestines obtained two isolates that show the characteristics of lactic acid bacteria. All the isolates are Gram-positive, rod-shaped bacteria that have the ability to grow in MRSA medium, have spherical shape, entire edge, convex height and the color is milk-white. Based on biochemistry tests, both of isolates are non-motile and are able to ferment carbohydrates especially glucose and sucrose. The negative results in indole test, lysine test, citric test, urease test are shown by both of isolates. Positive results in MR test, while in VP test all the isolates shown negative result, so is in catalase test where all isolates can't catalyze H₂O₂. Based on the result of the research, it can be concluded that all isolates show characteristics of lactic acid bacteria that strongly suspected as genus *Lactobacillus*.

Keywords: lactic acid bacteria, intestine of duck, characterization of lactic acid bacteria

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bakteri asam laktat (BAL) merupakan kelompok bakteri yang memiliki kemampuan membentuk asam laktat, baik sebagai satu-satunya produk maupun sebagai produk utama pada metabolisme karbohidrat. Beberapa ciri yang dimiliki oleh bakteri asam laktat adalah termasuk dalam Gram positif, tidak membentuk spora, berbentuk bulat atau batang, dan pada umumnya tidak menghasilkan katalase.

Bakteri asam laktat (BAL) telah digunakan secara luas dan diteliti sebagai probiotik untuk manusia, hewan ternak daratan dan akuatik. Hal ini berdasarkan pada kenyataan bahwa BAL adalah penghuni alami saluran pencernaan dengan kemampuan toleransi terhadap lingkungan asam dan empedu (*bile*) dari saluran pencernaan. Bakteri asam laktat juga berfungsi untuk mengubah laktosa menjadi asam asetat, sehingga menurunkan pH saluran pencernaan dan secara alami mencegah kolonisasi banyak bakteri (Watson, 2008, 227).

Allah SWT telah menciptakan berbagai macam jenis makhluk hidup sedangkan pencarian dan pemanfaatannya tergantung dari manusia bagaimana caranya dalam memanfaatkan hasil ciptaan Allah SWT tersebut. Isyarat adanya

mahluk hidup yang lebih kecil telah difirmankan Allah SWT dalam QS. Albaqarah: 26, yaitu sebagai berikut:

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيَىٰ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۗ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ۙ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿٢٦﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka, tetapi mereka yang kafir mengatakan: “Apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan?.” Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu (pula) banyak orang yang diberi-Nya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik.”

Kata “*Famaa fawkahaa*” terambil dari kata yang bermakna “yang lebih rendah dari itu” , menunjukkan bahwa Allah SWT kuasa untuk menciptakan apa saja, yaitu penciptaan apapun dengan obyek apa saja, baik yang besar maupun yang lebih kecil. Allah SWT tidak pernah menganggap remeh sesuatu pun yang Dia ciptakan meskipun hal itu kecil. Orang-orang yang beriman meyakini bahwa dalam perumpamaan penciptaan yang dilakukan oleh Allah memiliki manfaat bagi kehidupan manusia (Departemen Agama RI 2008, 5).

Bakteri asam laktat dapat diisolasi dan ditumbuhkan pada lingkungan baru sehingga mudah diteliti karakterisasinya. Telah banyak dilakukan penelitian tentang isolasi dan karakterisasi bakteri asam laktat. Baik dari susu sapi, kefir, yoghurt, nira,

bahkan susu formula bayi. Keberadaan bakteri asam laktat sangat penting bagi kesehatan, makanan, dan minuman. Karena bakteri ini menghasilkan substansi antimikroba yang memiliki kemampuan untuk mengubah aktivitas yang memiliki suatu dampak pada umur dari susu, yoghurt, kefir dan sebagainya dan pengembangan makanan, kesehatan dan fungsional yang berbasis pada faktor tersebut.

Menurut Salminen (2004), bakteri asam laktat mampu memproduksi substansi antimikroba seperti asam organik, diasetil, hydrogen peroksida, dan bakteriosin yang dapat menekan pertumbuhan bakteri patogen. Selain itu bakteri asam laktat memiliki kemampuan untuk menempel pada sel epitel usus, serta akan terjadi peningkatan sel lempengan peyer sebagai indikasi tersekresinya immunoglobulin (IgA) yaitu suatu reaksi terbentuknya kekebalan terhadap infeksi bakteri.

Bakteri asam laktat terbukti dapat menekan pertumbuhan bakteri patogen dan pembusuk sehingga dapat menjaga keseimbangan mikroflora alami di dalam usus. Terdapat banyak bakteri patogen yang biasa masuk ke dalam saluran pencernaan manusia. Salah satu bakteri yang biasa menginfeksi manusia adalah *salmonella typhosa* yaitu bakteri yang dapat menyebabkan tifus. Dengan mengonsumsi minuman probiotik dapat membantu mencegah gangguan saluran pencernaan (*gastroenteritis*) yang sering dialami oleh masyarakat pada umumnya. Bakteri Asam laktat yang biasa ditemukan dalam usus sangat membantu manusia dan hewan dalam melawan berbagai penyakit yang biasa masuk melalui saluran pencernaan. Telah dilaporkan pula oleh Trisna (2012) bahwa probiotik dapat meningkatkan kesehatan ternak, meningkatkan produksi telur, serta dapat menghilangkan sifat reservoir AI (*Avian*

influenza) pada unggas. Juga telah dilakukan isolasi bakteri asam laktat dari usus ayam yang dilakukan oleh Heni Mutmainnah (2013), dimana terdapat beberapa isolat dan memenuhi syarat sebagai karakteristik probiotik.

Sifat-sifat baik (positif) dari bakteri asam laktat sebagaimana diuraikan tersebut sangat banyak dimanfaatkan di dalam proses pengolahan dan pengawetan bahan pangan (hasil hewan, hasil laut, sayuran dan buah-buahan). Bakteri asam laktat banyak ditemukan pada produk makanan olahan, baik produk hewani seperti daging dan ikan yang difermentasi, susu fermentasi, maupun pada produk nabati seperti fermentasi sayuran dan buah-buahan. Secara alami bakteri asam laktat banyak dijumpai di berbagai habitat seperti pada organ dalam makhluk hidup, seperti pada saluran pembuangan, jalur genital, jalur intestin, maupun jalur respiratori pada manusia dan hewan (Prasetya, 1985).

Ketersediaan bakteri asam laktat yang diisolasi dari berbagai sumber dalam negeri masih memerlukan eksplorasi bakteri asam laktat untuk meningkatkan koleksi isolat bakteri asam laktat. Bakteri asam laktat dapat diperoleh dengan memanfaatkan sumber-sumber yang mengandung bakteri asam laktat. Salah satu sumber yang dapat digunakan untuk mengisolasi bakteri asam laktat adalah dari usus itik.

Itik sebagai salah satu hewan ternak, memiliki daya tahan yang relatif lebih tinggi dibandingkan ternak unggas lainnya, meskipun cara hidup itik cenderung tidak membutuhkan kondisi khusus bahkan pada lingkungan yang kotor sekalipun. Fenomena ini menjadi landasan penelitian ini untuk mendapatkan informasi tentang

keragaman dan karakteristik bakteri asam laktat yang terlibat (terdapat) di dalam saluran pencernaan itik yang kemungkinan secara tidak langsung menyebabkan tingginya daya tahan itik.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bakteri asam laktat apa saja yang terdapat pada usus itik?
2. Bagaimana karakteristik bakteri asam laktat yang terdapat pada usus itik?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bakteri asam laktat yang terdapat ada usus itik
2. Untuk mengetahui karakteristik bakteri asam laktat yang terdapat pada usus itik

D. Kegunaan Penelitian

1. Menambah khazanah pengetahuan dan informasi tentang keragaman bakteri asam laktat yang memberikan pengaruh positif dalam bidang kesehatan, makanan dan minuman
2. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat dalam hal pentingnya menjaga mikroflora dalam usus
3. Sebagai sumber informasi bagi dunia pendidikan tentang bakteri asam laktat yang terdapat pada usus itik yang memiliki potensi sebagai kandidat probiotik.
4. Sebagai sumber informasi dan bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Bakteri Asam Laktat

Informasi yang diperoleh dari mikrobiologi memungkinkan kemajuan besar dalam kemampuan kita untuk mengawasi banyak penyakit menular. Di samping itu, mikroorganisme telah digunakan untuk mempelajari berbagai proses biokimia yang diketahui terjadi pada bentuk kehidupan yang lebih tinggi. Lebih banyak fakta tentang metabolisme manusia yang diketahui sekarang, mula-mula telah diketahui pada mikroorganisme. Oleh karena itu jelaslah bahwa bidang mikrobiologi bukan hanya studi tentang mikroorganisme penyebab penyakit tetapi merupakan studi tentang semua aktivitas hayati mikroorganisme (Markham, 1993, 4).

Nutrisi merupakan indikasi dari kompleksitas fisiologis mikroba. Umumnya diketahui nutrient dibutuhkan oleh mikroba secara langsung mencerminkan kemampuan fisiologisnya. Sebagai contoh beberapa anggota genus *Lactobacillus* membutuhkan sejumlah asam amino, vitamin B dan nutrient lainnya untuk pertumbuhannya. Sebaliknya, mikroba autotrof hanya memerlukan cahaya dan karbon-dioksida serta nitrogen untuk tumbuh (Hafsah, 2011, 123).

Kebanyakan bakteri membutuhkan zat-zat anorganik seperti garam-garam yang mengandung Na, K, Ca, Mg, Fe, Cl, S, P, sedang beberapa spesies tertentu

masih membutuhkan tambahan mineral seperti Mn dan Mo. Kecuali zat-zat tersebut, bakteri memerlukan juga sumber- sumber makanan yang mengandung C, H, O dan N yang berguna untuk menyusun protoplasma. Unsur-unsur ini dapat diambil dalam bentuk elemen oleh beberapa spesies, akan tetapi beberapa spesies yang lain hanya dapat mengambil unsur-unsur tersebut dalam bentuk senyawa organik seperti karbohidrat, protein, lemak dan sebagainya. Banyak bakteri yang masih memerlukan tambahan seperti vitamin-vitamin dan B-kompleks, beberapa macam asam amino, asam lemak, hematin, sel-sel darah merah, purin, pirimidin, nukleotida, dan kadang-kadang asam cuka. Kebutuhan bakteri akan zat-zat ini dapat digunakan untuk menyelidiki macam-macam zat yang terkandung dalam buah-buahan, sayuran, daging, dan zat-zat lain yang berasal dari tumbuhan atau hewan. Jika suatu spesies yang memerlukan vitamin B ditanam di dalam medium yang tidak mengandung vitamin B, niscayalah bakteri tersebut tidak dapat hidup. Akan tetapi kalau pada medium ditambahkan sekelumit dari buah-buahan atau atau bahan makanan lain yang akan diselidiki, dan kemudian ternyata, bakteri tersebut dapat hidup, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa bahan makanan yang ditambahkan tersebut mengandung vitamin B. bakteri yang banyak dipakai untuk penyelidikan semacam ini (*bio-assay*) ialah bakteri asam susu dari genus *Streptococcus*, genus *Leuconostoc*, dan genus *Lactobacillus*. Bakteri-bakteri tersebut membutuhkan banyak vitamin B, asam amino untuk pembiakan dan pertumbuhannya (Dwidjoseputro, 2005, 70).

Menurut Thahjadi (2009, 201-202), ada dua kelompok fermentasi asam laktat yaitu homofermentatif dan heterofermentatif:

1. Fermentasi asam laktat homofermentatif

Bakteri asam laktat homofermentatif menghasilkan mayoritas asam laktat dengan sedikit produk samping, yaitu gliserol, etanol, asetat, format dan karbondioksida. Bakteri asam laktat homofermentatif mengoksidasi glukosa menjadi 2 piruvat melalui jalur Embden Meyerhoff Parnas (EMP). Pada jalur itu menghasilkan glukosa menjadi dua ATP. NADH yang dihasilkan pada jalur itu dipakai untuk mereduksi piruvat menjadi asam laktat. Bakteri yang tergolong dalam homofermentatif misalnya, *Streptococcus*, *Pediococcus*, dan beberapa *Lactobacillus*.

2. Fermentasi asam laktat heterofermentatif

Bakteri asam laktat heterofermentatif menghasilkan asam laktat dan produk fermentasi lainnya (kebanyakan etanol) dengan rasio yang seimbang. Hal ini karena mereka mengoksidasi glukosa menjadi piruvat dan asetil fosfat melalui jalur HeksosaMonofosfat (HMP). Piruvat kemudian direduksi menjadi asam laktat, sedangkan hasil fosfat kemudian direduksi menjadi etanol. Pada jalur itu menghasilkan 1 ATP. Bakteri yang tergolong dalam heterofermentatif adalah *Leuconostoc* dan beberapa *Lactobacillus*.

Allah SWT berfirman dalam Q.S Sad/ 38: 27 yaitu sebagai berikut:

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ
 كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴿٢٧﴾

Terjemahnya:

dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, Maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka (Departemen Agama RI, 2009).

Dari ayat tersebut di atas, Allah SWT menjelaskan bahwa dia menjadikan langit, bumi dan makhluk apa saja yang berada diantaranya tidak sia-sia. Langit dengan segala bintang yang menghiasi, matahari yang memancarkan sinarnya di waktu siang, dan bulan yang menampilkan bentuknya yang berubah-ubah dari malam kemalam serta bumi tempat tinggal manusia, baik yang tampak di permukaannya maupun yang tersimpan di dalamnya, sangat besar artinya bagi kehidupan manusia. Kesemuanya itu diciptakan Allah atas kekuasaan dan kehendaknya sebagai rahmat yang tak ternilai harganya. Allah menciptakan makhluknya dengan berbagai bentuk, ukuran dan fungsinya masing-masing di muka bumi agar manusia memahami dan mengambil hikmah dari ciptaan Allah tersebut.

Bakteri asam laktat homofermentatif sering digunakan dalam pengawetan makanan, karena produksi asam laktat dalam jumlah tinggi dalam makanan sehingga dapat menghambat pertumbuhan bakteri lain yang dapat merusak makanan. Bakteri asam laktat secara fisiologis dikelompokkan sebagai bakteri gram positif, bentuk coccus atau batang yang tidak berspora dengan asam laktat sebagai produk utama fermentasi karbohidrat (Malaka dan Laga, 2005).

Menurut Buckle (2006, 94), beberapa bakteri yang tergolong ke dalam bakteri asam laktat adalah sebagai berikut:

1. *Streptococcus thermopiles*, *Streptococcus lactis*, dan *Streptococcus cremoris*. Semuanya ini adalah bakteri gram positif, berbentuk bulat (*coccus*), yang terdapat sebagai rantai dan semuanya mempunyai nilai ekonomis penting dalam industri susu.
2. *Pediococcus cereviceae*, bakteri ini adalah bakteri gram positif yang berbentuk bulat, khususnya terdapat secara berpasangan atau berempat (*tetrads*). Walaupun jenis ini tercatat sebagai perusak bir dan anggur, bakteri ini berperan dalam fermentasi daging dan sayuran.
3. *Leuconostoc mesentroides*, *Leuconostoc dextranicum*. Bakteri ini adalah bakteri gram positif berbentuk bulat yang terdapat secara berpasangan atau rantai pendek. Bakteri-bakteri ini berperan dalam perusakan larutan gula dengan produksi pertumbuhan dekstran berlendir. Walaupun demikian, bakteri-bakteri ini merupakan jenis penting dalam permulaan fermentasi sayuran dan juga ditemukan dalam sari buah, anggur, dan bahan pangan lainnya.
4. *Lactobacillus lactis*, *lactobacillus acidophilus*, *lactobacillus bulgaricus*, *lactobacillus plantarum*, *lactobacillus delbruckii*. Organisme-organisme ini adalah bakteri berbentuk batang, gram positif dan sering membentuk pasangan dan rantai dari sel-selnya. Jenis ini umumnya lebih tahan terhadap keadaan asam daripada jenis *pediococcus* atau *streptococcus* dan oleh karenanya akan menjadi

banyak terdapat pada tahapan terakhir dari fermentasi tipe asam laktat. Bakteri-bakteri ini penting sekali dalam fermentasi susu dan sayuran.

Menurut Jansen (2006, 110-111), ada dua cara yang harus ditempuh untuk meningkatkan populasi mikroba yang menguntungkan dan menurunkan jumlah mikroba yang merugikan yaitu:

- a. Pendekatan probiotik adalah mengonsumsi sel bakteri, terutama penghasil laktat, yakni *Lactobacillus* dan *Bifidobacterium* di dalam makanan atau dalam bentuk suplemen makanan. Asam laktat yang dihasilkan bakteri ini akan menghambat perkembangan bakteri yang tidak tahan terhadap suasana asam seperti *Eschericia coli* dan genus *Clostridium*. *E. coli* dan *Clostridium* ini dianggap merugikan, dan bahkan berbahaya.
- b. Pendekatan prebiotik adalah dengan menyediakan bahan dalam makanan yang dapat meningkatkan pertumbuhan bakteri asam laktat. Biasanya oligosakarida merupakan media pertumbuhan yang baik. Oligosakarida adalah karbohidrat sederhana yang banyak dikonsumsi dalam bentuk minuman ringan, biskuit, gula-gula, dan produk susu.

Keberhasilan proses fermentasi sangat dipengaruhi oleh keberhasilan dalam mengoptimalkan faktor-faktor dari pertumbuhan mikroba yang diinginkan. Faktor-faktor tersebut akan memberikan kondisi yang berbeda untuk setiap mikroba sesuai dengan lingkungan hidupnya masing-masing sehingga mempengaruhi kinetika fermentasinya. Selain itu setiap bakteri akan menunjukkan perbedaan pola pertumbuhan, periode waktu yang dibutuhkan untuk tumbuh maupun beradaptasi, dan

metabolit yang dihasilkan. Studi mengenai kinetika pertumbuhan kultur mikroba dapat digunakan untuk menduga efisiensi biaya produksi dalam skala besar (Yuliana, 2008).

Menurut Sri (2010, 62), Bakteri asam laktat dan *bifidobakteria* secara alami terdapat dalam saluran pencernaan manusia dan hewan, dalam makanan fermentasi seperti yakult, yoghurt, keju dan berbagai produk alami, pickel buah dan sayuran, dan dikenal aman (mendapat status GRAS = *Generally Recognized As Safe*). Tidak semua asam laktat bersifat probiotik. Bakteri asam laktat, khususnya yang bersifat sebagai probiotik, banyak digunakan sebagai suplemen pangan dengan berbagai manfaat bagi kesehatan. Bakteri tersebut, khususnya berasal dari golongan *Lactobacillus* dan *Bifidibacteria*, memiliki banyak efek positif antara lain aktivitas antimikroba dan aktivitas antikolesterol, efek stimulasi sistem imun, meningkatkan penyerapan laktosa tubuh, mencegah diare, serta aktivitas antimutagenik sehingga dapat mencegah penyakit kanker khususnya kanker usus (Winarno, 1997).

Minuman probiotik merupakan istilah lain untuk menyebut minuman fermentasi asam laktat. Probiotik (bahasa Yunani, *probiotic* = untuk hidup) adalah minuman kesehatan yang mengandung bakteri asam laktat hidup yang mampu bertahan hidup dalam keasaman lambung sehingga dapat menempati usus dalam kuantitas yang cukup besar (Waspodo, 1997 dalam Thomas, 2000).

Selain dimanfaatkan sebagai suplemen manusia, probiotik juga kini banyak dijadikan suplemen ternak. Sebagai alternatif untuk menggantikan penggunaan

antibiotik yang banyak digunakan oleh para peternak ayam (Harimurti, *et al.*, 2007). Menurut Budiansyah (2004), pemakaian probiotika ini tidak mempunyai pengaruh yang negatif baik kepada ternaknya sendiri maupun kepada manusia yang mengonsumsi hasil ternaknya. Telah dilaporkan oleh Trisna (2012) bahwa Probiotik dapat meningkatkan kesehatan ternak, meningkatkan produksi telur, serta dapat menghilangkan sifat reservoir AI (*Avian influenza*) pada unggas.

Minuman probiotik terbukti dapat menekan pertumbuhan bakteri patogen dan pembusuk sehingga dapat menjaga keseimbangan mikroflora alami di dalam usus. Dengan mengonsumsi minuman probiotik dapat membantu mencegah gangguan saluran pencernaan (gastroenteritis) yang sering dialami oleh masyarakat pada umumnya. Bakteri asam laktat pada proses fermentasi karbohidrat dapat menghasilkan asam laktat yang dapat menurunkan pH. Penurunan nilai pH dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme lain, terutama bakteri patogen (*Buckle et al.*, 1987). Bakteri ini bersifat antagonis terhadap bakteri patogen, karena selama fermentasi bakteri asam laktat menghasilkan asam-asam organik dan senyawa bakteriosin yang mampu menghambat pertumbuhan mikroba patogenik dan mikroba pembusuk (Kilara dan Shahani, 1978).

Ada tiga faktor fisik yang mempengaruhi pertumbuhan dan bertahan hidupnya sel mikroorganisme, yaitu temperature, pH dan kebutuhan udara/gas. Temperatur yang umum untuk berlangsungnya metabolisme dalam sel yang normal adalah 20-40°C. Keadaan pH lingkungan sekitar sel mikroorganisme sangat mempengaruhi aktivitas enzim sel, sedangkan kebutuhan mikroorganisme akan udara ditentukan oleh

kandungan oksigennya yang diperlukan untuk bioksidasi proses respirasi (Subandi 2010, 129).

Dalam hal usus besar atau kolon terdapat sekitar 400 spesies bakteri yang disebut mikroflora. Sebanyak 50-60% dari berat feses adalah mikroflora. Berdasarkan aspek kesehatan dan sifatnya, bakteri dalam kolon dibagi menjadi dua kelompok yaitu bakteri yang menguntungkan dan bakteri yang merugikan. Kondisi dan media bagi perkembangan kedua golongan mikroba ini berbeda. Untuk mendukung kesehatan yang baik, populasi mikroba yang menguntungkan harus dominan (Jansen, 2006,108).

Keseimbangan mikrobiota dicapai saat saluran pencernaan didominasi oleh kelompok bakteri non patogen. Efek dominasi bakteri *indigenous* atau asli terdapat di dalam saluran pencernaan yang sering disebut "*Friendly bacteria*" menunjukkan pencernaan dalam kondisi sehat. Saluran pencernaan yang sehat merupakan pendukung utama dalam kesehatan tubuh secara keseluruhan. Sehingga dapat dikatakan bahwa keseimbangan mikrobiota di dalam saluran pencernaan memiliki peranan penting dalam menjaga kesehatan tubuh. sebaliknya, mikrobiota yang tidak seimbang dapat meningkatkan resiko munculnya penyakit tertentu. Sebagai contoh, masuknya bakteri patogen enteric via makanan (*Salmonella*, *Vibrio*, *Shigella*, dan lain-lain) dapat mengganggu keseimbangan mikrobiota, yang berujung pada diare (Soeharsono, 2010, 7).

Menurut Daulay (1991) dalam Fatma (2013), BAL mempunyai distribusi yang luas dan kemampuan tumbuh pada berbagai substrat organik dan kondisi seperti

kondisi asam, basa, suhu rendah, suhu tinggi, kadar garam tinggi, anaerob, sehingga menjadikan bakteri asam laktat sebagai kompetitor yang tangguh di semua sektor pengolahan pangan. Pada berbagai jenis makanan fermentasi, keterlibatan BAL memberikan efek yang menguntungkan karena asam yang dihasilkan dapat mencegah pertumbuhan mikroba lain yang tidak dikehendaki selama proses fermentasi berlangsung (Rahayu *et al.*, 1999). Bakteri asam laktat adalah kelompok bakteri yang mampu mengubah karbohidrat (glukosa) menjadi asam laktat. Efek bakterisidal dari asam laktat berkaitan dengan penurunan pH lingkungan menjadi 3 sampai 4,5 sehingga pertumbuhan bakteri lain termasuk bakteri pembusuk akan terhambat. Pada umumnya mikroorganisme dapat tumbuh pada kisaran pH 6-8 (Rostini, 2007 : 126).

Bakteri yang tumbuh dalam bahan pangan terdiri atas bakteri pembusuk yang dapat menyebabkan kerusakan makanan dan bakteri patogen penyebab penyakit pada manusia. Jumlah bakteri pembusuk umumnya lebih dominan dibandingkan dengan bakteri patogen. Bakteri patogen merupakan mikroorganisme indikator keamanan pangan. Bakteri patogen dibedakan atas penyebab intoksikasi yaitu keracunan yang disebabkan oleh toksin yang dihasilkan bakteri patogen yang berkembang di dalam bahan makanan, dan penyebab infeksi yaitu bakteri yang menghasilkan racun di dalam saluran pencernaan. Beberapa mikroba yang diamati sebagai bakteri pembusuk dan patogen pada produk fermentasi adalah dari family *Enterobacteriaceae*, didalamnya termasuk famili *Enterobacter*, *Erwinia*, *Citrobacter*, *Klebsiella*, *Proteus*, *Salmonella*, *Serratia*, *Shigella* dan *Yersinia* (Fardiaz, 1992).

BAL sebagai salah satu jenis bakteri yang memproduksi metabolit berupa asam organik (asam laktat, asam format, dan asam asetat), diasetil, hidrogen peroksida (H_2O_2), karbondioksida (CO_2) dan bakteriosin. Selama proses fermentasi, bakteri asam laktat akan menghasilkan metabolit-metabolit yang menimbulkan perubahan rasa dan bentuk makanan serta menghambat pertumbuhan bakteri patogen dan pembusuk (Asriani, 2006: 7).

Asam laktat merupakan senyawa metabolit utama pada fermentasi oleh bakteri asam laktat yang akan menurunkan pH pada sekitar saluran usus menjadi 4–5, sehingga menghambat pertumbuhan bakteri pembusuk dan *E.coli* yang membutuhkan pH optimum 6-7. Sejumlah asam volatil yang dihasilkan selama fermentasi juga memberikan efek antimikroba dalam kondisi redoks potensial yang rendah. Asam asetat dan asam propionat yang dihasilkan melalui fermentasi heterofermentatif, akan berinteraksi dengan sel membran dan mengakibatkan asidifikasi intraseluler dan denaturasi protein, sehingga sangat efektif sebagai antimikroba (Surono, 2004).

Asam laktat merupakan bahan kimia serbaguna yang digunakan sebagai: 1). Asidulan, aroma dan pengawet dalam industri makanan, obat-obatan, dan tekstil; 2). Untuk produksi bahan kimia dasar; dan 3). Untuk polimerisasi bahan yang mudah dirombak yaitu *poly lactid acid* (PLA) (Hidayat, 2006, 69).

Asam laktat dibedakan atas dua isomer, yaitu bentuk D- dan L-. kedua bentuk isomer asam laktat dapat dipolimerisasi dan polimer dengan sifat yang berbeda dapat dihasilkan tergantung pada komposisinya. Produksi asam laktat di dunia mencapai 80.000 ton dan sekitar 90% di antaranya dihasilkan oleh bakteri asam laktat melalui

fermentasi dan sisanya dihasilkan secara sintesis dengan menghidrolisis laktonitril. Produksi fermentasi memiliki keuntungan satu isomer yang secara optik akan dapat diperoleh produk yang murni. Produksi secara sintesis akan selalu menghasilkan campuran asam laktat (Hidayat, 2006, 169).

Bakteri asam laktat terutama *Lactobacillus* memproduksi H_2O_2 yang bersifat membunuh mikroorganisme pembusuk dan memproduksi senyawa antibiotik. Beberapa spesies menghasilkan senyawa anti bakteri seperti bakteriosin dan nisin. Asam organik yang dihasilkan secara fermentasi seperti asam propionat dan asam format mempunyai daya anti mikroba yang lebih kuat dibandingkan dengan asam laktat (Hadi , 1990, 73-75).

Salah satu contoh bakteri asam laktat adalah *Lactobacillus casei*. *Lactobacillus casei* merupakan bakteri gram positif, fakultatif anaerob, tidak bergerak dan tidak membentuk spora. Ukuran sel berkisar antara 0,7-1,1 x 2,0-4,0 μm . *L. casei* tahan terhadap asam dan dalam metabolisme fermentasi menghasilkan asam laktat sebagai produk akhir dari metabolisme. *L. casei* dapat tumbuh pada suhu 15°C tetapi tidak pada suhu 45°C, bisa diisolasi dari bahan berbasis susu mentah atau fermentasi dan dari saluran pencernaan manusia atau hewan. *L. casei* termasuk dalam bakteri asam laktat homofermentatif. *L. casei* menghasilkan asam laktat sebagai produk fermentasi utama manakala tumbuh pada suatu medium dengan glukosa atau laktosa sebagai sumber karbohidrat utama. Ketahanan *L. casei* dalam gastric dan empedu sudah dibandingkan dengan strain lain dari

Lactobacillus dan *Streptococcus*. Ketahanan *L. casei* dalam asam gastric adalah paling tinggi di antara strain-strain lain yang juga bersama-sama dipelajari, dan mempunyai waktu yang lebih lama dibandingkan dengan bakteri yoghurt (*Lactobacillus bulgaricus* dan *Streptococcus termophilus*) (Sri, 2010, 65-66).

B. Tinjauan Umum Itik

Itik adalah salah satu jenis unggas-air (*waterfowls*) yang termasuk dalam kelas aves. Atas dasar umum dan jenis kelaminnya, itik dibedakan satu sama lain dengan sebutan nama yang berbeda-beda. “*Duck*” adalah sebutan untuk itik secara umum, apabila kita tidak melihat umur maupun jenis kelaminnya. Di samping itu duck juga mempunyai arti “Itik dewasa betina”. “*drake*” adalah itik dewasa jantan, sedangkan “*draklet* atau *drakeling*” adalah itik jantan muda. Duckling adalah sebutan untuk itik betina muda, atau itik yang baru menetas (*Day-old-duckling=d.o.d*). itik jantan dan itik betina yang dipasarkan sebagai ternak potong pada umur 7 sampai 10 minggu, lazim disebut “*Green duck*”. Dikenal banyak spesies itik liar yang hidup di alam bebas di seluruh dunia, antara lain Mallard, Pintail, Wood Duck, bluewinged Teal, Green winged teal, dan widgeon. Nama-nama latinnya adalah *Anas platyrhynchos*, *Anas acuta*, *Anas crecca* dan *Anas Penelope*. Para ahli berpendapat bahwa ternak itik domestic yang kita kenal sekarang (kecuali Muskovi-entog), merupakan keturunan langsung dari itik liar yang bernama *Mallard* atau *Wild Mallard* (*Anas platyrhynchos*), yang sampai saat ini masih banyak tersebar di beberapa bagian dunia. Sejauh ini dikenal bahwa ada 6 sub spesies *Mallard*, salah satunya yang

paling dikenal ialah *Mallard* Eropa (*Anas platyrhynchos platyrhynchos*) (Bambang, 1997, 2).

Itik yang pertama kali masuk di Indonesia itu diperkirakan berasal dari Hindia Belanda dan dibawa pertama kali ke pulau Jawa. Itik yang dimaksud adalah itik yang sudah dijinakkan. Sebelumnya, itik liar sudah lebih dulu masuk ke Indonesia yang kemudian dikenal sebagai itik hutan. Jenis ini tidak pernah dijinakkan. Salah satu contoh itik liar yang mudah ditemui adalah Belibis. Di pulau Jawa, itik-itik tersebut yang sudah dijinakkan oleh pendatang banyak dipelihara di daerah dataran rendah karena pemeliharaannya mudah dan tahan penyakit. Oleh karenanya, banyak penduduk yang kemudian tertarik untuk memeliharanya. Ketika kerajaan Majapahit mulai melakukan ekspansinya ke seluruh wilayah di Nusantara, itik pun ikut disebarkan. Akibatnya, itik tidak lagi hanya terdapat di pulau Jawa saja, tetapi menyebar ke Kalimantan, Bali, Sumatera, dan pulau lainnya. Itik yang berasal dari Majapahit, diduga sekarang ini adalah itik dari Mojokerto (Suharsono, 2009, 12).

Menurut Bambang (1997, 3), sistematika dari itik domestik adalah sebagai berikut:

Kingdom : Animalia
Filum : Chordata
Kelas : Aves
Ordo : Anseriformis
Family : Anatidae

Genus : *Anas*

Spesies : *Anas domestica*

Dari berbagai itik liar yang diketahui, jenis Mallard adalah salah satunya yang memiliki “*sex feathers*” yaitu bulu-bulu mencuat ke atas (*curled feathers*) yang terdapat pada ujung ekornya sebagai pertanda khas bagi hewan/Mallard jantan (mallard betina tidak memiliki bulu seperti itu) (Bambang, 1997, 4).

Menurut Bambang (1997, 4), anggapan bahwa itik domestik merupakan keturunan langsung Mallard didasarkan atas kenyataan-kenyataan berikut:

- a. Itik domestik yang kita kenal sekarang (kecuali itik Muscovi) juga memiliki *Sex Feathers* seperti yang dimiliki Mallard
- b. Bila Mallard disilangkan (*Crossed*) dengan jenis itik liar lain yang tidak memiliki *Sex Feathers* dan kemudian disilangkan dengan F1-nya dikawinkan dengan itik liar non *Sex Feathers*, keturunannya akan cenderung kehilangan bulu spesifik itu. Kalaupun bulu tersebut tidak hilang, setidaknya-pertumbuhan bulu khas itu menjadi sempurna lagi. itik domestik ternyata bertahan dengan bulu itu.
- c. Mallard yang berhasil ditangkap dan kemudian dipelihara, memperlihatkan adaptasi yang amat baik terhadap kehidupan terkurung. Ini berarti bahwa mereka lebih mudah didomestikkan dibandingkan dengan jenis itik liar yang lain. Lagipula sifat-sifat liarnya nampak begitu cepat hilang hanya dalam 2 atau 3 generasi saja termasuk sifat migrasinya.

Menurut Bambang (1997, 6), itik Muscovi dianggap bukan keturunan Mallard karena adanya bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Ia tidak memiliki Sex feathers pada jantan
- b. Ia tidak bersuara keras seperti halnya itik asli tetapi hanya mendesis (*just to hiss not to quack*)
- c. Hidupnya lebih bersifat terrestrial (daratan)11-20
- d. Masa pengeraman telurnya lebih lama dibandingkan dengan itik asli yaitu selama 35 hari (itik asli mengerami selama 28 hari).



Gambar 2.1. Itik Muscovi yang dipelihara oleh peternak itik (Peternakan Itik milik warga di kelurahan samata)

Menurut Suharsono (2009, 11), dibanding dengan unggas jenis lainnya, itik mempunyai keunggulan sebagai berikut:

- a. Mampu mempertahankan produksi telur lebih lama dibandingkan ayam.
- b. Bila dipelihara dengan sistem pengelolaan yang lebih sederhana sekalipun, itik masih mampu memproduksi dengan baik.
- c. Tingkat kematian (*mortalitas*) itik umumnya kecil.
- d. Itik lebih tahan terhadap penyakit

- e. Itik selalu bertelur di pagi hari. Dengan demikian, kegiatan pengambilan telur hanya dilakukan sekali sehari sehingga peternak dapat melakukan kegiatan lainnya
- f. Dengan pakan kualitas rendah, itik masih bisa memproduksi
- g. Telurnya cocok dibuat telur asin.

Itik dapat menyebar ke kawasan yang luas karena aquatik. Selain itu, dalam hal makanan itik bersifat omnivorus (pemakan segala), mulai dari biji-bijian, rumput-rumputan, umbi-umbian, dan makanan yang berasal dari hewan atau binatang kecil. Sifat spesifik dari itik adalah kakinya relatif pendek dibanding tubuhnya, antara jari yang satu dan jari yang lain dihubungkan oleh selaput renang, serta bulu-bulunya tebal dan berminyak sehingga dapat menghalangi air masuk ke tubuhnya ketika berada dalam air. Dengan sifat seperti ini, meskipun sudah dijinakkan, itik cenderung menyukai hidup di air. Akan tetapi, untuk itik-itik ras sifat aslinya dapat dikurangi dominansinya (Suharsono, 2009, 11).

Usaha peternakan itik umumnya hanya terbatas dilakukan di daerah-daerah tertentu saja. Di pulau jawa banyak dilakukan di sekitar kora-kota di pantai utara, seperti Serang, Tangerang, Karawang, Subang, Cirebon, Tegal, Pekalongan, dan Kudus. Untuk wilayah ke arah timur, konsentrai pemeliharaannya terutama di sekitar Mojosari dan Mojokerto. Di luar pulau jawa, daerah-daerah yang cukup menonjol sebagai tempat pemeliharaan itik adalah tanjung balai dan asahan (Sumatera utara), Amuntai (kalimantan selatan), Sumatera utara, Bali, Lombok, dan Sulawesi selatan. Jenis itik yang dipelihara di daerah tadi jenisnya berbeda-beda. Pada umumnya, itik-

itik yang dipelihara di daerah pantai pulau Jawa merupakan jenis itik Jawa dan yang populer adalah itik tegal. Itik-itik yang dipelihara di Mojosari dan Mojokerto adalah itik lokal dari Mojosari dan Mojokerto. Itik yang populer di Amuntai, Kalimantan Selatan adalah itik Alabio. Di daerah Bali banyak dipelihara itik Bali. Sementara di daerah lainnya dipelihara itik lokal atau salah satunya dari itik-itik di atas tadi. Pada umumnya jenis-jenis itik tersebut merupakan jenis-jenis itik lokal Indonesia yang mempunyai potensi cukup baik sebagai penghasil telur (Suharsono, 2009, 3).

Itik Alabio adalah itik Borneo atau itik Kalimantan. Itik ini merupakan itik asli Kalimantan, di samping itik dari Nunukan (Kalimantan Timur). Itik Alabio diperkirakan hasil persilangan antara itik asli Kalimantan Selatan dengan itik Peking. Menurut dugaan, persilangan ini terjadi karena kerajaan Bandar di hulu sungai utara sudah sejak lama mengadakan kontak dengan dunia luar, salah satunya dengan kerajaan China. Dengan adanya hubungan dengan daratan China ini, kemungkinan ada itik Peking yang masuk disengaja atau secara liar yang kemudian berbaur dengan itik liar hingga akhirnya menurunkan itik yang dikenal sebagai itik Alabio yang memang berbeda jauh dari itik Jawa. Nama Alabio diberikan pada tahun 1950 oleh drh. Saleh Puspo. Alabio sendiri adalah nama salah satu kota kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara di Kalimantan Selatan (Suharno, 2009, 16-17).



Gambar 2.2 Itik Alabio adalah salah satu itik Mallard (Itik Penelitian, 2014).

Munculnya jenis itik alabio dalam arti yang sebenarnya, yakni dengan munculnya cirri-ciri fisik tertentu yang homogen, di sekitar tahun 1960-an. Sebelumnya, meskipun istilah “itik alabio” sudah muncul, kenyataannya bibitnya yang dipasarkan di alabio masih heterogen. Lama kelamaan peternak memurnikannya hingga jadilah itik alabio yang dikenal seperti sekarang ini. Menurut Suharno (2009, 17), ciri khas itik alabio adalah sebagai berikut:

1. Bentuk tubuh segitiga dan membentuk sudut 60° dengan tanah
2. Bentuk kepala kecil dan membesar ke bawah
3. Warna bulu itik betina kuning keabu-abuan dengan ujung bulu sayap ekor, dada, leher dan kepala agak kehitaman
4. Warna bulu itik jantan abu-abu kehitaman dan pada ujung ekor terdapat bulu yang melengkung ke atas
5. Warna paruh dan kaki kuning.

Untuk pemeliharaan itik petelur secara intensif, makanan menjadi masalah penting yang perlu dipecahkan. Karena walau bagaimanapun peralihan dari sistem pemeliharaan tradisional ke sistem pemeliharaan intensif jelas membawa banyak

perubahan. Perubahan yang terbesar dalam hal makanan adalah pemberian makanan harus intensif pula. Dalam hal ini jelas makanan produksi pabrik atau ransum komersial sangat tepat. Namun demikian, salah satu kendala untuk mendapatkan makanan yang ideal seperti itu adalah membutuhkan biaya yang cukup besar. Pada peternak itik petelur, hal ini jelas tidak ekonomis. Untuk itu, penggunaan ransum komersial dari pabrik hanya diberikan kepada itik periode awal saja. Sementara untuk itik dara mulai umur 7 minggu dan seterusnya menggunakan makanan yang diramu sendiri. Sebenarnya banyak jenis makanan yang dapat diberikan pada itik. Secara umum, pada pemeliharaan semiintensif jenis pakan yang biasa digunakan adalah campuran dari jagung giling, bekatul, dan kulit atau kepala udang. Sementara itu, ada juga yang menggunakan keong, keong emas, bekicot, atau ikan-ikan kecil yang dicampur dengan nasi (Suharsono, 2009, 65-66).

Itik mengenali makanan semata-mata hanya dari indera penglihatan saja, sedangkan indera penciuman dan indera perasaan praktis tidak berperan. Bahan-bahan makanan untuk ransum itik tidak berbeda dengan ransum ayam. Bahan makanan untuk itik biasanya terdiri dari jagung kuning, dedak halus, bungkil kacang kedele, bungkil kelapa, tepung ikan dan bahan-bahan makanan lain yang menjadi sumber protein dan energi; untuk bahan mineral dapat digunakan grit, kapur, dsb., sedangkan hijauan dan macam-macam rumput dapat menjadi sumber vitamin (Juju, 2004, 344).

Menurut Bambang (1997, 10), alat-alat pencernaan pada itik adalah sebagai berikut:

- a. Mulut: yang terdiri atas paruh dan ruang paruh serta lidah. Makanan yang masuk oleh pergerakan lidah didorong masuk ke dalam pharynx, yang kemudian ditelan. Makanan yang terapung-apung di air ditelan dengan bantuan alat penyaringan yang berupa lamella parallel
- b. Pharynx: proses menelan pada ternak itik tidak bersifat peristaltik Karena itik tidak memiliki palat halus dan muskulus konstriktor pada pharynxnya
- c. Esophagus: makanan masuk ke esophagus semata-mata oleh adanya gravitasi (gaya berat) makanan dan karena tekanan yang lebih rendah di dalam ruang esophagus oleh leher yang dijulurkan ke atas. Demikian juga halnya dengan proses menelan air
- d. Crop: merupakan pelebaran dinding esophagus. Pada itik dan unggas air pada umumnya crop tidak berkembang dengan sempurna. Tidak seperti pada ayam atau burung-burung pemakan rumput. Crop semata-mata berfungsi sebagai penampung sementara bagi makanan. Di sini makanan dilunakkan dengan bantuan saliva dari mulut serta dari kelenjar esophagus dan *crop* sendiri.
- e. Perut: terdiri atas perut kelenjar (*proventrikulus*) dan perut muscular (*ventrikulus*) sebagai alat penghancur makanan
- f. Usus halus (*intestine*) terdiri atas duodenum sepanjang antara 22-38 cm, jejunum sepanjang 105 cm dan ileum sepanjang 15 cm
- g. Kolon: terdapat dua ceca yang masing-masing panjangnya antara 10-20 cm

h. Rectum

i. Kloaka.

Kebiasaan makan kita ditentukan oleh tradisi dan kebudayaan makanan yang tidak enak dapat menimbulkan sakit biasanya dihindarkan. Hal ini dituturkan oleh para orang tua kepada anaknya atau yang lebih muda. Beberapa orang tua di daerah memberikan petunjuk bahwa daun-daun yang diserang ulat biasanya tidak beracun dan aman dimakan manusia. Dalam bahan makanan sering terdapat bahan-bahan berupa senyawa kimia yang tidak mempunyai nilai nutrisi. Adanya senyawa-senyawa kimia tersebut selalu dihubungkan dengan sifat-sifat yang tidak diinginkan dan kadang-kadang beracun sehingga membahayakan kesehatan manusia yang mengkonsumsinya. Senyawa-senyawa kimia tersebut terdapat dalam berbagai macam bentuk, dari garam an organik yang sederhana sampai ke molekul yang besar dan kompleks. Bahaya yang ditimbulkannya dapat berupa bahaya keracunan, yang akut atau bersifat menahun dan dapat menimbulkan perubahan sifat (mutagen) (Winarno, 2004,228).

Secara garis besar, senyawa beracun dalam bahan makanan dapat digolongkan menjadi tiga golongan: senyawa beracun alamiah, senyawa beracun dari mikroba, dan senyawa beracun dari residu dan pencemaran (Winarno, 2004, 234). Gejala-gejala keracunan bahan pangan yang tercemar karena bakteri ini termasuk diare, sakit perut dan kadang muntah-muntah, tetapi belum jelas apakah ini merupakan suatu bentuk keracunan bahan pangan yang bersifat intoksikasi atau infeksi (Buckle, 1987). Senyawa racun dari mikroba bisa berupa infeksi dan keracunan. Infeksi adalah suatu

istilah yang digunakan bila seseorang seseorang setelah mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung bakteri patogen mendapat gejala-gejala penyakit. Keracunan yang disebut juga intoksikasi disebabkan karena mengkonsumsi makanan yang telah mengandung senyawa beracun yang berasal dari mikroba baik bakteri maupun kapang. Beberapa senyawa senyawa racun yang dapat menyebabkan intoksikasi adalah bakteri *Colostrodium botulinum*, *Staphylococcus aureus*, dan *Pseudomonas aspergillus flavus*, *Penicilium sp.*, dan lain sebagainya (Winarno, 2004, 234). Gejala-gejala dari keracunan bahan pangan yang tercemar *Staphylococcus aureus* adalah yang bersifat intoksikasi. Pertumbuhan organisme ini dalam bahan pangan menghasilkan racun enterotoksin yang apabila 8 termakan dapat menyebabkan serangan mendadak yaitu kekejangan pada perut dan muntah-muntah yang hebat (Buckle, 1987).

Dalam kehidupan sehari-hari kita disarankan mengonsumsi makanan yang beraneka ragam. Makanan yang beraneka ragam yaitu makanan yang mengandung unsur-unsur zat gizi yang diperlukan oleh tubuh baik kualitas maupun kuantitasnya. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan. Tanpa makanan, makhluk hidup akan sulit dalam mengerjakan aktivitas sehari-harinya. Makanan dapat membantu kita dalam mendapatkan energi, membantu pertumbuhan badan dan otak. Setiap makanan mempunyai kandungan gizi yang berbeda. Protein, karbohidrat, lemak, dan lain-lain adalah contoh gizi yang kita dapatkan dari makanan. Tidak hanya itu, dalam Al-Quran juga diperintahkan agar manusia tidak boleh mengonsumsi makanan secara berlebih-lebihan, jangan sampai melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh.

Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al A'Raaf/7:31 sebagai berikut:

يٰۤاٰدَمُ خُذْ وَاٰزِيۡنَكَ مِمَّا عِنۡدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوۡا وَشَرِبُوۡا وَاَلَّا تُسْرِفُوۡا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ

اَلۡمُسْرِفِيۡنَ ﴿٣١﴾

Terjemahnya:

“Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”.

Dalam konteks berlebih-lebihan ini dalam pandangan sains, makan berlebih-lebihan hingga memenuhi volume maksimal lambung memang tidak baik, karena jika lambung diisi penuh dengan makanan, maka asam lambung yang berfungsi mencegah karbohidrat tidak bisa bekerja maksimal, ada polisakarida yang tidak terpecah jadi disakarida, sehingga pada pencernaan selanjutnya di usus halus, makanan tersebut tidak bisa diserap dan makanan yang dimakan menjadi sia-sia. Adapun jika bisa dicerna seluruhnya, membutuhkan waktu yang banyak dan energi yang besar. Makan yang baik memang secukupnya saja, namun dengan nutrisi yang lengkap (Departemen Agama, 2008, 154).

Pada unggas petelur dan broiler dalam makanan sehari-harinya diberi makanan tambahan pelengkap yang dipergunakan untuk meningkatkan metabolisme dari unggas tersebut. Menurut Juju (2004, 289-290), beberapa makanan tambahan pelengkap yang bukan zat makanan yang biasa dikonsumsi oleh unggas petelur atau broiler yaitu:

1. Peningkatan pellet yang mempengaruhi tekstur dan menguatkan makanan yang sudah dibuat pellet
2. Pemberi bau enak dipergunakan untuk meningkatkan palatibilitas makanan
3. Enzim-enzim yang memperbaiki daya cerna di bawah kondisi tertentu
4. antibiotika, senyawa-senyawa arsen dan nitofurans dipergunakan pada tingkat rendah untuk mencegah makanan dari serangan perusakan oleh mikroorganisme dan mencegah timbulnya yang disebabkan oleh mikroflora dalam usus
5. Pencegah jamur dipergunakan untuk mencegah jamur yang merusak di dalam makanan dan atau di dalam saluran pencernaan dari ayam
6. Antibiotika yang mempunyai spektrum luas (*broad-spectrum*) dan daya serap absorpsi yang baik ditambahkan ke dalam makanan untuk memerangi penyakit-penyakit yang khusus
7. Senyawa-senyawa kimia tertentu dipergunakan untuk meningkatkan daya penyembuhan dari antibiotika terhadap penyakit
8. Koksidiostat secara rutin ditambahkan ke dalam ransum broiler dan juga ke dalam ransum ayam-ayam petelur muda
9. Obat-obat pencegah cacing ditambahkan ke dalam ransum tertentu dari waktu ke waktu
10. Antioksidan dipergunakan untuk mencegah asam-asam lemak yang tidak jenuh dari vitamin-vitamin yang larut dalam lemak dari perusakan yang disebabkan oleh peroksidasi

11. Sumber-sumber karotenoid ditambahkan ke dalam ransum untuk memperbaiki pigmentasi dari broiler dan kuning telur
12. Hormon atau zat-zat lain yang kadang-kadang dipergunakan untuk memperbaiki metabolisme dari broiler tersebut seperti estrogen, senyawa-senyawa thyroaktif, dan beberapa macam obat-obatan
13. Reserpin, aspirin dan beberapa obat-obat penenang dipergunakan untuk memperbaiki pertumbuhan, membatasi apikaran dan memperbaiki efisiensi penggunaan makanan pada broiler.

Upaya meningkatkan ketahanan pangan selain memperhatikan kuantitas bahan pangan, maka kualitas bahan pangan perlu mendapat perhatian termasuk faktor keamanan produk (*food safety*), bebas dari cemaran mikrobiologis, bahan-bahan kimia, logam berat, antibiotika, dan racun (toksin). Keamanan pangan asal ternak merupakan interaksi antara status gizi, toksisitas mikrobiologis dan kimiawi yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi (Thahir *et al*, 2005, 18).

Penyakit usus tertentu seperti enteritis yang mengandung ulcera membutuhkan antibiotika dengan tingkat tinggi untuk mengobatinya. Untuk penyakit-penyakit itu untuk antibiotika yang tidak diabsorpsi, zinc bacitracin sama efektifnya dengan antibiotika yang dapat diabsorpsi. Kadang-kadang mikroorganisme yang patogen terdapat di dalam darah, sehingga antibiotika yang dapat diabsorpsi dalam tingkat yang tinggi diperlukan untuk mengobati penyakit tertentu. Untuk menaikkan tingkat antibiotika dalam darah harus diperhatikan cara penggunaannya. Beberapa cara diantaranya yaitu air minum dan suntikan. Beberapa

peneliti telah memberi kesimpulan bahwa antibiotika bekerja lebih efektif di dalam darah dan dalam jaringan tubuh. akan tetapi dilihat dari segi efeknya terhadap peningkatan pertumbuhan dari antibiotika yang tidak dapat diabsorpsi daya kerjanya hanya ditujukan terhadap pembunuhan mikroflora yang patogen di dalam usus (Juju, 2004, 295).

Dari cara hidup ternak di padang penggembalaan maupun yang di dalam kandang, akan segera terlihat bahwa agen-agen penyakit dapat dengan mudah memasuki tubuh melalui alat pencernaan makanan. Macam dan kualitas pakan di padangan memungkinkan untuk digunakan sebagai tempat berlindung bagi parasit-parasit sebelum mereka dapat berkembangbiak di dalam tubuh hewan. Agar tubuh hewan terhindar dari bahan-bahan yang dapat menyebabkan gangguan, dalam sistem pencernaan individu tersedia perangkat-perangkat pertahanan yang memadai. Pertahanan tubuh dalam sistem tersebut berupa sebagai perangkat mekanik faali yang berupa refleksi hipersalivasi, muntah dan peningkatan peristaltik saluran pencernaan hingga diare. Melalui kedua perangkat yang terakhir, bahan penyebab penyakit akan dikeluarkan dari tubuh dengan segera. Berbeda pada hewan kesayangan, alat-alat pengindra cita rasa pada ternak besar, yang reseptornya terdapat pada kebanyakan tanaman beracun, dengan mudah akan termakan oleh ternak besar di padangan (Subronto, 2007, 5).

Perangkat pertahanan yang unik yang terdapat di dalam saluran pencernaan, berupa mikroflora yang terdapat di dalam kolon seekor sapi mungkin berjumlah 400-500 jenis. Jumlah jasad renik tersebut dalam tiap gram kadang-kadang mencapai

100 milyar. Mikroflora di dalam saluran pencernaan mempunyai fungsi ganda, yaitu (a). sebagai sumber energi bagi hewan semang yang ditempatinya, (b). sebagai barrier pertahanan untuk mencegah masuknya kuman patogen ke dalam sel-sel selaput lendir saluran pencernaan, dan (c). sebagai pemacu sel-sel pertahanan tubuh guna membentuk komponen zat penolak atau antibodi. Selain itu mikroflora juga mampu memacu peristaltik usus hingga kuman-kuman atau parasit lain dapat tergolong ke arah distal dan dikeluarkan dari tubuh (Subronto, 2007, 5).

Secara aktif hewan yang mendapatkan rangsangan penyebab penyakit, yang bertindak sebagai antigen, sel-sel saluran pencernaannya akan memproduksi IgA dalam jumlah banyak serta membentuk kekebalan seluler. Kemampuan pembentukan zat-zat penolak oleh zat-zat makrofag, limfosit B dan Limfosit T demikian besarnya, karena sepanjang saluran pencernaan terapat simpul limfe yang mengandung sel-sel tersebut dalam jumlah besar. Selain di dalam selaput lendir pencernaan, immunoglobulin yang terbentuk juga akan dapat ditemukan di dalam getah pencernaan yang dihasilkan oleh sel-sel kelenjar khusus. Di dalam getah tersebut imunoglobulin mampu membentuk kompleks antigen-antibodi hingga antigen yang terdapat di dalam makanan tidak dapat diserap oleh usus. Bahan yang mampu menyebabkan penyakit baik itu kuman atau zat-zat beracun, yang lolos dari proses netralisasi di dalam saluran usus akan diserap oleh darah limfe. Dengan melalui vena porta hepatis bahan yang bersifat meracun akan dibawa ke hati untuk mengalami proses detoksifikasi, dan seterusnya disekresikan melalui empedu dan ginjal. Selain

itu, sel-sel hati, hepatosit, juga memiliki kemampuan menahan antigen, hingga antigen tersebut menjadi inaktif (Subronto, 2007, 7).

Penyakit merupakan masalah peternakan yang paling rumit diatasi karena walaupun peternak sudah melakukan sanitasi kandang yang baik, memberikan pakan yang bermutu, dan melaksanakan pemilihan bibit yang sangat hati-hati, tetapi ternyata penyakit masih saja ada dan tidak bisa hilang seratus persen. Secara sederhana, Suharsono (2009, 82) mengklasifikasikan penyebab penyakit menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

1. Penyebab penyakit yang sebenarnya (*actual cause*) dalam bentuk mikroorganisme seperti virus, bakteri, dan protozoa.
2. Penyebab yang mempermudah berjangkitnya penyakit (*predisposing cause*). Penyebab ini mengakibatkan ternak lebih peka terhadap serangan penyakit tertentu. Beberapa *predisposing cause* yang sering terjadi di peternakan adalah:
 - a. Defisiensi zat makanan dalam ransum. Keadaan ini menyebabkan penurunan kondisi ternak sehingga penyakit mudah menyerang, seperti penyakit *white eye*, sinusitis, dan infestasi parasit. Ternak itik yang menderita penyakit ini akan lebih parah jika terjadi defisiensi zat gizi dalam ransum.
 - b. Pemberian pakan yang tidak tepat (*bad feeding*). Tanda-tanda penyakit akan lebih parah jika pakan yang diberikan tidak seimbang, misalnya jika hanya diberi makanan dari sisa restoran.
 - c. Perkandangan yang buruk (*bad housing*). Penyakit-penyakit yang tidak begitu serius dapat menjadi wabah manakala ternak itik ditempatkan di

kandang basah dan berlumpur. Atau sering pula penyakit tadi terjadi karena air bersih yang tidak tersedia.

- d. Keadaan yang penuh sesak (*over crowding*). Bila ternak itik berdesak-desakan pada suatu ruangan makan sering terjadi rangsangan berjangkitnya coccidiosis dan infeksi cacing. Demikian pula pada kandang yang keadaannya kotor.
- e. Ventilasi yang buruk. Pada kandang yang berventilasi buruk, ternak itik yang dipelihara mudah menderita penyakit mata karena rangsangan amonia dari fesesnya. Seringkali pula timbul penyakit pernapasan karena tiupan angin yang langsung menuju ternak di dalam kandang.

Menurut Bambang (1997,147), itik biasa juga menderita berbagai penyakit yang biasa disebabkan oleh bakteri yaitu sebagai berikut:

a. *Haemorrhagic Septicemia (Avian Cholera)*

Penyakit ini disebabkan oleh salah satu jenis bakteri yang disebut *Pasteurella multocida*, dengan tanda-tanda kotoran berwarna hijau-kuning, tender joint membengkak, pertumbuhan terhambat, nafsu makan turun dan mata berair. Pada pemeriksaan di autopsy didapati pendarahan pada ujung jantung, kadang-kadang juga pada kelopak mata bagian dalam, intestinal kadang-kadang mengalami pembengkakan serta *necrotic liver*. Untuk lebih meyakinkan biasanya dilakukan pemeriksaan laboratorium sebab ada penyakit lain yang tandanya sama. Pengobatan dapat dilakukan dengan sulfonamide, sedangkan untuk pencegahan dapat dilakukan vaksinasi. Dalam keadaan epidemik, maka

harus secepatnya diambil tindakan dengan mendesinfeksi kandang serta peralatannya, sedangkan terhadap bangkai penderita dilakukan pembakaran.

b. *New Duck Disease (infeksi Anatipestifer)*

Penyebab penyakit ini adalah *Pasteurella anatipesfer*, dengan tanda-tanda yang hampir sama dengan penyakit cholera seperti yang telah disebutkan. Pembedaannya dengan Cholera dapat dilakukan dengan pemeriksaan di laboratorium. Pengobatan terhadap penyakit ini dapat dilakukan dengan sulfaquinoxalin 1/1000 pada makanan, atau dengan terramycine 27,5 mg/kg berat badan.

c. *Botulismus*

Penyakit ini disebut juga *Limberneck*. Penyebabnya ialah racun yang dihasilkan oleh *Clostridium botulinum*, yang banyak terdapat pada bangkai hewan maupun kadang-kadang juga pada tanaman yang telah memburuk, dimana itik yang pemeliharaannya ekstensif sering memakannya. Akibatnya timbullah berupa kelumpuhan, terutama pada urat leher, sehingga kehilangan kontrol. Kadang-kadang juga diikuti bulu rontok pengobatan dapat dilakukan dengan memberi 1 gram tablet sulphocarbolate (segera setelah tampak gejala) setiap tiga jam dengan jumlah maksimum 3 atau 4 kali. Biasanya dapat juga diberikan suntikan antitoxin.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan yang bersifat deskriptif untuk mengeksplorasi bakteri asam laktat (BAL) yang terdapat pada usus itik (*Anas domestica*).

B. Variabel Penelitian

Penelitian ini memiliki variabel tunggal yaitu bakteri asam laktat yang diisolasi dari usus itik (*Anas domestica*).

C. Defenisi Operasional variabel

Karakteristik bakteri asam laktat adalah ciri sifat atau karakter berdasarkan bentuk, tepi, permukaan dan warna koloni (morfologi) serta bentuk sel dan sifat biokimia dari bakteri yang diisolasi dan ditumbuhkan pada media selektif MRSA pada suhu 37° C selama 1 x 24 jam.

D. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

1. Isolasi dan karakterisasi bakteri asam laktat dilakukan dengan mengambil isi usus halus dari itik. Itik yang digunakan dalam penelitian ini adalah itik

petelur yaitu jenis itik Alabio yang dipelihara oleh peternak yang ada di kecamatan Somba Opu desa Samata sebanyak 2 ekor.

2. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2014 di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar.

E. Alat dan Bahan

1. Alat

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain pisau, sendok, botol pengenceran, cawan petri, inkubator, labu Erlenmeyer, gelas piala, laminar air flow, gelas ukur, pipet tetes, jarum ose, korek api, oven, neraca analitik, lampu spiritus, autoklaf, botol, lemari es, mikropipet dan tip, vortex, bunsen, gelas objek, mikroskop, tabung reaksi, kertas label dan spoit.

2. Bahan

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain aquadest, usus itik, medium pertumbuhan (MRS broth dan agar, larutan fisiologis (NaCl 0,9%), BCP (*Bromcresol Purple*), medium pengujian aktivitas biokimia (uji KIA, uji motility, uji Indol, uji Metil Red, uji Voges Proskauer, uji sitrat, uji urea, uji karbohidrat (glukosa, laktosa, sukrosa, maltosa, manitol dan malonat), uji lysin, uji katalase, H₂O₂).

F. Prosedur Penelitian

Penelitian ini terdiri atas tahapan-tahapan sebagai berikut: tahap persiapan (sterilisasi alat dan bahan serta pembuatan medium), isolasi bakteri dari usus halus itik, uji kemampuan bakteri, karakterisasi bakteri secara mikrobiologis dan biokimia.

1. Sterilisasi Alat dan Bahan

Alat-alat yang akan digunakan dicuci bersih lalu dibilas dengan air suling, kemudian alat-alat gelas disterilkan dengan menggunakan oven pada suhu 180°C selama 2 jam. Alat-alat logam disterilkan dengan cara dipijarkan menggunakan lampu spiritus. Bahan-bahan seperti aquades dan medium disterilkan dengan menggunakan autoklaf pada tekanan atmosfer 2 atm dengan suhu 121°C selama 15 menit. Medium yang telah disterilkan diletakkan pada ruangan steril selama 2 hari. Sebelum disterilkan, aquades dan medium disaring terlebih dahulu.

2. Pembuatan Medium

Bahan-bahan yang akan digunakan disiapkan untuk pembuatan masing-masing medium seperti MRS (*Man, Rogosa and Sharpe*) broth dan agar untuk bakteri gram positif, dan medium pengujian aktivitas biokimia. Bahan tersebut ditimbang sesuai dengan komposisi masing-masing medium yang akan dibuat, kemudian dilarutkan dengan aquadest, selanjutnya dilakukan sterilisasi.

3. Isolasi dan Seleksi Bakteri Asam Laktat dari Usus Itik

Itik disembelih kemudian sayat di bagian media ventral daerah abdomen sehingga otot dada dapat dilepas. Kemudian seluruh organ saluran pencernaan dikeluarkan lalu diambil bagian usus halusnya. Usus itik diambil sebanyak 10 gr diencerkan dengan penambahan larutan NaCl fisiologis 0,9 % steril dimasukkan ke dalam *stomacher* untuk mengeluarkan isi usus tersebut. Setelah itu memasukkan suspensi tersebut ke dalam NaCl untuk diencerkan dengan perbandingan 1: 9 ml.

Suspensi Usus itik diinokulasikan pada medium cair MRS Broth diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37°C. Kultur dari MRS Broth diinokulasikan pada medium MRSA yang ditambahkan BCP (*Bromcresol purple*) 0, 1%, diinkubasi selama 48 jam. Koloni yang di sekitarnya terbentuk zona bening dimurnikan kembali pada medium MRSA dengan metode goresan sinambung lalu diinkubasi selama 24–48 jam. Pemurnian dilakukan dengan penggoresan yang dilakukan berulang-ulang pada medium dan kondisi yang sama hingga didapatkan koloni tunggal.

4. Karakterisasi Bakteri

a. Identifikasi Morfologi Secara Mikroskopik dengan Pewarnaan

Gram

Gelas objek dibersihkan dengan alkohol 96% kemudian difiksasi di atas lampu spiritus, selanjutnya isolat aktif diambil secara aseptik dan diletakkan di atas gelas objek lalu diratakan. Difiksasi kembali di atas lampu spiritus. Setelah dingin ditetaskan cat Gram A (kristal violet) 2-3 tetes selama 1 menit, kemudian dicuci dengan air mengalir dan dikeringkan di udara. Setelah itu ditetesi dengan Gram B (Iodium) selama 1` menit, dicuci dengan air mengalir dan dikeringkan di udara. Kemudian ditetesi dengan Gram C (Alkohol 96 %) selama 30 detik, lalu dicuci dengan air mengalir dan dikeringkan di udara. Terakhir ditetesi dengan Gram D (Safranin) selama 45 detik, lalu dicuci dengan air mengalir dan kelebihan air dihilangkan dengan kertas serap. Pengamatan ini dilakukan dengan melihat bentuk dan warna sel dibawah mikroskop dengan pembesaran tertentu.

b. Pengujian Aktivitas Biokimia

Aktivitas biokimia atau metabolisme adalah berbagai reaksi kimia yang berlangsung dalam tubuh makhluk hidup untuk mempertahankan hidup. Metode yang digunakan dalam pengujian aktivitas biokimia berdasarkan metode yang dilakukan oleh Dewi Paramitasari (2013).

1. Uji KIA

Isolat murni sebanyak satu ose digoreskan pada permukaan agar miring dan diinkubasi pada suhu 37°C selama 1 x 24 jam.

2. Uji Motility

Isolat murni diambil sebanyak satu ose ditusuk hingga pertengahan medium untuk melihat sifat motil dari mikroba tersebut dan di inkubasi pada suhu 37°C selama 1 x 24 jam.

3. Uji Indol

Isolat murni diambil satu ose dimasukkan ke dalam medium dan di homogenkan. Setelah diinkubasi 1 x 24 jam pada suhu 37°C kemudian di tambahkan reagen Ehrlich atau kovac sebanyak satu tetes.

4. Uji Metil Red

Isolat murni diambil sebanyak satu ose dimasukkan ke dalam medium dan dihomogenkan setelah itu diinkubasi pada suhu 37°C selama 1 x 24 jam dan ditambahkan metil red.

5. Uji Voges Proskauer

Isolat murni diambil sebanyak satu ose dimasukkan ke dalam medium dan dihomogenkan. Diinkubasi pada suhu 37°C selama 1 x 24 jam kemudian di tambahkan pereaksi alfa-naftol dan KOH.

6. Uji Citrat

Isolat murni sebanyak satu ose digoreskan pada medium agar miring untuk uji citrat dan di inkubasi pada suhu 37°C selama 1 x 24 jam.

7. Uji Urea

Isolat murni sebanyak satu ose digoreskan pada medium agar miring untuk uji urea dan diinkubasi pada suhu 37°C selama 1 x 24 jam.

8. Uji Karbohidrat

Pada uji karbohidrat ini terdiri dari beberapa medium yaitu glukosa, lactosa, sukrosa, maltosa, manitol dan malonat. Pada setiap medium dimasukkan isolat murni sebanyak satu ose dan dihomogenkan lalu diinkubasi pada suhu 37°C selama 1 x 24 jam.

9. Uji Lysin

Isolat murni sebanyak satu ose dimasukkan ke dalam medium lysin dan dihomogenkan lalu diinkubasi pada suhu 37°C selama 1 x 24 jam.

10. Uji Katalase

Isolat murni diletakkan di atas gelas objek kemudian ditetesi dengan H₂O₂, diamati ada tidaknya gelembung gas yang dihasilkan.


BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Isolasi dan Seleksi Bakteri Asam Laktat dari Usus halus Itik

Upaya dalam memperoleh isolat bakteri asam laktat dari usus itik sebagai flora normal dilakukan dengan terlebih dahulu mengkultur suspensi usus halus itik pada medium MRS selama 1 x 24 jam pada suhu 37°C. Kultur dari MRS diinokulasikan secara kuadran pada medium MRSA yang ditambahkan BCP (*Bromcresol purple*) 0,1% selama 1 x 24 jam pada suhu 37°C. Warna ungu medium yang berubah menjadi warna kuning menunjukkan isolat yang tumbuh merupakan bakteri asam laktat. Pemurnian dilakukan dengan penggoresan yang dilakukan berulang-ulang pada medium dan kondisi yang sama hingga didapatkan koloni tunggal sebagaimana gambar 4.1.



a



b

Gambar 4.1. Isolat a dan b bakteri asam laktat dari usus itik


2. Karakterisasi Bakteri Asam Laktat

Dua isolat terpilih yang menunjukkan positif merupakan bakteri asam laktat diamati karakteristik morfologinya meliputi morfologi koloni dan sel. Dari stok isolat pada agar MRSA miring yang berasal dari koloni tunggal yang terbentuk dari hasil penggoresan selanjutnya dilakukan pengujian biokimia. Tabel 4.1, 4.2 dan 4.3 secara berturut-turut merupakan hasil pengamatan morfologi koloni, sel dan sifat biokimia.

Tabel 4.1 Karakteristik Morfologi Koloni Bakteri Asam Laktat dari Usus Halus Itik

No.	Kode Isolat	Gambar	Morfologi Koloni
1	A		<ul style="list-style-type: none"> • Bentuk : bulat • Tepi : Rata • Permukaan : Cembung • Warna : Putih susu
2	B		<ul style="list-style-type: none"> • Bentuk : bulat • Tepi : Rata • Permukaan : Cembung • Warna : Putih susu

Tabel 4.2 Karakteristik Morfologi Sel Bakteri Asam Laktat dari Usus Itik dengan Pewarnaan Gram

No.	Nama Isolat	Gambar	keterangan
1.	A		<ul style="list-style-type: none"> • Gram positif • Bentuk basil pendek • Warna ungu
2.	B		<ul style="list-style-type: none"> • Gram positif • bentuk basil panjang • Warna ungu

Tabel 4.3 hasil uji biokimia dari usus itik

Uji Biokimia	Kode Isolat bakteri	
	Isolat A	Isolat B
KIA	A/A, -/-	A/A, -/-
MIO	-	-
Citrat	-	-
Urea	-	-
Glukosa	+	+
Laktosa	+	-
Sukrosa	+	+
Maltosa	+	-
Manitol	-	-
Malonat	-	-
LIA	-	-
MR	+	+
VP	-	-
Katalase	-	-
Genus	<i>Lactobacillus</i>	<i>Lactobacillus</i>

Keterangan:

A/A, -/- = Acid/Acid, tidak

beraksi terhadap asam

+ = hasil positif, ada reaksi terhadap uji

- = hasil negatif, tidak ada reaksi terhadap uji

B. Pembahasan

BCP (*Bromcresol purple*) merupakan indikator warna terjadinya penurunan pH pada suatu medium. Perubahan warna medium MRSA yang ditambahkan BCP dari ungu menjadi kuning merupakan akibat karena asam yang dihasilkan oleh isolat BAL dari fermentasi glukosa sehingga menurunkan pH media medium (Lay, 1994).

Fermentasi dapat terjadi karena adanya aktivitas mikroba penyebab fermentasi pada substrat organik yang sesuai. Fermentasi sebagai perubahan gradual oleh enzim dari beberapa bakteri, kapang, dan khamir di dalam media pertumbuhan. Pertumbuhan bakteri umumnya menurun, akibat adanya perubahan keadaan lingkungan fermentasi menjadi asam yang mengakibatkan bakteri tidak toleran terhadap keadaan tersebut. Menurut Amin dan Lekson (2001) bahwa, efek bakterisidal dari asam laktat berkaitan dengan penurunan pH lingkungan menjadi 3 sampai 4,5 sehingga pertumbuhan bakteri lain termasuk bakteri pembusuk akan terhambat.

1. Karakterisasi Bakteri Asam Laktat

Identifikasi genera bakteri asam laktat memerlukan karakter-karakter utama dari bakteri yaitu morfologi sel (bentuk sel dan susunan sel) dan uji biokimia. Uji morfologi dan uji biokimia sudah dapat dilakukan identifikasi ke tingkat genera bakteri asam laktat. Uji morfologi dilakukan untuk mengetahui bentuk morfologi dari bakteri yang akan diidentifikasi sedangkan uji biokimia digunakan untuk mengetahui kemampuan bakteri untuk menggunakan zat-zat kimia untuk pertumbuhannya.

Bakteri yang ditumbuhkan pada media yang sesuai dengan zat kimia yang dibutuhkan akan tumbuh dengan baik dan pada media tersebut dengan mengambil nutrisi yang ada pada media tersebut. Pertumbuhan terbaik bakteri pada umumnya yaitu kurang lebih 24-48 jam pada suhu 37°C. Bakteri yang telah diisolasi ditumbuhkan pada media MRSA sebagai media pertumbuhannya dimana pada media tersebut hanya bakteri asam laktat saja yang bisa tumbuh karena MRSA adalah media selektif sehingga bakteri yang tumbuh adalah bakteri asam laktat saja tidak ada bakteri lain.

Bentuk morfologi koloni dari bakteri yang tumbuh dalam media pertumbuhan bakteri yaitu MRSA nampak bentuk bulat (*circulair*), tepi rata (*entire*), permukaan cembung (*conveks*) dan berwarna putih susu. Ciri morfologi koloni ini sama antara isolat A dan isolat B. Menurut Heni Mutmainnah (2013) morfologi koloni yang berbentuk bulat (*circulair*), tepi rata (*entire*), permukaan cembung (*conveks*) dan berwarna putih susu merupakan ciri morfologi dari bakteri asam laktat genus *Lactobacillus*. *Lactobacillus* tersebar luas di lingkungan, terutama pada hewan dan produk makanan sayur-sayuran. Mereka biasanya mendiami saluran usus burung dan mamalia, dan vagina mamalia serta tidak bersifat patogen.

Pada hasil uji perwarnaan Gram, kedua isolat yaitu isolat A dan isolat B menunjukkan bentuk batang. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Wibowo dan Ristanto (1988), yaitu sel bakteri dari genus *Lactobacillus* berbentuk batang yang bervariasi dari batang yang sangat pendek sampai batang yang panjang, bersifat homofermentatif atau heterofermentatif. Kedua isolat juga termasuk dalam Gram

positif. Pengecatan Gram dilakukan pada kultur bakteri umur 24 jam yang ditumbuhkan pada medium MRS padat. Bakteri asam laktat merupakan bakteri Gram positif (Stamer, 1979). Bakteri Gram positif akan memberikan warna ungu ketika diberi cat Gram. Warna ungu tersebut terjadi karena dinding sel bakteri mengikat cat kristal violet (Gram A) yang diperkuat oleh iodine (Gram B) dan kristal violet tersebut tidak akan hilang pada waktu diberi cat peluntur (Gram C), sehingga tidak terpengaruh pada saat diberi cat penutup (Gram D) yang berwarna merah.

Dari hasil pengecatan gram ini juga dapat digunakan untuk melihat bentuk dan susunan sel bakteri asam laktat. Pengamatan dilakukan pada perbesaran 1000x. Hasil pengamatan di mikroskop didapatkan bakteri dengan bentuk batang atau basil sedangkan susunannya kebanyakan berantai dan menggerombol. Hasil uji ini sesuai dengan hasil uji yang telah dilakukan oleh Heni Mutmainnah (2013), yaitu bentuk batang dan memiliki sifat Gram positif adalah ciri dari Genus *Lactobacillus*.

Prinsip pewarnaan gram adalah kemampuan dinding sel mengikat zat warna dasar (kristal violet) setelah pencucian dengan alkohol 95%. Keadaan ini berhubungan dengan komposisi senyawa penyusun dinding sel. Pada bakteri gram positif mengandung peptidoglikan lebih banyak dan lemak lebih sedikit dibandingkan bakteri gram negatif (Syulasmis, 2005). Menurut Cullimore (2000), *Lactobacillus* memiliki sel yang berbentuk panjang, batang silinder (kadang-kadang melengkung) sedang yang lain pendek, sering berbentuk *coryne* atau batang bulat. Selnya juga sering membentuk rantai. Walaupun termasuk ke dalam bakteri gram positif tetapi ada juga yang bipolar (Gram positif dan Gram negatif) kemungkinan terjadi akibat

granulasi dalam sel. Metabolismenya adalah metabolisme fermentatif dengan merubah setidaknya 50% karbon menjadi asam laktat.

Dinding sel bakteri gram negatif terdiri dari 5-20% peptidoglikan, selebihnya adalah polisakarida, sedangkan dinding sel bakteri Gram positif mengandung 90% peptidoglikan selebihnya adalah asam teikoat. Sel bakteri Gram positif terlihat berwarna ungu, karena dapat membentuk ikatan kompleks dengan pewarna pertama yaitu kompleks ungu kristal iodium. Pada sel bakteri Gram negatif pemberian larutan alkohol 95% dapat meningkatkan porositas dinding sel dengan melarutkan lipid pada membran luar, sehingga kompleks ungu kristal iodium akan terlepas dan sel menjadi tidak berwarna. Selanjutnya, sel akan berwarna merah karena terwarnai oleh warna pembanding yaitu safranin (Madigan, 2011).

Bakteri asam laktat dapat tumbuh dengan baik di lingkungan yang terdapat oksigen (aerob) dan tidak terdapat oksigen (anaerob) sehingga termasuk ke dalam bakteri yang bersifat anaerob fakultatif/anaerob aerotoleran. Hal tersebut dibuktikan dengan kemampuan kedua isolat yang tumbuh dalam kondisi aerob yaitu dalam inkubator dan kondisi anaerob di dalam *candle jar*. Menurut Hot *et al* (1994), bakteri *Lactobacillus* termasuk Gram positif, tidak berspora, tidak motil dan fakultatif anaerob.

Adapun uji biokimia yang dilakukan ada beberapa uji yaitu uji KIA, uji motilitas, uji indol, uji *metil red*, uji Voges Proskauer, uji citrat, uji urea, uji karbohidrat, uji lisyn, dan uji katalase. Pada uji motilitas yang dilakukan pada kedua isolat tersebut yaitu bakteri ditanam media agar tegak dengan cara menusukkan ose

yang sudah terdapat bakteri pada media tersebut. Hal yang diperhatikan pada uji ini yaitu adanya rambatan-rambatan pada bekas tusukan pada media tersebut untuk mengetahui kemampuan bakteri tersebut untuk bergerak. Pada hasil uji yang telah dilakukan bakteri ini tidak melakukan pergerakan pada media sehingga dikatakan bakteri tersebut bersifat non motil. Menurut Surono (2004) bakteri probiotik memiliki kemampuan biosintesis yang sangat terbatas, sehingga bersifat non motil. Perolehan energinya semata-mata hanya bergantung pada metabolisme secara fermentatif yang dilakukan pada tempatnya. Hasil negatif pada uji motilitas menunjukkan bahwa bakteri uji tidak memiliki flagella sebagai alat pergerakan.. Penelitian yang dilakukan oleh Heni Mutmainnah (2013) dan Yoni Suryani (2010) juga memperoleh hasil negatif pada uji motilitas yang dilakukan pada karakterisasi bakteri asam laktat yang mereka teliti.

Uji indol dilakukan untuk mengetahui kemampuan bakteri dalam membentuk indol dari triptofan. Pada uji ini ditambahkan reagen Erlich atau Kovach yang dapat mengakibatkan medium berwarna merah. Hasil menunjukkan negatif untuk semua isolat. Berarti bakteri ini tidak mampu menghasilkan enzim triptofanase yang dapat mengkatalisis reaksi pemecahan triptofan menjadi indol, asam piruvat dan ammonia. Hal yang sama juga terjadi pada penelitian yang dilakukan oleh Paramitasari (2013), yaitu bakteri asam laktat tidak menghasilkan indol. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Soeharsono (2010, 71) bahwa bakteri asam laktat tidak menghasilkan indol.

Karakterisasi isolat probiotik selanjutnya dilakukan dengan mengidentifikasi terbentuknya asam campuran pada media *metil red*. Uji *metil red* sendiri digunakan untuk menentukan adanya produk asam campuran dari fermentasi glukosa melalui jalur fermentasi asam campuran yang umumnya berupa asam laktat, asam asetat, asam format, dan asam suksinat. Berdasarkan hasil penelitian seperti yang disajikan pada tabel 4.3, semua isolat menunjukkan hasil positif pada uji MR yang ditandai dengan terbentuknya warna merah pada media setelah ditambahkan *metil red* sebagai larutan indikatornya. Brown (2001) menjelaskan bahwa warna merah yang terbentuk pada media akibat penurunan pH media oleh produk asam dalam jumlah besar yang dihasilkan dari fermentasi glukosa. Hasil uji ini sesuai dengan pernyataan Surono (2004) bahwa dalam proses fermentasi yang melibatkan bakteri asam laktat mempunyai ciri khas yaitu terakumulasinya asam organik yang disertai dengan penurunan pH.

Kemudian pada uji Voges proskauer, digunakan untuk menentukan kemampuan bakteri tersebut menghasilkan produk akhir yang netral (asetilmetilkarbinol) dari fermentasi glukosa melalui jalur butanediol (Brown, 2001). Pada uji Voges proskauer, ditambahkan reagen Barritt's A (α -naphthol) dan Barritt's B (kalium hidroksida). Hasil uji menunjukkan semua isolat negatif terhadap uji VP. Hal ini terlihat dengan tidak ditemukan adanya cincin merah yang terbentuk pada media setelah ditetesi dengan reagen.

Pada uji sitrat (*Simmons citrate Medium*) dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan bakteri untuk menggunakan sitrat sebagai satu-satunya sumber karbon.

Hasil uji menunjukkan semua isolat negatif terhadap uji sitrat. Hal ini terlihat dengan tidak berubahnya warna media dari hijau menjadi biru. Pada uji ini, bakteri meningkatkan pH agar bisa tumbuh yaitu dari asam menjadi basa sedangkan bakteri asam laktat adalah bakteri yang menghasilkan asam laktat. Bakteri asam laktat menggunakan karbohidrat sebagai sumber nutrisi utamanya dalam melakukan fermentasi.

Hasil uji urease terhadap kedua isolat bakteri memberikan hasil negatif, yang ditandai dengan tidak terbentuknya warna merah keunguan pada media biakan uji urease. Hal ini menunjukkan bahwa kedua isolat bakteri tersebut tidak dapat menghasilkan enzim urease yang dapat menguraikan urea menjadi CO_2 dan NH_3 , sehingga warna indikator *phenol red* tetap berwarna kuning yang berarti tidak terbentuk senyawa yang bersifat basa seperti NH_3 dalam media biakan.

Bakteri asam laktat memiliki sifat khusus yaitu mampu memfermentasi karbohidrat jenis monosakarida dan disakarida. Uji karbohidrat dilakukan dengan menggunakan beberapa jenis gula pada medium cair yaitu glukosa, laktosa, sukrosa, manitol, maltosa dan malonat. Pada isolat A hasil menunjukkan positif pada glukosa, sukrosa, laktosa dan maltosa sedangkan hasil negatif pada uji manitol dan malonat. Pada isolat B hasil menunjukkan positif pada uji glukosa dan sukrosa sedangkan hasilnya negatif pada uji maltosa, manitol dan malonat. Pada percobaan memberikan hasil yang berbeda dalam melakukan fermentasi pada berbagai jenis gula sehingga bisa diketahui bahwa kedua bakteri asam laktat tersebut berbeda jenis.

Menurut Helferich dan Westhoff (1980), pada metabolisme karbohidrat laktosa akan dihidrolisis oleh bakteri asam laktat dengan enzim β -galaktosidase menjadi glukosa dan galaktosa. Glukosa akan langsung dapat digunakan untuk memproduksi asam laktat sedangkan galaktosa terakumulasikan. Pada sukrosa dirubah menjadi 1 molekul glukosa dan 1 molekul fruktosa sedangkan laktosa dirubah menjadi 2 molekul glukosa. Pada uji kemampuan melakukan fermentasi pada isolat B, bakteri asam laktat dari usus tidak mampu melakukan fermentasi pada media laktosa, manitol, maltosa serta malonat. Pernyataan Soeharsono (2010, 71), bakteri asam laktat jenis *Lactobacillus acidophilus* tidak mampu melakukan fermentasi menggunakan jenis gula manitol, laktosa, maltosa serta malonat dalam fermentasinya.

Dari hasil fermentasi ini pada tabung tidak terdapat gelembung gas yang berarti bahwa tidak terbentuk asam campuran dalam fermentasi tersebut. Menurut Lay (1994) jika hasil uji fermentasi karbohidrat berupa warna kaldu menjadi kuning atau lebih kuning dari warna kaldu pada tabung kontrolnya dan terbentuk gas pada tabung Durham, menunjukkan terjadi fermentasi asam campuran. Sehingga dapat dipertegas bahwa bakteri asam laktat baik isolat A dan isolat B merupakan bakteri asam laktat yang bersifat homofermentatif.

Menurut Thahjadi (2009, 201-202), ada dua kelompok fermentasi asam laktat yaitu homofermentatif dan heterofermentatif. Bakteri asam laktat homofermentatif menghasilkan mayoritas asam laktat dengan sedikit produk samping, yaitu gliserol, etanol, asetat, format dan karbondioksida. Bakteri asam laktat homofermentatif mengoksidasi glukosa menjadi 2 piruvat melalui jalur Embden Meyerhoff Parnas

(EMP). Pada jalur itu menghasilkan glukosa menjadi dua ATP. NADH yang dihasilkan pada jalur itu dipakai untuk mereduksi piruvat menjadi asam laktat. Bakteri yang tergolong dalam homofermentatif misalnya, *Streptococcus*, *Pediococcus*, dan beberapa *Lactobacillus*. Adapun bakteri asam laktat heterofermentatif menghasilkan asam laktat dan produk fermentasi lainnya (kebanyakan etanol) dengan rasio yang seimbang. Hal ini karena mereka mengoksidasi glukosa menjadi piruvat dan asetil fosfat melalui jalur Heksosa Monofosfat (HMP). Piruvat kemudian direduksi menjadi asam laktat, sedangkan hasil fosfat kemudian direduksi menjadi etanol. Pada jalur itu menghasilkan 1 ATP. Bakteri yang tergolong dalam heterofermentatif adalah *Leuconostoc* dan beberapa *Lactobacillus*.

Adapun uji selanjutnya adalah uji katalase. Uji katalase merupakan uji untuk mengidentifikasi mikroba yang mampu menghasilkan enzim katalase yang digunakan untuk memecah hidrogen peroksida yang terbentuk dari proses respirasi aerob dan bersifat toksik terhadap bakteri, menjadi dihidrogen oksida (H_2O) dan oksigen (O_2) yang tidak bersifat toksik lagi. Hasil menunjukkan bakteri ini tidak mampu menghasilkan enzim katalase sehingga memberikan reaksi negatif. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri (2009) yang juga memperoleh hasil negatif pada uji katalase yang dilakukan.

Surono (2004) menyatakan bahwa bakteri asam laktat bersifat non motil dan menghasilkan berbagai senyawa metabolit lainnya disamping asam laktat, diantaranya adalah hydrogen peroksida (H_2O_2), karena tidak memiliki enzim katalase

yang bisa memecah H_2O_2 . Oleh karena itu, untuk melakukan karakterisasi bakteri probiotik salah satunya menggunakan uji katalase. Beberapa strain *Lactobacillus* menghasilkan antibiotik yang dapat membunuh bakteri melalui penjagaannya dari serangan bakteri yang berbahaya. Cara lainnya adalah melalui kerja proteksi dengan menghambat pertumbuhan dan aktivitas mikroorganisme tanpa membunuhnya seperti halnya antibiotik. Dalam aktivitas proteksi ini juga termasuk memproduksi asam dan hidrogen peroksida (H_2O_2) (Abun, 2008). H_2O_2 diproduksi oleh BAL di bawah kondisi pertumbuhan aerob dan berkurangnya katalase selular, *pseudokatalase* atau *peroksidase*. H_2O_2 merupakan oksidator, *bleaching agent* dan anti bakteri. H_2O_2 murni tidak berwarna, berbentuk cairan seperti sirup dan memiliki bau yang menusuk. BAL mensekresikan H_2O_2 tersebut sebagai alat pelindung diri yang mampu bersifat bakteristatik maupun bakterisidal (Widiasih, 2008: 5).

Djide dan Wahyudin (2008) menjelaskan bahwa reaksi katalase menunjukkan hasil positif bila terbentuk gelembung udara yang mengindikasikan terbentuknya gas O_2 dan hasil negatif jika tidak menunjukkan adanya gelembung gas. Hasil uji katalase terhadap ke-2 isolat menunjukkan hasil negatif untuk semua isolat, tidak terdapat gelembung gas pada H_2O_2 yang telah disuspensikan dengan isolat bakteri, tampak pada tabel 4.3.

Isolat diduga kuat sebagai *Lactobacillus* dengan memenuhi kriteria mempunyai sifat katalase negatif, pewarnaan Gram-positif, nonmotil, dan bentuk sel batang. Pemilihan ini berdasarkan Buchanan (1974) dalam *Bergey's manual of*

determinative bacteriology yang menyatakan bahwa *Lactobacillus* mempunyai sifat katalase negatif dan Gram-positif dengan bentuk morfologi basil atau coccobasil.

Berdasarkan uji morfologi dan uji kimia yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa bakteri asam laktat yang terdapat dalam usus halus itik tersebut adalah bakteri asam laktat genus *Lactobacillus*.

Lactobacillus sp berbentuk batang. Pembentukan rantai umum dijumpai, terutama pada fase pertumbuhan logaritma lanjut. Motilitas tidak umum. Tidak membentuk spora. Gram positif berubah menjadi gram negatif dengan bertambahnya umur dan derajat keasaman. Metabolisme fermentatif. Kisaran suhu optimum biasanya 30–40°C. Dijumpai dalam produk persusuan (Jawetz, Melnick, & Adelberg's 2001, 349).

Bakteri yang tergolong ke dalam genus *Lactobacillus* memiliki sel yang berbentuk batang yang bervariasi dari batang yang sangat pendek sampai batang yang panjang, bersifat homofermentatif atau heterofermentatif (Wibowo & Ristanto, 1988). Genus bakteri ini juga bersifat mikroaerofilik, katalase negatif, Gram positif dan memfermentasi gula dengan asam laktat sebagai produk utama. Bila bersifat homofermentatif akan memfermentasi gula menjadi asam laktat, sedangkan bila bersifat heterofermentatif akan menghasilkan produk volatil termasuk alkohol selain asam laktat. *Lactobacillus* yang bersifat homofermentatif tumbuh dengan temperatur optimal 37°C atau lebih rendah, contohnya *L. bulgaricus*, *L. helveticus*, *L. lactis*, *L. acidophilus* dan *L. thermophilus*, sedangkan *L. delbrueckii* dan *L. fermentum* adalah *Lactobacillus* heterofermentatif yang dapat tumbuh pada temperatur tinggi (Frazier &

Westhoff, 1988). Bakteri dari genus ini ditemukan pada tanaman, sayur-sayuran, biji-bijian, susu segar dan olahannya serta daging dan produk daging terfermentasi, sayuran terfermentasi dan beberapa spesies ditemukan dalam saluran pencernaan manusia dan hewan (Ray, 2004).

Bakteri asam laktat banyak terdapat di lingkungan dan memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Watkins dan Miller (1983) yang menyatakan bahwa bakteri asam laktat dapat menjaga keseimbangan populasi dalam usus halus dan dapat berkoloni dalam suasana asam saluran pencernaan. Total bakteri asam laktat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain ransum, umur, kondisi pH usus halus.

Berkaitan tentang manfaat, sebagian bakteri asam laktat berpotensi memberikan dampak positif bagi kesehatan dan nutrisi manusia, beberapa di antaranya adalah meningkatkan nilai nutrisi makanan, mengontrol infeksi pada usus, meningkatkan digesti (pencernaan) laktosa, mengendalikan beberapa tipe kanker, dan mengendalikan tingkat serum kolesterol dalam darah. Sebagian keuntungan tersebut merupakan hasil dari pertumbuhan dan aksi bakteri selama pengolahan makanan, sedangkan sebagian lainnya hasil dari pertumbuhan beberapa BAL di dalam saluran usus saat mencerna makanan yang mengandung BAL sendiri. Bakteri asam laktat dapat menghambat pertumbuhan bakteri lain dengan memproduksi protein yang disebut bakteriosin. Salah satu contoh bakteriosin yang dikenal luas adalah nisin. Senyawa bakteriosin yang diproduksi BAL dapat bermanfaat karena menghambat bakteri patogen yang dapat merusak makanan ataupun membahayakan kesehatan manusia, sehingga keamanan makanan lebih terjamin (Anonim, 2011).

Selain asam laktat, bakteri asam laktat juga menghasilkan bakteriosin. Bakteriosin adalah senyawa peptida antimikroba yang mudah didegradasi oleh enzim proteolitik dalam sistem pencernaan manusia dan hewan. Bakteriosin yang dihasilkan oleh bakteri asam laktat sangat menguntungkan dalam industri makanan terutama dalam produk makanan hasil fermentasi, karena aktivitasnya yang mampu menghambat pertumbuhan beberapa bakteri kontaminan penyebab pembusukan dan penyakit yang ditularkan melalui makanan (*food borne illness*). Penambahan bakteriosin dalam makanan selain untuk mencegah terjadinya pembusukan, juga untuk memperpanjang waktu penyimpanan makanan dan menghambat pertumbuhan atau membunuh bakteri patogen (Sri, 2009).

Asam-asam organik yang banyak digunakan sebagai bahan pengawet pangan sebagian besar diproduksi oleh BAL sehingga menurut Soeharsono (2010), metabolit yang dihasilkan oleh BAL memiliki kemampuan untuk menghambat pertumbuhan bakteri patogen. Komponen penghambat yang dihasilkan oleh *Lactobacillus spp*, meliputi bakteriosin yang memiliki sifat khusus (yaitu nisin, reuterin, acidolin, bulgaricin), substansi seperti bakteriocin dan substansi antagonis lainnya seperti H₂O₂ dan beberapa asam-asam organik tertentu. Walaupun *Lactobacilli* kurang efektif dalam mengurangi koloni *Salmonella* pada unggas, komponen yang dihasilkan oleh *Lactobacilli* aktif dalam melawan spesies bakteri spektrum luas. beberapa sifat penghambat juga memiliki keefektifan yang bervariasi, beberapa bakteriosin hanya menghambat bakteri Gram positif, sedangkan acidolin menghambat beberapa spesies

bakteri Gram positif dan Gram negatif, dan reuterin dapat menghambat semua bakteri, jamur dan fungi (Soeharsono, 2010: 168).

Dalam kehidupan sehari-hari kita disarankan mengonsumsi makanan yang beraneka ragam. Makanan yang beraneka ragam yaitu makanan yang mengandung unsur-unsur zat gizi yang diperlukan oleh tubuh baik kualitas maupun kuantitasnya. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan. Tanpa makanan, makhluk hidup akan sulit dalam mengerjakan aktivitas sehari-harinya. Makanan dapat membantu kita dalam mendapatkan energi, membantu pertumbuhan badan dan otak. Setiap makanan mempunyai kandungan gizi yang berbeda. Protein, karbohidrat, lemak, dan lain-lain adalah contoh gizi yang kita dapatkan dari makanan. Al-Quran menganggap makanan dan aktivitas sangat penting, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Abasa,80:24 yaitu sebagai berikut:

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ۚ

Terjemahnya:

“Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya”.

Al-Maraghi mengatakan bahwa hendaklah manusia mau memikirkan tentang kejadian dirinya dan makanan yang dimakannya. Bagaimana hal itu diciptakan dan disediakan untuknya sehingga bisa dijadikan makanan yang menunjang kelangsungan hidupnya. Di samping itu ia pun bisa merasakan lezatnya makanan yang menunjang kekuatan tubuhnya agar tetap terjaga sampai batas umur yang telah ditentukan untuknya (Syarfaini, 2012, 28).

Saluran pencernaan manusia merupakan tempat pencernaan makanan yang terdiri atas lambung (perut), usus kecil dan usus besar. Cairan lambung memiliki pH cukup rendah berkisar 2. Lambung dapat dianggap sebagai penghalang mikrobiologis terhadap masuknya bakteri–bakteri asing ke dalam saluran usus. Meskipun jumlah bakteri dalam lambung sangat kecil tetapi dinding lambung sering ditumbuhi bakteri. Bakteri yang sering ditemukan tumbuh adalah bakteri yang toleran asam seperti *lactobacillus* dan *streptococcus*. Hal ini dapat terlihat dalam jumlah yang banyak bila dilakukan pemeriksaan secara histologis maupun dengan pemayaran mikroskop elektron. Bakteri ini tumbuh lebih awal dan lebih pesat pada minggu pertama (Hafsah, 2011, 197).

Dalam hal usus besar atau kolon terdapat sekitar 400 spesies bakteri yang disebut mikroflora. Sebanyak 50-60% dari berat feses adalah mikroflora. Berdasarkan aspek kesehatan dan sifatnya, bakteri dalam kolon dibagi menjadi dua kelompok yaitu bakteri yang menguntungkan dan bakteri yang merugikan. Kondisi dan media bagi perkembangan kedua golongan mikroba ini berbeda. Untuk mendukung kesehatan yang baik, populasi mikroba yang menguntungkan harus dominan (Jansen, 2006,108).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bakteri asam laktat yang terdapat pada usus itik baik isolat A dan B diduga kuat merupakan kelompok bakteri asam laktat yang tergolong ke dalam anggota genus *Lactobacillus*.
2. Karakteristik morfologi koloni isolat A bentuk bulat, tepi rata, permukaan cembung dan berwarna putih susu, bersifat Gram positif serta berbentuk batang. Karakteristik biokimianya yaitu memfermentasi karbohidrat dengan jenis gula berupa glukosa, laktosa, sukrosa, dan maltosa. Menghasilkan asam sehingga mampu menurunkan pH, katalase negatif dan nonmotil. Adapun pada isolat B memiliki karakteristik morfologi bentuk bulat, tepi rata, permukaan cembung dan berwarna putih susu, bersifat Gram positif serta berbentuk batang. Karakteristik biokimianya yaitu memfermentasi karbohidrat dengan jenis gula berupa glukosa, dan sukrosa. Menghasilkan asam, katalase negatif dan nonmotil.

B. Saran

Penelitian ini perlu dikembangkan lagi dengan mengidentifikasi isolat BAL yang diperoleh sampai ke tingkat spesies mengingat cara identifikasi yang dilakukan dalam penelitian ini masih bersifat standar sehingga perlu dilakukan pengujian isolat sampai pada tingkat molekuler.

DAFTAR PUSTAKA


- Abun. 2008. *Hubungan Mikroflora dengan Metabolisme dalam Saluran Pencernaan Unggas dan Monogastrik*. Universitas Padjajaran. Jatinangor.
- Amin dan Leksono, 2001. *Efektivitas Bakteri Asam Laktat dalam Menghambat Bakteri*. Airlangga. Jogjakarta.
- Anonim, 2011. “*Bakteri Asam Laktat*”.http://id.wikipedia.org/wiki/Bakteri_asam_laktat. Akses tanggal 3 Januari 2013.
- Asriani. 2006. *Kajian Efek Sinergi Antimikroba Metabolit Bakteri Asam Laktat dan Monoasilgliserol Minyak Kelapa terhadap Bakteri Patogen*. Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Buckle, K.A., R. A. Edwards, G. H. Fleet, M. Wootton. 1987. *Ilmu Pangan*, Diterjemahkan oleh H. Purnomo dan Adiono, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Budiansyah. A. 2004. *Pemanfaatan Probiotik dalam Meningkatkan Penampilan Produksi Ternak Unggas*. Intitut Pertanian Bogor. Bogor.
- Buchanan, R.E., Gibbons, N.E. 1974. “*Bergey’s Manual of Determinative Bacteriology 8th edition*”. The William & Wilkin Company/Baltimore. USA.
- Brown, A. 2001. *Microbiological Applications Lab Manual. 8th Ed.* The McGraw-Hill Companies. New York.
- Daulay, D. 1991. *Fermentasi Asam Laktat dan penggunaannya dalam Pengolahan makanan*. Bogor: IPB.
- Departemen Agama RI. 2002. *Al Qur’an dan Terjemahnya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- Djide, M.N. dan Wahyuddin, E. 2008. *Isolasi Bakteri Asam Laktat dan Air Susu Ibu dan Potensinya dalam Penurunan Kadar Kolestrol Secara In Vitro*. Majalah Farmasi dan Farmakologi. Vol 12 (3).
- Fardiaz, S. 1992. *Mikrobiologi Pangan I*. P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Fatmawati. 2013. *Toleransi isolat bakteri asam laktat (BAL) dari dangke terhadap pH rendah*. Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

- Frazier, WC dan Westhoff DF. 1998. *Food Microbiology*. Di dalam: Asriani. *Kajian Efek Sinergi Antimikroba Metabolit Bakteri Asam Laktat dan Monoasilgliserol Minyak Kelapa terhadap Bakteri Patogen*. Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, 2006.
- Hafsah. 2011. *Mikrobiologi Umum*. Makassar: Alauddin Press.
- Harimurti, S., Endang S.R., Nasroedin dan Kurniasih. 2007. *Bakteri Asam Laktat dari Intestin Ayam Sebagai Agensia Probiotik*. *Animal Production*. 9 (2): 82 – 91.
- Helferich, W and D. Westhoff. 1980. *All About Yoghurt, dalam Setyaningsih, I. 1992. Pengaruh Jenis Kultur L. Casei, Penambahan Susu Skim dan Glukosa terhadap Mutu Yakult Kedelai*. Skripsi. Fateta. IPB. Bogor.
- Holt. G., Kreig, N.R., Sneath, P.H.A., Stanley, J.T. & Williams, S.T. 2000. *Bergey's Manual Determinative Bacteriology*. Baltimore: Williamn and Wilkins Baltimore.
- Jawetz, Melnick, & Adelberg's. 2001. *Medical Microbiology*. Jakarta: Salemba Medica.
- Lay, B. W. 1994. *Analisis mikrobiologi di Laboratorium*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Madigan MT, Martinko JM, Stahl DA, and Clark D. 2011. *Biology of Microorganisms Thirteenth Edition*. Pearson Education International. USA.
- Malaka, R dan A. Laga. 2005. *Isolasi dan identifikasi Lactobacillus Bulgaricus strain Ropy dari yogurt komersial*. *J. Sains dan Teknotogi*.5(1). 51-58.
- Markham, *Mikrobiologi Dasar*. Jakarta: erlangga, 1993.
- Mutmainnah, Heni. 2013. *Isolasi Dan Karakterisasi Bakteri Probiotik Dari Saluran Pencernaan Ayam Kampung Gallus domesticus*. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin.
- Owehand, A. C. and vesterlund, S. *Antimicrobial component from lactic acid bacteria*. In salminem S. A. V. Wright and A. C. ouwehand (eds) *lactic Acid Bacteria, microbiology and fungsional aspect*. Third edition. Marcel dekker. Lnc. 2004. Newyork.


- Paramitasari, Dewi. 2013. *Isolasi dan Karakterisasi Bakteri Asam Laktat dari Dangke*. Jurusan Biologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Rahayu, E.S., F.D. Titiek, D. Mahyu, dan S. Edi. 1999. *Bakteri Asam Laktat pada Makanan Fermentasi Tradisional (abstrak)*. Di dalam: *Panduan Seminar Nasional Makanan Tradisional*. Yogyakarta 16 Maret 1999.
- Ray, B. 2004. *Fundamental Food Microbiology*. Di dalam: *Asriani. Kajian Efek Sinergi Antimikroba Metabolit Bakteri Asam Laktat dan Monoasilgliserol Minyak Kelapa terhadap Bakteri Patogen*. Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, 2006.
- Rostini, 2007. *Pengaruh Jenis Rennet dan Lama Pemeraman terhadap Kadar Air dan Kadar Protein Keju Susu Sapi*. Skripsi S1 Program Studi Produksi Ternak Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.
- Salle, A.J. 1979. *Fundamental Principles of bacteriology*. Tata McGraw-Hill Publishing Company Ltd, New Delhi.
- silalahi, Jansen. 2006. *Makanan fungsional*. Yogyakarta: Kanisius.
- Srigandono, Bambang. 1997. *Produksi unggas Air*. Yogyakarta: Universitas Gadjah mada Press.
- Soeharsono. 2010. *Probiotik. Basis Ilmiah, Aplikasi dan Aspek Praktis*. Bandung: Widya Padjajaran.
- Subandi. 2010. *Mikrobiologi Di Perguruan Tinggi Islam*. Bandung: Gunung Djati Press.
- Subronto. 2007. *Ilmu Penyakit Ternak II*. Yogyakarta: Universitas Gadjah mada Press.
- Supardi, Imam dan Sukamto. 1999. *Mikrobiologi Dalam Pengolahan dan Keamanan Pangan*. Bandung : Alumni.
- Suharno, Bambang, 2009. *Beternak Itik Secara Intensif*. Jakarta: penebar Swadaya.
- Sumarsih, Sri T. Yudiarti, C.S.Utamar, E. S. Rahayu, dan E. Harmayani. *Isolasi dan identifikasi bakteri asam laktat pada caecum ayam Pedaging*. Fakultas Peternakan Universitas Diponegoro

- Suryani, Yoni, Astuti, Bernadeta Oktavia, Siti Umniyati. *Isolasi Dan Karakterisasi Bakteri Asam Laktat Dari Limbah Kotoran Ayam Sebagai Agensi Probiotik Dan Enzim Kolesterol Reduktase*. Jurdik Biologi FMIPA UNY.
- Surono, I.S. 2004. *Probiotik Susu Fermentasi dan Kesehatan*. Tri Cipta Karya. Jakarta.
- Sri, AF Kusuma., 2009. “*Bakteri Asam Laktat*”. pustaka.unpad.ac.id/wp.../pustaka_unpad_bakteri_asam_laktat.doc. Diakses tanggal 3 Januari 2013.
- Syarfaini, SKM, M. Kes. 2012. *Dasar-dasar Ilmu Gizi*. Makassar: UIN Press.
- Syulasma, A., Hamdiyati, Y. Dan Kurnadi. 2005. *Petunjuk Praktikum Mikrobiologi*. Fakultas MIPA. Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung.
- Thahir, S. Ridwan, Joni Munarso, dan Sri Usmiati. 2005. *Review Hasil-Hasil Penelitian Keamanan Pangan Produk Peternakan*. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian Bogor.
- Thomas Indarto p. Suseno, sutarjo surjoseputro, dan anita k. *Minuman probiotik nira siwalan: Kajian lama penyimpanan terhadap daya anti mikroba Lactobacillus casei pada beberapa bakteri patogen*. Jurnal Teknologi Pangan dan Gizi Volume 1 Nomor 1, April 2000.
- Trisna dan Wahud N. 2012. *Identifikasi Molekuler dan Pengaruh Pemberian Probiotik Bakteri Asam Laktat (BAL) Asal Dadih dari Kabupaten Sijunjung Terhadap Kadar Kolestrol Daging pada Itik Pitalah Sumber Daya Genetic Sumatra Barat*. Artikel. Universitas Andalas. Padang.
- Polunin, Nicholas. 1994. *Pengantar Geografi Tumbuhan beberapa ilmu serumpun*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- Purwoko, Thahjadi. 2009. *Fisiologi Mikroba*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahju, Juju. *Ilmu Nutrisi unggas*. Yogyakarta: Gadjah Mda University Press.
- Waspodo, 1997. *Probiotik Bakteri Pencegah Kanker*. Yogyakarta: Intisari.

- Watkins, B. A. dan B. F. Miller. 1983. *Competitive got exclusion of avian pathogens by lactobacillus acidophilus in gnotobiotic chick*. Poultr Sci. 62(9): 2088-2094.
- Watson, A.K., H. Kaspar, M.J. Lategan & L. Gibson. 2008. *Probiotic in aquaculture: The need, principles and mechanisms of action and screening processes*. Aquaculture, 274: 1-14.
- Wibowo dan Ristanto, D. 1988. *Petunjuk Khusus Deteksi Mikroba Pangan*. Yogyakarta: Pusat Antar Universitas Pangan dan Gizi Universitas Gadjah Mada.
- Widiasih, Triani. 2008. *Aktivitas Substrat Antimikroba Bakteri Asam Laktat Yang Diisolasi Dari Daging Sapi Terhadap Bakteri Patogen Dan Konsentrasi Minimum Penghambatannya*. Skripsi. Bogor: Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor,
- Winarno. F. G. 2004. *Kimia pangan dan Gizi*. Jakarta: gamedia pustaka utama.
- Winarti, Sri. *Makanan Fungsional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yuliana, Neti. 2008. *Kinetika Pertumbuhan Bakteri Asam Laktat Isolat T5 Yang Berasal Dari Tempoyak*. Jurusan Teknologi Industri Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung.

LAMPIRAN-LAMPIRANLampiran I: Alur Penelitian**3. Pengambilan usus Itik**

4. Isolasi Bakteri Asam Laktat



5. Pewarnaan Gram




- Memfiksasi isolat
- Tambahkan Gram A (Kristal violet) 2-3 tetes
- Selama 1 menit
- Cuci dengan air mengalir lalu keringkan



- Tetesi isolat dengan Gram B (Iodium)
- Selama 1 menit
- Cuci dengan air mengalir lalu keringkan



- Tambahkan Gram C (alkohol 96%)
- Selama 30 detik
- Cuci air dengan air mengalir lalu keringkan




- Tambahkan Gram D (safranin)
- Selama 45 detik
- Cuci dengan air mengalir lalu keringkan


Hasil pencecatan
Gram dilihat dengan
Mikroskop

6. Pengujian Aktivitas Biokimia


a) Uji KIA




b) Uji Motility




c) Uji Indol




d) Uji Methyl Red




e) Uji Voges Proskauer




f) Uji Citrat




g) Uji Urea



h) Uji karbohidrat



i) Uji Lysin



j) Uji Katalase



lampiran II: Komposisi Media

NaCl Fisiologis

1. Komposisi

- a. NaCl 0,9 % : 4,5 gr
- b. Aquades : 450 ml

2. Cara Pembuatan

- a. NaCl 0,9 % dimasukkan dalam gelas kimia sebanyak 4,5 gr kemudian diencerkan dengan aquadest 450 ml kemudian dilarutkan
- b. Setelah itu dimasukkan 90 ml ke dalam 50 botol kemudian diinkubasi selama 15 menit pada suhu 121°C.

MRSB (de man Rogosa Sharpe Broth)

1. Komposisi:

- a. MRSB : 13 gr
- b. Aquadest : 250 ml

2. Cara Pembuatan

Campurkan MRSB padat 13 gr dengan aquadest 250 ml di dalam labu Erlenmeyer dan panaskan sampai mendidih sampai terlarut sepenuhnya. Masukkan ke dalam autoklaf selama 15 menit pada suhu 121°C. setelah diinkubasi, MRSB dimasukkan ke dalam botol sebanyak 5 botol masing-masing sejumlah 45 ml per botolnya.

MRSA (de Man Rogosa Sharpe Agar)

1. Komposisi

- a. MRSB : 10,4 gr
- b. Agar : 2,4 gr
- c. BCP (bromcresol purple) 0,1 % : 6 ml
- d. Aquadest : 200 ml

2. Cara Pembuatan

- a. Semua bahan ditimbang dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer
- b. Ditambahkan 200 ml aquadest
- c. Dipanaskan di atas hot plate hingga mendidih sambil diaduk dengan menggunakan magnetic stirrer sampai homogeny. Lalu dibiarkan beberapa saat.
- d. Dimasukkan dalam autoklaf untuk disterilkan beserta alat-alat yang akan digunakan dalam waktu 2 jam pada suhu 121°C dengan tekanan psi.
- e. Setelah dikeluarkan dari autoklaf didinginkan kemudian dituangkan ke dalam 10 plate. Didiamkan sampai memadat.

Lampiran III: Dokumentasi Penelitian

a. Pembuatan Medium



b. Penyembelihan Itik dan Pengambilan usus Itik



c. Pemeriksaan Gram



Lampiran IV: Hasil Penelitian

Uji Biokimia

No.	Gambar	keterangan
1.		Sebelum diinkubasi selama 1x 24 jam
2.		Sesudah diinkubasi selama 1x 24 jam

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Harlina selaku penulis lahir di Selayar, pada tanggal 04 April 1992.

.Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Ayahanda Massairang dan Ibunda Andi Narru. Jalur pendidikan formal yang pernah ditempuh penulis adalah sebagai

berikut:

1. Sekolah Dasar Negeri Bontolipang, tahun 1998-2004.
2. Sekolah Menengah Pertama, tahun 2004-2007.
3. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Taka Bonerate, tahun 2007-2010.
4. Pada Tahun 2010, penulis diterima di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Program Strata Satu (S1) dan tercatat sebagai mahasiswa Jurusan Biologi, Fakultas Fakultas Sains dan Teknologi, melalui jalur SNMPTN.

Selama menempuh pendidikan di jenjang S1, penulis cukup aktif dalam bidang akademik maupun organisasi. Penulis pernah menjadi asisten Biologi dasar, struktur hewan, dan fisiologi hewan. Pada bidang organisasi, penulis pernah menjadi koordinator Aklak dan moral dalam organisasi HMJ Biologi, bendahara umum di organisasi IKASMANTAB periode 2012-2013, bendahara umum di organisasi GEMPITA periode 2013-2014. Penulis juga aktif mengikuti kegiatan seminar-seminar baik ditingkat jurusan, regional, dan Universitas.