

**ANALISIS KEPADATAN JENTIK NYAMUK *Aedes aegypti* Linnaeus DI DUSUN CORING DAN KANAREA  
KECAMATAN BAJENG KABUPATEN GOWA**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains  
Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar

Oleh :  
**MARLINA**  
NIM : 60300106024

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN  
MAKASSAR  
2010**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karena batal demi hukum

Makassar, Agustus 2010  
Penulis

**(Marlina)**  
Nim : 60300106024

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “**Analisis Kepadatan Jentik Nyamuk *Aedes aegypti* di dusun Coring dan Kanarea Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa**” yang disusun oleh Marlina, Nim 60300106024, mahasiswa jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah di uji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari rabu, 4 Agustus 2010 M bertepatan dengan 23 Sya’ban 1431 H dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains (S.Si) dalam ilmu Sains dan Tekhnologi, Jurusan Biologi (dengan beberapa perbaikan).\*

Makassar, 4 Agustus 2010 M  
23 Sya’ban 1431 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. H. Bahaking. Rama, M.S	(.....)
Sekretaris	: Fatmawati Nur, S.Si.,M.Si	(.....)
Munaqisy I	: Dra.Hj.Asmawati Aziz, M.Si	(.....)
Munaqisy II	: Hj. Rachmawati, S.Si.,M.Si	(.....)
Munaqisy III	: Drs. M. Arif Alim, M, Ag	(.....)
Pembimbing I	: Syahribulan, S.Si.,M.Si	(.....)
Pembimbing II	: Sitti Saenab, S.Pd.,M.Pd	(.....)

Diketahui oleh :

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar

**Prof. Dr. H. Bahaking Rama, M.S**

NIP. 19520709 198103 1.001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis lantunkan ke hadirat Allah *Rabbul Izzati* atas segala limpahan ni'mat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Salam dan shalawat tetap tercurah kepada Rasulullah SAW. Karena berkat perjuangannya sehingga islam masih eksis sampai sekarang ini.

Tekhusus kepada Ayahanda Rahim dan Ibunda Inra tercinta atas segala do'a dan kasih sayangnya yang tak lekang dimakan oleh waktu, atas segala jerih payah dan keletihannya, mengasuh, merawat, mendoakan dan membesarkan penulis sejak dalam kandungan sampai sekarang. Saudara dan saudari penulis atas semua bantuan materi maupun moril dan nasehatnya selama penulis dalam masa pendidikan.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengalami berbagai rintangan dan tantangan karena keterbatasan penulis baik dari segi kemampuan ilmiah, waktu, biaya dan tenaga. Akan tetapi dengan komitmen yang kuat serta adanya bantuan dan saran dari berbagai pihak, semua rintangan dan tantangan dapat diminimalkan. Oleh karena itu kepada semua pihak yang telah berpartisipasi secara aktif dalam penyelesaian skripsi ini, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Azhar Arsyad., selaku Rektor beserta Pembantu Rektor I,II,III UIN Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. Bahaking Rama., selaku Dekan beserta Pembantu Dekan I, II, III Fakultas Sains dan Teknologi.

3. Ibu Fatmawati Nur, S.Si., M.Si dan Masriany, S.Si selaku ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
4. Ibu Syahribulan, S.Si., M.Si. dan Ibu Sitti Saenab, S.Pd. M.Pd, selaku pembimbing I dan II yang telah bersedia meluangkan waktunya, memberikan sumbangan pemikiran, nasehat, dan bimbingan sejak awal sampai rampungnya skripsi ini.
5. Para dosen di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi yang telah memberikan dorongan dan arahan selama penulis belajar sampai menyelesaikan studi
6. Kepala pegawai perpustakaan UIN Alauddin Makassar atas bantuan dan pelayanannya selama penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Camat Bajeng dan jajarannya atas segala bantuan dan pelayanannya selama penelitian
8. Rekan-rekan seperjuangan: Fitri, Nurwahidah, Rezeki dan semua teman-teman Biologi angkatan 2006, Nisma, Irna, Karneli, Mala, Ezy, Nida, Isna, Novie, Ekha, Fera, Ria, Inna, Mila, Natri, Fingki, Buyung, Chiko, Nona, Budi, Anto, Dul, Rain, Arfan, Jihad, Agil, Nai, Arif dan Arfan
9. Terkhusus kepada saudara A. Baso Sidiq atas motivasi dan bantuannya baik materi, waktu maupun tenaga, pikiran selama penulis dalam masa pendidikan.
10. Kepada Ka'Icha, Ade Andha, Ade Army atas setiap persaudaraan, bantuan motivasi do'a dan pengertiannya selama ini.

Kepada semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini. Dengan segala keterbatasan. Penulis hanya bias berdo'a kepada Allah agar rahmat dan hidayah-nya Senantiasa terlimpah atas mereka.

Akhirnya hanya kepada Allah jualah penulis serahkan segalanya, semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis baik berupa moril maupun materi mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amien

*Billahi taufiq wal hidayah*

*Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.*

Makassar, 4 Agustus 2010

Penulis

**Marlina**  
**NIM. 60 300 106 024**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tinjauan Umum Demam Berdarah Dengue (DBD).....	6
B. Vektor DBD.....	8
C. Tinjauan Tentang Nyamuk <i>Ae. Aegypti</i> Linnaeus.....	12
D. Ekologi vector.....	18
1. Tempat Perindukan.....	18
2. Kesenangan Menggigit ( <i>feeding habit</i> ).....	22
3. Tempat hinggap/istirahat ( <i>resting place</i> ).....	22

4. Jarak Terbang.....	23
5. Tempat Bertelur.....	24
E. Ukuran Kepadatan Populasi Nyamuk.....	30
F. Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Keberadaan Jentik	34
<b>BAB III. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>40</b>
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Populasi dan Sampel.....	40
C. Defenisi Operasional.....	41
D. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian.....	41
E. Alat dan Bahan.....	42
F. Cara Kerja.....	42
G. Analisis Data.....	43
<b>BAB IV. HASIL dan PEMBAHASAN.....</b>	<b>47</b>
A. Hasil penelitian.....	48
B. Pembahasan.....	51
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>59-60</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>61-63</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



## ABSTRAK

**Nama** : Marlina  
**Nim** : 60300106024  
**Judul skripsi** : Analisis Kepadatan Jentik Nyamuk *Aedes aegypti* di dusun Coring dan Kanarea Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa

---

Telah dilakukan penelitian tentang “Analisis Kepadatan Jentik Nyamuk *Aedes aegypti* di dusun Coring dan Kanarea Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa pada bulan Januari - Maret 2010” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepadatan jentik *Aedes aegypti* di dusun Coring dan Kanarea Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Sampling jentik dilakukan secara acak terhadap 70 KK (35KK/Dusun) dengan memilih rumah yang telah ditentukan jaraknya. Pengambilan jentik dilakukan pada TPA di dalam dan di luar rumah. Hasil menunjukkan bahwa tingkat kepadatan jentik di dusun Coring pada bulan Januari-Maret 2010 mengalami penurunan sebagai berikut di dusun Coring pada bulan Januari musim hujan sehingga HI (42,9%) dan CI (16,7%), begitu pula pada bulan Februari musim hujan sehingga HI (34,28%) dan CI (13,76) menurun, sedangkan Pada bulan Maret dengan HI (22,83%) dan CI (9,42%). Sedangkan pada dusun Kanarea pada bulan Januari HI (31,4%) dan CI (14,3%), Februari HI (25,71%) dan CI (11,9%), Maret HI (14,28%) dan CI (7,93). Penurunan kepadatan jentik dipengaruhi oleh faktor lingkungan (suhu dan kelembaban) serta faktor pelaksanaan PSN. Hasil analisis korelasi menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara keberadaan jentik dengan pelaksanaan PSN dan tingkat pengetahuan masyarakat.

Kata kunci : Kepadatan, Jentik, *Aedes*

## ABSTRACT

**Name** : Marlina  
**Nim** : 60300106024  
**Title Skripsi** : **Analysis of Density of *Aedes aegypti* Linnaeus Larva at Coring and Kanarea Village Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa**

---

A Study on “Analysis of Density of *Aedes aegypti* Linnaeus Larva at Coring and Kanarea Village Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. The research is took place at Coring and Kanarea Village Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa in January to March 2010 and is aimed to know the density level of *Ae. aegypti* larva in Coring and Kanarea Village. Sampling is done by using simple randomize method to 70 households (35 households/village). Larva of *Ae. Aegypti* in various container in each house is taken by single larva method and questionnaire is given to the community to take additional data. The result showed that the high of density level of larva found in the month of January are as follow : Coring with 42,9% of HI and 16,7% of CI. In February, HI found as much as 34,28% and CI as much as 13,76%, in March, HI found as much as 22,83% and CI as much as 9,42%. At Kanarea found that in the month of January, HI as much as 31,4% and CI as much as 14,3%, in February HI found as much as 25,71% and CI as much as 11,9%, in March, HI found as much as 14,28% and CI as much as 7,93. The decrease of density level of larval during the research is affected by some factors as follow : the environmental condition such as temperature and humidity and also eradication of breeding site. The result of correlation test showed that there are strong correlation between the existence of mosquito larva within eradication of breeding site program and also with the knowledge of the community.

Key word : Density, Mosquito Larva, *Aedes*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### ***A. Latar Belakang***

Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit tropis yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan oleh nyamuk *Aedes aegypti* Linnaeus dan *Ae. albopictus*. Ada empat serotipe virus dengue yang dikenali yaitu, DEN-1, DEN-2, DEN-3, dan DEN-4. Salah satu serotipe virus tersebut biasanya kebal terhadap serotipe yang sama dalam jangka waktu tertentu namun tidak kebal terhadap serotipe lainnya bahkan menjadi sensitif terhadap serangan demam berdarah dengue.<sup>1</sup>

Virus dengue ditularkan dari orang sakit ke orang sehat melalui gigitan nyamuk *Aedes* subgenus *Stegomyia*. Di Indonesia ada 3 jenis nyamuk *Aedes* yang bisa menularkan virus dengue yaitu, *Ae. aegypti*, *Ae. albopictus*, *Ae. scutellaris*. Akan tetapi dari ketiga jenis nyamuk tersebut *Ae. aegypti* lebih berperan dalam penularan penyakit DBD. Nyamuk ini banyak di temukan di dalam rumah atau bangunan dan tempat perkembangbiakannya yang juga lebih banyak terdapat dalam rumah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Supartha *Pengendalian Terpadu Vektor Virus Demam Berdarah Dengue Aedes Aegypti(Linn)Dan Aedeaa Albopictus*.2004. h.10

Berdasarkan data Departemen Kesehatan 2002 jumlah penderita demam berdarah di Indonesia pada tahun 2005 sebanyak 95.279 pasien, dengan jumlah pasien meninggal 1.298 orang. Sedangkan tahun 2006 jumlah pasien bertambah menjadi 111.730 orang, dengan 1.152 orang meninggal. Sepanjang Januari 2007, jumlah pasien sebanyak 8.019 orang, 144 orang meninggal. Dan jumlah kasus DBD tahun 2008 sebanyak 126.600 kasus dengan 1.084 kematian. Sedangkan jumlah kasus DBD selama tahun 2009 sebanyak 137.600 kasus dengan 1.170 kematian.<sup>3</sup>

Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang dinyatakan rawan DBD. Ada tiga daerah di Sulawesi Selatan dinyatakan rawan DBD yaitu kota Makassar, Wajo, dan Gowa di Kabupaten Gowa yang termasuk wilayah endemis DBD yaitu Somba Opu, Pallangga, Bajeng Barat, Bontomarannu, Bontonompo, Bontonompo Selatan, dan Barombong. Penetapan ini didasarkan kondisi lingkungan daerah yang dinilai berpotensi sebagai tempat berkembangbiaknya nyamuk *Ae. Aegypti* Linnaeus.<sup>4</sup>

Data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa (2008) melaporkan bahwa di Kabupaten Gowa pada tahun 2005 sebanyak 174 kasus, dengan jumlah *Insidence Rate (IR)* 32, tahun 2006 sebanyak 91 jumlah kasus

---

<sup>2</sup>Departemen Kesehatan, *Pedoman Survei Entomologi Demam Berdarah Dengue(DBD)* (Cet. II; Jakarta: Bakti Husada, 2002), h. 4

<sup>3</sup>*Ibid.*

<sup>4</sup>Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, *Laporan Bulanan Bidang Kesehatan Kabupaten Gowa* (Makassar: Dinas Kesehatan, 2008), h. 30.

dengan *IR* 16, pada tahun 2007 jumlah kasus 134 dengan jumlah *IR* 23, tahun 2008 jumlah kasus 217 dengan *IR* 37 DBD di Kab.Gowa 2.469 Jiwa. Salah satu kecamatan di Kabupaten Gowa yang merupakan daerah endemis yaitu Kecamatan Bajeng, dengan jumlah kasus tinggi yang berada di lingkungan Coring sebanyak 5 kasus dan Kanarea sebanyak 2 kasus. Dikatakan daerah endemis (daerah rawan I) apabila ada kasus DBD selama 3 tahun berturut-turut.<sup>5</sup>

Survei yang telah dilakukan di Kecamatan Bajeng pada dua kelurahan yaitu Coring dan Kanarea ditemukan jentik *Ae. aegypti* dan *Ae. albopictus* yang berada di dalam maupun di luar rumah-rumah penduduk pada tempat penampungan air (TPA) seperti, drum, bak penampungan, ember, baskom, tempayan, jerigen, dan bak mandi tempat penampungan air bukan untuk keperluan sehari-hari (non TPA) seperti tempat minum burung, vas bunga, dan barang-barang bekas (ban, kaleng, botol plastik dan lain - lain).

Keberadaan jentik *Ae. aegypti* di suatu wilayah merupakan indikator terdapatnya populasi nyamuk *Ae. aegypti* di daerah tersebut. Penanggulangan penyakit DBD mengalami masalah yang cukup kompleks karena penyakit ini belum ditemukan obatnya. Tetapi cara paling baik untuk mencegah penyakit ini

---

<sup>5</sup>*Ibid.*

adalah dengan pemberantasan jentik nyamuk penularnya atau dikenal dengan istilah Pemberantasan Sarang Nyamuk Demam Berdarah Dengue (PSN - DBD).<sup>6</sup>

Kepadatan jentik di suatu wilayah diketahui dengan indikator angka bebas jentik (ABJ). ABJ merupakan persentase rumah atau tempat-tempat umum yang tidak ditemukan jentik. ABJ yang rendah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Perilaku masyarakat dalam hal menampung air untuk keperluan sehari-hari tidak hanya pada satu tempat dan jarang membersihkan bak penampungan air, hal ini memberikan peluang lebih banyak bagi nyamuk *Ae. aegypti* untuk bertelur. Menurut Dumai *et.al*, (2007) faktor pengetahuan, kebiasaan menggantung pakaian, kondisi tempat penampungan air (TPA) dan kebersihan lingkungan berhubungan dengan kejadian DBD, sedangkan TPA rumah tangga yang paling banyak ditemukan jentik atau pupa *Aedes aegypti* adalah TPA rumah tangga yang berasal dari bahan dasar semen dan plastik. Jenis TPA rumah tangga yang paling banyak ditemukan jentik atau pupa *Ae. aegypti* adalah TPA jenis tempayan. Jenis TPA yang ditemukan positif jentik *Ae. aegypti* yang berada di dalam atau di luar rumah ada 3 yaitu drum, bak mandi, dan ember plastik.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Departemen Kesehatan Republik Indonesia “*Modul latihan Kader Dalam Pemberantasan Sarang Nyamuk Demam Berdarah Dengue*”. Jakarta, 1996. h. 8.

<sup>7</sup>Hasyimi. *Pengamatan Tempat Perindukan Aedes aegypti Pada tempat Penampungan Air Rumah Tangga Pada Masyarakat Pengguna Air Olahan*. *Ekologi Kesehatan*. Vol.3.1. April 2007. h. 42.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian penelitian mengenai kepadatan jentik nyamuk *Ae.aegypti* di daerah endemis Kec Bajeng Kabupaten Gowa.

### ***B. Rumusan Masalah***

Bagaimana tingkat kepadatan jentik nyamuk *Ae.aegypti* di dusun Coring dan Kanarea Kecamatan Bajeng?

### ***C. Tujuan Penelitian***

Untuk mengetahui tingkat kepadatan jentik nyamuk *Ae. Aegypti* di daerah endemis Coring dan Kanarea. Kecamatan Bajeng.

### ***D. Manfaat Penelitian.***

1. Penelitian ini dapat memberi informasi kepada masyarakat/Dinas yang terkait dalam penanggulangan dan pencegahan penyakit DBD yang ditularkan oleh nyamuk *Ae. aegypti* yang merupakan vektor utama virus *dengue*.
2. Manfaat bagi peneliti yaitu mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana menentukan kepadatan jentik nyamuk *Ae. aegypti* sebagai vektor Demam Berdarah *Dengue* (DBD) pada suatu daerah.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. *Tinjauan Umum Demam Berdarah Dengue (DBD)*

Salah satu perintah dalam Al-Qur'an adalah perintah untuk berpikir dan merenungkan segala ciptaan yang ada di alam ini. Manusia diperintahkan untuk merenungkan dirinya sendiri sebagai ciptaan Allah SWT, selain itu Al-Qur'an juga mengajak manusia untuk menginvestigasi alam dan melihat bukti serta tanda kekuasaan-Nya. Seluruh alam semesta beserta semua elemen baik yang hidup maupun yang mati terdiri dari tanda-tanda yang mengungkapkan bahwa mereka semua itu 'diciptakan'. Dan semuanya itu ada untuk menunjukkan kekuatan, ilmu dan seni dari 'Penciptanya'. Semua makhluk hidup memiliki tanda-tanda ini, termasuk nyamuk yang disebutkan dalam Q.S Al-Baqarah/2: 26 :

\* إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ۗ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿٢٦﴾

Terjemahnya :

Sesungguhnya, Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka



yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka, tetapi mereka yang kafir mengatakan, "Apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan?" Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu (pula) banyak orang yang diberi-Nya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik.<sup>8</sup>

Adapun Demam Berdarah Dengue (DBD) atau *dengue haemorrhagic fever* (DHF) adalah penyakit yang ditularkan oleh nyamuk jenis *Ae.aegypti* yang menyerang anak-anak berumur di bawah 15 tahun dan orang dewasa. Penyakit ini lebih banyak ditemukan di daerah perkotaan dari pada pedesaan terutama di daerah yang padat penduduknya. Penyakit ini sangat berbahaya, terutama jika tidak mendapat pertolongan dengan cepat, sebab dapat menimbulkan kematian. Gejala utama DBD yaitu nyeri otot dan sendi yang biasanya memburuk setelah dua hari pertama.

Penyakit DBD sampai saat ini masih merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang utama di Indonesia. Penyakit ini belum ditemukan vaksinnnya, sehingga tindakan yang paling efektif untuk mencegah perkembangbiakan nyamuk ini adalah dengan meningkatkan kebersihan lingkungan dengan cara 3M, yaitu menguras tempat penampungan air dengan menyikat bagian dalam dan harus dikuras paling sedikit seminggu sekali, menutup

---

<sup>8</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Pentahsis dan Penerjemah Al-Qur'an, 1990), h. 12-13.

rapat-rapat tempat penampungan air dan menimbun dalam tanah barang-barang bekas atau sampah yang dapat menampung air hujan.<sup>9</sup>

Populasi nyamuk *Ae. Aegypti* biasanya meningkat pada waktu musim hujan, karena sarang-sarang (*breeding place*) nyamuk akan terisi oleh air hujan. Peningkatan populasi nyamuk ini berarti meningkatnya kemungkinan penyakit DBD di daerah endemis.<sup>10</sup>

Beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan dan penyebaran kasus DBD antara lain : pertumbuhan penduduk yang tinggi, urbanisasi yang tidak terencana dan terkontrol, tidak adanya kontrol vektor nyamuk yang efektif di daerah endemis dan peningkatan sarana transportasi.<sup>11</sup>

## **B. Vektor DBD**

Vektor utama virus dengue di Indonesia adalah nyamuk *Ae. aegypti*, di samping itu juga dilaporkan, *Ae. albopictus*, *Ae. polynesiensis*, *Ae. scutellaris*, sebagai vektor. Vektor ini berkembangbiak di bejana-bejana yang berisi air seperti bak mandi, drum penampung air, kaleng bekas dan lain-lain. Keberadaan vektor berhubungan dengan beberapa faktor, antara lain kebiasaan masyarakat

---

<sup>9</sup>Siti Marlina, *Perilaku Keluarga Terhadap Usaha Pencegahan Penyakit DBD di Lingkungan Rumah*, <http://Blog WordPress.com>, 2008 (8 Februari 2010).

<sup>10</sup>Christphers , *Aedes aegypti* Linnaeus The Yellow Fever Mosquito Its Life History, Bionomic and Structure. (1960)

<sup>11</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa. *Gowa dalam Angka* 2008. h, 42

menampung air bersih untuk keperluan sehari-hari, sanitasi lingkungan yang kurang baik, dan kurang tersedianya air bersih.<sup>12</sup>

Salah satu contoh penyebaran penyakit demam berdarah dipengaruhi perubahan iklim, karena perubahan iklim akan menyebabkan terjadinya modifikasi dalam habitat nyamuk *Ae. aegypti*. Perubahan iklim menyebabkan peningkatan suhu udara dan curah hujan pada suatu daerah. Dengan tidak adanya sistem drainase yang baik maka akan terbentuk genangan-genangan air yang sangat cocok untuk tempat perindukan nyamuk - nyamuk tersebut.<sup>13</sup>

Syarat-syarat nyamuk menjadi vektor tertentu antara lain, umur nyamuk, kepadatan, ada kontak dengan manusia, rentan/tahan terhadap parasit dan ada sumber penularan.

#### a. Umur nyamuk

Untuk menjadi vektor suatu penyakit, umur nyamuk cukup lama sehingga parasit bisa menyelesaikan siklus hidupnya di dalam tubuh nyamuk. Perkiraan lamanya pertumbuhan parasit di dalam tubuh nyamuk untuk virus dengue pada *Ae. Aegypti* selama 8 sampai 10 hari.

#### b. Kepadatan nyamuk

Kepadatan nyamuk umumnya dipengaruhi oleh faktor topografi daerah termasuk kesuburan daerah yang berarti ada orang dan ternak sebagai sumber

---

<sup>12</sup>Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, *op.cit. Gowa*. h.13

<sup>13</sup> *Ibid.* 11

makanan nyamuk, rumah dengan halaman dan kebun untuk tempat hinggap dan istirahat nyamuk dan ada sumber air sebagai tempat perkembangbiakan nyamuk dan sumber air beserta genangan – genangan airnya sebagai tempat perkembangbiakan nyamuk. Selain itu dipengaruhi oleh kegiatan manusia yang secara tidak langsung menyebabkan terciptanya tempat-tempat perkembangbiakan nyamuk seperti, pembuatan saluran-saluran irigasi, dan pembuatan tambak.

c. Kontak antara manusia dengan nyamuk

Kontak manusia dengan nyamuk hanya terjadi pada waktu singkat karena dimanfaatkan oleh beberapa parasit patogen demi kelangsungan hidupnya.<sup>14</sup>

d. Kerentanan nyamuk terhadap parasit

Kerentanan nyamuk terhadap parasit juga menentukan apakah suatu nyamuk bias menjadi vektor atau tidak. Ada dua hal yang perlu diperhatikan pada kerentanan nyamuk untuk menjadi vektor suatu penyakit:

1. Bila jumlah parasit yang dihisap oleh nyamuk terlalu sedikit, maka parasit itu tidak bisa berkembang dalam tubuh nyamuk.
2. Kerentanan nyamuk terhadap parasit ada kekhususan tersendiri (*host spesifik*).

Misal ditularkan oleh nyamuk *Aedes*.

---

<sup>14</sup>Departemen Kesehatan, *Pencegahan dan Pemberantasan Demam Berdarah Dengue (DBD) di Indonesia*, Jakarta 2005, h.20.

#### e. Sumber Penularan

Adanya orang sakit dengan penularan pertumbuhan parasit dengan stadium tertentu dalam darahnya sebagai sumber penularan ikut pula menentukan terjadinya vektor

Pengendalian vektor yang dianggap murah, aman, mudah serta mempunyai nilai keberhasilan yang tinggi bila dilakukan secara serentak dan berkesinambungan adalah PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk). Namun demikian pelaksanaan PSN masih mengalami hambatan karena tidak semua masyarakat mau melaksanakan PSN. Hal ini terjadi karena pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap penyakit DBD masih kurang.<sup>15</sup>

PSN adalah salah satu cara pengendalian vektor dilakukan dengan membasmi jentik nyamuk *Ae. aegypti* melalui peran aktif masyarakat melaksanakan 3M yaitu menguras tempat penampungan air sedikitnya satu minggu sekali, menutup rapat tempat penampungan air dan mengubur barang-barang bekas yang dapat menjadi tempat perkembangbiakan jentik nyamuk


*Ae. aegypti*. Adapun teknik terpadu dalam pengendalian populasi nyamuk dan jentik yang melibatkan semua metode yang dianggap tepat. Metode tersebut yaitu

---

<sup>15</sup>WHO . *Panduan Lengkap Pencegahan dan Pengendalian Dengue dan Demam Berdarah Dengue*. Jakarta.2008

metode lingkungan/fisik, biologis, maupun kimiawi yang aman, hemat biaya serta ramah lingkungan.<sup>16</sup>

Bagan 1  
Cara Pemberantasan Nyamuk



Keterangan:

- 1) Kimia : Menggunakan insektisida pembasmi larvasida dikenal dengan istilah Abatisasi
- 2) Fisik : dengan 3M, yaitu : Menguras, Menutup, dan Mengubur.
- 3) Biologi : Memelihara ikan pemakan jentik

Untuk memahami kejadian penyakit yang ditularkan vektor dan untuk pemberantasan penyakit sebagai ekosistem alam yang terkait dalam ekosistem ini adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan fisik, lingkungan fisik yang terkait adalah
  - a. Macam tempat penampungan air (TPA) sebagai tempat perindukan nyamuk *Ae. Aegypti*. Macam tempat penampungan air ini dibedakan berdasarkan bahan TPA ( logam, plastik, porselen, fiberglass, semen,

<sup>16</sup> Departemen Kesehatan Republik Indonesia. *Petunjuk Teknis Pengamatan Penyakit Demam Berdarah Dengue*. Jakarta 1992. h. 12

tembikar, dll), warna TPA ( putih, coklat, hijau, dll), volume TPA ( kurang dari 50 lt, 51-100 lt), letak TPA ( di dalam atau luar rumah), penutup TPA ( ada atau tidak ada), pencahayaan pada TPA (terang atau gelap) dan sebagainya.

- b. Ketinggian tempat, di daerah pantai kelembaban udara mempengaruhi umur nyamuk sedangkan di dataran tinggi suhu udara mempengaruhi pertumbuhan virus di dalam tubuh nyamuk. Di tempat dengan ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut tidak ditemukan nyamuk *Ae. Aegypti*.
- c. Curah hujan, menambah genangan air sebagai tempat perindukan, menambah kelembaban udara terutama untuk daerah pantai, Kelembaban udara menambah jarak terbang nyamuk dan umur nyamuk di daerah pantai.
- d. Kecepatan angin, mempengaruhi suhu udara dan pelaksanaan pemberantasan vektor dengan cara fogging.
- e. Suhu udara, mempengaruhi perkembangan virus di dalam tubuh nyamuk.
- f. Tata guna tanah, menentukan jarak dari rumah ke rumah.
- g. Pestisida yang digunakan mempengaruhi kerentanan nyamuk
- h. Kelembaban udara mempengaruhi umur nyamuk.

Pada dasarnya hujan akan mempengaruhi kelembaban nisbi udara dan menambah jumlah tempat perkembangbiakan (*Breeding place*). Curah hujan

yang lebat menyebabkan bersihnya tempat perkembangbiakan vektor oleh karena jentiknya hanyut dan mati. Kejadian penyakit yang ditularkan oleh nyamuk biasanya meninggi beberapa waktu sebelum musim hujan lebat atau setelah hujan lebat. Pengaruh hujan berbeda-beda menurut banyaknya hujan dan keadaan fisik daerah. Terlalu banyak hujan akan menyebabkan banjir dan terlalu kurang hujan akan menyebabkan kekeringan, mengakibatkan berpindahnya tempat perkembangbiakan nyamuk secara berturut-turut. Dengan demikian perkembangbiakan vektor akan berkurang, tetapi keadaan ini akan segera pulih cukup bila keadaan kembali normal. Curah hujan yang cukup tetapi dengan jangka waktu lama akan memberi peluang nyamuk untuk berkembangbiak secara optimal.<sup>17</sup>

## 2. Lingkungan biologik

Lingkungan biologik yang mempengaruhi penularan penyakit DBD terutama adalah banyaknya tanaman hias dan tanaman pekarangan yang mempengaruhi kelembabandan pencahayaan di dalam rumah dan halamannya. Bila banyak tanaman hias dan tanaman pekarangan, berarti akan menambah tempat yang disenangi nyamuk untuk hinggap istirahat dan juga menambah umur nyamuk. Pada tempat – tempat yang demikian di daerah pantai akan memperpanjang umur nyamuk dan penularan mungkin terjadi sepanjang tahun tersebut.

---

<sup>17</sup> *Ibid* 14



Nyamuk akan menjadi vektor apabila :

- a. Ada virus Dengue pada orang yang di hisap darahnya, yaitu orang sakit DBD, 1-2 hari sebelum demam atau 4-7 hari selama demam.
- b. Nyamuk hanya akan bisa menularkan penyakit apabila umurnya lebih dari 10 hari
- c. Untuk dapat menularkan penyakit dari orang ke orang nyamuk harus menggigit orang/manusia, dengan demikian nyamuk dimusuhi oleh manusia
- d. Untuk bisa bertahan hidup maka jumlah nyamuk harus banyak karena musuhnya banyak, dimusuhi manusia dan sebagai makanan hewan lain.
- e. Nyamuk juga harus tahan terhadap virus, karena virus akan memperbanyak diri di dalam tubuh nyamuk dan bergerak dari lambung, menembus dinding klambung dan kelenjar ludah.

### **C. Tinjauan Tentang Nyamuk *Ae. Aegypti* Linnaeus**

*Ae. Aegypti* Linnaeus ditemukan pertama kali oleh Linnaeus di Mesir pada tahun 1762. Nyamuk ini bersifat kosmopolitan yang tersebar di daerah beriklim tropis dan subtropis. Nyamuk ditemukan di daerah sampai ketinggian 1000 m dari permukaan laut. Dan diketahui tersebar merata di seluruh Indonesia pada tahun 1954.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup>Anonim, *Nyamuk Demam Berdarah Tidak Buta Warna*, 2008.<http://strenkali.org> (5 Februari, 2010).

*Ae. aegypti* Linnaeus merupakan jenis nyamuk yang dapat membawa virus dengue penyebab DBD. Selain virus dengue *Ae. aegypti* Linnaeus juga dapat membawa virus demam kuning (yellow fever). Persebaran nyamuk jenis ini sangat luas meliputi hampir semua daerah tropis di seluruh dunia, sebagai pembawa virus dengue *Ae. aegypti* Linnaeus merupakan vektor utama (primary vector) dan bersama nyamuk *Ae. albopictus* Skuse menciptakan siklus persebaran dengue di desa dan di kota.<sup>19</sup>

*Ae. aegypti* Linnaeus termasuk serangga yang mengalami metamorfosa sempurna, yaitu mulai dari tahap telur, larva, pupa sampai dewasa. *Ae. Aegypti* meletakkan telurnya pada air yang tenang dan lebih menyukai air yang bersih. Sekali bertelur nyamuk betina dapat mengeluarkan 100-200 butir telur yang akan mengapung di atas permukaan air. Pada suhu 30°C, telur akan menetas setelah 1-3 hari dan pada suhu 16°C akan menetas, akan berubah menjadi larva yang dapat dilihat jelas dengan mata karena menggantung di permukaan air. Setelah 9-10 hari pada fase larva, selanjutnya akan memasuki fase pupa selama 2-3 hari. Baru setelah itu menjadi nyamuk dewasa. Nyamuk betina usianya lebih panjang dibandingkan nyamuk jantan. Nyamuk betina bisa mencapai usia 1 bulan, sedangkan yang jantan hanya berusia satu minggu. Serangga ini aktif pada siang hari karena dipengaruhi oleh alat indera yang dimiliki. Dari beberapa kajian

---

<sup>19</sup>*Ibid*

diketahui puncak aktif nyamuk ini sekitar pukul 08.00-13.00 dan antara pukul 15.00 sampai 17.00, di luar waktu tersebut, *Ae. aegypti* memanfaatkan untuk beristirahat.<sup>20</sup>

Nyamuk adalah binatang berdarah dingin dan karenanya proses-proses metabolisme dan siklus kehidupannya tergantung pada suhu lingkungan. Nyamuk tidak dapat mengatur suhu tubuhnya sendiri terhadap perubahan-perubahan diluar tubuhnya. Suhu rata – rata optimum untuk perkembangan nyamuk adalah 25°C – 27°C. nyamuk dapat bertahan hidup dalam suhu rendah, tetapi proses metabolismenya menurun atau bahkan terhenti bila suhu sampai dibawah kritis dan pada suhu yang sangat tinggi akan mengalami perubahan proses fisiologisnya.<sup>21</sup>

*Ae. Aegypti* merupakan vektor utama yang paling penting, sementara spesies *Ae. Albopictus*, *Ae. Scutellaris* merupakan vektor sekunder. Adanya vektor tersebut berhubungan dengan beberapa faktor antara lain:

1. Kebiasaan masyarakat menampung air bersih untuk keperluan sehari – hari
2. Sanitasi lingkungan yang kurang baik
3. Penyediaan air bersih yang kurang.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup>*Ibid*

<sup>21</sup>Akhmadi. “*Daur Kehidupan Nyamuk*”,<http://id. Wikipedia. Org/wiki/Nyamuk>. 2009.

<sup>22</sup>Anny widiyani. *Hubungan Kondisi Lingkungan, Kontainer dan Perilaku Masyarakat dengan Keberadaan Jentik Nyamuk Aedes aegypti*.2004.

## ***D. Ekologi vektor***

### **1. Tempat Perindukan**

Habitat merupakan tempat yang banyak dihuni oleh seluruh komunitas yang diartikan sebagai tempat hidup suatu makhluk. Habitat suatu organisme adalah tempat organisme itu hidup, atau tempat ke mana seseorang harus pergi menemukannya tempat perindukan *Aedes* terutama *Ae. aegypti* merupakan suatu tempat di mana nyamuk dewasa dapat meletakkan telurnya dan melakukan perkembangan hingga menjadi kepompong (pupa) atau stadium nyamuk dari stadium telur hingga kepompong tanpa bersentuhan dengan tanah. Tempat perindukan dapat dibedakan atas tempat berkembangbiak sementara, permanen dan alamiah.<sup>23</sup>

Tempat potensial untuk perkembangbiakan utama nyamuk *Ae. aegypti* adalah tempat-tempat penampungan air berupa genangan air yang tertampung di suatu tempat atau bejana di dalam atau sekitar rumah atau tempat-tempat umum, biasanya tidak melebihi jarak 500 meter dari rumah. Nyamuk ini biasanya tidak dapat berkembang biak digenangan air yang langsung berhubungan dengan tanah yaitu :

---

<sup>23</sup> Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, *loc.cit.*

a. Tempat Penampungan Air (TPA)

Secara fisik macam tempat penampungan air dibedakan lagi berdasarkan bahan tempat penampungan air (logam, plastik, porselin, fiberglass, semen, tembikar, dll), warna tempat penampungan air (putih, hijau, coklat, dll), volume tempat penampungan air (kurang dari 50 lt, 51-100 lt, 101- 200 lt, dll), letak tempat penampungan air (di dalam rumah atau di luar rumah), penutup tempat penampungan air (ada atau tidak ada), pencahayaan pada tempat penampungan air (terang atau gelap).<sup>24</sup>

Untuk meletakkan telurnya, nyamuk betina tertarik pada kontainer yang berwarna gelap, terbuka, dan terutama yang terletak ditempat- tempat yang terlindung dari sinar matahari. Telur diletakkan di dinding kontainer di atas permukaan air, bila terkena air akan menetas menjadi larva/ jentik, setelah 5-10 hari larva menjadi pupa dan 2 hari kemudian menjadi nyamuk dewasa memerlukan waktu 7-14 hari.<sup>25</sup>

b. Bukan Tempat Penampungan Air (Non TPA)

Non TPA adalah tempat-tempat yang bisa menampung air, tetapi bukan untuk keperluan sehari- hari seperti tempat minum hewan piaraan, barang-barang bekas,

---

<sup>24</sup>Departemen Kesehatan, *op.cit.*, h. 3.

<sup>25</sup>*Ibid.*, h. 5-6.

vas bunga, perangkap semut, penampungan air dispenser, dan barang-barang yang memungkinkan air tergenang yang tidak beralaskan tanah.<sup>26</sup>

#### 1) Tempat minum hewan piaraan

Tempat minum hewan piaraan yang dimaksud adalah tempat-tempat minum hewan piaraan yang dimiliki oleh responden yang berada di lingkungan sekitar rumah baik di dalam rumah maupun di luar rumah, misalnya tempat minum burung, tempat minum ayam, dan hewan piaraan yang lain.

#### 2) Barang-barang bekas

Barang-barang bekas yang dimaksud adalah barang-barang yang sudah tidak terpakai yang dapat menampung air, yang berada di dalam maupun di luar rumah responden. Barang-barang tersebut antara lain kaleng, ban bekas, botol, pecahan gelas, dll.

#### 3) Vas bunga

Vas bunga yang dimaksud adalah vas bunga yang berisi air yang terletak di dalam rumah responden yang memungkinkan nyamuk *Ae.aegypti* berkembangbiak di dalam vas bunga tersebut.

#### 4) Perangkap semut

Perangkap semut yang dimaksud adalah tempat perangkap semut yang berisi air yang biasanya diletakkan di bawah kaki meja untuk mencegah semut-

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, h. 17.

semut naik ke atas meja yang berisi makanan yang terletak di dalam rumah responden.

#### 5) Penampungan air dispenser

Penampungan air dispenser yang dimaksud adalah tempat penampungan air yang menyatu dengan dispenser yang terletak di bawah alat yang digunakan untuk mengalirkan air di dalam wadah/galon dispenser, letaknya di dalam rumah responden

#### 6) Pot tanaman air

Pot tanaman air yang dimaksud adalah pot-pot berisi air yang digunakan sebagai media tanaman air untuk hidup, yang terletak di dalam maupun di luar rumah responden.<sup>27</sup>

Daerah yang disenangi nyamuk adalah suatu daerah dimana tersedia tempat berkembangbiak, adanya hospes yang disukai dan tempat untuk berkembangbiak. Setiap jenis nyamuk pada waktu aktivitasnya akan melakukan orientasi terhadap habitatnya, dimana terdapat keadaan-keadaan yang disenangi untuk memenuhi kebutuhan fisiologisnya. Nyamuk berkumpul di tempat yang disenangi, kadang -kadang terpaksa terbang jauh dari tempat tersebut untuk mencari tempat yang baru.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>*Ibid.21*

<sup>28</sup> Dines Kesehatan Kabupaten Gowa, *loc. cit*

Penyebaran jentik pada tempat-tempat perindukan tidaklah merata, pada tempat perindukan yang kecil jentik akan selalu berkumpul di daerah pinggir atau sekitar benda-benda yang terapung di air atau tanaman air. Maka di situ jentik terlindung dari gerakan air sewaktu mengambil makanan atau untuk menghindarkan pengaruh gerakan lapisan permukaan air bila ada sedikit aliran. Flora dan Fauna yang mikroskopis sebagai bahan makanan jentik lebih banyak terdapat di sekitar tanaman. Parameter area yang disenangi penting masa waktu survei jentik untuk aplikasi larvasida.<sup>29</sup>

Pada tempat-tempat yang airnya bergerak tetap atau sementara, jentik berkumpul ditempat dimana jentik biasa bertahan. Pada genangan-genangan air yang besar jentik instar I dan II berkumpul pada tempat dimana telur-telur diletakkan, sedangkan jentik instar III dan IV bergerak beberapa meter dari tempat penetasan dan berkumpul di bagian-bagian yang disenangi misal bagian yang teduh atau terang. Gangguan air yang alamiah atau buatan menyebabkan nyamuk lenyapnya tempat perindukan, atau jentik tersebar ke tempat yang lebih jauh, beberapa meter sampai kilometer. Telur-telur nyamuk dapat terbawa oleh aliran air yang cepat dan dapat musnah karena gerakan-gerakan air yang dapat

---

<sup>29</sup>*Ibid*



menghanyutkan ke permukaan tanah yang kering sehingga telur-telur itu akan kering oleh panas matahari.<sup>30</sup>

## 2. Kesenangan Menggigit (*feeding habit*)

*Ae. aegypti* bersifat *antropofilik* yaitu senang menggigit manusia, menghisap darah pada siang hari (*diurnal/day-bitter*). *Ae aegypti* mengisap darah pada siang hari pukul 08.00-13.00 dan sore hari pukul 15.00-17.00 sore, yang berarti bahwa bagi *Ae. aegypti* terdapat dua puncak pengisapan darah yang merupakan aktivitas kegiatan darah yang dilakukan di siang hari.<sup>31</sup>

Spesies nyamuk ini bersifat *endofilik* dan *eksofilik* artinya melakukan pengisapan darah baik dalam rumah maupun di luar rumah. Sifat lain serangga ini adalah *eksofilik* yaitu setelah mengisap darah lebih suka istirahat di luar rumah dari pada dalam rumah, *Ae. Aegypti* adalah spesies nyamuk yang disebut *intermittent feeder* artinya melakukan pengisapan darah berulang kali sebelum merasa kenyang atau maksimal mengisap darah (*fully engorged*). Sifat yang dimiliki inilah yang menjadi sebab mengapa *Ae. aegypti* dalam saat yang sama dapat menginfeksi beberapa orang dalam satu keluarga sehingga terjadi musibah kejangkitan penyakit DBD lebih dari seorang dalam satu keluarga.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup>Cahaya Indra, *Pemberantasan Vektor Demam Berdarah Dengue Di Indonesia*. Bagian kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara.2003

<sup>31</sup> Hoedojo. Vektor Demam Berdarah Dengue dan Upaya Penanggulangannya. Majalah Parasitologi Indonesia 1993. h. 31

<sup>32</sup> *Ibid* .9-10

### 3. Tempat hinggap/istirahat (*resting place*)

*Ae. aegypti* menyukai vegetasi yang ditemukan tumbuh di sekitar tempat berkembangbiak yang secara tidak langsung terkena oleh cahaya matahari sebagai tempat istirahat (*resting place*). Tempat istirahat nyamuk di dalam rumah, berupa benda tergantung seperti pakaian, kelambu, gorden atau perabot rumah yang terletak/berada di tempat yang gelap, berbau dan lembab. Penelitian yang dilakukan oleh Hoedojo (1962) mengenai tempat istirahat nyamuk rumah (*Culex quinquefasciatus*) di rumah-rumah penduduk Jakarta dan daerah sekitarnya, menemukan 99% nyamuk rumah adalah *Cx. quinquefasciatus*, dan sisanya yang 1% terdiri dari *Cx. fuscephalus*, *Ae. aegypti* dan *Ae. albopictus*. Hoedojo dan Wijono (1967) selanjutnya melaporkan bahwa tempat istirahat *Ae. aegypti* ternyata sangat bergantung pada keadaan lingkungan di dalam dan di sekitar rumah yang mendukung keberadaan nyamuk tersebut.<sup>33</sup>

Setelah menggigit, selama menunggu waktu pematangan telur nyamuk akan berkumpul ditempat-tempat dimana terdapat kondisi yang optimum bagi setiap jenis nyamuk untuk beristirahat, setelah itu akan bertelur dan kemudian menggigit lagi. Tempat-tempat yang disenangi nyamuk untuk hinggap beristirahat selama menunggu waktu bertelur adalah tempat-tempat gelap, lembab dan sedikit

---

<sup>33</sup> *IbidI*,11

dingin. Oleh karena pada ekosistem kepulauan, nyamuk telah beradaptasi pada ambang kelembaban yang tinggi.<sup>34</sup>

#### **4. Jarak Terbang**

Spesies *Aedes* adalah nyamuk penerbang jarak pendek yang mampu terbang mencapai jarak kira-kira 50-100 m dari tempat berkembangbiak. Hal tersebut sangat erat kaitannya dengan keberadaan manusia dan binatang yang berperan sebagai sumber makanan dan juga tempat-tempat penampungan air bersih yang diperlukan untuk bertelur, yang terletak di sekitar pemukiman padat penduduk. Ditemukannya nyamuk dewasa pada jarak yang mencapai 2 km dari tempat perindukannya, di mana disebabkan oleh pengaruh angin atau transportasi yang membawa terbang *Ae. aegypti*.<sup>35</sup>

Angin sangat mempengaruhi kemampuan terbang nyamuk. Bila kecepatan angin 11-14 meter per detik atau 25 -31 mil per jam akan menghambat penerbangan nyamuk. Secara langsung angin akan mempengaruhi penguapan (evaporasi) air dan suhu udara (konveksi). Dalam keadaan udara tenang mungkin suhu tubuh nyamuk ada beberapa fraksi satu derajat lebih tinggi dari suhu lingkungan, bila angin evaporasi baik dan juga konveksi baik maka suhu tubuh

---

<sup>34</sup> Soemirat, *Epidomilogi Lingkungan*. UGM Press. Yogyakarta.2002

<sup>35</sup> WHO, *Demam Berdarah: Diagnosis, Pengobatan, Pencegahan dan Pengendalian* (Jakarta: Kedokteran EGC, 2001).

nyamuk akan turun beberapa fraksi satu derajat lebih rendah dari suhu lingkungan.<sup>36</sup>

## 5. Tempat Bertelur

Waktu yang diperlukan untuk mematangkan telur mulai saat nyamuk mengisap darah sampai meletakkan telur, biasanya bervariasi antara 3- 4 hari. Jangka waktu tersebut disebut satu *gonotrofik*. Pada umumnya telur diletakkan pada air yang jernih dan tidak mengalir yang terdapat di sekitar atau di dalam rumah pada tempat berkembangbiak buatan pada kontainer tak jauh dari permukaan air, selain itu nyamuk *Aedes* suka meletakkan telurnya pada bejana yang sedikit air.<sup>37</sup>

Tempat berkembangbiak yang disukai *Ae. aegypti* adalah kontainer yang tidak langsung kontak dengan tanah. Macam kontainer yang ditemukan yaitu, *in door container* (terdapat dalam rumah) dan *outdoor container* (terdapat di luar rumah).<sup>38</sup>

Untuk menentukan investasi *Ae. Aegypti* disuatu daerah sebaiknya diadakan survei terhadap semua sarang atau tempat perindukan atau wadah yang

---

<sup>36</sup>Departemen Kesehatan *Pedoman...*,*lop.cit.* 13

<sup>37</sup> Sugeng Yuwono M. (1988). *Pengaruh Perubahan Lingkungan Fisik Terhadap Penetasan Telur Nyamuk Aedes aegypti*. Berkl Kedokteran Masyarakat, 4:6.

<sup>38</sup>Departemen Kesehatan, *op.cit.*. 5

berisi air bersih yang diduga sebagai tempat bersarang nyamuk (potensial breeding habit) pada sejumlah rumah yang ada.<sup>39</sup>

### ***E. Ukuran Kepadatan Populasi Nyamuk***

Untuk mengetahui kepadatan populasi nyamuk *Ae.aegypti* di suatu lokasi dapat dilakukan melalui survei rumah yang dipilih secara acak, kegiatan survei yang biasa dilakukan adalah survei terhadap nyamuk dewasa, jentik, dan survei dengan menggunakan *ovitrap* (perangkap telur) atau tempat perindukan nyamuk sebagai berikut:

#### 1. Survei nyamuk

Survei nyamuk dilakukan dengan cara penangkapan nyamuk menggunakan umpan baik dalam dan di luar rumah, masing-masing selama 20 menit per rumah dan penangkapan nyamuk yang hinggap di dinding dalam rumah yang sama. Penangkapan nyamuk biasanya dilakukan dengan menggunakan aspirator (alat penangkap nyamuk dewasa). Dari survei nyamuk dewasa ini akan dapat diketahui identitas vektor dengan mencermati angka indeks nyamuk dewasa yaitu, biting/landing rate.

#### 2. Survei Jentik (pemeriksaan jentik)

Survei jentik dilakukan dengan cara sebagai berikut:

---

<sup>39</sup> Departemen Kesehatan ...,*lop.cit.* 18

- a. Semua tempat atau bejana yang dapat menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk *Ae. aegypti* diperiksa (dengan mata telanjang) untuk mengetahui ada tidaknya jentik.
- b. Untuk memeriksa tempat penampungan air yang berukuran besar, seperti bak mandi, tempayan, drum dan bak penampungan air lainnya. Jika pada penglihatan pertama tidak menemukan jentik, tunggu kira-kira 1/2-1 menit untuk memastikan bahwa benar jentik tidak ada.
- c. Untuk memeriksa tempat-tempat perkembangbiakan yang kecil, seperti vas bunga/pot tanaman air/botol yang airnya keruh, seringkali airnya perlu dipindahkan ke tempat lain.
- d. Untuk memeriksa jentik di tempat yang agak gelap, atau airnya keruh, biasanya digunakan senter.<sup>40</sup>

Survei jentik dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu :

#### 1. Cara *Single Larva*

Cara ini dilakukan dengan mengambil satu jentik pada setiap kontainer yang ditemukan ada jentik, dengan menggunakan cidukan (gayung plastik) atau menggunakan pipet panjang jentik sebagai sampel untuk pemeriksaan spesies jentik dan identifikasi lebih lanjut jenis jentiknya. Jentik yang diambil ditempatkan dalam botol kecil/vial bottle dan diberi label sesuai dengan nomor

---

<sup>40</sup>Departemen Kesehatan, 1996. *Pencegahan dan Penanggulangan Demam Berdarah dengue* DBD. hal. 12

tim survei, nomor lembar formulir berdasarkan nomor rumah yang disurvei dan nomor kontainer dalam formulir

## 2. Cara visual

Survei hanya di lihat dan di catat ada tidaknya jentik di dalam kontainer tidak dilakukan pengambilan dan pemeriksaan spesies jentik yakni *Aedes aegypti*. Survei ini dilakukan pada survei lanjutan unuk memonitor indeks kepadatan jentik atau nilai PSN yang dilakukan. Survey jentik yang biasanya digunakan adalah cara visual.<sup>41</sup>

Ukuran yang dipakai untuk mengetahui kepadatan jentik *Ae. aegypti* adalah :

- a. Angka Bebas Jentik (ABJ) yaitu rumah yang tidak terinfeksi jentik
- b. *House Index* (HI) yaitu persentase rumah yang positif dengan larva *Ae. aegypti*
- c. *Container Index* (CI) yaitu persentase wadah/tempat perindukan yang positif terjangkit larva atau jentik *Aedes aegypti*
- d. *Breteau Index* (BI) yaitu jumlah wadah/tempat perindukan yang positif dengan larva *Ae. aegypti* yang ditemukan di dalam 100 rumah yang diperiksa

Berdasarkan penelitian dari ahli WHO (2000) ditemukan korelasi antara kepadatan *Ae. aegypti* di suatu daerah dengan kemungkinan transmisi demam berdarah. Kepadatan populasi *Aedes aegypti* dinyatakan dalam skala 1-9.

---

<sup>41</sup>Departmen Kesehatan Republik Indonesia. 1992. *op.cit* h. 16

Tabel 1. Tabel Skala Kepadatan Jentik sehubungan dengan Nilai Indeks yang ditemukan.

Density Figure	House Index (HI)	Container Index (CI)	Breteau Index
1	1-3	1-2	1-4
2	4-7	3-5	5-9
3	8-17	10-14	10-19
4	18-28	10-14	20-34
5	29-37	15-20	35-49
6	38-49	21-27	50-74
7	50-59	28-31	75-79
8	60-76	32-40	100-199
9	77+	41+	200+

Pengukuran Breteau Index merupakan indikator yang baik untuk menyatakan kepadatan nyamuk sedangkan House index menunjukkan luas penyebaran nyamuk dalam suatu wilayah. Melalui hasil pengukuran kepadatan *Ae.aegypti* dapat digunakan untuk mengetahui angka ambang kritis yang merupakan suatu indikator adanya ancaman wabah penyakit demam berdarah. Oleh para ahli menetapkan bahwa *Breteau Index* di atas 50 pada suatu daerah, besar kemungkinan terjadinya penyakit demam berdarah.<sup>42</sup>

Angka Bebas Jentik (ABJ) merupakan prosentase rumah / tempat- tempat umum yang tidak ditemukan jentik. Sebelum menetapkan ABJ perlu dilakukan

---

<sup>42</sup>WHO "Demam berdarah Dengue, Diagnosis, pengobatan, Pencegahan dan Pengendalian". Jakarta.2001



pemeriksaan jentik berkala yang dilakukan untuk mengetahui adanya jentik nyamuk *Ae. aegypti* di rumah dan tempat-tempat umum secara teratur yang dilakukan oleh petugas sekurang- kurangnya sekali sebulan untuk mengetahui keadaan populasi jentik nyamu *Ae. aegypti*, baru kemudian hasil rekapan dari pemeriksaan jentik berkala yang dilakukan setiap bulan dapat direkapitulasi menjadi Angka Bebas Jentik (ABJ).<sup>43</sup>

Data prosentase ABJ di kota Semarang diperoleh hasil 86,12%. Pada tahun 2005, prosentase ABJ di Kecamatan Pedurungan sebesar 92,30 %, di Kelurahan Tlogosari Kulon sebesar 94,4 %, dan RW yang paling rendah ABJnya adalah RW III (93,30 % ) pada bulan Januari-November tahun 2006. Hasil ini menggambarkan ABJ dari tingkat propinsi sampai tingkat RW, masih di bawah target pemerintah Indonesia yaitu  $ABJ > 95 \%$ .<sup>44</sup>

ABJ yang rendah dipengaruhi oleh banyak faktor. Penelitian yang dilakukan oleh Sukoco (2001) menunjukkan bahwa ada hubungan yang kuat antara praktek PSN dengan ada tidaknya jentik. Sedangkan Abdul Rochman (2004) menyebutkan bahwa ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan

---

<sup>43</sup>Departemen Kesehatan Republik Indonesia “*Modul latihan Kader Dalam Pemberantasan Sarang Nyamuk Demam Berdarah Dengue*”. Jakarta, 1996. hal.5

<sup>44</sup>Dinas Kesehatan Kota Semarang .*Data Program Pemberantasan Penyakit DBD*.2005

dengan sikap responden, pengetahuan dengan praktik responden, dan sikap dengan praktik responden dalam PSN – DBD.<sup>45</sup>

Menurut Dian ( 2004 ), Angka Bebas Jentik dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pengetahuan responden tentang PSN – DBD, sikap responden terhadap PSN – DBD, dan praktik responden terhadap piket bersama. Adapun faktor – faktor yang diteliti pada penelitian ini yaitu: pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk Demam Berdarah Dengue (PSN – DBD), macam tempat penampungan air, persediaan air bersih, pembuangan sampah padat, tempat perindukan yang bukan tempat penampungan air, dan abatisasi selektif.<sup>46</sup>

Hasil penelitian Widagdo (2003) di Kecamatan Banyumanik menunjukkan klasifikasi endemis tinggi dengan nilai IR 12,25. Sedangkan Pada tahun 2007 IRnya peringkat ketiga se-Kota Semarang, yakni sebesar 28,33 %, setelah Kecamatan Tembalang (29,28 %) dan Gajah Mungkur (28,72 %). Selain itu angka kematian DBD di Kecamatan Banyumanik termasuk sepuluh besar angka kematian tertinggi di Kota Semarang diantara 17 kecamatan yang ada. Angka bebas jentik (ABJ) masih berada di bawah target ideal 95 % yakni 89 % . Tahun 2007, Kecamatan Banyumanik ditetapkan dalam status Kejadian Luar Biasa (KLB) DBD.

---

<sup>45</sup>Abdul Rahman “*Hubungan pengetahuan sikap, dan Praktik ibu Rumah Tangga dalam Pemberantasan Nyamuk (PSN)*” di Desa Gondang Rejo .2004

<sup>46</sup>Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah.*Info Kesehatan Dinas Kesehatan.2004*

Penetapan itu didasarkan tingginya angka penderita DBD, jauh di atas batas yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang.<sup>47</sup>

Hasil penelitian Febriyanto (2005) di Kampung IV Desa Saung Naga Kec. Baturaja Barat Kab. OKU. Sumatera Selatan memperoleh nilai HI sebesar 35%, CI sebesar 26% dan BI sebesar 36%. Sementara ABJ yang didapat adalah sebesar 65%. Didapatkan jenis kontainer yang paling banyak digunakan adalah bak mandi (60,71%) dan drum (28,58%). Sedangkan kontainer positif jentik lebih banyak terdapat di dalam rumah (75%). Ditemukan pula bahwa jenis jentik yang mendominasi adalah *Ae. aegypti* (94,45%).<sup>48</sup>

Hasil Penelitian Yudhastuti dan Vidiyani (2005) di Surabaya memperoleh hasil bahwa kepadatan jentik nyamuk *Ae.aegypti* di kelurahan Wonokusumo yang diukur dengan parameter HI=58%, CI=30,6%, BI=82% dan DF= 7 menunjukkan transmisi nyamuk *Ae.aegypti* tinggi. Jenis kontainer yang digunakan oleh masyarakat, serta kondisi lingkungan dalam hal ini kelembaban udara mempunyai hubungan dengan kepadatan jentik nyamuk *Ae.aegypti*.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup>Laksmono Widagdo,2003 ”Kepadatan jentik *aedes aegypti* sebagai indikator keberhasilan pemberantasan sarang nyamuk (3plus) Di kelurahan spondol wetan, semarang.

<sup>48</sup>Milani Salim Febriyanto, Survey jentik *aedes aegypti* di desa saung naga kab. oku tahun 2006

<sup>49</sup>Yudhihastuti dan Vidiyani “Hubungan Kondisi lingkungan, Kontainer, dan Perilaku Masyarakat dengan Keberadaan Jentik Nyamuk *Aedes aegypti* di Daerah endemis Demam Berdarah Dengue” Surabaya vol 1 2005

Hasil penelitian (2004) melakukan studi tentang faktor yang mempengaruhi densitas jentik *Ae. aegypti* di wilayah kerja puskesmas jumpandang baru memperlihatkan bahwa densitas jentik *Ae. aegypti* pada daerah tersebut diperoleh House index sebesar (30,37%) Container index sebesar (15,22%) dan Breteau index sebesar (48,15%) dikorelasikan dengan angka Density Figure (DF) sama dengan 5. Hal ini menunjukkan densitas jentik *Aedes aegypti* berada pada nilai ambang kritis dan TPA yang merupakan wadah penyimpanan yang paling banyak jentik *Ae. Aegypti* adalah semen.<sup>50</sup>

Hasil penelitian Bambang Yuniarto ( 2006 ) di Semarang, yang meneliti angka kepadatan jentik memperoleh hasil bahwa terdapat hubungan antara kecenderungan HI dan CI sebelum dan sesudah uji coba peran serta masyarakat dalam upaya PSN. Dari hasil penelitian didapatkan HI sebesar 18,6 %, BI sebesar 22,34% dimana termasuk dalam *density figure* 4 serta ABJ 81,38 % yang mana masih dibawah target ideal . Pada PSN 3M plus yang buruk, akan beresiko 8,13 x lebih besar untuk terkena DBD.<sup>51</sup>

Hasil penelitian Iscaacs (2006) yang mengukur resiko penyebaran DBD pada daerah endemik di Pedesaan dapat dilihat dari kepadatan jentik yang ada di

---

<sup>50</sup>Gafur, *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Densitas jentik Aedes aegypti di Wilayah Kerja Puskesmas Jumpandang Baru*. Skripsi Sarjana Fakultas kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar.2004

<sup>51</sup>Bambang Yuniarto, *Kecenderungan HI dan CI Sebelum dan Sesudah Uji Coba Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya PSN Kabupaten Dati II Wonogiri*. Skripsi Sarjana. Fakultas Kesehatan Masyarakat, 1995.

daerah Narayankere adalah salah satu desa di Bangalore, nilai rata-rata CI sebesar 13,64%, HI sebesar 12%, dan BI sebesar 13,64% kontainer yang paling disenangi oleh jentik *Aedes* adalah pot (12,5%) dan kontainer yang terbuat dari semen (50%).<sup>52</sup>

Hasil penelitian Sleman (2007) Di Dusun Blimbingsari, Catur Tunggal, Depok, Yogyakarta memberikan gambaran bahwa Indeks jentik dari bulan Mei hingga Juli mengalami penurunan. HI = 46%, 41%, 22%; CI = 17%, 11%, 7%; dan BI = 99%, 58%, 32%. Dibandingkan dengan HI, nilai BI selalu lebih tinggi, ini memberikan gambaran bahwa pada rumah yang positif jentik/pupa terdapat lebih dari satu container yang positif jentik/pupa. Nilai ABJ dari bulan Mei hingga Juli berturut-turut sebagai berikut: 54%, 59%, 78%; jadi mengalami peningkatan, walaupun masih di bawah standar nasional sebesar 95%.<sup>53</sup>

Hasil penelitian Maulana (2004) di Makassar Kel. Sudiang studi tentang hubungan penyimpanan air bersih dengan densitas jentik *Ae. Aegypti* diteliti sebanyak 365 rumah tangga yang disurvei didapatkan 1.279 wadah yang terdiri dari gentong 79 buah, drum 19 buah, ember plastik 835 buah dan bak semen 346 buah. Berdasarkan perhitungan indeks jentik ditemukan angka densitas jentik cukup tinggi yaitu sebanyak HI sebanyak 51,2%, CI sebanyak 27,4% dan BI 351

---

<sup>52</sup>Iscaacs, *Juornal of Community Medicene*. Vol 31

<sup>53</sup>Sleman, *Survei Tempat Perindukan Nyamuk* Di Dusun Blimbingsari, Catur Tunggal, Depok, 2007

per 100 rumah dan angka density figure = 7 melampaui indeks ambang batas kritis lebih dari 5, dimana jenis wadah, letak wadah, lama penyimpanan dan kondisi wadah penyimpanan air bersih mempunyai hubungan yang bermakna dengan densitas jentik *Ae. Aegypti*.<sup>54</sup>

Hasil penelitian Hasyimi dan Mardjan (2004) bahwa pada kelurahan Papanggo kecamatan Tanjung proik, ditemukan persentase jentik Aedes paling banyak padaa tempayan (66,7%), kemudian drum (32,6%), bak mandi sebesar (18,8%) dan ember dengan nilai rata-rata Container index (17,9%), House index (27,3%) dan Breteau index (33,7%). Berarti lokasi ini dapat dikategorikan mempunyai resiko penularan penyakit DBD yang tergolong tinggi (angka bebas jentik, ABJ<95).Maka dapat diketahui bahwa keberadaan tempat penampungan air dan container yang digunakan sebagai breeding site sangat berhubungan dengan kepadatan jentik pada daerah tersebut.<sup>55</sup>

#### ***F. Faktor- faktor yang Berhubungan dengan Keberadaan Jentik***

Survei untuk *Ae. aegypti* sangat penting untuk menentukan distribusi, kepadatan populasi, habitat utama larva, faktor resiko berdasarkan waktu dan tempat yang berkaitan dengan penyebaran dengue, dan tingkat kerentanan atau kekebalan insektisida yang dipakai guna memprioritaskan wilayah dan musim

---

<sup>54</sup>Maulana. R. *Hubungan Wadah Penyimpanan Air Bersih Dengan Densitas Jentik Aedes aegypti*. Dikelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar. FKM UNHAS. 2004.

<sup>55</sup>Hasyimi dan Mardjan

untuk pelaksanaan pengendalian vektor. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberadaan jentik yaitu variasi musiman, ketinggian tempat, vektor nyamuk *Ae. aegypti*, pelaksanaan PSN-DBD, macam tempat penampungan air, persediaan air bersih, pembuangan sampah padat, tempat perkembangbiakan bukan tempat penampungan air dan abatisasi selektif.

#### 1. Variasi Musiman

Pada musim penghujan tempat perkembangbiakan *Ae.aegypti* yang pada musim kemarau tidak terisi air, mulai terisi air. Telur-telur yang belum sempat menetas, dalam tempo singkat akan menetas. Selain itu juga pada musim penghujan, semakin banyak tempat penampungan air alamiah yang terisi air hujan dan dapat digunakan sebagai tempat berkembangbiak nyamuk ini. Oleh karena itu pada musim hujan populasi *Ae.aegypti* meningkat. Bertambahnya populasi nyamuk ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan penularan virus dengue.<sup>56</sup>

Apabila satu beberapa faktor lingkungan yang diperlukan oleh nyamuk terbatas atau melimpah, maka nyamuk itu tidak dapat mempertahankan hidupnya. Jadi keadaan minimum atau maksimum yang dapat ditoleransi oleh nyamuk maka

---

<sup>56</sup> Depertemen Kesehatan, *Petunjuk Tekhnis Penggerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) DBD* (Jakarta:1992).h.13

nyamuk itu dapat hidup. Bila faktor tersebut dalam keadaan optimum maka dapat menghasilkan kehidupan yang baik bagi nyamuk.<sup>57</sup>

## 2. Ketinggian Tempat

Kemampuan terbang nyamuk betina rata-rata 40 meter, maksimal 100 meter. Namun secara pasif misalnya karena angin atau terbawa kendaraan nyamuk ini dapat berpindah lebih jauh. *Ae. aegypti* tersebar luas di daerah tropis dan sub tropis. Di Indonesia, nyamuk ini tersebar luas baik di rumah-rumah maupun tempat-tempat umum. Nyamuk ini dapat hidup dan berkembangbiak sampai ketinggian daerah 1000 meter dari permukaan air laut. Di atas ketinggian tersebut suhu udara terlalu rendah sehingga tidak memungkinkan bagi kehidupan nyamuk tersebut.<sup>58</sup>

## 3. Persediaan Air Bersih

Kebutuhan manusia akan air sangat kompleks antara lain untuk minum, masak, mencuci berbagai macam bahan, dll. Menurut perhitungan WHO (2004) di negara- negara maju tiap orang memerlukan air antara 60- 120 lt per hari. Sedangkan di negara- negara berkembang termasuk Indonesia tiap orang memerlukan air antara 30- 60 lt perhari. Jika persediaan air berpipa tidak kuat dan

---

<sup>57</sup> *Ibid*

<sup>58</sup> *Ibid.* h. 14



hanya keluar pada jam – jam tertentu atau tekananya rendah, maka orang cenderung malas untuk melaksanakan pemberantasan sarang nyamuk, karena persediaan air bersih hanya cukup untuk kebutuhan sehari- hari. Ada kebutuhan untuk menyimpan air dalam berbagai jenis wadah.

Hal ini akhirnya akan memperbanyak tempat perkembangbiakan nyamuk *Ae. aegypti* karena sebagian besar wadah yang digunakan memiliki ukuran yang besar dan berat yang tidak mudah dibuang atau dibersihkan, misalnya: gentong air, ember besar. Dengan demikian, sangatlah penting apabila persediaan air minum dialirkan dalam jumlah, mutu, dan konsistensi yang layak untuk mengurangi keharusan dan penggunaan wadah penyimpanan air yang dapat berfungsi sebagai habitat larva yang paling produktif.

#### 4. Pembuangan Sampah Padat

Sampah padat seperti kaleng, botol, ember, atau benda tidak terpakai lainnya yang berserakan di sekeliling rumah harus dibuang dan dikubur di tempat penimbunan sampah. Barang - barang pabrik dan gudang yang tidak terpakai harus disimpan dengan benar sampai saatnya dibuang. Peralatan rumah tangga dan kebun (ember, mangkuk, dan alat penyiram tanaman) harus disimpan dalam kondisi terbalik untuk mencegah tergenangnya air hujan. Demikian pula pada perahu harus diletakkan pada posisi terbalik jika tidak digunakan. Sampah tanaman (batok kelapa, pelepah kakao) harus dibuang dengan benar tanpa menunda- nunda.

## 5. Abatisasi Selektif

Abatisasi selektif adalah menaburkan bubuk abate/altosid ke dalam tempat penampungan air yang ditemukan jentik pada waktu Pemeriksaan Jentik Berkala (PJB) yang dilakukan oleh petugas kesehatan setiap sebulan sekali di rumah – rumah dan tempat – tempat umum (Depkes RI, 1992: 16). Bubuk abate berwarna kecoklatan, terbuat dari pasir yang dilapisi dengan zat kimia yang dapat membunuh jentik nyamuk, sedangkan altosid berbentuk butiran seperti gula pasir berwarna hitam arang. Zat kimia dalam altosid akan menghambat (membunuh kepompong, sehingga tidak menjadi nyamuk).

Cara melakukan abatisasi, yaitu:

### 1) Menggunakan bubuk abate

Takaran penggunaan bubuk abate adalah untuk 10 liter air cukup dengan 1gr bubuk abate atau 10 gr untuk 100 liter air dan seterusnya. Bila tidak ada alat untuk menakar, gunakan sendok makan. Satu sendok makan peres berisi 10 gr abate. Selanjutnya tinggal membaginya atau menambahnya sesuai dengan banyaknya air yang akan diabatisasi.

### 2) Menggunakan Altosid

Takaran penggunaan altosid adalah untuk 100 liter air cukup dengan 2, 5 gr altosid atau 5 gr untuk 200 liter air. Bila tidak ada alat penakar, gunakan sendok teh. Satu sendok teh peres berisi 5 gr altosid. Selanjutnya tinggal membagi atau menambahkannya sesuai dengan banyak air yang akan diabatisasi

Kepadatan nyamuk *Ae. Aegypti* juga dipengaruhi oleh kondisi kontainer seperti warna, jenis bahan kontainer, jenis kontainer, jumlah air dan ukuran kontainer. Hal lain seperti letak tempat penampungan air juga mempengaruhi populasi nyamuk *Ae. Aegypti*.<sup>59</sup>

Jenis-jenis nyamuk tertentu suka berkembangbiak pada genangan-genangan air terbuka, kena sinar matahari langsung, misalnya *Anopheles sudaicus* menyukai genangan air terbuka, berkembangbiak di tambak-tambak. Ada pula jenis-jenis nyamuk yang suka berkembangbiak pada genangan-genangan air yang terlindung tidak kena sinar matahari langsung misal *Ae. Aegypti* menyukai genangan-genangan air yang terlindung oleh karena itu berkembangbiak di tempat-tempat penampungan air di dalam rumah.<sup>60</sup>

Daerah yang disenangi nyamuk ( tempat perindukan nyamuk ) adalah suatu daerah dimana tersedia tempat beristirahat, adanya hospes yang disukai dan tempat untuk berkembangbiak. Setiap jenis nyamuk pada waktu aktivitasnya akan melakukan orientasi terhadap habitatnya, dimana terdapat keadaan – keadaan yang disenangi untuk memenuhi kebutuhan fisiologisnya. Nyamuk berkumpul di tempat yang disenangi, dan kadang – kadang terpaksa terbang jauh dari tempat tersebut untuk mencari tempat yang baru.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup>Saleha sungkar. *Pengaruh Jenis Tempat Penampungan Air terhadap Kepadatan dan Perkembangan Larva Ae. Aegypti*. UI. 1994.

<sup>60</sup>Departemen Kesehatan, *Petunjuk Tekhni Penggerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk* (PSN) DBD. Jakarta. 1992. h.16

<sup>61</sup> *Ibid*

Daerah yang disenangi nyamuk ( tempat perindukan nyamuk ) adalah suatu daerah dimana tersedia tempat beristirahat, adanya hospes yang disukai dan tempat untuk berkembangbiak. Setiap jenis nyamuk pada waktu aktivitasnya akan melakukan orientasi terhadap habitatnya, dimana terdapat keadaan-keadaan yang disenangi untuk memenuhi kebutuhan fisiologisnya. Nyamuk berkumpul di tempat yang disenangi, dan kadang-kadang terpaksa terbang jauh dari tempat tersebut untuk mencari tempat yang baru.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup>Suroso T, *Pemberantasan Demam Berdarah*..Jakarta: Departemen Kesehatan,2000.h.10

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Jenis Penelitian***

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggambarkan kepadatan jentik nyamuk *Aedes. aegypti* dengan melakukan karakterisasi terbatas pada daerah yang merupakan objek penelitian.

#### ***B. Variabel penelitian***

Penelitian ini terdiri dari dua variabel bebas (variabel independen) adalah dipengaruhi faktor suhu, kelembaban, pengetahuan dan pelaksanaan PSN variabel terikat (variabel dependen) adalah kepadatan jentik nyamuk di daerah endemis Kecamatan Bajeng

#### ***C. Populasi dan Sampel***

##### **1. Populasi**

Populasi dalam penelitian ini adalah semua jentik nyamuk *Ae. aegypti* pada setiap KK di dusun yang terpilih.

##### **2. Sampel dalam penelitian ini adalah sebahagian jentik yang terdapat pada 70 KK di daerah Coring dan Kanarea**

#### ***D. Defenisi operasional***

1. Kepadatan jentik nyamuk yaitu banyaknya jentik *Ae.aegypti* yang ditemukan pada setiap jenis wadah tempat penampungan air yang di ukur dengan rumus House Index dan Container Index,
2. Daerah endemis (Daerah rawan I) suatu daerah dimana 3 tahun berturut-turut terdapat kasus DBD.
3. Tempat penampungan air (TPA), yaitu tempat-tempat untuk menampung air guna keperluan sehari-hari seperti tempayan, drum, bak mandi, Bak WC, ember, dan lain-lain.
4. Bukan Tempat Penampungan Air (non TPA) yaitu tempat-tempat yang bisa menampung air bukan keperluan sehari-hari seperti : Tempat minum hewan piaraan (ayam, burung, Dll), barang bekas (kaleng dan botol. Pecahan gelas dan dll), vas bunga, perangkat semut, penampung air, dispenser, dsb.
5. Tempat Penampungan Air (TPA) alami seperti lubang pohon, lubang batu, pelepah daun, tempurung kelapa, kulit kerang, potongan bambu, dll.

#### ***C. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian***

1. Ruang Lingkup Penelitian
  - a. Pengambilan sampel dilakukan di Dusun Coring dan Kanarea Kecamatan Bajeng Kab.Gowa pada tempat penampungan air di beberapa rumah penduduk yang terpilih.

b. Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari – Maret 2010

2. Batasan Penelitian

Pengambilan sampel jentik dilakukan 2 kali dalam sebulan selama 3 bulan di Kelurahan Coring dan Kanarea.

***D. Alat dan Bahan***

1. Alat

Adapun alat yang digunakan adalah Mikroskop Dynolite AM-450, thermohyrometer, endorff tip, pipet, termometer air, kain kasa.

2. Bahan

Adapun bahan yang digunakan adalah sampel jentik nyamuk dan alkohol 70%.

***E. Cara Kerja***

1. Menentukan lokasi penelitian di masing-masing daerah endemis di Kecamatan Bajeng yaitu Kanarea dan Coring .

2. Melakukan survei jentik di rumah-rumah penduduk yang dipilih secara acak.

Dalam Penelitian ini keseluruhan jumlah kepala keluarga di dusun Coring berjumlah 3564 KK dan Kanarea berjumlah 3558 KK. Karena keterbatasan waktu dan dana maka sampel yang diambil adalah 1% dari jumlah KK di kedua dusun yaitu sebanyak 35 KK.

3. Mengambil sampel jentik nyamuk pada setiap tempat penampungan di setiap rumah untuk analisis HI dan CI. Untuk mengetahui hubungan antara keberadaan jentik dengan pengetahuan dan pendidikan responden, maka saat sampling dilakukan wawancara dengan menggunakan angket,
4. Melakukan pemeliharaan sampel jentik menjadi nyamuk dewasa di laboratorium untuk selanjutnya diidentifikasi dengan menggunakan mikroskop Dynolite AM-450 dan CD penuntun identifikasi nyamuk (Armend Forced Pest Management Board, 2009).
5. Menganalisis kepadatan jentik dengan menghitung nilai Indeks Rumah (*House Index/HI*), dan Indeks Kontainer (*Container Index/CI*) sebagai berikut:
  - a. *House Index* (HI) yaitu persentase rumah yang positif dengan larva *Ae.aegypti*.

$$\frac{\text{Jumlah rumah/bangunan yang ditemukan jentik}}{\text{Jumlah rumah/bangunan yang diperiksa}} \times 100 \%$$

- b. *Container Index* (CI) yaitu persentase wadah/tempat perindukan yang positif terjangkit larva atau jentik *Ae. Aegypti*

$$\frac{\text{Jumlah container dengan jentik}}{\text{Jumlah container yang diperiksa}} \times 100\%$$

## **F. Analisis Data**

Data dianalisis secara deskriptif dan disajikan dalam bentuk histogram.





a



b



c



d

Gambar 1. Dokumentasi Hasil Penelitian

- a. Rumah yang disurvei
- b. Tempat salah satu Breeding site
- c. Pemeriksaan Jentik pada tempayan
- d. Keadaan rumah penduduk.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Lokasi Penelitian**

Kecamatan Bajeng terletak disebelah selatan kota Sungguminasa  $\pm$  12 km. Terdiri dari termasuk diantara adalah Coring dan Kanarea. merupakan daerah urban yang terletak pada dataran rendah yang merupakan jalur transportasi umum ( poros Takalar ). Daerah ini sudah termasuk kota karena sebahagian besar penduduk mata pencahariannya ada yang pegawai negeri, wiraswasta, petani dll. Daerah ini berjarak dari pantai 8,5 km<sup>2</sup> dan jarak dari kota Kabupaten Somba Opu 12 km. Di Kecamatan bajeng daerah ini yang di pilih sebagai lokasi penelitian di yaitu Coring (Lingkungan Kalebajeng) yang berada disebelah timur dengan jumlah penduduk 3354 Jiwa dan Kanarea (Lingkungan Limbung) yang berada disebelah barat dengan jumlah penduduk

## B. Hasil Penelitian


Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data diperoleh data sebagai berikut:

### 1. Kepadatan Jentik *Ae.aegypti* di dusun Coring dan Kanarea selama bulan Januari-Maret 2010

Hasil analisis data mengenai kepadatan jentik di Dusun Coring dan Kanarea meliputi data House Index dan Container Index yang disajikan pada Histogram 1 dan 2 sebagai berikut.

#### 1.1 Nilai House Index (HI) di Dusun Coring dan Kanarea Pada Bulan Januari – Maret 2010.


Hasil perhitungan Nilai House Index (HI) disajikan pada Histogram 1. sebagai berikut :



Gambar 1. Histogram House Index (HI) di Dusun Coring dan Kanarea pada Bulan Januari – Maret 2010

## 1.2 Nilai Container Index (CI) di Dusun Coring dan Kanarea pada Bulan Januari – Maret 2010


Hasil perhitungan Container Index (CI) disajikan pada Histogram 2 sebagai berikut.



Gambar 2. Histogram Nilai Container Index (CI) di Dusun Coring dan Kanarea pada bulan Januari – Maret 2010


## 2. Hubungan antara Keberadaan Jentik dengan Pelaksanaan PSN

a. Hubungan antara keberadaan jentik dengan pelaksanaan PSN di Dusun Coring pada Bulan Januari – Maret 2010



Gambar 3. Histogram Hubungan Keberadaan jentik dengan Kegiatan PSN pada bulan Januari – Maret 2010


b. Hubungan Keberadaan Jentik dengan pelaksanaan PSN di dusun Kanarea pada Bulan Januari- Maret 2010.



Gambar 4. Histogram Hubungan Keberadaan jentik dengan Kegiatan PSN di dusun Kanarea pada bulan Januari – Maret 2010

### 3. Hubungan Keberadaan Jentik terhadap Pengetahuan


a. Hubungan keberadaan jentik terhadap pengetahuan di Dusun Coring Pada bulan Januari – Maret 2010.



Gambar 5. Histogram Hubungan Keberadaan jentik terhadap Pengetahuan di Dusun Coring Pada bulan Januari – Maret 2010

b. Hubungan keberadaan Jentik Terhadap Pengetahuan di Dusun Kanarea pada Bulan

januari- Maret 2010.



Gambar 6. Histogram Hubungan keberadaan jentik terhadap pengetahuan di Dusun Kanarea pada Bulan januari- Maret 2010.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Kepadatan Jentik *Ae.aegypti* di dusun Coring dan Kanarea selama bulan Januari-Maret 2010

Hasil analisis kepadatan jentik (histogram 1) memperoleh hasil prosentase rumah terinfeksi (HI) di dusun Coring pada bulan Januari sebanyak 42,9% dan pada bulan Februari mengalami penurunan menjadi 34,2% dan pada bulan Maret menjadi 22,89%. Pada dusun Kanarea persentase rumah terinfeksi (HI) pada bulan Januari sebanyak 31,4%, pada bulan Februari mengalami penurunan 25,71% dan pada bulan Maret menjadi 14,26%. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai kepadatan

jentik/Density Figure (DF) pada kedua dusun di bulan pertama (Januari 2010) tinggi dimana nilai DF Coring sebesar 6 dan nilai DF Kanarea sebesar 5, pada bulan Februari nilai DF Coring masih tinggi 5, sedangkan di dusun Kanarea nilai DF rendah 4. Pada bulan Maret tampak bahwa di kedua dusun kepadatan jentik rendah, Coring (DF=4) dan Kanarea (DF=3).

Tingginya kepadatan jentik di dusun Coring dan Kanarea pada bulan Januari dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu cuaca, pada bulan Januari saat sampling kondisi lingkungan lembab setelah hujan, suhu  $27^{\circ}\text{C}$  dan kelembaban 75%. Kondisi ini menyebabkan tempat-tempat penampungan air yang digunakan oleh penduduk baik TPA buatan yang berada di luar rumah (misalnya bak tampung, tempayan, ember, baskom, jerigen dan drum), non TPA (misalnya ban bekas, kaleng dan botol bekas) maupun TPA alami (lubang bambu) terisi air hujan sehingga menciptakan breeding site/tempat perkembanganbiakan bagi nyamuk tersebut.

Penurunan kepadatan jentik di bulan Februari dan Maret 2010 dipengaruhi oleh faktor kondisi lingkungan yang panas/kering karena tidak ada hujan, saat sampling suhu sebesar  $30^{\circ}\text{C}$  dan kelembaban sebesar 70%, juga karena masyarakat sudah rajin melaksanakan progam PSN dalam hal ini membersihkan TPA (histogram 2). Mereka sudah sadar akan resiko/bahaya keberadaan jentik.

Hasil penelitian Yuwono (1998) di beberapa kota di Indonesia menunjukkan bahwa tempat perindukan yang paling potensial teinfeksi adalah kontainer yang

digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti tempayan, bak mandi, ember, baskom, drum dan sejenisnya.

Hasil penelitian Bambang Yuniarto ( 2006 ) di Semarang, yang meneliti angka kepadatan jentik memperoleh hasil bahwa terdapat hubungan antara kecenderungan HI dan CI sebelum dan sesudah uji coba peran serta masyarakat dalam upaya PSN. Dari hasil penelitian didapatkan HI sebesar 18,6 %, BI sebesar 22,34% dimana termasuk dalam *density figure* 4 serta ABJ 81,38 % yang mana masih dibawah target ideal . Pada PSN 3M plus yang buruk, akan beresiko 8,13 x lebih besar untuk terkena DBD.

Hasil Penelitian Yudhastuti dan Vidiyani (2005) di Surabaya memperoleh hasil bahwa kepadatan jentik nyamuk *Ae.aegypti* di kelurahan Wonokusumo yang diukur dengan parameter HI=58%, CI=30,6%, BI=82% dan DF= 7 menunjukkan transmisi nyamuk *Ae.aegypti* tinggi. Jenis kontainer yang digunakan oleh masyarakat, serta kondisi lingkungan dalam hal ini kelembaban udara mempunyai hubungan dengan kepadatan jentik nyamuk *Ae.aegypti*

Hasyimi dan Mardjan (2004) menyatakan bahwa keberadaan tempat penampungan air dan kontainer yang digunakan sebagai *breeding site* sangat berhubungan dengan kepadatan jentik pada daerah tersebut serta mempunyai resiko terhadap penularan penyakit DBD.



## **2. Hubungan Keberadaan Jentik dengan Pelaksanaan PSN**

Hubungan keberadaan jentik dengan pelaksanaan PSN (Histogram 3) menunjukkan bahwa pada dusun Coring, responden yang ditemukan tempat penampungan airnya tidak terdapat jentik merupakan responden yang melakukan PSN 71%. Sedangkan responden yang tidak melakukan PSN dan tidak terdapat jentik sebesar 66%. Responden yang melakukan PSN tetapi terdapat jentik sebesar 28%, sedangkan yang tidak melakukan PSN dan terdapat jentik sebesar 33%. Responden yang melakukan PSN tetapi juga terdapat jentik kemungkinan disebabkan karena adanya breeding site yang lain di sekitar rumah responden yang dapat dimanfaatkan oleh nyamuk sebagai tempat untuk berkembangbiak ataukah faktor adanya nyamuk dewasa yang datang ke rumah responden untuk bertelur di TPA tersebut. Pada dusun Kanarea diperoleh hasil bahwa responden yang ditemukan tempat penampungan airnya tidak terdapat jentik merupakan responden yang melakukan PSN 85%

Responden yang tidak melakukan PSN dan tidak terdapat jentik sebesar 60%. Sedangkan Responden yang melakukan PSN tetapi terdapat jentik sebesar 15% . Responden yang tempat penampungan airnya terdapat jentik yang tidak melakukan PSN adalah sebesar 40%.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdul Rachan (2004), bahwa ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan, sikap dan praktik ibu rumah tangga dalam pemberantasan sarang nyamuk (PSN). Adanya

hubungan antara pelaksanaan PSN dengan keberadaan jentik dikarenakan responden atau ibu – ibu melaksanakan PSN sesuai standar sehingga tidak ditemukan jentik, sedangkan responden atau ibu – ibu yang melaksanakan PSN tidak sesuai standar ternyata dirumahnya ditemukan jentik pada tempat penampungan airnya.

Teori lain menyebutkan selama jentik tidak dibasmi, setiap hari akan muncul nyamuk baru yang menetas dari tempat perindukannya, karena itu cara yang paling tepat adalah membasmi jentik yang dikenal dengan pemberantasan sarang nyamuk. Dalam hal ini PSN harus dilakukan sesuai standar yaitu melaksanakan kegiatan 3M dengan teratur, menguras setiap minggu sekali, menutup tempat penampungan air setiap hari, dan mengubur atau membuang barang – barang yang dapat menampung air hujan.

### **3. Hubungan Keberadaan Jentik terhadap Pengetahuan Responden**

Hasil analisis mengenai hubungan pengetahuan responden dengan keberadaan jentik (Histogram 4.) pada dusun Coring diketahui bahwa responden dengan tingkat pengetahuan tinggi dan tidak ditemukan jentik pada tempat penampungan airnya sebesar 83% dan yang berpengetahuan rendah dan tidak terdapat jentik sebesar 58%. Sedangkan responden berpengetahuan tinggi dan ditemukan jentik pada tempat penampungan airnya sebesar 16% dan berpengetahuan rendah ditemukan jentik sebesar 41%. Pada dusun Kanarea diperoleh hasil bahwa responden yang berpengetahuan tinggi dan tidak ditemukan

jentik pada tempat penampungan air sebesar 90% dan responden yang berpengetahuan rendah tidak terdapat jentik sebesar 66%, pada tempat penampungan air yang ditemukan jentik berpengetahuan tinggi 10% dan responden yang berpengetahuan rendah ditemukan jentik pada tempat penampungan airnya sebesar 33%.

Hasil analisis mengenai hubungan pengetahuan responden dengan keberadaan jentik diketahui bahwa ternyata ada hubungan yang sangat kuat dan signifikan antara keberadaan jentik dengan pengetahuan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pengetahuan memiliki pengaruh, meskipun misalnya responden memiliki pengetahuan tinggi tetapi jarang melakukan PSN maka akan besar kemungkinannya terdapat jentik di tempat penampungan airnya. Sebaliknya responden pendidikan rendah, akan tetapi rajin melakukan kegiatan PSN maka kecil kemungkinannya terdapat jentik di tempat penampungan airnya. Mengapa? karena kita ketahui bahwa informasi mengenai PSN dalam hubungannya dengan penyakit DBD saat ini tidak hanya diperoleh melalui bangku pendidikan akan tetapi dapat diperoleh di berbagai media, baik media cetak misalnya koran, dan majalah maupun dari media massa misalnya televisi, radio, dll.

Menurut Notoatmodjo (1993) bahwa pengetahuan merupakan hasil tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap obyek tertentu melalui panca indera manusia. Pengetahuan responden mengenai Demam berdarah dengue, vector penyebabnya serta factor yang mempengaruhi keberadaan

jentik nyamuk *ae. aegypti* sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya penularan penyakit serta menekan perkembangan dan pertumbuhan jentik nyamuk *Ae. aegypti*. Kurangnya pengetahuan dapat berpengaruh pada tindakan yang akan dilakukan, karena menurut Green (1980) bahwa pengetahuan merupakan salah satu faktor predisposisi untuk terjadinya perilaku.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Dusun Coring dan Kanarea selama bulan Januari-Maret 2010 dapat disimpulkan bahwa kepadatan jentik di masing-masing dusun mengalami penurunan dimana pada dusun Coring pada bulan Januari HI (42,9%) dan CI (16,7%), Februari HI (34,28%) dan CI (13,76) menurun. Pada bulan Maret HI (22,83%) dan CI (9,42%). Sedangkan pada dusun Kanarea pada bulan Januari HI (31,4%) dan CI (14,3%), Februari HI (25,71%) dan CI (11,9%), Maret HI (14,28%) dan CI (7,93) hal tersebut karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan (suhu dan kelembaban) serta faktor kebiasaan masyarakat yang melakukan kegiatan PSN.

#### **B. Saran**

Disarankan kepada dinas terkait/petugas teknis di lapangan dalam hal ini Jumantik (Juru pemantau jentik) agar melakukan monitoring secara berkala terhadap tempat penampungan air di masyarakat sehingga populasi nyamuk vector DBD dapat ditekan dan proses penularan penyakit DBD dapat dicegah/ditanggulangi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, *Penyakit Demam Berdarah Dengue*, <http://melilea-organik.com>.2008 (8 Februari 2010)Christphers , S.S.R, *Aedes aegypti* Linnaeus The Yellow Fever Mosquito Its Life History, Bionomic and Structure. The university Press, Cambridge. 1960
- Akhmadi. “*Daur Kehidupan Nyamuk*”,<http://id. Wikipedia. Org/wiki/Nyamuk>. 2009.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa. *Gowa Dalam Angka 2008*. 2008.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Pentahsis dan Penerjemah Al-Qur'an, 1990
- Departemen Kesehatan. *Pedoman Survei Entomologi Demam Berdarah Dengue(DBD)*.Bakti Husada: Jakarta.2002
- Departemen Kesehatan. *Pencegahan dan Pemberantasan Bemam Berdarah Dengue (DBD) di Indonesia* .Bakti Husada: Jakarta.2005
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 1996. *Modul latihan Kader Dalam Pemberantasan Sarang Nyamuk Demam Berdarah Dengue*”. Jakarta.
- Departemen Kesehatan,1996. *Pencegahan dan Penanggulangan Demam Berdarah dengue DBD*.
- Depertemen Kesehatan, 1992. *Petunjuk Tekhnis Penggerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) DBD* Jakarta.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa. *Laporan Bulanan Bidang Kesehatan Kabupaten Gowa*.Makassar: Dinas Kesehatan. 2008
- Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah. 2004. *Info Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah*. Semarang: Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah

- Laksmono Widagdo, "Kepadatan jentik *aedes aegypti* sebagai indikator keberhasilan pemberantasan sarang nyamuk (3plus) Di kelurahan spondol wetan, semarang. 2003
- Marlina, Siti *Perilaku Keluarga terhadap Usaha Pencegahan Penyakit DBD di Lingkungan Rumah*, <http://Blog WordPress.com>. 2008 (8 Februari)
- Silalahi, Levi. 2008. *Demam Berdarah*. <http://www.pdat.co.id>. (25 Desember 2009)
- Sumekar DW. 2007. *Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Keberadaan Jentik Nyamuk*. Seminar Hasil Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat, Unila. Available from :<http://lemlit.unila.ac.id>.
- Yuwono Sugeng M. 1988. *Pengaruh Perubahan Lingkungan Fisik Terhadap Penetasan Telur Nyamuk *Aedes aegypti**. Berkl Kedokteran Masyarakat.
- WHO. 2004. *Panduan Lengkap Pencegahan dan Pengendalian Dengue dan Demam Berdarah Dengue* . Jakarta: EGC,

## LAMPIRAN I

### 1. Prosentase Jumlah Tempat Penampungan Air (TPA) buatan, Alami dan Non TPA di dusun Coring dan Kanarea selama bulan Januari-Maret 2010

Persentase TPA buatan, Alami dan Non TPA disajikan pada tabel 1 sebagai berikut :

Tabel 1. Persentase TPA (Buatan, alami dan Non TPA)

Dusun	TPA buatan		TPA Alami		Non TPA		Jumlah	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Coring	138	52,3	3	60	21	55,3	162	52,8
Kanarea	126	47,7	2	40	17	44,7	145	47,2
Jumlah	264		5		38		307	

### 2. Prosentase TPA yang terdapat Dalam Rumah (DR) dan Luar Rumah (LR) di Dusun Coring dan Kanarea selama bulan Januari-Maret 2010

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh data yang disajikan sebagai berikut:

Tabel 2. Persentase TPA yang terdapat dalam Rumah dan Luar Rumah

Dusun	DR		LR		Jumlah	
	n	%	n	%	N	%
<b>Coring</b>	120	54,8	18	40	233	50,17
<b>Kanarea</b>	99	45,2	27	60	231	49,83
<b>Jumlah</b>	219		45		464	



**3. Jumlah dan Persentase TPA Menurut Jenis Bahan Dasar (Tanah liat, Semen, Palstik dan Alumunium) di dusun Coring dan Kanarea selama bulan Januari-Maret 2010**

Hasil Analisis data mengenai jenis bahan dasar (Tanah liat, Semen, Palstik dan Alumunium) yang disajikan pada tabel 3. Sebagai berikut

Tabel 3. \Persentase TPA Menurut Jenis Bahan (Tanah liat, Semen, Plastik dan Alumunium).

Dusun	% TPA Menurut Bahan							
	Tanah liat		Semen		Plastik		Alumunium	
	n	%	n	%	n	%	N	%
<b>Coring</b>	15	48,4	16	47,1	75	53,2	2	67
<b>Kanarea</b>	16	51,6	18	52,9	66	46,8	1	33
<b>Jumlah</b>	31		34		141		3	

**4. Kepadatan Jentik *Ae.aegypti* di dusun Coring dan Kanarea selama bulan Januari -Maret 2010**

Tabel 1.1 HI di Dusun Coring dan Kanarea selama bulan Januari-Maret 2010

No	Dusun	Jumlah rumah diperiksa	Januari		HI %	Februari		HI%	Maret		HI%
			Jentik			Jentik			Jentik		
			Ada	tidak ada		ada	tidak ada		ada	tidak ada	
1	Coring	35	15	20	42,9	12	23	34,28	8	27	22,85
2	Kanarea	35	11	24	31,4	9	26	25,71	5	30	14,28

Tabel 1.2 CI di Dusun Coring dan Kanarea selama Januari-Maret 2010

No.	Dusun	Januari			Februari			Maret		
		Entik	diperiksa	CI (%)	+jentik	diperiksa	CI (%)	+jentik	diperiksa	CI (%)
1	Coring	23	138	16,7	19	138	13,76	13	138	9,42
2	Kanarea	18	126	14,3	15	126	11,9	10	126	7,93

### 5. Hubungan antara Keberadaan jentik dan Pelaksanaan PSN

Hasil analisis data mengenai hubungan antara Keberadaan dan pelaksanaan PSN

Jentik di dusun Coring dan Kanarea yang disajikan pada tabel 5 sebagai berikut

Tabel 5. Hubungan antara keberadaan jentik dan pelaksanaan PSN.

No	Dusun	PSN	Jentik		Total
			Ada	tidak ada	
1	Coring	Melakukan	4 (28%)	10 (71%)	14
		Tidak melakukan	7 (33%)	14 (66%)	21
2	Kanarea	Melakukan	3 (15%)	17 (85%)	20
		Tidak melakukan	6 (40%)	9 (60%)	15

## 6. Hubungan antara Keberadaan jentik dan Pengetahuan Responden

Hasil analisis data mengenai hubungan antara Keberadaan jentik dan pengetahuan Responden di dusun Coring dan Kanarea yang disajikan pada tabel 6 sebagai berikut:

Tabel 6. Hubungan antara keberadaan jentik dan pengetahuan responden

No	Dusun	Pengetahuan	Jentik		Total
			Ada	tidak ada	
1	Coring	Tinggi	3 (16%)	15 (89%)	18
		Rendah	7 (41%)	10 (58%)	17
2	Kanarea	Tinggi	2 (10%)	18 (90%)	20
		Rendah	5 (33%)	10 (66%)	15

## **RIWAYAT HIDUP**

**Marlina, S.Si** lahir di Desa Lasape Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang pada tanggal 27

November 1988, anak terakhir dari 7 bersaudara dari pasangan Rahim dan Hinra. Penulis menempuh pendidikan formal pada tahun 1994-2000 di SD Negeri 38 Duampanua. Pada tahun 2000-2003 penulis melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Ittihadul Usrati Waljamaah DDI – Benteng Sawitto Kab.Pinrang. Kemudian pada tahun 2003-2006 penulis melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Mazra'atul-Akhirah Baramuli Pinrang. Pada tahun 2006 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan tinggi melalui jalur ujian UML di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan diterima di Jurusan Biologi Sains.

Selama menjalani pendidikan sebagai mahasiswa, pada tahun 2007 penulis pernah menjabat sebagai Bendahara Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Biologi. Dan pernah menjabat sebagai asisten Laboratorium Biologi Sains pada beberapa mata kuliah praktikum. Penulis menyelesaikan rangkaian tugas akhir, yaitu mengikuti Kerja Praktek (KP) di PDAM Kota Makassar, dan KKN di Desa Julu'Bori Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.

Berkat rahmat Allah SWT dan diiringi do'a dari kedua orang tua, perjuangan panjang penulis dalam mengikuti pendidikan di perguruan tinggi dapat berhasil dalam waktu 4 tahun, penulis memperoleh gelar Sarjana Sains (S.Si). Semoga segala ilmu yang telah diperoleh dan dimiliki dapat bermanfaat bagi bangsa dan agama serta dapat dilanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Amin.....Ya Rabbal Alamin.