

**STUDI FARMAKOFOR RESEPTOR ESTROGEN α
SEBAGAI TARGET TERAPI
KANKER SERVIKS**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi
pada Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

FATMAWATI S.
NIM. 70100110043

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2014**

**STUDI FARMAKOFOR RESEPTOR ESTROGEN α
SEBAGAI TARGET TERAPI
KANKER SERVIKS**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi
pada Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

FATMAWATI S.
NIM. 70100110043

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2014**

KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Subhanallah wal hamdulillah atas limpahan puji dan syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kepada Zat yang Maha Agung Allah swt. atas limpahan rahmat, rezeki, dan karunia-Nya, sehingga skripsi yang berjudul "Studi Farmakofor Reseptor Estrogen α sebagai Target Terapi Kanker Serviks" ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana dari Program Studi Farmasi di Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

Dalam kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu penelitian ini hingga skripsi ini selesai dibuat, terutama kepada:

1. Ayahanda Slamet AT dan Ibunda Rosnawati, saudara-saudari, serta semua anggota keluarga yang senantiasa memberi dukungan baik dari segi materi maupun motivasi serta do'a yang tak pernah hentinya berikan kepada penulis.
2. Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing, HT., M.S. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar.
3. Yang terhormat Bapak Nursalam Hamzah, S.Si., M.Si., Apt. selaku pembimbing I dan Bapak Ahmad Najib, S.Si., M.Farm., Apt. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan segenap jiwa, tenaga dan ilmu yang begitu besar dan tak ternilai dengan apapun demi penyelesaian skripsi ini dengan baik.

4. Yang terhormat Bapak Drs. Hasyim Bariun, M. Si., Apt. selaku penguji kompetensi dan Bapak Dr. Nurhidayat Muh. Said, M. Ag. selaku penguji agama yang telah meluangkan waktu dari sekian banyak kesibukannya dalam menguji dan membimbing penulis. Begitupun saran dan ilmu-ilmu baru yang sangat membantu dalam kesempurnaan skripsi ini.
5. Para dosen-dosen farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan ilmu-ilmu mereka yang begitu berarti bagi kami.
6. Kakak-kakak dan adik-adik seorganisasi terkhusus kepada Kak Dewi Marwa, S. Ag., M. Ag. atas motivasi, dukungan dan do'a selama penyusunan skripsi ini.
7. Teman-teman seperjuangan di Farmasi angkatan 2010 "Corrigensia", khususnya kelas Farmasi B, Ika Misqawati, Husnul Khatimah S., Kamsia Dg. Paewa, Fathiyah Nuhrang, Firdyawati, Fitriya Sakinah, Hasriadi, Hasriani, Heriana, Ika Lismayani, Irna Umar, Israyani, Isrul Zulfajrin, Juliandri, Jumatia, Jurandi Efendi, Khairunnisa, Mir'atun Syarifah, Muh. Agus Safar, Muh. Hidayat, Muh. Ali Khumaini, Muhammad Basir, Mukhlis Rauf, Mumang, Mustakim Masnur, Nasrawati Basir, Naswina Putrianti, Ninin Hidayah. Teman-teman di kelas farmasi A, Abidah Atqiah, Ummu Qoltsum, Arini serta teman-teman di farmasi C, Nursyahrani, Rahmawati, Nurmawaddah, dan masih banyak teman-teman yang tidak sempat ditulis disini.

8. Kakak-kakak dan adik-adik di Farmasi UIN Alauddin Makassar yang juga selalu memberi dukungan dan dorongan, serta pihak-pihak yang tidak sempat dituliskan satu persatu disini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, masukan berupa saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi menyempurnakan kekurangan yang ada. Semoga tulisan ini bermanfaat dengan segala keterbatasannya.

DAFTAR ISI

JUDUL		i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI		ii
PENGESAHAN		iii
KATA PENGANTAR		iv
DAFTAR ISI		vi
DAFTAR LAMPIRAN		viii
DAFTAR TABEL		ix
DAFTAR GAMBAR		x
ABSTRAK		xi
BAB I	PENDAHULUAN	1-13
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah	7
	C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian	7
	D. Kajian Pustaka	8
	E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
BAB II	TINJAUAN TEORITIS	14-47
	A. Tinjauan Islam	14
	B. Mekanisme Terjadinya Kanker	20
	C. Pengembangan Obat Kanker Serviks	22
	D. Reseptor Estrogen <i>Alfa</i>	28
	E. Farmakofor dan Virtual Skrining	40
	F. <i>Docking</i> Molekuler	43
	G. MOE (Molecular Operating Environment)	45
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	48-62
	A. Jenis dan Lokasi Penelitian	47
	B. Pendekatan Penelitian	47
	C. Alat dan Data Penelitian	47
	D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	55
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63-72
	A. Hasil Penelitian	62
	B. Pembahasan	67

BAB V	PENUTUP	75-77
	A. Kesimpulan	75
	B. Implikasi Penelitian	77
KEPUSTAKAAN		77-79
LAMPIRAN-LAMPIRAN		80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		104

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Daftar Perbandingan penyakit serviks/vagina pada tikus K14E6/K14E7 E2-diobati dengan atau tanpa terapi pengobatan ICI /raloxifen	23
Tabel II.2	Perbandingan penyakit serviks/vagina pada tikus K14E6/K14E7 E2-diobati dengan atau tanpa pengobatan pencegahan ICI	24
Tabel II.3	Protein – protein reseptor estrogen α yang di unduh dari data bank RCSB	30
Tabel III.1	Struktur Protein ER- α	55
Tabel IV.1	Persentase Kesamaan Interaksi Ligan-Protein	78

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Skema Kerja	78
Lampiran 2	Protein Reseptor Estrogen <i>Alfa</i>	81
Lampiran 3	Struktur Agonis dan Antagonis RE- α	83
Lampiran 4	Fingerprint Protein ER- α Menggunakan Program MOE	84
Lampiran 5	Interaksi 23 Ligan yang Terikat dengan RE- α	85
Lampiran 6	Farmakofor <i>Query</i>	97
Lampiran 7	Database Senyawa Kimia BahanAlam	98
Lampiran 8	Virtual Skrining 3560 Senyawa dengan Fitur Farmakofor	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Mekanisme Infeksi Kanker Serviks	21
Gambar II.2	Pengaruh RE- α terhadap karsinogenik serviks	25
Gambar II.3	Struktur Model Farmakofor	40
Gambar II.4	Pendekatan berbasis struktur dan model farmakofor	42
Gambar III.1	Databases	56
Gambar III.2	Jendela <i>Database Viewer</i>	56
Gambar III.3	Panel PLIF 23 Protein ER- α	57
Gambar III.4	Panel <i>Pharmacophore Query Editor</i>	58
Gambar III.5	Tampilan fitur-fitur farmakofor senyawa 23 dan panel <i>Pharmacophore Query Editor</i>	59
Gambar III.6	Panel <i>Flexible Alignment</i>	60
Gambar III.7	Penapisan virtual skrining zinc databases dengan fitur farmakofor	60
Gambar IV.1	Interaksi Ligan dengan Asam Amino	64
Gambar IV.2	Struktur Protein di <i>Superpose</i>	66
Gambar IV.3	Struktur Protein setelah disejajarkan (<i>Superpose</i>)	67
Gambar IV.4	Struktur Protein setelah di <i>Show Ligan</i>	67
Gambar IV.5	Struktur protein sejajar di <i>style ribbon</i> dalam bentuk <i>line</i>	68
Gambar IV.6	Fitur Farmakofor dan Query Editor	69
Gambar IV.7	Jarak antar fitur-fitur dalam farmakofor <i>query</i>	70
Gambar IV.8	Virtual Skrining Fitur Farmakofor dengan 3568 Senyawa	72
Gambar 7.1	Fingerprint Protein ER- α Menggunakan Program MOE	84
Gambar 8.1	Interaksi 23 Ligan yang Terikat dengan RE- α	85

Gambar 9.1	Farmakofor <i>Query</i>	97
Gambar 10.1	Database Senyawa Kimia BahanAlam	98
Gambar 11.1	Virtual Skrining 3560 Senyawa dengan Fitur Farmakofor	102

ABSTRACT

Name : Fatmawati S.

NIM : 70100110043

Title : Pharmacophore Study ER- α as Treatment Targeting Cervical Cancer

One of the target on chemotherapeutic agent especially for curing cervical cancer is the inhibition of estrogen activity on estrogen alpha receptors. Estrogen stimulates *human papilloma virus*/ HPV oncogene expression, promotes cervical cancer (CC) cell proliferation and prevents apoptosis. Therefore, blockage of estrogen function may have therapeutic application to CC. SERMs (*Selective Estrogen Receptor Modulator*) are the group of substances which inhibit the activity of estrogen on its receptor. The aim of this reserach is to determine the features that are important pharmacophore on anti-cercix cancer activity of compounds on ER- α that depended on this receptor. Modeling and determination pharmacophore features created using the program MOE application version 2009. Screening Virtual of chemical compounds to look for natural ingredients in accordance with pharmacophore features that have been made, performed using MOE. The result of the pharmacophore showed that 4-hydroxitamoxifen and its analogues have an antagonism activity on estrogen alpha receptor.

Key words: ER- α , cervix cancer, 4-hydroxitamoxifen, pharmacophore.

ABSTRAK

Nama : Fatmawati S.

NIM : 70100110043

Judul : Studi Farmakofor RE- α sebagai Target Terapi Kanker Serviks

Salah satu titik target pengobatan kanker khususnya kanker serviks adalah dengan menghambat aktivitas estrogen pada reseptor estrogen alfa (ER α). Estrogen menstimulasi ekspresi onkogen *human papilloma virus/ HPV*, mempromosikan proliferasi sel dan mencegah apoptosis pada kanker serviks (CC). Senyawa-senyawa yang mampu menghambat aktivitas estrogen pada reseptornya disebut SERMs (*Selective Estrogen Receptor Modulator*). Tujuan penelitian ini adalah menentukan fitur-fitur farmakofor Re α yang berperan penting pada aktivitas senyawa anti kanker serviks yang bergantung pada reseptor ini. Pemodelan dan penentuan fitur farmakofor dibuat dengan menggunakan program aplikasi MOE versi 2009. Virtual screening untuk mencari senyawa kimia dari bahan alam yang sesuai (*hits*) dengan fitur farmakofor yang telah dibuat. Adapun *query* farmakofor yang berperan dalam interaksi ligan-reseptor adalah antagonis 4-hidroxitamoxifen yang memiliki selektivitas terhadap RE- α .

Kata kunci: RE- α , kanker serviks, 4-hidroxitamoxifen, farmakofor.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Quran sebagai kalam Allah swt. yang digunakan sebagai penawar dan obat terhadap penyakit seseorang baik jasmani maupun rohani. Hal ini dijelaskan oleh Allah swt. dalam surah QS. Yunus/10: 107.

وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ
لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٧﴾

Terjemahannya:

Jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tak ada yang dapat menolak kurniaNya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (beriman (Departemen Agama RI, 2012: 428).

Islam memandang, bahwa kesehatan merupakan nikmat dan karunia Allah swt. yang wajib disyukuri. Selama menjalani kehidupan tidak ada manusia yang tidak pernah sakit, setiap manusia pasti pernah mengalami sakit baik ringan maupun berat. Saat mengalami kondisi sakit, manusia harus senantiasa berikhtiar mencari pengobatan, karena Allah swt. tidak akan menurunkan suatu penyakit apabila tidak menurunkan juga obatnya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra dari Nabi saw bersabda:

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

Artinya:

"Allah tidak akan menurunkan penyakit melainkan menurunkan obatnya juga" (HR. Al-Bukhari no. 5678). Salah satu dari sekian banyak penyakit yang dimaksud adalah kanker.

Kanker adalah sekelompok penyakit yang ditandai dengan pertumbuhan sel yang tidak terkendali dan penyebaran sel-sel abnormal (Anonim, 2012-2014: 1-2). Kanker dimulai di sel, sel akan membelah sehingga membentuk jaringan. Jaringan membentuk leher rahim dan organ lainnya di tubuh. Sel-sel di leher rahim yang normal tumbuh dan membelah untuk membentuk sel-sel baru ketika tubuh membutuhkannya. Ketika sel-sel normal menjadi tua atau rusak, maka sel akan mati, dan sel-sel baru akan menggantikan sel yang sudah mati. Kadang-kadang, proses ini berjalan salah. Sel-sel baru ini terbentuk secara terus menerus meski tubuh tidak membutuhkannya, dan sel-sel yang sudah tua atau rusak tidak mati seperti seharusnya maka akan terjadi penumpukan sel yang berlebihan sehingga membentuk suatu massa dari jaringan yang disebut dengan tumor (National Cancer Institute, 2012 : 8). Ketika kanker dimulai di leher rahim, maka disebut dengan kanker leher rahim (serviks). Leher rahim terletak di bagian bawah, di ujung rahim yang sempit. Leher rahim menghubungkan vagina dengan bagian atas rahim (Anonim, 2012 : 1). Kanker serviks dimulai pada sel-sel di permukaan leher rahim. Seiring dengan berjalannya waktu, kanker serviks dapat menyerang ke jaringan di sekitarnya melalui pembuluh getah bening ke kelenjar getah bening di dekatnya dengan demikian sel-sel kanker

tersebut dapat menyebar melalui pembuluh darah ke paru-paru, hati, bahkan ke tulang (metastais).

Pada tahun 2012, kanker serviks disetiap tahunnya terdapat 528.000 kasus baru sehingga kanker serviks dianggap kanker yang paling umum dengan urutan keempat yang mempengaruhi wanita di seluruh dunia, setelah kanker payudara, kolorektal, dan paru-paru (IARC, 2012 : 2). Menurut WHO pada tahun 2013, lebih dari 270.000 wanita meninggal tiap tahun diakibatkan oleh kanker serviks, lebih dari 85% dari kematian ini berada dinegara berkembang dan berpenghasilan rendah sehingga kanker serviks dianggap urutan kedua penyebab kematian pada wanita di seluruh dunia. Berdasarkan perkiraan dari *American Cancer Society*, untuk kanker serviks di Amerika Serikat pada tahun 2013 terdapat 12.340 kasus baru untuk kanker serviks invasif yang sudah terdiagnosis dan diperkirakan sekitar 4.030 wanita akan meninggal akibat kanker serviks (Anonim, 2013 : 3). Data dari tiga belas pusat patologi di Indonesia menunjukkan bahwa kanker serviks peringkat pertama di antara semua kanker (23,43% dari 10 jenis kanker paling umum dikalangan laki-laki dan perempuan 31,0% dari 10 jenis kanker yang paling umum dikalangan wanita) (Nuranna, L. dkk, 2012 : 147). Sedangkan pada tahun 2014, berjumlah 20.928 kasus kanker serviks yang baru didiagnosa setiap tahunnya sehingga kanker serviks menempati urutan kedua sebagai penyebab kanker perempuan di Indonesia mulai umur 15 sampai 44 tahun (Bruni, S. 2014: 5).

Tingkat kematian yang tinggi terutama disebabkan oleh kurangnya terapi yang efektif untuk menghilangkan penyakit kanker serviks pada wanita dan kurangnya

respon terhadap kemoterapi penyakit pasca dioperasi. Di antara perempuan yang aktif secara seksual, faktor penyebab utama kanker serviks adalah infeksi *human papillomavirus* (HPV) (Anonim, 2013: 6), khususnya genotipe HPV 16 dan HPV 18 yang masing-masingnya ditemukan sekitar 60% dan 20% pada kanker serviks. Potensi tumorigenik virus ini berasal terutama dari dua onkogen virus, yaitu E6 dan E7, yang dikenal karena kemampuannya untuk menonaktifkan p53 dan protein pRb. Onkogen E6 dan E7 dalam perkembangannya pada kanker serviks dimulai di CIN1, CIN2, CIN3, kanker invasif, karsinogenik) dan pertumbuhan selanjutnya menjadi kanker serviks (Chung, 2013: 1). Terlebih untuk onkoprotein E7 yang berperan dalam menginduksi tumor serviks dan karsinogenesis serviks, bekerjasama secara sinergis dengan estrogen tepatnya 17β -estradiol (E_2) serta dapat mempertahankan lesi prakanker dan kanker setelah E7 dan E_2 muncul (Romero, R. L., 2013: 1594).

Dua reseptor estrogen inti yang berbeda, yaitu *reseptor estrogen alfa* ($ER\alpha$) dan *reseptor estrogen beta* ($ER\beta$) yang berperan dalam memediasi *signaling* estrogen dan mengatur jalannya pertumbuhan transkripsi gen, proliferasi, dan diferensiasi, diantara banyak proses seluler. Karena ER dapat mengatur proliferasi sel, sehingga reseptor estrogen ini dapat ditargetkan sebagai terapi dalam menghambat pertumbuhan kanker (Shanle, 2010: 1). Reseptor $ER\alpha$ terdapat di sel epitel, di otot rahim dan vagina, di sel-sel epitel dan stroma dari kelenjar susu, dalam sel teka dan epitel germinal ovarium, dan testis sel Leydig (Romero, R. L., 2013: 1595). Estrogen dan $ER\alpha$, khususnya ER terdapat dalam leher rahim, diperlukan untuk perubahan yang dinamis dalam epitel serviks, yang penting dalam mengatur perkembangan dan

fungsi reproduksi perempuan (Parisi, 2009: 1). Regulasi penting dari gen dalam menjaga pertumbuhan sel normal dan gangguan regulasi gen dikaitkan dengan kanker manusia, misalnya memahami mekanisme dari aktivasi gen dengan reseptor estrogen alpha ($ER\alpha$) (Ellison, 2010: 1).

Selanjutnya Chengjian Mao, dkk (2008) telah meneliti bahwa reseptor estrogen *alfa* ($ER\alpha$) memainkan peranan penting untuk beberapa jenis kanker pada manusia. Juga diungkapkan bahwa kebanyakan antagonis $ER\alpha$ terikat pada situs pengikatan ligan reseptor dan bersaing untuk berikatan dengan ligan estrogenik. Penelitian tersebut telah memperkuat penelitian-penelitian sebelumnya yang meneliti Reseptor Estrogen sebagai target aksi obat-obat anti kanker serviks yang baru, seperti Modulator Reseptor Estrogen Selektif (SERMs).

Dalam sebuah studi yang dilakukan oleh Chung dan Lambert, pada tikus transgenik E6/E7 berhasil diobati dengan Raloxifen yang secara spontan kanker serviks terobati, antagonis reseptor estrogen yang mengurangi resiko kanker payudara (Castle, 2011: 1). Kemudian pada tahun 2014 Chung, dkk. kembali melanjutkan penelitian mereka dan mengatakan bahwa pengobatan kanker serviks dengan obat raloxifen pada jangka pendek dapat mengakibatkan efek samping yaitu resistensi kembali pada kanker serviks ketika pengobatan dengan raloxifen dihentikan (Spurgeon, 2014: 1). Oleh karena itu, maka muncul keinginan dalam menemukan SERM baru yang mungkin terbukti lebih efektif sebagai agen hormonal atau terapeutik. Ligan ER yang mengurangi tingkat (serta aktifitas) dari ER yang disebut *Selective Estrogen Receptor Downregulators* (SERDs), dan karena SERDs tersebut

benar-benar ER tingkat rendah, SERDs berbeda dari SERM. SERDs seperti fulvestrant menjanjikan dalam pengobatan kanker payudara metastatik, karena mereka dapat menghambat pertumbuhan sel-sel kanker payudara resisten-tamoxifen.

Salah satu metode pengembangan obat yang paling mutakhir adalah berdasarkan pendekatan komputasi (*in silico*). Metode kimia komputasi telah dikembangkan dan banyak digunakan untuk pengembangan hipotesis farmakologi dan pengujian (Ekins et. al 2007: 21). Metode kimia komputasi memberikan hasil pengujian yang jauh lebih memadai dari prediksi teoritis, mudah untuk digunakan, tidak mahal dan aman (Rode et al. 2007: 118).

Beberapa pengembangan obat yang sampai sekarang ini masih dilakukan adalah pengembangan secara *in vitro/in vivo*. Dimana dalam hal ini, dapat menghabiskan waktu yang sangat lama, tenaga, dan biaya yang cukup besar.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dalam penelitian ini, akan dilakukan pencarian senyawa-senyawa yang berpotensi dari turunan sebagai agonis dan antagonis reseptor estrogen *alfa* sebagai target terapi kanker leher rahim (serviks) dengan bantuan komputer melalui software *Molecular Operating Environment* (MOE).

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah fitur farmakofor yang berperan dalam pengikatan ligan pada reseptor estrogen *alfa* ?
2. Bagaimanakah pandangan Islam dalam mendukung penemuan/ pengembangan obat baru ?

B. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Defenisi Operasional

Pharmacophore modeling adalah faktor fitur sterik dan elektronik yang diperlukan untuk memastikan interaksi optimal antarmolekul dengan target biologis dan untuk memicu atau memblokir aktivitas biologisnya. Fitur farmakofor didefinisikan pula sebagai akseptor proton, donor proton, aromatis, kation, dan anion. Pemodelan farmakofor merupakan metode yang secara cepat dalam mengidentifikasi obat baru dengan potensial yang kuat, sebagai target terapi yang relevan dengan menentukan geometri sisi aktifnya.

Senyawa agonis adalah senyawa obat yang dapat mengaktifkan reseptor untuk mencapai efek farmakologi, sedangkan senyawa antagonis adalah senyawa obat yang dapat memberikan respon lebih kecil dari respon agonis dan bekerja pada sisi reseptor yang sama.

Reseptor estrogen *alfa* adalah reseptor yang bertindak sebagai mediator proliferasi sel kanker serviks. Reseptor-reseptor tersebut diperoleh dari situs RCSB PDB (*Protein Data Bank*).

2. Ruang Lingkup Penelitian

Menemukan fitur-fitur farmakofor obat yang penting dalam aktivitas dan selektivitas sebagai antagonis reseptor estrogen *alfa*.

C. Kajian Pustaka

1. Sheng; *Pharmacophore Modeling and Applications in Drug Discovery: Challenges and Recent Advances*: Konsep farmakofor pertama kali diperkenalkan pada tahun 1909 oleh Ehrlich yang didefinisikan farmakofor sebagai 'kerangka molekul yang menghasilkan fitur penting sehingga bertanggung jawab untuk aktivitas biologis obat'. Setelah pengembangan lebih se-abad, konsep dasar farmakofor masih tetap tidak berubah, berbagai aplikasi telah diperluas. Menurut definisi baru-baru ini oleh IUPAC model farmakofor adalah “sekumpulan fitur sterik dan elektronik yang diperlukan untuk memastikan interaksi supramolekul optimal dengan target biologis tertentu dan untuk memicu (atau memblok) respon biologis”. Sebuah model farmakofor dapat dibentuk baik secara ligand-based, dengan mensuperposisikan seperangkat molekul aktif dan mengekstraksi fitur kimia yang penting untuk bioaktivitasnya, atau dengan cara yang berbasis struktur, dengan menelusuri kemungkinan titik interaksi antara target makromolekul dan ligan. Pendekatan farmakofor telah digunakan secara luas dalam virtual skrining, desain de novo dan aplikasi lain seperti optimasi dan desain obat multitarget.

2. Spurgeon, Megan E., dkk.; *Recurrence of Cervical Cancer in Mice after Selective Estrogen Receptor Modulator Therapy*: Estrogen dan reseptor nuklear yaitu reseptor estrogen *alfa*, adalah kofaktor yang diperlukan dalam inisiasi dan perkembangan karsinogenesis multistap dalam model tikus transgenik K14E6/E7 kanker serviks terkait dengan human papillomavirus. Baru-baru ini, laboratorium kami melaporkan bahwa raloxifen, modulator reseptor estrogen selektif, kanker yang

muncul di leher rahim dari K14E6/E7 tikus transgenik diobati dengan estrogen jangka panjang kini diperkenalkan. Di sini, kami mengevaluasi kambuhnya kanker serviks setelah terapi raloxifen dalam model praklinis pada *human papillomavirus* terkait dengan serviks karsinogenesis. Kami mengamati kambuhnya kanker serviks pada tikus kembali terkena estrogen setelah pengobatan raloxifen, meskipun bukti yang menunjukkan efek antagonis raloxifen bertahan dalam saluran reproduksi setelah pengobatan telah berhenti. Kami juga mengamati kambuhnya penyakit neoplastik pada tikus yang tidak lepas dengan estrogen eksogen, meskipun tingkat keparahan penyakit kurang. Penyakit neoplastik berulang dan kanker ditahan oleh fungsional reseptor estrogen *alfa* dan menanggapi penafsiran dengan raloxifen. Selain itu, pengobatan secara terus menerus pada tikus dengan raloxifen mencegah timbulnya penyakit berulang yang terlihat pada tikus ketika raloxifen dihentikan. Data pada penelitian ini menunjukkan bahwa sel-sel kanker serviks tidak sepenuhnya diberantas dengan raloxifen dan apakah dengan cepat memperluas pengobatan raloxifen dapat berhenti. Temuan ini menunjukkan bahwa periode pengobatan jangka panjang dengan raloxifen mungkin diperlukan untuk mencegah kambuhnya penyakit neoplastik dan kanker di saluran reproduksi pada tingkat yang lebih rendah.

3. Malagón, Cortés M. Enoc., dkk. *Gene Expression Profile Regulated by the HPV16 E7Oncoprotein and Estradiol in Cervical Tissue*: HPV 16 onkoprotein E7 dan 17β -estradiol merupakan faktor penting untuk induksi lesi prakanker dan kanker serviks. Studi tentang faktor-faktor ini sangat penting untuk pemahaman yang lebih baik mengenai tumorigenesis serviks. Di sini, Malagón menilai profil ekspresi gen

secara keseluruhan yang disebabkan oleh HPV 16 onkoprotein E7 dan 17β -estradiol pada jaringan serviks dari FvB dan K14 E7 tikus transgenik. Malagón menemukan bahwa perubahan yang paling drastis dalam ekspresi gen terjadi di K14 E7 dan FvB kelompok perlakuan dengan 17β -estradiol. Sejumlah besar ekspresi gen diferensial yang dinyatakan terlibat dalam respon imun yang diamati pada kelompok perlakuan 17β -estradiol. Onkoprotein E7 terutama mempengaruhi ekspresi gen yang terlibat pada metabolisme inseluler. Data *array mikro* pada jurnal ini juga mengidentifikasi ekspresi gen diferensial bahwa sebelumnya belum pernah dilaporkan pada kanker serviks. Identifikasi gen diatur oleh E7 dan 17β -estradiol, memberikan dasar untuk studi lebih lanjut tentang peran mereka dalam karsinogenesis serviks.

4. Chung, Sang-Hyuk. *Requirement for Stromal Estrogen Receptor Alpha in Cervical Neoplasia*. Faktor etiologi besar bagi kanker serviks adalah berisiko tinggi *human papillomavirus* (HPV), yang mengkode onkogen E6 dan E7. Namun, HPV tidak cukup dan estrogen telah diusulkan sebagai kofaktor etiologi untuk penyakit ini. Kebutuhannya telah dibuktikan dalam model tikus yang terkena kanker serviks yang berhubungan dengan HPV, (misalnya tikus transgenik K14E7). Meskipun reseptor estrogen *alfa* ($ER\alpha$) menjadikan tikus resisten terhadap kanker serviks, keperluan jenis sel spesifik untuk $ER\alpha$ tidak diketahui. Dalam studi ini, kami menunjukkan bahwa penghapusan $ER\alpha$ stroma dengan cepat diinduksi mengakibatkan kemunduran displasia serviks pada tikus K14E7. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang dilakukan oleh Chung, bahwa $ER\alpha$ jaringan stroma diperlukan di leher rahim yang diinduksi oleh HPV karsinogenesis dan mengaitkan

mekanisme parakrin yang melibatkan *signaling* ER α dalam pengembangan kanker serviks ketergantungan estrogen. Ini adalah bukti pertama yang mendukung pentingnya ER α jaringan stroma pada penyakit neoplastik yang ketergantungan estrogen pada saluran reproduksi wanita.

5. Lambert, Paul F.; *Prevention and Treatment of Cervical Cancer in Mice Using Estrogen Receptor Antagonists*. Sebagian besar kanker serviks manusia berhubungan dengan tipe *human papillomavirus* (HPV) yang berisiko tinggi. Dalam model tikus yang terkena kanker terkait HPV, estrogen diperlukan untuk pengembangan kanker leher rahim dan vagina. Reseptor estrogen *alfa* (ER α) juga diperlukan pada tikus pada saat kanker ini muncul. Data tersebut dengan pengamatan menunjukkan pada wanita bahwa penggunaan jangka panjang kontrasepsi oral atau hamil kembar secara signifikan meningkatkan risiko kanker serviks pada wanita yang telah positif HPV sebelumnya. Pada studi saat ini, kami memeriksa apakah obat yang mengganggu fungsi ER α efektif dalam mengobati atau mencegah kanker serviks pada tikus. Kami menyediakan bukti bahwa antagonis ER, ICI 182,780 (ICI), serta ER modulator selektif yaitu raloxifen; kanker efisien dan di kedua lesi prekursor serviks dan vagina. Selain itu, ICI mampu mencegah timbulnya kanker pada bantalan lesi prekursor tikus. Temuan ini menunjukkan nilai potensi antagonis ER dalam mengendalikan penyakit ginekologi di saluran reproduksi lebih rendah pada wanita.

6. Zhu, Manghong; *Bicyclic core estrogens as full antagonists: synthesis, biological evaluation and structure–activity relationships of estrogen receptor ligands based on bridged oxabicyclic core arylsulfonamides*. Senyawa yang

menghambat aksi estrogen melalui reseptor estrogen (ER) atau mengatur penurunan tingkat ER yang berguna untuk pengobatan kanker payudara dan gangguan endokrin. Dalam pencarian kami, struktur estrogen yang baru memiliki perancah inti dengan tiga-dimensi, kami menemukan beberapa senyawa inti 7-oxabicyclo-hepten yang terikat dengan baik ke ERs. Dari senyawa yang terbaik ini, ester fenil sulfonat (disebut OBHS untuk oxabicyclohepten sulfonat), adalah antagonis parsial pada kedua ER α dan ER β . Meskipun OBHS tidak memiliki kemiripan struktur dengan estrogen antagonis yang lain, tampaknya untuk mencapai kemiripan antagonis parsial dengan konformasinya dari ER yang melibatkan distorsi signifikan dari helix-11. Untuk meningkatkan sifat antagonis oxabisikloheptene ligan inti, kami memperluas fungsional yang beragam pada OBHS dengan mengganti gugus sulfonat dengan sulfonamida sekunder atau tersier (-SO₂NR-), penggantian molekul isoelektrik dan struktur iso yang berpotensi.

Komentar pembeda : penelitian yang akan dilakukan adalah menemukan fitur-fitur farmakofor ligan reseptor estrogen alfa yang penting dalam aktivitas dan selektivitas sebagai antagonis reseptor estrogen *alfa*.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menemukan fitur-fitur farmakofor ligan reseptor estrogen *alfa* yang berperan dalam aktivitas dan selektivitas reseptor estrogen *alfa*.
- b. Menemukan dalil-dalil tentang penemuan atau pengembangan obat.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Praktis : Menemukan senyawa baru yang selektif terhadap reseptor estrogen *alfa* sehingga berpotensi sebagai terapi kanker serviks.
- b) Teoritis : Mencari dan menemukan fitur-fitur farmakofor dengan cara *PLIF* dan *Pharmacopore searching* pada aplikasi *MOE*.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Islam

Kesehatan memiliki makna dan dimensi yang luas sesuai definisi menurut WHO/*World Health Organization* maupun Undang-undang Kesehatan, yaitu keadaan sehat yang meliputi aspek fisik, mental, spiritual dan sosial serta dapat produktif secara sosial maupun ekonomis (Notoatmodjo, 2003: 3-4). Menurut Quraish Shihab, terdapat istilah terkait dengan kesehatan yaitu “*afiat*” yang berarti perlindungan Allah untuk hamba-Nya dari segala macam bencana dan tipu daya dan berarti sehat yang sempurna. Dalam hal ini *afiat* merujuk pada manfaat dan kebaikan, sedangkan sehat diartikan pada keadaan baik (Hasman, 2012: 46).

Pembicaraan tentang kesehatan tidak bisa dilepaskan dari pembicaraan tentang penyakit. Konsep penyebab munculnya penyakit berkembang dari waktu ke waktu seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penemuan-penemuan baru di bidang kesehatan dan kedokteran (Bisri, 2007: 36).

Allah swt. berfirman sebagai berikut,

وَإِذَا مَرَضْتُ لَبِثْتُ فِي بَيْتِي فَأَنْزِلْنِي وَإِذَا مَرَضْتُ لَبِثْتُ فِي بَيْتِي فَأَنْزِلْنِي وَإِذَا مَرَضْتُ لَبِثْتُ فِي بَيْتِي فَأَنْزِلْنِي

Terjemahannya:

Dan apabila aku sakit, maka hanya Dia Yang menyembuhkan aku dan yang akan mematikan aku kemudian akan menghidupkan aku (Departemen Agama RI, 2005: 80-81).

Firma-Nya: *وَإِذَا مَرِضْتُ* dan *apabila aku sakit* berbeda dengan redaksi lainnya.

Perbedaan pertama adalah penggunaan kata *apabila* dan mengandung makna besarnya kemungkinan atau bahkan kepastian terjadinya apa yang dibicarakan, dalam hal ini adalah sakit. Ini mengisyaratkan bahwa bahwa sakit berat atau ringan, fisik atau mental merupakan salah satu keniscayaan hidup manusia. perbedaan kedua adalah redaksinya yang menyatakan “Apabila aku sakit” bukan “Apabila Allah menjadikan aku sakit”. Namun demikian, dalam hal penyembuhan seperti juga dalam pemberian hidayah, makan, dan minum secara tegas beliau menyatakan bahwa Yang melakukannya adalah Dia, Tuhan semesta alam (Shihab, 2002: 186).

Al-Quran sebagai kalam Allah swt. yang dapat digunakan sebagai penawar dan obat terhadap penyakit seseorang baik jasmani maupun rohani, tanpa terkecuali penyakit kanker, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah swt. dalam surah QS. Yunus/10: 107. Dalam ayat ini Allah swt. menegaskan keesaan-Nya dalam memelihara hamba-Nya. Hanya Dialah yang kuasa menghilangkan kesulitan hidup atau kemudharatan yang sedang menimpa hamba-Nya itu, baik kesulitan karena kekurangan harta atau pun karena terganggunya kesehatan dan perlakuan yang tidak adil dari orang lain. Segala kesulitan yang menimpa seseorang itu tentu ada sebab-sebabnya. Sebab-sebab itu terdapat dalam lingkungan hidup manusia, dan sebab-sebab itu diciptakan Allah swt. dan berada di bawah pentadbiran-Nya. Manusia berkat pengalamannya yang lama dan luas dapat mengetahui sebagian sebab-sebab itu. Misalnya dalam soal kesehatan, menurut pengalaman manusia bahwa suatu

bakteri tertentu yang menghinggapi tubuh manusia menjadi sebab bagi penyakit tertentu pula. Karena itu manusia menjaga dirinya dari bakteri tersebut dan bilamana dia terkena penyakit disebabkan bakteri itu tentulah dia menghilangkan bakteri itu. Namun bukanlah suatu kepastian, sebab lenyapnya bakteri itu hanya dengan izin Allah swt. Demikian pula dalam bidang kehidupan manusia lainnya, seperti bidang sosial, ekonomi dan politik. Bilamana mereka mengalami kesulitan tentu ada sebab-sebabnya dan sebab-sebab itu berada dalam lingkungan mereka sendiri. Kewajiban manusia itu sendiri mencari sebab itu agar terlepas dari akibatnya sambil berdoa kepada Allah dengan sepuh hati serta tawakal kepada-Nya. Sesudah menyatakan tentang kesulitan hidup yang menimpa manusia, Allah menyatakan pula tentang kenikmatan dan kesenangan yang dialami manusia. Mengenai kesenangan dan kelapangan hidup ini Allah menyatakan bahwa jika Dia berkehendak dengan iradat-Nya melimpahkannya kepada manusia, maka tak seorang pun yang dapat menjadi penghambat, sebab kebahagiaan dan kesenangan itu adalah karunia-Nya kepada hamba-Nya dan menurut iradat-Nya. Apa yang dikehendaki-Nya pasti terjadi, dan Allah tidak terikat kepada suatu sebab dalam memberikan kesenangan dan kebaikan itu. Karunia Allah atas hamba-Nya berdasarkan keluasan rahmat-Nya (Asbabun Nuzul, Tafsiran Surah Yunus: 2007).

Islam memandang, bahwa kesehatan merupakan nikmat dan karunia Allah swt. yang wajib disyukuri. Selama menjalani kehidupan tidak ada manusia yang tidak pernah sakit, setiap manusia pasti pernah mengalami sakit baik ringan maupun berat. Saat mengalami kondisi sakit, manusia harus senantiasa berikhtiar mencari

pengobatan, karena Allah swt. tidak akan menurunkan suatu penyakit apabila tidak menurunkan juga obatnya. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari yang artinya, "Allah tidak akan menurunkan penyakit melainkan menurunkan obatnya juga". Ungkapan "Setiap penyakit ada obatnya" bersifat umum sehingga di dalamnya juga termasuk penyakit-penyakit mematikan dan berbagai penyakit yang masih sulit untuk disembuhkan, seperti kanker. Allah SWT. telah menjadikan penyakit dan obat-obatan untuk menyembuhkannya.

Kanker adalah sekelompok penyakit yang ditandai dengan pertumbuhan sel yang tidak terkendali dan penyebaran sel-sel abnormal. Jika menyebarkan tidak terkontrol, dapat mengakibatkan kematian. Kanker disebabkan oleh faktor eksternal (tembakau, organisme yang menular, gizi buruk, bahan kimia, dan radiasi) dan faktor internal (mewarisi mutasi, hormon, kondisi kekebalan tubuh, dan mutasi yang terjadi dari metabolisme) (Anonim, 2012-2014: 1-2).

Sejatinya, kanker bukanlah penyakit baru. Di era kejayaan peradaban Islam, para dokter muslim telah mampu mendiagnosis dan mengobati penyakit kanker. Tak hanya itu, dokter muslim, seperti Ibnu Sina dan al-Baitar pun telah menemukan obat untuk menyembuhkan penyakit yang mematikan itu, dalam al-Baitar, seorang ilmuwan Muslim abad ke-12 M yang berhasil menemukan ramuan herbal untuk mengobati kanker bernama Hindiba. Ramuan Hindiba yang ditemukan al-Baitar itu mengandung zat antikanker yang juga bisa menyembuhkan tumor dan gangguan-gangguan neoplastic. Menurut teks pengobatan kuno, kemampuan pengobatan kanker dengan menggunakan Hindiba didasarkan atas pertimbangan teoritis pengobatan,

yakni efek obat-obatan medis beroperasi sesuai dengan sifat dari konstituen. Menurut Prof Nil, konstituen yang dihasilkan dari dekomposisi akan memiliki efek yang disebut energi. Potensi kualitas panas dan dingin dalam sifat obat akan keluar sebagai hasil dekomposisi dalam tubuh. Prof Nil Sari dari Universitas Istanbul, Cerrahpasha Medical School dalam tulisannya berjudul "Hindiba: A Drug for Cancer Treatment", menuturkan, pada abad ke-12M, ilmuwan Muslim bernama Ibnu al-Baitar menemukan ramuan obat kanker atau tumor bernama "Hindiba". Obat kanker warisan peradaban Islam itu dipatenkan oleh Prof Nil Sari pada 1997 (Anonim, 2012). Khasiat Hindiba diteliti oleh Prof Nil Sari dengan menyajikan data yang mendalam mengenai latar belakang teori percobaan *invivo* dan *invitro* dengan sari herbal dari Turki. Ia memulai dari filsafat Turki Usmani, yang berakar dari pengobatan Islam. Dalam karyanya ini, disebutkan bahwa obat *Cichorium intybus* L dan *Crocus sativus* L diidentifikasi sebagai alternatif tanaman yang identik satu sama lain yang merupakan komponen aktif untuk pengobatan kanker (Anonim, 2009).

Rasulullah mengatakan sebuah prinsip dasar dalam pengobatan untuk setiap penyakit adalah perawatan (*ma anzala allahu daa; illa anzala lahu shifa'a- Kitaab al Tibb, al Bukhari*). Hal ini mendorong kita untuk mencari cara pengobatan. Dengan demikian, tradisi pengobatan ala Nabi tidak hanya berhenti pada pengajaran pengobatan oleh Rasulullah melainkan untuk mendorong manusia agar terus mencari dan bereksperimen dengan ilmu pengobatan baru (Tibbun Nabawi).

Oleh karena itu, dilakukanlah penelitian ini studi farmakofor reseptor estrogen *alfa* sebagai pengobatan kanker serviks, penelitian ini didasarkan pada keteraturan

dari struktur senyawa kimia yang akan diteliti. Hal ini berdasar pada prinsip keteraturan yang telah ada dalam al-quran, seperti pada QS. Yunus/10: 5–6.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ
وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾ إِنَّ فِي
أَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ ﴿٦﴾

Terjemahnya:

5. Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.

6. Sesungguhnya pada pertukaran malam dan siang itu dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan-Nya) bagi orang-orang yang bertakwa (Departemen Agama RI, 2005: 306).

Ayat ini masih merupakan lanjutan dari uraian tentang kuasa Allah swt. serta ilmu dan hikmah-Nya dalam mencipta, menguasai, dan mengatur alam raya. Ayat ini merupakan salah satu bukti keesaan Allah swt. dalam pemeliharaan-Nya terhadap manusia. Penutup ayat ini mengisyaratkan bahwa perubahan-perubahan yang terjadi di alam raya ini seharusnya menyadarkan manusia bahwa ia tidak akan tetap dalam keadaannya, tetapi pasti berubah. Aneka perubahan terjadi, antara lain yang terlihat sehari-hari, seperti kematian, dan karena itu hendaklah setiap orang berhati-hati dan mempersiapkan diri dengan perubahan-perubahan itu (Shihab, 2002, 5: 334–335).

A. Kanker Serviks (Leher Rahim)

Pada tahun 2012, kanker serviks disetiap tahunnya terdapat 528.000 kasus baru sehingga kanker serviks dianggap kanker yang paling umum dengan urutan keempat yang mempengaruhi wanita di seluruh dunia, setelah kanker payudara, kolorektal, dan paru-paru (IARC, 2012 : 2). Menurut WHO pada tahun 2013, lebih dari 270.000 wanita meninggal tiap tahun diakibatkan oleh kanker serviks, lebih dari 85% dari kematian ini berada di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah sehingga kanker serviks dianggap urutan kedua penyebab kematian pada wanita di seluruh dunia. Berdasarkan perkiraan dari American Cancer Society, untuk kanker serviks di Amerika Serikat pada tahun 2013 yaitu terdapat 12.340 kasus baru kanker serviks invasif yang terdiagnosis dan 4.030 wanita akan meninggal akibat kanker serviks (Anonim, 2013 : 3). Data dari tiga belas pusat patologi di Indonesia menunjukkan bahwa kanker serviks merupakan peringkat pertama di antara semua kanker (23,43% dari 10 jenis kanker paling umum dikalangan laki-laki dan pada perempuan 31,0% dari 10 jenis kanker yang paling umum dikalangan wanita) (Nuranna, L. dkk, 2012 : 147).

Kanker serviks adalah neoplasma ganas yang timbul dari sel-sel yang berasal dari leher rahim, salah satu gejala yang paling umum dari kanker serviks adalah pendarahan pada vagina yang abnormal, tetapi dalam beberapa kasus mungkin tidak ada gejala yang jelas sampai kanker telah berkembang menuju kebagian pinggung. Dua jenis utama dari sel-sel yang menutupi serviks adalah sel skuamosa (eksoserviks)

dan sel-sel kelenjar (endoserviks). Tempat di mana kedua jenis sel ini bertemu yang disebut zona transformasi. Sebagian besar kanker mulai di zona transformasi serviks.

Biasanya kanker tumbuh lambat yang mungkin tidak memiliki gejala langsung tetapi dapat ditemukan dengan tes Pap smear secara teratur (prosedur di mana sel-sel yang dikorek dari leher rahim dan melihat di bawah mikroskop). Kanker serviks dimulai dari kondisi pra-kanker yang disebut displasia. Kondisi pra-kanker ini dapat dideteksi dengan adanya bantuan alat Pap smear dan 100% dapat diobati. Oleh sebab itu, mengapa sangat penting bagi perempuan untuk mendapatkan pap smear secara rutin. Kebanyakan wanita yang didiagnosis dengan kanker serviks saat ini belum memiliki Pap smear secara teratur atau mereka tidak menindaklanjuti hasil Pap smear yang abnormal. Perubahan pra-kanker tidak terdeteksi dapat berkembang menjadi kanker serviks. Dari sanalah kanker serviks dapat menyebar (metastasis) ke kandung kemih, usus, paru-paru, dan hati. Hal ini dapat memakan waktu beberapa tahun untuk perubahan pra-kanker berubah menjadi kanker serviks. Pasien biasanya mulai mengalami masalah ketika kanker sudah maju dan telah menyebar.


Kanker serviks cenderung muncul pada usia pertengahan. Lebih dari setengah wanita yang didiagnosis adalah usia 35 dan 55 antara. Penyakit ini jarang terjadi pada wanita di bawah 20 dan hanya 20% dari wanita yang terinfeksi lebih dari 65 tahun.

Studi tentang etiologi kanker serviks Menunjukkan Virus Papilloma manusia (HPV) yang merupakan penyebab >99% dari kanker ini. Sedangkan jenis HPV terkait dengan penyakit kanker ini bervariasi di berbagai belahan dunia, hampir 70% yang

mengatakan bahwa jenis HPV yang terkait yaitu HPV 18 dan HPV 16 (Anonim, 2013: 3-4).

B. Mekanisme Terjadinya Kanker

HPV adalah virus DNA double stranded (dsDNA) yang menginfeksi keratinosit manusia dalam selaput lendir atau kulit. Dalam persisten infeksi HPV, urutan virus HPV selalu diintegrasikan ke dalam DNA selular, HPV menginduksi kanker. HPV bereplikasi hanya pada sel-sel basal epitel berlapis, infeksi HPV begitu dibatasi untuk sel-sel tersebut. Genom HPV, adalah ds-DNA mengandung Open Reading Frame (ORF) gen yang mengkodekan delapan jenis protein yang bertanggung jawab untuk replikasi virus. Produk gen ORF ini telah diklasifikasikan ke dalam 6 tahap awal (E1, E2, E3, E4, E5, E6) dan 2 stadium akhir (protein L1, L2). Setelah HPV menginfeksi sel inang, ekspresi protein HPV E1 dan E2. Ketika dsDNA bergabung dengan HPV ke dalam diri DNA, fungsi protein HPV E2 terganggu. E2 menekan fungsi E6 dan E7. Gangguan fungsi E2 akibatnya menyebabkan aktivasi pada onkoprotein E6/E7. Ekspresi Persistent oncoproteins E6 dan E7 menyebabkan kanker/malignant yang terinfeksi pada transformasi sel. Inaktivasi E6 sementara p53 dan PRB dilemahkan oleh E7. Inaktivasi kedua penekan gen tumor yang sangat penting (P53 dan PRB) yang mungkin penyebab etiologi utama perkembangan kanker (Andersson, 2008: 4-5).



Gambar II.1 Mekanisme Infeksi Kanker Serviks.

Infeksi HPV pada serviks dan peristiwa yang menyebabkan perkembangan kanker serviks, HPV menginfeksi sel epitel basal melalui *mikro-abrasi* di epitel serviks dan gen HPV awal (E1, E2, E4, E5, E6 dan E7) dinyatakan sebagai virus DNA bereplikasi dari DNA episomal (lingkaran biru). Genan termasuk L1 disajikan dalam lapisan epitel atas menghasilkan replikasi penuh virus. Protein L1 dan L2 membungkus genom virus untuk membentuk virion. Infeksi dengan beberapa tipe HPV risiko tinggi dapat menginduksi maju ke serviks intraepithelial neoplasia. Perkembangan lesi invasif mikro dan kanker invasif dikaitkan dengan integrasi genom HPV ke dalam kromosom inang (inti merah), dengan kerugian yang terkait atau gangguan dari beberapa virus gen, dan ekspresi regulasi onkogen E6 dan E7 berikutnya.

Beberapa jumlah laporan yang mendukung hubungan antara infeksi *human papilloma virus* (HPV) dan karsinogenesis serviks. Di sisi lain, tidak semua wanita terinfeksi HPV dapat menyebabkan kanker serviks, hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor lain yang terlibat bersama dengan HPV dalam menginduksi karsinogenesis serviks. Hormon seks telah terbukti dalam meningkatkan ekspresi gen dari HPV 16 dan HPV 18, dua sub tipe HPV yang paling terkait dengan kanker serviks. Selain itu, disebagian besar kasus kanker serviks muncul karena paparan estrogen yang sebagian besar sensitif pada leher rahim. Selain itu, penelitian

menunjukkan bahwa kerusakan DNA oleh metabolit estrogen mungkin menjadi faktor dalam karsinogenesis serviks.

Beberapa penelitian telah menunjukkan hubungan antara paparan hormonal dan risiko kanker serviks. Salah satu studi telah menunjukkan bahwa wanita yang menggunakan kontrasepsi oral berada pada peningkatan risiko kanker serviks dan bahwa karsinoma tersebut memiliki tingkat yang lebih tinggi dari reseptor estrogen (ER) dibandingkan wanita yang tidak pernah menggunakan estrogen yang terkandung pada kontrasepsi oral. Keseimbangan ini telah terbukti menjadi kofaktor bersama dengan HPV terhadap peningkatan risiko serviks kanker. Selain itu, perempuan yang ibunya diberi resep yang dietilstilbestrol (estrogen sintetis) selama kehamilan dapat beresiko tinggi sehingga meningkatkan adenosis servikovaginal dan serviks adenokarsinoma. Lesi serupa diamati pada tikus yang terkena dietilstilbestrol perinatal. Baru-baru ini study mengenai dengan perinatal ER α tikus *knocout* diobati dengan dietilstilbestrol telah menemukan bahwa ER α diperlukan untuk pengembangan adenosis servikovaginal (Nair, 2005: 1164).

C. Pengembangan Obat Kanker Serviks

Berdasarkan etiologi, sudah sangat jelas bahwa hubungan antara human papillomavirus (HPV) karsinogenik dan kanker serviks. Dua pendekatan baru untuk pencegahan kanker serviks, yaitu: 1) vaksinasi HPV untuk pencegahan primer HPV pada wanita muda dan 2) deteksi HPV karsinogenik untuk pencegahan sekunder melalui identifikasi dan mengobati serviks prakanker dan kanker dini.

Meskipun pengetahuan bahwa infeksi HPV merupakan penyebab kanker serviks, maka ditargetkan pendekatan secara imunologi untuk terapi seperti vaksin, namun terapeutik tersebut telah gagal. Chung dan Lambert menyajikan pendekatan baru menggunakan antagonis reseptor estrogen (modulator reseptor estrogen selektif atau SERM) untuk mengobati prakanker serviks dan kanker. Data epidemiologi estrogen yang memainkan peran dalam memberikan kontribusi pada karsinogenesis serviks (Castle, 2011 : 3).

a. Pengembangan dalam Pencegahan Kanker Serviks oleh ICI/*Intraepital Cervix Inhibitor*

CIN dan VIN dianggap lesi prekursor pada masing-masing kanker serviks dan vagina. Karena lesi ini sebagian besar hilang di ICI pada tikus atau tikus diobati dengan raloxifen (Tabel 1.), sehingga antagonis ER dapat mencegah timbulnya kanker serviks/vagina. Penghambatan ER α tidak hanya diperkenalkan dalam regresi kanker serviks tetapi juga mampu mencegah perkembangan kanker serviks.

Tabel II.1 Perbandingan penyakit serviks/vagina pada tikus K14E6/K14E7 E2-diobati dengan atau tanpa terapi pengobatan ICI /raloxifen.

Treatment group	Group size, n	No disease	Dysplasia only			Cancer and dysplasia	Cancer incidence, %	Tumor multiplicity, mean \pm SD
		Cervix (vagina)	CIN1 (VIN1)	CIN2 (VIN2)	CIN3 (VIN3)	Cervix (vagina)	Cervix (vagina)	Cervix (vagina)
E2(6m)	6*	0 (0)	0 (0)	0 (1)	0 (2)	6 (3)	100 (50)	3.3 \pm 1.1 (0.5 \pm 0.5)
E2(6m)/no antagonist(1m)	14	0 (0)	0 (0)	0 (3)	3 (6)	11 (5)	79 (36)	2.3 \pm 1.4 (0.4 \pm 0.6)
E2(6m)/ICI(1m)	13	12 (12)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (1)	8 (8)	0.2 \pm 0.5 (0.1 \pm 0.3)
E2(6m)/Ral(1m)	7	7 (6)	0 (0)	0 (0)	0 (1)	0 (0)	0 (0)	0.0 \pm 0.0 (0.0 \pm 0.0)

Tabel II.2 Perbandingan penyakit serviks/vagina pada tikus K14E6/K14E7 E2-diobati dengan atau tanpa pengobatan pencegahan ICI


Treatment group	Group size, n	No disease	Dysplasia only			Cancer and dysplasia	Cancer incidence, %
		Cervix (vagina)	CIN1 (VIN1)	CIN2 (VIN2)	CIN3 (VIN3)	Cervix (vagina)	Cervix (vagina)
E2(3m)	6	0 (2)	1 (2)	3 (2)	2 (0)	0 (0)	0 (0)
E2(6m)/preventive ICI(1m)	6	6 (6)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
E2(6m)*	6	0 (0)	0 (0)	0 (1)	0 (2)	6 (3)	100 (50)

Chun dan Lambert melakukan percobaan tambahan untuk menentukan apakah antagonis ER dapat mencegah timbulnya kanker serviks/vagina. Untuk mengatasi hal ini, Chun dan Lambert mulai mengobati tikus dengan ICI setelah pengobatan hanya 3 bulan pada onkogen E2 (Gambar II. d1), pada waktu periode di mana CINS/VINs masih tetap ada tetapi belum berkembang pada kanker (Gambar II. d2, Tabel 2, grup E2 (3m). Tikus diobati yang dengan ICI selama 1 bulan, pada waktu 3 bulan [E2 (6m) /pencegahan dengan kelompok ICI (1m)] menunjukkan kanker serviks atau tidak CIN pada akhir 6 bulan (Tabel 2). Epitel serviks dari E2 (6m) /pencegahan dengan kelompok ICI (1m) identik hampir dengan usia tikus -cocok diobati K14E6/K14E7 di estrus (Gambar 3B). Fenotipe ini sangat berbeda dari orang-orang dari kelompok E2 (6m) yang tidak menerima ICI ($P = 0,002$, kanker serviks; $P = 0.0009$, penyakit serviks).

Sebuah pertanyaan yang relevan Chung dan Lambert juga mencoba menjawab dalam penelitian ini adalah apakah kanker kambuh dengan cepat setelah pengobatan antagonis ER berhenti. Untuk menjawab pertanyaan itu, kami melakukan bagian dari tikus yaitu kelompok E2 (6m)/ICI (1m) untuk tambahan 6 minggu setelah

pengobatan 1 bulan dengan ICI, dan selama periode 6-minggu Chung dan Lambert menempatkan kembali tikus dalam pengobatan estrogen eksogen. Pada titik akhir Chung dan Lambert mengamati tidak ada kanker atau bahkan lesi CIN. Sebaliknya, kita menemukan epitel serviks yang tetap hypoplastik, mirip dengan yang diamati di kelompok E2 (6m)/ICI (1m). Chung dan Lambert menafsirkan data ini untuk menunjukkan bahwa ICI dibuktikan dalam model tikus untuk waktu yang lama pada tingkat waktu yang cukup tinggi dalam menghambat ER α .

Dengan demikian, penghambatan ER α tidak hanya diperkenalkan pada regresi kanker serviks tetapi juga mencegah perkembangan dari keganasan pada tikus. Kelompok E2 (6m)/pencegahan ICI (1m) juga ditampilkan secara signifikan tingkat lebih rendah dari penyakit vagina dibandingkan dengan E2 (6m) kelompok (P = 0,002) (Tabel 2) .



Gambar II.2 Pengaruh RE- α terhadap karsinogenik serviks.

Temuan dari studi praklinis Lambert, dkk konsisten dengan hipotesis mereka bahwa ER α diperlukan untuk kemajuan dan pemeliharaan kanker serviks pada tikus. Oleh karena itu, peneliti ini memperkirakan bahwa obat lain yang menghambat jalur estrogen - ER α dalam serviks harus memiliki efek terapi dan pencegahan yang sama pada kanker serviks. Chung dan Lambert telah menunjukkan bahwa ER α memang diperlukan untuk pengembangan ASM/ *Atypical Squamous Metaplasia*, yang dianggap prekursor untuk kanker serviks dan berasal dari jenis sel tertentu yang disebut reservasi sel atau sel cadangan dalam transformasi zona serviks. Secara bersama-sama, peneliti ini mengusulkan model di mana sel cadangan adalah jenis sel prekursor untuk karsinogenesis serviks, dan setelah perlahan-lahan infeksi HPV 16 menuju ke ASM, CIN, dan kemudian kanker di hadapan estrogen dan ER α . Kedua faktor ini juga diperlukan untuk persisten kanker serviks. Antagonis ER dapat menyebabkan regresi efisien kanker, displasia, dan ASM serta mencegah perkembangan ganas. Kebutuhan onkogen HPV di semua karsinogenesis serviks telah baik ditunjukkan dalam kedua saluran sel kanker yang diturunkan serviks dan model tikus transgenik. Meskipun model tikus transgenik untuk kanker serviks HPV terkait mengulangi sebagian besar aspek kanker serviks manusia, jelas bahwa penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menentukan apakah model yang diusulkan ini relevan dengan kanker serviks manusia. Jika terbukti relevan, maka itu akan memiliki implikasi yang jelas dalam pencegahan dan pengendalian dari serviks ganas pada wanita, dan hal itu mungkin memberikan alternatif untuk modalitas saat ini yang tersedia untuk mengobati kanker serviks dan lesi prekursor. Hal ini juga akan

meningkatkan beberapa kekhawatiran bahwa penggunaan tamoxifen, sebuah SERM dengan kerja agonis ER dalam saluran reproduksi wanita manusia, atau estrogen (hormon) terapi penggantian dapat menyebabkan kenaikan neoplasia dalam serviks pada wanita yang terinfeksi HPV (Chung dan Lambert, 2009: 19470-19471).

b. ER α sebagai target: modus baru pengobatan dan / atau mencegah kanker serviks

Telah diketahui bahwa ER α diperlukan dalam aktivitas karsinogenik estrogen dalam leher rahim dan estrogen yang memberikan kontribusi tidak hanya untuk genesis tetapi juga untuk pemeliharaan serviks penyakit neoplastik, utilitas obat antagonis ER α dalam mengobati atau mencegah kanker serviks telah dievaluasi dengan menggunakan model tikus transgenik HPV, dua antagonis ER α telah dievaluasi, yaitu raloxifen dan fulvestrant. Obat tersebut telah disetujui oleh FDA untuk digunakan dalam pengobatan/pencegahan kanker payudara manusia, dan merupakan anggota obat dari kelas *selektive estrogen receptor modulator* (SERM). Keduanya adalah raloxifene dan fulvestrant yang sangat efektif dalam menghilangkan kanker serviks yang sudah ada dengan hanya masa pengobatan selama sebulan. Obat tersebut juga menghilangkan lesi CIN yang sudah ada, yang menyebabkan hipotesis bahwa antagonis ER α juga bisa mencegah kanker serviks yang timbul. Pengobatan dilakukan dengan fulvestrant pada tikus CIN, selama pengobatan dengan estrogen dapat mencegah dari lesi CIN menuju ke kanker. Dengan demikian, dalam model praklinis ini untuk kanker serviks terkait HPV, penghambatan fungsi ER α - yang

mengarah kehilangan dan pencegahan penyakit neoplastik serviks, memberikan bukti lebih lanjut untuk peran estrogen dan reseptor pada kanker serviks (Chung, 2010: 4).

D. Reseptor Estrogen Alfa/(RE- α)

Estrogen, melalui reseptor intinya yaitu *estrogen receptor alfa* (ER α) dan *estrogen receptor beta* (ER β), dan reseptor membran GPR30, mempengaruhi proses fisiologis di berbagai jaringan namun tidak terbatas pada saluran reproduksi wanita, payudara, usus, otak, tulang, jantung dan sistem kekebalan tubuh. Oleh karena itu, tidak mengherankan pula, jika estrogen terlibat dalam berbagai penyakit manusia termasuk kanker (misalnya payudara, endometrium, dan usus besar) dimana estrogen tersebut dapat mendorong atau menekan perkembangan tumor.

Reseptor ER- α terdapat di sel epitel, di otot rahim dan vagina, di sel-sel epitel dan stroma dari kelenjar susu, dalam sel teka dan epitel germinal ovarium, dan testis sel Leydig (Romero, R. L ,2013: 1595).

Serviks uterus merupakan bagian dari saluran reproduksi wanita yang sangat responsif terhadap estrogen. Selama siklus menstruasi, sel epitel serviks berproliferasi dan berdiferensiasi karena estrogen meningkat, sehingga epitel terjadi hiperplastik tanpa ditandai adanya perubahan patologis. Estrogen dan ER α , khususnya ER terdapat dalam leher rahim, diperlukan untuk perubahan yang dinamis dalam epitel serviks.

Reseptor estrogen *alfa* manusia (ER α) adalah reseptor inti yang penting dalam mengatur perkembangan dan fungsi reproduksi perempuan (Parisi, 2009: 1). Regulasi penting dari gen dalam menjaga pertumbuhan sel normal dan gangguan

regulasi gen dikaitkan dengan kanker manusia, misalnya memahami mekanisme dari aktivasi gen dengan reseptor estrogen alpha ($ER\alpha$) (Ellison, 2010: 1).


Data epidemiologi menunjukkan bahwa hubungan antara status hormonal, penggunaan kontrasepsi hormonal dan paritas dan risiko lesi preneoplastik serviks dan kanker serviks. Bukti eksperimental yang bersumber dari asosiasi primer mengatakan fakta bahwa tingkat endogen hormon steroid, progesteron yang merupakan bahan utama kontrasepsi oral dan suntik kontrasepsi hormonal dapat meningkat selama kehamilan dan studi eksperimen secara *in vitro* menunjukkan bahwa hadirnya elemen hormonal dalam LCR HPV mukosa berisiko tinggi dan peningkatan produksi protein E6 dalam menanggapi rangsangan hormonal eksogen. Adapula juga bukti eksperimen bahwa hormon dapat memediasi perubahan status kekebalan mukosa serviks.

Dalam review literatur, Pater et al. (1994) meringkas bukti yang mendukung hubungan antara hormon dan tumorigenesis HPV- yang dimediasi. Beberapa laporan sebelumnya mengamati transformasi hormon-ditunjukkan pada sel tikus primer, menyebabkan keratinosit genital dan meningkatkan ekspresi HPV pada sel-sel leher rahim. Selain itu, penghambatan transformasi dan ekspresi oleh anti-hormon (misalnya RU-486) telah diamati dalam beberapa laporan. Sejak saat itu, bukti-bukti untuk mendukung peran hormon, termasuk estrogen dan progesteron, dalam peningkatan ekspresi HPV telah diakumulasi. Baru-baru ini, bukti peran co-karsinogenik bagi hormon pada kanker serviks diakumulasikan dari studi yang dilakukan pada tikus transgenik terinfeksi HPV. Menunjukkan bahwa paparan K14-

HPV 16 tikus transgenik untuk 17β -estradiol meningkatkan perkembangbiakan sel dalam epitel skuamosa serviks dan vagina dan menghasilkan *up-regulasi* seiring dengan ekspresi gen E6/E7 melalui semua tahapan karsinogenesis. Selain itu, paparan K14-HPV 16 pada tikus transgenik terhadap estrogen diinduksi ke kelenjar hiperplasia di bawah rahim, dan paparan terus-menerus terhadap estrogen mengakibatkan pengembangan metaplasia skuamosa dan perkembangan neoplastik pada kanker serviks (Anonim, 2007: 449).

Berikut ini protein-protein reseptor estrogen alfa ($ER\alpha$) yang di upload dari situs data bank RCSB.

Tabel II.3. Protein – protein reseptor estrogen α yang di unduh dari data bank RCSB.

No.	Kode protein	Ikatan	Ligan	Protein
1.	4IUI	1. Ikatan hidrogen 2. NH_2	4-[1-butyl-7-(trifluoromethyl)-1H-indazol-3-yl]benzene-1,3-diol	Glu 353A Arg 394A
Mode Ikatan:				
				
2.	4IU7	1. Ikatan hidrogen 2. NH_2	4-[2-ethyl-7-(trifluoromethyl)-2H-indazol-3-yl]benzene-	Glu 353A Arg 394A Leu 346A


			1,3-diol	
Model ikatan:				
3.	4IV2	1. Ikatan hidrogen 2. $\text{NH}_2 - \text{H}_2\text{N}$	4-[1-(2-methylpropyl)-7-(trifluoromethyl)-1H-indazol-3-yl]benzene-1,3-diol	Glu 353A Arg 394A
Mode ikatan:				
4.	4IV4	1. Ikatan hidrogen 2. $\text{H}_2\text{N} - \text{NH}$	4-[2-(2-methylpropyl)-7-(trifluoromethyl)-2H-indazol-3-yl]benzene-1,3-diol	Leu 346A Glu 353A Arg 394A

Mode ikatan:				
5.	4IVW	1. Ikatan hidrogen 2. H ₂ N – NH	4-[2-benzyl-7-(trifluoromethyl)-2H-indazol-3-yl]benzene-1,3-diol	Glu 353A Met 388A Leu 346A Arg 394A
Mode ikatan:				
6.	4IVY	1. Ikatan hidrogen 2. OH	4-[1-(but-3-en-1-yl)-7-(trifluoromethyl)-1H-indazol-3-yl]benzene-1,3-diol	Arg 394A Glu 353A
Mode ikatan:				

7.	4IW6	1. Ikatan hidrogen 2. H ₂ N – NH	4-[2-(but-3-en-1-yl)-7-(trifluoromethyl)-2H-indazol-3-yl]benzene-1,3-diol	Leu 346A Glu 353A Arg 394A
Mode ikatan:				
8.	4IW8	1. Ikatan hidrogen 2. H ₂ N – NH	4-[1-(3-methylbut-2-en-1-yl)-7 (trifluoromethyl)- 1H-indazol-3-yl]benzene-1,3-diol	Glu 353A Arg 394A
Mode ikatan:				
9.	4IWC	1. Ikatan hidrogen	4,4' – thiene - 2,5 –diylbis(3methyl phenol)	Arg 394A Glu 353A
Mode ikatan:				


10.	4IWF	1. Ikatan hidrogen 2. NH	2-chloro-3'-fluoro-3-[(E)-(hydroxy amino)methyl]biphenyl-4,4'-diol	Met 421A Arg 394A Glu 353A
Mode ikatan:				
11.	1SJ0	1. Ikatan hidrogen	(2S,3R)-2-(4-(2-(Piperidin-1YL)Ethoxy)Phenyl)-2,3-Dihydro-3-(4Hydroxi phenil)Benzo[b][1,4]Oxathiin-6-Ol	Glu 353A Gy 521A His 524A Arg 394A ASP 351A

Mode ikatan:




12.	1YIM	1. Ikatan hidrogen 2. NH	(2R,3R,4S)-3-(4-Hydroxi phenilL)-4-Methyl-2-[4-(2 Pyrolidin-1 Ylethoxy)Phenyl]C hroman- 6-Ol)	Glu 353A Arg 394A Gly 521A His 524A Asp 351A
-----	------	-----------------------------	---	--

Mode ikatan:



13.	3DT3	1. Ikatan Hidrogen	5-(4hydroxy phenoxy)6(3hydrox y-phenyl)-7methyl- naphthalen-2-ol	His 524A Phe 404A Glu 353A Arg 394A
-----	------	--------------------	--	--

Mode Ikatan:



14.	1YIN	1. Ikatan hidrogen 2. NH ⁺	(2R,3R,4S)-5-fluoro-3-(4-(4-Hydroxyphenyl)-4-Methyl-2-[4-(2-Pyrrolidin-1-Ylethoxy)Phenyl]Chroman-6-Ol)	Asp 351A Glu 353A His 524A
Mode Ikatan:				
15.	2R6W	1. ikatan hidrogen	[6-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-1-benzothien-3-yl]{4-[2-(4-methylpiperidin-1-yl)ethoxy]phenyl}methanone	Asp 351A Arg 394A Glu 353A His 524A
Mode Ikatan:				
16.	2R6Y	1. Ikatan hidrogen	[6-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-1-benzothien-3-yl][4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]methanone	Arg 394A Asp 351A Glu 353A Phe 406A

Mode Ikatan:				
17.	3ERD	1. Ikatan hidrogen	Diethylstilbestrol	Arg 394A Glu 353A His 524A
Mode Ikatan:				
18.	3ERT	1. Ikatan hidrogen	4-Hidroksitamoxifen	Arg 394A Glu 353A
Mode Ikatan:				


19.	2OUZ	1. Ikatan hidrogen 2. NH ⁺	(5R,6S)-6-Fenil-5-[4-(2-Pirolidin-1-Yleyhoxy)Fenil]-5,6,7,8 Tetrahidro naftalen-2-Ol	Arg 394A Asp 351A Glu 353A
Model Ikatan:				
20.	2IOG	1. Ikatan hidrogen	N-[(1R)-3-(4-Hydroxy phenyl)-1 Methyl propyl]-2-[2-Phenyl-6-(2-Piperidin-1-Ylethoxy)-1H-Indol-3YL]Acetamide	Arg 394A Asp 351A Glu 353A
Mode Ikatan:				
21.	2IOK	1. Ikatan hidrogen	N-[(1R)-3-(4Hidro fenil)-1-metilpropil]-2-(2-PFenil-1H-Indol-3-YL) Asetamida	Phe 404A

Mode Ikatan:				
22.	2JFA	1. Ikatan hidrogen 2. HN^+	Raloxifen	Arg 394A Asp 351A Glu 353A His 524A
Mode Ikatan:				
23.	2JF9	1. Ikatan hidrogen 2. HN^+	4-Hidroksitamoxifen	Arg 394A Asp 351A Glu 353A
Mode Ikatan:				

E. Farmakofor dan Virtual Skrining

Konsep farmakofor pertama kali diperkenalkan pada tahun 1909 oleh Ehrlich, yang didefinisikan farmakofor sebagai 'molekul framework' yang bertanggung jawab untuk aktivitas biologis obat. Menurut IUPAC, farmakofor model adalah sebuah ensembel fitur sterik dan elektronik yang diperlukan untuk memastikan interaksi supramolekul yang optimal dengan target biologis tertentu dan untuk memicu atau memblokir respon biologis.

Model farmakofor dapat dibentuk dengan cara ligand-based, yang mensuperposisikan satu set molekul aktif dan mengekstraksi fitur kimia umum yang penting untuk bioaktivitas atau dengan cara yang berbasis struktur, dengan menelusuri titik kemungkinan interaksi antara target dan ligan makromolekul. Pendekatan farmakofor telah digunakan secara luas salah satunya adalah virtual skrining (Yang, 2010: 444-445).




Gambar II.3 Struktur Model Farmakofor

Pemodelan farmakofor berbasis Ligan telah menjadi strategi komputasi utamanya untuk memudahkan penemuan obat tanpa adanya sasaran struktur makromolekul. Secara umum, generasi farmakofor dari beberapa ligan (biasanya disebut senyawa training set) melibatkan dua langkah utama: menciptakan ruang konformasi untuk masing-masing ligan pada training set untuk mewakili fleksibilitas konformasi ligan, dan menyetarakan beberapa ligan pada training set dan menentukan fitur kimia yang sama untuk membangun model farmakofor. Penanganan fleksibilitas konformasi ligan dan melakukan penyelarasan molekuler merupakan teknik utama dan juga kesulitan utama dalam pemodelan farmakofor berbasis ligan. Pada penelitian ini, perangkat yang digunakan adalah MOE (*Chemical Computing Group*, <http://www.chemcomp.com>) (Sheng, 2010: 445)

Pemodelan farmakofor berbasis struktur bekerja secara langsung dengan struktur 3D dari target makromolekul atau kompleks makromolekul-ligan. Protokol pemodelan farmakofor berbasis struktur melibatkan analisis fitur kimia komplementer dari situs aktif dan hubungannya, dan perakitan model yang farmakofor berikutnya dengan fitur yang dipilih. Metode pemodelan farmakofor berbasis struktur dapat diklasifikasikan lebih lanjut menjadi dua subkategori: berbasis makromolekul-ligan kompleks dan berbasis makromolekul (tanpa ligan). Pendekatan berbasis makromolekul-ligan kompleks mudah dalam menemukan situs-ligan pengikatan target makromolekul dan menentukan titik interaksi utama antara ligan dan makromolekul (Sheng, 2010: 446)

Setelah model farmakofor dihasilkan baik oleh pendekatan berbasis ligan atau berbasis struktur, hal itu dapat digunakan untuk *query* database kimia 3D untuk mencari ligan potensial, yang disebut adalah “farmakofor berbasis penapisan virtual” (virtual skrining). Berbasis farmakofor virtual skrining dan berbasis docking virtual skrining mewakili arus utama alat virtual skrining pada saat ini. Penapisan virtual digambarkan sebagai penggunaan perhitungan komputasi kinerja tinggi untuk menganalisis suatu database dari banyak senyawa kimia untuk mengidentifikasi probabilitas kandidat obat (Waszkowycz et al. 2001: 2).



Gambar II.4 Pendekatan berbasis struktur dan model farmakofor

Metode berbasis farmakofor virtual skrining mengurangi masalah yang timbul dari pertimbangan yang memadai fleksibilitas protein atau penggunaan kurang dirancang atau fungsi scoring dioptimalkan dengan memperkenalkan toleransi radius untuk setiap fitur farmakofor (Lyne, 2002: 1047-1055).

F. Docking Molekuler

Secara umum, *docking* molekul adalah penggunaan komputerisasi dalam memasang suatu molekul kecil pada reseptor (bagian ini sering didefinisikan sebagai sisi aktif dari enzim) melalui representasi yang dihasilkan komputerisasi, yang diikuti oleh evaluasi struktur molekul dalam hal ini yaitu bentuk dan karakteristiknya seperti parameter elektrostatik. Subyek *docking* adalah pembentukan kompleks protein-ligan non kovalen. Suatu molekul dengan struktur yang baik mengindikasikan bahwa molekul tersebut potensial sebagai ligan pengikat yang baik. Hasil dari *docking* secara umum meliputi prediksi afinitas molekul, termasuk *ranking* dari senyawa yang di-*docking* berdasarkan pada afinitasnya. Pemodelan interaksi intermolekular kompleks ligand-protein tidaklah mudah karena berbagai derajat kebebasan dan kebatasan Komputasi efek pelarut pada ikatan asosiasi (Gao, H. dkk, 2007; Abraham DJ, 2003; Nadendla, 2004).

Jika afinitas molekul pada reseptor dapat diprediksi dengan akurasi yang baik maka akan diperoleh berbagai keuntungan dari pendekatan ini. Salah satunya adalah kemampuan untuk melakukan *docking* dan *scoring* molekul dalam jumlah yang besar dalam waktu yang cukup singkat. Hanya senyawa dengan prediksi afinitas terbaik yang kemudian akan dipilih untuk disintesis dan/atau diujicobakan. Beberapa hal yang menjadi tantangan yang dihadapi dengan menggunakan program *docking* adalah untuk memprediksi *binding mode* yang benar dari molekul (dalam hal ini prediksi posisi yang berkaitan dengan orientasi dan konformasi molekul pada sisi pengikatan reseptor) dan untuk memprediksikan afinitas pengikatan dari senyawa (untuk

menghasilkan ranking relatif dari sejumlah senyawa) dengan kepercayaan tinggi (Gao, H. dkk, 2007).

Beberapa jenis docking molekuler berdasarkan sifat ligan dan reseptornya, yaitu (Mohan, V., 2005) :

- a. *rigid body docking*, dimana reseptor dan ligan keduanya diperlakukan kaku,
- b. *flexible ligand docking*, dimana reseptor diperlakukan kaku dan ligan dapat digerakkan ke segala arah,
- b. *flexible docking*, dimana fleksibilitas reseptor dan ligan dipertimbangkan.

Pada umumnya prosedur *docking* yang paling umum dipergunakan adalah model *flexible ligand docking*.

Fungsi *scoring* dapat dikategorikan dalam tiga kategori, yaitu (Mohan, V., 2005):

- a. *knowledge-based*, berdasarkan fungsi statistik untuk memasukkan aturan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan, interaksi pasangan atom dari eksperimen penentuan kompleks protein-ligan,
- b. *empirical-based*, menjumlahkan interaksi entalpi dan entropi dengan bobot relatif berdasarkan pengaturan kompleks protein-ligan,
- c. *forcefield-based*, fungsi ini hampir menyerupai *scoring* empirik dengan memprediksikan energi bebas pengikatan dari kompleks protein-ligan dengan penambahan kontribusi individual dari berbagai tipe interaksi.

G. MOE (Molecular Operating Environment)

MOE (*Molecular Operating Environment*) adalah platform pemodelan yang dikembangkan oleh *Chemical Computing Group*. Platform ini memungkinkan akses ke berbagai set alat komputasi mulai dari bioinformatika, pemodelan protein, desain berbasis struktur untuk persepsi farmakofor. Semua aplikasi ini telah terintegrasi dengan menggunakan *Scientific Vector Language (SVL)* (Mannhold dkk, 2006).

Permasalahan utama dalam pemanfaatan komputer ini adalah keberadaan aplikasi kimia komputasi yang memadai dan lengkap. Salah satu aplikasi kimia komputasi yang cukup memadai untuk penemuan obat adalah *Molecular Operating Environment (MOE)* yang dikembangkan oleh *Chemical Computing Group* (www.chemcomp.com, 2009).

Sedangkan (HKSA) Hubungan kuantitatif struktur-aktivitas merupakan metode komputasi atau model matematik untuk menemukan korelasi signifikan secara statistik antara struktur dan aktivitas. Dari segi desain obat, struktur di sini merujuk pada sifat dari molekul, substituen atau interaksi medan energi, serta aktivitas yang sesuai dengan suatu eksperimental biologi/biokimia seperti afinitas ikatan, aktivitas, toksisitas atau tingkat konstanta. Berbagai pendekatan HKSA telah dikembangkan secara bertahap selama rentang waktu lebih dari seratus tahun dan berfungsi sebagai alat prediktif yang penting, khususnya dalam desain obat-obatan (Verma *et al*, 2010: 95).

Kebanyakan semua metode HKSA fokus pada hal-hal berikut:

- 1) Untuk menghubungkan secara kuantitatif dan rekapitulasi hubungan antara kecenderungan perubahan struktur kimia dan perubahan masing-masing di titik akhir biologis dalam memahami sifat kimia yang paling mungkin sebagai penentu dalam aktivitas biologis.
- 2) Untuk mengoptimalkan senyawa induk yang ada sehingga dapat meningkatkan aktivitas biologis.
- 3) Untuk memprediksi aktivitas biologis dari senyawa yang belum teruji dan biasanya belum tersedia (Verma *et al*, 2010: 95)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Komputer Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, Mei – Juli 2014.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan eksperimentatif.




C. Alat dan Data Penelitian


1. Alat Penelitian


Perangkat yang digunakan pada penelitian ini adalah perangkat keras berupa satu set laptop dengan spesifikasi: Intel (R) Core (TM) 2 Duo CPU T5870, 2.00GHz RAM 1.00 GB, dan hard disk 135 GB, perangkat keras *Molecular Operating Environment (MOE)*, serta databes *Zinc*¹².


D. Data Penelitian


Struktur protein-protein reseptor estrogen *alfa* yang diunduh dari situs *Protein Data Bank /PDB RCSB*.


No.	Kode protein	Ligan
1.	4IU1	 <p>Chemical structure of the ligand in protein 4IU1. The ligand is a complex molecule featuring a benzimidazole core with a trifluoromethyl group (CF₃) and a propyl group. It is linked via an ether oxygen to a phenol ring, which is further connected to a guanidinium group (H₂N-C(=NH)-NH⁺-R). The phenol ring also has a hydroxyl group (OH). The guanidinium group is shown with a positive charge (⊕) on the central nitrogen. The ligand is shown interacting with several amino acid residues: Ala350A, Leu346A, and Leu387A are highlighted in green, indicating their proximity to the ligand. Arg394A is shown interacting with the guanidinium group. Glu353A is shown interacting with the ether oxygen of the phenol ring.</p>
2.	4IU7	 <p>Chemical structure of the ligand in protein 4IU7. The ligand is a complex molecule featuring a benzimidazole core with a trifluoromethyl group (CF₃) and a propyl group. It is linked via an ether oxygen to a phenol ring, which is further connected to a guanidinium group (H₂N-C(=NH)-NH⁺-R). The phenol ring also has a hydroxyl group (OH). The guanidinium group is shown with a positive charge (⊕) on the central nitrogen. The ligand is shown interacting with several amino acid residues: Leu391A, Leu387A, Leu346A, Met388A, and Phe404A are highlighted in green, indicating their proximity to the ligand. Arg394A is shown interacting with the guanidinium group. Glu353A is shown interacting with the ether oxygen of the phenol ring. Leu346A is shown interacting with the carbonyl group of the guanidinium group.</p>
3.	4IV2	 <p>Chemical structure of the ligand in protein 4IV2. The ligand is a complex molecule featuring a benzimidazole core with a trifluoromethyl group (CF₃) and a propyl group. It is linked via an ether oxygen to a phenol ring, which is further connected to a guanidinium group (H₂N-C(=NH)-NH⁺-R). The phenol ring also has a hydroxyl group (OH). The guanidinium group is shown with a positive charge (⊕) on the central nitrogen. The ligand is shown interacting with several amino acid residues: Ala350A, Phe404A, and Leu346A are highlighted in green, indicating their proximity to the ligand. Arg394A is shown interacting with the guanidinium group. Glu353A is shown interacting with the ether oxygen of the phenol ring.</p>
















Tabel III.1 Struktur Protein ER- α

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Penentuan Sidik Jari Interaksi Ligan Protein (Protein-Ligand Interaction Fingerprint/PLIF)

Sidik jari interaksi protein dengan ligan dibuat dengan menggunakan struktur-struktur protein reseptor estrogen *alfa* yang diunduh dari situs RCSB PDB. Seluruh struktur kemudian dibuka pada jendela MOE dan disejajarkan sehingga rantai memiliki struktur yang sama yang akan bergerak bersama-sama sebagai satu unit.

Dengan cara ini kompleks protein-ligan dapat disejajarkan. File kemudian disimpan sebagai database.



Gambar III.1 Databases


Database Viewer : c:/databasfatma.mdb

File Edit Display Compute Window Help

	mol	ligand	...	PLIF_raw	FP:PLIF	PLIF_ligidx
1	1SJO	1SJO	0	[[28,8,8,8,8,16	3 4 5 6 7	[28,28,[28,28],
2	1YIM	1YIM	0	[[29,8,8,8,8,17	3 4 5 6 7	[29,29,[29,29],
3	1YIN	1YIN	0	[[30,8,8,8,8,18	3 4 5 6 7	[30,30,[30,30],
4	2IOG	2IOG	0	[[34,5,5,5,18,5	3 4 5 6 7	[34,34,[34,34],
5	2IOK	2IOK	0	[[5,35,18,29,30	7 17	[5,[15,16,17,18
6	2JF9	2JF9	0	[[35,25,15,15,1	3 4 5 6 7	[25,25,[25,25],
7	2JFA	2JFA	0	[[29,4,4,4,4,63	3 4 5 6 7	[29,29,[29,29],
8	2OUZ	2OUZ	0	[[29,27,27,27,2	3 4 5 6 7	[29,29,[29,29],
9	2R6W	2R6W	0	[[30,24,24,24,2	3 4 5 6 7	[30,30,[30,30],
10	2R6Y	2R6Y	0	[[19,26,26,26,2	3 4 5 6 7	[19,19,[19,19],
11	3DT3	3DT3	0	[[15,15,15,27,4	7 8 10 13	[15,15,15,27,27
12	3ERD	3ERD	0	[[16,16,16,16,3	7 8 9 10 1	[[16,16],16,16,
13	3ERT	3ERT	0	[[15,15,15,22,1	5 7 8 10 1	[25,15,15,15,15
14	4IU7	4IU7	0	[[102,99,99,99,	1 2 7 8 10	[102,102,99,99,
15	4IUI	4IUI	0	[[171,171,58,9,	7 8 10 11	[[171,171],171,
16	4IV2	4IV2	0	[[101,101,101,1	7 8 10 11	[101,101,101,10
17	4IV4	4IV4	0	[[104,101,101,1	1 2 7 8 10	[104,104,101,10
18	4IVW	4IVW	0	[[106,80,80,80,	1 2 7 8 10	[106,106,[80,80
19	4IVY	4IVY	0	[[91,91,91,116,	7 8 10 11	[[91,91],[91,91
20	4IW6	4IW6	0	[[104,101,101,1	1 2 7 8 10	[104,104,[101,1
21	4IW8	4IW8	0	[[22,22,22,22,4	7 8 10 11	[[22,22],[22,22
22	4IWC	4IWC	0	[[97,97,97,97,9	7 8 9 10 1	[97,97,97,97,97
23	4IWF	4IWF	0	[[84,84,84,97,9	7 8 10 11	[84,84,84,84,97

Gambar III.2 Jendela Database Viewer

Dilakukan analisis PLIF dengan urutan perintah DBV | Compute | PLIF | Generate.




Gambar III.3 Panel PLIF 23 Protein ER- α

b. Penentuan Fitur Farmakofor

Pencarian farmakofor secara hipotetik digambarkan sebagai *pharmacophore query*, yaitu seperangkat fitur query yang biasanya dibuat dari titik anotasi ligan. Titik anotasi adalah penanda dalam ruang yang menunjukkan lokasi dan jenis atom atau gugus yang penting, seperti donor dan akseptor hidrogen, pusat aromatik, posisi proyeksi interaksi yang mungkin, muatan gugus, dan bio-isosterik. Poin-poin anotasi pada ligan adalah lokasi fitur yang potensial yang akan menjadi *query pharmacophore*. Fitur farmakofor ditentukan melalui empat tahapan yaitu membuat database konformasi, membuat *Query Pharmacophore*, mencari fitur farmakofor


berdasarkan Query Pharmacophore pada database konformasi, kemudian memperbaiki Query.



Gambar III.4 Tampilan panel *Pharmacophore Query Editor*

Query pharmacophore dibuat dengan menggunakan senyawa obat yang dianggap mampu terikat dengan reseptor estrogen *alfa* hingga dijadikan sebagai penuntun. Setelah senyawa penuntun terbuka pada Jendela MOE, *Pharmacophore Query Editor* dibuka dengan perintah *MOE >> File >> New >> Pharmacophore Query*. Skema anotasi farmakofor otomatis membuat *query pharmacophore*, sehingga pada Jendela MOE akan terlihat fitur-fitur farmakofor yang terdapat pada senyawa penuntun. Skema anotasi yang digunakan adalah *unified*. Titik anotasi yang sesuai dengan hasil penelitian interaksi ligan reseptor dan SAR dipilih untuk menjadi fitur farmakofor (Liu, J. dkk, 2012).


Langkah ketiga adalah menjalankan *pharmacophore search*. Tujuannya adalah untuk menguji *query pharmacophore* apakah cocok dengan fitur-fitur farmakofor dari keseluruhan senyawa atau sebagian senyawa yang terbaik, sehingga dapat ditentukan fitur berperan penting pada aktivitas senyawa. Perbaikan *query* dimaksudkan untuk memodifikasi *query* atau menghasilkan kecocokan dengan pengaturan *query* yang lebih ketat.



Gambar III.5 Tampilan fitur-fitur farmakofor senyawa 23 dan panel *Pharmacophore Query Editor*


Untuk molekul yang mirip dapat diselaraskan dan dibuat konsensus sehingga memudahkan untuk memilih fitur farmakofor. Konsensus farmakofor menyediakan fitur yang disarankan yang terdapat pada molekul-molekul yang selaras. Penyelarasan (*alignment*) senyawa-senyawa dalam database konformasi dengan menggunakan *MOE's*

Flexible Alignment, dengan urutan perintah *MOE >> Compute >> Simulations >> Flexible Alignment*.



Gambar III.6 Panel *Flexible Alignment*

Langkah keempat adalah virtual skrining, dengan mendownload terlebih dahulu beberapa ribu senyawa dari zinc¹² databes. Senyawa-senyawa yang telah didownload kemudian disimpan sebagai databes, untuk melakukan langkah virtual skrining ikuti beberapa perintah *MOE >> Compute >> Pharmacophore >> Search*.



Gambar III.7 Tampilan skrining zinc databes dengan fitur farmakofor

Tujuan virtual skrining adalah untuk memperoleh senyawa-senyawa yang hits antara senyawa-senyawa dari zinc databes dengan fitur farmakofor yang diperoleh. Virtual skrining dapat juga dilakukan pada beberapa aplikasi kimia komputasi lainnya, seperti Autodoc Vina.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tawaran yang menarik akhir-akhir ini adalah pemanfaatan komputer sebagai alat bantu dalam penemuan obat. Kemampuan komputasi yang meningkat eksponensial merupakan peluang untuk mengembangkan simulasi dan kalkulasi dalam merancang obat.

Komputer menawarkan metode *in silico* sebagai komplemen metode *in vitro* dan *in vivo* yang lazim digunakan dalam proses penemuan obat. Terminologi *in silico*, analog dengan *in vitro* dan *in vivo*, merujuk pada pemanfaatan komputer dalam studi penemuan obat. Hasil riset menunjukkan bahwa perkembangan model Farmakofor dan kemudian model berbasis Virtual skrining telah menghasilkan identifikasi aktivitas senyawa kimia dengan tingkat keberhasilan yang tinggi, salah satu model farmakofor yang telah dikembangkan adalah fitur farmakofor reseptor estrogen *alfa* yang digunakan sebagai target treatment dari berbagai jenis penyakit.

Untuk penyusunan farmakofor digunakan *Protein-Ligand Interaction Fingerprint (PLIF)*, *Pharmacophore Query Editor*, dan *Pharmacophore Search* pada program (*Molecular Operating Environment*) MOE. Aplikasi MOE ini digunakan untuk mengembangkan model Farmakofor dalam memprediksi aktivitas reseptor estrogen α menghambat sel kanker. Deskriptor ini dirancang dan dioptimalkan untuk mengkarakterisasi sifat fisikokimia molekul untuk digunakan dalam model farmakofor dalam memprediksi pengikatan dan penghambatan (MOE).

IV.1. Analisis Interaksi Protein-Ligan


Pemodelan farmakofor berbasis ligan telah menjadi strategi dibidang komputasi khususnya untuk memudahkan penemuan obat tanpa adanya sasaran struktur makromolekul dengan menggunakan aplikasi MOE.

Tujuan dari analisis interaksi protein-ligan ini adalah untuk mengetahui interaksi antara ligan dengan jenis-jenis asam amino yang terdapat pada situs aktif reseptor RE- α yang kemudian akan berinteraksi dengan senyawa-senyawa ligan dengan menggunakan skema sidik jari. Penelitian tentang keterikatan struktur kompleks RE- α dengan ligan senyawa obat pada terapi kanker serviks sudah ada dilaporkan sebelumnya, beberapa ligan yang dimaksud adalah Raloxifen, Tamoxifen dan Fulvestran.

Terdapat 31 struktur senyawa yang telah didownload dari situs (www.rcsb.org), tetapi hanya 23 struktur kompleks RE- α yang mampu mengikat ligan yaitu dengan kode ISJ0, 1YIM, 1YIN, 2IOG, 2IOK, 2JFA, 2JF9, 2OUZ, 2R6W, 2R6Y, 3DT3, 3ERD, 3ERT, 4IUI, 4IU7, 4IV2, 4IV4, 4IW6, 4IW8, 4IWC, 4IWF, 4IVY, dan 4IVW. Dengan menggunakan 23 struktur kompleks ligan-protein tersebut di atas, dapat dibuat sidik jari interaksi ligan-protein dengan membandingkan cara pengikatan masing-masing ligan terhadap residu asam amino di sisi pengikatan protein. Interaksi diantaranya ikatan hidrogen, interaksi ionik dan kontak permukaan yang diklasifikasikan sesuai dengan residu asal, dan dibangun dalam skema sidik jari yang merupakan representasi dari database dari protein-ligan kompleks.

Berikut ini skema sidik jari interaksi ligan dengan protein dan kode sidik jari (DIIdAC) yang penting dalam pengikatan dengan reseptor:

- D : donor ikatan hidrogen rantai samping protein
- I : ikatan ionik
- d : donor ikatan hidrogen *backbone* protein
- A : akseptor ikatan hidrogen rantai samping protein
- C : kontak permukaan



Kotak hitam berarti ligan dari 23 protein ER- α

Berikatan dengan asam amino.

Gambar IV.1 Interaksi Ligan dengan Asam Amino

Tabel IV.1 Persentase Kesamaan Interaksi Ligan-Protein


No.	Ligan	Kode Protein	Asam Amino										
			Arg 394A	Asp 351A	Glu 353A	Gly 521A	His 524A	Leu 346A	Leu 364A	Met 421A	Leu 367A	Phe 404A	
1	1GQ	4IUI											
2	1GM	4IU7											
3	1GR	4IV2											
4	1GS	4IV4											
5	IGJ	4IVW											
6	1GT	4IVY											
7	1GU	4IW6											
8	KN3	4IW8											
9	1GV	4IWC											
10	15Q	4IWF											
11	CM4	1YIM											
12	CM3	1YIN											
13.	I0G	2I0G											
14.	I0K	2I0K											
15.	OHT	3ERT											
16.	DES	3ERD											
17.	LLB	2R6W											
18.	LLC	2R6Y											
19.	369	3DT3											
20.	C3D	2OUZ											
21.	RAL	2JFA											
22.	E4D	1SJ0											
23.	2HT	2JF9											
Persentase Kesamaan			83%	39%	91%	17%	35%	13%	4%	9%	4%	13%	

Berdasarkan tabel IV.1 terlihat bahwa Arg 394A, Asp 351A, Glu 353A, Gly 521A dan His 524A merupakan asam amino yang penting dalam pengikatan antara ligan dan reseptor RE- α .

IV.2. Penyusunan *Query* Farmakofor Ligan


Tujuan dari penyusunan *query* farmakofor adalah untuk menjelaskan struktur 3D fitur senyawa-senyawa anti kanker serviks untuk pengikatan dengan reseptor hingga menghasilkan farmakofor, dan untuk menentukan fitur struktur dari RE- α yang penting untuk aktivitas biologis dengan melihat residu asam amino yang berperan pada pengikatan. Farmakofor hipotetik yang dihasilkan juga akan menjelaskan pengikatan ligan dalam situs pengikatan atau katalitik dari reseptor.

Salah satu tahapan yang paling penting dalam penyusunan *query* farmakofor ligan ini adalah pada proses pensejajaran (*allignment*) struktur 23 protein yang telah diunduh dari situs RCSB. Pada saat proses pensejajaran berlangsung dari seluruh protein perlu diperhatikan agar 23 protein tersebut benar-benar sejajar dengan baik, karena akan sulit untuk membuat fitur farmakofor dari ligan jika strukturnya tidak sejajar dengan baik. Adapun dalam proses pensejajaran tersebut, protein dibuka pada jendela MOE satu persatu dan disejajarkan setiap penambahan protein. Hal tersebut dilakukan agar pensejajaran struktur protein dapat berjalan maksimal dan menghasilkan struktur yang sejajar dengan baik.




Gambar IV.2 Struktur Protein di*Superpose*


Langkah selanjutnya untuk memastikan struktur protein telah sejajar dengan baik, maka pada bagian *ribbon* diubah *style* menjadi *line* sehingga akan tampak seperti benang-benang berwarna yang tersusun rapi



Gambar IV. 3 Struktur Protein setelah disejajarkan (*Superpose*)




Gambar IV. 4 Struktur Protein setelah di *Show Ligan*



Gambar IV. 5 Struktur protein sejajar di *style ribbon* dalam bentuk *line*

Sebelum masuk pada tahap membuat fitur farmakofor ligan, seluruh reseptor dan pelarut dihilangkan sehingga yang bertumpuk hanya struktur ligannya saja. Selanjutnya pembuatan fitur farmakofor ligan dapat dilakukan


dengan menjalankan *Pharmacophore Query Editor*. Titik-titik anotasi ligan akan muncul secara otomatis di layar MOE. Adapun cara pemilihan titik anotasi ligan yang tepat adalah ligan yang memiliki kemiripan struktur ligan senyawa obat (Raloxifen, Tamoxifen, Estradiol, dll) dengan ligan yang telah didownload dari RCSB, titik-titik anotasi yang dipilih kemudian dibuat menjadi tiga fitur farmakofor.



Gambar IV.6 Fitur Farmakofor dan Query Editor

Ketiga fitur farmakofor tersebut masing-masing sebagai gugus donor proton dan akseptor proton (F3:Don&Acc dan F1:Don&Acc) dan gugus kationik (F2:Cat). Tiga titik anotasi ligan tersebut dipilih karena banyaknya titik anotasi ligan yang bertumpuk pada titik-titik tersebut. Di samping itu, berdasarkan interaksi ligan yang diperoleh pada tahap analisis interaksi ligan-protein, dapat dilihat bahwa interaksi ligan dengan protein terjadi di titik anotasi ligan pada fitur farmakofor F3: Don&Acc dan F1: Don&Acc (4-hidroxytamoxifen) masing-

masing merupakan antagonis reseptor estrogen *alfa* terhadap kanker serviks, dalam hal ini terapi yang paling baik untuk pemilihan obat anti estrogen terhadap pemicu (eksogen) kanker serviks sebagaimana informasi yang tercantum pada penelitian- penelitian sebelumnya.



Gambar IV.7 Jarak antar fitur-fitur dalam farmakofor *query*

F3 ke F1: 11.38
 F1 ke F2: 11.15
 F2 ke F3: 12.69

Jarak F3 ke F1 perlu dijaga sedemikian rupa pada saat desain obat baru, sebab perubahan konformasi ikatan ini berpengaruh signifikan pada aktif atau tidaknya senyawa hasil desain.


Pola ini selanjutnya dapat digunakan untuk menguji senyawa hasil desain baru apakah aktif atau tidak aktif dengan melihat kecocokan antara fitur-fitur farmakofor yang ada pada senyawa hasil desain dengan *query* farmakofor dengan lebih cepat, atau seberapa banyak atom atau gugus yang *hit* dengan *query* farmakofor yang juga biasa disebut dengan penapisan berbasis virtual skrining.

IV.3. Virtual Screening

Untuk melakukan penapisan senyawa biologis terhadap milyaran senyawa masih sangat sulit, oleh karena itu, perlu dilakukan pendekatan secara virtual menjadi alternatif. Karena metode ini relatif lebih cepat bahkan mampu menangani ribuan senyawa dalam satu hari dan bergantung pada senyawa yang diuji dan kecepatan komputer. Kini, virtual skining telah mencapai status sebagai teknologi yang dinamis dan menguntungkan dalam penemuan senyawa obat.

Proses virtual skining digunakan untuk membantu menemukan senyawa senyawa yang kemungkinan besar berpotensi sebagai obat, dengan membutuhkan waktu yang relatif singkat. Jika target telah diketahui, algoritma *docking* dapat digunakan untuk menempatkan kandidat obat ke dalam sisi aktif dari target seperti enzim atau reseptor. Kemudian interaksi senyawa-senyawa yang telah diikatkan kemudian diurutkan berdasarkan hasil analisis secara komputasi komponen sterik dan elektrostatisnya.

Hingga saat ini telah banyak ditemukan senyawa anti kanker dari bahan alam. Tetapi, belum diketahui senyawa-senyawa yang selektif terhadap reseptor estrogen *alfa*. Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan penelitian yang secara khusus memodelkan interaksi beberapa senyawa yang diketahui diketahui memiliki aktivitas anti kanker serviks melalui penghambatan estrogen melalui RE- α . Pada penelitian ini dilakukan proses virtual skining terhadap 3560 senyawa kimia yang diunduh dari situs zinc database.



Gambar IV.8 Virtual Skrining Fitur Farmakofor dengan 3568 Senyawa

Dari proses tersebut tidak diperoleh senyawa kimia bahan alam yang *hits* dengan fitur farmakofor ligan yang memiliki interaksi dengan reseptor estrogen alfa, dikarenakan jumlah senyawa yang diperoleh dari Zinc databes masih kurang serta pertimbangan yang lain sehingga tidak diperoleh senyawa-senyawa yang *hits*.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Asam amino yang penting dalam interaksi reseptor RE- α dengan beberapa senyawa penghambat sel kanker serviks yaitu Arg 394A, Asp 351A, Glu 353A, Gly 521A, dan His 524A.

Adapun *query* farmakofor yang berperan dalam interaksi ligan-reseptor memiliki fitur dua gugus donor proton dan akseptor proton, nama ligan ke dua fitur tersebut adalah antagonis 4-hidroksitamoxifen yang memiliki selektivitas terhadap RE- α .

2. Al-Quran sebagai kalam Allah swt. yang dapat digunakan sebagai penawar dan obat terhadap penyakit seseorang baik jasmani maupun rohani, tanpa terkecuali penyakit kanker (QS.Yunus/10: 107). Oleh karena itu, pentingnya dilakukanlah penelitian Studi Farmakofor Reseptor Estrogen *Alfa* sebagai Target Terapi Kanker Serviks guna menemukan petunjuk dalam menemukan obat yang baik bagi penyakit kanker serviks.

B. Implikasi Penelitian

1. Penelitian ini memberikan beberapa implikasi baik terhadap pihak institusi (kampus) maupun pemerintah, dalam hal ini penemuan obat baru dapat meningkatkan dan diharapkan pemerintah lebih mampu mendukung para peneliti-peneliti baik tingkat universitas maupun industri obat guna mengembangkan produktivitas obat baru untuk terapi kanker serviks yang lebih baik. Selain itu, peran pemerintah dan orang yang paham dibidangnya melakukan program kerja dalam hal penyuluhan dan pengobatan yang lebih baik tentang bahaya kanker, dalam hal ini kanker serviks, serta cara-cara mencegah terjadinya kanker pada masyarakat.
2. Diharapkan penelitian ini dapat dilanjutkan dengan menemukan obat baru untuk terapi kanker serviks yang lebih baik melalui aktivitas RE- α .

KEPUSTAKAAN


- Abdul Mujib, *Kepribadian dalam Psikologi Islam*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *Metode Pengobatan Nabi SAW*. Jogjakarta: Hikam Pustaka, 2002.
- American Cancer Society. *Cervical Cancer*. USA : Atlanta, Inc. 2013.
- Anderson, Jan. *The Discoveries of Human Papilloma viruses that cause Cervical Cancer and of Human Immunodeficiency Virus*. Karolinska : Department of Medicine, Karolinska Institutet, Karolinska University Hospital, Huddinge. 2008.
- Anonim. *Obat Kanker Warisan Kedokteran Islam*. Diakses tanggal 15 Juli 2014. http://www.republika.co.id/berita/53910/Obat_Kanker_Warisan_Kedokteran_Islam. 2009.
- As- Suyuthi, Jalaluddin. *Asbabun Nuzul; Sebab Turunnya Ayat Al-Quran*. Jakarta: Gema Insani. 2008.
- Bisri, Mukti. *Pendidikan Agama Bernuansa Kesehatan*. Jakarta: Modul Guru. 2007.
- Bukhari. *Maktabah 'Ibadi al-Rahman*. Mesir. 2008.
- Castl, E. Philip. *Do selective estrogen receptor modulators treat cervical precancer and cancer? time to pool data from relevant trials*. Italy : Division of Cancer Epidemiology and Genetics, National Cancer Institute. 2011.
- Cherry, J. Jonathan., dkk. *Structure Based Identification and Characterization of Flavonoids That Disrupt Human Papillomavirus-16 E6 Function*. Indiana, United States of America : Department of Medicinal Chemistry and Molecular Pharmacology, Purdue University College of Pharmacy. 2013.
- Chung SH, Lambert PF. *Prevention and treatment of cervical cancer in mice using estrogen receptor antagonists*. USA; Proc Natl Acad Sci. 2009.
- Departemen Agama RI. *Kesehatan Dalam Perspektif al-Qur'an; Tafsir al-Qur'an Tematik*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an. 2009.
- Hartati, Netty, et.al., *Islam dan Psikologi*, Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2004.
- Hasman, Ade. *Rahasia Kesehatan Rasulullah*. Jakarta: November Books. 2012.
- International Agency for Research on Cancer/ IARC. *Latest World Cancer Statistics Global Cancer*. 2013.
- Lyne, P. D. 2002. *Structure-based Virtual Screening: an Overview*. *Drug design & Targeting*, 7, 1047-1055.

- Lambert, Paul F., and Chung, Sang-Hyuk. 2010. *Estrogen and ER α : Culprits in Cervical Cancer?*. USA : McArdle Laboratory for Cancer Research, University of Wisconsin School of Medicine and Public Health, Madison, WI.
- Lambert, Paul F., Chung, Sang-Hyuk and Spurgeon, E Megan. 2013. *Recurrence of Cervical Cancer in Mice after Selective Estrogen Receptor Modulator Therapy*. Department of Oncology, McArdle Laboratory for Cancer Research, University of Wisconsin School of Medicine and Public Health, Madison, Wisconsin.
- Malagón, Cortés M. Enoc., dkk. *Gene Expression Profile Regulated by the HPV16 E7Oncoprotein and Estradiol in Cervical Tissue*. USA : McArdle Laboratory for Cancer Research, University of Wisconsin School of Medicine and Public Health. 2013.
- Mannhold, R., H. Kubinyi, G. Folkers, 2006, *Pharmacophore and Pharmacophore Searches*, Wiley –VCH, Weinheim, 3
- Masyhudi, In'amuzzahidin. dan Arvitasari, Nurul Wahyu. *Berdzikir dan Sehat ala Ustadz H. Hariyono ; Menguak Pengobatan Penyakit dengan Terapi Dzikir*
- Muadzlin dan Muhadi., *Semua Penyakit Ada Obatnya; Menyembuhkan Penyakit Ala Rasulullah*. Jakarta: Mutiara Media. 2009.
- National Cancer Institute. *What You Need To Know About Cervical Cancer*. USA : Departement of Health and Human Services. 2012.
- Nurana, Laila. dkk. *Cervical Cancer Prevention Program in Jakarta, Indonesia: See and Treat Model in Developing Country*. The Netherlands: Department of Gynecology, Leiden University Medical Centre, Leiden. 2012.
- Notoatmodjo, Soekidjo. *Pendidikan dan Prilaku Kesehatan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2003.
- Pryanti, Dwita. *Perspektif Islam: Bahagia dengan Penyakit*. Jakarta Timur : Yayasan Ginjal Dlatrans Indonesia. 2012.
- Resna, Riska Wibawa. *Kesadaran Sosial dalam Kesehatan*.
- Samahah, M. Syekh Riyadh. *Cara Penyembuhan Dengan al-Qur'an*. Yogyakarta: Mitra Pustaka. 2007.
- Shadnia, Hooman, Wright, S. James dan Anderson, M. James. *Interaction force diagrams: New insight into ligand-receptor binding*. Canada: Department of Chemistry, Carleton University, Ottawa. 2008.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- , *Tafsir Al Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, vol. 5. Jakarta: Lentera Hati, 2002.


- Spurgeon, E. Megan, dkk. *Recurrence of Cervical Cancer in Mice after Selective Estrogen Receptor Modulator Therapy*. USA; Proc Natl Acad Sci. 2014.
- World Health Organization. *IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risk to Human, Volume 90 Human Papillomaviruses*. France; Lyon. 2007.
- Xu, Wei and Shanle, K Erin. *Selectively Targeting Estrogen Eeceptors for Cancer Treatment*. Madison, USA: McArdle Laboratory for Cancer Research, University of Wisconsin, 1400 University Avenue. 2010.
- Yan, Sheng-Yong. *State Key Laboratory of Biotherapy and Cancer Center*. China: West China Hospital, West China Medical School, Sichuan University, Chengdu, Sichuan. 2010.

Lampiran 1: Skema Kerja


1. Penentuan Sidik Jari Interaksi Ligan Protein (*Protein Ligan Interaction Fingerprint/PLIF*)



2. Penentuan Fitur Farmakofor






3. Virtual Skrining



Lampiran 2: Protein Reseptor Estrogen Alfa

Kode Protein	Nama Senyawa	Aktivitas
1YIM	(2R,3R,4S)-3-(4-HYDROXYPHENYL)-4-METHYL-2-[4-(2-PYRROLIDIN-1-YLETHOXY)PHENYL]CHROMAN- 6-OL	Antagonis
1YIN	(2R,3R,4S)-5-FLUORO-3-(4-HYDROXYPHENYL)-4- METHYL-2-[4-(2-PIPERIDIN-1-YLETHOXY)PHENYL]CHROMAN- 6-OL	Antagonis
1SJ0	(2S,3R)-2-(4-(2-(PIPERIDIN-1-YL)ETHOXY)PHENYL)- 2,3-DIHYDRO-3-(4-HYDROXYPHENYL)BENZO[B][1,4] OXATHIIN- 6-OL	Antagonis
2IOG	N-[(1R)-3-(4-HYDROXYPHENYL)-1-METHYLPROPYL]- 2-[2-PHENYL-6-(2-PIPERIDIN-1-YLETHOXY)-1H- INDOL-3-YL]ACETAMIDE	Antagonis
2OUZ	(5R,6S)-6-Fenil-5-[4-(2-Pirolidin-1-Yleyhoxy)Fenil]- 5,6,7,8-Tetrahidronaftalen-2-Ol	Antagonis
3ERT	4-Hidroksitamoxifen	Agonis
4IU7	4-[2-ethyl-7-(trifluoromethyl)-2H-indazol- 3-yl]benzene-1,3-diol	Agonis dan Antagonis
4IUI	4-[1-butyl-7-(trifluoromethyl)-1H-indazol- 3-yl]benzene-1,3-diol	Agonis dan Antagonis
4IV2	4-[1-(2-methylpropyl)-7-(trifluoromethyl)- 1H-indazol-3-yl]benzene-1,3-diol	Agonis dan Antagonis
4IV4	4-[2-(2-methylpropyl)-7-(trifluoromethyl)- 2H-indazol-3-yl]benzene-1,3-diol	Agonis dan Antagonis
4IVW	4-[2-benzyl-7-(trifluoromethyl)-2H-indazol- 3-yl]benzene-1,3-diol	Agonis dan Antagonis
4IVY	4-[1-(but-3-en-1-yl)-7-(trifluoromethyl)- 1H-indazol-3-yl]benzene-1,3-diol	Agonis dan Antagonis
4IW6	4-[2-(but-3-en-1-yl)-7-(trifluoromethyl)- 2H-indazol-3-yl]benzene-1,3-diol	Agonis dan Antagonis

4IW8	4-[1-(3-methylbut-2-en-1-yl)-7-(trifluoromethyl)-1H-indazol-3-yl]benzene-1,3-diol	Agonis dan Antagonis
4IWC	4,4'-thiene-2,5-diylbis (3-methylphenol)	Agonis dan Antagonis
4IWF	2-chloro-3'-fluoro-3-[(E)-(hydroxyimino)methyl]biphenyl-4,4'-diol	Agonis dan Antagonis
2R6W	[6-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-1-benzothien-3-yl]{4-[2-(4-methylpiperidin-1-yl)ethoxy]phenyl}methanone	Antagonis
2R6Y	[6-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-1-benzothien-3-yl][4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]methanone	Antagonis
3DT3	5-(4-hydroxyphenoxy)-6-(3-hydroxyphenyl)-7-methylnaphthalen-2-ol	Antagonis
3ERD	Diethylstilbestrol	Agonis
2IOK	N-[(1R)-3-(4-Hidrofenil)-1-metilpropil]-2-(2-PFenil-1H-Indol-3-YL)Asetamida	Antagonis
2JFA	Raloxifen	Antagonis
2JF9	4-Hidroksitamoxifen	Agonis

Lampiran 3: Struktur Agonis dan Antagonis RE- α **Estradiol****Tamoxifen****Raloxifene**

Lampiran 4: Fingerprint Protein ER- α Menggunakan Program MOE

PLIF: databasfatma.mdb

Leu Asp Glu Leu Gly His Leu ? Asp Glu Lys Leu Glu Arg Asp Glu Leu Ile Val Glu Arg Glu ? ? ? ? ? ? H2O
346 351 353 387 521 524 525 B2 B351 B353 B362 B379 B380 B394 B358 B542 C346 C358 C376 C380 C394 C542 D702 D703 E704 F701 F702 G701


Selected 23 of 23 entries


Display Mode: Barcodes Population Significance Ligands Export... Tools: Select: Prev Next All


```
entry
1 --DDIIDDdAA dDAAC-----
2 --DDIIDDdA -dDAAC-----
3 --DDIIDDdA -dDAAC-----
4 --DDIIDD- A-----
5 -----D-----C-----
6 --DDIIDDdAA-----DDIIDD-----AA-----DD-----A-----
7 --DDIIDDdAA -DDAA-----DDIIDD-----C -AADDAA-----
8 --DDIIDD- AA-----OO-----
9 --DDIIDD- AA -DDAAC---DDIIDD-----dAA-----
10 --DDIIDD- AA -DDAAC---DDIIDD-----C dAADDAA-----
11 -----DD- A- -DDAA-----DD-----AAD- A-----
12 -----DDdAA -DDAA-----DD-----A- DDAA-----
13 -----I- DD- AA-----OO-----
14 dd-----DD- AA-----d-----DDCAACCCDDII- A-----CDDC-----OO-----OO-----
15 -----DD- AA-----DDCAACCC-----AA-----C- DDC-----OO- O- -OO-----OOC00C---
```


Activity: <none> Verbose List Include Selected Only Show Ligand in MOE Fields... Fingerprints... Select...


Recalculate Update from DBV Select in DBV View Print... Close


Lampiran 5: Interaksi 23 Ligan yang Terikat dengan RE- α 































Lampiran 6: Farmakofor Query

Fitur Farmakofor	Jarak antar Fitur
<p>F1 Don & Acc (Antagonis) F3 Don & Acc (Antagonis) F2 Cat & Don (Agonis)</p> 	<p>F3 ke F1: 11.38 F1 ke F2: 11.15 F2 ke F3: 12.69</p> 

Lampiran 7: Database Senyawa Kimia Bahan Alam

1	ZINC10215935	35	ZINC00120283	69	ZINC13108543
2	ZINC01000250	36	ZINC12153652	70	ZINC13108863
3	ZINC00001011	37	ZINC12153794	71	ZINC13108877
4	ZINC00001021	38	ZINC00001219	72	ZINC13109239
5	ZINC10215935	39	ZINC12341708	73	ZINC13118172
6	ZINC00105086	40	ZINC12358789	74	ZINC13119571
7	ZINC00105309	41	ZINC12359045	75	ZINC13124366
8	ZINC00105356	42	ZINC12370966	76	ZINC13130203
9	ZINC01069090	43	ZINC12375086	77	ZINC13130205
10	ZINC01081099	44	ZINC12405252	78	ZINC13130207
11	ZINC01081322	45	ZINC12416954	79	ZINC13130209
12	ZINC01081534	46	ZINC12428237	80	ZINC13130920
13	ZINC01081535	47	ZINC12428433	81	ZINC13130927
14	ZINC00001083	48	ZINC12462557	82	ZINC13132552
15	ZINC00001084	49	ZINC12496083	83	ZINC13136667
16	ZINC01087344	50	ZINC12655077	84	ZINC13136668
17	ZINC00001102	51	ZINC12662322	85	ZINC13136669
18	ZINC00113287	52	ZINC12662324	86	ZINC13136670
19	ZINC00113294	53	ZINC12662326	87	ZINC13139345
20	ZINC00113309	54	ZINC12662328	88	ZINC13139347
21	ZINC00113473	55	ZINC12662338	89	ZINC13161523
22	ZINC11535894	56	ZINC12662399	90	ZINC13161524
23	ZINC00011544	57	ZINC12662478	91	ZINC01318371
24	ZINC11592912	58	ZINC12662521	92	ZINC01322227
25	ZINC11592913	59	ZINC12662530	93	ZINC01323265
26	ZINC00117559	60	ZINC12662532	94	ZINC01323364
27	ZINC11866865	61	ZINC12662654	95	ZINC00013246
28	ZINC00119434	62	ZINC12662691	96	ZINC13311184
29	ZINC00119978	63	ZINC12662696	97	ZINC13311346
30	ZINC00119983	64	ZINC12662738	98	ZINC13311349
31	ZINC00119988	65	ZINC12662847	99	ZINC13311350
32	ZINC00120126	66	ZINC12662866	100	ZINC13311353
33	ZINC00120179	67	ZINC12725849	101	ZINC13311420
34	ZINC00120273	68	ZINC01280591	102	ZINC13311422

103	ZINC13311424
104	ZINC13311426
105	ZINC13327407
106	ZINC13327491
107	ZINC13334702
108	ZINC13334703
109	ZINC13334942
110	ZINC13334943
111	ZINC13334944
112	ZINC13341042
113	ZINC13341044
114	ZINC13341184
115	ZINC13360793
116	ZINC13366958
117	ZINC13366960
118	ZINC13367837
119	ZINC13367843
120	ZINC13367860
121	ZINC13367866
122	ZINC13368434
123	ZINC13370769
124	ZINC13373368
125	ZINC13373646
126	ZINC13374022
127	ZINC13374323
128	ZINC13374351
129	ZINC13374352
130	ZINC13374377
131	ZINC13374378
132	ZINC13377886
133	ZINC13377887
134	ZINC13377888
135	ZINC13377889
136	ZINC13377936
137	ZINC13378189


138	ZINC13378210
139	ZINC13378214
140	ZINC13379108
141	ZINC13380840
142	ZINC13380841
143	ZINC13381371
144	ZINC13381381
145	ZINC13381382
146	ZINC13382495
147	ZINC13382497
148	ZINC13382850
149	ZINC13383325
150	ZINC13383333
151	ZINC13399052
152	ZINC13407266
153	ZINC13408699
154	ZINC13423831
155	ZINC13423832
156	ZINC13424716
157	ZINC13424750
158	ZINC13424751
159	ZINC13424752
160	ZINC13424753
161	ZINC13424754
162	ZINC13424755
163	ZINC13429859
164	ZINC13434330
165	ZINC13456523
166	ZINC13456526
167	ZINC13460029
168	ZINC13460235
169	ZINC13460237
170	ZINC13460239
171	ZINC13460241
172	ZINC13462926

173	ZINC13480529
174	ZINC13480530
175	ZINC13481200
176	ZINC13482857
177	ZINC13484083
178	ZINC13485075
179	ZINC13485414
180	ZINC13485433
181	ZINC13485647
182	ZINC13485961
183	ZINC13507070
184	ZINC13512214
185	ZINC13513942
186	ZINC13513943
187	ZINC13515185
188	ZINC13515203
189	ZINC13515708
190	ZINC13517390
191	ZINC13520815
192	ZINC13523718
193	ZINC13540459
194	ZINC13541228
195	ZINC13542534
196	ZINC13543254
197	ZINC13544730
198	ZINC13558214
199	ZINC13558220
200	ZINC13558221
201	ZINC13585370
202	ZINC13651794
203	ZINC13651795
204	ZINC13660035
205	ZINC13660037
206	ZINC13660040
207	ZINC13660042

208	ZINC13660139
209	ZINC13660151
210	ZINC13660158
211	ZINC13660176
212	ZINC13660178
213	ZINC13660192
214	ZINC13660199
215	ZINC13660201
216	ZINC13660204
217	ZINC13660208
218	ZINC13660211
219	ZINC13660217
220	ZINC13660219
221	ZINC13660257
222	ZINC13660259
223	ZINC13660263
224	ZINC13772069
225	ZINC13783532
226	ZINC13783789
227	ZINC13827498
228	ZINC13827619
229	ZINC13838494
230	ZINC13838505
231	ZINC13889040
232	ZINC13889041
233	ZINC13909135
234	ZINC01390924
235	ZINC00001392
236	ZINC00014036
237	ZINC00001411
238	ZINC00001412
239	ZINC00142380
240	ZINC14417338
241	ZINC14417736
242	ZINC14417738

243	ZINC14417739
244	ZINC14417741
245	ZINC14435203
246	ZINC14436792
247	ZINC14437962
248	ZINC14438552
249	ZINC14438554
250	ZINC14438556
251	ZINC14438558
252	ZINC14438802
253	ZINC14445191
254	ZINC14445203
255	ZINC14445205
256	ZINC14452023
257	ZINC14452025
258	ZINC14452027
259	ZINC14452028
260	ZINC14455174
261	ZINC14455311
262	ZINC14455391
263	ZINC14486165
264	ZINC14487813
265	ZINC14487815
266	ZINC14487817
267	ZINC14487818
268	ZINC14488178
269	ZINC14488180
270	ZINC14488182
271	ZINC14488184
272	ZINC14488198
273	ZINC14488199
274	ZINC14492390
275	ZINC14500124
276	ZINC14500127
277	ZINC14502893

278	ZINC14503833
279	ZINC14504288
280	ZINC14505475
281	ZINC14512219
282	ZINC14516846
283	ZINC14516849
284	ZINC14516851
285	ZINC14516854
286	ZINC01453173
287	ZINC01453808
288	ZINC01453810
289	ZINC01453811
290	ZINC00145536
291	ZINC14557836
292	ZINC14584912
293	ZINC14584914
294	ZINC14584916
295	ZINC14584918
296	ZINC14585674
297	ZINC14590768
298	ZINC14593896
299	ZINC14611100
300	ZINC14611102
301	ZINC14611103
302	ZINC14611105
303	ZINC14611785
304	ZINC14612871
305	ZINC14615856
306	ZINC14615857
307	ZINC14615858
308	ZINC14615859
309	ZINC14616880
310	ZINC14616881
311	ZINC14616882
312	ZINC14616883

Lampiran 8: Virtual Skrining 3560 Senyawa dengan Fitur Farmakofor



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Fatmawati S., kelahiran Luppereng, 09 Desember 1991. Anak keenam dari delapan bersaudara dari pasangan Slamet AT dan Rosnawati.

Telah menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-Kanak Sejahtera (1998), SD Inp 6/75 Arasoe (2004), MTs Ma'had Biru Watampone (2007), MAN Bontang (2010). Setelah lulus dari jenjang SMA, penulis kemudian melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi tepatnya di Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar pada tahun 2010 melalui jalur SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri) dan lulus hingga meraih gelar Sarjana Farmasi tahun 2014.

Selama menempuh masa kuliah aktif di Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Farmasi Periode 2011-2012, pernah menjadi asisten Biokimia (2012, 2013) dan asisten Ilmu Dasar Farmasi (2013).