

**UJI AKTIVITAS EKSTRAK ETANOL DAUN KERSEN (*Muntingia calabura*
L.) TERHADAP MENCIT (*Mus musculus*) SEBAGAI ANTIINFLAMASI**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi
pada Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

WAHYUNI SARIYATI
NIM. 70100112093

FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyuni Sariyati
NIM : 70100111093
Tempat/Tgl. Lahir : Watu Lendo, 30 November 1994
Jurusan : Farmasi
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Manuruki II
Judul : Uji Aktivitas Ekstrak Etanol Daun Kersen (*Muntingia calabura* L.) Terhadap Mencit (*Mus musculus*) sebagai Antiinflamasi

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 31 Mei 2016

Penulis,

WAHYUNI SARIYATI

NIM. 70100112093

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Uji Aktivitas Ekstrak Etanol Daun Kersen (*Muntingia calabura* L.) Terhadap Mencit (*Mus musculus*) Sebagai Antiinflamasi” yang disusun oleh Wahyuni Sariyati, NIM: 70100112093, mahasiswa jurusan Farmasi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, diuji dan dipertahankan dalam ujian sidang Skripsi yang diselenggarakan pada hari Selasa, 31 Mei 2016 M yang bertepatan dengan tanggal 24 Sya’ban 1437 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Makassar, 31 Mei 2016 M
24 Sya’ban 1437 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M. Sc.	(.....)
Sekretaris	: Haeria, S.Si., M.Si.	(.....)
Pembimbing I	: Mukhriani, S.Si., M.Si., Apt.	(.....)
Pembimbing II	: Abdul Karim, S.Farm., M.Si.	(.....)
Penguji Kompetensi	: Khaerani, S.Farm., M.Farm.Klin., Apt.	(.....)
Penguji Agama	: Dr. H. M. Dahlan, M.Ag.	(.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu
Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc.
NIP.19550203 198312 1 001

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah memberikan kesehatan dan kenikmatan iman, dan shalawat serta salam selalu tercurah kepada Rasul Muhammad SAW yang telah memberikan teladan hidup kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “UJI AKTIVITAS EKSTRAK ETANOL DAUN KERSEN (*Muntingia calabura* L.) TERHADAP MENCIT (*Mus musculus*) SEBAGAI ANTIINFLAMASI dapat diselesaikan. Disusun untuk melengkapi salah satu syarat dalam memperoleh gelar S1 FARMASI di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Pertama, ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada Ayahanda H. Muhammad Sudin, S.pd.I dan teruntuk Ibunda tersayang Mahani. Terima kasih atas dukungan, semangat, kerja keras, kasih sayang yang tiada terkira serta air mata dalam doa yang selalu menjadi penopang penyemangat saya. Buat kakandaku tercinta kak Zainudin Sandro, kak Nita, kak Syahrul Hakim, kak Zulkarnain terima kasih atas doa dan nasehatnya yang selalu memotivasi saya dan juga dukungan materi yang sudah diberikan. Untuk adik-adikku tersayang Rofiqah Niyati Rahayu, Multasim Iskandar, Nurlaela Safrani, Sumitra Ningsih, Farid Iswanto terima kasih juga atas doa dan dukungannya selama ini.

Tidak lupa juga penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababari, M.Si selaku Rektor UIN Alauddin Makassar dan bapak DR. dr. Andi Armyn Nurdin, M.Sc. selaku Dekan Fakultas

2. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang telah memberikan saran dan arahnya dalam penyempurnaan skripsi
3. Ibu Dr. Nurhidayah, S.Kep., Ns, M.Kes selaku Wakil Dekan I, ibu Dr. Andi Susilawaty, S.Si., M.Kes selaku Wakil Dekan II, dan bapak Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd. selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang telah memberikan saran dan arahnya dalam penyempurnaan skripsi.
4. Ibu Haeria, S.Si., M.Si. selaku Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang telah memberikan saran dan arahnya dalam penyempurnaan skripsi.
5. Ibu Mukhriani, S.Si., M.Si., Apt. Selaku Sekertaris Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan sekaligus sebagai pembimbing pertama yang telah banyak memberikan dan pengarahan serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis.
6. Bapak Abdul Karim S.Farm., M.Si. selaku pembimbing kedua yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis.
7. Ibu Khaerani, S.Farm.,M.Farm.,Klin., Apt. Selaku penguji kompetensi yang telah memberikan saran dan arahnya dalam penyempurnaan skripsi.
8. Bapak Dr. H. M. Dahlan, M.Ag selaku penguji Agama yang telah memberikan saran dan arahnya dalam penyempurnaanskripsi.
9. Kepada teman peneliti inflamasi (Ayu Lestari Nusa), Kakanda ifa, S.Farm dan kakanda Agus dan Andi Rasdianah yang banyak membantu, serta teman-teman seperjuangan “**ISOHIDRIS 2012**” terima kasih untuk kekeluargaan kalian selama ini.

10. kakak-kakak angkatan 2005 (Halogen), 2006 (Anastesi), 2007 (Injeksi), 2008 (Emulsi), 2009 (Hidrogenasi), 2010 (Corrigensia), dan adik-adik angkatan 2013 (Farbion) 2014 (Galenika) 2015 (pulvis).
11. Paman Sayun, Bibi jeni'a, Bibi semia, Mama Nur, kakanda Mustari Mustafa dan Sekeluarga, kakanda syahrin, yang selalu mendoakan dan menasehati saya dalam proses perkuliahan.
12. Sahabat-sahabatku yang sering memberikan bantuan, motivasi dan semangat yang luar biasa (kak Hylda, kak Mashurin, kak Fitriana, kak Salmi, kak Alam, teman-temanku Nurzakiyah, Yusriani, Hermawati, Hamida, Salmia, Raden, adik Hasan, Husen, Sidin, Sahir Sata, Uyu).

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Namun besar harapan kiranya dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya di bidang farmasi dan semoga bernilai ibadah di sisi Allah swt. Amin Ya Rabbal Alamin.

Wassalammu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Gowa, 31 Mei 2016

Penyusun

WAHYUNI SARIYATI

NIM. 70100112093

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian	4
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Inflamasi.....	10
1. Defenisi	10
2. Klasifikasi.....	11
3. Mediator Peradangan.....	11
4. Gejala-Gejala Terjadinya Peradangan	13
5. Mekanisme Terjadinya Radang.....	14
6. Pengobatan Inflamasi	17
a. Anti Inflamasi Non-Steroid	17
b. Kortikosteroid.....	21

B. Daun Kersen.....	21
1. Uraian Tanaman	21
a. Klasifikasi Tanaman.....	21
b. Nama Lain.....	22
c. Morfologi Tanaman	22
2. Kandungan Daun Kersen	23
C. Metode Ekstraksi.....	25
1. Ekstraksi	25
2. Tujuan Ekstraksi	27
3. Ekstraksi Secara Maserasi	27
4. Rotary Evaporator.....	28
D. Karagenin.....	29
E. Hewan Coba	30
F. Tinjauan Islam	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	37
1. Jenis Penelitian	37
2. Lokasi Penelitian	37
B. Pendekatan Penelitian	37
C. Instrumen Penelitian.....	37
1. Alat.....	37
2. Bahan.....	37
D. Prosedur kerja.....	38
1. Pengambilan Sampel	38
2. Pengolahan Sampel	38
3. Ekstraksi sampel.....	38
4. Penyiapan Bahan Uji	38
E. Pemilihan dan Penyiapan Hewan Uji	39
F. Perlakuan Terhadap Hewan Uji.....	39
G. Pengamatan dan Pengumpulan Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	41
B. Pembahasan.....	44

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	51
B. Saran.....	51
KEPUSTAKAAN	52
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	57
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	78

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Hasil Ekstraksi Daun Kersen	41
2. Persentase rata-rata penurunan volume udem telapak kaki mencit	41
3. Penurunan volume udem telapak kaki mencit	42
4. Hasil pengukuran rata-rata penurunan volume udem	43
5. Analisis ragam dengan nilai F tabel	66
6. Hasil Uji BJND	66

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Skema Kerja Ekstraksi Daun Kersen (<i>Muntingia calabura</i> L.).....	57
2. Skema Kerja Uji Antiflamasi	58
3. Perhitungan Dosis dan volume pemberian sediaan uji.....	59
4. Analisis Statistik Inflamasi	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Mekanisme terjadinya inflamasi	16
2. Biosintesis prostaglandin	19
3. Tanaman kersen	22
4. Daun kersen.....	68
5. Hasil ekstraksi	68
6. Rotavapor	69
7. Ekstrak kental.....	69
8. Kelompok hewan uji mencit	70
9. Ekstrak 4%, 6% dan 8%	70
10. Natrium diklofenak	71
11. Na-CMC 1%	72
12. Karagenin 1%	73
13. Pletismometer model/series PANLAB LE 7500.....	73
14. Pengukuran volume kaki awal mencit	74
15. Pengukuran volume kaki mencit 1 jam setelah diinduksi karagenin	75
16. Udem kaki kiri dan kaki kanan mencit	76
17. Pemberiaan oral hewan uji	77

ABSTRAK

Nama Penyusun : Wahyuni Sariyati
Nim : 70100112093
Judul Skripsi : Uji Aktivitas Ekstrak Etanol Daun Kersen (*Muntingia calabura L.*) Terhadap Mencit (*Mus musculus*) Sebagai Antiinflamasi

Inflamasi adalah respon alami yang terjadi pada kerusakan jaringan. Obat Antiinflamasi Non Steroid (OAINS) digunakan sebagai terapi antiinflamasi namun memiliki efek samping berupa iritasi lambung. Salah satu tanaman obat yang digunakan secara empirik untuk pengobatan secara tradisional adalah Daun kersen (*Muntingia calabura L.*). Tanaman ini memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi obat karena mengandung flavanoid, triterpen, fenolik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas dan konsentrasi ekstrak etanol daun kersen (*Muntingia calabura L.*) terhadap mencit (*Mus musculus*) sebagai antiinflamasi yang diinduksi karagenin.

Penelitian ini dilakukan dengan cara memberikan karagenan sebagai mediator radang pada telapak kaki mencit, lalu mencit diberikan ekstrak etanol daun kersen secara oral dengan konsentrasi dosis 4%, 6% dan 8% dan dilakukan pengamatan setelah diinduksi karagenan selama 6 Jam. Sebagai pembanding digunakan natrium diklofenak, dengan perlakuan yang sama pada ekstrak etanol daun kersen.

Diperoleh persentase penurunan radang untuk ekstrak 4% berturut-turut yaitu 4%, 10,7% dan 12%, ekstrak 6% berturut-turut yaitu 6%, 8% dan 15% sedangkan ekstrak 8% berturut-turut yaitu 11%, 12% dan 18,1%. Berdasarkan hasil statistik dengan uji ANOVA-one way menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan. Pada uji lanjutan yaitu uji Duncan pada konsentrasi 4%, 6% dan 8% tidak terdapat perbedaan yang nyata dan terdapat perbedaan yang nyata dengan pembanding natrium diklofenak.

Kata Kunci : Ekstrak Daun Kersen, Antiinflamasi, Natrium diklofenak

ABSTRACT

Author : Wahyuni Sariyati
Student Reg. Number : 7010112093
Title : **Activity of *Muntingia calabura* L. Leaves Etanolic Extract as Anti-inflammatory of White Mice**

Inflammation is a natural respon for tissue damage. Non Steroid Anti-inflammatory Drugs (NSAID) have been used anti-inflammatory therapy but have side gastrointestinal effect. One of medicinal plant empirically used for traditional medicine is *Muntingia calabura* L. This plant is potential to be developed as medicine for anti-inflammatory because its contains flavanoid, triterpen and fenolic. This study aims to determine the activity and concentrations of ethanol extract of *Muntingia calabura* L. leaves on mice as carrageenan induced as anti-inflammatory.

The research was carried out by giving carrageenan as a mediator of inflammation in the feet of mice and rats to extract ethanol *Muntingia calabura* L. leaves by oral at any doses concentration, there are 4%, 6% and 8% and after induction of carrageenan for six hours and comparison as used diclofenac sodium. With the same steps on extract ethanol of *Muntingia calabura* L.

The percentage of inflammation reduction to extract 4% respectively is 4%, 10.7% and 12%, extract 6% respectively is 6%, 8% and 15%, while the extract 8% respectively is 11%, 12% and 18, 1%. Based on statistical tests using by ANOVA (*Analysis of varians*) *one way* significant difference in the treatment effect, and then followed by *Duncan test* no significant difference between ethanol extract concentrations 4%, 6% and 8% and significant difference in the diclofenac sodium comparison.

Keywords: Cherry leaves extract, Anti-inflammatory, Diclofenac sodium

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Antiinflamasi didefinisikan sebagai obat-obat atau golongan obat yang memiliki aktivitas menekan atau mengurangi peradangan. Radang atau inflamasi dapat disebabkan oleh berbagai rangsangan yang mencakup luka-luka fisik, infeksi, panas dan interaksi antigen-antibodi (Houglum et al, 2005). Berdasarkan mekanisme kerja obat-obat antiinflamasi terbagi dalam dua golongan, yaitu obat antiinflamasi golongan steroid dan obat antiinflamasi non steroid. Mekanisme kerja obat antiinflamasi golongan steroid dan non-steroid terutama bekerja menghambat pelepasan prostaglandin ke jaringan yang mengalami cedera (Gunawan, 2007). Obat-obat antiinflamasi yang banyak di konsumsi oleh masyarakat adalah antiinflamasi non steroid (AINS). Obat-obat golongan AINS biasanya menyebabkan efek samping berupa iritasi lambung (Kee dan Hayes, 1996).

Penggunaan obat antiinflamasi dibedakan menjadi 2 jenis yaitu non steroid dan kortikosteroid. Pada obat antiinflamsi non steroid mempunyai efek analgetik pada dosis rendah dan antiinflamasi pada dosis besar (Priyanto, 2009). Mekanisme kerja obat golongan non steroid adalah melalui penghambatan prostaglandin (Tjay dan Raharja, 2002). Prostaglandin diproduksi oleh mukosa lambung dan diduga mempunyai efek sitoprotektif dan mekanisme kerja utama prostaglandin adalah menghambat sekresi lambung (Katzung dan Trevor, 2004). Hambatan sintesis prostaglandin menyebabkan sekresi asam yang berlebih, sehingga meningkatkan keasamannya yang berpotensi menimbulkan tukak (ulcer) (Mutschler, 1986).

Banyaknya efek samping dari obat-obat inflamasi yang beredar di pasaran saat ini, maka diperlukan suatu alternatif obat inflamasi yang aman dikonsumsi, salah satunya dengan pemanfaatan daun kersen. Kersen atau talok merupakan tanaman yang memiliki buah kecil berwarna merah dan manis seperti cery. Kersen merupakan salah satu jenis pohon pinggir jalan yang umum sekali dijumpai, terutama di wilayah-wilayah yang kering, bahkan tidak hanya di pedesaan, di daerah perkotaan pun dapat dijumpai pohon ini. Pohon kecil ini awalnya tumbuh liar ditepi jalan, selokan atau bahkan ditengah retakan tembok lantai atau pagar. Walau sekarang banyak dipakai hanya sebagai tanaman peneduh, sebenarnya tanaman ini mempunyai manfaat kesehatan yang sangat berguna (Peoloengan, 2006).

Kersen (*Muntingia calabura* L.) merupakan tanaman yang telah lama digunakan masyarakat untuk berbagai tujuan pengobatan antara lain sebagai obat batuk, sakit kuning dan asam urat, sakit kepala, antipasmodik, antiseptic. Daun kersen mengandung berbagai zat kimia antara lain : polifenol, flavanoid dan saponin (Warintek. 2006).

Menurut cerita rakyat Flores khusus di Watu Lendo Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat bahwa daun kersen ini banyak sekali khasiat salah satu diantaranya mengurangi radang (inflamasi). Daun kersen ini telah lama digunakan di masyarakat flores khususnya di Watu Lendo Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat-NTT untuk mengobati berbagai penyakit. Menurut cerita rakyat Peru juga, daun kersen dapat direbus atau direndam dalam air untuk mengurangi pembengkakan kelenjar prostat, sebagai obat untuk menurunkan panas, menghilangkan sakit kepala, flu dan mengobati penyakit asam urat, selain itu juga dapat dimanfaatkan sebagai antiseptik, antioksidan, antimikroba, antiinflamasi

(mengurangi radang), antidiabetes, dan antitumor (Siddiqua *et al.* 2010). Secara kualitatif diketahui bahwa senyawa yang dominan dalam daun kersen adalah flavonoid dan glikosida (Zakaria *et al.*, 2007).

Dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Ekstrak Daun Kersen (*Muntingia calabura* L.) Terhadap Derajat Eritema Pada Proses Inflamasi Marmut (*Cavia porcellus*) dengan Luka Bakar Derajat II Dangkal” terdapat pengaruh dalam pemberian ekstrak daun kersen terhadap derajat eritema pada proses inflamasi pada luka bakar derajat II dangkal dan melalui penelitian ini daun kersen dapat digunakan sebagai alternatif antiinflamasi yang diberikan secara topikal.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perlu dilakukan penelitian daun kersen menggunakan ekstrak etanol daun kersen secara oral yang akan diujikan pada mencit sebagai antiinflamasi.

Allah berfirman dalam Al-qur'an surat Yunus/11 : 57

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى
وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ٥٧

Terjemahnya : “*Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.*”

Al-qur'an adalah penyembuh yang sempurna dari seluruh penyakit hati dan jasmani. Dan tidaklah setiap orang diberi keahlian dan taufiq untuk menjadikannya sebagai obat. Bagaimana mungkin penyakit tersebut mampu menghadapi firman Dzat yang memiliki langit dan bumi. Jika diturunkan kepada gunung, maka ia akan menghancurkannya. Atau diturunkan kepada bumi, maka ia akan membelahnya.

Maka tidak satu pun jenis penyakit, baik penyakit hati maupun jasmani, melainkan dalam Al-qur'an ada cara yang membimbing kepada obat dan sebab kesembuhannya. Dalam al-qur'an manusia telah diberi petunjuk tentang penyembuh bagi penyakit-penyakit, dan salah satu petunjuk itu adalah keanekaragaman hayati sebagai nikmat bagi kehidupan manusia, di dalamnya terkandung manfaat yang sangat beragam yaitu tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai pengobatan.

Oleh karena itu, penelitian tentang khasiat tanaman obat khususnya daun kersen perlu dilakukan untuk menunjang penggunaan secara empiris masyarakat dengan data-data ilmiah sehingga penggunaannya dapat lebih dipertanggungjawabkan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah ekstrak etanol daun kersen (*Muntingia calabura* L.) dapat memberikan Aktivitas antiinflamasi pada mencit (*Mus musculus*)?
2. Berapa konsentrasi ekstrak etanol daun kersen (*Muntingia calabura* L.) yang memberikan efek terhadap mencit (*Mus musculus*) sebagai antiinflamasi?
3. Apakah hasil analisis data secara statistik terdapat perbedaan yang signifikan?

C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Defenisi Operasional

- a. Ekstrak merupakan sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif dari simplisia nabati atau hewani dengan menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian sehingga memenuhi baku yang telah ditetapkan.

- b. Ekstraksi adalah penyarian zat-zat aktif dari bagian tanaman. Zat-zat aktif tersebut terdapat didalam sel, namun sel tanaman dan hewan berbeda ketebalannya sehingga diperlukan metode ekstraksi dengan pelarut tertentu.
- c. Inflamasi merupakan suatu mekanisme proteksi tubuh terhadap gangguan dari luar atau infeksi.
- d. Hewan coba hewan laboratorium adalah hewan yang sengaja dipelihara dan ditenakkan untuk dipakai sebagai hewan model, dan juga untuk mempelajari dan mengembangkan berbagai macam bidang ilmu dalam skala penelitian atau pengamatan laboratorik.
- e. Dosis adalah takaran zat/obat yang dapat memberikan efek farmakologis.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah laboratorium murni yang meliputi penggunaan bahan alam yang diujikan pada hewan coba.

D. Kajian Pustaka

1. Penelitian tentang daun kersen sebelumnya telah banyak dilakukan diantaranya Ekstrak Etanol Daun Kersen (*Muntingia calabura* L.) Sebagai Antibakteri Terhadap *Streptococcus agalactiae* Penyebab Mastitis Subklinis Pada Sapi Perah. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : Penggunaan ekstrak etanol daun kersen pengaruhnya dapat menghambat pertumbuhan bakteri *Streptococcus agalactiae* dimana semakin tinggi konsentrasi ekstrak diperoleh zona hambat bakteri yang semakin besar. Konsentrasi ekstrak etanol daun kersen 40% memberikan pengaruh zona hambat tertinggi terhadap *Streptococcus agalactiae* dibandingkan dekok daun kersen 20% dan iodips 10%.

2. Fraksinasi dan Identifikasi Senyawa Antioksidan pada Ekstrak Etanol Daun Kersen (*Muntingia calabura* L.) Secara Kolom Kromatografi. Pada penelitian ini dilakukan pemisahan senyawa antioksidan secara kolom kromatografi dan fraksi-fraksi yang terkumpul diuji daya antioksidannya secara kualitatif dengan metode KLT – DPPH. Metode ekstraksi menggunakan perkolasi. Serbuk diekstraksi dengan menggunakan etanol 96% lalu diuapkan hingga didapatkan ekstrak kental (kadar air 8,68%). Dari hasil skrining fitokimia terhadap ekstrak dan fraksi aktif antioksidan diketahui bahwa ekstrak mengandung flavonoid, tanin, dan terpenoid, sedangkan fraksi mengandung tanin dan terpenoid. Fraksi kemudian diidentifikasi menggunakan kromatografi lapis tipis, spektrofotometer UV-Vis, dan spektroskopi infra red. Kandungan Senyawa yang memiliki daya antioksidan dari fraksi adalah golongan senyawa tanin. Hasil pengujian aktivitas antioksidan menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun kersen memiliki aktivitas antioksidan lebih besar dengan nilai IC₅₀ 14,4873 µg/ml sedangkan fraksinya mempunyai daya antioksidan lebih rendah dengan nilai IC₅₀ 16,492 µg/ml. Golongan metabolit sekunder dalam fraksi etanol daun kersen yang berfungsi sebagai senyawa antioksidan adalah tanin. Ekstrak etanol daun kersen (IC₅₀ = 14,4873 µg/ml) memiliki aktivitas antioksidan yang lebih baik dibandingkan dengan fraksinya (IC₅₀ = 16,492 µg/ml). Nilai IC₅₀ dari vitamin C 6,04 µg/ml dan nilai IC₅₀ rutin 8,05 µg/ml
3. Uji Efek Diuretik Ekstrak Etanol Daun Kersen (*Muntingia calabura* L.) Terhadap Kadar Natrium dan Kalium pada Urin Tikus Putih Jantan Galur Wistar. Penelitian ini merupakan eksperimental murni pre and post test group design. Sampel adalah 25 ekor tikus putih dibagi menjadi lima kelompok yaitu

kontrol negatif, kontrol positif (furosemid 2,5 mg/kg BB), ekstrak etanol daun kersen kadar 8% b/v, 10% b/v, 12% b/v. Setelah 24 jam volume urin tikus serta kadar natrium dan kalium diukur menggunakan Spektrometer Autolizer. Hasil diolah dengan ANOVA satu jalan dengan taraf kepercayaan 95% dan Uji LSD untuk volume urin, sedangkan untuk kadar natrium dan kalium diuji menggunakan Kruskal-Wallis dan Mann-Whitney dengan taraf kepercayaan 95%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun kersen mempunyai efek diuretik. Pada kadar 8% b/v, 10% b/v, dan 12% b/v menunjukkan efek diuretik yang sebanding dengan furosemid dosis 2,5 mg/kg BB. Serta dapat meningkatkan kadar Na⁺ dan K⁺ setelah pemberian ekstrak etanol daun kersen.

4. Isolasi dan Daya uji Antimikroba Ekstrak Daun Kersen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak hasil isolasi daun kersen merupakan senyawa flavonoid berupa auron, flavonol, dan flavon. Hal ini ditunjukkan dengan munculnya puncak pada spektrum UV-Vis di daerah panjang gelombang 382 nm, 350 nm dan 323 nm serta diperkuat dengan munculnya serapan khas C=O dan -OH pada spektrum IR. Ekstrak hasil isolasi daun kersen dengan pelarut etanol dan metanol memiliki daya hambat terhadap bakteri yakni terbukti mempunyai sifat antibakteri terhadap bakteri *Eschericia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Bacillus subtilis*, dan *Staphylococcus aureus*. Semakin tinggi konsentrasi ekstrak daun kersen semakin tinggi pula daya hambatnya terhadap bakteri. Ekstrak yang paling efektif menghambat bakteri adalah pada ekstrak dengan konsentrasi 96% dengan pelarut metanol.

5. Pengaruh Jus Buah Kersen (*Muntingia calabura* L.) Terhadap Kadar Asam Urat darah mencit (*Mus musculus*) dan analisis data menunjukkan bahwa penurunan kadar asam urat darah mencit yang diberi perlakuan, dari tertinggi keterendah yaitu kelompok II(kalium oksonat+aquades 0,5ml/20g), kelompok IV(kalium oksonat+jus kersen 0,5ml/20g), kelompok I (aquades 0,5/20g), dan terendah kelompok III(kalium oksonat+allopurinol 0,014/20g), dapat disimpulkan bahwa pemberian jus kersen berpengaruh terhadap penurunan kadar asam urat darah mencit, tetapi belum setara dengan Allopurinol untuk menurunkan kadar asam urat darah.
6. Menurut cerita rakyat Flores khusus di Watu Lendo Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat bahwa daun kersen ini banyak sekali khasiat salah satu diantaranya mengurangi radang (inflamasi). Daun kersen ini telah lama digunakan di masyarakat flores khususnya di Watu Lendo Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat-NTT untuk mengobati berbagai penyakit. Menurut cerita rakyat Peru juga, daun kersen dapat direbus atau direndam dalam air untuk mengurangi pembengkakan kelenjar prostat, sebagai obat untuk menurunkan panas, menghilangkan sakit kepala, flu dan mengobati penyakit asam urat, selain itu juga dapat dimanfaatkan sebagai antiseptik, antioksidan, antimikroba, antiinflamasi (mengurangi radang), antidiabetes, dan antitumor (Siddiqua *et al.* 2010).
7. Daun kersen mengandung kelompok senyawa antara lain flavanoid, fenolik, triterpenoid. Secara kualitatif diketahui bahwa senyawa yang dominan dalam daun kersen adalah flavanoid. Flavanoid diketahui berperan penting dalam penghambatan biosintesis prostaglandin (PGE) dan lipooksigenase (LOX)

(Nijveld, R. J. 2001). Fenolik dapat menghambat peradangan (inflamasi) dengan mekanisme penangkapan radikal bebas yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan jaringan dan akan memicu terjadinya biosintesis asam arakidonat menjadi mediator inflamasi (Lands, W.E. 1985) sedangkan triterpenoid mencegah produksi beberapa mediator proinflamasi dan menghambat PGE₂ (prostaglandin) (Fernandez MA. 2001).

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

- a. Mengetahui aktivitas ekstrak etanol daun kersen (*Muntingia calabura* L.) terhadap mencit (*Mus musculus*) sebagai antiinflamasi.
- b. Mengetahui konsentrasi ekstrak etanol daun kersen (*Muntingia calabura* L.) terhadap mencit (*Mus musculus*) sebagai antiinflamasi.
- c. Mengetahui analisis data secara statistik terdapat perbedaan yang signifikan.

2. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat terhadap penggunaan daun kersen (*Muntingia calabura* L.) sebagai antiinflamasi.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Inflamasi

1. Defenisi

Inflamasi merupakan suatu respon biologis dari jaringan-jaringan vaskular yang kompleks terhadap rangsangan yang dapat membahayakan seperti patogen, iritan dan kerusakan sel. Inflamasi adalah usaha protektif dari suatu organisme untuk menghilangkan stimuli yang merugikan sekaligus mengawali proses penyembuhan suatu jaringan (Denko, 1992). Inflamasi merupakan respons protektif setempat yang ditimbulkan oleh cedera atau kerusakan jaringan, yang berfungsi menghancurkan, mengurangi, atau mengurung (sekuestrasi) baik agen pencedera maupun jaringan yang cedera (Dorland, 2002).

Inflamasi (peradangan) merupakan suatu mekanisme pertahanan tubuh yang dilakukan oleh tubuh untuk melawan agen asing yang masuk ke tubuh, tidak hanya itu inflamasi juga bisa disebabkan oleh cedera jaringan oleh karena trauma, bahan kimia, panas, atau fenomena lainnya. Jaringan yang mengalami inflamasi tersebut melepaskan berbagai zat yang menimbulkan perubahan sekunder yang dramatis disekeliling jaringan yang normal (Guyton dan Hall, 1997).

Inflamasi adalah reaksi fisiologis setempat dari badan terhadap stimuli/rangsangan atau iritan noksius. Setiap iritan baik traumatik, kimiawi, maupun bakterial, menyebabkan suatu rangkaian dasar aksi fisiologik dan morfologik pada jaringan vaskular, limfatik dan penghubung. Tujuan inflamasi adalah untuk menghilangkan atau menghancurkan iritan atau untuk memperbaiki kerusakan

jaringan. Inflamasi membawa pada daerah inflamasi sel-sel fagositik untuk mencerna bakteri atau debris seluler, antibodi untuk mengenal, menyerang dan menghancurkan bahan asing, edema atau cairan untuk mencairkan dan menetralkan iritan dan fibrin untuk membatasi perluasan inflamasi (Louis, 1995).

2. Klasifikasi

Inflamasi secara umum dibagi menjadi 3 fase, yakni : inflamasi akut, respon imun dan inflamasi kronis. Inflamasi akut merupakan respon awal terhadap cedera jaringan, hal tersebut terjadi melalui media rilisnya autakoid serta pada umumnya didahului oleh pembentukan respon imun (Katzung, 2001). Fase ini ditandai dengan adanya vasodilatasi lokal dan peningkatan permeabilitas kapiler (Vogel, 2002).

Respon imun terjadi bila sejumlah sel yang mampu menimbulkan kekebalan diaktifkan untuk merespon organisme asing atau substansi antigenik yang terlepas selama respon terhadap inflamasi akut serta kronis. Akibat dari respon imun bagi hospes mungkin menguntungkan, seperti bilamana ia menyebabkan organisme penyerang menjadi difagositosis atau dinetralisir. Sebaliknya, akibat tersebut juga dapat bersifat merusak bila menjurus kepada inflamasi kronis. Inflamasi kronis melibatkan keluarnya sejumlah mediator yang tidak begitu berperan dalam respon akut seperti interferon, platelet-derived growth factor (PDGF) serta interleukin-1,2,3 (Katzung, 2001). Pada fase ini terjadi degenarasi jaringan dan fibrosis (Vogel, 2002).

3. Mediator Peradangan

Inflamasi dimulai saat sel mast berdegranulasi dan melepaskan bahan-bahan kimianya seperti histamin, serotonin dan bahan kimia lainnya. Histamin yang merupakan mediator kimia utama inflamasi juga dilepaskan oleh basofil dan

trombosit. Akibat pelepasan histamin ini adalah vasodilatasi pembuluh darah sehingga terjadi peningkatan aliran darah dan terjadinya peningkatan permeabilitas kapiler pada awal inflamasi (corwin.2008).

Mediator lain yang dilepaskan selama respon inflamasi yaitu faktor kemotaktik neutrofil dan eosinofil, dilepaskan oleh leukosit (neutrofil dan eosinofil) yang dapat menarik sel-sel ke daerah cedera. Selain itu, juga dilepaskan prostaglandin terutama seri E. Saat membran sel mengalami kerusakan, fosfolipid akan diubah menjadi asam arakhidonat dikatalisis oleh fosfolipase A₂. Asam arakhidonat ini selanjutnya akan dimetabolisme oleh lipooksigenase dan siklooksigenase (COX). Pada jalur siklooksigenase inilah prostaglandin disintesis. Prostaglandin dapat meningkatkan aliran darah ke tempat yang mengalami inflamasi, meningkatkan permeabilitas kapiler dan merangsang reseptor nyeri. Sintesis prostaglandin ini dapat dihambat oleh golongan obat AINS. Leukotrien merupakan produk akhir dari metabolisme asam arakhidonat pada jalur lipooksigenase. Senyawa ini dapat meningkatkan permeabilitas kapiler dan meningkatkan adhesi leukosit pada pembuluh kapiler selama cedera atau infeksi (Corwin, 2008).

Mediator inflamasi yang lain adalah sitokin, yaitu zat-zat yang dikeluarkan oleh leukosit. Sitokin bekerja seperti hormon dengan merangsang sel-sel lain pada sistem imun untuk berproliferasi atau menjadi aktif selama infeksi dan inflamasi. Sitokin terdiri dari dua kategori yaitu bersifat pro-inflamasi dan antiinflamasi. Sitokin pro-inflamasi antara lain interleukin-1 yang berasal dari makrofag dan monosit, interleukin-2, interleukin-6, *tumor necrosis factor*, dan interferon gamma berasal dari aktivasi limfosit. Sitokin pro-inflamasi berperan dalam merangsang makrofag untuk

meningkatkan fagositosis dan merangsang sumsum tulang untuk meningkatkan produksi leukosit dan eritrosit. Sitokin antiinflamasi meliputi interleukin-4 dan interleukin-10 yang berperan dalam menurunkan sekresi sitokin pro-inflamasi. Selain itu juga terdapat kemokin yaitu sejenis sitokin, bekerja sebagai agen kemotaksis yang meregulasi pergerakan leukosit (Corwin.2008).

4. Gejala-Gejala Terjadinya Respon Peradangan

a. Kemerahan (Rubor)

Kemerahan atau rubor biasanya merupakan hal pertama yang terlihat didaerah yang mengalami peradangan. Waktu reaksi peradangan mulai timbul maka arteri yang mensuplai darah ke daerah tersebut melebar, dengan demikian lebih banyak darah mengalir kedalam mikrosirkulasi lokal. Pembuluh-pembuluh darah yang sebelumnya kosong atau sebagian saja meregang dengan cepat dan terisi penuh oleh darah. Keadaan ini dinamakan hiperemia atau kongesti menyebabkan warna merah lokal karena peradangan akut. Timbulnya hiperemia pada permulaan reaksi peradangan diatur oleh tubuh melalui pengeluaran zat mediator seperti histamin (Price dan Wilson, 1995).

b. Panas (kalor)

Panas atau terjadi bersamaan dengan kemerahan dari reaksi peradangan. Panas merupakan sifat reaksi peradangan yang hanya terjadi pada permukaan tubuh yakni kulit. Daerah peradangan pada kulit menjadi lebih panas dari sekelilingnya, sebab darah dengan suhu 37°C yang disalurkan tubuh kepermukaan daerah yang terkena radang lebih banyak disalurkan dari pada ke daerah normal (Price dan Wilson, 1995).

c. Rasa sakit (Dolor)

Rasa sakit atau dolor dari reaksi peradangan dapat dihasilkan dengan berbagai cara. Perubahan pH lokal atau konsentrasi ion-ion tertentu dapat merangsang ujung-ujung saraf, pengeluaran zat kimia tertentu misalnya mediator histamin atau pembengkakan jaringan yang meradang mengakibatkan peningkatan tekanan lokal dapat menimbulkan rasa sakit (Price dan Wilson, 1995).

d. Pembengkakan (Tumor)

Gejala yang paling menyolok dari peradangan akut adalah tumor atau pembengkakan. Hal ini terjadi akibat adanya peningkatan permeabilitas dinding kapiler serta pengiriman cairan dan sel-sel dari sirkulasi darah ke jaringan yang cedera. Pada peradangan, dinding kapiler tersebut menjadi lebih permeabel dan lebih mudah dilalui oleh leukosit dan protein terutama albumin, yang diikuti oleh molekul yang lebih besar sehingga plasma jaringan mengandung lebih banyak protein dari pada biasanya yang kemudian meninggalkan kapiler dan masuk kedalam jaringan menjadi bengkak (Price dan Wilson, 1995).


e. Perubahan Fungsi (Fungsio Laesa)


Gangguan fungsi yang diketahui merupakan konsekuensi dari suatu proses radang. Gerakan yang terjadi pada daerah radang, baik yang dilakukan secara sadar ataupun secara reflek akan mengalami hambatan oleh rasa sakit, pembengkakan yang hebat secara fisik mengakibatkan berkurangnya gerak jaringan (Price dan Wilson, 1995).

5. Mekanisme terjadinya Radang

Terjadinya inflamasi adalah reaksi setempat dari jaringan atau sel terhadap suatu rangsang atau cedera. Setiap ada cedera, terjadi rangsangan untuk

dilepaskannya zat kimia tertentu yang akan menstimulasi terjadinya perubahan jaringan pada reaksi radang tersebut, diantaranya histamin, serotonin, bradikinin, leukotrin dan prostaglandin. Histamin bertanggung jawab pada perubahan yang paling awal yaitu menyebabkan vasodilatasi pada arteriol yang didahului dengan vasokonstriksi awal dan peningkatan permeabilitas kapiler, hal ini menyebabkan perubahan distribusi sel darah merah. Oleh karena aliran darah yang lambat, sel darah merah akan menggumpal, akibatnya sel darah putih terdesak kepinggir, makin lambat aliran darah maka sel darah putih akan menempel pada dinding pembuluh darah makin lama makin banyak. Perubahan permeabilitas yang terjadi menyebabkan cairan keluar dari pembuluh darah dan berkumpul dalam jaringan. Bradikinin bereaksi lokal menimbulkan rasa sakit, vasodilatasi, meningkatkan permeabilitas kapiler. Sebagai penyebab radang, prostaglandin berpotensi kuat setelah bergabung dengan mediator lainnya (mansjoer, 1999).





Gambar 1 : Mekanisme Terjadinya Inflamasi

Asam arakhidonat merupakan prekursor dari sejumlah besar mediator inflamasi. Senyawa ini merupakan mediator inflamasi. Senyawa ini merupakan komponen utama lipid seluler dan hanya terdapat dalam keadaan bebas dengan jumlah kecil yang sebagian besar berada dalam fosfolipid membran sel. Bila membran sel mengalami kerusakan oleh suatu rangsangan maka enzim fosfolifase diaktivasi untuk mengubah menjadi asam arakhidonat, kemudian sebagian diubah oleh enzim siklooksigenase atau COX dan seterusnya menjadi prostaglandin, prostasiklin dan tromboksan. Bagian lain dari asam arakhidonat diubah oleh enzim lipooksigenase menjadi leukotrin. Siklooksigenase terdiri dari dua iso enzim, COX 1 dan COX 2. Iso enzim COX 1 terdapat kebanyakan di jaringan seperti di ginjal, paru-paru, platelet dan saluran cerna sedangkan COX 2 tidak terdapat di jaringan, tetapi dibentuk selama proses peradangan oleh sel-sel radang. Leukotrin yang dibentuk melalui alur lipooksigenase yaitu LTA_4 yang tidak stabil yang kemudian oleh hidrolase diubah menjadi LTB_4 atau LTC_4 yang terakhir bisa diubah menjadi LTD_4 dan LTE_4 , selain pada rema, leukotrin dibentuk digranulosit eosinofil dan berkhasiat vasokonstriksi di bronkus dan mukosa lambung. Khusus LTB_4 disintesa di makrofag dan bekerja menstimulasi migrasi leukosit. Mediator-mediator ini dinamakan *slow substance of anaphylaxis* (SRS-A) (Tjay, 2002).

6. Pengobatan Inflamasi

Secara umum pengobatan inflamasi dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu :


a. Anti Inflamasi Non-Steroid (AINS)


Obat golongan AINS yang mempunyai khasiat sebagai analgetik, antipiretik serta antiinflamasi merupakan suatu kelompok obat yang heterogen, bahkan beberapa

obat sangat berbeda secara kimia. Walaupun demikian, obat-obat ini memiliki banyak persamaan dan efek terapi maupun efek samping berdasarkan mekanisme kerjanya, yaitu menghambat biosintesis prostaglandin (Wilmana, 2007).

AINS menghambat siklooksigenase (COX) sehingga konversi asam arakhidonat menjadi prostaglandin, prostasiklin dan tromboksan yang berperan dalam menimbulkan reaksi peradangan terganggu (Gambar 2). Tetapi inflamasi nonsteroid tidak menghambat biosintesis leukotrien yang diketahui ikut berperan dalam proses inflamasi (Wilmana, 2007).

Siklooksigenase terdapat dalam dua bentuk, yaitu COX-1 dan COX-2. COX-1 penting dalam pemeliharaan berbagai organ dan jaringan khususnya ginjal, saluran cerna dan trombosit. Jika aktivitas COX-1 dihambat oleh AINS maka akan timbul efek samping pada berbagai organ dan jaringan tersebut. Sedangkan jika aktivitas COX-2 dihambat oleh AINS maka inflamasi akan berkurang (Wilmana, 2007; Fitzgerald Garret & Carlo, 2001).





(Sumber : Wilmana, 2007)

Gambar 2 : Biosintesis Prostaglandin

Berdasarkan mekanisme penghambatan siklooksigenase, AINS dikelompokkan menjadi AINS non-selektif dan AINS selektif penghambat COX-2. AINS selektif penghambat COX-2 antara lain selekoksib, rekoksib, dan etorikoksib. Sedangkan AINS non-selektif antara lain aspirin, indometasin, diflunisal, naproksen dan natrium diklofenak. AINS selektif penghambat COX-2 terbukti kurang menyebabkan gangguan saluran cerna dibanding AINS non-selektif tetapi tidak ada yang secara klinis terbukti lebih efektif dari AINS-non selektif (Wilmana, 2007)

Satu diantara obat golongan AINS yang sering digunakan untuk mengatasi inflamasi dan nyeri adalah natrium diklofenak. AINS derivat fenil asetat ini, memiliki aktivitas analgesik dan antipiretik serta memiliki potensi efek antiinflamasi kuat dan efek samping iritasi terhadap saluran cerna yang lebih rendah jika dibandingkan dengan indometasin, naproxen, piroxicam. Obat ini sering digunakan untuk mengatasi radang pada penyakit karena arthritis (Health Professions Division, 1996).

Diklofenak diabsorpsi cepat dan sempurna setelah pemberian peroral. Konsentrasi plasma obat ini tercapai dalam 2-3 jam. Pemberian bersama makanan akan memperlambat laju absorpsi tetapi tidak mengubah jumlah yang diabsorpsi. Bioavailabilitasnya sekitar 50% akibat metabolisme lintas pertama yang cukup besar. Obat ini 99% terikat pada protein plasma dan waktu paruhnya berada pada rentang 1-3 jam. Diklofenak diakumulasi di cairan sinovial setelah pemberian oral. Hal ini menjelaskan bahwa efek terapi di sendi jauh lebih panjang daripada waktu paruhnya. Dosis untuk radang akibat arthritis adalah 100-150 mg sehari terbagi dalam 2 atau 3 dosis (Health Professions Division, 1996 ; Wilmana, 2007).

b. Kortikosteroid

Timbulnya gejala inflamasi dapat dicegah atau ditekan oleh kortikosteroid. Mekanisme kerjanya adalah menghambat aktivitas fosfolipase, sehingga mencegah pelepasan awal asam arakhidonat yang diperlukan untuk mengaktifasi jalur enzim berikutnya. Hal ini menyebabkan sintesis prostaglandin, tromboksan, prostasiklin maupun leukotrien terganggu (Gambar 2). Di samping itu, kortikosteroid juga dapat mengurangi gejala inflamasi dengan efek vaskularnya. Yaitu vasokonstriksi, penurunan permeabilitas kapiler dengan mengurangi jumlah histamin yang dilepaskan oleh basofil, menghambat fungsi fagositosis leukosit dan makrofag jaringan (Katzung, 2002; Wilmana, 2007).

B. Daun Kersen

1. Uraian Tanaman

a. Klasifikasi Tanaman (Tjitrosoepomo.1991).

Kerajaan	: Plantae (Tumbuhan)
Divisi	: Spermatophyta (Tumbuhan biji)
Anak Divisi	: Angiospermae (Tumbuhan biji tertutup)
Kelas	: Dicotyledoneae (Tumbuhan biji belah/ dikotil)
Anak Kelas	: Dialypetalae
Bangsa	: Malvales / Columniferae
Suku	: Elaeocarpaceae
Genus	: Muntingia

Spesies : *Muntingia calabura* L.



Gambar 3. Kersen

b. Nama Lain

Di beberapa daerah, seperti di Jakarta buah ini juga dinamai ceri, Gresem (NTT), Talok (Jawa). Nama-nama lainnya di beberapa negara adalah: Takhob farang (Thailand), kerukup siam (Malaysia,) Singapore cherry (Inggris), Japanese kers (Belanda), yang lalu dari sini diambil menjadi kersen dalam bahasa Indonesia. Nama ilmiahnya adalah *Muntingia calabura* L. (Dagun, 2006).

c. Morfologi Tumbuhan

Deskripsi tanaman talok (kersen) berperawakan pohon kecil yang selalu hijau, tingginya 3-12 m. Percabangannya mendatar, menggantung ke arah ujung, berbulu halus-halus. Daunnya tunggal, berbentuk bulat telur sampai berbentuk lanset, berukuran (4-14) cm x (1-4) cm, dengan pangkal lembaran daun yang nyata tidak simetris, tepi daun bergerigi, lembaran daun bagian bawah berbulu kelabu. Bunga-bunga ((1-3-5) kuntum) terletak pada satu berkas yang letaknya supra-aksilar dari daun, bersifat hermafrodit. Buahnya bertipe buah buni, berwarna merah kusam,

berdiameter 15 mm, berisi beberapa ribu biji yang kecil, terkubur dalam daging buah yang lembut (Sentra, 2005)

2. Kandungan Daun Kersen

Kersen (talok) merupakan tanaman buah tropis yang mudah dijumpai dan termasuk dalam famili *Elaeocarpaceae*. Kersen (talok) berkhasiat sebagai antioksidan, obat sakit kuning, memelihara kesehatan hati dan ginjal, mencegah kanker, dan meningkatkan kebugaran tubuh (Sentra, 2005).


Daun kersen (talok) telah lama dimanfaatkan sebagai tanaman obat tradisional yang digunakan sebagai obat sakit kepala dan anti radang oleh masyarakat Peru (Wiwied, 2009). Daun kersen (talok) mengandung kelompok senyawa atau lignan antara lain flavonoid, tannin, triterpen, saponin, dan polifenol yang menunjukkan aktivitas antioksidatif (Priharyanti, 2007 dan Zakaria, 2007). Secara kualitatif diketahui bahwa senyawa yang dominan dalam daun kersen (talok) adalah flavonoid (Zakaria, 2007).

Aktivitas antioksidatif daun kersen (talok) (*Muntingia calabura* L.) melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Pengikatan radikal bebas
2. Dekomposisi peroksida lipid
3. Pengikatan katalis ion logam transisi
4. Pencegahan inisiasi dan berlanjutnya kerusakan rantai hidrogen

(Zakaria, 2007).

Daun kersen (talok) juga mengandung flavanon dan flavon.



7-methoxy 3,5,8-trihydroxyflavanone (Park *et al*, 2003).

Nutrisi tanaman kersen per 100 g adalah air, protein, lemak, serat, kalsium, fosfor, karoten, vitamin B₁, B₂, B₃ dan C. Kandungan senyawa aktif tanaman kersen adalah ester, alkohol, flavonoid, sesquiterpenoid dan derivat furan. Manfaat tanaman kersen adalah sebagai obat batuk, obat sakit kepala, antiinflamasi, antioksidan, antikanker, antinosiseptik, antibakteri dan kardioprotektif (Lim, 2012). Secara kualitatif diketahui bahwa senyawa yang dominan dalam daun kersen adalah flavonoid yang menunjukkan aktivitas antioksidan (Zakaria *et al*, 2007).

Mekanisme antiinflamasi yang dilakukan oleh flavonoid dapat melalui beberapa jalur yaitu : Penghambatan aktivitas enzim COX dan/atau lipooksigenase. Aktivitas antiinflamasi flavonoid dilaporkan oleh Pearson (2005), Landolfi *et al.*, (1984) dalam Nijveldt *et al.*, (2001), dan Robak dan Gryglewski (1996) karena penghambatan COX atau lipooksigenase. Penghambatan jalur COX dan lipooksigenase ini secara langsung juga menyebabkan penghambatan biosintesis eikosanoid (Damas *et al.*, 1985 dalam Nijveldt *et al.*, 2001) dan leukotrien (Mueller, 2005), yang merupakan produk akhir dari jalur COX dan lipooksigenase.

Penghambatan akumulasi leukosit. Ferrandiz dan Alcaraz (1991) mengemukakan bahwa efek antiinflamasi flavonoid dapat disebabkan oleh aksinya dalam menghambat akumulasi leukosit di daerah inflamasi. Menurut Frieseneker *et*

al., (1994) dalam Nijveldt et al., (2001), pada kondisi normal leukosit bergerak bebas sepanjang dinding endotel. Selama inflamasi, berbagai mediator turunan endotel dan faktor komplemen mungkin menyebabkan adhesi leukosit ke dinding endotel sehingga menyebabkan leukosit menjadi immobil dan menstimulasi degranulasi netrofil. Frieseneker et al., (1994 dalam Nijveldt et al., (2001) menyebutkan bahwa pemberian flavonoid dapat menurunkan jumlah leukosit immobil dan mengurangi aktivasi komplemen sehingga menurunkan adhesi leukosit ke endotel dan mengakibatkan penurunan respon inflamasi tubuh. Penghambatan degranulasi netrofil. Tordera et al., (1994) dalam Nijveldt et al., (2001) menduga bahwa flavonoid dapat menghambat degranulasi netrofil, sehingga secara langsung mengurangi pelepasan asam arakhidonat oleh netrofil.

Pengambilan zat kimia dalam daun talok (daun kersen) tersebut dilakukan dengan ekstraksi prinsip maserasi dimana serbuk daun talok direndam dalam pelarut tertentu. Isi sel akan larut karena perbedaan konsentrasi kemudian dilakukan penyaringan dan penguapan sehingga didapatkan ekstrak daun talok (Zakaria *et al*, 2007). Maserasi digunakan untuk penyarian simplisia yang mengandung zat aktif yang mudah larut dalam cairan penyari. Flavonoid mudah larut dalam air, terutama glikosidanya. Oleh karena itu senyawa ini berada dalam ekstrak air tumbuhan (Harbone, 1987).

C. Metode Ekstraksi

1. Ekstraksi

Ekstrak adalah sediaan kering, kental atau cair dibuat dengan menyari simplisia nabati atau hewani menurut cara yang cocok, diluar pengaruh cahaya matahari langsung (Ditjen POM, 1979). Ekstraksi adalah suatu cara penyarian simplisia dengan menggunakan penyari tertentu (Harborne, 1987). Ekstraksi adalah kegiatan penarikan kandungan kimia yang dapat larut sehingga terpisah dari bahan yang tidak larut dengan pelarut cair (Ditjen POM, 2000). Cara penyarian (ekstraksi) yang tepat tergantung pada jenis senyawa yang diisolasi dan pelarut yang digunakan.

Ada beberapa metode ekstraksi menurut Ditjen POM (2000) yaitu:

a. Cara dingin

- 1) Maserasi adalah proses pengekstraksian simplisia menggunakan pelarut yang statis dalam suatu wadah dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperatur kamar. Remaserasi berarti dilakukan pengulangan penambahan pelarut setelah dilakukan penyaringan maserat pertama.
- 2) Perkolasi adalah ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru yang dialirkan dari suatu reservoir sampai terjadi penyarian sempurna yang umumnya dilakukan pada temperatur ruangan. Proses perkolasi terdiri dari tahapan pengembangan bahan, tahap maserasi antara, tahap perkolasi sebenarnya (penetesan atau penampungan ekstrak), terus menerus sampai diperoleh ekstrak (perkolat).

b. Cara Panas

- 1) Refluks adalah ekstraksi pelarut pada temperatur titik didihnya, selama waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas yang relatif konstan dengan adanya pendingin balik.
- 2) Digesti adalah maserasi dengan pengadukan kontinyu pada temperatur yang lebih tinggi dari temperatur ruangan yaitu temperatur 40-50°
- 3) Infus adalah ekstraksi dengan pelarut air pada temperatur penangas air (bejana infus tercelup dalam penangas air mendidih, temperatur terukur 96-98 °C
- 4) Dekok adalah infus pada waktu yang lebih lama dan temperatur sampai titik didih air (Ditjen POM, 2000).
- 5) Sokletasi merupakan proses ekstraksi yang menggunakan penyarian berulang dan pemanasan. Penggunaan metode sokletasi adalah dengan cara memanaskan pelarut hingga membentuk uap dan membasahi sampel. Pelarut yang sudah membasahi sampel kemudian akan turun menuju labu pemanasan dan kembali menjadi uap untuk membasahi sampel, sehingga penggunaan pelarut dapat dihemat karena terjadi sirkulasi pelarut yang selalu membasahi sampel. Proses ini sangat baik untuk senyawa yang tidak terpengaruh oleh panas (Darwis (2000)).

2. Tujuan Ekstraksi

Tujuan ekstraksi adalah untuk menarik semua komponen kimia yang terdapat dalam sampel. Ekstraksi ini didasarkan pada perpindahan massa komponen zat padat ke dalam pelarut dimana perpindahan mulai terjadi pada lapisan antar muka, kemudian berdifusi masuk ke dalam pelarut (Ditjen POM, 1986).

3. Ekstraksi Secara Maserasi

Maserasi adalah proses pengekstrakan simplisia dengan menggunakan pelarut dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperatur kamar (Ditjen, 2000). Maserasi adalah proses penyarian simplisia menggunakan pelarut dengan perendaman dan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperatur ruangan (kamar). Cairan penyari akan menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat aktif yang akan larut, karena adanya perbedaan konsentrasi larutan zat aktif di dalam sel dan di luar sel maka larutan terpekat didesak keluar. Proses ini berulang sehingga terjadi keseimbangan konsentrasi antara larutan di dalam dan diluar sel. Cairan penyari yang digunakan dapat berupa air, etanol, metanol, etanol-air atau pelarut lainnya. Remaserasi berarti dilakukan penambahan pelarut setelah dilakukan penyaringan maserat pertama, dan seterusnya. Remaserasi berarti dilakukan penambahan pelarut setelah dilakukan penyaringan maserat pertama, dan seterusnya. Keuntungan cara penyarian dengan maserasi adalah cara pengerjaan dan peralatan yang digunakan sederhana yang mudah diusahakan (Ditjen POM 1995).

Maserasi digunakan untuk penyarian simplisia yang mengandung zat aktif yang mudah larut dalam cairan penyari, tidak mengandung zat yang mudah mengembang dalam cairan penyari, tidak mengandung benzoin, strirak dan lain-lain. Cairan penyari yang digunakan dapat berupa air, etanol, air, etanol atau pelarut lain.

Etanol merupakan penyari yang bersifat universal yaitu dapat melarutkan senyawa polar maupun senyawa nonpolar. Etanol adalah senyawa yang mudah menguap, jernih (tidak berwarna), berbau khas. Etanol mudah menguap baik pada

suhu rendah maupun pada suhu mendidih (78°C), mudah terbakar, serta larut dalam air, dan semua pelarut organik. Bobot jenis etanol tidak lebih dari 0,7964. Etanol dipertimbangkan sebagai penyari karena lebih selektif dibandingkan air. Selain itu, kapang dan mikroba sulit tumbuh dalam etanol 20% ke atas. Etanol juga memiliki beberapa keuntungan lain yaitu tidak beracun, netral, absorpsi baik, dapat bercampur dengan air pada segala perbandingan, dapat memperbaiki stabilitas bahan obat terlarut, dan tidak memerlukan panas yang tinggi untuk pemekatan (Ditjen POM 1995). Penggunaan etanol sebagai cairan pengekstraksi biasanya dicampur dengan pelarut lain, terutama campuran etanol dan air. Etanol yang paling baik untuk menghasilkan senyawa aktif yang optimal adalah etanol 70% (Voight, 1995).

4. Rotary Evaporator

Vacuum Rotary Evaporator adalah alat yang berfungsi untuk memisahkan suatu larutan dari pelarutnya sehingga dihasilkan ekstrak dengan kandungan kimia tertentu sesuai yang diinginkan. Cairan yang ingin diuapkan biasanya ditempatkan dalam suatu labu yang kemudian dipanaskan dengan bantuan penangas, dan diputar. Uap cairan yang dihasilkan didinginkan oleh suatu pendingin (kondensor) dan ditampung pada suatu tempat (receiver flask). Setelah pelarutnya diuapkan, akan dihasilkan ekstrak yang dapat berbentuk padatan atau cairan (Nugroho et al., 1999).

Kecepatan alat ini dalam melakukan evaporasi sangat cepat, terutama bila dibantu oleh vakum. Terjadinya bumping dan pembentukan busa juga dapat dihindari. Kelebihan lainnya dari alat ini adalah diperolehnya kembali pelarut yang diuapkan. Prinsip kerja alat ini didasarkan pada titik didih pelarut dan adanya tekanan yang menyebabkan uap dari pelarut terkumpul di atas, serta adanya kondensor (suhu

dingin) yang menyebabkan uap ini mengembun dan akhirnya jatuh ke tabung penerima (receiver flask) (Mutairi dan Jasser, 2012).

D. Karagenin

Iritan yang digunakan untuk pengujian efek antiinflamasi beragam jenisnya, satu diantaranya adalah karagenin. Karagenin merupakan polisakarida hasil ekstraksi rumput laut dari family Eucheuma, Chondrus, dan Gigartina. Bentuknya berupa serbuk berwarna putih hingga kuning kecoklatan, ada yang berbentuk butiran kasar hingga serbuk halus, tidak berbau, serta memberi rasa berlendir di lidah. Karagenin juga memiliki sifat larut dalam air bersuhu 80°C (Rowe et al., 2009).

Karagenin berperan dalam pembentukan edema dalam model inflamasi akut (Singh et al., 2008). Karagenin dipilih karena dapat menstimulasi pelepasan prostaglandin setelah disuntikkan ke hewan uji. Oleh karena itu, karagenin dapat digunakan sebagai iritan dalam metode uji yang bertujuan untuk mencari obat-obat antiinflamasi, tepatnya yang bekerja dengan menghambat sintesis prostaglandin (Winter et al., 1962).

Ada tiga fase pembentukan edema yang diinduksi oleh karagenin. Fase pertama adalah pelepasan histamin dan serotonin yang berlangsung hingga 90 menit. Fase kedua adalah pelepasan bradikinin yang terjadi pada 1,5 hingga 2,5 jam setelah induksi. Pada fase ketiga, terjadi pelepasan prostaglandin pada 3 jam setelah induksi, kemudian edema berkembang cepat dan bertahan pada volume maksimal sekitar 5 jam setelah induksi (Morris, 2003). Berdasarkan penelitian terdahulu, yang berperan dalam proses pembentukan edema adalah prostaglandin yang terbentuk melalui proses biosintesis prostaglandin. Senyawa ini dilepaskan lalu bereaksi dengan

jaringan di sekitarnya dan menyebabkan perubahan pada pembuluh darah yang merupakan awal mula terjadinya edema (Vinegar et al., 1976).

E. Hewan Coba

Hewan coba yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencit (*Mus musculus*). Mencit termasuk hewan percobaan yang paling banyak digunakan dalam penelitian (Smith & Mangkoewidjojo, 1988).

Hewan ini memiliki sistematika sebagai berikut : (Sugiyanto,1995)

Filum : Chordata
Sub filum : Vertebrata
Kelas : Mamalia
Sub kelas : Placentalia
Ordo : Rodentia
Famili : Muridae
Genus : Mus
Spesies : *Mus musculus*

Mencit termasuk mamalia yang dianggap memiliki struktur anatomi pencernaan mirip manusia, mudah ditangani dan mudah diperoleh dengan harga relatif murah dibandingkan hewan uji yang lain (Mangkoewidjojo & Smith, 1988). Hewan ini bersifat fotofobik dan penakut. Mencit merupakan hewan *nocturnal* yang

lebih aktif di malam hari, Aktivitas ini menurun dengan kehadiran manusia sehingga mencit perlu diadaptasikan terlebih dahulu dengan lingkungannya (Pamudji, 2003).

Menurut Ngatijan (1991) Mencit sering digunakan dalam penelitian dikarenakan mencit mewakili hewan dari kelas mamalia, sehingga sistem reproduksi, pernapasan dan peredaran darah, ekskresi dan organ lainnya sudah menyerupai manusia. Mencit mempunyai masa hidup 1 hingga 2 tahun. Mencit jantan dan betina mencapai kematangan seksual (siap dikawinkan) pada usia 8 minggu. Mencit memiliki tubuh yang ditutupi oleh rambut, kulit dengan kelenjar dan jari-jari cakram. Berikut Data Biologis mencit :

Lama Hidup	1-2 tahun, bisa sampai 3 tahun
Umur dewasa	35 hari
Siklus kelamin	Polyestrus
Berat dewasa	Jantan : 20 - 40 gr Betina : 18 – 35 gr
Suhu (Rektal)	35 – 39 °C (rata-rata 37,4°C)
Tekanan darah	130 – 160 sistol, 102-110 diastol, turun menjadi 110 sistol, 80 diastol dengan anastesi
Konsumsi O ²	2,38-4,48 mL/gr/jam
Volume darah	75-80 ml/Kg
Sel darah merah	7,7-12,5.10 ⁶ /mm ³
Sel darah putih	6,0-12,6.10 ³ / mm ³
Netrofil	12-30 %

Limfosit	55-85 %
Monosit	1-12 %
Eosinofil	0,2-40 %
PCV (package cell volume)	41-48 %
Trombosit	150-400.10 ³ /mm ³
Hb	13-16 gr/100 mL
Protein plasma	4,0-6,8/100 mL

(Smith dan Mangkoewidjojo, 1988).

F. Tinjauan Islam

Kitab suci Al-qur'an adalah kalamullah sebagai jalan hidup bagi kaum Muslimin dan memiliki otoritas tertinggi sebagai dasar penentuan hukum dan tatacara berperilaku bagi kaum Muslimin. Di dalam Al-qur'an, termuat seluruh kebenaran yang mengatur segala aspek kehidupan termasuk dalam hal pengobatan. Dalam pelaksanaannya, Al-qur'an perlu diperinci dengan hadis Rasulullah Saw. Hadis mencakup seluruh aspek kehidupan Rasulullah SAW yang merupakan teladan terbaik bagi seorang Muslim dalam bertindak, termasuk dalam hal pengobatan suatu penyakit yang beberapa diantaranya menggunakan bahan-bahan yang berasal dari alam.

Beberapa bahan alam, menurut Al-qur'an dan Hadis yang dapat digunakan sebagai obat-obatan, antara lain, sitrun, beras, beras ketan, semangka, kurma, telur, bawang merah, buah ara, gandum, bawang putih, jinten hitam, cuka, daun kemangi, buah delima, minyak zaitun, jahe, kayu siwak, minyak samin, ikan, sayur rebus, kacang kedelai, pisang, mayang, anggur, madu, kayu cendana, kacang adas, mentimun, lada hitam, susu, air, kesturi, garam, dan labu (AlJauziyah, 2008).

Terjemahnya : *“Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan Maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan (perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman.*

Dalam ayat di atas Allah menjelaskan bahwa Dia-lah yang menurunkan hujan dari langit sebagai rahmat bagi semesta alam yang merupakan salah satu bentuk nikmat yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya. Dalam lanjutan ayat tersebut Allah swt. menumbuhkan berbagai macam tumbuhan yang tumbuh dari bumi dan dari berbagai macam tumbuhan tersebut Allah tambahkan beberapa nikmatnya yaitu dihasilkannya buah yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan ummat manusia. Manusia diberikan tanggung jawab untuk menjaga dan mengelola dengan baik (Rossidy, 2008).

Allah berfirman dalam Al-qur'an surah Taahaa/20 : 53

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَّكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَأَخْرَجْنَا بِهٖ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ ٥٣

Terjemahnya: *“Yang Telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang Telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit*

air hujan. Maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuhan-tumbuhan yang bermacam-macam.”

Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa banyak jenis tumbuhan yang mampu tumbuh di bumi ini dengan adanya air hujan. Tumbuhan yang tumbuh seperti tumbuhan obat dan lain, ada tumbuhan yang tergolong ke dalam tumbuhan tingkat rendah yaitu tumbuhan yang tidak jelas bagian akar, batang dan daunnya. Golongan selanjutnya mengalami perkembangan adalah tumbuhan tingkat tinggi yaitu tumbuhan yang bisa dibedakan secara jelas bagian daun, batang dan akarnya. Dalam ayat ini, Allah menunjukkan empat tanda-tanda kekuasaan-Nya Yang menunjukkan bahwa hanya Allah-lah yang berhak untuk di sembah. Di samping sebagai tanda yang menunjukkan atas kesempurnaan kekuasaan Allah dan keberkahan-Nya atas ibadah, bukan selain-Nya, keempat tanda tersebut merupakan nikmat yang sangat besar bagi manusia. Keempat tanda tersebut yaitu (Rossidy, 2008):

1. Allah menghamparkan bumi dalam bentuk yang menakjubkan ini. Bentuk yang tiada satu makhluk pun yang dapat menyamainya, hanya Allah lah tempat berlindung dan menguasai kerajaan-Nya.
2. Allah telah menjadikan di bumi ini terdapat jalan-jalan yang dilewati manusia. Jalan yang menjadi lahan guna mendekatkan diri kepada Allah.
3. Allah menurunkan air hujan dari langit dengan bentuk sedemikian rupa dan menakjubkan, hujan yang membawa rahmat bagi kehidupan di bumi termasuk manusia, hewan, tumbuhan dan segala ciptaan Allah yang ada di muka bumi.

4. Allah menumbuhkan berbagai jenis tumbuhan dari dalam bumi dengan berbagai macam bentuk dan dengan berbagai fungsi dan manfaat yang berbeda pula.

Teknologi medis boleh saja merambati modernisasi dan shopisticasi yang sulit diukur. Namun perkembangan jenis penyakit juga tidak kalah cepat beregenerasi. Sementara banyak manusia yang tidak menyadari bahwa Allah swt. tidak pernah menciptakan manusia dengan ditinggalkan begitu saja. Setiap kali penyakit muncul, pasti Allah swt. juga menciptakan obatnya. Sabda Rasulullah saw *“Tidaklah Allah swt. menurunkan suatu penyakit, melainkan Dia turunkan penyembuhnya.”* (HR. Al-Bukhari dan Ibnu Majah.) Hanya saja ada manusia yang mengetahuinya dan ada yang tidak mengetahuinya.

Nabi Muhammad saw bersabda yang *Artinya: “Setiap penyakit ada obatnya, jika obat itu tepat mengenai sasarannya, maka dengan izin Allah penyakit itu sembuh”* (HR. Muslim dan Ahmad).

Hadits tersebut menjelaskan bahwa segala sesuatu penyakit pasti akan ada penawarnya (obat). Akan tetapi pemilihan akan obat yang tepat sasaran menjadi tantangan besar bagi manusia untuk mengupayakan dan menggali pengetahuannya. Dengan diciptakannya tumbuhan yang beraneka ragam. Manusia dituntut untuk mengkaji dan mempelajari tentang tumbuhan mana yang bisa berpotensi sebagai obat penyakit tertentu sehingga kesejahteraan manusia akan mudah tercapai (An-Najjar, 2006).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah bersifat eksperimental laboratorium.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Kimia Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan Farmakologi toksikologi Fakultas Farmasi Universitas Muslim Indonesia Makassar.

B. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dilakukan oleh penulis adalah penelitian eksperimental, berdasarkan permasalahan dan penjabaran pada latar belakang.

C. Instrumen Penelitian

1. Alat

Gelas piala, Gelas ukur, Kanula, Kompor, Timbangan analitik, Lumpang dan Alu, Panci, Plathysmometer model/series PANLAB LE 7500, Seperangkat Alat Maserasi.

2. Bahan

Aquadest, Daun kersen (*Muntingia calabura* L.), Etanol 70%, Karagenin, Na-CMC, NaCl 0,9%, Tablet natrium diklofenak.

D. Prosedur Kerja

1. Pengambilan Sampel

Sampel daun kersen (*Muntingia calabura* L.) diperoleh di Anging Mamiri, Kota Makassar-Sulawesi Selatan. Pengambilan sampel ini dilakukan dengan mengambil daun kersen yang masih muda atau yang belum terlalu tua. Sampel diambil pada pagi hari.

2. Pengolahan Sampel

Sampel daun kersen (*Muntingia calabura* L.) yang telah dipetik dibersihkan dari kotoran yang menempel, lalu dicuci dengan air mengalir, kemudian diangin-anginkan ditempat yang tidak terkena langsung sinar matahari. Setelah kering, sampel di serbukkan dan siap untuk diekstraksi

3. Ekstraksi Sampel

Sampel ditimbang sebanyak 500 g, kemudian dimasukkan kedalam wadah maserasi. Pelarut etanol 70% dituang secara perlahan-lahan kedalam wadah maserasi yang berisi sampel sambil diaduk sampai pelarut merata. Pelarut etanol 70% dibiarkan sampai diatas permukaan sampel, ekstraksi dilakukan selama 3 x 24 jam dan setiap 24 jam pelarut etanol 70% diganti sambil sekali-kali diaduk, filtrat hasil penyaringan diuapkan menggunakan Rotary Evaporator sampai diperoleh ekstrak kental dan dikeringkan dengan menggunakan waterbath.

4. Penyiapan Bahan Uji

a. Pembuatan Sediaan uji

Pembuatan suspensi sediaan uji. Sediaan uji dibuat dengan cara menimbang ekstrak daun kersen dengan konsentrasi 4%, 6 % dan 8% masing-masing 12 mg, 18

mg, 24 mg. ekstrak kemudian disuspensikan dalam larutan Na-CMC 1% hingga 10 ml

b. Pembuatan larutan koloidal Na-CMC 1 %.

Na- CMC 1% dibuat dengan menimbang 1 g serbuk Na-CMC dan di larutkan dalam air hingga volume 100 ml.

c. Pembuatan Suspensi Karagenin 1%.

Karagenin 1% di peroleh dengan menimbang 1 g karagenin dan dilarutkan dalam NaCl 0,9% sampai 100 ml.

d. Pembuatan Suspensi Natrium Diklofenak

Sebanyak 10 tablet natrium diklofenak (setiap tablet mengandung natrium diklofenak 25 mg) ditimbang, kemudian dihitung bobot rata-rata dan diperoleh bobot rata-rata 183 mg lalu digerus. Natrium diklofenak ditimbang sebanyak 7,137 mg kemudian disuspensikan dengan dalam larutan Na-CMC 1% sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga homogen kemudian dimasukkan kedalam labu tentukur 10 ml kemudian volumenya dicukupkan sampai 10 ml.

E. Pemilihan dan Penyiapan Hewan Uji

Hewan uji yang digunakan adalah Mencit putih (*Mus musculus*), Berat Badan 20-30 gram, umur 2-3 bulan. Kondisi hewan adalah sehat. Jumlah mencit putih (*Mus musculus*) yang digunakan sebanyak 15 ekor yang dibagi menjadi 5 kelompok dan tiap kelompok terdiri atas 3 ekor.

F. Perlakuan Terhadap Hewan Uji

Mencit dipuasakan selama 8 jam sebelum pelaksanaan percobaan dimulai. Sebelum pengujian, mencit ditimbang terlebih dahulu kemudian masing-masing mencit diinduksi dengan karagenin 1% secara intraplantar lalu diukur volume awal

kaki mencit. Setelah itu, diukur volume edema kaki mencit 1 jam setelah penyuntikan karagenin 1% dengan cara mencelupkannya dalam alat platysmometer. Kemudian sediaan diberikan peroral dengan volume pemberian maksimal 1 ml sesuai dengan kelompok perlakuan sebagai berikut :

- a. **Kelompok I** : Kontrol negatif dengan perlakuan per oral suspensi Na-CMC 1% b/v
- b. **Kelompok II** : Diberi perlakuan ekstrak etanol daun kersen per oral konsentrasi 4% b/v
- c. **Kelompok III** : Diberi perlakuan ekstrak etanol daun kersen per oral konsentrasi 6% b/v
- d. **Kelompok IV** :Diberi perlakuan ekstrak etanol daun kersen per oral konsentrasi 8% b/v
- e. **Kelompok V** : Kontrol positif dengan perlakuan pemberian per oral Natrium diklofenak.

Kemudian diukur volume udem telapak kaki mencit setelah perlakuan setiap selang waktu 1 jam selama 6 jam. Volume udem ditentukan berdasarkan kenaikan raksa pada alat plathysmometer PANLAB LE 7500.

G. Pengamatan dan Pengumpulan Data

Pengumpulan data berdasarkan hasil pengamatan dilanjutkan dengan analisa dan secara statistik menggunakan regresi dan Rancangan Acak Lengkap (RAL).

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Ekstraksi Daun Kersen

Tabel 1. Hasil Ekstraksi Daun Kersen (*Muntingia calabura* L.)

No.	Sampel	Berat sampel	Berat Ekstrak	Volume Pelarut (Etanol 70%)	Lama perendaman
1.	Daun Kersen	500 gram	23,18 gram	6 liter	3 x 24 jam

2. Data Pengukuran Volume Udem

Tabel 2. Persentase rata-rata Penurunan volume udem telapak kaki mencit yang diberi perlakuan dengan pemberian peroral sediaan uji, dibandingkan dengan sediaan kontrol.

Perlakuan	Penurunan udem rata-rata (ml)
Kontrol negatif (Na-CMC)	0
4%	0,02
6%	0,02
8%	0,03
Kontrol Positif (Na-diklofenak)	0,05

Tabel 3. Penurunan volume udem telapak kaki mencit yang diberi perlakuan dengan pemberian peroral sediaan uji dan kelompok kontrol (ml)

Perlakuan	Hewan Uji	Pengukuran Volume Udem (ml)								
		Awal	Induksi	Jam ke-1	Jam ke-2	Jam ke-3	Jam ke-4	Jam ke-5	Jam ke-6	Penurunan Udem (ml) Vt-V6)
Na-CMC	1	0.13	0.23	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	-0.01
	2	0.13	0.20	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	-0.08
	3	0.13	0.30	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	-0.03
Rata-rata		0.13	0.24	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	-0.04
Natrium Diklofenak	1	0.12	0.27	0.27	0.28	0.26	0.19	0.16	0.16	0.11
	2	0.12	0.26	0.25	0.26	0.25	0.20	0.18	0.16	0.10
	3	0.12	0.28	0.25	0.24	0.26	0.21	0.17	0.16	0.12
Rata-rata		0.12	0.27	0.25	0.26	0.25	0.20	0.17	0.16	0.11
Ekstrak kersen 4%	1	0.12	0.28	0.28	0.29	0.28	0.26	0.24	0.20	0.08
	2	0.13	0.31	0.32	0.32	0.30	0.28	0.25	0.20	0.11
	3	0.13	0.22	0.23	0.24	0.23	0.22	0.20	0.19	0.03
Rata-rata		0.12	0.27	0.27	0.28	0.27	0.25	0.23	0.19	0.08
Ekstrak kersen 6%	1	0.13	0.23	0.24	0.26	0.23	0.22	0.19	0.17	0.06
	2	0.13	0.31	0.31	0.31	0.30	0.29	0.27	0.26	0.05
	3	0.13	0.26	0.26	0.27	0.25	0.23	0.18	0.14	0.12
Rata-rata		0.13	0.22	0.27	0.28	0.26	0.24	0.21	0.19	0.07
Ekstrak kersen 8%	1	0.12	0.22	0.21	0.21	0.19	0.17	0.16	0.16	0.06
	2	0.12	0.27	0.27	0.28	0.26	0.24	0.23	0.21	0.06
	3	0.12	0.25	0.24	0.25	0.24	0.22	0.20	0.17	0.08
Rata-rata		0.12	0.24	0.24	0.24	0.23	0.21	0.19	0.18	0.06

Tabel 4. Hasil pengukuran rata-rata penurunan volume udem telapak kaki mencit awal, setelah induksi, terapi dan persen penurunan

Kelompok	Hewan Uji	Pengukuran Volume Udem (ml)				
		Awal	Induksi	Terapi	Penurunan Volume Udem setelah perlakuan (Vinduksi-Vterapi)	Persentase Penurunan (%)
Na-CMC	1	0.13	0.23	0.24	0	0
	2	0.13	0.20	0.28	0	0
	3	0.13	0.30	0.33	0	0
Natrium Diklofenak	1	0.12	0.27	0.22	0.05	22,7%
	2	0.12	0.26	0.21	0.05	19,2%
	3	0.12	0.28	0.21	0.07	25%
Ekstrak Kersen 4%	1	0.12	0.28	0.25	0.03	10,7%
	2	0.13	0.31	0.27	0.04	12,9%
	3	0.13	0.22	0.21	0.01	4%
Ekstrak Kersen 6%	1	0.13	0.23	0.21	0.02	8%
	2	0.13	0.31	0.29	0.02	6%
	3	0.13	0.26	0.22	0.04	15%
Ekstrak Kersen 8%	1	0.12	0.22	0.18	0.04	18%
	2	0.12	0.27	0.24	0.03	11%
	3	0.12	0.25	0.22	0.03	12%

B. Pembahasan

Udem adalah salah satu gejala adanya inflamasi (radang). Inflamasi merupakan respon protektif normal terhadap luka jaringan yang disebabkan oleh trauma fisik, zat kimia yang merusak, atau zat-zat mikrobiologik. Inflamasi adalah usaha tubuh untuk menginaktivasi atau merusak organisme yang menyerang, menghilangkan zat iritan dan mengatur derajat perbaikan jaringan. Inflamasi dicetuskan oleh pelepasan mediator kimiawi dari jaringan yang rusak dan migrasi sel (Mycek et al., 2001).

Gejala-gejala terjadinya respon peradangan adalah kemerahan (rubor) yang merupakan hal pertama yang terlihat di daerah yang mengalami peradangan. Waktu reaksi peradangan mulai timbul maka arteri yang mensuplai darah ke daerah tersebut melebar, dengan demikian lebih banyak darah mengalir kedalam mikrosirkulasi lokal. Pembuluh-pembuluh darah yang sebelumnya kosong dan sebagian saja meregang dengan cepat dan terisi penuh oleh darah. Panas (kolor), terjadi bersamaan dengan kemerahan dari reaksi peradangan. Panas merupakan sifat reaksi peradangan yang hanya terjadi pada permukaan tubuh yakni kulit. Daerah peradangan pada kulit menjadi lebih panas dari sekelilingnya, sebab darah dengan suhu 37°C yang disalurkan tubuh ke permukaan daerah yang terkena radang lebih banyak disalurkan dari pada ke daerah normal. Rasa sakit (dolor) terjadi karena pelepasan mediator-mediator nyeri (histamin, kinin, dan prostaglandin). Pembengkakan (tumor) terjadi akibat adanya peningkatan permeabilitas dinding kapiler serta pengiriman cairan dan sel-sel dari sirkulasi darah ke jaringan yang cedera. Pada peradangan, dinding kapiler tersebut menjadi lebih permeabel dan lebih mudah dilalui oleh leukosit dan protein terutama albumin, yang diikuti oleh molekul yang lebih besar sehingga plasma

jaringan mengandung lebih banyak protein dari pada biasanya yang kemudian meninggalkan kapiler dan masuk ke dalam jaringan sehingga menyebabkan jaringan menjadi bengkak. Perubahan fungsi (fungsi laesa) merupakan konsekuensi dari suatu proses radang. Gerakan yang terjadi pada daerah radang baik yang dilakukan secara sadar ataupun secara reflek akan mengalami hambatan oleh rasa sakit, pembengkakan yang hebat secara fisik mengakibatkan berkurangnya gerak jaringan (Price dan Wilson, 1995).

Jika suatu obat dapat menurunkan edema yang diinduksikan dengan karagenin berarti obat tersebut mempunyai efek antiradang. Derajat efektivitas obat antiradang tergantung pada besarnya penurunan edema oleh obat tersebut.

Daun kersen (*Muntingia calabura* L.) merupakan tanaman yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbagai macam penyakit, diantaranya peradangan. Salah satu kandungan kimia yang terkandung dalam daun kersen adalah flavanoid yang memberikan efek antiinflamasi. Efek tersebut disebabkan karena pengaruh efek flavanoid terhadap metabolisme asam arakidonat dan efek penghambatan siklooksigenase seperti prostaglandin dan tromboksan, sebagai mana diketahui bahwa prostaglandin didalam tubuh bertanggung jawab bagi sebagian besar gejala peradangan.

Metode ekstraksi yang digunakan dalam penelitian ini adalah ekstraksi secara maserasi. Metode maserasi merupakan metode dingin (proses ekstraksi tanpa pemanasan), dan cocok untuk sampel yang bertekstur lunak. Selain itu, pemanasan dapat menyebabkan kerusakan kandungan kimia dalam simplisia. Metode ini memiliki keuntungan yaitu semua bagian sampel dapat kontak dengan larutan. Maserasi dilakukan dengan cara merendam simplisia sebanyak 500 g dalam cairan

penyari etanol 70% . Etanol digunakan sebagai cairan penyari karena mampu menarik komponen senyawa polar dan non polar. Selain itu, dipilih sebagai larutan penyari karena etanol sangat efektif dalam menghasilkan jumlah bahan aktif yang optimal, kapang dan kuman sulit tumbuh dalam etanol 20% ke atas dan relatif tidak toksik.

Penelitian ini menggunakan natrium diklofenak sebagai pembanding karena obat ini memiliki aktivitas dengan jalan menghambat enzim siklooksigenase sehingga pembentukan prostaglandin terhambat. Natrium diklofenak juga merupakan derivat fenilasetat yang kuat antiradang dengan efek samping yang relatif ringan dibandingkan obat jenis lainnya.

Pengujian antiinflamasi dilakukan dengan menggunakan mencit (*Mus musculus*) jantan sebagai hewan uji karena mencit (*Mus musculus*) jantan kondisi biologisnya stabil bila dibandingkan dengan mencit betina yang kondisi biologisnya dipengaruhi masa siklusnya (estrus). Pengujian antiinflamasi pada mencit berdasarkan metode Rat hind paw edema, yaitu pembengkakan radang buatan pada telapak kaki kiri hewan uji yang diinduksi karagenan. Karagenan sebagai penginduksi udem merupakan turunan polisakarida yang akan dikenali tubuh sebagai substansi asing sehingga mampu menginduksi terjadinya udem. Karagenan akan merangsang fosfolipid membran sel mast yang terdapat pada jaringan ikat disekitar telapak kaki mencit untuk mengeluarkan asam arakidonat dengan bantuan enzim fosfolipase A₂ sehingga menghasilkan berbagai macam mediator inflamasi. Akibatnya terjadi pembengkakan lokal pada telapak kaki mencit disertai kemerahan dan akumulasi mediator inflamasi. Hal ini juga ditandai dengan gerakan kaki mencit yang tidak normal setelah diinjeksikan karagenan. Karagenin bekerja dengan cara melepaskan mediator-mediator inflamasi yaitu histamin, serotonin, dan kinin yang akan

dilepaskan pada jam 1, sedangkan mediator inflamasi yang akan dilepaskan pada jam ke-2 sampai jam ke-3 yaitu prostaglandin dan lisosom. Penggunaan karagenan sebagai penginduksi radang memiliki beberapa keuntungan antara lain tidak dapat menimbulkan kerusakan pada jaringan, tidak menimbulkan bekas dan memiliki respon yang lebih peka terhadap obat antiinflamasi apabila dibandingkan dengan senyawa iritan lain. Efek penghambatan pembentukan radang dinilai dengan pengukuran volume telapak kaki hewan uji pada selang waktu tertentu menggunakan alat *Pletismometer Panlab LE 7500*.

Sebelum perlakuan, masing-masing mencit dipuasakan selama 8 jam. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya pengaruh makanan terhadap kandungan bahan berkhasiat pada ekstrak etanol daun kersen yang dapat mempengaruhi efek antiinflamasi yang ditimbulkan. Kemudian ditimbang berat badannya, untuk mengetahui volume pemberian obat yang sesuai, lalu diukur volume awal kaki kiri mencit dengan menggunakan *Pletismometer Panlab LE 7500*, untuk mengetahui volume kaki sebelum diberi perlakuan lebih lanjut. Setelah itu, tiap kelompok perlakuan diinduksi karagenan dengan cara disuntikan secara intraplantar pada bagian kaki kiri mencit. Senyawa karagenan merupakan senyawa iritan yang melepaskan mediator-mediator inflamasi seperti histamin dan serotonin pada jam-jam pertama dan berlangsung selama 90 menit. Ini merupakan fase pembentukan udem. Fase kedua yaitu pelepasan bradikinin yang terjadi selama 1,5 jam- 2,5 jam. Fase ketiga terjadi pelepasan prostaglandin pada 3 jam setelah. Kemudian udem berkembang cepat dan bertahan selama 6 jam. Setelah diinduksi karagenan ditunggu selama 1 jam. Hal ini karena 1 jam setelah pemberian karagenan terjadi pelepasan mediator-mediator inflamasi seperti histamin dan serotonin. Kemudian diukur volume kaki kiri

mencit setelah diinduksi. Setelah itu, diberikan ekstrak 4%, 6%, 8%, kontrol positif dan kontrol negatif sesuai kelompok perlakuannya. Diukur volume penurunan udem tiap 1 jam selama 6 jam. Diamati 1 jam selama 6 jam untuk melihat penghambatan penurunan volume udem dari tiap kelompok.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh terlihat bahwa pemberian larutan koloidal Na-CMC tidak mempengaruhi penurunan persentase radang kaki mencit. Pada kelompok Na-CMC persentase radang yang di hasilkan meningkat dan terus berlangsung sampai pada jam ke-6. Hal ini karena Na-CMC hanya sebagai pelarut media obat sehingga tidak ada rangsangan berupa obat untuk mengurangi edema sehingga edema akan terus meningkat dan proses penghilangan mediator-mediator inflamasi dalam tubuh mencit hanya terjadi secara alamiah, sehingga persentase penurunan udemnya 0%.

Pada pemberian ekstrak etanol daun kersen 4%, 6% dan 8% rata-rata radang meningkat perlahan dan terus berlangsung sampai pada jam ke-2 dan mulai mengalami penurunan pada jam ke-3 dan terus berlangsung sampai pada jam ke-6. Pada ekstrak etanol daun kersen 4% terjadi penurunan volume udem rata-rata sebesar 4%, 10,7% dan 12,9%. Ekstrak etanol daun kersen 6% terjadi penurunan sebesar 6%, 8% dan 15%, sedangkan pada ekstrak etanol daun kersen 8% terjadi penurunan sebesar 11%, 12% dan 18,1%. Dari persentase penurunan volume udem terlihat adanya aktivitas antiinflamasi yang dihasilkan. Hal ini di sebabkan karena kemungkinan adanya kandungan senyawa flavanoid yang terkandung dalam daun kersen yang diketahui berperan penting dalam penghambatan prostaglandin (PGE) dan lipooxygenase (LOX). Mekanisme flavanoid dalam menghambat proses terjadinya inflamasi melalui 2 cara, yaitu dengan menghambat permeabilitas kapiler

dan menghambat metabolisme asam arakidonat dan sekresi enzim lisosom dari sel neutrofil dan sel endothelial. Flavanoid terutama bekerja pada endothelium mikrovaskular untuk mengurangi terjadinya hipermeabilitas dan radang. Beberapa senyawa flavanoid dapat menghambat pelepasan asam arakhidonat dan sekresi enzim lisosom dari membran dengan jalan memblok jalur siklooksigenase. Penghambatan jalur siklooksigenase dapat menimbulkan pengaruh lebih luas karena reaksi siklooksigenase merupakan langkah pertama pada jalur yang menuju ke hormon eikosanoid seperti prostaglandin dan tromboksan.

Pada kelompok pembanding (natrium diklofenak) radang meningkat perlahan dan terus berlangsung sampai pada jam ke-2 dan mulai mengalami penurunan pada jam ke-3 dan terus berlangsung sampai pada jam ke-6. Persentase penurunan volume udem kelompok pembanding lebih besar dibandingkan dengan larutan uji dengan persentase penurunan volume udem sebesar 19,2%, 22,7% dan 25% artinya potensi penghambatan natrium diklofenak lebih besar di bandingkan larutan uji. Hal ini karena natrium diklofenak bekerja dengan cara menstabilkan membran lisosomal, menghambat pembebasan dan aktivitas mediator peradangan (histamin, serotonin, prostaglandin), menghambat migrasi sel ke tempat peradangan dan menekan rasa nyeri.

Hasil analisis data secara statistik dengan menggunakan metode Rancangan Acak Lengkap (RAL) dimana $F_{hitung} > F_{tabel}$ pada taraf kepercayaan 5% dan 1% yang mana faktor hitung lebih besar dari faktor tabel yang menunjukkan nilai signifikan yang artinya ada perbedaan efek antara perlakuan, sehingga dikatakan bahwa ada pengaruh pemberian ekstrak kersen terhadap efek antiinflamasi mencit jantan.

Aktivitas antiinflamasi ekstrak etanol daun kersen dapat dilihat pada hasil analisis uji BNJD (BNJD/beda nyata jujur duncan) ternyata pada konsentrasi 4%, 6% dan 8% menunjukkan efek antiinflamasi yang tidak beda nyata dan aktivitas antiinflamasi yang beda nyata dengan pembanding natrium diklofenak. Artinya potensi penghambatan natrium diklofenak lebih besar dibandingkan larutan uji dalam menghambat pembentukan prostaglandin. Hal ini karena natrium diklofenak dapat menekan respon pada fase akhir, yang juga disebut fase pembentukan prostaglandin karena kemampuan menekan migrasi leukosit mononuklear ke jaringan radang. Sedangkan kelompok kontrol negatif yakni Na-CMC menunjukkan perbedaan yang nyata pada semua kelompok yaitu ekstrak 4%, 6%, 8% dan pembanding natrium diklofenak.

Pengukuran volume telapak kaki mencit dengan pletismometer dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya sulitnya mengkondisikan hewan uji dan banyak zat-zat pengotor yang bercampur pada larutan NaCl 0,9%, dimana NaCl sebagai indikator pembengkakan, sehingga mempengaruhi hasil pengukuran.

Penelitian ini mengingatkan kita tentang adanya tanda-tanda kekuasaan Allah swt. dalam dunia tumbuh-tumbuhan yang memang penuh dengan tanda-tanda yang menunjukkan keagungan dan keperkasaannya. Seperti pada hasil penelitian yang diperoleh membuktikan bahwa terdapat tanaman yang baik untuk dijadikan sebagai obat yaitu tanaman kersen yang berkhasiat sebagai antiinflamasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa

1. Ekstrak etanol daun kersen (*Muntingia calabura* L.) dapat memberikan efek antiinflamasi.
2. Ekstrak etanol daun kersen (*Muntingia calabura* L.) 4%, 6% dan 8% memiliki efek antiinflamasi dan efek antiinflamasi yang paling besar adalah 8% diantara konsentrasi yang digunakan.
3. Hasil analisis data secara statistik dengan menggunakan metode Rancangan Acak Lengkap (RAL) dimana $F_{hitung} > F_{tabel}$ pada taraf kepercayaan 5% dan 1% menunjukkan terdapat perbedaan efek antara perlakuan. Pada uji lanjutan yaitu Uji Beda Nyata Jujur Duncan (BJND) pada konsentrasi 4%, 6% dan 8% tidak terdapat perbedaan yang nyata dan terdapat perbedaan yang nyata dengan pembanding natrium diklofenak.

B. Saran

1. Perlu dilakukan peningkatan dosis ekstrak etanol daun kersen (*Muntingia calabura* L.) agar diketahui dosis ekstrak etanol daun kersen yang memberikan aktivitas antiinflamasi yang lebih baik.
2. Dapat dilakukan pemisahan senyawa agar diketahui senyawa metabolit yang lebih berperan memberikan aktivitas antiinflamasi.

KEPUSTAKAAN

Al-Jauziyah I. Q., 2008. *Praktek Kedokteran Nabi diterjemahkan oleh Abu Firly*. Bantu: Hikam Pustaka. 2008. Hal. 35.

An-najjar, Zaghulul. *Pembuktian Sains Dalam Sunnah*. Jakarta: Amzah. 2006. hal 74.

Corwin, E.J. *Handbook Of Pathophysiology*, 3th Edition. Philadelphia :Lippincort Williams dan Wilkins.2008. hal 138-143.

Dagun, M. *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*. Jakarta : Lembaga Pengkajian dan Kebudayaan Nusantara.2006. hal. 489.

Darwis D. *Teknik Dasar Laboratorium Dalam Penelitian Senyawa Bahan Alam Hayati, Workshop Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Bidang Kimia Organik Bahan Alam Hayati*, FMIPA Universitas Andalas Padang. 2000. Hal. 376

Denko CW. A Role of Neuropeptide in Inflammation, in :Whicher, J.I. and Evan S.W. *Biochemistry of Inflammation*. London : Kluwer Pub. hal. 177-181.

Ditjen POM. *Parameter Standar Umum Ekstrak Tumbuhan Obat. Cetakan Pertama*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI.2000.hal 10-11.

Ditjen POM. *Farmakope Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta :Departemen Kesehatan RI. 1979. hal. 9

Ditjen POM. *Sediaan Galenik. Jilid II*. Jakarta : Departemen Kesehatan RI. 1986. Hal 19 - 22.

- Ditjen POM. *Farmakope Indonesia. Edisi IV.* Jakarta : Departemen Kesehatan RI. 1995. hal. 925
- Dorland, Newman. *Kamus Kedokteran Dorland. Edisi 29.* Jakarta : EGC. 2002. hal 1097.
- Fernandez MA, de las Heras B, Garcia MD, Saenz MT, Villar A. *New insights into the mechanism of Action of the Antiinflammatory Triterpene Lupeol.* J Pharm Pharmacol. 2001. hal.53: 1533-9
- Ferrandiz, M. L. and M. J. Alcaraz. *Journal Anti-inflammatory activity and inhibition of arachidonic acid metabolism by flavonoids.* Agents Actions . 1991. hal.283-288.
- Fitzgerald, Garret A. And Carlo Patrono. *The Coxib, Selective Inhibitors of Cyclooxygenase-2.* N Engl J Med. 2001.hal. 345, 433-442.
- Gunawan Sulistia Gan., *Farmakologi dan Terapi.* Edisi 5. Jakarta: Bagian Farmakologi FK UI. 2007. hal. 210-229
- Guyton A. C., Hall J. E. *Buku Ajar Fisiologi Kedokteran. Edisi 9.* Jakarta : EGC. 1997. hal. 455.
- Harborne, J.B. *Metode Fitokimia.* Bandung : ITB.1987. hal. 152.
- Health Professions Division. *Goodman dan Gillman' S the Pharmacological Basis of Therapeutics, 9th edition.* USA; McGrew-Hill. 1996. hal. 637.
- Houglum, J. E., Herrelson, G.L. Leaver-Dunn, D. *Principles of pharmacology for Athleti Trainers.* Slak incorporated, United State. 2005. hal. 389.

Katzung, B. G., *Basic and clinical pharmacology, diterjemahkan oleh bagian Farmakologi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Edisi 8, Buku 3*. Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC. 2001. hal. 449-462, 637.

Katzung, B.G. *Farmakologi dasar dan klinik. Buku II Edisi VIII*. Jakarta : Salemba Medika, 2002. Hal 537-539.

Katzung, B. G., dan Trevor, A. J., *Buku Bantu Farmakologi. Diterjemahkan oleh Staf Pengajar, Laboratorium Farmakologi, Fakultas Kedokteran Cetakan I, Penerbit Buku Kedokteran Universitas Sriwijaya, EGC, Jakarta. 2004. Hal 227.*

Kee, J.L & Hayes, E. R. *Farmakologi Pendekatan Proses Keperawatan*. Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran, 1996. hal. 197

Kementerian Agama RI. *Alqur'an dan Terjemahnya*. Bandung : Cipta Media. 2010. Hal. 216.

Lands, W.E. *Mechanisms of Action of Antiinflammatory Drugs*, *Advances in Drug Research*. 1985. hal 114, 148-163.

Lim T.K. *Edible Medicinal and Non-Medicinal plant*. New York : Springer Dordrecht Heidelberg. 2012. Hal 56.

Louis S. Goodman, Alfred Gilman. *Ilmu endodontic dalam Praktek edisi Kesebelas*. Jakarta: EGC. 1995. hal. 127.

Mansjoer, S. *Mekanisme Kerja Obat Antiradang*. Jakarta : Media Farmasi Indonesia. 1999. hal. 34.

Morris, C.J. *Carrageenan-Induced Paw Edema in the Rat and Mouse. Methods Mol Biol*. 2003. 225:115-21.

- Mueller, J. *Bioflavanoid : Natural Relief for Allergies and Asthma*. 2005. Hal 5
- Mustchler, E. *Dinamika Obat*, Ed.V, Cetakan Ketiga. Bandung : ITB Press. 1986.hal 129
- Mycek, J Mary. *Farmakologi Ulasan Bergambar edisi II*. Jakarta. Widya medika. 2001.hal.404
- Mutairi and Jasser. *Effect of using Rotary Evaporator on Date Dibs Quality*. *Journal of American Science*. 2012. Hal. 8
- Ngatijan. *Metode Laboratorium dalam Toksikologi. Petunjuk Laboratorium, PAU Bioteknologi*. Yogyakarta : UGM.1991. hal. 13
- Nijveldt, R. J., E. van Nood, D.E.C. van Hoorn, P.G. Boelens, K. van Norren, P.A.M. van Leeuwen. *Flavonoids: a review of probable mechanisms of action and potential applications*. *American Journal of Clinical and Nutrition*. 2001. Hal 418-425.
- Nugroho, B W., Dadang, dan Prijono, D. *Pengembangan dan Pemanfaatan Insektisida Alami. Pusat Kajian Pengendalian Hama Terpadu*. Bogor : ITB. 1999. hal 26.
- Pamudji G. *Petunjuk Praktikum Farmakologi*. Surakarta : Bagian Farmakologi Universitas Setia Budi. 2003. hal 29
- Park J. S. V., James G. G., Fernando C., Harry H. S. F., John M. P. and A. Douglas Kinghorn. *Activity-guided isolation of the chemical constituents of Muntingia calabura using a quinone reductase induction assay journal*. *Phytochemistry*. 2003. Hal. 335-341
- Peoloengan M, Chairul, Iyep K, dan Susan MN. *Aktivitas Antimikro badan Fitokimia dari Beberapa Tanaman Obat. Seminar Nasional Teknologi*. Bogor : Balai Penelitian. 2006. hal. 38

- Priharyanti, Dwi. *Efek Ekstrak daun Talok (Muntingia calabura L.)*. 2007. Hal 3
- Priyanto. *Farmakoterapi dan Terminologi Medis*. Leskonfi : Depok. 2009. Hal 21
- Pearson, W. *Bioflavonoids. Chemical constituents and antiinflammatory test of ethanolic extracts of Lantana camara L. on white male rats (Rattus norvegicus L.)*. 2005.hal 4
- Price, A. dan Wilson, L. *Patofisiologi: Konsep Klinis Proses-prose Penyakit. Edisi 4. Cetakan Pertama*. Jakarta Penebit Buku Kedokteran EGC. 1995. hal 35-50.
- .
- Rasyidi. *Rahmatan Lil 'Alamin*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar. 1999. Hal 316
- Robak, J. and R.J. Gryglewski. *Bioactivity of flavonoids. Polish Journal of Pharmacology*. 1996. hal. 555-564.
- Rossidy, I. *Fenomena Flora dan Fauna dalam Perspektif Al-Qur'an*. Malang: UIN Press. 2008.
- Rowe, R.C., Paul, J.S., and Marian, E.Q. *Handbook of Pharmaceutical Excipients*. London: Royal Pharmaceutical Society of Great Britain. 2009. hal. 1198.
- Sentra. *Efek Ekstrak daun Talok (Muntingia calabura L.)Terhadap Aktivitas Enzim SGPT pada mencit yang diinduksi Karbon Tertraklorida*. Jurnal 2005.hal. 8-9
- Siddiqua A, Premakuri KB, Roukiya S, Vithya&Savitha. *Antioxidant activity and estimation of total phenolic content of Muntingia calabura by colorimetry*.Int Journal Chem Tech Res. 2010.hal 4-5

- Singh, A., Maholtra, S., dan Subban, R. *Antiinflammatory and Analgesic Agents from Indian Medicinal Plants. International Journal of Integrative Biology.* 2008. hal. 57-72.
- Smith dan Mangkoewidjojo. *Pemeliharaan, Pembiakan dan Penggunaan Hewan Percobaan pada Daerah Tropis*, Universitas Indonesia, Jakarta. 1988. hal 18
- Sugiyanto. *Petunjuk Farmakologi. Adisi IV.* Laboratorium Farmakologi dan Toksikologi Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.1995. hal 19
- Tjay, T. H., dan Raharja.,*Obat – Obat Penting. Khasiat, penggunaan dan efek-efek sampingnya, edisi V, Cetakan Pertama.* Jakarta: Penerbit PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia. 2002. hal 303-314.
- Tjitrosoepomo, G. *Morfologi Tumbuhan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.1991. hal 123
- Vinegar, R., Truax, J.L., dan Selph, J.L., *Quantitative Studies of The Pathway to Acute Carrageenan Inflammation journal. Federation Proceefing.*1976. hal. 35 (13): 228.
- Vogel, H. G., *Drug Discovery dan Evaluation : Pharmacological Assays, 2nd Edition.* New York : Springer. 2002. hal 669-691, 725, 751-761.
- Voigt, R. *Buku Pelajaran Teknologi Farmasi, Diterjemahkan oleh Soendani N. S.*Yogyakarta : UGM Press. 1995. hal 969.
- Warintek. *Muntingia calabura L.* Jakarta : Kementerian Negara Riset dan Teknologi. 2006.
- Wilmana, P.F., dan Sulistia G.G. *Analgesik-Antipiretik Analgesik AntiInflamasi non steroid dan Obat Pirai. Dalam: Sulistia G.G. Farmakologi dan Terapi. Edisi 5.*

Jakarta : Bagian Farmakologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. 2007.
Hal. 230-246, 500-506.


Winter, C.A., Risley, E.A., dan Nuss, G.W., *Carrageenin - induced Udem in Hind Paw of the Rat as an Assay for Antiinflammatory Drugs. Proc. Soc. Exp .Biol. Med.* 1962.hal 111. 544-7.

Wiwied, Ekasari. *Tanaman Obat Berkhasiat Besar. Jurnal Efek Ekstrak daun Talok (Muntingia calabura L.) Terhadap Aktivitas Enzim SGPT pada mencit yang diinduksi Karbon Tertraklorida*


Zakaria Zainul Amiruddin. 2007. *Free radical scavenging activity of some plants available in malaysia. IJPT.* 2007. hal.87-91.

Zakaria Z. A., Mustapha S., Sulaiman M. R., Jais A. M. M., Somchit M. N., Abdullah F. C. *The antinociceptive action of aqueous extract from muntingia calabura leaves journal: the role of opioid receptors. Med Princ Pracyt.* 2007. hal.130-136.

Lampiran 1. Skema Kerja Ekstraksi Daun Kersen (*Muntingia calabura* L.)



Lampiran 2. Skema Kerja Uji Efek Ekstrak Etanol Daun Kersen (*Muntingia calabura L.*) Terhadap Mencit Sebagai Antiinflamasi



- Setelah 1 Jam
- Diukur Penurunan Volume Udema Kaki Mencit tiap 1 jam selama 6 jam

Data Penurunan Volume Udema

Kesimpulan

Lampiran 3. Perhitungan Dosis dan Volume Pemberiaan sediaan Uji

1. Perhitungan Dosis

Natrium Diklofenak

$$\text{Dosis lazim diklofenak} = 25 \text{ mg/kgBB}$$

$$\text{Faktor konversi dari manusia ke mencit} = 0,0026$$

$$\begin{aligned} \text{Dosis untuk mencit 20 gram} &= \text{FK} \times \text{DL} \\ &= 0.0026 \times 25 \\ &= 0.065 \text{ mg/kgBB} \end{aligned}$$

Untuk pemberian oral di gunakan standar volume maksimal 1 ml untuk mencit 30 gram

$$\begin{aligned} \text{Dosis untuk mencit 30 gram} &= \frac{30 \text{ g}}{20 \text{ g}} \times 0,065 \text{ mg/kgBB} \\ &= 0,0975 \text{ mg/kgBB} \end{aligned}$$

Perhitungan larutan stok

$$\begin{aligned} \text{Larutan stok 10 ml} &= 0,0975 \times 10 \text{ ml} \\ &= 0,975 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Berat 10 tablet diklofenak} &= 1,83 \text{ g} \\ &= 1830 \text{ mg} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Berat rata-rata} &= \frac{\text{berat 10 tablet}}{10} \\ &= \frac{1830 \text{ mg}}{10} \\ &= 183 \text{ mg} \end{aligned}$$

Berat yang ditimbang

$$= \frac{\text{berat yang diinginkan}}{\text{berat etiket}} \times \text{berat rata-rata}$$

$$= \frac{0,975 \text{ mg/kgBB}}{25 \text{ mg}} \times 183 \text{ mg}$$

$$= 7,137 \text{ mg/kgBB}$$

2. Volume Pemberiaan sediaan Uji

Volume pemberiaan sediaan secara oral pada mencit (*Mus musculus*) adalah 1 ml.

Hewan Uji BB tertinggi = 30 g

Volume pemberiaan sediaan = 1 ml/30 g

Volume pemberian = $\frac{\text{Berat yang ditanya}}{\text{berat max}} \times V_{pmax}$

a. Natrium Diklofenak (Kontrol positif)

1) $V_{p1} = \frac{27 \text{ g}}{30 \text{ g}} \times 1 \text{ ml} = 0.9 \text{ ml}$

2) $V_{p2} = \frac{25 \text{ g}}{30 \text{ g}} \times 1 \text{ ml} = 0.84 \text{ ml}$

3) $V_{p3} = \frac{28 \text{ g}}{30 \text{ g}} \times 1 \text{ ml} = 0.94 \text{ ml}$

b. Na-CMC (Kontrol Negatif)

1) $V_{p1} = \frac{28 \text{ g}}{30 \text{ g}} \times 1 \text{ ml} = 0.94 \text{ ml}$

2) $V_{p2} = \frac{30 \text{ g}}{30 \text{ g}} \times 1 \text{ ml} = 1 \text{ ml}$

3) $V_{p3} = \frac{30 \text{ g}}{30 \text{ g}} \times 1 \text{ ml} = 1 \text{ ml}$

c. Ekstrak etanol daun kersen 4%

$$1) V_{p1} = \frac{27 \text{ g}}{30 \text{ g}} \times 1 \text{ ml} = 0.9 \text{ ml}$$

$$2) V_{p2} = \frac{30 \text{ g}}{30 \text{ g}} \times 1 \text{ ml} = 1 \text{ ml}$$

$$3) V_{p3} = \frac{29 \text{ g}}{30 \text{ g}} \times 1 \text{ ml} = 0.97 \text{ ml}$$

d. Ekstrak etanol daun kersen 6%

$$1) V_{p1} = \frac{25 \text{ g}}{30 \text{ g}} \times 1 \text{ ml} = 0.84 \text{ ml}$$

$$2) V_{p2} = \frac{27 \text{ g}}{30 \text{ g}} \times 1 \text{ ml} = 0.9 \text{ ml}$$

$$3) V_{p3} = \frac{25 \text{ g}}{30 \text{ g}} \times 1 \text{ ml} = 0.84 \text{ ml}$$

e. Ekstrak etanol 8%

$$1) V_{p1} = \frac{27 \text{ g}}{30 \text{ g}} \times 1 \text{ ml} = 0.9 \text{ ml}$$

$$2) V_{p2} = \frac{26 \text{ g}}{30 \text{ g}} \times 1 \text{ ml} = 0.87 \text{ ml}$$

$$3) V_{p3} = \frac{30 \text{ g}}{30 \text{ g}} \times 1 \text{ ml} = 1 \text{ ml}$$

Lampiran 4. Analisis Statistik Inflamasi

Kelompok	Hewan	Penurunan Volume Udem (ml)							
		t ₁	t ₂	t ₃	t ₄	t ₅	t ₆	∑	Rata-rata
A	1	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	1,44	0,24
	2	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	1,68	0,28
	3	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	1,98	0,33
Jumlah		0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	5,1	
Rata-rata		0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	1,68	0,28
B	1	0,27	0,28	0,26	0,19	0,16	0,16	1,32	0,22
	2	0,25	0,26	0,25	0,20	0,18	0,16	1,3	0,21
	3	0,25	0,24	0,26	0,21	0,17	0,16	1,29	0,21
Jumlah		0,77	0,78	0,77	0,60	0,51	0,48	3,91	
Rata-rata		0,25	0,26	0,25	0,20	0,17	0,16	1,29	0,21
C	1	0,28	0,29	0,28	0,26	0,24	0,20	1,55	0,25
	2	0,32	0,32	0,30	0,28	0,25	0,20	1,67	0,27
	3	0,23	0,24	0,23	0,22	0,20	0,19	1,31	0,21
Jumlah		0,83	0,85	0,81	0,76	0,69	0,59	4,53	
Rata-rata		0,27	0,28	0,27	0,25	0,23	0,19	1,49	0,24
D	1	0,24	0,26	0,23	0,22	0,19	0,17	1,36	0,22
	2	0,31	0,31	0,30	0,29	0,27	0,26	1,66	0,27
	3	0,26	0,27	0,25	0,23	0,18	0,14	1,37	0,22
Jumlah		0,81	0,84	0,78	0,74	0,64	0,57	4,38	

Rata-rata		0,27	0,28	0,26	0,24	0,21	0,19	1,45	0,24
E	1	0,21	0,21	0,19	0,17	0,16	0,16	1,1	0,18
	2	0,27	0,28	0,26	0,24	0,23	0,21	1,49	0,24
	3	0,24	0,25	0,24	0,22	0,20	0,17	1,32	0,22
Jumlah		0,72	0,74	0,69	0,63	0,59	0,54	3,91	
Rata-rata		0,24	0,24	0,23	0,21	0,19	0,18	1,29	0,21
Jumlah total								29,03	0,24
Rata-rata jumlah total								7,2	

Keterangan: A : Kelompok I Na-CMC

B : Kelompok II Natrium Diklofenak

C : Kelompok III Ekstrak kersen 4%

D : Kelompok IV Ekstrak kersen 6%

E : Kelompok V Ekstrak kersen 8%

t₁ : Pengukuran volume kaki pada jam ke-1

t₂ : Pengukuran volume kaki pada jam ke-2

t₃ : Pengukuran volume kaki pada jam ke-3

t₄ : Pengukuran volume kaki pada jam ke-4

t₅ : Pengukuran volume kaki pada jam ke-5

t₆ : Pengukuran volume kaki pada jam ke-6

$$\begin{aligned}
 \text{A. Faktor Koreksi (FK)} &= \frac{\text{Jumlah } h^2}{\text{Banyak perlakuan} \times \text{jumlah replikasi}} \\
 &= \frac{(7,2)^2}{3 \times 5 \times 6} \\
 &= \frac{51,84}{90} \\
 &= 0,576 \\
 \\
 \text{B. Jumlah Kuadrat Total (JKT)} &= \sum(Y_{ij})^2 - \text{FK} \\
 &= [(0,24)^2 + (0,24)^2 + \dots + (0,17)^2 - 3,456] \\
 &= 5,5013 - 0,576 \\
 &= 4,92 \\
 \\
 \text{C. Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP)} &= \frac{\sum(T_{ij})^2}{r} - \text{Faktor Koreksi} \\
 &= \frac{[(0,85)^2 + (0,85)^2 + \dots + (0,54)^2]}{6} - \text{FK} \\
 &= \frac{16,27}{6} - 0,576 \\
 &= 2,713 - 0,576 \\
 &= 2,137 \\
 \\
 \text{D. Jumlah Kuadrat Galat (JKG)} &= \text{JKT} - \text{JKP} \\
 &= 4,9253 - 2,137 \\
 &= 2,783 \\
 \\
 \text{E. Derajat Bebas Total (DBT)} &= \sum n - 1 \\
 &= (3 \times 5 \times 6) - 1 \\
 &= 89 \\
 \\
 \text{F. Derajat Bebas Perlakuan (DBP)} &= t - 1
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= 5-1 \\
 &= 4 \\
 \text{G. Derajat Bebas Galat (DBG)} &= \text{DBT-DBP} \\
 &= 89-4 \\
 &= 85 \\
 \text{H. Kuadrat Tengah Perlakuan} &= \frac{\text{Jumlah Kuadrat Perlakuan}}{\text{Derajat Bebas Perlakuan}} \\
 &= \frac{2,137}{4} \\
 &= 0,53425 \\
 \text{I. Kuadrat Tengah Galat} &= \frac{\text{Jumlah kuadrat galat}}{\text{Derajat Bebas Galat}} \\
 &= \frac{2,783}{85} \\
 &= 0,03274 \\
 \text{J. F Hitung perlakuan} &= \frac{\text{Kuadrat Tengah Perlakuan}}{\text{Kuadrat Tengah Galat}} \\
 &= \frac{0,53425}{0,03274} \\
 &= 16,31
 \end{aligned}$$

Tabel 5. Analisis ragam dengan nilai F tabel

Sumber Keseragaman	DB	JK	KT	F hitung	F Tabel	
					5%	1%
Perlakuan	4	2,137	0,53425	16,31*	3,48	5,99
Galat	85	2,783	0,03274			
Total	89					

Keterangan :

* = signifikan

= Non Signifikan

F hitung signifikan pada taraf kepercayaan 1% dan 5%. F hitung dinyatakan signifikan jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ artinya terdapat perbedaan yang nyata dari setiap perlakuan.

Untuk menentukan perlakuan yang signifikan, dilakukan Uji BJND sebagai berikut.

Tabel 6. Hasil uji BJND

Persentase Penurunan				
Perlakuan	N	Subset for alpha = 0,05		
		1	2	3
Na-CMC	3			
Ekstrak 4%	3		9.2	
Ekstrak 6%	3		9.6667	
Ekstrak 8%	3		13.6667	
Natrium Diklofenak	3			22.3
Sig.		1	0.183	1

Efek ekstrak etanol daun kersen (*Muntingia calabura* L.) 4%, 6% dan 8% tidak berbeda nyata dan memiliki efek antiinflamasi berbeda nyata dengan pembanding natrium diklofenak.

*	Non Sigfinikan
**	Sigfinikan

Lampiran 1. Gambar 1



Daun kersen




Hasil ekstraksi

Lampiran 3. Gambar 3



Rotavapor

Lampiran 4. Gambar 4



Ekstrak Kental

Lampiran 5. Gambar 5




Kelompok hewan uji mencit

Lampiran 6. Gambar 6



Ekstrak 4%, 6% dan 8%



Ekstrak 4%, 6% dan 8%

Lampiran 7. Gambar 7




Natrium Diklofenak 10 tablet



Natrium Diklofenak 7,137 mg

Lampiran 8. Gambar 8



Na-CMC 1%

Lampiran 9. Gambar 9



Karagenin 1%


Lampiran 10. Gambar 10




Pletismometer

Model/series

PANLAB LE 7500



Lampiran 11. Gambar 11



**Pengukuran volume awal
kaki mencit**

Lampiran 12. Gambar 12

**Pengukuran volume kaki mencit 1 jam
setelah diinduksi karagenin**

Lampiran 13. Gambar 13



Udem kaki kiri menci



Udem kaki kanan menci

Lampiran 14. Gambar 14



Pemberiaan oral hewan uji

RIWAYAT HIDUP



WAHYUNI SARIYATI, Lahir di Watu Lendo, Nusa Tenggara Timur pada tanggal 30 November 1994 putri Ke-empat dari pasangan Bapak H. Muhammad Sudin, S.pd.I dan Ibu Mahani. Wahyuni ini mengawali pendidikan di MI. Jabal Nur Watu Lendo Kec. Lembor Kab. Manggarai Barat-NTT pada tahun 2000 dan selesai pada tahun 2006. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di MTs Jabal Nur Watu Lendo Kec. Lembor Kab. Manggarai Barat-NTT selesai pada tahun 2009 dan Ma. Negeri 2 Kota Bima dan selesai pada tahun 2012. Pada tahun 2012, penulis kembali melanjutkan pendidikan dan mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Jurusan Farmasi dan diterima sebagai mahasiswa Farmasi angkatan 2012 sampai saat ini.

