

**DAYA HAMBAT EKSTRAK RUMPUT MUTIARA
(*Hedyotis corymbosa*) TERHADAP PERTUMBUHAN
BAKTERI *Salmonella Thypi***



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih
Gelara Sarjana Sains (S.Si) Jurusan Biologi
Pada Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

ATIRAH MULIA
NIM.60300112022

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Atirah Mulia
NIM : 60300112022
Tempat/Tgl. Lahir : Sinjai, 31 Mei 1994
Jurusan : Biologi
Fakultas : Sains dan Teknologi
Alamat : BTN. Tabariyah Blok G8 No.3
Judul : Daya Hambat Ekstrak Rumput Mutiara (*Hedyotis corymbosa*) Terhadap Pertumbuhan Bakteri *Salmonella Thypi*

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 6 September 2016

Penyusun,

ATIRAH MULIA
NIM: 60300112022

PERSTUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi Saudara **Atirah Mulia**, NIM: 60300112022, mahasiswa Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi dengan seksama skripsi yang berjudul “Daya Hambat Ekstrak Rumput Mutiara (*Hedyotis corymbosa*) Terhadap Pertumbuhan Bakteri *Salmonella Thypi*”, memandang bahwa hasil penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Samata, 6 September 2016



St. Aisyah S, S.Pd., M.Kes
Pembimbing II



Dr. Cut Muthiadin, S.Si., M.Si
Pembimbing I

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Daya Hambat Ekstrak Rumpun Mutiara (*Hedyotis corymbosa*) Terhadap Bakteri *Salmonella Thypi*” yang disusun oleh Atirah Mulia, NIM : 60300112022, Mahasiswa Jurusan Biologi pada Fakultas sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, diuji dan dipertahankan dalam Ujian Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan 7 November 2016 M bertepatan dengan 7 Shafar 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Biologi Sains.

Samata, 12 Desember 2016 M
12 Rabi’ul Akhir 1438 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag
Sekretaris	: Hafsan, S.Si.,M.Si
Munaqisy I	: Dr. Mashuri Masri, S.Si.,M.Kes
Munaqisy II	: Isna Rasdiana Aziz, S.Si.,M.Sc
Munaqisy III	: Dr. Rosmini, M.Th.L
Pembimbing I	: Dr. Cut Muthiadin, S.Si.,M.Kes
Pembimbing II	: St. Aisyah S, S.Pd.,M.Kes

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar,


Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag
NIP. 19691205 199303 1 001

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt atas nikmat akal dan pikiran yang diberikan serta limpahan rahmat, kasih sayang dan karunianya sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. Tak lupa pula kita haturkan salam dan shalawat kepada Nabi besar kita Muhammad saw, keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang mengikutinya.

Skripsi yang berjudul “Daya Hambat Ekstrak Rumput Mutiara (*Hedyotis corymbosa*) Terhadap Bakteri *Salmonella Thypi*” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Sains pada fakultas Sains dan Teknologi. Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini bukanlah tujuan akhir dari belajar karena belajar adalah sesuatu yang tidak terbatas.

Dengan selesainya skripsi ini tentunya tak lepas dari dorongan dan uluran tangan berbagai pihak. Penulis menyadari banyaknya kendala yang dihadapi dalam penyusunan skripsi ini. Namun berkat doa, motivasi dan kontribusi dari berbagai pihak, maka kendala tersebut mampu teratasi dan terkendali dengan baik.

Untuk itu penulis menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak / ibu :

1. Orang tua tercinta, Ibunda Hasriati, dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan serta dukungan penuhnya baik berupa materi, nasehat yang tulus, saudariku Anugerah Mulia serta keluarga yang senantiasa memberikan restu dan doa'nya.

2. Prof. Dr. Musafir Pababbari, M. Si., selaku rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
3. Prof. Dr. H. Arifuddin, M. Ag., sebagai Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
4. Dr. Mashuri Masri, S.Si., M.Kes selaku ketua dan ibu Baiq Farhatul Wahidah, S.Si., M.Si, selaku sekretaris pada jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Dr. Cut Muthiadin, S.Si., M.Si, selaku pembimbing pertama yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis.
6. Siti Aisyah S, S.Pd., M.Kes, selaku pembimbing kedua yang telah banyak memberikan bantuan pengarahan serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis.
7. Dr. Mashuri Masri, S.Si., M.Kes selaku penguji I, Isna Rasdiana Aziz, S. Si., M. Sc, selaku penguji II, Dr. Rosmini, M. Th. L, selaku penguji III yang telah banyak memberikan pengarahan serta meluangkan waktunya dalam menguji dan mengembangkan skripsi penulis.
8. Bapak, Ibu Dosen serta seluruh Staf jurusan Biologi atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis sejak menempuh pendidikan biologi hingga saat ini.

9. Sukri S.Farm selaku Laboran Laboratorium Farmasi UIN Alauddin Makassar yang juga turut meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penelitian penulis.
10. Saudara seperjuangan Karmila, Andi Nurul Islamiah Imran, Irma Fitrianti, Muhammad Yusuf S.Si, Wahyunita Nur S.E, Musdalifah S.E dan teman-teman kelas A “BANTA” (*Biological An Nidus To Affection*) yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terima kasih atas bantuan dan semangatnya.
11. Teman KKN-51 di Kec. Lembang, Kab. Pinrang Sulawesi Selatan.
12. Teman-teman seangkatan “RANVIER” (Biologi Angkatan 2012) yang senantiasa memberikan semangat dan terima kasih untuk kekeluargaan kalian selama ini.

Besar harapan saya kiranya skripsi ini dapat bernilai ibadah di sisi Allah swt dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Amin.

Samata, November 2016

ATIRAH MULIA
NIM: 60300112022

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1-9
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup.....	6
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN TEORITIS	10-39
A. Uraian Tumbuhan.....	10
B. Uraian Bakteri Uji	14
C. Ekstraksi.....	26
D. Ayat yang Relevan	36
E. Kerangka Pikir.....	39
F. Hipotesis.....	39

BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	40-46
	A. Jenis dan Lokasi Penelitian	40
	B. Pendekatan Penelitian	40
	C. Variable Penelitian	40
	D. Defenisi Operasional Variabel	41
	E. Desain Penelitian	42
	F. Metode Pengumpulan Data	42
	G. Instrumen Penelitian (Alat dan Bahan)	43
	H. Prosedur Kerja	43
	I. Analisis Data	46
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	47-49
	A. Hasil Penelitian	47
	B. Pembahasan	49
BAB V	PENUTUP	57
	A. Kesimpulan	57
	B. Saran	57
	KEPUSTAKAAN	58-61
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	62-72
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	73

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Perlakuan Ekstrak Rumput Mutiara pada Bakteri Uji	29
Tabel 4.1. Hasil Pengamatan Diameter Hambatan Ekstrak Rumput Mutiara	34
Tabel 4.2. Perbandingan Rata-Rata Diameter Zona Bening	35

.DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Tumbuhan Rumput Mutiara.....	10
Gambar 2.2. Bakteri <i>Salmonella Thypi</i>	14
Gambar 4.1. Grafik Rata-Rata Zona Bening (Hambatan)	36

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Skema Kerja	46
Lampiran 2. Perhitungan.....	49
Lampiran 3. Gambar	52

ABSTRAK

Nama penulis : Atirah Mulia
NIM : 60300112022
Judul Skripsi : Daya Hambat Ekstrak Rumput Mutiara (*Hedyotis corymbosa*) Terhadap Bakteri *Salmonella Thypi*

Telah dilakukan uji daya hambat ekstra rumput mutiara (*Hedyotis corymbosa*) terhadap bakteri *Salmonella thypi* dengan menggunakan variasi konsentrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya daya hambat ekstrak rumput mutiara (*Hedyotis corymbosa*) terhadap bakteri *Salmonella Thypi* yang menyebabkan penyakit tifoid dengan kosentrasi 2,5%, 5%, 10% dan perbandingan kontrol negatif dan kontrol positif. Uji daya hambat ini menggunakan metode difusi agar atau metode kertas cakram dengan menentukan adanya zona bening disekitaran kertas cakram. Data yang diperoleh dengan dua kali pengulangan yang menunjukkan bahwa pemberian ekstrak daun rumput mutiara (*Hedyotis corymbosa*) pada bakteri *Salmonella Thypi*. Selanjutnya data yang diperoleh dengan menggunakan metode RAL (Rancangan Acak Lengkap) kemudian dianalisis menggunakan analisis sidik ragam (uji-F) pada taraf α 0, 05 dan dilanjutkan dengan menggunakan uji Beda Nyata Terkecil (BNT) α 0, 05 dimana diperoleh hasil bahwa pemberian ekstrak daun rumput mutiara (*Hedyotis corymbosa*) terhadap pertumbuhan bakteri *Salmonella Thypi*, yang mana semakin tinggi konsentrasi ekstrak, maka semakin besar pula zona bening (hambatan) yang terbentuk di sekitaran paper disk

Kata kunci : Ekstrak Daun Rumput Mutiara (*Hedyotis corymbosa*), *Salmonella Thypi*, Rancangan Acak Lengkap (RAL).

ABSTRACT

Name : Atirah Mulia
Student ID Number : 60300112022
Title : Pearl Grass Leaves Extract (*Hedyotis corymbosa*) Against *Salmonella Thypi*

It has been conducted inhibition test of the extract from pearl grass (*Hedyotis corymbosa*) against *Salmonella Thypi* by using varying concentrations. This study aims to determine the inhibitory of pearl grass (*Hedyotis corymbosa*) extract against the *Salmonella* that cause typhoid disease using concentration of 2.5%, 5%, 10% and the ratio of the negative or and a positive method control. This inhibition test using agar diffusion paper disc with a clear zone around it. Data obtained with two repetitions showed the extract from leaf of pearl grass (*Hedyotis corymbosa*) in *Salmonella Thypi*. Furthermore, the data obtained using methods Completely Randomized Design (CRD) then analyzed using analysis of variance (F-test) at level α 0,05 and continued using the Least Significant Diferent Test α 0,05 showed that the extract from leaf of pearl grass (*Hedyotis corymbosa*) leaf on the growth of the bacteria *Salmonella Thypi* where, the higher of extract concentration, means the widest of clear zone was performed around disk paper.

Keywords: Completely Randomized Design (CRD), Pearl Grass Leaf Extract (*Hedyotis corymbosa*), *Salmonella Thypi*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Potensi tumbuhan adalah melawan pengaruh bakteri dan zat perusak potensi yang lain adalah membantu tubuh terbebas dari bakteri-bakteri dan mempermudah penyerapan bahan-bahan aktif yang terdapat dalam tumbuhan tersebut. (Rahman, 2007:5).

Allah swt berfirman dalam QS. Thaha/ 20: 53

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى ﴿٥٣﴾

Terjemahnya:

“Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam.”(QS. Thaha/ 20: 53).

Ayat diatas menjelaskan bahwa Dia, yakni Allah swt, yang telah menjadikan bagi kamu, wahai Fir'aun dan seluruh manusia, sebagaimana besar bumi sebagai hamparan dan menjadikan sebagian kecil lainnya gunung-gunung untuk menjaga kestabilan bumi dan Dia, Tuhan itu juga, yang telah menurunkan dari langit air, yakni hujan, sehingga tercipta sungai-sungai dan danau, maka

Kami tumbuhkan dengannya, yakni dengan perantara hujan itu, berjenis-jenis tumbuhan yang bermacam-macam bentuk dan manfaatnya. Seperti halnya berbagai macam rumput-rumputan yang memiliki manfaat diantaranya Rumput mutiara. Itu semua Allah swt ciptakan buat kamu dan binatang-binatang kamu (Shihab, 2002).

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat dan canggih ternyata tidak mampu menggeser peran obat tradisional. Selama ini tidak kita sadari bahwa beberapa bahan dapur untuk memasak dan tanaman ternyata dapat dipergunakan dan berkhasiat mengobati penyakit (Wibowo, 2008).

Demam tifoid merupakan penyakit sistematik akut yang disebabkan oleh *Salmonella Thypi*. Di dunia, insiden demam tifoid diperkirakan mencapai 16 juta kasus setiap tahunnya. Lebih dari 600.000 orang meninggal setiap tahun karena penyakit ini. Di Indonesia, demam tifoid atau yang lebih dikenal sebagai penyakit tifus merupakan penyakit endemik dan menjadi masalah kesehatan yang serius. Insidensi rata-rata mencapai 650 kasus per 100.000 penduduk di Indonesia, dengan mortalitas rata-rata bervariasi dari 3,1-10,4%. Demam tifoid yang disebabkan oleh *Salmonella Thypi* banyak terjadi pada musim penghujan terutama di daerah dengan tingkat sanitasi rendah dan daerah banjir (Gassem, 2001).

Demam tifoid dapat terjadi pada semua umur, terbanyak pada usia 3-19 tahun, sekitar 77% dengan puncak tertinggi pada usia 10-15 tahun. *S. Thypi* dapat menyebabkan penyakit yang parah disuatu wilayah tetapi hanya menimbulkan

gejala penyakit yang ringan pada wilayah yang lain, berarti ada hubungan antara perbedaan wilayah dengan tingkat keparahan penyakit. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di kawasan Asia Tenggara dengan konsekuensi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang cepat, menimbulkan dampak terjadinya urbanisasi dan migrasi pekerja antar negara yang berdekatan seperti Malaysia, Thailand dan Filipina. Mobilisasi antar pekerja ini memungkinkan terjadinya perpindahan atau penyebaran *S. Typhi* antar negara endemis (Simanjuntak, 1993).

S. Typhi merupakan kuman patogen penyebab demam tifoid, yaitu suatu penyakit infeksi sistemik dengan gambaran demam yang berlangsung lama, adanya bakteremia disertai inflamasi yang dapat merusak usus dan organ-organ hati (Johnson, 1993).

Di Indonesia kloramfenikol masih merupakan obat terpilih untuk penderita demam tifoid. Antibiotik kotrimoksazol, siprofloksasin, ofloksasin, amoksisilin, dan sefalopsorin merupakan generasi ketiga menjadi alternatif obat tifoid bila kloramfenikol sudah lagi tidak efektif. Namun lain halnya dengan di India, golongan kuinolon seperti siprofloksasin telah menjadi *drug of choice* menggantikan kloramfenikol, amoksisilin dan kotrimoksazol yang hanya digunakan untuk kasus-kasus tertentu (Mandell, 1995).

Penatalaksanaan demam tifoid secara medis sampai saat ini masih menganut trilogi penatalaksanaan demam tifoid yaitu antimikroba, istirahat dan diet. Namun bakteri penyebab demam tifoid ini telah resisten terhadap obat-obatan

konvensional. Untuk itu perlu difikirkan pengobatan alternatif ataupun pengobatan pendamping yang efektif dan efisien serta aman dan cukup murah akan tetapi tetap berorientasi pada standar pelayanan kesehatan yang telah ada. Pengobatan pendamping yang dimaksud antara lain adalah dengan menggunakan ramuan tradisional yaitu dengan menggunakan bahan-bahan tradisional (Sya'roni, 2002).

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam terutama tumbuh-tumbuhan yang banyak tersebar diseluruh kepulauan Indonesia. Indonesia juga merupakan negara yang kaya akan tanaman-tanaman yang berkhasiat obat. Salah satu tanaman yang kini sudah dijadikan obat herbal dan banyak dikonsumsi masyarakat adalah Rumput Mutiara, dengan nama latin *Hedyotis corymbosa* (L.) Lamk atau *Oldelandia corymbosa* Linn, yang termasuk dalam famili Rubiaceae (Sudarsono, 2005).

Tanaman rumput mutiara (*Hedyotis corymbosa*) ini memiliki kandungan bakteriostatik diantaranya tanin, fenol, terpenoid, saponin, flavonoid, steroid. Berbagai penelitian yang dikembangkan untuk mengeksplorasi aktivitas biologi herba rumput mutiara yang terkait dengan farmakologi antara lain aktivitas antikanker, antioksidan, dan antihepatotoksis, peningkat proliferasi limfosit, peningkat aktivitas fagositosis makrofag serta toksitasnya (Lela, 2012).

Adapun tumbuhan-tumbuhan yang memiliki kandungan bakteriostatik yang sama dengan rumput mutiara (*Hedyotis corymbosa*) yang dapat menghambat bakteri *S. Thypi* diantaranya tanaman keji beling (*Strobilanthes crispus* BI),

tanaman belimbing (*Averhoa bilimbi* Liin), tanaman kangkung (*Ipomea aquatic*), tanaman secang (*Caesalpinia sappan* Liin), tanaman jarak pagar (*Jatropha curcas* Linn) (Budikafa, 2014).

Rumput mutiara (*Hedyotis corymbosa*), merupakan salah satu tumbuhan yang menarik perhatian yang dapat dijadikan sebagai obat tradisional, karena dalam rumput mutira terdapat salah satu zat aktif yang bersifat antioksidan. Tanaman ini hidup liar di berbagai tempat seperti kebun, pinggir jalan sampai di pinggir selokan yang mendapat cukup sinar matahari dan air. Seluruh bagian tanaman dapat digunakan sebagai obat yang dipercaya berkhasiat sebagai antiradang, antikanker, antipiretik, diuresis, melancarkan peredaran darah, antitoksin, dan masih banyak lagi. Masyarakat mengkonsumsinya dalam bentuk asli (berupa air rebusan tanaman, atau tanaman yang dilumatkan) maupun hasil olahannya (berupa tablet, granule, teh, dan kapsul) dalam dosis yang bervariasi. Digunakan sebagai obat kanker, hepatitis, usus buntu, tulang patah, dan merupakan salah satu upaya untuk pengobatan tradisional yang dapat digunakan sebagai alternatif pengobatan penyakit infeksi, untuk itu diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai aktifitas anti bakteri Rumput mutiara (*Hedyotis corymbosa*) sebagai ramuan obat khususnya dapat digunakan sebagai pengobatan alternatif untuk mengobati penyakit demam tifoid (Dharmananda, 2004).

Berdasarkan hasil tersebut dilakukan penelitian untuk memberikan kontribusi berupa informasi tentang daya antibakteri sehingga dapat dimanfaatkan

sebagai pertimbangan terhadap penelitian lain yang berkaitan dengan tumbuhan tradisional atau sebagai strategi dalam pengembangan obat tradisional.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana tingkat daya hambat ekstrak rumput mutiara (*Hedyotis corymbosa*) terhadap pertumbuhan bakteri *S. Thypi* penyebab penyakit tifoid?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini meliputi ekstraksi rumput mutiara (*Hedyotis corymbosa*) yang diambil dari area dalam kampus UIN Alauddin Makassar, uji aktivitas antibakteri *S. Thypi*.

D. Kajian pustaka / penelitian terdahulu

1. Lela Mukmilah, dkk, 2012. Dengan melakukan penelitian tentang Uji Aktivitas Antibakteri dari Ekstrak Rumput Mutiara (*Hedyotis corymbosa*). Hasil pengujian fitokimia yang dilakukan pada ekstrak pekat etanol, fraksi n-heksana, fraksi metilen klorida, fraksi etil asetat, fraksi butanol dan residu tumbuhan rumput mutiara menunjukkan beberapa golongan senyawa yang terdeteksi yaitu: tanin, fenol, terpenoid, saponin, flavonoid dan steroid dalam ekstrak pekat (ekstrak etanol) dan etil asetat, dalam fraksi butanol, fraksi

heksan dan residu terdeteksi adanya senyawa golongan tanin, fenol, terpenoid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tumbuhan rumput mutiara (*Hedyotis corymbosa*), memiliki aktivitas antibakteri dalam pelarut metilen klorida hal ini menandakan bahwa senyawa aktif yang bersifat antibakteri pada rumput mutiara dapat larut dalam pelarut semi polar (pelarut metilen klorida) dan sedikit larut dalam pelarut n-heksan (non polar), bahkan tidak larut dalam pelarut polar (butanol). Bila dilihat dari hasil uji fitokimia dibandingkan terhadap aktivitas antibakteri antara butanol dan metilen klorida diduga zat aktif yang bersifat anti bakteri adalah senyawa dari golongan flavonoid.

2. Dian Pratiwi, 2014. Dengan judul Pengaruh Ekstrak Daun Kelor (*Moringa oleifera*) terhadap pertumbuhan *S. Typhi*. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental laboratoris dengan rancangan penelitian berupa penelitian in vitro menggunakan metode sumuran dengan kontrol positif. Kloramfenikol 1% dan kontrol negatif aquades steril yang dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi Program Studi Pendidikan Biologi FKIP Universitas Jember. Penelitian ini menggunakan bakteri *S. Typhi* yang ditanam dengan metode *power plate*, tujuannya untuk mencari konsentrasi hambat minimal (KHM) ekstrak daun kelor menggunakan konsentrasi 1%, 2%, 3%, 4%, 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konsentrasi Hambat Minimal (KHM) daun kelor yang efektif menghambat pertumbuhan bakteri *S. Typhi* berada pada konsentrasi 2% yang ditunjukkan dengan adanya zona bening disekitar sumuran.

3. Opstaria Saptarini, 2011. Dengan judul Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanolik Daun Patikan Kebo (*Euphorbia hirta Linn*) dan Herba Rumput Mutiara (*Hedyotis corymbosa*) terhadap Bakteri Penyebab Pneumonia. Hasil determinasi tumbuhan menunjukkan bahwa jenis tumbuhan adalah patikan keboden herba rumput mutiara. Ekstraksi yang dilakukan dengan menggunakan pelarut metanol, air dan etanol. Kemudian dilakukan uji aktivitas terhadap bakteri *Klebsiella pneumonia*, *Streptococcus haemolyticus* alpha dan beta serta *Streptococcus pneumonia*. Hasil pengujian adanya aktivitas antimikroba terhadap bakteri *Streptococcus haemolyticus* tipe alpha dan beta, *Streptococcus pneumonia* dan *Klebsiella pneumonia* dilakukan dengan menggunakan metode *broth microdilution*. Berdasarkan pengujian aktivitas antibakteri terhadap infuse, ekstrak metanol dan ekstrak etanol daun patikan kebo, dan herba rumput, dengan metode *broth microdilution*, terlihat bahwa ekstrak yang paling aktif adalah ekstrak etanol daun patikan kebo dan ekstrak etanolik herba rumput mutiara pada bakteri, *Streptococcus Pneumonia*, *Streptococcus haemolyticusalpha* dan *Streptococcus haemoyiticus beta* dan *Klebsiella pneumonia*.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya daya hambat ekstrak rumput mutiara (*Hedyotis corymbosa*) terhadap pertumbuhan bakteri *S. Thypi*.

F. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat memberikan kontribusi berupa informasi tentang daya antibakteri sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan terhadap penelitian lain yang berkaitan dengan tumbuhan tradisional atau sebagai strategi dalam pengembangan obat tradisional.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Uraian Tumbuhan

1. Nama Daerah

Rumput Mutiara (*Hedyotis corymbosa*), memiliki beberapa nama daerah, diantaranya adalah rumput siku-siku, lidah ular, bunga telur belungkas (Indonesia), daun mutiara, rumput mutiara (Jakarta), katepan, urek-urek polo (Jawa), Pengka (Makassar), pucuk pulung (Kalimantan Barat), Shui xian cao (China) (Depkes RI, 1995).

2. Morfologi

Rumput mutiara merupakan tanaman herba yang tumbuh rindang berserak, tumbuh subur pada tanah yang lembab di tepi jalan pinggir selokan atau di tanah terlantar, mempunyai banyak percabangan, batang bersegi, daun berhadapan bersilang, tangkai daun pendek/hampir duduk, panjang daun 2-5 cm, ujung runcing, tulang daun satu di tengah, ujung daun mempunyai rambut yang pendek, permukaan bagian bawah daun hijau pucat. Bunga keluar dari ketiak daun, bentuknya seperti payung berwarna putih, bunga tersusun dalam bentuk bongkol, tangkai bunga (induk) pendek dan keras, panjangnya 5-10 mm, tabung kelopak gundul (Wijayakusuma, 1992).



Gambar 2.1: Rumput mutiara (*Hedyotis corymbosa*) (Ruwaida, 2010)

3. Kandungan Kimia

Kandungan kimia dalam rumput mutiara diantaranya hentriacontane, stigmasterol, ursolic acid, oleanolic acid, beta-sitosterol, sitisterol-D-glucoside, p-coumaric acid, flavonoid glycosides, tanin. Anggota Rubiaceae ini bersifat manis, sedikit pahit lembut dan netral (Hariana, 2006).

Rumput mutiara memiliki efek farmakologis. Kandungan rumput mutiara yang sering dimanfaatkan adalah kandungan ursolic acid. Selain itu terdapat kandungan merol dan marol, yaitu senyawa triperpenoid pentasiklik ($C_{30}H_{48}O_3$) yang berfungsi sebagai lapisan lilin dan buah. Senyawa ini berfungsi menolak serangga dan mikroba (Pendleton, 2009).

Kandungan flavonoid pada rumput mutiara diduga mampu menghambat proses karsinogenesis baik secara *in vitro* maupun *in vivo*. Flavonoid berfungsi sebagai antibakteri dengan cara membentuk senyawa kompleks terhadap protein ekstraseluler yang mengganggu integritas membran sel bakteri. Flavonoid merupakan senyawa fenol sementara senyawa fenol dapat bersifat koagulator protein. Alkaloid memiliki kemampuan sebagai

antibakteri. Mekanisme yang diduga adalah dengan cara mengganggu komponen penyusun peptidoglikan pada bakteri sehingga lapisan sel akan mengalami kematian (Dwijoseputro, 1996).

P-coumaric acid terkandung di dalam rumput mutiara. Senyawa tersebut merupakan bagian dari asam fenolik (C6-C1) dan coumarin (C6-C3). Pengaruh fisiologi dari coumarin dapat dimanfaatkan sebagai antibakteri dari beberapa binatang. Pada pertumbuhan 25 spesies bakteri (Wattimena, 1998).

Nurhayati (2006) telah berhasil mendeteksi aktivitas antibakteri dalam rumput mutiara (*Hedyotis corymbosa*) terhadap bakteri *E. coli*, *Staphylococcus aureus*, *Shyggella dysenteriae*, *Pseudomonas aeruginosa* dan *Salmonella* sp dengan konsentrasi hambat minimum berkisar dari 2-8 g/ml atau memiliki daya hambat bakteri 0,2 - 0,8%.

4. Kegunaan

Khasiat yang dimilikinya adalah sebagai antiradang (anti-inflamasi), diuretik, menyembuhkan bisul (anti karbunkular), menghilangkan panas (demam), antitoksin, mengaktifkan sirkulasi darah dan memperlancar sumbatan sperma (Kusuma, Zaky 2005), serta meningkatkan daya fagositosis sel darah putih dan imunitas hormonal (Dalimartha 2005) Dapat mengobati berbagai penyakit seperti radang kandung empedu, hepatitis, kanker (payudara, limpa, usus besar, serviks, rektum, lambung, nasofaring dan fibrosarkoma), tekanan darah tinggi, tonsilis, bronchitis, gondongan, pneumonia, radang usus buntu, radang panggul, infeksi saluran kemih, bisul,

dan borok untuk batu ginjal, radang ginjal dan infeksi ginjal. Daunnya yang segar juga dapat dimanfaatkan untuk mengobati luka luar seperti memar, pyodermi, gigitan ular, tersiram air panas, tulang patah, terkilir, yaitu dengan cara melumatkan herba segar lalu dibubuhkan pada tempat yang sakit (Permadi 2006).

5. Klasifikasi

Adapun klasifikasi dari tumbuhan Rumput Mutiara (*Hedyotis corymbosa*) menurut USDA, 2012 adalah:


Regnum	: Plantae
Superdivisi	: Spermatophyta
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Subclass	: Asteridae
Ordo	: Rubiales
Familia	: Rubiaceae
Genus	: <i>Hedyotis</i>
Species	: <i>Hedyotis corymbosa</i>

B. Uraian Bakteri Uji

1. Sifat dan Morfologi

S. Typhi merupakan bakteri Gram negatif berbentuk batang, tidak memiliki spora, bergerak dengan flagel peritrik, ukurannya berkisar 0,7 μm , memiliki antigen somatik (O), antigen flagel (H) dengan 2 fase dan antigen kapsul (Vi), hidup secara aerobik atau anaerobik fakultatif. Tumbuh optimal pada suhu 37°C dan berkembang pada suhu kamar (Hawley, 2003).

Bakteri *S. Typhi* ditularkan melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi oleh kotoran atau tinja dari seseorang penderita demam typhoid. Bakteri ini akan masuk melalui mulut bersama makanan dan minuman dan kemudian hanyut ke saluran pencernaan. Apabila bakteri masuk ke dalam tubuh manusia, tubuh akan berusaha untuk mengeliminasinya. Tetapi bila bakteri dapat bertahan dan jumlah yang masih cukup banyak, maka bakteri akan berhasil mencapai usus halus. Kemudian bakteri berusaha masuk ke dalam tubuh yang akhirnya dapat merangsang sel darah putih untuk menghasilkan interleukin yang merangsang terjadinya gejala demam perasaan lemah, sakit kepala, nafsu makan berkurang, sakit perut, gangguan pencernaan serta gejala lainnya. Usaha penyembuhannya adalah dengan pengobatan bagi penderitanya (Kresno, 2001).



Gambar 2.2: Bakteri *S. Thypi*
(Sumber: <http://textbookofbacteriology.net/HorizontalTransfer.gif>)

2. Fase Pertumbuhan Bakteri

Kurva pertumbuhan bakteri adalah suatu informasi mengenai fase hidup bakteri, fase-fase hidup bakteri pada umumnya meliputi, adaptasi, log (pertumbuhan eksponensial), stationer, kematian.

a. Fase Adaptasi

Singkatnya fase adaptasi bakteri dikarenakan bakteri tumbuh pada media yang sama pada waktu penyegaran, menyebabkan singkatnya waktu penyesuaian diri pada lingkungan yang baru. Panjang atau pendeknya fase adaptasi sangat ditentukan oleh jumlah sel yang diinokulasikan, kondisi fisiologis dan morfologis yang sesuai serta media kultivasi yang dibutuhkan.

b. Fase logaritmik

Fase logaritmik menggambarkan sel membelah diri dengan laju yang konstan, serta keadaan pertumbuhan yang seimbang.

c. Fase Stasioner

Fase stasioner adalah fase tetap yang ditandai dengan adanya pertumbuhan yang konstan antara bakteri yang hidup dan yang mati. Hal ini disebabkan berkurangnya nutrisi dan terbentuknya senyawa hasil metabolisme yang cenderung bersifat racun bagi bakteri.

d. Fase kematian

Pada fase kematian sel yang mati menjadi lebih banyak daripada terbentuknya sel-sel yang baru. Fase kematian, sel-sel yang berada dalam fase tetap akhirnya akan mati bila tidak dipindahkan ke media segar lainnya.

Kurva pertumbuhan digunakan untuk mengetahui kecepatan pertumbuhan sel dan pengaruh lingkungan terhadap kecepatan pertumbuhan. Pembuatan kurva pertumbuhan merupakan bagian yang penting dari suatu penelitian karena dapat menggambarkan karakteristik kolonisasi bakteri. Selain itu perhitungan waktu generasi diperlukan untuk mengetahui prediksi populasi setiap mikroorganisme dalam jangka waktu yang sama dengan keaktifannya dalam proses metabolisme (Fardiaz, 1992).

3. Faktor Transmisi Penyakit

4. Klasifikasi

Adapun klasifikasi dari bakteri *S. Thypi* menurut Garitty, 2004:

Kingdom	: Bacteria
Filum	: Proteobakteria
Classis	: Gamma proteobakteria
Ordo	: Enterobakteriales
Famili	: Enterobakteriaceae
Genus	: Salmonella
Species	: <i>Salmonella Thypi</i>

C. Ekstraksi

1. Pengertian Ekstraksi

Ekstraksi adalah proses penyarian zat-zat berkhasiat atau zat-zat aktif dari bagian tanaman obat, hewan, atau biota laut (Dirjen POM, 1986). Ekstraksi atau penyarian merupakan peristiwa perpindahan massa zat aktif, yang semula berada di dalam sel ditarik oleh cairan penyari sehingga zat aktif larut dalam cairan penyari tersebut (Dirjen POM, 1986: 3).

2. Mekanisme Kerja

Cairan penyari akan menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat aktif, zat aktif akan larut dan adanya perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif di dalam sel dengan yang di luar

sel, maka larutan yang terpekat terdesak keluar. Peristiwa tersebut berulang sehingga terjadi keseimbangan konsentrasi antara larutan di luar dan di dalam sel (Dirjen POM, 1986: 10).

5. Tujuan Ekstraksi

Tujuan ekstraksi adalah untuk menarik semua komponen kimia yang terdapat dalam simplisia, ekstraksi ini didasarkan pada perpindahan massa komponen zat padat ke dalam pelarut dimana perpindahan mulai terjadi pada lapisan antar muka, kemudian berdifusi masuk ke dalam peralut. Tujuan ekstraksi secara umum terdapat empat situasi (Mulyati, 2009: 11).

- a. Secara kimia telah diketahui identitasnya untuk diekstraksi dari organisme. Dalam kasus ini prosedur yang telah dipublikasikan dapat diikuti dan dibuat modifikasi yang sesuai untuk mengembangkan proses atau menyeimbangkan dengan kebutuhan pemakai.
- b. Bahan diperiksa untuk menentukan kelompok senyawa kimia tertentu, misalnya: alkaloid, flavanoid, saponin. Dalam situasi ini metode umum yang digunakan untuk senyawa kimia yang diminati dapat diperoleh dari pustaka.
- c. Organisme (hewan atau tumbuhan) digunakan dalam pengobatan tradisional dan biasanya dibuat dengan berbagai cara misalnya *Tradisional Chinese Medicine* (TCM) seringkali membutuhkan herba yang dididihkan dalam air untuk diberikan sebagai obat. Proses ini harus ditiru sedekat mungkin jika ekstrak akan melalui kajian ilmiah biologi atau kimia lebih

lanjut, khususnya jika tujuannya untuk memvalidasi penggunaan obat tradisional.

- d. Sifat senyawa yang akan diisolasi belum ditentukan sebelumnya dengan cara apapun. Situasi ini (umumnya dalam program skrining) dapat timbul jika tujuannya adalah menguji organisme, baik yang dipilih secara acak ataupun yang didasarkan pada penggunaan tradisional untuk mengetahui adanya senyawa dengan aktivitas biologi tertentu.

6. Metode Ekstraksi

Pemilihan metode ekstraksi sangat diperlukan untuk mencapai hasil maksimal sesuai yang diinginkan. Zat aktif dalam simplisia tidak sama karakteristiknya, ada yang tahan terhadap pemanasan dan ada yang tidak tahan pemanasan sehingga metode ekstraksi dapat di golongkan ke dalam dua golongan menurut Dewi, 2010 yaitu:

- a. Metode ekstraksi secara dingin yaitu metode ekstraksi yang dalam proses kerjanya tidak memerlukan panas. Metode ini diperuntukkan untuk simplisia yang mengandung komponen kimia yang mudah larut, tidak tahan terhadap pemanasan simplisia yang mempunyai struktur yang lunak dan tipis seperti rimpang, daun, akar. Ekstraksi secara dingin terdiri atas beberapa macam, yaitu;

- 1). Metode maserasi

Maserasi merupakan cara penyairan sederhana yang dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia dalam larutan selama

beberapa hari temperatur kamar dan terlindung dari cahaya. Metode maserasi digunakan untuk menyari simplisia yang mengandung komponen kimia yang mudah larut dalam cairan penyari, tidak mengandung benzoin, tiraks dan lilin.

Keuntungan dari metode ini adalah peralatannya sederhana. Sedang kerugiannya antara lain waktu yang diperlukan untuk mengekstraksi sampel cukup lama, larutan yang digunakan lebih banyak, tidak dapat digunakan untuk bahan-bahan yang mempunyai tekstur keras seperti benzoin, tiraks dan lilin.

2). Metode Soxhletasi

Soxhletasi merupakan penyarian simplisia secara berkesinambungan, cairan penyari dipanaskan sehingga menguap, uap cairan penyari terkondensasi menjadi molekul-molekul air oleh pendingin balik dan turun menyari simplisia dalam klongsong dan selanjutnya masuk kembali ke dalam labu alas bulat setelah melewati pipa sifon.

Keuntungan metode ini adalah dapat digunakan untuk sampel dengan tekstur yang lunak dan tidak tahan terhadap pemanasan secara langsung, digunakan pelarut yang lebih sedikit, dan pemanasannya dapat diatur sedangkan kerugian dari metode ini adalah karena pelarut didaur ulang, ekstrak yang terkumpul pada wadah di sebelah bawah terus-menerus dipanaskan sehingga dapat menyebabkan reaksi

peruraian oleh panas dan bila dilakukan dalam skala besar, mungkin tidak cocok untuk menggunakan pelarut dengan titik didih yang terlalu tinggi, seperti metanol atau air, karena seluruh alat yang berada di bawah kondensor perlu berada pada temperature ini untuk pergerakan uap pelarut yang efektif.

3). Metode Perkolasi

Perkolasi adalah cara penyarian dengan mengalirkan penyari melalui serbuk simplisia yang telah dibasahi. Keuntungan metode ini adalah tidak memerlukan langkah tambahan yaitu sampel padat telah terpisah dari ekstrak. Kerugiannya adalah kontak antara sampel padat tidak merata atau terbatas dibandingkan dengan metode refluks, dan pelarut menjadi dingin selama proses perkolasi sehingga tidak melarutkan komponen secara efisien.

- b. Metode ekstraksi secara panas adalah metode ekstraksi yang di dalam prosesnya dibantu dengan pemanasan. Pemanasan dapat mempercepat terjadinya proses ekstraksi karena cairan penyari akan lebih mudah menembus rongga-rongga sel simplisia dan melarutkan zat aktif yang ada dalam sel simplisia tersebut. Metode ini diperuntukkan untuk zat aktif yang tahan terhadap pemanasan dan simplisia yang memiliki tekstur keras seperti biji, kulit kayu, kulit akar. Cara ekstraksi ini misalnya refluks, destilasi uap air.

1). Metode refluks

Keuntungan dari metode ini adalah digunakan untuk mengekstraksi sampel-sampel yang mempunyai tekstur kasar dan tahan pemanasan langsung. Kerugiannya membutuhkan volume total pelarut yang besar dan sejumlah manipulasi dari operator

2). Metode destilasi uap

Destilasi uap adalah metode yang populer untuk ekstraksi minyak-minyak menguap (esensial) dari sampel tanaman. Metode destilasi uap air diperuntukkan untuk menyari simplisia yang mengandung minyak menguap atau mengandung komponen kimia yang mempunyai titik didih tinggi pada tekanan udara normal.

7. Antimikroba

Antimikroba adalah bahan-bahan atau obat-obatan yang digunakan untuk membunuh infeksi mikroba pada manusia termasuk diantaranya antibiotik, antiseptik, desinfektan dan preservatife (Djide M.N Sartini, 2008: 338).

Obat-obat yang digunakan membasmi mikroorganisme yang menyebabkan infeksi pada manusia, hewan ataupun tumbuhan harus bersifat toksisitas selektif artinya obat atau zat tersebut harus bersifat toksis terhadap mikroorganisme penyebab penyakit tetapi relatif tidak toksis terhadap jasad inang atau hospes (Djide M.N Sartini, 2008: 339).

1. Mekanisme kerja antimikroba

a. Penginaktifan enzim tertentu

Penginaktifan enzim tertentu adalah mekanisme umum dari senyawa antiseptika dan desinfektansia, halogen, senyawa-senyawa merkuri dan senyawa ammonium kuarterner.

b. Denaturasi protein

Turunan alkohol, halogen dan halogenator, senyawa merkuri, peroksida, turunan fenol dan senyawa amonium kuarterner bekerja sebagai antiseptika dan desinfektan dengan cara denaturasi dan konjugasi protein sel bakteri.

c. Mengubah permeabilitas membran sitoplasma bakteri

Cara ini adalah model kerja dari turunan anin dan guaninine, turunan fenol dan senyawa-senyawa tersebut dapat menyebabkan bocornya konstituen sel yang esensial, sehingga bakteri mengalami kematian.

d. Interkalasi ke dalam DNA

Beberapa zat warna seperti turunan trifenilmetan dan turunan akridin, bekerja sebagai antibakteri dengan mengikat secara kuat asam nukleat, menghambat sintesa DNA dan menyebabkan perubahan kerangka mutasi pada sintesis protein.

e. Pembentukan khelat

Beberapa turunan fenol, seperti heksaloroform dan oksikuinolin dapat membentuk khelat dengan ion Fe dan Cu, kemudian bentuk khelat

tersebut masuk ke dalam sel bakteri. Kadar yang tinggi dari ion-ion logam di dalam sel menyebabkan gangguan fungsi enzim-enzim, sehingga mikroorganismenya mengalami kematian (Djide, 2008: 340-341).

2. Pembagian antimikroba

Antimikroba berdasarkan spektrum atau kisaran kerja antimikroba dapat dibedakan menjadi:

- a. Spektrum sempit, yaitu antimikroba yang hanya mampu menghambat satu golongan bakteri saja, contohnya hanya mampu membunuh atau menghambat bakteri gram negatif saja atau gram positif saja.
- b. Spektrum luas, yaitu antimikroba yang dapat menghambat atau membunuh bakteri baik gram negatif maupun gram positif (Pratiwi, 2008).

8. Sifat Antimikroba

Antimikroba memiliki 2 sifat utama menurut Pratiwi, 2008 yaitu;

1. Bakteriostatik

Zat atau bahan yang dapat menghambat atau menghentikan pertumbuhan mikroorganisme (bakteri). Dalam keadaan seperti ini jumlah mikroorganisme menjadi stasioner, tidak dapat lagi bermultiplikasi dan berkembang biak. Contoh dari bakteriostatik adalah sulfonamide, tetrasikin, kloramfenikol dan eritromisin.

2. Bakteriosida

Zat atau bahan yang dapat membunuh mikroorganisme (bakteri). Dalam hal ini jumlah mikroorganisme (bakteri) akan berkurang atau bahkan akan habis dan tidak dapat lagi melakukan multiplikasi atau berkembang baik. Contoh dari bakteriosida adalah penisilin sefalosporin, dan neomisin

Bahan antimikroba dapat bersifat bakteriostatik pada konsentrasi yang rendah, namun bersifat bakterisida pada konsentrasi tinggi. Bahan kemoterapeutik yang baik adalah mempunyai daya mematikan mikroba, namun tidak menyebabkan keracunan pada induk atau inang yang menggunakan bahan tersebut

Selain itu antibiotik juga memiliki beberapa sifat yang lain, yaitu menghambat atau membunuh pathogen tanpa merusak sel inang, tidak menyebabkan resistensi pada kuman (bakteri), memiliki spectrum yang luas efektif digunakan bagi banyak sepsis bakteri, baik kokus (bulat), basil (batang), maupun spiral (koma), tidak bersifat alergenik atau menimbulkan efek samping bila dipergunakan dalam jangka waktu yang lama, tetap aktif dalam plasma, cairan badan atau eksudat, larut di dalam air serta stabil.

Kebanyakan zat antimikroba yang efektif kerjanya mengganggu sintesis, penyusunan atau fungsi komponen-komponen makromolekul sel,

seperti penghambatan pembentukan dinding sel oleh polimiksin, penghambatan sintesis protein oleh kloramfenikol.

D. Ayat yang Relevan

Tumbuhan adalah aspek yang mengandung zat aktif dan variatif yang telah diciptakan Allah swt. Dengan hikmah dan takdirnya. Potensi tumbuhan adalah melawan pengaruh bakteri dan zat perusak yang lain adalah membantu tubuh terbebas dari bakteri-bakteri dan mempermudah penyerapan bahan-bahan aktif yang terdapat dalam tumbuhan tersebut (Rahman, 2007: 5).

Allah swt berfirman dalam QS. Asy Syu'ara'/26: 7

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿٧﴾

Terjemahnya

“Dan Apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?”(QS. Asy Syu'ara'/26: 7).

Ayat diatas mengajak manusia untuk mengarahkan pandangan hingga batas kemampuannya, dengan aneka tanah dan tumbuhannya, serta aneka keajaiban yang terhampar dipersada bumi, sedemikian manfaatnya lagi berbeda-beda jenis warna dan rasanya. Itu semua tidak mungkin tercipta dengan sendirinya, pasti ada penciptanya yang Maha Esa lagi Maha Kuasa. Disisi lain, tanah yang gersang melalui hujan yang diturunkan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Karena itu, ayat diatas memulai dengan pertanyaan

“Apakah mereka tidak melihat?”, pertanyaan yang mengandung unsur keheranan terhadap mereka yang tidak memfungsikan matanya untuk melihat bukti yang sangat jelas bahwa banyaknya tumbuh-tumbuhan yang mempunyai berbagai manfaat untuk menyembuhkan berbagai penyakit comtohnya rumput mutiara yang dapat menyembuhkan penyakit demam tifoid dan masih banyak lagi macam-macam tumbuhan yang baik (Shihab, 2002).

Allah swt berfirman pada surah surah QS Ali Imran/ 3:191, yang berbunyi:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ
 الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطِيلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾

Terjemahnya:


Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. (Yaitu) orang-orang yang mengingat Allah swt sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka. (QS Ali Imran/ 3:191).

Ayat diatas sangatlah jelas bahwasanya segala sesuatu yang telah Allah swt ciptakan di muka bumi ini pasti tidaklah sia-sia, artinya semuanya

memiliki manfaat dan kegunaan, bagi kaum pemikir bahwasanya Allah swt menciptakan langit dan bumi, malam dan siang bagi orang-orang yang berakal, Allah swt menciptakan segala sesuatu memiliki manfaat masing-masing, bahkan daun rumput mutiara pun yang merupakan tumbuhan liar yang menurut sebagian orang tidaklah bermanfaat, ternyata memiliki kandungan kimia yang dapat digunakan sebagai obat tradisional dan mematikan bakteri.

Hal ini juga menunjukkan bahwa seiring dengan perkembangan zaman, jenis-jenis penyakit yang ada di muka bumi ini semakin beragam jenisnya, sehingga diperlukan berbagai macam jenis pengobatan yang modern hingga pengobatan tradisional yang menggunakan bahan-bahan alamiah, baik itu dari hewan maupun tumbuhan (Achmad, 2009).


E. Kerangka Pikir



Daun rumput mutiara (*Hedyotis corymbosa*) merupakan salah satu tumbuhan yang dapat dijadikan obat tradisional karena terdapat zat aktif antioksidan.

Ekstrak rumput mutiara (*Hedyotis corymbosa*)

1. Pengambilan sampel



2. Pengolahan sampel
3. Ekstraksi
4. Pembuatan sampel
5. Uji daya hambat

Daun rumput mutiara (*Hedyotis corymbosa*) diharapkan dapat menghambat bakteri *S. Thypi* penyebab demam tifoid.

F. Hipotesis

Terdapatnya zona bening pada cawan petri, maka rumput mutiara (*Hedyotis corymbosa*) dapat menghambat pertumbuhan bakteri *S. Thypi*.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah termasuk penelitian kuantitatif.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilaksanakan di laboratorium Biologi Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar untuk melaksanakan proses ekstraksi daun rumput mutiara (*Hedyotis corymbosa*). Peneliti juga menggunakan laboratorium Mikrobiologi Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar untuk melaksanakan uji aktivitas daun rumput mutiara terhadap bakteri *S. Thyphi*.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini berupa eksperimentatif yang dimaksudkan untuk mengetahui efek yang diberikan oleh ekstrak daun rumput mutiara (*Hedyotis corymbosa*) sebagai antibiotik terhadap bakteri *S. Thyphi*.

C. Variabel Penelitian

Adapun jenis variabel independen adalah ekstrak rumput mutiara, variabel dependen adalah daya hambat pertumbuhan *S. Thyphi*.

D. Defenisi Operasional Variabel

1. Ekstrak rumput mutiara (*Hedyotis corymbosa*) adalah sediaan pekat yang didapat dengan mengekstraksi zat aktif dari daun rumput mutiara dengan menggunakan pelarut methanol dengan konsentrasi 2,5%, 5%, 10%, serta kontrol negatif menggunakan pelarut aquadest dan untuk kontrol positif menggunakan kloramfenikol 1%.

2. Diameter zona hambat *S. Thyphi* adalah diameter zona bening yang muncul pada *paper disk* yang diukur dengan jangka sorong (dalam millimeter) untuk mengetahui kekuatan daya hambat ekstrak rumput mutiara terhadap pertumbuhan *S. Thyphi*. Kekuatan daya hambat bakteri dikategorikan menurut Davis dan Stout (1971) : sangat kuat (zona bening >20mm), kuat (zona bening 10 – 20mm), sedang (zona bening 5 –10mm), lemah (<5mm) (Dewi, 2010).
3. Waktu adalah besaran yang menunjukkan lamanya peristiwa mulai darimasuknya media pertumbuhan *S. Thyphi* ke inkubator selama proses inkubasi sampai dikeluarkannya media dengan satuan jam yaitu antara 18 - 24 jam menggunakan timer.
4. Media pertumbuhan adalah media yang digunakan untuk menumbuhkan bakteri *S. Thyphi* yaitu media padat *Nutrient Agar* (NA).

E. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang diberikan ekstrak rumput mutiara dengan perlakuan sebagai berikut:

- a. A0 = kontrol negatif (dijenuhkan dalam aquadest)
- b. A1 = kontrol positif (dijenuhkan dalam kloramfenikol)
- c. A2 = konsentrasi ekstrak rumput mutiara 2,5%

- d. A3 = konsentrasi ekstrak rumput mutiara 5%
- e. A4 = konsentrasi ekstrak rumput mutiara 10%

Perlakuan ekstrak rumput mutiara pada mikroba uji ditunjukkan pada tabel 3.1.

Tabel 3.1. Perlakuan ekstrak rumput mutiara pada bakteri uji

No	Kode	Perlakuan
1.	A0	Kontrol negatif (aquadest)
2.	A1	Kontrol positif (kloramfenikol)
3.	A2	Konsentrasi 2,5% rumput mutiara <i>S. Thypi</i>
4.	A3	Konsentrasi 5% rumput mutiara <i>S. Thypi</i>
5.	A4	Konsentrasi 10% rumput mutiara <i>S. Thypi</i>

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu data primer hasil pemeriksaan di laboratorium.

G. Instrumen Penelitian

1. Alat

Adapun alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah cawan petri, pinset, autoklaf, korek api, tabung reaksi, gelas ukur 250 ml, inkubator, oven, rotary evaporator, bunsen, jangka sorong, neraca analitik, LAF (*Laminar Air Flow*), ose bulat, labu erlenmeyer 250 ml, mangkok, masker, *handschoen*,

batang pengaduk, mikropipet, vortex, lemari pengering, toples, kain saring, spoit 10 ml.

2. Bahan

Adapun bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah bakteri *S. Thypi*, rumput mutiara (*Hedyotis corymbosa*), medium *Nutrient Agar* (NA), aquadest, metanol, kapas, kertas aluminium foil, *tissue*, kertas cakram, DMSO, aquadest steril 10 ml, es kristal, tip, kloramfenikol 1%, alkohol 70%, botol coklat, spiritus.

H. Prosedur Penelitian

1. Pengambilan Sampel

Sampel daun ekstrak rumput mutiara (*Hedyotis corymbosa*) diperoleh di sekitar kampus II Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Pengambilan sampel dilakukan pada pagi hari, daun yang digunakan adalah dewasa.

2. Pengolahan Sampel

Daun rumput mutiara (*Hedyotis corymbosa*) yang telah diambil, dicuci hingga bersih dengan air mengalir, dikeringkan tanpa terkena sinar matahari langsung kurang lebih tiga hari hingga menjadi simplisia.

3. Ekstraksi Sampel

Simplisia daun rumput mutiara (*Hedyotis corymbosa*) dimasukkan ke dalam wadah maserasi, direndam dengan methanol hingga simplisia terendam dengan merata. Wadah maserasi ditutup dan disimpan selama 24 jam di tempat terlindung dari sinar matahari dan sesekali diaduk. Selanjutnya disaring, dipisahkan antara ampas dan filtratnya.

Ampas diekstraksi kembali dengan penyari yang baru dengan jumlah yang sama. Hal ini terus dilakukan hingga cairan penyari tampak bening. Ekstrak sampel yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan dipekatkan dengan cairan penyari dalam rotavapor 40°C. Ekstrak sampel disaring dengan kertas *whatman* menggunakan rangkaian pompa vakum. Ekstrak encer diuapkan dengan menggunakan kipas angin hingga diperoleh ekstrak kental.

4. Pembuatan Sampel Penelitian

Ekstrak kental yang telah diperoleh kemudian dibuat dalam konsentrasi 2, 5%, 5%, 10%, untuk konsentrasi 2,5% ditimbang 25 mg, konsentrasi 5% ditimbang sebanyak 50 mg, konsentrasi 10% ditimbang sebanyak 100 mg masing-masing diencerkan dengan DMSO 1 ml, sedangkan untuk kontrol positif menggunakan kloramfenikol 1% serta kontrol negatif menggunakan aquadest.

5. Sterilisasi Alat

Semua alat yang digunakan dalam penelitian dicuci dengan detergen selama 15-30 menit. Alat-alat dikeringkan dengan posisi terbalik di udara terbuka, setelah kering dibungkus dengan kertas aluminium foil. Tabung reaksi

dan gelas Erlenmeyer terlebih dahulu disumbat dengan kapas bersih. Alat-alat suntik seperti spuit yang tidak tahan dalam pemanasan tinggi, disterilkan pada autoklaf pada suhu 121°C selama 15 menit dengan tekanan 2 atm, jarum inokulasi dan ose disterilkan dengan pemanasan langsung hingga memijar.

6. Penyiapan Bakteri Uji

Bakteri uji digunakan dalam penelitian ini adalah *S. Thypi*. Bakteri ini diremajakan dalam medium *Nutrient Broth* (NB).

7. Uji Daya Hambat

Uji daya hambat ekstrak methanol daun rumput mutiara dilakukan dengan menggunakan kertas cakram.

Disiapkan medium glukosa *Nutrient Agar* (NA) steril dengan suhu 40°C-50°C sebanyak 15 ml kemudian dicampur dengan 0, 1 ml suspensi bakteri yang telah disiapkan sebelumnya, selanjutnya dituang secara aseptik ke dalam cawan petri steril dan dibiarkan hingga membeku. Selanjutnya kertas cakram yang telah direndam beberapa menit pada masing-masing konsentrasi sampel yaitu 2, 5%, 5%, 10% serta pada kontrol positif diletakkan di atas permukaan medium secara aseptik dengan jarak titik tengah kertas cakram dengan yang lain lebih kurang 3 cm dari jarak pinggir cawan petri 2 cm, selanjutnya diinkubasi pada suhu 37°C selama 24 jam.

8. Zona inhibisi

Daya hambat diketahui berdasarkan pengukuran diameter zona inhibisi (zona bening atau daerah jernih tanpa pertumbuhan mikroorganisme) yang

terbentuk di sekitar *paper disk*. Pengukuran tersebut menggunakan jangka sorong dan dinyatakan dalam milimeter. Kekuatan daya hambat bakteri adalah lemah (<5 mm), sedang (5-10 mm), kuat (10-20 mm), sangat kuat (>20 mm).

I. Analisis Data

Analisis data menggunakan analisis sidik ragam dan bila hasil sidik ragam berbeda nyata ($F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel 5\%}}$) dan berbeda sangat nyata ($F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel 1\%}}$) maka untuk membandingkan dan rata-rata perlakuan dilakukan uji lanjutan dengan Uji Beda Nyata Terkecil (BNT).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Dari penelitian yang telah dilakukan pada sampel ekstrak rumput mutiara (*Hedyotis corymbosa*) terhadap bakteri *S. Thyphi* diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.1 Pengamatan Diameter hambatan ekstrak rumput mutiara (*Hedyotis corymbosa*) terhadap bakteri uji dengan menggunakan metode difusi agar.

Perlakuan	Diameter (mm)		Jumlah	Rata-Rata
	Ulangan			
	I	II		
A0 (Kontrol (-))	0	0	0	0
A1 (Kontrol (+))	26	30	56	28
A2 (2,5%)	5	8	13	6,5
A3 (5%)	8	13	21	10,5
A4 (10%)	10	18	28	14
Jumlah	49	69	118	59


Perbandingan rata-rata diameter zona hambat pertumbuhan bakteri *S. Thyphi* yang diberikan perlakuan dengan ekstrak Rumput mutiara (*Hedyotis corymbosa*) dan kontrol dalam beberapa konsentrasi dapat ditunjukkan pada tabel 4.2

Tabel 4.2 Perbandingan rata-rata diameter zona bening (hambatan) pertumbuhan bakteri *S. Thyphi* yang diberikan perlakuan dengan ekstrak Rumput mutiara (*Hedyotis corymbosa*)

Perlakuan	Diameter (mm)		Jumlah	Rata-rata
	Ulangan			
	I	II		
A0 (Kontrol (-))	0	0	0	0 ^d
A1 (Kontrol (+))	26	30	56	28 ^a
A2 (2,5%)	5	8	13	6,5 ^c
A3 (5%)	8	13	21	10,5 ^{bc}
A4 (10%)	10	18	28	14 ^b
Jumlah	49	69	118	59

Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama berarti berbeda tidak nyata.

Rata-rata diameter zona hambat pertumbuhan bakteri *S. Thyphi* yang diberikan perlakuan dengan ekstrak Rumput mutiara (*Hedyotis corymbosa*) dan kontrol dalam beberapa konsentrasi dapat ditunjukkan pada gambar 4.1:



Gambar 4.1 Grafik Rata-rata zona hambat Bakteri *S. Thyphi* dengan 2 ulangan pada kontrol positif dan negatif dari beberapa konsentrasi

B. Pembahasan

Antimikroba adalah bahan-bahan atau obat-obatan yang digunakan untuk membunuh mikroba pada manusia termasuk diantaranya antibiotik, antiseptik dan desinfektan. Antibiotik adalah bahan yang diperoleh dari organism yang digunakan untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Antiseptik adalah senyawa kimia yang digunakan untuk menghambat atau mematikan mikroorganisme pada jaringan hidup, yang mempunyai efek membatasi dan mencegah infeksi agar tidak menjadi lebih parah. Desinfektan adalah senyawa kimia yang digunakan untuk menghambat atau mematikan mikroorganisme, yang digunakan pada benda mati.

Dalam penelitian ini digunakan bahan alam yang banyak digunakan dan dijumpai dilingkungan sekitar oleh masyarakat daun rumput mutiara (*Hedyotis corymbosa*) untuk diketahui daya hambat antimikrobanya. Dimana mikroba uji yang digunakan adalah *S. Thypi*.

Metode yang dipilih pada pengujian daya hambat antimikroba ekstrak daun rumput mutiara (*Hedyotis corymbosa*) adalah metode difusi agar, dasar pemilihan metode ini adalah karena cepat mudah dan sederhana pengerjaannya. Metode difusi agar merupakan metode yang paling sering digunakan untuk menentukan daya hambat antimikroba. Kerjanya dengan cara mengamati zona bening, yang mengindikasikan adanya hambatan pertumbuhan mikroorganisme oleh antimikroba pada permukaan media agar.

Hasil pengamatan dengan rata-rata diameter zona bening (hambatan) bakteri *S. Thyphi* setelah diberikan beberapa macam konsentrasi ekstrak dan dua kontrol yaitu kontrol negatif dan kontrol positif dengan dua pengulangan ditunjukkan pada tabel 4.1. Dimana hasil uji analisis varians (uji F) menunjukkan bahwa pemberian ekstrak rumput mutiara dalam beberapa macam konsentrasi dengan dua kali pengulangan adalah berbeda nyata karena $F_{hitung} (19, 13596) > F_{tabel} (5, 19)$ dalam menghambat pertumbuhan bakteri *S. Thyphi* melalui zona bening disekeliling *paper disk*.

Hasil dari uji analisis varians (uji F) pemberian ekstrak rumput mutiara adalah berbeda nyata maka dilakukan uji lanjut atau uji BNT pada tabel 4.2, dimana angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama berarti berbeda tidak nyata sehingga kontrol negatif dengan konsentrasi 2,5%, 5%, 10% berbeda tidak nyata dibandingkan dengan kontrol positif yang berbeda nyata.

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan metode difusi agar dengan melakukan 2 replikasi dan dihitung diameter daerah hambatan zona bening pada permukaan cawan petri dengan rata-rata pada konsentrasi 2,5% ekstrak daun rumput mutiara (*Hedyotis corymbosa*) adalah 6,5 mm, konsentrasi 5% ekstrak daun rumput mutiara (*Hedyotis corymbosa*) adalah 10,5 mm, konsentrasi 10% ekstrak daun rumput mutiara (*Hedyotis corymbosa*) adalah 14 mm dengan menggunakan perbandingan kontrol negatif 0 mm dan kontrol positif 28 mm. Berdasarkan kekuatan daya hambat bakteri lemah (<5 mm), sedang (5-10 mm), kuat (10-20 mm), sangat kuat (>20 mm), dapat disimpulkan bahwa ekstrak

daun rumput mutiara (*Hedyotis corymbosa*) dapat menghambat bakteri *S. Thypi* pada konsentrasi 2,5%. Dapat disimpulkan bahwa daun rumput mutiara (*Hedyotis corymbosa*) dapat digunakan sebagai obat tradisional, dan kloramfenikol masih bersifat bakteriostatik, untuk menghambat bakteri *S. Thypi* penyebab demam tifoid.

Dari hasil pengamatan pada kontrol negatif yang menggunakan aquadest tidak menghambat bakteri dikarenakan tidak adanya zat kimia yang terkandung didalamnya sehingga tidak terbentuk zona bening berbeda dengan kontrol positif yang menggunakan kloramfenikol, sangat berpengaruh terhadap bakteri dan memiliki zona bening paling besar diantara konsentrasi, aktifitas penghambatannya tergolong sangat kuat dibanding dengan ekstrak rumput mutiara yang tergolong kuat. Menurut Setiabudi (1987) kloramfenikol bersifat bakteriostatik yang bekerja menghambat enzim peptidil transferase pada proses sintesis protein kuman.

Terbentuknya zona bening (hambatan) disekeliling paper disk ini disebabkan karena adanya zat-zat yang bersifat antimikroba yang terkandung dalam daun rumput mutiara (*Hedyotis corymbosa*), sebagaimana yang telah diketahui bahwa daun rumput mutiara mengandung beberapa unsur kimia diantaranya *ursolic acid*, tanin, asam ursolat, asam uleanolat, *beta-sitosterol*, *hentriacontane*, *stimagsterol*, *oleanolic acid*, *sitisterol-D-glucoside*, *p-coumaric acid*, *flavonoid glycosides*.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kerja antimikroba, diantaranya adalah: umur bakteri, konsentrasi zat antimikroba, suhu, kandungan bahan antimikroba dan sebagainya. Dimana kecepatan populasi mikroba mengalami kematian erat hubungannya dengan mikroba. Pada umumnya mikroba yang lebih muda daya tahannya lebih rendah dibandingkan dengan bakteri yang lebih tua (fase stasioner). Kemampuan suatu bahan dalam menghambat atau membentuk mikroba tergantung pada tinggi rendahnya konsentrasi dan bahan antimikroba. Pada umumnya, kecepatan kematian mikroba berhubungan secara langsung dengan konsentrasi antimikroba. Ini berarti semakin tinggi konsentrasi antimikroba yang digunakan, semakin cepat mikroba terbunuh (Ristiati, 2000).

Menurut Robinson T, Tanin mempunyai aktivitas antimikroba terhadap *S. Thyphi*. Tanin dalam konsentrasi rendah mampu menghambat pertumbuhan bakteri, sedangkan pada konsentrasi tinggi tanin bekerja sebagai antibakteri dengan mengkoagulasikan protoplasma bakteri karena terbentuk ikatan yang stabil dengan protein bakteri. Secara garis besar mekanisme yang diperkirakan adalah sebagai berikut: toksitas tanin dapat merusak membrane sel bakteri, senyawa tannin dapat menginduksi pembentukan kompleks senyawa ikatan terhadap enzim atau substrat mikroba dan pembentukan suatu kompleks ikatan tanin terhadap ion logam yang dapat menambah daya toksisitas tannin itu sendiri. Efek antibakteri tanin antara lain: reaksi dengan membran sel, inaktivitas enzim dan destruksi atau inaktivisasi fungsi materi genetik.

Selain itu senyawa lain yang bekerja adalah senyawa flavonoid merupakan senyawa fenol yang mempunyai kecenderungan untuk mengikat protein bakteri sehingga menghambat aktivitas enzim yang pada akhirnya mengganggu proses metabolisme bakteri. Flavonoid merupakan senyawa fenol sementara senyawa alkaloid yang memiliki kemampuan sebagai antibakteri. Mekanisme kerjanya adalah dengan cara mengganggu komponen penyusun peptidoglikan pada sel bakteri, sehingga lapisan dinding sel tidak terbentuk secara utuh dan menyebabkan kematian sel tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa ekstrak daun rumput mutiara dapat menghambat pertumbuhan bakteri *S. Thypi* pada beberapa konsentrasi dan kontrol, dimana pemberian konsentrasi ekstrak yang

paling efektif adalah 10% yang memiliki luas zona hambat terbesar disbanding dengan konsentrasi lainnya dan aktifitas hambatannya tergolong kuat.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti kemukakan adalah:

1. Perlu dilakukan sebuah penelitian lanjutan mengenai uji toksitas daun ekstrak rumput mutiara pada hewan uji guna mengetahui efektifitas daun rumput mutiara sebagai antimikroba yang tepat.
2. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya menggunakan konsentrasi ekstrak yang lebih tinggi untuk mengetahui konsentrasi yang optimum dan diujikan pada mikroba uji lainnya.
3. Perlu diinformasikan kepada masyarakat untuk membudidayakan tanaman rumput mutiara (*Hedyotis corymbosa*).

KEPUSTAKAAN

Achmad Arifin Sjamsul dan Eus Holiston Hakim. *Ilmu Kimia dan Kegunaan Tumbuh-tumbuhan Obat Indonesia Jilid 5*. Bandung: Penerbit ITB, 2009.

Budikafa Jefryanto Muhammad. *Profil Fitokimia dan Aktivitas Antibakteri Tanaman Obat di Sulawesi Tenggara terhadap Bakteri Salmonella Thypi*. Skripsi Program Studi Farmasi Universitas Halu Oleo Kendari, 2014.

Dalimartha S. *Atlas Tumbuhan Obat Indonesia Jilid 5*. Jakarta: Pustaka Bunda, 2008.

Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: CV Kathoda, 2005.

- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. *Materia Medika Indonesia Jilid VI (pp. 119-120)*. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Dewi, F.K. *Aktivitas Bakteri Ekstrak Etanol Buah Mengkudu (Morinda Citrifolia, Linnaeus) Terhadap Bakteri Pembusuk Daging Segar*. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 2010.
- Djide, M. Natsir dan Sartini. *Dasar-Dasar Mikrobiologi Farmasi*. Makassar: Lembaga Penerbit Unhas. 2008.
- Entjang, Indan. *Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Dwidjosaputro, D. *Pengantar Fisiologi Tumbuhan*. Jakarta: PT Gramedia. 1986.
- Garitty, G.M., Bell, J. A., and Lilbum, T.G. *Taxonomic Outline of The Prokaryotes Bergey's Sistematic Bacteriologi*. 2th Edition. Springer New York Berlin Hendeberg: United States of America. 2004.
- Gassem MH, *Typoid Fever, Clinical Epidemiological Studies in Indonesia*. Thesis Semarang: Diponegoro University Semarang. 2001.
- Hariana A, *Tumbuhan Obat dan Khasiatnya Seri 3*. Penebar Swadaya. Jakarta. 2006.
- Hawley LB, *Intisari Mikrobiologi dan Penyakit Infeksi*. Terjemahan Pendit BU. Jakarta: Hipokrates, 2003.
- Johnson, A.G. *Microbiology and Immunology 2nd edition*. Harvard Publishing Company, Malvern, Pennsylvania. 63-66. 1993.
- Kresno SB. *Imunologi: Diagnosis dan Prosedur Laboratorium Edisi IV*. Jakarta: Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2001.
- Kusuma FR, Zaky BM. *Tumbuhan Liar Berkhasiat Obat*. Jakarta: AgromediaPustaka. 2005.
- Mukmilah Lela, *Uji Aktivitas Antibakteri dari Ekstrak Rumput Mutiara (Hedyotis corymbosa (L.) Lamk)*. Program Studi Kimia Universitas Muhammadiyah Sukabumi. 2012.
- Nurhayati, M. Latief, dan Handoko. *Uji Antimikroba Rumput Mutiara (Oldenlandia corymbosa) Terhadap Beberapa Mikroba Penyebab Utama Pada Penyakit Ternak Unggas (Antimicrobial Test of Pearl Grass (Oldenlandia corymbosa))*

- on Several Microbes Cause Main Diseases in Poultry*). Laporan Penelitian Fundamental. 2006.
- Permadi A. *Tanaman Obat Pelancar Air Seni*. Jakarta: Penerbar Swadaya. 2006.
- Pendlton, J. Ursolic Acid. Excitement Management. http://Herbal-propertyessuite101.com/article.cfm/ursolic_acid. diakses tanggal 31 Desember 2010. 2009.
- Pratiwi Dian. *Pengaruh Ekstrak daun Kelor (Moringa oleifera) terhadap pertumbuhan Salmonella Thypi*. Program Studi Pendidikan Biologi. Jurusan Pendidikan Biologi. Universitas Jember, 2014.
- Pratiwi ST. *Mikrobiologi Farmasi*. Penerbit Erlangga, Jakarta. 2008.
- Rahman.Afzalur.*Al-Qur'an Sumber Ilmu Pengetahuan*. Terjemahan Arifin., H., M., Drs., M.Ed. Jakarta: Penerbit Bina Aksara. 1989.
- Robinson, T. *Kandungan Organik Tumbuhan Tinggi*. Edisi ke-6 (Terjemahan: K. Padmawinata. Bandung: ITB-Press. 1955.
- Ruwaida GD. *Uji Toksisitas Senyawa Hasil Isolasi Rumput Mutiara (Hedyotis corymbosa)L.) Lamk) dengan Metode Brine Shrimp Lethality Test (BST)*, Jurusan Biologi, FMIPA, Universitas Sebelas Maret, Surakarta; 2010.
- Saptriani Opstaria, *Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanolik daun Patikan Kebo (Euphorbia hirta Linn) dan Herba Rumput Mutiara (Oldenlandia corymbosa) terhadap bakteri pneumonia*. Fakultas Farmasi. Universitas Setia Budi, 2011.
- Shihab, Quraish, M. *Tafsir Al-Misbah volume 5*. Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Sya'roni A. *Perkembangan Penatalaksanaan Demam Tifoid*. Smart Doctor. 2002. http://b.domaindx.com/smartdoctor/software/utama/news_item.asp?NewsID=28 [akses 15 Mei 2004].
- Sabhuti Dharmananda. *Oldenlandia and Scutellaria antitoxin and anticancer Herbs*. Available from URL: Hyperlink [http : // www. itmolin. org /arts/ oldenlandia. htm](http://www.itmoln.org/arts/oldenlandia.htm). September 2004. Disitasi pada tanggal 7 Juli 2005.
- Sudarsono.Asperulosid, Senyawa Iridoid *Hedyotis corymbosa (L.)Lamk.(Oldelandia corymbosa Linn)*, Suku *Rubiaceae*. Available from URL : HYPERLINK Members.tripod.com/~ugm2/mFi103.htm. 2005. Disitasi pada tanggal 7 Juli 2005.

Suryo, Dirwan. *Petunjuk Kesehatan dalam Al-Qur'an dan As-sunnah*. Yogyakarta. 2010).

Wattimena, G. A. *Zat Pengatur Tumbuh Tanaman*. Pusat Antar Universitas Institut Pertanian. Bogor. 1988.

Wibowo, Marlia Singgih, dkk. *Uji Aktivitas Infusum Bunga Rosella (Hibiscus sabdariffa. L)*. STIKES BTH Tasikmalaya, 2008.

Wijayakusuma H, Wirian A.S, Yaputra T, Dalimartha S, Wibowo B. *Tanaman Berkhasiat Obat di Indonesia Jilid I*, Jakarta: Pustaka Kartini. 1992.

LAMPIRAN-LAMPIRAN




Gambar Ekstrak metanol daun rumput mutiara (*Hedyotis corymbosa*) dengan menggunakan metode maserasi

1. Rotavapor



2. Ekstrak daun rumput mutiara (*Hedyotis corymbosa*) setelah di rotav



3. Ekstrak kental daun rumput mutiara (*Hedyotis corymbosa*) setelah dirotav kemudian diangin-anginkan



4. Biakan bakteri uji




5. Konsentrasi ekstrak rumput mutiara (*Hedyotis corymbosa*)




6. Alat dan bahan pengujian daya hambat bakteri




7. Uji daya hambat menggunakan metode difusi agar




8. Zona bening konsentrasi 2, 5%




9. Zona bening konsentrasi 5%



10. Konsentrasi 10%




11. Daya hambat konsentrasi 2,5%, 5%, 10%




LAMPIRAN - LAMPIRAN**Lampiran 1. Skema Kerja**


1. Ekstraksi Sampel



2. Penyiapan Bakteri Uji



3. Pengujian Daya Hambat Antibakteri



Lampiran 2. Perhitungan

Tabel 1. Uji Analisis Sidik ragam uji F0 dan uji Beda Nyata Terkecil (BNT) *S. Thypi*

Perlakuan	Ulangan		Jumlah	Rata-Rata
	I	II		
A0 (Kontrol (-))	0	0	0	0
A1 (Kontrol (+))	26	30	56	28
A2 (2,5%)	5	8	13	6,5
A3 (5%)	8	13	21	10,5
A4 (10%)	10	18	28	14
Jumlah	49	69	118	59

$$\begin{aligned} \text{Faktor Koreksi (FK)} &= 118^2/2 \times 5 \\ &= 1392,4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Jumlah Kuadrat Total (JKT)} &= \sum y^2 - \text{FK} \\ &= (26)^2 + (30)^2 + (5)^2 + (8)^2 + (8)^2 + (13)^2 + \\ &\quad (10)^2 + (18)^2 - \text{FK} \\ &= 929,6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP)} &= \sum (\sum y_j^2) / R - \text{FK} \\ &= (56)^2 + (13)^2 + (21)^2 + (28)^2 / 2 - \text{FK} \\ &= 872,6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Jumlah Kuadrat Galat (JKG)} &= \text{JKT} - \text{JKP} \\ &= 929,6 - 872,6 \end{aligned}$$

$$= 57$$

$$\begin{aligned} \text{Derajat Bebas Total (dbt)} &= (axr) - 1 \\ &= (5 \times 2) - 1 = 9 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Derajat Bebas Perlakuan (dbp)} &= - 1 \\ &= 5 - 1 = 4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Derajat Bebas Galat (dbg)} &= - \\ &= 9 - 4 = 5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Kuadrat Tengah Perlakuan (KTP)} &= \text{-----} \\ &= 872,6 / 4 \\ &= 218,15 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Kuadrat Tengah Galat (KTG)} &= \text{-----} \\ &= 57 / 5 \\ &= 11,4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{F HitungPerlakuan} &= \text{-----} \\ &= 218,15 / 0,1388 \\ &= 19,13596 \end{aligned}$$

Tabel 2. Analisis varians (uji F) daerah hambat ekstrak daun rumput mutiara (*Hedyotis corymbosa*) terhadap bakteri *Salmonella thypi*

SK	DB	JK	KT	F Hitung	F Tabel	
					5%	1%
Perlakuan	4	872,6	218,15	19,13596*	5.19	11.39
Galat	5	57	11,4			
Total	9	929,6				

Ket. *Berbeda Nyata

$$KK = \frac{\text{---}}{\text{---}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{---}}{\text{---}} \times 100\% = 30,146\%$$

Lampiran 3. Gambar




Kosentrasi 2,5% Kontrol (+) Kontrol (-)

Zona bening pada konsentrasi 2,5%, kontrol positif dan kontrol negatif




Konsentrasi 5% Kontrol (+) Kontrol (-)

Zona bening pada konsentrasi 5%, kontrol positif dan kontrol negatif



Zona bening pada konsentrasi 10%, kontrol positif dan kontrol negatif



Zona bening pada konsentrasi 2, 5%, 5%, 10%



Maserasi daun Rumput mutiara (*Hedyotis corymbosa*)



(a)


(b)

(c)

Ekstraksi sampel (a) Penyaringan (b) Penguapan menggunakan *Rotary evaporator* (c) ekstrak kental



Biakan bakteri uji



Pembuatan konsentrasi (a) menimbang ekstrak (b) melarutkan dengan DMSO (c) menghomogenkan (d) konsentrasi 2,5%, 5%, 10%



(a)

(b)

Uji daya hambat (a) Perendaman kertas cakram pada masing-masing konsentrasi
(b) Penanaman kertas cakram pada bakteri yang diremajakan dengan Natrium
Agar (NA)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap **Atirah Mulia**, biasa dipanggil “Atirah” merupakan anak dari pasangan Akbar (Almarhum) dengan Hasriati yang lahir pada tanggal 31 Mei 1994 tepatnya di Sinjai Sulawesi Selatan. Penulis ini mulai mengenyam bangku pendidikan di TK Aisyiah Sinjai pada tahun 1999-2001. Kemudian melanjutkan pendidikan di SDN. 3 Unggulan Sinjai Utara pada tahun 2001-2006. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN. 1 Unggulan Sinjai Utara pada tahun 2006-2009. Kemudian melanjutkan sekolah di SMAN. 1 Sinjai Utara pada tahun 2009-2012. Pada tahun 2012 penulis melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tepatnya di Fakultas Sains dan Teknologi.