

**ANALISIS KADAR LOGAM BERAT TIMBAL (Pb) DALAM AIR  
SUNGAI KELAY KABUPATEN BERAU KALIMANTAN TIMUR  
DENGAN METODE SPEKTROFOTOMETRI SERAPAN ATOM (SSA)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi  
Fakultas Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

**OLEH :**

**RATI NUR AINNA**  
**NIM. 70100108067**

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
2013**

**ANALISIS KADAR LOGAM BERAT TIMBAL (Pb) DALAM AIR  
SUNGAI KELAY KABUPATEN BERAU KALIMANTAN TIMUR  
DENGAN METODE SPEKTROFOTOMETRI SERAPAN ATOM (SSA)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi  
Fakultas Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

**OLEH :**

**RATI NUR AINNA**  
**NIM. 70100108067**

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
2013**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Mahasiswa yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Rati Nur Ainna  
Nim : 70100108067  
Tempat/Tgl Lahir : Pinrang, 6 November 1991  
Jur/Prodi/Konsentrasi : Farmasi  
Fakultas/Program : Ilmu Kesehatan/S1  
Alamat : Desa Galesong Kota, Takalar  
Judul : Analisis Kadar Logam Berat Timbal (Pb) Pada Air  
Sungai Kelay Kab. Berau Kalimantan Timur  
Dengan Metode Spektrofotometri Serapan Atom  
(SSA).

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran, bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, November 2013

Penulis,

**RATI NUR AINNA**

NIM. 70100108067

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat kepada Allah swt. atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penelitian dan penulisan skripsi ini dapat terlaksana.

Skripsi yang disusun dengan judul “Analisis Kadar Logam Berat Timbal (Pb) dalam Air Sungai Kelay Kabupaten Berau dengan Metode Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)” ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Farmasi Program Studi Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Berkat kesabaran dan kemauan yang keras dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung atau tidak langsung, baik moril maupun material. Akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Ungkapan terima kasih dan bakti sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua, Muh. Saleh Kassa dan Asisah Pida, serta segenap keluarga yang memberikan dukungan baik moral maupun materil kepada penulis.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak/ibu:

1. Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT, MS selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Prof. Dr. H. Ahmad M. Sewang., M.A. selaku pejabat sementara Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Fatmawaty Mallapiang,SKM.,M.Kes selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

4. Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, M.Si., Apt selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar sekaligus sebagai pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan dan arahan.
5. Drs. Wahyuddin. G, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
6. Nursalam Hamzah, S.Si., M.Si., Apt selaku Ketua Prodi Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan bimbingan dan arahan.
7. Surya Ningsih, S.Si., M.Si., Apt selaku Sekretaris Jurusan Farmasi sekaligus sebagai koordinator seminar yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan.
8. Drs. H.M. Saleh Ridwan., M.Ag sebagai penguji keislaman yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan.
9. Haeria, S.Si., M.Si. selaku pembimbing pertama yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan.
10. Mukhriani S.Si., Apt sebagai penguji akademik yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan.
11. Isriany Ismail, S.Si., M.Si., Apt sebagai penasehat akademik yang telah banyak memberikan arahan.
12. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen serta staf dalam lingkungan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar atas jerih payah selama mendidik selama di bangku kuliah.

13. Rekan-rekan mahasiswa jurusan farmasi angkatan 2005, 2006, 2007, dan 2008 terkhusus kepada rekan-rekan angkatan 2008 dan para Laboran dan yang telah memberikan bantuan selama penelitian baik secara fisik maupun dalam bentuk motivasi.
14. Adik-adik mahasiswa jurusan farmasi angkatan 2009, 2010, 2011, dan 2012 yang selalu memberikan motivasi selama penyusunan skripsi ini.

Saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan bernilai ibadah di sisi Allah swt.

Makassar, November 2013

PENULIS

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	5
A. Air .....	5
B. Sungai Kelay .....	9
C. Logam Berat.....	10
D. Mekanisme keracunan Logam Berat .....	11
E. Timbal .....	13
F. Spektrofotometri Serapan Atom.....	22
G. Pencemaran dan Tinjauan Islam .....	29
BAB III METODE PENELITIAN .....	33
A. Alat dan Bahan .....	33
B. Prosedur Kerja .....	33

BAB	IV	HASIL DAN PEMBAHASAN .....	36
		A. Hasil Pengamatan .....	36
		B. Pembahasan .....	38
BAB	V	PENUTUP .....	44
		A. Kesimpulan.....	44
		B. Saran .....	44
		DAFTAR PUSTAKA .....	45
		LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	48
		BIOGRAFI.....	58



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Hal</b>
1. Konsentrasi Pb di dalam darah .....	16
2. Hasil pengukuran standar timbal .....	39
3. Hasil pengukuran kadar timbal dalam sampel.....	41
4. Penentuan garis regresi linear larutan standar timbal .....	53

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Hal</b>
1 Skema metabolisme timbal dalam tubuh manusia.....	17
2 Komponen-komponen SSA .....	25
3 Kurva baku timbal.....	40
4 Skema pembuatan kurva kalibrasi larutan standar timbal .....	51
5 Skema pengukuran kadar timbal dari sampel .....	52
6 Sampel air sungai kelay .....	57
7 Sampel yang telah dipreparasi .....	57
8 Spektrofotometer serapan atom .....	57
9 Aktivitas pertambangan di tepi sungai Kelay .....	58
10 Peta geologi kabupaten Berau.....	58

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran</b>	<b>Hal</b>
1 Skema kerja .....	43
2 Perhitungan-perhitungan.....	45
3 Daftar persyaratan kadar bahan kimia anorganik air minum.....	45
4 Daftar persyaratan kadar bahan kimia anorganik air bersih .....	45
5 Dokumentasi penelitian .....	45

## ABSTRAK

Nama Penyusun : Rati Nur Ainna  
NIM : 70100108067  
Judul Skripsi : “Analisis Kadar Logam Berat Timbal (Pb) pada Air Sungai Kelay Kabupaten Berau dengan Metode Spektrofotometri Serapan Atom”

---

Sungai Kelay merupakan sumber air utama bagi masyarakat kabupaten Berau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya logam Pb dalam air sungai Kelay dan menentukan kadar Pb pada air sungai Kelay Kabupaten Berau dengan metode Spektrofotometer Serapan Atom pada panjang gelombang 283 nm.

Pengambilan sampel menggunakan teknik judgment pada tempat yang dinilai representatif. Sampel air diambil dari lima titik di sepanjang sungai Kelay. Sampel A pada area konfeyor, sampel B dengan jarak 100 m, sampel C dengan jarak 500 m, sampel D dengan jarak 1 km dan sampel E dengan jarak 1,5 km dari konfeyor.

Hasil penelitian menunjukkan kadar timbal pada sampel A, B dan sampel C adalah < 0,01 mg/l, sampel D sebesar 0,0773 mg/l, serta sampel E sebesar 0,0634 mg/l. Dari hasil tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kadar sampel A, B, dan C masih dapat diterima, tetapi sampel D dan E tidak sesuai dengan Permenkes No. 482 tahun 2010 tentang kualitas air minum sebesar < 0,01 mg/l.

**Kata kunci:** logam berat, timbal, metode spektrofotometri serapan atom.

## ABSTRACT

Nama Penyusun : Rati Nur Ainna  
NIM : 70100108067  
Judul Skripsi : “Analysis Titrates Lead Heavy Metal (Pb) on Kelay's River Water Berau Regency by Atomic Absorbtion spectrophotometry”

---

Kelay river is main main source for kabupaten Berau society . The purpose of this study was to determine there was contain Pb in Kelay’s river or not and also determine Pb concentration in kelay river’s water Berau regency using Atomic Absorption Spectrophotometer at the wavelength, specific = 283,3 nm.

Sampling was done by judgment tech in a place that representative. Sample was taken from five dots along Kelay’s River. Sample A taken in confeyor’s area, sample B is 100 meters from the Confeyor, sample C is 500 meters from the Confeyor, sample D is 1 kilometers from the Confeyor, and sample is 100 meters from the Confeyor.

The result of analysis showed the Lead concentration at the Sample A, B, and C is less than 0,01 mg/l. Sample D is 0,0773 mg/l, and sample E is 0,0634 mg/l. From that result we can take conclusion that sample A, B, and C still can be accepted. But sample D and E is out of character minister for public health regulation No. 492 about drinking water quality (0,01 mg/l).

**Key word:** heavy metal, lead, atomic absorbtion Spectrofotometer.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang***

Air sungai saat ini banyak dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan irigasi pertanian, bahan baku air minum, pembangkit tenaga air, perikanan, serta berbagai pemanfaatan lainnya. Beberapa sungai juga dimanfaatkan sebagai sarana transportasi, sarana wisata dan juga sebagai sarana olahraga air (Yulistiyanto, 2013:3).

Air dapat tercemar karena proses alamiah ataupun disebabkan oleh kegiatan manusia. Sebagai sumber pencemar yang berupa logam berat diantaranya berasal dari pertambangan, peleburan logam dan jenis industri yang menggunakan logam, dan dapat juga berasal dari lahan pertanian yang menggunakan pupuk atau pestisida yang mengandung logam. Logam berat yang terkandung dalam sungai sangat berbahaya bagi makhluk hidup, karena apabila air sungai tersebut digunakan sebagai air minum, maka akan mempengaruhi fungsi organ tubuh. Oleh sebab itu sungai sebagai salah satu sumber air mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat, perlu dijaga kelestarian dan kelangsungan fungsinya (Indarwati, 2007: 2).

Wilayah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur termasuk kedalam Sub Cekungan Berau (bagian Cekungan Tarakan) yang telah mengalami minimal 4 kali proses tektonik sehingga terbentuk endapan batubara, terangkat, terlipat, terpatahkan dan sebagian tersingkap dipermukaan. Penambangan batubara telah berlangsung sejak tahun 1918 yang ditambang di sekitar Teluk Bayur dan Gunung Tabur dengan cara bawah tanah, tepatnya sekitar Teluk Bayur, Sambarata (Ishlah, 2004:2).

Pertambangan Batubara di sekitar sungai Kelay mempunyai andil terjadinya pencemaran di kawasan perairan Kabupaten Berau. Di sepanjang aliran sungai Kelay terdapat pertambangan batubara yang berpotensi menghasilkan buangan limbah jenis logam berat. Ditambah dengan kapal-kapal tongkang pengangkut batubara yang melintas di sepanjang sungai dapat menambah tingginya tingkat pencemaran sehingga mempengaruhi kualitas perairan. Sungai Kelay adalah sumber air bersih dan hulunya adalah daerah tangkapan hujan untuk kota Berau. Sungai Kelay yang merupakan satu-satunya sarana transportasi untuk menjangkau desa-desa terpencil di Kabupaten Berau ini juga merupakan sumber bahan baku PDAM untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat kota Berau (Ishlah, 2004: 4).

Beberapa bahan pencemar yang terdapat pada lingkungan adalah karbon monoksida (CO), nitrogen oksida (NO), sulfur dioksida (SO<sub>2</sub>), dan partikel. Partikel yang banyak terdapat di lingkungan di antaranya adalah debu, dan timbal. Timbal adalah salah satu bahan pencemar utama saat ini di lingkungan. Hal ini bisa terjadi karena sumber utama pencemaran timbal adalah dari emisi gas buang kendaraan bermotor. Selain itu timbal juga terdapat dalam limbah cair industri yang pada proses produksinya menggunakan timbal Timbal atau timah hitam atau Plumbum (Pb) sangat populer dan dikenal oleh orang awam, hal ini disebabkan oleh banyaknya Pb yang digunakan di pabrik dan paling banyak menimbulkan keracunan pada makhluk hidup. (Naria, 2005:66). Inilah yang menjadi dasar pemilihan timbal untuk dianalisis kadarnya.

Timbal (Pb) juga mempunyai arti penting dalam dunia kesehatan bukan karena penggunaan terapinya, melainkan lebih disebabkan karena sifat toksisitasnya. Absorpsi timbal di dalam tubuh sangat lambat, sehingga terjadi akumulasi dan menjadi dasar keracunan yang progresif. Keracunan timbal ini

menyebabkan kadar timbal yang tinggi dalam aorta, hati, ginjal, pankreas, paru-paru, tulang, limpa, testis, jantung dan otak (Supriyanto, 2007:148). Akibatnya, keracunan kronik pada otak dan pembuluh darah/syaraf tubuh, terjadinya penurunan perkembangan intelegensia dan rentan terhadap ketidakseimbangan sistem syaraf pusat, infeksi pada sistem pernafasan dan juga melemahnya kerja zat-zat pembangun tulang pada tubuh terutama pada anak-anak (Prasetyorini & Wardatun, 2011: 1).

Penggunaan metode Spektrofotometri Serapan Atom pada penentuan logam timbal didasarkan pada beberapa alasan, yaitu teknik SSA adalah alat yang canggih dalam analisis. Ini disebabkan diantaranya oleh kecepatan analisisnya, ketelitiannya sampai tingkat runut, tidak memerlukan pemisahan pendahuluan. Kemungkinannya untuk menentukan konsentrasi semua unsur pada konsentrasi runut. Sebelum pengukuran, tidak perlu memisahkan unsur yang ditentukan karena kemungkinan penentuan satu unsur dengan kehadiran unsur lain dapat dilakukan asalkan katoda berongga yang diperlukan tersedia (Khopkar, 2008: 296).

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan analisis kadar logam berat timbal dalam air sungai Kelay yang merupakan sumber air utama bagi penduduk sekitar.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah air sungai Kelay Kabupaten Berau yang digunakan masyarakat mengandung logam timbal (Pb)?
2. Berapakah kadar logam berat timbal (Pb) yang terkandung dalam air sungai Kelay Kabupaten Berau?



**C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui ada tidaknya logam timbal (Pb) dalam air sungai Kelay Kabupaten Berau.
2. Menentukan kadar logam timbal (Pb) dalam air sungai Kelay Kabupaten Berau dengan metode Spektrofotometer Serapan Atom.

**D. Manfaat Penelitian**

1. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kadar logam berat timbal (Pb) dalam air sungai Kelay yang digunakan masyarakat Kabupaten Berau.
2. Memberikan Informasi kepada masyarakat apakah air sungai Kelay yang digunakan masyarakat mengandung logam berat timbal (Pb).

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Air**

Air merupakan suatu sarana utama untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, karena air merupakan salah satu media dari berbagai macam penularan penyakit, terutama penyakit perut. Supaya air masuk kedalam tubuh manusia baik berupa minuman ataupun makanan tidak menyebabkan/membawa bibit penyakit, maka pengolahan air baik berasal dari sumber, jaringan transmisi atau distribusi sangat perlu dilakukan (Sutrisno, 2006: 3).

#### **1. Pencemaran air**

Pencemaran air adalah penyimpangan sifat-sifat air dari keadaan normal, bukan dari kemurniannya. Air yang tersebar di alam tidak pernah terdapat dalam bentuk murni, tetapi bukan berarti semua air sudah terpolusi. Air permukaan dan air sumur biasanya mengandung bahan-bahan metal terlarut seperti Na, Mg, Ca dan Fe. Air yang mengandung komponen-komponen tersebut dalam jumlah tinggi disebut *air sadah* (Fardiaz, 1992: 19).

Dalam PP No. 82 tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran Air, pencemaran air didefinisikan sebagai : “pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya” (Anonim, 2002:5). Definisi pencemaran air tersebut dapat diuraikan sesuai makna pokoknya menjadi 3 (tiga) aspek, yaitu aspek kejadian, aspek penyebab atau pelaku dan aspek akibat. Aspek pelaku/penyebab dapat disebabkan oleh alam, atau oleh manusia. Pencemaran yang disebabkan oleh alam tidak dapat berimplikasi hukum,

tetapi pemerintah tetap harus menanggulangi pencemaran tersebut. Sedangkan aspek akibat dapat dilihat berdasarkan penurunan kualitas air sampai ke tingkat tertentu. Pengertian tingkat tertentu dalam definisi tersebut adalah tingkat kualitas air yang menjadi batas antara *tingkat tak-cemar* (tingkat kualitas air belum sampai batas) dan *tingkat cemar* (kualitas air yang telah sampai ke batas atau melewati batas) (Warlina, 2004: 5).

## 2. Standar Kualitas Air

Standar kualitas air minum dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, antara lain : (Sutrisno, 2006: 26)

### a. Standar kualitas fisik air minum

Dalam standar persyaratan fisik air minum tampak adanya lima unsur persyaratan, meliputi : suhu, warna, bau, rasa dan kekeruhan.

#### 1) Suhu

Temperatur dari air akan mempengaruhi penerimaan (*acceptance*) masyarakat akan air tersebut dan dapat pula mempengaruhi reaksi kimia dalam pengolahan, terutama apabila temperatur tersebut sangat tinggi. Temperatur yang diinginkan adalah 50° F - 60° F atau 10° C – 15° C, tetapi iklim setempat, kedalaman pipa-pipa saluran air, dan jenis dari sumber-sumber air akan mempengaruhi temperatur ini. Disamping itu, temperatur pada air mempengaruhi secara langsung toksisitas banyak bahan kimia pencemar, pertumbuhan mikroorganisme dan virus (Sutrisno, 2006: 27).

#### 2) Warna

Intensitas warna dalam air diukur dengan satuan unit warna standar, yang dihasilkan oleh 1 mg/1 platina (sebagai  $K_2PtCl_6$ ). Standar yang ditetapkan oleh *Public Health Service* (Pelayanan Kesehatan Masyarakat) Amerika Serikat untuk intensitas warna dalam air minum adalah 20 unit

dengan skala Pt-Co. Standar ini lebih rendah dari pada standar yang ditetapkan oleh standar Internasional dari WHO maupun standar nasional Indonesia yang besarnya 5-50 unit (Sutrisno, 2006: 29).

### 3) Bau dan Rasa

Bau dan rasa biasanya terjadi bersama-sama dan biasanya disebabkan oleh adanya bahan-bahan organik yang membusuk, tipe-tipe tertentu organisme mikroskopik, serta persenyawaan-persenyawaan kimia seperti fenol. Bahan-bahan yang menyebabkan bau dan rasa ini berasal dari berbagai sumber. Intensitas bau dan rasa dapat meningkat, bila terhadap air dilakukan klorinasi. Standar persyaratan kualitas air minum yang menyangkut bau dan rasa ini baik yang ditetapkan oleh WHO maupun *Public Health Service* (Pelayanan Kesehatan Masyarakat) Amerika Serikat yang menyatakan bahwa dalam air minum tidak boleh terdapat bau dan rasa yang tidak diinginkan (Sutrisno, 2006: 30).

### 4) Kekeruhan

Air dikatakan keruh apabila air tersebut mengandung begitu banyak partikel bahan yang tersuspensi sehingga memberikan warna/rupa yang berlumpur dan kotor. Kekeruhan tidak menjadi sifat dari air yang membahayakan, tetapi ia menjadi tidak disenangi karena rupanya. Standar yang ditetapkan oleh *Public Health Service* (Pelayanan Kesehatan Masyarakat) Amerika Serikat mengenai kekeruhan ini adalah batas maksimal 10 ppm dengan skala silikat, tetapi dalam praktek angka standar ini umumnya tidak memuaskan. Kebanyakan bangunan pengolahan air yang modern menghasilkan air dengan kekeruhan 1 ppm atau kurang (Sutrisno, 2006: 30).

b. Standar kualitas kimia air minum

Dari daftar standar kualitas air minum dapat dilihat adanya unsur-unsur yang tercantum dalam standar kualitas kimia dari pada air minum dalam peraturan Menteri Kesehatan RI No. 416 tahun 1990 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air. Beberapa diantara unsur tersebut tidak dikehendaki kehadirannya pada air minum, oleh karena merupakan zat kimia yang bersifat racun, dapat merusak perpipaan, ataupun karena sebagai penyebab bau/rasa yang mengganggu estetika. Bahan-bahan tersebut adalah: nitrit, sulfida, ammonia dan CO<sub>2</sub> agresif. Beberapa unsur meskipun dapat bersifat racun masih dapat ditolerir kehadirannya dalam air minum asalkan tidak melebihi konsentrasi yang ditetapkan. Unsur atau bahan-bahan tersebut adalah : fenolik, arsen, selenium, kromium, sianida, kadmium, timbal, dan air raksa (Sutrisno, 2004: 32).

### **3. Polutan Air**

Ciri-ciri air yang mengalami polusi sangat bervariasi tergantung dari jenis air dan polutannya atau komponen yang mengakibatkan polusi. Sebagai contoh air minum yang terpolusi mungkin rasanya akan berubah meskipun baunya mungkin sukar dideteksi, bau yang menyengat mungkin akan timbul pada pantai laut, sungai dan danau yang terpolusi, kehidupan hewan air akan berkurang pada air sungai yang terpolusi berat atau minyak yang terlihat terapung pada permukaan air laut menunjukkan adanya polusi. Tanda-tanda polusi air yang berbeda ini disebabkan oleh sumber dan jenis polutan yang berbeda-beda (Fardiaz, 1992:20).

Pengelompokkan komponen pencemar air yang berasal dari industri rumah tangga (pemukiman) dan pertanian:

- a. Limbah padat
- b. Bahan buangan organik dan olahan bahan makanan
- c. Bahan buangan anorganik
- d. Bahan buangan cairan berminyak
- e. Bahan buangan berupa panas (polusi termal)
- f. Bahan buangan zat kimia, yaitu sabun, insektisida dan zat pewarna (Rahmawati, 2011: 21).

## **B. Sungai Kelay**

Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta di sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan. Sungai sebagai sumber air merupakan sumber daya alam yang mempunyai fungsi serbaguna bagi kehidupan dan penghidupan manusia. Ada dua fungsi sungai secara alami yaitu mengalirkan air dan mengangkut sedimentasi hasil erosi pada Daerah Aliran Sungai dan alurnya. Kedua fungsi ini terjadi bersamaan dan saling mempengaruhi (Rahmawati, 2011: 15).

Jenis-jenis sungai berdasarkan debit airnya, diklasifikasikan menjadi:

1. Sungai permanen, adalah sungai yang debit airnya sepanjang tahun relatif tetap.
2. Sungai periodik, yaitu sungai yang pada waktu musim penghujan debit airnya besar, sedangkan pada musim kemarau debitnya kecil.
3. Sungai episodik, yaitu sungai yang pada musim kemarau kering dan pada waktu musim penghujan airnya banyak.
4. Sungai ephemeral, yaitu sungai yang hanya ada airnya saat musim hujan dan airnya belum tentu banyak. (Rahmawati, 2011:16)

Sungai Kelay terdapat di wilayah Kabupaten Berau, terletak pada koordinat  $1^{\circ} 12' 00'' - 2^{\circ} 36' 0''$  LU dan  $116^{\circ} 00' 00'' - 118^{\circ} 57' 00''$  BT. Pencapaiannya dapat ditempuh dengan penerbangan Makassar-Balikpapan-Tanjung Redeb atau Makassar-Tarakan-Tanjung Redeb. Secara tektonik, Kabupaten Berau termasuk ke dalam Subcekung Berau (bagian Cekungan Tarakan). Subcekung Berau diperkirakan minimal telah mengalami 4 tektonik. Tektonik ini menyebabkan terjadinya pelipatan dan pensesaran yang mengakibatkan beberapa lapisan batubara tersingkap di sungai dan terangkat di atas permukaan laut sehingga lapisan batubara di daerah Tanjung Redeb memiliki kadar air yang rendah (Islah, 2004: 2).

Batubara sangat dominan di wilayah Kabupaten Berau, terdapat pada formasi Lati bagian atas, ketebalannya antara 0,4 m-11,2 m yang berumur neogen. Batubara tersebut umumnya telah dimiliki oleh pemegang izin usaha pertambangan (Islah, 2004: 3).

### **C. Logam Berat**

Logam berat masih termasuk golongan logam dengan kriteria-kriteria yang sama dengan logam-logam lain. Perbedaannya terletak dari pengaruh yang dihasilkan bila logam berat ini berikatan dan atau masuk ke dalam tubuh organisme hidup.

Karakteristik dari kelompok logam berat adalah sebagai berikut:

- (a) Memiliki spesifikasi gravitasi yang sangat besar (lebih dari 4)
- (b) Mempunyai nomor atom 22-34 dan 40-50 serta unsur-unsur lantanida dan aktinida
- (c) Mempunyai respon biokimia khas (spesifik) pada organisme hidup (Palar, 2008: 24).

## 1. Penyebaran Logam di Alam

Unsur logam ditemukan secara luas di seluruh permukaan bumi. Mulai dari tanah dan batuan, badan air, bahkan pada lapisan atmosfer yang menyelimuti bumi. Umumnya logam-logam di alam ditemukan dalam bentuk persenyawaan dengan unsur lain, dan sangat jarang yang ditemukan dalam bentuk elemen tunggal. Pada batuan, logam-logam ditemukan sebagai bagian dari mineral, seperti sinabar (HgS), pirit (FeS) dan bentuk-bentuk lainnya. Dalam badan perairan, logam pada umumnya berada pada bentuk ion-ion, baik sebagai pasangan ion ataupun dalam bentuk ion-ion tunggal. Sedangkan pada lapisan atmosfer, logam ditemukan dalam bentuk partikular, dimana unsur-unsur logam tersebut ikut beterbangan dengan debu-debu yang ada di atmosfer (Palar, 2008: 25).

## 2. Logam-logam di Perairan

Logam-logam lingkungan perairan (*hydrosphere*) umumnya terdapat dalam bentuk ion. Ion-ion itu ada yang merupakan ion-ion bebas, pasangan ion organik, ion-ion kompleks dan bentuk-bentuk ion lainnya (Palar, 2008:32).

Kelarutan dari unsur-unsur logam dan logam berat dalam badan perairan dikontrol oleh:

- (1) pH badan air,
- (2) Jenis dan konsentrasi logam khelat,
- (3) Keadaan komponen mineral teroksidasi dan sistem yang berlingkungan redoks (Palar, 2008:32).

### D. Mekanisme Keracunan Logam Berat

Mekanisme keracunan terbagi atas dua fase, yaitu fase kinetik dan fase dinamik. Fase kinetik meliputi proses-proses biologi biasa seperti penyerapan, penyebaran dalam tubuh, metabolisme dan proses pembuangan atau ekskresi.



Adapun fase dinamik meliputi semua reaksi-reaksi biokimia yang terjadi dalam tubuh, berupa katabolisme dan anabolisme yang melibatkan enzim-enzim (Palar, 2008: 50).

Pada fase kinetik, baik toksikan (bahan-bahan beracun) dan atau protoksikan (bahan-bahan yang mempunyai potensi untuk menjadi racun) akan mengalami proses sinergetik atau sebaliknya proses antagonis. Proses sinergetik merupakan proses atau peristiwa terjadinya penggandaan atau peningkatan daya racun yang sangat tinggi. Sedangkan proses antagonis merupakan proses atau peristiwa pengurangan dan bahkan mungkin penghapusan daya racun yang dibina oleh suatu zat atau senyawa. Peristiwa sinergetik dan antagonis ini di dalam tubuh dapat terjadi akibat dari adanya bahan-bahan lain yang terdapat di dalam tubuh, baik yang memang sudah ada sebagai sistem ataupun sebagai bahan lain yang masuk ke dalam tubuh (Palar, 2008: 52).


Fase dinamik merupakan proses lanjut dari fase kinetik. Pada fase dinamik ini bahan racun yang tidak bisa dinetralisir oleh tubuh akan bereaksi dengan senyawa-senyawa hasil dari biosintesa seperti protein, enzim, asam inti, lemak, dan lain-lain. Hasil dari reaksi yang terjadi antara bahan beracun dengan produk biosintesa ini bersifat merusak terhadap proses-proses biomolekul dalam tubuh (Palar, 2008: 53).

Bahan beracun atau toksikan bersifat inhibitor (menghalangi kerja) terhadap enzim. Apabila terjadi pertemuan atau reaksi antara bahan beracun dengan enzim, maka kerja enzim akan terhalang. Keadaan itu akan turut mempengaruhi proses metabolisme tubuh, sehingga terjadi ketimpangan-ketimpangan. Pada tingkat lanjutnya, keadaan ini dapat merusak seluruh sistem kerja enzim dalam tubuh (Palar, 2008: 53).


Mekanisme keracunan oleh logam dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori yaitu:

- (1) Memblokir atau menghalangi kerja gugus fungsi biomolekul yang esensial untuk proses-proses biologi, seperti protein dan enzim.
- (2) Menggantikan ion-ion esensial yang terdapat dalam molekul terkait.
- (3) Mengadakan modifikasi atau perubahan bentuk dari gugus-gugus aktif yang dimiliki oleh biomolekul.

Reaksi enzim yang terjadi secara sederhana dapat digambarkan dengan rantai reaksi berikut ini:



Dengan adanya ion logam, maka reaksi menjadi:



Mekanisme kerja reaksi dari logam terhadap protein, pada umumnya menyerang ikatan sulfida. Penyerangan terhadap ikatan sulfida yang selalu ada pada molekul protein itu akan menimbulkan kerusakan dari struktur protein terkait (Palar, 2008: 54).

#### **E. Timbal (Pb)**

Timbal mempunyai berat atom 207,21; berat jenis 11,34; bersifat lunak serta berwarna biru atau silver abu-abu dengan kilau logam, nomor atom 82 mempunyai titik leleh 327,4° C dan titik didih 1.620° C, biasanya ditemukan di dalam batu-batuan, tanah, tumbuhan dan hewan. Timbal 95% bersifat anorganik dan pada umumnya dalam bentuk garam anorganik yang umumnya kurang larut

dalam air. Selebihnya berbentuk timbal organik. Timbal organik ditemukan dalam bentuk senyawa *Tetra Ethyl Lead* (TEL) dan *Tetra Methyl Lead* (TML). Jenis senyawa ini hampir tidak larut dalam air, namun dapat dengan mudah larut dalam pelarut organik misalnya dalam lipid. Timbal tidak mengalami penguapan namun dapat ditemukan di udara sebagai partikel (Sudarwin, 2008: 45).

### **1. Sifat dan Kegunaan Pb (Timbal)**

Biji-biji logam timbal yang diperoleh dari penambangan hanya mengandung sekitar 3% sampai 10% timbal, hasil ini dipekatkan lagi sampai 40% sehingga didapatkan logam murni. Produksi penambangan logam dunia sampai tahun 1997 telah mencapai hasil 3.844.687 ton logam murni. Semua itu berasal dari penambangan logam timbal di AS, Uni Soviet, Australia, Kanada Peru, Meksiko, Korea, Cina dan Maroko (Palar, 2008: 75).

Timbal (Pb) memiliki titik lebur rendah, mudah dibentuk, memiliki sifat kimia yang aktif, sehingga bisa digunakan untuk melapisi logam agar tidak timbul perkaratan. Pb adalah logam lunak berwarna abu-abu kebiruan mengkilat serta mudah dimurnikan dari pertambangan. Timbal meleleh pada suhu 328° C; titik didih 1740° C; dan memiliki gravitasi 11,34 dengan berat atom 207,20 (Widowati. W, 2008: 109 ).

Timbal banyak dimanfaatkan oleh kehidupan manusia seperti sebagai bahan pembuat baterai, amunisi, produk logam (logam lembaran, solder, dan pipa), perlengkapan medis (penangkal radiasi dan alat bedah), cat, keramik, peralatan kegiatan ilmiah/praktek (papan sirkuit/CB untuk komputer) untuk campuran minyak bahan-bahan untuk meningkatkan nilai oktan (Fardiaz, 1992: 75).

### **2. Pencemaran timbal (Pb) di air**

*Public Healt Service* (Pelayanan Kesehatan Masyarakat) Amerika Serikat menetapkan bahwa sumber-sumber air alami untuk masyarakat tidak boleh

mengandung Pb lebih dari 0,05 mg/l (0.05 ppm), sedangkan WHO menetapkan batas Pb di dalam air sebesar 0,1 mg/l (Fardiaz, 1992: 62).

Jumlah Pb minimal di dalam darah yang dapat mengakibatkan timbulnya gejala keracunan biasanya berkisar antara 60-100  $\mu\text{g}/100\text{ml}$  darah untuk orang dewasa. Tabel dibawah menunjukkan bahwa konsentrasi Pb di dalam darah dapat dibedakan atas 4 kategori, yaitu:

Tabel 1. Konsentrasi timbal dalam darah

Kategori	Konsentrasi Pb ( $\mu\text{g}/100\text{ml}$ )	Keterangan
A (normal)	<40	Populasi normal tanpa pencemaran Pb pada konsentrasi abnormal
B (dapat diterima)	40-80	Absorpsi meningkat karena populasi Pb pada tingkat abnormal, tetapi masih belum berbahaya
C (berlebihan)	80-120	Absorpsi meningkat karena populasi Pb yang berlebihan, sering disertai gejala ringan, kadang-kadang gejala berat
D (berbahaya)	>120	Absorpsi pada tingkat berbahaya dengan gejala ringan dan berat, serta efek sampingan yang lama

(Fardiaz, 1992: 65)


### 3. Proses masuknya Pb (Timbal) dalam tubuh manusia

Jalur masuknya timbal ke dalam tubuh manusia melalui saluran pernapasan (respirasi), juga melalui saluran pencernaan (gastrointestinal), kemudian didistribusikan ke dalam darah, dan terikat pada sel darah. Sebagian Pb disimpan dalam jaringan lunak dan tulang, sebagian diekskresikan lewat kulit, ginjal dan usus besar.

Timbal bersirkulasi dalam darah setelah diabsorpsi dari usus, terutama berhubungan dengan sel darah merah (eritrosit). Pertama didistribusikan ke dalam

jaringan lunak dan berinkorporasi dalam tulang, gigi dan rambut untuk dideposit (*storage*). Timbal 90% dideposit dalam tulang dan sebagian kecil tersimpan dalam otak, pada tulang timbal dalam bentuk Pb fosfat ( $Pb_3(PO_4)$ ).

Secara skematis dapat dilihat di bawah ini :



Gambar 1. Skema metabolisme timbal (Pb) dalam tubuh manusia

(Palar, 1994: 21 )

Secara teori selama timbal terikat dalam tulang tidak akan menyebabkan gejala sakit pada penderita. Tetapi yang berbahaya adalah toksisitas Pb yang diakibatkan gangguan absorpsi Ca karena terjadi desorpsi Ca dari tulang yang menyebabkan penarikan deposit timbal dari tulang tersebut (Sudarwin, 2008:46).

#### 4. Keracunan Pb (Timbal)

Keracunan yang ditimbulkan oleh persenyawaan logam Pb dapat terjadi karena masuknya persenyawaan logam tersebut ke dalam tubuh. Proses masuknya Pb dalam tubuh dapat melalui beberapa jalur yaitu melalui makanan dan minuman, udara, perembesan atau penetrasi pada selaput atau lapisan kulit (Palar, 2008: 82).

Sebagian besar dari Pb yang terhirup pada saat bernafas akan masuk ke dalam pembuluh darah paru-paru. Tingkat penyerapan itu sangat dipengaruhi oleh

ukuran partikel dari senyawa Pb yang ada dan volume udara yang mampu terhirup, maka akan semakin besar pula konsentrasi Pb yang diserap oleh tubuh. Logam Pb yang masuk ke dalam paru-paru melalui pernafasan akan diserap dan berikatan dengan darah paru-paru untuk kondisi diedarkan ke seluruh jaringan dan organ tubuh (Palar, 2008: 83).

Keracunan akut yang ditandai dengan kadar lebih dari 0,72 ppm dalam darah jarang terjadi. Keracunan yang terjadi biasanya disebabkan oleh masuknya senyawa Pb yang larut dalam asam atau inhalasi uap Pb. Efek astringen menimbulkan rasa haus dan rasa logam. Gejala lain yang sering timbul ialah mual, muntah dengan muntahan menyerupai susu karena Pb klorida, dan sakit perut. Tinja warna hitam karena Pb sulfida, dapat disertai diare atau konstipasi. Pb yang diserap dengan cepat dapat menyebabkan sindrom syok yang juga disebabkan kehilangan cairan lewat saluran cerna (Ganiswarna, 1995: 845).

Daya racun Pb di dalam tubuh di antaranya disebabkan oleh penghambatan enzim oleh ion-ion  $Pb^{2+}$ . Enzim yang diduga dihambat adalah yang diperlukan dalam pembentukan hemoglobin. Penghambatan tersebut disebabkan terbentuknya ikatan yang kuat (ikatan kovalen) antara  $Pb^{2+}$  dengan grup sulfur yang terdapat di dalam asam-asam amino (misalnya cistein) dan enzim tersebut (Fardiaz, 1992: 64).

Penyerapan lewat kulit dapat terjadi disebabkan karena senyawa ini dapat larut dalam lemak dan minyak. Senyawa seperti tetraetil-Pb dapat menyebabkan keracunan akut pada susunan saraf pusat, meskipun proses keracunan tersebut terjadi dalam kecepatan penyerapan yang kecil (Palar, 2008: 83).

## 5. Efek Pb (Timbal) pada tubuh manusia

### a. Efek Pb dan sintesa hemoglobin

Sel-sel darah merah merupakan suatu bentuk kompleks khelat yang dibentuk oleh logam Fe(besi) dengan gugus haeme dan globin. Sintesa dari kompleks tersebut melibatkan 2 macam enzim, yaitu enzim ALAD (Amino Levulinic Acid Dehidrase) atau asam levulinat dehidrase dan enzim *ferrokhelatase*. Enzim ALAD adalah enzim jenis sitoplasma. Enzim ini akan bereaksi secara aktif pada tahap awal sintesa dan selama sirkulasi sel darah merah berjalan. Enzim *ferrokhelatase* ini akan berfungsi aktif pada akhir proses sintesa, yaitu mengkatalisasi pembentukan kompleks khelat haemoglobin. Senyawa Pb yang ada pada tubuh akan mengikat gugus aktif dan enzim ALAD. Ikatan yang terbentuk antara logam Pb dengan gugus ALAD tersebut akan mengakibatkan pembentukan intermediet porphobilinogen dan kelanjutan dan proses reaksi ini tidak dapat berlanjut (terputus) (Palar, 2008: 84).

### b. Efek Pb pada sistem syaraf

Sistem syaraf merupakan sistem yang paling sensitif terhadap daya racun yang dibawa oleh logam Pb. Pengamatan yang dilakukan pada pekerja tambang dan pengolahan logam Pb menunjukkan bahwa pengaruh dari keracunan Pb dapat menimbulkan kerusakan pada otak. Penyakit-penyakit yang berhubungan dengan otak, sebagai akibat dari keracunan Pb adalah epilepsi, halusinasi, kerusakan pada otak besar, dan *delirium*, yaitu sejenis penyakit gula (Sudarwin, 2008: 50).

### c. Efek Pb terhadap sistem urinaria

Senyawa-senyawa Pb yang terlarut dalam darah akan dibawa oleh darah ke seluruh sistem tubuh. Pada peredarannya, darah akan terus masuk ke

glomerulus yang merupakan bagian dari ginjal. Dalam glomerulus tersebut terjadi proses penyaringan akhir dari semua bahan yang dibawa darah, apakah masih berguna bagi tubuh atau harus dibuang karena sudah tidak diperlukan lagi. Ikut sertanya senyawa Pb yang terlarut dalam darah ke sistem urinaria (ginjal) dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan pada saluran ginjal. Kerusakan yang terjadi tersebut disebabkan terbentuknya *intranuclear inclusion bodies* yang disertai dengan membentuk *aminociduria*, yaitu terjadinya kelebihan asam amino urin. (Palar, 2008: 86). *Nephropathy* (kerusakan nefron pada ginjal) dapat dideteksi dari ketidakseimbangannya fungsi renal dan sering diikuti hipertensi (Sudarwin, 2008: 51).

d. Efek Pb terhadap sistem reproduksi

Percobaan yang diperlakukan terhadap tikus putih jantan dan betina yang diberi perlakuan dengan 1% Pb-asetat ke dalam makanannya, menunjukkan hasil berkurangnya kemampuan sistem reproduksi dari hewan tersebut. Embrio yang dihasilkan dari perkawinan yang terjadi antara tikus jantan yang diberi perlakuan Pb-asetat dengan betina normal (yang tidak diberi perlakuan), mengalami hambatan dalam pertumbuhannya. Sedangkan janin yang terdapat pada betina yang diberi perlakuan Pb-asetat mengalami penurunan dalam ukuran, hambatan pada pertumbuhan dalam rahim induk dan setelah dilahirkan (Palar, 2008: 87).

e. Efek Pb Terhadap Sistem Gastrointestinal

Gejala awal muncul pada konsentrasi timbal dalam darah sekitar 80  $\mu\text{g}/100\text{ ml}$ , gejala-gejala tersebut meliputi kurangnya nafsu makan, gangguan pencernaan, gangguan *epigastrik* setelah makan, sembelit dan diare. Jika kadar timbal dalam darah melebihi 100  $\mu\text{g}/100\text{ ml}$ , maka kecenderungan untuk munculnya gejala lebih parah lagi yaitu bagian perut kolik terus menerus dan



sembelit yang lebih parah. Jika gejala ini tidak segera ditangani, maka akan muncul kolik yang lebih spesifik. Konsentrasi timbal dalam darah di atas 150 µg/100 ml penderita menderita nyeri dan melakukan reaksi kaki ditarik-tarik ke arah perut secara terus-menerus dan menggeretakkan gigi, diikuti keluarnya keringat pada kening. Jika tidak dilakukan penanganan lebih lanjut maka kolik dapat terjadi selama beberapa hari, bahkan hingga satu minggu (Sudarwin, 2008: 52).

f. Efek Pb terhadap sistem endokrin

Pengukuran terhadap steroid dalam urin pada kondisi paparan Pb yang berbeda dapat digunakan untuk melihat hubungan penyerapan Pb oleh sistem endokrin. Dari pengamatan yang dilakukan dengan paparan Pb yang berbeda terjadi pengurangan pengeluaran steroid dan terus mengalami peningkatan dalam posisi minus. Kecepatan pengeluaran aldosteron juga mengalami penurunan selama pengurangan konsumsi garam pada orang yang mengalami keracunan Pb dari penyulingan alkohol. Endokrin lain yang diuji pada manusia adalah endokrin tiroid. Fungsi dari tiroid sebagai hormon akan mengalami tekanan bila manusia kekurangan I131 (yodium isotop 131) (Palar, 2008: 87).

g. Efek Pb terhadap jantung

Tahap akut keracunan timbal khususnya pada pasien yang menderita kolik, tekanan darah akan naik. Jika terjadi hal demikian, maka pasien tersebut akan mengalami hipotonia. Kemungkinan kerusakan miokardial harus diperhatikan (Sudarwin, 2008: 51).

Sejauh ini perubahan dalam otot jantung sebagai akibat dari keracunan Pb baru ditemukan pada anak-anak. Perubahan tersebut dapat dilihat dari

ketidaknormalan EKG. Tetapi setelah diberikan bahan khelat, EKG akan kembali normal (Palar, 2008: 87).

h. Efek karsinogenik

*International Agency for Research on Cancer (IARC)* menyatakan bahwa timbal anorganik dan senyawanya termasuk dalam grup 2B, kemungkinan menyebabkan kanker pada manusia. Tahap awal proses terjadinya kanker adanya kerusakan DNA yang menyebabkan peningkatan lesi genetik herediter yang menetap atau disebut mutasi. Timbal diperkirakan mempunyai sifat toksik pada gen sehingga dapat mempengaruhi terjadinya kerusakan DNA/mutasi gen dalam kultur sel mamalia. Patogenesis kanker otak akibat terpapar timbal adalah sebagai berikut: timbal masuk ke dalam darah melalui makanan dan akan tersimpan dalam organ tubuh yang mengakibatkan gangguan sintesis DNA, proliferasi sel yang membentuk nodul selanjutnya berkembang menjadi tumor ganas (Sudarwin, 2008:52).

## **6. Pengobatan Keracunan Pb (Timbal)**

Pengobatan awal fase akut intoksikasi Pb ialah secara suportif, dan selanjutnya harus dicegah pejalan lebih jauh. Serangan kejang diobati dengan diazepam, keseimbangan cairan dan elektrolit harus dipertahankan, udem otak diatasi dengan manitol dan deksametason. Kadar Pb darah harus ditentukan sebelum pengobatan dengan khelator (Ganiswarna, 1995: 847).

Pasien dengan kadar Pb dalam darah mencapai 80 µg/dL atau lebih, walaupun tanpa gejala, harus segera masuk rumah sakit dan diobati dengan bahan khelator sesegera mungkin. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya ensefalopati karena toksisitas Pb. Khelator yang dipergunakan adalah BAL (*British Anti Lewisite*), CaNa-EDTA, dan penisilamin. BAL sangat berguna dalam meningkatkan Pb dalam serum darah dan cairan serebrospinal. Ikatan yang


komplek dan stabil cepat disekresikan melalui urin. Beberapa efek samping terjadi pada penggunaan khelator tersebut yaitu terjadinya hipertensi, jantung berdenyut cepat, mual, muntah, dan demam. Rasa sakit pada daerah injeksi bila diberikan injeksi secara intramuskuler (Darmono, 2001: 165).

CaNa-EDTA akan mengkhelat Pb dari tulang dan jaringan lunak, sehingga membentuk ikatan kompleks dan stabil yang secara cepat juga diekskresikan melalui urin. Pengobatan dengan bahan khelat ini juga menimbulkan efek samping yaitu demam, sakit kepala, mual, muntah, anoreksia, mialgia, tekanan darah turun dan seperti terjadi alergi atau reaksi histamin. Sedangkan penggunaan penisilamin hasilnya cukup memuaskan untuk mengkhelat Pb, dan hampir tidak dijumpai efek samping (Darmono, 2001: 165).

#### F. *Spektrofotometer Serapan Atom*

Spektrofotometri dapat dibayangkan sebagai suatu perpanjangan dari penilikan visual di mana studi yang lebih terperinci mengenai pengabsorpsian energi cahaya oleh spesies kimia memungkinkan kecermatan yang lebih besar dalam pencirian dan pengukuran kuantitatif. Dalam penggunaan dewasa ini, spektrofotometri menyiratkan pengukuran jauhnya pengabsorpsian energi cahaya oleh suatu sistem kimia itu sebagai fungsi dari panjang gelombang radiasi, demikian pula pengukuran pengabsorpsian yang menyendiri pada suatu panjang gelombang tertentu (Day & Underwood, 2002: 419).

Proses penyerapan atom dapat diilustrasikan pada gambar dibawah ini:




Gambar 2. Proses penyerapan atom

Tingkat dasar atom menyerap energi cahaya dari panjang gelombang tertentu agar ia memasuki status tereksitasi. Semakin banyak jumlah atom yang diberi sumber cahaya, semakin banyak pula cahaya yang diserap. Dengan mengukur absorbansi dari cahaya, nilai kuantitatif dari analit dapat dibuat. Penggunaan sumber cahaya dan pemilihan panjang gelombang dapat menentukan element tertentu secara spesifik (Perkin-Elmer, 1996: 14).

### **1. Prinsip Spektrofotometer Serapan Atom**

Lazimnya suatu larutan berair yang mengandung logam yang harus ditetapkan (misalnya  $Pb^{2+}$  atau  $Cu^{2+}$ ) dimasukkan ke dalam nyala sebagai suatu aerosol, yakni suatu kabut yang terdiri dari tetesan yang sangat halus. Ketika butiran ini maju melewati nyala, pelarutnya menguap dan dihasilkan bintik-bintik halus dari materi berupa partikel. Zat padat itu kemudian berdisosiasi, sekurangnya sebagian, menghasilkan atom-atom logam. Semua tahap ini harus berlangsung dengan jarak beberapa sentimeter ketika partikel-partikel sampel itu diangkat dengan kecepatan tinggi oleh gas-gas nyala. Bila disinari dengan benar, kadang-kadang dapat terlihat tetes-tetes sampel yang belum menguap keluar dari puncak nyala, dan gas-gas nyala itu terencerkan oleh udara yang menyerobot masuk sebagai akibat dari tekanan rendah yang diciptakan oleh kecepatan tinggi itu. Lagi pula sistem optis tidak memeriksa seluruh nyala melainkan hanya mengurus suatu daerah dengan jarak tertentu di atas titik puncak pembakar. Tak ada satu titik pun di mana populasi atom kesetimbangan dan stabil, tetap diam untuk suatu pengukuran absorbansi; parameter-parameter kinetik, demikian pula konsentrasi sampel yang menetapkan beberapa atom telah dimasukkan ke dalam berkas sumber pada tiap saat (Day & Underwood, 2002: 421).

## 2. Instrumentasi



Gambar 3. Komponen-komponen suatu spektrofotometer serapan atom  
(Day & Underwood, 2002:425).

### a. Sumber sinar

Sumber sinar yang lazim dipakai adalah lampu katoda berongga. Lampu ini terdiri atas tabung-tabung kaca tertutup yang mengandung suatu katoda dan anoda. Katoda sendiri berbentuk silinder berongga yang terbuat dari logam atau dilapisi dengan logam tertentu. Tabung logam ini diisi dengan gas mulia (neon atau argon) dengan tekanan rendah (10-15 torr). Neon biasanya lebih disukai karena memberikan intensitas pancaran lampu yang lebih rendah. Bila antara anoda dan katoda diberi suatu selisih tegangan yang tinggi (600 volt), maka katoda akan memancarkan berkas-berkas elektron yang bergerak menuju anoda yang mana kecepatannya dan energinya sangat tinggi. Elektron-elektron dengan energi tinggi ini dalam perjalanannya menuju anoda akan bertabrakan dengan gas mulia yang diisikan tadi (Gandjar, 2008: 305).

Akibat dari tabrakan-tabrakan ini membuat unsur-unsur gas mulia akan kehilangan elektron dan menjadi ion bermuatan positif. Ion-ion gas mulia yang bermuatan positif selanjutnya akan bergerak ke katoda dengan kecepatan dan energi yang tinggi pula. Pada katoda terdapat unsur-unsur yang sesuai dengan unsur yang akan di analisis. Unsur-unsur ini akan ditabrak oleh ion-ion

positif gas mulia. Akibat tabrakan ini, unsur-unsur akan terlempar keluar dari permukaan katoda. Atom-atom unsur dari katoda ini kemudian akan mengalami eksitasi ke tingkat energi-energi elektron yang lebih tinggi dan akan memancarkan spektrum pancaran dari unsur yang sama dengan unsur yang akan di analisis (Gandjar, 2008:305).

#### **b. Tempat sampel**

Dalam analisis dengan SSA, sampel yang akan dianalisis harus diuraikan menjadi atom-atom netral yang masih dalam keadaan dasar. Ada berbagai macam alat yang dapat digunakan untuk mengubah suatu sampel menjadi uap atom-atom yaitu:

##### 1) Nyala (flame)

Nyala digunakan untuk mengubah sampel yang berupa padatan atau cairan menjadi bentuk uap atomnya, dan juga berfungsi untuk atomisasi. Suhu yang dapat dicapai oleh nyala tergantung pada gas-gas yang digunakan, misalkan untuk gas batubara-udara, suhunya kira-kira sebesar  $1800^{\circ}\text{C}$ ; gas alam-udara:  $1700^{\circ}\text{C}$ ; asetilen-udara:  $2200^{\circ}\text{C}$ ; dan gas asetilen-dinitrogen oksida ( $\text{N}_2\text{O}$ ) sebesar  $3000^{\circ}\text{C}$ .

Pemilihan macam bahan pembakar dan gas pengoksidasi serta komposisi perbandingannya sangat mempengaruhi suhu nyala. Pada umumnya nyala dari gas asetilen-nitro oksida menunjukkan emisi latar belakang yang kuat. Efek emisi nyala dapat dikurangi dengan menggunakan keping pemotong radiasi (*chopper*) (Gandjar, 2008:306).

##### 2) Tanpa nyala

Teknik Ionisasi dengan nyala dinilai kurang peka karena atom gagal mencapai nyala, tetesan sampel yang masuk ke dalam nyala terlalu besar, dan proses atomisasi kurang sempurna. Oleh karena itu, munculah suatu

teknik atomisasi yang baru yakni atomisasi tanpa nyala. Pengatoman dapat dilakukan dengan tungku dari grafit.

Sejumlah sampel diambil sedikit (untuk sampel cair diambil hanya beberapa  $\mu\text{L}$ , sementara sampel padat diambil beberapa mg), lalu diletakkan dalam tabung grafit, kemudian tabung tersebut dipanaskan dengan sistem listrik dengan cara melewatkan arus listrik pada grafit. Akibat pemanasan ini, maka zat yang akan dianalisis berubah menjadi atom-atom netral dan pada fraksi atom ini dilewatkan suatu sinar yang berasal dari lampu katoda berongga sehingga terjadilah proses penyerapan energi sinar yang memenuhi kaidah analisis kuantitatif (Gandjar, 2008: 308).

Sistem pemanasan dengan tanpa nyala ini dapat melalui 3 tahap, yaitu: pengeringan (*drying*), yang membutuhkan suhu relatif rendah; pengabuan (*ashing*) yang membutuhkan suhu yang lebih tinggi untuk menghilangkan matriks kimia dengan mekanisme volatilisasi atau pirolisis; dan pengatoman (*atomising*) (Gandjar, 2008:310).

### **c. Monokromator**

Pada SSA, monokromator dimaksudkan untuk memisahkan dan memilih panjang gelombang yang digunakan dalam analisis. Disamping sistem optik, dalam monokromator juga terdapat suatu alat yang digunakan untuk memisahkan radiasi resonansi dan kontinyu yang disebut dengan *Chopper* (Gandjar, 2008:311).

### **d. Detektor**

Digunakan untuk mengukur intensitas cahaya yang melalui tempat pengatoman. Biasanya digunakan tabung penggandaan foton (*photomultiplier tube*). Ada dua cara yang dapat digunakan dalam sistem

deteksi yaitu: (a) memberikan respon terhadap radiasi resonansi dan radiasi kontinyu; dan (b) yang hanya memberikan respon terhadap radiasi resonansi.

Pada cara pertama, *output* yang dihasilkan dari radiasi resonan dan radiasi kontinyu disalurkan pada sistem galvanometer dan setiap perubahan yang disebabkan oleh radiasi resonan akan menyebabkan perubahan *output*. Pada cara kedua, *output* berasal dari radiasi resonan dan radiasi kontinyu yang dipisahkan. Dalam hal ini, sistem penguat harus cukup selektif untuk dapat membedakan radiasi. Cara terbaik adalah dengan menggunakan detektor yang hanya peka terhadap radiasi resonan yang termodulasi (Gandjar, 2008: 312).

**e. *Readout***

*Readout* merupakan suatu alat penunjuk atau dapat juga diartikan sebagai suatu sistem pencatatan hasil. Pencatatan hasil dilakukan dengan suatu alat yang telah terkalibrasi untuk pembacaan suatu transmisi. Hasil pembacaan dapat berupa angka atau berupa kurva dari suatu rekorder yang menggambarkan absorbansi atau intensitas emisi (Gandjar, 2008: 312).

**3. Kelemahan dan keunggulan SSA**

a. Keunggulan :

- 1) Teknik SSA menjadi alat yang canggih dalam analisis. Ini disebabkan diantaranya oleh kecepatan analisisnya, ketelitiannya sampai tingkat runtu, tidak memerlukan pemisahan pendahuluan.
- 2) Kemungkinannya untuk menentukan konsentrasi semua unsur pada konsentrasi runtu
- 3) Sebelum pengukuran, tidak perlu memisahkan unsur yang ditentukan karena kemungkinan penentuan satu unsur dengan kehadiran unsur



lain dapat dilakukan asalkan katoda berongga yang diperlukan tersedia (Khopkar, 2008: 296).

b. Kekurangan :

- 1) Adanya pancaran latar belakang yang terserap tak sempurna dari sumber cahaya, dan cahaya terhambur dari sistem optik. Jika latar belakang relatif menjadi lebih terang dari penyerapan analit, ketelitian pengukuran menjadi melorot secara tajam (Munson; 1991: 298).
- 2) Gangguan Spektra yang terjadi apabila panjang gelombang (*atomic line*) dari unsur yang diperiksa berimpit dengan panjang gelombang dari atom atau molekul lain yang terdapat dalam larutan yang diperiksa.
- 3) Gangguan fisika, sifat-sifat fisika dari larutan yang diperiksa akan menentukan intensitas dari resapan atau emisi dari larutan zat yang diperiksa. Kekentalan mempengaruhi laju penyemprotan ke dalam nyala dan ketegangan muka, bobot jenis, kekentalan, serta kecepatan gas menentukan besar butir tetesan. Oleh karena itu sifat-sifat dari zat yang diperiksa dan larutan pembanding harus sama.
- 4) Gangguan kimia. Gangguan kimia bentuk uap biasanya memperkecil populasi atom pada level energi terendah. Dalam nyala, atom dalam bentuk uap dapat berkurang karena terbentuknya senyawa seperti oksida atau klorida, atau karena terbentuknya ion.

Gangguan bentuk padat disebabkan oleh terbentuknya senyawa yang sukar menguap atau sukar terdisosiasi dalam nyala. Hal ini


terjadi pada nyala ketika pelarut menguap meninggalkan partikel-partikel padat (Gandjar, 2008: 319).

**G. Tinjauan Islam Tentang Pencemaran Lingkungan**

Penciptaan langit dan bumi dalam keadaan seperti tersedianya air, dan tumbuh berkembang dan berbuahnya pohon-pohon menunjukkan betapa Allah telah menciptakan alam raya demikian bersahabat dengan manusia sehingga menjadi kewajiban manusia menyambut persahabatan itu sebagaimana dikehendaki Allah SWT. dengan menjadikan manusia khalifah di bumi (Shihab, 2002: 151-152).

Setiap bagian dan benda di alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan dengan tujuannya masing-masing, terlepas dari apakah tujuan itu untuk kepentingan manusia atau tidak. Oleh karena itu manusia sebagai bagian dari alam semesta, bertanggung jawab pula untuk menjaganya.

Seperti diterangkan dalam Q.S. al-Baqarah : 30:



Terjemahnya:


*“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan*

*darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (Departemen Agama, 2005).*

Surat ini menjelaskan kedudukan manusia sebagai khalifah di muka bumi yaitu manusia diberi tugas untuk memelihara dan melestarikan alam, menggali, mengelola, dan mengolah kekayaan alam untuk dimanfaatkan demi kesejahteraan segenap manusia dalam rangka beribadah kepada Allah SWT.

Untuk mewujudkan tugas yang mulia tersebut, manusia selama hidup di dunia diwajibkan meningkatkan kemampuannya baik fisik maupun rohaninya kearah yang lebih maju baik dalam bidang ilmu pengetahuan maupun teknologi. Dalam menjalankan tugas hidupnya manusia diharuskan menjauhi sifat-sifat yang buruk yang menjadi penyebab kerusakan tata hubungan antara manusia seperti pertumpahan darah maupun kerusakan alam. Oleh karena itu senantiasa manusia dianjurkan selalu ingat kepada Allah dengan berzikir, bertasbih, dan selalu menjalankan perintah-perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-larangan-Nya.

Dalam Q.S. al-Baqarah : 22:




Terjemahnya:

*“Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezki untukmu; Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu Mengetahui.” (Departemen Agama, 2005).*

Dijadikan bumi *terhampar* bukan berarti dia diciptakan demikian. Bumi diciptakan Allah bulat atau bulat telur, itu adalah hakikat ilmiah yang sulit di bantah. Lalu Dia menjadikan bulat itu terhampar bagi manusia, yakni kemanapun mereka melangkahakan kaki mereka akan melihat atau mendapatkannya terhampar. Itu dijadikan Allah agar manusia dapat meraih sebanyak mungkin dari dijadikannya bumi demikian (Shihab, 2002: 149).

Sejak penciptaan alam semesta, Allah swt telah memberlakukan *sunatullah* bagi ciptaanNya sehingga senantiasa dalam keteraturan dan keseimbangan atau dikenal dengan “hukum alam”. Secara alamiah, alam akan memperbaiki dirinya sendiri bila terjadi ketidakseimbangan atau ketidakteraturan akibat adanya kerusakan oleh alam itu sendiri dan manusia.

Tuntunan Islam tentang keseimbangan alam sangatlah jelas sebagaimana firman Allah swt dalam QS. Al-Mulk: 3,




Terjemahnya:

*“Allah menjadikan tujuh langit, kamu sama sekali tidak melihat sesuatu yang tidak seimbang/serasi di dalam ciptaan Allah Yang Maha Rahman. Lihatlah berulang kali dengan teliti, adakah kamu temui sesuatu yang tidak seimbang/serasi”* (Departemen Agama, 2005).

Petikan ayat di atas menjelaskan bahwa alam semesta yang diciptakan Allah dalam keadaan seimbang dan serasi.

Dengan dasar itulah manusia diberikan Allah kemampuan menundukkan alam dan membangun konsep-konsep ilmiah dari yang bersifat abstrak hingga yang konkret yang menjadi dasar bagi perkembangan Iptek. Tunduknya alam di

bawah kewenangan manusia dengan izin Allah, tidaklah serta merta memposisikan manusia sebagai penakluk dan alam sebagai yang ditaklukan. Dengan adanya kearifan mengedepankan kelestarian alam, sehingga sumber daya alam tidak terkuras dan tidak merusak, bahkan justru dapat melestarikan potensi dan fungsi alam serta memelihara kebutuhan makhluk Tuhan. Akan tetapi segala kegiatan pembangunan dilakukan menurut hawa nafsu, tentunya akan mendatangkan bencana bagi manusia. Allah swt berfirman dalam surah Ar rum: 41,



Terjemahannya:

*“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”* (Departemen Agama, 2005 )

Ayat diatas menyebut darat dan laut sebagai tempat terjadinya fasad itu. Ini berarti daratan dan lautan menjadi arena kerusakan, yang hasilnya keseimbangan lingkungan menjadi kacau. Inilah yang mengantar ulama kontemporer memahami ayat ini sebagai isyarat tentang kerusakan lingkungan (Shihab, 2002: 149).

Peringatan Allah dalam petikan ayat di atas cukup lugas dan keras. Allah akan menurunkan azab (bencana) di bumi bila manusia yang telah diberi amanah tidak mampu menjalankan amanah sesuai ketentuanNya, atau malah dengan

sombong dan mengikuti hawa nafsu melakukan pengrusakan di muka bumi dengan dalih melakukan pembangunan.

### **Larangan mencemari air**

Bentuk-bentuk pencemaran air yang dimaksud oleh ajaran Islam di sini seperti kencing, buang air besar dan sebab-sebab lainnya yang dapat mengotori sumber air. Rasulullah saw bersabda :

الطَّرِيقَ وَالظِّلَّ

Artinya :

*“Jauhilah tiga macam perbuatan yang dilaknat ; buang air besar di sumber air, ditengah jalan, dan di bawah pohon yang teduh.”* (HR. Abu Daud)

Rasulullah saw, juga bersabda :

لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ي لَا يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ

Artinya:

*“Janganlah salah seorang dari kalian kencing di air yang diam yang tidak mengalir, kemudian mandi disana.”* (HR. Al-Bukhari)

Pencemaran air di zaman modern ini tidak hanya terbatas pada kencing, buang air besar, atau pun hajat manusia yang lain. Bahkan banyak ancaman pencemaran lain yang jauh lebih berbahaya dan berpengaruh dari semua itu, yakni pencemaran limbah industri, zat kimia, zat beracun yang mematikan, serta minyak yang menggenangi samudra.

Menjaga lingkungan merupakan salah satu perbuatan terpuji dan memiliki banyak manfaat. Dengan memulainya dari diri sendiri akan kesadaran menjaga lingkungan, secara tidak langsung juga dapat menimbulkan kesadaran bagi orang di sekeliling kita untuk turut serta menjaga lingkungan.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Alat dan bahan yang digunakan**

##### **1. Alat-alat**

Alat yang digunakan adalah aluminium foil, botol plastik, cawan porselen bertutup, corong gelas (pyrex<sup>®</sup>), Erlenmeyer (pyrex<sup>®</sup>), gelas ukur (pyrex<sup>®</sup>), labu ukur (pyrex<sup>®</sup>), neraca analitik (KERN ALJ 220-4 NM), pemanas listrik, pipet volumetrik, Spektrofotometri Serapan Atom (varian Spectr AA).

##### **2. Bahan-bahan**

Bahan yang digunakan adalah air suling, asam nitrat (HNO<sub>3</sub>) pekat, timbal nitrat (Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>), sampel air sungai Kelay.

#### **B. Prosedur kerja**

##### **1. Pengambilan sampel**

Pengambilan sampel menggunakan teknik *judgment*, yakni cara pengambilan sampel dengan kebijaksanaan sendiri pada titik yang representatif. Sampel di ambil pada lima titik, dimana 1 lokasi diambil 3 titik dari tepi kiri ke tepi kanan sungai, kemudian sampel digabungkan dan dimasukkan ke dalam botol. Sampel A diambil pada area konfeyor (daerah pertambangan), sampel B berjarak 100 meter, sampel C berjarak 500 meter, sampel D berjarak 1 kilometer dan sampel E dengan jarak 1,5 kilometer dari konfeyor.

##### **2. Persiapan sampel**

Sampel sebanyak 50 ml yang telah diambil dimasukkan ke dalam gelas piala, ditambahkan asam nitrat pekat hingga pH < 2. Kemudian dipanaskan di



pemanas listrik sampai larutan sampel hampir kering. Lalu ditambahkan air suling dan dimasukkan ke dalam labu ukur 50 ml melalui kertas saring dan dicukupkan sampai 50 ml dengan air suling.

### **3. Pembuatan Blanko HNO<sub>3</sub>**

Diambil 2 ml larutan HNO<sub>3</sub> 0,5 M, kemudian dimasukkan ke dalam gelas ukur 100 ml dan cukupkan volumenya dengan air suling.

### **4. Pembuatan larutan Baku logam timbal 1000 ppm**

Ditimbang 1,6 g Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>, dimasukkan ke dalam labu ukur 1000 ml. Ditambahkan 10 ml HNO<sub>3</sub> pekat dan air suling hingga tepat pada tanda batas.

### **5. Persiapan kurva kalibrasi larutan standar timbal (Pb)**

Dibuat larutan standar 100 ppm yaitu dengan mengambil 10 ml larutan standar 1000 ppm kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml dan dicukupkan dengan air suling hingga 100 ml. Dibuat larutan standar Pb 0,1 ppm; 0,5 ppm; 1,0 ppm; 1,5 ppm; dan 2,0 ppm dengan cara dipipet 0,1 ml; 0,5 ml; 1,0 ml; 1,5 ml; 2,0 ml larutan baku timbal 100 ppm ke dalam labu ukur 100 ml dan ditambahkan 3 ml HNO<sub>3</sub> 0,5 M kemudian dicukupkan dengan air suling sampai tanda batas.

### **6. Pengukuran kurva kalibrasi standar timbal**

Dimasukkan masing-masing larutan baku yang telah dibuat dengan cara menginjeksikan ke dalam SSA lalu diukur serapannya pada panjang gelombang 283,3 nm. Dicatat hasil pengukuran kemudian dibuat kurva kalibrasi untuk mendapat persamaan garis regresi.

## 7. Pengukuran kadar timbal (Pb) dari sampel

Dimasukkan sampel uji air sungai yang sudah dipreparasi dengan cara menginjeksikan ke dalam SSA lalu diukur serapannya pada panjang gelombang 283,3 nm. Dan dicatat hasil pengukuran untuk kemudian dianalisis.

## 8. Analisis data

Analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian menggunakan Uji Regresi. Uji regresi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier sederhana, yaitu:  $Y = aX + b$

Dimana : a adalah *slope*, b adalah intersep. Selanjutnya harga slope dapat ditentukan sebagai berikut:

$$a = \frac{\{(X - \bar{X})(Y - \bar{Y})\}}{(X - \bar{X})^2}$$

Harga intersep (b) diperoleh melalui substitusi harga (a) ke persamaan. Dari nilai X dan Y dapat dihitung nilai korelasinya. Korelasi dapat dihitung dengan rumus :

$$r = \frac{\{(X - \bar{X})(Y - \bar{Y})\}}{\sqrt{\{(X - \bar{X})^2\} \{(Y - \bar{Y})^2\}}}$$

Koefisien korelasi regresi (r) yang didapatkan dibandingkan apakah lebih besar atau sama dengan 0,995 dengan intersepsi lebih kecil atau sama dengan batas deteksi. Batas deteksi (LOD) dapat dihitung secara statistik melalui garis regresi linear dari kurva kalibrasi dengan rumus sebagai berikut:

$$SD = \sqrt{\frac{\{(Y - \bar{Y})^2\}}{n-2}} \quad LOD = \frac{3 \times S}{S}$$

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Pengamatan

##### 1. Penentuan Absorbansi Larutan Standar Timbal

Data absorbansi larutan standar timbal digunakan untuk membuat persamaan garis regresi linear. Larutan standar besi di buat beberapa seri dengan berbagai kadar, yaitu 0; 0,1; 0,5; 1,0; 1,5; dan 2,0 ppm, kemudian dioperasikan pada Spektrofotometer Serapan Atom. Data yang diperoleh disajikan pada tabel

Tabel 2. Hasil pengukuran standar timbal (Pb)

No.	Kadar (ppm)	Serapan (A)
1.	0,0000	-0,0005
2.	0,1000	0,0048
3.	0,5000	0,0135
4.	1,0000	0,0270
5.	1,5000	0,0402
6.	2,0000	0,0534

##### 2. Penentuan Persamaan garis Linear Standar

Untuk menentukan persamaan garis regresi linear standar dapat di cari dengan rumus  $Y = ax + b$ . Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran

2. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh persamaan garis regresi linear larutan standar :


$$Y = 0,02636X + 0,00066$$

Dengan koefisien korelasi X terhadap Y adalah:

$$r = 0,99831$$

### 3. Penentuan Kurva Kalibrasi Larutan Standar Timbal

Berdasarkan data absorbansi sederet larutan standar, maka selanjutnya dapat dibuat kurva standar/ kalibrasi kadar terhadap absorbansi. Kurva kalibrasi timbal dibuat berdasarkan harga absorbansi larutan standar timbal dimana Y adalah absorbansi larutan standar timbal dan X adalah kadar larutan timbal.



Gambar 3. Kurva baku Timbal (Pb)

### 4. Penentuan Absorbansi Larutan Sampel

Absorbansi larutan sampel diperoleh dengan menginjektikan larutan sampel air sungai Kelay ke dalam spektrofotometer serapan atom. Hasil pengukuran absorbansi sampel kemudian disubstitusikan ke dalam persamaan garis regresi yang telah ditentukan. Data absorbansi dan kadar larutan sampel air sungai Kelay disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3. Hasil perhitungan kadar timbal (Pb) pada sampel air sungai Kelay secara Spektrofotometri serapan Atom (SSA).

No	Kode Sampel	Syarat (mg/l)	Absorbansi (A)	Kadar Timbal (mg/l)	Keterangan
1	A	0,01	-0,0030	< 0,001	Normal
2	B		0,0001	< 0,001	Normal
3	C		-0,0004	< 0,001	Normal
4	D		0,0027	0,0773	Melebihi
5	E		0,0021	0,0634	Melebihi

### 5. Penentuan Batas deteksi

Batas deteksi diperoleh melalui data statistik persamaan garis regresi  $Y = 0,02636x + 0,00066$ , dengan rumus perhitungan:

$$SD = \sqrt{\frac{\{(Y-Y)\}^2}{n-2}} \quad LOD = \frac{3 \times S}{S}$$

sehingga di peroleh nilai batas deteksi sebesar 0,01098 ppm. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 2.

### B. Pembahasan

Timbal adalah logam berat yang biasa digunakan sebagai bahan pembuat baterai, amunisi, produk cat, keramik, dan peralatan kegiatan medis/ilmiah. Tingginya kadar timbal dalam tubuh dapat berpengaruh pada penghambatan sintesa haemoglobin yang mengakibatkan anemia, gangguan pada sistem syaraf yang mengakibatkan epilepsi, halusinasi, kerusakan pada otak besar, kerusakan ginjal, hipertensi, serta menurunkan fertilitas.

Logam-logam berat seperti timbal yang terlarut dalam badan perairan pada kadar tertentu akan berubah fungsi menjadi sumber racun bagi kehidupan perairan.


Meskipun daya racun yang ditimbulkan oleh suatu logam berat terhadap semua biota perairan tidak sama, namun kehancuran dari suatu kelompok dapat menjadikan terputusnya suatu mata rantai kehidupan. Pada tingkat lanjutnya, keadaan ini tentu saja dapat menghancurkan suatu tatanan ekosistem perairan (Palar, 2008: 81).

Kandungan logam berat timbal dapat dianalisis menggunakan Spektrofotometer serapan atom (SSA). Teknik ini sangat tepat untuk analisis zat pada kadar rendah. Pada prinsipnya sampel cair atau larutan akan mengalami atomisasi, melewati nyala yang sangat panas, sehingga pelarut dari sampel akan menguap dan meninggalkan Pb. Pb ini kemudian menyerap sinar dari katoda. sinar yang diserap sebanding dengan konsentrasi logam Pb yang kemudian akan terbaca pada *readout*. Teknik ini digunakan untuk menganalisis baik kualitatif maupun kuantitatif unsur-unsur logam.

Analisis logam dalam air relatif lebih cepat dan lebih mudah dibandingkan dengan analisa pada sampel lain. Namun demikian penggunaan sampel air untuk monitoring logam berat memiliki kelemahan karena mobilitas air sangat tinggi yang berhubungan dengan perbedaan dan perubahan sifat-sifat fisika kimia dan kadar logam berdasarkan waktu (Bintal Amin :11 ).

Sampel yang dapat dianalisis dengan instrumen SSA harus berwujud cair dan untuk mencegah penyumbatan dan gangguan dalam analisis dengan SSA perlu dilakukan penyaringan dalam proses preparasi sampel. Sebelumnya, sampel ditambahkan asam nitrat pekat (60%) sampai pH <2. Asam nitrat merupakan asam anorganik dan zat cair yang tidak berwarna atau agak sedikit kekuningan yang berasap dan bersifat korosif. HNO<sub>3</sub> pekat juga berfungsi untuk melarutkan analit dan menjernihkan larutan. Hal ini terjadi karena asam nitrat memutus dan

menghilangkan ikatan antara logam dan bahan-bahan senyawa organik yang ada pada sampel air sungai. Timbal akan sangat mudah larut dalam suasana yang sangat asam. HNO<sub>3</sub> pekat yang bertemu dengan Timbal akan menghasilkan Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> pada permukaan logam yang mencegah pelarutan lebih lanjut. Reaksinya dapat dituliskan sebagai berikut:



Sampel yang telah dipreparasi kemudian diukur absorbansinya. Panjang gelombang yang dipilih adalah 283,3 nm karena panjang gelombang ini merupakan panjang gelombang paling kuat menyerap garis untuk transisi elektronik dari tingkat dasar ke tingkat eksitasi. Apabila atom pada tingkat energi dasar diberi energi yang sesuai maka energi tersebut akan diserap dan atom-atom tersebut akan tereksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi. Pada keadaan tereksitasi, atom tidak stabil sehingga akan kembali ke tingkat energi dasar dengan melepas sejumlah energi dalam bentuk sinar. Maka setiap panjang gelombang mempunyai energi yang spesifik. Timbal mempunyai energi sebesar  $7,0134 \cdot 10^{-8}$  Joule, dimana dengan energi tersebut akan menyebabkan atom Timbal (Pb) dalam keadaan dasar (Pb<sub>0</sub>) tereksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi (Pb\*). Absorbansi menunjukkan kemampuan sampel untuk menyerap radiasi elektromagnetik pada panjang gelombang maksimum (Dewi, Diana candra, 2012:16).

Pada penelitian ini, sebelum pengukuran absorbansi sampel, terlebih dahulu dilakukan pengukuran absorbansi standar timbal (Pb) untuk dibuat kurva kalibrasinya. Dari hasil penelitian didapatkan persamaan garis linear  $Y = 0.02636X + 0.00066$  dengan nilai  $r$  sebesar 0,99831. Hal ini sesuai dengan pengendalian mutu SNI 6989.8:2009 mengenai Cara uji timbal secara Spektrofotometer serapan

atom untuk air dan limbah yaitu koefisien korelasi regresi linear ( $r$ ) lebih besar atau sama dengan 0,995 dengan intersepsi lebih kecil atau sama dengan batas deteksi.

Nilai batas deteksi (LOD) yang diperoleh yaitu sebesar 0,01098 ppm artinya batas kadar terendah tersebut masuk dalam kadar timbal yang dianalisis. Nilai LOD merupakan nilai batas kadar terendah dari analit yang masih dapat terdeteksi oleh alat spektrofotometer serapan atom yang masih memberikan respon signifikan dibandingkan dengan blangko (Harmita, 2004: 130).

Dari persamaan regresi di atas, dapat ditentukan besarnya kadar timbal (Pb) dalam sampel dengan mensubstitusi nilai  $Y$  dengan absorbansi sampel ke dalam persamaan, sehingga didapatkan hasil pengukuran kadar logam berat timbal (Pb) air sungai Kelay di lokasi A, B, dan C  $< 0.001$  ppm artinya masih normal sehingga masih dapat mendukung kehidupan organisme di perairan tersebut. Sedangkan kadar logam berat timbal (Pb) di lokasi D sebesar 0,0773 ppm dan E sebesar 0,0634 ppm melebihi baku mutu perairan yang ditetapkan Permenkes No 416 tahun 1990, yaitu  $< 0,03$  ppm serta surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum yaitu 0,01 mg/l.

Pada Sampel D dan E, timbal yang masuk ke perairan mengalami pengendapan, pengenceran dan dispersi, kemudian diserap oleh organisme yang hidup di perairan tersebut. Pengendapan ini terjadi karena timbal bersifat mudah mengikat bahan organik dan mengendap di dasar perairan dan berikatan dengan partikel-partikel sedimen. Logam berat tersebut dapat terakumulasi dalam sedimen dan badan air yang menyebabkan kadarnya akan terus meningkat. Dalam hubungannya dengan kondisi morfologi dan hidrologi, materi terlarut seperti





logam timbal dapat terakumulasi sepanjang perairan, bahkan dapat terjadi beberapa kilometer setelah sumber polusi.

Pasang surutnya air serta arus juga mempengaruhi kadar logam berat terlarut dalam air. Arus lebih cepat pada saat surut jadi jika kecepatan air yang tinggi maka keberadaan timbal (Pb) dalam air akan tersebar terbawa mengikuti arus tersebut. Disamping itu, faktor fisik dan kimia perairan akan berpengaruh satu sama lain dan akan berpengaruh pada kadar logam berat terlarut di perairan tersebut.

Logam berat dapat masuk ke perairan melalui aktivitas masyarakat seperti dari asap kendaraan, perbengkelan, kegiatan industri dan pembuangan sisa limbah rumah tangga ke perairan. Demikian juga halnya di Sungai Kelay. Khususnya pada titik D dan E yang terletak di kawasan pemukiman, dekat dengan industri dan pertambangan. Selain itu di daerah ini juga masih terdapat kegiatan penduduk yang menggunakan kapal motor kecil (*ketinting*) yang digunakan masyarakat sebagai alat transportasi dan mengangkut barang-barang dari dan ke daerah sekitarnya disamping adanya kapal-kapal barang dan tanker serta tongkang batubara yang banyak melintasi dan bersandar di kawasan tersebut.

Ditinjau dari segi syariat islam, Sampel pada lokasi D dan E belum bisa dikatakan *tayyib*, walaupun dari segi zatnya termasuk halal, namun kadar timbal yang berlebihan memiliki dampak buruk bagi kesehatan baik secara langsung maupun dalam jangka panjang yang tidak dapat mendukung kesehatan, sesuai dengan Q.S. T ha / 20 : 81





Terjemahnya :

“Makanlah di antara rezeki yang baik yang Telah kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas padanya, yang menyebabkan kemurkaan-Ku menimpamu. dan barangsiapa ditimpa oleh kemurkaan-Ku, Maka Sesungguhnya binasalah ia” (Departemen Agama, 2005: 317).

Makanlah makanan apa saja yang kamu sukai selama tidak memabukkan tidak juga mengganggu kesehatan kamu dan janganlah berlebih-lebihan dalam segala hal, baik dalam beribadah dengan menambah cara atau kadarnya demikian juga dalam makan dan minum atau apa saja, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai yakni tidak melimpahkan rahmat dan ganjaran bagi orang berlebih-lebihan dalam hal apapun itu (Shihab, 2002: 87).

Manusia hendaknya berfikir tentang berbagai karunia Alah SWT yang telah diberikan kepada manusia. Allah SWT telah mengatur kehidupan ini dengan sempurna dan dengan penuh kesimbangan seperti yang telah tersurat dalam Al-Quran dan telah terbukti dalam kehidupan. Oleh karena itu, marilah kita lakukan segala perintahnya dan menjauhi larangannya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Sampel air sungai Kelay mengandung Logam berat timbal (Pb).
2. Kadar timbal (Pb) yang terkandung dalam air sungai Kelay sampel D sebesar 0,0773 mg/l dan sampel E sebesar 0,0634 mg/l. Sedangkan pada sampel A, B, dan C dibawah 0,01 mg/l.

#### **B. Saran**


Sebaiknya masyarakat tidak menggunakan air sungai Kelay sebagai sumber air minum karena mengandung logam berat timbal dan tidak membuang limbah rumah tangga maupun industri ke aliran sungai.

## DAFTAR PUSTAKA


- Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Departemen Agama RI, Bandung : CV. Penerbit J-ART, 2005.
- Amin, Bintal. Irvina, Nurrachmi. Martin, Manalu. *Kandungan Logam Berat Pada Air Laut Dan Sedimen Di Perairan Pantai Sekitar Kawasan Industri Perminyakan*. Laboratorium Kimia Laut Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Riau. Riau.
- Anonim. *Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air*. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. 2011.
- Anonim. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor 492 tahun 2010. Tentang Persyaratan Kalitas Air Minum*. Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2010.
- Anonim. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air*. Kementerian Lingkungan Hidup. 2002.
- Anonim, *SNI 6989.8:2009: Air dan Limbah – Bagian 8: Cara Uji timbal (Pb) secara Spektrofotometer serapan Atom (SSA) – Nyala*. Standar Nasional Indonesia. Badan Standarisasi Nasional. 2009.
- Day. R. A, JR. & Underwood. A. L. *Analisis Kimia Kuantitatif Edisi ke Enam*. Terjemahan Oleh Iis Sopyan. Erlangga. Jakarta. 2002.
- Dewi, Diana Candra. *Determinasi kadar logam timbal (pb) dalam makanan kaleng menggunakan destruksi basah dan destruksi kering*. Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Maliki. Malang. 2012.
- Darmono. *Lingkungan Hidup dan Pencemaran : Hubungannya dengan Toksikologi Senyawa Logam*. UI-Press. Jakarta. 2001.
- Fardiaz, S. *Polusi Air dan Udara*. Penerbit Kanisius, Yogyakarta.1992.
- Ganiswara, Sulistia. G. *Farmakologi dan Terapi Edisi 4*. Bagian Farmakologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jakarta. 1995.

- Harmita. *Petunjuk Pelaksanaan Validasi Metoda dan Cara Perhitungannya, Vol I, No 3.* Majalah Ilmu Kefarmasian. 2004.
- Indarwati. Maria.T, M.S. Mahendra, I W. Arthana. *Analisis Kadar Logam Berat Air Sungai Sekonyer di Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah.* Volume 2 No. 2. Program Magister Ilmu Lingkungan. 2007. <http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/19435/C09rse.pdf?sequence=1> (05 Juni 2013)
- Islah Teuku & Hendro Fujiono. *Evaluasi Konservasi Sumber Daya Batubara di Sekitar Tanjung Redep Kabupaten Berau Kalimantan Timur.* 2008. <http://psdg.bgl.esdm.go.id/kolokium/Konservasi/53.%20konservasi%20-%20berau,%20kaltiml.pdf> (13 september 2012).
- Khopkar S.M. *Konsep Dasar Kimia Analitik.* Terjemahan oleh Saptorahardjo. UI-Press. Jakarta. 2010.
- Munson. James. W. *Analisis Farmasi Metode Modern.* Terjemahan oleh Harjana. Airlangga University press. Surabaya. 1991.
- Naria, Evi. *Mewaspada dampak bahan pencemar timbal (pb) Di lingkungan terhadap kesehatan.* Bagian Kesehatan Lingkungan, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Universitas Sumatera Utara. Jurnal Komunikasi Penelitian. 2005.
- Palar. H. *Pencemaran dan Toksikologi Logam Berat.* PT Rineka Cipta, Jakarta. 1994.
- Palar. H. *Pencemaran dan Toksikologi Logam Berat.* PT Rineka Cipta, Jakarta. 2008.
- Perkin, Elmer. *Analytical Methods for Atomic Absorption Spectroscopy.* Perkin-ElmerCo. USA. 1996.
- Prasetyorini dan Wardatun. Sri. *Analisis Kandungan Timbal, Tembaga, dan Arsen pada Daun Kangkung (Ipomoea aquatica) yang Dijual Di Tempat yang Berbeda dengan Metode Spektrofotometer Serapan Atom.* FMIPA UNPAK. 2011.
- Gandjar I.G. & Rohman A. *Kimia Farmasi Analisis.* Pustaka Pelajar Yogyakarta. 2008.
- Rahmawati. Deazy. *Pengaruh Kegiatan Industri Terhadap Kualitas Air Sungai Diwak Di Bergas Kabupaten Semarang dan Upaya Pengendalian Pencemaran Air Sungai.* Universitas Diponegoro. Semarang. 2011.

- Sembiring, Rodieiser. Analisis Kandungan Logam Berat Hg, Cd, dan Pb Daging Kijing Lokal (*Pilsbryoconcha exilis*) dari Perairan Situ Gede, Bogor. Institut Pertanian Bogor. 2009.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Lentera Hati. Jakarta. 2002.
- Sudarwin. *Analisis Spasial Pencemaran Logam Berat (Pb dan Cd) Pada Sedimen Aliran Sungai dari Tempat Pembuangan Akhir TPA Sampah Jatibarang Semarang*. Universitas Diponegoro, Semarang. 2008.
- Sutrisno C. Totok. *Teknologi Penyediaan Air Bersih*. Rineka Cipta. Jakarta. 2006.
- Usodowati, Prastini. *Studi Kelayakan Pemanfaatan Gembili : Penentuan Logam Besi, Seng, Tembaga, Timbal, Merkuri Dan Arsen Dalam Tepung Dan Pati Gembili (Dioscorea Esculenta)*. ITS-Undergraduate, Chemistry. 2004. <http://digilib.its.ac.id/studi-kelayakan-pemanfaatan-gembili--penentuan-logam-besi-seng-tembaga-timbalmerkuri-dan-arsen-dalam-tepung-dan-pati-gembili-dioscorea-esculenta-12735.html> (3 Juli 2013)
- Warlina. Lina. *Pencemaran Air: Sumber, Dampak dan Penanggulangannya*. Sekolah Pasca Sarjana / S3. Institut Pertanian Bogor. Bogor. 2004. [http://abdul.student.umm.ac.id/files/2010/02/lina\\_warlina.pdf](http://abdul.student.umm.ac.id/files/2010/02/lina_warlina.pdf) (3 September 2012).
- Widowati W, Sastiono A, Jusuf R.. *Efek Toksik Logam*. Yogyakarta. Penerbit Andi. 2008.
- Yulistiyanto. Bambang. *Pelestarian dan Pemanfaatan Sungai Secara Terpadu dan Berkelanjutan Bagi Kemaslahatan Manusia*. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. 2013.

**Lampiran 1. Skema Kerja****1. Penentuan kurva kalibrasi larutan standar**

## 2. Pengukuran kadar timbal (Pb) dari sampel dengan menggunakan SSA





## Lampiran 2. Perhitungan

### 1. Perhitungan Pembuatan Larutan Pb 1000 Ppm

Diketahui : konsentrasi larutan 1000 ppm

Volume Larutan 1 Liter

(Ar Pb = 207; N = 14; O = 16)

$$\begin{aligned} \text{Mr Pb(NO}_3)_2 &= 207 + 2(14) + 6(16) \\ &= 207 + 28 + 96 \\ &= 331 \end{aligned}$$

Ditanya : massa Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> yang ditimbang = ..... ?

$$\begin{aligned} \text{Jawab : ppm} &= \frac{1}{10^6} \text{ mg/mg} \\ &= 1 \text{ mg/kg} \end{aligned}$$

Jadi Pb<sup>2+</sup> dalam larutan (x) dapat dicari dengan membandingkan

Massa Pb : Massa Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>

207 : 331

$$\text{X gram} = \frac{3}{2}$$

X gram = 1,599 gram

= 1,6 gram

Jumlah Pb<sup>2+</sup> dalam larutan :

$$= \frac{2}{3} \times 1,6 = 1 \text{ gram} = 1000 \text{ mg}$$

Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> ditimbang sebanyak 1,6 gram kemudian dilarutkan dengan air suling dalam labu ukur 1000 mL sampai tanda batas dan dikocok kemudian disimpan dalam botol, sehingga dalam 1 L larutan, konsentrasi ion Pb<sup>2+</sup> adalah 1000 ppm.

## 2. Penentuan Garis Regresi Linear Larutan Standar Timbal

No	Xi	Yi	(Xi-X)	(Yi-Y)	$(Xi - \bar{X})^2$	$(Yi - \bar{Y})^2$	(Xi-X) (Yi-Y)
1	0.0000	-0.0005	-0.8500	-0.0236	0.7225	0.00056	0.02003
2	0.1000	0.0048	-0.7500	-0.0183	0.5625	0.00033	0.01370
3	0.5000	0.0135	-0.3500	-0.0096	0.1225	0.00009	0.00335
4	1.0000	0.0270	0.1500	0.0039	0.0225	0.00002	0.00059
5	1.5000	0.0402	0.6500	0.0171	0.4225	0.00029	0.01113
6	2.0000	0.0534	1.1500	0.0303	1.3225	0.00092	0.03488
	<b>5.1000</b>	<b>0.1384</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.0000</b>	<b>3.1750</b>	<b>0.00221</b>	<b>0.08369</b>
rata2	0.8500	0.0231					

$$a = \frac{\{(X - \bar{X})(Y - \bar{Y})\}}{(X - \bar{X})^2}$$

$$= \frac{0,0}{3,1}$$

$$= 0,026359$$

$$b = Y - aX$$

$$= 0,0231 - (0,026359 \times 0,85)$$

$$= 0,000661$$

Jadi persamaan garis linear larutan standar timbal, adalah

$$Y = 0.02636X + 0,00066$$

Dari nilai tabel di atas dapat dihitung koefisien korelasinya yaitu :

$$r = \frac{\{(X - \bar{X})(Y - \bar{Y})\}}{\sqrt{\{(X - \bar{X})^2\} \{(Y - \bar{Y})^2\}}}$$

$$= \frac{0,0}{\sqrt{3,1} \times 0,0} = \frac{0,0}{\sqrt{0,0}} = \frac{0,0}{0,0} = 0,99916$$

### 3. Perhitungan Kadar Timbal (Pb) Dalam Sampel Air Sungai

Diketahui :  $y = ax + b$

y : absorban

a : 0,02636

b : 0,00066

x : Kadar timbal dalam sampel

jadi, 
$$x = \frac{y-0,0}{0,0}$$

$$\begin{aligned} X_A &= \frac{-0,0 - 0,0}{0,0} & X_D &= \frac{0,0 - 0,0}{0,0} \\ &= -0,1389 \text{ ppm} & &= 0,0773 \text{ ppm} \\ X_B &= \frac{0,0 - 0,0}{0,0} & X_E &= \frac{0,0 - 0,0}{0,0} \\ &= -0,0213 \text{ ppm} & &= 0,0634 \text{ ppm} \\ X_C &= \frac{-0,0 - 0,0}{0,0} \\ &= -0,0403 \text{ ppm} \end{aligned}$$

### 4. Perhitungan Batas Deteksi (LOD)

Batas deteksi dapat dihitung secara statistik melalui garis regresi linear dari kurva kalibrasi. Persamaan garis linear dari timbal yaitu:

$$Y = aX + b$$

$$Y = 0.02636X + 0.00066$$

No	Konsentrasi (ppm) (X)	Absorban (Y)	Yi	Y-Yi	(Y-Yi) <sup>2</sup>
1	0.0	-0.0005	0.000660000	-0.001160	0.0000013456
2	0.1	0.0048	0.003296000	0.001504	0.0000022620
3	0.5	0.0135	0.013840000	-0.000340	0.0000001156
4	1.0	0.0270	0.027020000	-0.000020	0.0000000004
5	1.5	0.0402	0.040200000	0.000000	0.0000000000
6	2.0	0.0534	0.053380000	0.000020	0.0000000004

Jumlah = 0.0000037240

$$\begin{aligned}
 SD &= \sqrt{\frac{\{(Y-Y)\}^2}{n-2}} \\
 &= \sqrt{\frac{0.0000037240}{6-2}} \\
 &= \sqrt{0.0000000931} \\
 &= 0.00009648
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 LOD &= \frac{3 \times S}{S} \\
 &= \frac{3 \times 0.0}{0.0} \\
 &= 0,01098 \text{ ppm}
 \end{aligned}$$

**Lampiran 3. Peraturan Menteri Kesehatan R.I No : 416/MENKES/PER/IX/1990  
Tanggal : 3 September 1990**

**DAFTAR PERSYARATAN KADAR ZAT KIMIA ANORGANIK AIR BERSIH**

NO	Parameter	Satuan	Kadar yang diperbolehkan
1	Air raksa	mg/l	0,001
2	Arsan	mg/l	0,05
3	Besi	mg/l	1,0
4	Flourida	mg/l	1,5
5	Kadmium	mg/l	0,005
6	Kesadanan (CaCO <sub>3</sub> )	mg/l	500
7	Klorida	mg/l	600
8	Kronium, valensi 6	mg/l	0,05
9	Mangan	mg/l	0,5
10	Nitrat	mg/l	10
11	Nitrit	mg/l	1,0
12	pH	mg/l	0,05
13	Selenium	mg/l	0,01
14	Seng	mg/l	15
15	Sianida	mg/l	0,1
16	Sulfat	mg/l	400
17	Timbal	mg/l	0,05

**Permenkes Nomor 492 Tahun 2010 Tanggal 19 april 2010**


**DAFTAR PERSYARATAN KADAR BAHAN ANORGANIK AIR MINUM**

NO	Jenis Parameter	Satuan	Kadar yang diperbolehkan
1.	Kimiawi		
a.	Bahan anorganik		
	Air raksa	mg/l	0,001
	Antimon	mg/l	0,02
	Barium	mg/l	0,7
	Boron	mg/l	0,5
	Molydenum	mg/l	0,007
	Nikel	mg/l	0,007
	Sodium	mg/l	200
	Timbalt organik	mg/l	0,01
	Uranium	mg/l	0,015
b.	Bahan organik		
	Zat organik (KmnO <sub>4</sub> )	mg/l	10

	Detergen	mg/l	0,05
	Chlorinated alkanes		
	Carbon tetrachlorite	mg/l	0,004
	Dicloromethane	mg/l	0.02
	1,2 – dikloroethane	mg/l	0,05
	Chlorinated ethanenes		
	1,2 dichloroethene	mg/l	0.05
	Trichloroethene	mg/l	0.02
	Tetrachloroethene	mg/l	0.04
	Aromatic hydrocarbon		
	Benzene	mg/l	0.01
	Toluene	mg/l	0.7
	Xylenes	mg/l	0.5
	Ethylbenzene	mg/l	0.3
	Styrene	mg/l	0.02
	Chlorinated benzenes		
	1,2 dichlorobenzenes	mg/l	1
	1,4-dichlorobenzene	mg/l	0.3
	Others	mg/l	
	Di(2-ethylhexyl) phthalate	mg/l	0.008
	Acrylamide	mg/l	0.0005
	Epichlorohydrin	mg/l	0.0004
	Hexachlorobutadiene	mg/l	0.0006

## LAMPIRAN 4

### Dokumentasi penelitian



Gambar 1. Sampel air Sungai Kelay

#### Keterangan

- A : Area Pertambangan
- B : 100 m dari tambang
- C : 500 m dari tambang
- D : 1 km dari tambang
- E : 1,5 km dari tambang




Gambar 2. Sampel yang telah dipreparasi



Gambar 3. Spektrofotometer Serapan Atom



Gambar 4. Pertambangan di tepi sungai Kelay



Gambar 5. Peta geologi pulau Kalimantan



Gambar 6. Peta geologi Kabupaten Berau



## BIOGRAFI



Rati Nur Ainna lahir pada 6 Nopember 1991 di Kabupaten Pinrang. Pada usia tiga tahun, anak kedua dari 3 bersaudara ini hijrah bersama keluarga ke Kalimantan Timur tepatnya Kota Tanjung Redeb Kabupaten Berau dan memulai pendidikan di SD Negeri 008 Tanjung Redeb, SMPN 1 Tg. Redeb dan menyelesaikan sekolah tingkat menengahnya di SMAN 1 Tg. Redeb pada tahun 2008.

Setelah melepas seragam putih abu-abu, Anak ke-2 dari pasangan Suami Istri M. Saleh (alm) dan Asisah pida ini kembali ke tanah Sulawesi menuntut ilmu untuk mendapatkan gelar sarjana farmasi dan membanggakan orang tua serta keluarga besar di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Dengan penyusunan skripsi ini penulis telah menyelesaikan pendidikan dan mendapat gelar Sarjana di Jurusan Farmasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2013.