

**UJI EFEK PENYEMBUHAN GEL EKSTRAK DAUN JARAK MERAH  
(*Jatropha gossypifolia* Linn.) TERHADAP LUKA SAYAT  
PADA KELINCI (*Oryctolagus cuniculus*)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi  
pada Fakultas Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

**NUR REZKI AMALIA K**  
**NIM. 70100111058**

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**2015**

**UJI EFEK PENYEMBUHAN GEL EKSTRAK DAUN JARAK MERAH  
(*Jatropha gossypifolia* Linn.) TERHADAP LUKA SAYAT  
PADA KELINCI (*Oryctolagus cuniculus*)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi  
pada Fakultas Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

**NUR REZKI AMALIA K**  
**NIM. 70100111058**

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**2015**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nur Rezki Amalia K  
NIM : 70100111058  
Tempat/Tanggal Lahir : Pangkajene, 01 Agustus 1993  
Jurusan : Farmasi  
Alamat : Jl.Manuruki 2 Lr.1 B, Makassar.  
Judul : Uji Efek Penyembuhan Gel Ekstrak Daun Jarak Merah  
(*Jatropha gossypifolia* Linn.) Terhadap Luka Sayat Pada  
Kelinci (*Oryctolagus cuniculus*).

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 2015

Penyusun,

**NUR REZKI AMALIA K**  
**NIM. 70100111058**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Uji Efek Penyembuhan Gel Ekstrak Daun Jarak Merah (*Jatropha gossypifolia* Linn.) Terhadap Luka Sayat Pada Kelinci (*Oryctolagus cuniculus*)” yang disusun oleh Nur Rezki Amalia K, NIM: 70100111058, mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, diuji dan dipertahankan dalam Ujian Munaqasah/ Sidang Skripsi yang diselenggarakan pada hari Jum’at 12 Juni 2015 M yang bertepatan dengan tanggal 25 Sya’ban 1436 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, 12 Juni 2015 M  
25 Sya’ban 1436 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Andi Armyn Nurdin, M.Sc.	(.....)
Sekretaris	: Surya Ningsi, S.Si., M.Si., Apt.	(.....)
Pembimbing I	: Surya Ningsi, S.Si., M.Si., Apt.	(.....)
Pembimbing II	: Andi Armisman Edy Paturusi, S.Farm, M.Si., Apt.	(.....)
Penguji I	: Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, M.Si., Apt.	(.....)
Penguji II	: Dr. Supardin, M.HI.	(.....)

Diketahui oleh:  
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar,

Dr. dr. Andi Armyn Nurdin, M.Sc.  
NIP. 19550203198312 1 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalāmu ‘alaikum warahmatullāhi wabarakātuh

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda Karhang S.Pd., Ibunda Murni dan saudara-saudariku, Nurhaedah S.Kep., Ns., Kurniawan S.Pd., Mustari Karhang, dan Muh. Ilham Akbar K, serta keluarga besarku yang tiada henti-hentinya mendoakan dan mencurahkan kasih sayangnya, yang selalu mendukung baik dari segi materi maupun non materi, sehingga skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya.

Ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga disampaikan kepada Bapak/ Ibu:

1. Prof. Dr. H. Musafir Pababari, M.Si. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar.
2. Dr. dr. Andi Armyn Nurdin, M.Sc..selakuDekan FakulasIlmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Fatmawaty Mallapiang, S.KM., M.Kes. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
4. Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, M.Si., Apt. selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar dan sekaligus selaku penguji kompetensi yang telah memberi banyak saran dan kritikan demi kesempurnaan skripsi ini.

5. Drs. Wahyudin G., M.Ag. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
6. Nursalam Hamzah, S.Si., M.Si., Apt. selaku Ketua Jurusan Farmasi UIN Alauddin Makassar
7. Surya Ningsi, S.Si., M.Si., Apt. selaku pembimbing pertama yang telah banyak meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Andi Armisman Edy Paturusi, S.Farm, M.Si., Apt. selaku pembimbing kedua yang telah banyak meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Dr. H. Supardin, M.HI. selaku penguji agama yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan dalam mengoreksi kekurangan pada skripsi ini.
10. Dosen serta seluruh staf Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar atas curahan ilmu pengetahuan dan segala bantuan yang diberikan sejak menempuh pendidikan di Jurusan Farmasi hingga terselesaikannya skripsi ini.
11. Kepada seluruh Laboran Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis selama penelitian.
12. Kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2011, kakak-kakak angkatan 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 dan 2005, serta adik-adik angkatan 2012, 2013 dan 2014 mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar atas segala bantuan dan kerjasama yang diberikan sejak menempuh pendidikan di Jurusan Farmasi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan, namun besar harapan kiranya dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya di bidang farmasi dan semoga bernilai ibadah di sisi Allah swt. amin.

Wassalāmu ‘alaikum warahmatullāhi wabarākātuh

Gowa, 2015

Penyusun,

**NUR REZKI AMALIA K**  
**NIM. 70100111058**

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK .....	xii
ABSTRACT .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian .....	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Kulit .....	11
B. Absorpsi Obat Melalui Kulit .....	13
C. Luka .....	17
D. Uraian Tanaman Jarak Merah .....	21
E. Metode Ekstraksi.....	24

F. Gel.....	26
G. Uraian Hewan Coba .....	29
H. Tanaman Obat dalam Pandangan Islam.....	30
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	37
B. Pendekatan Penelitian .....	37
C. Sampel.....	37
D. Metode Pengumpulan Data .....	38
E. Instrumen Penelitian .....	41
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	41
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian.....	42
B. Pembahasan.....	42
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	49
B. Implikasi Penelitian .....	49
KEPUSTAKAAN .....	50
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	53
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	66

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Rancangan Formula Gel Ekstrak Etanol Daun Jarak Merah ( <i>Jatropha gossypifolia</i> Linn.) .....	39
2. Efek Penyembuhan Luka Sayat .....	42
3. Perubahan Panjang Luka Sayat .....	56
4. PersentasePerubahan Panjang Luka Sayat .....	57
5. Hubungan Antara Formula Dan Kecepatan Penyembuhan Luka.....	58
6. Analisis Ragam dengan F-Tabel.....	59
7. RAL, BNT Hubungan antara Formula dan Kecepatan Penyembuhan Luka.	60

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Tanaman Jarak Merah ( <i>Jatropha gossypifolia</i> Linn.).....	21
2. Skema Ekstraksi Daun Jarak Merah ( <i>Jatropha gossypifolia</i> Linn.) .....	53
3. Pembuatan Gel Ekstrak Etanol Daun Jarak Merah ( <i>Jatropha gossypifolia</i> Linn.).....	54
4. Skema Kerja Pengujian Penyembuhan Luka .....	55
5. Gambar Daun Jarak Merah ( <i>Jatropha gossypifolia</i> Linn.) .....	61
6. Foto Ekstrak Etanol Daun Jarak Merah ( <i>Jatropha gossypifolia</i> Linn.) .....	62
7. Gambar Sediaan Gel Ekstrak Etanol Daun Jarak Merah ( <i>Jatropha</i> <i>gossypifolia</i> Linn.) dengan Variasi Konsentrasi dan Kontrol Negatif .....	63
8. Foto Hari Pertama Luka Sayat Pada Kelinci .....	63
9. Foto Luka Mulai Merapat .....	64
10. Foto Saat Terbentuk Keropeng .....	64
11. Foto Saat keropeng Terlepas .....	65

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Ekstraksi daun Jarak Merah ( <i>Jatropha gossypifolia</i> Linn.) .....	53
2. Pembuatan Gel Ekstrak Etanol Daun Jarak Merah.....	54
3. Skema Kerja Pengujian Penyembuhan Luka .....	55
4. Perubahan Panjang Luka Sayat .....	56
5. Presentase Perubahan Panjang Luka Sayat .....	57
6. Perhitungan RAL, Hubungan Antara Formula dan Kecepatan Penyembuhan Luka .....	58
7. Gambar Daun Jarak Merah ( <i>Jatropha gossypifolia</i> Linn.) .....	61
8. Dokumentasi Penelitian.....	62

## ABSTRAK

Nama :Nur Rezki Amalia K

NIM :70100111058

Judul :Uji Efek Penyembuhan Gel Ekstrak Daun Jarak Merah (*Jatropha gossypifolia* Linn.) Terhadap Luka Sayat Pada Kelinci (*Oryctolagus cuniculus*)

---

Telah dilakukan penelitian tentang Uji Efek Penyembuhan Gel Ekstrak Daun Jarak Merah (*Jatropha gossypifolia* Linn.) terhadap Luka Sayat pada Kelinci (*Oryctolagus cuniculus*) dengan tujuan untuk mengetahui konsentrasi optimum ekstrak etanol daun Jarak Merah (*Jatropha gossypifolia* Linn.) pada sediaan gel yang dapat menyembuhkan luka sayat pada kelinci (*Oryctolagus cuniculus*).

Metode penelitian meliputi ekstraksi sampel secara maserasi, formulasi gel dengan variasi konsentrasi ekstrak etanol daun Jarak Merah (*Jatropha gossypifolia* Linn.) yaitu 1 %, 3%, 5%, dan kontrol negatif (Gel basis tanpa ekstrak), uji efek penyembuhan pada kulit kelinci yang telah diberikan perlakuan sayatan pada kulit untuk semua formula, kontrol positif (Bioplacenton<sup>®</sup>) dan kontrol negatif (Gel basis tanpa ekstrak).

Hasil penelitian diperoleh bahwa hewan coba yang diberikan gel dengan kandungan ekstrak 1%, 3%, 5%, kontrol positif (Bioplacenton<sup>®</sup>) dan kontrol negatif (Gel basis tanpa ekstrak) memberikan efek penyembuhan rata-rata berturut-turut pada hari ke-11,33, ke-9,67, ke-9,33, ke-10,33 dan ke-12,33. Dari hasil uji statistik Rancangan Acak Lengkap (RAL) dan uji Beda Nyata Terkecil (BNT) dapat disimpulkan bahwa sediaan gel ekstrak etanol daun Jarak Merah pada konsentrasi 3% memberikan efek yang optimum dalam penyembuhan luka sayat.

Kata Kunci : Gel, Jarak Merah, Luka Sayat.

## ABSTRACT

Nama : Nur Rezki Amalia K  
NIM : 70100111058  
Judul : Wound Healing Assay of Bellayache Bush Leaf Extract (*Jatropha gossypifolia* Linn.) on Rabbit (*Oryctolagus cuniculus*) Cut.

---

A research of Wound Healing Assay of Bellayache Bush Leaf Extract (*Jatropha gossypifolia* Linn.) on Rabbit (*Oryctolagus cuniculus*) Cut has been conducted. This study aims to know the optimum concentration of bellayache bush leaf ethanolic extract (*Jatropha gossypifolia* Linn.) in gel that can heal cuts in rabbits (*Oryctolagus cuniculus*).

The procedure begins with the extraction of sample by maceration, gel formulations with different concentration of bellayache bush leaf ethanolic extract (*Jatropha gossypifolia* Linn.) were 1%, 3%, 5% and negative control (Gel base without extract), wound healing assay on rabbit skin which has been cuts is done for all of formulas, positive control (Bioplacenton<sup>®</sup>) and negative control (Gel base without extract).

From the research, the results obtained, experimental animals were given a gel containing extract 1%, 3%, 5%, positive control (Bioplacenton<sup>®</sup>) and negative control (Gel base without extract) give the wound healing effect on 11.33th, 9.67th, 9.33th, 10.33th and 12.33th respectively. the result of statistical completely randomized design (CRD) test and the least significant difference (LSD) test can be concluded that gel with 3% of bellayache bush leaf ethanolic extract give optimum effect in healing cuts.

Keywords : Gel, *Jatropha gossypifolia* Linn., Healing cuts.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### ***A. Latar Belakang Masalah***

Kulit merupakan organ tubuh yang penting yang merupakan permukaan luar organisme dan membatasi lingkungan luar. Mempunyai fungsi melindungi jaringan terhadap kerusakan mekanik dan terhadap masuknya mikroorganisme, mencegah terjadinya pengeringan berlebihan, akan tetapi penguapan air secukupnya tetap terjadi (*perspiration insensibilis*), bertindak sebagai pengatur panas dengan melakukan konstriksi dan dilatasi pembuluh darah kulit serta pengeluaran keringat, dan bertindak sebagai alat pengindra dengan reseptor yang dimilikinya yaitu reseptor tekan, suhu, dan nyeri (Mutschler, 1991: 577). Salah satu fungsi kulit yang sangat berperan adalah sebagai perlindungan yang sangat efektif terhadap invasi bakteri dan benda asing lainnya (Smeltzer, 2002: 1828).

Adanya gangguan terhadap kulit seperti luka akan mempengaruhi fungsi kulit itu sendiri. Luka merupakan hilang atau rusaknya sebagian jaringan kulit yang dapat disebabkan oleh trauma tajam atau tumpul, perubahan suhu, zat kimia, ledakan, sengatan listrik, atau gigitan hewan (Pusponegoro, 1997: 72).

Luka yang terjadi dapat berupa kerusakan pada epidermis saja, mengenai epidermis dan sebagian dermis bahkan menembus kulit melampaui dermis hingga mencapai jaringan subkutan, otot, bahkan tulang tergantung faktor penyebab

terjadinya luka. Dalamnya luka akan mempengaruhi kerusakan atau gangguan integritas kulit dan kematian sel-sel (Judd, 2007: 13).

Luka sayat merupakan suatu bentuk kerusakan atau kehilangan jaringan tubuh yang disebabkan oleh benda tajam. Luka sayat merupakan jenis luka akut. Luka sayat dapat menimbulkan pendarahan yang melibatkan peran hemostatis dan akhirnya terjadi peradangan (Khaerunnisa, 2014: 16).

Luka yang menimpa seseorang dapat dikatakan suatu musibah yang merupakan cobaan dari Allah swt. karena terjadi akibat kecelakaan yang tidak disengaja. Obat-obatan tidak lagi dipandang sebagai penyebab langsung bagi kesembuhan dari suatu penyakit. Namun, pengobatan tetaplah dianjurkan digunakan untuk menghilangkan sebab suatu penyakit dan dengan segala rahmat-Nya Allah menurunkan penyakit sekaligus obatnya. Obat itupun menjadi rahmat dan keutamaan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya, sebagaimana Firman Allah swt. yang menjelaskan bahwa ayat Al-Qur'an itu adalah obat dalam QS. al Israa'/17: 82.


 وَنُنزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

Terjemahnya :

Dan Kami turunkan dari Al-Qur'an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al-Qur'an itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian (Departemen Agama RI, 2002: 437).

Dari ayat di atas, telah menunjukkan bahwa al-Qur'an dapat dijadikan sebagai suatu obat penawar bagi segala macam penyakit ruhani (hati) manusia, dan terkadang juga, dapat dijadikan sebagai obat penawar bagi penyakit jasmani. Namun, hanya yang bersifat psikosomatik saja. Hal ini didukung adanya hadis Nabi saw. bersabda:

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً (رواه البخاري)

Artinya :

“Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia juga menurunkan obatnya”  
(H.R. al-Bukhariy, VII: 12).

Setiap penyakit yang diturunkan oleh Allah swt. ada obatnya, maka wajib bagi kita untuk berobat dan setiap pengobatan itu harus disesuaikan dengan penyakitnya. Kesembuhan seseorang dari penyakit yang diderita memang Allah swt., yang menyembuhkan, akan tetapi Allah swt. memerintahkan kita untuk berobat dan melarang kita pasrah tanpa melakukan usaha dan ikhtiar maksimal. Karena usaha dan ikhtiar dalam berobat sama sekali tidak bertentangan dengan sikap tawakkal. Allah pun menghendaki agar pengobatan itu dipelajari oleh ahlinya agar sesuai dengan penyakit yang akan diobati sehingga akan mendorong kesembuhan, hal ini secara empiris daun Jarak Merah digunakan sebagai obat luka sayat.

Penggunaan obat tradisional pada masyarakat telah berlangsung lama secara turun temurun. Indonesia memiliki banyak jenis tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber bahan obat. *Jatropha gossypifolia* Linn. atau biasa dikenal dengan nama jarak merah merupakan tanaman liar yang tumbuh tanpa perawatan khusus. Jarak merah memiliki banyak kandungan kimia diantaranya antrakuinon, flavonoid, phlobatannin, fenolat, saponin, tanin dan terpenoid (Khyade MS *et al*, 2011: 178). Hasil skrining fitokimia ditemukan bahwa ekstrak petroleum eter mengandung steroid, lemak dan minyak tetap; ekstrak air terkandung karbohidrat, asam amino, steroid, flavonoid, alkaloid, glikosida, dan tanin. Ekstrak etanol juga menunjukkan hasil yang hampir sama dengan ekstrak air (Jain *et al*, 2012: 1426).

Tanaman jarak merah digunakan masyarakat secara empiris di daerah Pangkep sebagai obat seperti luka sayatan pisau atau benda tajam lainnya dengan cara menghaluskan daun jarak merah atau mengambil getahnya dan ditempelkan pada bagian yang terkena luka.

Tanaman jarak merah untuk mengobati beberapa macam penyakit. Getah batang berkhasiat untuk menghentikan pendarahan dan gatal-gatal dari luka dan goresan. Sementara itu daunnya digunakan untuk mengobati luka, keseleo, ruam dan rasa sakit. Ekstrak dari daun segar diaplikasikan dengan cara menghancurkan daun lalu digunakan untuk menghentikan pendarahan pada hidung dan kulit. Di Nigeria, ekstrak dari daun segar diaplikasikan dengan cara dihancurkan, yang secara rutin digunakan oleh herbalis dan masyarakat lokal untuk menghentikan pendarahan pada kulit dan hidung (Karthikeyan *et al*, 2012: 256). Daun jarak merah digunakan untuk pengobatan dari sejumlah penyakit termasuk pembersih darah, antiseptik, borok, bisul, eksim, dan padaluka di lidah anak-anak, serta daunnya digunakan untuk mengobati payudara yang bengkak dan sebagai obat penurun panas. Daun efektif sebagai obat pencahar dan obat perut, dan daun digunakan dalam demam intermiten. Berbagai penelitian telah dilakukan dengan daun dan organ lainnya dari *Jatropha gossypifolia* Linn. sebagai antibakteri, anti-koagulan, anti-inflamasi, analgesik (Khyade MS *et al*, 2011: 177). Dari hasil uji kualitatif ditemukan berbagai senyawa kimia seperti antarkuinon, flavanoid, flobatanin, fenolik, dan lain-lain, dimana senyawa-senyawa inilah yang membuat suatu tanaman memiliki potensi sebagai obat bagi manusia. Hal ini karena tiap senyawa memiliki aktivitas farmakologi yang

berbeda- beda, adanya kandungan tanin dan senyawa fenolik yang memiliki sifat sebagai antiseptik, sehingga tanaman ini dapat digunakan untuk pengobatan berbagai penyakit. Flavanoid adalah kelompok senyawa polifenol dengan sifat yang di kenal sebagai anti radikal bebas, dan penghambatan enzim hidrolitik dan anti-inflamasi (Khyade MS *et al*, 2011: 178). Tanin diketahui memiliki kemampuan sebagai astringen, menghentikan pendarahan dan mencegah infeksi selama menyembuhkan luka internal, sedangkan saponin mempunyai kemampuan sebagai pembersih dan mampu memicu pembentukan kolagen yang merupakan suatu protein yang berperan dalam penyembuhan luka (Tenripadang, 2012: 3).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ekstrak daun jarak merah (*Jatropha gossypifolia* Linn.) mengandung sejumlah alkaloid, steroid, zat fenolik dan vitamin C (asam askorbat), saponin dan karbohidrat, berdasarkan eksplorasi skrining fitokimia begitu pula untuk jumlah jejak glikosida dan resin, dilakukan untuk mengeksplorasi *bioefficiency*-nya. Penelitian ini menggunakan metode membran stabilisasi Human Red Blood Cell (HRBC) untuk penyaringan. Hasil penelitian menunjukkan ekstrak metanol *Jatropha gossypifolia* Linn. menunjukkan persentase lisis dari 19,1% untuk 100 mg/mL diikuti oleh 1,6% untuk 200 mg/mL ekstrak metanol. Sedangkan ekstrak dalam medium berair menunjukkan 14,2% untuk 100 mg/mL dan 56,8% untuk 200 mg/mL. Oleh karena itu penelitian ini menyimpulkan ekstrak metanol dari *Jatropha gossypifolia* Linn. secara signifikan memiliki aktivitas terhadap (perlindungan membran) dimana aktivitas anti inflamasi

mungkin hadir karena alkaloid atau steroid dalam medium alkohol dan ekstrak dalam medium air *Jatropha gossypifolia* Linn. (Nagaharika *et al*, 2013: 158).

Penggunaan daun jarak merah dalam penyembuhan luka belum maksimal, karena penggunaannya yang kurang praktis jika harus disiapkan dan diberikan langsung. Oleh karena itu perlu dikembangkan suatu formula yang dapat memudahkan penggunaannya seperti gel. Bentuk sediaan ini lebih mudah digunakan dan penyebarannya di kulit lebih cepat. Selain itu gel mempunyai sifat yang menyejukkan, melembabkan, mudah berpenetrasi pada kulit sehingga memberikan efek penyembuhan.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, maka dilakukan penelitian tentang uji efek penyembuhan gel ekstrak daun jarak merah (*Jatropha gossypifolia* Linn.) terhadap luka sayat pada kelinci (*Oryctolagus cuniculus*).

### **B. Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang kemudian timbul dari latar belakang, yaitu:

1. Apakah gel ekstrak etanol daun Jarak Merah (*Jatropha gossypifolia* Linn.) dapat berefek menyembuhkan luka sayat pada kelinci (*Oryctolagus cuniculus*)?
2. Berapakah konsentrasi optimum ekstrak etanol daun Jarak Merah (*Jatropha gossypifolia* Linn.) dalam sediaan gel yang memiliki efektifitas menyembuhkan luka sayat pada kelinci (*Oryctolagus cuniculus*)?
3. Bagaimana pandangan Islam terhadap implementasi manfaat tanaman dalam pengobatan?

### ***C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian***

#### **1. Definisi operasional**

- a. Ekstrak etanol daun jarak merah (*Jatropha gossypifolia* Linn.) adalah sediaan kental yang diperoleh dari mengekstraksi simplisia menggunakan pelarut etanol 70%.
- b. Luka sayat merupakan luka akibat sayatan yang terjadi pada kulit, yang ditandai dengan tepi luka berupa garis lurus dan beraturan.
- c. Pemberian sediaan gel dimaksudkan untuk memaksimalkan penggunaan daun jarak merah (*Jatropha gossypifolia* Linn.) dalam penyembuhan luka, karena sediaan gel mudah digunakan dan penyebarannya di kulit lebih cepat, selain itu gel mempunyai sifat yang menyejukkan, melembabkan, mudah berpenetrasi pada kulit sehingga memberikan efek penyembuhan
- d. Kelinci merupakan hewan yang biasa digunakan dalam penelitian karena perkembang biakannya cepat, mudah dipelihara, sifat anatomi fisiologinya terkarakterisasi dengan baik.

#### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Disiplin ilmu yang terkait dengan penelitian ini adalah uji efek penyembuhan ekstrak daun jarak merah (*Jatropha gossypifolia* Linn.) Terhadap luka sayat pada kelinci (*Oryctolagus cuniculus*) dalam bentuk sediaan gel.

### ***D. Kajian Pustaka***

1. Khyde MS dan Vaikos NP, Penelitian ini berkaitan dengan evaluasi pharmacognostical dan fitokimia daun *Jatropha gossypifolia* L.

(Euphorbiaceae). Macromorphology, mikroskop (bagian melintang, reaksi warna histokimia dan kuantitatif mikroskop) dan komponen fitokimia dipelajari untuk membangun karakter diagnostik penting.

2. Yerramsetty Nagaharika, Valluri Kalyani, Shaik Rasheed, Ramados Karthikeyan, Penelitian ini berkaitan dengan aktivitas anti-inflamasi dari daun *Jatropha gossypifolia* Linn. dengan metode Human Red Blood Cell (HRBC) stabilisasi membran. Hasil penelitian menunjukkan ekstrak metanol *Jatropha gossypifolia* Linn. Menunjukkan persentase lisis dari 19,1% untuk 100 mg/mL diikuti oleh 1,6% untuk 200 mg/mL ekstrak metanol. Sedangkan ekstrak air menunjukkan 14,2% untuk 100 mg/mL dan 56,8% untuk 200 mg/mL. Oleh karena itu penelitian ini menyimpulkan ekstrak metanol dari *Jatropha gossypifolia* Linn diproduksi aktivitas yang signifikan (perlindungan membran) aktivitas antiinflamasi mungkin karena hadir alkaloid atau steroid dalam alcohol dan berair ekstrak *Jatropha gossypifolia* Linn.
3. Santy La Ananila, Pengaruh Jenis Basis Gel Ekstrak Etanol Daun Kelor (*Moringa oleifera* Lamk.) Terhadap Efektifitas Penyembuhan Luka Insisi Pada Kelinci (*Oryctolagus cuniculus*), membandingkan basis gel HPMC dan Carbopol 940 terhadap efektifitas penyembuhan luka insisi pada kelinci (*Oryctolagus cuniculus*) dan hasil yang diperoleh jenis basis gel tidak berpengaruh terhadap efektifitas penyembuhan luka insisi pada kelinci (*Oryctolagus cuniculus*). Jadi penelitian ini menggunakan formulasi dengan

basis carbopol 940 karena dalam konsentrasi rendah yaitu 0,5%-2,0% dapat berfungsi sebagai pembentuk gel yang transparan dan penambah viskositas.

## **E. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan**

Berdasarkan dari permasalahan yang dikemukakan di atas, maka dapat ditetapkan tujuan dari penelitian ini, antara lain:

- a. Mengetahui efek penyembuhan luka sayat gel ekstrak etanol daun Jarak Merah (*Jatropha gossypifolia* Linn.) pada kelinci (*Oryctolagus cuniculus*).
- b. Menentukan konsentrasi optimum ekstrak etanol daun Jarak Merah (*Jatropha gossypifolia* Linn.) pada sediaan gel yang dapat menyembuhkan luka sayat pada kelinci (*Oryctolagus cuniculus*).
- c. Mengetahui kedudukan tanaman-tanaman obat yang bermanfaat dalam Islam untuk menunjang kesehatan.

### **2. Kegunaan**

Penelitian ini diharap memberikan manfaat, yaitu:

- a. Menambah informasi bagi masyarakat tentang khasiat penggunaan daun Jarak Merah (*Jatropha gossypifolia* Linn.) dalam menyembuhkan luka sayat.
- b. Mendapatkan tingkat konsentrasi optimum daun Jarak Merah (*Jatropha gossypifolia* Linn.) untuk menyembuhkan luka sayat.
- c. Memperkaya khazanah ilmiah tanaman Indonesia yang bermanfaat dalam Islam untuk menunjang kesehata

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORITIS**

#### ***A. Kulit***

Kulit merupakan organ tubuh yang penting yang merupakan permukaan luar organisme dan membatasi lingkungan luar. Mempunyai fungsi melindungi jaringan terhadap kerusakan mekanik dan terhadap masuknya mikroorganisme, mencegah terjadinya pengeringan berlebihan, akan tetapi penguapan air secukupnya tetap terjadi (*perspiration insensibilis*), bertindak sebagai pengatur panas dengan melakukan konstriksi dan dilatasi pembuluh darah kulit serta pengeluaran keringat, dan bertindak sebagai alat pengindra dengan reseptor yang dimilikinya yaitu reseptor tekan, suhu, dan nyeri (Mutschler, 1991: 577).

Seluruh tubuh manusia ditutupi oleh lapisan selimut atau sawar yang disebut kulit. Kulit tersebut memiliki fungsi besar sebagai pelindung atau proteksi dari berbagai macam gangguan dan rangsangan yang terjadi di luar tubuh (Trenggono, 2007: 11).

#### **1. Fungsi kulit**

Fungsi perlindungan ini terjadi melalui sejumlah mekanisme biologis, seperti pembentukan lapisan tanduk secara terus-menerus (keratinisasi dan pelepasan sel-sel yang sudah mati), respirasi dan pengaturan suhu tubuh, produksi sebum dan keringat, dan pembentukan pigmen melanin untuk melindungi kulit dari bahaya sinar ultraviolet matahari, sebagai peraba dan perasa, serta pertahanan terhadap tekanan dan infeksi dari mikroba. Selain itu, kulit merupakan suatu kelenjar holokrin yang besar (Trenggono, 2007: 11).

Namun secara umum fungsi kulit adalah :

a. Fungsi proteksi

Menjaga bagian dalam tubuh terhadap gangguan fisik misalnya tekanan, gesekan, tarikan, gangguan kimiawi, misalnya zat-zat kimia terutama yang bersifat iritan, gangguan yang bersifat panas, misalnya radiasi, sengatan UV, gangguan infeksi luar terutama kuman maupun jamur.

b. Fungsi absorpsi

Kulit yang sehat tidak mudah menyerap air, larutan dan benda padat, tetapi cairan yang mudah menguap lebih mudah diserap, begitupun yang larut lemak.

c. Fungsi ekskresi

Kelenjar-kelenjar kulit mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna lagi atau sisa metabolisme dalam tubuh berupa NaCl, urea, asam urat dan ammonia.

d. Fungsi persepsi

Kulit mengandung ujung-ujung syaraf sensorik di dermis dan subkutis. Terhadap dingin oleh badan Krause. Rabaan diperankan oleh taktil meissner. Terhadap tekanan diperankan oleh badan *vates paccini*.

e. Fungsi pengaturan suhu tubuh

Kulit melakukan peranan ini dengan cara mengeluarkan keringat dan mengerutkan (otot berkontraksi) pembuluh darah kulit.

f. Fungsi pembentukan pigmen

Sel pembentuk pigmen (melanosit) terletak dilapisan basal dan sel ini berasal dari rigi syaraf (Rahman, 2010: 5-6).

## 2. Anatomi fisiologi kulit

Luas kulit pada manusia kira-kira  $\pm$  2 meter persegi, dengan berat 10 kg jika dengan lemaknya atau 4 kg jika tanpa lemak. Kulit terbagi atas tiga lapisan utama, yaitu :

- a. Epidermis (kulit ari), sebagai lapisan paling luar
- b. Dermis (korium, kutis, kulit jangat)
- c. Di bawah dermis terdapat subkutis atau jaringan lemak bawah kulit.

Para ahli histologi membagi epidermis dari bagian terluar hingga ke dalam menjadi 5 lapisan, yakni :

- a. Lapisan tanduk (*stratum corneum*), sebagai lapisan paling atas
- b. Lapisan jernih (*stratum lucidum*), disebut juga “lapisan barrier”
- c. Lapisan berbutir-butir (*stratum granulosum*)
- d. Lapisan malphigi (*stratum spinosum*) yang selnya seperti berduri
- e. Lapisan basal (*stratum germinativum*) yang hanya tersusun oleh satu lapisan sel sel basal (Trenggono, 2007: 12).

### **B. Absorpsi Obat Melalui kulit**

Mekanisme kerja obat terjadi ketika bertemu dengan reseptor yang sesuai dengan senyawa komponen dalam obat itu. Absorpsi obat melalui kulit merupakan upaya untuk menghantarkan senyawa dalam obat untuk bertemu dengan reseptornya yang ada di kulit tanpa harus melewati saluran gastrointestinal (peroral). Absorpsi bahan dari luar kulit menuju hingga ke bawah kulit yang tercakup dalam aliran darah, disebut absorpsi perkutan. Umumnya, absorpsi perkutan dari bahan obat ada

pada preparat dermatologi, seperti cairan, gel, salep, krim, dan pasta, yang tidak hanya tergantung pada sifat kimia fisika dari bahan obat apa saja, tapi juga pada sifat apabila dimasukkan ke dalam bahan pembawa dalam sediaan farmasetik.

Perlu dipahami bahwa bahan pembawa dalam sediaan farmasetik tidak dapat lebih jauh menembus kulit atau pembawa bahan obat melalui kulit, terhadap kadar dan tingkat penembus kulit, pembawa tidak mempengaruhi laju dan derajat penetrasi zat obat, dan derajat serta laju penetrasi variasi dengan berbedanya obat dan pembawa. Oleh karena itu, untuk absorpsi obat perkutan dan tingkat efikasi terapi yang dihasilkan, maka setiap kombinasi pembawa dalam suatu sediaan obat, harus diuji dan terbukti secara saintifik sendiri-sendiri (Ansel, 2008: 490).

Melalui penelitian yang terus mengalami kemajuan, maka muncul adanya hipotesis yang menganggap bahwa obat dapat mengalami penetrasi melewati kulit yang utuh setelah pemakaian topikal melalui dinding folikel rambut, kelenjar keringat, kelenjar lemak, atau antar sel dari selaput tanduk. Seharusnya bahan obat yang dipakai mudah memasuki kulit yang rusak atau pecah, akan tetapi penetrasi semacam itu bukan merupakan proses absorpsi perkutan yang benar (Ansel, 2008: 491). Penetrasi obat umumnya melalui lapisan epidermis. Komponen lemak menjadi faktor utama tinggi rendahnya penetrasi obat melalui kulit.

Kulit yang utuh, akan memudahkan penetrasi obat melalui lapisan epidermis di mana hal ini merupakan jalur yang lebih baik dari pada melalui folikel rambut atau kelenjar keringat. Ini disebabkan luas permukaan yang lebih rendah jika dibanding kulit yang tidak mengandung elemen anatomi. Lebih lanjut, selaput yang menutupi

lapisan tanduk umumnya tidak terus menerus dan tidak mempunyai daya tahan terhadap penetrasi, karena pada susunan dari bermacam-macam selaput dengan proporsi dan keringat yang diproduksi dan derajat daya pelepasnya melalui pencucian atau penguapan keringat (Ansel, 2008: 492).

Absorpsi obat yang terjadi melalui kulit disandarkan pada prinsip difusi pasif, yaitu proses pergerakan suatu substansi dari daerah satu ke daerah lain dengan mengalami penurunan tingkat gradien yang diikuti Bergeraknya molekul. Prinsip tersebut bertentangan dengan difusi aktif yang menyatakan bahwa terjadinya pergerakan substansi didasari dari adanya tekanan yang berbeda dari kadar tinggi ke kadar rendah. Terjadinya difusi pasif ini, menurut Martin (1971), didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. konsentrasi obat, di mana semakin besar konsentrasi substansi obat, maka proses difusi dapat berjalan semakin baik;
- b. koefisien partisi, dapat dilihat pada perbandingan konsentrasi dalam dua fase, menyatakan makin besar koefisien partisi, difusi obat makin cepat;
- c. koefisien difusi, berdasarkan pada tingkat keluasan membran yang akan semakin mendukung laju difusi obat;
- d. viskositas, besaran nilainya berbanding lurus dengan koefisien difusi dan berbanding terbalik dengan laju difusi; dan
- e. ketebalan membran, yang berdampak pada perlambatan laju difusi bila tingkat ketebalan membran semakin besar.

Stratum korneum dengan ketebalan 10 – 15 mikrometer menjadi salah satu ornamen dalam proses absorpsi percutan bagi obat, di mana dengan ketebalan pada lapisan datarnya tersebut dapat mengeringkan sebagian demi sebagian jaringan mati yang membentuk permukaan kulit paling luar. Pada lapisan stratum korneum sendiri, terdiri dari kurang lebih 40% protein dan 40% air, dengan sisanya berupa lemak (trigliserida, asam lemak bebas, kolesterol dan fosfat lemak). Kandungan lemak ini dipatkan dalam fase ekstra seluler yang akan membentuk membran dan mengelilingi sel.

Komponen lemak dipandang sebagai faktor utama yang bertanggung jawab secara langsung terhadap rendahnya penetrasi obat melalui stratum korneum. Molekul obat yang melalui stratum korneum dapat terus masuk melalui jaringan epidermis yang lebih dalam dan masuk ke dalam dermis. Apabila obat mencapai lapisan pembuluh kulit, maka obat tersebut siap untuk diabsorpsi ke dalam sirkulasi umum.

Sebagai jaringan keratin, stratum korneum bekerja sebagai membran buatan yang semi permeabel, lalu membuat molekul obat harus mengalami penetrasi secara difusi pasif. Sehingga jumlah molekul obat yang pindah menyeberangi lapisan kulit tergantung pada konsentrasi, kelarutan, dan koefisien partisi baik minyak atau air. Bahan-bahan yang mempunyai sifat larut dalam keduanya, minyak dan air, merupakan bahan yang baik untuk melakukan difusi melalui stratum korneum, sebagaimana absorpsi melalui epidermis dan lapisan-lapisan kulit lainnya (Ansel, 2008: 492).

Penetrasi obat melewati kulit dapat terjadi dengan dua cara :

1. **Rute trans-epidermal**, yaitu difusi obat menembus stratum korneum. Terdiri dari rute *trans-seluler* dan rute *intra-seluler*. Rute *trans-seluler* merupakan jalur terpendek dimana bahan obat melewati membran lipid maupun korneosit, tetapi rute ini memiliki resistansi yang besar terhadap penetrasi. Rute yang lebih umum adalah melalui rute interseluler. Bahan obat melintasi membran lipid antara korneosit
2. **Rute transfolikular (*trans-appendageal*)**, yaitu difusi obat melewati pori kelenjar keringat dan sebum. Rute yaitu melalui kelenjar dan folikel rambut memiliki kontribusi yang kecil terhadap penetrasi perkutan (Walters K.A, 2002: 103).

### **C. Luka**

#### **1. Definisi Luka**

Luka adalah keadaan hilangnya kontinuitas jaringan tubuh. Luka merupakan salah satu akibat trauma yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya disebabkan oleh sengatan listrik, ledakan, gigitan hewan dan oleh trauma benda tumpul maupun benda tajam (Rahayu, dkk, 2009: 1).

Luka sayat merupakan suatu bentuk kerusakan atau kehilangan jaringan tubuh yang disebabkan oleh benda tajam. Luka sayat disebut juga luka insisi yang merupakan jenis luka akut. Luka sayat dapat menimbulkan pendarahan yang melibatkan peran hemostatis dan akhirnya terjadi peradangan (Khairunnisa, 2014: 16).

Klasifikasi luka berdasarkan waktu terjadinya luka dapat dibagi menjadi luka kontaminasi dan luka infeksi. Pembagian luka ini berdasarkan waktu kontaminasi (golden periode) yaitu 6-8 jam dimana setelah waktu 6-8 jam setelah terjadi luka maka bakteri yang ada telah mencapai koloni tertentu dan mengadakan invasi ke dalam jaringan sekitar luka atau pembuluh darah. Pada kondisi ini luka disebut sebagai luka infeksi. Berdasarkan lama waktu penyembuhannya, luka dibagi menjadi luka akut dan luka kronis. Luka akut adalah luka trauma yang biasanya segera mendapat penanganan dan biasanya dapat sembuh dengan baik bila tidak terjadi komplikasi. Kriteria luka akut adalah luka baru, mendadak dan penyembuhannya sesuai dengan waktu yang diperkirakan. Contohnya adalah luka sayat, luka bakar, luka tusuk. Sedangkan luka kronis adalah luka yang berlangsung lama atau sering timbul kembali (rekuren) atau terjadi gangguan pada proses penyembuhan yang biasanya disebabkan oleh masalah multi faktor dari penderita. Pada luka kronis luka gagal sembuh pada waktu yang diperkirakan, tidak berespon baik terhadap terapi dan punya tendensi untuk timbul kembali. Contohnya adalah ulkus tungkai, ulkus vena, ulkus arteri (iskemi), penyakit vaskular perifer ulkus dekubitus, neuropati perifer ulkus dekubitus (David, 1996: 917)

## **2. Penyembuhan luka**

Rangsang eksogen dan endogen dapat menimbulkan kerusakan sel, dan selanjutnya memicu reaksi vaskuler kompleks pada jaringan ikat yang ada pembuluh darahnya. Reaksi inflamasi berguna sebagai proteksi terhadap jaringan yang mengalami kerusakan untuk tidak mengalami infeksi dan meluas tak terkendali.

Proses inflamasi sangat erat berhubungan dengan penyembuhan luka. Tanpa adanya inflamasi tidak akan terjadi proses penyembuhan luka, luka akan tetap menjadi sumber nyeri sehingga proses inflamasi dan penyembuhan luka akan cenderung menimbulkan nyeri.

Proses inflamasi terjadi pada jaringan ikat dengan pembuluh darah yang mengandung plasma, sel yang bersirkulasi, elemen seluler dan ekstra seluler jaringan pengikat. Komponen seluler adalah eritrosit, leukosit (netrofil, eosinofil, basofil), monosit, limfosit, trombosit, sedangkan sel jaringan pengikat adalah sel mast, *fibroblast*, monosit, makrofag dan limfosit. Elemen ekstra seluler antara lain kolagen, elatin, glikoprotein adesif (fibronektin, laminin, kolagen non fibril, tenasen, proteoglikan).

Proses penyembuhan luka terjadi pada awal inflamasi, selanjutnya akan bersamaan, dalam proses inflamasi terjadi kerusakan, pelarutan dan penghancuran sel atau agen penyebab kerusakan sel. Pada saat yang sama terjadi proses reparasi, proses pembentukan kembali jaringan rusak atau proses penyembuhan jaringan rusak. Proses ini baru selesai sempurna sesudah agen penyebab kerusakan sel dinetralkan. Selama proses reparasi berlangsung, jaringan rusak diganti oleh regenerasi sel parenkimal asli dengan cara mengisi bagian yang rusak dengan jaringan *fibroblast* (proses *scarring*) (Triyono, 2005: 26).

Secara singkat, proses penyembuhan luka dibagi dalam 3 fase. Fase pertama yaitu fase inflamasi atau fase inisial (*lag phase*) yang berlangsung pada saat terjadinya luka sampai hari ke-5. Pada fase ini terjadi perdarahan, kemudian

pembekuan/ penghentian perdarahan akibat kontraksi otot polos dinding pembuluh darah yang terluka dan penggumpalan darah oleh thrombin dan fibrin. Ikut keluar bahan pertahanan tubuh berupa sel-sel leukosit dan antibodi. Di sini terjadi vasodilatasi pembuluh darah, oedema (Bisono, 2002: 15).

Fase kedua yaitu fase fibroplasi atau fase proliferasi, berlangsung dari hari ke-6 sampai akhir minggu ke-3. Terjadi proliferasi sel-sel fibroblast yang berasal dari sel-sel mesensim yang belum berdiferensiasi. Terjadi pembentukan jaringan granulasi yang terdiri dari sel-sel fibroblast, serat kolagen yang dihasilkan oleh sel fibroblast, deposit sel-sel radang, kapiler baru, hasil angiogenesis. Terjadi penciutan luka akibat kontraksi serat-serat kolagen yang mempertautkan tepi luka. Terjadi epitelisasi akibat proses migrasi dan proses mitosis sel-sel stratum basal dan keratinosit lain yang terpapar luka (sel-sel kelenjar sebaceous, kelenjar keringat, dan akar rambut) ke tengah luka.

Semua proses ini akan berhenti bila seluruh permukaan luka sudah tertutup epitel. Orang awam mengatakan luka sudah sembuh/sudah kering. Sebaliknya, proses akan berjalan terus bila permukaan luka belum tertutup epitel.

Fase terakhir adalah fase maturasi atau fase resorpsi saat semua bentukan-bentukan baru akibat proses penyembuhan akan diresorpsi kembali atau mengkerut menjadi matur. Hal ini berlangsung selama 2 bulan atau lebih bahkan bisa sampai satu tahun. Tanda-tanda yang menunjukkan fase ini sudah berakhir, semua tanda radang hilang, pucat, tak ada rasa sakit/ gatal, lemas tak ada indurasi, pembengkakan sudah hilang (Bisono, 2002: 16-17).

Pengobatan luka umumnya dilakukan dengan mencegah terjadinya infeksi agar proses penyembuhan secara fisiologi dapat berlangsung lebih cepat, yakni dengan memberikan suatu senyawa antibiotik baik secara oral atau topikal. Perbaikan sel dapat dipercepat dengan memberikan suatu senyawa yang nantinya merangsang pembentukan fibroblast, sel endotel dan sel keratinosit (Qomar, 2013: 21).

**D. Uraian Tanaman Jarak Merah (*Jatropha gossypifolia* Linn.)**



Gambar 1. Tanaman Jarak Merah (*Jatropha gossypifolia* Linn.)

**1. Klasifikasi**

Regnum	:	Plantae
Divisi	:	Spermatophyta
Sub divisi	:	Angiospermae
Kelas	:	Dicotyledoneae
Ordo	:	Euphorbiales
Famili	:	Euphorbiceae
Genus	:	Jatropha
Spesies	:	<i>Jatropha gossypifolia</i> Linn. (Hariana, 2008: 141)

## 2. Nama Daerah

Sumatera	:	Jarak ulung (Lampung)
Jawa	:	Jarak cina (Jawa Tengah)
Madura	:	Kaleke Jarak
Sulawesi	:	Yodium (Bugis), Abiotik (Makassar) (Hariana, 2008: 141)

## 3. Morfologi

*Jatropha gossypifolia* L. merupakan tanaman perdu, tinggi  $\pm$  2 m, batang berkayu, bulat, coklat, bercabang, berambut. Daun tunggal, bertangkai, bulat telur, ujung romping, berbagi 3-5, panjang 7-22 cm, lebar 6-20 cm, tepi rata, ungu kemerahan. Bunga majemuk, bentuk malai, diujung batang dan di ketiak daun, benang sari banyak, mengelopak, tangkai putik tiga, kepala putik bentuk tapak kuda, kelopak bentuk corong, daun panjang 4-5 mm, merah tua. Buah kendaga, bulat telur, hitam. Biji bulat, coklat kehitaman. Akar tunggang, putih (Karthikeyan *et al*: 2012).

## 4. Kandungan Kimia

Daun *Jatropha gossypifolia* L. mengandung antrakuinon, flavonoid, phlobatannin, fenolat, saponin, tanin dan terpenoid (Khyade MS *et al*; 2011, 177). Hasil skrining fitokimia ditemukan bahwa ekstrak petroleum eter mengandung steroid, lemak dan minyak tetap; ekstrak air terkandung karbohidrat, asam amino, steroid, flavonoid, alkaloid, glikosida, dan tanin. Ekstrak etanol juga menunjukkan hasil yang hampir sama dengan ekstrak air (Jain *et al*, 2012: 1426).

## 5. Kegunaan Tanaman

Anggota famili Euphorbiaceae bersifat koagulan. Getah batang berkhasiat untuk menghentikan pendarahan dan gatal-gatal dari luka dan goresan. Sementara itu daunnya digunakan untuk mengobati luka, keseleo, ruam dan rasa sakit. Ekstrak dari daun segar diaplikasikan dengan cara menghancurkan daun lalu digunakan untuk menghentikan pendarahan pada hidung dan kulit (Karthikeyan *et al*, 2012: 256). Daun jarak merah digunakan untuk pengobatan dari sejumlah penyakit termasuk pembersih darah, antiseptik, borok, bisul, eksim, dan padaluka di lidah anak-anak, serta daunnya digunakan untuk mengobati payudara yang bengkak dan sebagai obat penurun panas. Daun efektif sebagai obat pencahar dan obat perut, dan daun digunakan dalam demam intermiten. Berbagai penelitian telah dilakukan dengan daun dan organ lainnya dari *Jatropha gossypifolia* Linn. sebagai antibakteri, anti-koagulan, anti-inflamasi, analgesik (Khyade MS *et al*, 2011: 177).

### E. Metode Ekstraksi

#### 1. Ekstraksi

Ekstraksi adalah penyarian zat-zat berkhasiat atau zat-zat aktif dari bagian tanaman obat, hewan dan beberapa jenis ikan termasuk biota laut. Zat-zat aktif tersebut terdapat di dalam sel, namun sel tanaman dan hewan berbeda demikian pula ketebalannya, sehingga diperlukan metode ekstraksi dan pelarut tertentu dalam mengekstraksinya.

Umumnya zat aktif yang terkandung dalam tanaman maupun hewan lebih larut dalam pelarut organik. Proses ekstraksinya zat aktif dalam tanaman adalah

pelarut organik akan menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat aktif, zat aktif akan terlarut sehingga terjadi perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif di dalam sel dan pelarut organik di luar sel. Maka larutan terpekat akan berdifusi keluar sel, dan proses ini berulang terus sampai terjadi keseimbangan antara konsentrasi zat aktif di dalam dan di luar sel (Fachruddin, 2001: 19).

Etanol adalah penyari yang bersifat universal yaitu dapat melarutkan senyawa polar maupun senyawa nonpolar. Etanol adalah senyawa yang mudah menguap, jernih (tidak berwarna), berbau khas, dan menyebabkan rasa terbakar pada lidah. Etanol mudah menguap baik pada suhu rendah maupun pada suhu mendidih ( $78^{\circ}\text{C}$ ), mudah terbakar, serta larut air, dan semua pelarut organik. Bobot jenis etanol tidak lebih dari 0,7964.

Etanol dipertimbangkan sebagai penyari karena lebih selektif dari pada air. Sukar ditumbuhi mikroba dalam etanol 20% ke atas. Memiliki beberapa kelebihan lain yaitu tidak beracun, netral, absorpsi baik, bercampur dengan air pada segala perbandingan, memperbaiki stabilitas bahan obat terlarut, dan tidak memerlukan panas tinggi untuk pemekatan. Penggunaan etanol sebagai cairan penyari biasanya dicampur dengan pelarut lain, terutama campuran dengan air (Dirjen POM, 1986: 6-7).

## **2. Maserasi**

Maserasi merupakan cara penyarian yang sederhana. Maserasi dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari. Cairan penyari akan

menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat aktif, zat aktif akan larut dan karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif di dalam dengan yang di luar sel, maka larutan yang terpekat didesak keluar. Peristiwa tersebut berulang sehingga terjadi keseimbangan konsentrasi antara larutan di luar dengan dalam sel.

Maserasi digunakan untuk penyarian simplisia yang mengandung zat aktif yang mudah larut dalam cairan penyari, tidak mengandung zat yang mudah mengembang dalam cairan penyari, tidak mengandung benzoin, stirik dan lain-lain.

Cairan penyari yang digunakan dapat berupa air, etanol, air-etanol, atau pelarut lain. Bila cairan penyari digunakan air maka untuk mencegah timbulnya kapang, dapat ditambahkan bahan pengawet, yang diberikan pada awal penyarian.

Keuntungan cara penyarian dengan maserasi adalah cara pengerjaan dan peralatan sederhana dan mudah diusahakan. Kerugian cara maserasi adalah pengerjaannya lama, dan penyariannya kurang sempurna (Dirjen POM, 1986: 10).

## **F. Gel**

### **1. Defenisi Gel**

Gel didefinisikan sebagai suatu sistem setengah padat yang terdiri dari suatu dispersi yang tersusun baik dari partikel anorganik yang kecil atau molekul organik yang besar dan saling diresapi cairan (Ansel, 1989: 390).

Idealnya pemilihan *gelling agent* dalam sediaan farmasi dan kosmetik harus inert, aman, tidak bereaksi dengan komponen lain. Penambahan *gelling agent* dalam formula perlu dipertimbangkan yaitu tahan selama penyimpanan dan tekanan tube

selama pemakaian topikal. Beberapa gel terutama polisakarida alami peka terhadap derajat mikrobial. Penambahan bahan pengawet perlu untuk mencegah kontaminasi dan hilangnya karakter gel dalam kaitannya dengan mikrobial.

## **2. Basis Gel**

Berdasarkan komposisinya, basis gel dapat dibedakan menjadi basis gel hidrofobik dan basis gel hidrofilik.

### **a. Basis gel hidrofobik**

Basis gel hidrofobik terdiri dari partikel-partikel anorganik. Apabila ditambahkan ke dalam fase pendispersi, bilamana tebal, hanya sedikit sekali interaksi antara kedua fase. Berbeda dengan bahan hidrofilik, bahan hidrofobik tidak secara spontan menyebar, tetapi harus dirangsang dengan prosedur yang khusus (Ansel, 1989: 392-393).

### **b. Basis gel hidrofilik**

Basis gel hidrofilik umumnya adalah molekul-molekul organik yang besar dan dapat dilarutkan atau disatukan dengan molekul dari fase pendispersi. Istilah hidrofilik berarti suka pada pelarut. Pada umumnya karena daya tarik menarik pada pelarut dari bahan-bahan hidrofilik kebalikan dari tidak adanya daya tarik menarik dari bahan hidrofobik, system koloid hidrofilik biasanya lebih mudah untuk dibuat dan memiliki stabilitas yang lebih besar (Ansel, 1989: 392).

### 3. Uraian Bahan Gel

#### a. Carbomer 940

Carbomer adalah polimer asam akrilat yang mempunyai berat molekul tinggi yang merupakan hasil silang dengan salah satu *allyl* sukrosa atau *allyl* eter dari pentaeritritol. Carbomer digunakan dalam formulasi cairan dan semisolid sebagai *rheologi modifiers*. Formulasinya termasuk dalam krim, gel, lotion, dan salep yang digunakan untuk sediaan mata, rektal, topikal dan vagina (Rowe *et al*, 2009: 110).

Carbomer 940 akan mengembang jika didispersikan dalam air dengan adanya zat-zat alkali seperti trietanolamin atau diisopropanolamin untuk membentuk sediaan semipadat. Gel juga dibentuk oleh selulosa seperti hidroksipropilselulosa dan hidroksipropilmetilselulosa (Lachman *et al*, 2007: 1119).

Carbomer berwarna putih, halus seperti benang, asam, dan merupakan serbuk higroskopik yang sedikit berbau. Konsentrasi carbomer yang digunakan sebagai *gelling agent* yaitu 0,5% sampai 2,0% (Rowe *et al*, 2009: 110).

#### b. Gliserin

Gliserin digunakan secara luas dalam formulasi sediaan farmasi termasuk sediaan oral, hidung, mata, kulit maupun parenteral. Pada formulasi sediaan topikal dan kosmetik, gliserin ini umumnya digunakan sebagai humektan dan emolien. Gliserin juga digunakan pada sediaan gel yang encer maupun tidak (Rowe *et al*, 2009: 283). Gliserin mempunyai rumus molekul  $C_3H_8O_3$  dengan berat molekul 92,09. Konsentrasi gliserin sebagai humektan adalah kurang atau sama dengan 30% (Rowe *et al*, 2009: 283).

c. Trietanolamin (TEA)

Senyawa ini tidak berwarna sampai berwarna kuning pucat, cair kental yang memiliki sedikit rasa ammonia. TEA mempunyai rumus molekul  $C_6H_{15}NO_3$  dengan berat molekul yaitu 149,19. Trietanolamin umumnya digunakan pada formulasi sediaan topikal sebagai *alkalizing agent* (Rowe *et al*, 2009: 754).

d. Metil paraben

Mempunyai rumus molekul  $C_8H_8O_3$  dengan berat molekul yaitu 152,15. Kristal tak berwarna atau serbuk kristal putih, hampir atau tidak berbau dan rasanya agak membakar.

Metil paraben umumnya digunakan sebagai pengawet antimikroba pada sediaan kosmetik, makanan, dan sediaan farmasetika. Biasanya, digunakan sendiri atau dikombinasi dengan paraben lainnya. Konsentrasi metil paraben sebagai pengawet pada sediaan topikal adalah 0,02% sampai 0,3% (Rowe *et al*, 2009: 442).

Metil paraben digunakan dalam preparat cairan dan preparat setengah padat untuk mencegah pertumbuhan jamur (Ansel, 1989: 145).

## **G. Uraian Hewan Coba**

### **1. Klasifikasi**

Kingdom	:	Animalia
Filum	:	Chordota
Sub-filum	:	Vertebrata
Kelas	:	Mamalia
Anak Kelas	:	Theria

Bangsa	:	Logomorpha
Suku	:	Oryctolagidae
Family	:	Muridae
Genus	:	Oryctolagus
Spesies	:	<i>Oryctolagus cuniculus</i> L.

## 2. Karakteristik Hewan Coba

Kelinci pada umumnya tidak berbahaya bila didekati dan dipegang lembut, sehingga banyak dipakai sebagai salah satu hewan percobaan. Kelinci dewasa yang sehat memiliki berat badan 2,0-5,0 kg (jantan) dan 2,0-6,0 kg (betina). Lama kehamilan kelinci betina mencapai 29-35 hari dengan melahirkan 4-10 anak. Volume darah normal dari kelinci dewasa 57-65 ml/kg;  $4-7 \times 10^6 / \text{mm}^3$  sel darah merah;  $9-11 \times 10^3 / \text{mm}^3$  sel darah putih. Kebutuhan makanan kelinci terdiri atas 16-20% serat kasar, 15-18% protein kasar dan tidak lebih dari 2500 kcal perhari. Kebutuhan air minum mencapai 10 ml dan makanan sekitar 5 gram untuk setiap BB perhari. Kelinci harus ditangani dengan tenang, selalu memperhatikan cara pengekangan saat pemindahannya (Malole, 1989: 64). Lapisan epidermis kelinci jantan memiliki ketebalan 28,1  $\mu\text{m}$  dan kelinci betina 29,6  $\mu\text{m}$  sedangkan lapisan dermis kelinci jantan memiliki ketebalan 1661,6  $\mu\text{m}$  dan betina 1777  $\mu\text{m}$  (Oznurlu, *et al*, 2009: 1697).

### H. Tanaman Obat dalam Pandangan Islam

Kesehatan merupakan nikmat tuhan yang paling berharga, serta kekayaan yang tidak ternilai manfaatnya. Ada sebagian orang yang menganggap bahwa agama

tidak memiliki kepedulian terhadap kesehatan manusia. Anggapan semacam ini didasari oleh pandangan bahwa agama hanya memperhatikan aspek-aspek rohania belaka tanpa mengindahkan aspek jasmania (Ar-Rumaikhon, 2008: 103).

Kehidupan manusia yang begitu kompleks akan terasa mudah dan ringan bila umat manusia berpegang teguh pada ajaran agama Islam. Peradaban Islam dikenal sebagai perinitis dalam bidang farmasi. Para ilmuwan Muslim pada kejayaan Islam sudah berhasil menguasai riset ilmiah mengenai komposisi, dosis, penggunaan, dan efek dari obat-obat sederhana dan campuran. Selain menguasai bidang farmasi, masyarakat muslim pun tercatat sebagai peradaban pertama yang memiliki apotek atau toko obat.

Obat setiap penyakit itu diketahui oleh orang yang ahli di bidang pengobatan, dan tidak diketahui oleh orang yang bukan ahlinya. Oleh karena itu Allah swt. menghendaki agar pengobatan itu dipelajari oleh ahlinya melalui penelitian agar sesuai dengan penyakit yang akan diobati sehingga akan mendorong kesembuhan sesuai dengan firman Allah swt. pada QS. asy Syu'ara/26: 80.

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٨٠﴾

Terjemahnya:

Dan apabila aku tertimpa sakit, maka Dialah yang menyembuhkan diriku (Departemen Agama RI, 2002: 579).

Ayat di atas menjelaskan bahwa penyakit itu sesuatu yang dapat dikatakan buruk sehingga tidak wajar dinyatakan bersumber dari Allah swt. Namun perlu dicatat bahwa penyembuhan, sebagaimana ditegaskan oleh Nabi Ibrahim as. ini,

bukan berarti upaya manusia untuk meraih kesembuhan tidak diperlukan lagi. Sekian banyak hadits Nabi Muhammad saw. yang memerintahkan untuk berobat (Shihab, 2009, 9: 259).

Lebih lanjut ayat dalam menganjurkan berobat, Allah berfirman QS. Yunus/10:57.

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ  
وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Hai manusia, Sesungguhnya Telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman (Departemen Agama RI, 2002: 315).

Ayat tersebut menjelaskan kepada manusia untuk terus berusaha meski Allah swt. yang menentukan hasilnya. Seperti di dalam dunia kesehatan, jika suatu penyakit menyerang dianjurkan untuk mencari pengobatan apakah itu menggunakan obat tradisional maupun obat sintetik karena berobat adalah salah satu bentuk usaha untuk mendapatkan kesembuhan. Ayat menekankan agar orang yang sakit mengupayakan sehat sebagai anjuran agama, tetapi penyembuhan yang hakiki adalah Allah swt.

Dalam menafsirkan ayat ini, al-Dzahabi menyatakan, tindakan penyembuhan penyakit secara medis merupakan perbuatan baik dan terpuji, yang juga sejalan dengan pesan Nabi: “Lakukanlah penyembuhan secara medis”.

Adapun hadits yang menganjurkan seseorang berobat ketika tertimpa suatu penyakit yaitu dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan sebuah hadits dari Usamah bin Syuraik :

قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَدَاوِي قَالَ تَدَاوُوا فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَنْزِلْ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً عَلَيْهِ مِنْ عِلْمِهِ وَجَهْلِهِ  
مَنْ جَهِلَهُ ۖ (رواه أحمد)

Artinya :

“Suatu saat aku sedang bersama Nabi, tiba-tiba datanglah beberapa lelaki Badui. Mereka bertanya ‘Apakah kami boleh berobat?’ Beliau menjawab, ‘Boleh wahai para hamba Allah, silahkan kalian berobat! Karena setiap Allah menciptakan penyakit pasti Allah juga menciptakan obatnya, kecuali satu penyakit saja.’ Mereka bertanya, ‘Penyakit apa itu ya Rasulullah?’ Beliau menjawab, ‘Penyakit tua’”. (HR. Abu Daud, Tirmizdi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim, Shahih).

Selain itu Allah juga telah berfirman dalam surah Al-Isra’/17: 82.

وَنَزَّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا

خَسَارًا ﴿٨٢﴾

Terjemahnya :

Dan kami turunkan dari Al Qur’an suatu yang menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Qur’an itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian (Departemen Agama RI, 2002: 437).

Tidak hanya berobat, Islam juga menganjurkan seseorang untuk selalu menjaga kesehatan, yang mencakup kesehatan jasmani dan rohani, seperti yang tersirat dalam sebuah ayat Q.S. Al-Baqarah/2: 22 yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢﴾

Artinya

Sesungguhnya Allah senang kepada orang yang bertobat, dan senang kepada orang yang membersihkan diri (Departemen Agama RI, 2002: 22).

Dari ayat di atas, dapat diketahui bahwa salah satu sifat manusia yang secara tegas dicintai oleh Allah adalah orang yang menjaga kebersihan. Kebersihan digandengkandengan taubat. Tobat menghasilkan kesehatan mental, sedangkan kebersihanlahiriah menghasilkan kesehatan fisik (Shihab, 1996: 265).

Tumbuhan sebagai bahan obat tradisional telah banyak digunakan untuk pemeliharaan kesehatan, pengobatan maupun kecantikan. Dunia kedokteran juga banyak mengkaji obat tradisional dan hasil-hasilnya yang mendukung bahwa tumbuhan obat memiliki kandungan zat-zat yang secara klinis bermanfaat bagi kesehatan. Hal tersebut sinergis dengan firman Allah swt. pada QS. al-Syu'ara/26: 7.

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿٧﴾

Terjemahnya:

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik? (Departemen Agama RI, 2002: 572).

Lebih lanjut disebutkan pula dalam QS. al An'am/6: 99.

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا مَخْرُجًا مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنَ طَلْعِهَا قَنَوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۗ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٩٩﴾

Terjemannya:

Dan Dialah yang menurunkan air dari langit, lalu Kami Tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami Keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang kurma, mengurai tangkai-

tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah, dan menjadi masak. Sungguh, pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman (Departemen Agama RI, 2002: 203).

Dari kedua ayat tersebut dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa Allah swt. memberi sebuah legalitas dan bersifat perintah pada manusia untuk memperhatikan bumi, yang dapat diartikan sebagai upaya untuk senantiasa mengkaji, meneliti, hingga menemukan setiap kegunaan dari tumbuhan yang ada. Tumbuhan yang baik dalam hal ini adalah tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat bagi makhluk hidup, termasuk tumbuhan yang dapat digunakan sebagai pengobatan.

Semua yang diciptakan Allah swt. memiliki manfaat, termasuk tumbuh-tumbuhan. Untuk pemanfaatan tumbuhan tersebut, diperlukan ilmu dan pengalaman (teoritis dan empiris) dengan penelitian dan eksperimen. Salah satunya dalam pemanfaatannya sebagai obat.

Bila ditinjau kembali tentang hukum mempelajari ilmu pengobatan tradisional bahwa para ahli pengobatan tradisional dari masa ke masa telah melakukan eksperimen terhadap obat-obatan. Mereka merujuk dari berbagai buku medis yang disusun oleh para pakar pengobatan. Ini termasuk satu cabang ilmu di antara berbagai ilmu yang sangat banyak. Sekelompok orang memang ada yang menjadi tenaga ahli dalam pengobatan semenjak masa kenabian, juga sebelum itu dan sesudahnya.

Mereka mengetahui formula obat-obatan dan penggunaannya. Diiringi dengan keyakinan bahwa obat itu hanya penyebab perantara kesembuhan saja, sebab Allahlah yang menjadikan semua itu. Oleh karena itu, hukumnya boleh mempelajari ilmu pengobatan tradisional dan berobat dengannya (Ar-Rumaikhon, 2008: 99).

Kemudian, bila memperhatikan hadits-hadits Nabi Muhammad saw. maka akan didapati hadits-hadits yang menjelaskan tentang pengobatan. Manusia hanya berusaha mengidentifikasi unsur-unsur pengobatan yang terdapat pada setiap tanaman tetapi berfungsinya manfaat atau khasiat tanaman obat tersebut tergantung dari izin Allah swt. Sebagaimana hadist yang di riwayatkan oleh Muhammad bin ‘Ismail Abu ‘Abdillah al-Bukharibahwa Rasulullah saw. bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

Artinya:

Telah menceritakan pada kami Muhammad bin al-Mutsanna, telah menceritakan pada kami Abu Ahmad al-Zubairi, telah menceritakan pada kami ‘Umar bin Sa’id bin Abi Husain, ia berkata: telah menceritakan padaku ‘Atha bin Abi Rabah, dari Abi Hurairah ra. dari nabi saw. bersabda : Allah tidak menurunkan penyakit kecuali dia menurunkan juga obatnya (Muhammad bin ‘Ismail Abu ‘Abdillah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz. 7 (Cet. I; t.t: Dar Thuq al-Najah, 1422 H), h. 122.).

Hadis tentang kesembuhan suatu penyakit karena obat tertentu adalah atas izin Allah swt., Sebagaimana hadist yang di riwayatkan oleh Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi bahwa Rasulullah saw. bersabda:

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَأَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عَيْسَى قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Artinya:

Telah menceritakan pada kami Harun bin Ma’ruf, dan Abu al-Thahir, dan Ahmad bin ‘Isa, mereka berkata: telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb,

‘Amr telah mengabarkanku dan ia adalah Ibn al-Harits, dari hamba tuhaninya bin Sa’id, dari Abi al-Zubair, dari Jabir, dari Rasulullah saw. bahwasanya ia bersabda: setiap penyakit ada obatnya, jika penyakit itu diberi obat, maka penyakit itu akan hilang dengan izin Allah(BairutDar Ihya al-Turats, t.th: h 1729).

Al-Nawawi dalam kitabnya *Syarh al-Nawawi ‘ala Muslim* menjelaskan bahwa hadis tersebut menunjukkan keutamaan berobat, itu menurut jumhur ulama, al-Qhadi mengatakan bahwa hadis ini mengandung ilmu-ilmu yang terkait dengan agama, dunia, kesehatan, ilmu kedokteran dan bolehnya berobat. Menurut hujjah para ulama bahwa Allah selaku penentu dan adapun pengobatan juga berasal dari ketentuan Allah (Abu Zakariyya Muhyiddin Yahya bin Syarf al-Nawawi, *al-Minhaj Syarh Shahih Mislim al-Hajjaj*, Juz. 14(Cet. II; Beirut: Dar Ihya al-Turats al-‘Arabi, 1392), h. 191).

Al-‘Aini menjelaskan dalam kitabnya syarahnya bahwa Allah swt. tidak memberikan penyakit kepada seseorang kecuali ia telah menentukan obatnya, yang dimaksud dengan “menurunkan” pada hadis di atas ialah Allah menurunkan penyakit dan obat melalui malaikat secara langsung kepada makhluk sebagai perwakilan. Dikatakan bahwa banyak orang yang berobat tapi mereka tidak mendapatkan kesembuhan, maka dijawab bahwa itu karena mereka tidak mengetahui hakikat dari pengobatan itu. Hadis tersebut tidak menunjukkan penyakit secara keseluruhan karena dikecualikan penyakit tua dan mati, dan pada hadis tersebut terdapat penjelasan bolehnya melakukan pengobatan dan ilmu kedokteran(Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad bin Musa bin Ahmad bin Husain Badaruddin al-‘Aini, *‘Umdah al-Qari Syarh Shahih al-Bukhari*, Juz. 21(Beirut: Dar Ihya al-Turats, t.th), h. 229.).

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Lokasi Penelitian**

##### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental laboratorik, dengan rancangan *The post test-only Control Group Design* yang menggunakan hewan percobaan yaitu kelinci (*Oryctolagus cuniculus*) sebagai objek penelitian. Perlakuan yang diberikan adalah pemberian sediaan gel ekstrak etanol daun jarak merah (*Jatropha gossypifolia* Linn.) terhadap penyembuhan luka sayat.

##### **2. Lokasi penelitian**

Penelitian dan pemeliharaan dilaksanakan di laboratorium Biologi Farmasi, laboratorium Farmasetik dan laboratorium Biofarmakologi Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini adalah berupa pendekatan ekperimentatif yaitu pengumpulan data berdasarkan hasil dari eksperimen yang dilakukan.

#### **C. Sampel**

Sampel yang digunakan adalah ekstrak etanol 70 % daun Jarak Merah (*Jatropha gossypifolia* Linn.) dengan perbandingan konsentrasi yang digunakan yaitu konsentrasi 1%, 3%, dan 5%.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

##### **1. Pengambilan Sampel**

Sampel daun Jarak Merah (*Jatropha gossypifolia* Linn.) diambil di daerah Pangkep, pengambilan daun dilakukan dengan cara memetik daun. Sampel yang telah dikumpulkan kemudian dibersihkan.

##### **2. Pengolahansampel**

Daun yang telah diperoleh dikeringkan di dalam lemari pengering. Daun yang telah kering kemudian dihaluskan dan siap diekstraksi.

##### **3. Ekstraksisampel**

Serbuk daun Jarak Merah ditimbang sebanyak 200 gram dan dimasukkan dalam wadah maserasi, kemudian ditambahkan 3 liter etanol 70% hingga simplisia terendam, wadah maserasi ditutup dan disimpan selama 1x24 jam di tempat yang terlindung dari sinar matahari langsung sambil sesekali diaduk. Selanjutnya disaring, dipisahkan antara ampas dan filtratnya. Ampas diekstraksi kembali dengan etanol 70% yang baru dengan jumlah 2 liter. Hal ini dilakukan selama 3x24 jam. Ekstrak etanol 70% yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan diuapkan cairan penyarinya (Rotavapor) sampai diperoleh ekstrak etanol 70% kental. Selanjutnya ekstrak dibebasetanolkan dengan cara ekstrak ditambahkan dengan aquadest kemudian dipanaskan di atas penangas sampai menguap hingga diperoleh ekstrak sebanyak 21,19 gram.

#### 4. Pembuatansediaan Gel

##### a. Rancangan Formula (Ananila, 2013: 32)

Tabel 1. Rancangan Formula Gel Ekstrak Etanol Daun Jarak Merah (*Jatropha gossypifolia* Linn.)

No	Nama bahan	Kegunaan	Konsentrasi (%)			
			Formula A	Formula B	Formula C	Formula D
1.	Ekstrak etanol daun jarak merah	Zat aktif	1	3	5	-
2.	Carbomer 940	Basis gel	1	1	1	1
3.	Metil paraben	Pengawet	0,05	0,05	0,05	0,05
4.	TEA	Pengalkalis	0,2	0,2	0,2	0,2
5.	Gliserin	Humektan	20	20	20	20
6.	Air suling	Pelarut	Sampai 100	Sampai 100	Sampai 100	Sampai 100

##### b. Pembuatan formula

Basis Carbomer 940 dikembangkan terlebih dahulu dalam air panas pada suhu 80°C selama 24 jam. Basis carbomer yang telah dikembangkan dimasukkan ke dalam lumpang, ditambahkan TEA digerus homogen. Tambahkan gliserin dan diaduk rata (campuran 1). Kemudian ditambahkan metil paraben yang telah dilarutkan dalam air panas pada suhu 75°C (campuran 2). Setelah homogen, dimasukkan campuran 2 tadi ke dalam campuran 1 dan dihomogenkan kemudian ditambahkan ekstrak etanol daun jarak merah, digerus homogen kemudian ditambahkan sisa air suling dan diaduk hingga terdispersi merata.

## 5. PengujianEfekPenyembuhan Luka

Efek penyembuhan luka dilakukan terhadap hewan coba kelinci yang sehat, dimana pertama-tama yang dilakukan yaitu dengan mencukur bulu pada bagian yang ingin dilukai kemudian dilukai dengan benda tajam (pisau bedah) steril dengan kedalaman luka  $\pm 2$  mm serta panjang luka 3 cm.

Kelompok I : Luka dioleskan sediaan gel yang mengandung 1 % ekstrak daun Jarak Merah (Formula A).

Kelompok II : Luka dioleskan sediaan gel yang mengandung 3 % ekstrak daun Jarak Merah (Formula B).

Kelompok III : Luka dioleskan sediaan gel yang mengandung 5 % ekstrak daun Jarak Merah (Formula C).

Kelompok IV : Luka dioleskan sediaan gel tanpa mengandung ekstrak daun Jarak Merah (Formula D).

Kelompok V : Luka dioleskan sediaan gel pembanding Bioplacenton<sup>®</sup>.

Luka yang terjadi diolesi dengan sediaan uji  $\pm 1,5$  gram setiap 24 jam, ditutup dengan kasa steril.

## 6. PengukuranEfekPenyembuhan Luka

Pengukuran efek penyembuhan luka dilakukan berdasarkan profil penyembuhan luka antara lain: penurunan panjang luka, waktu terbentuknya keropeng dan waktu keropeng mengelupas dengan sendirinya.

## **7. Pengumpulan dan Analisis Data**

Pengumpulan dan analisis data dilakukan berdasarkan pengukuran panjang luka serta waktu yang diperlukan hingga luka pada hewan coba sembuh dengan menggunakan formulasi sediaan gel yang mengandung ekstrak etanol daun Jarak Merah (*Jatropha gossypifolia* Linn.) pada konsentrasi berbeda.

### **E. Instrumen Penelitian**

#### **1. Alat yang digunakan**

Alat yang digunakan yaitu alat-alat gelas (*pyrex*<sup>®</sup>), cawan porselin, lumpang, penangas air, pisau bedah steril no.11 (*gea*<sup>®</sup>), rotavapor (*heidolph*<sup>®</sup>), termometer, timbangan analitik (*precisa*<sup>®</sup>).

#### **2. Bahan yang digunakan**

Bahan yang digunakan yaitu air suling, carbomer 940, ekstrak daun Jarak Merah (*Jatropha gossypifolia* Linn.), gliserin, kasa, kelinci (*Oryctolagus cuniculus*), metil paraben, trietanolamin (TEA).

### **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

#### **1. Teknik pengolahan data**

Cara-cara pengolahan data:

- a. Mengumpulkan data penurunan panjang luka,
- b. Memasukkan ke dalam tabel.

#### **2. Analisis Data**

Analisa data penelitian ini melalui Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan ANOVA (Analysis of Varians).

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### ***A. Hasil Penelitian***

Hasil yang diperoleh dari ekstraksi sampel sebanyak 200 gram serbuk daun Jarak Merah adalah 21.19 gram ekstrak etanol daun Jarak Merah (*Jatropha gossypifolia* Linn.).

Efek penyembuhan luka sayat Ekstrak Etanol 70 % Daun Jarak Merah pada beberapa konsentrasi dengan pengamatan hari mulai pembuatan luka sayat hingga luka sembuh disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Efek penyembuhan luka sayat

<b>Perlakuan</b>	<b>Rata-rata hari ke-n luka sembuh (Keropeng Terlepas)</b>
Formula A	11,33
Formula B	9,67
Formula C	9,33
Formula D	12,33
Bioplacenton <sup>®</sup>	10,33

### ***B. Pembahasan***

Luka sayat didefinisikan sebagai suatu bentuk kerusakan atau kehilangan jaringan tubuh yang disebabkan oleh benda tajam. Luka sayat disebut juga luka insisi yang merupakan jenis luka akut. Luka sayat dapat menimbulkan pendarahan yang melibatkan peran hemostatis dan akhirnya terjadi peradangan (Rizky, 2001: 9), dapat juga menyebabkan infeksi karena kulit terbuka yang kemungkinan mudah ditumbuhi mikroorganisme sehingga dapat menyebabkan luka menjadi kronik yaitu luka yang tidak sembuh dalam waktu yang diharapkan.

Sampel yang digunakan adalah daun Jarak Merah (*Jatropha gossypifolia* Linn.) yang memiliki efek penyembuhan luka sayat. Daun Jarak Merah secara tradisional digunakan untuk luka, keseleo, ruam dan rasa sakit. Ekstrak dari daun segar diaplikasikan dengan daun hancur secara rutin digunakan untuk menghentikan pendarahan dari kulit (Karthikeyan *et al*, 2012: 256). Jarak Merah digunakan masyarakat secara empiris di daerah Pangkep sebagai obat seperti luka sayatan pisau atau benda tajam.

Pada penelitian ini menggunakan zat aktif ekstrak daun Jarak Merah (*Jatropha gossypifolia* Linn.) yang diekstraksi menggunakan penyari etanol 70%. Etanol adalah penyari yang bersifat universal yaitu dapat melarutkan senyawa polar maupun senyawa nonpolar (Voight, 1995: 969), seperti saponin, flavanoid, minyak atsiri dan tanin yang terdapat dalam daun Jarak Merah yang berefek dalam penyembuhan luka. Penelitian uji efek ekstrak etanol daun Jarak Merah ini diujikan pada kulit kelinci.

Proses ekstraksi yang digunakan adalah maserasi, karena maserasi merupakan metode sederhana, dan merupakan metode ekstraksi dingin sehingga dapat digunakan untuk senyawa yang tidak tahan terhadap pemanasan, di mana hasil maserat yang didapatkan nantinya dibebaskan dengan proses penguapan penyari dalam alat rotavapor (*rotary evaporation*). Hasil maserasi 200 gram simplisia daun Jarak Merah, diperoleh ekstrak etanol daun Jarak Merah (*Jatropha gossypifolia* Linn.) sebanyak 21,19 gram.

Ekstrak etanol daun Jarak Merah diformulasikan dalam bentuk sediaan gel. Sediaan gel mempunyai kadar air yang tinggi, sehingga dapat menghidrasi stratum korneum dan mengurangi resiko timbulnya peradangan lebih lanjut akibat menumpuknya minyak pada pori-pori. Selain itu gel mudah digunakan, penyebarannya dikulit lebih cepat, mudah berpenetrasi pada kulit sehingga memberikan efek penyembuhan yang baik.

Basis yang digunakan dalam formulasi gel daun Jarak Merah merupakan basis gel hidrofil yaitu carbomer. Carbomer dijadikan sebagai pembentuk gel yang transparan dengan konsentrasi 0,5-2,0 % (Rowe *et al*, 2009: 111). Untuk basis carbomer ditambahkan bahan pengalkali yaitu TEA yang membentuk massa gel menjadi semi padat dan menetralkan sediaan. Selain basis digunakan juga bahan tambahan lain yaitu gliserin sebagai humektan yang mengurangi kehilangan air pada sediaan semisolid, metil paraben sebagai pengawet yang efektif menghilangkan kontaminasi mikroba yang disebabkan oleh tingginya kandungan air pada sediaan gel.

Formulasi gel ekstrak etanol daun Jarak Merah (*Jatropha gossypifolia* Linn.) dibuat dalam 3 konsentrasi yaitu konsentrasi 1 %, 3 %, dan 5 % berdasarkan penelitian sebelumnya Nagaharika *et al*, yang menunjukkan bahwa ekstrak daun Jarak Merah dapat sebagai aktivitas anti-inflamasi dari daun *Jatropha gossypifolia* Linn. dengan metode HRBC (Human Red Blood Cell) stabilisasi membran. Hasil penelitian menunjukkan ekstrak metanol *Jatropha gossypifolia* Linn. Menunjukkan persentase lisis dari 19,1% untuk 100 mg/mL diikuti oleh 1,6% untuk 200mg/mL

metanol yang ekstrak. Sedangkan ekstrak air menunjukkan 14,2% untuk 100 mg/mL dan 56,8% untuk 200 mg/mL. Oleh karena itu penelitian ini menyimpulkan ekstrakmetanol dari *Jatropha gossypifolia* Linn diproduksi aktivitas yang signifikan (perlindungan membran) aktivitas anti inflamasi mungkin karena hadir alkaloid atau steroid dalam alkohol dan berair ekstrak *Jatropha gossypifolia* Linn. Dalam penelitian ini dibuat juga sediaan gel yang tidak mengandung ekstrak sebagai kontrol negatif untuk memastikan bahwa yang memberikan efek penyembuhan luka sayat pada kelinci adalah ekstrak daun Jarak Merah dan digunakan gel pembanding yaitu Bioplacenton<sup>®</sup>.

Bioplacenton<sup>®</sup> mengandung *placenta extract* dan *neomycin sulfate*. Kombinasi ini merupakan bagian dari perawatan luka yang sangat efektif, *placenta extract* sebagai “*biogenic stimulator*” memegang peranan penting dalam mempercepat regenerasi sel dan penyembuhan luka. Sedangkan *neomycin sulfate* bekerja sebagai antibiotik yang mampu membunuh beragam jenis kuman dengan daya kerja yang tidak terganggu oleh nanah. Selain memberikan rasa sejuk, bioplacenton juga aman digunakan dan mudah didapat.

Pengobatan pada luka sayat dengan menggunakan sediaan gel ekstrak etanol daun Jarak Merah (*Jatropha gossypifolia* Linn.) dilakukan secara topikal dengan frekuensi satu kali sehari sampai terjadi kesembuhan luka. Terjadinya kesembuhan luka sayat ditandai dengan merapatnya kulit, terbentuknya keropeng serta keropeng di sekitar luka terbuka dengan sendirinya. Pada penelitian ini, pengamatan dilakukan hingga keropeng pada sekitar luka terbuka dengan sendirinya.

Dari hasil pengamatan diperoleh data perubahan panjang luka sayat dengan menghitung rata-rata perubahan panjang luka sayat dengan interval waktu pengukuran setiap 24 jam.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh rata-rata persentase penyembuhan luka yaitu ketiga sediaan gel ekstrak etanol daun Jarak Merah (*Jatropha gossypifolia* Linn.) memberikan efek penyembuhan luka yang cepat setelah pemberian formula. Efek penyembuhan luka sayat yang optimum adalah sediaan gel dengan konsentrasi 5 %, ini ditandai dengan terjadinya penyembuhan (keropeng terbuka dengan sendirinya) pada hari ke-9,33, untuk konsentrasi 3 % penyembuhan terjadi pada hari-9,67 sedangkan untuk konsentrasi 1% penyembuhan terjadi pada hari ke-11,33. Dan untuk kontrol negatif penyembuhan terjadi pada hari ke-12,33, penyembuhan luka dapat terjadi pada pemberian gel tanpa ekstrak dikarenakan luka yang terjadi dapat sembuh dengan sendirinya tetapi membutuhkan waktu yang lebih lama dari pemberian gel yang mengandung ekstrak. Untuk gel Bioplacenton<sup>®</sup> sebagai kontrol, penyembuhan terjadi pada hari ke-10,33. Ini menunjukkan bahwa proses penyembuhan dengan menggunakan ketiga formula berlangsung lebih cepat dari penyembuhan luka secara normal.

Proses penyembuhan luka dibagi dalam 3 fase. Fase pertama yaitu fase inflamasi atau fase inisial (*lag phase*) yang berlangsung pada saat terjadinya luka sampai hari ke-5. Pada fase ini terjadi perdarahan, kemudian pembekuan/penghentian perdarahan akibat kontraksi otot polos dinding pembuluh darah yang terluka dan penggumpalan darah oleh thrombin dan fibrin. Fase kedua yaitu fase fibroplasi atau

fase proliferasi, berlangsung dari hari ke-6 sampai akhir minggu ke-3. Terjadi pembentukan jaringan granulasi yang terdiri dari sel-sel fibroblas, serat kolagen yang dihasilkan oleh sel fibroblast, deposit sel-sel radang, kapiler baru, hasil angiogenesis. Terjadi penciutan luka akibat kontraksi serat-serat kolagen yang mempereratkan tepi luka. Fase terakhir adalah fase maturasi atau fase resorpsi saat semua bentukan-bentukan baru akibat proses penyembuhan akan diresorpsi kembali atau mengkerut menjadi matur. Hal ini berlangsung selama 2 bulan atau lebih bahkan bisa sampai satu tahun. Tanda-tanda yang menunjukkan fase ini sudah berakhir, semua tanda radang hilang, pucat, tak ada rasa sakit/gatal, lemas tak ada indurasi, kempis pembengkakan sudah hilang.

Hasil analisis statistik Rancangan Acak Lengkap (RAL) uji efek ekstrak etanol daun Jarak Merah (*Jatropha gossypifolia* Linn.) terhadap kelinci dengan menggunakan gel yang mengandung konsentrasi ekstrak etanol daun Jarak Merah berbeda yaitu 1 %, 3 %, dan 5 %, kontrol negatif dan Bioplacenton<sup>®</sup> menunjukkan perbedaan waktu kesembuhan. Hal ini terlihat dari hasil analisis hubungan antara formula dan kecepatan penutupan luka di mana F hitung > F tabel pada taraf kepercayaan 5 %, dan 1 %. Hasil uji BNT (Beda Nyata Terkecil) waktu sembuhnya luka yang ditandai dengan keropeng terlepas dengan sendirinya menunjukkan bahwa formula sediaan gel A (Ekstrak 1%) sangat berbeda nyata (sangat signifikan) jika dibandingkan dengan sediaan gel B (Ekstrak 3%) dan C (Ekstrak 5%), dan berbeda nyata (signifikan) jika dibandingkan dengan kontrol positif (Bioplacenton<sup>®</sup>). Sediaan gel B (Ekstrak 3%) tidak berbeda nyata (non signifikan) jika dibandingkan dengan

sediaan gel C (Ekstrak 5%). Sediaan gel D (kontrol basis) berbeda nyata (signifikan) jika dibandingkan dengan sediaan gel A (Ekstrak 1%) dan sangat berbeda nyata (sangat signifikan) jika dibandingkan dengan sediaan gel B (Ekstrak 3%), C (Ekstrak 5%) dan kontrol positif (Bioplacenton<sup>®</sup>). Sediaan kontrol positif (Bioplacenton<sup>®</sup>) tidak berbeda nyata (non signifikan) jika dibandingkan dengan sediaan gel B (Ekstrak 3%), dan berbeda nyata (signifikan) jika dibandingkan dengan sediaan gel C (Ekstrak 5%). hal ini berarti gel ekstrak etanol daun Jarak Merah dengan konsentrasi yang berbeda-beda menghasilkan efek penyembuhan luka sayat. Hasil penyembuhan yang diperoleh menunjukkan bahwa sediaan gel C (Ekstrak 5%) memberikan efek lebih baik dari pada ekstrak etanol daun Jarak merah dengan konsentrasi 1% dan 3%, kontrol basis, dan kontrol positif (Bioplacenton<sup>®</sup>). Namun ekstrak etanol daun Jarak Merah dengan konsentrasi 3%, dan 5% memberikan efek penyembuhan yang sangat berbeda nyata (sangat signifikan) dengan sediaan gel tanpa ekstrak (kontrol basis), hal ini berarti ekstrak etanol daun Jarak Merah berefek dalam penyembuhan luka sayat pada kelinci dan sediaan gel ekstrak etanol daun Jarak Merah pada konsentrasi 3% memberikan efek yang optimum dalam penyembuhan luka sayat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Ekstrak etanol daun Jarak Merah (*Jatropha gossypifolia* Linn.) dalam bentuk sediaan gel berefek menyembuhkan luka sayat terhadap kelinci (*Oryctolagus cuniculus*).
2. Sediaan gel ekstrak etanol daun Jarak Merah (*Jatropha gossypifolia* Linn.) pada konsentrasi 3%, memberikan efek optimum dalam penyembuhan luka sayat terhadap kelinci (*Oryctolagus cuniculus*).
3. Agama Islam mengajarkan manusia untuk senantiasa memanfaatkan dan mengembangkan potensi tumbuh-tumbuhan yang dapat digunakan sebagai obat dengan sebaik mungkin.

#### ***B. Implikasi Penelitian***


1. Disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan tentang stabilitas dari sediaan gel dan pemilihan konsentrasi basis untuk mendapatkan konsistensi sediaan gel yang lebih baik.
2. Disarankan untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi tumbuh-tumbuhan yang dapat digunakan sebagai obat dengan sebaik mungkin.
3. Disarankan bahwa tanaman yang diciptakan oleh Allah swt. Untuk dipetik pelajaran didalamnya, seperti daun Jarak merah dimanfaatkan sebagai obat luka sayat.

## KEPUSTAKAAN


- Al-Qur'an al-Karim.
- al-'Aini, Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad bin Musa bin Ahmad bin Husain Badaruddin. *'Umdah al-Qari Syarh Shahih al-Bukhari*, Juz. 21. Beirut: Dar Ihya al-Turats, t.th.
- al-Bukhari, Muhammad bin 'Ismail Abu 'Abdillah. *Shahih al-Bukhari*, Juz. 7. Cet. I; t.t: Dar Thuq al-Najah, 1422 H.
- al-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, Juz. 4. Bairut: Dar Ihya al-Turats, t.th.
- al-Nawawi, Abu Zakariyya Muhyiddin Yahya bin Syarf. *al-Minhaj Syarh Shahih Mislim al-Hajjaj*, Juz. 14. Cet. II; Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, 1392.
- Ananila, Santi La. "Pengaruh Jenis Basis Gel Ekstrak Etanol Daun Kelor (*Moringa oleifera* Lamk) Terhadap Efektivitas Penyembuhan Luka Insisi Pada Kelinci (*Oryctolagus cuniculus*)". *Skripsi*. Makassar: Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin, 2013.
- Ansel, C. Howard. *Pengantar Bentuk Sediaan Farmasi*. Jakarta: UI Press, 2008.
- Ar-Rumaikhon, Ali bin Sulaiman. *Fiqih Pengobatan Islami*. Solo: Darul Wathon lin Nasyr, 2008.
- Bisono, Dr. *Petunjuk Praktis Operasi Kecil*. Jakarta: EGC, Penerbit Buku Kedokteran, 2002.
- David, V Feliciano. *Trauma*. 1<sup>st</sup> ed. London, UK: Appleton & Lange, 1996.
- Dirjen POM. *Sediaan Galenik*. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 1986.
- Fachruddin, H. *Analisis Fitokimia Tumbuhan*. Makassar: Fakultas Farmasi. Universitas Hasanuddin, 2001.
- Hariana, H. Arief. *Tumbuhan Obat Dan Khasiatnya*. Jakarta: Penebar Swadaya, 2008.
- Jain Sachin, G.P. Choudhary and D.K. Jaina. *In vitro free radical scavenging activity of Jatropha gossypifolia Linn. containing phenolic compounds*. 2012. Hal: 1424-1428.
- Judd, H. *Wound care made incredible easy*. 1<sup>st</sup> ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 2007. Hal :30-34.
- Katsir, Ibnu. *Terjemah Singkat Tafir Ibnu Katsir*, vol. 3. Terj. Salim Bahreisy dan Said Bahreisy. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2004.

- Khaerunnisa. "Uji Efek Gel Ekstrak Etanol Daun Tembelean (*Lantana camara* Linn.) Terhadap Penyembuhan Luka Sayat Pada Kelinci (*Oryctolagus cuniculus*)". *Skripsi*. Makassar: Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin, 2014.
- Khyde MS dan Vaikos NP. Evaluasi pharmacognostical dan fitokimia daun *Jatropha gossypifolia* L. 2011. Hal: 177-180
- Lachman L., Liberman HA & Kaning JL. *Teori dan Praktek Farmasi Industri Edisi Ketiga*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2007.
- Malole MB, Pramono CSU. *Penggunaan hewan-hewan percobaan di laboratorium*. Bogor : PAU Biotek IPB. 1989
- Mutschler Ernst. *Dinamika obat farmakologi dan toksikologi*. Bandung: Penerbit ITB. 1991
- Nagaharika Yerramsetty Valluri Kalyani, Shaik Rasheed, Ramadosskarthekeyan. *Anti-inflammatory activity of leaves of Jatropha gossypifolia Linn. by hrbc membrane stabilization method*. 2013. Hal: 156-158.
- Oznurlu, Yasemin, *et al.* Comparative Skin Histology of the White New Zealand and Angora Rabbits: Histometrical and Immunohistochemical Evaluations. Turki: *Journal of Animal and Veterinary Advances*, 2009.
- Pusponegoro AD, Bisono. *Luka, trauma, syok dan bencana alam*. In: Sjamsuhidayat R, De Jong W, editor. Buku ajar ilmu bedah. Edisi revisi. Jakarta : EGC Penerbit buku kedokteran, 1997.
- Qomar, Muhammad Ahmad. "Uji Efek Penyembuhan Luka Bakar Ekstrak Etanol Daun Botto'-Botto' (*Chromolaena odorata* L.) Dalam Sediaan Gel Terhadap Kelinci (*Oryctolagus cuniculus*)". *Skripsi*. Makassar: Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin, 2013.
- R. Karthekeyan, V. Siva parvathi, B. Sri Jyothi, T. Lakshmi, P. Srinivasa Babu. V. *Morpho-anatomical and physicochemical studies of Jatropha gossypifolia (L.)*. 2012. Hal: 256-262
- Rahman, Hardiyanti. Formulasi dan Uji Stabilitas Fisik Sediaan Gel Luka Bakar dari Ekstrak Etanol Daun Jambu Mete (*Anacardium occidentale*). *Skripsi*, Makassar: Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin, 2010.
- Rahayu, Fitri dkk. *Efektivitas Penyembuhan Luka dengan Jati*. Skp.unair ac.id, 2009.
- Rizky P, Siti. Pemanfaatan Ekstrak Etanol Daun Dandang Gendis (*Clinacanthus nutans* (Burm F.) Lindau) Menggunakan Matriks Nata De Coco Dan Gel Dalam Penyembuhan Luka Sayat. *Tesis*, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2011.


- Rowe, Raymond C., Paul JS, Marian EQ. *Handbook of Pharmaceutical Exipients Sixth Edition*. USA: The Pharmaceutical Press, 2009.
- Savitri, Evika Sandi. *Rahasia Tumbuhan Berkhasiat Obat Perspektif Islam*. Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 3. Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, volume 9. Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an : Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Penerbit Mizan: Jakarta.. 1996.
- Tenripadang, A. Dhiza. Uji Efek Penyembuhan Luka Sayat Pada Kelinci (*Oryctolagus cuniculus*) Menggunakan Getah Jarak Pagar (*Jathropha curcas* L.) dalam Bentuk Sediaan Gel. *Skripsi*, Makassar: Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin, 2012.
- Trenggono, Retno Iswari. *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Triyono, Bambang. Perbedaan Tampilan Kolagen Di Sekitar Luka Insisi pada Tikus Wistar Yang Diberi Infiltrasi Penghilang Nyeri Levobupivakain Danyang Tidak Diberi Levobupivakain. *Skripsi*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2005.
- Voight, Rudolf. *Buku Pelajaran Teknologi Farmasi*, Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. 1995.
- Walters, Kenneth A. *Dermatological and Transdermal Formulation*. New York: Marcel Dekker Inc, 2002.

**Lampiran 1. Ekstraksi Daun Jarak Merah (*Jatropha gossypifolia* Linn.)**Gambar 2. Skema Ekstraksi Daun Jarak Merah (*Jatropha gossypifolia* Linn.)

**Lampiran 2. Pembuatan Gel Ekstrak Etanol Daun Jarak Merah (*Jatropha gossypifolia* Linn.)**



Gambar 3. Skema Pembuatan Gel Ekstrak Etanol Daun Jarak Merah (*Jatrophagossypifolia* Linn.)

**Lampiran 3. Skema Kerja Pengujian Penyembuhan Luka**

Gambar 4. Skema Kerja Pengujian Penyembuhan Luka

### Lampiran 4. Perubahan Panjang Luka Sayat

Tabel 3. Perubahan Panjang Luka Sayat

Hari ke- n	FORMULA														
	A (Ekstrak 1%) (cm)			B (Ekstrak 3%) (cm)			C (Ekstrak 5%) (cm)			D (Kontrol Basis) (cm)			Bioplacenton® (cm)		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
2	2,7	2,9	2,8	2,7	2,8	2,7	2,6	2,7	2,7	2,8	2,9	2,9	2,7	2,8	2,7
3	2,5	2,7	2,5	2,5	2,6	2,5	1,4	2,4	2,2	2,6	2,7	2,8	2,4	2,5	2,5
4	2,3	2,4	2,2	1,7	2,0	2,4	1,2	2,2	2,0	2,4	2,5	2,6	1,8	1,9	2,0
5	2,0	2,2	1,8	1,5	1,7	2,3	1,0	2,0	1,9	2,2	2,3	2,4	1,7	1,5	1,8
6	1,8	1,9	1,6	1,3	1,5	2,0	0,9	1,9	1,8	1,9	2,0	2,1	1,5	1,3	1,6
7	1,5	1,6	1,3	1,2	1,4	1,9	0,8	1,8	1,7	1,8	1,9	1,8	1,3	1,1	1,4
8	1,2	1,3	0,7	1,1	1,3	1,8	0,7	1,5	1,6	1,7	1,6	1,3	1,1	1,0	1,2
9	1,0	1,2	0,6	0,5	1,1	0	0	0,9	0	1,5	1,4	1,1	0,7	0,6	1,0
10	0,7	0,8	0,4	0	0			0		1,3	1,1	1,0	0	0,3	0
11	0	0,4	0							0,5	0,8	0,7		0	
12		0								0	0,7	0			
13											0				
14															
15															

Keterangan :

 Terbentuk keropeng

 Keropeng terlepas



**Lampiran 6. Perhitungan RAL, Hubungan antara formula dan kecepatan penyembuhan luka.**

Tabel 5. Hubungan antara formula dan kecepatan penyembuhan luka

Formula	Hari ke-n luka sembuh (Keropeng Terlepas)			Jumlah	Rata-rata
	Replikasi				
	1	2	3		
A Ekstrak 1%	11	12	11	34	11,33
B Ekstrak 3%	10	10	9	29	9,67
C Ekstrak 5%	9	10	9	28	9,33
D Kontrol Basis	12	13	12	37	12,33
Bioplacenton®	10	11	10	31	10,33
<b>Jumlah</b>	<b>52</b>	<b>56</b>	<b>51</b>	<b>159</b>	

**Perhitungan Anova**

$$\text{Faktor Korelasi} : \frac{(159)^2}{15}$$

$$: 1685,4$$

$$\text{JK Total} : ((11)^2+(12)^2+(11)^2+(10)^2+(10)^2+(9)^2+(9)^2+(10)^2+(9)^2+(12)^2 \\ + (13)^2+(12)^2+(10)^2+(11)^2+(10)^2) - \text{FK}$$

$$: 1707 - 1685,4$$

$$: 21,6$$

$$\text{JK Perlakuan} : \frac{((34)^2+(29)^2+(28)^2+(37)^2+(31)^2)}{3} - \text{FK}$$

$$: \frac{(5111)}{3} - 1685,4$$

$$: 1703 - 1685,4$$

$$: 18,27$$

$$\begin{aligned}
 \text{JK Galat} & : \text{JK Total} - \text{JK Perlakuan} \\
 & : 21,6 - 18,27 \\
 & : \mathbf{3,33} \\
 \\
 \text{db Total} & : r \times t - 1 \\
 & : 3 \times 5 - 1 = \mathbf{14} \\
 \\
 \text{db Perlakuan} & : t - 1 \\
 & : 5 - 1 = \mathbf{4} \\
 \\
 \text{db Galat} & : \text{db Total} - \text{db Perlakuan} \\
 & : 14 - 4 = \mathbf{10} \\
 \\
 \text{KT Perlakuan} & : \frac{\text{Jumlah kuadrat perlakuan}}{\text{derajat bebas perlakuan}} \\
 & : \frac{18,27}{4} \\
 & : \mathbf{4,57} \\
 \\
 \text{KT Galat} & : \frac{3,33}{10} \\
 & : \mathbf{0,333} \\
 \\
 \text{F-Hitung} & : \frac{\text{KT Perlakuan}}{\text{KT Galat}} \\
 & : \frac{4,57}{0,333} \\
 & : \mathbf{13,73}
 \end{aligned}$$

Tabel 6. Analisis Ragam dengan Nilai F Tabel

Sumber Keragaman (SK)	Jumlah Kuadrat (JK)	Derajat Bebas (db)	Kuadrat Tengah (KT)	F-Hitung	F-Tabel	
					0,05	0,01
Perlakuan	18,27	4	4,57	13,73**	3,48	5,99
Galat	3,33	10	0,333			
<b>Total</b>	<b>21,6</b>	<b>14</b>				

$$\begin{aligned}
 \text{Koefisien Keseragaman} & : \frac{\sqrt{KTG}}{\gamma} \times 100\% \\
 & : \frac{0,333}{10,6} \times 100\%
 \end{aligned}$$

$$: \frac{0,577}{10,6} \times 100\% = 5.44 \%$$

**Perhitungan Nilai BNT 0,05**

$$\text{BNT} : t(0,05) ; 10 \sqrt{\frac{2KTG}{r}}$$

$$: 1,812 \sqrt{\frac{0,666}{3}}$$

$$: 1,812 \times 0,47$$

$$: 0,852$$

**Perhitungan Nilai BNT 0,01**

$$\text{BNT} : t(0,01) ; 10 \sqrt{\frac{2KTG}{r}}$$

$$: 2,764 \sqrt{\frac{0,666}{3}}$$

$$: 2,764 \times 0,47$$

$$: 1,299$$

Tabel 7. RAL, BNT Hubungan antara formula dan kecepatan penyembuhan luka

Perlakuan		C	B	E	A	D
	<b>Rata-rata</b>	<b>9,33</b>	<b>9,67</b>	<b>10,33</b>	<b>11,33</b>	<b>12,33</b>
<b>C</b> <b>Ekstrak 5%</b>	<b>9,33</b>	<b>0</b>				
<b>B</b> <b>Ekstrak 3%</b>	<b>9,67</b>	0,34 <sup>NS</sup>	<b>0</b>			
<b>E</b> <b>Bioplacenton®</b>	<b>10,33</b>	1,00 <sup>*</sup>	0,66 <sup>NS</sup>	<b>0</b>		
<b>A</b> <b>Ekstrak 1%</b>	<b>11,33</b>	2,00 <sup>**</sup>	1,66 <sup>**</sup>	1,00 <sup>*</sup>	<b>0</b>	
<b>D</b> <b>Kontrol Basis</b>	<b>12,33</b>	3,00 <sup>**</sup>	2,66 <sup>**</sup>	2,00 <sup>**</sup>	1,00 <sup>*</sup>	<b>0</b>

**BNT 0,05 = 0,852**

**BNT 0,01 = 1,299**

Keterangan \* = Signifikan (Berbedanyata)  
 \*\* = SangatSignifikan (Sangatberbedanyata)  
 NS = Non Signifikan (Tidak jauh berbeda)

**Lampiran 7. Gambar Daun Jarak Merah (*Jatropha gossypifolia* Linn.)**



Gambar 5. Daun Jarak Merah (*Jatropha gossypifolia* Linn.)

**Lampiran 8. Dokumentasi Penelitian**

Gambar 6. Ekstrak etanol daun Jarak Merah (*Jatropha gossypifolia* Linn.)



Formula A (Ekstrak 1%)



Formula B (Ekstrak 3%)



Formula C (Ekstrak 5%)




Formula D (Basis)

Gambar 7. Sediaan Gel Ekstrak Etanol Daun Jarak Merah (*Jatropha gossypifolia*Linn.) dengan Variasi Konsentrasi dan Kontrol Negatif




Gambar 8. Hari Pertama Luka Sayat Pada Kelinci



Gambar 9. Luka Mulai Merapat (Pemberian Formula A hari ke-4)



Gambar 10. Terbentuk Keropeng (Pemberian Formula B Hari Ke-5)



Gambar 11. Keropeng Terlepas (Pemberian Formula C Hari Ke-9)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nur Rezki Amalia K, kelahiran Pangkajene, 01 Agustus 1993. Anak ke empat dari lima bersaudara di pasangan Karhang S.Pd dan Murni.

Telah menyelesaikan pendidikan di SDN 3 Jagong pada tahun 2005, pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Pangkajene hingga pada tahun 2008, pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Bungoro hingga pada tahun 2011. Masuk Perguruan Tinggi tepatnya di Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar pada tahun 2011 melalui jalur UMB SPMB dan lulus hingga meraih gelar Sarjana Farmasi tahun 2015.