

**UJI STABILITAS FISIK DAN UJI AKTIVITAS ANTIOKSIDAN SIRUP
BUAH PATIKALA (*Etilingera elatior*)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi
pada Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

DIAN FUSPITA DEWI S
NIM. 70100111022

FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2015

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dian Fuspita Dewi S.
NIM : 70100111022
Tempat/TanggalLahir : Makassar, 23 Mei 1993
Jur/Prodi/Konsentrasi : Farmasi
Alamat : Btn. Pao-pao Permai B4/1, Sungguminasa, Gowa.
Judul : Uji Stabilitas Fisik Dan Uji Aktivitas Antioksidan Sirup
Buah Patikala (*Etilingera Elatior*)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, April 2015

Penyusun,

DIAN FUSPITA DEWI S.
NIM. 70100111022

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Uji Stabilitas Fisik Dan Uji Aktivitas Antioksidan Sirup Buah Patikala (*Etilingera Elatior*)” yang disusun oleh Dian Fuspita Dewi S., NIM : 70100111022, Mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, diuji dan dipertahankan dalam ujian sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari selasa tanggal 14 April 2015 M yang bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Tsaniyah 1436 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, 14 April 2015 M
24 Jumadil Tsaniyah 1436 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc.	(.....)
Sekretaris	: Fatmawaty Mallapiang, SKM., M.Kes	(.....)
Pembimbing I	: Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, M.Si., Apt.	(.....)
Pembimbing II	: Andi Armisman Edy Paturusi, S.Farm., M.Si., Apt.	(.....)
Penguji I	: Andi Tenriugi Daeng Pine, S.Si., M.Si.	(.....)
Penguji II	: Prof. Dr. H. Bahaking Rama, M.S.	(.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar,

Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc. *fl*
NIP. 19550203 198312 1 001

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah swt. atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, tak lupa pula salam dan salawat saya kirimkan untuk baginda Rasulullah saw. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis yaitu Syamsuddin B., S.Pd., M.Pd., M.Kes. dan Nuraeni S. serta keluarga besar yang tiada henti-hentinya mendoakan dan mencurahkan kasih sayangnya, yang selalu memberikan nasehat, kritik, semangat dan motivasi sehingga skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya.

Penulis juga tak lupa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak/Ibu :

1. Prof. Dr. Ahmad Thib Raya, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan menyelesaikan studi di UIN Alauddin Makassar.

2. Prof. Dr. H. Bahaking Rama, M.S. selaku penguji agama yang telah memberikan tuntunan dan pengarahan dalam mengoreksi seluruh kekurangan pada skripsi ini.

3. Dr. dr. H. Armyn Nurdin, M.Sc. selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

4. Fatmawaty Mallapiang, S.KM., M.Kes. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

5. Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, M.Si., Apt. selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar dan pembimbing pertama atas segala keikhlasannya memberikan bimbingan, motivasi serta meluangkan waktu, tenaga, pikiran kepada penulis sejak rencana penelitian sampai tersusunnya skripsi ini.

6. Drs. Wahyudin G., M.Ag. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

7. Nursalam Hamzah, S.Si., M.Si., Apt.. selaku Ketua Jurusan Farmasi UIN Alauddin Makassar.

8. Andi Armisman Edy Paturusi, S.Farm., M.Si.,Apt. selaku pembimbing kedua atas segala keikhlasannya memberikan bimbingan, motivasi serta meluangkan waktu, tenaga, pikiran kepada penulis sejak rencana penelitian sampai tersusunnya skripsi ini.

9. Andi Tenriugi Daeng Pine, S.Si., M.Si. selaku penguji kompetensi yang telah memberi masukan dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

10. Bapak/Ibu dosen yang dengan ikhlas membagi ilmunya, semoga jasanya mendapatkan balasan dari Allah SWT. serta seluruh staf jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan yang telah memberikan bantuan kepada penulis.

11. Kepada seluruh Laboran Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis selama penelitian.

12. Kepada teman-teman seperjuangan yang telah banyak membantu penulis teman-teman farmasi angkatan 2011 (Efferfescent) khususnya kelas Farmasi A, kakak-kakak angkatan 2005-2010, dan adik-adik angkatan 2012-2014 Farmasi UIN Alauddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Namun semoga skripsi ini dapat bermanfaat sebagai tambahan referensi ilmu pengetahuan. Amin.

Makassar, Maret 2014

Penyusun

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian	
1. Definisi operasional	5
2. Ruang lingkup penelitian	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat penelitian	8
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Uraian Tanaman.....	9
B. Sirup Buah	13
C. Uji Stabilitas Fisik.....	14
D. Antioksidan.....	16
E. Radikal Bebas	20
F. DPPH	26
G. Spektrofotometer Uv-Vis.....	29
H. Tinjauan Islam	33

BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	
	A. Jenis dan Lokasi Penelitian	39
	B. Pendekatan Penelitian	39
	C. Prosedur Kerja	39
	D. Instrumen Penelitian	43
	E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	43
	F. Validasi dan Reabilitas Instrumen	45
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Hasil Penelitian	46
	B. Pembahasan.....	50
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	61
	B. Implikasi	61
	KEPUSTAKAAN	62
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	66
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	104

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Hasil Pengamatan Organoleptis	46
2. Hasil pengukuran viskositas	46
3. Hasil pengukuran pH	47
4. Hasil penentuan bobot jenis	48
5. Hasil pengukuran indeks bias	48
6. Hasil perhitungan IC ₅₀ jus buah Patikala (<i>Etlingera elatior</i>)	48
7. Hasil perhitungan IC ₅₀ sirup buah Patikala (<i>Etlingera elatior</i>)	49
8. Hasil perhitungan IC ₅₀ Troloks	50
9. Nilai absorbansi jus buah Patikala (<i>Etlingera elatior</i>).....	72
10. Hasil pengukuran serapan blanko DPPH	73
11. Nilai absorbansi sirup buah Patikala (<i>Etlingera elatior</i>) formula I	73
12. Nilai absorbansi sirup buah Patikala (<i>Etlingera elatior</i>) formula II	73
13. Nilai absorbansi sirup buah Patikala (<i>Etlingera elatior</i>) formula III.....	74
14. Nilai absorbansi Troloks [®]	75
15. Perhitungan persamaan regresi linear jus buah Patikala (<i>Etlingera elatior</i>)	78
16. Perhitungan persamaan regresi linear sirup buah Patikala (<i>Etlingera elatior</i>)formula I.....	79
17. Perhitungan persamaan regresi linear sirup buah Patikala (<i>Etlingera elatior</i>)formula II	81

18. Perhitungan persamaan regresi linear sirup buah Patikala (<i>Etilingera elatior</i>) formula I.....	82
19. Perhitungan persamaan regresi linear Troloks.....	83
20. Analisis statistik viskositas sirup buah Patikala (<i>Etilingera elatior</i>).....	86
21. Analisis varians viskositas	88
22. Analisis statistik bobot jenis sirup buah Patikala (<i>Etilingera elatior</i>).....	89
23. Analisis varians bobot jenis	91
24. Analisis statistik indeks bias sirup buah Patikala (<i>Etilingera elatior</i>).....	92
25. Analisis varians indeks bias	94
26. Analisis statistik pH sirup buah Patikala (<i>Etilingera elatior</i>).....	95
27. Analisis varians pH.....	97

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Skema kerja.....	66
2. Perhitungan penyiapan larutan DPPH.....	72
3. Nilai absorbansi jus buah Patikala (<i>Etilingera elatior</i>).....	72
4. Nilai absorbansi sirup buah Patikala (<i>Etilingera elatior</i>)	73
5. Nilai absorbansi Troloks	75
6. Perhitungan persen penghambatan jus buah Patikala (<i>Etilingera elatior</i>).....	75
7. Perhitungan persen penghambatan sirup buah Patikala (<i>Etilingera elatior</i>)	76
8. Perhitungan persen penghambatan Troloks	78
9. Perhitungan persamaan regresi linear jus buah Patikala (<i>Etilingera elatior</i>) ...	78
10. Perhitungan persamaan regresi linear sirup buah Patikala (<i>Etilingera elatior</i>)	79
11. Perhitungan persamaan regresi linear Troloks.....	83
12. Perhitungan IC ₅₀ jus buah Patikala (<i>Etilingera elatior</i>).....	84
13. Perhitungan IC ₅₀ sirup buah Patikala (<i>Etilingera elatior</i>)	84
14. Perhitungan IC ₅₀ Troloks	85
15. Analisis statistik viskositas sirup buah Patikala (<i>Etilingera elatior</i>)	86
16. Analisis varians viskositas	88
17. Analisis statistik bobot jenis sirup buah Patikala (<i>Etilingera elatior</i>)	89
18. Analisis varians bobot jenis	91
19. Analisis statistik indeks bias sirup buah Patikala (<i>Etilingera elatior</i>)	92

20. Analisis varians indeks bias	94
21. Analisis statistik pH sirup buah Patikala (<i>Etlingera elatior</i>)	95
22. Tanaman Patikala (<i>Etlingera elatior</i>)	98
23. Jus Buah Patikala (<i>Etlingera elatior</i>).....	99
24. Kurva baku troloks terhadap DPPH.....	100
25. Kurva baku jus buah Patikala (<i>Etlingera elatior</i>).....	100
26. Kurva baku sirup buah Patikala (<i>Etlingera elatior</i>).....	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Reaksi penghambatan antioksidan primer terhadap radikal lipid	19
2. Rumus bangun DPPH	27
3. Bagan Instrumen spektrofotometer Uv-Vis	30
4. Reaksi DPPH dengan antioksidan	55
5. Struktur troloks [®]	56
6. Reaksi penangkapan atom H oleh DPPH dari troloks [®]	57
7. Tanaman Patikala (<i>Etilingera elatior</i>)	99
8. Buah Patikala (<i>Etilingera elatior</i>).....	99
9. Jus buah Patikala (<i>Etilingera elatior</i>)	100
10. Sirup buah Patikala (<i>Etilingera elatior</i>).....	100
11. Kurva baku troloks terhadap DPPH.....	101
12. Kurva baku jus buah Patikala (<i>Etilingera elatior</i>).....	101
13. Kurva baku sirup buah Patikala (<i>Etilingera elatior</i>) formula I.....	102
14. Kurva baku sirup buah Patikala (<i>Etilingera elatior</i>) formula II	102
15. Kurva baku sirup buah Patikala (<i>Etilingera elatior</i>) formula III	103

ABSTRAK

Nama : Dian Fuspita Dewi S.

Nim : 70100111022

Judul : Uji Stabilitas Fisik Dan Uji Aktivitas Antioksidan Sirup Buah Patikala
(*Etilingera Elatior*)

Telah dilakukan penelitian mengenai penentuan aktivitas antioksidan dan uji stabilitas fisik sirup buah Patikala (*Etilingera elatior*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas antioksidan (IC_{50}) sirup buah Patikala serta untuk mengetahui stabilitas fisik dari formulasi sirup buah Patikala.

Penentuan aktivitas antioksidan dilakukan dengan menggunakan metode DPPH, dimana sirup buah Patikala dibuat dalam 5 konsentrasi yaitu 50 μ g/ml, 100 μ g/ml, 150 μ g/ml, 200 μ g/ml, dan 250 μ g/ml yang kemudian ditambahkan larutan DPPH dan diukur absorbansinya dengan spektrofotometer UV-VIS pada panjang gelombang maksimum, yaitu 515 nm. Pada uji stabilitas fisik sirup buah Patikala dilakukan dengan menggunakan dua parameter uji, yaitu penyimpanan yang dilakukan selama 4 minggu dan kondisi suhu penyimpanan yang berbeda, yaitu suhu kamar, suhu dingin, dan suhu 40°C.

Hasil penelitian pada uji aktivitas antioksidan menunjukkan bahwa konsentrasi sampel berbanding lurus dengan persen peredaman dimana semakin besar konsentrasi semakin tinggi pula peredaman radikal bebas DPPH. Berdasarkan persamaan regresi linear menunjukkan bahwa sirup buah Patikala memiliki aktivitas antioksidan dengan IC_{50} untuk formula I 52,66728 μ g/ml, formula II 59,1744 μ g/ml, dan formula III 72,82609 μ g/ml, sedangkan IC_{50} Trolox[®], yaitu 4,37002 μ g/ml. Sedangkan hasil penelitian pada uji stabilitas fisik menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh stabilitas fisik sirup buah Patikala yang signifikan pada lama penyimpanan maupun pada suhu penyimpanan yang berbeda. Hal ini dapat ditunjukkan berdasarkan hasil analisis statistik Rancangan Acak Kelompok (RAK), dimana $F_{hitung} < F_{tabel}$ 5% dan 1% pada setiap pengujian yang dilakukan, yaitu pengukuran indeks bias, penentuan bobot jenis maupun pH, dan pengukuran viskositas.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi untuk penelitian selanjutnya, yaitu pengaruh suhu pemanasan terhadap kekentalan sirup buah Patikala (*Etilingera elatior*) atau uji stabilitas kimia dan mikrobiologi sirup buah Patikala (*Etilingera elatior*).

Kata kunci: *Antioksidan, buah Patikala, sirup buah, stabilitas fisik*

ABSTRACT

Nama : Dian Fuspita Dewi S.

Nim : 70100111022

Judul : Uji Stabilitas Fisik Dan Uji Aktivitas Antioksidan Sirup Buah Patikala (*Etilingera Elatior*)

Has conducted research on the determination of antioxidant activity and physical stability test of Patikala fruit syrup (*Etilingera elatior*). This study aims to determine the antioxidant activity (IC_{50}) Patikala fruit syrup and to determine the physical stability of the formulation Patikala fruit syrup.

Determination of antioxidant activity using DPPH method. Fruit syrup Patikala made within 5 concentration is 50 μ g/ml, 100 μ g/ml, 150 μ g/ml, 200 μ g/ml and 250 μ g/ml were then added to a solution of DPPH and the absorbance was measured with UV-VIS spectrophotometer at the wavelength of maximum , is 515 nm. In the physical stability test Patikala fruit syrup performed using two test parameters, namely the storage is done for 4 weeks and conditions of different storage temperatures, is room temperature, cold temperatures, and temperature of 40°C.

The results showed that the concentration of the sample is directly proportional to the percent reduction where the greater the higher the concentration of free radical DPPH reduction. Based on linear regression equation showed that fruit syrup Patikala have antioxidant activity with IC_{50} for formula I 52,66728 μ g/ml, the formula II 59,1744 μ g/ml, and the formula III 72,82609 μ g/ml, whereas the IC_{50} Trolox®, is 4,37002 μ g/ml. The results showed that the lack of effect of physical stability Patikala significant fruit syrup on storage time or at different storage temperatures, except for the viscosity test. This can be demonstrated by the results of statistical analysis of randomized block design (RBD), where F arithmetic < F table 5% and 1% in each of the tests performed, the refractive index measurement, determination of specific gravity and pH, and viscosity measurements.

This study is expected to be one of the references for further study, namely the effect of heating temperature on the viscosity of fruit syrup Patikala (*Etilingera elatior*) or chemical and microbiological stability test Patikala fruit syrup (*Etilingera elatior*).

Keywords: *Antioxidants, Patikala fruit, fruit syrup, physical stability*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan akan senyawa antioksidan saat ini semakin meluas seiring dengan semakin besarnya pemahaman masyarakat tentang peranannya dalam menghambat penyakit degeneratif seperti penyakit jantung, arteriosclerosis, kanker, serta gejala penuaan. Masalah-masalah ini berkaitan dengan kemampuan antioksidan untuk bekerja sebagai inhibitor (penghambat) reaksi oksidasi oleh radikal bebas reaktif yang menjadi salah satu pencetus penyakit-penyakit di atas.

Patikala (*Etilingera elatior*) merupakan salah satu jenis tanaman rempah-rempah yang sejak lama dikenal dan dimanfaatkan oleh manusia sebagai obat-obatan berkaitan dengan khasiatnya, yaitu sebagai penghilang bau badan dan bau mulut. Patikala termasuk dalam golongan Zingiberaceae, satu famili dengan tanaman Laos. Tanaman ini biasanya dimanfaatkan sebagai bahan tambahan dalam masakan, seperti urap, pecel, sambal, kapurung, dll.

Tanaman Patikala ini juga merupakan salah satu tanaman sumber antioksidan alami. Berdasarkan penelitian Naufalin (2005) mengenai kandungan fitokimia bunga, batang, rimpang dan daun Patikala diperoleh senyawa alkaloid, saponin, tanin, fenolik, flavonoid, triterpenoid, steroid, dan glikosida yang berperan aktif sebagai antioksidan. Menurut Antoro (1995), pada rimpang ditemukan senyawa alkaloid,

flavonoid dan minyak atsiri yang bertindak sebagai antioksidan. Tampubolon et al. (1983) menyebutkan bahwa Patikala mengandung senyawa bioaktif seperti polifenol, alkaloid, flavonoid, steroid, saponin dan minyak atsiri yang diduga memiliki potensi sebagai antioksidan. Selain itu, manfaat lain dari tanaman ini adalah dapat berkhasiat dalam mengatasi bau badan dan napas yang kurang sedap (Permadi, 2008; 30).

Buah Patikala merupakan bagian bunga yang mengalami pendewasaan lebih lanjut dan kandungan senyawa bioaktif yang terdapat dalam buah sama dengan bunga, namun memiliki kandungan fenolik dan triterpenoid yang lebih banyak, dan aromanya segar dan lebih dapat diterima oleh konsumen (Naufalin *et al.*, 2010).

Allah SWT. menciptakan berbagai jenis tumbuhan di alam semesta ini agar dapat dimanfaatkan oleh manusia dan hal itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah SWT.

Firman Allah swt. dalam QS. an-Nahl: 11 berbunyi:

يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾

Terjemahnya :

“Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman; zaitun, korma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan.” (Depag, 1989; 268)

Ayat ini menyatakan bahwa *Dia*, yakni Allah swt., *menumbuhkan bagi kamu dengannya*, yakni dengan air hujan itu, *tanaman-tanaman*; dari yang paling cepat layu sampai dengan yang paling panjang usianya dan paling banyak manfaatnya. Dia menumbuhkan *zaitun*, salah satu pohon yang paling panjang usianya, demikian juga *kurma*, yang dapat dimakan mentah atau matang, mudah dipetik dan sangat bergizi lagi berkalori tinggi, juga *anggur* yang dapat dijadikan makanan halal atau minuman yang haram, *dan dari segala macam atau sebagian buah-buahan*, selain yang disebut di atas, dalam hal ini buah Patikala. *Sesungguhnya pada yang demikian*, yakni pada curahan hujan dan akibat-akibatnya itu, *benar-benar ada tanda* yang sangat jelas bahwa yang mengaturnya seperti itu adalah Maha Esa lagi Maha Kuasa. Tanda itu berguna *bagi kaum yang memikirkan*. Betapa tidak, sumber airnya sama, tanah tempat tumbuhnya berdempet, tetapi ragam dan rasanya berbeda-beda (Shihab, 2002;543).

Selain itu, dalam Firman Allah swt., QS. Qaaf: 11 berbunyi:

وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبْرَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ﴿١١﴾

Terjemahnya :

“Dan Kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya lalu Kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang dituai.”

Di sini Allah menyebutkan karunia-Nya kepada mahluk-mahluk-Nya dengan menurunkan air yang merupakan sumber kehidupan mereka dipentast bumi ini. Allah berfirman: *Dan di antara bukti kuasa Kami adalah Kami menurunkan sedikit demi sedikit dan sesuai dengan dengan kebutuhan dari langit, yakni angkasa, air hujan yang banyak manfaatnya bagi penghuni bumi lalu Kami tumbuhkan dengannya, yakni dengan air yang tercurah itu, aneka tumbuhan, bunga-bunga, juga buah-buahan yang tumbuh di kebun-kebun dan biji-biji tanaman yang dituai, dan juga Kami menumbuhkan pohon kurma yang tinggi-tinggi menjulang ke atas serta yang mempunyai mayang yang bersusun-susun karena banyaknya zat buah yang ada di dalamnya. Semua itu untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba Kami, dan jangan lupa Kami juga menghidupkan dengannya, yakni dengan air itu, tanah yang mati, yakni kering gersang. Seperti itulah, yakni menghidupkan sesuatu yang mati, terjadinya kebangkitan manusia setelah kematiannya di pentas bumi ini (Shihab, 2002: 17).*

Senyawa-senyawa yang telah disebutkan di atas merupakan beberapa dari senyawa yang berkhasiat sebagai antioksidan. Antioksidan merupakan senyawa yang dapat menghambat spesies oksigen reaktif dan juga radikal bebas, sehingga antioksidan dapat mencegah penyakit-penyakit yang dihubungkan dengan radikal bebas seperti, karsinogenesis, kardiovaskular, dan penuaan (Siagian, 2002). Sedangkan radikal bebas merupakan atom atau molekul yang tidak stabil dan sangat reaktif karena mengandung satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan pada orbital terluarnya (Cahyadi W, 2008;5). Untuk mengatasi dampak buruk dari radikal bebas ini, maka

dibutuhkan suatu senyawa antioksidan, salah satunya yaitu buah Patikala (*Etilingera elatior*). Seperti dalam Firman Allah swt. QS. Yunus: 11 berbunyi:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ

لِّلْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya :

“Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.”

Sirup atau *syrupus simplex* adalah sediaan cair berupa larutan yang mengandung sakarosa kecuali dinyatakan lain, kadar sakarosa $C_{12}H_{22}O_{11}$, tidak kurang dari 64,0 % dan tidak lebih dari 66,0 % (Ditjen POM, 1979).

Sirup buah adalah produk yang dibuat dari larutan gula kental dengan rasa dan aroma yang ditentukan oleh buah segarnya (Satuhu, 1994). Buah segar yang biasa digunakan dalam pembuatan sirup adalah buah yang mempunyai warna yang menarik, aroma yang kuat, dan rasa yang khas.

Pengujian stabilitas terhadap produk komersial berupa obat, kosmetik, olahan makanan dan minuman telah umum dilakukan oleh industri atau laboratorium penguji. Stabilitas produk farmasi dapat didefinisikan sebagai kemampuan suatu produk untuk bertahan dalam batas yang ditetapkan sepanjang periode penyimpanan

dan penggunaan, sifat dan karakteristiknya sama dengan yang dimilikinya pada saat dibuat.

Stabilitas didefinisikan sebagai kemampuan suatu produk untuk bertahan kualitasnya sesuai spesifikasi kualitas yang ditetapkan sepanjang periode waktu penggunaan dan penyimpanan (Rismana, et al. 2013).

Salah satu cara untuk mengetahui kestabilan suatu sediaan farmasi perlu dilakukan beberapa pengujian salah satunya yaitu pengaruh terhadap suhunya, dimana suhu merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam uji stabilitas sediaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan penelitian untuk mengetahui stabilitas fisik dan aktivitas antioksidan sirup buah patikala (*Etlingera Elatior*).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah:

1. Bagaimana stabilitas fisik dari sirup buah patikala (*Etlingera elatior*)?
2. Berapa nilai IC_{50} dari jus buah patikala (*Etlingera elatior*) terhadap radikal bebas 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazil (DPPH)?
3. Berapa nilai IC_{50} dari sirup buah patikala (*Etlingera elatior*) terhadap radikal bebas 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazil (DPPH)?

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

- a. Stabilitas didefinisikan sebagai kemampuan suatu produk untuk bertahan kualitasnya sesuai spesifikasi kualitas yang ditetapkan sepanjang periode waktu penggunaan dan penyimpanan. Sedangkan stabilitas fisik adalah tidak terjadinya perubahan sifat fisik dari suatu produk selama waktu penyimpanan. Stabilitas fisik pada sediaan sirup dilakukan untuk mempertahankan keutuhan fisik meliputi perubahan warna, perubahan rasa, perubahan bau, perubahan tekstur atau penampilan.
- b. Antioksidan merupakan semua bahan yang dapat menunda atau mencegah kerusakan akibat oksidasi pada molekul sasaran dan digunakan untuk menghambat autooksidasi.
- c. Metode DPPH adalah sebuah metode yang sederhana yang dapat digunakan untuk menguji kemampuan antioksidan yang terkandung dalam makanan.
- d. Patikala (*Etlintera elatior*) merupakan salah satu jenis tanaman rempah-rempah yang sejak lama dikenal dan dimanfaatkan oleh manusia sebagai obat-obatan berkaitan dengan khasiatnya, yaitu sebagai penghilang bau badan dan bau mulut.
- e. *Efficient concentration* (EC_{50}) atau *Inhibitory Concentration* (IC_{50}) yaitu konsentrasi suatu zat antioksidan yang dapat menyebabkan 50% DPPH kehilangan karakter radikal atau konsentrasi suatu zat antioksidan yang memberikan persen peredaman sebesar 50%. Zat yang mempunyai aktivitas antioksidan tinggi, akan mempunyai harga EC_{50} atau IC_{50} yang rendah.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini untuk mengetahui stabilitas fisik sirup buah patikala (*Etlingera elatior*) yang meliputi organoleptik, pH, viskositas, bobot jenis, dan indeks bias serta aktivitas antioksidan sirup buah patikala.

D. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka dibahas beberapa temuan hasil penelitian sebelumnya untuk melihat kejelasan arah, originalitas, kemanfaatan, dan posisi dari penelitian ini, dibandingkan dengan beberapa temuan penelitian yang dilakukan sebelumnya.

Hudaya (2010: 50) dalam penelitiannya telah menguji aktivitas antioksidan ekstrak air bunga Patikala (*Etlingera elatior*) menggunakan metode DPPH (1,1-difenil-2-pikrilhidrazil), dimana menunjukkan bahwa ekstrak air bunga Patikala (*Etlingera elatior*) dapat menghambat radikal bebas DPPH pada konsentrasi (IC_{50}) yaitu 61,65 ppm.

Tampubolon et al. (1983) menyebutkan bahwa Patikala mengandung senyawa bioaktif seperti polifenol, alkaloid, flavonoid, steroid, saponin dan minyak atsiri yang diduga memiliki potensi sebagai antioksidan.

Naufalin (2010) dalam penelitiannya yang menganalisis senyawa bioaktif (fitokimia) dalam buah Patikala diperoleh bahwa komponen bioaktif yang terdapat dalam buah Patikala yaitu alkaloid, fenol, flavonoid, triterpenoid, steroid, dan glikosida. Komponen yang dominan pada buah Patikala adalah fenol, flavonoid dan saponin.

Arung (2014) meneliti tentang Uji Aktivitas Jus Patikala (*Etlingera elatior*) sebagai antioksidan dengan metode 1,1-Diphenil-2-picrylhydrazil (DPPH) dan diperoleh IC_{50} sebesar 100,8 $\mu\text{g/ml}$.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui stabilitas fisik dari sirup buah patikala (*Etlingera elatior*).
2. Menentukan IC_{50} aktivitas antioksidan jus buah patikala (*Etlingera elatior*).
3. Menentukan IC_{50} aktivitas antioksidan sirup buah patikala (*Etlingera elatior*).

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Sebagai sumber rujukan untuk penelitian lanjutan dan peneliti lainnya tentang kandungan antioksidan yang diperoleh dari sirup buah patikala (*Etlingera elatior*).
2. Sebagai data ilmiah kepada masyarakat tentang ketahanan dan khasiat dari sirup buah patikala (*Etlingera elatior*).

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Uraian Tanaman Buah Patikala

1. Klasifikasi (Backer, 1963)

Filum	: Plantae
Divisi	: Spermathophyta
Anak divisi	: Angiospermae
Kelas	: Monocotyledoneae
Bangsa	: Zingiberales
Suku	: Zingiberaceae
Marga	: <i>Etilingera</i>
Jenis	: <i>Etilingera elatior</i>

2. Nama daerah

Nama-nama daerah tempat tanaman patikala ini tumbuh yaitu patikala (palopo), kalo (Gayo), puwa kijung (Minangkabau), katinbung (Makassar), salahawa (Seram), petikala (Ternate), sedangkan diluar negeri dikenal dengan nama ginger bud (Inggris), xiang bao jiang (Cina), gingembre aromatique (Perancis), kantan (Malaysia), boca de dragon (Spanyol) dan kaa laa (Thailand) (Hidayat dan Hutapea,1991).

3. Morfologi

Tanaman Patikala (*Etilingera elatior*) mempunyai akar berbentuk serabut dan berwarna kuning gelap. Batang tanaman Patikala (*Etilingera elatior*) mempunyai batang berbentuk semu gilig membesar di pangkalnya tumbuh tegak dan banyak. Batang saling berdekatan membentuk rumpun jarang keluar dari rimpang yang menjalar di bawah tanah. Rimpangnya tebal berwarna krem kemerahan jambuan ketika masih muda. Daun Patikala (*Etilingera elatior*) mempunyai daun 15-30 helai tersusun dalam dua baris berseling, di batang semu helaian daun berbentuk jorong lonjong dengan ukuran 20-90 cm x 10-20 cm dengan pangkal membulat atau bentuk jantung, tepinya bergelombang dan ujung meruncing pendek gundul namun dengan bintik-bintik halus dan rapat berwarna hijau mengkilap sering dengan sisi bawah yang keunguan ketika masih muda. Bunga Patikala (*Etilingera elatior*) mempunyai bunga dalam karangan berbentuk gasing bertangkai panjang dengan ukuran 0,5-2,5 cm x 1,5-2,5 cm, dengan daun pelindung bentuk jorong 7-18 cm x 1-7 cm berwarna merah jambu hingga merah terang berdaging, ketika bunga mekar maka bunga tersebut akan melengkung dan membalik. Kelopak berbentuk tabung dengan panjang 3-3,5 cm bertaju 3 dan terbelah. Mahkota berbentuk tabung berwarna merah jambu berukuran 4 cm. *Labellum* serupa sudip dengan panjang sekitar 4 cm berwarna merah terang dengan tepian putih atau kuning. Buah Patikala (*Etilingera elatior*) mempunyai buah berjejalan dalam bongkol hampir bulat berdiameter 10-20 cm, masing-masing butir besarnya 2-2,5 cm, berambut halus dan pendek di bagian luar, berwarna hijau dan

ketika masak warnanya menjadi merah. Biji Patikala (*Etilingera elatior*) mempunyai biji banyak berwarna coklat kehitaman dan diselubungi salut biji (*arilus*) berwarna putih bening atau kemerahan yang berasa masam (Agromedia, 2008: 192).

4. Kandungan Kimia

Patikala mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, polifenol, steroid, saponin, dan minyak atsiri. Selain itu, bunga Patikala mempunyai kandungan zat kimia, yaitu karbohidrat, serat pangan, lemak, protein, air, zat besi, fosforus, kalium, kalsium, magnesium, seng. Dan daun mengandung alkaloid, triterpenoid, flavonoid dan saponin (Ningtyas, 2010: 10)

Hasil penelitian oleh Jaffar *et al.*, (2007) pada daun, batang, bunga, dan rimpang tanaman ini menunjukkan adanya beberapa jenis minyak essensial yang kemungkinan bersifat bioaktif. Ekstraksi minyak essensial dilakukan dengan metode hidrodistilasi sedangkan analisisnya dilakukan dengan alat GC-MS (Gas Chromatography Mass Spectrometer). Penelitian ini terungkap kandungan minyak essensial tertinggi adalah pada daun, yaitu sebesar 0,0735 % diikuti bunga sebesar 0,0334 % lalu batang sebesar 0,0029 % dan terakhir rimpang sebesar 0,0021% . Komponen utama minyak essensial pada daun adalah β -pinene (19,7%), caryophyllene (15,36%) dan β -farnesene (27,9%).

Studi fitokimia dari rimpang tanaman ini berhasil mengungkapkan struktur 2 senyawa kimia baru yaitu 1,7-bis(4-hydroxyphenyl)-2,4,6-heptatrienone (1) dan

11,13-trien-15,16-olide (2)(Mohamad *et al.*,(2005). Studi lanjutan mengenai bioaktivitas kedua senyawa tersebut akan sangat bermanfaat bagi dunia farmasi.

5. Manfaat

Patikala atau yang biasa disebut Patikala merupakan salah satu jenis tanaman rempah-rempah yang sejak lama dikenal dan dimanfaatkan oleh manusia sebagai obat-obatan. Bagian tanaman yang umum digunakan adalah bunga dan batangnya. Pemanfaatannya adalah sebagai pemberi cita rasa pada masakan, seperti urab, pecel, sambal, dan masakan lain. Batangnya dipakai sebagai pemberi citarasa pada masakan daging. Patikala juga dimanfaatkan sebagai obat-obatan berkaitan dengan khasiatnya yaitu sebagai penghilang bau badan dan bau mulut (Hidayat dan Hutapea, 1991)

Dalam literatur kuno disebutkan juga kegunaan dari tanaman ini sebagai bahan kosmetik alami dimana bunganya dipakai untuk campuran cairan pencuci rambut dan daun serta rimpang dipakai untuk bahan campuran bedak oleh penduduk lokal. Praktek ini ternyata mempunyai basis ilmiah karena ternyata penelitian membuktikan bahwa daun dan rimpang tanaman ini mempunyai aktivitas antibakteri seperti yang telah dijelaskan diatas sehingga dapat membersihkan rambut sekaligus memberikan wangi tertentu. Selain itu, ekstrak tanaman ini ternyata mampu menghambat enzim tirosinase (Chan *et al.*,2007).

Hasil studi lain menunjukkan fakta yang lebih mengejutkan karena ternyata tanaman ini dapat dipakai untuk mengobati penyakit-penyakit yang tergolong berat

yaitu kanker dan tumor. Senyawa kimia stigmast -4-en-3-one dan stigmast-4-en-6b-ol-3-one dari rimpang tanaman ini terbukti mempunyai sifat menghambat pertumbuhan tumor berdasarkan EBV-EA (*Epstein Barr Virus Early Antigens*) assay. Senyawa-senyawa tersebut juga bersifat sitotoksik terhadap kultur sel kanker CEM-SS (LC₅₀ 4 µg/ml) dan MCF -7 (LC₅₀ 6.2 µg/ml) berdasarkan MTT (*Methyl Thiazole Tetrazolium*) assay sehingga direkomendasikan untuk dapat dipakai sebagai obat atau campuran obat anti kanker (Habsah *et al.*,2005)

B. Sirup Buah

Menurut SNI (1994), sirup didefinisikan sebagai larutan gula pekat (sakarosa : *High Fructose Syrup* dan atau gula inversi lainnya) dengan atau tanpa penambahan bahan tambahan makanan yang diijinkan. Definisi sirup yang lain yaitu sejenis minuman ringan berupa larutan kental dengan citarasa beraneka ragam, biasanya mempunyai kandungan gula minimal 65 % (Satuhu, 1994). Sedangkan menurut Cruess (1958), sirup didefinisikan sebagai produk yang dibuat dengan cara melarutkan gula tebu atau sirup jagung, atau kombinasi keduanya dalam air, dengan menambahkan bahan penambah cita rasa pada larutan tersebut.

Menurut Satuhu (1994), berdasarkan bahan baku, sirup dibedakan menjadi tiga, yaitu sirup esens, sirup glukosa, dan sirup buah-buahan. Sirup esens adalah sirup yang cita rasanya ditentukan oleh esens yang ditambahkan. Sirup glukosa adalah sirup yang mempunyai rasa manis saja, biasanya digunakan sebagai bahan baku

industri minuman, sari buah, dan sebagainya. Sirup buah adalah sirup yang aroma dan rasanya ditentukan oleh bahan dasarnya, yakni buah segar.

Menurut AFRC Institute of Food Research (1989), sirup buah adalah produk yang dibuat dari sari buah yang telah disaring dengan penambahan pemanis yaitu gula. Sirup buah biasanya mempunyai total padatan terlarut minimal 650 Brix, sehingga dalam penggunaannya tidak langsung diminum tetapi perlu diencerkan terlebih dahulu (Goel, 1975).

Berdasarkan Tressler dan Woodroof (1976), proses pembuatan sirup buah terdiri atas 2 tahap, yaitu pembuatan sari buah dan pembuatan sirup gula. Kemudian sari buah dan sirup gula dimasak dengan cara dipanaskan sambil dilakukan pengadukan. Pemasakan dihentikan setelah total padatan terlarut sirup buah mencapai 65° Brix, kemudian dilakukan pembotolan. Pada saat pemasakan dapat ditambahkan bahan tambahan makanan untuk memperbaiki warna, cita rasa, aroma, dan daya simpan dari sirup buah, misalnya penambahan asam sitrat (Tressler dan Joslyn, 1961).

C. Uji Stabilitas Fisik

Pengujian stabilitas terhadap produk komersial berupa obat, kosmetik, olahan makanan dan minuman telah umum dilakukan oleh industri atau laboratorium penguji. Stabilitas didefinisikan sebagai kemampuan suatu produk untuk bertahan kualitasnya sesuai spesifikasi kualitas yang ditetapkan sepanjang periode waktu penggunaan dan atau penyimpanan. Uji stabilitas dilakukan untuk menjamin

identitas, kekuatan, kualitas, dan kemurnian produk yang telah diluluskan dan beredar di pasaran, sehingga aman digunakan oleh konsumen. Berdasarkan hasil uji stabilitas dapat diketahui pengaruh faktor lingkungan seperti suhu dan kelembaban terhadap parameter-parameter stabilitas produk seperti kadar zat aktif, pH, berat jenis, bau, warna, dan lainnya sehingga dapat ditetapkan tanggal kadaluarsa yang sebenarnya. Untuk sediaan obat dan kosmetik stabilitas lebih ditujukan pada kemampuan produk tersebut untuk mempertahankan sifat dan karakteristik khasiat/terapi agar sama dengan yang dimilikinya pada saat dibuat hingga batasan yang ditetapkan sepanjang periode penyimpanan dan penggunaan (shelf-life) (Rismana et al. 2013).

Berdasarkan lamanya, uji stabilitas dibagi menjadi dua yakni uji stabilitas jangka pendek (dipercepat) dan jangka panjang (real time study). Jenis pengujian stabilitas untuk sediaan obat, kosmetik, dan makanan atau minuman meliputi stabilitas; fisika, kimia, dan mikrobiologi (Rismana et al. 2013).

Uji stabilitas dimaksudkan untuk menjamin kualitas produk yang akan diluluskan dan beredar di pasaran. Dengan uji stabilitas dapat diketahui pengaruh faktor lingkungan seperti suhu dan kelembaban terhadap parameter-parameter stabilitas produk seperti pH, berat jenis dan volume sehingga dapat diketahui bahwa sediaan tersebut memiliki kestabilan yang baik dan memiliki jaminan mutu yang baik pula.

1. Uji Organoleptik

Pengamatan organoleptik yang dilakukan terhadap sirup buah patikala (*Etilingera elatior*) yang telah dibuat meliputi pengamatan perubahan warna, bau, rasa dan bentuk, sebelum dan sesudah penyimpanan.

2. Penentuan Bobot Jenis

Penentuan bobot jenis sediaan dilakukan untuk mengetahui bobot dari sediaan aromaterapi.

3. Viskositas

Viskositas sediaan dilakukan untuk mengetahui apakah sediaan memiliki viskositas yang tetap apabila telah disimpan selama beberapa hari, minggu, bahkan bulan, kekentalannya tetap terjaga atau memiliki penurunan kekentalan.

D. Uraian Antioksidan

Antioksidan didefinisikan sebagai inhibitor yang bekerja menghambat oksidasi dengan cara bereaksi dengan radikal bebas reaktif yang membentuk radikal bebas tidak reaktif yang tidak stabil. Antioksidan merupakan semua bahan yang dapat menunda atau mencegah kerusakan akibat oksidasi pada molekul sasaran. Dalam pengertian kimia, antioksidan adalah senyawa-senyawa pemberi elektron, tetapi dalam pengertian biologis lebih luas lagi, yaitu semua senyawa yang dapat meredam dampak negatif oksidan, termasuk enzim-enzim dan protein-protein pengikat logam. Antioksidan merupakan senyawa yang dapat mencegah penyakit-penyakit yang dihubungkan dengan radikal bebas seperti karsinogenesis, kardiovaskular, dan penuaan (Siagian, 2002).

Secara umum, antioksidan dikelompokkan menjadi dua, yaitu antioksidan enzimatis dan non-enzimatis. Antioksidan enzimatis misalnya enzim superoksida dismutase (SO), katalase dan glutathion peroksidase. Antioksidan non-enzimatis masih dibagi dalam dua kelompok lagi, yakni (Winarsih, 2007;78) :

1. Antioksidan larut lemak, seperti tokoferol, karotenoid, flavonoid, quinon, dan bilirubin.
2. Antioksidan larut air, seperti asam askorbat, asam urat protein pengikat logam dan protein pengikat heme.

Berdasarkan mekanisme kerjanya, antioksidan digolongkan menjadi tiga kelompok, yaitu (Winarsih,2007;79) :

1. Antioksidan primer

Antioksidan primer disebut juga antioksidan enzimatis. Suatu senyawa dikatakan sebagai antioksidan primer, apabila dapat memberikan atom hidrogen secara cepat kepada senyawa radikal, kemudian radikal antioksidan yang terbentuk segera berubah menjadi senyawa yang lebih stabil. Belleville-Nabet (1996) menyebutkan bahwa antioksidan primer bekerja dengan cara mencegah pembentukan senyawa radikal bebas baru, atau mengubah radikal bebas yang telah terbentuk menjadi molekul yang kurang reaktif.

2. Antioksidan sekunder

Antioksidan non-enzimatis dapat berupa komponen non-nutrisi dan komponen nutrisi dari sayuran dan buah-buahan. Kerja sistem antioksidan non-

enzimatik, yaitu dengan cara memotong reaksi oksidasi berantai dari radikal bebas tidak akan bereaksi dengan komponen seluler.

3. Antioksidan tersier

Kelompok antioksidan tersier meliputi sistem enzim DNA-repair dan metionin sulfoksida reduktase. Enzim-enzim ini berfungsi dalam perbaikan biomolekuler rusak akibat reaktivitas radikal bebas. Kerusakan DNA yang terinduksi senyawa radikal bebas dicirikan oleh rusaknya single dan double strand, baik gugus non-basa maupun basa.

Perbaikan kerusakan basa dalam mtDNA dan DNA inti yang diinduksi senyawa oksigen reaktif terjadi melalui perbaikan jalur eksisi basa. Pada umumnya jalur eksisi basa terjadi dengan cara memusnahkan basa yang rusak yang dilakukan DNA glikosilase. Selanjutnya hasil glikosilasi pada sisi non-basa diproses oleh endonuklease, DNA polymerase, dan ligase.

Menurut Siagian (2002), antioksidan bekerja melindungi sel dan jaringan sasaran dengan cara (Sudirman, 2011;12) :

1. Memusnahkan (*scavenge*) radikal bebas secara enzimatik atau dengan reaksi kimia langsung.
2. Mengurangi pembentukan radikal bebas.
3. Mengikat ion logam yang terikat dalam pembentukan spesies yang reaktif (transferin, albumin).
4. Menghancurkan molekul yang rusak dan menggantinya dengan yang baru.

Antioksidan mempunyai dua fungsi menurut mekanisme kerjanya adalah sebagai berikut:

Pertama, fungsi utama antioksidan yaitu sebagai pemberi atom hidrogen. Antioksidan (AH) yang memiliki fungsi tersebut disebut juga sebagai antioksidan primer. Senyawa ini dapat memberikan atom hidrogen secara cepat ke radikal lipid (R^\bullet , ROO^\bullet) atau mengubahnya ke bentuk lebih stabil, sementara hasil reaksi radikal antioksidan (A^\bullet) tersebut memiliki keadaan lebih stabil dibanding dengan radikal lipid.

Kedua, fungsi kedua antioksidan merupakan antioksidan sekunder, yaitu berfungsi untuk memperlambat laju autooksidasi dengan berbagai mekanisme pemutusan rantai oksidasi di luar mekanisme pemutusan rantai autooksidasi melalui perubahan radikal lipid ke bentuk yang lebih stabil. Pada konsentrasi rendah penambahan antioksidan (AH) primer pada lipid dapat menghambat atau mencegah reaksi autooksidasi lemak dan minyak. Penambahan tersebut dapat menghalangi reaksi oksidasi pada tahap inisiasi maupun propagasi (Gambar 2.2). Radikal-radikal antioksidan (A^\bullet) yang terbentuk pada reaksi tersebut relatif stabil dan tidak mempunyai cukup energi untuk dapat bereaksi dengan molekul lipid lain membentuk radikal lipid baru (Trilaksani, 2003).



Radikal lipid



Gambar 1. Reaksi penghambatan antioksidan primer terhadap radikal lipid

Interaksi antara radikal-radikal antioksidan dapat membentuk produk non radikal (Hamilton, 1983). Menurut Gordon (1990) laju oksidasi dipengaruhi oleh konsentrasi antioksidan yang ditambahkan. Pada konsentrasi tinggi, aktivitas antioksidan kelompok fenolik sering lenyap sehingga terjadi perubahan sifat yang semula antioksidan menjadi prooksidan. Pengaruh jumlah konsentrasi pada laju oksidasi tergantung pada struktur antioksidan, kondisi dan sampel yang diuji.

E. Uraian Radikal Bebas

Di dalam tubuh kita terdapat senyawa yang disebut antioksidan, yaitu senyawa yang dapat menetralkan radikal bebas, seperti enzim SOD (Superoksida Dismutase), glutathione, dan katalase. Antioksidan juga dapat diperoleh dari asupan makanan yang banyak mengandung vitamin C, vitamin E, dan betakaroten serta senyawa fenolik. Bahan pangan yang dapat menjadi sumber antioksidan alami seperti rempah-rempah, coklat, biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran seperti buah tomat, papaya, jeruk, dan sebagainya (Prakash; Frei B; Trevor R. 2013;3)

Radikal bebas adalah atom atau molekul yang tidak stabil dan sangat reaktif karena mengandung satu atau lebih elektron tidak berpasangan pada orbital terluarnya. Untuk mencapai kestabilan atom atau molekul, radikal bebas akan bereaksi dengan molekul di sekitarnya untuk memperoleh pasangan elektron. Reaksi ini akan berlangsung terus menerus dalam tubuh dan bila tidak dihentikan akan

menimbulkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, katarak, penuaan dini, serta penyakit degeneratif lainnya.

Persyaratan (sesuai peraturan/undang-undang) : Antioksidan sebagai bahan tambahan pangan batas maksimum penggunaannya telah diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 772/Menkes/Per/IX/88 tertulis dalam Lampiran I, antioksidan yang diizinkan penggunaannya antara lain asam askorbat, asam eritrobat, askorbil palmitat, askorbil stearat, butyl hidroksilanisol (BHA), butyl hidrokinin tersier, butyl hidroksitoluen, dilauril tiopropionat, propyl gallat, timah (II) klorida, alpha tokoferol, tokoferol campuran pekat (Cahyadi W, 2008;5).

Radikal bebas (*free radical*) adalah suatu senyawa atau molekul yang mengandung satu atau lebih elektron berpasangan menyebabkan senyawa tersebut secara reaktif mencari pasangan, dengan cara menyerang dan mengikat elektron molekul yang berada di sekitarnya. Jika elektron yang terikat oleh senyawa radikal bebas tersebut ionik, dampak yang timbul memang tidak begitu berbahaya. Akan tetapi, bila elektron yang terikat dengan radikal bebas berasal dari senyawa yang berikatan kovalen, akan sangat berbahaya karena ikatan digunakan digunakan secara bersama-sama pada orbital terluarnya. Umumnya, senyawa yang memiliki ikatan kovalen adalah molekul-molekul besar (biomakromolekul), seperti lipid, protein, maupun DNA (Winarsih, 2007;15).

1. Jenis-Jenis Radikal Bebas

Jenis-jenis radikal bebas yang merusak lipid terdiri dari (Setiati, 2003: 366-368):

- a. *Reactive Oxygen Species* (ROS), yaitu senyawa reaktif turunan oksigen misalnya radikal superoksida (O_2^*), radikal hidroksil (OH^*), radikal alkoksil (RO^*), radikal peroksil (RO_2^*) serta senyawa bukan radikal yang berfungsi sebagai pengoksidasi atau senyawa yang mudah mengalami perubahan menjadi radikal bebas seperti hidrogen peroksida (H_2O_2), ozon (O_3) dan HOCl.
- b. *Reactive Nitrogen Species* (RNS), misalnya nitrogen dioksida (NO_2^*), dan peroksinitrit ($ONOO^*$) dan bukan radikal seperti HNO_2 dan N_2O_4 .
- c. Radikal Bebas DPPH (1,1-difenil-2-pikrilhidrazil), yaitu suatu senyawa organik yang mengandung nitrogen tidak stabil dengan absorbansi kuat pada λ_{max} 517 nm dan berwarna ungu gelap.

Setelah bereaksi dengan senyawa antioksidan, DPPH tersebut akan tereduksi dan warnanya akan berubah menjadi kuning. Perubahan tersebut dapat diukur dengan spektrofotometer, dan diplotkan terhadap konsentrasi. Penurunan intensitas warna yang terjadi disebabkan oleh berkurangnya ikatan rangkap terkonjugasi pada DDPH. Hal ini dapat terjadi apabila adanya penangkapan satu elektron oleh zat antioksidan, menyebabkan tidak adanya kesempatan elektron tersebut untuk beresonansi. Keberadaan sebuah antioksidan yang dapat menyumbangkan elektron kepada DPPH, menghasilkan warna kuning yang merupakan ciri spesifik dari reaksi radikal DPPH. Penangkap radikal bebas menyebabkan elektron menjadi berpasangan yang kemudian

menyebabkan penghilangan warna yang sebanding dengan jumlah elektron yang diambil (Prakash, 2001: 2).

1. Reaksi Pembentukan Radikal Bebas

Mekanisme reaksi radikal bebas paling tepat dibayangkan sebagai suatu deret reaksi-reaksi bertahap, yaitu (Fessenden, 1992: 224).

a. Inisiasi

Tahap inisiasi ialah pembentukan awal radikal-radikal bebas. Dalam klorinasi metana, tahap inisiasi adalah pemaksapisahan (*cleavage*) homolitik molekul Cl_2 menjadi dua radikal bebas klor. Energi untuk reaksi ini diberikan oleh cahaya ultraviolet (UV) atau oleh pemanasan campuran ke temperatur yang sangat tinggi.

b. Propagasi

Setelah terbentuk, radikal bebas klor mengawali sederetan reaksi sehingga terbentuk radikal bebas baru. Secara kolektif, terbentuknya reaksi ini disebut tahap propagasi dari reaksi radikal bebas. Pada hakikatnya, pembentukan awal beberapa radikal bebas akan mengakibatkan perkembangbiakan radikal bebas baru dalam suatu reaksi pengabdian diri (*self perpetuating*) yang disebut reaksi rantai. Sebagai tahap propagasi pertama, radikal bebas klor yang reaktif merebut sebuah atom hidrogen dari molekul metana, menghasilkan radikal bebas metil dan HCl. Radikal bebas metil itu juga reaktif. Dalam tahap propagasi kedua, radikal bebas metil merebut sebuah atom klor dari dalam molekul Cl_2 . Tahap ini menghasilkan salah satu dari produk keseluruhan klorometana. Produk ini juga menghasilkan ulang radikal bebas

klor, yang nantinya dapat merebut atom hidrogen dari molekul metana lain dan memulai deret propagasi selanjutnya.

c. Terminasi

Daur propagasi terputus oleh reaksi-reaksi pengakhiran (*termination*). Reaksi apa saja yang memusnahkan radikal bebas atau mengubah radikal bebas menjadi radikal yang stabil dan tidak reaktif, dapat mengakhiri daur propagasi radikal bebas. Klorinasi metana diakhiri terutama oleh bergabungnya radikal-radikal bebas, inilah pemusnahan radikal bebas. Senyawa apa saja yang mudah terurai menjadi radikal bebas dapat bertindak sebagai satu inisiator. Satu contoh ialah peroksida (ROOR), yang mudah membentuk radikal bebas karena energi disosiasi ikatan RO-RO hanyalah sekitar 35 kkal/mol, lebih rendah daripada kebanyakan ikatan.

Sebab-sebab yang dapat meningkatkan atau memicu pembentukan radikal bebas (Tapan, 2005: 110) :

a. Sebab dari dalam tubuh

- 1) Proses oksidasi yang berlebihan
- 2) Proses olahraga yang berlebihan yang mana dapat menghasilkan radikal bebas tambahan sesuai dengan bertambahnya kebutuhan energi dan pembakaran biokimia dalam tubuh.
- 3) Proses peradangan akibat menderita sakit kronik atau tumor/kanker. Radikal bebas aktif diproduksi dari luka atau otot yang digunakan secara berlebihan. Termasuk juga pada penderita diabetes, bertahun-tahun terpapar kadar gula darah

tinggi. Kondisi ini menghasilkan molekul oksigen yang tidak stabil terus menerus. Oleh karena itu, sangat penting penderita kronik atau kanker dalam hal ini menambah jumlah antioksidannya.

4) Dalam keadaan stress psikologis yang terus menerus mengakibatkan produksi radikal bebas yang berlebihan. Karena itu banyak studi yang mengaitkan serangan jantung dan kanker.

b. Penyebab dari luar

1) Menghirup asap rokok. Radikal bebas dari asap rokok masuk ke dalam tubuh manusia melalui saluran pernapasan. Molekul oksigen yang tidak stabil dapat langsung merusak jaringan paru atau memicu lepasnya spesies oksigen reaktif dalam sel-sel tubuh termasuk sel darah putih.

2) Menghirup udara/lingkungan tercemar. Sama seperti rokok, udara yang begitu terpopulasi dan tercemar akibat buangan kendaraan bermotor, hasil pabrik dan pembakaran sampah bisa melalui paru manusia dan radikal bebas tersebut merusak sel-sel tubuh dengan cara menembus membran sel.

3) Radiasi matahari/ kosmis. Sinar ultraviolet yang kuat ini dipancarkan matahari dan dapat merusak sel.

4) Radiasi foto terapi (penyinaran). Sinar X atau radio isotop merupakan radikal bebas yang sangat kuat.

5) Konsumsi obat-obatan termasuk kemoterapi. Obat-obatan termasuk obat antikanker, selain menyerang sel-sel kanker, obat tersebut juga merupakan radikal bebas bagi sel-sel normal lainnya.

6) Pestisida dan zat kimia pencemaran lain. Masuk ke dalam tubuh melalui makanan dan minuman yang terpapar dengan pestisida atau zat kimia pencemaran lainnya. Keadaan ini terus menerus berlangsung di saluran cerna.

Radikal bersifat destruktif, sangat reaktif dan mampu bereaksi dengan makromolekul sel, seperti: protein, lipid, karbohidrat, atau DNA. Reaksi antara radikal bebas dan molekul itu berujung pada timbulnya suatu penyakit, yaitu antara lain (Sa'ad M, 2009;5).

1. Kerusakan DNA pada inti sel

Senyawa radikal bebas merupakan salah satu faktor penyebab kerusakan DNA dengan mengoksidasi DNA. Jika sel yang mengandung DNA rusak (damage DNA) membelah sebelum DNA tersebut diperbaiki, akan mengakibatkan perubahan genetik secara permanen, hal tersebut merupakan langkah pertama dalam karsinogenesis. Oksidasi DNA oleh senyawa radikal bebas dapat menginisiasi terjadinya kanker.

2. Kerusakan protein

Perubahan LDL (*low density lipoprotein*) menjadi bentuk LDL teroksidasi yang diperantarai oleh radikal bebas dapat menyebabkan kerusakan dinding arteri dan


kerusakan bagian arteri lainnya. Meningkatnya kadar LDL oleh oksigen reaktif dapat merusak dinding arteri yang menyebabkan arteriosklerosis.

3. Kerusakan lipid peroksida

Radikal bebas dapat menyebabkan kerusakan oksidatif pada ikatan lemak tak jenuh dalam fosfolipid membran biologi (lipid peroksidasi). Lipid peroksidasi yang tak terkontrol disebabkan reaksi berantai radikal bebas merupakan proses toksik yang dapat menimbulkan kemerosotan fungsi membran biologis.

F. DPPH (1,1-Diphenyl-2-Picrylhydrazyl)

Pada tahun 1922, ditemukan senyawa berwarna ungu radikal bebas stabil DPPH, yang sekarang digunakan sebagai reagen kolorimetri. DPPH sangat berguna dalam berbagai penyelidikan seperti inhibisi atau radikal polimerisasi kimia, penentuan sifat antioksidan amina, fenol atau senyawa alami (vitamin, ekstrak tumbuh-tumbuhan, obat-obatan). DPPH berwarna sangat ungu seperti KMnO_4 dan bentuk tereduksinya berwarna orange-kuning.



Gambar 2. Rumus Bangun DPPH

Metode DPPH adalah sebuah metode yang sederhana yang dapat digunakan untuk menguji kemampuan antioksidan yang terkandung dalam makanan. Metode DPPH dapat digunakan untuk sampel yang padat dan juga dalam bentuk larutan. Prinsipnya dimana elektron ganjil pada molekul DPPH memberikan serapan maksimum pada panjang gelombang 517 nm yang berwarna ungu. Warna ini akan berubah dari ungu menjadi kuning lemah apabila elektron ganjil tersebut berpasangan dengan atom hidrogen yang disumbangkan senyawa antioksidan. Perubahan warna ini berdasarkan reaksi kesetimbangan kimia. Metode ini mudah digunakan, cepat, cukup teliti dan mudah untuk mengukur kapasitas antioksidan dengan menggunakan radikal bebas DPPH. Metode DPPH dapat digunakan untuk sampel padatan, larutan dan tidak spesifik untuk komponen antioksidan tertentu. (Prakash, 2001: 1-2).

Aktivitas antioksidan dapat dinyatakan dengan satuan % aktivitas. Nilai ini diperoleh dengan rumus (Molyneux, 2003):

$$\% \text{ Aktivitas Antioksidan} = \frac{\text{absorbance of control} - \text{absorbance of sample}}{\text{absorbance of control}} \times 100\% \quad \dots(2.1)$$

Uji Aktivitas Antioksidan Metode DPPH (Widyastuti *et al.* 2010). Sebanyak 3 ml ekstrak dengan konsentrasi 1000, 600, 300, 100, dan 50 µg/mL ditambah dengan 1 mL larutan DPPH (2,2'-diphenyl-1-picrylhydrazyl) 0,3mM dalam methanol dan dilakukan pengocokan dengan menggunakan vortex. Kemudian diinkubasi pada suhu 37 °C selama 30 menit. Absorbansi sampel dibaca pada panjang gelombang 517 nm. Persen inhibisi dihitung berdasarkan persamaan $((A \text{ blanko} - A \text{ sampel}) / A \text{ blanko}) \times 100\%$. Nilai IC₅₀ dihitung berdasarkan persamaan regresi sigmoid non-linier

menggunakan hasil persen inhibisi dan konsentrasi. IC_{50} menunjukkan nilai konsentrasi sampel yang diperlukan untuk menghambat 50% radikal bebas DPPH.

Parameter yang dipakai untuk menunjukan aktivitas antioksidan adalah harga konsentrasi efisien atau *efficient concentration* (EC_{50}) atau *Inhibitory Concentration* (IC_{50}) yaitu konsentrasi suatu zat antioksidan yang dapat menyebabkan 50% DPPH kehilangan karakter radikal atau konsentrasi suatu zat antioksidan yang memberikan persen peredaman sebesar 50%. Zat yang mempunyai aktivitas antioksidan tinggi, akan mempunyai harga EC_{50} atau IC_{50} yang rendah (Molyneux, 2004).

Metode ini akan bekerja dengan baik menggunakan pelarut metanol atau etanol dan kedua pelarut ini tidak mempengaruhi dalam reaksi antara sampel uji sebagai antioksidan dengan DPPH sebagai radikal bebas (Molyneux, 2004).

G. Spektrofotometer UV-Vis


Spektrofotometer UV-Vis merupakan salah satu jenis spektroskopi yang sering digunakan dalam analisis kimia dan biologi. Spektrofotometer ini didasarkan pada interaksi antara materi dengan radiasi elektromagnetik. Apabila seberkas radiasi (cahaya) dikenakan pada cuplikan (larutan sampel), maka sebagian dari cahaya diserap oleh molekul – molekul sesuai dengan struktur dari molekul. Setiap senyawa dalam sampel memiliki tingkatan tenaga yang spesifik. Bila cahaya mempunyai perbedaan energi antara tingkatan dasar dan tingkatan tereksitasi yang mengenai cuplikan, maka elektron – elektron pada tingkatan dasar akan dieksitasi ke tingkatan tereksitasi, dan sebagian energi cahaya yang sesuai diserap dengan panjang

gelombang ini. Elektron yang tereksitasikan melepaskan tenaga melalui proses radiasi panas dan akan kembali pada tingkatan dasar lagi. Perbedaan energi antara tingkat dasar dengan tingkat tereksitasi yang spesifik untuk tiap – tiap bahan/senyawa menyebabkan frekuensi yang diserap juga berbeda – beda (Sastrohamidjojo, 2001).

Pendeteksian senyawa dengan cara sederhana menggunakan spektrofotometer ultraviolet dilakukan pada panjang gelombang 254 nm dan 366 nm. Radiasi senyawa pada panjang gelombang 254 nm menunjukkan radiasi gelombang pendek, sedangkan pada panjang gelombang 366 nm menunjukkan radiasi panjang gelombang. Bila senyawa menyerap sinar UV, maka akan tampak sebagai bercak gelap pada latar belakang yang berfluoresensi (Stahl, 1985: 15).

Sinar radiasi UV-Vis adalah panjang gelombang antara 180 – 380 nm untuk UV dan panjang gelombang 380 – 780 nm untuk visible (Hayati, 2007). Cahaya yang dapat dilihat oleh manusia disebut cahaya tampak/visibel. Biasanya cahaya terlihat merupakan campuran dari cahaya yang mempunyai berbagai panjang gelombang dari 400 nm hingga 750 nm.

Instrumen yang digunakan untuk mempelajari serapan atau emisi radiasi elektromagnetik sebagai fungsi dari panjang gelombang disebut spektrometer atau spektrofotometer. Pada umumnya konfigurasi dasar dari spektrofotometer UV-Vis berupa susunan peralatan adalah sebagai berikut:



Gambar 3. Bagan instrumen spektrofotometer UV-Vis

1. Sumber radiasi

Beberapa sumber radiasi yang dipakai pada spektrofotometer adalah lampu deuterium, lampu tungsten, dan lampu merkuri. Sumber-sumber radiasi ultra lembayung yang kebanyakan dipakai adalah lampu hidrogen dan lampu deuterium (D_2). Disamping itu sebagai sumber radiasi ultra lembayung yang lain adalah lampu xenon. Kejelekannya lampu xenon tidak memberikan radiasi yang stabil seperti lampu deuterium. Lampu deuterium dapat dipakai pada panjang gelombang 180 nm sampai 370 nm (daerah ultra lembayung dekat). Lampu tungsten merupakan campuran dari filament tungsten gas iodine (halogen), oleh sebab itu sebagai lampu tungstein-iodin sumber radiasi pada daerah pengukuran sinar tampak dengan rentangan panjang gelombang 380-900 nm. Lampu merkuri adalah suatu lampu yang mengandung uap merkuri tekanan rendah dan biasanya dipakai untuk mengecek, mengkalibrasi panjang gelombang pada spektrofotometer pada daerah ultra lembayung khususnya daerah disekitar panjang gelombang 365 nm dan sekaligus mengecek resolusi monokromator.

2. Monokromator

Monokromator berfungsi untuk mendapatkan radiasi monokromatis dari sumber radiasi yang memancarkan radiasi polikromatis. Monokromator pada spektrofotometer biasanya terdiri dari susunan meliputi celah (slit) masuk-filter-prisma-kisi(grating)-celah keluar.

a. Celah (slit)

Celah monokromator adalah bagian yang pertama dan terakhir dari suatu sistem optik monokromator pada spektrofotometer. Celah monokromator berperan penting dalam hal terbentuknya radiasi monokromatis dan resolusi panjang gelombang.

b. Filter optik

Filter optik berfungsi untuk menyerap warna komplementer sehingga cahaya tampak yang diteruskan merupakan cahaya yang berwarna sesuai dengan warna filter optik yang dipakai. Filter optik yang sederhana dan banyak dipakai terdiri dari kaca yang berwarna. Dengan adanya filter optik sebagai bagian monokromator akan dihasilkan pita cahaya yang sangat sempit sehingga kepekaan analisisnya lebih tinggi. Dan lebih dari itu akan didapatkan cahaya hampir monokromatis sehingga akan mengikuti hukum Lambert-Beer pada analisis kuantitatif.

c. Prisma dan Kisi (grating)

Prisma dan kisi merupakan bagian monokromator yang terpenting. Prisma dan kisi pada prinsipnya mendispersi radiasi elektromagnetik sebesar mungkin supaya didapatkan resolusi yang baik dari radiasi polikromatis.

3. Kuvet

Kuvet atau sel merupakan wadah sampel yang dianalisis. Kuvet ini bentuk biasanya terbuat dari quartz atau leburan silika dan ada yang dari gelas dengan bentuk

tabung empat persegi panjang 1x1 cm, dengan tinggi kurang lebih 5 cm. Pada pengukuran di daerah ultra lembayung dipakai quartz atau leburan silika, sedang kuvet dari gelas tidak dipakai, sebab gelas mengabsorpsi sinar ultra lembayung.

4. Detektor

Detektor merupakan salah satu bagian dari spektrofotometer yang penting oleh sebab itu detektor akan menentukan kualitas dari spektrofotometer adalah merubah signal elektronik.

5. Amplifier

Amplifier dibutuhkan pada saat sinyal listrik elektronik yang dilahirkan setelah melewati detektor untuk menguatkan karena penguat dengan resistensi masukan yang tinggi sehingga rangkaian detektor tidak terserap habis yang menyebabkan keluaran yang cukup besar untuk dapat dideteksi oleh suatu alat pengukur (Mulja, 1995: 13).

Prinsip penentuan spektrofotometer UV-Vis merupakan aplikasi dari Hukum Lambert Bert. Hukum ini menyatakan bahwa intensitas yang diteruskan oleh larutan zat penyerap berbanding lurus dengan tebal dan konsentrasi kuvet (Rohman, 2007). Kesalahan–kesalahan secara sistematis dalam penggunaan spektrofotometer seringkali terjadi. Penyebab terjadinya kesalahan tersebut adalah (Tahir, 2008):

1. Serapan oleh larutan. Kesalahan seperti ini dapat diatasi dengan penggunaan blanko. Blanko adalah larutan yang berisi matrik selain komponen yang dianalisis.
2. Serapan oleh kuvet. Bahan yang biasanya digunakan dalam pembuatan kuvet adalah kuarsa (silika) dan gelas. Kuvet dari bahan kuarsa memberikan kualitas yang

lebih baik dibandingkan dari bahan gelas. Kesalahan ini dapat diatasi dengan penggunaan jenis, ukuran dan bahan kuvet yang sama untuk tempat blanko dan sampel.

3. Kesalahan fotometrik normal pada pengukuran absorbansi yang sangat rendah atau sangat tinggi. Hal tersebut dapat diatasi dengan pengaturan konsentrasi, sesuai dengan kisaran sensitivitas dari alat yang digunakan. Kesalahan dalam penggunaan spektrofotometer UV-Vis dapat diatasi dengan dilakukannya proses kalibrasi. Kalibrasi dilakukan dengan menggunakan blanko, yaitu setting nilai absorbansi = 0 dan nilai transmitansi = 100%.

H. Tinjauan Islam tentang Tanaman Obat

Islam sebagai agama yang lengkap dan sempurna telah mengajarkan kepada hambanya bagaimana cara hidup sehat, mencegah penyakit maupun mengobati bagi yang terkena penyakit. Namun tentunya seorang hamba tidaklah bergantung pada pengobatan semata karena tentunya segala penyakit bergantung kepada Dzat yang memberikan penyakit itu sendiri dan yang menurunkan obatnya sekaligus yaitu Allah swt. Sungguh tidak ada yang dapat memberikan kesembuhan kecuali Allah swt. semata.

Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. asy-Syu'ara: 80 berbunyi :

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٨٠﴾

Terjemahnya :

“dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan Aku.” (Depag, 1989; 370)

Dalam tafsir Al-Misbah, “*wa idza maridhtu*” dan apabila aku sakit mengandung makna besarnya kemungkinan atau bahkan kepastian terjadinya keniscayaan terhadap manusia dalam hal ini adalah sakit. Ini mengisyaratkan bahwa sakit baik berat maupun ringan, fisik ataupun mental merupakan salah satu keniscayaan hidup manusia. Secara tegas dalam ayat ini, Nabi Ibrahim as. menyatakan bahwa yang melakukannya adalah Dia, Tuhan semesta alam (Shihab, 2002; 258).

لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ

Artinya :

“Untuk setiap penyakit ada obatnya. Apabila obat tersebut sesuai dengan penyakitnya, penyakit tersebut akan sembuh dengan seizin Allah ” (H.R. Muslim).

Maksud hadits tersebut adalah, apabila seseorang diberi obat yang sesuai dengan penyakit yang dideritanya, dan waktunya sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah, maka dengan seizin-Nya orang sakit tersebut akan sembuh.

Firman Allah swt. dalam QS. Luqman: 10-11 berbunyi:

خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ^ط وَالْقَى فِي الْأَرْضِ رَواسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ^ع وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿١٠﴾ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ^ع بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿١١﴾

Terjemahnya :

“Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya dan Dia meletakkan gunung-gunung (di permukaan) bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu; dan memperkembang biakkan padanya segala macam jenis binatang. dan Kami turunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik (10). Inilah ciptaan Allah, Maka perhatikanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembah-sembahan(mu) selain Allah. sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata (11).”

Ayat ini memaparkan kekuasaan dan kehebatan ciptaan-Nya sekaligus sebagai bukti keperkuasaan-Nya. Ayat ini menyatakan *Dia menciptakan langit* demikian tinggi dan besar tanpa *tiang yang kamu melihatnya* dengan mata kepala sendiri seperti itu, dan *Dia meletakkan di permukaan bumi* yang merupakan hunian kamu *gunung-gunung* yang sangat kukuh sehingga tertancap kuat *supaya ia*, yakni bumi itu, *tidak guncang bersama kamu*, kendati ia lonjong dan terus berputar, dan *Dia mengembangbiakkan di sana segala jenis binatang* yang berakal, menyusui, bertelur, melata, dan lain-lain, dan *Kami turunkan air hujan dari langit*, baik yang cair maupun yang membeku, lalu *Kami tumbuhkan padanya*, setelah pencampuran tanah dengan air yang turun itu, *segala macam pasangan tumbuh-tumbuhan yang baik*.

Kata *karim* digunakan untuk segala sesuatu yang baik sesuai objeknya. *Rizq yang karim* adalah yang banyak, halal dan bermanfaat. Pasangan tumbuhan yang

karim adalah yang tumbuh subur dan menghasilkan apa yang diharapkan dari penanamannya.

Setelah menyebutkan beberapa ciptaan Allah swt., ayat di atas melanjutkan bahwa : *inilah* yang sangat dekat kepada kamu dan yang dapat kamu lihat sehari-hari yang merupakan *ciptaan Allah swt.* bukan ciptaan-Nya yang jauh tidak dapat kamu jangkau atau ketahui. *Maka perhatikanlah kepada-Ku* atau beritahulah aku *apa yang telah diciptakan oleh yang sembahkan-sembahkan kamu selain Allah! Sebenarnya orang-orang zalim, yang menyembah selain Allah atau mempersekutukan-Nya berada di dalam kesesatan yang nyata* (Shihab, 2002; 287-288).

Firman Allah swt. dalam QS. an-Nahl: 10 berbunyi:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿١٠﴾

Terjemahnya :

“*Dia-lah, yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebahagiannya menjadi minuman dan sebahagiannya (menyuburkan) tumbuh-tumbuhan, yang pada (tempat tumbuhnya) kamu menggembalakan ternakmu.*” (Depag, 1989;268)

Ayat ini adalah perincian argumentasi keEsaan Allah swt. Ayat ini menguraikan tentang tumbuh-tumbuhan yang merupakan bahan pangan dan kebutuhan manusia dan binatang.

Ayat di atas mengingatkan manusia dengan tujuan *agar* mereka mensyukuri nikmat Allah swt. dan memanfaatkan dengan baik anugerah-Nya bahwa *Dia yang Maha Kuasa itu lah yang telah menurunkan dari arah langit, yakni awan air hujan untuk kamu memanfaatkan. Sebagiannya menjadi minuman yang segar dan sebagian lainnya menyuburkan tumbuh-tumbuhan, yang padanya, yakni di tempat tumbuhnya,*

kamu menggembalakan ternak kamu sehingga binatang itu dapat dimakan dan pada gilirannya dapat menghasilkan untuk kamu susu, daging, dan bulu (Shihab, 2002: 542).

Firman Allah swt. dalam QS. an-Nahl: 11 berbunyi:

يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَبَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾

Terjemahnya :

“Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman; zaitun, korma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan.” (Depag, 1989; 268)

Ayat ini menyatakan bahwa *Dia*, yakni Allah swt., *menumbuhkan bagi kamu dengannya*, yakni dengan air hujan itu, *tanaman-tanaman*; dari yang paling cepat layu sampai dengan yang paling panjang usianya dan paling banyak manfaatnya. Dia menumbuhkan *zaitun*, salah satu pohon yang paling panjang usianya, demikian juga *kurma*, yang dapat dimakan mentah atau matang, mudah dipetik dan sangat bergizi lagi berkalori tinggi, juga *anggur* yang dapat dijadikan makanan halal atau minuman yang haram, dan dari segala macam atau sebagian *buah-buahan*, selain yang disebut di atas, dalam hal ini buah Patikala. *Sesungguhnya pada yang demikian*, yakni pada curahan hujan dan akibat-akibatnya itu, *benar-benar ada tanda* yang sangat jelas bahwa yang mengaturnya seperti itu adalah Maha Esa lagi Maha Kuasa. Tanda itu berguna *bagi kaum yang memikirkan*. Betapa tidak, sumber airnya sama, tanah

tempat tumbuhnya berdempet, tetapi ragam dan rasanya berbeda-beda (Shihab, 2002;543).

Firman Allah QS. an-Nahl: 69 yang berbunyi:

ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ۗ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ
أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٩﴾

Terjemahnya:

“kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan.” (Depag, 1989; 274)

Berdasarkan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa madu yang berasal dari lebah mengandung obat yang dapat menyembuhkan manusia dari penyakit, meskipun tidak semua penyakit dapat disembuhkan dengan madu. “Makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan”, disini mengisyaratkan bukan hanya madu yang dapat berkhasiat sebagai obat melainkan terdapat banyak tanaman lainnya, salah satunya adalah buah Patikala atau buah patikala (*Etilingera elatior*).

Di samping al-Qur’an mengisyaratkan tentang pengobatan juga menceritakan tentang keindahan alam semesta yang dapat kita jadikan sumber dari pembuat obat-obatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Lokasi penelitian di Laboratorium Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar dan Laboratorium Farmasetika Fakultas Farmasi Universitas Muslim Indonesia (UMI).

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian ekperimentatif. Dimana metode ini merupakan prosedur penelitian yang dilakukan untuk mengungkapkan hubungan sebab akibat dua variabel atau lebih, dengan mengendalikan pengaruh variabel lain. Metode ini dilaksanakan dengan memberikan variabel bebas kepada objek penelitian untuk diketahui akibatnya didalam variabel terikat.

C. Prosedur Kerja

a. Penyiapan Sampel

1) Pengambilan sampel

Sampel buah Patikala (*Etilingera elatior*) atau buah patikala diambil dari Kec. Burau, Kab. Luwu Timur. Buah diambil yang masih terlihat segar dan tidak busuk, kemudian dibersihkan dan dicuci dengan air bersih yang mengalir.

2) Pengolahan Sampel

Buah segar patikala di pipil dari bongkolnya (ditimbang), kemudian setiap buah dikupas kulitnya, isi buah segar ditimbang, lalu dimasukkan ke dalam *Juicer*, lalu mesin juicer dijalankan, cairan jus ditampung lalu diukur volumenya.

b. Formulasi Sirup Buah Patikala (*Etilingera elatior*)

1) Pembuatan sirup simplex

Ditimbang 650 g gula pasir, dilarutkan dalam air suling sampai 1000 ml dengan pemanasan, lalu disaring, disimpan dalam wadah tertutup rapat.

2) Pembuatan sirup buah patikala (*Etilingera elatior*)

Untuk formulasi 1 liter sirup, ditambahkan :

No.	Nama Bahan	Formula		
		I	II	III
1.	Jus buah patikala	30,6 gram	20,4 gram	10,2 gram
2.	Essens	2 ml	2 ml	2 ml
4.	Sirupus simplex	Ad 1 Liter	Ad 1 Liter	Ad 1 Liter

Pembuatan sirup buah dilakukan dengan cara memasukkan sirup simplex 65% sebanyak 500 ml yang telah dibuat ke dalam wadah botol kaca, kemudian jus buah Patikala yang telah ditimbang juga dimasukkan ke dalam larutan sirup simplex, ditambahkan 2 ml essens, dihomogenkan. Selanjutnya, dicukupkan dengan sirup simplex sampai 1 Liter.

c. Uji Stabilitas Fisik Sirup Buah Patikala (*Etilingera elatior*)

1) Organoleptik

Pengamatan organoleptik yang dilakukan terhadap sirup buah patikala (*Etilingera elatior*) yang telah dibuat meliputi pengamatan perubahan warna, bau, rasa, dan bentuk.

2) Bobot Jenis

Bobot jenis dari sediaan dapat digunakan alat piknometer pengukuran dilakukan setiap 7 hari selama 4 minggu, dimana mula-mula ditimbang pikno kosong dengan menggunakan neraca analitik, kemudian setelah diketahui berat pikno kosong (w_1) maka dimasukkan aquadest kedalam pikno yang telah ditimbang sebelumnya, lalu ditimbang kembali (w_2), dikeringkan, selanjutnya diisi dengan sampel kemudian ditimbang kembali (w_3) dengan menggunakan neraca analitik.

3) Viskositas

Sirup buah patikala (*Etilingera elatior*) yang telah disiapkan mula-mula diukur viskositasnya (sesaat sebelum penyimpanan) pada suhu kamar, suhu dingin, dan suhu 40°C masing-masing selama 30 hari, kemudian setiap minggu pada perlakuan yang telah ditetapkan diukur kembali viskositasnya dengan menggunakan viskometer Brookfield. Pengujian ini dilakukan setiap 7 hari selama 4 minggu pada suhu kamar, suhu dingin, dan suhu 40°C.

4) Indeks bias

Sirup buah Patikala (*Etlintera elatior*) yang telah disiapkan mula-mula diukur indeks biasnya (sesaat sebelum penyimpanan) pada suhu kamar, suhu dingin, dan suhu 40°C masing-masing selama 30 hari, kemudian setiap minggu pada perlakuan yang telah ditetapkan diukur kembali indeks biasnya dengan menggunakan refraktometer. Pengujian ini dilakukan setiap 7 hari selama 4 minggu pada suhu kamar, suhu dingin, dan suhu 40°C.

5) pH

Sirup buah Patikala (*Etlintera elatior*) yang telah disiapkan mula-mula diukur pH-nya (sesaat sebelum penyimpanan) pada suhu kamar, suhu dingin, dan suhu 40°C masing-masing selama 30 hari, kemudian setiap minggu pada perlakuan yang telah ditetapkan diukur kembali pH-nya dengan menggunakan indikator universal. Pengujian ini dilakukan setiap 7 hari selama 4 minggu pada suhu kamar, suhu dingin, dan suhu 40°C.

d. Uji Aktivitas Antioksidan (IC_{50})

1) Pembuatan Larutan DPPH 0,343 mM

Ditimbang DPPH (2,2-difenil-1-pikril hidrazil) sebanyak 13,52 mg kemudian dilarutkan dalam etanol p.a dengan menggunakan labu ukur 100 mL sehingga kadarnya 0,343 mM.

2) Pengukuran Serapan Maksimum Larutan DPPH

Pengujian dilakukan dengan mencampur 1,3 mL DPPH 0,343 mM dengan etanol p.a sampai volumenya 5,0 ml dalam labu ukur. Larutan ini kemudian

dipindahkan dalam wadah gelas coklat dan diinkubasi pada suhu 37°C selama 30 menit dan amati absorbansinya pada panjang gelombang 400-600 nm. Panjang gelombang yang memberikan nilai absorbansi paling besar di tetapkan sebagai panjang gelombang maksimum DPPH.

3) Penentuan Aktivitas Antioksidan Troloks (pembanding)

Sebanyak 10 mg troloks dilarutkan dalam 100 ml etanol p.a sehingga diperoleh konsentrasi sebesar 100 ppm sebagai larutan stok. Dipipet dari larutan stok troloks masing-masing 50 µl, 100 µl, 150 µl, 200 µl, dan 250 µl. Kemudian ditambahkan DPPH sebanyak 1,3 ml dan dicukupkan volumenya dengan etanol p.a hingga 5 ml sehingga diperoleh konsentrasi 1 µg/ml, 2 µg/ml, 3 µg/ml, 4 µg/ml, dan 5 µg/ml. Campuran tersebut dihomogenkan dan diinkubasi selama 30 menit suhu 37°C, lalu diukur serapannya menggunakan spektrofotometer Uv-Vis pada panjang gelombang 515 nm.

4) Penentuan Aktivitas Antioksidan Sirup Buah Patikala (*Etlintera elatior*)

Dipipet larutan sirup buah patikala 1000 bpj masing-masing 0,5 ml; 1 ml; 1,5 ml; 2 ml dan 2,5 ml; kemudian ditambahkan 1,3 ml larutan DPPH 0,343 mM pada setiap pengenceran, selanjutnya diencerkan dengan etanol p.a masing-masing sampai 5 ml, sehingga diperoleh konsentrasi 50 µg/ml, 100 µg/ml, 150 µg/ml, 200 µg/ml dan 250 µg/ml. Larutan ini diinkubasi selama 30 menit suhu 37°C, lalu diukur serapannya pada panjang gelombang 515 nm (visibel). Berubahnya warna dari ungu ke kuning

menunjukkan efisiensi penangkal radikal bebas. Daya pengikatan radikal bebas dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\% \text{ peredaman} = \frac{\text{Serapan kontrol} - \text{Serapan sampel}}{\text{Serapan Kontrol}} \times 100\%$$

D. Instrumen Penelitian

1. Alat-alat yang digunakan

Alat-alat yang digunakan adalah botol kaca, corong, *juicer (miyako)*, gelas erlenmeyer (*Pyrex*[®]), gelas kimia (*Pyrex*[®]), inkubator, labu tentukur (*Pyrex*[®]), piknometer (*Pyrex*[®]), pipet mikro (*Socorex ISBA S.*[®]), pipet tetes, pipet volum (*Pyrex*[®]), refraktometer (*Kem*), spektrofotometer UV-Vis (*Shimadzu UV 1601*[®]), timbangan analitik (*Presica*), vial, viskometer *Brookfield (DV-1 Prime)*.

2. Bahan-bahan yang digunakan

Bahan-bahan yang digunakan adalah aquadest, buah patikala (*Etilingera elatior*), 1,1-diphenyl-2-picrylhidrazyl (DPPH), essens, etanol p.a, gula pasir, indikator pH, kertas perkamen, kertas saring, tissue, dan troloks.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pada uji stabilitas fisik data yang diperoleh dari setiap pengujian dikumpulkan dan dianalisis menggunakan metode Rancangan Acak Kelompok (RAK) untuk melihat dan membandingkan stabilitas dari sirup buah patikala (*Etilingera elatior*) selama masa penyimpanan. Sedangkan untuk aktivitas antioksidan, analisis dilakukan dengan mengukur aktivitas antioksidan jus buah Patikala (*Etilingera elatior*) dengan metode DPPH menggunakan instrumen UV-VIS dan pengolahan data di lakukan

dengan menentukan nilai IC_{50} sampel uji jus buah Patikala dan sirup buah Patikala (*Etilingera elatior*).

F. Validasi dan Reliabilitas Instrumen

Alat ukur yang digunakan untuk penentuan aktivitas antioksidan dan uji stabilitas fisik adalah spektrofotometer UV-Vis, refraktometer dan *viscometer brookfield*. Validasi dijaga dengan cara menggunakan instrumen yang terkalibrasi. Reliabilitas dijaga dengan replikasi 3 kali tiap uji.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Uji Stabilitas Fisik Sirup Buah Patikala (*Etilingera elatior*)

a. Pengamatan Organoleptis

Tabel 1. Hasil pengamatan organoleptis

Rasa	Warna	Aroma	Bentuk
Manis	Merah terang	Khas	Cairan kental

b. Pengukuran viskositas

Table 2. Hasil pengukuran viskositas

Lama Penyimpanan (minggu ke)	Suhu		
	Kamar	Dingin	40°C
Minggu 0	20,80	20,80	20,80
	20,80	20,80	20,80
	20,80	20,80	20,80
Rata-rata	20,80	20,80	20,80
Minggu 1	20,21	20,15	19,21
	19,75	20,17	19,21
	19,21	20,35	19,00

Rata-rata	19,72333	20,22333	19,14
Minggu 2	19,60	19,85	19,30
	19,00	19,98	19,00
	19,60	19,85	19,30
Rata-rata	19,40	19,89333	19,2
Minggu 3	19,40	19,77	19,00
	19,40	19,77	19,00
	19,00	19,77	19,71
Rata-rata	19,26667	19,77	19,23667
Minggu 4	19,00	19,80	19
	19,80	19,80	19
	19,80	19,00	19
Rata-rata	19,53333	19,53333	19

c. Pengukuran pH

Tabel 3. Hasil pengukuran pH

Kondisi	Kelompok				
	Lama penyimpanan (minggu ke)				
	Minggu 0	Minggu 1	Minggu 2	Minggu 3	Minggu 4
Kamar	5	5	5	5	5
Dingin	5	5	5	5	5
40°C	5	5	5	5	5

d. Penentuan bobot jenis

Tabel 4. Hasil penentuan bobot jenis

Kondisi Suhu	Kelompok				
	Lama Penyimpanan (Minggu ke)				
	0	1	2	3	4
Kamar	1,144036882	1,159781135	1,161135884	1,159815617	1,158522
Dingin	1,144036882	1,157399061	1,162791095	1,163295014	1,165606
40°C	1,144036882	1,146046575	1,161328857	1,162156972	1,156498

e. Pengukuran indeks bias

Table 5. Hasil pengukuran indeks bias

Kondisi Suhu	Kelompok				
	Lama Penyimpanan (minggu ke)				
	0	1	2	3	4
Kamar	1,39392	1,394067	1,394237	1,393860	1,394468
Dingin	1,39392	1,394027	1,394170	1,393997	1,394673
40°C	1,39392	1,394383	1,394427	1,394703	1,394293

2. Uji Aktivitas Antioksidan Sirup Buah Patikala (*Etilingera elatior*)

a. Pengukuran aktivitas antioksidan jus buah Patikala (*Etilingera elatior*)

Tabel 6. Hasil perhitungan IC₅₀ dari jus buah Patikala (*Etilingera elatior*)

No.	Konsentrasi (ppm)	% Pengikatan DPPH	Persamaan Garis Linear	IC ₅₀ (ppm)
-----	----------------------	----------------------	---------------------------	------------------------

1.	50	46,27	$y = 37,96 + 0,235x$	52,347 µg/ml
2.	100	63,54		
3.	150	76,97		
4.	200	87,01		
5.	250	93,41		

b. Pengukuran aktivitas antioksidan sirup buah Patikala (*Etilingera elatior*)

Table 7. Hasil perhitungan IC₅₀ sirup buah Patikala

No	Formula	Konsentrasi (ppm)	% Penghambatan	Persamaan Garis	IC ₅₀
1.	Sirup I	50	45,79	$y = 38,508 + 0,2182x$	52,66728 µg/ml
		100	63,37		
		150	73,3		
		200	83,41		
		250	90,32		
2.	Sirup II	50	44,56	$y = 37,629 + 0,20906x$	59,1744 µg/ml
		100	63,58		
		150	69,08		
		200	78,21		
		250	89,51		
3.	Sirup III	50	40,08	$y = 34,322 + 0,21528x$	72,82609 µg/ml
		100	62,51		

		150	67,63		
		200	75,39		
		250	87,46		

c. Pengukuran aktivitas antioksidan troloks (pembanding)

Table 8. Hasil perhitungan IC₅₀ troloks

No.	Konsentrasi (ppm)	% Pengikatan DPPH	Persamaan Garis Linear	IC ₅₀ (ppm)
1.	1	18,42	$y = 7,903 + 9,633x$	4,370082 μg/ml
2.	2	25,29		
3.	3	37,36		
4.	4	47,42		
5.	5	55,52		

B. Pembahasan

Radikal bebas (*free radical*) adalah suatu senyawa atau molekul yang mengandung satu atau lebih elektron berpasangan menyebabkan senyawa tersebut secara reaktif mencari pasangan, dengan cara menyerang dan mengikat elektron molekul yang berada di sekitarnya. Reaksi ini akan berlangsung terus menerus dalam tubuh dan bila tidak dihentikan akan menimbulkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, katarak, penuaan dini, serta penyakit degeneratif lainnya. (Winarsih, 2007;15).

Radikal bebas dapat dihasilkan dari dalam tubuh (endongen) dan juga dari luar tubuh (eksogen). Radikal bebas endongen adalah radikal bebas yang dihasilkan dari dalam tubuh misalnya radikal dari mitokondria, xanthin oksidase, NADPH oksidase, mikrosom, membran inti dan peroksisom. Radikal bebas eksogen adalah radikal yang dihasilkan dari lingkungan luar seperti asap rokok, radikal UV, bahan kimia toksik. Jenis-jenis radikal bebas adalah *Reactive Oxygen Species* (ROS) dan *Reactive Nitrogen Species* (RNS).

Untuk menetralkan senyawa radikal bebas ini, maka dibutuhkan suatu senyawa antioksidan yang merupakan semua bahan yang dapat menunda atau mencegah kerusakan akibat oksidasi pada molekul sasaran, sehingga dapat melindungi sistem biologi tubuh dari efek merugikan (Siagian, 2002). Adapun beberapa senyawa yang dapat bertindak sebagai antioksidan, yaitu tokoferol, karotenoid, flavonoid, asam askorbat,

Salah satu tanaman rempah dan obat yang memiliki potensi sebagai pangan fungsional, yaitu sebagai senyawa antioksidan adalah Patikala (*Etlingera elatior*). Patikala merupakan salah satu jenis tanaman rempah-rempah yang sejak lama dikenal dan dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai obat-obatan berkaitan dengan khasiatnya, yaitu sebagai penghilang bau badan, dan bau mulut (Hidayat dan Hutapea 1991). Menurut Hasbah et. Al (2005) tanaman Patikala dapat dipakai untuk mengobati penyakit-penyakit yang tergolong berat, yaitu kanker dan tumor. Komponen bioaktif yang terdapat dalam buah Patikala yaitu alkaloid, fenol, flavonoid, triterpenoid,

steroid, dan glikosida. Komponen yang dominan pada buah Patikala adalah fenol, flavonoid dan saponin (Naufalin, dkk.2010). Senyawa antioksidan alami tumbuhan pada umumnya adalah senyawa fenolik atau polifenolik yang dapat berupa golongan flavonoid, turunan asam sinamat, kumarin, tokoferol, dan asam-asam organik polifungsional. Golongan flavonoid yang memiliki aktivitas antioksidan meliputi flavon, flavonol, isoflavon, katekin, dan flavonol (Winarsi, 2007; 45).

Buah Patikala diekstraksi dengan menggunakan alat *juicer extractor*, dimana alat ini dapat memeras sari pada buah baik yang larut air maupun yang tidak larut air, sehingga semua komponen senyawa dapat diperoleh. Metode ini merupakan cara yang sangat mudah dan praktis karena pada alat tersebut menggunakan mata pisau seperti halnya pada blender tetapi dengan putaran yang sangat cepat dan sari buah dapat terpisah dari ampasnya, sehingga dapat diperoleh sari buah (jus) yang jernih. Pembuatan jus buah patikala ini dilakukan dengan menggunakan 500 gram pipilan buah dikuliti, sehingga diperoleh daging buah berwarna merah jambu dan bening dengan biji berwarna hitam seberat 255 g. Selanjutnya, daging buah diperas menggunakan *juicer* dan diperoleh jus buah patikala sebanyak 110 ml. Jus buah patikala ini disimpan dalam gelas kimia dan ditutup dengan aluminium foil agar terhindar dari paparan sinar matahari.

Pada penelitian ini dilakukan uji aktivitas antioksidan jus buah patikala, kemudian diformulasi menjadi sirup buah patikala dan dilakukan lagi uji aktivitas antioksidan dengan trolox sebagai pembandingnya menggunakan metode DPPH.


Selain itu, juga dilakukan uji stabilitas fisik terhadap formulasi sirup buah patikala yang telah dibuat dengan menggunakan lima parameter uji, yaitu uji organoleptik, pengukuran viskositas, penentuan bobot jenis, pengukuran indeks bias dan pengukuran pH.

Jus buah patikala yang diperoleh dilakukan pengukuran aktivitas antioksidannya dengan menggunakan metode DPPH yang diukur menggunakan spektrofotometer Uv-Vis pada panjang gelombang 515 nm. Pada pengukuran aktivitas antioksidan digunakan lima deret konsentrasi, yaitu 50 µg/ml, 100 µg/ml, 150 µg/ml, 200 µg/ml, dan 250 µg/ml, dimana pada masing-masing konsentrasi dilakukan tiga kali pengukuran, sehingga hasil yang diperoleh lebih signifikan. Dan konsentrasi untuk pembanding yakni troloks, yaitu 1 µg/ml, 2 µg/ml, 3 µg/ml, 4 µg/ml, dan 5 µg/ml. Dalam penelitian ini troloks digunakan sebagai pembanding karena troloks merupakan senyawa antioksidan sintetik. Troloks[®] atau senyawa 6-hidroksi-2,5,7,8-tetrametilkroman-2-asam karboksilat dengan bobot molekul 250,32 g/mol merupakan antioksidan sintetik (Widyastuti, 2010: 11).

Uji aktivitas antioksidan dilakukan dengan menggunakan metode DPPH karena memiliki beberapa keuntungan yaitu, mudah digunakan, cepat, cukup teliti, baik digunakan dalam pelarut organik, dan sensitif untuk menguji aktivitas antioksidan dalam ekstrak tanaman serta hanya memerlukan sampel yang sedikit. (Apak *et al.* 2007).

Aktivitas antioksidan dari ekstrak dinyatakan dalam persen penghambatannya dalam menghambat radikal bebas. Persen penghambatan ini didapatkan dari perbedaan serapan absorbansi blanko yang digunakan pada setiap metode dengan absorbansi radikal bebas pada sampel yang diukur dengan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang maksimum yaitu 515. Selanjutnya persamaan regresi linear yang diperoleh dari grafik hubungan antara konsentrasi jus buah patikala dengan persen penghambatan untuk digunakan dalam mencari IC_{50} . Besarnya aktivitas antioksidan ditandai dengan nilai IC_{50} yaitu konsentrasi larutan sampel yang dibutuhkan untuk menghambat 50% radikal bebas (Kuntorini et al., 2010: 20). Menurut (Blois, 1958) bahwa semakin kecil nilai IC_{50} menunjukkan semakin tinggi aktivitas antioksidan, dimana untuk kapasitas antioksidan sangat kuat yaitu 50 ppm, kuat 50-100 ppm, sedang 101-150 ppm dan lemah >150 ppm.

Metode DPPH dipilih karena mudah digunakan, cepat, cukup teliti, baik digunakan dalam pelarut organik, dan sensitif untuk menguji aktivitas antioksidan dalam ekstrak tanaman (Apak et al. 2007). Metode DPPH (*1,1-difenil-2-pikrilhidrazil*) merupakan senyawa radikal nitrogen, DPPH akan mengambil atom hidrogen yang terdapat dalam suatu senyawa misalnya senyawa fenol. Mekanisme terjadinya reaksi DPPH ini berlangsung melalui mekanisme transfer elektron. Sebagaimana terlihat pada reaksi berikut :



Gambar 4. Reaksi DPPH dengan Antioksidan


Setelah bereaksi dengan senyawa antioksidan dari sampel jus buah patikala (*Etlingera elatior*) DPPH tersebut tereduksi dan warnanya akan berubah menjadi kuning. Perubahan tersebut dapat diukur dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 515 nm, dan diplotkan terhadap konsentrasi. Penurunan intensitas warna yang terjadi disebabkan oleh berkurangnya ikatan rangkap terkonjugasi pada DPPH. Hal ini dapat terjadi apabila adanya penangkapan satu elektron oleh zat antioksidan, menyebabkan tidak adanya kesempatan elektron tersebut untuk beresonansi.

Metode DPPH sensitif untuk mengukur aktivitas antioksidan dalam ekstrak tanaman tapi kurang sensitif untuk mengukur aktivitas antioksidan selain dari senyawa fenol (Apak *et al.* 2007). Dari hasil kurva profil absorbansi terhadap konsentrasi dapat diketahui bahwa semakin besar konsentrasi sampel akan menurunkan nilai absorbansi. Hal ini dikarenakan terjadinya proses stokiometri reaksi reduksi senyawa radikal bebas DPPH oleh senyawa yang memberikan donor hidrogen sehingga DPPH menjadi senyawa yang stabil.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil IC_{50} jus buah patikala, yaitu 52,347 $\mu\text{g/ml}$. Untuk sirup buah patikala pada formula I, yaitu 52,66728 $\mu\text{g/ml}$, formula II 59,1744 $\mu\text{g/ml}$, dan formula III 72,82609 $\mu\text{g/ml}$.

Sedangkan IC_{50} troloks, yaitu 4,370082 $\mu\text{g/ml}$. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas antioksidan jus buah patikala masih lebih lemah jika dibandingkan dengan troloks, namun aktivitas antioksidan jus buah patikala dan sirup buah Patikala tergolong dalam kategori kuat (50-100 ppm).


Dalam penelitian ini digunakan troloks sebagai pembanding karena troloks merupakan senyawa antioksidan sintetik. Troloks[®] atau senyawa 6-hidroksi-2,5,7,8-tetrametilkroman-2-asam karboksilat dengan bobot molekul 250,32 g/mol merupakan antioksidan sintetik (Widyastuti, 2010: 11).



Gambar 5. Struktur troloks[®]

Mekanisme antioksidan troloks[®] dengan cara mendonorkan atom H untuk bereaksi dengan radikal bebas sewaktu pertama kali dan memutuskan reaksi berantai yang terjadi sebelum produk akhir tersebut terbentuk. Pendonoran atom H ini akan membuat radikal bebas menjadi lebih stabil. Konsentrasi troloks[®] dibuat lebih kecil dibandingkan konsentrasi sampel karena troloks[®] merupakan senyawa murni yang telah terbukti sebagai senyawa antioksidan sehingga dengan konsentrasi kecilpun dapat menangkal radikal bebas, sedangkan pada sampel masih banyak senyawa kimia

yang terkandung di dalamnya sehingga konsentrasi sampel yang digunakan lebih besar dari konsentrasi troloks[®].



Gambar 6. Reaksi penangkapan atom H oleh DPPH dari Troloks[®]

Pada penelitian ini juga dilakukan uji stabilitas fisik terhadap sirup buah patikala, dimana ada lima parameter uji yang dilakukan, yaitu uji organoleptik, pengukuran viskositas, penentuan bobot jenis, pengukuran indeks bias, dan pengukuran pH. Pengujian ini dilakukan setiap 1 minggu selama 4 minggu dan pada kondisi suhu yang berbeda-beda, yaitu suhu ruang, suhu dingin, dan suhu 40°C. Tujuannya adalah untuk mengetahui kestabilan fisik dari sirup buah patikala yang dipengaruhi oleh perbedaan suhu pada periode waktu penyimpanan.

Uji organoleptik dilakukan dengan menentukan warna, aroma, rasa, dan bentuk dari sediaan sirup buah patikala.

Pengukuran viskositas dilakukan dengan menggunakan alat *viscometer Brookfield* yang merupakan alat untuk mengukur kekentalan (viskositas) suatu sediaan. Alat ini dilengkapi dengan spindle dengan nomor- nomor tertentu yang disesuaikan berdasarkan kekentalan sediaannya, dimana semakin kental suatu sediaan, maka nomor spindle yang dipakai semakin kecil. Hal yang membedakan

antara spindle yang satu dengan yang lain adalah diameter spindelnya, semakin tinggi nomor spindelnya maka semakin kecil diameter spindelnya. Nomor spindle yang tersedia, yaitu spindle yang terbesar diameternya adalah spindle 1 dan spindle yang paling kecil diameternya adalah spindle 7. Untuk sirup buah patikala digunakan spindle nomor 2 dengan kecepatan putaran 50 rpm selama 30 detik. Setelah dilakukan pengukuran viskositas, maka nilai viskositasnya akan tertera pada layar alat.

Penentuan bobot jenis dilakukan dengan menggunakan piknometer, dimana bobot pikno kosong (w_1), bobot pikno yang berisi aquadest (w_2), dan bobot pikno yang berisi sampel (w_3). Kemudian bobot jenis sampel ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{w_3 - w_1}{w_2 - w_1} \text{ dimana : } w_1 \text{ : bobot pino kosong (g)}$$

w_2 : bobot pikno + aquadest (g)

w_3 : bobot pikno + sampel (g)

Pengukuran indeks bias sirup buah patikala dilakukan dengan menggunakan alat refraktometer yang merupakan alat untuk mengukur indeks bias cairan, padatan dalam cairan atau serbuk dengan indeks bias dari 1,300 sampai 1,700 dan persentase padatan 0 sampai 95%, alat untuk menentukan indeks bias minyak, lemak, gelas optis, larutan gula, dan sebagainya, indeks bias antara 1,300 dan 1,700 dapat dibaca langsung dengan ketelitian sampai 0,001 dan dapat diperkirakan sampai 0,0002 dari gelas skala di dalam (Mulyono, 1997). Pengukuran sampel dilakukan dengan

memasukkan beberapa tetes sampel ke dalam wadah sampel sampai batas tertentu, kemudian diukur viskositasnya, sehingga muncul angka pada layar alat.

Pengukuran pH dilakukan dengan menggunakan strip pH indikator untuk mengetahui derajat keasaman dari sediaan sirup buah patikala. Menurut Buckle (1985), pH merupakan tingkat keasaman yang akan mempengaruhi daya tahan suatu produk. Dapat dikatakan bahwa kadar asam yang tinggi (pH yang rendah) disertai dengan total padatan terlarut yang tinggi seperti pada sirup merupakan teknik pengawetan pada produk. Pada pH rendah (kurang dari 4,6) mikroorganisme berbahaya seperti *Clostridium botulinum* akan sulit untuk tumbuh dan berkembang.

Pada penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil pengamatan pada uji organoleptik sirup buah patikala, yaitu cairan kental berwarna merah terang, aroma khas, dan berasa sangat manis.

Pada uji viskositas diperoleh hasil bahwa terjadi penurunan viskositas setiap minggunya dan viskositas yang paling rendah ditunjukkan pada suhu 40. Nilai viskositas setiap minggunya berkisar antara 19-20. Viskositas sirup cenderung meningkat dengan adanya lama waktu pemasakan. Viskositas yang dihasilkan cukup tinggi, disebabkan karena penambahan sukrosa saat pemanasan sehingga sukrosa dapat mengikat air bebas.

Untuk pengukuran indeks bias diperoleh hasil bahwa setiap minggunya terjadi penurunan dan peningkatan nilai indeks bias pada sirup buah patikala dan nilai indeks bias tertinggi ditunjukkan pada kondisi penyimpanan suhu 40°C. Untuk pengukuran

bobot jenis diperoleh hasil bahwa pada penyimpanan suhu dingin terjadi peningkatan bobot jenis setiap minggunya.

Pada pengukuran bobot jenis juga tidak terjadi perubahan secara signifikan, hal ini disebabkan karena tidak adanya perubahan fisik dari sediaan sirup, dimana tidak terjadi peningkatan maupun penurunan kekentalan yang signifikan pada sirup yang dapat mempengaruhi bobot jenis dan viskositasnya.

Sedangkan untuk pengukuran pH tidak terjadi perubahan apapun baik selama penyimpanan setiap minggunya maupun pada kondisi ketiga suhu yang berbeda, nilai pH nya tetap, yaitu 5. Kadar asam yang tinggi (pH rendah) disertai dengan total padatan terlarut yang tinggi pada sirup maka dapat dikatakan bahwa hal ini merupakan teknik pengawetan pangan karena dapat menghambat pertumbuhan kapang. Selain itu apabila gula ditambahkan dalam bahan pangan dengan konsentrasi tinggi (paling sedikit 40% padatan terlarut) sebagian dari air yang ada menjadi tidak tersedia untuk pertumbuhan mikroorganisme dan aktivitas air dari bahan pangan berkurang (Mukaromah dkk., 2010).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap jus buah Patikala (*Etlingera elatior*) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Formula sirup buah Patikala (*Etlingera elatior*) memiliki stabilitas fisik yang baik selama masa penyimpanan 4 minggu dan pada tiga kondisi suhu yang berbeda (suhu kamar, suhu dingin, dan suhu 40°C) dan dapat dilihat dari F hitung < F tabel pada taraf kepercayaan 99%.

2. Jus buah Patikala (*Etlingera elatior*) memiliki aktivitas antioksidan yang kuat terhadap DPPH, yaitu IC₅₀ 52,347 µg/ml.

3. Sirup buah Patikala (*Etlingera elatior*) memiliki aktivitas antioksidan (IC₅₀) yang kuat terhadap DPPH, dimana formula I, yaitu IC₅₀ 52,66728 µg/ml; formula II, yaitu IC₅₀ 59,1744 µg/ml; dan formula III, yaitu 72,82609 µg/ml.

B. Implikasi

Penulis berharap ada penelitian selanjutnya, yaitu pengaruh suhu pemanasan terhadap kekentalan sirup buah Patikala (*Etlingera elatior*) atau uji stabilitas kimia dan mikrobiologi sirup buah Patikala (*Etlingera elatior*).

KEPUSTAKAAN

- AFRC Institute of Fruit Research. *Home Preservation of Fruit and Vegetables*. London: HMSO Publications Centre. 1989.
- Agromedia, redaksi. *Buku Pintar Tanaman Obat*. Jakarta: PT. Agromedia Pustaka. 2008.
- Antoro, E.D. *Skrining Fitokimia Rimpang Nicolaia speciosa Horan. secara Mikrokimiawi Kromatografi Lapis Tipis dan Spektrofotometri UV*. FF-UGM. 1995.
- Apak R, Kubilai GI, Zyrek M, Karademir SE. "Novel total antioxidant capacity index for dietary polyphenols and vitamin C and E, using their cupric ion reducing in the presence neocuproine: cuprac method". *J Agric Food*, 2004.
- Arung, S.L. 2014. Uji Aktivitas Juis Patikala (*Etilingera elatior* (Jack). Smith) Sebagai Antioksidan dengan Metode 1,1 Diphenil-2-picryl hidrazil (DPPH)
- Backer CA, Brink RCB. *Flora of Java (Spermatopytes Only)*. Groningen The Netherlands. P.Noordhoof. 1963.
- Blois, M.S. "Antioxidant Determination by the use of a Stable Free Radical". *Nature* 181, 1985.
- Cahyadi, Wisnu. *Analisis dan Aspek Kesehatan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008.
- Chan, E.W.C, Y.Y. Lim dan M. Omar. *Antioxidant and Antibacterial activity of leaves of Etlingera species (Zingiberaceae) in Peninsular Malaysia*. Food Chemistry. Vol. 104 : 1586 – 1593. 2007.
- Cruess, W.V. *Commercial Fruit and Vegetable Products*. New York: Mc.Graw-Hill Co. 1958.
- Ditjen POM. *Farmakope Indonesia. Edisi III*. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 1979.
- Ditjen POM. *Farmakope Indonesia Edisi IV*. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 1995.
- Ditjen POM. *Parameter Standar Umum Ekstrak Tumbuhan Obat*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI. 2000.

- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Bandung: Gema Risalah Pres., 1989.
- Fessenden, R.J., and Fessenden, J.S. *Kimia Organik jilid 2*. Jakarta : Erlangga, 1982.
- Goel, R.K. *Technology of Food Products : Small Business Publications*. New Delhi. 1975.
- Habsah M., Lajis, N. H., Abas F., Ali, A. M., Sukari, M. A., Kikuzaki, H. and Nakatana N. *Antitumour-Promoting and Cytotoxic Constituentss of Etilingera Elatior*. Malaysian Journal of Medical Sciences. Vol. 12 : 6-12. 2005
- Heyne, K. *Tumbuhan Berguna Indonesia Jilid I*. Jakarta: Yayasan Sarana Wana Jaya. 1987.
- Hidayat, S.S dan Hutapea Jr..*Inventaris Tanaman Obat Indonesia. Edisi I* : 440-441. Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Kesehatan Republik Indonesia.1991
- Hudaya, A..Uji “*Antioksidan dan Antibakteri Ekstrak Air Bunga Kecombrang (Etilingera elatior) Sebagai Pangan Fungsional Terhadap Staphylococcus aureus dan Escherichia coli*”.Skripsi. Program Studi Biologi, FST, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta. 2010.
- Jaffar F. M., C. P. Osman,. N. H. Ismail,and K. Awang. *Analysis of Essential Oils of Leaves, Stems, Fowers and Rhizomes of Etilingera Elatior (JACK) R. M. SMITH*. The Malaysian Journal of Analytical Sciences, Vol. 11: 269-273. 2007.
- Koswara, 2009. E-book.com. *Pengolahan-pangan-dengan-suhu-rendah.pdf*_ Diakses tanggal 02 November 2014.
- Molyneux P. “*The use of the stable free radical diphenylpicrilhidrazyl (DPPH) for estimating antioxidant activity*”. Songklanakar J sci technol 26, 2004.
- Mukaromah. U., S. H. Susetyorini dan S. Aminah. *Kadar vitamin C, mutu fisik, pH dan mutu organoleptik sirup rosella (Hibiscus sabdariffa, I) berdasarkan cara ekstraksi*. Jurnal Pangan dan Gizi Vol. I(01): 43-51. 2010.
- Mulja, M, Suharman. *Analisis Instrumental*. Surabaya: Airlangga University Press, 1995.


- Naufalin, R., B. S. L. Jenie., F. Kusunandar., M. Sudarwanto, dan H. Rukmini., *Aktivitas Antibakteri Ekstrak Bunga Kecombrang Terhadap Bakteri Patogen dan Perusak Pangan*. Jurnal Teknologi dan Industri Pangan. Vol. 951 : 119-125. 2005.
- Naufalin, dkk. *Karakterisasi Nanoenkapsulan Buah Kecombrang (Nicolaia speciosa)*. Jurnal Teknologi dan Industri Pangan. 2010.
- Ningtyas, Rina. *‘Uji Antioksidan dan Antibakteri Ekstrak Air Daun Kecombrang (Etlingera elatior)*. (Jack) R.M. Smith’. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. Hal:9-10. 2010.
- Pantastico. *Postharvest Handling and Utilization of Tropical And Subtropical Fruits And Vegetables*. Penerjemah Kamariyanti dalam Fisiologi Pasca Panen, Penanganan Dan Pemanfaatan Buah-Buahan Tropika Dan subtropika, Gajah Mada University Press, Yogyakarta. 1997.
- Permadi, Adi. *Membuat Kebun Tanaman Obat*. Jakarta: Pustaka Bunda. 2008.
- Prakash, A., F., Rigelhof & E., Miller. “Antioxidant Activity”, http://www.medallionlabs.com/Downloads/Antiox_acti_.pdf, 2001.
- Rismana, Eriawan, Susi Kusumaningrum., Idah Rosidah., Nizar., Erna Yulianti. *Pengujian Stabilitas Sediaan Antiacne Berbahan Baku Aktif Nanopartikel Kitosan/Ekstrak Manggis – Pegagan*. Pusat Teknologi Farmasi dan Medika. Serpong. 2013
- Sa’ad M. *Uji Aktivitas Penangkap Radikal Isolat A dan B Fraksi IV Ekstrak Etanol Daun Kemangi (Ocimum sanctum Linn) terhadap Larva Artemia salina Leach dengan Metode Brine Shrimp Lethality Test (BST)*. Semarang: Universitas Diponegoro. 2009.
- Safaryani, Nurhayati, dkk. *Pengaruh Suhu dan Lama Penyimpanan terhadap Penurunan Kadar Vitamin C Brokoli (Brassica oleracea L)*. Semarang: Universitas Diponegoro. 2007.
- Satuhu, S. *Penanganan dan Pengolahan Buah*. Jakarta: PT Penebar Swadaya. 1994.
- Sastrohamidjojo, H. “Dasar–dasar Spektroskopi”. Yogyakarta: Liberty. [org/artikel_kimia/berita/antioksidan_dan_radikal_bebas/](http://artikel_kimia/berita/antioksidan_dan_radikal_bebas/). Diakses tanggal 1 November 2014.

- Setiati, S. Radikal Bebas. “*Antioksidan dan Proses Menua*”. Jakarta: *Majalah medika*, 2003.
- Shihab, Q. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, Vol. 10*. Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2002.
- Siagian A. *Bahan Tambahan Makanan*. Medan: Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sumatera Utara. 2002.
- Tahir, M. Indariani dan M. Sitanggang. *165 Sansevieria Eksklusif*. Jakarta: PT Agromedia Pustaka, 2008.
- Tampubolon, O.T., Suhatsyah S, dan Sastrapradja. S. Penelitian Pendahuluan Kimia Kecambah (*Nicolaia speciosa* Horan). *Risalah Simposium Penelitian Tumbuhan Obat III*. Fakultas Farmasi. UGM, Jogjakarta. 1983.
- Tranggono dan Sutardi. *Biokimia dan Teknologi Pasca Panen*. PAU Pangan dan Gizi UGM. Yogyakarta. 1990.
- Tressler, D.K. dan M.A. Joslyn. *Fruit and Vegetable Juice Processing Technology*. The AVI Publishing Company, Inc., Westport, Connecticut. 1961.
- Tressler, D.K. dan J.G. Woodrof. *Food Products Formulary Volume 3 : Fruit, Vegetable, And Nut Products*. The AVI Publishing Company Inc. Westport, Connecticut. 1976.
- Trilaksani, W. “*Antioksidan Jenis, Sumber, Mekanisme Kerja dan Peran Terhadap Kesehatan*”, 2003.
- Underwood, A.L. *Analisa Kimia Kuantitatif*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Widyastuti, N. “*Pengukuran Aktivitas Antioksidan dengan Metode CUPRAC, DPPH, FRAP serta korelasinya dengan Fenol dan Flavonoid pada Enam Tanaman*”. Skripsi. Bogor: Fakultas MIPA IPB, 2010.
- Winarno, F. G; S. Fardiaz; dan D. Fardiaz. *Pengantar Teknologi Pangan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 1982.
- Winarsi, H. *Antioksidan Alami dan Radikal Bebas*. Penerbit Kanisius. Yogyakarta, 2007.


Lampiran 1. Skema Kerja

1. Formulasi sirup buah patikala (*Etilingera elatior*)


a. Pembuatan sirup simplex




b. Pembuatan sirup buah patikala (*Etilingera elatior*)




2. Uji stabilitas fisik sirup buah patikala (*Etilingera elatior*)
a. Uji organoleptik




- b. Pengukuran bobot jenis




c. Uji viskositas



d. Pengukuran Indeks bias




e. Pengukuran pH





3. Uji Aktivitas Antioksidan

a. Pembuatan larutan DPPH 0,343 mM




b. Pengukuran λ maksimum larutan DPPH






c. Penentuan aktivitas antioksidan troloks (pembanding)




Ukur absorbansi
pada 515 nm

d. Penentuan aktivitas antioksidan jus buah patikala (*Etilingera elatior*)



e. Penentuan aktivitas antioksidan sirup buah patikala (*Etilingera elatior*)



Lampiran 2. Perhitungan Penyiapan larutan DPPH dan Sampel

$$0,343 \text{ mM} = \frac{3,43 \cdot 10^{-4}}{L} \text{ mol}$$

$$= \frac{3,43 \cdot 10^{-7}}{L} \text{ mol}$$

$$3,43 \cdot 10^{-7} \text{ mol} = \frac{\text{g}}{\text{BM}}$$

$$3,43 \cdot 10^{-7} \text{ mol} = \frac{\text{g}}{394,32 \text{ g/mol}}$$

$$\text{Massa} = 3,43 \cdot 10^{-7} \text{ mol} \cdot (394,32 \text{ g/mol})$$

$$\text{Massa/ml} = 0,0001352 \text{ g}$$

$$\text{Massa/100 ml} = 0,01352 \text{ g}$$

$$= 13,52 \text{ mg}$$

Lampiran 3. Nilai absorbansi jus buah Patikala (*Etilingera elatior*)

Tabel 9. Nilai absorbansi jus buah Patikala (*Etilingera elatior*)

Konsentrasi (ppm)	Absorbansi	Rata-rata absorbansi
50	0,393	0,420
	0,359	
	0,439	
100	0,351	0,285
	0,204	
	0,300	
150	0,117	0,180
	0,067	
	0,189	
200	0,080	0,102
	0,086	
	0,138	
250	0,053	0,052
	0,060	
	0,042	

Tabel 10. Hasil pengukuran seraan blanko DPPH

Absorbansi	Rata-rata
0,783	0.781667

0,782	
0,780	

Lampiran 4. Nilai absorbansi sirup buah patikala

Tabel 11. Nilai absorbansi sirup buah patikala formula I

Konsentrasi (ppm)	Absorbansi	Rata-rata absorbansi
50	0,433	0,424
	0,404	
	0,434	
100	0,296	0,286
	0,297	
	0,266	
150	0,216	0,209
	0,202	
	0,208	
200	0,121	0,129
	0,134	
	0,134	
250	0,076	0,076
	0,071	
	0,080	

Table 12. Nilai absorbansi sirup buah patikala formula II

Konsentrasi (ppm)	Absorbansi	Rata-rata absorbansi
50	0,440	0,433
	0,419	
	0,441	
100	0,285	0,285
	0,283	
	0,286	
150	0,253	0,242

	0,266	
	0,206	
200	0,164 0,160 0,187	0,170
250	0,080 0,086 0,080	0,082

Table 13. Nilai absorbansi sirup buah patikala formula III

Konsentrasi (ppm)	Absorbansi	Rata-rata absorbansi
50	0,470 0,469 0,466	0,468
100	0,297 0,296 0,286	0,293
150	0,254 0,254 0,251	0,253
200	0,187 0,195 0,195	0,192
250	0,108 0,095 0,091	0,098

Lampiran 5. Nilai absorbansi troloks

Tabel 14. Nilai absorbansi troloks

Konsentrasi (ppm)	Absorbansi	Rata-rata absorbansi
1	0,637 0,638 0,638	0,638
2	0,584 0,583 0,585	0,584
3	0,490 0,490 0,489	0,489
4	0,413 0,410 0,410	0,411
5	0,346 0,347 0,350	0,348

Lampiran 6. Perhitungan % penghambatan jus buah Patikala

1. Untuk konsentrasi 50 µg/ml

$$\% \text{ penghambatan} = \frac{0,781667 - 0,420}{0,781667} \times 100 \% = 46,27 \%$$

2. Untuk konsentrasi 100 µg/ml

$$\% \text{ penghambatan} = \frac{0,781667 - 0,285}{0,781667} \times 100 \% = 63,54 \%$$

3. Untuk konsentrasi 150 µg/ml

$$\% \text{ penghambatan} = \frac{0,781667 - 0,180}{0,781667} \times 100 \% = 76,97 \%$$

4. Untuk konsentrasi 200 µg/ml

$$\% \text{ penghambatan} = \frac{0,781667 - 0,102}{0,781667} \times 100 \% = 87,01 \%$$

5. Untuk konsentrasi 250 µg/ml

$$\% \text{ penghambatan} = \frac{0,781667 - 0,052}{0,781667} \times 100 \% = 93,41 \%$$

Lampiran 7. Perhitungan persen penghambatan sirup buah patikala (*Etilingera elatior*)

1. Formula 1

- a. untuk konsentrasi 50 µg/ml

$$\% \text{ penghambatan} = \frac{0,781667-0,424}{0,781667} \times 100 \% = 45,79 \%$$

- b. untuk konsentrasi 100 µg/ml

$$\% \text{ penghambatan} = \frac{0,781667-0,286}{0,781667} \times 100 \% = 63,37 \%$$

- c. untuk konsentrasi 150 µg/ml

$$\% \text{ penghambatan} = \frac{0,781667-0,209}{0,781667} \times 100 \% = 73,3 \%$$

- d. untuk konsentrasi 200 µg/ml

$$\% \text{ penghambatan} = \frac{0,781667-0,129}{0,781667} \times 100 \% = 83,41 \%$$

- e. untuk konsentrasi 250 µg/ml

$$\% \text{ penghambatan} = \frac{0,781667-0,757}{0,781667} \times 100 \% = 90,32 \%$$

2. Formula II

- a. untuk konsentrasi 50 µg/ml

$$\% \text{ penghambatan} = \frac{0,781667-0,433}{0,781667} \times 100 \% = 44,56 \%$$

- b. untuk konsentrasi 100 µg/ml

$$\% \text{ penghambatan} = \frac{0,781667-0,285}{0,781667} \times 100 \% = 63,58 \%$$

- c. untuk konsentrasi 150 µg/ml

$$\% \text{ penghambatan} = \frac{0,781667-0,242}{0,781667} \times 100 \% = 69,08 \%$$

d. untuk konsentrasi 200 µg/ml

$$\% \text{ penghambatan} = \frac{0,781667-0,170}{0,781667} \times 100 \% = 78,21 \%$$

e. untuk konsentrasi 250 µg/ml

$$\% \text{ penghambatan} = \frac{0,781667-0,082}{0,781667} \times 100 \% = 89,51 \%$$

3. Formula III

a. untuk konsentrasi 50 µg/ml

$$\% \text{ penghambatan} = \frac{0,781667-0,468}{0,781667} \times 100 \% = 40,08 \%$$

b. untuk konsentrasi 100 µg/ml

$$\% \text{ penghambatan} = \frac{0,781667-0,293}{0,781667} \times 100 \% = 62,51 \%$$

c. untuk konsentrasi 150 µg/ml

$$\% \text{ penghambatan} = \frac{0,781667-0,253}{0,781667} \times 100 \% = 67,63 \%$$

d. untuk konsentrasi 200 µg/ml

$$\% \text{ penghambatan} = \frac{0,781667-0,192}{0,781667} \times 100 \% = 75,39 \%$$

e. untuk konsentrasi 250 µg/ml

$$\% \text{ penghambatan} = \frac{0,781667-0,098}{0,781667} \times 100 \% = 87,46 \%$$

Lampiran 8. Perhitungan persen penghambatan trolaks

1. Untuk konsentrasi 1 µg/ml

$$\% \text{ penghambatan} = \frac{0,781667-0,638}{0,781667} \times 100 \% = 18,42 \%$$

2. Untuk konsentrasi 2 µg/ml

$$\% \text{ penghambatan} = \frac{0,781667-0,584}{0,781667} \times 100 \% = 25,29 \%$$

3. Untuk konsentrasi 3 µg/ml

$$\% \text{ penghambatan} = \frac{0,781667-0,489}{0,781667} \times 100 \% = 37,36 \%$$

4. Untuk konsentrasi 4 µg/ml

$$\% \text{ penghambatan} = \frac{0,781667-0,411}{0,781667} \times 100 \% = 47,42 \%$$

5. Untuk konsentrasi 5 µg/ml

$$\% \text{ penghambatan} = \frac{0,781667-0,348}{0,781667} \times 100 \% = 55,52 \%$$

Lampiran 9. Perhitungan persamaan regresi linear jus buah Patikala

Tabel 15. Perhitungan persamaan regresi linear jus buah Patikala

Konsentrasi		% peredaman		xy
x	x ²	y	y ²	
50	2500	46,27	2140,91	2313,5
100	10000	63,54	4037,33	6354
150	22500	76,97	5924,38	11545,5
200	40000	87,01	7570,74	17402
250	62500	93,41	8725,43	23352,5

750	137500	367,2	28398,79	60967,5
-----	--------	-------	----------	---------

Persamaan regresi $y = a + bx$

$$\text{Dimana, } a = \frac{\Sigma x^2 \cdot \Sigma y - \Sigma x \cdot \Sigma xy}{n \Sigma x^2 - (\Sigma x)^2}$$

$$= \frac{(137500 \times 367,2) - (750 \times 60967,5)}{5 \times 137500 - (750)^2}$$

$$= \frac{4764375}{125.500}$$

$$a = 37,96$$

$$\text{Dimana, } b = \frac{n \Sigma xy - \Sigma x \cdot \Sigma y}{n \Sigma x^2 - (\Sigma x)^2}$$

$$= \frac{(5 \times 60967,5) - (750 \times 367,2)}{5 \times 137.500 - (750)^2}$$

$$= \frac{29437,5}{125.500}$$

$$b = 0,235$$

Jadi, persamaan regresinya yaitu $y = a + bx$ atau $y = 37,96 + 0,235x$

Lampiran 10. Perhitungan persamaan regresi linear sirup buah Patikala

Tabel 16. Perhitungan persamaan regresi linear sirup buah Patikala formula I

Konsentrasi		% peredaman		xy
x	x ²	y	y ²	
50	2500	45,79	2096,724	2289,5

100	10000	63,37	4015,757	6337
150	22500	73,3	5372,890	10995
200	40000	83,41	6957,228	16682
250	62500	90,32	8157,702	22580
750	137500	356,19	26600,3	58883,5

Persamaan regresi $y = a + bx$

$$\begin{aligned} \text{Dimana, } a &= \frac{\Sigma x^2 \cdot \Sigma y - \Sigma x \cdot \Sigma xy}{n \Sigma x^2 - (\Sigma x)^2} \\ &= \frac{(13.7500 \times 26600,3) - (750 \times 58883,5)}{5 \times 137.500 - (750)^2} \\ &= \frac{4813500}{125.500} \\ a &= 38,508 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Dimana, } b &= \frac{n \Sigma xy - \Sigma x \cdot \Sigma y}{n \Sigma x^2 - (\Sigma x)^2} \\ &= \frac{(5 \times 58883,5) - (750 \times 26600,3)}{5 \times 137.500 - (750)^2} \\ &= \frac{27275}{125.500} \\ b &= 0,2182 \end{aligned}$$

Jadi, persamaan regresinya yaitu $y = a + bx$ atau $y = 38,508 + 0,2182x$

Tabel 17. Perhitungan persamaan regresi linear sirup buah Patikala formula II

Konsentrasi	% peredaman	xy
-------------	-------------	----

x	x ²	y	y ²	
50	2500	44,56	1985,594	2228
100	10000	63,58	4042,416	6358
150	22500	69,08	4772,046	10362
200	40000	78,21	6116,804	15642
250	62500	89,51	8012,040	22377,5
750	137500	344,94	24928,9	56967,5

Persamaan regresi $y = a + bx$

$$\begin{aligned} \text{Dimana, } a &= \frac{\Sigma x^2 \cdot \Sigma y - \Sigma x \cdot \Sigma xy}{n \Sigma x^2 - (\Sigma x)^2} \\ &= \frac{(13.7500 \times 344,94) - (750 \times 56967,5)}{5 \times 137.500 - (750)^2} \\ &= \frac{4703625}{125.500} \\ a &= 37,629 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Dimana, } b &= \frac{n \Sigma xy - \Sigma x \cdot \Sigma y}{n \Sigma x^2 - (\Sigma x)^2} \\ &= \frac{(5 \times 56967,5) - (750 \times 344,94)}{5 \times 137.500 - (750)^2} \\ &= \frac{26132,5}{125.500} \\ b &= 0,20906 \end{aligned}$$

Jadi, persamaan regresinya yaitu $y = a + bx$ atau $y = 37,629 + 0,20906x$

Tabel 18. Perhitungan persamaan regresi linear sirup buah Patikala formula III

Konsentrasi		% peredaman		xy
x	x ²	y	y ²	
50	2500	40,08	1606,406	2004
100	10000	62,51	3907,500	6251
150	22500	67,63	4573,817	10144,5
200	40000	75,39	5683,652	15078
250	62500	87,46	7649,252	21865
750	137500	333,07	23420,63	55342,5

Persamaan regresi $y = a + bx$

$$\begin{aligned} \text{Dimana, } a &= \frac{\Sigma x^2 \cdot \Sigma y - \Sigma x \cdot \Sigma xy}{n \Sigma x^2 - (\Sigma x)^2} \\ &= \frac{(13.7500 \times 333,07) - (750 \times 55342,5)}{5 \times 137.500 - (750)^2} \\ &= \frac{4290250}{125.500} \\ a &= 34,322 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Dimana, } b &= \frac{n \Sigma xy - \Sigma x \cdot \Sigma y}{n \Sigma x^2 - (\Sigma x)^2} \\ &= \frac{(5 \times 55342,5) - (750 \times 333,07)}{5 \times 137.500 - (750)^2} \\ &= \frac{26910}{125.500} \\ b &= 0,21528 \end{aligned}$$

Jadi, persamaan regresinya yaitu $y = a + bx$ atau $y = 34,322 + 0,21528x$

Lampiran 11. Perhitungan persamaan regresi linear troloks

Tabel 19. Perhitungan persamaan regresi linear troloks

Konsentrasi		% peredaman		xy
x	x ²	y	y ²	
1	1	18,42	339,296	18,42
2	4	25,29	639,5841	50,58
3	9	37,36	1395,770	112,08
4	16	47,42	2248,656	189,68
5	25	55,52	3082,470	277,60
15	55	184,01	7705,777	648,36

Persamaan regresi $y = a+bx$

$$\begin{aligned} \text{Dimana, } a &= \frac{\Sigma x^2 \cdot \Sigma y - \Sigma x \cdot \Sigma xy}{n \Sigma x^2 - (\Sigma x)^2} \\ &= \frac{(55 \times 184,01) - (15 \times 648,36)}{5 \times 55 - (15)^2} \\ &= \frac{395,15}{50} \\ a &= 7,903 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Dimana, } b &= \frac{n \Sigma xy - \Sigma x \cdot \Sigma y}{n \Sigma x^2 - (\Sigma x)^2} \\ &= \frac{(5 \times 648,36) - (15 \times 184,01)}{5 \times 55 - (15)^2} \end{aligned}$$

$$= \frac{481,65}{50}$$

$$b = 9,633$$

Jadi, persamaan regresinya yaitu $y = a + bx$ atau $y = 7,903 + 9,633x$

Lampiran 12. Perhitungan IC_{50} jus buah Patikala

$$y = 37,96 + 0,235x$$

$$50 = 37,96 + 0,235x$$

$$x = \frac{50 - 37,96}{0,235}$$

$$x = 52,347$$

$$IC_{50} = 52,347 \mu\text{g/ml}$$

Lampiran 13. Perhitungan IC_{50} sirup buah Patikala

1. Formula I

$$y = 38,508 + 0,2182x$$

$$50 = 0,1602x + 34,458$$

$$x = \frac{50 - 34,458}{0,1602}$$

$$x = 52,66728$$

$$IC_{50} = 52,66728 \mu\text{g/ml}$$

2. Formula II

$$y = 37,629 + 0,20906x$$

$$50 = 37,629 + 0,20906x$$

$$x = \frac{50-37,629}{0,20906}$$

$$x = 59,1744$$

$$IC_{50} = 59,1744 \mu\text{g/ml}$$

3. Formula III

$$y = 34,322 + 0,21528x$$

$$50 = 34,322 + 0,21528x$$

$$x = \frac{50-34,322}{0,21528}$$

$$x = 72,82609$$

$$IC_{50} = 72,82609 \mu\text{g/ml}$$

Lampiran 14. Perhitungan IC50 troloks

$$y = 7,903 + 9,633x$$

$$50 = 9,633x + 7,903$$

$$x = \frac{50-7,903}{9,633}$$

$$x = 4,370082$$

$$IC_{50} = 4,370082 \mu\text{g/ml}$$

Lampiran 15. Analisis Statistika Viskositas Sirup Buah Patikala dengan Rancangan Acak Kelompok (RAK)

Tabel 20. Analisis Statistika Viskositas Sirup Buah Patikala dengan Rancangan Acak

Kelompok (RAK)

Perlakuan suhu	Kelompok					Total	Rata- rata
	Lama penyimpanan						
	0	1	2	3	4		
Kamar	20,8	19,723	19,400	19,267	19,533	98,723	19,740
Dingin	20,8	20,223	19,893	19,770	19,533	100,220	20,044
40°C	20,8	19,140	19,200	19,237	19,000	97,380	19,475
Total	62,4	59,087	58,493	58,273	58,067	296,32	59,264
Rata-rata	20,8	19,695	19,498	19,424	19,355	98,733	19,755

$$\text{Faktor koreksi} = \frac{(\sum Y \dots)^2}{r \times t} = \frac{(279.6533)^2}{5 \times 3} = 5853,702$$

$$\begin{aligned} \text{JKTotal} &= \sum_{i=1}^t \sum_{j=1}^r \gamma_{ij}^2 - FK \\ &= (20,8)^2 + (19,732)^2 + \dots (19)^2 - 5853,702 \\ &= 5859,206 - 5853,702 \\ &= 5,503477 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{JKKelompok} &= \sum_j \frac{\gamma_j^2}{t} - FK \\ &= \frac{(62,4)^2 + (59,087)^2 + (58,493)^2 + (58,273)^2 + (58,067)^2}{3} - 5853,702 \\ &= 5857,994 - 5853,702 \end{aligned}$$

$$= 4,291636$$

$$\begin{aligned} \text{JK Kondisi} &= \sum_i \frac{y_i^2}{r} - FK \\ &= \frac{(92,723)^2 + (100,22)^2 + (97,38)^2}{5} - 5853,702 \\ &= 5854,512 - 5853,702 \\ &= 0,809197 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{JK Galat} &= \text{JK Total} - (\text{JK Kelompok} + \text{JK Kondisi}) \\ &= 5,503477 - (4,291636 + 0,809197) \\ &= 5,503477 - 5,100833 \\ &= 0,402644 \end{aligned}$$

$$\text{DB Kelompok} = 4$$

$$\text{DB Kondisi} = 2$$

$$\text{DB total} = 8$$

$$\text{DB Galat} = 2$$

$$\text{KT Kelompok} = \frac{\text{JK Kelompok}}{\text{DB Kelompok}} = \frac{4,291636}{4} = 1,072909$$

$$\text{KT Kondisi} = \frac{\text{JK Kondisi}}{\text{DB Kondisi}} = \frac{0,809197}{2} = 0,404598$$

$$\text{KT Galat} = \frac{\text{JK Galat}}{\text{DB Galat}} = \frac{0,402644}{2} = 0,201322$$

$$\text{FH Kelompok} = \frac{\text{KT Kelompok}}{\text{KT Galat}} = \frac{8,83328}{0,54403} = 5,329319$$

$$\text{FH Kondisi} = \frac{\text{KT Kondisi}}{\text{KT Galat}} = \frac{0,908896}{0,54403} = 2,009708$$

Lampiran 16. Analisis Varians Viskositas

Tabel 21. Analisis Varians Viskositas sirup buah patikala

Rumus varians	DB	JK	KT	F hitung	Tabel 5%	Tabel 1%
Penyimpanan	4	4,291636	1,072909	5,329319	3,84	7,01
Kondisi	2	0,809197	0,404598	2,009708	4,10	8,65
Galat	2	0,402644	0,201322			
Total	8	5,503477	1,678829			

Kesimpulan:

- Pada penyimpanan, $F_{hitung} < F_{tabel}$ 5% dan 1%, artinya tidak ada pengaruh suhu penyimpanan terhadap viskositas sirup buah patikala pada masing-masing lama penyimpanan.
- Pada kondisi, $F_{hitung} < F_{tabel}$ 5% dan 1%, artinya tidak ada pengaruh lama penyimpanan terhadap viskositas sirup buah patikala pada masing-masing suhu penyimpanan.

Lampiran 17. Analisis Statistika bobot jenis Sirup Buah Patikala dengan Rancangan

Acak Kelompok (RAK)

Tabel 22. Analisis Statistika bobot jenis Sirup Buah Patikala dengan Rancangan Acak

Kelompok (RAK)

Kondisi suhu	Kelompok					Total	Rata-rata
	Lama penyimpanan						
	0	1	2	3	4		
Kamar	1,144036882	1,159781135	1,161135884	1,159815617	1,158522010	5,783291527	1,156658305
Dingin	1,144036882	1,157399061	1,162791095	1,163295014	1,165605919	5,793127969	1,158625594
40°C	1,144036882	1,146046575	1,161328857	1,162156972	1,156497971	5,770067256	1,154013451
Total	3,432110645	3,463226771	3,485255835	3,485267602	3,480625900	17,34648675	3,469297350
Rata-rata	1,144036882	1,154408924	1,161751945	1,161755867	1,160208633	5,782162251	1,156432450

$$\text{Faktor koreksi} = \frac{(\sum Y. .)^2}{r \times t} = \frac{(17.34648675)^2}{5 \times 3} = 20.06004018$$

$$\begin{aligned} \text{JKTotal} &= \sum_{i=1}^t \sum_{j=1}^r \gamma_{ij}^2 - FK \\ &= (1.144036882)^2 + (1.159781135)^2 + \dots (1.156497971)^2 - \\ &\quad 20.06004018 \\ &= 20.0608875 - 20.06004018 \\ &= 0.000847328 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{JKKelompok} &= \sum_j \frac{\gamma_j^2}{t} - FK \\ &= \\ &= \frac{(3.432110645)^2 + (3.463226771)^2 + (3.485255835)^2 + (3.485267602)^2 + (3.4806259)^2}{3} - \\ &\quad 20.06004018 \\ &= 20.0607261 - 20.06004018 \end{aligned}$$

$$= 0.00068592$$

$$\begin{aligned} \text{JK Kondisi} &= \sum_i \frac{y_i^2}{r} - FK \\ &= \frac{(5.783291527)^2 + (5.793127969)^2 + (5.770067256)^2}{5} - 20.06004018 \\ &= 20.06009374 - 20.06004018 \\ &= 0.00005356 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{JK Galat} &= \text{JK Total} - (\text{JK Kelompok} + \text{JK Kondisi}) \\ &= 0.000847328 - (0.00068592 + 0.00005356) \\ &= 0.000847328 - 0.00073948 \\ &= 0.000107848 \end{aligned}$$

$$\text{DB Kelompok} = 4$$

$$\text{DB Kondisi} = 2$$

$$\text{DB total} = 8$$

$$\text{DB Galat} = 2$$

$$\text{KT Kelompok} = \frac{\text{JK Kelompok}}{\text{DB Kelompok}} = \frac{0.00068592}{4} = 0.00017148$$

$$\text{KT Kondisi} = \frac{\text{JK Kondisi}}{\text{DB Kondisi}} = \frac{0.00005356}{2} = 0.00002678$$

$$\text{KT Galat} = \frac{\text{JK Galat}}{\text{DB Galat}} = \frac{0.000107848}{2} = 0.0000539238$$

$$\text{FH Kelompok} = \frac{\text{KT Kelompok}}{\text{KT Galat}} = \frac{0.00017148}{0.0000539238} = 3.180043671$$

$$FH \text{ Kondisi} = \frac{KT \text{ Kondisi}}{KT \text{ Galat}} = \frac{0,00002678}{0,0000539238} = 0,496626549$$

Lampiran 18. Analisis Varians bobot jenis

Tabel 23. Analisis Varians bobot jenis sirup buah patikala

Rumus varians	DB	JK	KT	F hitung	Tabel 5%	Tabel 1%
Penyimpanan	4	0,0006860	0,0001710	3,180044	3,84	7,01
Kondisi	2	0,0000536	0,0000268	0,496627	4,10	8,65
Galat	2	0,0001080	0,0000539			
Total	8	0,0008470	0,0002520			

Kesimpulan:

- Pada kondisi, F hitung < F tabel 5% dan 1%, artinya tidak ada pengaruh suhu penyimpanan terhadap bobot jenis sirup buah patikala pada masing-masing lama penyimpanan.
- Pada kelompok, F hitung < F tabel 5% dan 1%, artinya tidak ada pengaruh lama penyimpanan terhadap bobot jenis sirup buah patikala pada masing-masing suhu penyimpanan.

Lampiran 19. Analisis Statistika indeks bias Sirup Buah Patikala dengan Rancangan Acak Kelompok (RAK)

Tabel 24. Analisis Statistika indeks bias Sirup Buah Patikala dengan Rancangan Acak

Kelompok (RAK)

Kondisi suhu	Kelompok					Total	Rata-rata
	Lama penyimpanan						
	0	1	2	3	4		
Kamar	1,39392	1,394067	1,394237	1,393900	1,394468	6,970552	1,3941104
Dingin	1,39392	1,394027	1,394170	1,394000	1,394673	6,970787	1,3941574
40°C	1,39392	1,394383	1,394427	1,394700	1,394293	6,971726	1,3943452
Total	4,181760	4,182477	4,182834	4,182600	4,183434	20,913070	4,1826130
Rata-rata	1,393920	1,394159	1,394278	1,394200	1,394478	6,9710220	1,3942043

$$\text{Faktor koreksi} = \frac{(\sum Y. .)^2}{r \times t} = \frac{(20.91307)^2}{5 \times 3} = 29.15708585$$

$$\begin{aligned} \text{JKTotal} &= \sum_{i=1}^t \sum_{j=1}^r \gamma_{ij}^2 - FK \\ &= (1.39392)^2 + (1.394067)^2 + \dots + (1.394293)^2 - 29.15708585 \\ &= 29.15708693 - 29.15708585 \\ &= 0.00000108 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{JKKelompok} &= \sum_j \frac{\gamma_j^2}{t} - FK \\ &= \frac{(4.18176)^2 + (4.182477)^2 + (4.182834)^2 + (4.1826)^2 + (4.183434)^2}{3} - 29.15708585 \\ &= 29.15708634 - 29.15708585 \end{aligned}$$

$$= 0.00000049$$

$$\begin{aligned} \text{JK Kondisi} &= \sum_i \frac{Y_i^2}{r} - FK \\ &= \frac{(6.970552)^2 + (6.970787)^2 + (6.971726)^2}{5} - 29.15708585 \\ &= 29.157086 - 29.15708585 \end{aligned}$$

$$= 0.00000015$$

$$\begin{aligned} \text{JK Galat} &= \text{JK Total} - (\text{JK Kelompok} + \text{JK Kondisi}) \\ &= 0.00000108 - (0.00000049 + 0.00000015) \\ &= 0.00000108 - 0.00073948 \\ &= 0.00000044 \end{aligned}$$

$$\text{DB Kelompok} = 4$$

$$\text{DB Kondisi} = 2$$

$$\text{DB total} = 8$$

$$\text{DB Galat} = 2$$

$$\text{KT Kelompok} = \frac{\text{JK Kelompok}}{\text{DB Kelompok}} = \frac{0.00000049}{4} = 0,0000001225$$

$$\text{KT Kondisi} = \frac{\text{JK Kondisi}}{\text{DB Kondisi}} = \frac{0.00000015}{2} = 0.000000075$$

$$\text{KT Galat} = \frac{\text{JK Galat}}{\text{DB Galat}} = \frac{0.00000044}{2} = 0,0000000629$$

$$\text{FH Kelompok} = \frac{\text{KT Kelompok}}{\text{KT Galat}} = \frac{0,0000001225}{0,0000000629} = 3.180043671$$

$$FH \text{ Kondisi} = \frac{KT \text{ Kondisi}}{KT \text{ Galat}} = \frac{0,000000075}{0,0000000629} = 0.496626549$$

Lampiran 20. Analisis Varians indeks bias

Tabel 25. Analisis Varians indeks bias sirup buah patikala

rumus varians	DB	JK	KT	F hitung	Tabel 5%	Tabel 1%
penyimpanan	4	0,00000049	0,0000001225	1,947535771	3,84	7,01
kondisi	2	0,00000015	0,0000000750	1,192368839	4,10	8,65
galat	2	0,00000044	0,0000000629			
total	8	0,00000108	0,0000002604			

Kesimpulan:

- Pada kondisi, $F \text{ hitung} < F \text{ tabel } 5\% \text{ dan } 1\%$, artinya tidak ada pengaruh suhu penyimpanan terhadap indeks bias sirup buah patikala pada masing-masing lama penyimpanan.
- Pada kelompok, $F \text{ hitung} < F \text{ tabel } 5\% \text{ dan } 1\%$, artinya tidak ada pengaruh lama penyimpanan terhadap indeks bias sirup buah patikala pada masing-masing suhu penyimpanan.

Lampiran 21. Analisis Statistika pH Sirup Buah Patikala dengan Rancangan Acak

Kelompok (RAK)

Tabel 26. Analisis Statistika pH Sirup Buah Patikala dengan Rancangan Acak

Kelompok (RAK)

Kondisi suhu	Kelompok					Total	Rata- rata
	Lama penyimpanan						
	0	1	2	3	4		
Kamar	5	5	5	5	5	25	5
Dingin	5	5	5	5	5	25	5
40°C	5	5	5	5	5	25	5
Total	15	15	15	15	15	75	15
Rata-rata	5	5	5	5	5	25	5

$$\text{Faktor koreksi} = \frac{(\sum Y. .)^2}{r \times t} = \frac{(75)^2}{5 \times 3} = 375$$

$$\begin{aligned} \text{JKTotal} &= \sum_{i=1}^t \sum_{j=1}^r \gamma_{ij}^2 - FK \\ &= (5)^2 + (5)^2 + \dots (5)^2 - 375 \\ &= 375 - 375 \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{JKKelompok} &= \sum_j \frac{\gamma_j^2}{t} - FK \\ &= \frac{(15)^2 + (15)^2 + (15)^2 + (15)^2 + (15)^2}{3} - 375 \end{aligned}$$

$$= 375 - 375$$

$$= 0$$

$$\begin{aligned} \text{JK Kondisi} &= \sum_i \frac{y_i^2}{r} - FK \\ &= \frac{(25)^2 + (25)^2 + (25)^2}{5} - 375 \end{aligned}$$

$$= 375 - 375$$

$$= 0$$

$$\text{JK Galat} = \text{JK Total} - (\text{JK Kelompok} + \text{JK Kondisi})$$

$$= 0 - (0 + 0)$$

$$= 0$$

$$\text{DB Kelompok} = 4$$

$$\text{DB Kondisi} = 2$$

$$\text{DB total} = 8$$

$$\text{DB Galat} = 2$$

$$\text{KT Kelompok} = \frac{\text{JK Kelompok}}{\text{DB Kelompok}} = \frac{0}{4} = 0$$

$$\text{KT Kondisi} = \frac{\text{JK Kondisi}}{\text{DB Kondisi}} = \frac{0}{2} = 0$$

$$\text{KT Galat} = \frac{\text{JK Galat}}{\text{DB Galat}} = \frac{0}{2} = 0$$

$$\text{FH Kelompok} = \frac{\text{KT Kelompok}}{\text{KT Galat}} = -$$

$$\text{FH Kondisi} = \frac{\text{KT Kondisi}}{\text{KT Galat}} = -$$

Lampiran 22. Analisis Varians pH

Tabel 27. Analisis Varians pH sirup buah patikala

Rumus varians	DB	JK	KT	F hitung	Tabel 5%	Tabel 1%
Penyimpanan	4	0	0	–	3,84	7,01
Kondisi Galat	2	0	0	–	4,10	8,65
Total	8	0	0			

Kesimpulan:

- Tidak terjadi perubahan pH pada kondisi suhu penyimpanan.
- Tidak terjadi perubahan pH selama lama penyimpanan.

Lampiran 23. Tanaman Kecombrang (*Etilingera elatior*)



Gambar 8. Buah Patikala (Etilingera elatior)

Lampiran 24. Jus Buah Patikala (*Etlingera elatior*)




Gambar 9. Jus Buah Patikala (Etlingera elatior)




Gambar 10. Sirup Buah Patikala (Etlingera elatior)

Lampiran 26. Kurva baku troloks terhadap DPPH




Gambar 11. Troloks terhadap DPPH

Lampiran 26. Kurva baku jus buah Patikala




Gambar 12. Jus Buah Patikala terhadap DPPH


Lampiran 27. Kurva Baku Sirup Buah Patikala



Gambar 13. Sirup Formula I terhadap DPPH



Gambar 14. Sirup Formula II terhadap DPPH



Gambar 15. Sirup Formula III terhadap DPPH

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

Gadis yang mempunyai nama lengkap Dian Fuspita Dewi Syamsuddin atau disapa Dian ini lahir di Makassar, 23 Mei 1993. Anak kedua dari enam bersaudara. Anak dari Syamsudddin



dan Nuraeni ini memulai pendidikan dasarnya di SDN Pao-pao selama 6 tahun, lalu dilanjutkan dengan pendidikan tingkat sekolah menengah pertama di MTs. Madani Alauddin, dan tamat pada tahun 2008. Kemudian pada pertengahan tahun 2011, saya berhasil menyelesaikan pendidikan di sekolah menengah atas MA. Madani Alauddin, lalu sejak September 2011 saya telah tercatat sebagai salah satu mahasiswa jurusan

Farmasi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang ada di Samata, Gowa. Semoga ia dapat menjadi orang yang sukses yang dapat membanggakan orang tua dan orang-orang yang menyayanginya.