

***HYPNO-EFT (EMOTIONAL FREEDOM TECHNIQUE) TERHADAP
SKALA NYERI PADA PASIEN POST OPERASI ORTOPEDI***



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Keperawatan Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar**

Oleh :

**RUSDIANA .M
NIM : 70300112007**

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2016

***HYPNO-EFT (EMOTIONAL FREEDOM TECHNIQUE) TERHADAP
SKALA NYERI PADA PASIEN POST OPERASI ORTOPEDI***



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Keperawatan Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar**

Oleh :

**RUSDIANA .M
NIM : 70300112007**

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat dengan orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 21 Juli 2016

Penyusun

Rusdiana. M
NIM.70300112007

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'Alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas karunia-Nya berupa kesehatan, kesempatan, dan nikmat yang begitu besar bagi umatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Hypno-EFT (Emotional Freedom Technique)* Terhadap Skala Nyeri Pada Pasien Post Operasi Ortopedi Di RSUD Labuang Baji Makassar”. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad saw yang merupakan suri tauladan yang terbaik, juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan semoga sampai kepada umat sekarang yang konsisten pada ajaran beliau. Penelitian dan penyusunan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Karya ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta, Ayahanda Musa D. dan Ibunda Nur Daeni yang senantiasa mendoakan dan memberikan kasih sayang, dukungan moril maupun materil serta adik-adikku yang selalu memberikan tawa kebahagiaan, Rustan, Salman Al Faqih, dan Khairul Azam. Serta segenap keluarga besar yang telah memberikan kasih sayang, arahan serta nasehatnya dalam menghadapi tantangan dan rintangan selama melakukan penyelesaian studi.

Segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak yang senantiasa menghiasi segala keluh kesah yang terucap dari keterbatasan penulis. Atas terselesainya skripsi ini, maka izinkanlah

penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh staf akademik yang telah membantu selama penulis mengikuti pendidikan.
3. Bapak Dr. Muh. Anwar Hafid, S.Kep., Ns., M.Kes., selaku Ketua Program Studi Keperawatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh Dosen Program Studi Keperawatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah berjasa memberikan bekal pengetahuan untuk memperkaya dan mempertajam daya kritis serta intuisi penulis.
4. Ibu Dr. Nurhidayah, S.Kep., Ns., M.Kes., selaku Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar sekaligus sebagai pembimbing I yang penuh kesabaran dan keikhlasan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan perhatian serta bimbingan kepada penulis.
5. Ibu Syamsiah Rauf, S.kep., Ns., M.Kep., selaku pembimbing II yang juga tetap sabar dan ikhlas dalam memberikan bimbingan kepada penulis.
6. Ibu Arbiansih, S.Kep., Ns., M.Kes., selaku penguji I dan Bapak Dr. Misbahuddin, S.Ag., M.Ag., selaku penguji II atas saran, kritik dan arahan yang diberikan kepada penulis.
7. Pimpinan, staf, dan perawat di RSUD Labuang Baji Makassar yang telah banyak membantu sepanjang proses penelitian ini. Serta pasien yang telah bersedia menjadi responden pada saat penelitian.

8. Sahabat seperjuanganku, Nurelisa, Ummu Alfatimah, Andini Fitriani, Nurrahmayani, Marhani, Nurul Hijrihani, Sri Novi Ardilla, Nur Ilmi, Ade Irma Suhardi, Vivi juwita Abdul, dan Nurmila Sandi yang telah setia berjuang dan telah memberikan begitu banyak inspirasi dan motivasi. Serta teman-teman dwipati SMA Neg. 3 Polewali atas segala dukungan dan do'anya.
9. Mahasiswa Prodi Keperawatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Angkatan 2012 atas kebersamaannya selama ini, yang selalu memberikan semangat dalam rasa kekeluargaan.
10. Semua pihak yang telah banyak membantu, dimana nama-namanya tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Tidak ada sesuatu terwujud yang dapat penulis berikan, kecuali dalam bentuk harapan, do'a dan menyerahkan segalanya hanya kepada Allah swt. Semoga segala amal ibadah serta niat yang ikhlas untuk membantu akan mendapatkan balasan yang setimpal dari-Nya. Penulis menyadari bahwa meskipun skripsi ini dibuat dengan usaha yang maksimal dari peneliti, tidak menutup kemungkinan di dalamnya masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis terbuka dalam menerima kritik dan saran yang bersifat membangun sehingga dapat berkarya lebih baik lagi pada masa yang akan datang.

Akhirnya, harapan dan do'a penulis adalah semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bernilai ibadah disisi-Nya. Amin.

Makassar, Mei 2016

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR SKEMA	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1-25
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Hipotesis	6
D. Tujuan	7
E. Definisi Operasional	7
F. Manfaat Penelitian	9
G. Kajian Pustaka	10
BAB II TINJAUAN TEORI	26-57
A. Bedah Ortopedi	26
B. Nyeri	31
C. <i>Hypno-Eft (Emotional Freedom Technique)</i>	46
D. Kerangka Konsep	55

E. Kerangka Kerja	57
BAB III METODE PENELITIAN	58-64
A. Desain Penelitian	58
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	59
C. Populasi dan Sampel	59
D. Instrumen Penelitian	60
E. Sumber dan Cara Pengumpulan Data	61
F. Pengolahan dan Analisa Data	62
G. Etika Penelitian	63
BAB IV HASIL PENELITIAN	65-84
A. Profil Tempat Penelitian	65
B. Hasil Penelitian	66
C. Pembahasan	72
D. Keterbatasan Penelitian	84
BAB V PENUTUP	85-86
A. Kesimpulan	85
B. Saran	85
Daftar Pustaka	
Lampiran	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Penilaian Intensitas Nyeri	8
Gambar 2.1 Skala Numerik	42
Gambar 2.2 Skala Deskriptik	42
Gambar 2.3 Skala Analog Visual	43
Gambar 2.4 Titik Sore Spot	51
Gambar 2.5 Titik Meridian Tubuh	52
Gambar 2.6 Titik Gammut	53
Gambar 3.1 Penilaian Intensitas Nyeri Skala Numerik	61
Gambar 4.1 Diagram <i>Estimated Marginal Means</i>	71
Gambar 4.2 Titik EFT (<i>Emotional Freedom Technique</i>).....	79

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kajian Pustaka.....	10
Tabel 2.1 Perbedaan Serabut Syaraf A-Delta dan C.....	34
Tabel 3.1 Rancangan <i>Pre-Eksperimental</i>	58
Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Umur Pada Pasien Post Operasi Ortopedi yang mengalami Fraktur (N=10).....	66
Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Pasien Post Operasi Ortopedi yang mengalami Fraktur (N=10)....	66
Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pada Pasien Post Operasi Ortopedi yang mengalami Fraktur (N=10)....	67
Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pekerjaan Pada Pasien Post Operasi Ortopedi yang mengalami Fraktur (N=10).....	67
Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Tingkat Nyeri Pada Pasien Post Operasi Ortopedi yang mengalami Fraktur Sebelum dan Sesudah Dilakukan <i>Hypno-Eft (Emotional Freedom Technique)</i> (N=10).....	68
Tabel 4.6 Rerata Skala Nyeri Sebelum dan Sesudah Dilakukan <i>Hypno-Eft (Emotional Freedom Technique)</i> (N=10).....	69
Tabel 4.7 Uji Normalitas.....	70
Tabel 4.8 Hasil Uji Repeated Anova Perbandingan Skala Nyeri Pasien Post Operasi Ortopedi yang mengalami Fraktur Sebelum dan Sesudah Dilakukan <i>Hypno-Eft (Emotional Freedom Technique)</i> (N=10)....	70
Tabel 4.9	

Hasil Uji Perbandingan Skala Nyeri Pasien Post Operasi Ortopedi yang mengalami Fraktur yang Dilakukan <i>Hypno-Eft (Emotional Freedom Technique)</i> selama 3 hari (N=10).....	71
--	----

DAFTAR SKEMA

Skema 2.1 Kerangka Konsep	55
Skema 2.2 Kerangka Kerja	57

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Permohonan Menjadi Responden
- Lampiran 2 : Lembar Persetujuan Menjadi Responden
- Lampiran 3 : Lembar Observasi
- Lampiran 4 : Penilaian Intensitas Nyeri
- Lampiran 5 : Standar Operasional Prosedur (SOP) *Hypno-Eft (emotional freedom technique)*
- Lampiran 6 : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 7 : Master Tabel Penelitian
- Lampiran 8 : Hasil Penelitian (UJI SPSS)

Abstrak

Nama : Rusdiana M

Nim : 70300112007

Judul : *Hypno-Eft (Emotional Freedom Technique)* Terhadap Skala Nyeri Pada Pasien Post Operasi Ortopedi

Pendahuluan: Nyeri merupakan salah satu keluhan tersering pada pasien setelah mengalami suatu tindakan pembedahan, pengelolaan nyeri pasca bedah yang baik, akan mempercepat kembalinya pasien ke kondisi normal. Dimana, salah satu terapi untuk mengatasi rasa nyeri adalah *hypno-efit (emotional freedom technique)*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *hypno-efit (emotional freedom technique)* terhadap skala nyeri pada pasien post operasi ortopedi yang mengalami fraktur di RSUD Labuang Baji Makassar. **Metode:** Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari-April 2016 dengan metode penelitian *Pre Experimental One Group Pretest-Posttest*. Analisa data menggunakan uji statistik *Repeated Anova dengan Post Hoc Bonferroni*. Responden sebanyak 10 orang dengan metode pengumpulan berupa *Accidental Sampling*. Alat ukur yang digunakan adalah skala numerik. **Hasil:** Berdasarkan hasil uji statistik didapatkan nilai $p < 0.001$ ($p < 0.05$), yang berarti ada perbedaan bermakna skala nyeri responden sebelum dan sesudah dilakukan *hypno-efit (emotional freedom technique)* selama 3 hari. Nilai selisih rerata skala nyeri hari pertama dengan hari kedua yaitu 0.95, hari pertama dengan hari ketiga yaitu 1.90 dan hari kedua dengan hari ketiga yaitu 0.95. **Diskusi:** Ada pengaruh *hypno-efit (emotional freedom technique)* terhadap skala nyeri pada pasien post operasi ortopedi yang mengalami fraktur di RSUD Labuang Baji Makassar. Tindakan ketukan akan mempengaruhi sistem saraf pusat, jika pusat otak yang lebih tinggi teraktivasi maka gerbang di *spinal cord* akan menutup, sehingga nyeri tidak akan sampai ke pusat otak dan tidak akan diinterpretasikan sebagai nyeri. Untuk penelitian lanjutan, diharapkan dalam penelitiannya untuk menggunakan jumlah sampel yang lebih banyak dan intervensi yang dilakukan dengan interval waktu yang lebih lama, juga harus memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi skala nyeri dan menentukan jenis fraktur yang lebih khusus, serta mengontrol batasan hari setelah operasi untuk dilakukannya intervensi. Selain itu, dalam penelitian selanjutnya sedianya menggunakan metode *Quasy-Experimental Design* agar hasil yang diperoleh dapat mendekati kebenaran penelitian.

Kata kunci: Nyeri, *Hypno-EFT*, Post Operasi Ortopedi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap individu pernah mengalami nyeri dalam tingkatan tertentu. Nyeri merupakan alasan yang paling umum orang mencari perawatan kesehatan. Nyeri bersifat subjektif dan tidak ada individu yang mengalami nyeri yang sama. Untuk itu perawat perlu mencari pendekatan yang paling efektif dalam upaya pengontrolan nyeri (Potter & Perry dalam Nurdin, 2013).

Rasa nyeri merupakan stressor yang dapat menimbulkan stress dan ketegangan dimana individu dapat berespon secara biologis dan perilaku yang menimbulkan respon fisik dan psikis. Respon fisik meliputi perubahan keadaan umum, wajah, denyut nadi, pernapasan, suhu badan, sikap badan, dan apabila napas makin berat dan dapat menyebabkan kolaps kardiovaskuler dan syok, sedangkan respon psikis akibat nyeri dapat merangsang respon stress yang dapat mengurangi sistem imun dalam peradangan, serta menghambat penyembuhan respon yang lebih parah akan mengarah pada ancaman merusak diri sendiri (Corwin dalam Astari, 2010).

Nyeri post operasi merupakan komplikasi bermakna pada sebagian besar pasien. Nyeri merupakan salah satu keluhan tersering pada pasien setelah mengalami suatu tindakan pembedahan. Pembedahan merupakan suatu peristiwa yang bersifat bifasik terhadap tubuh manusia yang berimplikasi pada pengelolaan nyeri. Lama waktu pemulihan post operasi normalnya terjadi hanya dalam waktu 1-2 jam (Potter & Perry dalam Pinandita, 2012).

Seringkali kita mengabaikan penanganan nyeri pasca bedah dan lebih terfokus pada proses saat pembedahan itu berlangsung. Padahal pengelolaan nyeri pasca bedah yang baik, akan mempercepat kembalinya pasien ke kondisi normal

sehingga akan terjadi pengurangan lama tinggal di rumah sakit serta penghematan biaya (Healthyentusiast, 2015).

Bila pasien mengeluh nyeri maka hanya satu yang pasien inginkan yaitu mengurangi rasa nyeri. Hal itu wajar karena dapat menjadi pengalaman yang kurang menyenangkan akibat pengelolaan nyeri yang tidak adekuat (Zulaik dalam Pinandita, 2012).

Didapatkan 50% pasien pasca operasi merasakan nyeri dan 2-3% diantaranya berakhir sebagai nyeri kronik. Penyebab tingginya kasus ini dikarenakan kurangnya pengetahuan dalam menangani nyeri, takut dalam penggunaan opioid dan adanya pandangan bahwa wajar bila pasien dibedah merasakan nyeri (Purwanto dalam Karendehi, 2015). Seperti hal yang dikatakan Walsh dalam Nurdin (2013) yang menyatakan bahwa pada pasien post operasi seringkali mengalami nyeri hebat meskipun tersedia obat-obat analgesik yang efektif, namun nyeri pasca bedah tidak dapat diatasi dengan baik, sekitar 50% pasien tetap mengalami nyeri sehingga dapat mengganggu kenyamanan pasien.

Sesuai dengan kenyataan yang sering ditemukan di lapangan bahwa sebanyak 80% pasien mengeluh nyeri, baik nyeri sedang atau nyeri berat pada post operasi. Nyeri setelah pembedahan merupakan hal yang normal, namun meskipun demikian nyeri merupakan salah satu keluhan yang paling ditakuti oleh klien post operasi. Bentuk nyeri yang dialami oleh klien post operasi adalah nyeri akut yang terjadi karena adanya luka insisi bekas pembedahan (Perry & Potter, 2006).

Data WHO (*World Health Organization*) menunjukkan bahwa selama dari satu abad perawatan bedah telah menjadi komponen penting dari perawatan kesehatan di seluruh dunia. Setiap tahun ada 230 tindakan operasi dilakukan di seluruh dunia, satu untuk setiap 25 orang hidup (Hasri dalam Sumarwanto, 2015).

Tindakan operasi di Indonesia pada tahun 2012 mencapai 1,2 juta jiwa (WHO dalam Hartoyo, 2015).

Menurut Powell, Phill & Bruce, pemberian intervensi keperawatan sebelum dan sesudah operasi menjadi penting, agar pasien dapat melakukan tindakan pencegahan komplikasi post operasi. Tindakan penurunan nyeri post operasi yang bersifat alami dengan menggunakan kemampuan pasien secara mandiri perlu dilakukan. Menurut Martorella & Choiniere, rasa sakit akut yang tidak teratasi akan mempengaruhi kondisi tubuh termasuk denyut nadi dan tekanan darah. Pemberian obat analgesik juga memiliki efek samping seperti mual, muntah, dan ketergantungan, sehingga pemberian terapi komplementer untuk mengatasi nyeri post operasi secara berkesinambungan sangat dibutuhkan pada kondisi ini (Sodikin, 2012).

Penelitian mengurangi efek nyeri post operasi yang bersifat *non farmakologi* akhir-akhir ini semakin berkembang, diantaranya terapi relaksasi, relaksasi benson, nafas dalam, hipnoterapi, dan terapi musik (Sodikin, 2012). Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Mudatsyir (2010) mengenai *Spiritual Emotional Freedom Technique (SEFT)* dan Nyeri Pasien Pasca Operasi Fraktur Femur, mengungkapkan bahwa pemberian penguluran pasif + *Spiritual Emotional Freedom Technique (SEFT)* lebih baik dari pada pemberian penguluran pasif saja terhadap pengurangan nyeri pada pasien pasca operasi fraktur femur.

Berdasarkan hal tersebut, bagian lain dari teknik tersebut yang juga dapat digunakan yaitu *Hypno-efit (emotional freedom technique)*. *Emotional Freedom Technique (EFT)* adalah suatu teknik terapi menggunakan energi tubuh/energi meridian yang dilakukan dengan memberikan ketukan-ketukan ringan pada titik-titik tertentu pada meridian tubuh (Jay dalam Mudatsyir, 2010).

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan, menunjukkan bahwa teknik EFT (*Emotional Freedom Technique*) ini cukup efektif pada beberapa masalah

psikologis, penelitian yang dilakukan oleh Steve yang menggunakan EFT (*Emotional Freedom Technique*) untuk mengurangi Fobia spesifik pada hewan kecil menunjukkan keefektivannya. Connais telah melakukan penelitian *Fibromyalgia Sindrom* (FMS) yang merupakan gangguan dengan ciri-ciri nyeri meluas kronis dengan kondisi kurang tidur, atrofi otot, dan stres emosional. Bukti menunjukkan merawat pasien *Fibromyalgia Sindrom* (FMS) menggunakan EFT (*Emotional Freedom Technique*) untuk terapi telah efektif dalam mengurangi gejala *Fibromyalgia Sindrom* (FMS) tersebut (Rahmi, 2012).

Penelitian lain yang dilakukan oleh Heynes yang mengukur efektivitas EFT (*Emotional Freedom Technique*) pada stres kerja bagi guru prasekolah. Dimana penelitian ini bertujuan untuk mengurangi stres dan kecemasan. Penelitian ini dilakukan dengan desain subjek tunggal di mana tingkat stress dan kecemasan diukur sebelum dan sesudah pelatihan EFT (*Emotional Freedom Technique*). Setelah selesai pelatihan, peserta dalam penelitian melaporkan penurunan tingkat stres dan kecemasan. Begitu juga EFT (*Emotional Freedom Technique*) yang digunakan oleh Judy menunjukkan efektivitas untuk menghilangkan substansi kepekaan dan tanggapan terhadap pemicu alergi pada penderita asma untuk beberapa bahan kimia pemicu (Rahmi, 2012).

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmi (2012) mengenai Efektifitas EFT (*Emotional Freedom Technique*) Dalam Mengatasi Trauma Gempa Ibu Rumah Tangga. Mengungkapkan bahwa EFT (*Emotional Freedom Technique*) efektif dalam mengatasi trauma gempa pada ibu rumah tangga di kelurahan Teluk Bayur. Juga penelitian yang dilakukan oleh Shari (2014) mengenai *Emotional Freedom Technique* (EFT) dan Tingkat Kecemasan Pasien yang Akan Mengalami PCI (*Percutaneous Coronary Intervention*). Mengungkapkan bahwa EFT (*Emotional Freedom Technique*) dapat menurunkan tingkat kecemasan pada pasien yang akan mengalami PCI (*Percutaneous Coronary Intervention*).

Selain penelitian di atas, Supardiana (2012) juga telah melakukan penelitian mengenai pemberian *hypno-eft (emotional freedom technique)* untuk mengurangi tingkat kecemasan pada pasien dengan gagal ginjal kronik sebelum dilakukan hemodialisa. Mengungkapkan bahwa pemberian terapi *hypno-eft (emotional freedom technique)* dapat mengurangi tingkat kecemasan Tn.M dari cemas sedang menjadi cemas ringan.

Gary Craig, sang penemu EFT (*Emotional Freedom Technique*) tidak mengklaim bahwa EFT (*Emotional Freedom Technique*) itu sempurna. Tetapi pada banyak kasus, EFT (*Emotional Freedom Technique*) bekerja sangat cepat dan dengan hasil spektakuler. EFT (*Emotional Freedom Technique*) sering kali berhasil menyembuhkan dimana teknik lainnya tidak sanggup (Majid, 2015).

Beberapa penelitian di atas menunjang penelitian ini tentang *hypno-eft (emotional freedom technique)*. Penelitian ini bertujuan bahwa *hypno-eft (emotional freedom technique)* dapat dimanfaatkan dalam penurunan skala nyeri pada pasien post operasi ortopedi. Dalam penelitian ini, peneliti hanya ingin mengetahui adanya pengaruh *hypno-eft (emotional freedom technique)* terhadap skala nyeri.

Data WHO (*World Health Organization*) pada tahun 2010, di seluruh dunia tercatat, terdapat lebih 7 juta orang yang meninggal dikarenakan insiden kecelakaan dan sekitar 2 juta orang mengalami kecacatan fisik. Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Departemen Kesehatan (DEPKES) RI tahun 2010 dari 66.488 kasus kecelakaan lalu lintas, sekitar 8,5% atau 5,651 orang mengalami fraktur (Delubis, 2013). Selain kecelakaan lalu lintas hal-hal lain yang dapat mengakibatkan fraktur adalah jatuh dari ketinggian, kecelakaan kerja, dan cedera olahraga (Budiarta dalam Delubis, 2013). Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan (DINKES) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2011 didapatkan 1.800 orang mengalami insiden fraktur,

58% penderita mengalami kecacatan fisik, 21% mengalami kematian, 16% kembali sembuh, dan 5% mengalami gangguan psikologis/depresi (Delubis, 2013).

Data yang didapatkan dari RSUD Labuang Baji Makassar menunjukkan bahwa jumlah tindakan bedah Ortopedi yaitu sebanyak 410 orang pada tahun 2013, 416 orang pada tahun 2014 dan pada bulan Januari-Juli sebanyak 165 orang di tahun 2015. Penatalaksanaan nyeri yang sering digunakan oleh perawat bergantung pada teknik farmakologis dalam perawatan pasien post operasi karena kurangnya pengenalan teknik-teknik non-farmakologis. Adapun tindakan manajemen nyeri non-farmakologis yang sering digunakan yaitu teknik relaksasi, distraksi, kompres hangat dan dingin, namun dengan pemberian teknik tersebut pasien masih sering merasakan nyeri dalam jangka waktu yang lama.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Pengaruh *Hypno-Eft (Emotional freedom technique)* Terhadap Skala Nyeri Pada Pasien Post Operasi Ortopedi Di RSUD Labuang Baji Makassar”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka ditetapkan rumusan masalah penelitian adalah “**Apakah ada Pengaruh *Hypno-Eft (Emotional freedom technique)* Terhadap Skala Nyeri pada Pasien Post Operasi Ortopedi Di RSUD Labuang Baji Makassar**”

C. Hipotesis

1. Hipotesis Nul (Ho) :

Tidak ada pengaruh *hypno-efit (emotional freedom technique)* terhadap skala nyeri pada pasien post operasi ortopedi yang mengalami fraktur di RSUD Labuang Baji Makassar.

2. Hipotesis alternatif (Ha) :

Ada pengaruh *hypno-eft (emotional freedom technique)* terhadap skala nyeri pada pasien post operasi ortopedi yang mengalami fraktur di RSUD Labuang Baji Makassar.

D. Tujuan

1. Tujuan Umum

Untuk mengukur pengaruh *hypno-eft (emotional freedom technique)* terhadap skala nyeri pada pasien post operasi ortopedi yang mengalami fraktur di RSUD Labuang Baji Makassar.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengukur skala nyeri sebelum dilakukan *hypno-eft (emotional freedom technique)* pada pasien post operasi ortopedi yang mengalami fraktur di RSUD Labuang Baji Makassar.
- b. Untuk mengukur skala nyeri setelah dilakukan *hypno-eft (emotional freedom technique)* pada pasien post operasi ortopedi yang mengalami fraktur di RSUD Labuang Baji Makassar.
- c. Untuk menganalisis pengaruh *hypno-eft (emotional freedom technique)* terhadap skala nyeri pada pasien post operasi ortopedi yang mengalami fraktur di RSUD Labuang Baji Makassar.

E. Definisi Operasional

1. Hypno-EFT (*Emotional Freedom Technique*)

Hypno-eft (emotional freedom technique) adalah teknik yang dilakukan dengan mengetukkan dua ujung jari pada titik meridian tubuh. Pemberian terapi *Hypno-eft (emotional freedom technique)* dengan durasi kurang lebih 30 menit dengan 5 tahapan yaitu persiapan, *the set up, the sequence, 9 gammut procedure*, dan mengulangi *the sequence*. Pemberian terapi ini di berikan pada pasien post


operasi dengan penyakit fraktur yang sudah berada di ruang perawatan dan dilanjutkan pada hari berikutnya pada jam yang sama.

2. Nyeri

Nyeri adalah suatu perasaan yang tidak menyenangkan bagi tubuh. Nyeri yang dirasakan seseorang memiliki tingkatan, yakni nyeri ringan, sedang, atau berat.

Kriteria objektif :

Alat ukur yang digunakan untuk mengetahui skala nyeri sebelum dan sesudah dilakukan intervensi adalah skala numerik, dimana pasien menilai nyeri dengan skala 0-10.



Gambar 1.1 Penilaian Intensitas Nyeri
Sumber: Brunelli & Novita dalam Ramadhani, 2014

Keterangan:

- 0 : tidak ada keluhan nyeri.
- 1-3 : ada rasa nyeri, mulai terasa, tetapi masih dapat ditahan.
- 4-6 : ada rasa nyeri, terasa mengganggu, dan dengan melakukan usaha yang cukup kuat untuk menahannya.
- 7-10 : ada rasa nyeri, terasa sangat mengganggu/ tidak tertahankan, sehingga harus meringis, menjerit bahkan berteriak.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti tentang pengaplikasian *hypno-eft (emotional freedom technique)* pada pasien yang mengalami nyeri post operasi ortopedi.

2. Bagi Institusi Pendidikan

Sebagai tambahan referensi dan pengembangan penelitian tentang pengaruh *hypno-eft (emotional freedom technique)* terhadap skala nyeri pada pasien post operasi ortopedi.

3. Bagi masyarakat/keluarga

Memberikan informasi bahwa *hypno-eft (emotional freedom technique)* bermanfaat untuk mengurangi rasa nyeri post operasi ortopedi.

G. Kajian Pustaka

No.	Judul penelitian	Tujuan	Metode	Hasil	Perbedaan dengan Penelitian yang akan dilakukan
1	<p><i>Spiritual Emotional Freedom Technique (SEFT) dan Nyeri Pasien Pasca Operasi Fraktur Femur Di RSUI Kustati Surakarta (Mudatsyir, 2012)</i></p>	<p>Tujuan penelitian ini adalah mengetahui manakah yang lebih baik antara penguluran pasif dan penguluran pasif ditambah <i>Spiritual Emotional Freedom Techniques</i> dalam mengurangi nyeri pada pasien pasca operasi fraktur</p>	<p><i>Eksperimental</i> dengan rancangan <i>two group pre test-post test design</i>. Sampel dalam peneltian ini terbagi dalam dua kelompok yaitu kelompok I sejumlah 20 responden dan</p>	<p>- Hasil analisis Uji beda pada kelompok I intensitas nyeri diam sebelum dan sesudah dilakukan penguluran pasif + SEFT dengan <i>Wilcoxon test</i> dan diperoleh $p = 0.00$ ($p < 0.05$). Hal ini menunjukkan adanya perbedaan intensitas nyeri diam yang sangat bermakna antara sebelum dan sesudah perlakuan. Uji beda intensitas nyeri gerak antara</p>	<p>Metode penelitian yang digunakan oleh Mudatsyir berbeda dengan metode penelitian yang akan dilakukan. Variabel independen dalam penelitian Mudatsyir yaitu <i>Spiritual Emotional Freedom Technique (SEFT)</i>, sedangkan dalam</p>

		femur.	kelompok II sebanyak 20 responden. Uji statistik yang digunakan yaitu <i>Wilcoxon test</i> .	<p>sebelum dan sesudah penguluran pasif + SEFT dengan <i>Wilcoxon test</i> dan diperoleh $p = 0.00$ ($P < 0.05$) yang berarti terdapat perbedaan intensitas nyeri gerak yang sangat bermakna antara sebelum dan sesudah perlakuan.</p> <p>- Hasil analisis Uji beda pada kelompok II intensitas nyeri diam antara sebelum dan sesudah diberikan penguluran pasif dilakukan dengan <i>dependent t test</i> dan diperoleh $p = 0.00$ ($p < 0.05$). Artinya terdapat perbedaan intensitas</p>	<p>penelitian yang akan dilakukan variabel independennya yaitu <i>Hypno-EFT (Emotional Freedom Technique)</i>. Yang membedakan adalah tekniknya dimana terapi yang digunakan oleh Mudtasyir yaitu teknik <i>Emotional Freedom Technique (EFT)</i> serta menambahkan unsur spiritual (berdo'a, dzikir) sedangkan teknik yang akan</p>
--	--	--------	--	--	--

				<p>nyeri yang sangat bermakna antara sebelum dan sesudah diberikan penguluran pasif. Uji beda intensitas nyeri gerak antara sebelum dan sesudah diberikan penguluran pasif dengan Wilcoxon test, diperoleh $p = 0.00$ ($p < 0.05$). Artinya terdapat perbedaan intensitas nyeri gerak yang sangat bermakna antara sebelum dan sesudah diberikan penguluran pasif.</p> <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian penguluran pasif dapat mengurangi nyeri</p>	<p>digunakan dalam penelitian ini yaitu hanya menggunakan teknik <i>Emotional Freedom Technique</i> (EFT) saja, dimana teknik ini hanya melakukan ketukan-ketukan ringan pada titik meridian tubuh dengan menggunakan dua jari sesuai dengan titik yang telah ditentukan.</p>
--	--	--	--	--	---

				<p>pada pasien pasca operasi fraktur femur, pemberian penguluran pasif + SEFT dapat mengurangi nyeri pada pasien pasca operasi fraktur femur, pemberian penguluran pasif + SEFT lebih baik dari pada pemberian penguluran pasif saja terhadap pengurangan nyeri pada pasien pasca operasi fraktur femur.</p>	
2	<p><i>Emotional Freedom Techniques</i> (EFT) dan Tingkat Kecemasan Pasien yang akan</p>	<p>Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi pengaruh intervensi <i>Emotional Freedom Techniques</i> (EFT)</p>	<p><i>Quasi experimental</i> dengan rancangan <i>one group pretest</i> dan</p>	<p>Hasil menunjukkan terdapat perbedaan yang bermakna antara tingkat kecemasan sebelum dan sesudah intervensi <i>Emotional Freedom Techniques</i> (EFT) ($p < 0.05$) dan terdapat perbedaan</p>	<p>Metode penelitian yang digunakan oleh Shari berbeda dengan metode penelitian yang akan dilakukan. serta lokasi penelitian yang</p>

	<p>Menjalani <i>Percutaneous Coronary Intervention</i> (Shari, 2014)</p>	<p>terhadap tingkat kecemasan pasien yang akan menjalani PCI di RS. X.</p>	<p><i>postest</i> Jumlah sampel 30 orang dibagi menjadi kelompok intervensi dan kontrol dengan menggunakan teknik <i>concecutive sampling</i>. Kelompok intervensi diberikan EFT selama 15 menit. Sebelum dan sesudah</p>	<p>yang bermakna intensitas kecemasan sesudah intervensi antara kelompok intervensi dan kontrol ($p < 0.05$).</p>	<p>berbeda. Variabel dependen dalam penelitian Shari yaitu tingkat kecemasan, sedangkan variabel dependen dalam penelitian yang akan dilakukan yaitu skala nyeri.</p>
--	--	--	---	---	---

			<p>intervensi diukur tingkat kecemasannya dengan menggunakan kuesioner <i>state trait anxiety inventory</i> (STAI-S). Data dianalisis dengan <i>uji t</i>.</p>		
3	<p>Efektivitas <i>Emotional Freedom Technique</i> dalam Mengatasi Trauma Gempa Ibu</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan trauma yang terjadi pada Ibu Rumah Tangga di Kelurahan</p>	<p><i>Quasi experimental</i> dengan rancangan <i>one group pre-post test design</i>.</p>	<p>Dari hasil analisis data yang dilakukan diperoleh nilai t hitung sebesar 7.466 dan $p = 0,00$. Karena untuk kriteria signifikan adalah $p < 0,05$, maka nilai hasil analisis dengan uji t sebesar $0,00 <$</p>	<p>Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan yaitu <i>Pre Experimental</i> sedangkan desain yang</p>

	Rumah Tangga Mengatasi (Rahmi, 2012)	Teluk Bayur Kecamatan Padang Selatan, mengetahui Bagaimana Efektivitas <i>Emotional Freedom Technique</i> dalam Mengatasi Trauma Gempa pada Ibu Rumah Tangga di Kelurahan Teluk Bayur Kecamatan Padang Selatan.	Jumlah dari sampel penelitian ini pada awalnya direncanakan minimal 30 orang, namun ternyata hanya terkumpul 18 orang saja yang berusia sekitar 30-50 tahun. Menggunakan teknik analisis uji t berpasangan.	0,05 menunjukkan terdapatnya perbedaan yang signifikan antara <i>pre test</i> dan <i>post test</i> . Hal ini menunjukkan bahwa <i>Emotional Freedom Technique</i> efektif dalam mengatasi Trauma Gempa pada Ibu Rumah Tangga di Kelurahan Teluk Bayur artinya hipotesis penelitian dapat diterima.	digunakan oleh Rahmi yaitu <i>Quasi Experimental</i> . Dalam penelitian yang akan dilakukan menggunakan variabel dependen yang berbeda, dimana variabel dependen yang digunakan oleh Rahmi yaitu Trauma Gempa sedangkan variabel independen yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah skala nyeri.
--	--------------------------------------	---	---	--	--

4	Pengaruh Teknik Relaksasi Terhadap Intensitas Nyeri pada Pasien Post Operasi Fraktur Di Ruang Irina A BLU RSUP Prof Dr. R.D Kandou Manado (Nurdin, 2013)	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh teknik relaksasi terhadap intensitas nyeri pada pasien post operasi fraktur.	Desain yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah <i>Pra eksperimen (one group pra dan post design)</i> . Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel <i>Accidental sampling</i> . Data yang diperoleh	Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh teknik relaksasi terhadap intensitas nyeri pada pasien post operasi fraktur di ruang Irina A BLU RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado. Hasil analisi diperoleh nilai $p = 0,000$ ($p < 0,05$).	Judul penelitian Nurdin berbeda dengan judul penelitian yang akan dilakukan. Serta variabel independen dan dependen juga berbeda.
---	--	---	---	--	---

			dianalisis dengan uji <i>paired samplet-test</i> .		
5	Pengaruh Teknik Relaksasi Genggam Jari Terhadap Penurunan Intensitas Nyeri pada Pasien Post Operasi Laparatomi Di RSUD Muhammadiyah Gombang (Pinandita, 2012)	Untuk mengetahui pengaruh teknik relaksasi genggam jari terhadap penurunan intensitas nyeri pada pasien post operasi laparatomi.	<i>Quasi-Experiment</i> dengan rancangan <i>pretest-posttest with control group design</i> . Teknik pengambilan sampling yaitu menggunakan teknik <i>incidental sampling</i> .	Berdasarkan harga signifikansi (p), dimana nilai p=0.000, dimana nilai tersebut (p < 0.05), artinya terdapat pengaruh teknik relaksasi genggam jari terhadap penurunan intensitas nyeri pada pasien post operasi laparatomi di RS PKU Muhammadiyah Gombang.	Judul dan desain penelitian berbeda. desain penelitian yang digunakan oleh Pinandita yaitu <i>Quasi-Experiment</i> , sedangkan desain yang digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan yaitu <i>Pre Experimental</i> .

			Sampel 17 responden kelompok eksperimen dan 17 responden kelompok kontrol dalam 3 bulan. Uji statistik <i>paired t-test</i> .		
6	Pengaruh Pemberian Musik Terhadap Skala Nyeri Akibat Perawatan Luka Bedah pada Pasien Pasca Operasi Di	Tujuan untuk mengetahui pengaruh musik terhadap skala nyeri akibat perawatan luka bedah pada pasien pasca operasi.	<i>Quasy Eksperimen Non Randomized Pretest-posttest Design With Control Group.</i> Teknik	Analisa data menggunakan uji statistik <i>paired sample t-Test</i> dengan tingkat kemaknaan 95% ($\alpha = 0,05$) didapatkan nilai <i>p value</i> $= 0,000 < \alpha = 0,05$ (H_0 ditolak). Kesimpulan yaitu musik bisa menurunkan skala nyeri akibat	Judul, lokasi dan desain penelitian yang digunakan oleh Karendehi berbeda dengan judul, lokasi dan desain penelitian yang akan dilakukan.

	Ruang Perawatan Bedah Flamboyan Rumah Sakit Tk. III 07.06.01 R.W Mongisidi Manado (Karendehi, 2015)		pengambilan sampel dilakukan dengan <i>Total Sampling</i> .	perawatan luka bedah pada pasien pasca operasi di ruangan perawatan bedah Rumah Sakit TK. III 07.06.01 R.W Mongisidi Manado.	Serta teknik pengambilan sampel berbeda, dimana teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh Karendehi yaitu <i>Total Sampling</i> , sedangkan teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan yaitu <i>Accidental sampling</i> .
7	Hubungan Antara Usia, Jenis Dan Lokasi Fraktur Dengan Lama Perawatan Pada	Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara usia, jenis dan lokasi <i>fraktur</i>	Penelitian ini merupakan jenis penelitian <i>deskriptif analitik</i> dengan	Hasil menunjukkan bahwa ada hubungan antara usia dengan lama perawatan pasien bedah tulang ($\alpha=0,001$), ada hubungan antara jenis <i>fraktur</i> dengan lama	Judul dan lokasi penelitian berbeda. Desain penelitian berbeda, dimana desain penelitian yang

	Pasien Bedah Tulang Di Ruang Rawat Inap Rsup Dr.Wahidin Sudirohusodo Makassar (Delubis, 2013)	dengan lama perawatan pada pasien bedah tulang di ruang rawat inap RSUP Dr.Wahidin Sudirohusodo Makassar.	metode <i>cross sectional</i> . Pengambilan sampel menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> , didapatkan 35 responden. Menggunakan uji <i>chi-square</i> ($<0,05$).	perawatan pasien bedah tulang ($=0,004$), dan ada hubungan lokasi <i>fraktur</i> dengan lama perawatan pasien bedah tulang ($=0,004$). Kesimpulan dalam penelitian ini adalah ada hubungan anatar usia, jenis dan lokasi <i>fraktur</i> dengan lama perawatan pada pasien bedah tulang di ruang rawat inap RSUP Dr.Wahidin Sudirohusodo Makassar.	digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan yaitu <i>Pre Experimental</i> sedangkan desain penelitian yang digunakan oleh Delubis yaitu <i>Cross Sectional</i> .
8	Pengaruh Terapi Bacaan Al-Quran Melalui Media Audio Terhadap Respon Nyeri	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh terapi bacaan Al-quran	<i>Quasi experiment pre and post test non equivalent control group</i> .	Hasil penelitian ada perbedaan skala nyeri ($p=0,008;a=0,05$) dan denyut nadi ($p=0,001;a=0,05$) sebelum dan sesudah TBA. Sementara pada kelompok tidak	Judul, metode dan lokasi penelitian berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan. Dan teknik

	Pasien Post Operasi Hernia Di RS. Cilacap (Sodikin, 2012)	(TBA) terhadap respon nyeri post operasi hernia.	Teknik pengambilan sampel dengan cara <i>Consecutive sampling</i> . Jumlah sampel 20 responden.	TBA didapatkan hasil tidak ada perbedaan skala nyeri dan denyut nadi sebelum dan sesudah terapi; terdapat perbedaan skala nyeri setelah TBA pada kedua kelompok ($p=0,005; a=0,05$); tidak ada perbedaan denyut nadi setelah terapi pada kedua kelompok; tidak ada hubungan faktor usia dan pengalaman mengatasi nyeri post operasi dengan nyeri dan denyut nadi. Maka disarankan bagi rumah sakit menggunakan terapi bacaan Al-quran sebagai terapi komplementer menurunkan nyeri.	pengambilan sampel yang akan dilakukan yaitu menggunakan teknik <i>Accidental sampling</i> , sedangkan teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh Sodikin yaitu <i>Consecutive Sampling</i> .
9	Pengaruh	Penelitian ini	Desain	Hasil uji Test Berpasangan	Judul dan lokasi

	<p>Hipnoterapi Terhadap Penurunan Intensitas Nyeri pada Pasien Post Operasi Dengan Skala Nyeri Sedang-Berat Di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kalbar (Sumarwanto, 2015)</p>	<p>bertujuan mengidentifikasi pengaruh hipnoterapi terhadap penurunan intensitas nyeri pada pasien post operasi dengan skala nyeri sedang-berat di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kalbar</p>	<p>penelitian ini <i>pre-eksperimental</i> dengan rancangan <i>one group Pretest - posstest design</i>. Sampel berjumlah 16 responden, dengan teknik <i>purposive sampling</i>. Alat ukur yang digunakan adalah <i>Numerical</i></p>	<p>menunjukkan dengan nilai <i>significan < 0,001 (p>0,05)</i> artinya hipnoterapi berpengaruh terhadap penurunan intensitas nyeri post operasi. Direkomendasikan untuk Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kalbar agar menerapkan hipnoterapi sebagai salah satu terapi nonfarmakologi untuk menurunkan intensitas nyeri post operasi. Kesimpulan: Hipnoterapi berpengaruh terhadap penurunan intensitas nyeri pasien post operasi. Disarankan agar perawat dapat</p>	<p>penelitian berbeda. teknik pengambilan sampel yang dilakukan oleh Sumarwanto yaitu <i>Purposive sampling</i> sedangkan teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan yaitu <i>Accidental sampling</i>.</p>
--	--	---	--	--	---

			<i>Rating Scale</i> (NRS). Analisis menggunakan Uji T Berpasangan.	mengaplikasikan hipnoterapi pada pasien dengan nyeri post operasi.	
10	Pengaruh Terapi Musik Klasik Mozart Terhadap Intensitas Nyeri pada Pasien Pasca Operasi Sesarea Di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar (Ramadhani, 2014)	Diketahuinya pengaruh terapi musik klasik mozart terhadap intensitas nyeri pasien pasca operasi sesarea di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar.	Jenis penelitian <i>Pre Experiment</i> dengan pendekatan <i>Pre Test And Post Test Design</i> . Menggunakan teknik <i>Consecutive Sampling</i> . Sampel sebanyak 18	Hasil analisis didapatkan p value sebesar 0,000 dimana $< 0,05$. Kesimpulan terdapat pengaruh terapi musik klasik mozart terhadap intensitas pasien pasca operasi sesarea di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar.	Judul dan lokasi penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan judul dan lokasi penelitian yang dilakukan oleh Indriyana. Dan teknik pengambilan sampel yang akan dilakukan yaitu menggunakan teknik <i>Accidental sampling</i> , sedangkan

			orang. Analisis dengan uji <i>Wilcoxon.</i>		teknik pengambilan sampel yang digunakan Ramadhani yaitu <i>Consecutive Sampling.</i>
--	--	--	---	--	--

Tabel 1.1 Kajian Pustaka

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Bedah Ortopedi

1. Definisi Bedah Ortopedi

Bedah ortopedi atau orthopaedi adalah cabang ilmu kedokteran yang mempelajari tentang cedera akut, dan trauma serta gangguan lain sistem muskuloskeletal (Salemba, 2016).

2. Jenis-Jenis Pembedahan Ortopedi menurut Brunner & Suddarth (2002)

- a. Reduksi Terbuka, adalah melakukan reduksi dan membuat kesejajaran tulang yang patah setelah terlebih dahulu dilakukan deseksi dan pemajanan tulang yang patah.
- b. Fiksasi Interna, adalah stabilisasi tulang patah yang telah direduksi dengan sekrup, plat, paku, dan pin logam.
- c. Graft Tulang, adalah penggantian jaringan tulang (graft autolog maupun heterolog) untuk memperbaiki penyembuhan, untuk menstabilisasi, atau mengganti tulang yang berpenyakit.
- d. Amputasi, adalah penghilangan bagian tubuh.
- e. Artroplasti, adalah memperbaiki masalah sendi dengan arthostop (suatu alat yang memungkinkan ahli bedah mengoperasi dalamnya sendi tanpa irisan yang besar) atau melalui pembedahan sendi terbuka.
- f. Menisektomi, adalah eksisi fibrokartilago sendi yang telah rusak.
- g. Penggantian Sendi, adalah penggantian permukaan sendi dengan bahan logam atau sintetis.
- h. Penggantian Sendi Total, adalah penggantian kedua permukaan artikuler dalam sendi dengan bahan logam atau sintetis.

- i. Transfer Tendo, adalah pemindahan insersi untuk memperbaiki fungsi.
- j. Fasiotomi, adalah pemotongan fasia otot untuk menghilangkan kontriksi otot atau mengurangi kontraktur fasia.

3. Gangguan Ortopedi

Beberapa gangguan ortopedi, antara lain:

a. Amputasi

Amputasi adalah pengangkatan/pemotongan/pembuangan sebagian anggota tubuh/anggota gerak yang disebabkan oleh adanya trauma, gangguan peredaran darah, osteomielitis, dan kanker melalui proses pembedahan (Lukman & Ningsih, 2012).

b. Penggantian sendi total

Penggantian sendi diindikasikan untuk kerusakan sendi peka rangsang dan nyeri yang tak hilang (contoh; degeneratif dan artritis reumatoid; fraktur tertentu (contoh, leher femur), ketidakstabilan sendi panggul kongenital. Penggantian panggula dan lutut dalam bedah paling umum. Prostase mungkin besi atau polietilen (atau kombinasi) dan ditanam dengan semen akrilik, atau mungkin sesuatu yang berpori-pori, implan bersalut yang mendorong pertumbuhan tulang ke dalam (Doenges, 2000).

c. Bedah rekonstruksi wajah

Seperti pada fraktur tulang, stabilisasi, dan fiksasi fraktur diperlukan untuk meningkatkan penyembuhan dan mengembalikan fungsi (Doenges, 2000).

d. Fraktur

1) Definisi Fraktur

Menurut Mansjoer, fraktur adalah terputusnya kontinuitas jaringan tulang yang umumnya disebabkan oleh rudapaksa. Sedangkan menurut Linda Juall C. Dalam buku *Nursing Care Plans and Documentation* menyebutkan bahwa fraktur

adalah rusaknya kontinuitas tulang yang disebabkan tekanan dari luar yang datang lebih besar dari yang dapat diserap oleh tulang (Rosyidi, 2013).

2) Etiologi Fraktur menurut Rosyidi (2013)

a) Kekerasan langsung

Kekerasan langsung menyebabkan patah tulang pada titik terjadinya kekerasan. Fraktur demikian sering bersifat fraktur terbuka dengan garis patah melintang atau miring.

b) Kekerasan tidak langsung

Kekerasan tidak langsung menyebabkan patah tulang di tempat yang jauh dari tempat terjadinya kekerasan. Yang patah biasanya adalah bagian yang paling lemah dalam jalur hantaran vektor kekerasan.

c) Kekerasan akibat tarikan otot

Patah tulang akibat tarikan otot sangat jarang terjadi. Kekuatan dapat berupa pemuntiran, penekukan, penekukan dan penekanan, kombinasi dari ketiganya, dan penarikan.

3) Klasifikasi Fraktur menurut Rosyidi (2013)

a) Fraktur tertutup (*Closed*)

Bila tidak terdapat hubungan antara fragmen tulang dengan dunia luar, disebut juga fraktur bersih (karena kulit masih utuh) tanpa komplikasi.

b) Fraktur terbuka (*Open/Compound*)

Bila terdapat hubungan antara fragmen tulang dengan dunia luar karena adanya perlukaan kulit.

c) Fraktur komplrit

Bila garis patah tulang melalui seluruh penampang tulang atau melalui kedua korteks tulang.

d) Fraktur inkomplit

Bila garis patah tulang tidak melalui seluruh penampang tulang seperti, *Hair Line Fraktur* (patah retak rambut), *Buckle* atau *Torus Fraktur*, bila terjadi lipatan dari satu korteks dengan kompresi tulang spongiosa di bawahnya, dan *Green Stick Fraktur*, mengenai korteks dengan angulasi korteks lainnya yang terjadi pada tulang panjang.

e) Fraktur patologis, fraktur yang diakibatkan karena proses patologis tulang.

4) Manifestasi Klinik Fraktur menurut Rosyidi (2013)

- a) Deformitas
- b) Bengkak/edema
- c) Echimosis (memar)
- d) Spasme otot
- e) Nyeri
- f) Kurang/hilang sensasi
- g) Krepitasi
- h) Pergerakan abnormal
- i) Rontgen abnormal

5) Komplikasi Fraktur menurut Rosyidi (2013)

a) Komplikasi awal

(1) Kerusakan arteri

Pecahnya arteri karena trauma bisa ditandai dengan tidak adanya nadi, CRT menurun, sianosis bagian distal, hematoma yang lebar, dan dingin pada ekstremitas yang disebabkan oleh tindakan emergensi splinting, perubahan posisi pada yang sakit, rindukan redukasi, dan pembedahan.

(2) Kompartement sindrom

Kompartement sindrom merupakan komplikasi serius yang terjadi karena terjebaknya otot, tulang, saraf, dan pembuluh darah jaringan parut. Ini disebabkan

oleh oedema atau perdarahan yang menekan otot, saraf, dan pembuluh darah. Selain itu karena tekanan dari luar seperti gips dan pembabatan yang terlalu kuat.

(3) *Fat embolism syndrom*

Fat embolism syndrom adalah komplikasi serius yang sering terjadi pada kasus fraktur tulang panjang. *Fat embolism syndrom* terjadi karena sel-sel lemak yang dihasilkan bone marrow kuning masuk ke aliran darah dan menyebabkan tingkat oksigen dalam darah rendah yang ditandai dengan gangguan pernafasan, takikardi, hipertensi, takipnea, demam.

(4) Infeksi

Sistem pertahanan tubuh rusak bila ada trauma pada jaringan. Pada trauma *orthopedic* infeksi dimulai pada kulit (superfisial) dan masuk ke dalam. Ini biasanya terjadi pada kasus fraktur terbuka, tapi bisa juga karena penggunaan bahan lain dalam pembedahan seperti pin dan plat.

(5) *Avaskuler nekrosis (AVN)*

Avaskuler nekrosis (AVN) terjadi karena aliran darah ke tulang rusak atau terganggu yang bisa menyebabkan nekrosis tulang dan diawali dengan adanya *Volkman's Ischemia*.

(6) Shock

Shock terjadi karena kehilangan banyak darah dan meningkatnya permeabilitas kapiler yang bisa menyebabkan menurunnya oksigenasi. Ini biasanya terjadi pada fraktur.

b) Komplikasi dalam waktu lama

(1) *Delayed union*

Delayed union merupakan kegagalan fraktur berkonsolidasi (bergabung) sesuai dengan waktu yang dibutuhkan tulang untuk menyambung. Ini disebabkan karena penurunan suplai darah ke tulang.

(2) *Nonunion*

Nonunion merupakan kegagalan fraktur berkonsolidasi dan memproduksi sambungan yang lengkap, kuat dan stabil setelah 6 -9 bulan. *Nonunion* ini ditandai dengan adanya pergerakan yang berlebih pada sisi fraktur yang membentuk sendi palsu atau *pseudoarthrosis*. Ini juga disebabkan karena aliran darah yang kurang.

(3) *Malunion*

Malunion merupakan penyembuhan tulang ditandai dengan meningkatnya tingkat kekuatan dan perubahan bentuk (deformitas). *Malunion* dilakukan dengan pembedahan dan reimobilisasi yang baik.

B. Nyeri

1. Definisi Nyeri

International Association For Study of Pain mendefinisikan nyeri sebagai sensori subjektif dan pengalaman emosional yang tidak menyenangkan berkaitan dengan kerusakan jaringan yang bersifat aktual atau potensial atau yang dirasakan dalam kejadian-kejadian dimana terjadi kerusakan (Prasetyo, 2010).

Nyeri adalah suatu pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan akibat dari kerusakan jaringan yang bersifat subjektif (Muttaqin, 2008).

Nyeri adalah bentuk ketidaknyamanan baik sensori maupun emosional yang berhubungan dengan resiko atau aktualnya kerusakan jaringan tubuh, bisa juga karena suatu mekanisme proteksi bagi tubuh, timbul ketika jaringan sedang rusak dan menyebabkan individu tersebut bereaksi untuk menghilangkan rasa nyeri (Andarmoyo, 2013).

2. Fisiologi Nyeri menurut Prasetyo (2010)

a. Stimulus

Nyeri selalu dikaitkan dengan adanya stimulus (rangsangan nyeri) dan reseptor. Reseptor yang dimaksud adalah *nosisseptor*, yaitu ujung-ujung saraf

bebas pada kulit yang berespon terhadap stimulus yang kuat. Munculnya nyeri dimulai dengan adanya stimulus nyeri. Stimulus-stimulus tersebut dapat berupa biologis, zat kimia, panas, listrik serta mekanik.

b. Reseptor nyeri

Reseptor merupakan sel-sel khusus yang mendeteksi perubahan-perubahan partikular disekitarnya, kaitannya dengan proses terjadinya nyeri maka reseptor-reseptor inilah yang menangkap stimulus-stimulus nyeri. Reseptor ini dapat terbagi sebagai berikut:

1) Exteroreseptor

Exteroreseptor yaitu reseptor yang berpengaruh terhadap perubahan pada lingkungan eksternal, antara lain:

- a) *Corpusculum miessineri, corpusculum merkel*: untuk merasakan stimulus taktil (sentuh/rabaan)
- b) *Corpusculum krausse*: untuk merasakan rangsang dingin
- c) *Corpusculum ruffini*: untuk merasakan rangsang panas, merupakan ujung saraf bebas yang terletak di dermis an sub kutis.

2) Telereseptor

Telereseptor merupakan reseptor yang sensitif terhadap stimulus yang jauh.

3) Propioseptor

Propioseptor merupakan reseptor yang menerima impuls primer dari organ otot, spindle dan tendon golgi.

4) Interoseptor

Interoseptor merupakan reseptor yang sensitif terhadap perubahan pada organ-organ visceral dan pembuluh darah. Beberapa penggolongan lain dari reseptor sensori:

- 1) Termoreseptor: reseptor yang menerima sensasi suhu (panas atau dingin).
- 2) Mekanoreseptor: reseptor yang menerima stimulus-stimulus mekanik.
- 3) Nosisseptor: reseptor yang menerima stimulus-stimulus nyeri.
- 4) Kemoreseptor: reseptor yang menerima stimulus kimiawi.

c. Pathways nyeri

Untuk mudah memahami proses terjadinya nyeri, dibutuhkan pengetahuan yang baik tentang anatomi fisiologi sistem persyarafan. Rangkaian proses terjadinya nyeri diawali dengan tahap transduksi, dimana hal ini terjadi ketika nosisseptor yang terletak pada bagian perifer tubuh distimulasi oleh berbagai stimulus, seperti faktor biologis, mekanis, listrik, thermal, radiasi dan lain-lain. Serabut saraf tertentu bereaksi atas stimulus tertentu, sebagaimana telah disebutkan dalam klasifikasi reseptor sebelumnya.

Fast pain dicetuskan oleh reseptor tipe mekanis atau thermal (yaitu serabut saraf A-Delta), sedangkan *slow pain* (nyeri lambat) biasanya dicetuskan oleh serabut saraf C. Serabut saraf A-Delta mempunyai karakteristik menghantarkan nyeri dengan cepat serta bermielinasi, berukuran sangat kecil dan bersifat lambat dalam menghantarkan nyeri. Serabut A mengirim sensasi yang tajam, terlokalisasi, dan jelas dalam melokalisasi sumber nyeri dan mendeteksi intensitas nyeri. Serabut C menyampaikan impuls yang tidak terlokalisasi (bersifat difusi), viseral dan terus menerus. Sebagai contoh mekanisme kerja serabut A-delta dan serabut C dalam suatu trauma adalah ketika seseorang menginjak paku, sesaat setelah kejadian orang tersebut dalam waktu kurang dari 1 detik akan merasakan nyeri yang terlokalisasi dan tajam, yang merupakan transmisi dari serabut A. Dalam beberapa detik selanjutnya, nyeri menyebar sampai seluruh kaki terasa sakit karena persarafan serabut C.

SERABUT A-DELTA	SERABUT C
Bermielinasi	Tidak bermielinasi
Diameter 2-5 mikrometer	Diameter 0,4-12,2 mikrometer
Kecepatan hantar 12-30 m/dt	Kecepatan hantar 0,5-2 m/dt
Menyulurkan impuls nyeri yang bersifat tajam, menusuk, terlokalisasi dan jelas	Menyulurkan impuls nyeri yang bersifat tidak terlokalisasi, visceral dan terus-menerus.

Tabel 2.1 Perbedaan serabut syaraf A-Delta dan C

Tahap selanjutnya adalah transmisi, dimana impuls nyeri kemudian ditransmisikan serat afferen (A-delta dan C) ke medulla spinalis melalui dorsal horn, dimana disini impuls akan bersinapsis di substansi gelatinosa (lamina II dan III). Impuls kemudian menyeberang ke atas melewati traktus spinothalamus anterior dan lateral. Beberapa impuls yang melewati traktus spinothalamus lateral diteruskan langsung ke thalamus tanpa singgah di formatio retikularis membawa impuls fast pain. Di bagian thalamus dan korteks serebri inilah individu kemudian dapat mempersepsikan, menggambarkan, melokalisasi, menginterpretasikan dan mulai berespon terhadap nyeri.

Beberapa impuls nyeri ditransmisikan melalui traktus paleospinothalamus pada bagian tengah medulla spinalis. Impuls ini memasuki formatio retikularis dan sistem limbik yang mengatur perilaku emosi dan kognitif, serta integrasi dari sistem saraf otonom. Slow pain yang terjadi akan membangkitkan emosi, sehingga timbul respon terkejut, marah, cemas, tekanan darah meningkat, keluar keringat dingin dan jantung berdebar-debar.

3. Teori Dasar Nyeri

Menurut Tamsuri (2007) terdapat beberapa teori yang berusaha menggambarkan bagaimana nosiseptor dapat menghasilkan rangsang nyeri, antara lain:

a. Teori spesivitas (*spesivicity theory*)

Teori ini digambarkan oleh Descartes pada abad ke-17. Teori ini didasarkan pada kepercayaan bahwa terdapat organ tubuh yang secara khusus mentransmisi rasa nyeri. Saraf ini diyakini dapat menerima rangsangan nyeri dan mentransmisikannya melalui ujung dorsal dan substensia gelatinosa ke thalamus yang akhirnya akan dihantarkan pada daerah yang lebih tinggi sehingga timbul respons nyeri. Teori ini tidak menjelaskan bagaimana faktor-faktor multidimensional dapat mempengaruhi nyeri.

b. Teori pola (*Pattern Theory*)

Teori ini diperkenalkan oleh Goldscheider (1894). Teori ini menerangkan bahwa ada dua serabut nyeri, yaitu serabut yang mampu menghantarkan rangsang dengan cepat dan serabut yang mampu menghantarkan dengan lambat. Kedua serabut saraf tersebut bersinapsis pada medulla spinalis dan meneruskan informasi ke otak mengenai jumlah, intensitas, tipe input sensori nyeri yang menafsirkan karakter dan kualitas input sensori nyeri.

c. Teori gerbang kendali nyeri (*Gate control theory*)

Pada tahun 1959, Melzack & Walk menjelaskan teori gerbang kendali nyeri, yang menyatakan terdapat semacam “pintu gerbang” yang dapat memfasilitasi atau memperlambat transmisi sinyal nyeri.

4. Klasifikasi Nyeri menurut Andarmoyo (2013)

a. Berdasarkan Durasi Nyeri

1) Nyeri Akut

Nyeri akut terjadi setelah terjadinya cedera akut, penyakit, atau intervensi bedah dan memiliki awitan yang cepat dengan intensitas yang bervariasi (ringan sampai berat) dan berlangsung untuk waktu singkat. Fungsi nyeri akut adalah untuk memberi peringatan akan cedera atau penyakit yang akan datang. Nyeri akut biasanya akan menghilang dengan atau tanpa pengobatan setelah area yang rusak pulih kembali.

Nyeri akut berdurasi singkat (kurang dari 6 bulan), memiliki onset yang tiba-tiba, dan terlokalisir. Nyeri ini biasanya diakibatkan oleh trauma, bedah, atau inflamasi. Hampir setiap individu pernah merasakan nyeri ini, seperti nyeri sakit kepala, sakit gigi, tertusuk jarum, terbakar, nyeri otot, nyeri saat melahirkan, nyeri sesudah tindakan pembedahan, dan yang lainnya.

Nyeri akut terkadang disertai oleh aktivasi sistem saraf simpatis yang akan memperlihatkan gejala-gejala seperti: peningkatan tekanan darah, peningkatan respirasi, peningkatan denyut jantung, diaphoresis dan dilatasi pupil. Klien yang mengalami nyeri akut akan memperlihatkan respon emosi dan perilaku seperti menangis, mengerang kesakitan, mengerutkan wajah atau menyeringai. Klien akan melaporkan secara verbal adanya ketidaknyamanan berkaitan dengan nyeri yang dirasakan.

2) Nyeri Kronik

Nyeri kronik adalah nyeri konstan atau intermiten yang menetap sepanjang periode waktu yang cukup lama dan biasanya berlangsung lebih dari enam bulan selain itu nyeri ini tidak memberikan respon terhadap pengobatan yang diarahkan pada penyebabnya. Manifestasi klinis yang tampak pada nyeri kronis sangat berbeda dengan yang diperlihatkan oleh nyeri akut. Pemeriksaan tanda-tanda vital

sering sekali didapatkan masih dalam batas normal dan serta tidak ditandai dengan dilatasi pupil. Manifestasi yang biasanya muncul berhubungan dengan respon psikososial seperti rasa keputusasaan, kelesuan, penurunan libido (gairah seksual), penurunan berat badan, mudah tersinggung, marah, tidak tertarik pada aktivitas fisik. Secara verbal nyeri kronik mungkin akan melaporkan adanya ketidaknyamanan, kelemahan, dan kelelahan.

b. Berdasarkan Asalnya

1) Nyeri Nosiseptif

Nyeri yang diakibatkan oleh aktivitas atau sensitisasi nosiseptor perifer dapat terjadi karena adanya stimulus yang mengenali kulit, tulang, sendi, otot, jaringan ikat, dan lain-lain.

2) Nyeri Neuropatik

Nyeri karena suatu cedera atau abnormalitas yang didapat pada struktur saraf perifer maupun sentral. Nyeri ini sulit diobati, nyeri seperti rasa terbakar.

Berdasarkan lokasi nyeri menurut Potter & Perry (2006) dibedakan sebagai berikut:

a) Nyeri superficial

Nyeri yang disebabkan karena stimulus kulit, karakteristik dari nyeri berlangsung sebentar dan terlokalisasi. Seperti tertusuk jarum, luka potongan kecil atau laserasi.

b) Nyeri dalam

Nyeri yang terjadi akibat stimulasi organ-organ internal. Durasinya berlangsung lebih lama dari pada nyeri superficial. Nyeri dapat terasa tajam, tumpul, tergantung organ yang terlibat, misalnya sensasi terbakar pada ulkus lambung.

c) Nyeri alih

Nyeri yang terjadi karena banyak organ tidak memiliki reseptor nyeri sehingga menjalar ke organ lain merasakan. Contoh penyebab yaitu nyeri pada infark miokard yang menyebabkan alih ke rahang.

d) Nyeri radiasi

Nyeri yang meluas dari empat awal cedera ke bagian tubuh yang lain. Karakteristik nyeri seakan menyebar kebagian bawah dan sepanjang bagian tubuh. Nyeri punggung bagian bawah akibat diskus intravertebral yang ruptur disertai nyeri yang meradiasi sepanjang tungkai dari iritasi syaraf skiatik.

5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Dan Reaksi Terhadap Nyeri menurut Prasetyo (2010)

a. Usia

Usia merupakan variabel yang penting dalam mempengaruhi nyeri pada individu. Anak yang masih kecil mempunyai kesulitan dalam memahami nyeri dan prosedur pengobatan yang dapat menyebabkan nyeri. Anak-anak kecil yang belum dapat mengucapkan kata-kata juga mengalami kesulitan dalam mengungkapkan secara verbal dan mengekspresikan nyeri kepada kedua orang tuanya ataupun perawat. Sebagian anak-anak terkadang segan untuk mengungkapkan keberadaan nyeri yang ia alami, mereka takut akan tindakan perawatan yang harus mereka terima nantinya.

Pada pasien lansia seorang perawat harus melakukan pengkajian lebih rinci ketika seorang lansia melaporkan adanya nyeri. Seringkali lansia memiliki sumber nyeri lebih dari satu. Terkadang penyakit yang berbeda-beda yang diderita lansia menimbulkan gejala yang sama, sebagai contoh nyeri dada tidak selalu mengindikasikan serangan jantung, nyeri dada dapat timbul karena gejala arthritis pada spinal dan gejala gangguan abdomen. Sebagian lansia terkadang pasrah

terhadap apa yang mereka rasakan, mereka menganggap bahwa hal tersebut merupakan konsekuensi penuaan yang tidak bisa dihindari.

b. Jenis Kelamin

Secara umum pria dan wanita tidak berbeda secara signifikan dalam berespon terhadap nyeri. Hanya beberapa budaya yang menganggap bahwa seorang anak laki-laki harus lebih berani dan tidak boleh menangis dibandingkan anak perempuan dalam situasi yang sama ketika merasakan nyeri. Akan tetapi dari penelitian yang terakhir memperlihatkan hormon seks pada mamalia berpengaruh terhadap tingkat toleransi terhadap nyeri. Hormon seks testosteron menaikkan ambang nyeri pada percobaan binatang, sedangkan estrogen meningkatkan pengenalan/sensitivitas terhadap nyeri. Bagaimanapun, pada manusia lebih kompleks, dipengaruhi oleh personal, sosial, budaya dan lain-lain.

c. Kebudayaan

Perawat seringkali berasumsi bahwa cara berespon pada setiap individu dalam masalah nyeri adalah sama, sehingga mereka mencoba mengira bagaimana pasien berespon terhadap nyeri. Sebagai contoh, apabila seorang perawat yakin bahwa menangis dan merintih mengindikasikan suatu ketidakmampuan dalam mengontrol nyeri, akibatnya pemberian terapi bisa jadi tidak cocok untuk klien berkebangsaan meksiko-Amerika. Seorang klien berkebangsaan meksiko-Amerika yang menangis keras tidak selalu mempersepsikan pengalaman nyeri sebagai suatu yang berat atau mengharapkan perawat melakukan intervensi (Calvillo dan Flaskerud, 1991)

d. Makna nyeri

Makna nyeri pada seseorang mempengaruhi pengalaman nyeri dan cara seseorang beradaptasi terhadap nyeri. Seorang wanita yang merasakan nyeri saat bersalin akan mempersepsikan nyeri secara berbeda dengan wanita lainnya yang nyeri karena dipukul oleh suaminya.

e. Lokasi dan Tingkat Keparahan Nyeri

Nyeri yang dirasakan bervariasi dalam intensitas dan tingkat keparahan pada masing-masing individu. Nyeri yang dirasakan mungkin terasa ringan, sedang atau bisa jadi merupakan nyeri yang berat. Dalam kaitannya dengan kualitas nyeri, masing-masing individu juga bervariasi, ada yang melaporkan nyeri seperti tertusuk, nyeri tumpul, berdenyut, terbakar dan lain-lain, sebagai contoh individu yang tertusuk jarum akan melaporkan nyeri yang berbeda dengan individu yang terkena luka bakar.

f. Perhatian

Tingkat perhatian seseorang terhadap nyeri akan mempengaruhi persepsi nyeri. Perhatian yang meningkatkan terhadap nyeri akan meningkatkan respon nyeri sedangkan upaya pengalihan (distraksi) dihubungkan dengan penurunan respon nyeri. Konsep inilah yang mendasari berbagai terapi untuk menghilangkan nyeri, seperti relaksasi, teknik imajinasi terbimbing dan masase.

g. Ansietas (kecemasan)

Hubungan antara nyeri dan ansietas bersifat kompleks, ansietas yang dirasakan seseorang seringkali meningkatkan persepsi nyeri, akan tetapi nyeri juga dapat menimbulkan perasaan ansietas. Sebagai contoh seseorang yang menderita kanker kronis dan merasa takut akan kondisi penyakitnya akan semakin meningkatkan persepsi nyerinya.

h. Keletihan

Keletihan/kelelahan yang dirasakan seseorang akan meningkatkan sensasi nyeri dan menurunkan kemampuan koping individu.

i. Pengalaman Sebelumnya

Setiap individu belajar dari pengalaman nyeri, akan tetapi pengalaman yang telah dirasakan individu tersebut tidak berarti bahwa individu tersebut akan mudah dalam menghadapi nyeri pada masa yang mendatang. Seseorang yang

terbiasa merasakan nyeri akan lebih siap dan mudah mengantisipasi nyeri daripada individu yang mempunyai pengalaman sedikit tentang nyeri.

j. Dukungan Keluarga dan Sosial

Individu yang mengalami nyeri seringkali membutuhkan dukungan, bantuan, perlindungan dari anggota keluarga lain, atau teman terdekat. Walaupun nyeri masih dirasakan oleh klien, kehadiran orang terdekat akan meminimalkan kesepian dan ketakutan.

6. Penilaian respon intensitas nyeri


Intensitas nyeri adalah gambaran tentang tingkat nyeri yang dirasakan oleh individu, pengukuran intensitas nyeri sangat subjektif dan individual serta kemungkinan nyeri dalam intensitas yang sama dirasakan sangat berbeda oleh dua orang yang berbeda (Tamsuri, 2007).

Penilaian intensitas nyeri dapat dilakukan dengan menggunakan skala sebagai berikut:

a. Skala numerik atau *Numerical Rating Scale* (NRS)

Skala yang digunakan sebagai skala pengganti alat pendeteksi kata dengan menggunakan skala 0-10. Skala yang paling efektif digunakan saat mengkaji intensitas nyeri sebelum dan sesudah intervensi terapeutik.


Penggunaan NRS direkomendasikan untuk menilai skala nyeri pasca operasi pada pasien berusia di atas 9 tahun. NRS sangat mudah digunakan dan merupakan skala yang sudah valid.



Gambar 2.1 Skala Numerik
Sumber: Brunelli & Novita dalam Ramadhani, 2014

b. Skala deskriptif

Merupakan alat pengukuran tinggi keparahan nyeri yang lebih objektif. Skala pendeskripsi verbal (*verbal descriptor scale*) merupakan sebuah garis yang terdiri dari tiga sampai lima kata pendeskripsi yang tersusun dengan jarak yang sama di sepanjang garis.



Gambar 2.2 Skala Deskriptif
Sumber: Tamsuri, 2007

c. Skala analog visual (*visual analog scale*)

Suatu garis lurus/ horizontal sepanjang 10 cm yang mewakili intensitas nyeri yang terus menerus dan pendeskripsi verbal pada setiap ujungnya. Pengukuran skala pada intensitas nyeri pada anak-anak telah dikembangkan alat yang dinamakan oucher, yang terdiri dari dua skala yang terpisah: sebuah skala dengan nilai 0-100 pada sisi sebelah kiri untuk anak-anak yang lebih besar dan

skala fotografik enam gambar pada sisi kanan untuk anak-anak yang lebih kecil. Skala tersebut digunakan setelah terapi atau saat gejala menjadi buruk untuk menilai apakah nyeri mengalami penurunan atau peningkatan.

Analog

Tidak nyeri

Nyeri yang tidak

Tertahankan

Gambar 2.3 Skala Analog
Sumber: Tamsuri, 2007

7. Managemen Nyeri

Tidak ada penyakit yang berat bagi Allah. Dimana dia yang menjadikan penyakit dan dia pula yang menyembuhkannya sebagaimana firmannya dalam QS. Asy-Syu'ara 26/80, yaitu:

وَإِذَا مَرَضْتُ فَبُهِرْتُ بِشِفَائِهِ

Terjemahnya:

“Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku” (Kementerian Agama RI, 2012).

Firman-Nya “Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku”, disandarkan penyakit kepada dirinya, sekalipun hal itu merupakan qadar, qadha dan ciptaan Allah. Akan tetapi, ia sandarkan hal itu kepada dirinya sebagai sikap beradaptasi. Makna hal itu berarti, jika aku menderita sakit, maka tidak ada seorang pun yang kuasa menyembuhkan aku selainnya (Ibnu Katsir, 2004). Kemudian diterangkan lebih lanjut oleh Muslim dari Jabir ra, dari Rasulullah saw bahwasanya beliau bersabda:

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ

()

Artinya:

“Dari Jabir ra, dari Rasulullah saw bahwasanya beliau bersabda: Setiap penyakit pasti ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, maka sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah Azza wa jalla” (HR. Muslim no. 1473).

Berdasarkan Ayat dan hadits di atas telah ditegaskan bahwa manusia terkadang diberi cobaan atau ujian berupa sakit, namun Allah juga menciptakan obat atau penawar untuk segala jenis penyakit yang Dia berikan terhadap hambanya. Apabila terserang penyakit manusia diperintahkan untuk berusaha untuk sembuh dari penyakitnya dengan cara berobat. Dalam hal ini obat atau penawar yang dimaksud bukan hanya dari segi farmakologis tetapi juga dalam hal non-farmakologis. Jadi, sebagai seorang perawat dalam memberikan asuhan keperawatan dalam penanganan nyeri, ketika mendapatkan obat atau penawar untuk mengatasi nyeri yang diderita klien maka nyeri tersebut akan hilang dengan izin Allah.

a. Farmakologis

Penanganan nyeri yang dialami oleh individu dapat melalui intervensi farmakologis, dilakukan oleh kolaborasi dengan dokter atau pemberi perawat utama lainnya pada pasien. Obat-obat yang biasanya digunakan adalah antiinflamasi nonsteroid. Obat-obatan ini dapat menurunkan nyeri dan menghambat produksi prostaglandin dari menghambat reseptor nyeri untuk menjadi sensitive terhadap stimulus penyakit sebelumnya (Smeltzer & Bare dalam Ramadhani, 2014).

b. Non Farmakologis

Banyak pasien dan anggota tim kesehatan cenderung untuk memandang obat sebagai salah satunya metode untuk menghilangkan nyeri. Namun begitu

banyak aktifitas keperawatan nonfarmakologis yang membantu dalam menghilangkan nyeri. Bentuk-bentuk penatalaksanaan nonfarmakologi menurut Smeltzer & Bare dalam Ramadhani (2014).

1) Stimulasi dan Massage

Massage adalah stimulasi tubuh secara umum, sering dipusatkan pada pinggang dan bahu, massage menstimulasi reseptor tidak nyeri, massage juga membantu pasien lebih nyaman karena membuat relaksasi otot.

2) Terapi Es dan Panas

Terapi Es dapat menurunkan prostaglandin yang memperkuat sensitifitas reseptor nyeri. Agar efektif es harus diletakkan di area sekitar pembedahan. Penggunaan panas dapat meningkatkan aliran darah yang dapat mempercepat penyembuhan dan penurunan nyeri.

3) Stimulasi Syaraf Elektris Transkutan (TENS)

TENS merupakan unit yang dijalankan oleh baterai dengan elektrode yang dipasang pada kulit untuk menghilangkan sensasi kesemutan atau menggetar pada area nyeri. Mekanisme ini sesuai dengan teori gate kontrol dimana mekanisme ini akan menutup transmisi sinyal nyeri ke otak pada jaras ascenden sistem syaraf pusat untuk menurunkan intensitas nyeri.

4) Teknik Distraksi

Dilakukan dengan memfokuskan perhatian pasien pada sesuatu selain nyeri. Distraksi diduga dapat menurunkan persepsi nyeri dengan menstimulasi sistem kontrol desenden, yang mengakibatkan lebih sedikit stimulasi nyeri yang ditransmisikan ke otak. Keefektifan transmisi tergantung pada kemampuan pasien untuk menerima dan membangkitkan input sensori selain nyeri.

5) Teknik Relaksasi

Relaksasi merupakan kebebasan mental dan fisik dari ketegangan dan stress yang mampu memberikan individu kontrol ketika terjadi rasa tidak nyaman atau nyeri fisik dan emosi pada nyeri.

6) Hipnosis

Hipnosis efektif menurunkan nyeri akut dan kronis. Teknik ini membantu pereda nyeri terutama dalam periode sulit.

7) Akupuntur menurut Andarmoyo (2013)

Teknik akupuntur ini adalah suatu teknik tusuk jarum yang mempergunakan jarum-jarum kecil panjang (ukuran bervariasi dari 1,7 cm hingga 10 cm) untuk menusuk bagian-bagian tertentu di badan (area yang paling digunakan adalah kaki, tungkai bawah, tangan, dan lengan bawah (Basford & Slevin, 2006), guna menghasilkan ketidakpekaan terhadap rasa sakit atau nyeri.

C. Hypno-EFT (Emotional Freedom Technique)

1. Pengertian EFT (*Emotional Freedom Technique*)

EFT adalah singkatan dari *Emotional Freedom Technique* (tapping) dan pada dasarnya, itu adalah versi emosional dari akupuntur (Craig, 2015). Bedanya, kalau akupuntur menggunakan jarum untuk menstimulasi titik-titik energi yang tersebar di jalur meridian, sedangkan EFT (*Emotional Freedom Technique*) menggunakan jari untuk mengetuk titik-titik energi ini dengan jumlah ketukan dan urutan tertentu (Gunawan, 2009).

EFT (*Emotional Freedom Technique*) adalah sebuah terapi psikologi praktis yang dapat menangani banyak penyakit, baik itu penyakit fisik dan penyakit psikologis (masalah pikiran dan perasaan) (Majid, 2015).

2. Sejarah EFT (*Emotional Freedom Technique*) dalam Indoeft (2015)

EFT (*Emotional Freedom Technique*) adalah versi emosional dari akupuntur. Teknik penyembuhan timur akupunktur sendiri berusia sudah lebih dari

5.000 tahun. Dr. John Diamond menulis tentang hubungan “sistim energi tubuh” dengan gangguan *psychologis*. Dari konsep ini dilahirkan cabang baru dari ilmu *psychology*, yaitu *Energy Psychology*.

Dr. Roger Callahan, seseorang yang juga sudah lama mempelajari sistim energi tubuh melahirlah teknik terapi yang kontroversial yaitu *Tought field Therapy* (TFT) atau juga dikenal dengan Callahan *Technique*.

Pada waktu itu di tahun 1980 Dr. Callahan sedang menangani Mary yang sudah bertahun-tahun dengan keluhan sakit kepala berkepanjangan dan mengalami mimpi buruk yang menakutkan karena intense aqua phobia. Hingga suatu hari, Dr. Callahan mencoba cara terakhir diluar batas ilmu psikoterapi. Dengan pengetahuan “sistim energi tubuh” yang didapat, Ia mecoba mentapping (mengetuk) dengan ujung jarinya ke bagian bawah mata. Setelah pulang Mary melaporkan phobianya hilang dan Ia berani mendekati kolam air dan memercikan air ke mukanya tanpa rasa takut. Sakit kepalanya hilang demikian juga dengan mimpi buruknya. Dari situlah Dr. Callahan menciptakan *Tought field Therapy* (TFT).

Murid pertama yang belajar teknik *Tought field Therapy* (TFT). pada Dr. Callahan adalah Gary Craig. Karena tekniknya dirasakan rumit, Gary Craig menyederhanakan TFT menjadi teknik yang mudah dipelajari namun efektif yang dinamakan *Emotional Freedom Technique* (EFT). Ia memperkenalkan teknik ini ke seluruh dunia. Dan pada puncaknya Ia menawarkan menterapi para veteran perang Vietnam di VA (*Veteran Administration*) yang sudah puluhan tahun menderita *Post traumatic Stress Disorder* (PTSD). Dalam 6 hari Gary berhasil membebaskan 20 orang veteran dari penderitaan puluhan tahun karena perang Vietnam.

3. Tujuan EFT (*Emotional Freedom Technique*)

EFT (*Emotional Freedom Technique*) dilakukan dengan mengetukkan dua ujung jari pada beberapa lokasi di tubuh. Ketukan-ketukan tersebut bertujuan untuk menyeimbangkan energi meridian dalam tubuh ketika terjadi gejala-gejala kemunduran fisik dan emosional yang mengganggu (Iskandar, 2008)

4. Prinsip Kerja EFT (*Emotional Freedom Technique*)

Ketika seseorang mengalami hambatan emosional seperti marah marah, kecewa, sedih, cemas, stress, trauma dan sebagainya aliran energi di dalam tubuh yang melalui titik meredian tubuh akan terganggu. Dan untuk menghilangkan hambatan-hambatan emosi tersebut, kita perlu memperbaiki gangguan aliran di titik meredian dengan cara mengetukkan jari dengan cara tertentu sesuai teknik EFT (*emotional freedom technique*) (Majid, 2015).

5. Manfaat EFT (*Emotional Freedom Technique*)

Menurut Psikohipnotis (2015), EFT (*Emotional Freedom Technique*) ditemukan untuk lebih mengefektifkan proses penyembuhan pada penyakit seperti:

- a. Kecanduan (makanan, rokok, alkohol, obat-obatan)
- b. Alergi
- c. Kegelisahan dan rasa panik
- d. Mudah marah
- e. Tekanan dan gangguan pikiran
- f. Depresi dan sedih
- g. Merubah citra tubuh
- h. Takut dan pobia
- i. Kehilangan dan kesedihan
- j. Rasa bersalah
- k. Insomnia

- l. Ingatan buruk
- m. Rasa sakit dan nyeri
- n. Penyembuhan fisik
- o. Meningkatkan kinerja (olah raga, berbicara di depan umum)
- p. Trauma
- q. Pelecehan seksual
- r. Menghilangkan rasa nyeri seperti migrain, radang sendi, dll.

6. Keunggulan EFT (*Emotional Freedom Technique*)

Menurut Fone, EFT (*Emotional Freedom Technique*) baik untuk kesehatan *emotional and physical* karena tidak menyakiti, bisa untuk siapa saja, tidak menggunakan obat, dapat digunakan sebagai intervensi tunggal atau dengan teknik lainnya, dan dapat dilakukan dimana saja. Selain itu, EFT (*Emotional Freedom Technique*) juga aman bagi siapa saja karena tidak memerlukan waktu yang lama (tahunan/bulanan), tidak membongkar pengalaman secara menyeluruh, tidak menggunakan operasi bedah, tidak ada obat, tidak menggunakan pencucian otak dan tidak perlu membuka pakaian (Rahmi, 2012).

EFT (*Emotional Freedom Technique*), jumlah titik yang distimulus hanya berjumlah 13 titik utama yang mewakili 12 jalur utama energi meridian. Sedangkan pada akupunktur terdapat 361 titik akupunktur agar bisa menstimulus jalur energi tubuh. Selain itu, penggunaan jarum pada titik-titik tersebut harus dilakukan dengan tingkat presisi yang tinggi agar jarum yang ditusukkan berada pada titik stimulus yang tepat (Syahril, 2015).

Para hypnotherapist saat ini umumnya juga menguasai EFT (*Emotional Freedom Technique*) dengan sangat baik, karena mereka tahu walaupun hypnosis sangat efektif, hypnosis tidak bisa diterapkan pada semua orang. Misalnya untuk menyembuhkan bayi dan balita dari fobia atau trauma, sangatlah sulit atau bahkan tidak mungkin menghipnotis bayi dan balita. Namun EFT (*Emotional Freedom*

Technique) bisa. EFT (*Emotional Freedom Technique*) juga bisa digunakan untuk penyembuhan jarak jauh yang mana hypnosis tidak memungkinkan. Dengan terapi EFT (*Emotional Freedom Technique*) jarak jauh, anda bisa membantu menyembuhkan kerabat atau teman anda yang sedang sakit (Majid, 2015).

7. Tahapan *hypno-ef* (*emotional freedom technique*) dalam Syahril (2015)

- a. Tahap 1 : Persiapan
 - 1) Sebelum melakukan teknik ini, sebaiknya minum air putih 1 gelas.
 - 2) Pikirkan dan rasakan kembali masalah anda (catat semua hal-hal yang muncul saat memikirkan dan merasakan kembali masalah tersebut).
 - 3) Tentukan skala nyeri dengan menggunakan skala 0-10.
 - 4) Menjawab pertanyaan tersebut dengan sungguh-sungguh:
 - a) Sudah berapa lama Anda merasakan nyeri ini?
 - b) Bagaimana (kualitas) hidup yang telah Anda jalani hingga saat ini, selama Anda merasakan nyeri ini?
 - c) Apa kerugian yang telah Anda alami selama Anda tetap mempertahankan nyeri ini? Pikirkan sungguh-sungguh minimal 5 kerugian.
 - d) Apa kerugian yang akan Anda alami bila Anda tetap mempertahankann nyeri ini? Pikirkan sungguh-sungguh minimal 5 kerugian.
 - e) Bayangkan dan rasakan semua pengaruh negatif yang selama ini telah sangat mengganggu hidup Anda akibat nyeri ini.
 - f) Putuskan dengan sungguh-sungguh dan tulus untuk melepaskan nyeri ini sekarang dan sekaligus.
 - g) Sekarang pikirkan minimal 5 hal positif yang akan terjadi dalam hidup Anda bila nyeri ini berhasil diatasi.
 - h) Bayangkan dan rasakan hal-hal positif yang Anda pikirkan tersebut seakan-akan telah terjadi dalam hidup Anda.

b. Tahap 2 : *The set up*

Kalimat *set up* adalah sebuah kalimat yang mengandung pengakuan dan penerimaan diri atas masalah yang dihadapi.

Baca afirmasi sebanyak tiga kali sambil menekan atau mengurut secara memutar bagian sore spot di dada kiri atau kanan, menggunakan 2 jari tengah dan telunjuk seperti menotok jalan darah. Letak sore spot itu di bawah tulang leher di atas payudara.

Contoh afirmasi :

“Meskipun saya merasakan nyeri pada.....(sebut namanya), dan segala sesuatu yang berhubungan dengan.....(sebut namanya), saya pasrah, menerima, dan menghargai diri saya seutuhnya, dan memutuskan untuk melepaskan semua perasaan tidak nyaman ini sekarang dan sekaligus demi kebaikan dan kemajuan hidup saya”.



Gambar 2.4 Titik Sore Spot

Sumber: Syahril, 2015

c. Tahap 3 : *The Sequence*

Ketuk tiap titik 5-7 kali sambil niatkan dan ikhlaskan untuk melepaskan nyeri.

- a) Pangkal alis kiri atau kanan (pilih salah satu)
- b) Tulang pelipis kiri atau kanan (pilih salah satu)

- c) Tulang di bawah mata, kiri atau kanan (pilih salah satu)
- d) Di bawah hidung di atas bibir, bagian tengah
- e) Di dagu
- f) Di 2 cm dari titik tengah tulang selangka (di bawah leher yang tulangnya menonjol) kiri atau kanan (pilih salah satu)
- g) Di bawah ketiak kiri atau kanan (pilih salah satu)
- h) Di ibu jari (bagian samping kuku) kiri atau kanan (pilih salah satu)
- i) Di jari telunjuk (bagian samping kuku) kiri atau kanan (pilih salah satu)
- j) Di jari tengah (bagian samping kuku) kiri atau kanan (pilih salah satu)
- k) Di jari kelingking (bagian samping kuku) kiri atau kanan (pilih salah satu)
- l) Di karate chop (telapak tangan bagian samping) kiri atau kanan (pilih salah satu)



Gambar 2.5 Titik Meridian Tubuh

Sumber: Syahril, 2015

d. Tahap 4 : 9 *gammut*

Cara melakukan 9 *gammut procedure* adalah dengan mengetuk titik *gammut* secara terus menerus, tanpa menyebut kata kunci, kepala tegak menatap ke depan. Titik *gammut* tertelak di punggung tangan di bawah jari manis.

- 1) Pejamkan mata dengan keras

- 2) Buka mata sambil melotot, pandangan lurus ke depan
- 3) Lirikkan mata ke kanan bawah secara keras, tanpa menggerakkan kepala
- 4) Lirikkan mata ke kiri bawah secara keras, tanpa menggerakkan kepala
- 5) Putar mata searah jarum jam, satu kali, dengan hidung sebagai poros
- 6) Putar mata berlawanan arah jarum jam, satu kali, dengan hidung sebagai poros
- 7) Pandangan lurus ke depan, gumamkan lagu "*happy birthday to you*" selama 3 detik
- 8) Hitung dengan cepat 1, 2, 3, 4, 5 dengan pandangan tetap lurus ke depan
- 9) Gumamkan lagi lagu "*happy birthday to you*" selama 3 detik, pandangan tetap lurus ke depan



Gambar 2.6 Titik Gammut
Sumber: Syahril, 2015

e. Tahap 5 : Ulangi tahap 3 (*the sequence*) sekali lagi

Setelah selesai, tarik napas dan buang napas panjang, lalu tanyakan pada diri sendiri terkait perubahan perasaan setelah melakukan tahapan-tahapan di atas.


Jika masih dirasa belum mengalami perubahan tidak perlu mengulangi satu putaran, tapi cukup lakukan Finishing Touch untuk membuat intensitas nyeri langsung turun. Caranya:

- 1) Arahkan wajah lurus ke depan, tidak boleh bergerak
- 2) Ketuk titik Gammut terus menerus (tanpa menyebut kata kunci)
- 3) Hitung satu, mata menatap lantai
- 4) Hitung dua, mata mulai sedikit naik
- 5) Hitung tiga, mata semakin naik menatap lurus ke depan
- 6) Hitung empat, mata bertambah naik
- 7) Hitung lima, mata sudah sangat naik
- 8) Hitung enam, mata menatap plafon (tanpa mendongakkan kepala)

Proses ini dilakukan 5 atau 6 kali untuk benar-benar memastikan bahwa skala nyeri turun. Bila skala telah turun maka anda telah terbebas dari masalah nyeri yang tadinya mengganggu anda.

D. Kerangka Konsep

Managemen nyeri menurut Smeltzer & Bare dalam Ramadhani (2014):




Skema 2.1 Kerangka Konsep

Keterangan :




: Variabel Independen



: Variabel Dependen



: Variabel yang diteliti




: Variabel penghubung



: Variabel yang tidak diteliti

E. Kerangka Kerja



Skema 2.2 Kerangka Kerja

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *Pre Experimental* dengan menggunakan rancangan *one group pretest-posttest design*, dalam desain ini satu kelompok objek diukur sebelum dan sesudah mendapat perlakuan *Hypno-EFT (Emotional Freedom Technique)*. Bagan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Subjek	Pra	Perlakuan	pasca-tes
K	O	I	OI
	Waktu 1	Waktu 2	Waktu 3

Tabel 3.1 Rancangan Penelitian *Pre-Eksperimental*
Sumber: Nursalam, 2013

Keterangan :

K : subjek (pasien post operasi)

O : observasi tingkat nyeri sebelum dilakukan perlakuan

I : perlakuan berupa *Hypno-EFT (Emotional Freedom Technique)*

OI : observasi tingkat nyeri sesudah dilakukan perlakuan

Pengaruh adanya perlakuan adalah apabila ada perubahan hasil pengukuran sebelum dan sesudah perlakuan. Dalam penelitian, pengaruh perlakuan dianalisis dengan uji beda menggunakan statistik *Repeated Anova Dengan Post Hoc Bonferroni*.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Ruang Kamase I dan Kamase II RSUD Labuang Baji Makassar.

2. Waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan. Penelitian ini dilakukan mulai tanggal 22 Februari- 22 Maret 2016 dan dilanjutkan pada tanggal 29 Maret- 29 Apri 2016.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian adalah subjek (misalnya manusia, klien) yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan (Nursalam, 2013). Populasi pada penelitian ini adalah semua pasien post operasi ortopedi di RSUD Labuang Baji Makassar dengan jumlah sebanyak 165 orang.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pada saat pengambilan data awal didapatkan jumlah populasi pasien post operasi ortopedi sebanyak 165 orang. Namun, peneliti tidak mengetahui jumlah populasi pasien post operasi ortopedi yang mengalami fraktur. Sehingga, pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *Non Probability* sampling jenis *Accidental Sampling* yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2014). Jumlah sampel yang didapatkan pada penelitian ini yaitu sebanyak 10 orang.

Dalam penelitian keperawatan, kriteria sampel meliputi kriteria inklusi dan kriteria eksklusi, dimana kriteria tersebut menentukan dapat atau tidaknya sampel tersebut digunakan.

a. Kriteria inklusi

- 1) Bersedia untuk diberikan terapi *hypno-eft (emotional freedom technique)*
- 2) Bersedia menandatangani surat persetujuan
- 3) Pasien post operasi ortopedi yang mengalami fraktur yang sudah berada di ruang perawatan Kamase I dan Kamase II RSUD Labuang Baji Makassar
- 4) Pasien dengan skala nyeri 1-10 (nyeri ringan sampai nyeri berat)
- 5) Pasien dengan usia remaja sampai dengan dewasa (12-45 tahun)


b. Kriteria eksklusi

- 1) Pasien tidak sadar
- 2) Pasien yang tidak bisa membaca dan berhitung
- 3) Pasien buta
- 4) Pasien yang pulang sebelum intervensi selesai dilakukan

D. Instrumen Penelitian

Penelitian ini menggunakan instrumen berupa lembar observasi yang berisi pengkajian nyeri dalam bentuk skala numerik atau *Numerical Rating Scale (NRS)*. Skala pengukuran ini memungkinkan pasien untuk memilih nyeri dari skala 0-10. Skala nyeri didapatkan melalui laporan langsung dari pasien dengan menyebutkan angka pada skala nyeri numerik atau *Numerical Rating Scale (NRS)*.

Lembar observasi pada penelitian ini untuk mengukur skala nyeri pasien sebelum dan sesudah diberi perlakuan *hypno-eft (emotional freedom technique)*. Adapun rentang skor untuk skala nyeri adalah:



Gambar 3.1 Penilaian Intensitas Nyeri
Sumber: Brunelli & Novita dalam Ramadhani, 2014

Keterangan:

- 0 : tidak ada keluhan nyeri.
- 1-3 : ada rasa nyeri, mulai terasa, tetapi masih dapat ditahan.
- 4-6 : ada rasa nyeri, terasa mengganggu, dan dengan melakukan usaha yang cukup kuat untuk menahannya.
- 7-10 : ada rasa nyeri, terasa sangat mengganggu/ tidak tertahankan, sehingga harus meringis, menjerit bahkan berteriak.

NRS merupakan skala ukur yang sudah valid dan penggunaan NRS direkomendasikan untuk penilaian skala nyeri pasca operasi pasien yang berumur di atas 9 tahun. Reabilitas NRS telah dilakukan ujinya oleh Brunelli dengan membandingkan instrumen NRS, VAS, VRS untuk menguji nyeri pada 60 pasien. Hasil uji Cohen's Kappa untuk instrumen NRS adalah 0,86 (sangat baik) (Brunelli & Novita dalam Ramadhani, 2014).

E. Sumber dan Cara Pengumpulan Data

1. Sumber Data

a. Data primer

Data primer diperoleh dengan cara pengukuran langsung skala nyeri pre-post test dengan menggunakan lembar observasi.

b. Data sekunder

Data sekunder yang dimaksud disini adalah berupa jumlah pasien post operasi ortopedi di RSUD Labuang Baji Makassar.

2. Cara Pengumpulan Data

- a. Mengurus perijinan dari Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sampai ke tempat yang ditunjukkan yaitu di RSUD Labuang Baji Makassar.
- b. Mencari sumber pustaka dan data penunjang di lapangan yaitu jumlah pasien post operasi ortopedi.

F. Pengolahan dan Analisa Data

1. Pengolahan Data

a. Editing

Proses editing setelah data hasil pemeriksaan terkumpul dan dilakukan dengan memeriksa kelengkapan data, memeriksa kesinambungan data, dan keseragaman data.

b. Coding

Dilakukan untuk memudahkan dalam pengolahan data, semua data perlu disederhanakan yaitu dengan simbol-simbol tertentu, untuk setiap hasil pemeriksaan (pengkodean).

c. Tabulating

Tabulasi adalah kegiatan memasukkan data-data hasil penelitian ke dalam tabel-tabel sesuai kriteria yang telah ditentukan sesuai dengan tujuan penelitian.

d. Entry Data

Memasukkan data yang telah ditabulasi ke dalam program komputer.

2. Analisa Data

a. Analisa Univariat

Untuk mengetahui distribusi frekuensi tingkat nyeri pada pasien post operasi ortopedi yang mengalami fraktur di RSUD Labuang Baji Makassar sebelum dan sesudah dilakukan terapi *hypno-ef* (*emotional freedom technique*).

b. Analisa Bivariat

Jika lebih dari dua kali pengukuran dan sebaran datanya normal, maka uji yang tepat digunakan yaitu uji *repeated anova dengan post hoc bonferroni*. Jika ada perbedaan yang signifikan sebelum dan setelah perlakuan maka perlakuan yang diberikan berpengaruh secara signifikan. Pada taraf signifikansi 5% (0,05), apabila ada perbedaan/pengaruh maka hipotesis penelitian (H_a) diterima dan hipotesis penelitian (H_o) ditolak. Sebaliknya, apabila tidak ada perbedaan/pengaruh dinyatakan bahwa hipotesis penelitian (H_o) tidak diterima (Nursalam, 2013).

G. Etika Penelitian

Secara umum prinsip etika dalam penelitian/pengumpulan data dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu prinsip manfaat, prinsip menghargai hak-hak subjek, dan prinsip keadilan (Nursalam, 2008).

1. Prinsip Manfaat

a. Bebas dari penderitaan

Penelitian harus dilaksanakan tanpa mengakibatkan penderitaan kepada subjek, khususnya jika menggunakan tindakan khusus.

b. Bebas dari eksploitasi

Partisipasi subjek dalam penelitian, harus dihindarkan dari keadaan yang tidak menguntungkan. Subjek harus diyakinkan bahwa partisipasinya dalam penelitian atau informasi yang telah diberikan, tidak akan dipergunakan dalam hal-hal yang dapat merugikan subjek dalam bentuk apapun.

c. Risiko (*benefits ratio*)

Peneliti harus hati-hati mempertimbangkan risiko dan keuntungan yang akan berakibat kepada subjek pada setiap tindakan.

2. Prinsip menghargai hak asasi manusia (*respect human dignity*)

a. Hak untuk ikut/tidak menjadi responden (*right to self determination*)

Subjek harus diperlakukan secara manusiawi. Subjek mempunyai hak memutuskan apakah mereka bersedia menjadi subjek ataupun tidak, tanpa adanya sangsi apapun atau akan berakibat terhadap kesembuhannya, jika mereka seorang klien.

b. Hak untuk mendapatkan jaminan dari perlakuan yang diberikan (*right to full disclosure*)

Seorang peneliti harus memberikan penjelasan secara rinci serta bertanggung jawab jika ada sesuatu yang terjadi pada subjek.

c. *Informed consent*

Subjek harus mendapatkan informasi secara lengkap tentang tujuan penelitian yang akan dilaksanakan, mempunyai hak untuk bebas berpartisipasi atau menolak menjadi responden. Pada *informed consent* juga perlu dicantumkan bahwa data yang diperoleh hanya akan dipergunakan untuk pengembangan ilmu.

3. Prinsip keadilan (*right to justice*)

a. Hak untuk mendapatkan pengobatan yang adil (*right in fair treatment*)

Subjek harus diperlakukan secara adil baik sebelum, selama, dan sesudah keikutsertaannya dalam penelitian tanpa adanya diskriminasi apabila ternyata mereka tidak bersedia atau dikeluarkan dari penelitian.

b. Hak dijaga kerahasiaannya (*right to privacy*)

Subjek mempunyai hak untuk meminta bahwa data yang diberikan harus dirahasiakan, untuk itu perlu adanya tanpa nama (*anonymity*) dan rahasia (*confidentiality*).

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil Tempat Penelitian

RSUD Labuang Baji Makassar didirikan pada tahun 1938 oleh Zending Gereja Genoformaf Surabaya, Malang dan Semarang sebagai rumah sakit Zending. RSUD Labuang Baji diresmikan pada tanggal 12 Juni 1938. Pada masa perang dunia ke II, rumah sakit ini digunakan oleh pemerintah Kotapraja Makassar untuk menampung penderita korban perang. Pada tahun 1946-1948, RSUD Labuang Baji mendapat bantuan dari pemerintah Negara Indonesia Timur (NIT) dengan merehabilitasi gedung-gedung yang hancur akibat perang. Kapasitas tempat tidur yang tersedia pada saat diresmikan adalah 25 tempat tidur. Pada tahun 1949-1951, Zending mendirikan bangunan permanen sehingga kapasitas tempat tidur menjadi 170 tempat tidur (TT). Pada tahun 1952-1955, oleh pemerintah daerah Kotapraja Makassar diberikan tambahan beberapa bangunan ruangan, sehingga kapasitas tempat tidur bertambah menjadi 190 TT. Sejak saat itulah (1955) RSUD Labuang Baji dibiayai oleh pemerintah daerah tingkat I Sulawesi Selatan. Pada tahun 1960, oleh Zending RSUD Labuang Baji diserahkan kepada pemerintah daerah tingkat I Sulawesi Selatan dan dikelola oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dengan akreditasi rumah sakit tipe C. Terhitung mulai tanggal 16 Januari 1996, melalui Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 1996, kelas rumah sakit ditingkatkan menjadi rumah sakit kelas B.

Visi RSUD Labuang Baji Makassar yaitu Menjadi Rumah Sakit Unggulan di Sulawesi Selatan. Dan Misi yaitu Mewujudkan Profesionalisme SDM, Meningkatkan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit, Memberikan Pelayanan Prima Evisiensi Biaya Rumah Sakit, Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan.

B. Hasil Penelitian

Penelitian mengenai pengaruh *hypno-eft (Emotional Freedom Technique)* terhadap skala nyeri pada pasien post operasi ortopedi di RSUD Labuang Baji Makassar telah dilaksanakan sejak bulan Februari-April 2016. Responden dalam penelitian ini adalah pasien post operasi ortopedi yang mengalami fraktur dengan jumlah responden sebanyak 10 orang. Jenis penelitian ini dirancang dalam bentuk *Pre Experimental* dengan desain penelitian berupa *One group Pre-Test and Post-Test*. Data diperoleh dengan cara pengukuran langsung skala nyeri sebelum dan sesudah dilakukan *hypno-eft (emotional freedom technique)* dengan menggunakan lembar observasi.

1. Karakteristik Responden

Tabel 4.1
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Umur Pada Pasien Post Operasi Ortopedi yang mengalami Fraktur (N=10)

Karakteristik		Jumlah (f)	Persentase (%)
Umur	Remaja Awal (12-16 tahun)	1	10.0
	Remaja Akhir (17-25 tahun)	3	30.0
	Dewasa Awal (26-35 tahun)	2	20.0
	Dewasa Akhir (36-45 tahun)	4	40.0
Total		10	100.0

Sumber : Data Primer, 2016

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa mayoritas umur responden adalah dewasa akhir (36-45 tahun) yaitu 4 reponden dengan persentase 40%.

Tabel 4.2
Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Jenis Kelamin pada Pasien Post Operasi Ortopedi yang mengalami Fraktur (N=10)

Karakteristik		Jumlah (f)	Persentase (%)
Jenis Kelamin	Laki-laki	8	80.0
	Perempuan	2	20.0
Total		10	100.0

Sumber : Data Primer, 2016

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki yaitu 8 responden dengan persentase 80%.

Tabel 4.3
Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Pasien Post Operasi Ortopedi yang mengalami Fraktur (N=10)

Karakteristik		Jumlah (f)	Persentase (%)
Tingkat Pendidikan	Tidak sekolah	1	10.0
	SD	3	30.0
	SMP	2	20.0
	SMA	4	40.0
	Total	10	100.0

Sumber : Data Primer, 2016

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa mayoritas tingkat pendidikan responden adalah SMA yaitu 4 responden dengan persentase 40%.

Tabel 4.4
Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Pekerjaan pada Pasien Post Operasi Ortopedi yang mengalami Fraktur (N=10)

Karakteristik		Jumlah (f)	Persentase (%)
Pekerjaan	Supir/Gojek	3	30.0
	Pelajar/Mahasiswa	2	20.0
	Petani/Buruh	2	20.0
	Wiraswasta	2	20.0
	Lain-lain	1	10.0
	Total	10	100.0

Sumber : Data Primer, 2016

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa mayoritas pekerjaan responden adalah Supir/gojek yaitu 3 responden dengan persentase 30%.

2. Gambaran Tingkat Nyeri

Tabel 4.5
Crosstabulation Tingkat Nyeri Pada Pasien Post Operasi Ortopedi yang
mengalami Fraktur Sebelum dan Sesudah Dilakukan *Hypno-EFT*
(*Emotional Freedom Technique*) (N=10)

Pre test	Post test 1			Post test 2			Post test 3		
	Ringan	Sedang	Berat	Ringan	Sedang	Berat	Ringan	Sedang	Berat
Ringan	2	0	0	2	0	0	2	0	0
Sedang	1	3	0	4	0	0	4	0	0
Berat	0	1	3	0	2	2	1	3	0
Total	3	4	3	6	2	2	7	3	0

Sumber : Data Primer, 2016

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa pada hari pertama sebelum dilakukan *hypno-eft (emotional freedom technique)* pada pasien post operasi ortopedi yang mengalami fraktur, terdapat 2 responden dalam kategori nyeri ringan, 4 responden dalam kategori nyeri sedang, dan 4 responden dalam kategori nyeri berat. Sedangkan pada hari pertama sesudah dilakukan *hypno-eft (emotional freedom technique)* pada pasien post operasi ortopedi yang mengalami fraktur menunjukkan bahwa terdapat 3 responden dalam kategori nyeri ringan, 4 responden dalam kategori nyeri sedang, dan 3 responden dalam kategori nyeri berat. Pada hari kedua sesudah dilakukan *hypno-eft (emotional freedom technique)* terdapat 6 responden dalam kategori nyeri ringan, 2 responden dalam kategori nyeri sedang, dan 2 responden dalam kategori nyeri berat. Pada hari ketiga sesudah dilakukan *hypno-eft (emotional freedom technique)* pada pasien post operasi ortopedi yang mengalami fraktur, terdapat 7 responden dalam kategori nyeri ringan, 3 responden dalam kategori nyeri sedang, dan 0 responden dalam kategori nyeri berat.

Tabel 4.6
Rerata Skala Nyeri Sebelum dan Sesudah Dilakukan *Hypno-EFT (Emotional Freedom Technique)* (N=10)

		Mean	Median	SD	Min	Max
Hari 1						
	Pre-test	5.60	5	2.22	3	9
	Post-test	5.10	4.5	2.33	2	9
Hari 2						
	Pre-test	4.90	4	2.33	2	9
	Post-test	3.90	3	2.33	1	8
Hari 3						
	Pre-test	3.80	3.5	1.75	2	7
	Post-test	3.10	2.5	1.91	1	6

Sumber : Data Primer, 2016

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa sebelum dilakukan *hypno-ef* (*emotional freedom technique*) pada hari pertama skala nyeri tertinggi yang dialami responden adalah 9 dan terendah adalah 3 dengan rata-rata skala nyeri yaitu 5.60. Sedangkan sesudah dilakukan *hypno-ef* (*emotional freedom technique*) skala nyeri tertinggi yang dialami responden adalah 9 dan terendah adalah 2 dengan rata-rata skala nyeri yaitu 5.10. Pada hari kedua sebelum dilakukan *hypno-ef* (*emotional freedom technique*) skala nyeri tertinggi yang dialami responden adalah 9 dan terendah adalah 2 dengan rata-rata skala nyeri yaitu 4.90. Sedangkan sesudah dilakukan *hypno-ef* (*emotional freedom technique*) skala nyeri tertinggi yang dialami responden adalah 8 dan terendah adalah 1 dengan rata-rata skala nyeri yaitu 3.90. Pada hari ketiga sebelum dilakukan *hypno-ef* (*emotional freedom technique*) skala nyeri tertinggi yang dialami responden adalah 7 dan terendah 2 dengan rata-rata skala skala nyeri yaitu 3.80. sedangkan sesudah dilakukan *hypno-ef* (*emotional freedom technique*) skala nyeri tertinggi yang dialami responden adalah 6 dan terendah adalah 1 dengan rata-rata skala nyeri yaitu 3.10.

3. Analisis Perbedaan Skala Nyeri Pasien Post Operasi Ortopedi yang mengalami Fraktur Sebelum dan Sesudah Dilakukan *Hypno-EFT (Emotional Freedom Technique)*

Sebelum dilakukan uji *repeated anova* terlebih dahulu dilakukan uji normalitas data. Dan diperoleh nilai *shapiro-wilk* untuk semua variabel >0.05 . dimana nilai signifikansi pada hari pertama yaitu 0.077, hari kedua yaitu 0.071, dan hari ketiga 0.056, sehingga disimpulkan bahwa distribusi data pada 3 hari pengukuran adalah normal.

Tabel 4.7
Uji Normalitas

	shapiro-wilk		
	Statistic	df	sig.
Hari 1	.914	20	.077
Hari 2	.912	20	.071
Hari 3	.907	20	.056

Tabel 4.8
Hasil Uji Repeated Anova Perbandingan Skala Nyeri Pasien Post Operasi Ortopedi yang mengalami Fraktur Sebelum dan Sesudah Dilakukan *Hypno-EFT (Emotional Freedom Technique)* (N=10)

		Mean	SD	Nilai p
Hari 1	Pre-test	5.6	2.22	<0.001
	Post-test	5.1	2.33	
Hari 2	Pre-test	4.9	2.33	
	Post-test	3.9	2.33	
Hari 3	Pre-test	3.8	1.75	
	Post-test	3.1	1.91	

Keterangan: Uji Repeated Anova

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan bahwa setelah dilakukan uji statistik didapatkan nilai *pillai's trace* $p=<0.001$ ($p<0.05$) dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan bermakna skala nyeri responden sebelum dan setelah dilakukan *hypno-eft (emotional freedom technique)* selama 3 hari. Dan

untuk mengetahui pada pengukuran mana yang berbeda maka dapat dilihat pada hasil *Paired Wise Comparison* pada tabel di bawah ini.


Tabel 4.9
Hasil Uji Perbandingan Skala Nyeri Pasien Post Operasi Ortopedi yang mengalami Fraktur yang Dilakukan *Hypno-EFT (Emotional Freedom Technique)* selama 3 hari (N=10)

	Mean Difference	IK95%	Nilai p
Hari 1 vs Hari 2 (n=10)	0.950	0.618-1.28	<0.001
Hari 1 vs Hari 3 (n=10)	1.900	1.43-2.37	
Hari 2 vs Hari 3 (n=10)	0.950	0.54-1.36	

Keterangan: Paired Wise Comparison

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa setelah dilakukan uji statistik didapatkan nilai *Paired Wise Comparison* $p < 0.001$ ($p < 0.05$) dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan skala nyeri pada hari pertama, hari kedua dan hari ketiga selama dilakukan *hypno-efit (emotional freedom tchnique)*.

Selain itu, untuk melihat perbedaan skala nyeri sebelum dan sesudah dilakukan *hypno-efit (emotional freedom tchnique)* dari hari ke hari selama 3 hari dapat dilihat pada diagram *Estimated Marginal Means* dibawah ini.



Gambar 4.1 Diagram *Estimated Marginal Means*

Berdasarkan gambar 4.1 menunjukkan bahwa rerata skala nyeri sebelum dilakukan *hypno-eft (emotional freedom technique)* pada hari pertama yaitu 5.6. Sedangkan rerata skala nyeri saat sesudah dilakukan *hypno-eft (emotional freedom technique)* yaitu 5.1. Rerata skala nyeri sebelum dilakukan *hypno-eft (emotional freedom technique)* pada hari kedua yaitu 4.9. Sedangkan rerata skala nyeri saat sesudah dilakukan *hypno-eft (emotional freedom technique)* yaitu 3.9. Rerata skala nyeri sebelum dilakukan *hypno-eft (emotional freedom technique)* pada hari ketiga yaitu 3.8. Sedangkan rerata skala nyeri saat sesudah dilakukan *hypno-eft (emotional freedom technique)* yaitu 3.1.

C. Pembahasan

Jenis penelitian ini menggunakan metode *Pre Experimental* dengan menggunakan rancangan *one group pretest-posttest design* untuk mengukur pengaruh *hypno-eft (emotional freedom technique)* terhadap skala nyeri pada pasien post operasi ortopedi yang mengalami fraktur. Sebelum melakukan penelitian, peneliti mengurus perijinan dari Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sampai ke tempat yang dituju yaitu di RSUD Labuang Baji Makassar. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 22 Februari - 22 Maret, karena sampel yang didapatkan selama 1 bulan yaitu sebanyak 6 orang sehingga peneliti menambah waktu penelitian yang dilakukan pada tanggal 29 Maret - 29 April dan didapatkan sampel sebanyak 4 orang di RSUD Labuang Baji Makassar. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *Non Probability* sampling jenis *Accidental Sampling*, dimana pasien yang memenuhi kriteria inklusi dalam penelitian ini dan dijadikan sampel penelitian yaitu sebanyak 10 orang sebab yang lain masuk dalam kriteria eksklusi (pasien yang pulang sebelum intervensi selesai dilakukan).

Adapun kriteria inklusi diantaranya: bersedia untuk diberikan terapi *hypno-eft (emotional freedom technique)*, bersedia menandatangani surat

persetujuan, pasien post operasi ortopedi yang mengalami fraktur di ruang perawatan Kamase I dan Kamase II RSUD Labuang Baji Makassar, pasien dengan skala nyeri 1-10 (nyeri ringan sampai nyeri berat), dan pasien dengan usia remaja dan dewasa (12-45 tahun).

Dalam rancangan penelitian ini kelompok perlakuan diberi terapi *hypno-eft (emotional freedom technique)* selama 3 hari. Pada hari pertama, kedua dan ketiga dilakukan pengukuran skala nyeri sebelum (*pre-test*) dilakukan terapi *hypno-eft (emotional freedom technique)* dan sesudah (*post-test*) dilakukan terapi *hypno-eft (emotional freedom technique)* dengan menggunakan lembar observasi yang berisi pengkajian nyeri dalam bentuk skala numerik atau *Numerical Rating Scale (NRS)*.

Setelah data hasil penelitian terkumpul, kemudian dilakukan penyuntingan data, pengkodean data, dan entri data ke dalam master tabel. Data kemudian diolah menggunakan *software* statistik. Hasil pengolahan disajikan ke dalam tabel frekuensi dan distribusi serta penjelasan dalam bentuk narasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas umur responden adalah dewasa akhir (36-45 tahun). Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratnasari (2012) yang menunjukkan bahwa berdasarkan umur diketahui paling banyak responden pada rentang umur 31-40 tahun (50.0%). Hal serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Karendehi (2015) yang menunjukkan bahwa berdasarkan umur diketahui paling banyak responden pada rentang umur 31-40 tahun dengan rincian pada kelompok perlakuan sebanyak 6 responden dan pada kelompok kontrol sebanyak 2 responden dengan jumlah persentase sebanyak 26.7%, kelompok tersebut masuk dalam umur produktif, artinya pada umur tersebut responden mempunyai aktivitas yaitu bekerja, responden dalam melaksanakan aktivitas bekerja menggunakan alat transportasi sepeda motor. Penggunaan sepeda motor memiliki resiko yang tinggi sebagai

penyebab terjadinya kecelakaan yang dapat menyebabkan terjadinya fraktur (Astari, 2010).

Menurut Perry & Potter (2006) usia adalah variabel penting yang mempengaruhi nyeri terutama pada anak dan orang dewasa. Perbedaan perkembangan yang ditemukan antara kedua kelompok umur ini dapat mempengaruhi bagaimana anak dan orang dewasa bereaksi terhadap nyeri. Anak-anak lebih kesulitan untuk memahami nyeri sedangkan orang dewasa kadang melaporkan nyeri jika sudah patologis dan mengalami kerusakan fungsi (Tamsuri, 2007).

Pada karakteristik jenis kelamin menunjukkan bahwa mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Firdaus (2014) yang menunjukkan bahwa mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki. Hal ini dikarenakan aktivitas yang dilakukan laki-laki lebih banyak dan bervariasi dibandingkan perempuan, laki-laki bergerak lebih aktif dibandingkan perempuan sehingga resiko kecelakaan yang dapat menyebabkan fraktur pada laki-laki lebih besar dibanding perempuan. Hal ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Darmojo dalam Astari (2010) yang mengungkapkan bahwa fraktur sering terjadi pada laki-laki dibanding perempuan, hal ini berhubungan dengan aktivitas yang berlebih pada laki-laki seperti: olah raga, pekerjaan, dan juga seringnya beraktivitas di luar yang membutuhkan sarana yang memperlancar aktivitasnya seperti menggunakan sepeda motor.

Secara umum, pria dan wanita tidak berbeda secara signifikan dalam berespon terhadap nyeri. Hanya beberapa budaya yang menganggap bahwa seorang anak laki-laki harus lebih berani dan tidak boleh menangis dibandingkan anak perempuan dalam situasi yang sama ketika merasakan nyeri (Prasetyo, 2010).

Pada karakteristik tingkat pendidikan menunjukkan bahwa mayoritas tingkat pendidikan responden adalah SMA. Hasil yang sama juga diperoleh pada penelitian yang dilakukan oleh Firdaus (2014) yaitu karakteristik responden berdasarkan pendidikan didapatkan hasil bahwa pendidikan yang terbanyak adalah SMA. Tingkat pendidikan dapat mempengaruhi pengetahuan seseorang dalam menerapkan perilaku hidup sehat. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pengetahuan seseorang dalam menjaga kesehatan.

Latar belakang pendidikan merupakan faktor yang mempengaruhi pola pikir seseorang. Latar belakang pendidikan akan membentuk cara berpikir seseorang termasuk membentuk kemampuan untuk memahami faktor-faktor yang berkaitan dengan penyakit dan menggunakan pengetahuan tersebut untuk menjaga kesehatan (perry & potter, 2006). Hal ini didukung dengan pernyataan Notoatmodjo dalam Firdaus (2014), semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pemahamannya, sehingga tingkat pendidikan sangat berperan dalam penyerapan dan pemahaman terhadap informasi, dalam hal ini terkait dengan terapi EFT (*Emotional Freedom Technique*).

Pada karakteristik pekerjaan menunjukkan bahwa mayoritas pekerjaan responden adalah supir/gojek. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Astari, 2010) menyatakan, penggunaan sepeda motor memiliki resiko yang tinggi sebagai penyebab terjadinya kecelakaan yang dapat menyebabkan terjadinya fraktur.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada hari pertama, sebelum dilakukan *hypno-eft (emotional freedom technique)* pada pasien post operasi ortopedi yang mengalami fraktur, terdapat 2 responden dalam kategori nyeri ringan, 4 responden dalam kategori nyeri sedang, dan 4 responden dalam kategori nyeri berat, (tabel 4.6) skala nyeri tertinggi yang dialami responden adalah 9 dan terendah adalah 3 dengan rata-rata skala nyeri yaitu 5.60. Sedangkan pada hari

pertama, sesudah dilakukan *hypno-eft (emotional freedom technique)* pada pasien post operasi ortopedi yang mengalami fraktur menunjukkan bahwa terdapat 3 responden dalam kategori nyeri ringan, 4 responden dalam kategori nyeri sedang, dan 3 responden dalam kategori nyeri berat, (tabel 4.6) skala nyeri tertinggi yang dialami responden adalah 9 dan terendah adalah 2 dengan rata-rata skala nyeri yaitu 5.10. Pada hari kedua, sesudah dilakukan *hypno-eft (emotional freedom technique)* terdapat 6 responden dalam kategori nyeri ringan, 2 responden dalam kategori nyeri sedang dan 2 responden dalam kategori nyeri berat, (tabel 4.6) skala nyeri tertinggi yang dialami responden adalah 8 dan terendah adalah 1 dengan rata-rata skala nyeri yaitu 3.90. Sedangkan pada hari ketiga, sesudah dilakukan *hypno-eft (emotional freedom technique)* pada pasien post operasi ortopedi yang mengalami fraktur, terdapat 7 responden dalam kategori nyeri ringan, 3 responden dalam kategori nyeri sedang dan 0 responden dalam kategori nyeri berat, (tabel 4.6) skala nyeri tertinggi adalah 6 dan terendah adalah 1 dengan rata-rata skala nyeri yaitu 3.1.

Untuk mengetahui hasil uji perbandingan skala nyeri pasien post operasi ortopedi yang mengalami fraktur sebelum dan sesudah dilakukan *hypno-eft (emotional freedom technique)* dilakukan uji statistik *Repeated Anova* dan didapatkan nilai *Pillai's Trace* $p < 0.001$ ($p < 0.05$) dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan bermakna skala nyeri responden sebelum dan sesudah dilakukan *hypno-eft (emotional freedom technique)* selama 3 hari.

Untuk mengetahui hasil uji perbandingan skala nyeri pasien post operasi ortopedi yang mengalami fraktur yang dilakukan *hypno-eft (emotional freedom technique)* selama 3 hari dilakukan uji *Post Hoc Bonferroni* dan didapatkan nilai *Paired Wise Comparison* $p < 0.001$ ($p < 0.05$) dengan demikian ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan skala nyeri pada hari pertama, hari kedua dan hari ketiga selama dilakukan *hypno-eft (emotional freedom technique)*.

Terlihat jelas penurunan skala nyeri dari hari ke hari selama 3 hari sebelum dan sesudah dilakukan *hypno-eft (emotional freedom technique)*. Berdasarkan gambar 4.1 menunjukkan bahwa rerata skala nyeri sebelum dilakukan *hypno-eft (emotional freedom technique)* pada hari pertama yaitu 5.6. Sedangkan rerata skala nyeri saat sesudah dilakukan *hypno-eft (emotional freedom technique)* yaitu 5.1. Rerata skala nyeri sebelum dilakukan *hypno-eft (emotional freedom technique)* pada hari kedua yaitu 4.9. Sedangkan rerata skala nyeri saat sesudah dilakukan *hypno-eft (emotional freedom technique)* yaitu 3.9. Rerata skala nyeri sebelum dilakukan *hypno-eft (emotional freedom technique)* pada hari ketiga yaitu 3.8. Sedangkan rerata skala nyeri saat sesudah dilakukan *hypno-eft (emotional freedom technique)* yaitu 3.1.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dimana hasil yang didapatkan sebelum dan sesudah dilakukan *hypno-eft (emotional freedom technique)* pada pasien post operasi ortopedi yang mengalami fraktur dimana $p < 0.001$ ($p < 0.05$) hal ini berarti hipotesis (H_0) ditolak. Dan hipotesis (H_a) diterima yaitu ada pengaruh *hypno-eft (emotional freedom technique)* terhadap skala nyeri pada pasien post operasi ortopedi di RSUD Labuang Baji Makassar.

Meskipun tidak terdapat penelitian yang sama persis dengan penelitian ini. Namun, penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya terkait EFT (*Emotional Freedom Technique*) dan skala nyeri. Latifah (2014) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang bermakna pada penurunan skala nyeri antara sebelum dan sesudah intervensi pada kelompok intervensi dengan nilai $p < 0.001$ ($p < 0.05$), sementara pada kelompok kontrol tidak menunjukkan perbedaan yang bermakna pada penurunan skala nyeri sebelum dan sesudah intervensi pada kelompok kontrol dengan nilai $p > 0.001$ ($p > 0.05$). Hal ini juga didukung oleh penelitian Hermawan (2013) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh EFT (*Emotional*

Freedom Technique) terhadap intensitas dismenore dengan nilai $p < 0.001$ ($p < 0.05$).

Pada terapi *hypno-eft (emotional freedom technique)* dimulai pada tahap pertama yaitu persiapan, dimana responden dianjurkan untuk minum air putih 1 gelas, agar responden tidak kelelahan selama dilakukan terapi. Kemudian responden diminta untuk memikirkan dan rasakan hal-hal yang muncul saat memikirkan dan merasakan masalahnya. Tujuan dari EFT (*Emotional Freedom Technique*) yaitu untuk menyeimbangkan energi meridian dalam tubuh ketika terjadi gejala-gejala kemunduran fisik dan emosional yang mengganggu (Iskandar, 2008). Pada tahap ini juga, responden diminta untuk menjawab pertanyaan yang telah ada dengan sungguh-sungguh. Pertanyaan tersebut untuk memberikan sugesti pada responden. Hipnoterapi pada dasarnya adalah seni komunikasi, dimana kondisi hipnosis merupakan kondisi relaksasi pikiran disertai relaksasi tubuh. dalam kondisi hipnosis, pikiran kita menjadi lebih terbuka terhadap perubahan. Dalam kondisi rileks inilah, kita dapat memberikan sugesti (Sumarwanto, 2015). Sugesti yang diberikan kepada responden memiliki tujuan agar apa yang terapis ucapkan atau sampaikan, responden mudah menerimanya.

Pada tahap kedua yaitu *the set up*, kalimat set up adalah sebuah kalimat yang mengandung pengakuan dan penerimaan diri atas masalah yang dihadapi (syahril, 2015). Pada tahap ini responden diminta untuk mengucapkan kalimat afirmasi sebanyak tiga kali pada saat peneliti menekan atau mengurut secara memutar bagian *sore spot*.

Kalimat afirmasi memicu penerimaan diri. Hal ini didukung penelitian oleh Ningsih (2015) yang menyatakan terapi EFT (*Emotional Freedom Technique*) menggunakan kalimat sugesti yang mendorong pasien untuk mengubah pola pikir menjadi lebih positif. Seperti yang dikatakan oleh salah seorang responden bahwa ketika dilakukan afirmasi Dia menjadi tenang dan

ikhlas menerima apa yang sedang dirasakannya. Latifah (2014) menyatakan bahwa efek bawah sadar dari EFT (*Emotional Freedom Technique*) mempengaruhi individu sehingga ketakutan akan nyeri berubah menjadi penerimaan. Hal ini diperkuat Brattberg dalam Latifah (2014) yang menyatakan walaupun tidak bisa dijelaskan cara kerjanya, akan tetapi secara klinis ditemukan bahwa pasien yang hanya memikirkan masalah yang dihadapinya, memiliki respon emosional yang berbeda dibandingkan dengan pasien yang diberi terapi EFT (*Emotional Freedom Technique*) dimana perubahan sikap terhadap nyeri terlihat nyata. Hal ini dimungkinkan bahwa EFT (*Emotional Freedom Technique*) membantu individu untuk menerima masalah yang tidak dapat diterima oleh individu.

Tahap ketiga yaitu *the sequence*. Pada tahap ini dilakukan ketukan atau *tapping* pada 12 titik EFT (*Emotional Freedom Technique*), diantaranya: 1) Alis mata, 2) sisi mata/pelipis, 3) dibawah mata, 4) dibawah hidung, 5) diantara bibir bawah dan dagu, 6) tulang selangka, 7) dibawah lengan/ketiak, 8) ibu jari, 9) telunjuk, 10) jari tengah, 11) kelingking, 12) karate chop (Syahril, 2015).



Gambar 4.2 Titik EFT (*Emotional Freedom Technique*)

Titik-titik ini jika di ketuk beberapa kali akan berdampak pada ternetralisirnya gangguan emosi atau rasa sakit yang kita rasakan karena aliran energi tubuh berjalan dengan normal dan seimbang kembali.

Pemahaman sistem energi tubuh menjadi dasar ilmu pengobatan timur seperti akupunktur, akupresur, refleksiologi, dan sebagainya. Para ahli

akupunktur, percaya bahwa gangguan sistem energi tubuh bisa menyebabkan penyakit fisik seperti jantung, sakit kepala, sesak nafas, dan berbagai penyakit lainnya. Cara menyembuhkannya yaitu dengan merangsang titik-titik tertentu yang berhubungan dengan sumber penyakit (Zainuddin, 2006). Terdapat 361 titik akupunktur agar bisa menstimulus jalur energi tubuh. Sementara *hypno-eft (emotional freedom technique)*, jumlah titik yang distimulus hanya berjumlah 13 titik utama yang mewakili 12 jalur utama energi meridian (Syahril, 2015).

EFT (*Emotional Freedom Technique*) merupakan salah satu pengobatan energi adalah untuk penyembuhan berbagai penyakit atau menghilangkan rasa sakit. Namun, khusus pada EFT (*Emotional Freedom Technique*), yang dibersihkan adalah energi negatif terlebih dahulu, karena emosi tinggi merupakan cikal bakal dari penyakit fisik, seperti sakit kepala, flu, stress, gangguan pencernaan, radang sendi (*arthritis*), leher kejang atau menurunkan sakit punggung hingga penyakit lain yang lebih berat (Iskandar, 2008).

Dasar teori EFT (*Emotional Freedom Technique*) mengatakan bahwa emosi negatif disebabkan oleh gangguan pada sistem energi tubuh (sistem meridian). Ketukan atau *tapping* pada titik-titik akupunktur sambil berfokus pada emosi negatif, dikatakan dapat menyeimbangkan energi tubuh (craig dalam Latifah, 2014).

Tahap keempat yaitu *gammut point*. Pada tahap ini dilakukan ketukan atau *tapping* pada titik *gammut* sambil melakukan *the 9 gammut procedure*. Ini adalah 9 gerakan untuk merangsang otak. Tiap gerakan (yang mungkin kelihatan aneh) dimaksudkan untuk merangsang bagian otak tertentu. Ini adalah langkah yang terlihat paling lucu, tetapi dalam beberapa kasus yang tidak dapat dituntaskan dengan versi inti, langkah ini terbukti efektif. Dalam teknik psikoterapi kontemporer, ini disebut teknik EMDR (*Eye Movement Desensitization Repatterning*). Setelah menyelesaikan *9 gammut procedure*, langkah terakhir

adalah tahap kelima yaitu mengulangi lagi tahap *the sequence*. Dan diakhiri dengan mengambil nafas panjang dan menghembuskannya (Zainuddin, 2006).

Tindakan ketukan atau *tapping* akan mempengaruhi sistem saraf pusat. Menurut *gate control theory*, jika pusat otak yang lebih tinggi teraktivasi maka gerbang di *spinal cord* akan menutup, sehingga sensasi nyeri tidak akan sampai ke pusat otak dan tidak akan diinterpretasikan sebagai nyeri. *tapping* ini dapat merangsang *acupoint* agar mengeluarkan internal opioid (*endorphin, encephalin, dan dynorpin*) (Ulett & Lane dalam Ma'rifah, 2012). Fungsi dari *endorphins* dan *encephalins* adalah untuk meningkatkan mood sehingga dapat mengubah penerimaan individu terhadap sakit atau gejala fisik lainnya (fachri dalam Sumarwanto, 2015). Selain itu *tapping* juga dapat dianggap sebagai rangsangan eksternal yang dapat mengganggu pengiriman impuls nyeri ke pusat otak sehingga impuls nyeri yang terkirim ke otak semakin sedikit (Ma'rifah, 2012).

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam hadis bahwa Allah tidak akan menurunkan penyakit melainkan menurunkan pula obatnya, maka ketika ditimpa sakit, misalnya nyeri akibat post operasi, kita hendaknya tetap bersabar dan menerimanya sebab kita yakin bahwa setiap penyakit ada obatnya. Selain itu Allah juga menjanjikan pahala yang besar bagi orang-orang yang bersabar ketika dalam kesulitan seperti yang disebutkan dalam hadis:

بُنْ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ
 نِ عَمْرٍو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِي
 هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا
 وَصَبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا أَدَى وَلَا غَمٍّ حَتَّى الشُّوْكَةِ يُشَاكِمَهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ
 خَطَايَاهُ ()

Artinya:

“Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin ‘Amru telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Muhammad dari Muhammad bin ‘Amru bin Halhalah dari ‘Atha’ bin Yasar dari Abu Sa’id Al Khudri dan dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam beliau bersabda: “Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit dan keletihan, kekhawatiran dan kesedihan, dan tidak juga gangguan dan kesusahan bahkan duri yang melukainya melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya” (HR. Bukhari no. 5210).

Pada saat dilakukan terapi *hypno-eft (emotional freedom technique)*, sebagian responden melaporkan perasaan nyaman. Wong (2010) mengatakan bahwa ketika seorang terapis memegang atau menekan berbagai titik pada tubuh dan sistem otot, energi tubuh akan terangsang sehingga dapat menyingkirkan sumbatan energi dan rasa lelah, jika semua jalur energi terbuka dan aliran energi tidak lagi terhalang oleh ketegangan otot atau hambatan lain, energi tubuh akan seimbang dan pada akhirnya orang yang diterapi akan merasa rileks.

Allah swt. berfirman dalam QS. Asy-Syu’ara 26/80

وَإِذَا مَرَضْتُ فَبِهِوَ يَشْفِينِ

Terjemahnya:

“Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku” (Kementerian Agama RI, 2012).

Firman-Nya “Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku”, disandarkan penyakit kepada dirinya, sekalipun hal itu merupakan qadar, qadha dan ciptaan Allah. Akan tetapi, ia sandarkan hal itu kepada dirinya sebagai sikap beradap. Makna hal itu berarti, jika aku menderita sakit, maka tidak ada seorang pun yang kuasa menyembuhkan aku selainnya (Ibnu Katsir, 2004). Jika dikaitkan dengan hasil penelitian, maka teratasinya rasa nyeri pada responden, maka itu

dikembalikan kepada Yang Maha Menyembuhkan. Sebagai terapis, kita hanya sebagai wasilah dan harus diyakinkan kembali kepada orang yang diterapi bahwa kesembuhan itu semata-mata dari-Nya.

Hypno-Eft (emotional freedom technique) memiliki manfaat menyeimbangkan energi meridian tubuh dan sakit kepala, nyeri punggung, maag, sakit jantung, asma, kelebihan berat badan, alergi, dan sebagainya. Pobia, trauma, depresi, cemas, kecanduan rokok, stress, sulit tidur, mudah marah/sedih, gugup menjelang ujian/presentase, kesulitan belajar, tidak percaya diri, dan beragam masalah-masalah emosi lainnya. begitu juga dengan permasalahan disfungsi seksual, mengatasi kenakalan anak-anak, anak malas belajar, kecanduan permainan online, anak ngompol, juga dapat meningkatkan prestasi olah raga, prestasi kerja, prestasi belajar, meningkatkan omset penjualan, memperlancar negosiasi, mencapai goal dan target, dll (Syahril 2015). *Hypno-efit (emotional freedom technique)* merupakan salah satu terapi komplementer yang dapat diterapkan pada seseorang yang mengalami nyeri, tidak hanya sebatas pada usia remaja dan dewasa saja. Hal ini juga dapat diterapkan pada segala usia. Jadi ketika ada yang mengalami nyeri, *hypno-efit (emotional freedom technique)* merupakan salah satu alternatif terapi yang dapat diberikan, selain mudah dilakukan, kita juga dapat menolong seseorang dari kesusahan serta sekaligus menjadi ladang pahala sesuai dengan hadis berikut:

رَيْدٍ

:

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَهُ كَ

() رَسُوْلِهِ مَا شَأ () وَالْيَقْضُ اللَّهُ عَلَ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al ‘Ala telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Buraid dari Abu Burdah dari Abu Musa dari Nabi shallallahu’alaihi wasallam “Apabila ada seseorang meminta atau memerlukan suatu kebutuhan datang kepada beliau, maka beliau bersabda: Berikanlah pertolongan agar kalian saling memperoleh pahala dan semoga Allah melaksanakan apa yang disenangi-Nya melalui ucapan Rasul-Nya” (HR. Bukhari no. 5568).

D. Keterbatasan Penelitian

1. Dalam penelitian ini, peneliti tidak mengontrol adanya faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi perubahan skala nyeri seperti anastesi.
2. Jumlah sampel dalam penelitian ini sudah sesuai dengan jumlah minimal sampel yang dibutuhkan, namun kemungkinan penelitian ini akan menghasilkan data yang lebih baik jika dilakukan pada populasi yang lebih besar dengan jumlah sampel yang lebih banyak lagi.
3. Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah pasien post operasi ortopedi yang mengalami fraktur, untuk peneliti lanjutan, diharapkan dalam penelitiannya untuk menentukan jenis fraktur yang lebih khusus.
4. Dalam penelitian ini, peneliti tidak mengontrol batasan hari setelah operasi untuk dilakukannya intervensi.
5. Metode yang digunakan dalam penelitian ini masih sederhana yaitu *Pre-Experimental Design*, sebaiknya dalam penelitian selanjutnya sediaanya menggunakan metode *Quasy-Experimental Design* agar hasil yang diperoleh dapat mendekati kebenaran penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sebelum dilakukan *hypno-eft (emotional freedom technique)* pada hari pertama skala nyeri tertinggi yang dialami responden adalah 9 dan terendah 3 dengan rata-rata skala nyeri yaitu 5.60, pada hari kedua skala nyeri tertinggi yang dialami responden adalah 9 dan terendah 2 dengan rata-rata skala nyeri yaitu 4.90, dan pada hari ketiga skala nyeri tertinggi yang dialami responden adalah 7 dan terendah 2 dengan rata-rata skala nyeri yaitu 3.80.
2. Sesudah dilakukan *hypno-eft (emotional freedom technique)* pada hari pertama skala nyeri tertinggi yang dialami responden adalah 9 dan terendah 2 dengan rata-rata skala nyeri yaitu 5.10, pada hari kedua skala nyeri tertinggi yang dialami responden adalah 8 dan terendah 1 dengan rata-rata skala nyeri yaitu 3.90, dan pada hari ketiga skala nyeri tertinggi yang dialami responden adalah 6 dan terendah 1 dengan rata-rata skala nyeri yaitu 3.10.
3. Ada pengaruh *hypno-eft (emotional freedom technique)* terhadap skala nyeri pada pasien post operasi ortopedi yang mengalami fraktur di RSUD Labuang Baji Makassar dengan nilai $p < 0.001$ ($p < 0.05$).

B. Saran

1. Bagi Institusi Pendidikan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa yang lebih luas tentang terapi non-farmakologis dalam penanganan nyeri post operasi ortopedi.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, yang ingin meneliti lebih jauh tentang pengaruh *hypno-eft (emotional freedom technique)* terhadap skala nyeri pada pasien post operasi ortopedi, diharapkan dalam penelitiannya untuk menggunakan jumlah sampel yang lebih banyak dan intervensi yang dilakukan dengan interval waktu yang lebih lama, juga harus memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi skala nyeri dan menentukan jenis fraktur yang lebih khusus, serta mengontrol batasan hari setelah operasi untuk dilakukannya intervensi. Selain itu, dalam penelitian selanjutnya sedianya menggunakan metode *Quasy-Experimental Design* agar hasil yang diperoleh dapat mendekati kebenaran penelitian.

3. Bagi masyarakat/keluarga

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan pilihan terapi komplementer *hypno-eft (emotional freedom technique)* yang berbasis non-farmakologis dengan harga yang lebih terjangkau serta tanpa efek samping bagi pasien post operasi ortopedi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Astari, Rizqi, Y. *Pengaruh Hipnoterapi Terhadap Penurunan Nyeri pada Pasien Post Operasi Fraktur Femur Di Ruang Rawat Inap Bedah Rumah Sakit Ortopedi Surakarta*. FKIK. UMS, 2010.

Andarmoyo, Sulistyono. *Konsep & Proses Keperawatan Nyeri*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2015.

Brunner & Suddarth. *Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah*. Edisi 8. Volume 3. Jakarta: EGC, 2002.

al-Bukhari Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah Sahih al-Bukhari juz 3 (cet. III; Beirut: Dar Ibn Kasir, 1987 M/ 1407 M), h. 1206.

Craig, Gary. *Standar Emas Eft Sumber Daya*. <http://www.emofree.com/>. Diakses Tanggal 29 Juni 2015, Pukul 14:38 WITA.

Doenges, Marilynn. *Rencana Asuhan Keperawatan*. Jakarta: EGC, 2000.

Delubis, Arman. *Hubungan Antara Usia, Jenis dan Lokasi Fraktur Dengan Lama Perawatan pada Pasien Bedah Tulang Di Ruang Rawat Inap Rsup Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar*. STIKES Nani Hasanuddin Makassar. Volume 2. Nomor 1, 2013.

Firdaus. *Efektivitas Terapi Musik Mozart Terhadap Penurunan Intensitas Nyeri Pada Pasien Post Operasi Fraktur Ekstremitas Bawah*. Program Studi Ilmu Keperawatan. Universitas Riau. JOM. Volume 1. Nomor 2, 2014.

Hermawan, Gatot. *Pengaruh Terapi Emotional Freedom Technique (EFT) Terhadap Intensitas Dismenorea Pada Mahasiswi Semester VIII*. STIKES 'Aisyiyah Yogyakarta, 2013

Healthyentusiast. *Program Pengelolaan Nyeri Pasca Bedah*. <http://www.healthyentusiast.com/program-pengelolaan-nyeri-pasca-bedah.html>. Diakses Tanggal 14 Mei 2015, Pukul 13:45 WITA.

Hartoyo. *Hubungan Antara Karakteristik Demografi dengan Pengetahuan Mobilisasi Dini pada Pasien Post Operasi Laparatomi Di RS PKU Muhammadiyah Bantul*. Karya Tulis Ilmiah. FKIK. UMY, 2015.

Iskandar, Eddy. *Buku Saku EFT, Panduan Singkat Pemula*. Holistic Institute, 2008.

- Indoeft. *Sejarah EFT*. <http://www.indoeft.com/sejarah-efit.html>. Diakses Tanggal 12 Juni 2015, Pukul 13:40 WITA.
- Katsir. *Lubabut Tafsir Min Ibni Katsir (Tafsir Ibnu Katsir Jilid VI)*. Terj. M. Abdul Ghoffar. Cet. I; Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2004.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: WALI, 2012.
- Karendehi, Deivi, S. *Pengaruh Pemberian Musik Terhadap Skala Nyeri Akibat Perawatan Luka Bedah Pada Pasien Pasca Operasi Di Ruang Perawatan Bedah Flamboyan Rumah Sakit TK. III 07.06.01 R.W Mogisidi Manado*. E Journal Keperawatan (E-Kp) Volume 3. Nomor 2. PSIK Fakultas Kedokteran. Universitas Sam Ratulangi Manado, 2015.
- Lukman & Ningsih. *Asuhan Keperawatan pada Klien Dengan Gangguan Sistem Muskuloskeletal*. Jakarta: Salemba Medika, 2012.
- Latifah, Lutfatul. *Intervensi Emotional Freedom Technique Untuk Mengurangi Nyeri Post Operasi Sectio Caesaria (SC)*. Jurnal INJEC. Volume 1. Nomor 1. Universitas Jendral Soedirman Purwokerto. Jurusan Keperawatan, 2014.
- Muttaqin, Arif. *Buku Ajar Asuhan Keperawatan Klien Dengan Gangguan Sistem Persarafan*. Jakarta: Salemba Medika, 2008.
- Muslim. *Mukhtashar Shahih Muslim*. Jakarta: Kampung Sunnah, 2009
- Mudatsyir. *Spiritual Emotional Freedom Technique Dan Nyeri Pasien Pasca Operasi Fraktur Femur*. Jurnal Terpadu Ilmu Kesehatan Jilid 1. Kementrian Kesehatan Politeknik Kesehatan Surakarta Jurusan Fisioterapi, 2012.
- Ma'rifah, Atun Raudotul. *Pengaruh Pemberian Terapi SEFT (Spiritual Emotional Freedom Technique) Terhadap Penurunan Nyeri Post Operasi Sektio Sesar Di RSUD Margono Soekardjo Purwokerto*. Stikes Harapan Bangsa Purwokerto, 2012.
- Majid, Indra. *Pusat Pelatihan Hypnosis & Hypnotherapy: Emotional Freedom Technique*. http://www.hypnosis45.com/terapi_efit.htm, Diakses tanggal 4 Mei 2015, pukul 18:16 WITA.
- Nursalam. *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan*. Edisi 2. Jakarta: EGC, 2008.
- Nursalam. *Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan*. Edisi 3. Surabaya: Salemba Medika, 2013.

- Nurdin, Suhartini. *Pengaruh Teknik Relaksasi Terhadap Intensitas Nyeri Pada Pasien Post Operasi Fraktur*. Ejournal Keperawatan (E-Kep) Volume 1, Nomor 1. Fakultas Kedokteran. Universitas Sam Ratulangi Manado, 2013.
- Ningsih, Santi Fitria. *Efektivitas Terapi Emotional Freedom Technique (EFT) Terhadap Kecemasan Pasien Kanker Payudara Stadium II Dan III*. JOM. Volume 2. Nomor 2. Program Studi Ilmu Keperawatan. Universitas Riau, 2015.
- Pinandita, Iin. *Pengaruh Teknik Relaksasi Genggam Jari Terhadap Penurunan Intensitas Nyeri Pada Pasien Post Operasi Laparotomi*. Jurnal Ilmiah Kesehatan Keperawatan Volume 8, Nomor 1. Jurusan Keperawatan. Stikes Muhammadiyah Gombong, 2012.
- Perry & Potter. *Buku Ajar Fundamental Keperawatan: Konsep, Proses, Dan Praktik*. Edisi 4. Jakarta: EGC, 2006.
- Prasetyo, Sigit Nian. *Konsep Dan Proses Keperawatan Nyeri*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Psikohipnotis. *Emotional Freedom Technique (EFT) Workshop*. <http://psikohipnotis.com/program-pelatihan/emotional-freedom-technique-eft-workshop/>. Diakses Tanggal 29 Juni 2015, Pukul 10:59 WITA.
- Rahmi, Tuti. *Efektivitas Emotional Freedom Technique Dalam Mengatasi Trauma Gempa Ibu Rumah Tangga*. Jurnal Ilmu Pendidikan Volume XII, Nomor 2. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Padang, 2012.
- Ratnasari, Ni Made Dewi. *Pengaruh Pemberian Guided Imagery Terhadap Skala Nyeri Pada Pasien Post Operasi Fraktur Di RSUD Panembahan Senopati Bantul*. FIK. Universitas Respati Yogyakarta, 2012.
- Rosyidi, Kholid. *Muskuloskeletal*. Jakarta: Trans Info Media. 2013.
- Ramadhani, Rezki. *Terapi Musik Klasik Mozart Terhadap Intensitas Nyeri Pada Pasien Pasca Operasi Seksio Sesarea di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar*. Fakultas Ilmu Kesehatan. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014.
- Sodikin. *Pengaruh Terapi Bacaan Al-Qur'an Melalui Media Audio Terhadap Respon Nyeri Pasien Post Operasi Hernia*. Tesis. Fakultas Ilmu Keperawatan. Universitas Indonesia, 2012.
- Supardiana. *Pemberian Hypno-Eft untuk Mengurangi Tingkat Kecemasan pada Klien dengan Gagal Ginjal Kronik Sebelum Dilakukan Hemodialisa*. Jurnal Kesehatan Hesti Wira Sakti Volume 2, Nomor 3, 2012.

- Shari, Weni, W. *Emotional Freedom Technique Dan Tingkat Kecemasan Pada Pasien Yang Akan Menjalani Percutaneous Coronary Intervention*. PSIK Fakultas Kedokteran. Universitas Sriwijaya, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Syam, Syahril. *Lab Skill Keperawatan Semester V UINAM*. Makassar: Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015.
- Sumarwanto. *Pengaruh Hipnoterapi Terhadap Penurunan Intensitas Nyeri pada Pasien Post Operasi Dengan Skala Nyeri Sedang-Berat Di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kalbar*. FK. Universitas Tanjungpura Pontianak, 2015.
- Salemba, Thamrin. *Spesialis Bedah Tulang/Orthopedic*. <http://www.thamrinhospitalsalemba.com/index.php/featured/304-spesialis-bedah-tulang>. Diakses Tanggal 9 februari 2016, Pukul 9:15 WITA.
- Tamsuri. *Konsep dan penatalaksanaan nyeri*. Jakarta: EGC, 2007.
- UINAM. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Gunawan, Adi, W. *Quantum Life Transformation*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Wong, Master. *Jaripunktur: Pengobatan Terdahsyat*. Jakarta, 2010.
- Zainuddin, Ahmad Faiz. *Spiritual Freedom Technique (SEFT)*. Jakarta: Arga Publishing, 2006.

**L
A
M
P
I
R
A
N**

Lampiran 1:

PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN

Kepada Yth
Calon Responden
Di-
Tempat

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan UIN Alauddin Makassar.

Nama : Rusdiana M.
Nim : 70300112007
Alamat : Mannuruki 2 Lor. 5A

Akan mengadakan penelitian dengan judul ***“Hypno-EFT (Emotional Freedom Technique) Terhadap Skala Nyeri pada Pasien Post Operasi Ortopedi Di RSUD Labuang Baji Makassar”***.

Untuk keperluan tersebut saya memohon kesediaan Bapak/Ibu atau Saudara/Saudari untuk menjadi responden dalam penelitian ini dan menandatangani lembar persetujuan menjadi responden. Selanjutnya saya mengharapkan Bapak/Ibu atau Saudara/Saudari untuk memberikan tanggapan atau jawaban atas persyaratan yang kami berikan dengan kejujuran dan jawaban anda dijamin kerahasiaannya. Jika Bapak/Ibu atau Saudara/Saudari tidak bersedia menjadi responden, tidak ada sanksi bagi Bapak/Ibu atau Saudara/Saudari.

Apabila Bapak/Ibu atau Saudara/Saudari menyetujui, maka saya mohon kesediaannya untuk menandatangani lembar persetujuan dan mengikuti semua proses penelitian ini.

Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu atau Saudara/Saudari kami ucapkan terima kasih.

Peneliti

Lampiran 2:

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Umur :

Alamat :

Setelah mendapat penjelasan dan tujuan dan manfaat penelitian dan bahwa segala informasi tentang penelitian ini akan dirahasiakan serta hanya digunakan untuk kepentingan peneliti, maka saya (bersedia/tidak bersedia)* untuk menjadi responden penelitian yang berjudul **“*Hypno-EFT (Emotional Freedom Technique)* Terhadap Skala Nyeri pada Pasien Post Operasi Ortopedi Di RSUD Labuang Baji Makassar”**

Saya memahami penelitian ini dimaksudkan untuk kepentingan ilmiah dalam rangka menyusun skripsi bagi peneliti dan tidak akan mempunyai dampak negatif serta merugikan bagi saya dan keluarga saya, sehingga jawaban dan hasil observasi, benar-benar dapat dirahasiakan. Dengan demikian secara sukarela dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun, saya siap berpartisipasi dalam penelitian ini.

Demikian lembar persetujuan ini saya tandatangi dan kiranya dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 2016

Responden

(_____)

Catatan:

*Coret yang tidak perlu

Lampiran 3:

LEMBAR OBSERVASI
***HYPNO-EFT (EMOTIONAL FREEDOM TECHNIQUE)* TERHADAP**
SKALA NYERI PADA PASIEN POST OPERASI ORTOPEDI DI RSUD
LABUANG BAJI MAKASSAR

Petunjuk: Jawaban akan diisi oleh peneliti berdasarkan hasil wawancara dengan pasien ditulis pada tempat yang disediakan.

1. Tanggal Penelitian :
2. Inisial :
3. No. Rekam Medik :
4. Umur :
5. Pendidikan :
6. Pekerjaan :
7. Jenis Operasi :
8. Pengukuran skala nyeri

Hari	Jam	Skala Nyeri Sebelum Intervensi	Skala Nyeri Sesudah Intervensi
I			
II			
III			

Lampiran 4:

**PENILAIAN INTENSITAS NYERI
NUMERICAL RATING SCALE (NRS)**

***HYPNO-EFT (EMOTIONAL FREEDOM TECHNIQUE) TERHADAP
SKALA NYERI PADA PASIEN POST OPERASI ORTOPEDI DI RSUD
LABUANG BAJI MAKASSAR***

Penilaian:


- 0 : tidak ada keluhan nyeri.
- 1-3 : ada rasa nyeri, mulai terasa, tetapi masih dapat ditahan.
- 4-6 : ada rasa nyeri, terasa mengganggu, dan dengan melakukan usaha yang cukup kuat untuk menahannya.
- 7-10 : ada rasa nyeri, terasa sangat mengganggu/ tidak tertahankan, sehingga harus meringis, menjerit bahkan berteriak.

Penilaian intensitas nyeri:

1. Tidak ada nyeri jika berada pada skala 0
2. Nyeri ringan jika berada pada skala 1-3
3. Nyeri sedang jika berada pada skala 4-6
4. Nyeri berat jika berada pada skala 7-10

A. SKALA NYERI SEBELUM DILAKUKAN INTERVENSI


Petunjuk: Lingkari angka di bawah ini sesuai dengan nyeri yang dirasakan saat ini.



Skala Nyeri =

B. SKALA NYERI SETELAH DILAKUKAN INTERVENSI

Petunjuk: Lingkari angka di bawah ini sesuai dengan nyeri yang dirasakan saat ini.



Skala Nyeri =

Lampiran 5

Standar Operasional Prosedur (SOP) *HYPNO-EFT (Emotional Freedom Technique)*

A. Definisi

Hypno-eft (emotional freedom technique) adalah versi emosional dari akupuntur. Bedanya, kalau akupuntur menggunakan jarum untuk menstimulasi titik-titik energi yang tersebar di jalur meridian, sedangkan *hypno-eft (emotional freedom technique)* menggunakan jari untuk mengetuk titik-titik energi ini dengan jumlah ketukan dan urutan tertentu. *Hypno-Eft (emotional freedom technique)* jumlah titik yang distimulus hanya berjumlah 13 titik utama yang mewakili 12 jalur utama meridian (Syahril, 2015).

B. Tujuan

EFT (*Emotional Freedom Technique*) dilakukan dengan mengetukkan dua ujung jari pada beberapa lokasi di tubuh. Ketukan-ketukan tersebut bertujuan untuk menyeimbangkan energi meridian dalam tubuh ketika terjadi gejala-gejala kemunduran fisik dan emosional yang mengganggu (Iskandar, 2008)

C. Indikasi

Masalah yang bisa disembuhkan oleh *Hypno-eft (emotional freedom technique)* meliputi Sakit kepala, nyeri punggung, maag, asma, sakit jantung, kelebihan berat badan, alergi, dan sebagainya. Phobia, trauma, depresi, cemas, kecanduan rokok, stress, sulit tidur, mudah marah atau sedih, gugup, menjelang ujian atau presentase, kesulitan belajar, tidak percaya diri, dan beragam masalah-masalah emosi lainnya. Begitu juga dengan permasalahan disfungsi seksual, mengatasi kenakalan anak-anak, anak malas belajar, kecanduan permainan online, anak mengompol. Juga dapat meningkatkan prestasi olah raga, prestasi kerja, prestasi belajar, meningkatkan omset

penjualan, memperlancar negosiasi, mencapai goal dan target, dll (Syahril, 2015)

D. Persiapan Pasien

1. Mengucapkan salam terapeutik.
2. Memperkenalkan diri.
3. Menjelaskan pada klien dan keluarga tentang prosedur dan tujuan tindakan yang akan dilaksanakan.
4. Menanyakan kesiapan klien sebelum kegiatan dilakukan.
5. Menjaga privasi klien
6. Penjelasan yang disampaikan dimengerti klien/keluarganya.
7. Selama komunikasi digunakan bahasa yang jelas, sistematis serta tidak mengancam.
8. Memerlihatkan kesabaran, penuh empati, sopan, dan perhatian serta respek selama berkomunikasi dan melakukan tindakan.
9. Membuat kontrak (waktu, tempat, dan tindakan yang akan dilakukan).

E. Persiapan Alat/Bahan

1. Air putih 1 gelas
2. Lembar penilaian tingkat nyeri
3. Polpen

F. Prosedur Kerja

1. Tahap 1 : Persiapan
 - a. Sebelum melakukan teknik ini, sebaiknya minum air putih 1 gelas.
 - b. Pikirkan dan rasakan kembali masalah Anda (catat semua hal-hal yang muncul saat memikirkan dan merasakan kembali masalah tersebut).
 - c. Tentukan skala nyeri dengan menggunakan skala 0-10.
 - d. Menjawab pertanyaan tersebut dengan sungguh-sungguh:
 - a) Sudah berapa lama Anda merasakan nyeri ini?

- b) Bagaimana (kualitas) hidup yang telah Anda jalani hingga saat ini, selama Anda merasakan nyeri ini?
- c) Apa kerugian yang telah Anda alami selama Anda tetap mempertahankan nyeri ini? Pikirkan sungguh-sungguh minimal 5 kerugian.
- d) Apa kerugian yang akan Anda alami bila Anda tetap mempertahankan nyeri ini? Pikirkan sungguh-sungguh minimal 5 kerugian.
- e) Bayangkan dan rasakan semua pengaruh negatif yang selama ini telah sangat mengganggu hidup Anda akibat nyeri ini.
- f) Putuskan dengan sungguh-sungguh dan tulus untuk melepaskan nyeri ini sekarang dan sekaligus.
- g) Sekarang pikirkan minimal 5 hal positif yang akan terjadi dalam hidup Anda bila nyeri ini berhasil diatasi.
- h) Bayangkan dan rasakan hal-hal positif yang Anda pikirkan tersebut seakan-akan telah terjadi dalam hidup Anda.

2. Tahap 2 : *The set up*

Kalimat *set up* adalah sebuah kalimat yang mengandung pengakuan dan penerimaan diri atas masalah yang dihadapi.

Baca afirmasi sebanyak tiga kali sambil menekan atau mengurut secara memutar bagian sore spot di dada kiri atau kanan, menggunakan 2 jari tengah dan telunjuk seperti menotok jalan darah. Letak sore spot itu di bawah tulang leher di atas payudara.

Contoh afirmasi :

“Meskipun saya merasakan nyeri pada.....(sebut namanya), dan segala sesuatu yang berhubungan dengan.....(sebut namanya), saya pasrah, menerima, dan menghargai diri saya seutuhnya, dan memutuskan untuk

melepaskan semua perasaan tidak nyaman ini sekarang dan sekaligus demi kebaikan dan kemajuan hidup saya”.




Sumber: Syahril, 2015

3. Tahap 3 : The Sequence

Ketuk tiap titik 5-7 kali sambil niatkan dan ikhlaskan untuk melepaskan nyeri.

- a. Pangkal alis kiri atau kanan (pilih salah satu)
- b. Tulang pelipis kiri atau kanan (pilih salah satu)
- c. Tulang di bawah mata, kiri atau kanan (pilih salah satu)
- d. Di bawah hidung di atas bibir, bagian tengah
- e. Di dagu
- f. Di 2 cm dari titik tengah tulang selangka (di bawah leher yang tulangnya menonjol) kiri atau kanan (pilih salah satu)
- g. Di bawah ketiak kiri atau kanan (pilih salah satu)
- h. Di ibu jari (bagian samping kuku) kiri atau kanan (pilih salah satu)
- i. Di jari telunjuk (bagian samping kuku) kiri atau kanan (pilih salah satu)
- j. Di jari tengah (bagian samping kuku) kiri atau kanan (pilih salah satu)
- k. Di jari kelingking (bagian samping kuku) kiri atau kanan (pilih salah satu)

1. Di karate chop (telapak tangan bagian samping) kiri atau kanan (pilih salah satu)



Sumber: Syahril, 2015

4. Tahap 4 : 9 gammut

Cara melakukan 9 gammut procedure adalah dengan mengetuk titik gammut secara terus menerus, tanpa menyebut kata kunci, kepala tegak menatap ke depan. Titik gammut tertelak di punggung tangan di bawah jari manis.

- a. Pejamkan mata dengan keras
- b. Buka mata sambil melotot, pandangan lurus ke depan
- c. Lirikkan mata ke kanan bawah secara keras, tanpa menggerakkan kepala
- d. Lirikkan mata ke kiri bawah secara keras, tanpa menggerakkan kepala
- e. Putar mata searah jarum jam, satu kali, dengan hidung sebagai poros
- f. Putar mata berlawanan arah jarum jam, satu kali, dengan hidung sebagai poros
- g. Pandangan lurus ke depan, gumamkan lagu "*happy birthday to you*" selama 3 detik

- h. Hitung dengan cepat 1, 2, 3, 4, 5 dengan pandangan tetap lurus ke depan
- i. Gumamkan lagi lagu "*happy birthday to you*" selama 3 detik, pandangan tetap lurus ke depan



Sumber: Syahril, 2015

5. Tahap 5 : Ulangi tahap 3 (the sequence) sekali lagi

Setelah selesai, tarik napas dan buang napas panjang, lalu tanyakan pada diri sendiri terkait perubahan perasaan setelah melakukan tahapan-tahapan di atas.

Jika masih dirasa belum mengalami perubahan tidak perlu mengulangi satu putaran, tapi cukup lakukan Finishing Touch untuk membuat intensitas nyeri langsung turun. Caranya:

- a. Arahkan wajah lurus ke depan, tidak boleh bergerak
- b. Ketuk titik Gammut terus menerus (tanpa menyebut kata kunci)
- c. Hitung satu, mata menatap lantai
- d. Hitung dua, mata mulai sedikit naik
- e. Hitung tiga, mata semakin naik menatap lurus ke depan
- f. Hitung empat, mata bertambah naik
- g. Hitung lima, mata sudah sangat naik

h. Hitung enam, mata menatap plafon (tanpa mendongakkan kepala)

Proses ini dilakukan 5 atau 6 kali untuk benar-benar memastikan bahwa skala nyeri turun. Bila skala telah turun maka anda telah terbebas dari masalah nyeri yang tadinya mengganggu anda.

G. Berpamitan dengan klien/keluarga

Lampiran 6

DOKUMENTASI PENELITIAN





MASTER TABEL PENELITIAN

NO	INISIAL	UMUR	JK	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	SKALA NYERI						TINGKAT NYERI					
						PRE TEST			POST TEST			PRE TEST			POST TEST		
						HARI I	HARI II	HARI III	HARI I	HARI II	HARI III	HARI I	HARI II	HARI III	HARI I	HARI II	HARI III
1	Tn. "T"	4	1	1	1	3	3	2	3	2	1	1	1	1	1	1	1
2	Tn. "B"	4	1	2	1	4	3	2	3	2	2	2	1	1	1	1	1
3	Ny. "N"	2	2	4	4	7	5	4	6	4	3	3	2	2	2	2	1
4	Tn. "N"	3	1	2	3	9	9	7	9	8	6	3	3	3	3	3	2
5	Tn. "A"	1	1	3	2	8	7	5	7	6	5	3	3	2	3	2	2
6	Tn. "K"	2	1	4	4	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Tn. "R"	4	1	3	3	5	4	4	5	3	2	2	2	2	2	1	1
8	Tn. "R"	4	1	4	1	4	4	3	4	3	2	2	2	1	2	1	1
9	Tn. "A"	2	1	4	2	5	4	3	4	3	3	2	2	1	2	1	1
10	Ny. "M"	3	2	2	5	8	8	6	8	7	6	3	3	2	3	3	2

Keterangan:

Umur	: Remaja awal (12-16 Tahun)	: 1	Pekerjaan	: Supir/gojek	: 1
	Remaja akhir (17-25 Tahun)	: 2		Pelajar/mahasiswa	: 2
	Dewasa awal (26-35 Tahun)	: 3		Petani/buruh	: 3
	Dewasa akhir (36-45 Tahun)	: 4		Wiraswasta	: 4
Jenis kelamin	: Laki-laki	: 1		Lain-lain	: 5
	Perempuan	: 2			
			Tingkat Nyeri	: Ringan	: 1
Pendidikan	: Tidak sekolah	: 1		Sedang	: 2
	SD	: 2		Berat	: 3
	SMP	: 3			
	SMA	: 4			

Lampiran8

HASIL PENELITIAN (UJI SPSS)

Frekuensi Karakteristik

Umur Responden

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 12-16	1	10,0	10,0	10,0
17-25	3	30,0	30,0	40,0
26-35	2	20,0	20,0	60,0
36-45	4	40,0	40,0	100,0
Total	10	100,0	100,0	

Jenis Kelamin Responden

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Laki-laki	8	80.0	80.0	80.0
Perempuan	2	20.0	20.0	100.0
Total	10	100.0	100.0	

Pekerjaan Responden

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Supir/gojek	3	30.0	30.0	30.0
Pelajar/mahasiswa	2	20.0	20.0	50.0
Petani/buruh	2	20.0	20.0	70.0
Wiraswasta	2	20.0	20.0	90.0
Lain-lain	1	10.0	10.0	100.0
Total	10	100.0	100.0	

Tingkat Pendidikan Responden

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
TidakSekolah	1	10.0	10.0	10.0
SD	3	30.0	30.0	40.0
Valid SMP	2	20.0	20.0	60.0
SMA	4	40.0	40.0	100.0
Total	10	100.0	100.0	

Frekuensi Tingkat Nyeri

tingkat nyeri pre test hari 1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Ringan	2	20,0	20,0	20,0
Valid Sedang	4	40,0	40,0	60,0
Berat	4	40,0	40,0	100,0
Total	10	100,0	100,0	

tingkat nyeri post test hari 1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Ringan	3	30,0	30,0	30,0
Valid Sedang	4	40,0	40,0	70,0
Berat	3	30,0	30,0	100,0
Total	10	100,0	100,0	

tingkat nyeri pre test hari 2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ringan	3	30,0	30,0
	Sedang	4	40,0	70,0
	Berat	3	30,0	100,0
	Total	10	100,0	

tingkat nyeri post test hari 2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ringan	6	60,0	60,0
	Sedang	2	20,0	80,0
	Berat	2	20,0	100,0
	Total	10	100,0	

tingkat nyeri pre test hari 3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ringan	5	50,0	50,0
	Sedang	4	40,0	90,0
	Berat	1	10,0	100,0
	Total	10	100,0	

tingkat nyeri post test hari 3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ringan	7	70,0	70,0
	Sedang	3	30,0	100,0
	Total	10	100,0	

Crosstabs

Tingkat Nyeri Pre Test Hari 1 * Tingkat Nyeri Post Test Hari 1 Crosstabulation

Count

		Tingkat Nyeri Post Test Hari 1			Total
		Ringan	Sedang	Berat	
Tingkat Nyeri Pre Test Hari 1	Ringan	2	0	0	2
	Sedang	1	3	0	4
	Berat	0	1	3	4
Total		3	4	3	10

Tingkat Nyeri Pre Test Hari 1 * Tingkat Nyeri Post Test Hari 2 Crosstabulation

Count

		Tingkat Nyeri Post Test Hari 2			Total
		Ringan	Sedang	Berat	
Tingkat Nyeri Pre Test Hari 1	Ringan	2	0	0	2
	Sedang	4	0	0	4
	Berat	0	2	2	4
Total		6	2	2	10

Tingkat Nyeri Pre Test Hari 1 * Tingkat Nyeri Post Test Hari 3 Crosstabulation

Count

		Tingkat Nyeri Post Test Hari 3		Total
		Ringan	Sedang	
Tingkat Nyeri Pre Test Hari 1	Ringan	2	0	2
	Sedang	4	0	4
	Berat	1	3	4
Total		7	3	10

Uji Normalitas Data

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Hari 1	.177	20	.099	.914	20	.077
Hari 2	.218	20	.013	.912	20	.071
Hari 3	.198	20	.039	.907	20	.056

a. Lilliefors Significance Correction

Hasil Pengujian

Statistics

		SkalaNyeri Pre 1	SkalaNyeri Post 1	SkalaNyeri Pre 2	SkalaNyeri Post 2	SkalaNyeri Pre 3	SkalaNyeri Post 3
N	Valid	10	10	10	10	10	10
	Missing	0	0	0	0	0	0
Mean		5.6000	5.1000	4.9000	3.9000	3.8000	3.1000
Std. Error of Mean		.70238	.73711	.73711	.73711	.55377	.60461
Median		5.0000	4.5000	4.0000	3.0000	3.5000	2.5000
Mode		3.00 ^a	3.00 ^a	4.00	3.00	2.00	2.00
Std. Deviation		2.22111	2.33095	2.33095	2.33095	1.75119	1.91195
Variance		4.933	5.433	5.433	5.433	3.067	3.656
Skewness		.329	.442	.742	.742	.689	.658
Std. Error of Skewness		.687	.687	.687	.687	.687	.687
Kurtosis		-1.572	-1.013	-.693	-.693	-.564	-1.109
Std. Error of Kurtosis		1.334	1.334	1.334	1.334	1.334	1.334
Minimum		3.00	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00

Maximum	9.00	9.00	9.00	8.00	7.00	6.00
Sum	56.00	51.00	49.00	39.00	38.00	31.00

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

Box's Test of Equality of Covariance Matrices ^a	
Box's M	4.404
F	.600
df1	6
df2	2.347E3
Sig.	.731
Tests the null hypothesis that the observed covariance matrices of the dependent variables are equal across groups.	
a. Design: Intercept + Klp Within Subjects Design: factor1	

Multivariate Tests ^c									
Effect		Value	F	Hypothesis df	Error df	Sig.	Partial Eta Squared	Noncent. Parameter	Observed Power ^b
factor1	Pillai's Trace	.866	55.123 _a	2.000	17.000	.000	.866	110.246	1.000
	Wilks' Lambda	.134	55.123 _a	2.000	17.000	.000	.866	110.246	1.000
	Hotelling's Trace	6.485	55.123 _a	2.000	17.000	.000	.866	110.246	1.000
	Roy's Largest Root	6.485	55.123 _a	2.000	17.000	.000	.866	110.246	1.000
factor1 * Klp	Pillai's Trace	.194	2.043 ^a	2.000	17.000	.160	.194	4.086	.362
	Wilks' Lambda	.806	2.043 ^a	2.000	17.000	.160	.194	4.086	.362

	Hotelling's Trace	.240	2.043 ^a	2.000	17.000	.160	.194	4.086	.362
	Roy's Largest Root	.240	2.043 ^a	2.000	17.000	.160	.194	4.086	.362

a. Exact statistic

b. Computed using alpha = .05

c. Design: Intercept + Klp

Within Subjects Design: factor1

Mauchly's Test of Sphericity^b

Measure: MEASURE_1

1

Within Subject's Effect	Mauchly's W	Approx. Chi-Square	df	Sig.	Epsilon ^a		
					Greenhouse-Geisser	Huynh-Feldt	Lower-bound
factor1	.843	2.904	2	.234	.864	1.000	.500

Tests the null hypothesis that the error covariance matrix of the orthonormalized transformed dependent variables is proportional to an identity matrix.

a. May be used to adjust the degrees of freedom for the averaged tests of significance. Corrected tests are displayed in the Tests of Within-Subjects Effects table.

b. Design: Intercept + Klp

Within Subjects Design: factor1

Tests of Within-Subjects Effects

Measure: MEASURE_1

Source		Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	Partial Eta Squared	Noncent. Parameter	Observed Power ^a
factor1	Sphericity Assumed	36.100	2	18.050	75.558	.000	.808	151.116	1.000
	Greenhouse-Geisser	36.100	1.729	20.884	75.558	.000	.808	130.608	1.000

	Huynh-Feldt	36.100	2.000	18.050	75.558	.000	.808	151.116	1.000
	Lower-bound	36.100	1.000	36.100	75.558	.000	.808	75.558	1.000
factor1 *	Sphericity	.633	2	.317	1.326	.278	.069	2.651	.268
Klp	Assumed								
	Greenhouse-Geisser	.633	1.729	.366	1.326	.277	.069	2.291	.249
	Huynh-Feldt	.633	2.000	.317	1.326	.278	.069	2.651	.268
	Lower-bound	.633	1.000	.633	1.326	.265	.069	1.326	.193
Error(factor 1)	Sphericity	8.600	36	.239					
	Assumed								
	Greenhouse-Geisser	8.600	31.114	.276					
	Huynh-Feldt	8.600	36.000	.239					
	Lower-bound	8.600	18.000	.478					

a. Computed using alpha = .05

Pairwise Comparisons

Measure: MEASURE_1

(I)	(J)	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig. ^a	95% Confidence Interval for Difference ^a	
					Lower Bound	Upper Bound
1	2	.950 [*]	.126	.000	.618	1.282
	3	1.900 [*]	.180	.000	1.426	2.374
2	1	-.950 [*]	.126	.000	-1.282	-.618
	3	.950 [*]	.154	.000	.544	1.356
3	1	-1.900 [*]	.180	.000	-2.374	-1.426
	2	-.950 [*]	.154	.000	-1.356	-.544

Based on estimated marginal means

Pairwise Comparisons

Measure: MEASURE_1


(I) factor1	(J) factor1	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig. ^a	95% Confidence Interval for Difference ^a	
					Lower Bound	Upper Bound
1	2	.950*	.126	.000	.618	1.282
	3	1.900*	.180	.000	1.426	2.374
2	1	-.950*	.126	.000	-1.282	-.618
	3	.950*	.154	.000	.544	1.356
3	1	-1.900*	.180	.000	-2.374	-1.426
	2	-.950*	.154	.000	-1.356	-.544

Based on estimated marginal means

*. The mean difference is significant at the .05 level.

a. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni.

Estimated Marginal Means of MEASURE_1





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS ILMU KESEHATAN

Kampus II: Jl. Sultan Alauddin No.36 Samata_gowa Telp. (0411)841879 Fax (0411) 8222400

Nomor : FIK/PP.00.9/ /2015 Samata, Juni 2015
Sifat :
Hal : **Permohonan Izin Pengambilan Data Awal**

**Kepada Yth,
Kepala RSUD Labuang Baji
Di**

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyusunan proposal penelitian mahasiswa Jurusan Keperawatan semester VI (Enam) Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, yang tersebut dibawah ini:

Nama : Rusdiana M
NIM : 70300112007
Judul : *Hypno-EFT (Emotional freedom technique)* Terhadap Tingkat Nyeri Pada Pasien Post Operasi.

Maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu agar mahasiswi kami tersebut dapat mengambil data awal untuk penelitian pada instansi Bapak/Ibu.

Demikian harapan kami, atas bantuan dan kerjasama baiknya disampaikan terima kasih.

Wassalam,

Wakil Dekan Bidang Akademik
UIN Alauddin Makassar



Fathawaty Mallappiang, SKM, M. Kes

710124 199403 2 004



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

RUMAH SAKIT UMUM LABUANG BAJI

Jl. Dr. RATULANGI NO. 81 Telp. 873482 - 872120 - 872836 - 874684 Fax : 0411-830454

E-mail: rumahsakittabuangbaji@yahoo.co.id

MAKASSAR

REKOMENDASI

Nomor : LB.07/DIKLAT-21/VI/2015

Berdasarkan Surat dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor F.K/PP.00.9/7487/VI/2015 Perihal: Permohonan Pengambilan Data Awal/izin Penelitian dengan ini disampaikan bahwa yang tersebut namanya di bawah ini.

Nama : Rusdiana M
Nim : 70300112007
Program Studi : Keperawatan
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Sit Alauddin No.36 Makassar

Diberikan rekomendasi untuk:

Merakukan Pengambilan Data Awal Kasus / Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi/Karya Tulis Ilmiah dengan Judul **HYPNO - EFT (EMOTIONAL FREEDOM TECHNIQUE) TERHADAP TINGKAT NYERI PADA PASIEN POST OPERASI** di Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji. Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana sebetulnya.

an. Wadir Umum dan Diklat
Kabang D

Juli 2015

D Labuang Baji

Magdalena
NIP. 19620925

Sp. Ns.M.Kes





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
Kampus II : Jl. Yasin Limpo No. 36 Samata-Sunggummasa-Gowa 1 tlp. (0411)841879 Fax 8221400

Nomor : FIK/PP.00.9/ /2016
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Samata-Gowa 17 Februari 2016

Kepada Yth.
Gubernur Sulawesi Selatan
Cc. Kepala UPT P2T, BKPMMD Provinsi Sulawesi Selatan

Di -
Makassar

Assalamualaikum wr wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa program studi keperawatan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar maka kami mohon perkenankan Bapak /Ibu untuk memberi izin mahasiswa(i) yang tersebut di bawah ini guna melakukan penelitian:

Nama : Rusdiana M
NIM : 70300112007
Alamat : JL.Manuruki II Lr.5a
Waktu Penelitian : 22 Februari 2016 - 06 Maret 2016
Program studi : Keperawatan
Judul : Hypno Eft (Emotional freedom technique) terhadap tingkat nyeri pada pasien post operasi ortopedi
Dosen Pembimbing : 1. Dr.Nur Hidayah, S.Kep,Ns,M.Kes
2. Syamsiah Rauf, S.Kep,Ns

Demikian Harapan Kami Atas Perhatian Dan Kerja samanya Kami sampaikan terima kasih

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
FIK UN Alauddin Makassar



Dr. Nur Hidayah, S.Kep, Ns, M.Kes
NIP. 19810405 100604 2 083



1 2 0 1 6 1 9 1 4 2 0 9 7 7

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS - PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
(UPT - P2T)

Nomor : **955/S.01.P/P2T/02/2016**
Lampiran :
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Direktur RSUD Labuang Baji Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN ALauddin Makassar Nomor : FK/KPP.0.9/845/2016 tanggal 17 Februari 2016 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **RUSDIANA M**
Nomor Pokok : **70300112007**
Program Studi : **Keperawatan**
Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa(S1)**
Alamat : **Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Gowa**

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" HYPNO-EFT (EMOTIONAL FREEDOM TECHNIQUE) TERHADAP TINGKAT NYERI PADA PASIEN POST OPERASI ORTOPEDI "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **22 Februari s/d 22 Maret 2016**

Selubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 18 Februari 2016

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



A. M. YAMIN, SE., MS.

Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN ALauddin Makassar;
2. Paringgai

SIMAP BKPMO 18-02-2016



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://p2tbkpmo.sulseiprov.go.id> Email : p2t_provsulsei@yahoo.com
Makassar 90222





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI

Jl. Dr. RATULANGI NO. 81 Telp. 873482 - 872120 - 872836 – 874684 Fax : 0411-830454

E-mail: rumahsakitlabuangbaji@yahoo.co.id

MAKASSAR

SURAT KETERANGAN

Nomor : /LB-02/DIKLAT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Magdalena Rieupassa,SKM,S.Kep,Ns.M.Kes

Jabatan : Kepala Bagian Pendidikan Dan Penelitian

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : RUSDIANA M

Nomor Pokok : 70300112007

Program Studi : Keperawatan

Pekerjaan : Mahasiswa (UIN)

Alamat : Jl. Slt Alauddin No. 36, Makassar

Bahwa yang tersebut namanya diatas telah melaksanakan pengambilan Data Awal, Kasus / penelitian Dalam rangka Penyusunan Skripsi / KTI dari bulan 22 Februari s/d 29 April 2016 dengan judul "**HYPNO-EFT (EMOTIONAL FREEDOM TECHNIQUE) TERHADAP TINGKAT NYERI PADA PASIEN POST OPERASI ORTOPEDI**"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, Juni 2016

an. Rumah Umum, SDM Dan Diklat
Kabag Diklat



Magdalena Rieupassa SKM,S.Kep. Ns.M.Kes

NIP. 19620925 198302 2 003

RIWAYAT HIDUP



Rusdiana M. lahir di Passembarang pada tanggal 13 September 1993. Penulis adalah anak pertama dari 4 bersaudara, adik bernama Rustan, Salman Al Faqih, dan Khairul Azam. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak Musa D. dan Ibu Nur Daeni.

Penulis pertama kali mengenyam pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah (MI) DDI Passembarang pada tahun 2001, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Polewali pada tahun 2006. Setelah itu penulis menempuh pendidikan di SMA Negeri 3 Polewali pada tahun 2009.

Penulis memasuki bangku kuliah di Perguruan Tinggi angkatan 2012 melalui jalur SNMPTN Jalur Undangan di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.

Pengalaman organisasi, sebagai anggota Palang Merah Remaja (PMR) pada tahun 2009, sebagai anggota Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) pada tahun 2010, dan juga sebagai anggota Majelis Perwakilan Kelas (MPK) pada tahun 2011 di SMAN 3 Polewali. Dan juga sebagai anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Keperawatan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan pada tahun 2013.