

**UJI EFEKTIFITAS EKSTRAK METANOL RIMPANG KUNYIT PUTIH
(*Curcuma zedoaria* (Berg) Roscoe) TERHADAP PENURUNAN KADAR
KOLESTEROL PADA MENCIT (*Mus musculus*) JANTAN**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi
Pada Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

OLEH :

ULFAH FITRIASARI
NIM. 70100111095

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2015

**UJI EFEKTIFITAS EKSTRAK METANOL RIMPANG KUNYIT PUTIH
(*Curcuma zedoaria* (Berg) Roscoe) TERHADAP PENURUNAN KADAR
KOLESTEROL PADA MENCIT (*Mus musculus*) JANTAN**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi
Pada Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

OLEH :

ULFAH FITRIASARI
NIM. 70100111095

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2015

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ulfah Fitriasaki
NIM : 70100111095
Tempat/Tanggal Lahir : Samasundu/ 15 November 1993
Jurusan : Farmasi
Alamat : Perumnas Antang
Judul : Uji Efektifitas Ekstrak Metanol Rimpang Kunyit Putih
(*Curcuma Zedoaria (Berg) Roscoe*) Terhadap Penurunan
Kadar Kolesterol Pada Mencit (*Mus Musculus*) Jantan

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, September 2015

Penyusun,

ULFAH FITRIASARI
NIM. 70100111095

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Uji Efektifitas Ekstrak Metanol Rimpang Kunyit Putih (*Curcuma Zedoaria (Berg) Roscoe*) Terhadap Penurunan Kadar Kolesterol Pada Mencit (*Mus Musculus*) Jantan” yang disusun oleh Ulfah Fitriyani, NIM: 70100111095, Mahasiswa Jurusan Farmasi Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, diuji dan dipertahankan dalam Ujian Munaqasah/ Sidang Skripsi yang diselenggarakan pada hari Senin 15 Juni 2015 M yang bertepatan dengan tanggal 28 Sya’ban 1436 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, 15 Juni 2015 M

28 Sya’ban 1436 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Andi Armyn Nurdin, M.Sc.	(.....)
Sekretaris	: Dr. Wahyuddin G, M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Mukhriani, S.Si., M.Si., Apt.	(.....)
Pembimbing II	: Dwi Wahyuni Leboe, S.Si., M.Si.	(.....)
Penguji I	: Nursalam Hamzah, S.Si., M.Si., Apt.	(.....)
Penguji II	: Nurkhalis A. Ghaffar, S.Ag. M. Hum.	(.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar,

Dr. dr. Andi Armyn Nurdin, M.Sc.
NIP. 19550203198312 1 001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahil'alamin, tiada kata yang lebih pantas diucapkan oleh seorang hamba selain puji Syukur kepada Allah swt. Tuhan segala pemilik ilmu kerana atas berkat hidayah-Nya maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke Baginda Rasulullah, Muhammad saw., Rasul terakhir yang telah menjadi penerang dan pembawa cahaya iman dan keilmuan.

Skripsi dengan judul “Uji Efektifitas Ekstrak Metanol Rimpang Kunyit Putih (*Curcuma Zedoaria (Berg) Roscoe*) Terhadap Penurunan Kadar Kolesterol Pada Mencit (*Mus Musculus*) Jantan”, ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana (S.Farm) pada program studi Farmasi, Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penghargaan setinggi-tingginya dan rasa terima kasih yang tiada tara penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda H. Baharuddin dan Ibunda Hj. Tanda, yang tak putus-putus atas segala doa restu, kasih sayang, nasehat dan bantuan moril maupun materi selama menempuh pendidikan hingga selesainya penyusunan skripsi ini. Saudari-Saudariku tercinta, Marwah, S.Pd, Syamsul Samad, S.IP, Ishaq, S.IP, Bakri Wahid dan Fitriana yang tanpa lelah memberikan dorongan dan semangat dalam menyelesaikan studi di farmasi.

Pada kesempatan ini penulis menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak/ ibu:

1. Prof. Dr. H. Ahmad Thib Raya, MA., selaku Rektor PGS UIN Alauddin Makassar.
2. Bapak Dr. dr. Andi Armyn Nurdin, M.Sc. selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Ibu Fatmawaty Mallapiang, S.KM., M.Kes. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
4. Ibu Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, M.Si., Apt. selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
5. Bapak Dr. Wahyudin G., M.Ag. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
6. Bapak Nursalam Hamzah, S.Si., M.Si., Apt. selaku Ketua Jurusan Farmasi UIN Alauddin Makassar dan sekaligus selaku penguji kompetensi yang telah memberi banyak saran dan kritikan demi kesempurnaan skripsi ini.
7. Ibu Mukhriani, S.Si., M.Si., Apt. selaku pembimbing pertama yang telah banyak meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Ibu Dwi Wahyuni Leboe, S.Si., M.Si. selaku pembimbing kedua yang telah banyak meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

9. Bapak Nurkhalis A. Ghaffar, S.Ag. M. Hum. selaku penguji agama yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan dalam mengoreksi kekurangan pada skripsi ini.
10. Bapak/ Ibu dosen serta seluruh staf Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar atas curahan ilmu pengetahuan dan segala bantuan yang diberikan sejak menempuh pendidikan di Jurusan Farmasi hingga terselesaikannya skripsi ini.
11. Kepada seluruh Laboran Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis selama penelitian.
12. Sahabat-sahabat terbaik kelas Farmasi B yang selalu memberikan semangat dan dukungan yang diberikan sejak menempuh pendidikan di Jurusan Farmasi hingga terselesaikannya skripsi ini.
13. Kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2011, kakak-kakak angkatan 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 dan 2005, serta adik-adik angkatan 2012, 2013 dan 2014 mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar atas segala bantuan dan kerjasama yang diberikan sejak menempuh pendidikan di Jurusan Farmasi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun besar harapan kiranya dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya di bidang farmasi dan semoga bernilai ibadah di sisi Allah swt. Amin.

Wassalāmu ‘alaikum warahmatullāhi wabarākātuh

Gowa, September 2015

Penyusun,

ULFAH FITRIASARI
NIM. 70100111095

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Definisi Operasional.....	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Uraian Tanaman	11
B. Uraian Hewan Coba	14
C. Uraian Ekstraksi	16
D. Uraian Kolesterol	18
E. Uraian Obat.....	31
F. Tinjauan Islam.....	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	38
B. Pendekatan Penelitian	38
C. Alat dan Bahan.....	38

D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	43
B. Pembahasan	44
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	53
KEPUSTAKAAN	54
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	58
RIWAYAT HIDUP.....	74

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Nilai Fisiologis Mencit	15
2. Kadar Kolesterol LDL.....	23
3. Kadar Kolesterol HDL.....	25
4. Perubahan Kadar Kolesterol Mencit Setelah Perlakuan	43
5. Analisis Statistik Kadar Kolesterol	63
6. Analisis varians Efektivitas penurunan kadar kolesterol	65
7. Analisis Duncan Efektivitas penurunan kadar kolesterol	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Rimpang Kunyit Putih.....	69
2. Strip Kolesterol.....	70
3. Alat ukur Kolesterol	70
4. Ekstrak Rimpang Kunyit Putih.....	71
5. Tablet Simvastatin	71
6. Pengambilan Darah	72
7. Pengukuran Kolesterol	72
8. Pemberian Oral	73

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Penyiapan Sampel	58
2. Ekstraksi Sampel	59
3. Perlakuan terhadap Hewan Uji	60
4. Perhitungan Dosis dan Pemberian Simvastatin	61
5. Konversi Dosis Pada Ekstrak Rimpang Kunyit Putih	62
6. Analisis Statistik	63
7. Analisis Uji Duncan	66
8. % penurunan kolesterol	67
9. Gambar	69

ABSTRAK

Nama : Ulfah Fitriasaki
NIM : 70100111095
Judul : Uji Efektifitas Ekstrak Metanol Rimpang Kunyit Putih (*Curcuma Zedoaria (Berg) Roscoe*) Terhadap Penurunan Kadar Kolesterol Pada Mencit (*Mus Musculus*) Jantan

Telah dilakukan penelitian tentang Uji Efektifitas Ekstrak Metanol Rimpang Kunyit Putih (*Curcuma Zedoaria (Berg) Roscoe*) Terhadap Penurunan Kadar Kolesterol Pada Mencit (*Mus Musculus*) Jantan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan konsentrasi ekstrak metanol Rimpang Kunyit Putih (*Curcuma Zedoaria (Berg) Roscoe*) yang diberikan secara oral.

Pada penelitian ini digunakan 15 ekor mencit yang dibagi menjadi 5 kelompok perlakuan. Seluruh mencit dibuat hiperkolesterolemia dengan memberi kuning telur. Setelah kadar kolesterol darah awal mencit diukur, pada kelompok I, II, III diberi ekstrak Rimpang Kunyit Putih (*Curcuma Zedoaria (Berg) Roscoe*) dengan dosis berturut-turut 0,33 mg/g BB, 0,66 mg/g BB dan 1 mg/g BB, kelompok IV diberikan Na-CMC 1% sebagai kontrol negatif dan kelompok V diberikan simvastatin sesuai berat badan mencit sebagai kontrol positif selama 1 minggu, lalu kadar kolesterol mencit diukur.

Dari hasil uji statistik Rancangan Acak Lengkap (RAL) dan uji Duncan dapat disimpulkan bahwa ekstrak metanol Rimpang Kunyit Putih (*Curcuma Zedoaria (Berg) Roscoe*) dapat menurunkan kadar kolesterol. Dosis yang paling efektif dalam menurunkan kadar kolesterol pada penelitian ini adalah dosis ke I yaitu 0,33 mg/g BB.

Kata kunci : Rimpang Kunyit Putih, kolesterol, dan mencit.

ABSTRACT

Nama : Ulfah Fitriasaki
NIM : 70100111095
Judul : Effectiveness Test Methanol Extracts White turmeric rhizome (Curcuma zedoaria (Berg) Roscoe) To Decrease Cholesterol Levels in Mice (Mus musculus) Males

Research on Effectiveness Test Methanol Extracts White turmeric rhizome (Curcuma zedoaria (Berg) Roscoe) To Decrease Cholesterol Levels in Mice (Mus musculus) Males. This study aims to determine the effectiveness and the concentration of the methanol extract of turmeric rhizome White (Curcuma zedoaria (Berg) Roscoe) given orally.

In this study used 15 mice were divided into five treatment groups. The whole is made hypercholesterolemic mice by giving the yolk. After the initial blood cholesterol levels measured mice, in group I, II, III was given a white turmeric rhizome extract (Curcuma zedoaria (Berg) Roscoe) with successive doses of 0.33 mg / g, 0.66 mg / g and 1 mg / g, the fourth group was given 1% Na-CMC as a negative control and simvastatin group V is given according to the weight of mice as a positive control for 1 week, and cholesterol levels were measured mice.

From the results of statistical tests completely randomized design (CRD) and Duncan test can be concluded that the methanol extract of turmeric rhizome White (Curcuma zedoaria (Berg) Roscoe) can lower cholesterol levels. The most effective dose in lowering cholesterol levels in this study is the first dose is 0.33 mg / g BB.

Keywords: White turmeric rhizome, cholesterol, and mice.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hidup sehat merupakan impian setiap orang. Namun harapan itu tersendat oleh semakin mahalnya harga obat-obat modern serta efek samping yang mungkin ditimbulkan. Karena alasan ini mulai muncul kecenderungan untuk kembali menggali pengalaman dari budaya leluhur, yakni kembali ke alam (*back to nature*). Kini bukan hanya kalangan para medis, masyarakat juga mulai melirik obat-obatan tradisional. Hal ini disebabkan karena obat tradisional memiliki efek samping yang relatif lebih sedikit dibandingkan obat modern (Sari, 2006: 1).

Penggunaan bahan alam, baik sebagai obat maupun tujuan lain cenderung meningkat, terlebih dengan adanya isu *back to nature* serta krisis berkepanjangan yang mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat. Obat tradisional dan tanaman obat banyak digunakan di masyarakat menengah kebawah terutama dalam upaya *preventif, promotif, dan rehabilitatif*. Sementara ini banyak orang beranggapan bahan penggunaan tanaman obat atau obat tradisional relatif lebih aman dibandingkan obat sintesis. Umumnya khasiat obat-obat tradisional sampai saat ini hanya didasarkan pada pengalaman empiris dan belum teruji secara ilmiah (Katno dan Pramono, 2009; 1).

Keanekaragaman tumbuhan banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sebagai bahan pengobatan, segala sesuatu yang diciptakan Allah swt. Memiliki fungsi sehingga di hamparkan dibumi. Salah satu fungsinya adalah pengobatan. Hanya saja

untuk mengetahui fungsi dari aneka macam tumbuhan yang telah diciptakan diperlukan ilmu pengetahuan dalam tumbuhan tersebut.

Allah swt. berfirman dalam QS al An'am/ 6: 99

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا
 مِنْهُ خَضِرًا حُجْرًا مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنَ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ
 وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۗ انظُرُوا إِلَىٰ
 ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٩٩﴾

Terjemahannya:

“Dan Dialah yang menurunkan air dari langit, lalu Kami Tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami Keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang kurma, mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah, dan menjadi masak. Sungguh, pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman.”
 (Departemen Agama RI, 2001: 371).

Dalam tafsir Al- Mishbah, ayat tersebut dijelaskan bahwa *Dan Dia* juga bukan selain-Nya yang telah menurunkan air, yakni dalam bentuk hujan yang deras dan banyak dari langit, lalu Kami, yakni Allah, mengeluarkan yakni menumbuhkan disebabkan olehnya, yakni akibat turunnya air itu, *segala macam tumbuh-tumbuhan,*

maka Kami keluarkan darinya, yakni dari tumbuh-tumbuhan itu, tanaman yang menghijau (Shihab, 2002: 573-574).

Untuk lebih menjelaskan kekuasaan-Nya ditegaskan lebih jauh bahwa, *Kami keluarkan darinya, yakni dari tanaman yang menghijau itu, butir yang saling bertumpuk, yakni banyak, padahal sebelumnya ia hanya satu biji atau benih* (Shihab, 2002: 574).

Selanjutnya, Allah memberi contoh dengan mendahulukan menyebut sesuatu yang berkaitan dengan butir karena butir yang disebut pertama pada ayat yang lalu (ayat 95), yaitu bahwa: *Dan dari mayang, yakni pucuk kurma, mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, yang mudah dipetik dan kebun-kebun anggur, dan Kami keluarkan pula Zaitun dan delima yang serupa bentuk dan buahnya dan tidak serupa aroma dan kegunaannya. Perhatikanlah buah yang dihasilkannya dengan penuh penghayatan guna menemukan pelajaran melalui beberapa fase di waktu pohonnya berbuah, dan perhatikan pula proses kematangannya yang melalui beberapa fase. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman* (Shihab, 2002: 574).

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah swt. telah menciptakan berbagai macam tumbuhan dimuka bumi yang bermanfaat untuk manusia karena sesungguhnya sesungguhnya Allah swt. menciptakan segala sesuatu di dunia ini pasti memiliki manfaat.

Salah satu penyakit yang menjadi musuh masyarakat Indonesia adalah penyakit jantung koroner. Suatu survei yang dilakukan Departemen Kesehatan RI menunjukkan bahwa penyakit jantung koroner telah menjadi pembunuh nomor satu di Indonesia. Penyakit jantung koroner dapat disebabkan oleh aterosklerosis yang dipercepat terjadinya oleh beberapa faktor, khususnya kadar kolesterol darah. Pola makanan moderen yang banyak mengandung kolesterol jahat (LDL), disertai intensitas makan yang tinggi dan stres yang menekan sepanjang hari, membuat kadar kolesterol darah sangat sulit dikendalikan. Kolesterol tersebut akan menempel pada permukaan sebelah dalam dinding pembuluh darah koroner, melekat lapis demi lapis secara perlahan-lahan, sehingga dapat mengakibatkan pembuluh darah menyempit dan tidak elastis yang dikenal sebagai aterosklerosis. Di samping itu aliran darah menjadi tidak lancar dan oksigen yang terdapat di dalamnya menjadi tidak cukup untuk menimbulkan metabolisme aerobik di dalam sel otot jantung. Terjadinya metabolisme anaerobik akan menyebabkan penumpukan asam laktat yang dapat menimbulkan rasa nyeri yang hebat di balik tulang dada yang dikenal sebagai serangan angina pectoris. Serangan dapat terjadi berulang-ulang dan puncaknya apabila lumen pembuluh darah koroner benar-benar tersumbat total sehingga terjadilah serangan jantung (Juhaeni 2002: 1).

Secara normal, kolesterol diproduksi oleh tubuh dalam jumlah yang tepat. Akan tetapi pola makan yang cenderung berupa makanan sumber hewani dengan lemak tinggi, menyebabkan kolesterol berada dalam jumlah berlebihan dalam darah.

Kelebihan kolesterol inilah yang dapat memacu aterosklerosis yang selanjutnya berpotensi menimbulkan penyakit jantung koroner (PJK) (Galton dan Krone, 1991).

Kolesterol sangatlah diperlukan oleh tubuh untuk keperluan pembangunan membrane sel dan membran organel-organel sel juga untuk pembentukan hormon-hormon steroid yang disintesis misalnya oleh kelenjar suprarenalis serta untuk menyusun garam empedu, Kolesterol pada dasarnya dapat disintesis oleh sel tubuh pada semua organ, namun kebanyakan kolesterol disintesis oleh sel hati dengan jumlah sekitar 500 mg/ hari. Namun kolesterol juga berasal dari makanan yang dimakan oleh individu tersebut dan banyak berasal dari kolestrol hewan semisal otak, hati, daging, kuning telur dan organ dalam lainnya (Sofro, 1990: 267).

Kunyit putih memiliki prospek sebagai obat tradisional, sebagai campuran makanan dan minuman maupun sebagai komoditi ekspor yang menjanjikan. Berdasarkan penelitian pengalaman (empiris) kunyit putih memiliki manfaat menyembuhkan berbagai macam penyakit yaitu antikanker, asma, hepatitis, menurunkan kadar kolesterol dan trigliserida darah, TBC, sinusitis (Afifah dan Tim Lentera, 2003).

Komponen utama yang berkhasiat dalam rimpang kunyit putih adalah kurkuminoid, flavonoid, polifenol dan minyak atsiri. Kunyit putih berkhasiat menetralkan racun, menghilangkan rasa nyeri sendi, menurunkan kadar kolesterol darah, antibakteri dan sebagai antioksidan alami penangkal senyawa-senyawa radikal bebas yang berbahaya. Minyak atsiri kunyit putih berkhasiat sebagai *cholagogum*, yaitu bahan yang dapat merangsang pengeluaran cairan empedu yang berfungsi

sebagai penambah nafsu makan dan anti *spasmodicum*, yaitu menenangkan dan mengembalikan kekejangan otot (Darwis *et al*, 1991).

Flavanoid adalah senyawa yang mengandung C15 yang banyak terdapat dalam tanaman dalam bentuk flavon, flavanol, isoflavon, antosianin, auron, leukosianin dan kalkon. Quercetin merupakan bagian dari flavanoid dengan sebutan flavanol yang paling banyak terdapat pada tanaman dapat menurunkan kadar kolesterol total (Sabirin, 1996: 288).

Pada penelitian ini digunakan ekstrak metanol yang pada dasarnya dapat menyari banyak komponen kimia. Disamping itu, zat yang berkhasiat sebagai penurun kolesterol pada rimpang kunyit putih (*Curcuma zedoaria* (Berg) Roscoe) yaitu flavanoid.

Berdasarkan pada penelusuran literatur terdapat banyak penelitian sebelumnya tentang aktivitas antikanker dan antioksidan pada rimpang kunyit putih (*Curcuma zedoaria* (Berg) Roscoe) dan secara empiris rimpang kunyit putih ini (*Curcuma Curcuma zedoaria* (Berg) Roscoe) dapat dimanfaatkan untuk menurunkan kolesterol.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dilakukanlah penelitian ini agar masyarakat dapat menggunakan lebih lanjut rimpang kunyit putih (*Curcuma zedoaria* (Berg) Roscoe) sebagai anti hiperkolesterolemia sehingga dapat menambah pengetahuan masyarakat lebih lanjut tentang kegunaan rimpang kunyit putih.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dirumuskan bahwa:

1. Apakah ekstrak metanol rimpang kunyit putih (*Curcuma zedoaria* (Berg) Roscoe) efektif menurunkan kadar kolesterol darah mencit yang diinduksi kuning telur?
2. Pada dosis berapakah ekstrak metanol rimpang kunyit putih (*Curcuma zedoaria* (Berg) Roscoe) dapat menurunkan kadar kolesterol darah pada mencit (*Mus musculus*) jantan?
3. Bagaimana pandangan Islam tentang tumbuh-tumbuhan yang dijadikan sebagai obat?

C. Defenisi Operasional

1. Defenisi Operasional

Terdapat berbagai macam istilah pada judul skripsi ini, diantaranya:

a. Ekstrak

Sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan.

b. Efektifitas

Suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya.

c. Kolesterol

Merupakan lemak berwarna kuning berwarna kekuningan berbentuk seperti lilin yang diproduksi oleh tubuh manusia, terutama di dalam lever (hati).

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah uji efektifitas penurun kolesterol.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan skripsi Marliana Zainuddin (2013) yang berjudul uji efektifitas ekstrak etanol daun keji beling (*Strobilanthes crispus* Linn.) terhadap penurunan kadar kolesterol pada mencit (*Mus musculus*) jantan diperoleh hasil bahwa ekstrak etanol pada 5,3 g/kg BB mencit merupakan dosis paling efektif dalam menurunkan kadar kolesterol darah pada mencit. Kandungan kimia yang berkhasiat sebagai hipolidemik pada keji beling ini adalah flavanoid.

Menurut Dewi Alexander, Gemini Alam, dan Willem Kondar dalam penelitiannya tentang pengaruh ekstrak rimpang temu putih (*Curcuma zedoaria* (Berg) Roscoe) terhadap kadar asam urat pada kelinci (*Oryctolagus cuniculus*) diperoleh bahwa pemberian ekstrak etanol rimpang temu putih secara signifikan berpengaruh dalam menurunkan kadar asam urat dengan dosis 3,6 g/1,5 kgBB memberikan efek yang sangat nyata.

Berdasarkan penelitian pengalaman (empiris) temu putih memiliki manfaat menyembuhkan berbagai macam penyakit yaitu antikanker, asma, hepatitis, menurunkan kadar kolesterol dan trigliserida darah, TBC, sinusitis. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian dengan membuktikan efektifitas dan dosis dari ekstrak

etanol rimpang kunyit putih (*Curcuma zedoaria* (Berg) Roscoe) untuk menurunkan kolesterol.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk:

- a. Untuk mengetahui efektifitas ekstrak metanol rimpang kunyit putih (*Curcuma zedoaria* Rosc.) terhadap penurunan kolesterol pada mencit (*Mus musculus*) jantan yang telah diinduksi dengan kuning telur.
- b. Untuk mengetahui dosis ekstrak metanol rimpang kunyit putih (*Curcuma zedoaria* Rosc.) yang dapat digunakan untuk menurunkan kadar kolesterol darah pada mencit (*Mus musculus*) jantan.
- c. Mengetahui pandangan Islam tentang tumbuh-tumbuhan yang digunakan sebagai obat.

2. Kegunaan Penelitian

Melalui aktualisasi penelitian ini diharap memberikan manfaat, yaitu:

- a. Menambah informasi bagi masyarakat tentang pemanfaatan dan pengolahan khasiat penggunaan rimpang kunyit putih (*Curcuma zedoaria* (Berg)Roscoe) untuk penurunan kolesterol.

- b. Memperkaya ilmu pengetahuan dibidang ilmu farmasi terutama dalam pengembangan dan penelitian obat-obatan baru. khazanah ilmiah tanaman Indonesia yang bermanfaat dalam Islam untuk menunjang kesehatan.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Uraian Tanaman

1. Klasifikasi (Munadia, 1999).

Regnum	: Plantae
Divisi	: Spermatophyta
Sub divisi	: Angiospermae
Kelas	: Monocotyledonae
Ordo	: Zingiberales
Famili	: Zingiberaceae
Genus	: Curcuma
Spesies	: <i>Curcuma zedoaria</i> (Berg) Roscoe.

2. Nama Daerah

Tanaman kunyit putih (*Curcuma zedoaria* (Berg) Roscoe) dikenal di Indonesia dan negara lain dengan nama yang berbeda. Temu Putih (Indonesia); koneng bodas, koneng tegal (Sunda); kunir putih (Jawa); zedora (Belanda); yu jiiin (China); White turmeric (Inggris); Zedoarwurzeln (Jerman); gulpa hamar (Turki).

3. Morfologi

Seluruh bagian tanaman temu putih mulai dari daun, bunga, rimpang dapat dimanfaatkan sebagai obat seperti maag, ambeien, radang tenggorokan, radang hati, amandel, nyeri haid, keputihan, jerawat, bisul, obat stimulan, obat cacing, obat diare, dan lain-lain (Dalimartha, 2003).

Adapun bagian dari tanaman rimpang kunyit tersebut yaitu (Dalimartha, 2003):

a. Batang

Batangnya merupakan batang semu yang dibentuk dari pelepah-pelepah daun yang tumbuh dari rimpangnya, berbentuk silindris dan lunak. Batang didalam tanah berbentuk rimpang berwarna hijau pucat. Herba setahun, lebih dari 2 m. Batang sesungguhnya berupa rimpang yang bercabang di bawah tanah, berwarna coklat muda dan coklat tua, di dalamnya putih atau putih kebiruan dengan rasa pahit.

b. Daun

Daun berbentuk lanset memanjang berwarna merah lembayung di sepanjang tulang tengahnya. Salah satu ciri khas dari spesies ini adalah adanya warna ungu di sepanjang ibu tulang daun. Helaian daun berwarna hijau muda sampai hijau tua dengan punggung daun berwarna pudar dan berkilat. Bentuk daunnya bundar, lonjong ke ujung, pertulangan daun menyirip, warnanya hijau dengan panjang 25-70 cm dan lebar 8-15 cm.

c. Bunga

Bunga keluar dari rimpang samping, menjulang ke atas membentuk bongkol bunga yang besar. Mahkota bunga berwarna putih, dengan tepi bergaris merah tipis atau kuning.

d. Akar

Kunyit putih memiliki akar serabut yang keluar dari rimpang dan berwarna putih yang pada ujungnya terdapat kantong air.

4. Kandungan Kimia

Rimpang temu putih mengandung 1,0 - 2,5 % minyak atsiri yang terdiri dari monoterpen, seskuiterpen. Minyak atsiri tersebut mengandung lebih dari 20 komponen, di antaranya komponen antara lain curzerenone (zedoarin) yang merupakan komponen terbesar, curzerene, pyrocurcuzerenone, curcumin, curcumemone, epicurcumenol, curcumol (curcumenol), isocurcumenol, procurcumenol, dehydrocurdone, furanodienone, isofuranodienone, furanodiene, zederone, dan cudione, sulfur, gum, resin, tepung, dan sedikit lemak (Yamrewaf, 2004).

Selain minyak atsiri, dalam kunyit putih juga terkandung zat pati, damar, mineral, lemak, saponin, flavanoid, polifenol, dan triterpenoid (Rita, 2010: 20).

5. Khasiat dan Kegunaan

Temu putih memiliki prospek sebagai obat tradisional, sebagai campuran makanan dan minuman maupun sebagai komoditi ekspor yang menjanjikan. Berdasarkan penelitian pengalaman (empiris) temu putih memiliki manfaat menyembuhkan berbagai macam penyakit yaitu antikanker, asma, hepatitis, menurunkan kadar kolesterol dan trigliserida darah, TBC, sinusitis (Afifah dan Tim Lentera, 2003).

Kunyit putih telah terbukti memiliki efek farmakologis yaitu memiliki sifat sebagai hemostasis (menghentikan pendarahan), menambah nafsu makan, antitoksik, mempercepat penyembuhan luka akibat kanker dan tumor. Kurkumin yang terkandung dalam kunyit putih juga bermanfaat sebagai antitumor, dan

antiinflamasi. Sementara itu, kandungan saponin berkhasiat sebagai antineoplastik (antikanker) dan polifenol berfungsi sebagai antioksidan (Yellia, 2003).

Penelitian terbaru menyebutkan bahwa kunyit putih memiliki efek farmakologis terhadap sel kanker. Khasiat ini berdasarkan uji coba laboratorium dimana sel kanker yang dikembangbiakkan untuk kepentingan ilmiah diberikan konsentrat kunyit putih terbukti lumpuh dan tak lagi menyerang sel sehat. Penelitian ini sejalan dengan apa yang dilakukan oleh American Institute of Cancer yang menyatakan bahwa kandungan antioksidan pada kunyit putih sangat ampuh mencegah kerusakan DNA yang merupakan biang kanker.

B. Uraian Hewan Coba

1. Klasifikasi (Vanderlip, 2001: 15).

Kerajaan	: Animalia
Filum	: Chordata
Sub Filum	: Vertebrata
Kelas	: Mammalia
Subkelas	: Theria
Ordo	: Rodentia
Famili	: Muridae
Genus	: Mus
Spesies	: <i>Mus musculus</i> .

2. Karakteristik Hewan Coba

Salah satu hewan uji yang sering digunakan adalah mencit. Mencit (*Mus musculus*) adalah hewan pengerat (Rodentia) yang cepat berbiak, mudah dipelihara dalam jumlah banyak, variasi genetiknya cukup besar serta sifat anatomis dan fisiologisnya terkarakterisasi dengan baik (Malole, 1989: 94).

Tabel 1: Nilai Fisiologis Mencit (Malole, 1989: 96-97).

- Berat badan	
- Jantan	20 - 40 g
- Betina	25 - 40 g
- Luas permukaan tubuh	20 g : 36 cm ²
- Temperatur tubuh	36,5 - 38 °C
- Jumlah diploid	40
- Harapan hidup	1,5 - 3 tahun
- Konsumsi makanan	15 g/100g/hari
- Konsumsi air minum	15 ml/100 g/hari
- Mulai dikawinkan :	
- Jantan	50 hari
- Betina	50 - 60 hari
- Lama hamil	19 - 21 hari
- Umur sapih	21 - 28 hari
- Jumlah anak perkelahiran	10 - 12 ekor
- Jumlah pernapasan	94 - 163/menit
- Detak jantung	325 - 780/menit
- Volume darah	76 - 80 mg/Kg
- Tekanan darah	113 - 147 / 81 - 106 mmHg
- Siklus birahi	4 - 5 hari (polyestrus)

- Glukosa dalam darah	62 – 175 mg/dL
- Kolesterol	26 – 82 mg/dL
- Kalsium dalam serum	3,2 – 9,2 mg/dL
- Fosfat dalam serum	2,3 – 9,2 mg/dL
- Suhu rektal	35 – 39 °C (rata-rata 37,4 °C)
- Butir darah merah	7 – 12,5 x 10 ⁶ mm ³
- Hematokrit	39 – 49 %
- Hemoglobin	10,2 – 16,6 mg/dL
- Butir darah putih	6 – 15 x 10 ³ /mm ³
- Neutrofil	10 – 40 %
- Lymfosit	55 – 95 %
- Eosinofil	0 – 4 %
- Monosit	0,1 – 3,5 %
- Basofil	0 – 0,3 %
- Platelet	160 – 410 x 10 ³ /mm ³
- Protein serum	3,5 – 7,2 g/dL
- Albumin	2,5 – 4,8 g/dL
- Globulin	0,6 g/dL
- Nitrogen dalam urea darah	17 – 28 mg/dL
- Creatinin	0,3 – 1 mg/dL
- Total bilirubin	0,1 – 0,9 mg/dL

C. Uraian Ekstraksi

1. Pengertian Ekstraksi

Ekstraksi adalah proses melarutkan komponen-komponen kimia yang terdapat dalam suatu sampel dengan menggunakan pelarut yang sesuai dengan komponen yang diinginkan. Ekstraksi ini didasarkan pada perpindahan massa komponen zat

padat ke dalam dan perpindahan mulai terjadi pada lapisan antar muka, kemudian terdifusi masuk ke dalam pelarut. (Dirjen POM, 1986: 4).

2. Mekanisme Ekstraksi

Umumnya zat aktif yang terkandung dalam tanaman maupun hewan lebih larut dalam pelarut organik. Pelarut organik akan menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat aktif, zat aktif akan terlarut sehingga terjadi perbedaan konsentrasi antara zat aktif di dalam sel dan pelarut organik di luar sel. Larutan dengan konsentrasi tinggi akan berdifusi keluar sel dan proses ini berulang terus sampai terjadi kesetimbangan antar konsentrasi zat aktif di dalam sel dan di luar sel (Dirjen POM 1986, 5).

3. Tujuan Ekstraksi

Tujuan ekstraksi adalah untuk menarik komponen kimia yang terdapat dalam bahan alam baik dari tumbuhan, hewan dan biota laut dengan pelarut organik tertentu yang akan masuk dalam rongga sel yang mengandung zat aktif. Zat aktif akan larut dalam pelarut organik dan karena adanya perbedaan antara konsentrasi di dalam dan konsentrasi di luar sel, mengakibatkan terjadinya difusi pelarut organik yang mengandung zat aktif keluar sel. Proses ini berlangsung terus menerus sampai terjadi kesetimbangan konsentrasi zat aktif di dalam dan diluar sel (Dirjen POM 1986: 9).

4. Maserasi

Maserasi adalah cara penyarian yang sederhana. Maserasi dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari. Cairan penyari akan menembus dinding sel dan masuk kedalam rongga sel yang mengandung zat aktif,

zat aktif akan larut karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif di dalam sel dengan yang diluar sel, maka larutan yang terpekat didesak keluar. Peristiwa tersebut berulang sehingga terjadi keseimbangan (Dirjen POM, 1986: 10).

D. Uraian Kolesterol

1. Lemak

a. Pengertian Lemak

Lemak adalah senyawa biomolekul yang tidak larut, sehingga terikat pada plasma sebagai mekanisme transport dalam serum. Lipid dapat diekstraksi dengan pelarut organik, seperti eter, benzene, kloroform, dan tetraklorometana. Lipid penting karena memiliki nilai energi yang tinggi, bahan isolasi dan pelindung yang terdapat pada jaringan-jaringan subkutan dan mengelilingi organ-organ tertentu misalnya: jaringan syaraf. Trigliserol terutama digunakan dalam tubuh untuk menyediakan energi bagi berbagai proses metabolisme, fungsi lipid ini mempunyai peranan yang hampir sama dengan karbohidrat. Beberapa lipid, khususnya kolesterol, fosfolipid, dan derivat-derivatnya digunakan di seluruh tubuh untuk menyediakan fungsi intrasel lain (Erinda, 2009: 17).

Lipid plasma yang utama yaitu kolesterol, trigliserida, fosfolipid dan asam lemak bebas tidak larut dalam cairan plasma. Agar lipid plasma dapat diangkut dalam sirkulasi, maka susunan molekul lipid tersebut perlu dimodifikasi yaitu dalam bentuk lipoprotein yang bersifat larut dalam air (Ganiswarna, 2009: 374).

b. Jalur Pengangkutan Lemak dalam Darah

Adapun jalur pengangkutan lemak dalam darah, yaitu (Fatmawati, 2008):

1) Jalur eksogen

Kolesterol dan *Free fatty acid* yang masuk ke dalam tubuh lewat asupan akan diserap di intestinal mikrovili dimana mereka akan diubah menjadi kolesterol ester dan trigliserida. Kedua zat ini kemudian dikemas dalam bentuk kilomikron dan disekresi ke dalam sistem limfatik dan memasuki sirkulasi sistemik. Trigliserida mengalami hidrolisis di kapiler jaringan lemak dan otot menjadi asam lemak bebas (mono dan diglyserida) dan kilomikron remnant, sehingga ukuran kilomikron menjadi berkurang dan karenanya ditransfer menjadi HDL.

Kilomikron remnant akan dimetabolisme dalam hati sehingga menghasilkan kolesterol bebas. Sebagian kolesterol yang mencapai organ hati akan diubah menjadi asam empedu, yang akan dikeluarkan ke dalam usus, membantu proses penyerapan dari makanan. Sebagian lagi dari kolesterol dikeluarkan melalui saluran empedu tanpa dimetabolisme menjadi asam empedu kemudian organ hati akan mendistribusikan kolesterol ke jaringan tubuh lainnya melalui jalur endogen. Kilomikron yang tersisa (yang lemaknya telah diambil) pada akhirnya dibuang dari aliran darah oleh hati. Kolesterol juga dapat diproduksi oleh hati dengan bantuan enzim yang disebut HMG-CoA reduktase, kemudian dikirimkan ke dalam aliran darah.

2) Jalur endogen

Hati mengubah karbohidrat menjadi asam lemak, kemudian membentuk trigliserida, trigliserida ini dibawa melalui aliran darah dalam bentuk VLDL yang kemudian disirkulasi ke jaringan lemak dan otot. VLDL kemudian akan dimetabolisme oleh enzim lipoprotein lipase menjadi IDL. IDL kemudian berubah menjadi LDL yang kaya akan kolesterol melalui serangkaian proses. LDL ini bertugas menghantarkan kolesterol ke dalam tubuh. Kolesterol yang tidak diperlukan akan dilepaskan ke dalam darah, dimana pertama-tama akan berikatan dengan HDL. HDL bertugas membuang kelebihan kolesterol dari dalam tubuh.

2. Lipoprotein

Lipoprotein adalah senyawa lemak dibuat larut dalam plasma dengan apoprotein. Pada saat ini dikenal sembilan jenis apoprotein yang diberi nama secara alfabetis yaitu Apo A, Apo B, Apo C, dan Apo E (Sudoyo, 2006: 437).

Dengan elektroforesis lipoprotein dibedakan menjadi 5 golongan besar, yaitu:

a. Kilomikron

Kilomikron merupakan lipoprotein dengan berat molekul terbesar dan mengandung Apo-B48. Kandungannya sebagian besar trigliserida (80-95%) untuk dibawa ke jaringan lemak dan otot rangka. Kilomikron juga mengandung kolesterol (2-7%) untuk dibawa ke hati. Setelah 8-10 jam sejak makan terakhir, kilomikron tidak ditemukan lagi dalam plasma. Adanya kilomikron pada saat puasa dianggap abnormal (Dalimartha, 2008: 8).

Trigliserida dikeluarkan dari kilomikron pada jaringan ekstrahepatik melalui suatu jalur yang berhubungan dengan VLDL (*Very low density lipoprotein*) yang mencakup hidrolisis progresif pada diameter partikel terjadi ketika trigliserida di dalam hati tersebut dikosongkan (Katzung, 2002: 462).

b. Lipoprotein Berdensitas Sangat Rendah (VLDL)

VLDL (*Very low density lipoprotein*), dibentuk dari asam lemak bebas di hati dengan kandungan Apo-B100. VLDL mengandung 55-80 % trigliserida 5-15 % kolesterol (Dalimartha, 2008: 8)

VLDL (*very low density lipoprotein*) yang disekresi oleh hati menyediakan suatu sarana untuk mengeksport trigliserida ke jaringan perifer. VLDL mengandung Apo C dari HDL plasma. Trigliserida VLDL dihidrolisis oleh lipase lipoprotein yang menghasilkan asam lemak bebas untuk disimpan di dalam jaringan adipose dan untuk oksidasi dalam jaringan seperti otot jantung dan otot rangka. Hasil dari deplesi trigliserida menghasilkan sisa yang disebut lipoprotein berdensitas menengah (IDL). Beberapa partikel IDL mengalami endositosis secara langsung oleh hati. IDL yang selebihnya dikonversi menjadi LDL dengan menghilangkan trigliserida lebih lanjut yang diperantarai oleh lipase hati. Proses tersebut dapat menjelaskan tentang fenomena klinis “pergeseran beta (beta shift)”, peningkatan LDL (Lipoprotein beta) dalam serum ketika kondisi hipertrigliseridemia menurun. Peningkatan kadar LDL dalam plasma dapat disebabkan dari peningkatan sekresi prekursor VLDL, dan juga dari penurunan katabolisme LDL (Katzung, 2002: 462).

c. Lipoprotein Berdensitas Rendah (LDL)

Merupakan lipoprotein pengangkut kolesterol terbesar (40-50%) untuk disebarkan ke seluruh endotel jaringan perifer dan pembuluh nadi (Dalimartha, 2008: 9).

Suatu jalur utama katabolisme LDL dalam hepatosit dan dalam sebagian besar sel-sel bernukleus lainnya melibatkan endositosis yang diperantari reseptor berafinitas tinggi. Ester kolesterol dari inti LDL kemudian dihidrolisis, yang menghasilkan kolesterol bebas untuk sintesis membran sel. Sel-sel juga mendapatkan kolesterol dari sintesis *de novo* melalui suatu jalur yang melibatkan pembentukan *mevalonic acid* oleh reduktase HMG coA. Produksi enzim tersebut dan reseptor LDL diatur pada tingkat transkripsional oleh kandungan kolesterol dalam sel. Biasanya, sekitar setengah dari eliminasi LDL dari plasma disebabkan oleh endositosis LDL kedalam hepatosit. Bahkan lebih banyak lagi kolesterol yang dikirim ke hati dari VLDL sisa dan kilomikron. Sehingga hati memainkan peran utama dalam pengolahan kolesterol tubuh. Tidak seperti sel lainnya, hepatosit mampu mengeliminasi kolesterol dari tubuh melalui sekresi kolesterol dalam empedu dan dengan mengonversi kolesterol menjadi asam empedu yang juga disekresi dalam empedu (Katzung, 2002: 462)

Klasifikasi kolesterol LDL menurut NCEP ATP III 2001 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Kadar Kolesterol LDL (Sudoyo, 2006: 1928)

Kategori	Kadar (mg/ dL)
< 100	Optimal
100-129	Mendekati optimal
130-159	Diinginkan
160-189	Tinggi
≥ 190	Sangat tinggi

d. Lipoprotein Lp (a)

Lipoprotein Lp (a) dibentuk dari suatu gugus yang menyerupai LDL dan protein Lp (a) sangat homolog dengan plasminogen tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk diaktifkan oleh aktivator plasminogen jaringan. Keadaan seperti tersebut di depan adapt terjadi pada sejumlah isoform dengan berat molekul yang berbeda. Kadar protein dalam serum manusia bervariasi nol hingga melebihi 200 mg/dL dan diduga sebagian besar ditentukan oleh faktor genetik. Kompleks lipoprotein Lp (a) dapat ditemukan di dalam plak arterosklerosis dan diduga berperan pula pada terjadinya penyakit koroner melalui hambatan trombolisis (Katzung, 2002: 462).

e. Lipoprotein Berdensitas Tinggi (HDL)

Merupakan lipoprotein yang mengandung Apo AI dan Apo AII dengan kandungan trigliserida (5-10%) dan kolesterol (15-25%). HDL (High Density Lipoprotein) mempunyai efek antiteratogenik kuat sehingga disebut juga kolesterol bebas yang terdapat dalam endotel jaringan perifer termasuk pembuluh darah, ke reseptor HDL di hati untuk dijadikan empedu dan dikeluarkan ke usus kecil untuk

menerima lemak dan dibuang berupa tinja. Dengan demikian penimbunan kolesterol di perifer berkurang (Dalimartha, 2008: 9).

Sebagian besar lipid di dalam HDL berasal dari permukaan satu lapis kilomikron dan VLDL selama lipolisis. HDL juga mendapatkan kolesterol dari jaringan perifer dari suatu jalur yang melindungi homeostasis kolesterol sel. Pada proses tersebut, kolesterol bebas dipindahkan dari sitosol ke membran sel oleh suatu transporter, ABC1. Kolesterol bebas tersebut kemudian dibutuhkan oleh suatu partikel kecil yang disebut HDL prabeta-1. Kolesterol tersebut kemudian diesterifikasi oleh lesitin: *cholesterol acyltransferase* (LCAT), yang menyebabkan pembentukan spesies HDL yang lebih besar. Ester kolestril ditransfer ke VLDL, IDL, LDL dan kilomikron sisa dengan bantuan protein transfer kolestril (CETP). Jadi, sebagian besar ester kolestril yang ditransfer pada akhirnya dibawa ke hati melalui endositosis lipoprotein-lipoprotein akseptor. HDL dapat pula membawa ester kolestril langsung ke hati melalui suatu reseptor pengait/ docking (resepyor scavenger, SR-BI) yang tidak melakukan endositosis terhadap lipoprotein (Katzung, 2002; 462).

Klasifikasi kolesterol HDL menurut NCEP ATP 2001, adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Kadar Kolesterol HDL (Sudoyo, 2006: 1928)

Kategori	Kadar (mg/dL)
<40	Rendah
≥ 60	Tinggi

3. Kolesterol

a. Pengertian Kolesterol

Kolesterol secara etimologi, berasal dari bahasa *yunani* yang terbagi menjadi kata *chole* yang artinya empedu dan *sterEOS* berarti padat. Jadi, kolesterol adalah zat alamiah dengan sifat fisik serupa lemak tapi berumus steroida, seperti banyak senyawa alamiah lainnya (Tjay dan Rahardja, 2007: 569).

Kolesterol sebenarnya merupakan salah satu komponen lemak. Kolesterol merupakan sterol utama dalam tubuh manusia, kolesterol merupakan komponen struktural membran sel dan lipoprotein plasma, dan juga merupakan bahan awal pembentukan asam empedu serta hormon steroid (Kumalasari, 2005). Kolesterol mempunyai beberapa fungsi untuk tubuh, pertama merupakan prekursor atau bahan pembentuk berbagai jenis hormon steroid antara lain hormon estrogen, progesteron, dan androgen. Kolesterol juga merupakan pro-vitamin D (ergosterol) yang terdapat di jaringan bawah kulit. Sinar matahari terutama sinar ultraviolet membantu mengubah pro-vitamin D itu menjadi vitamin D. Fungsi

berikutnya adalah sebagai bahan pembentuk asam empedu dan garam empedu (Tirtawinata, 2006)

Kolesterol hanya terdapat di dalam makanan asal hewan. Sumber utama kolesterol adalah hati, ginjal, dan kuning telur. Selain itu daging, susu penuh dan keju serta udang dan kerang. Ikan dan daging ayam sedikit sekali mengandung kolesterol (Almatsier, 2001: 73-74).

b. Sintesa kolesterol

Sintesa kolesterol dalam keadaan normal, hati melepaskan kolesterol ke darah sesuai kebutuhan. Tetapi bila diet mengandung terlampaui banyak kolesterol atau lemak hewani jenuh maka kadar kolesterol darah akan meningkat. Setelah diserap tubuh, sebagian lemak dan minyak dalam bahan pangan digunakan sebagai sumber energi, melalui reaksi penguraian: $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{kalori}$. Zat-zat perombakan lainnya di dalam hati digunakan lagi untuk sintesa kolesterol dan lemak lain. Sintesa endogen ini disesuaikan dengan kebutuhan, misalnya selama berpuasa atau bila terdapat banyak kolesterol dalam pangan, maka pembentukannya berkurang. Sebaliknya, bila kadar asam empedu menurun, sintesisnya meningkat untuk biotransformasi akan menjadi asam empedu lagi. Lazimnya, k.l. 2/3 berasal dari pangan (eksogen) (Tjay dan Rahardja, 2008).

c. Pengaturan Metabolisme Kolesterol

Di dalam tubuh manusia dan hewan, jumlah kolesterol di dalam sel diatur oleh banyak faktor. Faktor tersebut dapat dibagi menjadi menjadi dua macam (Wirahadikusumah, 1985):

- 1) Faktor luar sel, seperti jumlah kolesterol bebas atau yang terikat dalam lipoprotein di luar sel, persediaan asam lemak bebas, dan adanya hormon tertentu.
- 2) Faktor dalam sel, seperti kegiatan enzim yang berperan dalam sintesis kolesterol dan yang berperan dalam kotabolisme kolesterol, jumlah ketersediaan terpenoida lanosterol dan skualin sebagai prazat untuk sintesis kolesterol, jumlah hasil metabolisme kolesterol, adanya kegiatan pengangkutan kolesterol atau derivatnya ke luar dari sel dengan mekanisme pengangkutan aktif melalui membran sel, dan pengaruh viskositas membran. Gangguan terhadap salah satu mekanisme pengaturan tersebut dapat mengakibatkan berbagai kelainan yang bersifat patologis.

4. Hiperlipidemia

Hiperlipidemia adalah suatu keadaan patologis akibat kenaikan metabolisme lemak darah yang ditandai dengan meningkatnya kadar kolesterol darah (hiperkolesterolemia), trigliserida (hipertrigliseridemia) atau kombinasi keduanya (Wardiah, 2009: 14).

Jenis- jenis hiperlipidemia yang dapat terjadi (Tjay dan Rahardja, 2007: 572):

a. Hiperlipidemia keturunan

Dalam sejumlah kecil (2-3% dari penduduk), HLD bersifat familial akibat kelainan genetik yang mempengaruhi langsung metabolisme lipida, misalnya pembentukan LDL ditingkatkan atau kekurangan reseptor LDL yang berakibat LDL tidak diserap oleh sel.

b. Hiperlipidemia akibat susunan pangan

Pada kondisi ini (terlampau banyak lemak jenuh dan terlampau sedikit sayur-mayur) biasanya menimbulkan tipe II dan IV dengan kenaikan LDL dan atau VLDL. Bentuk ini dapat ditanggulangi dengan diet kalori rendah yang miskin kolesterol – TG dan kaya akan asam lemak *poly-unsaturated*.

c. Hiperlipidemia sekunder akibat penyakit

Hiperlipidemia sekunder akibat penyakit misalnya diabetes, hipotiroidis, insufisiensi ginjal menahun, obesitas, penyakit hati tertentu. Atau pengobatan dengan misalnya hormon (obat-obat KB), kortikosteroida diuretika tiazida dan beta-blockers. Lazimnya gangguan ini akan sembuh sesudah penyebabnya hilang.

5. Arteriosklerosis

Aterosklerosis merupakan penyakit progresif yang dikarakterisasikan dengan terjadinya penumpukan kolesterol, low density lipoprotein (LDL), dan elemen fibrous pada arteri besar yang berkontribusi terhadap keparahan penyakit kardiovaskular. Meningkatnya kolesterol total dan trigliserida merupakan faktor penyebab perkembangan penyakit aterosklerosis dan penyakit jantung koroner (Farias, 1996: 697 - 699).

Contoh ekstrim tingginya kolesterol yang menyebabkan aterosklerosis dijumpai pada diabetes melitus. Diabetes melitus merupakan sindrom metabolik yang dikarakterisasikan dengan kehilangan homeostasis glukosa sehingga menyebabkan kerusakan pada metabolisme glukosa dan sumber energi lainnya seperti lipid dan protein. Gambaran patologik diabetes melitus sebagian besar dapat dihubungkan

dengan salah satu efek utama akibat kurangnya insulin yaitu berkurangnya pemakaian glukosa oleh sel-sel tubuh, peningkatan metabolisme lemak yang menyebabkan terjadinya metabolisme lemak abnormal disertai endapan kolesterol pada dinding pembuluh darah sehingga timbul gejala aterosklerosis serta berkurangnya protein dalam tubuh. Penyakit ini sering berhubungan dengan meningkatnya parameter resiko kardiovaskular yaitu hipertrigliserida, hiperkolesterol dan rendahnya high density lipoprotein (HDL) (Kannel, 1985: 110;1100).

Arteriosklerosis adalah kombinasi 2 kata dari bahasa yaitu: *athere*: pudding dan *sclerosis* : pengerasan, dimana dinding arteri menjadi penuh dengan timbunan yang lembut dan lembek yang akhirnya mengeras sehingga arteri menjadi kaku dan sempit. Ada 4 langkah penting (Wardiah, 2009; 15):

a. Dinding arteri melemah

Naiknya kadar kolesterol menyebabkan sel-sel endotel didalam dinding arteri menjadi lebih lengket.

b. Respon radang

Merespon sinyal dari sel-sel endotelial, makrofag menyerang LDL yang menyerbu.

c. Terbentuknya plak

Seiring LDL menuju dinding arteri, makin banyak makrofag yang merespon dan dinding arteri menjadi makin meradang. Dalam upaya untuk menahan proses ini sel-sel otot memproduksi tutup (cap) berserat diatas bagian yang meradang.

d. Plak pecah dan gumpalan darah terbentuk

Timbunan plak yang dipenuhi oleh sel-sel radang (terutama makrofag dan limfosit T) dan juga kolesterol. Makin banyak sel-sel radang dan juga kolesterol serta makin tipis tutupnya makin tidak stabil plaknya. Sel-sel T memperlambat produksi materi berserat yang memperkuat tutup (seperti kolagen) dan makrofag memproduksi enzim yang menguraikan kolagen. Serangan bermata dua ini merusak tutup sehingga akhirnya pecah. Akibatnya kolesterol dan sel-sel didalam plak berkontak dengan darah mengalir, hal ini menyebabkan sel-sel darah yang disebut trombosit membentuk gumpalan. Gumpalan yang dihasilkan dapat menghambat aliran darah, mengurangi pasokan darah dan oksigen ke jantung yang bisa menyebabkan serangan jantung.

6. Penyebab Kolesterol Tinggi

Adapun penyebab kolesterol tinggi yaitu (Sudewo, 2004:64):

- a. Terlalu banyak mengonsumsi lemak binatang seperti daging, jeroan, telur, udang, kepiting, sumsum tulang, cumi, kulit ayam dan kikil.
- b. Semua lemak yang menempel di daging sebelum dimasak.
- c. Kelebihan berat badan dan jarang berolahraga
- d. Gaya hidup yang tidak seimbang dan pola makan yang tidak teratur
- e. Faktor keturunan atau riwayat keluarga yang menderita kadar kolesterol tinggi, hipertensi dan penyakit.

f. Uraian Obat

Simvastatin merupakan senyawa antilipemik, inhibitor HMG-CoA (hydroxymethylglutaryl-CoA) reduktase. Berdaya menurunkan sintesa kolesterol endogen dalam hati dan dengan demikian terjadi penurunan kolesterol total dengan kuat, LDL (dg 30-40%), TG, dan VLDL lebih ringan, sedangkan HDL dinaikkan. Statin juga berkhasiat antitrombotis, anti-aritmia dan anti radang dengan jalan menghambat sitokin-sitokin tertentu. (Tjay dan Rahardja: 2008).

Adapun pemerian dari simvastatin yaitu serbuk kristal warna putih, nonhigroskopis; kelarutannya yaitu praktis tidak larut dalam air dan sangat larut dalam kloroform, metanol dan etanol; indikasinya yaitu hiperkolesterolemia primer, heterozygous familial hiperkoles-terolemia, homozygous familial hiperkolesterolemia, atau tipe hiperkolesterolemia campuran pada pasien yang tidak menunjukkan respon yang adekuat terhadap diet dan tindakan lain yang sesuai; dosis dan cara pemakaiannya yaitu hiperkolesterolemia primer, hyperlipidemia kombinasi , 10 – 20 mg sehari pada malam hari, interval disesuaikan paling sedikit 4 minggu; kisaran dosis lazim 10 – 80 mg sekali sehari pada malam hari. Hiperkolesterolemia familial homozygous , 40 mg sehari pada malam hari atau 80 mg sehari terbagi dalam 3 dosis (dengan dosis terbesar pada malam hari). Pencegahan kardiovaskuler , dosis awal 20 – 40 mg sekali sehari pada malam hari, interval disesuaikan paling sedikit 4 minggu; maksimal 80 mg sekali sehari pada malam hari. Catatan : maksimal 10 mg sehari jika digunakan bersama ciclosporin , fibrat atau penurun lipid nicotinic acid . Maksimal 20 mg sehari jika digunakan bersama amiodaron atau verapamil. Maksimal

40 mg sehari dengan diltiazem; kontraindikasinya yaitu statin kontraindikasi pada pasien dengan penyakit hati yang aktif (tes fungsi hati abnormal yang persisten) , pada kehamilan dan menyusui, porphyria; efek sampingnya yaitu myositis reversibel merupakan efek samping yang jarang tetapi bermakna (significant side effect). Statin juga menyebabkan sakit kepala, mempengaruhi hasil fungsi hati (hepatitis, jarang terjadi), paraesthesia, dan efek pada saluran cerna termasuk. nyeri abdomen, flatulence, konstipasi, diare, mual dan muntah. Rash dan reaksi hipersensitifitas (termasuk angioedema dan anafilaksis) dilaporkan jarang terjadi. Efek pada otot: myalgia, myositis dan myopathy jika myopathy diduga terjadi dan kreatinin kinase meningkat (lebih dari 5 kali batas atas nilai normal), atau timbul gejala muskular yang berat, pengobatan tidak boleh dilanjutkan. Pada pasien dengan risiko tinggi terhadap gangguan otot, pemberian statin tidak boleh dimulai jika kreatinin kinase meningkat. Insidensi terjadinya myopathy akan meningkat jika statin diberikan pada dosis tinggi atau diberikan dengan fibrat, dengan asam nikotinat atau dengan immunosupresan seperti siklosporin ; perlu pengawasan (monitoring) yang ketat terhadap fungsi hati dan jika kreatinin kinase menunjukkan gejala akibat penggunaan obat tersebut. Rhabdomyolysis dengan gagal ginjal akut sekunder hingga myoglobinuria juga dilaporkan terjadi. Efek samping yang lain : alopesia, anemia, pusing, neuropati perifer, hepatitis, jaundice, pankreatitis.

Mekanisme kerja simvastatin yaitu bekerja dengan cara menghambat HMG-CoA reduktase secara kompetitif pada proses sintesis kolesterol di hati. Simvastatin akan menghambat HMG-CoA reduktase mengubah asetil-CoA menjadi asam

mevalonat. Simvastatin jelas menginduksi suatu peningkatan reseptor LDL dengan afinitas tinggi. Efek tersebut meningkatkan kecepatan ekstraksi LDL oleh hati, sehingga mengurangi simpanan LDL plasma (Katzung, 2002); farmakokinetika yaitu obat ini mempunyai bioavailabilitas relatif rendah, terutama disebabkan *first pass metabolism*, inhibitor reduktase merupakan senyawa aktif kecuali lovastatin dan simvastatin (Hadiyanto, 2009); peringatannya yaitu statin harus diberikan dengan hati-hati pada pasien dengan riwayat penyakit hati atau pasien yang menggunakan alkohol dalam jumlah yang banyak (penggunaan dihindari pada penyakit hati yang aktif). Hipotiroidisme harus diberi pengobatan yang adekuat lebih dahulu sebelum memulai pengobatan dengan statin). Tes fungsi hati harus dilakukan sebelum pengobatan dan 1 – 3 bulan setelah penggunaan obat, diteruskan tiap 6 sampai 1 tahun, kecuali jika terdapat tanda-tanda hepatotoksisitas. Pengobatan harus dihentikan apabila kadar serum transaminase meningkat hingga dan bertahan 3 kali batas atas nilai normalnya. Statin harus digunakan dengan peringatan (hati-hati) pada pasien dengan faktor resiko mengalami myopathy atau rhabdomyolysis; pasien diberi nasehat untuk melaporkan nyeri otot yang terjadi padanya. Statin dihindari penggunaannya pada porphyria , namun rosuvastatin aman digunakan.

HMG-CoA (hidroksimetilglutarilkoenzim) reduktase yaitu enzim yang membatasi kecepatan biosintesis kolesterol. HMG-CoA reduktase secara normal mengkonversi HMG-CoA menjadi mevalonic acid. Dengan berkompetisi dengan HMG-CoA reduktase, golongan statin ini mengurangi biosintesis kolesterol di hati (Hadiyanto, 2009: 131). Reduktasde HMG-CoA memperantarai langkah awal

biosintesis sterol. Bentuk aktif penghambat reduktase merupakan analog struktural HMG CoA dalam sintesis *mevalonate*. Analog tersebut menyebabkan hambatan parsial pada enzim dan oleh karenanya menurut teori dapat dapat merusak sintesis isoprenoid semacam ubiquinon dan lolicol, dan prenylasi protein. Penghambat reduktase jelas menginduksi suatu peningkatan reseptor LDL dengan afinitas tinggi. Efek tersebut meningkatkan baik kecepatan katabolisme fraksional LDL maupun ekstraksi precursor LDL oleh hati (VLDL sisa), sehingga mengurangi simpanan LDL plasma (Katzung, 2002: 441).

g. Tinjauan Islam

Tumbuhan sebagai bahan obat tradisional telah banyak digunakan untuk pemeliharaan kesehatan. Dunia kedokteran juga banyak mempelajari obat tradisional dan hasilnya mendukung bahwa tumbuhan obat memiliki kandungan zat-zat yang secara klinis yang bermanfaat bagi kesehatan (Rahim, 2007 : 5).

Tumbuhan atau tanaman adalah apotek lengkap yang mengandung zat aktif dan variatif yang telah diciptakan Allah swt. dengan hikmah dan takdirNya. Potensi tumbuhan adalah melawan pengaruh bakteri dan zat perusak potensi yang lain adalah membantu tubuh terbebas dari bakteri-bakteri dan mempermudah penyerapan bahan-bahan aktif yang terdapat dalam tumbuhan tersebut (Rahman, 2007: 5).

Di dalam firman Allah swt. dalam QS. Thaha / 20. 53

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ
مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى ﴿٥٣﴾

Terjemahnya :

“Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam.” (Departemen Agama RI, 2005: 481).

Ayat di atas menyatakan: Dia, yakni Allah swt, *Yang telah menjadikan bagi kamu*, wahai Fir'aun dan seluruh manusia sebagian besar *bumi sebagai hamparan* dan menjadikan sebagian kecil lainnya gunung-gunung untuk menjaga kestabilan bumi *dan* Dia, Tuhan itu juga, *Yang telah menjadikan bagi kamu di bumi itu jalan-jalan* yang mudah kamu tempuh, *dan menurunkan dari langit air*, yakni hujan, sehingga tercipta sungai-sungai dan danau, *maka Kami tumbuhkan dengannya*, yakni dengan perantaraan hujan itu, *berjenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam* jenis, bentuk, rasa, warna dan manfaatnya. Itu semua Allah ciptakan buat kamu dan binatang-binatang kamu (Shihab, 2002: 604-605).

Berdasarkan ayat di atas dapat pula disimpulkan bahwa Allah swt menciptakan hamparan yang luas dengan aneka macam tumbuhan untuk dimanfaatkan manusia. Salah satunya sampel ekstrak rimpang kunyit putih sebagai sampel yang dapat digunakan sebagai bahan dalam bidang pengobatan yang bermanfaat sebagai penurun kolesterol.

Rasulullah bersabda :

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:
لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أَصَابَ الدَّوَاءُ الدَّاءَ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Artinya :

Dari Jabir r.a. bahwa Rasulullah bersabda, “Setiap penyakit ada obatnya, jika benar obat yang digunakan dapat melawan penyakit yang dimaksud, maka dengan izin Allah akan sembuh” (H.R. Imam Muslim) (Mahmud, 2007 : 13-14).

Al-Nawawi dalam kitabnya *Syarh al-Nawawi ‘ala Muslim* menjelaskan bahwa hadis tersebut menunjukkan keutamaan berobat, itu menurut jumbuh ulama, al-Qhadi mengatakan bahwa hadis ini mengandung ilmu-ilmu yang terkait dengan agama, dunia, kesehatan, ilmu kedokteran dan bolehnya berobat. Menurut hujjah para ulama bahwa Allah selaku penentu dan adapun pengobatan juga berasal dari ketentuan Allah (Al-Nawawi, 1392: 191).

Al-‘Aini pun menjelaskan dalam kitabnya syarahnya bahwa Allah swt. tidak memberikan penyakit kepada seseorang kecuali ia telah menentukan obatnya, yang dimaksud dengan “menurunkan” pada hadis di atas ialah Allah menurunkan penyakit dan obat melalui malaikat secara langsung kepada makhluk sebagai perwakilan. Dikatakan bahwa banyak orang yang berobat tapi mereka tidak mendapatkan kesembuhan, maka dijawab bahwa itu karena mereka tidak mengetahui hakikat dari pengobatan itu. Hadis tersebut tidak menunjukkan penyakit secara keseluruhan karena dikecualikan penyakit tua dan mati, dan pada hadis tersebut terdapat penjelasan bolehnya melakukan pengobatan dan ilmu kedokteran (Al-‘Aini, 229).

Jadi setiap penyakit yang diturunkan oleh Allah swt. ada obatnya, dan setiap pengobatan itu harus sesuai dengan penyakitnya. Jika Allah swt. menghendaki maka seseorang akan sembuh dari penyakit yang dideritanya, akan tetapi Allah swt. menghendaki agar pengobatan itu dipelajari oleh ahlinya agar sesuai dengan penyakit yang akan diobati sehingga akan mempermudah penyembuhannya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan studi eksperimental laboratorium yang menggunakan mencit sebagai hewan percobaan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Laboratorium Fitokimia dan Biofarmasi Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Fitokimia untuk melaksanakan proses pengolahan sampel rimpang kunyit putih (*Curcuma zedoaria (Berg) Roscoe*) sampai di dapatkan ekstrak rimpang kunyit. Kemudian peneliti juga menggunakan Laboratorium biofarmasi untuk mempersiapkan kandang, hewan coba, pakan serta melaksanakan proses peralakuan dan pengamatan.

B. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu metode eksperimental.

C. Alat dan Bahan

1. Alat

Alat yang digunakan antara lain, cawan porselin, alat-alat gelas (*pyrex*[®]), aluminium foil, alat pengukur kolesterol (*Easy Touch GCU*), batang pengaduk, kanula, toples, rotavapor (*heidolph*[®]), penangas air, sendok tanduk, timbangan analitik (*precisa*[®]).

2. Bahan

Aquadest, rimpang kunyit putih (*Curcuma zedoaria* (Berg) Roscoe), metanol, mencit jantan (*Mus musculus*), kuning telur 10%, Na-CMC 1%, pakan mencit, tablet simvastatin.

D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengambilan Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah rimpang kunyit putih (*Curcuma zedoaria* (Berg) Roscoe) yang diambil di Sinjai.

2. Pengolahan Sampel

Sampel rimpang kunyit putih (*Curcuma zedoaria* (Berg) Roscoe) yang telah diambil kemudian dicuci bersih menggunakan air mengalir kemudian ditiriskan lalu diiris tipis-tipis lalu dikeringkan di lemari pengering. Setelah kering sampel kemudian diblender hingga menjadi serbuk dan disimpan dalam wadah tertutup rapat.

3. Ekstraksi Sampel

Metode ekstraksi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu maserasi. Sampel rimpang kunyit putih (*Curcuma zedoaria* Rosc.) ditimbang sebanyak 500 gram kemudian dimasukkan ke dalam wadah maserasi. Ditambahkan pelarut metanol hingga simplisia terendam. Wadah maserasi ditutup dan didiamkan sambil sesekali diaduk. Proses ekstraksi tetap berlanjut sampai filtrat jernih. Selanjutnya disaring, dipisahkan antara ampas dan filtrat. Filtrat yang diperoleh kemudian di rotavapor dan diuapkan hingga diperoleh ekstrak metanol yang kental. Ekstrak yang diperoleh ditimbang dengan menggunakan neraca analitik.

4. Prosedur Uji Penurunan kadar kolesterol pada Mencit Jantan

a. Pembuatan suspensi Na-CMC 1%

Serbuk Na-CMC ditimbang sebanyak 1 gram kemudian ditambahkan sedikit demi sedikit aquadest panas dalam erlenmeyer yang telah ditara, sambil diaduk, lalu dicukupkan dengan aquadest 100 ml.

b. Pembuatan suspensi kuning telur 10%

Ditimbang kuning telur yang telah terpisah dari putih telurnya sebanyak 10 g kemudian dicukupkan dengan aquadest hingga 100 ml, diaduk hingga homogen.

c. Pembuatan suspensi ekstrak rimpang kunyit putih

Dibuat larutan sampel dengan menimbang ekstrak rimpang kunyit putih 100 mg, 200 mg, 300 mg kemudian masing-masing dicukupkan dengan 10 ml Na-CMC 1%.

d. Pembuatan suspensi simvastatin

Ditimbang tablet simvastatin sebanyak 20 tablet. Kemudian dihitung bobot rata-rata tiap tablet. Setelah itu semua tablet simvastatin dimasukkan dalam lumpang dan digerus hingga halus dan homogen. Kemudian dihitung berat serbuk simvastatin. Lalu dimasukkan kembali ke dalam lumpang lalu ditambahkan sedikit demi sedikit larutan suspensi Na-CMC 1% b/v sambil diaduk hingga homogen. Hasilnya dimasukkan ke dalam labu tentukur 100 ml dan dicukupkan volumenya menggunakan larutan suspensi Na-CMC 1% b/v hingga 100 ml.

e. Pemilihan dan penyiapan hewan coba

Hewan uji yang digunakan adalah mencit jantan (*Mus musculus*) yang sehat dengan bobot badan rata-rata 20-30 gram, digunakan sebanyak 15 ekor yang dibagi ke dalam 5 kelompok perlakuan, dimana tiap kelompok perlakuan terdiri dari 3 ekor mencit jantan. Terlebih dahulu diadaptasikan selama 7 hari lalu dipuasakan selama 8 jam sebelum diukur kadar kolesterol awalnya.

f. Perlakuan hewan coba

Sebelum diberi perlakuan, semua hewan uji dipuasakan terlebih dahulu, kemudian diambil darah melalui ekor dan diukur kadar kolesterol darah awal. Kemudian hewan coba diinduksikan dengan kuning telur 10% sekali sehari selama 7 hari berturut-turut, kemudian diukur kenaikan kadar kolesterol, selanjutnya kelompok I, II, III (kelompok dosis ekstrak selama 1 minggu), kelompok IV (kontrol negatif yang diberi suspensi NaCMC 1% b/v), kelompok V (kontrol positif yang diberi suspensi simvastatin), kemudian diukur penurunan kadar kolesterol.

- Kelompok 1 : Diberikan ekstrak metanol rimpang kunyit putih dengan dosis 100 mg/g BB mencit.
- Kelompok 2 : Diberikan ekstrak metanol rimpang kunyit putih dengan dosis 200 mg/g BB mencit.
- Kelompok 3 : Diberikan ekstrak metanol rimpang kunyit putih dengan dosis 300 mg/g BB mencit.

- Kelompok 4 : diberikan Na-CMC 1% sebagai kontrol negatif
- Kelompok 5 : diberikan sediaan pembanding yaitu suspensi Simvastatin sebagai kontrol positif.

g. Pengukuran kadar kolesterol Darah

Terlebih dahulu alat pengukur kolesterol diaktifkan dengan menekan tombol alat tersebut dan dimasukkan chip kedalam alat dengan tujuan untuk cek alat tersebut kemudian dimasukkan strip di alat. Darah mencit diambil dari pembuluh darah vena pada ekor mencit kemudian diteteskan di atas strip dan kadar kolesterol darah akan terukur secara otomatis dimana hasilnya ditampilkan pada monitor berupa angka.

Prinsip kerja dari alat ini yaitu pada strip terdapat enzim yang secara spesifik bereaksi dengan kolesterol. Enzim tersebut kemudian menyampaikan elektron ke elektroda untuk pengukuran secara elektrokimia.

h. Analisis data

Data yang diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan sistem statistik Rancangan Acak Lengkap (RAL) karena media percobaannya homogen, jumlah perlakuannya sedikit dan seragam kemudian dilanjutkan dengan uji Duncan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada ekstrak metanol rimpang kunyit putih (*Curcuma zedoaria* (Berg) Roscoe) untuk menurunkan kadar kolesterol darah yang dilakukan pada hewan coba diperoleh hasil :

Tabel 4. Perubahan Kadar Kolesterol Mencit Jantan Yang Diberi Perlakuan Dengan Ekstrak Rimpang Kunyit Putih (*Curcuma Zedoaria* (Berg) Roscoe) Dibandingkan Dengan Kontrol.

Kelompok	Hewan Uji	Pengukuran			Penurunan kadar setelah perlakuan (mg/dL)	Persentase penurunan (%)	Rata-rata penurunan kadar setelah perlakuan (mg/dL)	Rata-rata persentase penurunan (%)
		K ₀	K ₁	K ₃				
Kelompok I Dosis ekstrak 0,33 mg/g BB	1	149	243	186	57	23,45 %	46	20,64 %
	2	122	224	174	50	22,32 %		
	3	111	206	173	33	16,17 %		
Kelompok II Dosis ekstrak 0,66 mg/g BB	1	120	236	167	69	29,23 %	60	26,19 %
	2	113	237	179	58	24,47 %		
	3	129	221	166	55	24,88 %		
Kelompok III Dosis ekstrak 1 mg/ g BB	1	130	247	151	96	38,86 %	99,66	41,08 %
	2	125	239	141	98	41,00 %		
	3	111	242	137	105	43,38 %		
Kelompok IV Kontrol (-)	1	128	243	220	23	9,46 %	21,66	9,28 %
	2	132	235	219	16	6,80 %		

NaCMC	3	120	224	198	26	11,60 %		
Kelompok V Kontrol (+) Simvastatin	1	138	257	115	142	55,25 %	134,33	53,04 %
	2	133	261	129	139	53,25%		
	3	120	241	119	122	50,62 %		

Keterangan:

K_0 = Kadar Kolesterol Awal

K_1 = Kadar Kolesterol Setelah Penginduksian Kuning Telur

K_2 = Kadar Kolesterol Setelah Perlakuan

B. Pembahasan

Kolesterol merupakan metabolit yang mengandung lemak sterol yang ditemukan pada membran sel dan sirkulasi dalam plasma darah. Kandungan kolesterol pada setiap bagian tubuh hewan berbeda, ada bagian yang sangat banyak mengandung kolesterol dan bagian lain sebaliknya. Sebagai contoh pada otak, hati dan kuning telur memiliki kadar koesterol yang sangat tinggi. Kolesterol secara fisiologi penting bagi tubuh, karena merupakan bahan untuk membangun membran sel dan hormon-hormon yang memiliki peranan vital khususnya kelompok hormon steroid (Lars, 1991: 22).

Tubuh manusia dan hewan yang normal akan berusaha memelihara konsentrasi plasma kolesterol dengan cara mengatur sintesis dan ekskresi kolesterol. Kolesterol yang melebihi kebutuhan tubuh akan dieliminir melalui empedu, tetapi walaupun begitu jika pasok kolesterol dari makanan berlebih, maka akan berakibat kurang baik bagi tubuh dan dapat menimbulkan berbagai gangguan fisiologi seperti

atherosclerosis yang dapat menjadi penyakit jantung koroner atau stroke. Kolesterol merupakan substansi lemak, oleh karena itu kolesterol tidak larut dalam air, dapat diekstraksi dari jaringan dengan kloroform, eter, benzena, dan alkohol panas (Lars, 1991: 23).

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh pemberian ekstrak yang mengandung ekstrak rimpang kunyit putih pada hewan coba yang diberikan diet lemak tinggi. Metode yang dipilih adalah perlakuan hewan coba melalui pemberian bahan uji dengan makanan diet tinggi lemak secara berpisah, dimana pada saat proses perlakuan dengan pemberian ekstrak, kontrol positif (obat) dan kontrol negatif (Na-CMC), dihentikan pemberian kuning telur untuk mencegah kenaikan kadar kolesterol mencit yang sangat tinggi sehingga dikhawatirkan mencit pada kelompok kontrol negatif yang hanya diberikan Na-CMC dapat mengalami hiperkolesterolemia yang sangat tinggi dan dapat menyebabkan kematian. Jadi, untuk melihat efektifitas ekstrak yang digunakan dapat dibandingkan antara penurunan kadar yang terjadi pada kelompok pemberian ekstrak dan kontrol positif dengan kelompok perlakuan kontrol negatif.

Pada penelitian ini, sebelum diberikan perlakuan pada hewan coba, terlebih dahulu rimpang kunyit putih (*Curcuma zedoaria* (Berg) Roscoe) ini dibuat dalam bentuk simplisia sebelum diolah menjadi ekstrak kemudian dilakukan sortasi basah. Sortasi basah merupakan suatu proses pemisahan rimpang yang kualitasnya kurang baik seperti rimpang yang telah ditumbuhi jamur. Setelah proses sortasi basah, rimpang kunyit putih dicuci dengan air yang bersih dan mengalir. Pencucian

bertujuan untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang menempel dipermukaan rimpang kunyit. Setelah proses pencucian, rimpang ditiriskan dan diiris tipis kemudian dikeringkan di lemari pengering. Salah satu tujuan pengeringan daun yaitu untuk mengurangi kadar air dalam rimpang, karena kadar air yang tinggi dapat membuat simplisia cepat rusak dan untuk mencegah tumbuhnya mikroorganisme pada simplisia.

Sampel yang telah kering selanjutnya diekstraksi dengan metode maserasi yang merupakan metode dingin (proses ekstraksi tanpa pemanasan). Selain itu pemanasan dapat menyebabkan kerusakan kandungan kimia dalam simplisia. Metode ini memiliki keuntungan yaitu semua bagian sampel dapat kontak dengan larutan. Maserasi dilakukan dengan cara merendam simplisia sebanyak 500 g dalam cairan penyari metanol. Cairan penyari akan menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat aktif, zat aktif akan larut dan karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif di dalam sel dengan diluar sel, maka larutan yang terpekat didesak keluar. Peristiwa tersebut berulang sehingga terjadi kesetimbangan konsentrasi dan dilakukan 3x24 jam. Filtrat yang dihasilkan dirotavapor pada suhu 60⁰ C agar ekstrak menjadi pekat dan kental. Kemudian ekstrak ditimbang dan diperoleh bobot ekstrak sebesar 31,7703 gram. Selanjutnya ekstrak kental di simpan dalam eksikator yang berisi silika gel yang telah aktif yang dapat menyerap uap air dan mencegah rusaknya ekstrak.

Setelah itu dilakukan pengujian pada hewan coba dimaksudkan untuk melihat efektivitas rimpang kunyit putih sebagai penurun kolesterol yang sudah digunakan

secara empiris oleh masyarakat. Pada pengujian ini digunakan mencit (*Mus musculus*) jantan sebagai hewan coba karena mudah untuk diperoleh, mudah ditangani, murah, dan memiliki sistem hormonal yang lebih stabil dibanding mencit betina. Mencit yang digunakan memiliki bobot rata-rata 20-30 gram yang dibagi kedalam 5 kelompok sehingga terdapat 3 mencit dalam setiap kelompok. Mencit yang akan digunakan terlebih dahulu diaklimatisasi selama 1 minggu untuk menyesuaikan dengan kondisi laboratorium.

Dalam penelitian ini digunakan tablet Simvastatin sebagai pembanding karena obat ini sangat efektif dalam menurunkan kolesterol total dan LDL. Pembanding atau kontrol positif ini digunakan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang penurunan kadar kolesterol darah pada hewan uji. Selain itu, simvastatin ini mudah dijangkau dan murah.

Sebelum pemberian perlakuan terhadap hewan uji, terlebih dahulu masing-masing kelompok diberikan diet lemak tinggi untuk menaikkan kolesterol hewan uji dengan menggunakan kuning telur 10%. Pemberian kuning telur ini dilakukan hingga kadar kolesterol mencit naik selama 7 hari, sebelum pemberian kuning telur terlebih dahulu diukur kadar kolesterol mencit dengan menggunakan alat pengukur kolesterol, untuk mengetahui peningkatan kadar kolesterol pada mencit dari kadar kolesterol sebelum pemberian kuning telur. Pemberian kuning telur digunakan untuk menaikkan kadar kolesterol darah pada hewan uji karena kuning telur memiliki kandungan kolesterol yang lebih tinggi dibandingkan bahan hewani lainnya selain itu kuning

telur juga mudah di peroleh dan diolah . Kadar kolesterol pada kuning telur yaitu 2630 mg/dL.

Sebelum pengukuran, terlebih dahulu mencit dipuasakan untuk menghindari pengaruh makanan pada saat dilakukan pengukuran kadar kolesterol awal. Walaupun demikian, faktor biologis dari hewan uji tidak dapat dihilangkan seperti mengalami tekanan emosional (stress) selama dalam perlakuan dan galur mencit yang digunakan tidak jelas diketahui, berbeda dengan mencit yang digunakan pada penelitian lain yang galurnya telah diketahui sehingga relatif dapat mempengaruhi hasil penelitian. Hal ini terlihat pada hasil pengukuran kolesterol awal pada hewan uji.

Pada pengujian efektivitas penurunan kolesterol, untuk kelompok I, II, III diberikan ekstrak rimpang kunyit putih dengan variasi dosis untuk masing-masing kelompok perlakuan yaitu 0,33 mg/g BB, 0,66 mg/g BB dan 1 mg/g BB, kelompok IV sebagai kontrol negatif diberikan suspensi Na-CMC 1% sesuai dengan berat badan mencit (*Mus musculus*), dan kelompok V sebagai pembanding diberikan tablet simvastatin dengan dosis yang telah dikonversi dari dosis manusia menjadi dosis mencit (*Mus musculus*). Pemberian perlakuan ini dilakukan hingga kadar kolesterol mencit (*Mus musculus*) turun, selanjutnya diukur kadar kolesterol akhir untuk masing-masing kelompok perlakuan.

Berdasarkan pengujian efektivitas penurunan kolesterol diperoleh hasil rata-rata penurunan, untuk kelompok I dengan dosis 0,33 mg/g BB yaitu 46 (mg/dL), kelompok II dengan dosis 0,66 mg/g BB yaitu 60 (mg/dL), kelompok III dengan dosis 1 mg/g BB yaitu 99,6 (mg/dL), kelompok IV sebagai kontrol negatif (Na-

CMC) yaitu 21,6 (mg/dL), dan untuk kelompok V sebagai kontrol positif (Simvastatin) yaitu 134,33 (mg/dL).

Dari data yang diperoleh kemudian dihitung % penurunannya dengan cara menghitung selisih antara kolesterol akhir setelah perlakuan dengan kolesterol setelah diinduksi kuning kemudian dibagi dengan kadar kolesterol setelah induksi kuning telur dan dikali dengan 100 % berdasarkan data yang diperoleh. Untuk ekstrak metanol rimpang kunyit putih (*Curcuma zedoaria* (Berg) Roscoe) dengan dosis 0,33 mg/g BB diperoleh persentase 20,64 %. Dari dosis 0,66 mg/g BB diperoleh persentase penurunan 26,19 %. Dari dosis 1 mg/g BB diperoleh persentase penurunan 41,08 %. Untuk kontrol negatif diperoleh persentase penurunan 9,28 %. Untuk Simvastatin sebagai kontrol positif diperoleh persentase penurunan 43,04 %. Hal ini menunjukkan bahwa dosis yang paling tinggi persentase penurunannya yaitu dosis 1 mg/g BB.

Dari data yang diperoleh kemudian diolah dengan perhitungan analisis statistik Rancangan Acak Lengkap (RAL). Dari hasil analisis statistika ini diperoleh nilai KK (Koefisien Keseragaman) sebesar 20,36 %. Jika nilai KK lebih dari 10% pada kondisi homogen (RAL) sehingga dilanjutkan dengan uji Duncan. Uji ini dimaksudkan untuk melihat perbedaan antara 3 jenis sampel dengan kontrol negatif dan kontrol positif. Dimana, nilai F hitung (12,37) lebih besar dari pada taraf kepercayaan 5% (2,61) dan 1% (3,83).

Dari hasil uji Duncan ini, ditemukan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara ketiga konsentrasi ekstrak terhadap kontrol positif, maupun dengan

kontrol negatif. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ekstrak 0,33 mg/g BB, 0,66 mg/g BB dan 1 mg/g BB mempunyai efek yang sama terhadap simvastatin, maupun terhadap Na CMC sebagai kontrol negatif.

Pemberian ekstrak rimpang kunyit putih mampu mengurangi peningkatan kadar kolesterol selama perlakuan. Hal ini dibuktikan karena rimpang kunyit putih mengandung bahan-bahan aktif yang dapat menurunkan kadar kolesterol LDL, salah satunya adalah flavonoid.

Penelitian ini mengingatkan kita tentang adanya tanda-tanda kekuasaan Allah dalam dunia tumbuh-tumbuhan yang memang penuh dengan tanda-tanda yang menunjukkan keagungan dan keperkasaan-Nya. Seperti pada hasil penelitian yang diperoleh membuktikan bahwa terdapat tanaman yang baik untuk dijadikan sebagai obat yaitu tanaman rimpang kunyit putih yang dapat dijadikan sebagai obat penurun kadar kolesterol.

Penelitian ini seolah menjawab firman Allah swt. Dalam QS. Al-Qhashas/ 28:

57

وَقَالُوا إِن نَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُنْخِطُفَ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجَبَىٰ
إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾

Terjemahannya:

"Dan mereka berkata: "Jika kami mengikuti petunjuk bersama kamu, niscaya kami akan diusir dari negeri kami." Dan apakah Kami tidak meneguhkan kedudukan mereka dalam daerah haram (tanah suci) yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam (tumbuh- tumbuhan) untuk menjadi rezki

(bagimu) dari sisi Kami?. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui” (Departemen Agama RI, 2005: 552).

Ayat diatas menyatakan bahwa sebagian diantara kaum musyrikin itu ada yang mengatakan: “Mengapa tidak diberikan kepadanya seperti yang telah diberikan kepada Musa dahulu *dan* ada juga diantara mereka yang berkata: “Jika kami mengikuti secara sungguh-sungguh *petunjuk itu*, yakni agama Islam, dengan mengesahkan Allah dan meninggalkan penyembahan tuhan-tuhan yang disembah leluhur kami serta bergabung *bersamamu*, wahai Nabi Muhammad, yang ajaranmu sangat berbeda dengan kepercayaan masyarakat Arab, *niscaya kami akan diculik*, yakni ditawan dan diusir oleh orang-orang Arab itu, *dari negeri kami*, yakni Mekkah. Harta dan kekuasaan kami akan dirampas. Bahkan, boleh jadi kami dibunuh karena mayoritas masyarakat menentang ajaranmu, sedang kami adalah kaum lemah yang tidak mampu melawan mereka (Shihab. 2002: 628)

Mereka semua tahu wahai Nabi Muhammad saw., bahwa Kami melindungimu bersama pengikut-pengikutmu walau engkau membawa ajaran yang berbeda dengan ajaran masyarakat Arab itu? *Dan*, di sisi lain, bagaimana mereka berucap demikian *padahal tidakkah Kami meneguhkan buat mereka* dengan peneguhan yang demikian mantap, yaitu menjadikan wilayah tempat tinggal mereka sebagai *Haram*, yakni tanah suci Mekkah yang *aman* dari penganiayaan dan pembunuhan, bahkan lebih dari itu, terus-menerus dan senantiasa sepanjang waktu *dihimpun*, yakni didatangkan, *ke sana* secara khusus *buah-buahan dari segala sesuatu*, yakni segala macam tumbuh-tumbuhan, *sebagai rezeki dari sisi Kami* untuk

semua yang tinggal di sana kendati mereka kafir? Jika demikian, bagaimana mungkin Allah mencabut rasa aman dari mereka dan menjadikan mereka terculik dan terbunuh apabila mereka beriman dan memeluk ajaran-Nya yang mereka sadari bahwa ajaran itu baik dan benar? Sungguh, dalih mereka itu tidak logis dan apa yang mereka khawatirkan tidak akan terjadi, *tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui* (Shihab. 2002: 628-629)

Ayat tersebut mengisyaratkan agar manusia mencari dan mempelajari berbagai tumbuhan yang menjadi rezeki yaitu yang memberikan manfaat bagi kehidupan. Tumbuhan menjadi rezeki bagi makhluk hidup karena merupakan bahan pangan, bahan sandang, papan dan bahan-bahan obat-obatan.

Pengetahuan yang akan menuntut manusia untuk menemukan obat-obat yang tersedia di alam, seperti obat dari tanaman. Jika manusia tidak mengembangkan ilmu pengetahuan maka tidak akan pernah tahu adanya obat yang berasal dari tanaman yang biasanya dihiraukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Ekstrak metanol rimpang kunyit putih (*Curcuma zedoaria* Rosc.) dapat menurunkan kadar kolesterol tetapi belum seefektif tablet simvastatin dalam menurunkan kadar kolesterol pada mencit (*Mus musculus*) jantan.
2. Dosis ekstrak metanol Rimpang Kunyit Putih yang paling efektif untuk menurunkan kadar kolesterol pada penelitian ini adalah dosis ke I yaitu 0,33 mg/g BB.
3. Agama Islam mengajarkan manusia untuk senantiasa memanfaatkan dan mengembangkan potensi tumbuh-tumbuhan yang dapat digunakan sebagai obat dengan sebaik mungkin

B. Saran

Diharapkan dapat melanjutkan penelitian dengan dosis yang lebih variatif.

KEPUSTAKAAN

- Afifah, E dan Tim Lentera. *Khasiat dan Manfaat Temulawak: rimpang penyembuh aneka penyakit*; Jakarta: Agromedia Pustaka, 2003.
- Alamatsier, Sunita. *Prinsip Dasar Ilmu Gizi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2001.
- Al-‘Aini, Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad bin Musa bin Ahmad bin Husain Badaruddin. *‘Umdah al-Qari Syarh Shahih al-Bukhari*, Juz. 21. Beirut: Dar Ihya al-Turats, t.th.
- Al-Nawawi, Abu Zakariyya Muhyiddin Yahya bin Syarf. *al-Minhaj Syarh Shahih Mislim al-Hajjaj*, Juz. 14. Cet. II; Beirut: Dar Ihya al-Turats al-‘Arabi, 1392.
- Dalimartha, Setiawan. *36 Resep Tumbuhan Obat*, Depok: Penebar Swadaya, 2008.
- Dalimartha, Setiawan. *Atlas Tumbuhan Obat Indonesia*, Jilid 3, Jakarta: Puspa Swara, 2003.
- Darwis, SN., dkk. *Tumbuhan Obat Famili Zingiberaceae*, Bogor: Pusat Pengembangan Tanaman Industri, 1991.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Semarang: PT Syaamil Qur’an. 2005.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Semarang: PT Syaamil Qur’an. 2001.
- Dirjen POM. *Sediaan Galenik*. Ed. II, Jakarta: Departemen Kesehatan RI Bhakti Husada, 1986.
- Erindra, Raja. *Efek Minyak Atsiri dari Bawang Putih (Allium sativum) terhadap Kadar Albumin Plasma pada Tikus yang Diberi Diet Kuning Telur*. Skripsi. Semarang.
- Farias, R.A.F., Neto, M.F.O., Viana, G.S.B., Rao V.S.N.I. *Effects Of Croton Cajucara Extract On Serum Lipids Of Rats Fed A High Fat Diet*. Phytother Res, 1996.
- Fatmawati, Erni. *“Pengaruh Lama Pemberian Ekstrak Daun Sambiloto (Andrographis paniculata) Terhadap Kadar Kolesterol, HDL, dan*

- Trigliserida Darah Tikus (Rattus norvegicus) Diabetes*". Skripsi, Malang: Fakultas Sains dan Teknologi UIN Malang, 2008.
- Galton, D. and Krone, W. *Hiperlipidaemia in Practice*, London: Gower Medical Publishing, 1991.
- Ganiswarna. *Farmakologi dan Terapi*, Edisi 5, Jakarta: Bagian Farmakologi Fakultas Kedokteran UI, 2009.
- Hadyanto, Lim. *Farmakologi Kardiovaskuler Mekanisme dan Aplikasi Klinis Ed 2*, Jakarta: Sofmedia, 2009.
- Juhaeni. "Pemanfaatan Herba Seledri (*Apium graveolens* L.) untuk Menurunkan Kolesterol dan Lipid dalam Darah Tikus Putih yang diberi Diet Tinggi Kolesterol dan Lemak". Depok: Universitas Indonesia, Makara, sains, vol. 6, no. 2, Agustus 2002.
- Kannel, W.B. *Lipids, Diabetes And Coronary Heart Diseases: Insights From The Framingham Study*. Am Heart J, 1985.
- Katno dan S. Pramono. *Tingkat Manfaat dan Keamanan Tanaman Obat dan Obat Tradisional*. Yogyakarta: UGM, 2009.
- Katzung, B. G. *Farmakologi Dasar dan Klinik*, Buku 2 Edisi 8, Jakarta: Salemba Medica, 2002.
- Kumalasari, N.D. 2005. "Pengaruh Berbagai Dosis Filtrat Daun Putri Malu (*Mimosa pudica*) terhadap Kadar Glukosa Darah pada Tikus (*Rattus norvegicus*)". Skripsi. Malang: Program Studi Pendidikan Biologi Jurusan MIPA FKIP U MM, 2005.
- Lars Heslet.1991.*Kolesterol*. Jakarta: Penerbit Kesaint Blanc.
- Malole MBM dan CSU Pramono. *Penggunaan Hewan-hewan Percobaan di Laboratorium*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Pusat Antar Universitas Bioteknologi IPB, 1989.
- Mahmud, Mahir Hasan. *Mukjizat Kedokteran Nabi*, Jakarta: Qultummedia. 2007.
- Munadia, A. *Pemeriksaan Farmakognostik dan Kadar Abu Tanaman Kunyit Putih*. 1999.
- Rahim. A., dkk. *Farmakognosi I*, Makassar: Penerbit Alauddin Press. 2007.

- Rahman. Afzalur. *Al-Qur'an Sumber Ilmu Pengetahuan*. Terjemahan Arifin., H., M., Drs., M.Ed, Jakarta: Penerbit Bina Aksara. 1989.
- Rita, S.W. *Isolasi, identifikasi, dan Uji Aktivitas Antibakteri Senyawa Golongan Triterpenoid pada Rimpang Temu Putih (Curcuma zedoaria (Berg.) Roscoe)*, Bukit Jimbaran: Jurusan Kimia FMIPA Universitas Udayana, 2010.
- Sabirin Matsjeb. *Kimia Organik II*. Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Depdikbud RI, 1996.
- Sari, Wulan Permata. *Uji Toksisitas Campuran Ekstrak Etanol Daun Sirih (piper betle L) dan Ekstrak Kering Gambir (uncaria gambir R) Terhadap Mencit Jantan. Skripsi*, Jakarta: Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah volume 3*, Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah volume 5*, Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah volume 6*, Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Sofro,A.S.M. *Biokimia*, Yogyakarta: PAU Pangan dan Gizi UGM, 1990.
- Sudewo, Bambang. *Tanaman Obat Populer Penggempur Aneka Penyakit*, Tangerang: Agromedia Pustaka. 2004.
- Sudoyo, Aru W, dkk . *Ilmu Penyakit Dalam*, Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia:, 2006.
- Tjay, Tan Hoan dan Kirana Rahardja. *Obat-Obat Sederhana Untuk Gangguan Sehari-hari*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2012.
- Tirtawanata, T.C. *Makanan dalam Perspektif Al-Qur'an dan Ilmu Gizi*; Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2006.
- Vanderlip, Lynn Sharon. *Mice:Everything about History, Care, Nutrition, Handling and Behavior*. China: Barron's Educational Series Inc, 2001.
- Wardiah, Nur Asdah. *Efek Bawang Putih (Allium sativum) dan Cabe Jawa (Piper retrofractum Vahl.) terhadap Jumlah Limfosit pada Tikus yang Diberi Suplemen Kuning Telur*. Skripsi, Semarang: Universitas Diponegoro, 2009.


Wirahadikusumah, Muhammad. *Biokimia Metabolisme Energi, Karbohidrat, dan Lipid*, Bandung: Penerbit ITB, 1995.

Yamrewaf, dkk. *Ekstraksi Kurkumin Dari Temu*. Yogyakarta: Jurusan Teknik Kimia, Sekolah Tinggi Tekno-logi Nasional, 2004.


Yellia, Mangan. *Cara Bijak Menaklukkan Kanker*, Jakarta: Agromedia Pustaka, 2003.

LAMPIRAN


Lampiran 1. Penyiapan Sampel



Lampiran 2. Ekstraksi Sampel



Lampiran 3. Perlakuan terhadap Hewan Uji



Keterangan:

- I : Ekstrak rimpang kunyit
- II : Ekstrak rimpang kunyit
- II : Ekstrak rimpang kunyit
- IV : Kontrol negatif (NaCMC 1%)
- V : Kontrol Positif (Simvastatin)

Lampiran 4. Perhitungan Dosis dan Pemberian Simvastatin

1. Konversi dosis mencit dan manusia

a. Dosis lazim untuk manusia = 10 mg

b. Faktor konversi untuk mencit (20 g mencit) = 0,0026

c. Dosis untuk mencit 20 g = 10 mg X 0,0026 = 0,026

2. Konversi Simvastatin manusia ke mencit

a. Volume pemberian = 1 ml untuk bobot 30 g BB mencit
(Volume dan BB maksimum)

b. Dosis untuk mencit 30 g = $\frac{30}{20} \times 0,026 \text{ mg} = 0,039 \text{ mg}$

c. Jumlah simvastatin yang dibuat = $0,039 \times 100 \text{ ml} = 3,9 \text{ mg} \sim 4 \text{ mg}$ untuk
100 ml.

3. Perhitungan Simvastatin

a. Berat rata – rata tablet = $\frac{\Sigma \text{ Tablet}}{20} = \frac{2,3655 \text{ g}}{20}$

= 0,118275 g = 118,275 mg

d. Berat yang ditimbang = $\frac{4 \text{ mg}}{10 \text{ mg}} \times 118,275 \text{ mg}$

= 47,31 mg

Jadi didapatkan simvastatin 4 mg ditimbang bobot tablet sebanyak 47,31 mg yang disuspensikan hingga 100 ml menggunakan NaCMC 1%.

Lampiran 5. Konversi Dosis Pada Ekstrak Rimpang Kunyit Putih (*Curcuma zedoaria* (berg) Roscoe)

- Untuk 1% = 1 g/ 100 ml = $\frac{1000 \text{ mg}}{100 \text{ ml}}$
= 10 mg/ml

Jadi, untuk mencit 30 g = 10 mg/30 g
= 0,33 mg/g BB

- Untuk 2% = 2 g/ 100 ml = $\frac{2000 \text{ mg}}{100 \text{ ml}}$
= 20 mg/ml

Jadi, untuk mencit 30 g = 20 mg/30 g
= 0,66 mg/ g BB

- Untuk 3% = 3 g/ 100 ml = $\frac{3000 \text{ mg}}{100 \text{ ml}}$
= 30 mg/ml

Jadi, untuk mencit 30 g = 30 mg/30 g
= 1 mg/ g BB

Lampiran 6. Analisis Statistik

Tabel 5. Analisis Statistik Kadar Kolesterol Rimpang Kunyit Putih (*Curcuma Zedoaria* (Berg) Roscoe) Terhadap Mencit (*Mus Musculus*) Jantan

Perlakuan	Replikasi	Kadar Kolesterol (mg/dL)			Jumlah	Rata-rata
		K ₀	K ₁	K ₂		
Kelompok I Dosis ekstrak 0,33 mg/g BB Mencit	1	149	243	186	578	192,22
	2	122	224	174	520	173,33
	3	111	206	173	490	163,33
	Jumlah	382	673	533	1588	
	Rata-rata	127,33	224,33	177,66		176,29
Kelompok II Dosis ekstrak 0,66 mg/g BB Mencit	1	120	236	167	523	174,33
	2	113	237	179	529	176,33
	3	129	221	166	516	172
	Jumlah	365	694	512	1571	
	Rata-rata	120,66	231,33	170,66		174,22
Kelompok III Dosis ekstrak 1 mg/ g BB Mencit	1	130	247	151	528	176
	2	125	239	141	505	168,33
	3	111	242	137	490	163,33
	Jumlah	366	728	429	1523	
	Rata-rata	122	242,66	143		169,22
Kelompok IV Kontrol (-) NaCMC	1	128	243	220	591	197
	2	132	235	219	586	195,33
	3	120	224	198	542	180,66
	Jumlah	380	702	637	1719	
	Rata-rata	126,66	234	212,33		190,99
Kelompok V Kontrol (+) Simvastatin	1	138	257	115	510	170
	2	133	261	129	523	174,33
	3	120	241	119	480	160
	Jumlah	391	759	363	1513	
	Rata-rata	130,33	253	121		168,11
Jumlah		1884	3556	2474	7914	
Rata-rata						175,76

Keterangan:

K₀ = Kadar Kolesterol AwalK₁ = Kadar Kolesterol Setelah Penginduksian Kuning TelurK₂ = Kadar Kolesterol Setelah Perlakuan

$$\begin{aligned}
 \text{a. Faktor Koreksi (FK)} &= \frac{T_{ij}^2}{A \times B \times R} = \frac{(7914)^2}{45} = 1.391.808,8 \\
 \text{b. JK Total} &= T(Y_{ij}^2) - FK \\
 &= (149^2 + 243^2 + 186^2 + \dots + 119^2) - 1.391.808,8 \\
 &= 1.506.495 - 1.391.808,8 \\
 &= 114.686,2 \\
 \\
 \text{c. Jumlah Kuadrat Perlakuan} &= \frac{\Sigma(\Sigma y_j^2)}{R} - FK \\
 &= \frac{(382^2 + 673^2 + 533^2 + \dots + 363^2)}{3} - FK \\
 &= 1.455.236,33 - 1.391.808,8 \\
 &= 63.427,53 \\
 \\
 \text{d. Jumlah Kuadrat Galat} &= \text{JK Total} - \text{JK Perlakuan} \\
 &= 114.686,2 - 63.427,53 \\
 &= 51.258,67 \\
 \\
 \text{e. Derajat Bebas Total (dbt)} &= (a \times b \times r) - 1 \\
 &= (5 \times 3 \times 3) - 1 = 44 \\
 \\
 \text{f. Derajat Bebas Perlakuan (dbp)} &= a - 1 \\
 &= 5 - 1 = 4 \\
 \\
 \text{Derajat Bebas Galat (dbg)} &= \text{dbt} - \text{dbp} \\
 &= 44 - 4 = 40 \\
 \\
 \text{Kuadrat Tengah Perlakuan} &= \frac{\text{Jumlah Kuadrat Perlakuan}}{\text{dbp}} \\
 &= \frac{63.427,53}{4} = 15.856,88
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Kuadrat Tengah Galat (KTG)} &= \frac{\text{Jumlah Kuadrat Galat}}{\text{dbg}} \\ &= \frac{51.258,67}{40} = 1.281,46 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Koefisien Keseragaman (KK)} &= \frac{\sqrt{\text{KT Galat}}}{\text{rata-rata total}} \times 100\% \\ &= \frac{\sqrt{1.281,46}}{175,76} \times 100\% \\ &= 20,36 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{F Hitung Perlakuan} &= \frac{\text{Kuadrat Tengah Perlakuan}}{\text{Kuadrat Tengah Galat}} \\ &= \frac{15.856,88}{1.281,46} = 12,37 \end{aligned}$$

Tabel 6. Analisis varians efektivitas penurunan kadar kolesterol terhadap mencit (*mus musculus*) jantan.

Sumber keseragaman	Derajat bebas	Jumlah kuadrat	Kuadrat tengah	F Hitung	F Tabel	
					5%	1%
Perlakuan	4	63427,53	15.856,88	12,37**	2,61	3,83
Galat	40	15.792,16	1.281,46			
Total	44	114.686,2				

Keterangan:

** = Sangat Signifikan (F hitung > F 1%)

F Hitung > F Tabel pada taraf kepercayaan 5% dan 1%, artinya ada perbedaan sangat nyata dengan yang lainnya (sangat signifikan).

Lampran 7. Analisis Uji Duncan

a. Nilai S_y

$$S_y = \sqrt{\frac{KTG}{r}} = \sqrt{\frac{1.281,46}{3}}$$

$$= 20,66$$

Tabel 7. Analisis Duncan efektivitas penurunan kadar kolesterol terhadap mencit (*mus musculus*) jantan.

Pelakuan	Rerata	Beda riel pada Jarak P			
		2	3	4	5
Simvastatin	168,11	-			
III	169,22	1,11 ^{Ns}	-		
II	174,22	6,11 ^{Ns}	5 ^{Ns}	-	
I	176,29	8,18 ^{Ns}	2,07 ^{Ns}	2,07 ^{Ns}	-
Na-CMC	190,99	22,8 ^{Ns}	21,77 ^{Ns}	16,77 ^{Ns}	14,7 ^{Ns}
P 0,05 (P,40)		2,86	3,01	3,10	3,17
0,01 (P,40)		3,82	3,99	4,10	4,17
BJND 0,05 (P,40)		59,0876	62,1866	64,046	65,4922
0,01 (P,40)		78,9212	82,4334	84,706	86,1522

ket: ** : Sangat signifikan

* : Signifikan

NS : Tidak Signifikan

Lampran 8. % penurunan kolesterol

Rumus :

$$\% \text{ penurunan} = \frac{\text{Penurunan Kadar Setelah Perlakuan}}{\text{Kolesterol Setelah Induksi}} \times 100\%$$

Ekstrak I :

- Replikasi 1 : $\frac{57}{243} \times 100 \% = 23,45\%$
- Replikasi 2 : $\frac{50}{224} \times 100 \% = 22,32 \%$
- Replikasi 3 : $\frac{33}{204} \times 100 \% = 16,17 \%$

Ekstrak II :

- Replikasi 1 : $\frac{69}{236} \times 100 \% = 29,23 \%$
- Replikasi 2 : $\frac{58}{237} \times 100 \% = 24,47 \%$
- Replikasi 3 : $\frac{55}{221} \times 100 \% = 24,88 \%$

Ekstrak III :

- Replikasi 1 : $\frac{96}{247} \times 100 \% = 38,86 \%$
- Replikasi 2 : $\frac{98}{239} \times 100 \% = 41,00 \%$
- Replikasi 3 : $\frac{105}{242} \times 100 \% = 43,38 \%$

Kontrol negatif (NaCMC) :

- Replikasi 1 : $\frac{23}{243} \times 100 \% = 9,46 \%$
- Replikasi 2 : $\frac{16}{235} \times 100 \% = 6,80 \%$
- Replikasi 3 : $\frac{26}{224} \times 100 \% = 11,60 \%$

Kontrol Positif (Simvastatin) :

- Replikasi 1 : $\frac{142}{257} \times 100 \% = 55,25 \%$
- Replikasi 2 : $\frac{139}{261} \times 100 \% = 53,25 \%$
- Replikasi 3 : $\frac{122}{241} \times 100 \% = 50,62 \%$

Lampiran 8. Gambar



Gambar 1. Rimpang Kunyit Putih



Gambar 2. Strip Test Kolesterol



Gambar 3. Alat Test Kolesterol



Gambar 4. Ekstrak Rimpang Kunyit Putih



Gambar 5. Tablet Simvastatin



Gambar 6. Pengambilan Darah



Gambar 7. Pengukuran Kolesterol



Gambar 8. Pemberian Oral

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Ulfah Fitriyani, kelahiran Samasundu, Polewali Mandar 15 November 1993. Anak ke empat dari enam bersaudara dari pasangan Hj. Tanda dan H. Baharuddin. Telah menyelesaikan pendidikan di SDN 026 Samasundu pada tahun 2005, pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Tinambung hingga pada tahun 2008, pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Majene hingga pada tahun 2011. Masuk Perguruan Tinggi tepatnya di Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar pada tahun 2011 melalui jalur UMB.