

**HUBUNGAN KUALITAS TIDUR DENGAN TEKANAN DARAH PADA
MAHASISWA KEPERAWATAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Keperawatan
Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

NURILMI

70300112063

**PROGRAM STUDI KEPERAWATAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2016**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tiada kalimat yang paling pantas peneliti panjatkan selain puji syukur kehadiran Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia yang tak terhingga sehingga penyusun masih diberi kesempatan dan nikmat kesehatan untuk menyelesaikan suatu hasil karya berupa Skripsi yang berjudul “**Hubungan Kualitas Tidur dengan Tekanan Darah Pada Mahasiswa Keperawatan UIN Alauddin Makassar**”. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah saw. sebagai *sang rahmatan lil alamin* dan para sahabat, *tabi'in*, *tabi'ut tabi'in* serta orang yang senantiasa istiqamah di jalan ini hingga hari akhir. Penelitian dan penyusunan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Keperawatan pada Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Dalam penyusunan Skripsi ini penyusun merasa telah dibantu oleh berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati penyusun menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tuaku tercinta, **Bapak Ramli** dan **Ibu Marwani** atas kasih sayang, doa, bimbingan, semangat dan bantuan moril maupun materilnya serta adikku tersayang, **Syamsul Muarif** atas kebersamaan selama ini yang menjadi motivasi, doa dan semangat, serta segenap keluarga besar yang telah memberikan kasih sayang, arahan serta nasehatnya dalam menghadapi tantangan dan rintangan selama melakukan penyelesaian studi.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada **Ibu Eny Sutria S. Kep., Ns., M. Kes.**, selaku Pembimbing I dan **Ibu Musdalifah S. Kep., Ns., M. Kes** selaku Pembimbing II yang dengan ikhlas dan sabar meluangkan waktu kepada penyusun dalam rangka penyusunan Skripsi baik dalam bentuk arahan, bimbingan dan

pemberian informasi yang lebih aktual demi tercapainya penelitian yang professional dan berbobot. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada **Bapak Dr. Anwar Hafid, S.Kep., Ns., M.Kes.,** selaku Penguji I dan **Ustadz Dr. H. Sadik Sabry, S.Ag., M.Ag.,** selaku Penguji II atas saran, kritik, arahan dan bimbingan yang diberikan sehingga menghasilkan karya yang terbaik dan dapat bermanfaat baik bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat.

Penyusun juga menyadari sepenuhnya selama mengikuti perkuliahan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sampai penyelesaian Skripsi ini. Oleh sebab itu, penyusun merasa patut menghaturkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang turut membantu, khususnya kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. **Bapak Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc, P.hd** selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh staf akademik yang telah membantu selama penyusun mengikuti pendidikan.
3. **Bapak Dr. Muh. Anwar Hafid, S.Kep, Ns., M.Kes,** selaku Ketua Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh staff akademik yang telah membantu selama penyusun mengikuti pendidikan.
4. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Keperawatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah berjasa memberikan bekal pengetahuan untuk memperkaya dan mempertajam daya kritis serta intuisi penyusun.
5. Para mahasiswa dan mahasiswi jurusan keperawatan yang telah membantu dalam penelitian ini.

6. Sahabat seperjuanganku, Rika, Nirwana Jupriadi, Nur Linda, Nurul Hidayah Nur, Risky Mutia Asri, Siti Hardianti Ariana, Husnaeni Ramli, Wahyudi, Gunaldi, Ahmad Rian Arsal, Nur Lia dan Nur Haidah Syam yang telah setia berjuang dan telah memberikan begitu banyak inspirasi, dan motivasi.
7. Mahasiswa Prodi Keperawatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Angkatan 2012 atas kebersamaanya selama ini, baik suka maupun duka selama menjalani perkuliahan hingga selesai.
8. Alumni SMPS DDI Mattoanging Bantaeng angkatan 2006 yang telah memberikan begitu banyak inspirasi, dan motivasi.
9. Serta semua pihak yang telah banyak membantu, dimana nama-namanya tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.

Tidak ada sesuatu terwujud yang dapat penyusun berikan, kecuali dalam bentuk harapan, doa dan menyerahkan segalanya hanya kepada Allah swt. Semoga segala amal ibadah serta niat yang ikhlas untuk membantu akan mendapatkan balasan yang setimpal dari-Nya. Penyusun menyadari bahwa tidak ada karya manusia yang sempurna di dunia ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penyusun mengharapkan masukan baik berupa saran dan kritik yang sifatnya membangun demi penyempurnaan penyusunan skripsi ini selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. *Amin yaa rabbal alamin.*

Gowa, Maret
2016

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	v
ABSTRAK	vi
BAB I PENDAHULUAN	1-14
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Hipotesis.....	8
D. Defenisi Operasional dan Kriteria Objektif	9
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian	11
G. Kajian Pustaka	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15-40
A. Tekanan Darah	15
B. Tinjauan Umum Kualitas Tidur	24
C. Variabel penelitian	39
D. Kerangka Kerja.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	41-49
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	41
C. Populasi dan Sampel	41
D. Teknik Pengambilan Sampel.....	43
E. Instrumen Penelitian	43
F. Metode Pengumpulan Data	45

G. Prosedur Penelitian	45
H. Pengelolaan dan Analisis Data	46
I. Etika Penelitian	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50-61
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	50
B. Hasil Penelitian	51
C. Pembahasan.....	55
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	62-63
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Defenisi Operasional	7
Tabel 2.1 Tekanan darah normal berdasarkan usia.....	20
Tabel 4.1 Distribusi pertanyaan kuesioner PSQI.....	41
Tabel 5.1 Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur Responden.....	49
Tabel 5.2 Distribusi frekuensi nilai kualitas tidur responden.....	50
Tabel 5.3 Distribusi frekuensi tekanan darah responden	50
Tabel 5.4 Tabulasi silang kualitas tidur dengan tekanan darah.....	51
Tabel 5.5 Korelasi kualitas tidur dengan tekanan darah.....	52

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Manset.....	21
Gambar 3.2 Stetoskop.....	21
Gambar 3.3 Tahapan Tidur.....	27
Gambar 3.4 Kerangka Konsep.....	36
Gambar 3.5 Kerangka Kerja.....	37

Abstrak

Nama : Nurilmi

Nim : 70300112063

Judul : Hubungan Kualitas Tidur dengan Tekanan Darah pada Mahasiswa Keperawatan UIN Alauddin Makassar

Menurut *World Health Organization (WHO)*, satu dari tiga orang dewasa di seluruh dunia memiliki tekanan darah tinggi. Proporsi meningkat sejalan dengan bertambahnya usia, yaitu satu dari sepuluh orang berusia 20-an dan 30-an sampai lima dari sepuluh orang berusia 50-an. Berdasarkan *Journal Circulation*, gangguan kualitas tidur dapat mewakili kontributor potensial untuk inisiasi dan perkembangan penyakit kardiovaskular.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kualitas tidur dengan tekanan darah pada mahasiswa keperawatan UIN Alauddin Makassar. Metode penelitian berupa *Deskriptif Koleratif*. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari 2016 pada mahasiswa keperawatan UIN Alauddin Makassar. Analisa data menggunakan uji statistik *Chi square*. Pengumpulan sampel menggunakan metode *Purposive Sampling* dan diperoleh 75 responden.

Berdasarkan perhitungan untuk nilai kualitas tidur didapatkan kualitas tidur sebagian besar mahasiswa keperawatan UIN adalah buruk yaitu sebanyak 72 responden (96%), dan kualitas tidur baik sangat sedikit yaitu 3 responden (4%) sedangkan tekanan darah responden ditemukan bahwa responden paling banyak memiliki tekanan darah normal yaitu sebanyak 51 responden (68%), yang memiliki tekanan darah rendah sebanyak 23 responden (30,7%), dan pada tekanan darah tinggi hanya 1 responden (1.3%).

Hasil uji *Chi square* didapatkan hasil *p value* =0,257 maka *p value* \geq 0,05, yang berarti tidak ada hubungan yang signifikan secara statistik (*p* = 0,257) antara kualitas tidur dengan tekanan darah pada mahasiswa keperawatan UIN Alauddin Makassar.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahasiswa adalah seseorang yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Usia mahasiswa berkisar antara 18-25 tahun, usia 18 tahun sampai 24 tahun merupakan usia dewasa awal (*young adulthood*), (Willis S, 2011).

Pada tahap dewasa muda ada beberapa tugas perkembangan yang harus dipenuhi oleh setiap individu yang berada pada tahap ini. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk Indonesia, jumlah remaja umur 10-24 tahun sekitar 63,4 juta atau 26,8% dari jumlah penduduk Indonesia dan sebanyak 233 juta diantaranya yaitu mahasiswa. Selain jumlahnya yang sangat kompleks seiring dengan masa transisi yang dialami mahasiswa, kelompok umur 10-24 tahun perlu mendapat perhatian khusus karena masih rendahnya pengetahuan tentang tidur dan dampak yang ditimbulkan ketika kurang tidur (Turner dalam Dariyo, 2008),.

Menurut *World Health Organization (WHO)*, satu dari tiga orang dewasa di seluruh dunia memiliki tekanan darah tinggi. Proporsi meningkat sejalan dengan bertambahnya usia, yaitu satu dari sepuluh orang berusia 20-an dan 30-an sampai lima dari sepuluh orang berusia 50-an. Orang dewasa di beberapa negara berpendapatan rendah di Afrika memiliki tekanan darah tinggi dengan persentase tertinggi sebesar lebih dari 40% (*WHO*, 2013).

Redline mengatakan bahwa dokter jantung perlu memberikan perhatian khusus terhadap pasien yang mengalami gangguan tidur, karena gangguan tidur dianggap sebagai salah satu faktor pemicu terjadinya peningkatan tekanan darah, baik pada pasien dewasa maupun pada anak dan remaja. Kualitas tidur dapat mempengaruhi proses homeostasis dan bila proses ini terganggu, dapat menjadi

salah satu faktor meningkatnya risiko penyakit kardiovaskular. Jadi, selain modifikasi gaya hidup (pengaturan diet dan olah raga), kualitas tidur sangatlah penting dalam mempertahankan kesehatan (Andreas, 2011.).

Pada tahun 2013 di Indonesia, untuk usia 15-24 tahun didapatkan prevalensi tekanan darah tinggi sebesar 8,7 % dari keseluruhan penduduk Indonesia, sedangkan berdasarkan jenis kelamin laki-laki mencapai 22,8 % sedangkan wanita mencapai 28,8 %, dan berdasarkan tingkat pendidikan pelajar/mahasiswa yang menderita hipertensi mencapai 22,1 %, sedangkan di Sulawesi Selatan sendiri, penderita hipertensi menduduki peringkat ke 8 dari 33 provinsi di Indonesia yaitu mencapai 28,1 % setelah Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Tengah, Gorontalo, Sulawesi Tengah dan Kalimantan Barat (Riskesdas 2013, 123).

Dunia kesehatan modern kini mengenal istilah *The Triumvirate of Good Health* yang artinya tiga komponen utama kesehatan. Ketiganya adalah kebugaran fisik, keseimbangan nutrisi dan kesehatan tidur. Olah raga dan menjaga menu makanan saja tidak cukup. Tidur memiliki hubungan yang erat dengan kesehatan dan kualitas hidup manusia. Memperbaiki kesehatan tidur dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan (Dement WC, 2010).

Tingkat kecemasan dan tekanan yang tinggi pada mahasiswa juga menyebabkan keadaan tidak bisa tidur pada malam hari. Hal ini membuat universitas sebagai tempat alami untuk berkembangnya masalah dan gangguan tidur di saat mahasiswa berjuang dengan batas waktu tugas kuliah, persiapan untuk ujian dan menghadiri kuliah. Beberapa mahasiswa juga mempunyai pekerjaan paruh waktu atau bahkan pekerjaan waktu penuh. Selain itu juga terdapat penyebab situasional antara lain bersosialisasi setiap malam hari, mengonsumsi minuman beralkohol yang berlebihan, tidak menjaga waktu tidur

yang tetap, tidak melakukan diet yang sehat dan prokrastinasi pada tugas untuk kuliah. Efek dari gaya hidup tersebut adalah jelas sekali akan menyebabkan sering membolos kuliah, bermasalah dengan banyak tugas yang menumpuk, menjadi mudah tersinggung, dan tidak dapat konsentrasi saat kuliah. Deskripsi di atas menunjukkan bahwa gangguan tidur terjadi pada mahasiswa yang berada pada rentang antara masa remaja akhir dan masa dewasa awal (Baso, 2014).

Data akurat masalah kualitas tidur di Sulawesi Selatan belum ada, sebagaimana data masalah kualitas tidur untuk seluruh Indonesia hanya berdasarkan perkiraan, sekitar 10-11,7% dari jumlah penduduk remaja akhir dan masa dewasa awal (Dinkes, 2013).

Kualitas tidur mengacu pada indeks subjektif dari bagaimana tidur yang dialami seseorang, meliputi perasaan istirahat ketika bangun dan kepuasan tidur (Dewald JF, 2010).

Seseorang memiliki siklus siang-malam sekitar 24 jam yang disebut ritme sirkadian. Hal ini sangat mempengaruhi kualitas tidur seseorang. Bila ritme sirkadian seseorang lebih stabil dan konsisten menyebabkan kualitas tidur lebih baik (Breus MJ, 2015).

Berdasarkan *Journal Circulation*, gangguan tidur dan gangguan bernapas saat tidur (*sleep apnea*) dapat mewakili kontributor potensial untuk inisiasi dan perkembangan penyakit kardiovaskular. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Javaheri dan Redline dari *Case Western Reserve School of Medicine Cleveland*, diketahui bahwa terdapat hubungan antara kualitas tidur yang buruk dengan prehipertensi pada remaja, terdapat peningkatan tekanan darah sistolik dan diastolik pada remaja yang memiliki kualitas tidur yang buruk (Javaheri S, 2008).

Kelainan tidur terjadi dalam persentase yang besar pada populasi dan biasanya tidak dibahas sebagai bagian dari evaluasi medis secara lengkap. Kantuk

meningkatkan risiko kecelakaan kendaraan bermotor, kerja, dan mengurangi kinerja dan kualitas hidup. Jika tidak diidentifikasi dan diobati dengan baik, gangguan tidur dapat menyebabkan atau memperburuk gangguan medis dan psikiatris seperti hipertensi, penyakit pembuluh darah koroner atau otak, obesitas, dan depresi. Keinginan membatasi tidur menjadi masalah besar karena peningkatan kompleksitas kehidupan dan ketersediaan hiburan larut malam mendorong waktu tidur yang lambat (Asmarita 2014, 6).

National Heart, Lung, and Blood Institut dari United States Department of Health and Human Services pada tahun 2009 menginformasikan bahwa kurang tidur atau kualitas tidur yang buruk meningkatkan resiko tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan kondisi medis lainnya (Asmarita 2014, 6).

Dalam Al-Qur'an juga di jelaskan tentang penyakit yang berada dalam dada atau jantung yaitu dalam **Q.S Yunus/ 10 : 57**.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى
وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya :

”Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman”.

Ayat ini menegaskan bahwa Al-Qur'an adalah obat bagi apa yang terdapat dalam dada. Penyebutan kata dada yang diartikan dengan hati, menunjukkan bahwa wahyu-wahyu Ilahi itu berfungsi menyembuhkan penyakit-penyakit rohani seperti ragu, dengki, takabur, dan semacamnya. Memang, oleh Al-Qur'an hati ditunjukkan sebagai wadah yang menampung rasa cinta dan benci, berkehendak dan menolak. Bahkan hati dinilai sebagai alat untuk mengetahui. Hati juga yang

mampu melahirkan ketenangan dan kegelisahan serta menampung sifat-sifat baik dan terpuji.

Sementara ulama memahami bahwa ayat-ayat al-Qur'an juga dapat menyembuhkan penyakit-penyakit jasmani. Mereka merujuk kepada sekian riwayat yang diperselisihkan nilai dan maknanya, antara lain yang diriwayatkan oleh Ibn Mardawaih melalui sahabat Nabi, Ibn Mas'ud ra. yang memberitakan bahwa ada seorang yang datang kepada Nabi saw. yang mengeluhkan dadanya. Rasul saw. kemudian bersabda, "Hendaklah engkau membaca al-Qur'an". Makna serupa dikemukakan oleh al-Baihaqi melalui Wa'ilah Ibn al-Asqa'. (Al-Misbah, 2002:102 vol.6).

Pada abad terakhir, jumlah rata-rata waktu tidur orang Amerika telah menurun sekitar 20%. Menurut pedoman durasi tidur yang disarankan oleh *National Sleep Foundation*, kondisi kurang tidur yang didefinisikan sebagai <8 jam untuk anak-anak dan <7 jam untuk orang dewasa, dialami oleh 45% dari anak usia 11-17 tahun dan 37% orang dewasa. Saat ini diperkirakan 50-70.000.000 warga Amerika menderita gangguan tidur yang mempengaruhi fungsi sehari-hari, kesehatan, dan umur panjang. Efek kumulatif dari kurang tidur yang berkepanjangan dan gangguan tidur telah dikaitkan dengan peningkatan mortalitas dan peningkatan risiko untuk berbagai penyakit kronis termasuk depresi, hipertensi, stroke, diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan obesitas (Lowry R, 2011).

Kualitas tidur sangat penting terhadap dunia kesehatan karena dua alasan yang utama. Pertama, keluhan terhadap kualitas tidur menjadi semakin sering. Survei epidemiologi mengindikasikan bahwa 15-35% dari populasi remaja dan orang dewasa, mengeluhkan gangguan kualitas tidur yang sering mereka alami, seperti gangguan memasuki tidur atau gangguan mempertahankan tidur sehingga durasi tidur menjadi memendek (Karakan, et al dalam Albert, 2013). Kedua kualitas

tidur yang buruk dapat dijadikan simptom dan gejala yang penting untuk banyak penyakit tidur medis lainnya (Kripke, et al, dalam Albert, 2013).

Dalam Al-Qur'an juga di jelaskan tentang diciptakannya malam untuk istirahat yaitu dalam **Q.S An-Naml / 27 : 86.**

أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لَيْسَكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّا فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ

يُؤْمِنُونَ

Terjemahnya :

“Apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Kami telah menjadikan malam agar mereka beristirahat padanya dan (menjadikan) siang yang menerangi? Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang beriman.”

Maka Allah Ta'ala berfirman, “apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Kami menjadikan malam agar mereka beristirahat di dalamnya,” di dalam kegelapan malam agar mereka istirahat dari aktivitas mereka dan menenteramkan diri-diri mereka serta beristirahat dari rasa lelah disiang hari. “Dan siang yang menerangi,” yaitu menyinari dan menerangi. Maka dengan sebab itulah kalian beraktivitas untuk mencari kehidupan, usaha, perjalanan, bisnis dan hal-hal lain yang menyangkut urusan yang kalian butuhkan. “Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang beriman,” (Katsir, 2005: 244).

Penelitian ini menggunakan sampel mahasiswa jurusan keperawatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Karena penelitian tentang kualitas tidur pada mahasiswa jurusan keperawatan masih sangat terbatas dan menurut hasil wawancara dari beberapa mahasiswa jurusan keperawatan tentang bagaimana pola istirahat dan tidurnya selama beberapa minggu atau sebulan

terakhir, kemungkinan pola hidup mahasiswa jurusan keperawatan seperti belajar yang dimulai sejak pagi hari hingga dilanjutkan praktikum dan kegiatan di luar kuliah pada sore hari, dan malam harinya dilanjutkan untuk mengerjakan tugas kuliah seperti asuhan keperawatan sehingga dapat menyebabkan kualitas tidurnya menjadi buruk dari hasil pengamatan tersebut peneliti mengambil kesimpulan untuk perlunya dilakukan penelitian lanjutan untuk memperoleh informasi lebih lanjut.

Berdasarkan hasil study pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti dari 10 Mahasiswa S1 Keperawatan UIN Alauddin Makassar yang diwawancarai terdapat 4 mahasiswa yang mengalami masalah gangguan tidur atau dengan kata lain dari 10 mahasiswa tersebut ada 40% mahasiswa yang mengalami masalah pada tidurnya dimalam hari, seperti susah untuk memulai tidur dan susah untuk bangun pagi serta mengeluh merasa pusing dan rasa tidak nyaman di siang hari, itu berarti semakin banyak mahasiswa yang di wawancarai maka semakin banyak pula mahasiswa yang mengeluh mengalami gangguan tidur yang akan di dapatkan dan berdasarkan pengamatan yang di lakukan peneliti di jurusan keperawatan angkatan 2012 UIN Alauddin Makassar, data yang ditemukan yaitu terdapat beberapa mahasiswa yang mengantuk pada saat proses perkuliahan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengetahui hubungan kualitas tidur dengan tekanan darah, sehingga sangat perlu adanya perhatian mengenai masalah ini karena mengingat dampaknya sangat merugikan mahasiswa.

B. *Rumusan Masalah*

Sampai saat ini di Indonesia masih jarang dilakukan penelitian yang berkaitan dengan kualitas tidur dan permasalahannya, terutama di kalangan mahasiswa. Ironisnya, berdasarkan penelitian-penelitian di Amerika Serikat dan Eropa, siswa SMA dan mahasiswa merupakan kelompok yang paling rentan

menderita kurang tidur kronis. Akibatnya mereka mempunyai resiko yang lebih tinggi dalam mengalami dampak negatif yang ditimbulkannya.

1. Bagaimana gambaran kualitas tidur mahasiswa keperawatan UIN Alauddin Makassar.
2. Bagaimana gambaran tekanan darah mahasiswa keperawatan UIN Alauddin Makassar.
3. Apakah terdapat hubungan antara kualitas tidur pada mahasiswa keperawatan UIN Alauddin Makassar dengan tekanan darah.

C. *Hipotesis*

Ha : Terdapat hubungan yang signifikan antara kualitas tidur dari mahasiswa keperawatan UIN Alauddin Makassar dengan tekanan darah.

Ho : Tidak Terdapat hubungan yang signifikan antara kualitas tidur dari mahasiswa keperawatan UIN Alauddin Makassar dengan tekanan darah.

D. *Defenisi Operasional dan Kriteria Objektif*

Variabel	Defenisi Operasional	Alat ukur	Hasil ukur	Skala
Kualitas tidur	Kualitas tidur dalam penelitian ini adalah kualitas tidur mahasiswa yang mengalami gangguan tidur maupun yang tidak.	Kuesioner PSQI (<i>Pittsburg Sleep Quality Index</i>)	Hasil pengukuran dinyatakan dengan skor 0 – 21	Ordinal
Kualitas tidur baik	Apabila seseorang menunjukkan tanda-tanda, memiliki awal tidur yang baik, tidak mengalami mimpi buruk dalam tidur, tidak mengalami masalah dalam tidur dan menghasilkan badan yang segar saat bangun		Baik : Jika skor PSQI ≤ 5	

Kualitas tidur buruk	Apabila memiliki awal tidur yang tidak baik, mengalami mimpi buruk dalam tidur dan merasakan ada bagian tubuh pegal atau badan lemas pada saat bangun pagi.		Buruk : Jika skor PSQI ≥ 5	
Tekanan darah	Tekanan darah pada penelitian ini adalah tekanan darah yang diperoleh pada saat peneliti melakukan pemeriksaan pengukuran tekanan darah pada mahasiswa.	Spigmoma nometer dan stetoskop.	Hasil pengukuran dinyatakan dengan Rendah : Sistol (90 mmHg) Diastol (60 mmHg) Normal : Sistol (100-130 mmHg) Diastol (70-90 mmHg) Tinggi : Sistol (140 mmHg) Diastol (>90 mmHg)	Numerik

Tabel 1.1 Defenisi Operasional

Islam adalah agama yang sempurna. Ia mengajarkan segala hal yang diperlukan oleh umat manusia. Ia memberikan segala tuntunan yang dibutuhkan oleh manusia. Demi kebaikan, demi kemaslahatan manusia. Sehingga siapapun yang mengikuti ajaran islam, ia akan terbimbing dalam kebenaran. Mendapatkan optimisme dalam keyakinannya, tenang jiwanya, damai hatinya dan selamat hidupnya. Kemudian berbahagia di akhirat dengan mendapatkan surga.

Salah satu tuntunan islam yang kadang terabaikan adalah soal mimpi. Padahal, setiap hari manusia tidur dan sering kali bermimpi. Dari segi aspek medis dikatakan bahwa salah satu tanda seseorang mengalami gangguan tidur

adalah ketika mengalami mimpi buruk begitupun dalam islam. Sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam:

وَالرُّؤْيَا ثَلَاثَةٌ فَرُؤْيَا الصَّالِحَةِ بُشْرَى مِنْ اللَّهِ وَرُؤْيَا تَحْزِينٍ مِنَ الشَّيْطَانِ وَرُؤْيَا مِمَّا يُحَدِّثُ الْمَرْءُ نَفْسَهُ (رواه مسلم)

Terjemahnya:

“Mimpi itu ada tiga macam. Yakni mimpi yang baik sebagai kabar gembira dari Allah, mimpi menakutkan atau menyedihkan yang datangnya dari syetan, dan mimpi yang timbul karena ilusi, angan-angan atau khayalan seseorang”.

Hadits ini juga menjelaskan bahwa mimpi yang dialami oleh seseorang ada tiga katagori, yaitu mimpi yang benar sebagai kabar gembira yang datang dari Allah, mimpi duka cita yang datang dari syetan, mimpi karena obsesi seseorang. Artinya mimpi tersebut terjadi karena bawaan pikiran pada waktu dia terjaga.

E. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang hubungan kualitas tidur dengan tekanan darah pada Mahasiswa keperawatan UIN Alauddin Makassar.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui gambaran kualitas tidur pada Mahasiswa Keperawatan UIN Alauddin Makassar.
- b. Mengetahui gambaran tekanan darah pada Mahasiswa Keperawatan UIN Alauddin Makassar.
- c. Mengetahui hubungan kualitas tidur dengan tekanan darah pada Mahasiswa Keperawatan UIN Alauddin Makassar.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk :

1. Bagi Profesi Keperawatan

Bagi tenaga kesehatan di mana penelitian ini memberikan gambaran tentang kualitas tidur yang buruk dapat meningkatkan tekanan darah sehingga dapat direncanakan asuhan keperawatan yang tepat dalam pemberian pelayanan kesehatan bagi mahasiswa keperawatan.

2. Bagi Institusi Pendidikan

Bagi institusi pendidik hasil penelitian ini dapat dijadikan data dasar dalam mengembangkan penelitian anak didik keperawatan selanjutnya, sehingga semakin banyak penelitian terkait kualitas tidur pada mahasiswa.

3. Bagi Masyarakat

Dapat dijadikan sebagai bahan penambah pengetahuan bahwa kualitas tidur yang buruk ternyata dapat mempengaruhi tekanan darah.

G. Kajian Pustaka

Dunia kesehatan modern kini mengenal istilah *The Triumvirate of Good Health* yang artinya tiga komponen utama kesehatan. Ketiganya adalah kebugaran fisik, keseimbangan nutrisi dan kesehatan tidur. Olah raga dan menjaga menu makanan saja tidak cukup. Tidur memiliki hubungan yang erat dengan kesehatan dan kualitas hidup manusia. Memperbaiki kesehatan tidur dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan.¹ Kualitas tidur mengacu pada indeks subjektif dari bagaimana tidur yang dialami seseorang, meliputi perasaan istirahat ketika bangun dan kepuasan tidur. Seseorang memiliki siklus siang-malam sekitar 24 jam yang disebut ritme sirkadian. Hal ini sangat mempengaruhi kualitas tidur seseorang. Bila ritme sirkadian seseorang lebih stabil dan konsisten menyebabkan kualitas tidur lebih baik.

1. Penelitian Deshinta (2010) dengan judul "*Hubungan Antara Kualitas Tidur Dengan Tekanan Darah Pada Remaja Usia 15-17 Tahun Di SMA Negeri 1 Tanjung Morawa*" Dengan hasil kualitas tidur baik sebanyak 67 orang (23,3%) dan kualitas tidur buruk 220 orang (76,7%). Dari seluruh sampel yang diambil di SMA Negeri 1 Tanjung Morawa, yang mengalami peningkatan tekanan darah sistolik di atas 140 mmHg, sebanyak 2 orang (0,69 %) sedangkan yang mengalami peningkatan tekanan darah diastolik di atas 90 mmHg sebanyak 16 orang (5,57 %) . Pada penelitian ini didapatkan bahwa tidak ada perbedaan kualitas tidur yang baik maupun buruk dengan tekanan darah sistolik maupun diastolik ($p > 0,05$) .
2. Penelitian Nova (2012) dengan judul "*Perbandingan Kualitas Tidur Mahasiswa Yang Mengikuti UKM dan Yang Tidak Mengikuti UKM Pada Mahasiswa FIK UI*". Hasil dari penelitian ini adalah:
Hasil Uji Hipotesis Dengan Analisis *Chi-square* memberikan kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan kualitas tidur antara mahasiswa yang mengikuti UKM dan mahasiswa yang tidak mengikuti UKM pada mahasiswa reguler FIK UI. Terdapat faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam tidur yang menyebabkan tidak adanya perbedaan kualitas tidur antara dua kelompok mahasiswa. Status sebagai civitas akademika dan lingkungan fisik seperti tempat tinggal, suhu dan cahaya mempengaruhi kualitas tidur mahasiswa.
3. Penelitian Vina (2011) dengan judul "*Kualitas Tidur dan Faktor-faktor Gangguan Tidur pada Penderita Hipertensi*". Penelitian ini menggunakan desain deskriptif dengan metode pengambilan sampel secara purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah 35 orang penderita hipertensi yang bertempat tinggal di wilayah kerja Puskesmas Medan

Johor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden tidak dapat tidur dengan baik yang dapat dilihat dari total waktu tidur pada malam hari 5-6 jam (37%), lama waktu yang dibutuhkan untuk tertidur 31-60 menit (37%) dan frekuensi terbangun 1-2 kali (60%). Dan mayoritas responden mengalami faktor-faktor gangguan tidur baik fisik seperti pusing (86%), rasa tidak nyaman (83%), sulit bernafas (37%), sukar tidur (60%), mudah lelah (80%), maupun faktor lingkungan seperti kebisingan (57%), sorot lampu ruangan yang terlalu terang (43%) dan suhu ruangan yang terlalu panas (77%). Sehingga diperlukan adanya penanganan untuk mengatasi kualitas tidur yang buruk dan faktor-faktor gangguan tidur pada penderita hipertensi.

4. Penelitian Destiana (2012) dengan judul “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Tidur Pada Pekerja Shift di PT. Krakatau Tirta Industri Cilegon*” penelitian ini menggunakan deskriptif koleratif dan teknik pengambilan sampel dengan cara total sampling. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 70 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja *shift* memiliki kualitas tidur yang buruk (64,3%) dan adanya hubungan kualitas tidur dengan penyakit fisik (p value=0,020, α =0,05). Rekomendasi bagi pekerja diperlukan pelayanan kesehatan untuk mengatasi masalah penyakit fisik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tekanan Darah

1. Pengertian Tekanan Darah

Tekanan darah adalah tenaga yang digunakan darah untuk melawan dinding pembuluh. Tekanan maksimum darah digunakan pada dinding arteri ketika ventrikel kiri pada jantung mendorong darah melalui katub aorta ke dalam aorta selama systole. Tekanan tertinggi tersebut dinamakan sistolik. Pada orang dewasa yang sehat normalnya adalah 120 mmHg (Eviana S,2012).

Ketika jantung istirahat di antara denyutan (diastole), maka tekanan akan menurun. Tekanan terendah pada dinding arteri pada saat ini disebut tekanan diastolik. Pada orang dewasa normalnya adalah tekanan diastolik. Sebagai contoh tekanan darah 120/80 mmHg, maka 120 adalah tekanan sistolik dan 80 adalah tekanan diastolik (Eviana S, 2012).

Perbedaan antara tekanan sistolik dan diastolik adalah tekanan nadi, jika tekanan nadi kecil menunjukkan adanya *strok volume* yang kecil atau peningkatan resistensi perifer atau keduanya (Eviana S, 2012).

2. Mekanisme Pengaturan Tekanan Darah

Berikut merupakan faktor-faktor yang terlibat dalam mempertahankan tekanan darah. Adanya perubahan dari tekanan darah normal dapat menghasilkan gangguan pada faktor-faktor di bawah ini baik sendiri atau kombinasi (Eviana S, 2012).

a. Resistensi perifer

Setiap darah meninggalkan jantung atau diedarkan melalui suatu ikatan dari pembuluh darah yang terdiri atas arteri, arteriole (cabang arteri kecil), kapiler, dan vena. Arteriole berbentuk selang yang elastis dengan kapasitas berkontraksi

atau dilatasi untuk mengatur distribusi darah ke berbagai organ, jaringan atau sel. Secara normal, arteriole dalam keadaan tidak sepenuhnya berkontraksi, dalam arti kata tidak secara total berkontraksi ataupun relaksasi. Keadaan semikontraksi ini disebut resisten perifer. Resistensi perifer menimbulkan suatu keadaan hambatan aliran darah yang relatif konstan. Resistensi perifer adalah salah satu dari faktor utama yang mempengaruhi tekanan darah.

b. Pemompaan jantung

Ketika terjadi peningkatan darah yang dipompakan ke dalam arteri (seperti ketika curah jantung meningkat), maka arteri akan lebih membesar (menggelembung), menghasilkan peningkatan tekanan darah. Ketika darah yang dipompakan ke dalam arteri sedikit, maka tekanan darah akan turun.

c. Volume darah

Ketika volume darah rendah, seperti yang terjadi pada peredaran atau dehidrasi, tekanan darah akan rendah dikarenakan terjadi penurunan cairan dalam arteri. Peningkatan jumlah darah meningkatkan tekanan karena pada saat ini akan terdapat peningkatan volume cairan yang dapat menimbulkan tekanan darah arteri.

d. Viskositas darah

Suatu keadaan pekat/ kepekatan darah. Viskositas darah tergantung dari proporsi sel darah dalam plasma. Semakin pekat darah, maka tekanan darah akan semakin tinggi. Hal ini terjadi karena jantung membutuhkan kekuatan yang lebih untuk menggerakkan cairan yang pekat melalui sistem sirkulasi.

e. Elastisitas dinding pembuluh darah

Arteri merupakan jaringan yang elastis yang mempunyai kemampuan meregang/ memanjang dan membesar/ menggelembung. Makin elastis, maka makin kecil tekanan yang diperlukan karena resistensi makin kecil. Seiring

dengan bertambahnya usia, maka dinding arteriole menjadi lebih elastis, yang mana mengganggu kemampuan elastisitas pembuluh darah untuk meregang/memanjang dan membesar.

Mengenai sistem jantung, darah dan sirkulasinya, seorang penulis menyebut tentang sebuah ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa dalam **Q.S Qaaf / 50 : 16 .**

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ^ط وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبَلٍ

الْوَرِيدِ

Terjemahnya :

“Dan Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya”.

Allah berfirman: “dan sesungguhnya” Aku bersumpah bahwa “kami”, yakni Allah dengan kuasa-Nya bersama ibu bapak yang dijadikan-Nya sebagai perantara “telah menciptakan manusia”, serta memelihara sampai waktu yang ditentukan baginya, “dan kami”, yakni Allah serta malaikat-malaikat yang ditugaskan mendampingi manusia, senantiasa “mengetahui” dari saat ke saat “apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami” bersama malaikat-malaikat – dengan pengetahuan Kami itu – “lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya” sendiri kendati setiap manusia amat dekat kepada urat leher masing-masing. (Al-Misbah, 2002 : 290, Vol.13) .

Ini menunjukkan relasi antara Allah swt. dengan hamba-Nya, sekaligus mengisyaratkan pentingnya pembuluh darah di leher dan hubungannya dengan jantung.

3. Faktor yang Mempengaruhi Tekanan Darah

Menurut (Audrey, Berman dkk.2009). ada 9 faktor yang mempengaruhi tekanan darah:

a. Usia

Bayi baru lahir memiliki tekanan sistolik rata-rata 73 mmHg. Tekanan sistolik dan diastolik meningkat secara bertahap sesuai usia hingga dewasa. Pada lansia, arterinya lebih keras dan kurang fleksibel terhadap tekanan darah. Hal ini mengakibatkan peningkatan sistolik. Tekanan diastolik juga meningkat karena dinding pembuluh darah tidak lagi retraksi secara fleksibel pada penurunan tekanan darah.

b. Jenis Kelamin

Wanita umumnya memiliki tekanan darah lebih rendah daripada pria yang berusia sama, hal ini lebih cenderung akibat variasi hormon. Setelah menopause, wanita umumnya memiliki tekanan darah yang lebih tinggi dari sebelumnya.

c. Olahraga/ Aktivitas Fisik

Aktivitas fisik meningkatkan tekanan darah. Untuk mendapatkan pengkajian yang dapat dipercaya dari tekanan darah saat istirahat, tunggu 20 hingga 30 menit setelah berolahraga.

d. Obat-obatan

Ada banyak obat dapat meningkatkan atau menurunkan tekanan darah.

e. Stress

Stimulasi sistem saraf simpatis meningkatkan curah jantung dan vasokonstriksi arteriole, sehingga meningkatkan hasil tekanan darah.

f. Ras

Pria Amerika Afrika berusia di atas 35 tahun memiliki tekanan darah yang lebih tinggi dari pada pria Amerika Eropa yang memiliki usia yang sama.

g. **Obesitas**

Obesitas baik pada masa anak-anak maupun dewasa merupakan faktor predisposisi hipertensi.

h. **Variasi Diurnal**

Tekanan darah umumnya paling rendah pada pagi hari, saat laju metabolisme paling rendah, kemudian meningkat sepanjang hari dan mencapai puncaknya pada akhir sore atau awal malam hari.

i. **Demam/ Panas/ Dingin**

Demam dapat meningkatkan tekanan darah karena peningkatan laju metabolisme. Namun, panas eksternal menyebabkan vasodilatasi dan menurunkan tekanan darah. Dingin menyebabkan vasokonstriksi dan meningkatkan tekanan darah.

4. Lokasi Pemeriksaan Tekanan Darah

Pemeriksaan tekanan darah biasanya pada lengan tangan dengan menggunakan arteri brakhialis dan stetoskop standar. Pengkajian tekanan darah pada paha dengan menggunakan arteri popliteal biasanya diindikasikan pada situasi di bawah ini: (Audrey, Berman dkk. 2009).

- a. Tekanan darah tidak dapat diukur pada kedua lengan (misalnya, karena luka bakar, trauma atau mastektomi bilateral).
- b. Tekanan darah disatu sisi paha harus dibandingkan dengan paha di sisi lainnya.
- c. Manset tekanan darah terlalu lebar untuk eksremitas atas.

5. Metode Pengukuran Tekanan Darah

Pengukuran tekanan darah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

a. Metode Palpasi (Metode, *Riva Rocci*)

Manset dipasang ketat dan sempurna pada lengan atas. Saluran karet dari manset kemudian dihubungkan dengan manometer. Sekarang rabalah arteri radialis pada pergelangan tangan dan naikkan tekanan dalam manset dengan memompa sampai denyut nadi (*arteri radialis*) tidak teraba lagi. Tekanan dalam manset kemudian diturunkan secara perlahan-lahan dengan memutar tombol pada pompa dengan kecepatan kira-kira 3 mm/ detik. Saat dimana denyut arteri radialis teraba kembali menunjukkan tekanan darah sistolik. Metode palpasi harus dilakukan sebelum melakukan metode *auskultasi* untuk menentukan tinggi tekanan yang diharapkan.

b. Metode Auskultasi

Metode ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang dokter Rusia yaitu *Korotkoff* pada tahun 1905. Tekanan sistolik dan diastolik dapat diukur dengan metode ini yaitu dengan mendengar (*Auskultasi*) bunyi yang timbul pada arteri brakhialis yang disebut bunyi *korotkoff*. Bunyi ini timbul akibat timbulnya aliran turbulen dalam arteri yang disebabkan oleh penekanan manset pada arteri tersebut. Dalam cara *auskultasi* ini, harus diperhatikan jarak antara manset dan tempat meletakkan stetoskop, paling kurang 5 cm. Mula-mula rabalah arteri brakhialis untuk menentukan tempat meletakkan stetoskop, kemudian pompalah manset sehingga tekanannya melebihi tekanan sistolik (yang telah diketahui dari metode palpasi). Turunkan tekanan manset perlahan-lahan sambil meletakkan stetoskop di atas arteri brakhialis pada siku. Mula-mula tidak terdengar bunyi kemudian akan terdengar bunyi mengetuk yaitu ketika darah mulai melewati arteri yang tertekan

oleh manset sehingga terjadilah turbulensi. Bunyi yang terdengar disebut bunyi *korotkoff* dan dapat dibagi dalam lima fase yang berbeda :

Fase I : timbulnya dengan tiba-tiba suatu bunyi mengetuk yang jelas dan makin lama makin keras sewaktu tekanan menurun 10-14 mmHg berikutnya, ini disebut pula nada letupan.

Fase II : bunyi berubah kualitasnya menjadi bising selama penurunan tekanan 15-20 mmHg.

Fase III: bunyi sedikit berubah dalam kualitas tetapi menjadi lebih jelas tekanan 5-7 mmHg berikutnya.

Fase IV: bunyi meredam (melemah) selama penurunan 5-6 mmHg berikutnya. Setelah itu bunyi menghilang.

Fase V : titik dimana bunyi menghilang.

Permulaan dari fase I yaitu dimana bunyi mula-mula terdengar merupakan tekanan sistolik.

Permulaan fase IV atau V merupakan tekanan diastolik, dengan perbedaan sebagai berikut : fase IV terjadi pada tekanan 7-10 mmHg lebih tinggi daripada tekanan diastolik intra arterial yang diukur secara langsung.

Fase V terjadi pada tekanan yang sangat mendekati tekanan diastolik intra arterial pada keadaan istirahat. Pada keadaan latihan otot atau keadaan meningkatkan aliran darah, maka fase V jauh lebih rendah dari tekanan diastolik yang sebenarnya. Pada anak-anak fase IV lebih cepat digunakan sebagai indeks tekanan diastolik.

Hasil pengukuran tekanan darah adalah sistolik dan diastolik. Nilai sistolik diambil dari *korotkoff* fase I, nilai diastolik diambil dari *korotkoff* fase V. Kecuali pada anak kecil dan pada keadaan terus terdengarnya bunyi walaupun permukaan

air raksa sudah nol. Pada dua keadaan ini dapat digunakan *korotkoff* fase IV untuk pencatatan nilai diastolik (Rosdianah, 2012).

6. Tekanan Darah Normal

Sangat penting mengetahui tekanan darah normal seseorang karena adanya perbedaan tekanan darah pada setiap individu. Peningkatan atau penurunan sampai 20-30 mmHg pada tekanan darah seseorang adalah bermakna bahkan walaupun itu masih dalam rentang normal.

Perkiraan tekanan darah normal berdasarkan kelompok usia (Eviana S dan Deswani Kasim, 2012) :

Usia	Rata-Rata Tekanan Darah Normal
Bayi Baru Lahir	40 mmHg sistolik
1 Bulan	85/54 mmHg
1 Tahun	95/65 mmHg
6 tahun	105/65 mmHg
10-13 Tahun	110/65 mmHg
14-17 Tahun	120/80 mmHg
18 Tahun Ke Atas	120/80 mmHg

Tabel 2.1 Tekanan Darah Normal Berdasarkan Usia

7. Alat Pengukur Tekanan Darah

Spigmomanometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tekanan darah. Bagian-bagian dari spigmomanometer adalah sebagai berikut :

a. Manometer

Ada 2 macam manometer yaitu manometer aneroid dan manometer merkuri. Pada saat awal pengukuran, air raksa harus berada pada angka 0 (nol) agar mendapatkan hasil yang akurat.

b. Manset

Manset mempunyai ukuran yang berbeda-beda dan penggunaan ukuran ini berdasarkan diameter lingkaran lengan atas. Adapun ukuran lebarnya 20% lebih lebar dari ukuran diameter lingkaran lengan atas.

Gambar 3.1 Manset



Selain spigmomanometer, alat yang juga digunakan adalah stetoskop, terdiri atas *earpiece*, tabung, dan *chestpiece* (terdiri atas bell dan diaphragma). *Earpiece* harus terletak nyaman ditelinga. Tabung panjangnya antara 20 sampai dengan 40 cm. Ukuran yang lebih panjang dapat mengakibatkan perubahan transmisi suara. Diaphragma menyalurkan frekuensi suara yang tinggi seperti yang dihasilkan oleh paru-paru maupun usus. Bila diaphragma diletakkan pada tubuh pasien, suara yang dihasilkan oleh bagian tubuh akan menggetarkan diaphragma, menciptakan tekanan gelombang akustik yang berjalan sampai ketabung lalu ketelinga pendengar. Bell dari stetoskop memperkuat suara frekuensi rendah seperti yang dihasilkan oleh jantung dan darah dalam pembuluh darah. Bila “bell” diletakkan pada tubuh pasien, getaran secara langsung memproduksi gelombang tekanan akustik yang berjalan ketelinga pendengar (Eviana S, 2012).

Gambar 3.2 Stetoskop



B. Tinjauan Umum Kualitas Tidur

1. Defenisi

Tidur merupakan suatu keadaan tidak sadar dimana persepsi dan reaksi individu terhadap lingkungan menurun atau hilang, dan dapat dibangunkan kembali dengan indra atau rangsangan yang cukup. Tidur diperlukan untuk menjaga keseimbangan mental emosional, fisiologis, dan kesehatan. Tidur tidak dapat diartikan sebagai manifestasi deaktivasi sistem saraf pusat. Sebab pada orang yang tidur, sistem saraf pusatnya tetap aktif dalam sinkronisasi terdapat neuron-neuron substansia retikularis dari batang otak (Asmadi, 2008).

Tidur didefenisikan sebagai suatu keadaan bawah sadar saat orang tersebut dapat dibangunkan dengan pemberian rangsang sensorik atau dengan rangsang lainnya. Tidur harus dibedakan dengan koma yang merupakan keadaan bawah sadar saat orang tersebut tidak dapat dibangunkan dengan pemberian rangsangan (Guyton & Hall, 2006).

2. Fisiologi Tidur

Tidur merupakan proses fisiologi yang berulang dalam periode tertentu. Pengaturan siklus tidur merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mempertahankan keseimbangan. Mekanisme homeostasis dalam siklus tidur berhubungan dengan aktivitas sel-sel neuron dalam batang otak serta peran dari *neurotransmitter* yang diproduksi *hipotalamus*. Waktu tidur dikontrol oleh *suprachiasmatis nukleus* (SCN) yang menyebabkan timbulnya rasa mengantuk ketika malam hari. Pengaturan siklus tidur dan bangun sangat mempengaruhi fungsi tubuh dan respon tingkah laku (Loriz, 2004).

Siklus tidur terdiri dari tidur *Non Rapid Eye Movements* (NREM) dan tidur *Rapid Eye Movements* (REM). Tidur NREM merupakan 75-80 % dari waktu tidur secara keseluruhan dan tidur REM sekitar 20-25 % total waktu tidur yang

bervariasi antara individu yang satu dengan yang lain. Rentang waktu siklus tidur mulai dari NREM sampai dengan REM memerlukan waktu kurang lebih 90-100 menit. Pada orang dewasa normal, tidur REM meningkat pada malam hari dan merupakan sepertiga dari waktu tidur (Loriz, 2004).

Selama periode tidur NREM, terjadi beberapa perubahan fisiologis. Perubahan fisiologis yang terjadi selama periode tidur NREM diantaranya adanya penurunan suhu tubuh, sekresi urin berkurang, denyut jantung dan frekuensi pernafasan menjadi lebih pelan dan teratur. Sedangkan pada periode tidur REM frekuensi dan denyut jantung lebih cepat dan tidak teratur, aliran darah ke otak meningkat dimana frekuensi pernafasan, denyut jantung dan tekanan darah sangat bervariasi diantara individu. Selama 2 (dua) jam pertama periode tidur terjadi peningkatan sekresi hormon pertumbuhan, hormon *adrenokortikotropin* (ACTH) hormon kortisol disekresi selama pertengahan waktu tidur (Loriz, 2004).

3. Fungsi Tidur

Periode tidur merupakan bagian dari proses mempertahankan fungsi fisiologis normal seperti menjaga keseimbangan mental, emosional, dan kesehatan. selain itu, stress pada paru, sistem kardiovaskular, endokrin, juga menurun aktivitasnya, tidur juga mempengaruhi metabolisme glukosa dimana kurang tidur memiliki efek yang berbahaya pada metabolisme karbohidrat (Iyer, 2012).

Al Qur'an adalah petunjuk terbaik bagi umat manusia. Hal-hal yang sangat penting bagi kebaikan dan kesejahteraan bagi manusia di dunia dan di akhirat tidak luput dibicarakan oleh Al Qur'an, termasuk masalah tidur yang tidak mungkin dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Tentang tidur dan fungsinya, Al Qur'an menjelaskan dengan bahasa yang ringkas, indah namun sarat makna.

Di dalam Q.S An Naba' / 78 : 9, dijelaskan.

وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا

Terjemahnya :

“dan Kami menjadikan tidurmu untuk istirahat”.

Di antara pengaturan Allah terhadap manusia ialah menjadikan tidur sebagai istirahat dan menghentikan mereka dari berpikir dan beraktivitas. Dia menjadikan mereka dalam keadaan yang tidak mati dan tidak pula hidup, untuk mengistirahatkan fisik dan saraf-sarafnya. Juga untuk memulihkan tenaga yang dikeluarkannya pada saat jaga, bekerja, dan sibuk dengan urusan kehidupan.

Semua ini terjadi dengan cara yang menakjubkan yang manusia tidak mengerti caranya. Tidak ada andil sedikitpun iradah manusia didalam hal ini, dan tidak mungkin ia mengetahui bagaimana hal ini berjalan dengan sempurna sedemikian rupa. Ketika dalam keadaan jaga pun, ia tidak mengetahui bagaimana cara kerjanya pada saat tidur. Apalagi dalam keadaan tertidur. Sudah tentu ia tidak mengetahui keadaan ini dan tidak dapat memperhatikannya.

Di dalam tidur pun terdapat rahasia-rahasia yang tidak berkaitan dengan kebutuhan fisik dan saraf. Yaitu, berhentinya ruh dari melakukan pergulatan hidup yang keras. Ketenangan mengunjungnya sehingga ia meletakkan senjata dan meninggalkan kebunnya, senang ataupun tidak senang. Ia menyerah kepada saat kedamaian yang penuh keamanan, yang dibutuhkan setiap orang sebagaimana kebutuhannya terhadap makanan dan minuman. (Fi Zhilalil Qur'an, 2001:149, Jilid 12)

Hal ini sejalan dengan prinsip kesehatan, dimana tidur yang cukup, khususnya di malam hari, dapat memberikan waktu untuk perbaikan dan

penyembuhan sistem tubuh. Tidur yang berkualitas dapat menyebabkan seseorang bangun dengan segar, penuh semangat serta bersiap untuk menjalani aktifitas keseharian. (Potter & Perry, 2005)

Energi yang tersimpan saat tidur diarahkan untuk fungsi-fungsi seluler yang penting. Secara umum terdapat dua efek fisiologis tidur (Uliyah & Hidayat, 2006).

- a. Efek pada sistem saraf yang diperkirakan dapat memulihkan kepekaan normal dan keseimbangan diantara berbagai susunan saraf.
- b. Efek pada struktur tubuh dengan memulihkan kesegaran dan fungsi organ dalam tubuh, mengingat terjadinya penurunan aktifitas organ-organ tubuh tersebut selama tidur.

4. Tingkatan Tidur Normal

Waktu dan tingkatan tidur normal.

- a. Waktu Tidur Normal

Tidur pada remaja-dewasa muda 16-30 tahun, mempunyai pola yang berbeda dibandingkan usia lainnya. Ini disebabkan oleh perubahan hormonal yang terjadi di akhir masa pubertas. Pada masa ini mereka mengalami pergeseran irama sirkadian, sehingga jam tidurnya bergeser secara umum kebutuhan tidur meningkat menjadi 5-8 jam perharinya. Tetapi waktu tidurnya berubah rasa kantuk baru menyerang sekitar tengah malam, dimana orang lain sudah tertidur. Saat orang lain mulai mengantuk pada pukul 12:00 atau 22:00, orang muda justru baru bersemangat untuk berkarya, baik itu belajar atau menyelesaikan pekerjaan pada jam tersebut. Kebutuhan tidur pada usia dewasa muda yaitu 7-8 jam sehari, pada usia dewasa pertengahan kebutuhan tidur sekitar 7 jam sehari, dan pada usia dewasa tua kebutuhan tidur sekitar 6 jam namun lama tidur pada usia ini sudah tidak menentu lagi (Asmadi, 2008).

b. Tingkatan Tidur Normal

Tidur yang normal dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu periode terjaga atau bangun, tidur NREM atau tidur REM. Tidur NREM atau REM merupakan komponen utama tidur yang adekuat serta penting untuk mempertahankan fungsi tubuh sehari-hari. Selama periode tidur NREM, hormon disekresi untuk meningkatkan pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh. Sedangkan tidur REM merupakan periode tidur yang aktif dan kadang disertai adanya mimpi. Tidur REM yang adekuat berperan dalam mengorganisasi informasi, proses belajar dan menyimpan memori jangka panjang (Loriz, 2004).

1) Periode Terjaga (Wakefulness)

Selama periode terjaga ditandai dengan mata terbuka dan adanya respon individu terhadap lingkungan sekitarnya. Selain itu individu tampak rileks selama periode ini dan disertai dengan mata yang tertutup (Loriz, 2004).

2) Periode Tidur NREM (75%)

Periode tidur NREM dimulai dari tidur ringan sampai tidur dalam. Tidur NREM berhubungan dengan fungsi aktivitas otot (Loriz, 2004). Metabolisme dan aliran darah meningkat terutama pada daerah otak selama periode tidur dibandingkan saat terbangun seperti sistem limbik yang berhubungan dengan respon emosi dan daerah yang berhubungan dengan fungsi visual (Loriz, 2004).

Tidur NREM terdiri dari 4 tahap dimana masing-masing tahap menunjukkan tingkat kedalaman tidur dengan karakteristik yang berbeda-beda.

Adapun tahap-tahap periode tidur NREM adalah sebagai berikut :

a) Tahap 1 (5% NREM)

Tahap tidur yang berlangsung beberapa menit dan ditandai adanya penurunan aktivitas fisik, tanda-tanda vital dan metabolisme, mata mulai

menutup, perasaan lebih rileks, pikiran hilang timbul dan merasa seperti melayang, pada tahap ini individu mudah untuk dibangunkan dan ketika terbangun merasa seperti mimpi, disebut juga dengan tidur ringan yang ditandai dengan kekuatan otot dan gerakan mata menurun (Loriz, 2004).

b) Tahap 2 (12% NREM)

Tahap kedua terjadi selama 10-20 menit, ditandai dengan gerakan mata berkurang, keadaan yang lebih rileks serta masih mudah untuk dibangunkan (Loriz, 2004).


c) Tahap 3 (12% NREM).

Tahap ini disebut dengan tidur dalam yang berlangsung sekitar 15-30 menit, ditandai dengan otot sangat rileks disertai dengan adanya penurunan tanda-tanda vital meliputi suhu, tekanan darah, denyut nadi dan frekuensi pernafasan. Pada tahap ini individu sulit untuk dibangunkan dan tampak jarang bergerak (Loriz, 2004).

d) Tahap 4 (13% NREM).

Tahap tidur yang lebu dalam dan sulit untuk dibangunkan, disertai adanya penurunan tanda-tanda vital, otot sangat rileks, berlangsung sekitar 13-30 menit dan pada tahap ini individu dapat mengalami tidur berjalan dan adanya ketidakmampuan untuk menahan kencing (Loriz, 2004).

Gambar 3.3 Tahapan Tidur



3) Periode Tidur Rem (20-25%)

Tidur REM merupakan 20-25% dari siklus tidur. Tidur REM umumnya terjadi sekitar 90 menit setelah tidur bersama siklus tidur NREM sepanjang malam hari yang ditandai adanya gerakan mata yang cepat, kelopak mata tertutup, pernafasan lebih cepat, tidak teratur dan dangkal, denyut jantung dari tekanan darah meningkat, kekuatan otot lengan dan kaki menurun (Loriz, 2004).

5. Perubahan Fisiologis Selama Tidur

Perubahan fisiologis yang terjadi selama periode tidur antara lain adalah adanya penurunan suhu tubuh, sekresi urine meningkat, irama pernafasan dan denyut nadi menurun yang terjadi selama aperiode tidur NREM. Sedangkan perubahan fisiologis yang terjadi selama periode tidur REM adalah adanya peningkatan aliran darah ke otak, irama pernafasan tidak teratur, perubahan denyut jantung dan tekanan darah, metabolisme meningkat. Peningkatan sekresi hormon pertumbuhan terjadi selama dua jam pertama periode tidur. Sekresi hormon kortisol dan ACTH terjadi pada akhir periode tidur. Menurut Colten dan Altevogt (2006) perubahan fisiologis yang terjadi selama aperiode tidur adalah sebagai berikut :

a. Kardiovaskuler

Perubahan pada tekanan darah dan denyut jantung terkait dengan aktivitas sistem saraf otonom.

b. Aktifitas sistem saraf simpatik

Aktivitas sistem saraf simpatik mengalami penurunan selama periode tidur NREM.

c. Pernafasan

Perubahan frekuensi pernafasan dan fungsi ventilasi terjadi selama tidur dan meningkat menjadi lebih cepat terutama selama periode tidur REM.

d. Aliran darah otak

Tidur NREM berhubungan dengan penurunan aliran darah dan metabolisme. Metabolisme dan aliran darah meningkat terutama pada daerah otak selama periode tidur dibandingkan saat terbangun seperti sistem limbik yang berhubungan dengan respon emosi dan darah yang berhubungan dengan fungsi visual.

e. Ginjal

Selama periode tidur terjadi penurunan ekskresi natrium, kalium, klorida dan kalsium yang menyebabkan penurunan aliran urine. Perubahan fungsi ginjal yang terjadi selama periode tidur sangat kompleks diantaranya adanya perubahan aliran darah ginjal, filtrasi glomerulus, sekresi hormon dan stimulasi saraf simpatik.

f. Endokrin

Perubahan fungsi endokrin yang terjadi selama periode tidur diantaranya berhubungan dengan hormon pertumbuhan (GH), hormon tiroid dan sekresi hormon melatonin. Sekresi hormon pertumbuhan terjadi beberapa jam setelah tidur. Sekresi hormon tiroid terjadi pada saat menjelang tengah malam, sedangkan hormon melatonin yang menekan rasa kantuk merupakan pengaruh dari aktivitas *suprachiasmatic nucleus* (SCN) yang dipengaruhi oleh siklus keadaan gelap dan terang dan ditekan oleh cahaya yang terang.

6. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Dan Kuantitas Tidur

Pemenuhan kebutuhan istirahat dan tidur setiap orang berbeda-beda, ada yang kebutuhannya terpenuhi dengan baik, adapula yang mengalami gangguan. Banyak faktor yang mempengaruhi kualitas maupun kuantitas tidur, diantaranya

adalah penyakit, lingkungan, kelelahan, gaya hidup, stress emosional, alkohol, diet, merokok dan medikasi (Mubarak & Chayatin, 2007).

a. Penyakit

Beberapa penyakit dapat mempengaruhi pola tidur diantaranya adalah asma, penyakit jantung koroner, hipertensi dan diabetes. Diabetes dan gangguan tidur saling berhubungan dimana diabetes dapat menyebabkan gangguan tidur dan sebaliknya beberapa penelitian menunjukkan bahwa tidur yang kurang akan meningkatkan resiko mengalami diabetes.

b. Lingkungan

Lingkungan dapat meningkatkan atau menghalangi seseorang untuk tidur. Pada lingkungan yang tenang memungkinkan seseorang dapat tidur dengan nyenyak, sebaliknya lingkungan yang ribut, bising dan gaduh akan menghambat seseorang untuk tidur (Mubarak & Chayatin, 2007).

c. Kelelahan

Kondisi tubuh yang lelah dapat mempengaruhi pola tidur seseorang. Kelelahan tingkat menengah orang dapat tidur dengan nyenyak, sedangkan pada kelelahan yang berlebihan akan menyebabkan periode tidur REM lebih pendek (Mubarak & Chayatin, 2007).

d. Gaya hidup

Individu yang sering berganti jam kerja harus mengatur aktivitasnya agar bisa tidur pada waktu yang tepat (Mubarak & Chayatin, 2007).

e. Sress emosional

Ansietas dan depresi sering kali mengganggu tidur seseorang. Kondisi ansietas dapat meningkatkan kadar *norepinefrin* darah melalui stimulasi sistem saraf simpatis. Kondisi ini menyebabkan berkurangnya siklus tidur NREM tahap IV dan tidur REM serta seringnya terjaga saat tidur (Mubarak & Chayatin, 2007).

f. Stimulan dan alkohol

Kafein yang terkandung dalam beberapa minuman dapat merangsang SSP sehingga dapat mengganggu pola tidur. Sedangkan konsumsi alkohol yang berlebih dapat mengganggu siklus tidur REM (Mubarak & Chayatin, 2007).

g. Diet

Makanan yang banyak mengandung *L-Triptofan* seperti keju, susu, daging dan ikan tuna dapat menyebabkan seseorang mudah tidur. Sebaliknya, minuman kafein maupun alkohol akan mengganggu tidur (Mubarak & Chayatin, 2007).

h. Merokok

Kadar nikotin yang tinggi menyebabkan peningkatan waktu terjaga dan perilaku agitasi. Nikotin memiliki waktu paruh sekitar 1-2 jam, individu yang merokok lebih dari 1 batang dalam beberapa jam menjelang waktu tidur akan mengalami kesulitan untuk memulai waktu tidur. Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan kerusakan paru secara permanen sehingga menimbulkan hipoksia. Hipoksia menyebabkan keluhan fatigue sehingga tubuh memerlukan waktu yang lama untuk istirahat (Mubarak & Chayatin, 2007).

i. Obat-obatan

Obat-obatan yang dikonsumsi seseorang ada yang berefek menyebabkan tidur, ada pula yang sebaliknya mengganggu tidur. Misalnya obat golongan amfetamin akan menurunkan tidur REM (Mubarak & Chayatin, 2007).

7. Kualitas Tidur

Kualitas tidur adalah kemampuan setiap orang untuk mempertahankan keadaan tidur dan untuk mendapatkan tahap tidur REM dan NREM yang

seharusnya. Kurang tidur yang berkepanjangan dapat mengganggu keadaan fisik dan psikis. Dari segi fisik, kurang tidur akan menyebabkan muka pucat, mata sembab, badan lemas, dan daya tahan tubuh menurun sehingga mudah terserang penyakit. Sedangkan dari segi psikis, kurang tidur akan menyebabkan timbulnya perubahan suasana kejiwaan, sehingga penderita akan menjadi lesu, lambat menghadapi rangsangan, dan sulit berkonsentrasi (Kozier, 2004).

Kualitas tidur adalah kepuasan seseorang terhadap tidur, sehingga seseorang tersebut tidak memperlihatkan perasaan lelah, mudah terangsang gelisah, lesu, apatis, kehitaman disekitar mata, kelopak mata bengkak, konjungtiva merah, mata perih, perhatian terpecah-pecah, sakit kepala dan sering menguap (Alimul, 2006).

Kualitas tidur adalah suatu keadaan dimana tidur yang dijalani seorang individu menghasilkan kesegaran dan kebugaran disaat terbangun, kepuasan seseorang terhadap tidur, sehingga seseorang tersebut tidak memperlihatkan perasaan lelah dan gelisah (Khusnul & Wahyu, 2012).

8. Pola Tidur Sehat

Tidur dengan pola yang teratur ternyata lebih penting jika dibandingkan dengan jumlah jam tidur itu sendiri. Kebutuhan tidur bervariasi pada setiap individu, umumnya dibutuhkan 5-9 jam perhari pada orang dewasa untuk mendapatkan kuantitas dan kualitas tidur yang efektif. Namun, semakin bertambahnya umur, semakin sulit pula untuk mendapatkan kualitas dan kuantitas tidur yang efektif. Untuk itu diperlukan sebuah pola tidur yang sehat. (Kozier dalam Fauziah, 2013).

Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencapai itu:

- a. Disiplin waktu

Sebaiknya tentukanlah kapan kita harus tidur dan kapan harus bangun. Para ahli tidur meyakini ritme dan jadwal tidur yang tetap serta teratur akan memberikan kontribusi positif terhadap tidur yang sehat. (Khasanah dalam Qoys Muhammad, 2014).

b. Perhatikan kondisi ruang tidur

Suasana yang nyaman didalam kamar akan sangat menentukan kualitas tidur maka jagalah suasana didalam kamar agar selalu nyaman. Saat seorang individu mencoba untuk tertidur, ia menuju ruangan yang gelap, tenang, temperature ruangan yang nyaman dan kemudian menutup matanya, maka stimulus yang menuju RAS berkurang. Mata yang tertutup dapat menurunkan stimulus cahaya yang ditangkap retina, penurunan stimulus cahaya ini akan diteruskan ke *suprachiasmatic nuclei* dan pada akhirnya menstimulasi kelenjar pineal untuk meningkatkan sekresi melatonin. Penurunan aktivitas RAS akan menurunkan aktivitas korteks serebral ditambahkan dengan peningkatan kadar melatonin yang membuat mengantuk dan pada akhirnya tertidur (Tortora dalam Qoys Muhammad, 2014).

c. Usahakan tidak makan sebelum tidur

Hal ini dikarenakan dapat menyebabkan sulitnya proses pencernaan, meningkatkan kadar gas, memicu gangguan pencernaan (dispepsia) dan memperbesar perut, sehingga mengakibatkan keluar bau tak sedap dari mulut dan nafas. Selain itu dapat membuat tenggorokan seperti terbakar, ini bisa terjadi karena terjadinya refluks asam, yaitu tidak menutupnya katup antar perut dan tenggorokan, hingga menyebabkan asam lambung menjalar ke arah tenggorokan. Jadi tidak aneh jika tenggorokan rasanya seperti terbakar (Reefani, 2014).

9. Pola Tidur Islami

Nabi Muhammad saw. sebagai tuntunan umat muslim di seluruh dunia telah mengajarkan berbagai kebaikan sebagai petunjuk bagi umat manusia yang mau mengamalkan. Tak hanya dalam masalah agama, islam melalui nabi terakhir juga mengajarkan bagaimana hidup sehat ala Rasulullah saw. Hingga masalah tidurpun, Nabi Muhammad sebenarnya sudah memberi contoh, bagaimana cara tidur, dan pola tidur yang baik bagi kesehatan (Reefani Nor Kholish, 2014). Oleh karena itu, rasul memiliki pola tidur yang cukup sederhana tapi sangat bermanfaat bagi kesehatan (Reefani Nor Kholish, 2014) di antaranya:

a. Sebelum tidur Rasul bersuci terlebih dahulu.

Upaya lain yang dapat meningkatkan semangat untuk bangun dan tidur dalam melaksanakan ibadah atau sebelum melakukan aktivitas tidur adalah tidur dengan keadaan suci baik hati maupun badan. Rasulullah saw. menganjurkan kepada kita agar tidur dalam keadaan suci karena dalam hal itu terdapat pahala yang besar (Ash-Shai'ari Muhammad bin Shalih, 2007).

b. Rasul sebelum melaksanakan tidur melakukan dzikir sampai jatuh tertidur

Diantara usaha yang dapat membantu seseorang giat melakukan qiyamullail adalah selalu berdzikir yang disyariatkan oleh Rasulullah sebelum ia tidur. Serta baca doa- doa sebelum tidur itu merupakan benteng yang kuat, yang atas izin Allah dapat menjaga dari syetan dan membantu agar bisa tertidur diawal malam dan bangun diawal pagi.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ
نَفَثَ فِي يَدَيْهِ وَقَرَأَ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَمَسَحَ بِهِمَا جَسَدَهُ

Terjemahan :

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah menceritakan kepada kami Al Laits dia berkata; telah menceritakan kepadaku 'Uqail dari Ibnu Syihab telah mengabarkan kepadaku 'Urwah dari Aisyah radiallahu

'anha bahwa apabila Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam hendak tidur, beliau meniupkan ke kedua tangannya sambil membaca mu'awidzatain (surat An Naas dan Al Falaq), lalu beliau mengusapkan ke badannya." (HR. Bukhari, No. Hadits 5844)"

- c. Rasulullah saw. mempunyai kebiasaan tidur pada awal malam kemudian bangun pada permulaan paruh kedua malam.

Pada saat itu beliau bangun lalu bersiwak, berwudhu dan melaksanakan sholat tahajjud (artinya maksimal sekitar pukul 9 malam nabi muhammad sudah tidur, dan bangun kira- kira pukul 3 pagi), (As Sidokare Abu Ahmad, 2011).

- d. Rasulullah saw. selalu tidur dalam keadaan miring, terutama dalam posisi miring kekanan (Kunnah Muawwiyah Abdurrahim, 2011).

Alasan rasul tidur menghadap ke kanan dapat di jelaskan secara ilmiah:

1) Untuk **jalan nafas**

Tidur miring mencegah jatuhnya lidah kebelakang yang dapat menyumbat jalan nafas. Lain halnya jika tidur pada posisi terlentang maka relaksasi lidah pada saat tidur dapat mengakibatkan penghalangan jalan nafas, penampakan dari luar berupa mendengkur. Orang yang mendengkur mengakibatkan tubuh kekurangan oksigen malah kadang-kadang dapat terjadi henti nafas untuk beberapa detik yang akan membangunkan orang yang tidur dengan posisi demikian. Orang tersebut biasanya akan bangun dengan keadaan pusing karena kurangnya pasokan oksigen ke otak. Tentunya ini sangat mengganggu tidur kita.

2) Untuk **jantung**

Tidur miring sebelah kanan membuat jantung tidak tertimpa organ lainnya ini karena posisi jantung yang memang berada lebih disebelah kiri. Tidur bertumpu pada sisi kiri menyebabkan curah jantung yang berlebihan karena darah yang masuk ke *atrium* juga banyak, sebab paru-paru kanan berada di atas sedangkan paru-paru kanan mendapatkan pasokan darah yang lebih banyak dari paru-paru kiri.

3) Bagi kesehatan **paru-paru**

Paru-paru kiri lebih kecil dibandingkan dengan paru-paru kanan. Jika tidur miring sebelah kanan, jantung akan jatuh sebelah kanan, itu tidak menjadi masalah karena paru-paru kanan besar, lain halnya kalau bertumpu pada sebelah kiri, jantung akan menekan paru-paru kiri yang berukuran kecil.

e. Rasulullah saw tidak pernah tidur dalam kondisi perut penuh makanan dan minuman, hal ini dikarenakan dapat menyebabkan sulitnya proses pencernaan, meningkatkan kadar gas, memicu gangguan pencernaan (dispepsia) dan memperbesar perut, sehingga mengakibatkan keluar bau tak sedap dari mulut dan nafas. Selain itu juga berpotensi menyebabkan mimpi buruk dan menakutkan (Sofyan, 2015).

C. Variabel Penelitian

1. Variabel Dependen (terikat)

Variabel dependen pada penelitian ini adalah tekanan darah pada Mahasiswa keperawatan Uin Alauddin Makassar.

2. Variabel Independen (bebas)

Variabel independen pada penelitian ini adalah kualitas tidur pada Mahasiswa keperawatan Uin Alauddin Makassar.


3. Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan landasan berfikir yang dikembangkan berdasarkan teori yang ada. Kerangka konsep memberikan gambaran sederhana tentang landasan berfikir penelitian dengan menunjukkan variabel-variabel penelitian dan keterkaitan antara variabel (Sugyono, 2012).

Kerangka konsep dari penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen dari penelitian ini

adalah pola tidur pada mahasiswa keperawatan Uin Alauddin Makassar, sedangkan variabel dependen dari penelitian ini adalah tekanan darah.


Gambar 3.4 Kerangka Konsep



Keterangan:



: Variabel Independen




: Variabel Dependen



: Penghubung

Gambar 3.5 Kerangka Kerja

D. Kerangka Kerja

BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Jenis penelitian*

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dengan desain penelitian deskriptif korelatif dengan menggunakan pendekatan *cross sectional* yaitu cara pengumpulan data sekaligus pada suatu saat, dimana penelitian dilakukan untuk menjelaskan antara dua variabel yang dilakukan pada suatu waktu tertentu dan pengumpulan data mengenai kualitas tidur dan tekanan darah pada mahasiswa keperawatan hanya dilakukan satu kali dan tidak ada intervensi (Notoadmojo, 2005)

B. *Lokasi dan Waktu Penelitian*

Penelitian ini telah dilakukan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang dilaksanakankan pada bulan Februari 2016.

C. *Populasi dan Sampel*

1. *Populasi*

Populasi merupakan sekumpulan objek yang akan diteliti dan memiliki kesamaan karakteristik. Kesamaan karakteristik tersebut ditentukan berdasarkan pada sifat spesifik dari populasi yang ditentukan dengan kriteria inklusi atau ketentuan tertentu (Putra, 2012).

Populasi dalam penelitian ini adalah semua mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan program studi keperawatan UIN Alauddin Makassar sebanyak 300 orang.

2. *Sampel*

Sampel adalah sejumlah anggota yang dipilih atau diambil dari suatu populasi. Dalam penelitian keperawatan kriteria sampel meliputi kriteria inklusi dan eksklusi, dimana kriteria itu menentukan dapat atau tidaknya sampel tersebut digunakan (Notoatmodjo, 2010).

Adapun teknik pengambilan sampel yaitu dengan menggunakan rumus *Taro Yamane* berikut ini :

$$n = \frac{N}{N(d^2) + 1}$$

Keterangan:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

d = presisi sebesar 10%

Dengan menggunakan rumus tersebut dapat ditentukan besar sampel yang akan diambil :

$$\begin{aligned} n &= \frac{N}{N \cdot d^2 + 1} \\ &= \frac{300}{300 \times (0,1)^2 + 1} \\ &= \frac{300}{300 \times 0,01 + 1} \\ &= \frac{300}{4} \\ &= 75 \end{aligned}$$

Jadi sampel dalam penelitian ini yang didapatkan peneliti menggunakan rumus *Taro Yamane* adalah sejumlah 75 orang dan juga memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi.

D. Teknik Pengambilan Sampel

1. Teknik Sampling

Sampling adalah proses dalam menyeleksi porsi dari populasi untuk mewakili populasi. Penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling* yaitu suatu teknik penetapan sampel sesuai dengan yang dikehendaki peneliti, sehingga sampel tersebut dapat diwakili karakteristik populasi yang telah dikenal sebelumnya (Hidayah, 2014)

2. Kriteria inklusi dan eksklusi.

a. Kriteria inklusi

Kriteria inklusi adalah karakteristik umum subjek penelitian dari suatu populasi target dan terjangkau yang akan diteliti, (Nursalam, 2008), yaitu:

- 1) Mahasiswa keperawatan UIN Alauddin Makassar.
- 2) Mahasiswa yang bersedia menjadi responden.

b. Kriteria eksklusi

Kriteria eksklusi adalah mengeluarkan atau menghilangkan subjek yang tidak memenuhi kriteria inklusi dari studi (Nursalam, 2008).

- 1) Mahasiswa yang mengalami obesitas.
- 2) Mahasiswa yang terbiasa meminum kopi dimalam hari.
- 3) Mahasiswa yang mengkonsumsi obat tidur.
- 4) Mahasiswa yang sedang sakit.

5) Mahasiswa yang merokok.

E. Instrumen penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya kuesioner dan lembar observasi. Kuesioner yang digunakan adalah *Pittsburg Sleep Quality Index* (PSQI). PSQI merupakan metode penilaian yang berbentuk kuesioner yang digunakan untuk mengukur kualitas tidur dan gangguan tidur orang dewasa. Dalam PSQI terdiri dari tujuh item penilaian. Terdiri dari kualitas tidur, latensi tidur, durasi tidur, kebiasaan tidur, gangguan tidur, penggunaan obat tidur (yang berlebihan) dan disfungsi siang hari. Hasil pengukuran dinyatakan dengan skor 0 – 21, kualitas tidur baik: jika skor PSQI ≤ 5 dan kualitas tidur buruk: jika skor PSQI > 5 . Sedangkan untuk penilaian tekanan darah diukur dengan menggunakan tensimeter air raksa dan stetoskop. Tata cara pemeriksaan tekanan darah dilakukan setelah didapatkan hasil dari pengisian kuesioner tersebut.

Tabel 4.1
Distribusi Pertanyaan Kuesioner PSQI

Komponen Kualitas Tidur		Pertanyaan	Cara Menghitung Skor	Skor
No	Nama			
C1	Kualitas tidur subjektif	6	#6	0-3
C2	Latensi tidur	2 dan 5a	Skor #2 (≤ 15 mnt= 0; 16-30 mnt= 1; 31-60 mnt= 2; > 60 mnt= 3) + Skor 5a (hasil penjumlahan keduanya setara 0=0; 1-2=1; 3-4=2; 5-6=3)	0-3
C3	Durasi tidur	4	Skor #4 ($> 7=0$; 6-7=1; 5-6=2; $< 5=3$)	0-3
C4	Efisiensi Kebiasaan	1, 3	(Total jam tidur/ total waktu	0-3

	Tidur	dan 4	ditempat tidur) x 100 = efisiensi kebiasaan tidur (%) (>85%= 0; 75-84%= 1; 65-74%= 2; <65%=3)	
C5	Gangguan tidur	5b sampai 5j	Jumlah skor 5b sampai 5j (0=0; 1-9=1; 10-18=2; 19-27=3)	0-3
C6	Penggunaan obat tidur	6	Skor #6	0-3
C7	Disfungsi siang hari	7 dan 8	Skor #7 + skor #8 (0=0; 1-2=1; 3-4=2; 5-6=3)	0-3
	Skor total seluruh komponen		C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7	0-21

F. Metode pengumpulan data

Pada awalnya seluruh kuesioner untuk variabel kualitas tidur yang telah dikembalikan, diperiksa kelengkapan dan ketepatannya, kemudian data yang telah lengkap dan tepat diberi tanda secara manual sebelum diolah pada computer. Lalu data yang telah diberi kode dimasukkan ke computer. Lakukan *cleaning* data setelah itu disimpan. Hasilnya disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, sedangkan hubungan antara variabel kualitas tidur dengan tekanan darah akan dianalisis dengan menggunakan uji statistik “*Chi Square*”. Analisis statistik akan dilakukan dengan bantuan computer (program SPSS for windows versi 21) (Arlinda 2008).

G. Prosedur Penelitian

Dari pemeriksaan ini akan mendeskripsikan bagaimana hubungan kualitas tidur dengan tekanan darah pada mahasiswa keperawatan UIN Alauddin Makassar. Setelah didapatkan beberapa jumlah responden yang termasuk dalam kriteria inklusi maka responden diminta untuk mengisi kuesioner kualitas tidur lalu diperiksa tekanan darahnya. Pada tahap awal seluruh responden mendapatkan

kuesioner mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas tidur dan setelah pengisian kuesioner selesai, peneliti akan melanjutkan dengan pemeriksaan tekanan darah pada pagi hari sebelum perkuliahan dimulai, sehingga diperoleh hasil tekanan darah dari yang memiliki kualitas tidur yang baik dan kualitas tidur yang buruk apakah terdapat hubungan yang signifikan atau malah sebaliknya.

H. *Pengolahan dan Analisa Data*

Dalam penelitian ini, data yang sudah terkumpul selanjutnya diolah dan dianalisis dengan teknik statistik (Hidayat, 2009).

1. *Pengolahan Data*

Tahap-tahap mengolahan data menurut Setiadi (2007), meliputi kegiatan:

a. *Editing*

Editing adalah upaya untuk memeriksa kembali kebenaran data yang diperoleh atau dikumpulkan. Editing dapat dilakukan pada tahap pengumpulan data atau data terkumpul.

b. *Coding*

Coding merupakan kegiatan pemberian kode *numeric* (angka) terhadap data yang terdiri dari atas beberapa kategori. Pemberian kode ini sangat penting bila pengolahan data dan analisis data menggunakan komputer.

c. *Entri*

Data dari entri adalah kegiatan memasukkan data yang telah dikumpulkan ke dalam master tabel database komputer, kemudian membuat distribusi frekuensi sederhana atau bisa juga dengan membuat tabel kontigensi.

d. *Cleaning*

Pembersihan data yaitu dengan cara melihat variabel data sudah benar atau salah.

2. Analisa Data

Penelitian ini bersifat deskriptif, maka dalam analisisnya menggunakan perhitungan-perhitungan sederhana secara hasil penyebaran data menurut frekuensi antar kategori. Analisis dilakukan terhadap tiap-tiap variabel dari hasil penelitian. Pada umumnya dalam analisis ini hanya menghasilkan distribusi dan persentasi dari tiap variabel (Notoatmodjo, 2005).

a. Analisa Univariat

Pada analisis univariat, data yang diperoleh dari hasil pengumpulan dapat disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, ukuran tendensi sentral atau grafik (Saryono, 2008).

b. Analisa Bivariat

Setelah data-data tersebut ditabulasi, maka dilakukan interpretasi terhadap data yang terkumpul dengan menggunakan komputerisasi. Statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Chi Square* untuk mengetahui hubungan antara kualitas tidur dengan tekanan darah (Saryono, 2008) .

I. Etika Penelitian

Menurut Nursalam (2008), ada tiga bagian yang menjadi prinsip etis dalam penelitian (pengumpulan data), yaitu:

1. Prinsip manfaat

a. Bebas dari penderitaan

Peneliti menjelaskan prosedur perawatan yang akan dijalankan dan meyakinkan responden intervensi yang akan diberikan tidak menyakiti responden.

Jika responden merasa ada ketidaknyamanan dalam memberikan intervensi, responden akan dieksklusikan.

b. Bebas dari eksploitasi

Peneliti menjelaskan secara jelas manfaat dan tujuan penelitian untuk perkembangan ilmu keperawatan, sehingga responden mengerti dan yakin bahwa informasi yang diberikannya untuk peneliti digunakan untuk tujuan dan kepentingan penelitian dan tidak akan disalahgunakan untuk kepentingan lainnya.

c. Resiko (*benefits ratio*)

Peneliti menjelaskan secara terbuka manfaat penelitian yang akan diperoleh oleh pasien dan juga menjelaskan resiko-resiko apa saja yang akan mungkin didapatkan oleh responden terkait kesediannya berpartisipasi dalam penelitian ini.

2. Prinsip menghargai hak asasi manusia (*respect human dignity*)

a. Hak untuk ikut atau tidak menjadi responden (*right to self determination*).

Peneliti memberikan hak yang terbuka kepada responden bahwa responden dapat memilih untuk berpartisipasi dalam penelitian atau tidak.

b. Hak untuk mendapatkan jaminan dari perlakuan yang diberikan (*right to full disclosure*).

Peneliti menjelaskan secara terbuka semua informasi penelitian kepada responden, mulai dari tujuan penelitian, manfaat, keuntungan dan risiko penelitian, intervensi dan prosedur yang dipakai, serta semua informasi yang terkait kepada responden.

c. *Informed consent*

Peneliti menjelaskan kepada responden bahwa responden memiliki hak untuk menyetujui atau menolak berpartisipasi dalam penelitian ini. Peneliti memberikan hak bebas apakah responden ini menandatangani *informed consent* atau tidak. Jika responden menandatangani *informed consent* itu berarti responden setuju untuk berpartisipasi dalam penelitian ini.

3. Prinsip keadilan (*right to justice*)

a. Hak untuk mendapatkan pengobatan yang adil (*right in fair treatment*)

Peneliti memperlakukan semua responden secara adil perawatan yang diberikan pada responden. Meskipun intervensi masase kaki dengan minyak esensial lavender diberikan pada kelompok perlakuan dan masase kaki tanpa minyak esensial lavender diberikan pada kelompok control. Peneliti berlaku adil terhadap pemberian intervensi tersebut.

b. Hak dijaga kerahasiaannya (*right to privacy*)

Peneliti merahasiakan semua informasi terkait dengan identitas responden dengan cara menyamarkan setiap nama responden dengan menggantinya dengan kode responden dimana hanya peneliti yang mengetahui kode responden tersebut. Selain itu, semua data terkait informasi responden disimpan oleh peneliti dan tidak akan disebarluaskan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum lokasi penelitian

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar adalah salah satu perguruan tinggi terbesar di kawasan Indonesia Timur yang terletak di Sulawesi Selatan kota Makassar Kabupaten Gowa Kel. Romang Polong tepatnya di Samata. Perguruan tinggi Islam yang mengawali namanya IAIN Alauddin yang terletak di Jl. Sultan Alauddin Makassar itu kini telah menjadi Universitas dengan jumlah mahasiswa yang setiap tahunnya semakin meningkat dengan pesat dan hal itu pulalah yang mendorong pemerintah untuk menjadikan perguruan tinggi islam itu menjadi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar atau yang sekarang sering disebut UINAM.

1. Keadaan Geografis dan Luas Wilayah

Uin Alauddin Makassar yang terletak di samata Kab.Gowa atau biasa disebut kampus II Samata Gowa Kel. Romang Polong, dengan luas $\pm 32.000 \text{ m}^2$ dengan jumlah gedung perkuliahan yang terdiri dari delapan Fakultas, dimana Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan sendiri memiliki luas wilayah $1.057,18 \text{ m}^2$ yang terdiri dari tiga gedung perkuliahan dan memiliki empat jurusan.

2. Suasana di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Dengan konsep bangunan yang bergaya arsitek mesir, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan nampak indah dan megah dengan balutan cat warna coklat muda dengan tatanan gedung yang berdiri rapih di lingkungan yang asri dan hijau.

3. Sarana dan prasarana

Di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan sebagian ruang kelas dilengkapi dengan AC dan proyektor untuk mendukung proses belajar mengajar mahasiswa dan juga laboratorium yang dilengkapi dengan pasilitas kebutuhan belajar mahasiswa seperti buku, pantom, dan alat-alat medis lainnya serta sebuah perpustakaan, musolah, kelas teater (LT) dan dipermudah dengan adanya jaringan wifi yang setiap saat dapat digunakan mahasiswa untuk mencari tugas-tugas yang diberikan oleh dosen.

4. Proses belajar mengajar

Dengan lokasi yang dekat di pintu keluar kampus, suasan belajar di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan sendiri terbilang cukup kondusif, proses

belajar mengajar yang di mulai hari senin sampai dengan jum'at. Dengan menggunakan sistem blok yang dimana mahasiswa dituntut untuk belajar full satu hari dengan hanya satu pelajaran saja yang membuat mahasiswa untuk selalu aktif dan hadir dalam perkuliahan setiap hari.

B. Hasil penelitian

Penelitian mengenai hubungan kualitas tidur dengan tekanan darah pada mahasiswa keperawatan UIN Alauddin Makassar telah dilaksanakan pada bulan Februari 2016. Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa jurusan keperawatan dengan jumlah responden sebanyak 75 orang. Jenis penelitian ini dirancang dalam bentuk penelitian *Kuantitatif Deskriptif* dengan menggunakan pendekatan *Cross Sectional*.

1. Karakteristik Responden

Berdasarkan perhitungan dari karakteristik responden didapatkan (16%) responden berjenis kelamin laki-laki, yakni sebanyak 12 orang dan (84%) responden berjenis kelamin perempuan, yakni sebanyak 63 orang dengan

distribusi umur yakni sebanyak 6 responden (8%) yang berumur 19 tahun, 14 responden (18,7%) yang berumur 20 tahun, 43 responden (57,3%) yang berumur 21 tahun dan 12 responden (16%) yang berumur 22 tahun dan dapat dilihat pada tabel 5.1.

Tabel 5.1
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur
pada Mahasiswa Keperawatan

No	Karakteristik	F	%
1	Jenis kelamin		
	a. Laki-laki	12	16
	b. Perempuan	63	84
	Total	75	100
2	Umur		
	a. 19 tahun	6	8
	b. 20 tahun	14	18,7
	c. 21 tahun	43	57,3
	d. 22 tahun	12	16
	Total	75	100

Sumber: Data Primer, 2016

2. Analisa Univariat

Berdasarkan perhitungan untuk nilai kualitas tidur didapatkan kualitas tidur sebagian besar mahasiswa keperawatan UIN adalah buruk yaitu sebanyak 72 responden (96%), dan kualitas tidur baik sangat sedikit yaitu 3 responden (4%) dan dapat dilihat pada tabel 5.2.

Tabel 5.2
Distribusi Frekuensi Nilai Kualitas Tidur Responden

No	Kualitas Tidur	F	%
1	≤ 5 Baik	3	4
2	≥ 5 Buruk	72	96

Total	75	100
-------	----	-----

Sumber: Data Primer, 2016

Berdasarkan perhitungan tekanan darah responden ditemukan bahwa responden paling banyak memiliki tekanan darah normal yaitu sebanyak 51 responden (68%), yang memiliki tekanan darah rendah sebanyak 23 responden (30,7%), dan pada tekanan darah tinggi hanya 1 responden (1.3%) dan dapat dilihat pada tabel 5.3.

Tabel 5.3
Distribusi Frekuensi Tekanan Darah Responden

No	Klasifikasi Tekanan Darah	F	%
1	Rendah	23	30,7
2	Normal	51	68
3	Tinggi	1	1,3
	Total	75	100

Sumber: Data Primer, 2016

3. Analisa Bivariat

Dari hasil tabulasi silang antara kualitas tidur dan tekanan darah pada klasifikasi tekanan darah rendah, didapatkan bahwa 2 responden (1%) dengan kualitas tidur baik dan 21 responden (22,0%) dengan kualitas tidur buruk dan total 23 responden. Pada klasifikasi tekanan darah normal, didapatkan 1 responden (2,0%) dengan kualitas tidur baik dan 50 responden (49,0%) dengan kualitas tidur buruk dan total 51 responden. Pada klasifikasi tekanan darah tinggi, tidak didapatkan responden dengan kualitas tidur baik namun terdapat 1 responden (1,0%) dengan kualitas tidur buruk dan total 1 responden.

Hasil uji statistik dengan menggunakan uji *chi square* didapatkan nilai $p=0,257$ (p value $>0,05$) maka dapat diambil kesimpulan bahwa “tidak terdapat

hubungan yang signifikan antara kualitas tidur dengan tekanan darah” dan dapat dilihat pada tabel 5.4.

Tabel 5.4
Tabulasi silang kualitas tidur dengan tekanan darah

		Klasifikasi tekanan darah						<i>P</i>
		Rendah		Normal		Tinggi		
		F	%	F	%	F	%	
Kualitas tidur	Baik	2	1	1	2,0	0	0	0,257
	Buruk	21	22,0	50	49,0	1	1,0	
Total		23	23,0	51	51,0	1,0	1,0	
		75						

*Keterangan: Crosstabulation *Uji chi square*

C. Pembahasan

Jenis penelitian ini dirancang dalam bentuk penelitian *Deskriptif Koleratif* dengan menggunakan pendekatan *Cross Sectional* untuk mengetahui hubungan antara kualitas tidur dengan tekanan darah pada mahasiswa. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 25 Februari – 3 Maret 2016 di Fakultas Ilmu Kesehatan UIN alauddin Makassar. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 300 mahasiswa. Penarikan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, dimana mahasiswa yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi dalam penelitian ini dan dijadikan sampel penelitian yaitu sebanyak 75 orang, sebab yang lain masuk dalam kriteria eksklusi (mengalami obesitas, terbiasa meminum kopi dimalam hari, mengkonsumsi obat tidur dan sedang sakit). Responden dengan

jenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan responden dengan jenis kelamin laki-laki, dikarenakan jumlah populasi perempuan di jurusan keperawatan lebih banyak dibanding laki-laki.

Adapun kriteria inklusi diantaranya : mahasiswa keperawatan UIN Alauddin Makassar dan mahasiswa yang bersedia menjadi responden. Sedangkan kriteria eksklusi yaitu, mahasiswa yang mengalami obesitas, terbiasa meminum kopi di malam hari, mengkonsumsi obat tidur dan sedang sakit.

Dalam rancangan penelitian ini setelah didapatkan beberapa jumlah responden yang termasuk dalam kriteria inklusi maka responden diminta untuk mengisi kuesioner kualitas tidur lalu diperiksa tekanan darahnya. Pada tahap awal seluruh responden mendapatkan kuesioner mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas tidur dan setelah pengisian kuesioner selesai, peneliti akan membagi responden menjadi dua kategori berdasarkan hasil perhitungan. Kategori pertama adalah kelompok yang memiliki kualitas tidur baik dan kategori ke dua adalah yang memiliki kualitas tidur buruk, setelah itu peneliti akan melanjutkan dengan pemeriksaan tekanan darah pada pagi hari, sehingga diperoleh hasil tekanan darah dari yang memiliki kualitas tidur yang baik dan kualitas tidur yang buruk.

Setelah data hasil penelitian terkumpul, kemudian dilakukan penyuntingan data, pengkodean data, dan entri data ke dalam master tabel. Data kemudian diolah menggunakan program SPSS dan hasil pengolahan disajikan ke dalam tabel frekuensi dan distribusi serta penjelasan dalam bentuk narasi.

1. Karakteristik Responden

Distribusi frekuensi berdasarkan jenis kelamin yakni, sebanyak 63 responden (84%) berjenis kelamin perempuan dan 12 responden (16%) berjenis kelamin laki-laki. Distribusi frekuensi berdasarkan umur yakni, sebanyak 6

responden (8%) yang berumur 19 tahun, 14 responden (18,7%) yang berumur 20 tahun, 43 responden (57,3 %) yang berumur 21 tahun dan 12 responden (16%) yang berumur 22 tahun.

Dari pembahasan diatas didapatkan bahwa jumlah responden laki-laki lebih sedikit dibanding responden perempuan. Hal ini dikarenakan pada jurusan keperawatan diperkirakan jumlah keseluruhan mahasiswa sekitar 75% mahasiswa perempuan dan hanya 25% mahasiswa laki-laki. Sedangkan pada karakteristik usia responden didapatkan usia paling banyak yaitu pada usia 20 tahun, hal ini dikarenakan pada saat penelitian kebanyakan mahasiswa yang hadir adalah mahasiswa keperawatan angkatan 2013.

2. Hasil Pengukuran Kualitas Tidur Dan Tekanan Darah

Berdasarkan tabel 5.2 didapatkan data bahwa jumlah mahasiswa berdasarkan kualitas tidur yang paling banyak adalah yang memiliki kualitas tidur buruk sebanyak 72 responden (96%), sedangkan jumlah paling sedikit pada kualitas tidur baik yaitu sebanyak 3 responden (4%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar mahasiswa memiliki kualitas tidur buruk. Hal ini selaras dengan penelitian deshinta (2010), dengan hasil kualitas tidur baik sebanyak 67 responden (23,3%) dan kualitas tidur buruk 220 responden (76,7%).

Berdasarkan tabel 5.3 didapatkan data bahwa jumlah mahasiswa dengan tekanan darah paling banyak adalah pada tekanan darah normal sebanyak 51 responden (68%), tekanan darah rendah sebanyak 23 responden (30,7%), sedangkan jumlah paling sedikit pada tekanan darah tinggi yaitu, sebanyak 1 responden (1,3%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar mahasiswa memiliki tekanan darah normal.

Dari penjelasan pada tabel diatas peneliti mengambil kesimpulan bahwa alasan mengapa pada responden didapatkan hasil lebih banyak pada tekanan darah

normal, itu karena dipengaruhi oleh usia responden yang mana pada usia remaja atau usia dewasa muda sangat jarang ditemui peningkatan tekanan darah atau dengan kata lain individu yang sering berganti jam kerja dan harus mengatur aktivitasnya agar bisa tidur pada waktu yang tepat namun tetap tidak memberikan pengaruh signifikan pada perubahan tekanan darah karena kebutuhan tidur seseorang akan berkurang secara bertahap sesuai usia (Hidayat dalam Fauziah, 2013), dan sebaliknya tekanan sistolik dan diastolik justru akan meningkat secara bertahap sesuai usia (Audrey, Berman dkk, 2009), sehingga dapat disimpulkan bahwa usia dewasa (mahasiswa) dengan kualitas tidur yang buruk tidak memberikan pengaruh signifikan pada tekanan darah.

Allah swt. berfirman dalam QS Asy-Syu'ara' /26: 80

وَإِذَا مَرَضْتُ فَبُهِرْتُ بِشِفَائِهِ .

Terjemahnya:

“dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku” .

Makna hal itu berarti jika aku menderita sakit maka tidak ada seorangpun yang kuasa menyembuhkanku selainNya sesuai takdirnya yang dikarenakan oleh sebab yang menyampaikannya (Katsir, 2004). Jika dikaitkan dengan hasil penelitian, maka peningkatan atau penurunan kualitas tidur yang terjadi pada responden, maka itu dikembalikan kepada Yang Maha Menyembuhkan. Sebagai peneliti, kita hanya sebagai wasilah dan harus diyakinkan kembali kepada orang yang menjadi responden bahwa kesembuhan itu semata-mata dariNya.

3. Hubungan Kualitas Tidur dengan Tekanan Darah pada Mahasiswa Keperawatan UIN Alauddin Makassar.

Dari hasil tabulasi silang antara kualitas tidur dan tekanan darah pada klasifikasi tekanan darah rendah, didapatkan bahwa 2 responden (1%) dengan

kualitas tidur baik dan 21 responden (22,0%) dengan kualitas tidur buruk dan total 23 responden . Pada klasifikasi tekanan darah normal, didapatkan 1 responden (2,0%) dengan kualitas tidur baik dan 50 responden (49,0%) dengan kualitas tidur buruk dan total 51 responden. Pada klasifikasi tekanan darah tinggi, tidak didapatkan responden dengan kualitas tidur baik namun terdapat 1 responden (1,0%) dengan kualitas tidur buruk dan total 1 responden.

Hal yang tidak sesuai dikarenakan beberapa faktor diantaranya :

- a. Penggunaan instrumen untuk menilai kualitas tidur pada penelitian sebelumnya, yakni *Wrist Actigraphy*. Alat tersebut memiliki ketepatan lebih tinggi untuk menilai kualitas tidur dibandingkan dengan menggunakan kuesioner, meskipun kuesioner tersebut sudah baku (*PSQI*). Sehingga hasil yang didapat lebih terkesan subjektif dalam penilaian kualitas tidur responden.
- b. Perbedaan aktivitas responden pada penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh pola hidup responden pada penelitian sebelumnya yang memicu gejala insomnia yang sering dialami oleh remaja-remaja diluar negeri daripada penelitian ini.
- c. Karakteristik responden pada penelitian-penelitian sebelumnya menurut umur dan jenis kelamin berbeda pada penelitian ini. Pada penelitian sebelumnya usia responden yang dipilih peneliti yaitu pada rentang usia dewasa tua sampai dengan usia lansia dan jumlah responden laki-laki lebih banyak juga ada yang keseluruhan respondennya hanya laki-laki saja, dimana laki-laki memiliki aktivitas yang lebih banyak sebagai pemicu perubahan pola tidur. Sementara jumlah responden perempuan pada penelitian ini lebih banyak dibanding laki-laki.

Hasil uji statistik dengan menggunakan uji *chi square* didapatkan nilai $p=0,257$ (p value $>0,05$) yang berarti H_a ditolak dan H_o diterima yaitu tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kualitas tidur dengan tekanan darah pada mahasiswa keperawatan UIN Alauddin Makassar.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya terkait kualitas tidur dan tekanan darah. Penelitian Ayu dkk, (2012) menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang bermakna antara kualitas tidur yang buruk dengan peningkatan tekanan darah sistolik dengan nilai ($p= 0.172$). Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Angkat, dimana kualitas tidur yang buruk tidak mempengaruhi peningkatan tekanan darah sistolik. Hal ini juga didukung oleh penelitian Deshinta (2010), menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang bermakna rerata tekanan darah pada remaja usia 15-17 tahun dengan kualitas tidur ($p > 0,05$).

Hal tersebut bertentangan dengan teori yang menyatakan bahwa gangguan tidur yang terjadi secara terus menerus dapat menyebabkan perubahan fisiologi tubuh dimana keseimbangan antara pengaturan sistem saraf simpatis dan parasimpatis terganggu. Sistem simpatis akan ditingkatkan sehingga memicu terjadinya peningkatan tekan darah pada orang yang mengalami gangguan tidur tersebut. Sebaliknya, aktivitas sistem parasimpatis diturunkan (Wendy, *et al* ., 2007). Penjelasan tersebut juga mendukung pada hasil penelitian (Jawaheri, 2008), yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara kualitas tidur dengan tekanan darah, yakni kualitas tidur yang buruk menyebabkan peningkatan tekanan darah.

Selain modifikasi gaya hidup (pengaturan diet dan olah raga), kualitas tidur sangatlah penting dalam mempertahankan kesehatan. Pencegahan peningkatan tekanan darah dimasa yang akan datang, bukan hanya terbatas pada program olah raga dan pengaturan berat badan, namun juga optimalisasi jam tidur. Sangatlah penting memantau kualitas dan kuantitas tidur baik itu pada anak,

remaja, dewasa ataupun lansia, sebagai bagian dalam meningkatkan kesehatan masyarakat (Javaheri, 2008).

Tidur adalah suatu keadaan relatif tanpa sadar yang penuh ketenangan tanpa kegiatan yang merupakan siklus yang berulang-ulang dan masing-masing menyatakan fase kegiatan otak dan badaniah yang berbeda. Tidur merupakan aktivitas yang melibatkan susunan saraf pusat, saraf perifer, endokrin, kardiovaskular, respirasi dan muskuloskeletal (Potter & Perry, 2005).

Bentuk bioritme yang paling umum adalah ritme sirkadian yang melengkapi siklus selama 24 jam. Dalam hal ini fluktuasi denyut jantung, tekanan darah, temperatur tubuh, sekresi hormon, metabolisme, dan penampilan serta perasaan individu tergantung pada ritme sirkadiannya. Tidur adalah salah satu irama biologis tubuh yang sangat kompleks. Sinkronisasi sirkadian terjadi jika, individu memiliki pola tidur-bangun yang mengikuti jam biologisnya. Individu akan bangun pada saat ritme fisiologis dan psikologis paling tinggi atau paling aktif dan akan tidur pada saat ritme tersebut paling rendah.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya dalam hadis bahwa Allah tidak akan menurunkan penyakit, melainkan menurunkan pula obatnya, maka ketika ditimpa sakit, misalnya gangguan tidur, kita hendaknya tetap bersabar dan menerimanya sebab kita yakin bahwa setiap penyakit ada obatnya selain itu, Allah juga menjanjikan pahala yang besar bagi orang-orang yang bersabar ketika dalam kesulitan.

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا حُزْنٍ وَلَا أَذَى وَلَا غَمٍّ حَتَّى الشُّوْكَةِ يُشَاكُّهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ (رواه البخاري)

Terjemahan :

“Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin 'Amru telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Muhammad dari Muhammad bin 'Amru bin Halhalah dari 'Atha` bin Yasar dari Abu Sa'id Al Khudri dan dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit dan keletihan, kekhawatiran dan kesedihan, dan tidak juga gangguan dan kesusahan bahkan duri yang melukainya melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya." (HR. Bukhari no. 5210)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Gambaran kualitas tidur paling banyak yaitu pada klasifikasi kualitas tidur buruk sebanyak 72 orang (96%) dan untuk kualitas tidur baik sebanyak 3 orang (4%).
2. Gambaran tekanan darah paling banyak yaitu pada klasifikasi tekanan darah normal sebanyak 51 orang (68%), klasifikasi tekanan darah rendah 23 orang (30,7%) dan klasifikasi tekanan darah tinggi hanya 1 orang (1,3%).

3. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara kualitas tidur dengan tekanan darah pada mahasiswa keperawatan UIN Alauddin Makassar.

B. Saran

1. Bagi Profesi Keperawatan

Penelitian ini dapat memberikan acuan bagi tenaga kesehatan agar dapat merencanakan asuhan keperawatan yang tepat dalam pemberian pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

2. Bagi Institusi Pendidikan

Penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan dan dapat dijadikan data dasar dalam mengembangkan penelitian anak didik keperawatan selanjutnya, sehingga semakin banyak penelitian terkait kualitas tidur dan tekanan darah pada mahasiswa maupun usia lainnya.

3. Bagi Masyarakat

Agar masyarakat lebih mengatur gaya hidup, pola istirahat dan tidur mengingat bahwa hal tersebut jika dianggap sepele akan menimbulkan berbagai masalah kesehatan dikemudian hari.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan alat ukur kualitas tidur yang lebih akurat, misalnya dengan mengupayakan kuesioner lain yang memiliki angka realibilitas yang lebih besar,
- b. Dalam penelitian ini pengukuran tekanan darah hanya dilakukan satu kali, untuk itu agar mendapatkan hasil yang lebih akurat mengenai tekanan darah

responden, perlu dilakukan pengukuran tekanan darah dengan frekuensi lebih sering.

- c. Mengambil banyak data tambahan sebagai karakteristik responden untuk dicari hubungannya dengan tekanan darah, misalnya tingkat sosioekonomi.
- d. Kriteria inklusi dan eksklusi lebih dipertajam untuk mengurangi variabel perancu pada tekanan darah yang diukur.

DAFTAR PUSTAKA

Adelina dan Almitra, “ *Prevalensi Gangguan Tidur pada Remaja Usia 12-15 Tahun di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.*”, Jurnal, Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2009.

Albert, “*Gambaran Kualitas Tidur dan Tekanan Darah Pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara Tahun Masuk 2009.*” KTI, Medan : Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, 2013.

Al-Bukhari Muhammad bin Ismail Abu ‘Abdillah >, *S{ah}ih al-Bukhari*, juz 3 (Cet. III; Beirut: Daar Ibn Kasir, 1987 M/ 1407 H), h. 1206.

Alimul dan Aziz. *Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia*, Jakarta: Salemba Medika. 2006.

- Andreas. *“Nasional Kardiovaskular Harapan Kita: Jantung Sehat dan Tidur Sehat”*. Diakses dari [://www.pjnhk.go.id/](http://www.pjnhk.go.id/). 25 Oktober; 2015.
- Asmadi. *Teknik Prosedural Keperawatan Konsep Dan Aplikasi Kebutuhan Dasar Klien*. Jakarta: Salemba Medika 2008.
- As Sidokare dan Abu Ahmad. *Kitab Shahih Bukhari Terjemahan*, 2011.
- Aspuah dan Siti. *Kumpulan Kuesioner dan Instrumen Penelitian Kesehatan*.Jogjakarta. NuhaMedik. 2013.
- Audrey, dkk. *Buku Ajar Praktik Keperawatan Klinis Kozier*. Jakarta: EGC. 2009.
- Ayu dkk, *“Hubungan Kualitas Tidur Dengan Tekanan Darah PadaMahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Riau Angkatan 2012”*, Riau. 2012.
- Baso Asriadi, dkk. *“Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Insomnia Pada Warga Di Kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai Kabupaten Maros”*, Makassar. 2014
- Breus MJ, *“Sleep Hygiene Solutions for Better Sleep”*. Available from: <http://www.webmd.com/sleep-disorders/features/sleep-hygiene>. Diakses pada: 1 Desember 2015.
- Colten, R., Altevogt. *“Sleep Disorder and Sleep Deprivation: An Unmet Public Health Problem”*. Wasington, DC: The Nasional Academic Press.
- Dariyo A, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*. Jakarta : Grasindo, 2008.
- Dement WC. *“Sleep Apnea Management Services for Payers, Doctors and Their Patients”*. 2010. Available from: www.sleepquest.com/pdf/SQ-128_corp_brochure.pdf. Diakses pada: 1 Desember 2015.
- Destiana Agustin, *“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Tidur Pada Pekerja Shift di PT. Krakatau Tirta Industri Cilegon”*, Skripsi, Depok: Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, 2012.
- Dewald JF, dkk. *“The influence of sleep quality, sleep duration and sleepiness on school performance in children and adolescents”* : A meta-analytic review. 2010.
- Dhea Rachmawati, *“Rerata Nilai Kualitas Hidup Pada Mahasiswa PSPD FKIK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Dengan Excessive Daytime Sleepiness (EDS) Dan Tanpa EDS.”* ,Skripsi, Jakarta: Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah, 2013.
- Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan, 2014.
- Dr. dr.Trihono. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, *“Riset Kesehatan Dasar 2013.”* Jakarta : Kementerian Kesehatan RI, 2013.
- Eviana S, dkk. *“Panduan Pemeriksaan Fisik Bagi Mahasiswa Keperawatan.”*, Jakarta. Salemba Medika. 2012.

- Fauziah dan Reni. *Gambaran Kualitas Tidur Pada Wanita Lanjut Usia (Lansia) di Panti Sosial Tresna Werdha Budi Pertiwi Bandung*. Skripsi Universitas Pendidikan Indonesia. Skripsi 2013.
- Guyton, A.C., HALL, J.E. *Buku Ajar Fisiologi Kedokteran*. Edisi 11. Jakarta; EGC. 2006.
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Maktabah Dahlan, Indonesia, Juz. IV, Hal. 1773, No. Hadits : 2263
- Intan Asmarita, “*Hubungan Antara Kualitas Tidur Dengan Tekanan Darah Pada Pasien Hipertensi Di Rumah Sakit Umum Daerah Karanganyar*” Skripsi, Surakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah , 2014.
- Iyer dan Ramnathan S. *Sleep and Type 2 Diabetes Mellitus- Clinical Implications. Association of Physicians*. Vol 60. http://www.japi.org/october_2012/08_oa_sleep_and_type_2.pdf . Diakses, 20 Januari 2016.
- Javaheri S, dkk. “*Sleep Quality and Elevated Blood Pressure in Adolescent. American Heart Association*” . Journal Circulation. 2008.
- Katsi>r. Luba>but Tafsir>r Min Ibni> Katsi>r (*Tafsir Ibnu Katsir Jilid I*), terj. M. Abdul Ghoffar. Cet. IV; Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi’I, 2005.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahan*. Jakarta: WALI, 2012.
- Khusnul dkk. “*Kualitas Tidur Lansia*”, Jurnal Nursing Studies. Volume 1. <http://ejournal-s1.unpid.ac.id./index.php/jnursing>. Diakses tanggal 20 Januari 2016.
- Kozier, B. “*Fundamentals of Nursing Concepts, Process, and Practice. New Jersey ; Pearson Prentise Hall*”, 2004.
- Kunnah, dkk. “*Kiat Tidur Sehat dan Berpahala*.” Yogyakarta: Kiswah, 2014.
- Loriz, L.M. *Excessive Daytime Sleepiness: How To Help Your Patient Manage. Clinical Excellence For Nurse Practitioners*. Vol.8. 2004.
- Lowry R, Eaton DK, dkk. “*Association of Sleep Duration with Obesity among US High School Students*.” Journal of Obesity. 2011.
- Mubarak, dkk. “*Buku Ajar Kebutuhan Dsar Manusia:Teori & Aplikasi Dalam Praktik*”, Jakarta: Buku Kedokteran EGC. 2007.
- National Heart, Lung, and Blood Institut dari U.S. *Department of Health and Human Services, 2009*. Healthy Sleep. www.nhlbi.nih.gov. (10 September 2015)
- Notoadmodjo dan Soekidjo. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta. Rineka . 2010.

- Nursalam. *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan*. Jakarta. SalembaMedika. 2008.
- Potter, dkk. *Fundamental Keperawatan :Konsep, Proses dan Praktik*. Jakarta : EGC, 2005.
- Putra Rizeme Sitiatava.. *Panduan Riset Keperawatan dan Penulisan Ilmiah*. Jakarta. D Medika. 2012.
- Qoys dan Iqbal.”*Pengaruh Dzikir Menjelang Tidur Terhadap Kualitas Tidur Lanjut Usia Di Panti Tresna Werdha Budi Mulia Di Jakarta Timur.*”, Skripsi. Jakarta. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, 2014.
- Raharjo, AR. *Rahasia Keajaiban Hidup Sehat dan Berkah Rasulullah*. Yogyakarta: Araska. 2014.
- Reefani NK. “*Pola hidup dan Tidur Sehat Ala Rasulullah saw.*” Jakarta: PT Gramedia. 2014.
- Remmes A. H. *Current Diagnosis and Treatment Neurology*. Sleep Disorders. Second Edition. Singapore : The McGraw-Hill Companies, Inc. pp. 483-491. 2012.
- RISKESDAS. “*Badan penelitian dan pengembangan kesehatan Kementerian kesehatan RI.*”, 2013.
- Riza dan Sigit , “*Hubungan Kualitas Tidur Dengan Fungsi Kognitif Dan Tekanan Darah Pada Lansia Di Desa Pasuruhan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang.*”, Jurnal Keperawatan, Magelang: Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah, 2012.
- Rosdianah, *Pemeriksaan Fisik Diagnostik*. Makassar: Alauddin University pres. 2012.
- Rosie dan Aaltje. “*Gambaran Tekanan Darah Pada Remaja Obes Di Kabupaten Minahasa.*”, Jurnal E-Biomedik (Ebm), Volume 1, Nor 2, (2013), Hlm. 951-955.
- Sagala dan Pina. “*Kualitas Tidur Dan Faktor Gangguan Tidur Pada Penderita Hipertensi Di Wilayah Kerja Puskesmas Medan Johor.*”, Skripsi. Medan. Universitas Sumatera Utara, 2011.
- Sayyid Quthb. (*Tafsir Fi Zhilalil Qur’an Jilid 12*), terj. As’ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil. Cet. I; Jakarta : Gema Insani Press, 2001.
- Shihab M. Quraish. (*Tafsir Al-Misbah Volume 13*). Cet. I; Jakarta : Lentera Hati, 2002.
- Sofyan, dkk. *Pola Hidup sehat Ala Rasulullah*. 2012. http://www.imsa.us/index.php?option=com_content&view=article&id=177:-pola-hidup-sehat-ala-rasulullah&catid=57:article-ramadan-2010&Itemid=10. Diakses April 2015.

- Susalit E, dkk. *Buku Ajar Ilmu Penyakit dalam II*. Jakarta :Balai penerbit FKUI; 2001.
- Taufiq Septiyo, dkk, “ *Hubungan Antara Pola Tidur Dengan Tekanan Darah Pada Pasien Hipertensi Di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Pontianak..*” *Jurna Keperawatan*, Program Studi Keperawatan, Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura, 2013.
- Uliyah, dkk, “keperawatan dasar praktik kebidanan”, Jakarta: Salemba Medika, 2006.
- Vina Prismawati, “*Kualitas Tidur dan Faktor-faktor Gangguan Tidur pada Penderita Hipertensi*”. Skripsi, Medan: Fakultas Keperawatan Unuversitas Sumatera Utara, 2011.
- Wendy M, et al, *marital quality and marital bed: examining the covariation between relationshipquality and sleep*. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17854738>. diakses 26 Februari 2016.
- World Health Organization, 2013. World Health Day – 7 April 2013. www.who.int. Diakses September 2015.

Lampiran I

PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN

Kepada Yth
Calon Responden
Di-
Tempat

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan UIN Alauddin Makassar.

Nama : Nurilmi
Nim : 70300112063
Alamat : Samata-Gowa

Akan mengadakan penelitian dengan judul “Hubungan Kualitas Tidur Dengan Tekanan Darah Pada Mahasiswa Keperawatan UIN Alauddin Makassar”.

Untuk keperluan tersebut saya memohon kesediaan dari Mahasiswa/Mahasiswi, untuk menjadi responden dalam penelitian ini dan menandatangani lembar persetujuan menjadi responden, selanjutnya saya mengharapkan Mahasiswa/Mahasiswi untuk bersedia menjawab pertanyaan yang kami berikan dan mengikuti prosedur yang kami tetapkan. Seluruh informasi yang Mahasiswa/Mahasiswi berikan selama penelitian akan dijamin kerahasiaannya, sehingga tidak akan merugikan Mahasiswa/Mahasiswi. Jika Mahasiswa/Mahasiswi tidak bersedia menjadi responden, tidak ada sanksi bagi Mahasiswa/Mahasiswi.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Peneliti

(Nurilmi)

Lampiran II

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

(Inform Consent)

Saya yang bertanda tangan dibawah ini bersedia dan tidak keberatan menjadi responden dalam penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar atas nama Nurilmi, dengan judul “Hubungan Kualitas Tidur Dengan Tekanan Darah Pada Mahasiswa Keperawatan UIN Alauddin Makassar” Saya berharap penelitian ini tidak akan mempunyai dampak negatif serta merugikan bagi saya dan keluarga saya, sehingga pertanyaan yang akan saya jawab benar-benar dirahasiakan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun untuk diperlukan sebagaimana mestinya.

Gowa, 29 Maret 2016

Responden

()

Lampiran III

KUESIONER PENELITIAN

Hubungan Kualitas Tidur Dengan Tekanan Darah Pada Mahasiswa Keperawatan
Uin Alauddin Makassar

I. Identitas Responden

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin : Pria Wanita

II. Index kualitas tidur Pittsburgh

Petunjuk :

Pertanyaan-pertanyaan berikut berhubungan dengan kebiasaan tidur anda selama dua minggu terakhir. Jawaban anda harus menunjukkan jawaban yang paling akurat dalam dua minggu terakhir.

Jawablah semua pertanyaan.

1. Selama dua minggu terakhir, pukul berapa Anda biasanya tidur di malam hari? _____
2. Selama dua minggu terakhir, berapa menit biasanya Anda habiskan waktu di tempat tidur , sebelum akhirnya Anda tertidur? _____
3. Selama dua minggu terakhir, jam berapa Anda biasanya bangun setiap pagi? _____

4. Selama dua minggu terakhir, berapa jam Anda tidur di malam hari?(Jumlah jam pada tidur malam) _____

Untuk pertanyaan berikut,pilih salah satu jawaban yang sesuai

5.Selama dua minggu terakhir,seberapa sering anda mengalami kesulitan tidur :	Tidak selama dua minggu terakhir	< 1 kali seminggu	1 kali / 2 kali seminggu	≥ 3 kali seminggu
a. Tidak bisa tidur dalam waktu 30 menit				
b. Terbangun di tengah malam atau bangun pagi terlalu cepat				
c. Terbangun karena ingin ke toilet				
d. Tidak dapat bernafas dengan nyaman				
e. Batuk atau mendengkur dengan keras				
f. Merasa terlalu dingin				
g. Merasa terlalu panas				
h. Mengalami mimpi buruk				
i. Merasa nyeri				
j. Alasan lain jelaskan :				
	Sangat baik	Baik	Buruk	Sangat buruk
6. Selama dua minggu				

terakhir, bagaimana anda menilai kualitas tidur anda secara keseluruhan?				
	Tidak selama dua minggu terakhir	< 1 kali seminggu	1 kali / 2 kali seminggu	≥ 3 kali seminggu
7. Selama dua minggu terakhir, seberapa sering anda mengonsumsi obat untuk membantu anda tidur ?				
8. Selama dua minggu terakhir, seberapa sering muncul masalah-masalah yang dapat mengganggu anda saat mengendarai kendaraan, makan, atau aktivitas sosial ?				
	Tidak ada masalah samasekali	Sangat sedikit masalah	Sedikit masalah	Masalah yang sangat besar
9. Selama dua minggu terakhir, berapa banyak masalah yang anda hadapi				
10. Apakah anda mempunyai teman sekamar?	Tidak memiliki teman sekamar	Teman sekamar di kamar yg berbeda	Teman sekamar di kamar yang sama namun berbeda tempat tidur	Teman sekamar dalam tempat tidur yang sama
Jika anda mempunyai teman sekamar, tanyalah dia seberapa sering anda pada dua minggu yang lalu:	Tidak ada pada bulan lalu	Kurang dari sekali seminggu	Kurang dari sekali seminggu	Tiga kali atau lebih seminggu
a. Mendengkur kuat				
b. Jeda yang panjang diantara dua nafas ketika tertidur				

c. Lasak ketika tertidur				
d. Disorientasi atau kebingungan selama tertidur				
e. Jika ada kegelisahan yang lain, tolong jelaskan:				

Lampiran IV

SKORING PITTSBURGH SLEEP QUALITY INDEX (PSQI)

Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) terdiri dari 19 pertanyaan unruk diri sendiri dan 5 pertanyaan untuk teman sekamar (jika memungkinkan). Hanya pertanyaan untuk diri sendiri yang dimasukkan dalam skoring. Kesembilan belas pertanyaan dikombinasikan dalam tujuh skor komponen. Setiap item memiliki poin 0-3. Dalam semua kondisi, skor 0 berarti tidak ada kesulitan, sedangkan skor 3 berarti agak kesulitan. Skor ketujuh komponen selanjutnya dijumlah dan dimasukkan kedalam suatu skor global dengan rentang 0-21, kualitas tidur baik: jika skor PSQI ≤ 5 dan kualitas tidur buruk: jika skor PSQI > 5 .

A. Komponen I: Kualitas Tidur Subjektif

Pertanyaan #6

Jawaban	Skor
“Sangat baik”	0

“Cukup baik”	1
“Cukup buruk”	2
“Sangat buruk”	3

Skor Komponen I: _____

B. Komponen II: Latensi Tidur

1. Pertanyaan #2

Jawaban	Skor
≤15 menit	0
16-30 menit	1
31-60 menit	2
>60 menit	3

Skor pertanyaan #2: _____

2. Pertanyaan #5a

Jawaban	Skor
Tidak selama satu bulan terakhir	0
< 1 kali seminggu	1
1 kali /2 kali seminggu	2
≥ 3 kali seminggu	3

Skor pertanyaan #5a: _____

3. Tambahkan jumlah skor #2 dengan skor #5a

Jumlah skor #2 + skor #5a: _____

4. Hasil skor komponen II

Jumlah skor #2 + skor #5a	Skor
0	0
1-2	1
3-4	2
5-6	3

Skor Komponen II: _____

C. Komponen III: Durasi Tidur

Pertanyaan #4

Jawaban	Skor
>7 jam	0
6-7 jam	1
5-6 jam	2
<5 jam	3

Skor Komponen III: _____

D. Komponen IV: Efisiensi Kebiasaan Tidur

1. Jam tidur (pertanyaan #4):
2. Kalkulasi jumlah waktu yang dihabiskan ditempat tidur

Jam bangun tidur (pertanyaan #3) :

Jam tidur (pertanyaan #1) :

Skor jumlah waktu yang dihabiskan ditempat tidur : _____

3. Kalkulasi efisiensi kebiasaan tidur

(Total jam tidur/ total waktu ditempat tidur) x 100 = efisiensi kebiasaan tidur (%)

(_____/ _____) x 100 = _____ %

4. Skor komponen IV

%Efisiensi kebiasaan tidur	Skor
>85%	0
75-84%	1
65-74%	2
<65%	3

Skor Komponen IV: _____

E. Komponen V: Gangguan tidur

1. Pertanyaan #5b-5j

Jawaban	Skor
Tidak selama satu bulan terakhir	0
< 1 kali seminggu	1
1 kali /2 kali seminggu	2
≥ 3 kali seminggu	3
Skor pertanyaan #5b:	_____
Skor pertanyaan #5c:	_____
Skor pertanyaan #5d:	_____
Skor pertanyaan #5e:	_____

Skor pertanyaan #5f: _____

Skor pertanyaan #5g: _____

Skor pertanyaan #5h: _____

Skor pertanyaan #5i: _____

Skor pertanyaan #5j: _____

2. Jumlah skor pertanyaan #5b-5j

Hasil penjumlahan pertanyaan #5b-5j: _____

3. Skor komponen V

Hasil penjumlahan pertanyaan #5b-5j	Skor
0	0
1-9	1
10-18	2
19-27	3

Skor Komponen V: _____

F. Komponen VI: Penggunaan obat tidur

Pertanyaan #7

Jawaban	Skor
Tidak selama satu bulan terakhir	0
< 1 kali seminggu	1
1 kali /2 kali seminggu	2
≥ 3 kali seminggu	3

Skor Komponen VI: _____

G. Komponen VII: Disfungsi siang hari

1. Pertanyaan #8

Jawaban	Skor
Tidak selama satu bulan terakhir	0
< 1 kali seminggu	1
1 kali /2 kali seminggu	2
≥ 3 kali seminggu	3
Skor pertanyaan #8:	_____

2. Pertanyaan #9

Jawaban	Skor
Tidak ada masalah sama sekali	0
Sangat sedikit masalah	1
Sedikit masalah	2
Masalah yang sangat besar	3
Skor pertanyaan #9:	_____

3. Hasil skor komponen VII

Jumlah skor #8 + skor #9	Skor
0	0
1-2	1
3-4	2
5-6	3

Skor Komponen VII: _____

Total Skor Global PSQI

Hasil penjumlahan komponen I-VII

Total skor global PSQI: _____

Lampiran V

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PEMERIKSAAN TEKANAN DARAH

1. *Mempersiapkan alat*
 - a. *Mengecek kembali semua peralatan sudah lengkap dan berfungsi dengan baik caranya memasang ear pieces pada telinga kemudian mengetuk bagian bell/ diafragma apakah stetoscope buntu/terdengar suara ketukan, membuka kotak tensimeter dengan cara menekan tombol pengunci bagian luar dari tensimeter.*
 - b. *Membuka kunci tabung air raksa dengan cara menggeser pengunci yang ada di bawah tabung air raksa kearah kiri.*
 - c. *Memastikan tensimeter Hg berfungsi dengan cara tangan kiri memegang manset, tangan kanan menutup katub bulb kearah kanan lalu memompa tensimeter lihat apakah air raksa ikut naik keatas/ tidak.*

- d. *Menggunakan masker apabila klien menderita penyakit saluran pernafasan.*
2. *Menjelaskan prosedur pada klien*
Agar pemeriksaannya lebih akurat sisi lengan baju ibu/bapak yang akan dilakukan pemeriksaan harus di longgarkan, nanti apabila saya memasang manset terlalu kencang tolong ibu/ bapak memberitahu saya.
 3. *Meminta persetujuan kepada klien*
Meminta persetujuan dari klien (bagaimana apakah bapak/ibu bersedia saya periksa tekanan darahnya?).
 4. *Menyiapkan klien*
 - a. *Mempersilahkan klien untuk duduk di kursi yang sudah disiapkan atau berbaring di tempat tidur*
 - b. *Mengatur posisi klien apabila dalam posisi duduk, klien duduk dengan cara kaki diregangkan, tangan sebelah kiri di letakan di atas meja, telapak tangan menghadap ke atas. · Jika berbaring, klien berbaring (rileks) mering kearah kiri, dan letakkan batas bawah air raksa sejajar dengan jantung klien. ·*
 - c. *Menganjurkan klien membuka pakaian yang menutupi lengan atas yang akan di periksa sehingga tidak menutupi dan menekan arteri brachialis, (apabila klien menggunakan pakaian yang ketat atau lengan panjang, dianjurkan klien untuk melepas bajunya terlebih dahulu dan menutupi badannya dengan selimut di ruang yang sudah di siapkan, kemudian klien dapat kembali duduk di kursi meja pemeriksaan).*
 5. *Mencuci tangan*
 6. *Memakai sarung tangan*

7. *Meletakkan stetoscope di leher Meletakkan stetoskop di leher dengan cara kedua tangan memegang ujung stetoskop kemudian stetoskop dilingkarkan pada leher.*
8. *Meraba arteri brachialis*
9. *Meminta klien untuk meluruskan tangan ke depan dan menggangkatnya sejajar bahu, meraba arteri brachialis yang berada di bawah aksila sebelah dalam yaitu dengan cara menarik garis khayal dari tepi kelingking menuju ke atas sampai teraba denyut nadi arteri brachialis.*
10. *Meletakkan pipa karet dan menentukan batas bawah manset.*
 - a. *Memasang pipa karet di atas denyut nadi arteri brachialis. Dan batas bawah manset setinggi 3 cm atau 2 jari diatas fosa kubiti. Untuk memasang manset jenis perekat caranya pasang manset 3 cm atau 2 jari di atas fosa kubiti, lingkarkan kearah kanan/ searah jarum jam pada lengan tempat pemeriksaan lalu rekatkan pada perekat manset. Jika menggunakan manset jenis pita kain caranya pasang manset manset 3 cm atau 2 jari di atas fosa kubiti, lingkarkan kearah kanan/ searah jarum jam pita kain pada lengan lalu kaitkan pengait pita pada pita yang di lingkarkan tadi. Jika menggunakan manset jenis perekat yang terdapat pengaitnya caranya pasang karet manset 3 cm atau 2 jari di atas fosa kubiti, lingkarkan manset kearah kanan/ searah jarum jam pada lengan lalu selipkan ujung kerat manset pada lubang yang tersedia kemudian tarik manset dan rekatkan pada perekat. Memastikan terpasang tidak terlalu kencang dengan merekatkan manset sesuai ukuran lengan klien*
11. *Menanyakan pada klien apakah manset terpasang terlalu kencang/ tidak, jika terpasang kencang maka longgarkan manset/ jika terlalu longgar maka kencangkan manset sesuai dengan lengan klien.*

12. *Menghubungkan manset dengan tensimeter* Menghubungkan manset dengan tensimeter Hg dengan posisi tegak, dan level air raksa setinggi jantung klien.
13. *Menutup katub bulb tensimeter*
Menutup katub bulb pada tensimeter dengan cara memutar kearah kanan/ searah jarum menggunakan tangan dominan.
14. *Meraba denyut nadi arteri radialis*
Meraba arteri radialis pada bagian atas pergelangan tangan klien dengan jari telunjuk dan jari tengah secara lembut.
15. *Menentukan letak penempatan bell stetoskop* Meraba arteri brachialis yang berada di fossa kubiti dengan tangan dominan untuk menempatkan bell stetoskop.
16. *Memompa balon karet*
 - a. *Meletakkan dua jari tangan non dominan diatas denyut nadi arteri radialis pada pergelangan tangan selanjutnya tangan dominan memompa balon karet secara perlahan dengan menggunakan tangan dominan sampai balon benar-benar kempis hingga denyut arteri radialis tidak teraba lagi.*
 - b. *Menambahkan pompa sehingga air raksa naik 20 – 30 mmHg.*
17. *Memasang stetoskop* Memasang ear pieces stetoskop ke dalam telinga, meletakkan bell stethoscope di atas arteri brachialis yang berada di fossa kubiti.
18. *Menurunkan air raksa*
 - a. *Memutar katub bulb dengan cara meletakkan katub bulb diantara ibu jari dan jari telunjuk tangan dominan kemudian secara perlahan putar katub bulb kearah kiri/ berlawanan dengan jarum jam, sehingga air raksa turun*

dengan kecepatan 2 – 3 mmHg/detik atau 1 skala/detik sambil mendengarkan perubahan suara yang terjadi.

- b. Menentukan sistole Memastikan tinggi air raksa saat terdengar detakan I (pertama) dari arteri brachialis (korotkoff I).....tekanan sistole.....*
- c. Menentukan diastole Melanjutkan menurunkan air raksa saat terjadi perubahan suara yang tiba – tiba melemah (korotkoff IV).....tekanan diastole.....*

19. Melepaskan earpieces dan manset

- a. Melepaskan ear piece stetoskop dari telinga.*
- b. Melepaskan manset dari lengan klien secara perlahan*

20. Menginformasikan kepada klien

- a. Memberi tahu klien mengenai hasil pemeriksaan (menyesuaikan dengan kondisi klien).*
- b. Mempersilahkan pasien untuk menunggu pemeriksaan selanjutnya.*

21. Merapikan klien.

22. Merapikan alat

- a. Membersihkan ear pieces stetoskop dan diafragma stetoskop dengan menggunakan kapas alkohol secara sirkuler*
- b. Meletakkan bekas kapas alkohol ke tempat sampah medis*
- c. Menutup kunci tabung air raksa tensimeter Hg dengan cara menggeser pengunci yang ada di bawah tabung air raksa ke arah kanan kemudian mengecek kemblai apakah air raksa telah terkunci dengan cara memiringkan tensimeter.*
- d. Merapikan pita manset dengan cara menggulung pita kain/ manset, meletakkan karet pompa serta katub bulb dibawah manset yang telah*

terguling serta meletakkanya pada bagian tengah tensimeter Hg yang kosong.

- e. Menutup tensimeter Hg dengan cara menurunkan bagian atas tensimeter Hg ke bagian bawah tensimeter sehingga kedua sisi menempel sampai terdengar suara klik.t 23. Melepas sarung tangan 24. Mencuci tangan 25. Mendokumentasikan dalam catatan perawatan*
- f. Mencatat semua hasil pemeriksaan yaitu hari/ tanggal pemeriksaan, nama pasien, umur pasien, alamat pasien, keluhan pasien, hasil pemeriksaan pengukuran tekanan darah, nama pemeriksa.*

Lampiran VI

DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar pengisian kuesioner PSQI



Gambar pemeriksaan tekanan darah pada responden laki-laki



Gambar pemeriksaan tekanan darah pada responden perempuan

Lampiran VII

MASTER TABEL

No	Inisial	Umur	Jenis kelamin	Kualitas tidur	Tekanan darah
1	Sd	4	1	2	2
2	Fa	3	1	2	2
3	Sn	3	2	2	2
4	Ga	2	1	2	2
5	Gn	3	1	2	2
6	Ra	4	1	2	2
7	Nn	3	1	2	2
8	Dp	3	2	2	1
9	An	3	2	1	2
10	Kh	3	2	2	2
11	Wd	3	2	2	2
12	Mn	3	2	2	2
13	Fa	3	2	2	2
14	Sr	3	2	2	2

15	Ba	3	2	2	2
16	Aa	3	2	2	3
17	Ra	1	2	2	2
18	In	2	2	2	2
19	Wa	2	2	2	2
20	Ra	2	2	2	2
21	In	2	2	2	1
22	Ya	2	2	2	2
23	Gn	3	2	2	1
24	Rp	3	2	2	2
25	Rr	4	2	2	2
26	En	3	2	2	1
27	Mr	3	2	2	1
28	Mm	3	2	2	2
29	Yy	3	2	2	1
30	Ka	3	2	2	1
31	St	4	2	2	2
32	Na	4	2	2	2
33	Hr	4	2	2	1
34	Id	3	2	2	2
35	Aa	4	1	2	2
36	Wy	3	2	2	1
37	Nh	3	2	2	2
38	Nn	1	2	2	1
39	Na	3	2	2	2
40	Ia	1	2	2	2
41	Ra	1	2	2	1
42	Nt	3	2	2	2
43	Ad	3	2	2	2
44	Nd	2	2	2	2
45	Nn	2	2	2	2
46	Nv	2	2	2	1
47	Nr	3	2	2	1
48	An	3	2	2	2
49	Ah	4	1	2	2
50	Rr	3	2	2	2
51	Ta	1	2	2	1
52	Mk	2	2	2	2
53	Yy	4	1	2	2
54	Fd	3	2	2	2
55	In	3	2	2	2
56	Ul	3	2	1	1
57	Jm	3	2	2	1
58	Af	4	1	2	2

59	Nh	3	2	2	1
60	As	3	2	2	2
61	Is	2	2	2	2
62	Wy	2	2	2	2
63	Nj	2	2	2	1
64	Nl	3	2	2	1
65	Qw	3	2	2	2
66	Aw	3	2	2	2
67	Ft	1	2	2	1
68	Mh	2	2	2	2
69	Ih	4	1	2	2
70	Sa	3	2	2	2
71	Mz	3	2	1	2
72	Nf	3	2	2	1
73	Hn	3	2	2	1
74	Am	4	1	2	2
75	Bb	3	2	2	1
	Total	19 thn = 6 20 thn = 14 21 thn = 43 22 thn = 12	L = 12 P = 63	Baik : 3 Buruk : 72	Rendah : 23 Normal : 51 Tinggi : 1

Keterangan : Umur (19=1, 20=2, 21=3, 22=4), Jenis kelamin (L=1, P=2), Kualitas tidur (≤ 5 =Baik, >5 =Buruk), Tekanan darah (Rendah=1, Normal=2, Tinggi=3)

Lampiran VIII

HASIL PENELITIAN UJI (SPSS)

Uji Normalitas Data

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Umur	75	100.0%	0	0.0%	75	100.0%
Jenis kelamin	75	100.0%	0	0.0%	75	100.0%
Kualitas tidur	75	100.0%	0	0.0%	75	100.0%
Tekanan darah	75	100.0%	0	0.0%	75	100.0%

Descriptives

		Statistic	Std. Error
Umur	Mean	2.81	.092
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	2.63
		Upper Bound	3.00
	5% Trimmed Mean	2.85	
	Median	3.00	

	Variance		.640	
	Std. Deviation		.800	
	Minimum		1	
	Maximum		4	
	Range		3	
	Interquartile Range		1	
	Skewness		-.622	.277
	Kurtosis		.264	.548
	Mean		1.84	.043
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	1.76	
		Upper Bound	1.92	
	5% Trimmed Mean		1.88	
	Median		2.00	
	Variance		.136	
Jenis kelamin	Std. Deviation		.369	
	Minimum		1	
	Maximum		2	
	Range		1	
	Interquartile Range		0	
	Skewness		-1.893	.277
	Kurtosis		1.626	.548
	Mean		1.96	.023
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	1.91	
		Upper Bound	2.01	
	5% Trimmed Mean		2.00	
	Median		2.00	
	Variance		.039	
Kualitas tidur	Std. Deviation		.197	
	Minimum		1	
	Maximum		2	
	Range		1	
	Interquartile Range		0	
	Skewness		-4.791	.277
	Kurtosis		21.529	.548
	Mean		1.71	.056
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	1.59	
Tekanan darah		Upper Bound	1.82	
	5% Trimmed Mean		1.71	

Median	2.00	
Variance	.237	
Std. Deviation	.487	
Minimum	1	
Maximum	3	
Range	2	
Interquartile Range	1	
Skewness	-.561	.277
Kurtosis	-.803	.548

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Umur	.326	75	.000	.822	75	.000
Jenis kelamin	.508	75	.000	.441	75	.000
Kualitas tidur	.540	75	.000	.196	75	.000
Tekanan darah	.420	75	.000	.637	75	.000

a. Lilliefors Significance Correction

Uji Chi Square (Crosstabulation Kualitas tidur*Tekanan darah)

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Kualitas tidur * Tekanan darah	75	100.0%	0	0.0%	75	100.0%

Kualitas tidur * Tekanan darah Crosstabulation

Expected Count

		Tekanan darah			Total
		Rendah	Normal	Tinggi	
Kualitas tidur	baik	.9	2.0	.0	3.0
	buruk	22.1	49.0	1.0	72.0
Total		23.0	51.0	1.0	75.0

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	1.915 ^a	2	.384	.257	
Likelihood Ratio	1.758	2	.415	.566	
Fisher's Exact Test	3.404			.257	
Linear-by-Linear Association	1.837 ^b	1	.175	.236	.217
N of Valid Cases	75				

a. 4 cells (66.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .04.

b. The standardized statistic is 1.355.