

**FORMULASI SEDIAAN KRIM EKSTRAK METANOL  
DAUN JATI (*Tectona grandis* L.F) DAN UJI EFEKTIFITASNYA  
TERHADAP BAKTERI *Staphylococcus aureus***



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi  
pada Fakultas Ilmu Kesehatan  
Universitas Islam Negeri  
Alauddin Makassar**

**Oleh**

**HERMIN**  
**NIM: 70100106 033**

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
2010**

## **PERNYATAAN KEASLIHAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 21 Juni 2010

Penulis,

**Hermin**  
70 100 106 033

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Formulasi sediaan krim ekstrak metanol daun jati (*Tectona grandis* L.F) da uji efektifitasnya terhadap bakteri *Staphylococcus aureus*” yang disusun oleh Hermin, NIM: 70100106033, mahasiswa Jurusan Farmasi pada Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2010 M bertepatan dengan tanggal 12 Sya’ban 1431 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 22 Juli 2010 M  
12 Sya’ban 1431 H


### DEWAN PENGUJI:

Ketua : **Gemy Nesity Handayani, S.Si, M.Si., Apt** ( )  
Sekretaris : **Isriany Ismail, S.Si, M.Si., Apt** ( )  
Penguji I : **Haeria, S.Si.** ( )  
Penguji II : **Dr. Abdullah. S.Ag, M.Ag** ( )

Diketahui oleh:  
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar,

**dr. M. Furqaan Naiem, M.Sc., Ph.D.**  
**NIP. 19580404 1989031 001**

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, tiada kata yang lebih patut diucapkan oleh seorang hamba selain mengucapkan puji Syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan segala pemilik ilmu kerana atas berkat hidayah-Nya maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi dengan judul “Formulasi Sediaan Krim Ekstrak Metanol Daun Jati (*Tectona grandis* L.F) dan Uji Efektifitasnya Terhadap Bakteri *Staphylococcus aureus*”, ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Pada kesempatan ini penulis menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua tercinta, Ayahanda H. Arsyad K., dan Ibunda Hj. Miskiyah, yang tak putus-putus atas segala doa restu, kasih sayang, nasehat dan bantuan moril maupun materi selama menempuh pendidikan hingga selesainya penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Bapak Dekan dan Para Pembantu Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Ibu Gemy Nastity Handayani S.Si., M.Si., Apt. Sebagai pembimbing Pertama serta Ibu Isriany Ismail S.Si., M.Si., Apt. Selaku pembimbing kedua yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan serta meluangkan waktu

dan pikirannya dalam membimbing penulis sejak awal perencanaan penelitian sampai selesainya penyusunan skripsi ini.

5. Ibu Haeria, S.Si., Apt., selaku Penguji dan Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan.
6. Bapak DR. Abdullah S.Ag, M.Ag., selaku Penguji Agama yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis.
7. Ibu Ketua Jurusan Farmasi UIN Alauddin Makassar, Bapak, Ibu Dosen, serta Seluruh Staf Jurusan Farmasi atas curahan ilmu pengetahuan dan segala bantuan yang diberikan pada penulis sejak menempuh pendidikan farmasi, melaksanakan pendidikan hingga selesainya skripsi ini.
8. Kakak-kakak jurusan farmasi angkatan 2005, terkhusus Kakak A.Armisman Edy Paturusi S.Farm, Kakak Rusydi S.Farm, Kakak Kisrin Mirwan S.Farm, dan kakak Wahyuni Hasan S.Farm yang selalu memberikan bantuan baik secara materi maupun secara moril selama penyusunan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan angkatan 2006 terutama Abd. Azis, Jayadi, Evi Jayatri Bodini, Fitriana, Budhi Sentosa Putra, Asrul Ismail, Maryam, Riswadi, Dilla, Rusmiati, Asma Yahrib, Fahri kadir, Fitriana dan Asrul Ihsan. AF atas segala bantuannya selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, serta teman-teman yang tidak sempat disebutkan namanya satu per satu, pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan banyak terima kasih.

10. Adik-adik jurusan farmasi angkatan 2007, 2008 & 2009, yang selalu memberikan bantuan baik secara materi maupun secara moril selama penyusunan skripsi ini.

Disadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, namun besar harapan penulis kiranya skripsi ini dapat bernilai ibadah di sisi Allah SWT, dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Amin...

Makassar, 21 Juni 2010

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
<i>A. Latar Belakang</i> .....	1
<i>B. Rumusan Masalah</i> .....	2
<i>C. Maksud dan Tujuan Penelitian</i> .....	3
<i>D. Manfaat Penelitian</i> .....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	5
<i>A. Uraian Kulit</i> .....	5
1. Gambaran Umum Kulit .....	5
2. Permeabilitas dan Penetrasi Kulit.....	8
<i>B. Uraian Infeksi-infeksi Kulit Oleh Staphylococcus aureus</i> .....	9
1. Bakteri Penyebab.....	10
2. Bentuk Infeksi Kulit.....	10
3. Jenis-jenis Infeksi Disebabkan oleh Staphylococcus aureus.	10
<i>C. Uraian Krim</i> .....	14
<i>D. Uraian Emulgator</i> .....	15

1. Pembagian Emulgator.....	15
2. Mekanisme Emulgator.....	16
3. Sistem Keseimbangan Hidrofilik-Lipofilik .....	17
E. <i>Evaluasi Kestabilan Emulsi</i> .....	18
1. Kriming.....	18
2. Viskositas.....	19
3. Perubahan Ukuran Tetes Terdispersi.....	19
4. Inverse Fase.....	19
F. <i>Kondisi Penyimpanan Dipercepat</i> .....	20
G. <i>Uraian Antimikroba</i> .....	20
1. Pengertian Antimikroba.....	20
2. Sifat Antimikroba.....	21
3. Prinsip Kerja Antimikroba.....	21
4. Mekanisme Antimikroba.....	22
H. <i>Uraian Tumbuhan</i> .....	24
1. Klasifikasi.....	24
2. Morfologi.....	24
3. Nama Daerah.....	25
4. Kandungan Kimia.....	25
5. Khasiat.....	25
I. <i>Uraian Bahan Tambahan</i> .....	26
J. <i>Uraian Mikroorganisme</i> .....	29
1. Klasifikasi.....	29
2. Sifat dan Morfologi.....	29
K. <i>Tinjauan Islam Mengenai Penelitian Tumbuhan Obat</i> .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>37</b>
A. <i>Alat dan Bahan</i> .....	37
B. <i>Prosedur Kerja</i> .....	37
1. Pengambilan Sampel.....	37
2. Pengolahan Sampel.....	38



3.	Ekstraksi Sampel.....	38
4.	Sterilisasi Alat.....	38
5.	Pembuatan Medium.....	39
6.	Penyiapan Bakteri Uji.....	39
7.	Penentuan Zona Hambat Optimum.....	40
8.	Pembuatan Sediaan Krim dengan Emulgator Nonionik...	41
9.	Pemeriksaan Hasil Jadi Krim Pemeriksaan Hasil Jadi krim.....	42
10.	Pengujian Efektifitas Sediaan Terhadap Bakteri Staphy lococcus aureus.....	44
11.	Pengumpulan dan Analisis Data... ..	44
BAB IV	HASIL DAN PENBAHASAN.....	45
	<i>A. Hasil Penelitian.....</i>	45
	1. Pengamatan Organoleptis.....	45
	2. Penentuan Tipe Emulsi.....	45
	3. Evaluasi Kestabilan Fisik.....	46
	4. Pengukuran Daya Hambat.....	47
	<i>B. Pembahasan.....</i>	47
BAB V	PENUTUP.....	53
	<i>A. Kesimpulan.....</i>	53
	<i>B. Saran.....</i>	53
	DAFTAR PUSTAKA.....	54
	LAMPIRAN.....	57
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	95

## DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
1. Perhitungan Konsentrasi Surfaktan Nonionik.....	62
2. Hasil Pengamatan Uji Tipe Emulsi.....	65
3. Hasil Pengukuran Volume Kriming (%).....	66
4. Hasil Pengukuran Viskositas Krim (poise).....	67
5. Analisis Statistika Viskositas .....	68
6. Analisis Varians Viskositas.....	69
7. Rentang Ukuran Tetes Terdispersi.....	70
8. Analisis Statistika Tetes Terdispersi ( $\mu\text{m}$ ).....	72
9. Analisis Varians Tetes Terdispersi.....	73
10. Hasil Pengukuran Zona Hambatan Krim Sebelum dan Setelah Penyimpanan Dipercepat (mm (mm)).....	75
11. Analisis Statistika Zona Hambat Krim Sebelum dan Setelah Penyimpanan Dipercepat (mm).....	76
12. Analisis Varians Zona Hambatan Krim Sebelum dan Setelah Penyimpanan Dipercepat (mm).....	77
13. Hasil Pengukuran Zona Hambatan Krim Pada Kondisi Penyimpanan Dipercepat Inkubasi 1 x 24 Jam dan 2 x 24 Jam.....	78
14. Analisis Statistika Zona Hambat (mm) Krim Pada Kondisi Penyimpanan Dipercepat Inkubasi 1 x 24 Jam dan 2 x 24 Jam .....	78
15. Analisis Varians Zona Hambatan Krim Pada Kondisi Penyimpanan Dipercepat Inkubasi 1 x 24 Jam dan 2 x 24 Jam .....	80

## DAFTAR GAMBAR


Nomor	Halaman
1. Pengujian Zona Hambat Optimum Ekstrak Metanol Daun Jati ( <i>Tectona grandis</i> L.F)..	64
2. Histogram Viskositas Krim (poise) Sebelum Dan Seteah Kondisi Dipercepat.....	81
3. Histogram Ukuran Tetes Terdispersi Krim ( $\mu\text{m}$ ) Sebelum Dan Sete lah Kondisi Penyimpanan Dipercepat.....	81
4. Histogram Zona Hambatan Krim (mm) Sebelum dan Setelah Kon disisi dipercepat.....	82
5. Pengamatan Pada Kondisi Sebelum Penyimpanan Dipercepat Pada Krim Dengan kombinasi Emulgator Tween 60 Dan Span 60.....	83
6. Uji Pengenceran Krim Dengan kombinasi Emulgator Tween 60 Dan Span 60 Pada Kondisi Sebelum Penyimpanan Dipercepat.....	84
7. Pengamatan Pada Kondisi Setelah Penyimpanan Dipercepat Pada Krim Dengan kombinasi Emulgator Tween 60 Dan Span 60.....	85
8. Uji Pengenceran Krim Dengan kombinasi Emulgator Tween 60 Dan Span 60 Pada Kondisi Setelah Penyimpanan Dipercepat .....	86
9. Uji Hantaran Listrik Pada Krim Dengan kombinasi Emulgator Tween 60 Dan Span 60 Pada Kondisi Sebelum Penyimpanan Dipercepat....	87
10. Uji Hantaran Listrik Pada Krim Dengan kombinasi Emulgator Tween 60 Dan Span 60 Pada Kondisi Sebelum Penyimpanan Dipercepat ...	88
11. Uji Volume Kriming Pada Krim Dengan kombinasi Emulgator Tween 60 Dan Span 60 Pada Kondisi Setelah Penyimpanan Dipercepat.....	89
12. Uji Tetes Terdispersi Pada Krim Dengan kombinasi Emulgator Tween 60 Dan Span 60 Pada Kondisi Sebelum Penyimpanan Dipercepat.....	90
13. Uji Tetes Terdispersi Pada Krim Dengan kombinasi Emulgator Tween 60 Dan Span 60 Pada Kondisi Setelah Penyimpanan Dipercepat.....	91
14. Uji Efektifitas Sediaan Pada Pada Kondisi Sebelum Penyimpanan Dipercepat Inkubasi 1 x 24 Jam Pada Suhu 37° C.....	92
15. Uji Efektifitas Sediaan Pada Pada Kondisi Sebelum Penyimpanan	

Dipercepat Inkubasi 2 x 24 Jam Pada Suhu 37° C.....	92
16. Uji Efektifitas Sediaan Pada Pada Kondisi Setelah Penyimpanan	
Dipercepat Inkubasi 1 x 24 Jam Pada Suhu 37° C.....	93
17. Uji Efektifitas Sediaan Pada Pada Kondisi Setelah Penyimpanan	
Dipercepat Inkubasi 2 x 24 Jam Pada Suhu 37° C.....	93
18. Gambar Tumbuhan Jati.....	94


## DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Halaman
1. Skema Kerja Ekstraksi Daun Jati ( <i>Tectona grandis</i> L.F).....	57
2. Skema Penentuan Zona Hambat Optimum Ekstrak Metanol Daun Jati ( <i>Tectona grandis</i> L.F).....	58
3. Skema Kerja Pembuatan krim Dengan surfaktan nonionic.....	59
4. Skema Pengujian Kestabilan Krim.....	60
5. Skema Pengujian Daya Hambat Sediaan Terhadap Bakteri <i>Staphyloco</i> <i>ccus aureus</i> .....	61
6. Perhitungan Konsentrasi Surfaktan Nonionik.....	62
7. Foto Pengujian Penentuan Zona Hambat Optimum Ekstrak Metanol Daun Jati ( <i>Tectona grandis</i> L.F ).....	64
8. Hasil Pengamatan Uji Tipe Emulsi.....	65
9. Pengukuran Volume Kriming (%).....	66
10. Hasil Pengukuran Viskositas Krim (poise).....	67
11. Analisis Statistika Viskositas Krim Dengan Rancangan Acak Kelompok (RAK).....	68
12. Analisis Varians Viskositas.....	69
13. Rentang Ukuran Tetes Terdispersi.....	70
14. Analisis Statistika Tetes Terdispersi ( $\mu\text{m}$ ) Krim Dengan Rancangan Acak Kelompok (RAK).....	72
15. Analisis Varians Tetes Terdispersi.....	73
16. Perhitungan Skala Lensa Okuler Dengan Lensa Objektif.....	74
17. Hasil Pengukuran Zona Hambatan Krim (mm).....	75
18. Analisis Statistika Zona Hambatan (mm) Krim Dengan Rancangan Acak Kelompok (RAK).....	76
19. Analisis Varians Zona Hambatan Krim.....	77
20. Hasil Pengukuran Zona Hambatan Krim (mm).....	78
21. Analisis Statistika Zona Hambatan Krim (mm) Dengan Rancangan Acak Kelompok (RAK).....	79

22. Analisis Varians Zona Hambatan Krim.....	80
23. Histogram Krim Sebelum dan Setelah Kondisi Dipercepat.....	81
24. Krim Sebelum Penyimpanan Dipercepat .....	83
25. Uji Pengenceran Pada Kondisi Sebelum Penyimpanan Dipercepat.....	84
26. Krim Setelah Penyimpanan Dipercepat.....	85
27. Uji Pengenceran Pada Kondisi Setelah Penyimpanan Dipercepat....	86
28. Uji Hantaran Listrik Sebelum Kondisi Penyimpanan dipercepat.....	87
29. Uji Hantaran Listrik Setelah Kondisi Penyimpanan dipercepat.....	88
30. Uji Volume Kriming Setelah Kondisi Penyimpanan Dipercepat.....	89
31. Uji Tetes Terdispersi Sebelum Kondisi Penyimpanan Dipercepat/....	90
32. Uji Tetes Terdispersi Setelah Kondisi Penyimpanan Dipercepat.....	91
33. Uji Efektifitas Sediaan Krim Terhadap <i>Staphylococcus aureus</i> Sebelum Kondisi Dipercepat.....	92
34. Uji Efektifitas Sediaan Krim Terhadap <i>Staphylococcus aureus</i> Setelah Kondisi Dipercepat.....	93
35. Foto Tumbuhan Jati.....	94


Lampiran 1. Skema Kerja Ekstraksi Daun Jati (*Tectona grandis* L.F)

Lampiran 2. Skema Penentuan Zona Hambat Optimum Ekstrak Metanol Daun Jati (*Tectona grandis* L.F)







Lampiran 3. Skema Kerja Pembuatan Krim Dengan Surfaktan Nonionic



Lampiran 4. Skema Pengujian Kestabilan Krim



Lampiran 5. Skema Pengujian Daya Hambat Sediaan Terhadap Bakteri  
*Staphylococcus aureus*




## Lampiran 6

Tabel 1. Perhitungan Konsentrasi Surfaktan Nonionik

Fase minyak	A (Gram )	HLB Butuh	A x B	A x B
				Jumlah A (Gram)
Asam Stearat	3	15	45	2,5
Cetyl Alkohol	5	13	65	3,6
Adeps Lanae	5	15	75	4,17
Parafin Cair	5	12	60	3,33
	18			13,6

Jumlah HLB butuh fase minyak      13,6  
 HLB Span                                        4,7  
 HLB Tween                                     14,9



## a. Formula I

Konsentrasi emulgator 2 %

$$\frac{2}{100} \times 100 \text{ g} = 2 \text{ g}$$

$$\text{Tween 60} \frac{8,9}{10,2} \times 2 \text{ g} = 1,745 \text{ g}$$

$$\text{Span 60} \frac{1,3}{10,2} \times 2 \text{ g} = 0,225 \text{ g}$$

## b. Formula II

Konsentrasi emulgator 3 %

$$\frac{3}{100} \times 100 \text{ g} = 3 \text{ g}$$

$$\text{Tween 60 } \frac{8,9}{10,2} \times 3 \text{ g} = 2,618 \text{ g}$$

$$\text{Span 60 } \frac{1,3}{10,2} \times 3 \text{ g} = 0,382 \text{ g}$$

## c. Formula III

Konsentrasi emulgator 4 %

$$\frac{4}{100} \times 100 \text{ g} = 4 \text{ g}$$

$$\text{Tween 60 } \frac{8,9}{10,2} \times 4 \text{ g} = 3,490 \text{ g}$$

$$\text{Span 60 } \frac{1,3}{10,2} \times 4 \text{ g} = 0,510 \text{ g}$$

Lampiran 7. Foto Pengujian Penentuan Zona Hambat Optimum Ekstrak Metanol Daun Jati (*Tectona grandis* L.F)



Gambar 1. Foto Pengujian Penentuan Zona Hambat Optimum Ekstrak Metanol Daun Jati (*Tectona grandis* L.F)

Keterangan :

Dengan diameter hambatan :

- |          |           |
|----------|-----------|
| a. 0,2 % | = 0,8 cm  |
| b. 0,4%  | = 0,9 cm  |
| c. 0,8%  | = 1,2 cm  |
| d. 1,6 % | = 1,22 cm |
| e. 3,2 % | = 1,23 cm |
| f. 6,4 % | = 1,86 cm |
| g. 12,8% | = 2,03 cm |

Lampiran 8.

Tabel 2. Hasil Pengamatan Uji Tipe Emulsi

Krim	Tipe Emulsi			
	Sebelum Kondisi Penyimpanan Dipercepat		Setelah Kondisi Penyimpanan Dipercepat	
	Uji Pengenceran	Uji Hantaran Listrik	Uji Pengenceran	Uji Hantaran Listrik
I	M/A	M/A	M/A	M/A
II	M/A	M/A	M/A	M/A
III	M/A	M/A	M/A	M/A

Keterangan:

M/A = Emulsi tipe minyak dalam air

I = Krim dengan kombinasi emulgator tween 60 dan span 60 konsentrasi 2%

II = Krim dengan kombinasi emulgator tween 60 dan span 60 konsentrasi 3%

III = Krim dengan kombinasi emulgator tween 60 dan span 60 konsentrasi 4%

## Lampiran 9

Tabel 3. Hasil Pengukuran Volume Kriming (%)

Siklus	Krim		
	I	II	III
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	0	96	0
7	0	96	0
8	96	92	0
9	96	92	0
10	96	92	0

Keterangan :

Volume awal : 25 ml

I = Krim dengan kombinasi emulgator tween 60 dan span 60 konsentrasi 2%

II = Krim dengan kombinasi emulgator tween 60 dan span 60 konsentrasi 3%

III = Krim dengan kombinasi emulgator tween 60 dan span 60 konsentrasi 4%



## Lampiran 10

Table 4. Hasil Pengukuran Viskositas Krim (poise)

Krim	Sebelum Kondisi Penyimpanan Dipercepat	Setelah Kondisi Penyimpanan Dipercepat
	42	38
I	39	36
	38	36
<b>Rata-rata</b>	<b>39,7</b>	<b>36,7</b>
	56	52
II	58	48
	59	50
<b>Rata-rata</b>	<b>57,7</b>	<b>50</b>
	53	58
III	52	63
	50	63
<b>Rata-rata</b>	<b>51,7</b>	<b>61,3</b>

Keterangan :

I = Krim dengan kombinasi emulgator tween 60 dan span 60 konsentrasi 2%

II = Krim dengan kombinasi emulgator tween 60 dan span 60 konsentrasi 3%

III = Krim dengan kombinasi emulgator tween 60 dan span 60 konsentrasi 4%

## Lampiran 11

Tabel 5. Analisis Statistika Viskositas Krim Dengan Rancangan Acak Kelompok (RAK)

Viskositas	Formula Krim				
	I	II	III	Total	Rata-rata
Sebelum Penyimpanan	39,7	57,7	51,7	149,1	49,70
Setelah Penyimpanan	36,7	50	61,3	148	49,3333
Total	76,4	107,7	113	297,1	99.0333
Rata	38,2	53,85	56,5	148,55	49,5167

$$\text{Faktor koreksi} = \frac{(\Sigma Y)^2}{axb} + \frac{(297,1)^2}{3 \times 2} = 14711,40$$

$$\begin{aligned} \text{JK Total (JKT)} &= (39,7)^2 + (57,7)^2 + (51,7)^2 + \dots (61,3)^2 - FK \\ &= 15182,85 - 14711,40 \\ &= 471,45 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{JK Krim (JKK)} &= \frac{(76,4)^2 + (107,7)^2 + (113)^2}{2} - FK \\ &= 15102,63 - 14711,40 \\ &= 391,23 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{JK Kondisi} &= \frac{(149,1)^2 + (148)^2}{3} - FK \\ &= 14711,60 - 14711,40 \\ &= 0,2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{JK Galat (JKT)} &= \text{JK Total} - (\text{JK Krim} + \text{JK Kondisi}) \\ &= 471,49 - (391,23 + 0,2) \\ &= 471,45 - 391,43 \\ &= 80,02 \end{aligned}$$

## Lampiran 12

Table 6. Analisis Varians Viskositas

Rumus Variansi	db	JK	KT	Fh	Tabel 5%	Tabel 1%
Krim	2	391,23	195,62	4,889	19,00	99,01
Kondisi	1	0,2	0,2	0,005	18,51	98,49
Galat	2	80,02	40,01			
Total	5	471,45				

$$FH_{2,2}(\text{krim}) = 4,889$$

$$FH_{1,2}(\text{kondisi}) = 0,005$$

$$\begin{aligned} \text{Untuk FT 5\%} &= 4,889 < 19,00 (\text{krim}) \longrightarrow \text{Berbeda tidak nyata (ns)} \\ &= 0,005 < 18,51 (\text{kondisi}) \longrightarrow \text{Berbeda tidak nyata (ns)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Untuk FT 1\%} &= 4,889 < 99,01 (\text{krim}) \longrightarrow \text{Berbeda tidak nyata (ns)} \\ &= 0,005 < 98,49 (\text{kondisi}) \longrightarrow \text{Berbeda tidak nyata (ns)} \end{aligned}$$

## Lampiran 13

Tabel 7. Rentang Ukuran Tetes Terdispersi

## 1. Krim I

Rentang Ukuran Tetes Terdispersi ( $\mu\text{m}$ )	d ( $\mu\text{m}$ )	Sebelum Kondisi Dipercepat		Setelah Kondisi Dipercepat	
		n	n.d	N	n.d
6,6 – 13,2	9,9	70	693	40	396
19,8 – 26,4	23,1	130	3003	150	3465
33 – 39,6	36,3	40	1452	40	1452
46,2 – 52,8	49,5	10	495	20	990
Jumah		250	5643	250	6303

$$Rt0 = \frac{5643}{250} = 22,57 (\mu\text{m})$$

$$Rt1 = \frac{6303}{250} = 25,2 (\mu\text{m})$$

## 2. Krim II

Rentang Ukuran Tetes Terdispersi ( $\mu\text{m}$ )	d ( $\mu\text{m}$ )	Sebelum Kondisi Dipercepat		Setelah Kondisi Dipercepat	
		n	n.d	N	n.d
6,6 – 13,2	9,9	120	1188	100	990
19,8 – 26,4	23,1	80	1848	60	1386
33 – 39,6	36,3	40	1452	80	2904
46,2 – 52,8	49,5	10	495	10	495
Jumah		250	4983	250	5775

$$Rt0 = \frac{4983}{250} = 19,93 (\mu\text{m})$$

$$Rt1 = \frac{5775}{250} = 23,1 (\mu\text{m})$$

## 3. Krim III

Rentang Ukuran Tetes Terdispersi ( $\mu\text{m}$ )	d ( $\mu\text{m}$ )	Sebelum Kondisi Dipercepat		Setelah Kondisi Dipercepat	
		n	n.d	N	n.d
6,6 – 13,2	9,9	235	2326,5	215	2128,5
19,8 – 26,4	23,1	15	346,5	20	462
33 – 39,6	36,3	-	-	15	544,5
46,2 – 52,8	49,5	-	-	-	-
Jumah		250	2672	250	3135

$$Rt_0 = \frac{2672}{250} = 10,69 (\mu\text{m})$$

$$Rt_1 = \frac{3135}{250} = 12,54 (\mu\text{m})$$

## Lampiran 14

Tabel 8. Analisis Statistika Tetes Terdispersi ( $\mu\text{m}$ ) Krim Dengan Rancangan Acak Kelompok (RAK)

Viskositas	Formula Krim				
	I	II	III	Total	Rata-rata
Sebelum Penyimpanan	22,57	19,93	10,69	53,19	17,73
Setelah Penyimpanan	25,20	23,1	12,54	60,84	20,28
Total	47,77	43,03	23,23	114,03	38,01
Rata	23,89	21,51	11,61	57,02	19,01

$$\text{Faktor Koreksi} = \frac{(\Sigma Y)^2}{axb} + \frac{(114,03)^2}{3x2} = 2167,14$$

$$\begin{aligned} \text{JK Total (JKT)} &= (22,57)^2 + (19,93)^2 + (10,69)^2 + \dots + (12,54)^2 - \text{FK} \\ &= 2346,78 - 2167,14 \\ &= 179,64 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{JK Krim (JKK)} &= \frac{(47,77)^2 + (43,03)^2 + (23,23)^2}{2} - \text{FK} \\ &= 2336,59 - 2167,14 \\ &= 169,43 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{JK Kondisi} &= \frac{(53,19)^2 + (60,84)^2}{3} - \text{FK} \\ &= 2176,90 - 2167,14 \\ &= 9,76 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{JK Galat (JKT)} &= \text{JK Total} - (\text{JK Krim} + \text{JK Kondisi}) \\ &= 179,64 - (169,43 + 9,76) \\ &= 179,64 - 179,19 \\ &= 0,48 \end{aligned}$$

## Lampiran 15

Tabel 9. Analisis Varians Tetes Terdispersi

Rumus Variansi	db	JK	KT	Fh	Tabel 5%	Tabel 1%
Krim	2	169,43	84,72	353	19,0	99,01
Kondisi	1	9,76	9,76	40,67	18,51	98,49
Galat	2	0,48	0,24			
Total	5					

FH 2,2 (Krim) = 353

FH 1,2 (Kondisi) = 40,67

Untuk FT 5% = 353 > 19,00 (krim) → Berbeda sangat nyata (s)

= 40,67 > 18,51 (kondisi) → Berbeda sangat nyata (s)

Untuk FT 1% = 353 > 99,01 (krim) → Berbeda sangat nyata (s)

= 40,67 < 98,49 (kondisi) → Berbeda tidak nyata (ns)

### Lampiran 16. Perhitungan Skala Lensa Okuler Dengan Lensa Objektif

Perbesaran lensa yang digunakan =  $10 \times 10$

Garis mikrometer yang berhimpitan adalah :

Skala pada mikrometer okuler = 10

Skala pada mikrometer objektif = 15

Satuan skala yang tertera pada mikrometer objektif = 0,01 mm

Maka, ukuran 1 skala pada mikrometer okuler adalah =

$$\frac{10}{15} \times 0,01 \text{ mm} = 0,0066 \text{ mm} = 6,6 \mu\text{m}$$



## Lampiran 17

Tabel 10. Hasil Pengukuran Zona Hambatan Krim (mm)

Krim	Sebelum Kondisi Penyimpanan Dipercepat	Setelah Kondisi Penyimpanan Dipercepat
	11,16 mm	13,00 mm
I	11,12 mm	11,00 mm
	12,00 mm	12,18 mm
<b>Rata-rata</b>	<b>11,43</b> mm	<b>12,06</b> mm
	10,09 mm	11,00 mm
II	12,00 mm	10,00 mm
	10,09 mm	10,15 mm
<b>Rata-rata</b>	<b>10,73</b> mm	<b>10,38</b> mm
	10,07 mm	09,75 mm
III	10,14 mm	10,20 mm
	11,16 mm	09,06 mm
<b>Rata-rata</b>	<b>10,46</b> mm	<b>9,67</b> mm
	00,00 mm	00,00 mm
IV	00,00 mm	00,00 mm
	00,00 mm	00,00 mm
<b>Rata-rata</b>	<b>00,00</b> mm	<b>00,00</b> mm

Keterangan :

- I = Krim dengan kombinasi emulgator tween 60 dan span 60 konsentrasi 2%  
 II = Krim dengan kombinasi emulgator tween 60 dan span 60 konsentrasi 3%  
 III = Krim dengan kombinasi emulgator tween 60 dan span 60 konsentrasi 4%  
 IV = Krim dengan kombinasi emulgator tween 60 dan Span 60 (Kontrol)

## Lampiran 18

Tabel 11. Analisis Statistika Zona Hambatan (mm) Krim Dengan Rancangan Acak Kelompok (RAK)

Zona Hambat	Formula Krim				
	I	II	III	Total	Rata-rata
Sebelum Penyimpanan	11,43	10,73	10,46	32,62	10,87
Setelah Penyimpanan	12,06	10,38	9,67	32,11	10,70
Total	23,49	21,11	20,13	64,73	21,57
<b>Rata</b>	<b>11,75</b>	<b>10,56</b>	<b>10,07</b>	<b>32,37</b>	<b>10,79</b>

$$\text{Faktor koreksi} = \frac{(\Sigma Y)^2}{axb} + \frac{(64,73)^2}{3x2} = 698,33$$

$$\begin{aligned} \text{JK Total (JKT)} &= (11,43)^2 + (10,73)^2 + (10,46)^2 + \dots (9,67)^2 - FK \\ &= 701,88 - 698,33 \\ &= 3,55 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{JK Krim (JKK)} &= \frac{(23,49)^2 + (21,11)^2 + (20,13)^2}{2} - FK \\ &= 701,32 - 698,33 \\ &= 2,99 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{JK Kondisi} &= \frac{(32,62)^2 + (32,11)^2}{3} - FK \\ &= 698,37 - 698,33 \\ &= 0,04 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{JK Galat (JKT)} &= \text{JK Total} - (\text{JK Krim} + \text{JK Kondisi}) \\ &= 3,55 - (2,99 + 0,04) \\ &= 3,55 - 3,03 \\ &= 0,52 \end{aligned}$$

## Lampiran 19

Tabel 12. Analisis Varians Zona Hambatan Krim

Rumus Variansi	db	JK	KT	Fh	Tabel 5%	Tabel 1%
Krim	2	2,99	1,495	5,75	19,01	99,01
Kondisi	1	0,04	0,04	0,154	18,51	98,49
Galat	2	0,52	0,26			
Total	5	0,034				

$$FH_{2,2} (\text{Krim}) = 5,75$$

$$FH_{1,2} (\text{Kondisi}) = 0,154$$

$$\text{Untuk FT 5\%} = 5,75 < 19,00 (\text{krim}) \longrightarrow \text{Berbeda tidak nyata (ns)}$$

$$= 0,154 < 18,51 (\text{kondisi}) \longrightarrow \text{Berbeda tidak nyata (ns)}$$

$$\text{Untuk FT 1\%} = 5,75 < 99,01 (\text{krim}) \longrightarrow \text{Berbeda tidak nyata (ns)}$$

$$= 0,154 < 98,49 (\text{kondisi}) \longrightarrow \text{Berbeda tidak nyata (ns)}$$

## Lampiran 20

Tabel 13. Hasil Pengukuran Zona Hambatan Krim (mm)

Krim	Setelah Kondisi Penyimpanan Dipercepat Inkubasi 1x 24 jam	Setelah Kondisi Penyimpanan Dipercepat Inkubasi 2 x 24 jam
	13,00 mm	13,00 mm
I	11,00 mm	11,00 mm
	12,18 mm	12,14 mm
<b>Rata-rata</b>	<b>12,18</b> mm	<b>12,05</b> mm
	11,00 mm	11,00 mm
II	10,00 mm	10,00 mm
	10,15 mm	10,15 mm
<b>Rata-rata</b>	<b>10,38</b> mm	<b>10,38</b> mm
	09,75 mm	09,75 mm
III	10,20 mm	10,18 mm
	09,26 mm	09,04 mm
<b>Rata-rata</b>	<b>09,67</b> mm	<b>09,66</b> mm
	00,00 mm	00,00 mm
IV	00,00 mm	00,00 mm
	00,00 mm	00,00 mm
<b>Rata-rata</b>	<b>00,00</b> mm	<b>00,00</b> mm

Keterangan :

- I = Krim dengan kombinasi emulgator tween 60 dan span 60 konsentrasi 2%
- I = Krim dengan kombinasi emulgator tween 60 dan span 60 konsentrasi 3%
- I = Krim dengan kombinasi emulgator tween 60 dan span 60 konsentrasi 4%
- IV = Krim dengan kombinasi emulgator tween 60 dan Span 60 (Kontrol)

Lampiran 21.

Tabel 14. Analisis Statistika Zona Hambatan Krim (mm) Dengan Rancangan Acak Kelompok (RAK)

Zona Hambat	Formula Krim				
	I	II	III	Total	Rata-rata
Setelah Penyimpanan Inkubasi 1 x 24 jam	12,06	10,38	09,67	32,11	10,70
Setelah Penyimpanan Inkubasi 2 x 24 jam	12,05	10,38	09,66	32,09	10,69
Total	24,11	20,76	19,33	64,2	21,4
<b>Rata</b>	<b>12,05</b>	<b>10,38</b>	<b>9,665</b>	<b>32,1</b>	<b>10,7</b>

$$\text{Faktor koreksi} = \frac{(\Sigma Y)^2}{axb} + \frac{(64,2)^2}{3 \times 2} = 686,94$$

$$\begin{aligned} \text{JK Total (JKT)} &= (12,06)^2 + (10,38)^2 + (09,67)^2 + \dots + (09,66)^2 - \text{FK} \\ &= 692,95 - 686,94 \\ &= 6,02 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{JK Krim (JKK)} &= \frac{(24,11)^2 + (20,76)^2 + (19,33)^2}{2} - \text{FK} \\ &= 692,96 - 686,94 \\ &= 6,02 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{JK Kondisi} &= \frac{(32,11)^2 + (32,09)^2}{3} - \text{FK} \\ &= 686,94 - 686,94 \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{JK Galat (JKT)} &= \text{JK Total} - (\text{JK Krim} + \text{JK Kondisi}) \\ &= 6,02 - (6,02 + 0) \\ &= 6,02 - 6,02 \\ &= 0 \end{aligned}$$

## Lampiran 22

Table 15. Analisis Varians Zona Hambatan Krim

Rumus Variansi	db	JK	KT	Fh	Tabel 5%	Tabel 1%
Krim	2	6,02	3,01	3,01	19,01	99,01
Kondisi	1	0	0	0	18,51	98,49
Galat	2	0	0			
Total	5	6,02				

$$FH_{2,2} (\text{Krim}) = 3,01$$

$$FH_{1,2} (\text{Kondisi}) = 0$$


$$\text{Untuk FT 5\%} = 3,01 < 19,00 (\text{krim}) \longrightarrow \text{Berbeda tidak nyata (ns)}$$

$$= 0 < 18,51 (\text{kondisi}) \longrightarrow \text{Berbeda tidak nyata (ns)}$$


$$\text{Untuk FT 1\%} = 3,01 < 99,01 (\text{krim}) \longrightarrow \text{Berbeda tidak nyata (ns)}$$

$$= 0 < 98,49 (\text{kondisi}) \longrightarrow \text{Berbeda tidak nyata (ns)}$$


Lampiran 23. Histogram Krim Sebelum dan Setelah Kondisi Dipercepat



Gambar 2. Histogram Viskositas Krim (poise) Sebelum Dan Setelah Kondisi Dipercepat.



Gambar 3. Histogram Ukuran Tetes Terdispersi Krim ( $\mu\text{m}$ ) Sebelum Dan Setelah Kondisi Penyimpanan Dipercepat




Gambar 4. Histogram Zona Hambatan Krim (mm) Sebelum dan Setelah Kondisi dipercepat.

Keterangan :

- I = Krim dengan kombinasi emulgator tween 60 dan span 60 konsentrasi 2%
- II = Krim dengan kombinasi emulgator tween 60 dan span 60 konsentrasi 3%
- III = Krim dengan kombinasi emulgator tween 60 dan span 60 konsentrasi 4%



Lampiran 24. Krim Sebelum Penyimpanan Dipercepat




Gambar 5. Foto Pengamatan Pada Kondisi Sebelum Penyimpanan Dipercepat Pada Krim Dengan kombinasi Emulgator Tween 60 Dan Span 60

Keterangan:

- I = Krim dengan kombinasi emulgator tween 60 dan span 60 konsentrasi 2%
- II = Krim dengan kombinasi emulgator tween 60 dan span 60 konsentrasi 3%
- III = Krim dengan kombinasi emulgator tween 60 dan span 60 konsentrasi 4%

Lampiran 25. Uji Pengenceran Pada Kondisi Sebelum Penyimpanan Dipercepat



Gambar 6 : Foto Uji Pengenceran Krim Dengan kombinasi Emulgator Tween 60 Dan Span 60 Pada Kondisi Sebelum Penyimpanan Dipercepat


Keterangan:

I = Krim dengan kombinasi emulgator tween 60 dan span 60 konsentrasi 2%

II = Krim dengan kombinasi emulgator tween 60 dan span 60 konsentrasi 3%

III = Krim dengan kombinasi emulgator tween 60 dan span 60 konsentrasi 4%

Lampiran 26. Krim Setelah Penyimpanan Dipercepat



Gambar 7. Foto Pengamatan Pada Kondisi Setelah Penyimpanan Dipercepat Pada Krim Dengan kombinasi Emulgator Tween 60 Dan Span 60


Keterangan:

I = Krim dengan kombinasi emulgator tween 60 dan span 60 konsentrasi 2%

II = Krim dengan kombinasi emulgator tween 60 dan span 60 konsentrasi 3%

III = Krim dengan kombinasi emulgator tween 60 dan span 60 konsentrasi 4%

Lampiran 27. Uji Pengenceran Pada Kondisi Setelah Penyimpanan Dipercepat



Gambar 8 : Foto Uji Pengenceran Krim Dengan kombinasi Emulgator Tween 60 Dan Span 60 Pada Kondisi Setelah Penyimpanan Dipercepat


Keterangan:

I = Krim dengan kombinasi emulgator tween 60 dan span 60 konsentrasi 2%

II = Krim dengan kombinasi emulgator tween 60 dan span 60 konsentrasi 3%

III = Krim dengan kombinasi emulgator tween 60 dan span 60 konsentrasi 4%

Lampiran 28. Uji Hantaran Listrik Sebelum Kondisi Penyimpanan dipercepat



Gambar 9 : Foto Uji Hantaran Listrik pada Krim Dengan kombinasi Emulgator Tween 60 Dan Span 60 Pada Kondisi Sebelum Penyimpanan Dipercepat


Keterangan:

I = Krim dengan kombinasi emulgator tween 60 dan span 60 konsentrasi 2%

II = Krim dengan kombinasi emulgator tween 60 dan span 60 konsentrasi 3%

III = Krim dengan kombinasi emulgator tween 60 dan span 60 konsentrasi 4%

Lampiran 29. Uji Hantaran Listrik Setelah Kondisi Penyimpanan dipercepat



Gambar 10 : Foto Uji Hantaran Listrik pada Krim Dengan kombinasi Emulgator Tween 60 Dan Span 60 Pada Kondisi Setelah Penyimpanan Dipercepat


Keterangan:

I = Krim dengan kombinasi emulgator tween 60 dan span 60 konsentrasi 2%

II = Krim dengan kombinasi emulgator tween 60 dan span 60 konsentrasi 3%

III = Krim dengan kombinasi emulgator tween 60 dan span 60 konsentrasi 4%

Lampiran 30. Uji Volume Kriming Setelah Kondisi Penyimpanan Dipercepat



Gambar 11 : Foto Uji Volume Kriming pada Krim Dengan kombinasi Emulgator Tween 60 Dan Span 60 Pada Kondisi Setelah Penyimpanan Dipercepat

Keterangan:


I = Krim dengan kombinasi emulgator tween 60 dan span 60 konsentrasi 2%

II = Krim dengan kombinasi emulgator tween 60 dan span 60 konsentrasi 3%

III = Krim dengan kombinasi emulgator tween 60 dan span 60 konsentrasi 4%

K = Volume Kriming

Lampiran 31. Uji Tetes Terdispersi Sebelum Kondisi Penyimpanan Dipercepat



Gambar 12 : Foto Uji Tetes Terdispersi pada Krim Dengan kombinasi Emulgator Tween 60 Dan Span 60 Pada Kondisi Sebelum Penyimpanan Dipercepat

Keterangan:


I = Krim dengan kombinasi emulgator tween 60 dan span 60 konsentrasi 2%

II = Krim dengan kombinasi emulgator tween 60 dan span 60 konsentrasi 3%

III = Krim dengan kombinasi emulgator tween 60 dan span 60 konsentrasi 4%



Lampiran 32. Uji Tetes Terdispersi Setelah Kondisi Penyimpanan Dipercepat




Gambar 13 : Foto Uji Tetes Terdispersi pada Krim Dengan kombinasi Emulgator Tween 60 Dan Span 60 Pada Kondisi Setelah Penyimpanan Dipercepat


Keterangan:

- I = Krim dengan kombinasi emulgator tween 60 dan span 60 konsentrasi 2%
- II = Krim dengan kombinasi emulgator tween 60 dan span 60 konsentrasi 3%
- III = Krim dengan kombinasi emulgator tween 60 dan span 60 konsentrasi 4%

Lampiran 33. Uji Efektifitas Sediaan Krim Terhadap *Staphylococcus aureus* Sebelum Kondisi Dipercepat



Gambar 14. Foto Pengamatan Pada Kondisi Sebelum Penyimpanan Dipercepat. Inkubasi 1 x 24 jam pada suhu 37° C




Gambar 15. Foto Pengamatan Pada Kondisi Sebelum Penyimpanan Dipercepat. Inkubasi 2 x 24 jam pada suhu 37° C


Keterangan :

- I = Krim dengan kombinasi emulgator tween 60 dan span 60 konsentrasi 2%
- II = Krim dengan kombinasi emulgator tween 60 dan span 60 konsentrasi 3%
- III = Krim dengan kombinasi emulgator tween 60 dan span 60 konsentrasi 4%
- IV = Krim dengan kombinasi emulgator tween 60 dan span 60 (Kontrol)

Lampiran 34. Uji Efektifitas Sediaan Krim Terhadap *Staphylococcus aureus* Setelah Kondisi Dipercepat



Gambar 16. Foto Pengamatan Pada Kondisi Setelah Penyimpanan Dipercepat. Inkubasi 1 x 24 jam pada suhu 37° C



Gambar 17. Foto Pengamatan Pada Kondisi Setelah Penyimpanan Dipercepat. Inkubasi 1 x 24 jam pada suhu 37° C

Keterangan :

- I = Krim dengan kombinasi emulgator tween 60 dan span 60 konsentrasi 2%
- II = Krim dengan kombinasi emulgator tween 60 dan span 60 konsentrasi 3%
- III = Krim dengan kombinasi emulgator tween 60 dan span 60 konsentrasi 4%
- IV = Krim dengan kombinasi emulgator tween 60 dan span 60 (Kontrol)

## Lampiran 35



Gambar 18. Tumbuhan Jati (*Tectona grandis* L.F)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Hermin dilahirkan di Segeri-Mandalle (Kab. Pangkep) pada tanggal 01 Desember 1987 merupakan anak Ketiga dari pasangan suami istri H. Arsyad K. dan Hj. Miskiyah.

Pendidikan formal yang telah dilalui adalah sekolah dasar di SD Inpres Saramom ( Kab. Biak-Papua) pada tahun 1993-1999. Setelah itu dilanjutkan ke jenjang menengah pertama yaitu Madrasah Tsanawiyah (Kab. Biak-Papua) pada tahun 1999-2002. Pendidikan menengah atasnya ditempuh di Madrasah Aliyah Mangkoso (Kab. Barru) pada tahun 2003-2006. Pada tahun 2006 penulis diterima di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Ilmu Kesehatan Program Studi Farmasi. Pengalaman organisasi penulis sebagai Sekertaris HMJ Jurusan Farmasi Fakultas Kesehatan UIN Alauddin tahun 2008, Seketaris II BEM Fakultas Kesehatan UIN Alauddin tahun 2009, dan Bendahara LPP (Lembaga Pemilihan Presiden Mahasiswa) Fakultas Kesehatan UIN Alauddin tahun 2010.

## ABSTRAK

Nama Penyusun : Hermin  
NIM : 70100106033  
Judul Skripsi : “ Formulasi sediaan krim ekstrak metanol daun jati (*Tectona grandis L.F*) dan uji efektifitasnya terhadap bakteri *Staphylococcus aureus*”

---

Telah dilakukan Formulasi sediaan krim ekstrak metanol daun jati (*Tectona grandis L.F*) dan uji efektifitasnya terhadap bakteri *Staphylococcus aureus*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui stabilitas fisik sediaan krim yang mengandung ekstrak metanol daun jati (*Tectona grandis L.F*) dengan menggunakan emulgator nonionik, serta efektifitasnya terhadap bakteri *Staphylococcus aureus*.

Daun jati (*Tectona grandis L.F*) diekstraksi dengan metode maserasi menggunakan metanol. Ekstrak kemudian dibuat krim dengan konsentrasi 7% dengan variasi kombinasi emulgator nonionik (Tween 60 dan Span 60) konsentrasi 2%, 3% dan 4%. Krim tersebut diuji kestabilan fisiknya dengan menggunakan metode volume kriming, viskositas emulsi, ukuran tetes terdispersi, inversi fase dan uji efektifitasnya terhadap bakteri *Staphylococcus aureus* dengan menggunakan metode pengukuran daya hambat sediaan.

Krim dengan kombinasi emulgator nonionik (Tween 60 dan Span 60) konsentrasi 2% dan 3% tidak mempengaruhi tekstur krim, warna, bau, viskositas, mempengaruhi ukuran tetes terdispersi dan volume kriming. Sedangkan krim yang menggunakan variasi emulgator nonionik (Tween 60 dan Span 60) konsentrasi 4% tidak mempengaruhi tekstur krim, warna, bau, viskositas krim, ukuran tetes terdispersi dan volume kriming. Krim dengan konsentrasi kombinasi emulgator nonionik 2%, 3% dan 4% dapat menghambat pertumbuhan bakteri *Staphylococcus aureus*. Ketiga krim yang diformulasi dengan menggunakan variasi konsentrasi emulgator nonionik (Tween 60 dan Span 60) dapat dikatakan stabil secara fisik tetapi yang paling stabil adalah krim yang diformulasi dengan menggunakan kombinasi konsentrasi emulgator nonionik (Tween 60 dan Span 60) dengan konsentrasi 4%.

Kata kunci: *Ekstrak Metanol Daun Jati , Krim, Stabilitas Fisisk, Uji Efektivitas, Staphylococcus aureus*

## ABSTRACT

Name : Hermin  
NIM : 70100106033  
Title of Script : "Formulation of creams methanol extract of leaves of teak (*Tectona grandis LF*) and to test its effectiveness against *Staphylococcus aureus*"

---

Formulation of the cream has done the methanol extract of leaves of teak (*Tectona grandis LF*) and to test its effectiveness against *Staphylococcus aureus*. This study aims to determine the physical stability of creams that contain methanol extract of leaves of teak (*Tectona grandis L.F*) using emulgator nonionik, as well as its effectiveness against *Staphylococcus aureus*.

Leaves of teak (*Tectona grandis L.F*) was extracted with methanol using a maceration method. Extracts then made cream with 7% with the variation of concentration combinations emulgator nonionik (Tween 60 and Span 60) concentration of 2%, 3% and 4%. Physical stability of creams were tested using the methods kriming volume, the viscosity of the emulsion, the size of the dispersed drops, phase inversion and test its effectiveness against *Staphylococcus aureus* using the methods of measurement of the inhibition stocks.

Cream with a combination of emulgator nonionik (Tween 60 and Span 60) concentration of 2% and 3% did not affect the cream texture, color, odor, viscosity, affect the size and volume of drops dispersed kriming. Whereas the use variations emulgator cream nonionik (Tween 60 and Span 60) concentration of 4% does not affect the cream texture, color, odor, viscosity cream, size and volume of drops dispersed kriming. Cream with a combination of concentration emulgator nonionik 2%, 3% and 4% can inhibit the growth of *Staphylococcus aureus*. Third cream, formulated using a variation of concentration range nonionik (Tween 60 and Span 60) can be said to be physically stable, but the most stable is the cream formulated using a combination of concentration range nonionik (Tween 60 and Span 60) with a concentration of 4 %.

Key Words : *Methanol Leaf Extracts of Teak, Cream, Stability Fisik, Test Effectiveness, Staphylococcus aureus*





# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang**

*Staphylococcus aureus* merupakan bakteri gram positif yang sering ditemukan sebagai kuman flora normal pada kulit dan selaput lendir pada manusia. Dalam kondisi tertentu dapat menjadi penyebab infeksi baik pada manusia maupun pada hewan. Setiap jaringan tubuh dapat diinfeksi olehnya dan menyebabkan timbulnya penyakit dengan tanda-tanda yang khas, yaitu peradangan, nekrosis dan pembentukan abses. Infeksinya dapat berupa furunkel yang ringan pada kulit sampai berupa suatu piema yang fatal (Syahracham, Agus, 1994 : 103).

Tanaman jati (*Tectona grandis* L.F) merupakan suatu tanaman yang biasa digunakan masyarakat sebagai bahan obat. Daun Jati secara empiris banyak digunakan sebagai obat kolesterol, jantung, anti obesitas, hipertensi, diabetes dan borok (Sumarna. Y, 2008 : 8).

A.Armisman (2009) Telah melakukan ekstraksi dan fraksinasi senyawa antibakteri daun jati ( *Tectona grandis* L.F). Hasil skrining antibakteri yang dilakukan dengan menggunakan ekstrak metanol daun Jati (*Tectona grandis* L.F), menunjukkan adanya aktifitas antibakteri terhadap *Staphylococcus aureus* (A.Armisman, 2009 : 41-42).

Beberapa bentuk sediaan obat yang dimaksudkan untuk pemakaian pada kulit seperti salep, krim, lotio, larutan topikal dan tinktur menggambarkan bentuk sediaan dermatologi yang paling sering dipakai, tapi bagaimanapun preparat lain seperti pasta, liniment, serbuk dan aerosol (juga biasa digunakan).

Preparat yang digunakan pada kulit antara lain untuk efek fisik yaitu kemampuan bekerja sebagai pelindung kulit, pelincir, pelembut, zat pengering dan lain-lain, atau untuk efek khusus dari bahan obat yang ada. Preparat dijual bebas, sering mengandung campuran dari bahan obat yang digunakan dalam pengobatan kondisi tertentu seperti infeksi kulit, gatal-gatal, luka bakar, sengatan dan gigitan serangga, kutu air, mata ikan, penebalan kulit dan keras, kutil, ketombe, jerawat, penyakit kulit kronis dan eksim ( Ansel. C. howard, 2005: 489).

Krim adalah bentuk sediaan setengah padat mengandung satu atau lebih bahan obat terlarut atau terdispersi ke dalam bahan dasar yang sesuai. Krim biasanya digunakan sebagai emolien atau pemakaian obat pada kulit. Banyak dokter dan pasien lebih suka pada krim dari pada salep, untuk satu hal, umumnya bentuk sediaan yang menyenangkan, mudah menyebar rata, praktis, mudah digunakan dan dalam hal krim dari emulsi jenis minyak dalam air lebih mudah dibersihkan dari pada kebanyakan salep ( Ansel. C. howard, 2005 : 513).

Berdasarkan uraian diatas, maka akan dilakukan penelitian tentang formulasi sediaan krim yang mengandung ekstrak metanol daun jati (*Tectona grandis* L.F) dan uji efektifitasnya terhadap bakteri *Staphylococcus aureus*.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah formulasi sediaan krim yang mengandung ekstrak metanol daun jati (*Tectona grandis* L.F) stabil secara fisik dengan menggunakan emulgator surfaktan nonionik ?
2. Apakah sediaan krim yang telah dibuat dapat menghambat pertumbuhan bakteri *Staphylococcus aureus* ?

3. Bagaimana perspektif islam tentang daun jati (*Tectona grandis* L.F) Sebagai Antibakteri?

#### **C. Maksud Dan Tujuan**

Maksud dari penelitian ini adalah memformulasi sediaan krim dari ekstrak metanol daun jati ( *Tectona grandis* L.F) dan uji efektifitasnya terhadap bakteri *Staphylococcus aureus*.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui stabilitas fisik sediaan krim yang mengandung ekstrak metanol daun jati ( *Tectona grandis* L.F) dengan menggunakan emulgator nonionik, serta efektifitasnya terhadap bakteri *Staphylococcus aureus*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Diperoleh sediaan krim yang mengandung ekstrak metanol daun jati ( *Tectona grandis* L.F) yang berkhasiat sebagai antibakteri dan memiliki stabilitas fisik yang baik yang diharapkan dapat menjadi alternatif obat penyakit kulit, khususnya terhadap infeksi-infeksi yang disebabkan oleh bakteri *Staphylococcus aureus*.
- b. Dapat digunakan dalam pengembangan obat-obatan herbal, terutama meminimalisir efek samping yang dapat memicu timbulnya penyakit baru yang lebih serius dibanding penyakit yang diobati itu sendiri.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Diperoleh data ilmiah mengenai stabilitas fisik sediaan krim yang mengandung ekstrak metanol daun jati ( *Tectona grandis* L.F) dengan menggunakan emulgator nonionik, serta efektifitasnya terhadap bakteri

*Staphylococcus aureus* agar dapat menunjang pengembangan dan pemanfaatannya khususnya di bidang kesehatan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### ***A. Uraian Kulit***

##### **1. Gambaran Umum Kulit**

Kulit merupakan organ terluar dari tubuh kita yang langsung berhubungan dengan lingkungan. Jika lingkungan kurang menguntungkan bagi kesehatan, maka organ yang paling pertama kali terkena pengaruhnya adalah kulit. Kulit juga sangat kompleks, elastis dan sensitif, serta bervariasi pada keadaan iklim, umur, seks, dan ras . Fungsi kulit antara lain: proteksi, absorpsi, ekskresi, pengindera sensoris, pengaturan suhu tubuh, pembentukan pigmen, serta ekspresi emosi (Wasitaatmadja, S.M. 1977 : 3-4).

Luas kulit pada manusia rata-rata  $\pm$  2 meter persegi, dengan berat 10 kg jika dengan lemaknya atau 4 kg jika tanpa lemak. Kulit terbagi atas 3 lapisan utama, yaitu:

- a. Epidermis (kulit ari ), sebagai lapisan yang paling luar.
- b. Dermis.
- c. Subkutis.

Dibawah dermis terdapat subkutis atau jaringan lemak bawah kulit (Tranggono Retno Iswari, Fatma Latifah. 2007 : 11).

##### **1. Epidermis**

Epidermis adalah bagian luar atau sebelah luar dari kulit dimana tempat penggunaan kosmetik dan sediaan obat topikal. Oleh karena itu,

perlu perhatian khusus dari farmasis dan ahli kulit. Epidermis bervariasi ketebalannya dari 1 mm pada telapak tangan dan tumit kaki, hingga 0,1 mm atau lebih kurang pada bagian wajah dan badan. Dimana ditutupi dengan lapisan permukaan yang disusun dari lemak teremulsi (Joseph B Sprowls, 1970 : 233).

Para ahli histologi membagi epidermis dari bagian terluar hingga ke dalam menjadi 5 lapisan, yakni (Tranggono Retno Iswari, Fatma Latifah. 2007 : 12-13):

- a. Lapisan tanduk (*Stratum corneum*) terdiri atas beberapa lapisan sel yang pipih, mati, tidak memiliki inti, tidak mengalami proses metabolisme, tidak berwarna dan sangat sedikit mengandung air. Lapisan ini lebih tebal pada tumit kaki dan telapak tangan (0,6-0,8 mm) dan sangat tipis pada wajah. Lapisan tanduk sebagian besar terdiri atas keratin, jenis protein yang tidak larut dalam air dan sangat resisten terhadap bahan-bahan kimia. Hal ini berkaitan dengan fungsi kulit untuk memproteksi tubuh dari pengaruh luar. Secara alami, sel-sel yang sudah mati dipermukaan kulit akan melepaskan diri untuk berregenerasi.

Komposisi kimia dari *stratum corneum* adalah protein 85% (kira-kira 15% larut air, 65% keratin atau protein sitoplasma dan 5% membran protein), lemak 7 - 9% ( $C_{10}$ - $C_{18}$  asam lemak jenuh dan tidak jenuh dan ester-ester, trigliserida dan kolesterol dan sterol yang berhubungan), yang lain 6-8% (mukopolisakarida, karbohidrat, mucin, asam lipo amino, dll) (Joseph B Sprowls, 1970 : 233).

Karena lapisan tanduk disusun sebagian besar oleh keratin, protein yang menyerap sejumlah besar air dan senyawa polar lainnya,

mungkin menjadi tempat penyimpanan untuk bahan penetrasi, dengan cara demikian mempertahankan gradien konsentrasi maksimum hanya kira-kira pada stratum lusidum. Penetran seperti ion-ion dan zat pewarna dapat mengikat stratum corneum dan peningkatan penetrasinya melewati lubang dari folikel rambut (Joseph B Sprowls, 1970 : 233).

- b. Lapisan jernih (Stratum lucidum), disebut juga " lapisan barier". Terletak tepat dibawah stratum corneum, merupakan lapisan yang tipis, jernih, sangat tampak jelas pada telapak tangan dan telapak kaki.
- c. Lapisan berbutir-butir (Stratum granulosum) tersusun oleh sel-sel keratinosit yang berbentuk poligonal, berbutir kasar, berinti mengkerut.
- d. Lapisan Malphigi (Stratum spinosum) memiliki sel yang berbentuk kubus dan seperti berduri. Intinya besar dan oval. Setiap sel berisi filamen- filamen kecil yang terdiri atas serabut protein.
- e. Lapisan Basal (Stratum germinativum) adalah lapisan terbawah epidermis. Di dalam stratum germinativum juga terdapat sel-sel melanosit, yaitu sel-sel yang tidak mengalami keratinisasi dan fungsinya hanya membentuk pigmen melanin dan memberikannya kepada sel-sel keratinosit melalui dendrit-dendritnya. Satu sel melanosit melayani sekitar 36 sel keratinosit.

## 2. Dermis

Berbeda dengan epidermis yang tersusun oleh sel-sel dalam berbagai bentuk dan keadaan, dermis terutama terdiri dari bahan dasar serabut kolagen dan elastin, yang berada di dalam substansi dasar yang bersifat koloid dan terbuat dari gelatin mukopolisakarida.

Di dalam dermis terdapat adneksa-adneksa kulit seperti folikel rambut, papila rambut, kelenjar keringat, kelenjar sebacea, otot penegang rambut, ujung pembuluh darah dan ujung saraf, karena lapisannya berair, ini mungkin bertindak sebagai penghalang untuk lewatnya molekul non polar (Joseph B Sprowls, 1970 : 233).

### 3. Subkutis

Lapisan ini merupakan kelanjutan dermis, terdiri atas jaringan ikat longgar berisi sel-sel lemak didalamnya. Sel lemak merupakan sel bulat, besar, dengan inti terdesak ke pinggir karena sitoplasma lemak yang bertambah. Sel-sel ini membentuk kelompok yang dipisahkan satu dengan lainnya oleh trabekula yang fibrosa. Lapisan ini berfungsi sebagai cadangan makan (Wasitaatmadja, S.M. 1977 : 6).

## 2. Permeabilitas dan Penetrasi Kulit

Obat dapat mempenetrasi kulit yang utuh setelah pemakaian topikal melalui dinding folikel rambut, kelenjar keringat atau kelenjar lemak atau antara sel-sel dari selapuk tanduk. Sebenarnya bahan obat yang dipakai mudah memasuki kulit yang rusak atau pecah-pecah (Ansel. C. howard, 2005: 491).

Apabila kulit utuh maka cara utama untuk berpenetrasi umumnya melalui lapisan epidermis, lebih baik dari pada melalui folikel rambut atau kelenjar keringat. Absorpsi suatu obat pada umumnya disebabkan oleh penetrasi langsung obat melalui stratum corneum 10-15  $\mu\text{m}$ , tebal lapisan datar mengeringkan sebagian demi sebagian jaringan mati yang membentuk permukaan kulit paling luar. Stratum corneum terdiri dari kurang lebih 40% protein (pada umumnya keratin) dan 40% air dengan lemak berupa



pertimbangannya terutama sebagai trigliserida, asam lemak bebas, kolesterol dan fosfat lemak. Komponen lemak dipandang sebagai faktor utama yang secara langsung bertanggung jawab terhadap rendahnya penetrasi obat melalui stratum corneum (Ansel. C. howard, 2005: 492).

Stratum corneum sebagai jaringan keratin akan berlaku sebagai membran buatan yang semi permeabel dan molekul obat mempenetrasi secara difusi pasif. Jadi, jumlah obat yang pindah menyeberangi lapisan kulit tergantung pada konsentrasi obat, kelarutannya dalam air dan koefisien partisi minyak atau airnya. Bahan-bahan yang mempunyai sifat larut dari keduanya, minyak dan air, merupakan bahan yang baik untuk difusi melalui stratum corneum begitu juga melalui epidermis dan lapisan-lapisan kulit (Ansel. C. howard, 2005: 492).

Griesemer (1962) memperkirakan berbagai cara penetrasi yang mungkin ke dalam kulit, yaitu:

1. Lewat antara sel-sel stratum corneum.
2. Melalui dinding saluran folikel rambut.
3. Melalui kelenjar keringat.
4. Melalui kelenjar sebacea.
5. Menembus sel-sel stratum corneum.

#### **B. Uraian Infeksi - Infeksi Kulit Oleh Bakteri *Staphylococcus aureus***

Bakteri bersama-sama dengan jamur dan virus, dapat menyebabkan banyak penyakit kulit. Infeksi bakteri pada kulit yang paling sering adalah *pioderma* (Harahap mawali, 2000: 46).

## 1. Bakteri penyebab

Infeksi bakteri primer pada kulit sering sekali disebabkan oleh *stafilokok* koagulase positif dan *streptokok* beta hemolitik. *Staphylococcus aureus*, suatu bakteri koagulase-positif, merupakan kokus patogen paling utama pada kulit. Kokus ini adalah gram positif, berbentuk bola, bergerombol dalam bundel-bundel kecil. *Streptokok* adalah bakteri gram positif juga. *Streptokokus pyogenes* termasuk kedalam golongan A *streptokokus* beta hemolitik (Harahap mawali, 2000: 47).

## 2. Bentuk infeksi kulit

### a. Infeksi bakteri primer

Infeksi bakteri primer adalah infeksi yang terjadi pada kulit yang sehat , dengan manifestasi klinik yang khas dan biasanya disebabkan oleh satu jenis bakteri.

### b. Infeksi bakteri sekunder

Infeksi kulit sekunder adalah infeksi yang terjadi pada bermacam-macam kelainan kulit. Infeksi sekunder dapat disebabkan oleh beberapa bakteri (Harahap mawali, 2000: 47).

## 3. Jenis –jenis infeksi yang disebabkan oleh bakteri *Staphylococcus aureus*

### a. *Impetigo*

*Impetigo* adalah infeksi piogenik superficial dan mudah menular yang terdapat dipermukaan kulit. Terdapat dua bentuk jenis *impetigo*, yaitu *impetigo contagiosa* dan *impetigo bulosa*. *Impetigo bulosa* disebabkan oleh *stafilokok* sedangkan *impetigo contagiosa* dapat disebabkan oleh *Staphylococcus aureus* (Harahap mawali, 2000: 47).

*Impetigo contagiosa* adalah infeksi kulit yang mudah menular dan terutama mengenai anak-anak yang belum sekolah. Penyakit ini mengenai kedua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, sama banyak. Pada orang dewasa *impetigo* ini sering terdapat pada mereka yang tinggal bersama-sama dalam satu kelompok seperti asrama dan penjara (Harahap mawali, 2000: 48).

*Impetigo* merupakan proses radang dangkal dengan visiko-pustula unilokuler yang terdapat diantara stratum korneum dan stratum granulosum (Harahap mawali, 2000: 48).

b. *Staphylococcal Scalded Skin Syndrome* (Sindrom Kulit Terkelupas Akibat Stafilokok)

*Staphylococcal Scalded Skin Syndrome* (SSSS) merupakan suatu bentuk penyakit kulit yang berat dan disebabkan oleh eksotoksin eksfoliatif yang dihasilkan *Staphylococcus aureus* dan ditandai oleh pembentukan bula dan eksfoliasi yang generalisata (Harahap mawali, 2000: 49).

Penyakit ini sering menyerang anak-anak berumur 5 tahun. Akan tetapi kadang-kadang dapat mengenai orang dewasa. Penyakit terjadi mendadak, kadang-kadang muncul beberapa hari sesudah faringitis (Harahap mawali, 2000: 50).

c. *Folikulitis*

*Folikulitis* adalah peradangan bagian distal folikel rambut yang biasanya hanya mengenai ostium, tapi dapat meluas sedikit ke bawahnya. Sebenarnya folikulitis sering ditemui dan diabaikan oleh penderita. *Folikulitis* mengenai anak-anak dan orang dewasa, terutama penderita

jerawat. *Folikulitis* biasanya disebabkan oleh *stafilokok* koagulasi positif (*Staphylococcus aureus*) ( Harahap mawali, 2000: 51).

d. *Furunkel*

*Furunkel* adalah suatu infeksi nekrotik akut folikel rambut yang dalam. *Furunkel* dapat terjadi sekunder terhadap dermatosis lain. Sering mengenai anak-anak sebagai komplikasi penyakit parasit, seperti scabies. *Furukel* sering terjadi pada kulit yang sering mendapat gesekan, tekanan dan iritasi lokal, seperti garukan ( Harahap mawali, 2000: 52).

- Penyebab, *furunkel* ialah *Staphylococcus aureus*.
- Gejala, pada permulaan penderita merasa gatal, lesi menjadi nyeri bila ditekan atau diusap, terdapat benjolan merah kecil (5 – 30 mm) yang kemudian berisi nanah, terasa nyeri dan berdenyut-denyut.
- Tanda-tanda, timbul peradangan folikuler kecil dan merah yang cepat bertambah besar dan membentuk suatu tonjolan berbentuk kerucut dan teraba keras dan dikelilingi oleh warna merah.
- Lokasi lesi, muka (bibir atas, hidung dan telinga), kuduk, punggung ketiak, badan dan paha ( Harahap mawali, 2000: 53).

e. *Karbunkel*

*Karbunkel* adalah infeksi bakteri dalam, yang mengenai beberapa folikel rambut yang disertai reaksi inflamasi berat disekelilingnya. Terjadi penyebaran infeksi sampai pada lapisan di bawah kulit. *Karbunkel* terutama mengenai laki-laki usia pertengahan atau orang tua (Harahap mawali, 2000: 54).

- Penyebab ialah *Staphylococcus aureus*.

- Keluhan, bila diraba terasa sakit, gejala sistemik yang terjadi ialah demam tinggi.
- Tanda-tanda, timbul mendadak, biasanya muncul satu nodul merah, keras dan cepat membesar membentuk suatu bentuk lesi besar dan terasa sakit.

f. *Sikosis vulgaris*

*Sikosis vulgaris* adalah infeksi *stafilokok* pustuler kronik yang mengenai seluruh kedalaman folikel rambut pada laki-laki yang berumur 30-40 tahun, terutama didaerah yang berjengot ( Harahap mawali, 2000: 55).

- Penyebab, disebabkan oleh bakteri *Staphylococcus aureus*, bakteri berasal dari hidung.
- Keluhan, penderita merasa terbakar dan gatal pada daerah yang terkena.
- Tanda-tanda, mula - mula sebagai kumpulan papula edematus merah, didaerah tempat tumbuh rambut keluar. Sesudah lesi pecah, terbentuklah krusta.
- Lokasi lesi, terutama disekitar bibir atas dekat hidung dan daerah berjenggot.

g. *Paronikia*

*Paronikia* adalah inflamasi atau infeksi lipatan kulit disekeliling kuku. Kelainan ini biasa dibagi 2 jenis, yaitu *paronikia* akut yang disebabkan oleh bakteri dan *paronikia* kronik yang disebabkan oleh jamur. *Paronikia* akut disebabkan oleh *Staphylococcus aureus*. *Paronikia* akut sering terdapat sebagai pembengkakan jaringan merah yang sakit atau abses sekitar kuku. *Paronikia* mengenai penderita semua golongan

umur, baik laki-laki maupun perempuan, terutama pada mereka yang pekerjaannya sering mencuci tangan atau kerja basah (Harahap mawali, 2000: 56).

### ***C. Uraian Krim***

Emulsi yang dikenal dengan istilah lotion dan krim, merupakan bentuk sediaan yang paling sering digunakan. Krim adalah bentuk sediaan setengah padat mengandung satu atau lebih bahan terlarut terdispersi ke dalam bahan dasar yang sesuai. Istilah ini secara tradisional telah digunakan untuk sediaan setengah padat yang mempunyai konsistensi yang relatif cair diformulasi sebagai emulsi air dalam minyak atau minyak dalam air. Sekarang ini batasan tersebut lebih diarahkan untuk produk yang terdiri dari emulsi minyak dalam air. Yang dapat dicuci dengan air dan lebih dianjurkan untuk penggunaan kosmetika dan estetika (Depertemen Kesehatan Republik Indonesia, 1995 : 6).

Emulsi, adalah sistem dispersi kasar yang secara termodinamika tidak stabil, terdiri dari minimal dua atau lebih cairan yang tidak bercampur satu sama lain. Dimana cairan yang satu terdispersi kedalam cairan yang lain dan untuk memantapkannya ditambahkan emulgator (Voigth, R, 1995 : 398).

Sistem emulsi banyak digunakan dalam farmasi. Dapat dibedakan antara emulsi cairan, untuk pemakaian dalam (emulsi minyak ikan, emulsi parafin) dan emulsi untuk pemakain luar. Emulsi terdiri dari dua fase yang tidak dapat bercampur satu sama lainnya, dimana yang satu menunjukkan krakter hidrofil, yang lain lipofil. Fase hidrofil umumnya adalah air atau suatu cairan yang dapat bercampur dengan air, sedangkan sebagai fase lipofil adalah minyak mineral atau minyak tumbuhan atau lemak. Ada dua kemungkinan yang dapat terjadi, apakah fase hidrofil yang terdispersi ke dalam lipofil

ataukah fase lipofil yang terdispersi ke dalam fase hidrofil (Voigth, R, 1995 : 398 - 399).

Pada formulasi krim ada dua tipe basis emulsi yang digunakan yaitu minyak dalam air (M/A) dan air dalam minyak (A/M). pemilihan basis didasarkan atas tujuan penggunaannya dan jenis bahan yang akan digunakan (Lahman L. Liberman HA & Kaning JL, 1994).

#### **D. Uraian Emulgator**

Emulgator adalah bahan aktif permukaan yang mengurangi tegangan antarmuka antara minyak dan air dan mengililingi tetesan-tetesan terdispersi dalam lapisan kuat yang mencegah koalesensi dan pemisahan fase terdispersi (Parrot, Eugena, 1974 : 310).

##### **1. Pembagian Emulgator**

Berdasarkan struktur kimianya emulgator diklasifikasikan menjadi (Gennaro AR., At al. 1990 : 299- 301, Lierbermen, HA., et al. 1988 : 201) :

###### **a. Emulgator Alam**

1. Emulgator alam yang membentuk film multimolekuler, misalnya akasia dan gelatin.
2. Emulgator alam yang membentuk film monomolekuler misalnya lesitin, kolesterol.
3. Emulgator yang membentuk film berupa partikel padat misalnya bentonit dan vegum.

b. Emulgator sintetik atau surfaktan yang membentuk film monomolekuler. Kelompok bahan aktif permukaan ini dibagi menjadi anionik, kationik, dan nonionik. Tergantung dari muatan yang dimiliki oleh surfaktan.

### 1. Anionik

Surfaktan ini memiliki muatan negatif. Contoh bahannya yaitu kalium, natrium, dan garam ammonium dari asam laurat dan asam oleat yang larut dalam air dan merupakan bahan pengemulsi M/A yang baik. Bahan ini mempunyai rasa yang kurang menyenangkan dan mengiritasi saluran cerna sehingga dibatasi penggunaannya hanya untuk bagian luar.

### 2. Kationik

Aktifitas permukaan bahan kelompok ini terletak pada kation yang bermuatan positif. pH dari sediaan emulsi dengan pengemulsi kationik yaitu antara 4-8. Rentang pH ini juga menguntungkan karena masuk kedalam pH normal kulit. Contohnya yaitu senyawa ammonium kuartener.

### 3. Nonionik

Surfaktan yang luas penggunaannya sebagai bahan pengemulsi karena memiliki kesiimbangan hidrofilik dan lipofilik dalam molekulnya. Tidak seperti tipe anionik dan kationik, emulgator nonionik tidak dipengaruhi perubahan pH dan penambahan elektrolit. Contoh yang paling banyak digunakan yaitu ester gliseril, ester asam lemak sorbitan (Span) dan turunan polioksietilennya (Tween)

## 2. Mekanisme Emulgator

Berdasarkan mekanisme kerjanya, emulgator dibagi menjadi (Gennaro AR., At al. 1990 : 302) :

#### a. Adsorpsi monomolekuler

Surfaktan atau amfibil menurunkan tegangan antar muka karena teradsorpsi pada antarmuka minyak air membentuk film monomolekuler.



Film ini membungkus tetes terdispersi dengan suatu lapisan tunggal yang seragam berfungsi mencegah bergabungnya tetesan. Idealnya film ini harus fleksibel sehingga dapat terbentuk kembali jika pecah atau terganggu.

b. Adsorpsi Multimolekuler

Koloid hidrofil terhidrasi dapat dianggap sebagai bahan aktif permukaan karena terdapat pada antarmuka minyak air tetapi berbeda dengan surfaktan sintetik. Koloid hidrofil tidak menyebabkan penurunan tegangan antarmuka yang nyata tetapi membentuk film multi molekuler pada antarmuka tetesan. Aksi sebagai emulgator terutama disebabkan oleh film yang dibentuknya kuat sehingga mencegah koalesensi. Film multimolekuler ini bersifat hidrofilik sehingga cenderung membentuk minyak dalam air.

c. Adsorpsi Partikel Padat

Partikel padat yang dibagi halus yang terbasahi oleh minyak dan air dapat bertindak sebagai emulgator membentuk suatu film partikel halus disekeliling tetes terdispersi pada antarmuka sehingga mencegah koalesensi.

### **3. Sistem Keseimbangan Hidrofilik-Lipofilik**

HLB adalah harga yang harus dimiliki oleh sebuah emulgator sehingga pertemuan antara fase lipofil dengan air dapat menghasilkan emulsi dengan tingkat dispersitas dan stabilitas yang optimal (Voight, R. 1995 : 409).

Sistem keseimbangan hidrofilik-lipofilik digunakan untuk menyatakan perbandingan sifat hidrofilik dan lipofilik dari suatu emulgator. Emulgator dengan nilai HLB rendah, dapat larut atau terdispersi dalam

minyak. Sedangkan emulgator dengan nilai HLB tinggi dapat larut atau terdispersi dalam air (Michael, EA. 1988 : 297).

Emulgator sering dikombinasikan untuk menggunakan emulsi yang lebih baik yaitu emulgator dengan keseimbangan hidrofilik dan lipofilik yang diinginkan, meningkatkan kestabilan dan sifat kohesi dari lapisan antarmuka serta mempengaruhi konsistensi dan penampakan emulsi (Gennaro AR., At al. 1990 : 307).

Emulgator dengan nilai HLB dibawah 7 umumnya menghasilkan emulsi air dalam minyak (A/M) sedangkan emulgator dengan nilai HLB diatas 7 umumnya menghasilkan emulsi minyak dalam air. Tetapi sistem HLB tidak memberikan indikasi tentang konsentrasi yang digunakan. Sebagai aturan, emulgator dengan konsentrasi 2 % adalah jumlah yang cukup dalam suatu formula walaupun konsentrasi yang lebih kecil dapat memberikan hasil yang lebih baik. Jika konsentrasi emulgator lebih dari 5 % maka emulgator akan menjadi bagian utama dari formula dan hal ini bukanlah tujuan dari penggunaan emulgator (Martin EL. : 528 – 529).

#### ***E. Evaluasi Kestabilan Emulsi***

Sesudah penyimpanan, kestabilan emulsi dipengaruhi oleh suhu dan waktu. Bentuk ketidakstabilan emulsi selama penyimpanan ditunjukkan dengan terjadinya kriming, perubahan viskositas, perubahan ukuran tetes terdispersi serta inverse fase (Lahman L. Liberman HA & Kaning JL. 1994).

##### **1. Kriming**

Kriming adalah naik atau turunnya tetes-tetes terdispersi membentuk suatu lapisan pada permukaan atau dasar dari suatu emulsi. Kriming terjadi karena pengaruh gravitasi bumi dan naik atau turunnya tetesan tergantung pada

rapat jenis kedua fase. Bila kriming terjadi tanpa penggabungan, maka emulsi dapat diemulsikan kembali dengan penggocokan.

## **2. Viskositas**

Persamaan stokes juga menunjukkan bahwa kecepatan kriming berbanding terbalik dengan viskositas. Viskositas emulsi merupakan kriteria yang penting untuk mempelajari kestabilan emulsi dan tidak berhubungan dengan viskositas absolut tetapi dengan perubahan viskositas pada berbagai periode waktu. Tetesan-tetesan pada emulsi yang dibuat bergabung dengan segera dan menunjukkan peningkatan viskositas. Setelah perubahan ini kebanyakan emulsi menunjukkan perubahan viskositas yang berhubungan dengan waktu. Jika viskositas tidak berubah dengan waktu diterima, emulsi dianggap ideal meskipun kebanyakan sistem masih dapat diterima kestabilannya bila menunjukkan sedikit kenaikan viskositas dalam waktu antara 0,04 dan 400 hari. Kebanyakan emulsi menjadi encer pada suhu tinggi dan mengental bila ditempatkan pada suhu kamar.

## **3. Perubahan Ukuran Tetes Terdispersi**

Perubahan rata-rata ukuran tetes terdispersi atau distribusi ukuran tetes terdispersi merupakan parameter yang penting untuk mengevaluasi suatu emulsi. Analisis ukuran tetes terdispersi dapat dilakukan dengan beberapa metode. Salah satu adalah pengukuran diameter tetes terdispersi dengan mikroskop yang memberikan nilai rata-rata pada jumlah tetes untuk setiap ukuran.

## **4. *Inverse fase***

Emulsi dikatakan membalik ketika perubahan emulsi dari M/A ke A/M atau sebaliknya. Inverse kadang-kadang terjadi dengan penambahan elektrolit atau dengan mengubah rasio volume. Inverse dapat dilihat ketika emulsi

disiapkan dengan pemanasan dan pencampuran dua fase kemudian didinginkan. Hal ini terjadi kira-kira kerana adanya daya larut bahan pengemulsi tergantung pada perubahan temperatur.

#### ***F. Kondisi Penyimpanan Yang Di percepat***

Salah satu cara evaluasi kestabilan adalah dengan penyimpanan selama beberapa periode waktu pada temperatur yang lebih tinggi dari normal. Tetapi cara ini khususnya berguna untuk mengevaluasi “shelf life” emulsi dengan siklus antara dua suhu (Gennaro AR., At al. 1990 : 1297).

Didalam laboratorium siklus suhu 5° C dan 40° C dalam 24 jam digunakan selama 24 siklus. Sedangkan siklus lainnya 5° C dan 35° C dalam 12 jam digunakan selama 10 siklus (Banker GS, Rodes CT. 1979 : 323).

Efek normal penyimpanan suatu emulsi pada suhu yang lebih tinggi biasanya adalah mempercepat koalesensi atau terjadinya kriming dan hal ini biasanya diikuti dengan perubahan kekentalan. Kebanyakan emulsi menjadi lebih encer pada suhu tinggi dan menjadi lebih kental bila dibiarkan mencapai suhu kamar. Pembekuan dapat merusak emulsi dari pada pemanasan, kerana kelarutan emulgator baik dalam fase air maupun fase minyak lebih sensitif pada pembekuan dari pada pemanasan sedang (Gennaro AR., At al. 1990 : 1297).

#### ***G. Uraian Antimikroba***

##### **1. Pengertian Antimikroba**

Obat-obatan atau bahan-bahan yang digunakan untuk memberantas infeksi mikroba pada manusia termasuk diantaranya antibiotika, antiseptika, disinfektansia dan preservative.

Obat-obatan yang digunakan untuk membasmi mikroorganisme yang menyebabkan infeksi pada manusia, hewan maupun tumbuhan harus bersifat toksisitas selektif artinya obat atau zat tersebut harus bersifat toksik terhadap mikroorganisme penyebab penyakit tetapi tidak toksik terhadap jasad inang atau hospes (Djide, M. N, Sartini 2008 : 399).

## **2. Sifat Antimikroba**

### **a. Bakteriostatik**

Zat atau bahan yang dapat menghambat atau menghentikan pertumbuhan mikroorganisme (bakteri). Dalam keadaan seperti ini jumlah mikroorganisme menjadi stasioner, tidak dapat lagi bermultiplikasi dan berkembang biak.

### **b. Bakteriosida**

Zat atau bahan yang dapat membunuh mikroorganisme (bakteri). Dalam hal ini jumlah mikroorganisme (bakteri) akan berkurang atau bahkan habis, tidak dapat lagi melakukan multiplikasi atau berkembang biak (Djide, M. N, Sartini 2008 : 399).

## **3. Prinsip Kerja Antimikroba**

Suatu antimikroba memperlihatkan toksisitas yang selektif, dimana obat lebih toksik terhadap mikroorganismenya dibanding pada sel hospes. Hal ini dapat terjadi karena pengaruh obat yang selektif terhadap mikroorganisme atau karena obat pada reaksi biokimia yang penting pada sel parasit lebih unggul dari pada pengaruhnya dari pada hospes. Disamping itu struktur sel mikroorganisme berbeda dengan struktur sel manusia (Djide, M. N, Sartini 2008 : 340).

#### 4. Mekanisme Antimikroba

##### a. Mengganggu Metabolisme Sel Mikroba

Pada umumnya bakteri membutuhkan para amino benzoic acid (PABA) untuk mensintesis purin dan primidin, bila asam folat tidak ada, sel-sel tidak dapat tumbuh atau membelah (Mycek . 2001 : 383-284).

Antimikroba bekerja dengan cara memblok terhadap metabolik spesifik mikroba, seperti sulfonamide. Sulfonamide menghambat pertumbuhan sel dengan menghambat sintesis asam folat, para amino benzoic acid (PABA), dan bekerja secara kompetitif untuk enzim-enzim yang langsung mempersatukan PABA dan sebagian pteridin menjadi asam dihidropteroat (Djide, M. N, Sartini 2008 : 341).

##### b. Penghambatan Sintesis Dinding Sel

Ada antibiotik yang merusak dinding sel mikroba dengan menghambat sintesis enzim, sehingga menyebabkan hilangnya viabilitas dan sering menyebabkan sel lisis. Antibiotik ini menghambat sintesis dinding sel terutama dengan mengganggu sintesis peptidoglikan (suwandi : 1992).

Dinding sel bakteri menunjukkan bentuk karakteristik dan berfungsi melindungi bahan dalam sel terhadap perubahan tekanan osmotik dan kondisi lingkungan lainnya. Di dalam sel terdapat sitoplasma yang merupakan tempat berlansungnya proses biokimia sel (Suwandi : 1992, Mycek 2001 : 284).

##### c. Penghambatan Terhadap Fungsi Membran Sel

Di bawah dinding sel bakteri adalah lapisan membran sel lipoprotein yang dapat disamakan dengan membran sel pada manusia.

Membran ini mempunyai sifat permeabilitas selektif dan berfungsi mengontrol keluar masuknya substansi dari dan ke dalam sel, serta memelihara tekanan osmotik internal dan ekskresi.

d. Penghambatan Terhadap Sintesis Protein

Hidupnya suatu sel tergantung pada terpeliharanya molekul-molekul dalam keadaan alamiah. Suatu kondisi atau substansi mengubah keadaan ini yaitu mendenaturasi protein dengan merusak sel tanpa dapat diperbaiki kembali. Suhu tinggi atau konsentrasi beberapa zat dapat mengakibatkan koagulasi komponen-komponen seluler yang vital ini.

Antimikroba mempunyai fungsi ribosom pada mikroorganisme yang menyebabkan sintesis protein terlambat. Dimana dapat berikatan dengan ribosom 30S yang dapat menyebabkan akumulasi sintesis protein awal yang kompleks, sehingga salah dalam menerjemahkan tanda mRNA dan menghasilkan polipeptida yang abnormal. Selain itu juga dapat berikatan dengan ribosom 50S yang dapat menghambat ikatan asam amino baru pada rantai peptida yang memanjang (Ganiswara 1995 : 572-573).

e. Penghambatan Terhadap Sintesis Asam Nukleat

Asam nukleat merupakan bagian yang sangat vital bagi perkembangbiakan sel, untuk pertumbuhannya kebanyakan sel bergantung pada sintesis DNA, sedangkan RNA diperlukan untuk transkripsi dan penentuan informasi sintesis protein dan enzim (suwandi 1992).

Begitu pentingnya DNA dan RNA dalam proses kehidupan sel. Hal ini berarti bahwa gangguan apapun yang terjadi pada pembentukan atau pada fungsi zat-zat tersebut dapat mengakibatkan kerusakan total

pada sel. Dalam hal ini mempengaruhi metabolisme asam nukleat (Pleazer. Michael j and Chan. E.C.S 2008 : 458).

## H. Uraian Tumbuhan

### 1. Klasifikasi

Regnum	: Plantae
Division	: Spermatophyta
Sub division	: Angiospermae
Kelas	: Dycotyledonae
Sub Kelas	: Magnoliidae
Ordo	: Verbenales
Family	: Verbenaceae
Genus	: Tectona
Spesies	: <i>Tectona grandis</i> L.F (Backer. C A V brink R.C.B 1968 : 85, Sutrisno . B 1998 ; 9-234).

### 2. Morfologi

Pohon tinggi sampai 40 m. Batang jauh diatas tanah baru bercabang. Bagian yang muda dan bagian sisi bawah daun berbulu rapat, berbentuk bintang. Daun bertangkai pendek, kadang-kadang duduk, elips atau sedikit banyak bulat telur dan bagian pangkal yang menyempit pada batang yang berbunga, 23-40 kali 11-21 cm. Daun yang muda sering coklat kemerah-merahan. Karang bunga tersusun dari anak payung mengarpu, diujung merambut serupa tepung, ditutupi dengan kelenjar. Bunga lk 1 cm garis tengahnya, jarang berbilangan 5, semuanya berbilangan 6-7. Kelopak berbentuk lonceng, pada waktu menjadi buah membesar dan melembung, mahkota dengan tabung pendek, putih, kadang-kadang agak ros, leher tidak berambut. Benang sari sebanyak taju mahkota, menjulan jauh. Bakal buah



beruang 4, bakal biji 4, tangkai putik dengan ujung yang telah dua pendek. Buah berambut kasar, inti tebal, berbiji 2-4. Mungkin dari india belakang, ditanam dan liar, terutama didaerah kering secara berkala sampai 650 m. Musim berbunga kebanyakan dalam permulaan musim penghujan (Backer. C.A V brink R.C.B 1965 : 351).

### 3. Nama Daerah

Jawa : Dodolan (sunda), Jati, Jatos, Daleg (jawa),  
(Heyne.K 1987 : 1671)

Sulawesi : Jati (bugis), jati (engrekang), jati (makassar)

### 4. Kandungan Kimia

Batangnya mengandung antraquinon, senyawa naptalain, triterpenoid, dan hemi terpen, daun jati mengandung quinon dan kayunya mengandung tannin 7,14% , dan minyak bunganya mengandung asam lenoleat (54%) dengan laurit, maristad, palmitad, sterarad, oleic, linoleat, asam asaridi dan 45,5% minyak lemak (Khare.C.P 2007: 649-650).

### 5. Khasiat

Kayu jati yang rasanya tidak enak mempunyai daya untuk memperbaiki makanan dan minuman dan dapat menahan kolera yang mengganas. Kayu jati yang diremas-remas halus dengan air diatas batu, dapat dianjurkan pada radang . Air seduhan dari daunnya, diminum seperti teh dianjurkan terhadap kolera. (Heyne.K 1987: 1672-1973).

Bunga jati dapat digunakan sebagai obat bronchitis dan melancarkan serta membersihkan kantung kencing. Bagian buah atau benihnya dapat digunakan sebagai obat deuritik. Adapun ekstrak daunnya dapat menghambat kinerja bakteri tuberkolosa (Sumarna. Y 2008 : 8).

### **I. Uraian Bahan Tambahan**

1. Asam stearat (Kibbe , A.H, 2000 : 534-535)

Rumus molekul :  $C_{18}H_{36}O_2$

Asam stearat adalah campuran asam organik padat yang diperoleh dari lemak. Merupakan zat padat, keras mengkilat, menunjukkan susunan hablur, putih atau kuning pucat, mirip lemak lilin, praktis tidak larut dalam air, larut dalam 20 bagian etanol (95%)P, dalam 2 bagian kloroform P, suhu lebur tidak kurang dari 54°C. Asam stearat merupakan bahan pengemulsi. Digunakan luas secara oral dan topikal dalam bidang farmasi. Untuk penggunaan topical asam stearat digunakan sebagai bahan pengemulsi. Digunakan umumnya Karena tidak toksik dan tidak mengiritasi.

2. Setil alkohol (Kibbe , A.H, 2000 : 117)

Rumus molekul :  $C_{16}H_{34}O$

Setil alkohol merupakan lilin, putih, granul atau bersegi. Memiliki bau dan rasa yang khas setil alkohol yang digunakan dalam sediaan farmasi merupakan alkohol alifatik padat pada umumnya. Setil alkohol umumnya digunakan dalam sediaan farmasi dan kosmetik, seperti emulsi, krim dan salep. Dalam emulsi M/A setil alkohol dapat meningkatkan stabilitas dari emulsi. Memiliki titik lebur 45°C-52°C.

3. Paraffin cair (Kibbe , A.H, 2000 : 358)

Cairan kental transparan, tidak berwarna, bebas dari fluoresensi pada cahaya matahari. Praktis tidak berbau dan tidak berbau ketika dingin dan mempunyai bau lemah ketika dipanaskan. Praktis tidak larut dalam etanol (95%), gliserin dan air. Larut dalam aseton benzene, kloroform, karbon disulfid, eter dan eter minyak tanah. Berfungsi sebagai emollient, pelarut.

4. Adeps lanae (Kibbe , A.H, 2000 : 286)

Cairan jernih, tidak berasa, tidak berwarna. Praktis tidak larut dalam air, agak sukar larut dalam etanol, mudah larut dalam kloroform dan eter. Berfungsi sebagai peningkat konsistensi.

5. Gliserin (Kibbe , A.H, 2000 : 220. Depertemen Kesehatan Republik Indonesia, 1979: 271)

Rumus molekul :  $C_3H_8O_3$

Cairan seperti sirup jernih berwarna, tidak berbau, manis diikuti rasa hangat, higroskopik. Dapat bercampur dengan air dan dengan etanol (95%)P, praktis tidak larut dalam kloroform P, dalam eter P dan dalam minyak lemak. Berfungsi sebagai humectant.

6. Tween 60 (Kibbe , A.H, 2000 : 416 )

Rumus molekul :  $C_{64}H_{126}O_{26}$

Cairan seperti minyak atau semigel, warna kuning hingga jingga, semigel kuning coklat menjadi cairan jernih diatas  $25^{\circ}C$ , mempunyai bau yang khas. Tween 60 dapat bercampur dengan air, alkohol dan etil asetat. Praktis tidak larut dalam paraffin cair dan minyak. Digunakan sebagai bahan pegemulsi nonionik tipe M/A pada konsentrasasi 1-15%. Sedangkan dalam kombinasi 1-10% , memiliki HLB butuh yaitu 14,9 . Berfungsi sebagai emulgator untuk fase air.

7. Span 60 (Kibbe , A.H, 2000 : 511)

Rumus molekul :  $C_7H_{130}O_{30}$

Berupa butir-butir warna krem hingga coklat. Span 60 larut dalam minyak tumbuhan atau minyak mineral, tidak larut dalam air, alkohol dan propilenglikol. Merupakan bahan pegemulsi nonionik yang dapat dikombinasikan dengan bahan pegemulsi lain dengan konsentrasi 1-10%.

Nilai HLB butuhnya adalah 4,7. Span 60 melebur pada suhu 50-53°C.

Berfungsi sebagai emulgator fase minyak.

8. Metil paraben (Kibbe , A.H, 2000 : 340)

Rumus molekul :  $C_8H_8O_3$

Merupakan serbuk putih, berbau, serbuk higroskopik, mudah larut dalam air. Digunakan sebagai pengawet pada kosmetik, makanan dan sediaan farmasetik. Dapat digunakan sendiri, kombinasi dengan pengawet paraben lain atau dengan antimikroba lainnya. Lebih efektif terhadap gram negatif dari pada gram positif. Aktif pada pH antara 4-8. Efektifitas pengawetnya meningkat dengan peningkatan pH. Mempunyai titik lebur 125°- 128° C.

9. Propil paraben (Kibbe , A.H, 2000 : 450)

Rumus molekul :  $C_{10}H_{12}O_3$

Merupakan kristal putih, berbau dan berasa. Aktif pada range pH 4-8. Lebih efektif pada gram positif di banding gram negatif. Dapat digunakan sendiri atau kombinasi dengan pengawet paraben lainnya. Memiliki titik lebur 95-98°C.

10. Vitamin E (Kibbe , A.H, 2000 : 18)

Rumus molekul :  $C_{29}H_{50}O_2$

Berupa cairan seperti minyak, kuning jernih, tidak berbau atau sedikit berbau. Praktis tidak larut dalam air. Larut dalam etanol (95%) P dan dapat bercampur dengan eter P dan dengan aseton P dan minyak nabati dan kloroform P, tidak stabil terhadap cahaya dan udara. Tokoferol digunakan sebagai antioksidan dalam sediaan kosmetik.

## J. Uraian Mikroorganisme

### *Staphylococcus aureus*

#### a. Klasifikasi

Domain	: Bacteria
Phylum	: Firmicutes
Class	: Bacilli
Ordo	: Bacillales
Familia	: Staphylococcaceae
Genus	: Staphylococcus
Spesies	: <i>Staphylococcus aureus</i> (Garrity. G.M., Bell.J.A and Lilburn 2004 : 24-187)

#### b. Sifat dan Morfologi

*Staphylococcus aureus* adalah bakteri gram positif, sel-sel berbentuk bola, berdiameter 0,5 – 1,5  $\mu\text{m}$ , terdapat dalam bentuk tunggal dan berpasangan dan secara khas membela diri pada lebih dari satu bidang sehingga membentuk gerombolan yang tidak teratur. Non motil, tidak diketahui adanya medium istirahat. Dinding sel mengandung dua komponen utama yaitu peptidoglikan dan asam trikoat yang berkaitan denganya. Metabolisme dengan respirasi dan fermentatif. Anaerob fakultatif, tumbuh lebih cepat dan lebih banyak dalam keadaan aerobik. Suhu optimum 35-40°C. Terutama berasosiasi dengan kulit dan selaput lender hewan berdarah panas, dan merupakan patogen potensial (Pelczar, Michael J dan Chan E.C.S 2008 : 954-955).

### K. Tinjauan Islam Mengenai Penelitian Tanaman Obat

Istilah yang populer tentang obat dalam berbagai teks keagamaan ialah *dawa'* (bentuk tunggal) atau *adwiyah* (bentuk jamak). Sedangkan kata *da'* yang seakar dengan istilah di atas adalah penyakit.

Terkait dengan istilah di atas, secara umum dapat ditemukan dalilnya pada hadis Nabi yang berbicara tentang penyakit dan obat sebagai berikut:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Artinya:

*Setiap penyakit pasti ada obatnya. Apabila didapatkan obat yang cocok untuk menyembuhkan suatu penyakit maka penyakit itu akan hilang seizin Allah azza wa jalla (HR. Muslim, IV, 1729).*

Meskipun demikian bukan berarti obat-obat itu yang menyembuhkan tetapi atas izin Allah. Disinilah letak perbedaan antara ahli pengobatan sekuler dengan yang beragama. Setiap pengobatan menghubungkan dengan ajaran agama yakni Islam.

Dalam alquran Allah banyak menyebutkan tentang tanaman-tanaman yang ada di muka bumi ini. Diantaranya ayat yang mencantumkan tentang tanaman-tanaman yang terdapat pada Q.S Al-A'raf / 7 : 54

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشَىٰ اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ ۗ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٥٤﴾

Terjemahnya:

*Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu Dia bersemayam di atas 'Arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat dan matahari, bulan dan bintang-bintang (masing-masing) tunduk kepada*

*perintah-Nya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam (Q.S Al-A'raf/7 : 54 )*

Munculnya berbagai macam penyakit pada zaman modern ini menuntut manusia untuk mencari berbagai metode pengobatan. Salah satu metode pengobatan yang belakangan ini sering dilakukan adalah pengobatan dengan menggunakan tumbuh-tumbuhan sebagai obatnya. Sejak dahulu manusia telah menemukan tumbuhan dan rumput-rumputan sebagai bahan obat. Sehingga, ia pun mengetahui bahwa tumbuhan dan rumput-rumputan itu memiliki keistimewaan sebagai bahan pengobatan. Allah swt. berfirman dalam Q.S. Lukaman/31 :10

خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ۗ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ  
فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ ۗ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿١٠﴾

Terjemahnya:

*Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya dan dia meletakkan gunung-gunung (di permukaan) bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu; dan memperkembang biakkan padanya segala macam jenis binatang. dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. ( Q.S. Lukaman/31 :10)*

Kata *karim* digunakan untuk menyifati segala sesuatu yang baik sesuai objeknya. Pasangan tumbuhan yang berbeda-beda jenisnya yang *karim* adalah yang tumbuh subur dan menghasilkan apa yang diharapkan dari penanamannya (shihab 2002 jilid 11, 119)

Dewasa ini bahan alam khususnya tumbuhan telah banyak diteliti oleh para ahli untuk dikembangkan menjadi suatu bahan obat, mengingat bahwa negara kita kaya akan berbagai jenis tumbuhan yang memiliki banyak manfaat

bagi kehidupan manusia, salah satu diantaranya adalah dalam pengobatan yang biasa dikenal dengan obat tradisional (Abdushshamad 2002, 141).

Relevansinya dengan itu, di dalam Al- Quran Allah SWT Q.S. Qaaf/50:7 yang berbunyi :

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْفَيْنَا فِيهَا رُؤْسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٧﴾

Terjemahnya :

*Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik? (Q.S. Qaaf/50:7)*

Maksud ayat tersebut adalah menghendaki agar manusia senantiasa bersyukur atas segala pemberian Allah melalui tumbuh-tumbuhan yang memiliki manfaat untuk kepentingan manusia, tumbuhan yang telah diciptakan oleh Allah SWT.

*Dan kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik.* Dipahami oleh sebagian ulama dalam arti bahwa Allah swt. Menumbuhkembangkan di bumi ini aneka ragam tanaman untuk kelangsungan hidup dan menetapkan bagi sebagian tanaman itu masa pertumbuhan dan penuaian tertentu. Sesuai dengan kuantitas dan kebutuhan makhluk hidup. Demikian juga, Allah swt. Menentukan bentuknya sesuai dengan penciptaan dan habitat alamnya (shihab 2002 jilid 7, 119)

Ketika Allah berkehendak berlaku lembut pada hambanya dengan menciptakan penyakit dan obat, pada saat yang sama, Allah menciptakan tumbuhan dan rumput-rumputan yang mengandung keistimewaan yang dapat berfungsi sebagai pencegahan dan penyembuhan penyakit manusia. Artinya, Allah tidak menciptakan sesuatu tanpa makna dan arti. Akan tetapi, Allah



menciptakan setiap sesuatu dengan hikmah-hikmah tertentu (Mahmud 2007, 65-75)

Sebagian orang, menganggap bahwa agama tidak memiliki kepedulian terhadap kesehatan umat manusia. Anggapan semacam ini, didasari oleh pandangan bahwa agama hanya memperhatikan aspek-aspek rohaniah belaka, dan tidak memperhatikan aspek-aspek jasmaniah. Agama hanya memperhatikan hal-hal yang sifatnya ukhrawi dan kurang peduli terhadap segala sesuatu yang sifatnya duniawi. Anggapan seperti ini tidak dibenarkan dalam ajaran agama Islam, sebab pada kenyataannya Islam merupakan agama yang memperhatikan dua sisi kebaikan yaitu kebaikan duniawi dan kebaikan ukhrawi. Jadi, dalam hal ini Islam juga sangat memperhatikan tentang kesehatan dan pengobatan (Qaradhawi 2001, 157).

Sebagaimana diriwayatkan oleh Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً (رواه البخارى)

Artinya :

*Dari Abu Hurairah Ra. dari Nabi Saw. bersabda; Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia Juga menurunkan obatnya. (H.R. Al-Bukhari, VII, 12)*

Islam sangat menghargai bentuk-bentuk pengobatan yang didasari oleh ilmu pengetahuan melalui, penelitian, dan eksperimen ilmiah. Oleh karena itu, setiap pengobatan hendaklah ditangani oleh para ahlinya (Qaradhawi 2001, 159).

Hal ini dapat dilihat dari keanekaan fungsi dan manfaat segala tumbuhan sebagai ciptaan Tuhan, yang dijelaskan dalam Al-Quran QS. An-Naml (27):60

أَمْنَّ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ  
حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَأَلَّهُ مَعَ اللَّهِ بَلْ  
هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ﴿٦٠﴾

Terjemahnya :

*Atau siapakah yang Telah menciptakan langit dan bumi dan yang menurunkan air untukmu dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya? apakah disamping Allah ada Tuhan (yang lain)? bahkan (sebenarnya) mereka adalah orang-orang yang menyimpang (dari kebenaran) (QS. An-Naml /27:60 )*

Maksud ayat tersebut adalah sesungguhnya kekuasaan Allah itu mampu menumbuhkan pohon-pohon atau tanaman di bumi dengan bantuan sinar matahari dan air hujan dari langit seperti daun jati yang telah tumbuh di bumi dan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia.

Dalam Alquran Allah juga menjelaskan tanaman yang berbeda-beda yang terdapat pada Q.S Al-Fathir/35 : 27-28.

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا  
وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيْضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ﴿٢٧﴾

Terjemahnya:

*Tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit lalu Kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya dan ada (pula) yang hitam pekat (Q.S Al-Fathir/35 : 27)*

وَمِنَ النَّاسِ وَالذَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ  
 مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿٣٥﴾

Terjemahnya:

*Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambaNya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun (Q.S Al-Fathir/35 : 28)*

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa berbagai jenis buah-buahan dan perbedaan warna pegunungan itu berasal dari suatu unsur yang sama yakni buah-buahan berasal dari air dan gunung-gunung berasal dari magma, ayat ini juga menjelaskan perbedaan bentuk dan warna makhluk hidup. Ayat diatas menyatakan diantara manusia, binatang-binatang melata dan binatang ternak yakni unta,sapi dan domba bermacam-macam bentuk, ukuran, jenis dan warnanya seperti itu pula. Yakni seperti keragaman tumbuhan dan gunung-gunung. Sebagian dari penyebab perbedaan itu dapat ditangkap maknanya dan karena itu sesungguhnya yang takut kepada Allah diantara hamba-hambaNya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi pengampun. (shihab 2002,5 : 116-117)

Karena dengan adanya tanaman-tanaman yang beredar menunjukkan adanya fungsi yang berbeda pula. Salah satu bedanya adalah untuk pengobatan. Salah satu contohnya adalah tanaman jati yang digunakan sebagai obat antibakteri, khususnya bakteri staphylococcus aureus yang menyebabkan bisul atau *furunkel* . Seperti yang terdapat dalam Q.S An-Nahl/16 : 11, yang berbunyi:

يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ  
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾

Terjemahnya:

*Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman; zaitun, korma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan (Q.S An-Nahl/16 : 11)*

Q.S An-Nahl /16:11 diatas ditutup dengan kalimat “ bagi orang-orang yang berpikir”. Dengan kalimat tersebut dapat dipahami sebagai isyarat Allah kepada ummatNya yang berilmu untuk senantiasa mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu yang membahas tentang obat yang berasal dari alam, baik dari tumbuh-tumbuhan, hewan maupun miniral.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Alat Dan Bahan

##### 1. Alat Yang Digunakan

Autoklaf, seperangkat alat maserasi, cawan petri, gelas erlenmeyer (Iwaki Pyrex), gelas ukur 100 ml (Iwaki Pyrex), gelas ukur 25 ml (Iwaki Pyrex), inkubator (Mettler), kompor listrik (Mettler), mikroskop, neraca O'Haus, oven (Mettler), ose bulat, termometer, timbangan analitik (precisa), viscometer (brookfield).

##### 2. Bahan Yang Digunakan

Sampel ekstrak daun jati (*Tectona grandis* L.F), metanol (teknis), biakan murni (*Staphylococcus aureus*), medium nutrient agar (NA), medium glukosa nutrient broth (GNB), *blank disc* (oxid), Na-CMC 1 %, asam stearat, setil alkohol, gliserin, paraffin cair, adeps lanae, metil paraben, propil paraben, Span 60, Tween 60, vitamin E, Air suling steril.

#### B. Prosedur Kerja

##### 1. Pengambilan Sampel

Daun jati (*Tectona grandis* L.F), yang digunakan diperoleh dari kampus II UIN Alauddin Makassar. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara memetik mulai dari daun kelima dari pucuk secara manual. Daun yang diambil adalah daun yang sehat dan tidak berjamur.

## **2. Pengolahan Sampel**

Daun jati (*Tectona grandis* L.F), yang telah dipetik dibersihkan dari kotoran. Kemudian dikeringkan dengan cara diangin-anginkan ditempat yang tidak terkena sinar matahari. Setelah kering sampel diserbukkan dan siap diekstraksi.

## **3. Ekstraksi Sampel**

Sampel daun jati (*Tectona grandis* L.F) yang telah diserbukkan, ditimbang sebanyak 400 gram, dimasukkan dalam wadah maserasi dan ditambahkan metanol hingga terendam semua dan ditutup rapat, dibiarkan selama 24 jam sambil diaduk sekali-kali. Disaring dan dipisahkan ampas dan filtratnya, selanjutnya dimaserasi kembali dengan cairan penyari yang baru. Hal ini dilakukan sebanyak 3 kali. Ekstrak yang diperoleh dienaptuangkan semalam lalu diuapkan sehingga diperoleh ekstrak metanol yang kental.

## **4. Sterilisasi Alat**

Alat- alat yang digunakan dicuci, alat – alat gelas dicuci dengan deterjen. Peralatan gelas yang baru direndam dalam HCL 2-3 % selama beberapa jam dan terakhir dengan air suling. Alat-alat dikeringkan dengan posisi terbalik di udara terbuka setelah kering dibungkus dengan kertas perkamen. Tabung reaksi dan gelas erlenmeyer terlebih dahulu disumbat dengan kapas bersih. Alat dari kaca disterilkan di oven selama 2 jam pada suhu 180° C. Alat- alat suntik dan alat-alat plastik lainnya disterilkan di dalam autoklaf pada suhu 121°C selama 15 menit dengan tekanan 2 atm. Jarum ose disterilkan dengan pemanasan langsung hingga memijar.

## 5. Pembuatan Medium (Djide. M.N, Sartini, 2008: 22-23)

### a. Medium Nutrien Agar

Komposisi :

Pepton	3 gram
Ekstrak beef	5 gram
Agar	15 gram
Aguadest	hingga 1000 ml

Pembuatan :

Semua bahan dimasukkan kedalam gelas erlemenyer kemudian dilarutkan dengan air suling sebanyak 800 ml, dipanaskan sampai larut, dicukupkan sampai 1000 ml dengan aguadest. Kemudian disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121° C selama 15 menit.

### b. Medium Glukosa Nutrien Broth (GNB)

Komposisi :

Pepton	10 gram
Ekstrak beef	5 gram
Glukosa	10 gram
Aguadest	hingga 1000 ml

Pembuatan :

Semua bahan dimasukkan kedalam erlemenyer kemudian dilarutkan dengan air suling hingga 800 ml, dipanaskan sampai larut. Kemudian dicukupkan dengan aguadest hingga 1000 ml. Kemudian disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121° C selam 15 menit.

## 6. Penyiapan Bakteri Uji

Bakteri uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Staphylococcus aureus*. Bakteri yang berasal dari Kultur Koleksi

Laboratorium Mikrobiologi UIN Alauddin Makassar yang diremajakan dalam Medium Glukosa Nutrient Broth (GNB) dan diinkubasi selama 1 x 24 jam pada suhu 37°C.

#### **7. Penentuan Zona Hambat Optimum Ekstrak Metanol Daun jati (*Tectona grandis* L.F)**

Ekstrak metanol daun jati (*Tectona grandis* L.F) dibuat dalam beberapa konsentrasi yaitu 0,0125%, 0,025%, 0,05%, 0,1%, 0,2%, 0,4%, 0,8%, 1,6%, 3,2%, 6,4% dan 12,8% dengan menggunakan larutan koloidal Na- CMC 1%. Medium NA steril kemudian didinginkan hingga suhu 40-45°C. kemudian dituang ke dalam cawan petri sebanyak 20 ml medium NA yang telah dicampur dengan 0.02 ml suspensi biakan bakteri yang telah disiapkan dalam botol. Dihomogenkan dan dibiarkan hingga membeku.

Kemudian diletakkan *blank disc* ke dalam cawan petri yang berisi medium NA tadi, dimana *blank disc* tersebut terlebih dahulu ditetesi 0.1 ml ekstrak metanol daun jati (*Tectona grandis* L.F) dengan masing-masing konsentrasi 0,0125%, 0,025%, 0,05%, 0,1%, 0,2%, 0,4%, 0,8%, 1,6%, 3,2%, 6,4% dan 12,8% secara aseptik. Kemudian cawan tersebut ditutup dan diinkubasi selama 1x 24 jam pada suhu 37°C, kemudian diukur diameter zona hambatnya.



## 8. Pembuatan Sediaan Krim Dengan Emulgator Nonionik

### a. Rancangan Formula

Nama Bahan	Formulasi Krim (%)		
	I	II	III
Ekstrak metanol daun jati	7	7	7
Setil alkohol	3	3	3
Asam stearat	5	5	5
Gliserin	15	15	15
Paraffin	5	5	5
Adeps lanae	5	5	5
Span 60 tween 60	2	3	4
Propil paraben	0,1	0,1	0,1
Metil paraben	0,05	0,05	0,05
Vitamin E	0,05	0,05	0,05
Aguadest	57,8	56,8	55,8

### b. Cara pembuatan

Disiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Fase minyak dibuat dengan melebur berturut-turut asam stearat, setil alkohol, adeps lanae, paraffin cair, span 60. Kemudian ditambahkan propil paraben, vitamin E dan ekstrak metanol daun jati (*Tectona grandis L.F*), kemudian suhu dipertahankan pada 70° C. Fase air dibuat dengan melarutkan metil paraben dalam air, pada suhu 90° C dan ditambahkan gliserin, kemudian ditambahkan tween 60, dipertahankan pada suhu 70°C. Krim dibuat dengan mencampurkan fase minyak kedalam fase air sambil diaduk dengan pengaduk elektrik selama 3 menit. Kemudian didiamkan selama 20 detik, lalu diaduk kembali sampai terbentuk krim yang homogen.

**9. Pemeriksaan Hasil Jadi Krim** (Lahman L. Liberman HA & Kaning JL, 1994)

a. Pengamatan Organoleptis

Pengamatan organoleptis yang dilakukan terhadap sediaan yang telah dibuat meliputi pengamatan perubahan warna, bau, bentuk. Pengamatan ini dilakukan sebelum dan sesudah emulsi diberi kondisi penyimpanan dipercepat

b. Evaluasi Tipe Emulsi (Martin EL, : 528-529)

1. Metode Pengenceran

Emulsi yang telah dibuat dimasukkan kedalam cawan, kemudian diencerkan dengan ditambahkan air. Jika emulsi dapat diencerkan maka emulsi adalah minyak dalam air.

2. Metode Hantaran Listrik

Emulsi yang telah dibuat, dimasukkan dalam gelas kimia, kemudian dimasukkan dua kawat yang dihubungkan dengan lampu dan arus listrik, maka hanya pada emulsi M/A yang akan menyalakan lampu. Hanya air sebagai fase luar dapat memberikan aliran listrik ( Voigth, R, 1995 : 443).

c. Evaluasi Kestabilan Fisik Krim

Evaluasi kestabilan fisik krim dilakukan sebagai berikut:

1. Pengukuran Volume Kriming

Krim sebanyak 25 ml, dimasukkan dalam gelas ukur kemudian diberi kondisi penyimpanan dipercepat yaitu penyimpanan pada suhu 5° C dan 37°C masing-masing selama 12 jam sebanyak 10 siklus. Pengamatan volume kriming dihitung dalam % dengan rumus :

$$\text{Volume kriming} : \frac{Hu}{Ho} \times 100 \%$$

Dimana :  $Hu$  = Volume emulsi yang kriming

$Ho$  = Volume total krim

## 2. Pengukuran kekentalan

Pengukuran kekentalan dilakukan terhadap sediaan krim yang telah dibuat sebelum dan setelah diberi kondisi penyimpanan dipercepat yaitu pada suhu 5°C dan 35°C masing-masing selama 12 jam sebanyak 10 siklus. Pengukuran kekentalan dilakukan dengan menggunakan viscometer.

## 3. Pengukuran Tetes Dispersi

Krim dimasukkan kedalam vial kemudian dilakukan pengukuran tetes terdispersi sebelum dan setelah kondisi penyimpanan dipercepat yaitu pada suhu 5°C dan 35°C masing-masing selama 12 jam sebanyak 10 siklus. Pengamatan ukuran tetes dispersi dilakukan dengan menggunakan mikroskop. Dengan meneteskan krim pada objek gelas kemudian ditutup dengan deck gelas dan setelah diperoleh pembesaran yang sesuai maka diamati rentang ukuran partikel tetes terdispersinya.

## 4. *Inverse Fase*

Sediaan yang telah jadi diberi kondisi penyimpanan dipercepat yaitu penyimpanan pada suhu 5°C dan 35°C masing –masing selama 12 jam sebanyak 10 siklus, kemudian diuji kembali tipe emulsinya dengan metode pengenceran dan metode hantaran listrik.

#### **10. Pengujian Efektivitas Sediaan Terhadap Bakteri *Staphylococcus aureus* L.F**

Dibuat medium NA steril kemudian didinginkan hingga suhu 40-45° C. Sebanyak 20 ml medium NA yang telah dicampur dengan 0,02 ml suspensi biakan bakteri dituang ke dalam cawan petri. Dihomogenkan dan dibiarkan hingga membeku. Kemudian diletakkan *blank disc* ke dalam cawan petri yang berisi medium NA tadi, dimana *blank disc* tersebut terlebih dahulu dijenuhkan dengan sediaan krim yang mengandung ekstrak metanol daun jati (*Tectona grandis* L.F) selama 15-30 menit. Kemudian cawan tersebut ditutup dan diinkubasi selama 1x 24 jam pada suhu 37°C, kemudian diukur diameter zona hambatannya.

#### **11. Pengumpulan dan Analisa Data**

Data hasil pengamatan dikumpulkan dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode statistik Rancangan Acak Kelompok (RAK).

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Hasil Penelitian***

Hasil pengamatan organoleptis, penentuan tipe emulsi, pengukuran volume kriming, pengukuran viskositas, pengukuran tetes terdispersi, *inverse fase* dan uji efektifitas terhadap bakteri *Staphylococcus aureus* pada krim ekstrak metanol daun jati (*Tectona grandis* L.F) yang telah dibuat memberikan hasil sebagai berikut :

##### **1. Pengamatan Organoleptis**

Pengamatan organoleptis terhadap sediaan krim ekstrak metanol daun jati (*Tectona grandis* L.F) yang menggunakan emulgator surfaktan nonionik (Tween 60 dan Span 60) pada konsentrasi 2%, konsentrasi 3% dan konsentrasi 4 % tidak mengalami perubahan warna dan bau sebelum dan setelah kondisi penyimpanan dipercepat. Warna tetap coklat dan berbau ekstrak.

##### **2. Penentuan Tipe Emulsi**

Pada pengujian tipe emulsi krim ekstrak metanol daun jati (*Tectona grandis* L.F) sebelum dan setelah penyimpanan dipercepat dengan menggunakan metode uji pengenceran dengan air, memberikan hasil bahwa emulsi tetap homogen (tidak pecah), dan uji hantaran listrik memberikan hasil dapat menghantarkan listrik ditandai dengan menyalnya lampu, menunjukkan tipe emulsi M/A (minyak dalam air).

### 3. Evaluasi Kestabilan Fisik

#### a. Volume Kriming

Pada pengukuran volume kriming, untuk krim yang dibuat menggunakan emulgator nonionik (Tween 60 dan Span 60) pada konsentrasi 2% dan 3% setelah diberi kondisi penyimpanan dipercepat mengalami kriming, sedangkan pada krim dengan konsentrasi 4% setelah diberi kondisi penyimpanan dipercepat tidak memperlihatkan adanya kriming. Hasil selengkapnya dapat dilihat gambar 11.

#### b. Viskositas Emulsi

Viskositas emulsi diukur menggunakan Viscometer Brookfield dengan “spindel” no. 6. Sebelum kondisi penyimpanan dipercepat, viskositas rata-rata masing –masing krim adalah krim I : 39,7 poise, krim II : 57,7 poise dan krim III : 51,7 poise, sedangkan viskositas rata-rata masing-masing krim setelah diberi kondisi penyimpanan dipercepat adalah krim I : 36,7 poise, krim II : 50 poise dan krim III : 61,3 poise. Hasil dapat dilihat pada tabel 4.

#### c. Ukuran Tetes Terdispersi

Pada pengukuran tetes terdispersi, sebelum kondisi penyimpanan dipercepat diperoleh rata-rata ukuran tetes terdispersi masing-masing krim adalah krim I : 22,57  $\mu\text{m}$ , krim II : 19,93  $\mu\text{m}$  dan krim III : 10,69  $\mu\text{m}$ . Sedangkan, setelah diberi kondisi penyimpanan dipercepat rata-rata ukuran tetes terdispersi masing-masing krim adalah krim I : 25,20  $\mu\text{m}$ , krim II : 23,1  $\mu\text{m}$  dan krim III : 12,54  $\mu\text{m}$ . Hasil dapat dilihat pada tabel 7.

#### d. *Inverse Fase*

Pada pengujian tipe emulsi krim dengan menggunakan metode uji pengenceran dengan air dan uji hantaran listrik sebelum kondisi penyimpanan dipercepat menunjukkan tipe emulsi minyak dalam air (M/A). Hal yang sama juga terjadi pada pengujian ulang tipe emulsi setelah krim diberi kondisi penyimpanan dipercepat yaitu tipe minyak dalam air (M/A). Hal ini berarti tidak terjadi inverse fase. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.

#### 4. Pengukuran Daya Hambat Sediaan

Pada pengukuran zona hambatan sediaan, sebelum kondisi penyimpanan dipercepat diperoleh rata-rata ukuran diameter zona hambatan masing-masing krim adalah krim I : 11,43 mm, krim II : 10,73 mm dan krim III : 10,46 mm. Sedangkan, setelah diberi kondisi penyimpanan dipercepat rata-rata ukuran diameter zona hambatan masing-masing krim adalah krim I : 12,06 mm, krim II : 10,38 mm dan krim III : 9,67 mm. Hasil dapat dilihat pada tabel 10.

#### B. Pembahasan

Ekstrak metanol daun jati ( *Tectona grandis* L.F ) diformulasi menjadi sediaan krim antibakteri yang dikhususkan pada infeksi-infeksi yang disebabkan oleh bakteri *Stapylococcus aureus* menggunakan emulgator nonionik (Tween 60 dan Span 60). Tween dan Span merupakan surfaktan yang memiliki sifat relatif hidrofil / lipofil atau HLB, makin rendah nilai HLB suatu surfaktan maka akan makin lipofil surfaktan tersebut, sedangkan makin tinggi nilai HLB surfaktan akan makin hidrofil.

Penggunaan emulgator nonionik gabungan tween 60 dan span 60 dengan HLB butuh 10,2 dipilih dengan alasan emulgator gabungan dapat

menghasilkan pengurangan tegangan antar muka yang lebih besar dibanding emulgator tunggal sehingga emulsi yang dibentuk akan lebih stabil serta karakteristik hidrofilik dan lipofilik yang seimbang, sehingga molekul surfaktan cenderung lebih senang berada pada antar muka ( Kamarza mulia, 2010). Disamping itu juga emulgator ini memiliki tingkat iritasi yang rendah serta tidak sensitif dengan asam, alkali dan garam (Jellineck, 1986 : 159). Penggunaan emulgator ini dipertimbangkan mengingat belum diketahui secara pasti komponen kimia atau senyawa yang terdapat dalam ekstrak metanol daun jati (*Tectona grandisa* L.F) yang mungkin dapat berpengaruh jika digunakan emulgator golongan ion.

Hasil pengamatan organoleptis terhadap krim yang mengandung ekstrak metanol daun jati (*Tectona grandis* L.F) dengan pengaruh emulgator nonionik Tween 60 dan Span 60 dari konsentrasi 2%, 3% dan 4%, tidak menunjukkan perubahan warna dan bau setelah kondisi penyimpanan dipercepat. Berarti tidak terjadi reaksi kimia antara ekstrak metanol daun jati (*Tectona grandis* L.F) dengan bahan pengemulsi nonionik terhadap perubahan organoleptis untuk ketiga krim yang dibuat. Hal ini kemungkinan disebabkan karena dasar emulgator nonionik bersifat netral terhadap pengaruh kimia, tidak toksik dan mudah bercampur dengan bahan lain serta tidak menyebabkan terjadinya perubahan pH (Voigth, R, 1995 : 418).

Hasil pengujian tipe emulsi krim ekstrak metanol daun jati (*Tectona grandis* L.F) sebelum dan setelah kondisi penyimpanan dipercepat memperlihatkan bahwa ketiga formula krim (kombinasi emulgator nonionik Tween 60 dan Span 60 dengan konsentrasi 2%, 3% dan 4%) mempunyai tipe emulsi minyak dalam air (M/A) baik dengan uji pengenceran dengan air dan uji hantaran listrik. Hal ini disebabkan karena jumlah fase terdispersi



(minyak/lemak) yang digunakan dalam krim lebih kecil dari fase pendispersi (fase air), sehingga fase minyak akan terdispersi merata kedalam fase air dan membentuk emulsi minyak dalam air dengan bantuan emulgator. Pada emulgator nonionik terlihat bahwa Hidrofilik Lipofilik Balance (HLB) kombinasi yang dibutuhkan adalah 10,2 yang menurut pernyataan Daviss bahwa emulgator dengan HLB lebih dari 7 akan terdistribusi dalam fase air dan membentuk emulsi tipe M/A (Lieberman, HA, 1998 : 201).

Hasil pengamatan volume kriming menunjukkan terjadinya kriming pada krim I dan krim II, hal ini disebabkan karena dibanding krim III viskositas serta ukuran tetes terdispersi dari krim I dan krim II sebelum kondisi penyimpanan dipercepat menunjukkan perbedaan dibanding setelah kondisi penyimpanan dipercepat. Ukuran tetes terdispersi krim I dan II lebih besar dari pada krim III, hal ini kemungkinan disebabkan karena surfaktan tidak cukup membentuk tetes terdispersi yang lebih kecil. Kriming adalah perpindahan keatas dari tetesan relatif zat terdispersi ke fase kontinyu. Ketika emulsi mengalami kriming, ia berpisah dalam dua atau lebih lapisan yang viskositasnya berbeda tetapi dengan penggocokan lapisan menjadi terdispersi dan emulsi menjadi sediaan yang homogen lagi. Kriming bukanlah tanda pecahnya emulsi tetapi secara estetika tidak bagus dipandang dan tidak elegan secara kosmetika (Scovilles, 1995 : 314).

Menurut persamaan stokes laju pemisahan dari fase terdispersi dari suatu emulsi dapat dihubungkan dengan faktor-faktor seperti, ukuran partikel dari fase terdispersi, perbedaan dalam kerapatan antarfase, dan viskositas fase luar. Analisis persamaan menunjukkan bahwa jika fase terdispersi kurang rapat dibandingkan dengan fase kontinyu yang merupakan hal umum dalam emulsi m/a, kecepatan sedimentasi menjadi negatif, yakni dihasilkannya creaming

yang mengarah ke atas. Jika fase dalam lebih berat dari fase luar, bola-bola akan mengendap. Fenomena ini sering terdapat pada emulsi tipe a/m dimana creaming mengarah ke bawah. Makin besar perbedaan kerapatan dari kedua fase tersebut, makin besar bola-bola minyak dan makin menurun viskositas dari fase luar sehingga laju creaming makin besar. Faktor-faktor dalam persamaan Stoke's dapat diubah untuk mengurangi laju creaming dalam suatu emulsi. Viskositas dari fase luar dapat ditingkatkan tanpa melewati batas-batas konsistensi yang dapat diterima dengan menambahkan suatu zat pengental (Gennaro AR, 1990 : 307).

Hasil pengukuran viskositas masing-masing krim sebelum dan setelah kondisi penyimpanan dipercepat, menunjukkan adanya perubahan viskositas. Hal ini dapat dilihat pada histogram viskositas (Gambar 2). Berdasarkan histogram tersebut terjadi penurunan viskositas pada kondisi penyimpanan dipercepat pada krim I dan II, sedangkan pada krim III menunjukkan adanya peningkatan viskositas setelah kondisi penyimpanan dipercepat. Hal ini mungkin disebabkan karena pengaruh perbedaan konsentrasi emulgator yang digunakan, dimana pada krim I digunakan konsentarsi emulgator 2% , krim II digunakan konsentrasi emulgator 3% dan krim III digunakan konsentarsi emulgator 4%. Makin tinggi konsentarsi emulgator yang digunakan maka makin sedikit jumlah air yang diperlukan untuk mencapai massa krim yang diinginkan, begitu juga sebaliknya makin kecil jumlah konsentrasi emulgator yang digunakan maka makin banyak jumlah air yang diperlukan untuk mencapai volume krim yang diinginkan, sehingga terjadilah perbedaan viskositas untuk ketiga krim tersebut. Disamping itu, konsentrasi emulgator yang cukup dapat membentuk lapisan antarmuka yang stabil sehingga viskositas dapat dipertahankan. Hasil analisis statistik rancangan acak

kelompok (RAK) pada perubahan viskositas krim kombinasi emulgator nonionik Tween 60 dan Span 60 sebelum dan setelah diberi kondisi penyimpanan dipercepat tidak dipengaruhi oleh variasi konsentrasi emulgator nonionik yang digunakan. Hal ini dapat dilihat (pada tabel 5-6) dimana  $F_{hitung} < F_{tabel}$ .

Hasil pengukuran tetes terdispersi yang diperlihatkan pada hasil pengukuran tetes terdispersi (tabel 7) dan berdasarkan hasil analisis statistik dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok (tabel 8) ukuran tetes terdispersi krim sebelum dan setelah kondisi penyimpanan dipercepat dipengaruhi oleh variasi konsentrasi emulgator nonionik yang digunakan. Hal ini dapat dilihat (tabel 9) dari  $F_{hitung} > F_{tabel}$ . Jika dilihat di bawah mikroskop terlihat bahwa ukuran partikel dari kombinasi emulgator nonionik Tween 60 dan Span 60 konsentrasi 2% dan konsentrasi 3% mempunyai ukuran partikel yang lebih besar dari pada kombinasi emulgator nonionik Tween 60 dan Span 60 konsentrasi 4%, meskipun secara teori rata-rata ukuran tetes terdispersi semua krim masih memenuhi syarat yaitu antara 0,2 – 50  $\mu\text{m}$ . Konsentrasi surfaktan 2% dan 3% tidak mampu mencegah terjadinya koalesensi dari tetes terdispersi, hal ini pula yang menyebabkan terjadinya kriming pada kedua formulasi krim tersebut.(Parrot, Eugena, 1974 : 313).

Hasil pengujian efektifitas krim terhadap bakteri *Staphylococcus aureus* (tabel 10), berdasarkan hasil analisis statistik dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok (tabel 11) diameter zona hambatan krim sebelum dan setelah kondisi penyimpanan dipercepat, menunjukkan tidak dipengaruhi oleh variasi konsentrasi emulgator nonionik yang digunakan. Hal ini dapat dilihat (pada tabel 12) dari  $F_{hitung} < F_{tabel}$ . Dan setelah perlakuan inkubasi selama 2 x 24 jam diameter zona hambatan krim menunjukkan tidak ada perubahan yang

signifikan (tabel 13, 14 dan 15) serta zona hambatan tetap jernih, sehingga dapat disimpulkan bahwa krim yang mengandung ekstrak metanol daun jati (*Tectona grandis* L.F) bersifat bakteriosida (membunuh mikroorganisme).

Dari pembahasan diatas, adanya kondisi penyimpanan dipercepat terhadap kondisi krim yang diformulasi menggunakan kombinasi konsentrasi emulgator nonionik (Tween 60 dan Span 60) 2%, 3% dan 4 % tidak memberikan pengaruh terhadap perubahan organoleptis (warna dan bau), tipe emulsi dan viskositas. Namun mempengaruhi volume kriming serta ukuran tetes terdispersi yang terjadi pada kombinasi emulgator nonionik Tween 60 dan Span 60 pada konsentrasi 2% dan 3%. Secara keseluruhan dapat dinyatakan bahwa krim antibakteri yang mengandung ekstrak metanol daun jati (*Tectona grandis* L.F) dinyatakan stabil secara fisik, tetapi yang paling stabil dari sisi estetika adalah krim yang diformulasi dengan menggunakan kombinasi emulgator nonionik Tween 60 dan Span 60 dengan konsentrasi 4 %.

## BAB V

### PENUTUP

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengamatan organoleptis dan pengukuran volume kriming, viskositas, dan ukuran tetes terdispersi, setelah dianalisis secara statistika dan dibahas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Formula krim yang diformulasi dengan menggunakan konsentarsi 2%, 3% dan 4% emulgator nonionik (Tween 60 dan Span 60) stabil secara fisik, tetapi yang paling stabil secara fisik dan estetika adalah krim yang diformulasi dengan menggunakan kombinasi konsentrasi emulgator noionik (Tween 60 dan Span 60) 4%.
2. Krim yang dibuat dengan ekstrak metanol daun jati (*Tectona grandis* L.F) memberikan aktivitas bakterisid terhadap bakteri *Stapylococcus aureus*.
3. Agama Islam membuktikan bahwa tumbuh-tumbuhan dan rumput-rumputan yang diciptakan oleh Allah swt terdapat kebaikan, salah satunya sebagai bahan obat. Dimana daun jati (*Tectona grandis* L.F) dapat dimanfaatkan sebagai bahan obat terhadap infeksi oleh bakteri *staphylococcus aureus* seperti penyakit bisul (*Furunkel*).

#### **B. Saran**

Disarankan untuk dilakukan pengujian stabilitas kimia, pengujian stabilitas lama waktu penyimpanan dan upaya untuk menghilangkan warna ekstrak sediaan agar lebih menarik.

## DAFTAR PUSTAKA

### *Alquran Alkarim*

- Abdushshamad, Muhammad, 2002. *Mukjizat Ilmiah dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana,
- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardazba. *Sahih Al-Bukhari Jilid 1*, Bairut: Dar al-Kutub allmiyah.
- Ansel. C. howard, 2005. *Pengantar Bentuk Sediaan Farmasi*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Armisman.A, 2009. *Ekstraksi dan Fraksinasi Senyawa Antibakteri Daun Jati (Tectona grandis L.F)*, Makassar: Uin Alauddin.
- Backer. C.A V Brink R.C.B, 1968. *Flora Of Java*, Noordhoff Gronigen: The Natherlands.
- Banker GS, Rodes CT, 1979. *Modern Pharmaceutics, Drugs And Pharmaceutical Sciences. 7<sup>th</sup> Volume*. New York: Marcel Dekker, Inc.
- Depertemen Kesehatan Republik Indonesia, 1995. *Farmakope Indonesia, Edisi IV*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pengawasan Obat Dan makanan.
- Depertemen Kesehatan Republik Indonesia, 1979. *Farmakope Indonesia, Edisi III*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pengawasan Obat Dan makanan.
- Djide. M.N, Sartini, 2008. *Dasar-Dasar Mikrobiologi Farmasi*. Makassar: Lembaga Penerbit UNHAS.
- Djide. M.N, Sartini. *Metode Instrumental Dalam Bidang Farmasi*. Makassar : Laboratorium Mikrobiologi Farmasi Jurusan Farmasi UNHAS.
- Ganiswara, Sulistia G. 1995. *Farmakologi Dan Terapi. Edisi 4*, Jakarta: Bagian Farmakologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

- Garrity. G.M., Bell. J. A and Lilburn. T.G. 2004. *Taxonomic Outline Of The Prakaryotes Bergey's Manual Of Sistematic Bacteriology, 2th Edition*, United States Of Amerika: Spinger New York Berlin Hendelberg.
- Gennaro AR., At. 1990. al.*Remington Pharmaceutical Sciences, eighteenth edition*, Easton Pennsylvania: Mack Publishing Company.
- Harahap mawali. 2000. *Ilmu Penyakit Kulit*. Jakarta: Hipokrates.
- Harmita,. Randji. M,. 2005. *Buku Ajar Analisis Hayati. Edisi Ke II*. Jakarta: Ari cipta.
- Heyne. K. 1987. *Tumbuhan Berguna Indonesia III*. Jakarta: Badan Litbang Kehutanan.
- Jellineck, Stephan. 1986. *Formulation and Function Of Cosmetic*. New York: Wiley interscience.
- Khare.C.P. 2007. *Indial Medical Plants*. India: New Delhi Spinger.
- Kibbe, A.H. 2000. *Handbook Of Pharmaceutical Exipients.3th Edition*. Pennsylvania: University Of Pharmacy.
- Lahman L. Liberman HA & Kaning JL. 1994. *Theory And Practice Of Industrial Pharmacy*. Easton Pennysylvania: Mack Publishing Company.
- Lierbermen, HA,. 1988. et al. *Pharmaceutical Dosage Form: Dispersi System. Volume I*. Inc.New York: Marcel Dekker.
- Martin EL. *Dispensing of Madication. 7<sup>th</sup> Edition*. Easton Pennsylvania: Mack Publishing Company,
- Mahmud, Muhammad Mahir Hasan. Al-Thib. 2007. al *Tsimar wa al-A'syab al waridat fi Al-Quran Al-Karim wa Al-Sunnah Al-Nabawiyah*.Terj. Hamsah Hasan, Lc, *Mukjizat Kedokteran nabi*, Jakarta Selatan: Qultum Media.
- Michael, EA. Pharmaceutics. 1998. *The Science Of Dosage Form Design. .* Edinburgh London: Churchill Livingstone.
- Mulia kamarza. *Pengaruh Surfaktan Campuran Pada Pembentukan Emulsi untuk Ekstraksi Merkuri II dengan Membran Cair Emulsi (MCEI)*, Departemen Teknik Gas dan Petrokimia, Fakultas Tehnik Universitas Indonesia (On Line). Depak.Email: [kmulia@che.ui.edu](mailto:kmulia@che.ui.edu). (08 Mei 2010)

- Mycek. M. J. 2001. *Farmakologi Ulasan Bergambar, Cetakan 1*, Terjemahan Azwar Agoes, Jakarta: Widya Medika.
- Parrot, Eugena. *Pharmaceutical Tecnology*. Burgess Publishing Company. Iowa City. Iowa : University Of Iowa, 1974.
- Pelczar. Michael J, and Chan. E.C.S. 2008. *Dasar-Dasar Mikrobiologi*, Terjemahan Oleh Hadioetomo, Ratna Sari. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Qaradhawi, Yusuf. 2002. *Islam Agama Ramah Lingkungan*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Rostamailis. 2005. *Pengunaan Kosmetik, Dasar Kecantikan Dan Berbusana Yang Serasi*. Jakarta : PT. Rineka Cipta,
- Scovilles. 1995. *The Art Of Compunding*, London.
- Shihab, M.Quraish. 2002. *Tafsir Al-Mishbah Jilid 5*, Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M.Quraish. 2002. *Tafsir Al-Mishbah Jilid 11*, Jakarta: Lentera Hati.
- Sprowls Joseph B. 1970. *Prescription Pharmacy*, Philadelphia-Toronto J.B: lippincott Company.
- Sumarna. Y. 2008. *Budi daya Jati*. . Jakarta: Penebar Swadaya.
- Suwandi. U. *Mekanisme Kerja Antibiotik*, Pusat Penelitian Dan Pengembangan P.T.Kalbe Farma. Jakarta.(On Line). <http://www.kalbe.co.id> (diakses 20 oktober 2009)
- Syahracham, Agus, dkk. 1994. *Mikrobiologi kedokteran*, Edisi Revisi, Jakarta; Binapura Aksara.
- Tranggono, R.I, Fatma latifah. 2007. *Buku Pengangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Voigth, R. 1995. *Buku Pelajaran Teknologi farmasi*. Edisi V. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Wasitaatmadja, S.M. 1977. *Penuntun Ilmu Kosmetik Medik*. Jakarta; Universitas Indonesia Press.