

**BIOAKUMULASI LOGAM BERAT MERKURI (Hg) PADA IKAN
EKOR KUNING (*Caesio cuning*) DI PERAIRAN
PULAU LAE-LAE MAKASSAR**



HASIL PENELITIAN

Oleh:

NUR AENIA
60300113037

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**
2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Aeni A
NIM : 60300113037
Tempat/Tgl. Lahir : Sinjai/ 19 April 1995
Jurusan/Prodi : Biologi/S1
Fakultas : Sains dan Teknologi
Alamat : Toddopuli VI, JL. Borong Indah No. 2
Judul : Bioakumulasi Logam Berat Merkuri (Hg) pada Ikan Ekor Kuning (*Caesio cuning*) di Perairan Pulau Lae-lae Makassar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 2017
Penyusun






NUR AENI A
NIM: 60300113037

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "**Bioakumulasi Logam Berat Merkuri (Hg) pada Ikan Ekor Kuning (*Caesio cuning*) di Perairan Pulau Lae-lae Makassar**" yang disusun oleh **Nur Aeni A**, NIM: 60300113037, mahasiswa Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 18 September 2017, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Sains dan Teknologi, Jurusan Biologi.

Makassar, 18 September 2017 M
27 Dzul-Hijjah 1438 H


DEWAN PENGUJI :

Ketua	: Prof. Dr.H.Arifuddin, M.Ag.	()
Sekretaris	: Hasyimuddin, S.Si, M.Si.	()
Munaqisy I	: Fatmawati Nur, S.Si., M.Si	()
Munaqisy II	: Dr. Muh Thahir Maloko, M.Hi	()
Pembimbing I	: Sitti Saenab, S.Pd., M.Pd	()
Pembimbing II	: Ulfa Triyani A. Latif, S.Si., M.Pd	()

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar,




Prof. Dr.H.Arifuddin Ahmad M.Ag.

NIP. 19710412 200003 1 001

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alam, segala puji syukur ke hadirat Allah Swt atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, hingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Bioakumulasi Logam Berat Merkuri (Hg) pada Ikan Ekor Kuning (*Caesio cuning*) di Periran Pulau Lae-lae Makassar” ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Saw. sebagai *uswatun hasanah* dalam meraih kesuksesan di dunia dan akhirat.

Melalui tulisan ini pula, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus, teristimewa kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda **Anwar** dan Ibunda **Hasriani** atas segala doa, restu, kasih sayang, pengorbanan dan perjuangan yang telah diberikan selama ini. Kepada beliau penulis senantiasa memanjatkan doa semoga Allah Swt. mengasihi dan mengampuni dosanya. Amin.

Keberhasilan penulisan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, pengarahan dan bantuan dari berbagai pihak baik berupa pikiran, motivasi, tenaga, maupun doa. Karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si., selaku Rektor UIN Alauddin Makassar beserta seluruh jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr.H. Arifuddin Ahmad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

3. Bapak Dr. Mashuri Masri, S.Si., M.Kes. dan Bapak Hasyimuddin, S.Si., M.Si. selaku ketua dan sekretaris Jurusan Biologi.
4. Ibu Siti Saenab, S.Pd., M.Pd. dan Ibu Ulfa Triyani A. Latif, S.Si., M.Pd. selaku pembimbing I dan II yang dengan sabar telah meluangkan waktu demi memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh dosen jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang telah menyalurkan ilmunya kepada penulis selama berada di bangku kuliah.
6. Segenap karyawan dan karyawan Fakultas Sains dan Teknologi yang telah bersedia melayani penulis dari segi administrasi dengan baik selama penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
7. Saudara-saudaraku tercinta Ernawati dan Zaid Fadil serta sepupuku Zainal, dan Imran tak lupa keponakanku tercantik Nurhidayah dan Syamsidar yang selalu memberikan doa, semangat dan dukungan selama ini. Serta keluarga besarku yang ada di daerah. Kalian penyemangat dalam setiap langkah perjalanan menempuh pendidikan. Begitu banyak hal yang telah diberikan kepada penulis untuk tetap tegar dalam menghadapi kerasnya kehidupan.
8. Seluruh teman-teman seperjuangan di keluarga "**BRACHIALIS 013**" terkhusus untuk teman-teman "**BRACHIALIS 013**" yang telah memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi.

9. Untuk semua kakanda dan adinda Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar terima kasih atas bantuan dan dukungannya.

10. Teman-teman alumni SMAN 1 Tellulimpoe yang telah banyak memberikan bantuan berupa moril yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Rasa terima kasih yang tiada hentinya penulis haturkan, semoga bantuan yang telah diberikan bernilai ibadah di sisi Allah Swt. dan mendapat pahala yang setimpal. Amin.

Akhirnya, diharapkan agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan menambah khasanah ilmu pengetahuan.

Amin Ya Rabbal Alamin

Makassar, September 2017
Penulis

Nur Aeni A
NIM: 60300113037

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
KATA PENGANTAR	v-vii
DAFTAR ISI	viii-x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1-12
A. Latar Belakang.....	1-9
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	9-10
D. Kajian Pustaka.....	10-11
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Kegunaan Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN TEORITIS	13-14
A. Ayat yang Relevan.....	14-15
B. Tinjauan Umum Logam Berat.....	15-17
C. Tinjauan Umum Merkuri.....	17-22
D. Bioakumulasi Logam Berat di Perairan.....	23-25
E. Bioakumulasi Logam pada Ikan.....	25-27
F. Batas Minimum Merkuri (Hg).....	27-29
G. Toksisitas Merkuri (Hg).....	29-31
H. Tinjauan Umum Ikan Ekor Kuning.....	31-38
I. Tinjauan Umum Pulau Lae-lae.....	38-39
J. Kerangka Pikir.....	40

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	41-45
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	41
B. Pendekatan Penelitian.....	41
C. Populasi dan Sampel.....	41
D. Variabel Penelitian.....	42
E. Definisi Operasional Variabel.....	42
F. Instrumen Penelitian.....	42-43
G. Prosedur Kerja.....	43-45
H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	48-62
A. Hasil Penelitian.....	48-49
B. Pembahasan.....	49-62
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	63
KEPUSTAKAAN	65-68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	69-83

DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN

Diagram 2.1 Skema rantai perjalanan merkuri dari industri sampai ke manusia.....	26
Gambar 2.1 Merkuri.....	19
Gambar 2.2 Ikan ekor kuning.....	33
Gambar 2.3 Anatomi ikan.....	34
Gambar 2.4 Letak <i>aorta dorsalis</i> , <i>sinus venosus</i> , jantung dan insang.....	36
Gambar 2.5 Sistem sirkulasi dari ikan.....	36
Gambar 2.6 Lokasi pulau Lae-lae.....	40
Gambar 2.7 Lokasi pulau Lae-lae.....	40
Gambar 4.1 Histogram kandungan kadar rata-rata logam Hg pada sampel insang dan daging ikan ekor kuning (<i>Caesio cuning</i>) pada Stasiun (I) dan Stasiun (II).....	48
Gambar L 1.1 Lokasi penelitian.....	69
Gambar L 1.2 Lokasi Stasiun (I) dan Stasiun (II).....	69
Gambar L 5.1 Tahap pengambilan sampel.....	80
Gambar L 5.2 Hasil tangkapan pada Stasiun(I) dan stasiun (II).....	80
Gambar L 5.3 Tahap preparasi sampel.....	81
Gambar L 5.4 Proses penimbangan sampel.....	81
Gambar L 5.5 Proses destruksi basah.....	82
Gambar L 5.6 Tahap penyaringan sampel.....	82
Gambar L 5.7 Analisis sampel pada SSA.....	83
Tabel 2.1 Kegunaan Hg dalam pabrik.....	22
Tabel 2.2 Batas maksimum cemaran Hg dalam pangan.....	28-30
Tabel 4.1 Kandungan logam berat Hg pada organ insang dan daging ikan ekor kuning (<i>Caesio cuning</i>).....	48
Tabel L 4.1 Rona Lingkungan Perairan Pulau Lae-lae Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Lae-lae, Kota Makassar.....	79

ABSTRAK

Nama : Nur Aeni. A
NIM : 60300113037
Judul : **Bioakumulasi Logam Berat Merkuri (Hg) pada Ikan Ekor Kuning (*Caesio cuning*) di Perairan Pulau Lae-lae Makassar**

Merkuri (Hg) merupakan salah satu dari jenis logam berat yang memiliki efek toksik berbahaya. Hg dianggap sebagai logam berbahaya karena sebagai ion atau dalam bentuk senyawa tertentu mudah diserap ke dalam tubuh organisme. Di dalam tubuh, Hg dapat menghambat fungsi dari berbagai enzim bahkan dapat menimbulkan kerusakan sel. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kadar logam berat Hg pada ikan ekor kuning (*Caesio cuning*) yang diperoleh dari dua titik stasiun diperairan Pulau Lae-lae Makassar yaitu Stasiun (I) sebelah utara dan Stasiun (II) sebelah timur. Metode pengambilan sampel yang digunakan yaitu *Purposive sampling* dengan bagian organ yang diuji yaitu organ insang dan dagingnya. Analisis sampel menggunakan spektrofotometer serapan atom (SSA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan Hg pada organ insang di Stasiun (I) 0,22 mg/kg sedangkan di Stasiun (II) yaitu 0,19 mg/kg. Kandungan Hg pada organ daging di Stasiun (I) mencapai 0,12 mg/kg sedangkan pada Stasiun (II) mencapai 0,11 mg/kg. Dari hasil penelitian diketahui bahwa kandungan logam berat merkuri (Hg) pada ikan ekor kuning (*Caesio cuning*) yang diperoleh dari perairan Pulau Lae-lae Makassar masih di bawah ambang batas toleransi yang diperbolehkan oleh peraturan (SNI, 2009) yaitu 0,5 mg/kg.

Kata kunci: Logam Berat, Merkuri (Hg), ekor kuning (*Caesio cuning*)

Abstract

Name : Nur Aeni. A

NIM : 60300113037

Title : Bioaccumulation of Heavy Metals Mercury (Hg) on Yellowfin (*Caesio cuning*) in PulauLae-lae of Makassar

Mercury (Hg) is one of a kind of heavy metals that has a harmful toxic effect. Hg is considered a dangerous metal because as an ion or in the form of certain compounds easily absorbed into the body of the organism. In the body, Hg can inhibit the function of various enzymes can even cause cell damage. The aim of this research was to find out the heavy metal content of Hg on the yellow tail fish (*Caesio cuning*) obtained from two points of the water station of Lae-lae Makassar Island, the Station (I) north and the east Station II. Sampling method used is Purposive sampling with the organs that tested the gill and meat organ. The sample analysis used atomic absorption spectrophotometer (SSA). The results showed that the content of Hg in gill organs in Station (I) 0.22 mg/kg while in Station (II) is 0.19 mg / kg. The content of Hg in meat organ at Station (1) reaches 0.12 mg/kg while at Station (II) reaches 0.11 mg/kg. From the results of the research, it is known that the content of heavy metals mercury (Hg) in yellow tail fish (*Caesio cuning*) obtained from the waters of Lae-lae Island Makassar is still below the tolerance threshold allowed by the regulation (SNI, 2009) that is 0.5 mg/kg.

Keywords: Heavy Metal, Mercury (Hg), Yellow tail (*Caesio cuning*)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Air laut adalah suatu komponen yang berinteraksi dengan lingkungan daratan, di mana buangan limbah dari daratan akan bermuara ke laut. Selain itu air laut juga sebagai tempat penerimaan polutan (bahan cemar) yang jatuh dari atmosfer. Limbah tersebut yang mengandung polutan kemudian masuk ke dalam ekosistem perairan pantai dan laut. Sebagian larut dalam air, sebagian tenggelam ke dasar dan terkonsentrasi ke sedimen, dan sebagian masuk ke dalam jaringan tubuh organisme laut (termasuk fitoplankton, ikan, udang, cumi-cumi, kerang, rumput laut dan lain-lain).

Meningkatnya industri memberikan dampak meningkatnya pelepasan limbah ke lingkungan sekitar termasuk di dalamnya lingkungan perairan laut. Buangan limbah yang masuk ke perairan laut dapat melalui aliran sungai ataupun secara langsung yang bermuara ke perairan tersebut. Limbah tersebut mengandung bahan kimia yang beracun dan berbahaya, salah satu dari limbah berbahaya tersebut adalah logam berat.

Lingkungan jangan sampai rusak dan manusia harus bertanggung jawab atas kerusakan itu untuk selanjutnya memperbaikinya kembali. Dalam melaksanakan kekhalfahan ini, manusia sudah dibekali fisik dan akal yang sempurna, bahkan

agama yang akan menjadi petunjuk agar manusia tidak terjerumus oleh hawa nafsunya. Dalam memberikan petunjuk pada manusia akhir zaman ini, Allah mengutus Muhammad saw. dengan al-Qur'an sebagai pedoman. Kerusakan lingkungan sebagai akibat dari tidak menjaga dan melindungi atas rahmat Allah swt. yang diberikan-Nya, dikaitkan pada surah Ar Ruum/30: 41.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Terjemahnya:

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar) (Kementerian Agama RI, 2012).

Menurut (Shihab, 2002) makna dari QS Ar Ruum/30:41 yaitu telah tampak kerusakan di darat dan lautan, seperti rusaknya penghidupan mereka, turunnya musibah, dan turunnya penyakit yang menimpah diri mereka, dan lain-lain disebabkan perbuatan buruk (maksiat) yang mereka lakukan. Telah terlihat kebakaran, kekeringan, kerusakan, kerugian perniagaan dan ketertenggelaman yang disebabkan oleh kejahatan dan dosa-dosa yang diperbuat manusia. Allah swt. menghendaki untuk menghukum manusia di dunia dengan perbuatan-perbuatan mereka, agar mereka bertobat dari kemaksiatan.

Seperti telah dijelaskan dalam al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 41 bahwa kerusakan itu telah terjadi di darat dan di laut. Hal ini disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri yang tidak mau menjaga kelestarian alam. Dalam ayat ini pula Allah swt.

menyuruh kita untuk melakukan perjalanan di muka bumi dan menengok kembali kisah-kisah umat terdahulu yang binasa karena ingkar kepada Allah swt.

Sayyid Quthb dalam tafsirnya menjelaskan keterkaitan kondisi-kondisi kehidupan dengan usaha mereka, juga menjelaskan bahwa kerusakan hati manusia serta akidah dan amal mereka akan menghasilkan kerusakan di bumi dan memenuhi daratan dan lautan. Tampaknya kerusakan seperti itu, takkan terjadi tanpa adanya sebab. Hal ini merupakan hasil dari hukum-hukum Allah swt. serta pengaturan-Nya (Quthb, 2002).

Selain untuk beribadah kepada Allah swt, manusia juga diciptakan sebagai khalifah dimuka bumi. Sebagai khalifah, manusia memiliki tugas untuk memanfaatkan, mengelola dan memelihara alam semesta. Allah telah menciptakan alam semesta untuk kepentingan dan kesejahteraan semua makhluk-Nya, khususnya manusia. Keserakahan dan perlakuan buruk sebagian manusia terhadap alam dapat menyengsarakan manusia itu sendiri. Tanah longsor, banjir, kekeringan, tata ruang daerah yang tidak karuan dan udara serta air yang tercemar adalah buah kelakuan manusia yang justru merugikan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Telah diketahui bahwa sekitar 70% wilayah Indonesia adalah perairan laut yang merupakan sumber daya yang sangat besar untuk dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia. Masuknya bahan pencemar akan mampu menurunkan potensi sumber daya hayati. Pencemaran oleh bahan-bahan industri yang mengandung bahan berbahaya, misalnya logam berat seperti merkuri (Hg), kadmium (Cd), plumbum (Pb) cenderung meningkatkan kasus keracunan dan gangguan kesehatan masyarakat.

Logam berat merupakan salah satu zat pencemar yang sangat mempengaruhi kualitas air untuk kehidupan organisme perairan. Keberadaan logam berat di perairan laut berasal dari berbagai sumber, antara lain adalah kegiatan pertambangan, rumah tangga, limbah pertanian dan limbah industri. Logam berat akan terakumulasi dalam sedimen dan biota yang akan menimbulkan bahaya karena sifat logam berat yang beracun (Rochyatun dan Rozak, 2006).

Logam-logam berat dalam perairan dapat bersumber dari sumber alamiah dan dari aktivitas manusia. Sumber alamiah masuk ke dalam perairan bisa dari pengikisan batuan mineral yang kemudian terbawa oleh air sungai menuju laut. Partikel logam yang ada di udara, karena adanya hujan dapat menjadi sumber logam dalam perairan. Logam yang berasal dari aktivitas manusia dapat berupa buangan industri ataupun buangan dari limbah rumah tangga dan juga disebabkan oleh lumpur saluran air kotor, limbah peleburan logam. Senyawa logam berat banyak digunakan untuk kegiatan industri sebagai bahan baku, katalisator, biosida maupun sebagai *additive*. Limbah yang mengandung logam berat ini akan terbawa oleh sungai dan karenanya limbah industri merupakan sumber pencemar logam berat yang potensial bagi pencemaran laut.

Hg adalah logam berat berbentuk cair, berwarna putih perak, serta mudah menguap. Keberadaan merkuri di alam dapat ditemukan dalam lingkungan tanah, udara, dan air. Dalam tanah diperkirakan sekitar 0,04 $\mu\text{g}/\text{mL}$, dalam udara sekitar beberapa nanogram per meter kubik, sedangkan dalam lingkungan perairan diperkirakan sekitar 0,06 ng/mL (Sawyer dkk., 1984).

Limbah yang mengandung senyawa Hg dalam perairan akan dirombak mikroorganisme menjadi senyawa Hg organik seperti metil Hg. Metil Hg yang berada di perairan masuk ke dalam tubuh fitoplankton dan termakan oleh ikan-ikan herbivora, dan dalam sistem rantai makanan sampai pada manusia sebagai konsumen tertinggi dalam piramid makanan. Proses tersebut jika berlangsung intensif akan terjadi bioakumulasi dalam tubuh ikan sehingga kesehatan dapat terganggu (Sulistyorini dan Hikmawati, 2006).

Salah satu penyebab pencemaran lingkungan oleh Hg adalah pembuangan tailing pengolahan emas yang diolah secara amalgamasi, dimana Hg mengalami perlakuan tertentu berupa perlakuan tertentu berupa putaran, tumbukan atau gesekan sehingga sebagian Hg akan membentuk amalgam dengan logam-logam (Au, Ag, Pt) dan sebagian hilang dalam proses.

Banyaknya toko emas yang berjejeran di seberang pulau yaitu berseblahan dengan dermaga kayu bangkoa, dimana dermaga ini menjadi penghubung transportasi dari kota Makassar menuju Pulau Lae-lae. Aktivitas dari toko-toko ini seperti membersihkan perhiasan emas yang mulai memudar dengan cara mencuci menggunakan air raksa. Daur ulang raksa atau merkuri ini dikeluarkan kembali dari produk-produk dan limbah dari proses industri. Limbah dari pertokoan ini nantinya akan terbawa arus air menuju laut.

Berbagai produk yang mengandung Hg, diantaranya adalah bola lampu, penambal gigi dan termometer. Hg digunakan dalam kegiatan penambangan emas, produksi gas klor dan soda kaustik, serta dalam industri pulp, kertas dan baterai. Hg

dengan klor, belerang atau oksigen akan membentuk garam yang digunakan dalam pembuatan krim pemutih dan krim antiseptik. Logam tersebut digunakan secara luas untuk mengekstrak emas (Au) dari bijihnya. Ketika Hg dicampur dengan bijih emas, Hg akan membentuk amalgama dengan emas (Au) dan perak (Ag). Amalgama tersebut harus dibakar untuk menguapkan merkuri guna menangkap dan memisahkan butir-butir emas dari butir-butir batuan (Widowati, 2008).

Seperti yang telah diketahui ikan merupakan salah satu produk perikanan yang cukup digemari masyarakat. Konsumsi ikan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan gizi dan membantu perkembangan. Namun di sisi lain, banyak penelitian yang menunjukkan adanya kandungan logam berat pada ikan yang telah melebihi baku mutu. Logam berat tidak dapat didegradasi secara biologis dan saat logam masuk ke dalam lingkungan, terjadi biokonsentrasi dalam jaringan ikan pada kasus lingkungan akuatik, melalui proses metabolisme dan biosorpsi.

Ikan sebagai salah satu biota air dapat dijadikan sebagai salah satu indikator tingkat pencemaran yang terjadi di dalam perairan. Jika di dalam tubuh ikan telah terkandung kadar logam berat yang tinggi dan melebihi batas normal yang telah ditentukan dapat sebagai indikator terjadinya suatu pencemaran dalam lingkungan. Kandungan logam berat dalam ikan erat kaitannya dengan pembuangan limbah industri di sekitar tempat hidup ikan tersebut, seperti sungai, danau, dan laut.

Rumput atau tumbuhan mikroskopik, diatom dan alga (*phytoplankton*) yang tumbuh di laut, danau dan aliran sungai memberikan suplai oksigen kepada ikan, dan ini bergantung dari penetrasi cahaya ke dalam air. *Phytoplankton* berperan penting

dalam permulaan rantai makanan yang mendorong laju produksi ikan pada umumnya. Mereka menggunakan sinar matahari dalam mengubah CO₂ menjadi bahan organik dan menjadi makanan bagi ikan. Selain dari itu, cahaya matahari juga berpengaruh terhadap pola reproduksi, pertumbuhan dan perilaku termasuk dalam kebiasaan makan.

Material yang tidak dikehendaki yang bersifat racun diproduksi secara alami dan polusi dari aktifitas manusia menjadi ancaman besar dan serius bagi keberadaan ikan-ikan dan tentunya juga bagi manusia yang mengkonsumsinya. Walaupun ikan dapat mendeteksi zat-zat kimia berbahaya, tetapi kebanyakan dari mereka tidak dapat menghindar dari kontaminasi. Seperti yang terjadi pada semua hewan, ikan juga mempunyai sejumlah penyakit yang bisa menyerangnya, baik yang diakibatkan oleh faktor eksternal seperti virus, jamur, cacing, dan lain-lain, maupun akibat sebagian kecil yang bersifat internal. Mereka juga masih mendapat ancaman dari fluktuasi bahan kimia air laut dan jeratan alat tangkap nelayan.

Apabila organisme laut yang sudah tercemar oleh logam berat seperti Hg dikonsumsi, akan berpotensi menimbulkan berbagai penyakit baik jangka pendek maupun jangka panjang, tergantung konsentrasi maupun kondisi penderita. Makanan yang aman merupakan faktor yang penting untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Menurut Undang-Undang RI No 7 tahun 1996, keamanan pangan didefinisikan sebagai kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia (Priyanto dkk., 2008).

Ketersediaan sumber makanan yang melimpah menyebabkan di sekitar aliran sungai dan pesisir pantai itu ramai didiami oleh berbagai jenis makhluk, termasuk manusia, yang mencari mata pencaharian dan kemudian membangun peradaban. Sejak dahulu kala manusia mengembangkan koloni dan aktivitasnya di daerah-daerah pantai, terutama karena kemudahan transportasinya dari satu wilayah ke wilayah lain. Banyak perkampungan yang kemudian menjadi kota metropolitan terletak tidak jauh dari pantai.

Pulau Lae-Lae merupakan salah satu pulau kecil dengan luas wilayah 0,22 km². Warga Pulau Lae-lae sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan. Pulau Lae-Lae merupakan pulau yang memiliki jarak yang paling dekat dari daratan utama Pulau Sulawesi sehingga diduga sudah banyak mendapat pengaruh dari aktivitas manusia berupa buangan air limbah pencemar, karena laut menjadi tempat terkumpulnya zat-zat pencemar yang dibawa aliran air. Diduga karena perairan Pulau Lae-lae berdekatan dengan kota Makassar yang menjadi pusat kegiatan dan aktifitas yang tinggi, yang tentunya juga akan menghasilkan bahan-bahan polutan gas dan partikel udara dan perairan.

Sarana pembuangan air limbah rumah tangga yang ada kondisinya tidak memadai, air limbah rumah tangga yang dihasilkan langsung dibuang begitu saja tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu. Kondisi ini jelas akan sangat berpengaruh terhadap kualitas sumber air baik perairan laut maupun air tanah dangkal (sumur), sebab air limbah rumah tangga merupakan air buangan yang dapat berasal dari buangan kamar mandi, aktivitas dapur, cuci pakaian dan lain-lain yang

mungkin mengandung mikroorganisme patogen dan berbagai senyawa kimia lainnya yang dapat membahayakan kesehatan manusia (Irhamiah dkk, 2014).

Pembuangan sampah ke dalam laut akan menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti menyebabkan terjadinya pencemaran air dan menurunnya kadar oksigen terlarut. Masyarakat Pulau Lae-Lae memiliki persoalan dalam hal pembuangan sampah, sebab belum tersedianya tempat penampungan sampah sementara sehingga responden membuang sampah tidak pada tempatnya.

Melihat dari uraian diatas, maka penelitian tentang “Bioakumulasi Logam Berat Merkuri (Hg) Pada Ikan Ekor Kuning (*Caesio cuning*) di Perairan Pulau Lae-lae Makassar”, penting untuk dilakukan.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana kadar logam berat merkuri (Hg) pada ikan ekor kuning (*Caesio cuning*) di perairan Pulau Lae-lae Makassar?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Logam berat merkuri (Hg) merupakan salah satu logam non esensial yang dapat menyebabkan keracunan akut dan kronis karena sifat dari logam berat yang dapat terakumulasi dalam tubuh.

2. Sampel ikan ekor kuning (*Caesio cuning*) diperoleh langsung dari tangkapan nelayan di Pulau Lae-lae pada Stasiun (I) sebelah utara dan Stasiun (II) sebelah timur.
3. Pengambilan sampel dengan metode *Purposive sampling*, jumlah sampel yang digunakan yaitu 10 ekor dari masing-masing stasiun dengan ukuran berkisar 15-20 cm.
4. Bagian sampel yang diperiksa adalah bagian insang dan daging.
5. Analisis kandungan logam berat merkuri (Hg) dilakukan dengan menggunakan Spektrofotometri Serapan Atom (SSA).

D. *Kajian Pustaka*

1. Supriyanto, dkk (2007) dalam penelitiannya yang berjudul “*Analisis Cemaran Logam Berat Pb, Cu dan Cd Pada Ikan Air Tawar dengan Metode Spektrofotometri Nyala Serapan Atom (SSA)*”. Diperoleh kadar Pb dan Cu dalam tiga jenis ikan (ikan mas, nila, dan lele) dari kolam air tawar yang berbeda (selokan Mataram, sungai Winongo, sungai Cebongan, sungai Bedog) tidak ada perbedaan yang signifikan. Sedangkan kadar Cd dalam cuplikan tiga jenis ikan berada di bawah batas deteksi. Alat uji SSA masih layak sebagai alat uji dengan perolehan akurasi 0,65 % dan presisi 0,019 ppm berada di bawah batas yang dipersyaratkan 1 % dan 0,04 ppm.
2. Nandang, dkk (2008) dengan judul penelitian “*Kandungan Logam Berat (Hg, Pb, Cd, dan Cu) Pada Ikan, Air, dan Sedimen di Waduk Cirata, Jawa Barat*”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kandungan Hg, Pb, Cd, dan Cu pada berbagai jenis ikan yang ditangkap dari waduk lebih tinggi dibandingkan dalam air, tetapi lebih rendah dibandingkan pada sedimen. Kandungan Hg, Pb, Cd, dan Cu pada ikan masih di bawah ambang batas yang diijinkan. Sementara itu kandungan Hg, Cd, dan Cu dalam air di beberapa stasiun sudah ada yang melebihi ambang batas. Kandungan Hg, Pb, Cd, dan Cu pada sedimen umumnya juga masih di bawah ambang batas yang ditetapkan, kecuali kandungan Hg yang diambil pada bulan Mei di beberapa stasiun melebihi ambang batas yang diijinkan. Hasil pengamatan kualitas air yaitu suhu, pH, kecerahan, DO, BOD, COD, nitrat, dan fosfat umumnya masih dalam kisaran yang dipersyaratkan untuk kegiatan budidaya perikanan sesuai PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, meskipun COD pada beberapa stasiun yang diamati melebihi ambang batas. Sementara itu, kandungan nitrit, amonia, dan sulfida umumnya sudah melebihi ambang batas yang ditetapkan.

3. Frangki Datuela (2015) dengan judul penelitian "*Analisis Kandungan Merkuri (Hg) Pada Jenis Ikan Demersal di Pasar Tradisional Bilato Kabupaten Gorontalo*". Penelitian ini bertujuan untuk mengamati kandungan merkuri (Hg) pada beberapa jenis ikan demersal di pasar tradisional Bilato, Kabupaten Gorontalo. Hasil penelitian tentang kandungan merkuri (Hg) pada beberapa jenis ikan demersal di pasar tradisional Bilato, Kabupaten Gorontalo menunjukkan bahwa kandungan merkuri pada ikan ekor kuning sebanyak 0,28 mg/kg, ikan

kakap merah 0,27 mg/kg, kerapu 0,25 mg/kg, dan pasir sebagai kontrol sebanyak 0,30 mg/kg. Kandungan merkuri (Hg) pada ketiga jenis ikan demersal yang dijual di pasar tradisional Bilato, Kabupaten Gorontalo masih di bawah ambang batas SNI NO 01-2729.1-2006 yaitu 0,5 mg/kg.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kadar logam berat merkuri (Hg) pada ikan ekor kuning (*Caesio cuning*) di perairan Pulau Lae-lae Makassar.

F. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat yaitu:

1. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat selaku konsumen mengenai kualitas ikan ekor kuning (*Caesio cuning*) mengenai kandungan logam berat Hg pada ikan tersebut yang diperoleh dari Pulau Lae-lae Makassar.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber referensi di bidang pengetahuan biologi. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai acuan dan literatur tambahan untuk penelitian selanjutnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Ayat yang Relevan

Laut sebagai lingkungan hidup berbagai jenis biota laut berpotensi untuk dijadikan sumber pangan yang berlebih. Hal ini tentu menawarkan kesempatan yang besar kepada manusia untuk dimanfaatkan. Sebenarnya biota laut sebagai sumber daya hayati sudah berabad-abad dimanfaatkan manusia melalui kegiatan perikanan yang makin hari makin berkembang, baik dilihat dari wilayahnya maupun intensitas penangkapannya.

Al-Qur'an memperkenalkan laut sebagai salah satu tanda kebesaran dan kemahakuasaan Allah swt. Laut sebagai prasarana transportasi yang memungkinkan mobilisasi manusia dari satu wilayah ke wilayah lainnya, aneka komoditas hasil laut yang berlimpah, manfaat air laut bagi kehidupan makhluk. Samudera nan luas menyimpan aneka biota laut yang melimpah dan terus menerus dieksplorasi dan dieksploitasi oleh manusia.

Seperti yang telah terjadi di sekitar kita akhir-akhir ini mengenai lingkungan, telah menjadi isu yang hangat diperbincangkan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat. Persoalan ini mengingatkan manusia agar sering menjaga lingkungannya supaya masalah-masalah global yang membahayakan lapisan bumi dan kehidupan makhluk hidup nantinya tidak terjadi.

Al-Qur'an telah menyatakan bahwa segala jenis kerusakan yang terjadi di permukaan bumi merupakan akibat dari ulah tangan manusia dalam berinteraksi terhadap lingkungan hidupnya. Seperti yang terlihat kerusakan telah terjadi di darat dan di laut karena perbuatan manusia itu sendiri, kerusakan-kerusakan tersebut merupakan teguran yang diberikan oleh Allah swt. kepada manusia agar mereka sadar segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah perlu dijaga kelestariannya.

Lingkungan yang merupakan alam tempat manusia berada di dalamnya harus dijaga kelestariannya. Lestari adalah ungkapan yang dimaknai pemeliharaan. Pemeliharaan lingkungan nyatanya bukan hanya kepentingan manusia itu sendiri yang juga menggantungkan kepada makhluk lain, tetapi juga memelihara seluruh makhluk Allah ini karena tidak ada kehidupan di dunia ini tanpa ketergantungan. Larangan akan membuat kerusakan di muka bumi difokuskan pada informasi yang diperoleh dari QS Al-Aaraf/7: 56.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ
 اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik (Kementerian Agama RI, 2012).

Pada ayat diatas menegaskan bahwa Allah swt. melarang siapapun untuk membuat kerusakan dibumi dalam segala bidang. Allah swt. menciptakan bumi dan seisinya ini dengan sebaik-baiknya. Semuanya itu dijadikan Allah swt untuk dimanfaatkan manusia, tetapi bukan untuik dirusak. Selanjutnya Allah swt. mengingatkan kepada manusia untuk senantiasa berdoa kepada-Nya dengan rasa takut jika doanya tidak terkabulkan. Dengan berdoa manusia tidak akan berputus asa, namun sebaliknya akan memperlebar keyakinan, kepasrahan dan keikhlasan. Ingatlah bahwa rahmat Allah swt. itu sangat dekat dengan orang yang berbuat kebajikan.

Alam yang diciptakan Allah swt. yang sungguh amat luas dengan berbagai macam jenisnya ini diamanahkan untuk diurus oleh manusia karena hanya manusi, diantara makhluk Allah ini, yang memiliki kemampuan menjaganya, dibebankan kepada manusia agar bertanggung jawab memeliharanya. Dalam perannya sebagai khalifah, manusia harus mengurus, memanfaatkan, dan memelihara, baik langsung maupun tidak langsung amanah tersebut meliputi bumi dan segala isinya, seperti gunung-gunung, laut, air, awan dan angin, tumbuh-tumbuhan, sungai, binatang-binatang, sehingga manusia dapat memiliki perilaku yang baik. Pola hisup bersih merupakan bagian penting dari manusia dalam memelihara lingkungan hidup, khususnya air dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerusakan dan ketidaknyamanan terhadap lingkungan.

Lingkungan jangan sampai rusak dan manusia harus bertanggung jawab atas kerusakan itu untuk selanjutnya memperbaikinya kembali. Maka kesadaran ekologis agar lingkungan ini lestari merupakan keniscayaan pula. Al-Qur'an dan hadis, sebagai sumber hukum dan nilai, tidak dapat disangsikan lagi. Tinggal sejauh mana ummat islam ini mampu menyusun pedoman perilakunya sendiri yang diambil dari kedua sumber ajaran islam tersebut.

Manusia sebagai khalifah memiliki tanggung jawab yang besar di dunia ini, yang tanggung jawab bukan hanya dalam kaitannya dengan perkara *ta'abbudi*, yaitu hubungan langsung dengan Allah, tetapi juga aspek *ta'ammuli*, yaitu hubungan manusia dengan manusia dan juga hubungannya dengan alam atau *bablun minal-alam*. Dalam melaksanakan tugas ini, manusia sudah dibekali dengan fisik dan akal yang sempurna bahkan agama yang akan menjadi petunjuk agar manusia tidak terjerumus oleh hawa nafsunya. Dalam memberikan petunjuk pada manusia akhir zaman ini, Allah mengutus Muhammad saw. dengan Al-Qur'an sebagai pedoman dan Sunah sebagai *bayan* (penjelasan) yang tercantum dalam Al-Qur'an tersebut (Tafsir Al-Qur'an Tematik, 2009).

Manusia adalah bagian dari lingkungannya karena ketergantungan manusia atas lingkungan amat besar sekali, seolah tidak bisa dipisahkan antara manusia dengan lingkungan tersebut. Dimana ada manusia, disitulah lingkungan yang mengitarinya, tanah yang diinjak, udara untuk bernafas, air yang diminum, tumbuhan dan pohon untuk makannya. Maka, sudah selayaknya manusia itu memelihara yang ada di sekitarnya untuk kelanjutan hidupnya dan hidup generasi sesudahnya.

B. Tinjauan Umum Logam Berat

Logam berasal dari kerak bumi yang berupa bahan-bahan murni, organik dan anorganik. Logam merupakan bahan pertama yang dikenal oleh manusia dan digunakan sebagai alat-alat yang berperan penting dalam sejarah peradaban manusia. Logam mula-mula diambil dari pertambangan di bawah tanah (kerak bumi), yang kemudian dicairkan dan dimurnikan dalam pabrik menjadi logam-logam murni (Rumahlatu, 2011).

Berdasarkan daya hantar panas dan listriknya, semua unsur-unsur kimia yang terdapat dalam Susunan Berkala Unsur-unsur dapat dibagi atas dua golongan yaitu golongan logam dan non-logam. Golongan logam mempunyai daya hantar panas dan listrik yang tinggi, sedangkan unsur-unsur non-logam mempunyai daya hantar panas dan listrik rendah. Berdasarkan densitasnya, unsur-unsur logam dapat pula dibagi atas dua golongan, yaitu golongan logam ringan dan logam berat. Unsur-unsur logam ringan (*light metals*) mempunyai densitas lebih kecil dari 5, sedangkan unsur-unsur logam berat (*heavy metals*) mempunyai densitas lebih besar (Hutagalung, 1984).

Menurut (Widowati, 2008), logam berat dibagi ke dalam dua jenis, yaitu:

1. Logam berat esensial: yakni logam dalam jumlah tertentu yang sangat dibutuhkan oleh organisme. Dalam jumlah yang berlebihan, logam tersebut bisa menimbulkan efek toksik. Seperti Zn, Cu, Fe, Co, Mn.
2. Logam berat tidak esensial: yakni logam yang keberadaannya dalam tubuh masih belum diketahui manfaatnya, bahkan bersifat toksik seperti Hg, Cd, Pb, Cr.


Seperti unsur-unsur kimia lainnya, unsur-unsur logam berat juga dibutuhkan oleh organisme hidup dalam berbagai proses metabolisme untuk pertumbuhan dan perkembangan sel-sel tubuhnya. Sebagai contoh, kobal (Co) dibutuhkan untuk pembentukan vitamin B₁₂, besi (Fe) dibutuhkan untuk pembuatan hemoglobin, sedangkan seng (Zn) berfungsi dalam enzim-enzim dengan hidrogenase. Tetapi unsur logam berat dalam jumlah yang berlebihan akan bersifat racun (Phillips, 1980 *dalam* Hutagalung, 1984).

Logam-logam berat yang masuk ke dalam hewan umumnya tidak dikeluarkan lagi dari tubuh mereka. Karena itu logam ini cenderung untuk menumpuk di dalam tubuh mereka. Sebagai akibat logam-logam ini akan terus ada di sepanjang rantai makanan. Suatu bukti yang nyata dapat dilihat dari jaringan tubuh kebanyakan dari sistem rantai makanan termasuk ikan yang akhirnya di makan oleh manusia. Dari sini dilihat bahwa kandungan konsentrasi logam berat terdapat lebih tinggi pada tubuh hewan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hewan pemangsa lain tingkat tinggi akan lebih banyak menumpukkan logam berat di dalam tubuhnya. Hewan yang umurnya lebih panjang dari mangsa-mangsanya akan mempunyai waktu lebih banyak dalam menumpuk logam berat di dalam tubuhnya (Nonci, 2008).

C. Tinjauan Umum Merkuri (Hg)

Logam merkuri atau air raksa mempunyai nama kimia *hydragyrum* yang berarti perak cair (Palar, 1994). Merkuri atau raksa merupakan logam dengan ikatan metalik terlemah di antara semua logam, dan satu-satunya logam berfase cair pada

temperatur kamar. Lemahnya ikatan metalik mengakibatkan tingginya tekanan uap pada temperatur kamar dan ini sangat berbahaya sebagai racun jika terhisap oleh makhluk hidup. Merkuri banyak digunakan dalam termometer, barometer, panel pengganti listrik, dan lampu pijar merkuri. Larutan logam dalam merkuri disebut amalgam (Sugiyarto, 2001).



Gambar 2.1. Merkuri (sumber: <http://profetik.farmasi.ugm.ac.id/archives/69>)

Menurut (Rianto, 2010), secara umum logam merkuri memiliki sifat - sifat sebagai berikut:

- a. Berwujud cair pada suhu kamar ($25\text{ }^{\circ}\text{C}$) dengan titik beku paling rendah sekitar $-39\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- b. Masih berwujud cair pada suhu $396\text{ }^{\circ}\text{C}$, pada temperatur $396\text{ }^{\circ}\text{C}$ ini telah terjadi pemuaiian secara menyeluruh.
- c. Merupakan logam yang paling mudah menguap jika dibandingkan dengan logam-logam yang lain.

- d. Tahanan listrik yang dimiliki sangat rendah, sehingga menempatkan merkuri sebagai logam yang sangat baik untuk menghantarkan daya listrik.
- e. Dapat melarutkan bermacam-macam logam untuk membentuk *alloy* yang disebut juga *amalgam*.
- f. Merupakan unsur yang sangat beracun bagi semua makhluk hidup, baik itu dalam bentuk unsur tunggal (logam) ataupun dalam bentuk persenyawaan.

Adapun sifat logam Hg seperti mempunyai kelarutan yang rendah di lingkungan air, mempunyai sifat kimia yang stabil terutama di lingkungan sedimen, dan mempunyai sifat yang mengikat protein, sehingga mudah terjadi biokonsentrasi pada tubuh organisme air melalui rantai makanan (Gocfeld, 2003).

Merkuri di alam dibagi dalam tiga bentuk yaitu logam merkuri, merkuri organik, dan merkuri anorganik. Unsur Hg dapat mengambang di udara selama bertahun-tahun. Unsur ini juga dapat menguap dari endapan-endapan telaga dan laut yang tercemar yang kemudian jatuh kembali ke bumi dalam bentuk hujan beracun. Di alam, Hg dapat membentuk berbagai jenis senyawa, dan setiap senyawa Hg adalah beracun, namun yang paling berbahaya adalah jika senyawa itu berubah menjadi Hg metil di lingkungan. Di alam Hg anorganik dapat berubah menjadi Hg organik atau sebaliknya karena adanya interaksi dengan mikroba. Genus *Pseudomonas* dan *Neurospora* dapat mengubah Hg anorganik menjadi Hg organik. *Staphylococcus aureus* dapat mereduksi ion Hg^{2+} menjadi Hg elemental (Akhadi, 2014).

Pemanfaatan logam Hg pada saat ini sudah hampir mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dan lingkungan. Selama kurun waktu beberapa tahun, merkuri telah banyak digunakan dalam bidang kedokteran, pertanian dan industri. Bidang kedokteran telah menggunakan merkuri sejak abad ke-15 dimana Hg digunakan untuk pengobatan penyakit kelamin (sifilis). Kalomel (HgCl) digunakan sebagai pembersih luka sampai diketahui bahwa bahan tersebut beracun sehingga tidak digunakan lagi. Komponen Hg organik digunakan untuk obat diuretika sampai bertahun-tahun dan juga digunakan sebagai bahan untuk kosmetik

Dalam bidang pertanian, Hg digunakan untuk membunuh jamur sehingga baik digunakan untuk pengawet produk hasil pertanian. Hg organik juga digunakan untuk pembasmi hama pada tanaman seperti buah apel, tomat, kentang dan juga digunakan sebagai pembasmi hama padi. Di bidang industri, terbanyak adalah pabrik alat-alat listrik yang menggunakan lampu-lampu merkuri untuk penerangan jalan raya. Hg juga digunakan pada pembuatan baterai, karena baterai dengan bahan yang mengandung merkuri dapat tahan lama dan tahan terhadap kelembapan yang tinggi (Alfian, 2001).

Hg digunakan dalam industri pembuatan klor alkali yang menghasilkan klorin (Cl_2), dimana perusahaan air minum memanfaatkan klorin untuk penjernihan air dan pembasmi kuman (proses klorinasi). Juga dalam pembuatan kaustik soda yang di produksi dengan jalan elektrolisis dari larutan garam NaCl , menggunakan merkuri dalam bentuk amalgam dicampur dengan logam natrium dan digunakan sebagai katoda yang banyak digunakan dalam pembuatan baterai basah maupun kering.

Penggunaan Hg disini pada dasarnya berbentuk larutan konduksi dan kemampuannya mengikat logam natrium sebagai amalgam dan membebaskan klor. Hg juga digunakan dalam campuran cat yang digunakan untuk mengecat pada daerah yang mempunyai kelembapan tinggi sehingga dapat mencegah tumbuhnya jamur. Industri lain yang menggunakan Hg sebagai bahan katalis terutama pada industri vinil-klorida yang mensintetis plastik (proses pembuatan plastik) (Alfian, 2006).

Tabel 2.1 Kegunaan Hg dalam pabrik (Lestari, 2002).

Penggunaan	Bentuk
Alat listrik	Logam
Klor alkali	Logam
Cat	Organik
Instrumen	Logam
Peralatan kedokteran gigi	Logam, organik
Pertanian	Logam, organik, anorganik
Penggunaan di laboratorium	Logam
Katalis	Organik, anorganik
Farmasi	Logam, Organik, anorganik

Sumber pencemaran Hg ternyata bukan saja datang dari pabrik atau industri petrokimia atau pabrik dan industri lainnya pengolah senyawa kimia. Bahkan dari kegiatan sehari-hari, baik secara terbatas di lingkungan keluarga ataupun dari lingkungan/pendidikan, ternyata sumber Hg cukup meyakinkan jumlahnya. Misalnya, dari jenis-jenis kosmetika pembersih kulit muka. Di dalam pembersih itu

terkandung Hg, yang kadang-kadang jumlahnya melebihi batas. Ini dapat diketahui dari jenis pembersih kulit muka yang dikeluarkan oleh pabrik kecil yang kadang-kadang tidak terkontrol.

Beberapa jenis batu baterai pun mengandung Hg di dalamnya. Sehingga jelas kalau bekas batu baterai tersebut di buang sembarangan, akhirnya akan menambah Hg di dalam buangan bertambah. Kehadiran buangan yang terbawa oleh air yang mengandung senyawa-senyawa berbahaya, langsung ataupun tidak langsung akan mempunyai arti yang membahayakan untuk suatu tempat (Suriawiria, 2005).

Kasus pencemaran logam berat Hg sebagai dampak dari kegiatan manusia salah satunya adalah pencemaran merkuri di perairan teluk Minamata Jepang tahun 1968 yang tidak terdeteksi, dimana secara lambat laun Hg terakumulasi dalam tubuh masyarakat yang mengkonsumsi ikan hasil tangkapan nelayan Minamata dan telah menelan korban 10.353 jiwa terdiri dari korban meninggal dan cacat fisik. Pada konsentrasi yang sangat rendah efek logam berat dapat berpengaruh langsung dan terakumulasi pada rantai makanan sehingga dikhawatirkan berdampak pada kesehatan manusia. Seperti halnya sumber-sumber pencemaran lingkungan lainnya, logam berat tersebut dapat ditransfer dalam jangkauan yang sangat jauh di lingkungan, selanjutnya berpotensi mengganggu kehidupan biota lingkungan dan akhirnya berpengaruh terhadap kesehatan manusia walaupun dalam jangka waktu yang lama dan jauh dari sumber pencemar utamanya (Palar, 2008).

Tragedi yang dikenal dengan “Minamata Disease” (penyakit Minamata), berdasarkan penelitian ditemukan penduduk disekitar kawasan tersebut memakan ikan yang berasal dari laut sekitar Teluk Minamata yang mengandung Hg yang bersal dari buangan sisa industri plastik. Gejala keanehan mental dan cacat saraf mulai tampak terutama pada anak-anak. Namun baru sekitar 25 tahun kemudian sejak gejala penyakit tersebut tampak (ditemukan), pemerintah Jepang menghentikan pembuangan Hg. Untuk menghilangkan sisa-sisa bahan pencemar dan melakukan rehabilitasi penduduk yang terkena dampak menahun (kronis), negara ini telah membayar sangat mahal jauh melebihi keuntungan yang diperoleh dari hasil pengoperasian perusahaan Chisso corporation (Parvaneh, 1979 *dalam* Alfian, 2001)

D. Bioakumulasi Logam Berat di Perairan

Bioakumulasi merupakan pengambilan atau akumulasi suatu bahan kimia di dalam tubuh mahluk hidup. Pencemaran logam berat di perairan dapat menyebabkan biota yang hidup di dalamnya menjadi tercemar pula. Hal ini dapat terjadi karena biota dapat mengakumulasikan residu logam berat melalui rantai makanannya yang akan menyebabkan keracunan dan akhirnya membahayakan kesehatan manusia bila mengkonsumsinya. Akumulasi terjadi karena adanya proses absorpsi logam berat yang masuk ke dalam tubuh melalui saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Proses ini semakin lama menyebabkan peningkatan logam berat dalam jaringan tubuh organisme perairan dan dapat menyebabkan kematian organisme tersebut (Darmono, 1995 *dalam* Triana, 2012).

Bila bahan cemaran (polutan) masuk ke dalam lingkungan laut, maka bahan cemaran ini akan mengalami tiga macam proses akumulasi, yaitu proses fisik, kimia dan biologis. Akumulasi melalui proses biologik inilah yang disebut bio-akumulasi. Kadar logam berat yang terdapat dalam tubuh organisme laut lebih tinggi jika dibandingkan dengan kadar logam berat yang terdapat dalam lingkungan hidupnya. Akumulasi terjadi karena logam berat yang masuk ke tubuh organisme cenderung berbentuk senyawa kompleks dengan zat-zat organik yang terdapat dalam tubuh organisme. Dengan demikian logam berat terfiksasi dan tidak diekskresi oleh organisme yang bersangkutan (Hutagalung, 1984).

Sebagai salah satu zat pencemar, Hg bersifat neurotoksin dan masuk ke ekosistem akuatik melalui deposisi atmosferik maupun bersumber dari eksternalisasi limbah industri (Gocfeld, M. 2003). Hg dari limbah tersebut akan mengendap pada dasar aliran dan bersama lumpur terbawa ke muara sampai ke laut. Di dalam lumpur Hg akan mengalami perombakan oleh molekul menjadi bentuk senyawa metil Hg yang terlarut dalam air. Senyawa ini akan dilepas dari dasar berlumpur tersebut ke dalam air dan selanjutnya akan dikonsumsi dan akan diakumulasi di dalam tubuh organisme yang hidup dalam perairan tersebut (Hutagalung, 1980 *dalam* Lestari, 2002).

Logam-logam berat sebagian besar masuk melalui rantai makanan. Fitoplankton merupakan bagian awal rantai makanan bagi organisme perairan yang lebih tinggi serta mampu mengabsorpsi logam berat sampai konsentrasi tertentu tanpa

menyebabkan keracunan pada organisme tersebut. Oleh karena itu, zat tersebut juga akan terakumulasi pada organisme perairan yang lebih tinggi




Diagram 2.1. Skema rantai perjalanan merkuri dari industri sampai ke manusia (Dauglass,1972 dalam Lestari, 2002).

E. Bioakumulasi Logam pada Ikan

Pada lingkungan akuatik, Hg berbentuk anorganik maupun organik. Hg anorganik dapat dimetilasi oleh bakteri membentuk senyawa organo Hg yang mempunyai toksisitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan Hg anorganik. Senyawa Hg mempunyai afinitas lipid sehingga lebih mudah terakumulasi di dalam tubuh organisme dibandingkan senyawa logam berat lainnya (Ravichandran, 2004)

Unsur-unsur logam berat dapat masuk ke dalam tubuh organisme laut dengan tiga cara yaitu melalui rantai makanan, insang dan difusi melalui permukaan kulit. Sebagian besar logam berat masuk ke dalam tubuh hewan laut melalui rantai makanan, hanya sedikit yang diambil langsung dari air. Fitoplankton yang merupakan awal dari rantai makanan mengambil logam berat dari air melalui proses absorpsi. Fitoplankton akan dimangsa oleh zooplankton, zoo-plankton dimangsa oleh ikan-ikan kecil, ikan kecil dimangsa oleh ikan yang lebih besar, demikian seterusnya. Oleh karena proses mangsa-memangsa ini diikuti oleh proses akumulasi, maka pemangsa yang berukuran besar seperti ikan cucut pedang dan tuna akan mengandung kadar logam berat yang tinggi. Akumulasi terjadi karena logam berat yang masuk ke tubuh organisme cenderung membentuk senyawa kompleks dengan zat-zat organik yang terdapat dalam tubuh organisme. Dengan demikian logam berat terfiksasi dan tidak diekskresi oleh organisme yang bersangkutan (Waldichuk, 1974 *dalam* Hutagalung, 1984).

Faktor konsentrasi (kemampuan organisme untuk mengakumulasi logam berat) didefinisikan sebagai perbandingan antara kadar logam berat dalam organisme dan dalam airnya. Faktor konsentrasi ini tergantung pada jenis logam berat, jenis organisme, lama pemaparan serta kondisi lingkungan perairan seperti pH, temperatur dan salinitas. Hasil penelitian (Waldichuk, 1974) menunjukkan bahwa kenaikan suhu, penurunan pH dan salinitas perairan menyebabkan tingkat bioakumulasi semakin besar (Hutagalung, 1984).

F. *Batas Minimum Merkuri (Hg)*

World Health Organization (WHO) menghitung apabila ikan terus menerus dikonsumsi sebanyak 60 g/orang/hari, maka kadar Hg maksimum yang diizinkan adalah 0,5 mg/kg ikan basah (Widowati, 2008).

Tabel 2.2 Batas maksimum cemaran Hg dalam pangan (SNI, 2009)

No. Kategori Pangan	Kategori pangan	Batas maksimum
01.1	Produk-produk susu dan analognya, kecuali yang termasuk kategori 02.0	
	Susu dan hasil olahannya	0,03 mg/kg (dihitung terhadap produk siap konsumsi)
02.0	Lemak, minyak dan emulsi	
	Margarin	0,03 mg/kg
	Mentega	0,03 mg/kg
	Minyak nabati yang dimurnikan	0,05 mg/kg
04.0	Buah dan sayur (termasuk jamur, umbi, kacang termasuk kacang kedelai dan lidah buaya), rumput laut, biji-bijian	
	Tomat dan hasil olahannya	0,03 mg/kg
05.0	Kembang gula/permen dan cokelat	

	Coklat bubuk	0,03 mg/kg
06.0	Sereal dan produk sereal yang merupakan produk turunan dari biji sereal, akar dan umbi, kacang dan empelur (bagian dalam batang tanaman), tidak termasuk produk bakteri dari kategori 07.0 dan tidak termasuk kacang dari kategori 04.2.1 dan 04.2.2	
	Tepung dan hasil olahannya	0,05 mg/kg
07.0	Produk bakteri	
	Produk bakteri	0,05 mg/kg
08.0	Daging dan produk daging, termasuk daging unggas dan daging hewan buruan	
	Daging dan hasil olahannya	0,03 mg/kg
09.0	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustase dan ekinodermata serta amfibi dan reptil	
	Ikan dan hasil olahannya	0,5 mg/kg
	Ikan predator seperti cucut, tuna, marlin	1,0 mg/kg
	Kerang-kerangan (bivalve) moluska dan teripang	1,0 mg/kg
	Udang dan krustasea lainnya	1,0 mg/kg
12.0	Garam, rempah, sup, saus, salad, produk protein	
	Garam	0,1 mg/kg
	Kecap	0,05 mg/kg
13.0	Produk pangan untuk keperluan gizi khusus	
	Susu formula bayi	0,03 mg/kg (dihitung terhadap produk siap konsumsi)
	Susu formula lanjutan	0,03 mg/kg (dihitung terhadap produk siap konsumsi)
	Makanan pendamping ASI (MP-ASI) siap santap	0,03 mg/kg
	Makanan pendamping ASI (MP-ASI) biskuit	0,03 mg/kg
	Makanan pendamping ASI (MP-ASI) siap masak	0,114 mg/kg
	Makanan pendamping ASI (MP-ASI) bubuk instan	0,114 mg/kg
14.0	Minuman, tidak termasuk produk susu	
	Air mineral alami	0,001 mg/kg

	Air minum dalam kemasan	0,001 mg/kg
	Sari buah	0,03 mg/kg
	Sari buah konsentrat	0,03 mg/kg (dihitung terhadap produk siap konsumsi)
	Kopi bubuk	0,03 mg/kg
	Teh	0,03 mg/kg
	Minuman keras	0,03 mg/kg

Menurut Ditjen POM (1983), batas maksimal Hg yang diperbolehkan adalah 0,5 mg/kg. Untuk mencegah atau melindungi konsumen dari keracunan Hg akibat memakan ikan segar yang telah tercemar, maka (Sanusi dkk, 1984 dalam Lestari, 2002) mengutip ketentuan yang ditetapkan dalam ADI (*Acceptable Daily Intake*) sebagai berikut:

1. Jika makanan manusia mengandung 0,3 mg Hg/hari, maka darah manusia menunjukkan 0,2 ppb, hal ini menunjukkan tubuh telah keracunan Hg
2. ADI untuk Hg 0,03 mg/hari sebagai senyawa metil-Hg yang merupakan faktor keselamatan.

G. Toksisitas Merkuri (Hg)

Toksisitas adalah kemampuan suatu molekul atau senyawa kimia dalam menimbulkan kerusakan pada bagian yang peka di dalam maupun di bagian luar tubuh makhluk hidup (Durham, 1975 dalam Datuela, 2015). Hg dapat terakumulasi dalam hati dan ginjal dan dapat menyebabkan kerusakan serta cacat pada organ tersebut. Logam merkuri juga dapat mempengaruhi sistem syaraf dan menyebabkan

kerusakan pada otak sehingga menyebabkan tidak terkoordinasinya kerja otak dan pandangan. Keracunan akibat merkuri dapat berakibat akut dan kronis (Lestari, 2002).

Hg mempunyai beberapa tingkat bahaya bergantung pada bentuk ikatan unsur dan senyawanya, serta perlakuan manusia terhadap logam beracun itu. Unsur Hg akan terakumulasi terutama dalam ikan dan kerang. Jika masuk ke dalam tubuh manusia baik secara langsung maupun melalui rantai makanan, unsur Hg akan tinggal di dalam tubuh relatif lama. Unsur ini akan mengumpul dalam hati, ginjal, otak dan darah (Akhadi, 2014).

Ion Hg menyebabkan pengaruh toksik, karena terjadinya proses presipitasi protein menghambat aktivitas enzim dan bertindak sebagai bahan yang korosif. Hg juga terikat oleh gugus sulfhidril, fosforil, karboksil, amida dan amina, dimana di dalam gugus tersebut merkuri dapat menghambat fungsi enzim. Efek toksisitas merkuri pada manusia bergantung pada bentuk komposisi merkuri, jalan masuknya ke dalam tubuh, dan lamanya berkembang. Contohnya adalah bentuk HgCl_2 lebih toksik daripada bentuk HgCl . Hal ini disebabkan karena bentuk divalen lebih mudah larut daripada bentuk monovalen. Di samping itu, bentuk HgCl_2 juga cepat dan mudah diabsorpsi sehingga daya toksisitasnya lebih tinggi (Darmono, 2001).

Hg mampu menghambat kerja enzim dan menyebabkan kerusakan sel yang disebabkan kemampuan Hg untuk terikat dengan grup yang mengandung sulfur di dalam molekul yang terdapat di dalam enzim dan dinding sel, keadaan ini mengakibatkan penghambatan aktivitas enzim dan reaksi kimia yang dikatalis oleh

enzim tersebut dalam tubuh. Sifat-sifat membran dari dinding sel akan rusak karena pengikatan dengan Hg sehingga aktivitas sel yang normal akan terganggu (Hartanti, 1998).

Hg merupakan racun sistemik yang dapat terakumulasi dalam hati, ginjal, limpa dan tulang. Oleh tubuh, Hg akan diekskresikan melalui urine, faeces, keringat, saliva dan air usus. Logam Hg dapat bersifat toksik karena dapat berikatan secara kimiawi dengan struktur biologis tubuh manusia. Keracunan Hg akan menimbulkan gejala susunan saraf pusat (SSP) seperti kelainan kepribadian dan tremor, pikun, insomnia, kehilangan kepercayaan diri, iritasi, depresi dan rasa ketakutan. Sebagai senyawa organik, Hg cenderung merusak SSP (lapangan penglihatan menciut dan perubahan kepribadian). Keracunan Hg juga menimbulkan gejala gastero-intestinal (GI) seperti stomatitis, hipersalivasi, colitis, sakit saat mengunyah, gingivitis, garis hitam pada gusi (*leadline*) dan gigi yang mudah tanggal. Terhadap kulit, Hg dapat menyebabkan dermatitis dan ulcer. Sebagai senyawa anorganik, Hg biasanya merusak ginjal dan menyebabkan cacat bawaan. Kematian akibat keracunan Hg terjadi karena infeksi sekunder maupun karena kelemahan yang semakin parah.


H. Tinjauan Umum Ikan Ekor Kuning

Oleh para ikhtiologi ikan didefinisikan secara umum yaitu binatang vertebrata yang berdarah dingin (*poikilotherm*), hidup dalam lingkungan air, umumnya bernapas dengan insang, pergerakan dengan keseimbangan badannya terutama menggunakan sirip (Raven, 2005).

1. *Klasifikasi dan Deskripsi*

Menurut (Nelson, 2006), klasifikasi ikan ekor kuning adalah sebagai berikut :


Dunia	: Animalia
Filum	: Chordata
Kelas	: Actinopterygii
Ordo	: Perciformes
Famili	: Caesionidae
Genus	: <i>Caesio</i>
Spesie	: <i>Caesio cuning</i>
Nama lokal	: Rappo-rappo



Gambar 2.2 Ikan ekor kuning (sumber: Dokumentasi pribadi, 2017).

Menurut (Kottelat, dkk, 1993), ikan ekor kuning disebut juga *redbelly yellowtail fusilier*. Ciri-ciri ikan ekor kuning yaitu bentuk badan memanjang, melebar, pipih, mulut kecil, memiliki gigi-gigi kecil, dan lancip. Dua gigi taring

terdapat pada rahang bawah. Jari-jari keras sirip punggung sebanyak 10 buah dan jari-jari yang lemah sebanyak 15 buah. Tiga jari-jari keras pada sirip dubur dan jari-jari yang lemah sebanyak 11 buah. Ikan ini memiliki sisik tipis sebanyak 52-58 buah pada garis rusuknya. Sisik-sisik kasar di bagian atas dan di bawah garis rusuk tersusun secara horizontal, sisik pada kepala terletak dari mata.



Gambar 2.3. Anatomi ikan (Sumber: Raven, 2005)


Tubuh ikan ekor kuning bagian atas sampai punggung berwarna ungu kebiruan. Bagian belakang punggung, batang ekor, sebagian dari sirip punggung berjari-jari lemah, dan sirip dubur berwarna biru keputihan. Ekor berwarna kuning, bagian bawah kepala, badan, sirip perut, dan dada berwarna merah jambu. Pinggiran sirip punggung sedikit hitam dan ketiak sirip dada berwarna hitam (Kottelat *et al.* 1993).

Beberapa pengaruh toksisitas logam pada ikan yang telah terpapar logam berat yaitu pada insang, alat pencernaan, hati dan ginjal. Insang merupakan organ yang dimiliki ikan sebagai alat utama pernafasan. Insang selain sebagai alat pernafasan ikan, juga digunakan sebagai pengatur tekanan antara air dan dalam tubuh ikan (osmoregulasi). Oleh sebab itu insang merupakan organ yang penting pada ikan. Sebagian besar kematian ikan yang disebabkan oleh bahan pencemar terjadi karena kerusakan pada bagian insang dan organ-organ yang berhubungan dengan insang. Karena letaknya di luar dan berhubungan langsung dengan air sebagai media hidupnya, maka organ inilah yang pertama kali mendapat pengaruh apabila lingkungan air tercemar oleh bahan pencemar (Anand, 1978).


Senyawa kimia tersebut akan masuk melalui insang yang langsung bersentuhan dengan lingkungan air. Setelah melewati insang, bahan-bahan kimia termasuk merkuri akan ikut ke dalam sistem pernafasan sampai akhirnya akan menembus sel epitel endothelial kapiler darah untuk masuk ke dalam darah. Selanjutnya akan terikut ke dalam aliran darah dan akhirnya ikut dalam proses metabolisme (Benhard, 1978).

Darah ikan terdiri atas sel darah merah, sel darah putih, dan plasma darah. Sistem peredaran darah ikan melibatkan jantung dan pembuluh darah. Jantung ikan terdiri atas *sinus venosus*, *atrium* dan *ventrikel*. Jantung ikan berada dalam suatu rongga yang dinamakan perikardium. Jantung ikan terdiri atas dua ruang, yakni satu *ventrikel* dan satu *atrium*. Sistem peredaran darah pada ikan termasuk sistem

peredaran darah tunggal karena darah hanya melewati jantung satu kali (Afrianto, 2015).



Gambar 2.4 Letak *Aorta dorsalis*, *sinus venosus*, jantung, dan insang (Sumber: Afrianto, dkk., 2015).



Gambar 2.5 Sistem sirkulasi dari ikan (Sumber: Kimball, dkk., 1983).

Pada gambar 2.5 tampak aliran darah yang hanya satu kali melewati jantung. Darah kotor dari sistem kapiler mengalir masuk ke *atrium* dan selanjutnya mengalir ke *ventrikel*. Darah dari *ventrikel* dipompakan keluar dari jantung menuju insang melalui *aorta ventralis* yang kemudian bercabang-cabang membentuk *arteri*. Selanjutnya darah masuk ke dalam insang melalui *arteri eferen brankialis*. Darah tersebut banyak mengandung CO₂. Di dalam insang, CO₂ dibebaskan ke dalam air dan O₂ berdifusi dari air ke dalam insang sehingga darah yang meninggalkan insang merupakan darah bersih yang banyak mengandung O₂. Melalui *aorta dorsalis*, darah diedarkan ke seluruh tubuh. Darah dari tubuh bagian depan kembali ke jantung melalui *vena kardinalis anterior* dan *vena kardinalis posterior* (Sumber: Kimball, dkk., 1983).

Pada umumnya, saluran pencernaan ikan berturut-turut terdiri dari segmen mulut, rongga mulut, faring, esofagus, lambung, pilorus, usus, rektum dan anus. Sedangkan kelenjar pencernaan terdiri dari lambung, hati dan pankreas mensekresi enzim pencernaan. Makanan yang dimakan oleh ikan akan masuk ke dalam lambung. Sambil dicernakan, makanan tersebut secara perlahan-lahan akan bergerak ke segmen bagian belakang. Di usus mulai terjadi penyerapan zat-zat makanan yang tidak dapat dicerna, selanjutnya akan dikeluarkan melalui usus (Fujaya. 2004).

Pada organ hati memiliki beberapa fungsi, antara lain detoksifikasi yaitu hati bertanggung jawab atas biotransformasi zat-zat berbahaya menjadi zat-zat yang tidak berbahaya yang kemudian diekskresi oleh ginjal. Suatu toksikan dalam hati akan diinaktifkan oleh enzim-enzim di dalam hati, tapi apabila toksikan di berikan secara

terus-menerus, kemungkinan toksikan di dalam hati akan menjadi jenuh (enzim tidak mampu mendetoksifikasi toksikan lagi), sehingga terjadi penurunan aktifitas metabolisme dalam hati. Hal ini akan menyebabkan proses detoksifikasi tidak efektif lagi, maka senyawa metabolit akan dapat bereaksi dengan unsur sel dan hal tersebut dapat menyebabkan kematian sel. Fungsi yang lain adalah pembentukan dan eksresi empedu, metabolisme garam empedu, metabolisme karbohidrat (Glikogenesis, glikogenolisis, glukoneogenesis), sintesis protein, metabolisme dan penyimpanan lemak (Anderson, 1995 *dalam* Datuela 2015).

2. *Habitat dan kebiasaan hidup*

Ikan ekor kuning termasuk *plankton feeder*, yaitu pemakan plankton. Hidup di perairan pantai, karang-karang, perairan karang, dan membentuk gerombolan besar. Panjang tubuhnya dapat mencapai panjang 35 cm tetapi pada umumnya hanya dapat mencapai 25 cm. Famili Caesionidae memiliki ciri khas yaitu hidup bergerombol (*schooling*) dalam ukuran yang besar dan ditemui di dekat tubir, berenang dengan cepat (*fast swimming*), dan memakan zooplankton. Ikan ekor kuning merupakan jenis ikan yang tidak melakukan migrasi ke tempat lain karena banyak terdapat pada kawasan perairan yang memiliki substrat pasir dan karang, terutama kawasan terumbu karang. Banyak terdapat di kolom perairan sepanjang tepi lereng terumbu karang. Ikan ekor kuning dapat hidup di perairan pada kedalaman 0-40 m (Fujaya, 2004).

Menurut Allen & Steene (1990), berdasarkan periode aktif mencari makan ikan terbagi menjadi dua kategori, yaitu ikan diurnal dan ikan nokturnal. Ikan-ikan diurnal yaitu kelompok ikan yang aktif berinteraksi dan mencari makan pada siang hari. Pada malam hari ikan-ikan diurnal akan masuk dan berlindung di dalam terumbu dan digantikan oleh ikan-ikan nokturnal (ikan malam). Ikan diurnal karena aktif pada siang hari dan istirahat di karang pada malam hari. Ikan nokturnal meliputi Holocentridae, Apogonidae, Haemulidae, Muraenidae, Scorpaenidae, Serranidae, dan Labridae.

I. Tinjauan Umum Pulau Lae-lae


Pulau Lae-lae termasuk dalam gugusan spermonde archipelago Sulawesi Selatan. Pulau ini berjarak 1,25 km dari dermaga Kayu Bangkoa Makassar dan dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 15 menit dari dermaga tersebut (Radja, 2013). Pulau Lae-lae adalah pulau dengan kepadatan tinggi dimana 0,22 km² luas wilayahnya dihuni oleh 1639 jiwa dengan 346 rumah tangga pada tahun 2013 (Irhamiah, 2014).

Secara administratif termasuk ke dalam wilayah Kota Makassar, Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Lae-lae, dengan luas daratan pulau 8,9 Hektar. Secara Geografis pulau ini terletak pada posisi 119° 23'33,1" BT dan 05° 08' 16,0" LS atau di perairan Selat Makassar. Batas-batas administrasi meliputi sebelah barat berbatasan dengan Pulau Samalona, sebelah timur dengan Kota Makassar, Sebelah

Selatan dengan Tanjung Bunga, dan Sebelah Utara dengan Lae-lae kecil (Amri, 2013).




Gambar 2.6 Lokasi pulau Lae-lae (Sumber: Radja, 2013).



Gambar 2.7 Lokasi Pulau Lae-lae (Sumber: Google earth, 2017).

J. Kerangka Pikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif, bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis suatu fenomena, yaitu mendeskripsikan kandungan logam berat Hg pada ikan ekor kuning (*Caesio cuning*) di Pulau Lae-lae Makassar. Pengambilan sampel dilakukan pada dua titik stasiun yaitu pada Stasiun (I) terletak di bagian sebelah utara Pulau Lae-lae dimana berbatasan dengan Pulau Lae-lae kecil dan Stasiun (II) sebelah timur berbatasan dengan kota Makassar dan berbatasan langsung dengan Pantai Losari

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif, tujuan utama dari penelitian ini yaitu untuk menggambarkan kadar logam berat Hg yang terkandung pada ikan ekor kuning (*Caesio cuning*) yaitu pada bagian insang dan daging.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi dalam penelitian ini yaitu semua spesies ikan ekor kuning (*Caesio cuning*) di perairan Pulau Lae-lae Makassar.

2. Sampel pada penelitian ini yaitu 10 spesies ikan ekor kuning (*Caesio cuning*) dengan ukuran sampel berkisar 15-20 cm yang diambil dengan teknik *Purposive sampling* pada masing-masing stasiun yaitu di Stasiun (I) sebelah utara dan Stasiun (II) sebelah timur perairan Pulau Lae-lae Makassar.

D. Variabel Penelitian

Adapun variabel dalam penelitian ini yaitu kandungan logam berat merkuri (Hg) pada ikan ekor kuning (*Caesio cuning*) pada bagian insang dan daging.

E. Defenisi Operasional Variabel

Kandungan logam berat merkuri (Hg) pada ikan ekor kuning (*Caesio cuning*) adalah banyaknya kadar logam berat Hg yang terkandung pada bagian insang dan daging ikan ekor kuning (*Caesio cuning*) yang dinyatakan dalam mg/kg, diharapkan tidak melampaui 0,5 mg/kg dari batas (SNI, 2009) yang telah ditetapkan.

F. Instrumen Penelitian (Alat dan Bahan)

1. Alat

Alat yang digunakan untuk analisis logam berat Hg yaitu seperangkat alat spektrofometer serapan atom (SSA), lemari asam, neraca analitik, kamera, alat tulis-menulis, *electric stove*, *cool box*, gelas kimia 250 ml, gelas erlenmeyer 250 ml, labu alas bulat 50 ml dan 250 ml, bulp, pipet tetes, batu didih, corong, pingset, pisau, gunting, ember, kertas saring, dan label.

2. Bahan

Bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah ikan ekor kuning (*Caesio cuning*) yaitu pada bagian insang dan daging. Bahan kimia yang dibutuhkan untuk analisis logam berat Hg dengan cara SSA yaitu asam nitrat (HNO_3), asam perklorat (H_2O_2), *waterone*, larutan primer merkuri 100 ppm dan larutan standar (SnCl_2).

G. Prosedur Kerja

Adapun prosedur kerja analisis logam berat Hg dengan cara spektrofotometri serapan atom sebagai berikut:

1. Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *Purposive sampling*. Jumlah ikan yang digunakan yaitu 10 ekor dengan ukuran 15-20 cm, dimana pengambilan sampelnya dilakukan pada dua titik berbeda yaitu Stasiun (I) sebelah utara dan Stasiun (II) sebelah timur. Sampel kemudian disimpan pada *cool box* untuk selanjutnya di analisis di Laboratorium Kimia Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Alauddin Makassar.

2. Preparasi Sampel

Tahap ini merupakan tahap persiapan dimana sampel dibersihkan terlebih dahulu. Sampel ikan ekor kuning (*Caesio cuning*) dibersihkan dari sisik serta kotorannya kemudian dicuci bersih. Mengambil bagian organ yang akan dianalisis yaitu pada bagian insang dan daging secukupnya dari 10 ekor ikan.

Daging dan insang tersebut kemudian dihaluskan dan memberi label serta menempatkan sampel dalam cawan petri untuk mempermudah tahap selanjutnya.

3. Tahap Destruksi

Menimbang sebanyak 5 gram dari masing-masing sampel yaitu pada sampel daging dan insang yang diambil secara acak. Menambahkan 100 ml *waterone* ke dalam sampel. Sampel kemudian dimasukkan ke dalam lemari asam untuk ditambahkan HNO_3 sebanyak 5 ml serta menambahkan satu buah batu didih. Selanjutnya memanaskan sampel selama 30 menit hingga volume berkurang sampai 50 ml. Sampel selanjutnya didinginkan dan ditambahkan HClO_4 sebanyak 1 ml. Sampel kemudian dipanaskan kembali selama 30 menit hingga volumenya berkurang menjadi 25 ml dan selanjutnya didinginkan. Setelah dingin, larutan sampel disaring ke dalam labu alas bulat dan menambahkan *waterone* hingga volumenya menjadi 100 ml.

4. Pembacaan pada SSA

Dalam pembacaan pada SSA, larutan sampel, standar dan blanko disiapkan. Tahap awal dalam proses pembacaan adalah perangkat SSA dihidupkan, diatur posisi optimum untuk pengujian Hg dengan mengatur posisi lampu katoda Hg dan kedudukan sel absorban dan panjang gelombang untuk uji Hg. Selanjutnya larutan standar dihubungkan dengan selang kecil yang bermuara pada sebuah tabung didalam sistem SSA, kemudian reduktor (SnCl_2) dialirkan kedalam tabung tersebut. Reduktor tersebut yang memodifikasi larutan standar sehingga

terbentuk kabut uap merkuri. Kabut uap merkuri akan didorong oleh campuran gas argon menuju ke sel absorban, didalam sel absorban, uap Hg akan menyerap sinar dari lampu katoda Hg pada panjang gelombang 253,7 nm. Besarnya absorban yang diserap akan langsung dibaca pada layar monitor. Setelah larutan standar kerja dibaca, maka akan terbentuk kurva standar absorban (Y) konsentrasi Hg (ug/l) (X), sehingga terbentuk kurva linier seperti terlihat pada lampiran hasil pembacaan SSA. Selanjutnya pembacaan blanko dan sampel seperti tahap pada pembacaan larutan standar, secara rinci tahap pembacaan pada SSA.

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis kadar logam berat Hg dilakukan menggunakan spektrofotometri serapan atom. Berdasarkan pembacaan di SSA maka, konsentrasi Hg dihitung dengan rumus:

$$C = \frac{c \times V}{A}$$

Keterangan:

- C = Kadar logam dalam sampel (mg/kg)
- c = Konsentrasi larutan sampel (mg/L)
- V = Volume pengenceran (ml)
- a = Berat basah sampel (gram)

(Sumber: Pedoman perhitungan kadar logam berat sampel instalasi kimia, Fakultas Sains dan Teknologi).

Data yang diperoleh diolah secara deskriptif dalam bentuk tabel dan gambar dengan parameter yaitu kandungan logam berat Hg pada ikan ekor kuning (*Caesiocuning*) diperairan pulau Lae-lae Makassar.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Adapun hasil penelitian dari analisis logam Hg terhadap organ insang dan daging ikan ekor kuning (*Caesio cuning*) yang diperoleh dari perairan Pulau Lae-lae Makassar pada stasiun (I) (sebelah utara) dan stasiun (II) (sebelah timur) ditunjukkan pada tabel 4.1 di bawah ini:

Tabel 4.1 Kandungan Logam Merkuri (Hg) pada Organ Insang dan Daging Ikan ekor kuning (*Caesio cuning*)

No	Kode sampel	Rata-rata kadar logam berat merkuri (Hg) mg/kg
1	T ₁ In	0,22
2	T ₂ In	0,19
3	T ₁ Dg	0,12
4	T ₂ Dg	0,11

Sumber: Hasil Analisa Instalasi Laboratorium Kimia UIN Alauddin Makassar, 2017.


Keterangan:

T₁ : Pengambilan sampel pada Stasiun (I)

T₂ : Pengambilan sampel pada Stasiun (II)

In : Sampel insang ikan ekor kuning (*Caesio cuning*)

Dg : Sampel daging ikan ekor kuning (*Caesio cuning*)



Gambar 4.1 Histogram Kandungan Kadar Rata-rata Logam Merkuri (Hg) pada Sampel Insang dan Daging Ikan Ekor Kuning (*Caesio cuning*) pada Stasiun (I) dan Stasiun (II).

B. Pembahasan

Logam berat merupakan bahan pencemar yang paling banyak ditemukan di perairan akibat industri dan limbah perkotaan. Salah satu logam berat yang berbahaya sebagai pencemar dan cenderung mengganggu kelangsungan hidup organisme perairan adalah logam Hg. Ikan yang mengandung Hg pada dagingnya apabila dikonsumsi oleh manusia akan berdampak buruk bagi kesehatan manusia tersebut.

Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan pada dua titik berbeda yaitu pada Stasiun (I) sebelah utara dan Stasiun (II) sebelah timur. Pada bagian utara ini berbatasan dengan Pulau Lae-lae kecil dan menjadi area yang banyak terkena aktifitas manusia, pada bagian pantainya berfungsi sebagai area wisata publik dimana

terdapat banyak pondok-pondok kecil yang bisa disewa untuk pengunjung, tempat bersandarnya perahu para nelayan setelah menangkap ikan. Sedangkan pada sebelah timur berbatasan dengan kota Makassar dan berbatasan langsung dengan Pantai Losari, pada area ini juga merupakan jalur utama atau perlintasan bagi perahu dari dermaga kayu Bangkoa untuk terhubung ke pulau Lae-lae. Pulau Lae-lae ini merupakan Pulau yang memiliki jarak paling dekat dengan daratan.

Adapun metode pengambilan sampel yang digunakan yaitu *Purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel secara sengaja, tidak acak, pemilihan sampel berdasarkan sampling tergantung kriteria tertentu. Pada penelitian ini, 10 ekor *Caesio cuning* diambil dari masing-masing stasiun (I) dan (II) dengan ukuran berkisar antara 15-20 cm.

Prosedur pengujian sebelum analisis SSA dimulai dari preparasi sampel. Preparasi sampel adalah tahap awal dalam pengujian Hg dimana sampel dibersihkan dari sisik dan dicuci bersih. Hal tersebut bertujuan untuk mempermudah dalam pengambilan daging. Sampel yang diambil adalah pada insang dan daging, karena pada bagian tersebut adalah bagian pengakumulasi Hg selain pada organ hati dan ginjal, selanjutnya sampel dihomogenasi dan ditempatkan dalam cawan petri untuk mempermudah tahap selanjutnya.

Tahap selanjutnya yaitu tahap destruksi basah. Destruksi basah adalah proses perombakan logam organik dengan menggunakan asam kuat, kemudian dioksidasi menggunakan zat oksidator sehingga dihasilkan logam anorganik bebas. Kesempurnaan destruksi ditandai dengan diperolehnya larutan jernih pada larutan

destruksi yang menunjukkan bahwa semua konstituen yang ada telah larut sempurna atau perombakan senyawa-senyawa organik telah berjalan dengan baik. Pemilihan metode destruksi basah dikarenakan tidak banyak bahan yang hilang dengan suhu pengabuan yang sangat tinggi. Di samping itu destruksi dengan cara basah biasanya dilakukan untuk memperbaiki cara kering yang biasanya memerlukan waktu yang lama.

Pelarut-pelarut yang digunakan dalam destruksi basah adalah asam nitrat (HNO_3) dan asam perklorat (H_2O_2). Penambahan HNO_3 berfungsi untuk mempercepat terjadinya oksidasi atau berfungsi untuk merombak jaringan daging atau insang. Penambahan H_2O_2 bertujuan untuk mempercepat terjadinya oksidasi. Penambahan batu didih dimaksudkan untuk meredam buih yang besar pada saat proses pemanasan.

Pada penelitian ini menggunakan metode SSA. Penggunaan SSA dikarenakan SSA ini memiliki beberapa kelebihan yaitu spesifik yaitu analisis tertentu dengan panjang gelombang atau garis resonansi yang sesuai, selektif, dan sensitif untuk menganalisis logam. Ini disebabkan karena kecepatan analisisnya, ketelitian sampai tingkat rumit (sekecil mungkin), tidak memerlukan pemisahan pendahuluan, serta relatif murah dengan pengerjaan yang sederhana. Metode Spektrofotometer SSA didasarkan pada prinsip absorpsi cahaya oleh atom. Atom-atom akan menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu, tergantung pada sifat unsurnya. Cahaya pada panjang gelombang ini mempunyai cukup energi untuk mengubah tingkat elektronik suatu atom yang mana transisi elektronik suatu atom bersifat spesifik.

Dengan menyerap suatu energi, maka atom akan memperoleh energi sehingga suatu atom pada keadaan dasar dapat ditingkatkan energinya ke tingkat eksitasi (Napitupulu, 2008 *dalam* Suriani, 2016).

Insang merupakan alat respirasi ikan seperti paru-paru pada mamalia atau hewan darat lainnya. Luas permukaan epitel insang hampir setara dengan luas total permukaan kulit, bahkan pada sebagian besar spesies ikan luas permukaan epitel insang ini jauh melebihi kulit. Fungsi lain dari insang yaitu mengatur homeostasis ikan. Lapisan epitel insang yang tipis dan berhubungan langsung dengan lingkungan luar menyebabkan insang berpeluang besar terinfeksi penyakit. Insang juga berfungsi sebagai pengatur pertukaran garam dan air, pengeluaran limbah-limbah yang mengandung nitrogen. Kerusakan struktur yang ringan sekalipun dapat sangat mengganggu pengaturan osmose dan kesulitan pernafasan.

Berdasarkan hasil penelitian kandungan logam Hg terhadap ikan ekor kuning (*Caesio cuning*) pada organ insang nilai tertinggi terdapat pada Stasiun (I) yaitu 0,22 mg/kg sedangkan pada stasiun (II) dengan nilai 0,19 mg/kg. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kadar Hg tertinggi terdapat pada organ insang kemudian diikuti dengan daging ikan.

Hal tersebut sesuai dengan proses fisiologis pada tubuh ikan yaitu proses masuknya logam berat bersamaan dengan air yang secara difusi diserap oleh insang selanjutnya disebarkan keseluruh tubuh melalui darah sehingga terjadi penimbunan logam berat pada daging. Sedangkan akumulasi yang terjadi pada usus ini terjadi

karena air masuk secara langsung melalui mulut secara osmosis atau bersamaan ketika ikan mengambil makanan (Windarti, 2007).

Beberapa pengaruh toksisitas logam pada ikan yang telah terpapar logam berat yaitu pada insang dan alat pencernaan. Jumlah Hg yang terakumulasi pada tubuh ikan tergantung dari ukuran, umur dan kondisi ikan. Distribusi dan akumulasi logam tersebut sangat berbeda-beda untuk organisme air. Hal ini tergantung pada spesies, konsentrasi logam dalam air, pH, fase pertumbuhan dan kemampuan untuk pindah tempat (Darmono, 1995).

Sanusi (1980) dalam Darmono (2003), mengemukakan bahwa terjadinya proses akumulasi merkuri di dalam tubuh hewan air terjadi karena kecepatan pengambilan Hg (*uptake rate*) oleh organisme air lebih cepat dibandingkan dengan proses ekskresi. Hg merupakan logam yang terlibat dalam proses enzimatik, terikat dengan protein (*ligan binding*). Ikatan Hg dengan protein jaringan membentuk senyawa *metallotionein*. *Metallotionein* merupakan protein aditif yang berperan dalam proses homeostatis organisme dalam mentolelir logam berat.

Senyawa-senyawa kimia yang telah berikatan dengan protein dan membentuk *metallotionein* tersebut akan dibawa oleh darah (Darmono, 1995). Senyawa Hg yang masuk bersama makanan, akan masuk ke dalam alur pencernaan, setelah mengalami absorpsi di usus, senyawa merkuri akan dibawa ke hati oleh vena porta hepatic. Selanjutnya di dalam hati senyawa Hg mengalami metilasi lambat menjadi Hg^{2+} , dan kemudian akan masuk ke dalam darah dan akan teroksidasi sempurna menjadi Hg bivalensi (Hg^{2+}). Bersama peredaran darah, Hg^{2+} yang masuk ke hati akan mengalami

metabolisme, terdegradasi dan melepaskan Hg^{2+} sehingga dapat menghambat enzim proteolitik dan menyebabkan kerusakan sel. Hg yang tadinya masuk ke dalam hati akan terbagi dua yaitu sebagian akan terakumulasi pada hati, sedangkan sebagian lainnya akan dikirim ke empedu. Dalam kantong empedu, akan dirombak menjadi senyawa Hg anorganik yang kemudian akan dikirim lewat darah ke ginjal, dimana sebagian akan terakumulasi pada ginjal dan sebagian lagi dibuang bersama urin (Palar, 1994).

Masuknya logam berat merkuri ke dalam tubuh ikan ekor kuning (*Caesio cuning*) tidak hanya terjadi melalui rantai makanan, tetapi juga dapat masuk melalui proses respirasi. Pada saat ikan melakukan respirasi, air akan melewati insang untuk melakukan pertukaran O_2 dan CO_2 pada filamen insang. Filamen insang yang sangat tipis memungkinkan ion-ion dari logam berat yang terkandung di dalam air akan masuk dan diikat oleh hemoglobin di dalam darah.

Hemoglobin diperlukan untuk transportasi oksigen dari insang ke seluruh jaringan tubuh, sehingga apabila ada ion logam berat yang diikat oleh hemoglobin maka ion logam berat tersebut juga akan diedarkan ke seluruh jaringan tubuh. Di perairan sungai, merkuri dapat berbentuk senyawa merkuri organik dan merkuri anorganik. Dari beberapa senyawa tersebut, senyawa merkuri organik lebih mudah diadsorpsi oleh ikan dibandingkan dengan merkuri anorganik. Hal ini disebabkan senyawa organik raksa lebih mudah larut dalam lemak. Dalam tubuh ikan bentuk senyawa merkuri yang terbanyak adalah metil merkuri, yaitu lebih dari 90% (Hutagalung 1984).

Hg dalam daging perlu diperiksa karena daging merupakan bagian dari ikan yang dikonsumsi manusia. Seperti telah dibahas sebelumnya Hg berbahaya apabila dikonsumsi manusia karena dapat mengganggu kesehatan. Pada Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa konsentrasi Hg dalam daging ikan memiliki rentang nilai 0,11 – 0,14 mg/kg. Konsentrasi Hg dalam daging yang ditunjukkan pada Gambar 4.1 juga masih tergolong sangat kecil dan jauh berada di bawah baku mutu oleh (SNI, 2009). Dapat dikatakan bahwa ikan ekor kuning (*Caesio cuning*) yang diperoleh dari perairan Pulau Lae-lae masih layak dikonsumsi bila dilihat dari konsentrasi Hg dalam daging. Namun diperlukan pengukuran konsentrasi logam lainnya agar dapat benar-benar dinyatakan aman untuk dikonsumsi.

Kandungan logam berat merkuri dalam daging ikan ekor kuning (*Caesio cuning*) yang ditangkap pada bulan September yang dianalisis dengan metode SSA menunjukkan hasil <0.5 mg/kg. Hasil analisis pada bulan Juni dan Juli. Apabila dibandingkan dengan standar baku mutu yang ditetapkan yaitu 0.5 mg/kg (SNI 2009); 0.5 mg/kg (BPOM RI 2007); 0.5 mg/kg (European Communities, 2006); 0.5 mg/kg (Codex 1995); 0.5 mg/kg (Gazette Food Standards 2011) maka hasil penelitian ini masih berada di bawah batas baku mutu. Pada analisis logam Hg pada organ daging, nilai tertinggi diperoleh pada sampel di Stasiun (I) yaitu 0,12 mg/kg sedangkan pada stasiun (II) diperoleh nilai adalah 0,11 mg/kg.

Kemungkinan terjadi eliminasi logam yang terakumulasi pada daging dan insang sangat kecil karena kondisi perairan yang telah dicemari oleh Hg sehingga aktifitas pernafasan ikan selalu berkaitan erat dengan perairan tersebut maka secara

terus menerus akan terjadi penumpukan Hg pada insang dan daging. Sedangkan pada usus masih memungkinkan terjadi proses eliminasi yaitu melalui proses sekresi dimana ikan tersebut mampu mengeluarkan logam berat yang masuk bersamaan dengan feces yang dikeluarkan (Siregar, 2012).

Akumulasi logam berat pada ikan dapat terjadi karena adanya kontak antara medium yang mengandung toksik dengan ikan. Kontak berlangsung dengan adanya pemindahan zat kimia dari lingkungan air ke dalam atau permukaan tubuh ikan, misalnya logam berat masuk melalui insang. Logam merkuri dapat masuk ke dalam tubuh organisme melalui rantai makanan, insang atau difusi melalui permukaan kulit, akibatnya logam itu dapat terserap dalam jaringan, tertimbun dalam jaringan (bioakumulasi) dan pada konsentrasi tertentu akan dapat merusak organ-organ dalam jaringan tubuh.

Dalam kondisi normal, ikan berinteraksi dengan lingkungannya. Dalam interaksi ini semua sistem tubuh (pencernaan, osmoregulasi, respirasi, reproduksi dan metabolisme) bekerja. Apabila kondisi perairan tempat ikan hidup mengalami perubahan karena polutan (dalam hal ini logam berat) yang masuk secara terus menerus dalam jangka waktu yang lama, akan menyebabkan perubahan pada sistem imun, gambaran darah dan struktur organ/jaringan pada ikan (uji histologi).

Hal ini terjadi karena darah berfungsi mengalirkan semua zat yang dibutuhkan oleh tubuh seperti zat-zat makanan, hormon, dan nutrisi ke seluruh tubuh. Sehingga apabila dalam lingkungan tersebut terdapat benda asing yang masuk, maka darah merupakan agen yang menyalurkan benda asing tersebut masuk

kedalam jaringan dan organ ikan. Sedangkan histologi menggambarkan perubahan sel, jaringan bahkan organ tubuh ikan baik karena gangguan penyakit maupun karena adanya gangguan polutan dalam media hidupnya. Sehingga tepat apabila pendekatan biologis tersebut dijadikan acuan untuk melihat kesehatan lingkungan, karena kedua indikator tersebut menggambarkan suatu perubahan sejalan dengan perubahan yang terjadi pada sistem lingkungan.

Berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI 7387:2009) batas maksimum cemaran logam berat merkuri (Hg) dalam ikan dan produk olahannya adalah 0,5 mg/kg. Berdasarkan hasil yang diperoleh baik pada organ insang dan daging belum melewati ambang batas karena memiliki nilai rata-rata dibawah 0,5 mg/kg, dimana nilai tertingginya yaitu 0,2 mg/kg pada sampel insang.

Rendahnya kandungan logam berat merkuri pada sampel ikan ekor kuning (*Caesio cuning*) yang diperoleh di kedua titik stasiun pengambilan diakibatkan karena masih rendahnya kandungan konsentrasi logam merkuri (Hg) pada perairan tersebut. Tinggi rendahnya logam yang terserap dan terakumulasi dalam jaringan biota sangat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya konsentrasi atau banyak sedikitnya logam polutan diperairan.

Parameter lainnya yang turut mempengaruhi kandungan logam berat di perairan adalah arus, suhu, salinitas, padatan tersuspensi total, dan derajat keasaman (pH). Pada umumnya faktor oseanografi yang paling berperan dalam penyebaran bahan cemaran adalah arus, pasang surut, dan gelombang.

Nontji (2005) menyatakan bahwa, arus yang terjadi di daerah pantai merupakan elemen penting dalam proses penyebaran bahan pencemar pada lingkungan pantai yang dapat mempengaruhi proses pertumbuhan alga.

Arus merupakan gerakan mengalir suatu massa air yang dapat disebabkan oleh tiupan angin atau karena perbedaan densitas air laut atau dapat pula disebabkan gerakan gelombang panjang termasuk pasang surut. Arah kecepatan arus sangat penting untuk mengetahui arah transportasi dan pengadukan zat-zat yang terkandung dalam perairan seperti logam berat merkuri (Hg). Pola arus perairan akan memindahkan dan mengencerkan zat-zat tersebut dalam bentuk larutan atau terserap pada larutan partikel, atau mengalami proses pengenceran oleh pola arus pasang surut.

Menurut Siahainenia (2001), sebagian bahan pencemar yang masuk ke dalam ekosistem laut dapat diencerkan dan disebarkan ke seluruh wilayah laut melalui adukan dan arus laut. Untuk wilayah-wilayah yang luas dan terbuka dengan pola arus dan turbulensi yang aktif, bahan-bahan pencemar akan terurai ke perairan laut yang lebih luas, sehingga dapat menimbulkan rendahnya konsentrasi bahan polutan dalam suatu badan perairan. Akan tetapi pada wilayah laut yang sempit dan tertutup, bahan pencemar yang tidak diencerkan dan disebarkan ke laut yang luas akan mudah sekali terakumulasi di dalam suatu badan perairan, sehingga akan dipekatkan melalui proses biologi, fisik dan kimiawi.

Dalam proses biologi, bahan pencemar biasanya diserap oleh organisme laut, seperti fitoplankton, maupun tumbuhan laut yang akan berpindah ke tingkat trofik

berikutnya yaitu zoo-plankton, avertebrata, ikan dan mamalia, melalui proses rantai makanan. Dan sebagian lagi bahan pencemar tersebut akan terbawa oleh arus laut ataupun biota yang melakukan migrasi ke wila-yah laut lainnya.

Rendahnya kadar logam berat dalam suatu perairan laut, bukan berarti bahan polutan yang mengandung logam berat tersebut tidak berdampak negatif terhadap perairan, namun lebih disebabkan karena kemampuan perairan tersebut yang cukup tinggi untuk mengencerkan bahan polutan (*self purification*) (Rochyatun dkk., 2006)

Hasil analisis kandungan merkuri pada daging dan insang diperoleh konsentrasi merkuri masing-masing $<0,5$ mg/kg. Selain itu, distribusi dan akumulasi logam berat sangat berbeda-beda untuk setiap organisme air. Hal tersebut tergantung pada spesies, konsentrasi logam dalam air, pH, fase pertumbuhan, dan kemampuan untuk berpindah tempat (Darmono 1995).

Banyak faktor yang mempengaruhi kandungan Hg dalam ikan termasuk kondisi fisik kimia dari danau, makanan, ukuran ikan, dan usia. Untuk beberapa jenis ikan, konsentrasi merkuri meningkat seiring dengan peningkatan ukuran. Hal tersebut menunjukkan bahwa konsentrasi Hg berbeda antara ikan dengan ukuran kecil dan ukuran besar. Berdasarkan penelitian sebelumnya (Rahmawati, 2006 dalam Yuniar, 2007) dinyatakan bahwa logam berat pada ikan kecil umumnya lebih tinggi dibandingkan pada ikan besar. Hal ini disebabkan oleh proses metabolisme pada ikan yang berukuran kecil belum sempurna jika dibandingkan dengan ikan besar, sehingga logam berat yang masuk ke dalam tubuh ikan belum dapat didetoksifikasi dan diekskresikan secara sempurna. Logam berat dalam tubuh ikan menjadi

terakumulasi dalam jumlah yang cukup besar. Sedangkan dalam ikan besar proses metabolisme sudah sempurna, sehingga logam berat yang masuk dapat didetoksifikasi dan diekskresikan dengan sempurna.

Meskipun kandungan logam Hg pada daging ikan ekor kuning (*Caesio cuning*) masih sedikit, tidak menutup kemungkinan adanya cemaran logam berat lainnya yang sudah melebihi baku mutu. Seperti pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Hamazah, dkk., 2015) menunjukkan bahwa konsentrasi logam timbal (Pb) pada perairan Pulau Lae-Lae telah melewati standar baku mutu perairan peraturan Kementerian Negara Lingkungan Hidup No. 51 Tahun 2004, tentang baku mutu akumulasi logam Pb pada perairan ditetapkan yaitu 0,008 ppm. Dengan berdasarkan pada standar baku mutu timbal di perairan tersebut, maka perairan pulau Lae-lae tergolong telah tercemar berat logam timbal (0.556 – 0.609 ppm).

Sehingga diperlukan suatu upaya pengelolaan perairan Pulau Lae-lae agar dampak dari pencemaran khususnya logam berat di perairan Pulau Lae-lae dapat diminimalkan. Beberapa pencegahan yang dapat dilakukan agar tidak membahayakan kesehatan masyarakat yang mengkonsumsi produk makanan dari hasil olahan ikan yang ditangkap di Pulau Lae-lae adalah dengan cara menentukan batas aman konsumsi.

Batas aman konsumsi yang biasa digunakan ialah standar PTWI (*Provisional Tolerable Weekly Intake*) atau batas aman konsumsi dalam satu minggu. Mengingat kandungan logam berat merkuri yang terkandung di dalam daging ikan ekor kuning (*Caesio cuning*) adalah <0,5 mg/kg maka tidak bisa dihitung batas aman konsumsi

dengan metode PTWI, artinya ikan ekor kuning (*Caesio cuning*) masih aman untuk dikonsumsi.

Pengelolaan limbah rumah tangga dapat dilakukan dengan penataan *septic tank*, pengurangan beban pencemaran dari industri dilakukan melalui pembangunan sarana terpadu, khususnya pengendalian limbah dan sampah dilakukan melalui pengomposan dan pemanfaatan biogas limbah.

Laut yang menjadi bagian dari kehidupan di planet ini merupakan wilayah yang sangat luas, melebihi luasnya daratan yang ada. Laut menjadi penyangga ekosistem, produsen rantai makanan bagi makhluk-makhluk hidup termasuk manusia, menjadi sumber penghasilan bagi aneka profesi, serta dapat menjadi bagian dari instrumen taharah dalam ibadah. Karena fungsi itulah maka manusia harus menjaga dan memanfaatkan sebaik-baiknya sumber daya yang ada di laut sehingga terjadi harmonisasi kehidupan manusia dengan alam lingkungannya. Sedemikian pentingnya fungsi laut maka wajar apabila Allah swt mengulang-ulang pertanyaan-penyadaran kepada manusia yang tidak mensyukuri nikmat-Nya. Allah berfirman dalam QS Ar Rahman/55: 13.

فَبِأَيِّ آءِ الْآءِ رَيْبِكُمْ أَتُكذِّبَانِ ﴿١٣﴾

Terjemahnya:

Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? (Kementrian Agama RI, 2002).

Melalui surah ini Allah swt seolah memberi sinyal kepada kita akan sifat kita yang pelupa, kufur nikmat, dan tidak mau berfikir. Bentuk rasa syukur seharusnya

menambah keimanan kita dengan mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Beribadah kepada Allah swt dan menjauhkan diri dari maksiat. Celakalah orang yang kufur nikmat dan berbahagialah orang yang bisa mensyukuri nikmat. Karena ketika ia bersyukur, Allah menambahkan nikmat-Nya. Menjaga lingkungan merupakan salah satu bentuk bersyukur kepada karunia yang diberikan Allah swt.

Peran manusia, yang dalam islam disebut khalifah, sejatinya adalah sebagai makhluk yang didelegasikan Allah bukan hanya sekedar sebagai penguasa di bumi, akan tetapi juga perannya untuk memakmurkan bumi. Dalam perannya sebagai khalifah, manusiaa harus mengurus, memanfaatkan dan memelihara, baik langsung maupun tidak langsung amanah tersebut meliputi bumi dan segala isinya sehingga manusia dapat memiliki perilaku yang baik. Pola hidup yang bersih merupakan bagian penting dari manusia dalam memelihara lingkungan hidup, khususnya air dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerusakan dan ketidaknyamanan terhadap lingkungan.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kandungan logam berat Hg pada ikan ekor kuning (*Caesio cuning*) memiliki nilai rata-rata yaitu pada sampel insang sebesar 0,22 mg/kg yang diperoleh dari Stasiun (I) dan 0,19 mg/kg yang diperoleh dari Stasiun (II). Pada sampel daging 0,12 mg/kg pada Stasiun (I) sedangkan yang diperoleh dari Stasiun (II) sebesar 0,11 mg/kg. Standar Nasional Indonesia (SNI 7387:2009) batas maksimum cemaran logam berat Hg dalam ikan dan produk olahannya adalah 0,5 mg/kg sehingga kandungan logam berat Hg pada ikan ekor kuning (*Caesio cuning*) masih di bawah ambang batas dan masih aman untuk dikonsumsi.

B. Saran

Adapun saran saya setelah melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai kandungan logam berat Hg pada jenis ikan atau sampel lainnya di lokasi penelitian ini.
2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang pengaruh parameter lingkungan terhadap keberadaan logam berat di perairan.
3. Disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai uji histologi pada sampel dan sedimen untuk lebih mendukung keberadaan logam berat di perairan.

KEPUSTAKAAN

- Achmad, Rukaesih. *Kimia Lingkungan*. Yogyakarta: ANDI, 2004.
- Afrianto, dkk. *Penyakit Ikan*. Jakarta: Penebar Swadaya, 2015.
- Akhadi, Mukhlis. *Isu Lingkungan Hidup: Mewaspada Dampak Kemajuan Teknologi dan Polusi Lingkungan Global yang Mengancam Kehidupan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Alfian, Zul. “Merkuri: Antara Manfaat dan Efek Penggunaannya Bagi Kesehatan Manusia dan Lingkungan”. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap FMIPA Universitas Sumatera Utara, Medan, 1 Medan 2006.
- Allen G & Steene RC. “A guide to angelfishes and butterflyfishes”. *Odyssey Publishing (USA/Tropical Reef Research) Australia*. 378 p, 1990.
- Anand, S.J.S. “Determination Of Mercury, Arsenic, And Cadmium In Fish By Neutron Activation”. *Journal of Radioanalytical Chemistry*, 44 -101, 1978.
- Benhard, M. “Impact and control of heavy metals and chlorinated hydrocarbons in the marine environment”. *WHO training course on coastal pollution control*. Vol III. Denmark. 991 -1015, 1978.
- Burhanuddin, Andi. *Ikhtologi dan Segala Aspek Kehidupannya*. Yogyakarta: Deepublish, 2014.
- Djuangsih, N., A.K. dan Benito, H. Salim. *Aspek Toksikologi Lingkungan*, Laporan Analisis Dampak Lingkungan, Lembaga Ekologi Universitas Padjadjaran, Bandung, 1982.
- Darmono. *Lingkungan hidup dan pencemaran hubungannya dengan Toksikologi Senyawa Logam*. Jakarta: UI-Press, 1995.
- Day, R.A dan Underwood, A. L. *Analisa Kimia Kuantitatif Edisi Ke-4*. Jakarta: Erlangga, 1981.
- Fujaya, Yushinta. *Fisiologi Ikan: Dasar Pengembangan Teknik Perikanan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Kementerian Agama RI. *Al Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Tiga Serangkai, 2012.
- Kimball, dkk. *Biologi Jilid 2 Edisi Kelima*. Jakarta: Erlangga, 1983.

- Kottelat M, Whitten AJ, Kartikasari SN, & Wirjoatmodjo S. *Freshwater fishes of Western Indonesia & Sulawesi, Indonesia*. Periplus editions (HK) Ltd. 293p, 1993.
- Gocfeld, M. 2003. "Cases of Merkuri (Hg) exposure, bioavaila bility, and absorpction". *Ecotoxicologi and Environmental safly* 56, 174-179, 2003.
- Hamazah, dkk. "Analisis Timbal (Pb) pada Caulerpa racemosa (Forsskal) J. Agardh dari Perairan Pulau Lae-lae Makassar dan Laikang Kabupaten Takalar". *Jurusan Biologi Fakultas MIPA Universitas Hasanuddin*, 2015.
- Hartanti. Kandungan Logam Berat Raksa (Hg), Kadmium (Cd), Timah Hitam (Pb), Arsen (As) dan Tembaga (Cu) dalam Tubuh Kerang-kerangan Konsumsi. *Skripsi*. Bogor: Fakultas Perikanan IPB, 1998.
- Hutagalung, Horas P. "Logam Berat dalam Lingkungan Laut". *Oseana* 9 no.1 (www.oseanografi.lipi.go.id) 1984. (Diakses 24 Juni 2016).
- Irhamiah, Magfirah., Birawida, A.B., Manyullei, Syamsuar. "Kondisi Sanitasi Dasar Pada Masyarakat Pulau Lae-lae Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar". *Repository UNHAS*, 2014. (Diakses 12 Desember 2016).
- Lestari, Arma. "Kandungan Logam Berat Hg dan Pb Pada Kerang Hijau (*Mytilus viridis*) Berbagai Ukuran Hasil Tangkapan di Pantai Losari Makassar Propinsi Sulawesi Selatan". *Skripsi*. Bogor: Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor, 2002.
- Nelson Js. *Fishes of the world, Fourth Edition*. New Jersey: John Wileydsons Inc, 2006.
- Nonci. *Pencemaran Dampak dan Penanggulangannya*. Makassar: Karya Mandiri Jaya, 2008
- Nontji, A. *Laut Nusantara*. Jakarta: Djambatan, 2005.
- Kordi, M. Ghufran H. *Jurus Jitu Pengelolaan Tambak Budi Daya Perikanan Ekonomis*. Yogyakarta: ANDI, 2012.
- Palar, H. *Pencemaran dan Toksikologi Logam Berat*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994
- Priyanto, Nandang., Dwiytino., Ariyani, Farida. "Kandungan Logam Berat (Hg, Pb, Cd, dan Cu) Pada Ikan, Air, Dan Sedimen Di Waduk Cirata, Jawa Barat". *Jurnal Pascapanen dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan* 3 no. 1, 2008. (Diakses 4 September 2016).
- Quthb, Sayyid. "Tafsir Fi Zhilalil Qur'an. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.j

- Radja, A. Mufti. "Pemanfaatan Ruang Terbuka di Pulau Lae-lae, Makassar". *Temu Ilmiah IPLBI*, 2013. (Diakses 3 Desember 2016).
- Raven, dkk. *Biology: Seventh Edition*. 2005.
- Ravichandran, M. "Interactions between mercury and dissolved organic mattera review". *Chemosphere* 55, 319-331, 2004.
- Rianto, Sugeng. "Analisi Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Keracunan Merkuri Pada Penambangan Emas Tradisional di Desa Jendi Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri". *Tesis*. Semarang: Magister Kesehatan Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2010.
- Rochyatun, Endang dan Rozak, Abdul. "Pemantauan Kadar Logam Berat Dalam Sedimen di Perairan Teluk Jakarta". *Makara, SAINS* 11 no. 1 (April 2007). (Diakses 4 September 2016).
- Rochyatun, dkk. "Distribusi Logam Berat dalam Air dan Sedimen di Perairan Muara Sungai Cisadine". *Makara Sains* 10 no. 1 (April, 2006).
- Rumahlatu, Dominggus. "Konsentrasi Logam Berat Kadmium Pada Air, Sedimen dan *Deadema Setosum* (Echinodermata, Echinoidea) di Perairan Pulau Ambon". *Ilmu Kelautan* 16 no. 2, 2011. (Diakses 4 September 2016).
- Sawyer, D.T., Heineman, W.R., and Beebe, J.M. *Chemistry Experiments for Instrumental Methods*, New York: John Wiley & Sons, Inc, 1984. (Diakses 13 Desember 2016).
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 3*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Siahainenia, L. Pencemaran Laut, Dampak, dan Penanggulangannya. Makalah Falsafah Sains, Institut Pertanian Bogor. Bogor, 2001.
- Siregar, YI., Zamri, A., Putra, H. "Penyerapan Timbal (Pb) Pada Sistem Organ Ikan Mas (*Cyprinus carpio* L)". *Jurnal Ilmu Lingkungan*, Vol 6 No (1), 2012.
- Subani W & Barus HR. "Alat penangkapan ikan dan udang laut di Indonesia". *Jurnal Perikanan Laut* 5 no. 50, 1989.
- Sugiyarto, Kristian H. *Common Textbook Kimia Anorganik II*. Yogyakarta: JICA, FMIPA UNY, 2001.

- Sulistiyorini, L. dan Hikmawati, A. “Perubahan Kadar Merkuri (Hg) pada Ikan Tongkol (*Euthnnus sp*) dengan Perlakuan Perendaman Larutan Jeruk Nipis dan Pemasakan”. *Jurnal kesehatan lingkungan*, 3. no 1, 2006 (Diakses 25 November 2016).
- Suriani. “Analisis Kandungan Logam Berat Timbal (Pb), Kadmium (Cd) dan Seng (Zn) Pada Tanah Sawah Kelurahan Paccinongan Kecamatan Sombaopu Gowa”. *Skripsi*. Makassar: Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin, 2016.
- Suriawiria, Unus. *Air Dalam Kehidupan dan Lingkungan Yang Sehat*. Bandung: P.T. Alumni, 2005
- Tafsir Al-Qur’an Tematik. *Pelestarian Lingkungan Hidup*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2009.
- Triana, Linda., Endah, N.W., Nurjazuli. “Analisis Cemar Logam Berat Merkuri Pada Air dan Udang di Sungai Mandor Kecamatan Mandor Kabupaten Landak”. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia* 11 no. 2, 2012. (Diakses 24 November 2016).
- Widowati, Wahyu. *Efek Toksik Logam: Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran*. Yogyakarta: ANDI, 2008.
- Windarti. *Fisiologi Ikan*. Pekanbaru: Universitas Riau press, 2007.
- Yuniar, Vika. “Toksisitas Merkuri (Hg) Terhadap Tingkat Kelangsungan Hidup, Pertumbuhan, Gambaran Darah dan Kerusakan Organ Pada Ikan Nila *Oreochromis niloticus*”. *Skripsi*. Bogor: Departemen Budidaya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor, 2009.

LAMPIRAN

Lampiran 1




Gambar 1.1 Lokasi Penelitian



Gambar 1.2 Lokasi Stasiun (I) dan Stasiun (II)

Lampiran 2

Skema Alur Penelitian



Lampiran 3

Perhitungan Kandungan Logam merkuri (Hg)

Kandungan Logam merkuri (Hg) pada sampel diperoleh dengan menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$C = \frac{c \times V}{a}$$

Keterangan :

C : Kadar logam dalam sampel (mg/gr)

c : Konsentrasi larutan sampel (mg/L)

V : Volume penetapan/pengencer (ml)

a : Berat sampel basah (gram)

$$R^2 = 0,998$$

$$y = a x + b$$

$$ax + b = y$$

$$ax = y - b$$

$$x = y - b/a$$

keterangan:

y : Absorbansi sampel

a : 7,602

b : 0,003

x : Konsentrasi sampel (mg/ml)

A. Sampel insang

1. Stasiun (1)

Untuk sampel T₁ A Insang

$$\begin{aligned} \text{Konsentrasi T}_1\text{A}_x &= \frac{y-b}{a} \\ &= \frac{0,1047-0,003}{7,602} \\ &= 0,01337806 \text{ mg/L} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} c_1 = \text{T}_1 \text{ A I} &= 0,013 \text{ mg/L} \\ &= 0,000013 \text{ mg/ml} \\ &= 0,000013 \text{ mg/ml} \times 100 \text{ ml} \\ &= 0,0013 \text{ mg} \\ &= \frac{0,0013 \text{ mg}}{5,02 \text{ gr}} \\ &= 0,00026 \text{ mg/gr} \\ &= \frac{0,00026 \text{ mg/gr}}{0,001 \text{ kg}} \\ &= 0,25 \text{ mg/kg} \end{aligned}$$

Untuk sampel T₁ B Insang

$$\begin{aligned} \text{Konsentrasi T}_1\text{B}_x &= \frac{y-b}{a} \\ &= \frac{0,081-0,003}{7,602} \\ &= 0,010 \text{ mg/L} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
c_2 &= T_1 A I = 0,010 \text{ mg/L} \\
&= 0,000010 \text{ mg/ml} \\
&= 0,000010 \text{ mg/ml} \times 100 \text{ ml} \\
&= 0,001 \text{ mg} \\
&= \frac{0,001 \text{ mg}}{5,19 \text{ gr}} \\
&= 0,00019 \text{ mg/gr} \\
&= \frac{0,00019 \text{ mg/gr}}{0,001 \text{ kg}} \\
&= 0,19 \text{ mg/kg}
\end{aligned}$$

Kadar rata-rata logam merkuri (Hg) pada sampel insang adalah:

$$\begin{aligned}
C &= \frac{C_1 + C_2}{2} \\
&= \frac{0,25 \text{ mg/kg} + 0,19 \text{ mg/kg}}{2} \\
&= 0,22
\end{aligned}$$

2. Stasiun (2)

Untuk sampel T₂ A Insang

$$\begin{aligned}
\text{Konsentrasi } T_2 A_x &= \frac{y-b}{a} \\
&= \frac{0,0749 - 0,003}{7,602} \\
&= 0,009458037 \text{ mg/L}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
c_1 = T_2 A I &= 0,0095 \text{ mg/L} \\
&= 0,0000095 \text{ mg/ml} \\
&= 0,0000095 \text{ mg/ml} \times 100 \text{ ml} \\
&= 0,00095 \text{ mg} \\
&= \frac{0,00095 \text{ mg}}{5,38 \text{ gr}} \\
&= 0,00018 \text{ mg/gr} \\
&= \frac{0,00018 \text{ mg/gr}}{0,001 \text{ kg}} \\
&= 0,18 \text{ mg/kg}
\end{aligned}$$

Untuk sampel T₂ B Insang

$$\begin{aligned}
\text{Konsentrasi } T_2 B_x &= \frac{y-b}{a} \\
&= \frac{0,0871-0,003}{7,602} \\
&= 0,011 \text{ mg/L}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
c_2 = T_2 B I &= 0,011 \text{ mg/L} \\
&= 0,000011 \text{ mg/ml} \\
&= 0,000011 \text{ mg/ml} \times 100 \text{ ml} \\
&= 0,0011 \text{ mg} \\
&= \frac{0,0011 \text{ mg}}{5,19 \text{ gr}} \\
&= 0,00021 \text{ mg/gr}
\end{aligned}$$

$$= \frac{0,00021 \text{ mg/gr}}{0,001 \text{ kg}}$$

$$= 0,21 \text{ mg/kg}$$

Kadar rata-rata logam merkuri (Hg) pada sampel insang adalah:

$$C = \frac{C1+C2}{2}$$

$$= \frac{0,18 \text{ mg/kg} + 0,21 \text{ mg/kg}}{2}$$

$$= 0,195$$

B. Sampel daging

1. Stasiun (1)

Untuk sampel T₁ A Daging

$$\text{Konsentrasi } T_1 A_x = \frac{y-b}{a}$$

$$= \frac{0,0641 - 0,003}{7,602}$$

$$= 0,0080 \text{ mg/L}$$

$$c_1 = T_1 A D = 0,008 \text{ mg/L}$$

$$= 0,000008 \text{ mg/ml}$$

$$= 0,000008 \text{ mg/ml} \times 100 \text{ ml}$$

$$= 0,0008 \text{ mg}$$

$$= \frac{0,0008 \text{ mg}}{5,42 \text{ gr}}$$

$$= 0,00014 \text{ mg/gr}$$

$$= \frac{0,00014 \text{ mg/gr}}{0,001 \text{ kg}}$$

$$= 0,14 \text{ mg/kg}$$

Untuk sampel T₁ B Daging

$$\text{Konsentrasi T}_1 \text{ B}_x = \frac{y-b}{a}$$

$$= \frac{0,0523 - 0,003}{7,602}$$

$$= 0,0064 \text{ mg/L}$$

$$c_2 = \text{T}_1 \text{ B D} = 0,0064 \text{ mg/L}$$

$$= 0,0000064 \text{ mg/ml}$$

$$= 0,0000064 \text{ mg/ml} \times 100 \text{ ml}$$

$$= 0,00064 \text{ mg}$$

$$= \frac{0,00064 \text{ mg}}{5,40 \text{ gr}}$$

$$= 0,00011 \text{ mg/gr}$$

$$= \frac{0,00011 \text{ mg/gr}}{0,001 \text{ kg}}$$

$$= 0,11 \text{ mg/kg}$$

Kadar rata-rata logam merkuri (Hg) pada sampel daging adalah:

$$\begin{aligned}
 C &= \frac{C_1 + C_2}{2} \\
 &= \frac{0,14 \text{ mg/kg} + 0,11 \text{ mg/kg}}{2} \\
 &= 0,125 \text{ mg/kg}
 \end{aligned}$$

2. Stasiun (2)

Untuk sampel T₂ A Daging

$$\begin{aligned}
 \text{Konsentrasi T}_2 A_x &= \frac{y-b}{a} \\
 &= \frac{0,0514 - 0,003}{7,602} \\
 &= 0,0063 \text{ mg/L}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 c_1 = T_2 A D &= 0,0063 \text{ mg/L} \\
 &= 0,0000063 \text{ mg/ml} \\
 &= 0,0000063 \text{ mg/ml} \times 100 \text{ ml} \\
 &= 0,00063 \text{ mg} \\
 &= \frac{0,00063 \text{ mg}}{5,07 \text{ gr}} \\
 &= 0,00012 \text{ mg/gr} \\
 &= \frac{0,00012 \text{ mg/gr}}{0,001 \text{ kg}} \\
 &= 0,12 \text{ mg/kg}
 \end{aligned}$$

Untuk sampel T₂ B Daging

$$\begin{aligned} \text{Konsentrasi T}_2 \text{ B}_x &= \frac{y-b}{a} \\ &= \frac{0,0478-0,003}{7,602} \\ &= 0,005 \text{ mg/L} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} c_2 = \text{T}_2 \text{ B D} &= 0,005 \text{ mg/L} \\ &= 0,000005 \text{ mg/ml} \\ &= 0,000005 \text{ mg/ml} \times 100 \text{ ml} \\ &= 0,0005 \text{ mg} \\ &= \frac{0,0005 \text{ mg}}{5,13 \text{ gr}} \\ &= 0,0001 \text{ mg/gr} \\ &= \frac{0,0001 \text{ mg/gr}}{0,001 \text{ kg}} \\ &= 0,11 \text{ mg/kg} \end{aligned}$$

Kadar rata-rata logam merkuri (Hg) pada sampel insang adalah:

$$\begin{aligned} C &= \frac{C_1+C_2}{2} \\ &= \frac{0,12 \text{ mg/kg}+ 0,1 \text{ mg/kg}}{2} \\ &= 0,11 \end{aligned}$$

Lampiran 4

Tabel Hasil Analisis Kandungan Logam Berat Merkuri (Hg)

1. Sampel ikan pada Stasiun I (terletak di bagian sebelah utara pulau Lae-lae berbatasan dengan pulau Lae-lae kecil)

2. Sampel ikan pada Stasiun II (terletak sebelah timur berbatasan dengan kota Makassar dan pantai Losari).

Lampiran 5


Rona lingkungan

Tabel L 5.1 Rona Lingkungan Perairan Pulau Lae-lae Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Lae-lae, Kota Makassar.

Sampel	Rona Lingkungan
Stasiun (I)	Terletak di bagian sebelah utara Pulau Lae-lae dimana berbatasan dengan Pulau Lae-lae kecil dan menjadi area yang banyak terkena aktifitas manusia, pada bagian pantainya berfungsi sebagai area wisata publik, kondisi air kurang baik karena banyaknya limbah domestik pada perairan, sebagai tempat bersandarnya perahu para nelayan setelah menangkap ikan serta tempat pembuatan dan pewarnaan kapal oleh penduduk.
Stasiun (II)	Memiliki jarak paling dekat dengan daratan, dimana sebelah timur berbatasan dengan kota Makassar dan berbatasan langsung dengan Pantai Losari, pada area ini juga merupakan jalur utama atau perlintasan bagi perahu dari dermaga kayu Bangkoa untuk terhubung ke pulau Lae-lae.

Lampiran 6

Gambar 5.1 Tahap pengambilan sampel




Gambar 5.2 Hasil tangkapan pada Stasiun(I) dan stasiun (II)



Gambar L 5.3 Tahap preparasi sampel



Gambar L 5.4 Proses penimbangan sampel



Gambar L 5.5 Proses destruksi basah



Gambar L 5.6 Tahap penyaringan sampel



Gambar L 5.7 Analisis sampel pada SSA



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

JURUSAN KIMIA

LABORATORIUM RISET

JL. Muh.Yasin Limpo No. 36 Gowa.Sulawesi Selatan

Nomor : Lab Riset/LA/01/123
Lamp : -
Hal : *Laporan Hasil Analisa*

Analisis : Awaluddin Iwan Perdana, S.Si.,M.Si
Waktu analisa : Rabu / 24 Mei 2017
Metode : Spektrofotometer Serapan Atom metode Nyala
Judul Penelitian : Bioakumulasi Logam Berat Merkuri (Hg) pada Ikan Ekor Kuning (*Caesio cuning*) di Perairan Pulau Lae-Lae Makassar

A. Data Deret Standar logam Hg

Sample ID	Konsentrasi (ppb)	Absorbansi
Cal zero	0	-0.0003
Standard 1	10	0.0814
Standard 2	20	0.1543
Standard 3	30	0.2330
Standard 4	40	0.3146
Standard 5	50	0.3762

B. Data Absorbansi Sampel logam Hg

Sampel	Abs	Sampel	Abs
T1 A Insang	0.1047	T1 A Daging	0.0641
T1 B Insang	0.0810	T1 B Daging	0.0523
T2 A Insang	0.0749	T2 A Daging	0.0514
T2 B Insang	0.0871	T2 B Daging	0.0478

Samata-Gowa, 28 Mei 2017

Diperiksa Oleh

Kepala Laboratorium Kimia

Dra. St. Chadijah, M.Si
NIP : 19680216 199903 2 001

Disusun Oleh

Laboran

Awaluddin Iwan Perdana, S.Si., M.Si
NIP : 19800526 201101 1 004