

**SENSITIVITAS *Trichoderma* sp TERHADAP *Fusarium* sp
DENGAN MENGGUNAKAN ABU DARI KULIT
JAGUNG (*Zea mays*) SEBAGAI MEDIA
PERTUMBUHAN**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains (S. Si)
Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

OLEH :

HUMAERAH ARIFUDDIN
60300111016

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2015**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Humaeroh Arifuddin
NIM : 60300111016
Tempat/Tgl. Lahir : Makassar/22 Januari 1993
Jur/Prodi : Biologi/S1
Fakultas : Sains dan Teknologi
Alamat : Jl. Tamarunang 1 No. 7
Judul : Sensitivitas *Trichoderma* Sp Terhadap *Fusarium* Sp Dengan Menggunakan Abu Dari Kulit Jagung (*Zea Mays*) Sebagai Media Pertumbuhan

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, Oktober 2015
Penyusun,

Humaeroh Arifuddin
NIM: 60300111016

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **HumaerahArifuddin**, Nim: **60300111016**, mahasiswi jurusan Biologi pada fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi proposal yang bersangkutan dengan judul: **“Sensivitas *Trichoderma* sp terhadap *Fusarium* sp dengan menggunakan abu dari kulit jagung (*Zea mays*) sebagai media pertumbuhan”**,memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan kesidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Makassar, 21 Agustus 2015

Pembimbing I

Pembimbing II

FatmawatiNur, S. Si, M.Si
NIP. 19720203 16 200604 2 001

Dr. Cut Muthiadin, S.Si, M.Si
NIP. 19821110 200912 2 005

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Sensitivitas *Trichoderma sp* dengan *Fusarium sp* dengan menggunakan abu dari kulit jagung (*Zea mays*) sebagai media pertumbuhan”, yang disusun oleh Humaeroh Arifuddin, NIM: 60300111016 , UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Jum’at, tanggal 10 September 2015 M, bertepatan dengan 26 Zulqaidah 1436 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Sains dan Teknologi, Jurusan Biologi (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 10 September 2015 M.
20 Zulqaidah 1436 H.

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag (.....)

Sekretaris : Baiq Farhatul Wahidah, S.Si., M.Si (.....)

Munaqisy I : Hafsan, S.Si., M.Pd (.....)

Munaqisy II : Eka Sukmawaty, S.Si., M.Si (.....)

Munaqisy III : Rusdi Rasyid, S.Ag., M.Ed (.....)

Pembimbing I : Fatmawati Nur, S.Si., M.Si (.....)

Pembimbing II: Dr. Cut Muthiadin, S.Si., M.Si (.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag
NIP. 19691205 199303 1 001

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji hanya milik Allah swt atas rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dicurahkan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai. Salam dan shalawat senantiasa penulis haturkan kepada Rasulullah Muhammad *Sallallahu' Alaihi Wasallam* sebagai satu-satunya uswahtun hasanah dalam menjalankan aktivitas keseharian kita.

Melalui tulisan ini pula, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus, teristimewa kepada kedua orang tua tercinta, ibunda Hj Johriati S. Ag dan ayahanda Drs Arifuddin Dj serta segenap keluarga besar kedua belah pihak yang telah mengasuh dan membimbing penulis selama dalam pendidikan, sampai selesainya skripsi ini, kepada beliau penulis senantiasa memanjatkan doa semoga Allah swt mengasihi, dan mengampuni dosanya. Amin.

Penulis menyadari tanpa adanya bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan seperti yang diharapkan. Oleh karena itu penulis patut menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si selaku Rektor UIN Alauddin Makassar.
2. Prof. Dr. Arifuddin Ahmad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar beserta wakil dekan I, II, dan III.
3. Dr. Mashuri Masri S.Si, M.Si dan Baiq Farhatul Wahida S.Si, M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Biologi UIN Alauddin Makassar.
4. Fatmawati Nur, S.Si, M.Si dan Dr. Cut Muthiadin, S.Si, M.Si selaku pembimbing I dan II yang telah memberi arahan, pengetahuan baru dan koreksi dalam penyusunan skripsi ini, serta membimbing penulis sampai taraf penyelesaian.
5. Hafsa S.Si, M.Pd, Eka Sukmawaty S.Si, M.Si, dan Rusdi Rasyid S.Ag, M.Ed selaku penguji.
6. Para dosen, karyawan dan karyawan Fakultas Sains dan Teknologi yang secara konkrit memberikan bantuannya baik langsung maupun tak langsung.
7. Keluarga, kakak ilo, adikku uti dan ila yang selalu mendoakan dan memberikan semangat dalam pengerjaan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabatku kurcaci Dani, Ratih, fika, ika, bebi, nunu, dan irma yang senantiasa memberikan doa dan semangatnya.

9. Rekan-rekan seperjuanganku Biologi angkatan 2011 terutama Biologi A.
 10. Teman-teman Dema saintek 2015.
 11. Bapak penjual sayur yang tidak diketahui namanya yang tiap hari membawakan kulit jagungnya.
 12. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan sumbangsih kepada penulis selama kuliah hingga penulisan skripsi ini.
- Akhirnya hanya kepada Allah jualah penyusun serahkan segalanya, semoga semua pihak yang membantu penyusun mendapat pahala di sisi Allah swt, serta semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua orang khususnya bagi penyusun sendiri.

Samata-Gowa, Agustus2015

Penulis,

HumaerahArifuddin

NIM: 60300111016

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
ABSTRAK	
viii	
ABSTRACT.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1-7
A. LatarBelakang	1-4
B. Rumusan Masalah.....	5
C. RuangLingkupPenelitian.....	5
D. KajianPustaka	5-6
E. TujuanPenelitian.....	7
F. KegunaanPenelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8-21
A. TinjauanUmum <i>Trichodermasp</i>	8-11
B. TinjauanUmum <i>Fusariumsp</i>	12-14
C. TinjauanUmumLimbahKulitJagung.....	15-18
D. UjiAntagonis.....	18-19

E. Ayat AL-Quran	19-21
F. KerangkaPikir.....	21
BAB III METODE PENELITIAN.....	22-27
A. Jenisdan Lokasi Penelitian.....	22
B. Pendekatan Penelitian.....	22
C. PopulasidanSampel.....	22
D. VariabelPenelitian	22
E. Definisi Operasional Variabel.....	23
F. MetodePengumpulan Data	24
G. AlatdanBahan	24
H. ProsedurKerja	24
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	28-35
A. Hasil Pengamatan.....	28-29
B. Pembahasan.....	30-35
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	36
A. Kesimpulan	36
B. Saran.....	36
DAFTAR PUSTAKA.....	37-40
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 <i>Trichoderma</i> sp.....	8
Gambar 3.2 <i>Fusarium</i> sp	12
Gambar 3.3 Limbah Kulit Jagung	15
Gambar 4.1 Hasil Uji antagonis <i>Trichoderma</i> sp dan <i>Fusarium</i> sp.....	29

ABSTRAK

Nama : Humaerah Arifuddin

NIM : 60300111016

Judul Skripsi : "Sensitivitas *Trichoderma* sp terhadap *Fusarium* sp dengan menggunakan abu dari kulit jagung sebagai media pertumbuhan"

Trichoderma sp. merupakan kapang antagonis yang sangat penting untuk pengendalian hayati. *Fusarium* sp merupakan kapang patogen yang dapat menyerang tanaman. Sensitivitas *Trichoderma* sp terhadap *Fusarium* sp menggunakan abu dari limbah kulit jagung ini merupakan penelitian eksperimental dan bersifat aplikatif skala (*in vitro*) yang bertujuan untuk mengetahui sensitivitas kapang *Trichoderma* sp terhadap pemberian abu dari limbah kulit jagung (*Zea mays*) pada medium cair *yeast malt glucose pepton* (YMGP) sebagai tempat tumbuh dan sumber makanan bagi *Trichoderma* sp dalam uji antagonis melawan hiperparasit *Fusarium* sp. Pemberian abu dari limbah kulit jagung terdapat 4 konsentrasi, kontrol, 1 gr, 3 gr, dan 5 gr. Pada penelitian ini medium yang digunakan adalah medium *potato dekstroza agar* (PDA) dan medium cair *yeast malt glucose pepton* (YMGP) kemudian penelitian ini dilanjutkan dengan uji antagonis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi yang paling baik digunakan dalam melakukan uji antagonis *Trichoderma* sp melawan *Fusarium* sp adalah konsentrasi 5 gr dimana hasil tersebut menunjukkan hasil yang sensitif terhadap pertumbuhan *Fusarium* sp.

Kata kunci : Uji Antagonis, Abu Kulit Jagung (*Zea mays*), *Trichoderma* sp.

ABSTRACT

Nama : Humaerah Arifuddin
NIM : 60300111016
Judul Skripsi : "*Trichoderma* sp sensitivity against *Fusarium* sp using corn husk ash as a medium of growth "

Trichoderma sp. an antagonist mold which is essential for biological control. *Fusarium* sp is pathogenic fungi that can attack plants. Sensitivity *Trichoderma* sp against *Fusarium* sp using the ashes of waste corn husk is an experimental study and is applicable scale (in vitro) which aims to determine the sensitivity of the fungus *Trichoderma* sp against the granting of ash from the waste bark of corn (*Zea mays*) in a liquid medium yeast malt glucose peptone (YMGP) as a place to grow and source of food for *Trichoderma* sp in the test hiperparasit antagonists against *Fusarium* sp. Giving corn husk ash from waste there are 4 concentration, control, 1 gr, 3 gr and 5 gr. In this study, the medium used is a medium potato dextrose agar (PDA) and a liquid medium malt yeast peptone glucose (YMGP) then this study continued with test antagonist. The results showed that the concentration is best used in the test antagonist *Trichoderma* sp against *Fusarium* sp is a concentration of 5 gr where those results demonstrate that the results are sensitive to the growth of *Fusarium* sp.

Key words: sensitivity , Abu Leather Maize (*Zea mays*), *Trichoderma* sp.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyebab penyakit yang tergolong ke dalam patogen atau dari faktor biotik adalah organisme hidup yang mayoritas bersifat mikro dan mampu untuk menimbulkan penyakit pada tanaman dan tumbuhan. Mikroorganisme tersebut antara lain dari golongan cendawan, bakteri, dan virus (Yudiarti, 2012).

Pembuktian secara ilmiah bahwa cendawan dapat bersifat patogen telah dilakukan oleh Tillet dan juga Prevost. Tillet pada tahun 1755 mendapati tanaman gandum terserang penyakit gosong. Infeksi penyakit ini diperoleh dari benih gandum yang sehat diberi bubuk hitam yang berasal dari biji gandum yang sakit. Kemudian R. Prevost ditahun 1807 pembuktiannya lewat penemuan cendawan *Tilletia caries* yang menyebabkan penyakit *bunt* pada tanaman gandum, kemudian masih banyak penemuan-penemuan berikutnya yang mendukung pembuktiannya bahwa cendawan dapat bersifat patogen, satu diantaranya De Bary yang kemudian menjadikan ilmu penyakit tumbuhan ini dipakai salah satu subyek ilmu (Yudiarti, 2012).

Walaupun golongan cendawan termasuk dalam salah satu patogen tanaman, akan tetapi tidak semua cendawan bersifat patogen. Ada beberapa kemungkinan suatu jenis cendawan dapat bersifat patogen, dua diantaranya yaitu tingkat pertumbuhan tinggi dan kemampuan untuk mensekresikan zat yang dapat merusak sel atau jaringan pada tanaman. Apabila suatu cendawan hanya mempunyai kemampuan tingkat pertumbuhan tinggi saja, ada kemungkinan dapat bersifat patogen, akan tetapi kemungkinan ini akan lebih besar apabila didukung oleh kemampuan cendawan tersebut untuk dapat mensekresi zat yang bersifat merusak tubuh tanaman (Yudiarti, 2012).

Penyakit layu *Fusarium sp* pada tanaman cabe merupakan penyakit yang disebabkan oleh cendawan *Fusarium sp*. Cendawan ini menyerang jaringan empulur batang melalui akar yang luka dan terinfeksi. Batang yang terserang akan kehilangan banyak cairan dan berubah warna menjadi kecoklatan, tepi bawah daun menjadi kuning, merambat ke bagian lain secara cepat sehingga seluruh permukaan daun tersebut menguning. Patogen ini bersifat parasit fakultatif. Tanaman inang adalah tanaman muda dan penyakit ditularkan melalui bahan vegetatif dari inang (Endah, 2002). Penyakit ini bisa mengakibatkan gagal panen sampai 50 % (Pracaya, 1994).

Layu *Fusarium* biasanya menyerang tanaman cabe pada pH tanah yang asam (≤ 6) dan tanah yang banyak mengandung unsur Nitrogen dan sedikit unsur Kalium (Pracaya, 1994). Gejala penyakit pada tanaman adalah tulang daun sebelah atas memucat, kemudian diikuti dengan menunduknya tangkai, busuk basah pada berkas pembuluh dan agak berbau amoniak (Pratnanto, 2002).

Penyakit layu *Fusarium* atau sering disebut penyakit panama pada tanaman merupakan penyakit yang paling berbahaya dan dapat menyebabkan kerugian lebih dari 35 persen. *Fusarium oxysporum sp.*, merupakan salah satu patogen tular tanah yang dapat mengakibatkan kehilangan hasil yang sangat signifikan di Indonesia. Serangan penyakit ini pada tanaman menunjukkan gejala menguningnya daun dan layu pada daun. Penguningan ini mulai dari pinggir daun, diikuti oleh pecah batang dan perubahan warna pada saluran pembuluh, ruas daun pendek serta perubahan warna pada daun (Nurhayati dkk., 2012).

Batang yang terserang patogen ini biasanya mengeluarkan bau busuk. Patogen masuk melalui akar dan masuk ke dalam bonggol dan merusak pembuluh sehingga tanaman layu dan akhirnya mati. Penyakit dapat menyebar melalui air ke tanaman yang sehat dengan cepat (Ploetz, 2006).

Selama ini pengendalian penyakit menggunakan bahan kimia yang tidak saja berbahaya bagi lingkungan tetapi juga berbahaya bagi kesehatan. Penggunaan bahan kimia yang semakin meningkat mengakibatkan beberapa pengaruh negatif seperti timbulnya agensia yang resisten (Anitha dan Rabeeth, 2009). Akhir-akhir ini telah banyak dikembangkan pengendalian untuk menekan pertumbuhan patogen dengan menggunakan beberapa agensi hayati (Ramesh dkk., 2009).

Pencegahan serangan penyakit layu *Fusarium* sp. yang sering dilakukan adalah dengan penggunaan pestisida. Secara teknis penggunaan pestisida sebaiknya dihindari karena dapat memberikan dampak negatif terhadap manusia dan lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, diupayakan alternatif lain untuk mengendalikan patogen penyebab penyakit tanaman yaitu dengan penggunaan agen hayati, di antaranya cendawan *Trichoderma harzianum*, *Gliocladium* dan *Aspergillus*. Alternatif ini disebut biopestisida (Sastra 1990).

Cendawan antagonis *Trichoderma* sp dapat diisolasi dari tanah lokal, termasuk cendawan selulolitik sejati karena mampu menghasilkan komponen selulase secara lengkap. Cendawan tanah ini terdiri dari sembilan jenis yaitu *Trichoderma piluliferum*, *Trichoderma polysporum*, *Trichoderma koningii*, *Trichoderma auroviride*, *Trichoderma amantum*, *Trichoderma harzianum*, *Trichoderma longibrachiatum*, *Trichoderma pseudokoningii*, dan *Trichoderma viride* (Raharjo Budi, dkk., 2008).

Trichoderma sp. merupakan cendawan antagonis yang sangat penting untuk pengendalian hayati. Mekanisme pengendalian *Trichoderma* sp yang bersifat spesifik target, koloni *rhizosfer* dengan cepat dan melindungi akar dari serangan cendawan patogen, mempercepat pertumbuhan tanaman dan meningkatkan hasil produksi tanaman, menjadi keunggulan lain sebagai agen pengendali hayati. Aplikasi dapat

dilakukan melalui tanah secara langsung. Selain itu *Trichoderma* sp sebagai jasad antagonis mudah dibiakkan secara massal dan mudah disimpan dalam waktu lama (Cholil, 1991).

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat aplikatif (in vitro), sebelum biopestisida ini dilakukan di alam (lingkungan), meskipun masih harus dilakukan banyak uji-uji aklimasi setelahnya. sebelumnya penulis pernah melakukan penelitian di LIPI BOGOR yaitu uji antagonis *Trichoderma* sp dan *Fusarium* sp. dengan sampel yang sama dari limbah tetapi penelitian sebelumnya menggunakan abu dari sekam padi maka dari itu penulis melanjutkan penelitian sebelumnya dengan mencoba sampel dari limbah pertanian.

Penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian tentang Uji sensitivitas (antagonis) *Trichoderma* sp dan *Fusarium* sp. menggunakan abu dari limbah kulit jagung sebagai media tumbuh dan bahan makanan dari cendawan patogen, karena sampai saat ini belum banyak penelitian ilmiah yang menggunakan abu dari limbah kulit jagung yang dipakai sebagai media pertumbuhan untuk cendawan dan juga penulis berinisiatif memakai bahan abu dari limbah kulit jagung karena banyaknya limbah kulit jagung yang kurang dimanfaatkan serta kandungan kulit jagung berupa karbohidrat, glukosa, lemak, protein, dan mineral dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan buat pertumbuhan cendawan. selain dari abu sekam padi

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Bagaimana sensitivitas *Trichoderma* sp dengan menggunakan medium cair YMGP (Yeast Malt Glukosa Pepton) yang dicampur dengan abu dari limbah kulit jagung terhadap pertumbuhan *Fusarium* sp ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

1. Isolat *Trichoderma* sp dan *Fusarium* sp. didapatkan dari jurusan hama dan penyakit fakultas pertanian UNHAS.
2. Penelitian ini dilakukan dengan pemberian limbah pertanian seperti kulit jagung ke dalam medium cair YMGP sebagai tempat tumbuh dari *Trichoderma* sp.
3. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan 20 Juni 2015. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji antagonis untuk melihat apakah *Trichoderma* sp dapat melawan hiperparasit *Fusarium* sp setelah *Trichoderma* sp ditumbuhkan di medium cair YMGP yang sudah diberikan limbah pertanian seperti kulit pisang dan kulit jagung. Pengamatan dilakukan pada saat medium yang sudah ditumbuhkan *Trichoderma* sp dan *Fusarium* sp. berumur tiga hari.

D. Kajian Pustaka

Pada tahun 2002 penelitian Soesanto dkk dan pada tahun 2004 Winarni penelitiannya menunjukkan adanya beragam isolat *Fusarium* sp. di Jawa Tengah dengan kepatogenan beragam pada tanaman jahe, dan dipilih sembilan isolat. Pengendalian yang sering dilakukan adalah penggunaan pestisida kimia. Namun demikian, penggunaan bahan kimia sering menimbulkan residu pada lingkungan dan membunuh organisme bukan sasaran. Oleh karena itu, upaya pengendalian yang efektif dan ramah lingkungan perlu dilakukan, salah satunya adalah penggunaan *Trichoderma harzianum*, yang telah diketahui sebagai agensia antagonis yang mampu menekan *Fusarium* sp. pada tanaman jahe (Soesanto dkk., 2005). Selain itu, *Trichoderma harzianum* ternyata mampu mengendalikan *Fusarium* sp. pada kapas dan melon (Soesanto dkk., 2002).

Cendawan antagonis tanah isolat lokal seperti *Trichoderma* sp dilaporkan mempunyai aktivitas antagonisme yang kuat terhadap cendawan patogen dengan

mekanisme hiperparasitismenya dan antibiosisnya sehingga efektif menghambat pertumbuhan cendawan patogen tanaman dengan mendegradasi dinding selnya. Dinding sel cendawan patogen menjadi rusak kemudian mati melalui aktivitas enzim kitinasenya. Beberapa enzim kitinolitiknya hanya toksik pada cendawan patogen penyebab penyakit tanaman budidaya tetapi namun tidak pada mikroorganisme lain dalam tanah dan tumbuhan inang (Budi raharjo, dkk.,2008).

Hasil penelitian Soesanto dkk, (2002) dan Winarni (2004) telah terpilih sembilan isolat, yang berasal dari daerah penanaman jahe yang berbeda dan juga terdapat tanaman kencur, sehingga dimungkinkan cendawan patogen tersebut dapat menyerang ke pertanaman kencur di lapang. Oleh sebab itu, dilakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan *Trichoderma harzianum* terhadap sembilan isolat *Fusarium sp* secara *in planta* dan terhadap hasil tanaman kencur, tetapi yang perlu dikembangkan dari penelitian ini adalah penggunaan bahan baku umum seperti kencur yang dimana bahan baku tersebut sudah banyak digunakan jadi harus di kembangkan kembali dengan hal yang belum pernah dilakukan di penelitian seperti mengganti bahan baku utamanya dengan limbah pertanian. (Prabowo, dkk., 2010).

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

Untuk mengetahui sensitivitas pertumbuhan cendawan *Trichoderma sp* terhadap penggunaan medium cair YMGP dengan tambahan abu dari kulit jagung dalam uji antagonis melawan *Fusarium sp*.

1. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjadi bahan informasi kepada petani dan masyarakat tentang limbah pertanian yang dapat dijadikan sebagai campuran dalam pembuatan pupuk organik.
2. Sebagai bahan informasi kepada petani dan masyarakat tentang agen pengendali cendawan *Trichoderma sp* terhadap penyakit layu *Fusarium sp*.
3. Sebagai bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Uraian *Trichoderma sp*

Trichoderma sp merupakan cendawan asli tanah yang bersifat menguntungkan karena mempunyai sifat antagonis yang tinggi terhadap cendawan-cendawan patogen tanaman budidaya. Mekanisme pengendalian yang bersifat spesifik target dan mampu meningkatkan hasil produksi tanaman, menjadi keunggulan tersendiri bagi cendawan *Trichoderma sp*, Ini sebagai agen pengendali hayati (Hastuti budi, dkk.,2009).



Gambar 3.1. Morfologi *Trichoderma sp*. (Ramadani, 2013).

1. Morfologi

Beberapa ciri morfologi cendawan *Trichoderma sp* antara lain :

- a. Koloninya berwarna hijau muda sampai hijau tua yang memproduksi konidia aseksual berbentuk globus dengan konidia tersusun seperti buah anggur dengan pertumbuhan yang sangat cepat.

- b. Cendawan tersebut merupakan salah satu jenis cendawan mikro parasitik yang artinya bersifat parasit terhadap jenis cendawan lain (Yudiarti, 2012).

2. Habitat

Trichoderma sp merupakan cendawan asli tanah dimana *Trichoderma sp* ini bersifat spesifik ke targetnya serta mampu meningkatkan kualitas hasil produksi tanaman (Hastuti budi, dkk., 2009).

3. Manfaat

Pemanfaatan *Trichoderma sp* sebagai agen pengendali hayati cendawan patogen seperti *Fusarium sp.* dan *Phytophthora infestans* merupakan salah satu alternatif penting untuk mengendalikan cendawan patogen tersebut tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan (Hastuti budi, dkk., 2009).

Cendawan *Trichoderma sp* memiliki kemampuan dalam menghambat pertumbuhan cendawan patogen karena menghasilkan lipase yang dapat memecah senyawa kitin, glukukan dan lemak dinding sel patogen (Vinale dkk.,2008).

Cendawan *Trichoderma sp* menghasilkan enzim hidrolitik β -1,3 glukukanase, kitinase dan selulase. Enzim kitinase mampu menyebabkan kerusakan sel cendawan patogen yang akhirnya dapat menyebabkan kematian sel cendawan patogen (Umrah dkk., 2009).

Mekanisme antagonis cendawan *Trichoderma sp* yaitu dengan kompetisi makan, ruang, parasitisme, dan lisis (Sunarwati dan Yoza, 2010).

Mikroba antagonis atau APH (agen pengendali hayati) penyakit tanaman adalah jasad renik yang diperoleh dari alam, baik berupa bakteri, cendawan, *actinomycetes* maupun virus yang dapat menekan, menghambat atau memusnahkan OPT (organisme pengganggu tanaman) Pengendalian hayati adalah suatu tindakan yang bertujuan mereduksi kepadatan inokulum atau aktivitas patogen sehingga tidak

menimbulkan gejala pada tanaman, dengan menggunakan satu atau lebih APH melalui manipulasi lingkungan, inang atau antagonistik. Adapun mekanisme penekanan perkembangan penyakit dapat berupa antibiosis. Berbagai spesies mikroorganisme telah berhasil diisolasi dan dievaluasi keefektifannya sebagai APH penyakit tanaman dan diformulasi dalam bentuk biopestisida. APH dapat dikelompokkan ke dalam golongan bakteri, cendawan/ cendawan, *actinomycetes*, dan virus. Kelompok bakteri yang telah digunakan sebagai APH antara lain adalah *Trichoderma* sp (Hanudin, 2012).

Kelompok cendawan yang telah digunakan sebagai APH penyakit tanaman adalah *Trichoderma harzianum* dan *Gliocladium* sp Selanjutnya telah memproduksi secara massal biofungisida berbahan aktif *Trichoderma* sp dalam bentuk tepung yang diberi nama Bio-Tri dengan biaya produksi Rp 8.000/kg. Cendawan lain yang berpotensi sebagai APH penyakit tanaman yaitu *Fusarium* sp. nonpatogenik (Maryono, 2007).

4. Penyakit Busuk *Trichoderma* sp

Penyakit busuk *Trichoderma* sp menyerang jeruk lemon yang disimpan beberapa bulan pada suhu 14°C dan juga pada jeruk orange yang dikapalkan pada suhu 10°C hanya udara biasa yang berventilasi (berjendela). Penyakit ini dianggap kelas dua setelah penyakit busuk hijau pada jeruk orange yang dikapalkan dari Afrika selatan ke Kerajaan Serikat (*United Kingdom*) yang biasa disalahtafsirkan dengan inggris (Martoredjo, 2010).

Gejala: konidia dipencarkan dengan butir tanah atau cendawan yang dapat menginfeksi buah bila bersinggungan langsung dengan kotak simpan kayu terinfeksi. Luka yang relatif dalam diperlukan sebagai persyaratan infeksi. Infeksi buah lebih sering terjadi bila minyak kulit dibersihkan. Infeksi dapat terjadi di semua bagian

buah, tetapi yang umum pada pangkal buah tempat melekatnya ujung tangkai buah dan pada ujung buah tempat bekas pangkal tangkai putik (Martoredjo, 2010).

Buah yang sakit menjadi coklat dan kulit sakit tetap seperti kulit. Hifa udara dapat tumbuh dari buah yang sakit ke buah di dekatnya. Patogen tidak dapat menginfeksi buah sehat secara langsung, tetapi cairan dari buah sakit merusak kulit buah didekatnya memungkinkan cendawan menginfeksi melalui luka tersebut. Buah yang merupakan sarang patogen yang tertutup oleh miselium dan konidia cendawan sering ditemukan dalam simpanan atau tempat pengapalan. Penyebab utamanya adalah *Trichoderma* sp yang tumbuh safrofitis pada tanah atau bahan kayu karena mempunyai enzim selulitik yang sangat aktif (Martoredjo, 2010).

Pengendalian dapat dilakukan dengan cara perlakuan dalam larutan boraks, sodium karbonat, sodium o-phenylphenate, dan panas (suhu 40°C) yang diikuti benomil hasilnya baik. Pendinginan buah yang cepat pada suhu 10°C mencegah penyebaran konidia dan penyimpanan 4°C mencegah perkembangan penyakit dalam buah yang sakit (Martoredjo, 2010).

5. Klasifikasi

Klasifikasi cendawan *Trichoderma* sp adalah sebagai berikut

Kerajaan : Fungi

Kelas : Deuteromycetes

Bangsa : Moniliales

Suku : Moniliaceae

Marga : *Trichoderma*

Species : *Trichoderma* sp (Raharjo Budi, dkk., 2008).

B. Uraian *Fusarium sp.*

Fusarium sp. adalah salah satu genus cendawan berfilamen yang banyak ditemukan pada tanaman dan tanah. Cendawan *Fusarium sp.* merupakan patogen tular tanah yang termasuk parasit lemah. Cendawan ini menular melalui tanah atau rimpang yang berasal dari tanaman sakit, dan menginfeksi melalui luka. Luka tersebut dapat terjadi karena pengangkutan benih, penyiangan, pembumbunan, atau karena serangga dan nematoda. Apabila kondisi lingkungan tidak menguntungkan, cendawan bertahan hidup dalam bagian tanaman, baik di lapangan maupun selama masa penyimpanan. Pada saat kondisi lingkungan menguntungkan, cendawan akan tumbuh dan berkembang pada bagian tanaman dan menular ke bagian tanaman lain (Yudiarti, 2012).



Gambar 3.2. Morfologi *Fusarium sp.* (Alexander, 2010).

1. Morfologi

Miselium cendawan ini bersekat terutama terdapat di dalam sel, khususnya di dalam pembuluh kayu. Di samping itu cendawan membentuk miselium yang terdapat di antara sel-sel, yaitu dalam kulit dan di jaringan parenkim di dekat tempat terjadinya infeksi. Pada medium PDA mula-mula miselium berwarna putih, semakin tua warna menjadi krem atau kuning pucat, dalam keadaan tertentu berwarna merah muda agak ungu. Miselium bersekat dan membentuk percabangan. Beberapa isolat *Fusarium sp.* akan membentuk pigmen biru atau merah di dalam medium (Rahayuniati, 2010).

Di alam cendawan ini membentuk konidium pada suatu badan buah yang disebut *sporodokium*. Konidiofor bercabang-cabang rata-rata mempunyai panjang 70 μm . Cabang-cabang samping biasanya bersel satu, panjangnya sampai 14 μm . Konidium terbentuk pada ujung cabang utama atau cabang samping. Mikrokonidium sangat banyak dihasilkan oleh cendawan pada semua kondisi, bersel satu atau bersel dua, hialin, jorong atau agak memanjang, berukuran 5-7 x 2.5-3 μm , tidak bersekat atau kadang-kadang bersekat satu dan berbentuk bulat telur atau lurus. Makrokonidium berbentuk sabit, bertangkai kecil, kebanyakan bersel empat, hialin, berukuran 22-36 x 4-5 μm . Klamidospora bersel satu, jorong atau bulat, berukuran 7-13 x 7-8 μm , terbentuk di tengah hifa atau pada makrokonidium, seringkali berpasangan (Yudiarti, 2012).

2. Penyakit *Fusarium* sp.

Fusarium sp. merupakan salah satu cendawan patogen penting penyebab penyakit layu *Fusarium* sp pada tanaman tomat. Cendawan dapat menyebabkan kerugian besar pada tanaman (Rahayuniati, dkk.,2010).

Pengendalian yang telah dilakukan, baik dengan fungisida kimia sintetis maupun varietas tahan belum memberikan hasil yang memuaskan. Bahkan penggunaan fungisida sintetis dapat menyebabkan dampak negatif (Rahayuniati, dkk.,2010).

Pengendalian penyakit karena *Fusarium* sp. dapat dilakukan dengan menambahkan cendawan antagonis dan bahan organik ke dalam tanah. Pengendalian menggunakan agensia hayati merupakan pilihan yang perlu dikembangkan, sebab relatif murah dan mudah dilakukan, serta bersifat ramah lingkungan (Rahayuniati, dkk., 2010).

Cendawan *Fusarium* sp. dapat mengakibatkan warna benih berubah, perkecambahan terhambat, dan dapat menyebabkan penyakit di persemaian atau pada tanaman dewasa di lapangan. Selama biji atau benih dalam penyimpanan, aktivitas cendawan tersebut terhenti (istirahat) karena syarat untuk pertumbuhannya tidak terpenuhi (Rahayuniati, *dkk.*,2010).

Pengaruh infeksi cendawan tentunya akan berbeda tergantung pada jenis dan umur atau tahapan perkembangan tanaman mulai dari bibit sampai tanaman dewasa. Hal ini disebabkan karena tingkat ketahanan secara individual terhadap cendawan dipengaruhi oleh genotip, tingkat perkembangan dan lingkungan serta interaksi antara faktor-faktor tersebut (Soesanto, 2008).

3. Klasifikasi

Kingdom : Fungi

Filum : Deuteromycota

Kelas : Deuteromycetes

Ordo : Moniliales

Family : Tuberculariaceae

Genus : *Fusarium*

Spesies : *Fusarium* Sp (Arie, 2012).

C. Uraian Limbah Pertanian

1. Kulit Jagung (*Zea mays*)

Di daerah Indonesia bagian timur, jerami jagung selain diberikan dalam bentuk segar, dapat dikeringkan atau diolah menjadi pakan awet seperti pelet dan disimpan untuk cadangan pakan ternak (Sudradjat, 2004).

Jagung (*Zea mays*) adalah merupakan tanaman pangan yang penting di Indonesia. Pada tahun 2006, luas panen jagung adalah 3,5 juta hektar dengan

produksi rata-rata 3,47 ton/ha, produksi jagung secara nasional 11,7 juta ton. Limbah batang dan daun jagung kering adalah 3,46 ton/ha sehingga limbah pertanian yang dihasilkan sekitar 12.1 juta ton. Dengan konversi nilai kalori 4370 kkal/kg (Sudradjat, 2004).



Gambar 3. 3. Limbah Pertanian Kulit Jagung (Ningsi rahayu, 2012).

1. Manfaat

Kulit jagung merupakan bahan buangan (limbah buah jagung) yang cukup banyak jumlahnya. Pada umumnya kulit jagung belum dimanfaatkan secara nyata, hanya dibuang sebagai limbah organik saja atau digunakan sebagai makanan ternak atau sebagian masyarakat menggunakannya dengan membuat kerajinan dari kulit jagung. Jumlah kulit jagung yang cukup banyak akan memiliki nilai jual yang menguntungkan apabila bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku makanan (Anggraeny dkk., 2006). Kulit buah jagung/klobot jagung adalah kulit luar buah jagung yang biasanya dibuang. Kulit jagung manis sangat potensial untuk dijadikan silase karena kadar gulanya cukup tinggi (Anggraeny dkk., 2006).

Limbah tanaman jagung juga dapat dimanfaatkan untuk pakan, tetapi hanya untuk ternak ruminansia karena tingginya kandungan serat. Jerami jagung merupakan bahan pakan penting untuk sapi pada saat rumput sulit diperoleh, terutama pada musim kemarau. Jerami jagung yang diawetkan dengan pengeringan matahari menghasilkan hay dan disimpan oleh petani untuk persediaan pakan sapi pada musim kemarau. Dengan berkembangnya usaha penggemukan sapi impor atau berkembangnya industri sapi perah, seluruh tanaman jagung dapat dimanfaatkan sebagai pakan. Jagung ditanam secara khusus untuk menggantikan rumput. Tanaman jagung pada umur tertentu, terutama ketika bulir mulai tumbuh, mempunyai nilai gizi yang tinggi untuk sapi (Angreany dkk., 2006).

2. Kandungan

Jumlah dari kulit jagung cukup banyak, yaitu kira-kira 1/2 dari buah jagung yang belum dikupas dan dipanen. Kandungan unsur gizi kulit jagung, seperti karbohidrat, lemak, glukosa, protein, dan air (Angreany dkk., 2006).

Limbah jagung sebagian besar adalah bahan berlignoselulosa yang memiliki potensi untuk pengembangan produk masa depan. Seringkali limbah yang tidak tertangani akan menimbulkan pencemaran lingkungan. Pada dasarnya limbah tidak memiliki nilai ekonomi, bahkan mungkin bernilai negatif karena memerlukan biaya penanganan. Namun demikian, limbah lignoselulosa sebagai bahan organik memiliki potensi besar sebagai bahan baku industri pangan, minuman, pakan, kertas, tekstil, dan kompos. Lignoselulosa terdiri atas tiga komponen fraksi serat, yaitu selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Dari ketiga komponen tersebut, selulosa merupakan komponen yang sudah dimanfaatkan untuk industri kertas. Menumpuknya limbah kulit jagung yang banyak dapat dimanfaatkan secara optimal. Hal inilah yang

mendorong untuk melakukan percobaan pembuatan pulp dari kulit jagung sebagai bahan alternatif (Rahayu, 2012).

Potensi energi limbah pada komoditas jagung sangat besar dan diharapkan akan terus meningkat sejalan dengan program pemerintah dalam meningkatkan produksi jagung secara nasional. Namun, limbah jagung memiliki banyak kegunaan, diantaranya adalah untuk pakan ternak, dalam hal ini pemerintah telah mencanangkan program pengembangan peternakan secara terintegrasi (Crop Livestock System/CLS). Oleh karena itu, optimasi pemanfaatan limbah jagung sangat diperlukan untuk mendapatkan keuntungan yang optimal. Untuk memperkirakan potensi riil energi limbah jagung, penggunaan tongkol jagung untuk keperluan bahan bakar sekitar 90% sedangkan limbah batang dan daun sekitar 30% dari potensi yang ada (Wikan, 2010).

Limbah perkebunan jagung bukanlah pakan yang berkualitas baik karena mengandung kadar protein dan karotenoid yang rendah dan kadar serat yang tinggi dan juga mudah ditumbuhi cendawan pada kondisi suhu panas. Bila limbah perkebunan ini diberikan kepada ternak tanpa disuplementasi atau diberi perlakuan sebelumnya maka nutrisi limbah ini tidak akan cukup untuk mempertahankan kondisi ternak. Oleh sebab itu, disarankan pencampuran jerami jagung dengan leguminosa sebagai sumber protein ketika akan diberikan ke ternak atau bila hendak dibuat silase (Elita, dkk., 2010).

Penggunaan limbah hasil pertanian/perkebunan sebagai pakan ternak terlihat mudah dan ekonomis, namun perlu memperhatikan akan timbulnya residu kimiawi di dalam produk ternak yang dihasilkan serta kandungan anti nutrisi atau toksin yang terdapat di dalam limbah hasil pertanian tersebut. Beberapa tanaman pangan maupun

perkebunan dilaporkan terdapat toksin dan anti nutrisi yang dapat mempengaruhi kesehatan ternak (Subhan, 2006).

3. Klasifikasi :

Kingdom : Plantae

Super Divisi : Spermatophyta

Divisi : Magnoliophyta

Kelas : Liliopsida

Ordo : Poales

Famili : *Poaceae*

Genus : *Zea*

Spesies : *Zea mays* (Neny iryani, dkk., 2010).

D. Metode Uji Antagonis

Uji antagonis merupakan uji yang bertujuan untuk mengetahui daya hambat mikroorganisme satu dengan yang lain. Dalam penelitian dilakukan uji antagonis bertujuan untuk mengetahui daya hambat isolat *Trichoderma sp* terhadap cendawan layu batang *Fusarium sp*.


Teknik pembuatan abu pada limbah pertanian dilakukan dengan mengeringkan limbah pertanian (kulit jagung) pengeringan bertujuan untuk mengurangi kadar air yang terkandung didalam limbah pertanian tersebut atau cara alternatif lainnya bisa dilakukan dengan cara limbah di keringkan dalam oven. Setelah itu limbah pertanian tersebut dibakar ke dalam tanur dengan suhu 17°C selama 10 menit sampai limbah tersebut menjadi abu yang halus.

E. Ayat Al – Qur'an yang Relevan

Al Quran memiliki kesempurnaan yang luar biasa semua ilmu pengetahuan dibahas di dalamnya tidak terkecuali ilmu pertanian dan biologi, yang di bahas

didalamnya, Allah swt memberikan sebuah pengertian dan cara manusia untuk bercocok tanam pertanian untuk kehidupan untuk makan sebagai melengkapi kebutuhan jasmaninya, dengan protein, vitamin, karbohidrat, lemak, gizi dan lain sebagainya yang semuanya ada di tumbuhan, maka untuk itu Allah swt menurunkan segudang ilmu pertanian melalui ayatnya.

Allah berfirman dalam QS. Asy-Syu'ara/ 26: 7 yaitu sebagai berikut :




Terjemahanya :

Dan Apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik ?

Menurut Tafsir Al-Mishbah Quraish Shihab (2002) ayat ini membuktikan tentang keesaan Allah swt. Yang telah menciptakan aneka tumbuhan yang terhampar di persada bumi sedemikian banyak dan bermanfaat lagi berbeda-beda, jenis, rasa dan warnanya, namun keadaanya konsisten. Itu semua tidak mungkin tercipta dengan sendirinya, pasti ada Penciptanya lagi maha Esa dan maha Kuasa. Disisi lain tanah yang gersang melalui hujan yang diturunkan-Nya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Inipun menunjukkan kuasa-Nya menghidupkan yang mati demikian juga manusia yang mati dan telah terkubur di bumi. Allah swt kuasa menghidupkan mereka kembali, serupa dengan menghidupkan pepohonan yang tumbuh di tanah yang gersang itu.

Allah swt juga berfirman dalam QS. Ad-Dukhaan/ 44: 39 yaitu sebagai berikut:



Terjemahnya:

“Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan haq, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui”.


Berdasarkan ayat di atas, dapat diketahui bahwa Allah swt menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya dengan *haq*, yakni selalu disertai dengan kebenaran dan bertujuan benar, bukan permainan atau kesia-siaan. Segala sesuatu yang diciptakan-Nya memiliki persiapan-persiapan yang telah matang yang memiliki manfaat atau hikmah dalam hidup Allah swt menciptakan mikroorganisme di dunia ini sesuai fungsinya masing-masing seperti cendawan *Trichoderma sp* yang memiliki fungsi untuk menghambat atau membunuh cendawan yang bersifat hiperparasit dengan kemampuannya mengendalikan hayati. Oleh karena itu hendaknya kita memperhatikan alam dan segala keajaibannya dan dengan pengetahuan yang benar kita dapat mengetahui rahasia dan dapat mengambil manfaat dari apa yang disimpan di dalam perut bumi maupun yang tampak pada permukaannya, yang dapat membawa kemajuan bagi umat manusia.

Selama ini pengendalian penyakit menggunakan bahan kimia yang berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan. Penggunaan bahan kimia sebagai pupuk yang semakin meningkat mengakibatkan beberapa pengaruh negatif seperti timbulnya agensia yang resisten yang dapat merusak pertumbuhan pada tanaman. Maka dari itu pada penelitian ini dilakukan uji antagonis dengan menambahkan limbah sebagai bahan makanan untuk cendawan *Trichoderma sp* untuk melawan


cendawan hiperparasit yang dapat menyebabkan penyakit layu pada tanaman yaitu *Fusarium sp.*

F. Kerangka Pikir


INPUT:



PROSES:



OUTPUT:



BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan secara eksperimental. Lokasi penelitian di Laboratorium Mikrobiologi Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan eksperimental kualitatif yang terdiri dari tiga perlakuan dan tiga ulangan.

C. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini yaitu limbah pertanian kulit jagung. Sampel penelitian ini yaitu limbah pertanian kulit jagung.

D. Variabel Penelitian

Pada penelitian ini variabel tunggal, yaitu sensitivitas pertumbuhan *Trichoderma sp* dengan menggunakan medium cair YMGP dengan tambahan abu dari limbah kulit jagung dalam uji antagonis melawan *Fusarium sp*.

E. Definisi Operasional Variabel

1. Kulit jagung merupakan limbah pertanian (limbah buah jagung) yang cukup banyak jumlahnya. Kulit jagung digunakan sebagai bahan tambahan untuk

pertumbuhan cendawan *Trichoderma sp* Dalam penelitian ini kulit jagung berfungsi sebagai sumber makanan untuk cendawan *Trichoderma sp* karena kulit jagung mengandung karbohidrat, protein dan glukosa. Sebelum dijadikan makanan untuk cendawan limbah jagung dikeringkan kemudian diolah menjadi abu yang selanjutnya dicampurkan ke dalam medium cair sebagai tempat tumbuh dan sumber makanan dari cendawan *Trichoderma sp*.

2. *Trichoderma sp* merupakan cendawan asli tanah yang bersifat menguntungkan karena mempunyai sifat antagonis yang tinggi terhadap cendawan patogen tanaman budidaya. Penggunaan *Trichoderma sp* dalam penelitian karena *Trichoderma sp* bersifat spesifik target dan mampu meningkatkan hasil produksi pada tanaman. Pemanfaatan *Trichoderma sp* sebagai agen pengendali hayati cendawan pathogen merupakan salah satu alternatif penting untuk mengendalikan cendawan patogen tersebut tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Trichoderma sp berasal dari biakan murni yang isolatnya diambil dari Fakultas Pertanian UNHAS yang akan ditumbuhkan ke pada media PDA dan diperbanyak kemudian ditumbuhkan kembali ke dalam media cair YMGP, yang kemudian akan diamati daya hambatnya terhadap *Fusarium sp* ditandai dengan tumbuhnya spora.

3. *Fusarium sp* adalah salah satu genus cendawan berfilamen yang banyak ditemukan pada tanaman dan tanah. Cendawan *Fusarium sp*. merupakan cendawan patogen tular tanah yang termasuk parasit lemah. *Fusarium sp* merupakan cendawan yang dapat menyebabkan penyakit layu pada tanaman. Penggunaan cendawan *Fusarium sp*, karena sifat parasit seperti kemampuannya yang dapat merusak tanaman dan salah satu cendawan yang

bisa di uji antagonis dengan *Trichoderma sp* Isolat murni *Fusarium sp* diperoleh dari Fakultas Pertanian UNHAS.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan melakukan uji antagonis kemudian dilakukan pengamatan.

G. Alat dan Bahan

Alat yang digunakan didalam penelitian ini adalah gelas ukur, tabung reaksi, oven atau tanur, ose, *Lamina air flow*, autoclave, double shaker gelas kimia, labu Erlenmeyer, cawan petri, timbangan analitik, lampu spritus, dan kapas.

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Trichoderma sp*, *Fusarium sp*. yang diambil dari Fakultas Pertanian Unhas, PDA (*Potato Dextrosa Agar*), Yeast ekstrak, Malt ekstrak, Glukosa, Pepton, Limbah pertanian dari kulit jagung, aquadest, dan aluminium foil.

H. Prosedur Kerja

1. Pembuatan Media

- a. Menimbang bahan baku pembuatan Media

Media yang akan dipakai adalah *Potato Dextrose Agar* (PDA) pada cawan petri dan tabung reaksi. Medium PDA dibuat dengan melarutkan 10 gram PDA pada 250 ml aquades yang telah disiapkan di labu Erlenmeyer setelah itu ditutup dengan sumbat kapas, kertas dan plastik tahan panas, kemudian campuran disterilkan di autoclave selama 2 jam pada suhu 121°C.

- b. Pembuatan Abu dari Limbah Kuli Jagung

Pembuatan abu dari limbah kulit jagung pertama dengan mengambil limbah kulit jagung. Kemudian limbah di keringkan selama 2 Jam, setelah kadar airnya berkurang limbah dimasukkan ke dalam oven selama 15 menit dengan suhu 140°C memastikan agar limbah sudah tidak mengandung air. Kemudian limbah dibakar sampai limbah tersebut berwarna hitam (menjadi abu).

c. Pembuatan Media Cair YMGP (Yeast, Malt, Glucosa, Pepton)

Pembuatan media cair YMGP pertama menimbang *yeast extract* 0,3 gram, *malt extract* 0,3 gram, Glukosa 1 gram dan pepton 0,5 gram setelah masing-masing ditimbang kemudian disatukan atau dicampur dimasukkan ke dalam erlenmeyer dan di larutkan ke dalam 100 ml aquades. Setelah itu ditutup dengan sumbat kapas, kertas, dan plastik tahan panas kemudian setelah di tutup di sterilkan ke dalam *autoclave* selama 2 jam dengan suhu 121°C.

d. Peremajaan biakan *Fusarium sp* dan *Trichoderma sp*

Proses peremajaan dilakukan pada *Lamina Air Flow* agar tidak terkontaminasi atau tetap pada keadaan steril. Penanaman mikroba dilakukan dengan cara menginokulasikan misellium *Fusarium sp* dan *Trichoderma sp* yang telah ditumbuhkan pada medium plat agar, kemudian diinkubasi selama 7 hari sampai terlihat adanya pertumbuhan spora.

e. Pembuatan Media Cair dengan Abu dari limbah kulit jagung

Mengambil *Trichoderma sp* dari tabung reaksi dengan memasukkan air atau aquadest steril sebanyak 1 ml, kemudian kerok *Trichoderma sp* dari media PDA sampai habis. Masukkan kerokan *Trichoderma sp* beserta aquadest 10 ml kedalam tiga erlenmeyer masing-masing diberi tanda media kontrol, konsentrasi 1 gr, konsentrasi 3 gr, dan konsentrasi 5 gr. Pada media cair YMGP kemudian homogenkan dengan menggunakan *shaker* hingga mikroba *Trichoderma sp*

tumbuh kembali ditandai adanya penggumpalan dalam media cair YMGP berwarna putih.

Kemudian mengambil abu dari limbah kulit jagung dengan menimbanginya sebanyak 1 gr, 3 gr, dan 5 gr abu dari limbah pertanian kulit jagung kemudian dimasukkan kedalam Erlenmeyer yang sudah diberi tanda label untuk konsentrasi 1 gr, 3 gr, dan 5 gr . Kemudian Erlenmeyer yang sudah bertanda konsentrasi 1, 3, dan 5 gr masing-masing ditambahkan media cair YMGP yang didalamnya sudah homogen dengan *Trichoderma sp* sebanyak 1 ml. Setelah dimasukkan kedalam Erlenmeyer yang sudah tercampur kemudian ditambahkan dengan aquadest steril sebanyak 100 ml kemudian dihomogenkan dengan *shaker* selama 2 x 24 jam sampai tumbuhnya cendawan *Trichoderma sp*.

f. Pembuatan media padat dengan abu dari limbah kulit jagung

Media padat yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDA yang di campurkan abu dari limbah kulit jagung. Media PDA yang sudah dicampurkan dengan abu dari kulit jagung dengan berbagai konsentrasi 1 gr, 3 gr, dan 5 gr, kemudian setelah PDA dicampurkan dengan abu dari kulit jagung ditanam cendawan *Trichoderma sp* dengan inkubasi selama 7 hari.

2. Uji Antagonis

Menurut prosedur di laboratorium mikrobiologi LIPI uji antagonis ini dilakukan untuk mengetahui daya sumbat isolat dengan menggunakan limbah pertanian untuk menumbuhkan *Trichoderma sp* sebagai biokontrol *Fusarium sp*.

Mengambil cawan petri yang sudah diinokulasikan dengan *Fusarium sp* kemudian masing-masing diberi label agar dapat diketahui. Cawan petri yang sudah diberi tanda label kemudian dibolongkan di tengah dengan pipet sedotan yang steril. Kemudian ambil erlenmeyer kontrol kemudian memipet sebanyak 1 ml dan

dimasukkan kedalam cawan petri kontrol yang sudah dibolongkan. Kemudian ambil Erlenmeyer 1 gr kemudian memipet sebanyak 1 ml dan dimasukkan ke dalam cawan petri yang sudah dibolongkan.

Ambil erlenmeyer 3 gr dan 5 gr kemudian memipet sebanyak 1 ml dan dimasukkan ke dalam cawan petri yang sudah dibolongkan selanjutnya tahap akhir lakukan inkubasi pada cawan petri kontrol, 1 gr, 3 gr, dan 5 gr selama 7 hari atau lebih sampai terlihat adanya pertumbuhan spora cendawan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian



Pada penelitian ini sebelum melakukan uji sensitivitas atau antagonis terlebih dahulu sampel utama abu dari kulit jagung ditimbang dengan masing-masing konsentrasi 1 gr, 3 gr, dan 5 gr yang konsentrasi masing-masing dari abu kulit jagung dicampur kedalam media cair YMGP dan dicampurkan juga dengan *Trichoderma sp* yang sudah dikerok kemudian secara bersamaan di shaker selama 2x 24 jam kemudian jika sudah terlihat adanya pertumbuhan *Trichoderma sp* dalam medium cair tersebut maka dilanjutkan dengan uji sensitivitas .

Selain media cair YMGP pada penelitian ini juga dilakukan pada media padat PDA yang dicampurkan abu dari limbah kulit jagung. Media padat PDA yang dicampur dengan abu limbah jagung ini hanya sebagai pembanding.

Keberhasilan pada uji sensitivitas *Trichoderma sp* melawan *Fusarium sp* ini dapat ditandai dengan tumbuhnya *Trichoderma sp* yang mampu menutupi pertumbuhan dari *Fusarium sp* sehingga yang mendominasi pertumbuhan di dalam cawan petri adalah *Trichoderma sp*.

Pada uji sensitivitas ini dilakukan beberapa konsentrasi 1 gr, 3 gr, dan 5 gr juga terdapat kontrol sebagai pembanding dari beberapa konsentrasi tersebut.

Tabel 4.1. Hasil Penelitian Uji sensitivitas *Trichoderma sp* dengan *Fusarium sp*.

Perlakuan	Hasil Gambar	Keterangan
Kontrol		Sensitif
1 gram		Sensitif
3 gram		Sensitif

5 gram		Sangat sensitif
--------	---	-----------------

B. Pembahasan

Cendawan patogen *Fusarium oxysporum* sp merupakan jamur tular tanah penyebab penyakit busuk rimpang jahe (Kurniawan albertus dkk., 2006).

Pengendalian yang sering dilakukan adalah penggunaan peptisida kimia. Namun demikian, penggunaan bahan kimia sering menimbulkan residu pada lingkungan dan membunuh organisme bukan sasaran. Oleh karena itu upaya pengendalian yang efektif dan ramah lingkungan dan ramah lingkungan perlu dilakukan salah satunya adalah penggunaan *Trichoderma sp* yang telah diketahui sebagai agensia antagonis yang mampu menekan *Fusarium sp* (Kurniawan albertus dkk., 2006).

Trichoderma sp merupakan cendawan antagonis yang sangat penting untuk pengendalian hayati Mekanisme pengendalian *Trichoderma sp* yang bersifat spesifik target, mengkoloni *rhizosfer* dengan cepat dan melindungi akar dari serangan cendawan patogen, mempercepat pertumbuhan tanaman dan meningkatkan hasil produksi tanaman, menjadi keunggulan lain sebagai agen pengendali hayati. Aplikasi dapat dilakukan melalui tanah secara langsung, melalui perlakuan benih maupun melalui kompos atau dengan biopestisida. Selain itu *Trichoderma sp* sebagai jasad

antagonis mudah dibiakkan secara massal, mudah disimpan dalam waktu lama dan dapat diaplikasikan sebagai *seed furrow* dalam bentuk tepung atau butiran (Purwantisari Susiana, dkk., 2009).

Media cair YMGP menggunakan tambahan abu kulit Jagung sebagai media tumbuh *Trichoderma sp* (setelah di shaker 2x24 jam). Media cair YMGP (yeast, malt, glukosa, pepton) merupakan media cair yang dibuat sebagai bahan makanan untuk cendawan *Trichoderma sp* selain bahan makanan media cair YMGP berfungsi sebagai tempat tumbuh bagi cendawan patogen seperti *Trichoderma sp*, Karena kandungan dari media cair tersebut dapat memicu pertumbuhan *Trichoderma sp* secara cepat.

Konsentrasi 1 gr media cair YMGP yang dicampur dengan abu dari limbah kulit jagung pada konsentrasi tersebut cendawan *Trichoderma sp* tumbuh dengan cepat media cair tapi sampai hari ke 7 pertumbuhan *Trichoderma sp* tidak banyak sama halnya pada konsentrasi 3 gr pertumbuhan *Trichoderma sp* cepat namun tidak terlalu banyak berbeda dengan konsentrasi paling tinggi 5 gram *Trichoderma sp* tumbuh lama tetapi pada hari ke 7 tumbuh banyak di permukaan media cair YMGP yang dicampur dengan abu dari limbah kulit jagung. Pada konsentrasi 5 gr disimpulkan bahwa konsentrasi tersebut sangat sensitif dikarenakan abu dari limbah kulit jagung sangat cukup karena pemanfaatan limbah abu kulit jagung sebagai sumber bahan organik untuk memacu pertumbuhan *Trichoderma sp* sebagai pesaing *Fusarium sp*.

Pada penelitian sebelumnya peneliti menggunakan konsentrasi 12 gr, 18 gr dan 24 gr tetapi sama sekali tidak ada terlihat pertumbuhan *Trichoderma sp*, setelah peneliti mengurangi konsentrasi menjadi 5 gr barulah terlihat adanya pertumbuhan *Trichoderma sp*.

Hal ini terjadi karena pekatnya media cair sehingga pertumbuhan *Trichoderma sp* tidak bisa terlihat dengan jelas, dapat disimpulkan bahwa sesuatu yang berlebihan tidak baik.

Media padat PDA menggunakan tambahan abu kulit jagung sebagai media tumbuh *Trichoderma sp*. Pertumbuhan cendawan *Trichoderma sp* pada media padat sama halnya dengan pertumbuhan *Trichoderma sp* pada media cair pertumbuhan cepat tumbuh pada konsentrasi 1 dan 3 gram namun *Trichoderma sp* yang tumbuh tidak terlalu banyak berbeda halnya dengan konsentrasi 5 gr yang kecepatan tumbuh cendawan *Trichoderma sp* tidak cepat namun pada konsentrasi ini *Trichoderma sp* tumbuh banyak sampai menutupi diameter dari cawan petri tersebut. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi konsentrasi maka semakin banyak pula makanan untuk *Trichoderma sp* seperti yang diketahui PDA adalah makanan pokok dari cendawan serta adanya tambahan bahan makanan dari abu kulit jagung yang mengandung karbohidrat, lemak, protein dan mineral yang sangat disukai oleh cendawan *Trichoderma sp*.

Uji antagonis merupakan suatu penekanan pertumbuhan dan perkembangan patogen yang meliputi antibiosis yang merupakan penghambatan, pertumbuhan atau perkembangan dan penghancuran suatu organisme oleh hasil metabolisme organisme lain. Hasil metabolisme tersebut bersifat racun dan dikenal sebagai antibiotik. Pada tahun 1971 penelitian Dennis dan Webster menyebutkan bahwa *Trichoderma sp* menghasilkan antibiotik. Kemudian kompetisi terjadi apabila dua atau tempat yang sama dan memperebutkan sumber nutrisi seperti karbon (carbon (C)), nitrogen (N), dan besi (Fe), termasuk oksigen, cahaya, air, dan hiperparatisme yang merupakan bentuk penghambatan dan penghancuran oleh agen pengendali dengan memarasit

cendawan patogen melalui hifa dan dapat pula menyebabkan lisis hifa cendawan patogen (Joni, 2011).

Mekanisme penghambatan yang terjadi pada uji antagonis ini adalah antibiosis yaitu hubungan antara 2 mikroorganisme yang salah satunya menghambat pertumbuhan organisme lain dan hiperparasit yang dapat diamati dengan adanya miselium atau spora sebagai zona penghambat pertumbuhan bagi *Fusarium sp* dan *Trichoderma sp* yang salah satunya dapat menutupi seluruh permukaan media pada salah satu mikroba (Joni ph, 2011).

Beberapa keuntungan dan keunggulan *Trichoderma sp* yang lain adalah mudah dimonitor dan dapat berkembang biak, sehingga keberadaannya di lingkungan dapat uji antagonisme cendawan patogen bertahan lama serta aman bagi lingkungan, hewan dan manusia lantaran tidak menimbulkan residu kimia berbahaya yang persisten di dalam tanah (Purwantisari Susiana, dkk., 2009).

Abu dari limbah kulit jagung yang digunakan pada penelitian ini diambil dari pasar tradisional Sungguminasa Kabupaten Gowa. Sebelum dijadikan abu, sampel limbah kulit jagung dicuci bersih kemudian dikeringkan selama 2 jam kemudian sampel dikeringkan lagi di oven selama 24 jam. Limbah kulit jagung yang telah dikeringkan kemudian dibakar manual sampai diperoleh abu.

Pada penelitian dilakukan untuk melihat pengaruh pemberian abu dari limbah kulit jagung terhadap pertumbuhan cendawan *Trichoderma sp* dalam melakukan uji antagonis melawan cendawan hiperparasit *Fusarium sp* Konsentrasi yang digunakan dalam penelitian adalah 1 gr, 3 gr, dan 5 gr abu dari limbah kulit jagung.

Penelitian yang dilakukan terlihat pada media kontrol, media 1 gr, media 3gr, dan media 5 gr sesudah di shaker sudah bisa terlihat bahwa cendawan yang

telah di tumbuhkan dengan diberi dua perlakuan dengan diberi abu dari kulit jagung dan tidak diberi Abu kulit jagung sudah terlihat dari hari keempat sampai sudah tumbuh berkembang hal ini terjadi karena cendawan *Trichoderma sp* yang telah di beri abu kulit jagung. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan *Trichoderma sp* pada medium tersebut salah satunya adalah karena abu dari kulit jagung mengandung unsur karbohidrat, lemak, protein, glukosa dan mineral dimana *Trichoderma sp* sangat menyukai.

Pertumbuhan cendawan *Trichoderma sp* yang paling cepat pada konsentrasi 1 gram tetapi pertumbuhan pada konsentrasi 1 gram ini tidak memenuhi cawan petri sama halnya dengan kontrol kecepatan tumbuh cendawannya cepat tetapi tidak terlalu memenuhi diameter pada cawan petri tersebut, sedangkan pada konsentrasi 5 gram walaupun pertumbuhannya tidak lebih cepat dari konsentrasi 1 gram dan 3 gram tetapi konsentrasi 5 gram tumbuh dengan sempurna dengan diameter yang hampir menutupi cawan petri sehingga *Fusarium sp* semakin terdesak karena kahabisan ruang tumbuh dan *Fusarium sp* dimakan habis oleh cendawan patogen *Trichoderma sp*. Akibatnya jari-jari pertumbuhan biakan *Fusarium sp* yang mendekati biakan *Trichoderma sp* lebih kecil dari pada yang menjauhi *Trichoderma sp*. Ruang dalam medium sudah benar-benar habis, maka *Fusarium sp* tumbuh dengan arah tumbuh ke atas.

Trichoderma sp banyak diteliti dan di aplikasikan dalam pengendalian cendawan patogen tanah. Kemampuan *Trichoderma sp* menghasilkan antibiotik menyebabkan terhambatnya pertumbuhan cendawan patogen yang ada di sekitarnya, disamping itu keberadaan *Trichoderma sp* dapat membuat keasaman tanah (pH) menjadi tidak optimum bagi patogen, sehingga terjadi ketidak seimbangan

konsentrasi nutrisi dan selanjutnya tidak dapat dimanfaatkan oleh patogen dan pada akhirnya mampu menekan infeksi.

Pada penelitian hari ketujuh konsentrasi 5 gram tumbuh dengan sempurna hingga menutupi seluruh permukaan cawan petri karena pada konsentrasi tersebut abu dari kulit jagung banyak sehingga cendawan patogen seperti *Trichoderma sp* dapat tumbuh banyak karena kandungan dari abu kulit jagung kaya akan karbohidrat, lemak, glukosa, protein, dan air, sehingga cendawan patogen dapat tumbuh subur dan mampu melawan cendawan yang hiperparasit.

Hal ini menunjukkan bahwa spora *Trichoderma sp* telah menyerang *Fusarium sp* dengan mekanisme penetrasi hifa yaitu kemampuan *Trichoderma sp* melilit hifa *Fusarium sp*, yang dimana *Fusarium sp.* habis karena *Trichoderma sp* mampu mendominasi pertumbuhan di cawan petri.

Menurut Weller dan Cook, (1983) bahwa untuk menstabilkan efektifitas agensia hayati harus diformulasikan. Beberapa laporan menyebutkan bahwa *Trichoderma sp* telah diformulasikan dalam bentuk cair, tepung dan kompos. Perkembangbiakan *Trichoderma sp* akan terjadi bila hifa jamur mengadakan kontak dengan bahan organik seperti kompos, bekatul atau beras jagung (Soesanto, dkk., 2013).

Hal ini membuktikan bahwa abu dari kulit jagung mampu memacu pertumbuhan *Trichoderma sp* untuk menghambat pertumbuhan dan perkembangan *Fusarium sp* hal ini bisa juga dikatakan hiperparatisme dimana hiperparatisme adalah bentuk penghambatan dan penghancuran oleh agen pengendali dengan memarasit cendawan patogen melalui hifa.

Hasil penelitian Kurniawan, dkk, (2006) bahwa *Trichoderma sp* menghasilkan enzim β - (1-3) glukonase dan kitinase yang menyebabkan eksolisis

pada patogen sehingga menyebabkan hancurnya dinding sel cendawan *Fusarium sp*. Pengamatan *in vitro* setelah patogen mati terlihat bahwa cendawan antagonis tumbuh terus menutupi permukaan koloni cendawan patogen. Hal ini membuktikan bahwa cendawan antagonis *Trichoderma sp* dapat digunakan untuk mengendalikan cendawan patogen.

Persaingan antar mikroorganisme, akan menyebabkan perubahan kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan patogen, sehingga patogen tidak dapat berkembang dengan sempurna (Joni, 2011).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Limbah kulit jagung yang ditambahkan pada cair YMGP menunjukkan hasil pertumbuhan yang baik pada *Trichoderma sp* yaitu pada konsentrasi 5 gr dan pada konsentrasi tersebut pula *Trichoderma sp* juga menunjukkan hasil yang sangat sensitif terhadap pertumbuhan *Fusarium sp*.

B. Saran

Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan optimasi media abu dari kulit jagung dan mekanismenya dalam mempercepat dan memperkuat pertumbuhan cendawan *Trichoderma sp* dalam uji antagonis melawan *Fusarium sp*.

DAFTAR PUSTAKA

- Agrios, G. N. Ilmu Penyakit Tumbuhan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1996.
- Alexander. Growth big Fertilizer. 2010. (Diakses 30 Januari 2015).
- Anitha, A and M. Rabeeth. Control of fusarium wilt of tomato by bioformulation of *Sterptomyces griseun* in green house condition. Africa Journal of basic and applied science 1(1-2):9-14. 2009. (Diakses 30 Januari 2015).
- Anggreny, *dkk.* 2006. Potensi limbah jagung siap rilis sebagai sumber hijauan sapi potong. Prosiding Lokakarya Nasional Jejaring Pengembangan Sistem Integrasi Jagung-Sapi. Direktorat Jendral Produksi Peternakan. Buku Statistik Peternakan. Departemen Pertanian, Jakarta 149-153. Puslitbangnak, Pontianak, 9-10 Agustus, 2006. (Diakses 7 Desember 2014).
- Budi harjo, *dkk.* 2009. Uji antagonism cendawan patogen *Phytopora infestans* penyebab penyakit busuk daun dan umbi tanaman kentang menggunakan *Trichoderma sp.* Laboratorium Mikrobiologi Jurusan Biologi FMIPA, UNDIP. (Diakses 22 januari 2015).
- Cholil, A dan Latief Abadi. *Penyakit-penyakit penting tanaman pangan*. Pendidikan Program Diploma Satu Pengendalian Hama Terpadu. Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang. 2010. (Diakses 11 Desember 2014).

- Endah, H.J. *Mengendalikan Hama dan Penyakit Tanaman*. Agro Media Pustaka: Jakarta, 2002.
- Elita dkk. *Bio Energi Berbasis Jagung dan Pemanfaatan Limbahnya*. Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian Serpong. Badan Litbang Pertanian. Departemen Pertanian. 2010. (Diakses 7 Desember 2014).
- Hanudin dan Budi Marwoto. *Prospek Penggunaan Mikroba Antagonis Sebagai pengendali Hayati Penyakit Utama Pada Tanaman Hias dan Sayuran*. Balai Penelitian Tanaman Hias. 30 Januari 2012.
- Hastuti Rini Budi dan Susiana Purwantisari. *Laboratorium Mikrobiologi Jurusan Biologi FMIPA Undip. Uji Antagonisme Cendawan Patogen *Phytophthora infestans* Penyebab Penyakit Busuk Daun dan Umbi Tanaman Kentang Dengan Menggunakan *Trichoderma* spp. Isolat Lokal*. ISSN: 1410-8801. Vol. 11, No. 1, Hal. 24-32. BIOMA, Juni 2009. (Diakses 5 Desember 2014).
- Joni, ph. *Mekanisme Pengendali Hayati Penyakit Tumbuhan*. PS Hama dan Penyakit Tumbuhan Fakultas Pertanian Universitas Palembang, 2011. (Diakses 15 Agustus 2015).
- Kurniawan albertus, dkk. *Potensi Trichoderma harzianum Dalam mengendalikan Sembilan isolate Fusarium oxysporum SCHLECHT. f. sp. Zingiberi TRUJILLO Pada kencur*. Jurusan HPT Fakultas Pertanian. Unsoed Purwokerto, 2006. (Diakses 15 Agustus 2015).
- Martoredjo Toekidjo. *Ilmu Penyakit Pascapanen*. Cetakan kedua. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Maryono T. *Uji Antagonis Trichoderma sp. Terhadap Phytophthora palmivora Penyebab b. Fusarium sambucinum yang diisolasi dari jaringan Busuk Buah Kakao*, http://www.digilib.unila.ac.id/.laptunilapp_gdlres.2008_trimaryono_1228 . 2007. (Diakses 5 Desember 2014).
- Neny iriani dkk. *Asal, sejarah, evolusi dan taksonomi tanaman*. Balai Penelitian Tanaman Serelia Maros. 2010. (Diakses 30 Januari 2015).
- Ningsih Rahayu Eva. *Digester Test Run on Corn's Skin Pulping Proceswith Temperature and Time Cooking Variable*. Universitas Diponegoro. Semarang. 2012. (Diakses 15 Januari 2015).
- Nurhayati dkk. *Antagonism of pseudomonas fluorescen migule asal tanah cabe & jagung terhadap Fusarium oxysporum f. sp. Cubence penyebab penyakit layu pada pisang*. Faculty of agriculture, Sriwijaya University. 2012. (Diakses 30 Januari 2015).

- Ploetz, R. C. Fusarium-induced diseases of tropical, perennial crops. J. Phytopathol. 96:648-652. 2006. (Diakses 30 Januari 2015).
- Prabowo. (*POTENCY OF Trichoderma harzianum IN CONTROLLING NINE ISOLATES OF Fusarium oxysporum SCHLECHT. F.SP. zingiberi TRUJILLO ON GALANGA*). 2010. (Diakses 3 Desember 2014).
- Pratnanto, F. Kiat Sukses Bertanam Cabai di Musim Hujan. Penebar Swadaya: Jakarta, 2002.
- Pracaya. Bertanam Lombok. Penerbit Kanisius: Jakarta, 1994.
- Raharjo Budi, Purwantisari susiana, dan Rejeki Siti Ferniah. Pengendalian Hayati Penyakit Lodoh (Busuk Umbi Kentang) Dengan Agens Hayati. Cendawan-cendawan Antagonis Isolat Lokal. Lab. Mikrobiogenetika Jurusan Biologi FMIPA Undip. ISSN: 1410-8801. Vol. 10, No. 2, Hal. 13-19. 2008. (Diakses 3 Desember 2014).
- Rahayuniati Ruth Feti, Loekas Soesanto dan Endang Mugiastuti. Kajiann Mekanisme Antagonis Pseudomonas Fluorencens P60 Terhadap Fusarium sp. Lycopersici pada tanaman Tomat In Vivo. Vol. 10, No. 2: 108 – 115, September 2010. (Diakses 5 Desember 2014).
- Ramesh, R., A. A. Joshi and M.P. Ghanekar.. Pseudomonas: Majorendophytic bacteria to suppress bacterial wilt pathogen *Ralstonia solanacearum* the egg plant (*Solanum melongena* L.). World Journal of Microbiology and Biotechnology. 25:47-55. 2009. (Diakses 30 Januari 2015).
- Ramadhina arie. PENGGUNAAN CENDAWAN ANTAGONIS *Trichoderma* sp. Dan *Gliocladium* sp. UNTUK MENGENDALIKAN PENYAKIT LAYU (*Fusarium oxysporum*). DEPARTEMEN HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN , FAKULTAS PERTANIAN , UNIVERSITAS SUMATERA UTARA , MEDAN. 2012. (Diakses 3 Desember 2014).
- Sabiha Ramadani. *Trichoderma* sp Agen Pengendali Hayati Pengendali Penyakit Tanaman. Fakultas Pertanian Brawijaya Malang. 2013. (Diakses 30 Januari 2015).
- Sastra hidayat, I.R. *Ilmu Penyakit Tumbuhan*. Usaha Nasional: Surabaya, 1990
- Sunarwati, dan R Yoza, 2010. Kemampuan *Trichoderma* dan *Penicillium* dalam Menghambat Pertumbuhan Cendawan Penyebab Penyakit Busuk Akar Durian (*Phytophthora palmivora*) secara in Vitro. 2010. (Diakses 5 Desember 2014).

- Sudradjat, R. The Potential of Biomass Energy Resources in Indonesia for the Possible Development of Clean Technology Process (CTP). Proceedings (Complete Version) International Workshop on Biomass & Clean Fossil Fuel Power Plant Technology: Sustainable Energy Development & CDM, pp. 36–59. 2004. (Diakses 7 Desember 2014).
- Soesanto, L. Pengantar Pengendalian Hayati Penyakit Tanaman. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2008. (Diakses 5 Desember 2014).
- Soesanto loekas., dkk. Uji kesesuaian empat isolate *Trichoderma* sp dan daya hambat in vitro terhadap beberapa patogen tanaman. Fakultas pertanian dan Biologi. Universitas jendral soedirman. 2013. (Diakses 30 Agustus 2015).
- SUBHAN A. Janggal jagung fermentasi sebagai pakan alternatif untuk ternak sapi pada musim kemarau. Prosiding Lokakarya Nasional Jejaring Pengembangan Sistem Integrasi Jagung-Sapi. Puslitbangnak, , p. 193-196. Pontianak, 9-10 Agustus 2006. (Diakses 5 Desember 2014).
- Umrah, T Anggraeni, RR Esyanti, dan INP Aryantha. Antagonisitas dan efektivitas *Trichoderma* sp dalam menekan perkembangan *Phytophthora palmivora* pada buah kakao. *J. Agroland* 16 (1) : 9– 16. 2009. (Diakses 2 Desember 2014).
- Vinale F, K Sivasithamparam, EL Ghisalberti, R Marra, SL Woo, dan M Lorito. *Trichoderma*–plant–pathogen interactions. *Review Article. Soil Biology & Biochemistry*, 40: 1–10. 2008. (Diakses 7 Desember 2014).
- Widodo Wikan. *Bio Energi Berbasis Jagung dan Pemanfaatan Limbahnya*. Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian Serpong Badan Litbang Pertanian, Departemen Pertanian, Tromol Pos 2 Serpong, Tangerang 15310 BANTEN. 2010. (Diakses 15 Januari 2015).
- Winarni, W. Uji Patogenisitas Beberapa Isolat *Fusarium oxysporum* Schlecht f.sp. *zingiberi* Trujillo. Dalam: L. Soesanto (Ed.), *Prosiding Simposium Nasional I tentang Fusarium*, PFI Komda Purwokerto dan Jurusan HPT Fakultas Pertanian Unsoed, Purwokerto 26-27 Agustus. 2004. (Diakses 7 Desember 2014).
- Yudiarti Turrini. Ilmu Penyakit Tumbuhan. Cetakan kedua. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Lampiran

1. Komposisi media PDA (Potato Dextro Agar)

Komposisi media PDA adalah:

1. Potato dextro agar 4,0 g/l
2. Glukose 20,0 g/l
3. Agar 15,09 g/l

2. Komposisi media Cair YMPG

media cair YMGP

yeast extract 0,3 gram,

malt extract 0,3 gram

Glukosa 1 gram


pepton 0,5 gram


Setelah masing-masing di timbang kemudian di satukan atau dicampur dimasukkan ke dalam erlenmeyer dan di larutkan ke dalam 100 ml aquadest.

3. Limbah Pertanian Kulit Jagung

Limbah pertanian kulit jagung di bakar sampai menjadi abu kemudian ditimbang sebanyak 1 gram, 3 gram, dan 5 gram.



Alur Penelitian





Alur Penelitian Optimasi media pertumbuhan *Trichoderma sp* dengan menggunakan limbah pertanian dengan biokontrol *Fusarium sp*.

LAMPIRAN GAMBAR



Sampel *Fusarium sp* dan *Trichoderma sp*

LIMBAH KULIT JAGUNG



BAHAN PEMBUATAN MEDIA CAIR





Penimbangan Bahan untuk pembuatan Media Cair



Media Cair



Abu Kulit Jagung





Abu kulit jagung yang dimasukkan ke dalam medium cair YMGP



Proses pengerokan *Trichoderma* sp






Media Cair YMGP Kontrol



Media Cair YMGP 1 %



Media Cair YMGP 3 %



Media Cair YMGP 5 %



**Gambar Media Cair Kontrol
Sebelum di shaker**




**Gambar Media Cair 1 %
Sebelum di shaker**



**Gambar Media Cair 3 %
Sebelum di Shaker**


**Gambar Media Cair 5 %
Sebelum di Shaker**



Medium yang akan di shaker selama 2x 24 jam


**Gambar Media Cair Kontrol
Setelah di Shaker**

**Gambar Media Cair 1 %
Setelah di Shaker**




**Gambar Media Cair 3 %
Setelah di Shaker**

**Gambar Media Cair 5 %
Setelah di Shaker**






Media Padat yang terbuat dari media cair yang di campur dengan PDA




Uji antagonis kontrol



Uji antagonis 1 gram



Uji antagonis 3 gram



Uji antagonis 5 gram



RIWAYAT HIDUP

Humaerah Arifuddin. lahir Makassar 22 Januari 1993 adalah anak pertama dari pasangan Drs. Arifuddin Dj dan Hj Johriati S. Ag. Penulis menempuh pendidikan taman kanak-kanak di TK Kartika Wirabuana Kodim kemudian setelah menamatkan TK selama 1 tahun, penulis melanjutkan pendidikannya ke jenjang SD di SD NEG Mangasa Gowa selama 6 tahun, penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di Islamic Boarding School Abnaul Amiir Gowa. Pada tahun 2007 penulis melanjutkan pendidikannya dijenjang Sekolah Menengah Akhir (SMA) di SMK KESEHATAN TERPADU MEGA REZKY Makassar selama 3 tahun dengan mengambil jurusan ANALIS KESEHATAN. Setelah lulus dari SMK KESEHATAN MEGA REZKY Makassar pada tahun 2010 penulis melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi di Universitas Muslim Indonesia Jurusan Hukum selama 1 tahun. Kemudian pada tahun 2011

penulis melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam Negeri Makassar dengan melulusi ujian tes tertulis SNMPTN jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi.