

**KOMPOSISI JENIS ZOOPLANKTON DI PERAIRAN SUNGAI
JE'NEBERANG SUNGGUMINASA KECAMATAN SOMBA OPU
KABUPATEN GOWA**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar sarjana Sains Jurusan
Biologi pada fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar

Oleh :

RABANAI

NIM. 60300106037

**JURUSAN BIOLOGI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2010**

**KOMPOSISI JENIS ZOOPLANKTON DI PERAIRAN SUNGAI
JE'NEBERANG SUNGGUMINASA KECAMATAN SOMBA OPU
KABUPATEN GOWA**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar sarjana Sains Jurusan
Biologi pada fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar

Oleh :

RABANAI

NIM. 60300106037

**JURUSAN BIOLOGI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2010**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul, “ Komposisi Jenis Zooplankton di Perairan Sungai Je’neberang Sungguminasa Kec. Somba Opu. Kab. Gowa ” yang disusun oleh Rabanai, NIM: 60300106037, mahasiswa jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari rabu, tanggal 18 Agustus 2010 M, bertepatan dengan 25 Sya’ban 1431 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Sains dan Teknologi, Jurusan Biologi (dengan beberapa perbaikan).*

Makassar, 18 Agustus 2010 M
25 Sya’ban 1431 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Ir. Syarif Beddu M. T	(.....)
Sekretaris	: Drs. M. Arif Alim M. Ag	(.....)
Munaqisy I	: Hafsan S. Si., M. Pd	(.....)
Munaqisy II	: Cut Muthiadin S, Si., M. Si	(.....)
Munaqisy III	: Prof. Dr. H. Bahaking Rama, M. S	(.....)
Pembimbing I	: Hj Ernawati S Kaseng S. Pi., M. Si	(.....)
Pembimbing II	: Sitti Saenab S. Pd., M. Pd	(.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. Bahaking Rama ,M. S.
NIP. 19520709 198103100. 1

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, dibuat atau dibantu orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, Agustus 2010

Penulis

Rabanai

NIM: 60300106037

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan taufik-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Shalawat dan salam tidak lupa penulis haturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sampai sekarang.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian yang tertuang dalam bentuk skripsi ini adalah usaha maksimal dari penulis yang sudah barang tentu masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi teknis penulisan maupun pada tataran ruang lingkup pembahasannya. Oleh karena itu, segala bentuk koreksi dan kritikan yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini bukanlah hal yang mudah sehingga peran dan partisipasi dari berbagai pihak sangat berarti dan berguna bagi penulis dalam membantu menyelesaikan skripsi ini. Segala aral yang melintang dapat diatasi dengan usaha yang keras dan tawakkal.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ayahanda Lemba dg Jarre dan Ibunda tercinta Basse dg Kanang yang telah melahirkan, mengasuh dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang serta selalu memotivasi penulis untuk senantiasa berkarya dan beribadah. Salam hormat dan maaf penulis bila belum mampu memberikan yang terbaik.
2. Prof. Dr. H. Azhar Arsyad , M. A. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar.

3. Prof. Dr. H. Bahaking Rama, M. S. selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
4. Fatmawati Nur, S. Si., M. Si. selaku ketua jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dan Hafsan, S. Si., M. Pd. selaku Sekretaris Jurusan Biologi.
5. Hj Ernawati S. Kaseng S. Pi., M. Si dan Sitti Saenab S. Pd., M. Pd selaku pembimbing I dan II, terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala arahan dan bimbingannya selama penyusunan skripsi.
6. Prof. Dr. H. Bahaking Rama, M. S, Hafsan S. Si., M. Pd, dan Cut Muthiadin S. Si., M. Si selaku penguji I, II, dan III, terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala kritik, saran, dan arahan yang membangun selama penyusunan skripsi.
7. Seluruh Staf pengajar terkhusus dosen Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi dan pegawai akademik Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yang telah banyak membimbing dan membantu penulis selama kuliah pada Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Biologi.
8. Dr. Inayah Yasir, M. Sc. selaku Kepala Laboratorium Biologi Laut FIKP UNHAS sekaligus yang membimbing penulis selama penelitian serta Mahasiswa-mahasiswi Jurusan Kelautan FIKP UNHAS Iwan, Febe, dan Cici yang telah banyak memberi pengetahuan dan membantu penulis selama penelitian.

9. Terkhusus kepada Khaerul Bayang, Accunk, Vina, Echi, Ahmad yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan moril serta material kepada penulis tanpa kalian saya tidak akan bisa.
10. Teman-teman yang telah banyak memberikan inspirasi dan motivasi, *Spesial For The big family Bio Science '06 , 07. 08, 09*, Terima kasih atas segala kenangan indah yang kalian berikan selama perkuliahan, serta senantiasa mengadakan simbiosis mutualisme dalam memberikan dukungan dan do'anya dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Teman-teman KKN Posko Parang Banoa : Saudaraku Muflihun, Irfan, Rhido, vina, Echi, k' Nisa. Ima, Ummul, dan Inna Terima kasih atas kesediannya yang pernah menciptakan suatu keluarga buat penulis selama di tempat KKN.

Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan dan partisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya penulis memanjatkan do'a kepada Allah SWT, semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis baik berupa moril maupun materi mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amien.

Makassar, Agustus 2010.

Penulis

Rabanai
NIM. 60300106037

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR ILUSTRASI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Mamfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Umum Sungai Je'neberang.....	7
B. Ekosistem Perairan Sungai.....	10
C. Tinjauan Umum Plankton.....	11
1. Zooplankton.....	17

2. Peranan Zooplankton Dalam Ekosistem.....	20
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyebaran Zooplankton.....	23
4. Produktivitas Zooplanton.....	32
5. Distribusi Zooplankton.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Variabel Penelitian.....	41
C. Defenisi Operasional Variabel.....	41
D. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian.....	42
E. Prosedur Penelitian.....	42
F. Analisis Data.....	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Hasil Pengamatan.....	46
B. Pembahasan.....	51
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	62

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I. Pengamatan Parameter Pada stasiun I Di Perairan Sungai Je'neberang Kec. Somba opu. Kab. Gowa.....	46
Tabel II. Pengamatan Parameter Pada stasiun II Di Perairan Sungai Je'neberang Kec. Somba opu. Kab. Gowa.....	47
Tabel III. Pengamatan Parameter Pada stasiun III Di Perairan Sungai Je'neberang Kec. Somba opu. Kab. Gowa.....	47
Tabel IV. Pengamatan Komposisi Jenis Zooplankton Pada stasiun I Di Perairan Sungai Je'neberang Kec. Somba opu. Kab. Gowa.....	48
Tabel V. Pengamatan Komposisi Jenis Zooplankton Pada stasiun II Di Perairan Sungai Je'neberang Kec. Somba opu. Kab. Gowa.....	49
Tabel VI. Pengamatan Komposisi Jenis Zooplankton Pada stasiun III Di Perairan Sungai Je'neberang Kec. Somba opu. Kab. Gowa.....	49

DAFTAR ILUSTRASI

	Halaman
Gambar 1. Wilayah Daerah Aliran Sungai Je'neberang.....	8
Gambar 2. Zooplankton Jenis <i>Brine Shrimp</i>	18
Gambar 3. Histogram Komposisi Jenis Zooplankton Pada Stasiun I Di Perairan Sungai Je'neberang.....	50
Gambar 4. Histogram Komposisi Jenis Zooplankton Pada Stasiun II Di Perairan Sungai Je'neberang.....	50
Gambar 5. Histogram Komposisi Jenis Zooplankton Pada Stasiun III Di Perairan Sungai Je'neberang.....	51

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran I. Deskripsi Lokasi Pengambilan Sampel.....	62
Lampiran II. Gambar Peta Lokasi Pengambilan Sampel Di Perairan Sungai Je'neberang.....	63
Lampiran III. Tabel Hasil Pengamatan Komposisi Jenis Zooplankton.....	64
Lampiran IV. Tabel Kelimpahan, Keanekaragaman dan Dominasi Jenis Zooplankton Pada Tiga Stasiun Pengamatan.....	75

ABSTRAK

Nama : Rabanai
Nim : 60300106037
Jurusan : Biologi
Fakultas : Sains dan Teknologi

Penelitian mengenai komposisi jenis zooplankton di perairan sungai Je'neberang Sungguminasa Kec. Somba Opu. Kab. Gowa bertujuan untuk mengetahui komposisi jenis zooplankton yang terdapat di perairan sungai Je'neberang sungguminasa Kec. Somba Opu. Kab. Gowa. Pengambilan sampel dilakukan di sungai Je'neberang dengan menggunakan plankton net no 25 pada selama tiga hari dan pengambilan sampel dilakukan pada malam hari yaitupada pukul 20.00- 22.00 Wita. Parameter yang diukur yaitu parameter biologi, fisika, dan kimia.

Penelitian ini bersifat *deskriptif* yang menggambarkan komposisi jenis zooplankton yang terdapat di perairan sungai Je'neberang pada tiga titik stasiun pengamatan dengan menggunakan metode *sedwicgk Rafter* (SRC) yang diamati dibawah mikroskop binokuler. Dari hasil penelitian pada tiga stasiun pengamatan ditemukan 26 jenis zooplankton yang termasuk dalam Filum *Arthropoda*, *Annelida*, *Asteroidae* dan *Cnidaria*. Komposisi jenis zooplankton pada semua stasiun pengamatan didominasi Kelas *Crustacea*. Kelimpahan zooplankton dari tiga stasiun berkisar antara 54 ind/m³ –702 ind/m³. Dari nilai indeks keanekaragaman dan dominasi secara umum diketahui bahwa perairan sungai Je'neberang memiliki keanekaragaman zooplankton yang rendah (< 2,30).

Kata kunci : Komposisi zooplankton, metode *sedgwick rafter*, dan sungai Je'neberang

ABSTRACT

Name : Rabanai
Nim : 60300106037
Majors : Biology
Faculty : Science and Tecnology

A research report of the composition of zooplankton species on Je'neberang river in Sungguminasa regency Somba Opu sub district. The objective of this research was to find out the composition of zooplankton species on Je'neberang river in Sungguminasa regency Somba Opu sub district. The sample was taken between 20.00-22.00 wita by using plankton net number 25 during three days. The parameter used was biology, physics and chemistry parameters.

This research employed *descriptive* method. It symbolized the composition of zooplankton species on Je'neberang river in Sungguminasa regency Somba Opu sub district on the three monitoring transports by using *Sedgwick rafter method* (SRC). It was monitored under binocular microscope. The finding of the research showed that there were 26 species of zooplankton included *Arthropod*, *Annelid*, *Asteroid*, and *Cnidaria filus*. The Composition of zooplankton in the three monitoring transports was dominated by *crustacean* class. The abundance of zooplankton was 54 ind/m³.-702 ind/m³. Based on the variety and dominan index, it can be concluded that Je'neberang river had the low variety of zooplankton. It was less than.

Keyword: composition of zooplankton, *sedgwick rafter* method, and Je'neberang river.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sungai Je'neberang merupakan sungai yang terletak di wilayah kabupaten Gowa dan sebagian berada pada bagian selatan di wilayah kota Makassar, ibu kota propinsi Sulawesi Selatan. Sungai ini berasal dan mengalir dari gunung Bawakaraeng dan gunung Lompobatang yang hilirnya di Selat Makassar. Pada daerah aliran sungai Je'neberang terdapat dua daerah penampungan air (*reservoir*) utama yaitu di desa Bili-bili dan Jenelata.¹

Secara geografis daerah aliran sungai Je'neberang terletak pada 119⁰23'50" BT-1190 56'10" BT dan 05⁰ 10'00" LS-05⁰26'00" LS dengan panjang sungai utamanya 78,75 km². Daerah aliran sungai Je'neberang dialiri oleh satu sungai pendukungnya (anak sungai) yaitu sungai Jenelata (220 km²). Jalur sungai Je'neberang meliputi wilayah Malino, Bili-bili, Sungguminasa dan Kota Makassar.²

Gunung dan sungai merupakan ciptaan Allah yang mempunyai manfaat dan tujuan tertentu. Firman Allah dalam Q.S. Ar ra'd (13) Ayat 3 sebagai berikut :

¹ Sandy, *Republik Indonesia Geografi Regional*, (Jakarta: Jurusan Geografi FMIPA UI-PT Indograf Bakti, 1996), h. 89

² *Ibid*

وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ
جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشَى اللَّيْلُ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ

يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾

Terjemahnya : Dan Dia-lah Tuhan yang membentangkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya. dan menjadikan padanya semua buah-buahan berpasang-pasangan, Allah menutupkan malam kepada siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan. Yang dimaksud berpasang-pasangan, ialah jantan dan betina, pahit dan manis, putih dan hitam, besar kecil dan sebagainya.³

Di dalam sungai hidup bermacam-macam plankton yang semuanya mempunyai manfaat. Plankton adalah organisme yang berukuran kecil yang hidupnya terbawa oleh arus. Plankton terdiri dari makhluk yang hidupnya sebagai hewan (zooplankton) dan sebagai tumbuhan (fitoplankton). Plankton merupakan makanan alami larva organisme perairan. Zooplankton disebut juga plankton hewani adalah hewan yang hidupnya mengapung, atau melayang di perairan. Kemampuan renangnya sangat terbatas hingga keberadaannya sangat ditentukan ke mana arus membawanya. Zooplankton bersifat heterotrofik, yang maksudnya tidak dapat memproduksi sendiri bahan organik dari bahan anorganik.

³Departemen Agama RI. *Alqur'an dan terjemahnya. CV, Di Ponegoro, 2007.*

Oleh karena itu untuk kelangsungan hidupnya, ia sangat bergantung pada bahan organik dari fitoplankton yang menjadi makanannya.⁴

Zooplankton merupakan biota yang sangat penting peranannya dalam rantai makanan pada suatu ekosistem. Zooplankton menjadi kunci utama dalam transfer energi dari produsen utama ke konsumen pada tingkatan pertama dalam tropik ekologi, seperti ikan laut, mamalia laut, penyu dan hewan terbesar di laut seperti halnya paus pemakan zooplankton (*Baleens whale*). Selain itu zooplankton juga berguna dalam regenerasi nitrogen di lautan dengan proses penguraiannya sehingga berguna bagi bakteri dan produktivitas fitoplankton di laut. Peranan lainnya yang tidak kalah penting adalah memfasilitasi penyerapan karbondioksida (CO₂) di perairan. Zooplankton memakan fitoplankton yang menyerap CO₂ dan kemudian setiap harinya turun ke bagian dasar laut untuk menghindari pemangsa di permukaan seperti ikan predator, sehingga karbon yang berada di dalam zooplankton tersebut dapat terendapkan di sedimen yang kemudian terendapkan dan terdegradasi. Oleh karena itu zooplankton memegang peranan dalam pendistribusian CO₂ dari permukaan ke dalam sedimen di dasar laut.⁵

⁴ Arinardi, O. H. *Status Pengetahuan Plankton di Indonesia*, (Oseanologi dan Limnologi di Indonesia. Puslitbang-LIPI. Jakarta. 1997). h. 27.

⁵ Richardson, A. J. *In hot water: zooplankton and climate change*, (ICES Journal of Marine Science, 2008). h. 65.

Lingkungan perairan sungai terdiri dari komponen abiotik dan biotik (*algal flora*) yang saling berinteraksi melalui arus energi dan daur hara (nutrien). Bila interaksi keduanya terganggu, maka akan terjadi perubahan atau gangguan yang menyebabkan ekosistem perairan itu menjadi tidak seimbang. Seperti halnya Sungai Je'neberang yang lahan di sekitar bantaran sungainya telah dimanfaatkan untuk permukiman dan aktivitas lainnya yaitu pertanian, industri, perkantoran dan perdagangan. Kegiatan pada lahan tersebut pada umumnya mengeluarkan limbah dan menghasilkan sampah yang langsung di buang ke dalam perairan sungai sehingga masuknya sumber-sumber pencemar tersebut menyebabkan penurunan kualitas perairan .⁶

Tingkat pencemaran limbah di Sungai Je'neberang semakin parah. Penggunaan air secara langsung dapat berdampak pada kondisi kesehatan manusia dan biota perairan. Pencemaran umumnya disebabkan zat terlarut dari penggunaan pupuk dan pestisida dari kegiatan pertanian dan peternakan. Indikator pencemarannya menggunakan *chemical oxygen demand* (COD), *biological oxygen demand* (BOD), dan *triple suspended solid* (TSS). Pencemaran terhadap air Sungai Je'neberang disebabkan oleh bahan kimiawi pada tanaman sayuran petani yang

⁶Hendrawan, D., M.F. Melati, and B. Bestari .*Kajian Kualitas Perairan Sungai*. Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah Lemlit Usakti 3 (15) . 2004, h. 54

saluran irigasinya mengarah ke sungai Jeneberang semakin memperparah tingkat pencemaran sungai.⁷

Mengingat peranan zooplankton yang sangat penting di perairan, maka keseimbangan ekosistem di perairan perlu dijaga tak terkecuali pada perairan sungai Jeneberang, Salah satu usaha yang dilakukan adalah mempertahankan keberagaman dari zooplankton. Untuk mengetahui keberagaman zooplankton dalam suatu perairan diperlukan penelitian mengenai komposisi jenis zooplankton. Sejauh ini belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji mengenai komposisi jenis zooplankton di perairan sungai Je'neberang. Terkait dengan hal tersebut maka sangat perlu dilaksanakan penelitian untuk mengetahui bagaimanakah komposisi jenis zooplankton yang terdapat di perairan sungai Je'neberang.⁸

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang tersebut maka peneliti merumuskan masalah yaitu bagaimanakah komposisi jenis zooplankton yang terdapat di perairan sungai Je'neberang?

C. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komposisi jenis zooplankton yang terdapat di perairan sungai Je'neberang.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid*

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan informasi bagi peneliti untuk dapat mengetahui komposisi jenis zooplankton yang terdapat di perairan sungai Je'neberang.
2. Sebagai data dasar untuk membandingkan keadaan sebaran zooplankton di perairan sungai Je'neberang didukung oleh parameter biologi, fisika dan kimia dalam pemanfaatan dan pengelolaannya secara optimal khususnya bagi sektor perikanan.
3. Sebagai bahan informasi kepada masyarakat tentang komposisi jenis zooplankton di perairan sungai Je'neberang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Sungai Je'neberang

Sungai Je'neberang merupakan sungai yang besar yang terletak di wilayah kabupaten Gowa dan sebagian berada pada bagian selatan wilayah kota Makassar, ibu kota propinsi Sulawesi selatan. Sungai ini berasal dan mengalir dari gunung Bawakaraeng dan gunung Lompobatang yang hilirnya di selat Makassar. Pada daerah aliran sungai Je'neberang terdapat dua daerah penampungan air (*reservoir*) utama yaitu di desa Bili-bili dan Jenelata.⁹

Secara geografis daerah aliran sungai Je'neberang terletak pada 119⁰23'50" BT-1190 56'10" BT dan 05⁰ 10'00" LS-05⁰26'00" LS dengan panjang sungai utamanya 78,75 km. Daerah aliran sungai Je'neberang dialiri oleh satu sungai pendukungnya (anak sungai) yaitu sungai Jenelata (220 km²). Jalur sungai Je'neberang meliputi wilayah Malino, Bili-bili Sungguminasa, dan kota Makassar.¹⁰

⁹ Sandy, *Republik Indonesia Geografi Regional*, (Jakarta: Jurusan Geografi FMIPA UI-PT Indograf Bakti, 1996), h. 89

¹⁰ *Ibid*

Berdasarkan sungai utama dan anak sungainya memiliki hulu di gunung Bawakaraeng dan gunung Lompobatang. Maka dapat digambarkan umum daerah aliran sungai Je'neberang keruangan yaitu:



Gambar 1. wilayah daerah aliran Sungai Je'neberang.¹¹

Sebagai sebuah ekosistem daerah aliran sungai, sungai Je'neberang sebenarnya masih mampu bertahan dari kondisi yang kritis sebagai sebuah daerah aliran sungai dimana penggunaan tanah hutan masih di atas 50% (Parameter sebagai daerah aliran sungai, kritis ialah jika kondisi hutan sudah di bawah 50%) yaitu sebesar 501,63 km² /69 % dari luas penggunaan tanah dalam satu daerah aliran sungai. Daerah aliran sungai adalah suatu tempat dengan pembatas fisik berupa

¹¹ *Ibid*

pegunungan dimana air hujan yang jatuh tepat berada pada daerah yang dibatasi oleh pegunungan dan memberi dampak terhadap penggunaan tanah disekitarnya.¹²

Muara sungai sangat penting peranannya di dalam kegiatan perikanan dan perhubungan, juga memiliki arti penting sebagai tempat berlabuh kapal-kapal perikanan, tempat pendaratan ikan, serta kegiatan lain dari wilayah hulu. Muara sungai merupakan bagian dari perairan umum yang secara hidrologis langsung dipengaruhi oleh pasang surut air laut dan tempat berkumpulnya nutrien dalam jumlah besar yang terbawa aliran sungai dari daerah hulu, menyebabkan perairan tersebut menjadi subur dan cocok untuk habitat berbagai macam jasad akuatik antara lain ikan, udang-udangan, kepiting dan kerang-kerangan.¹³

Muara sungai atau estuaria merupakan tempat bertemunya aliran sungai dengan lautan terbuka, sehingga wilayah perairan yang menuju ke arah laut meliputi bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alam yang terjadi di daratan, seperti aliran air tawar, gas-gas terlarut, sampah rumah tangga, limbah industri dan sebagainya. Wilayah perairan yang menuju ke arah daratan meliputi bagian darat yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat umum dari laut seperti pasang surut, salinitas, detritus, distribusi organisme air laut dan sebagainya. Dengan bergabungnya kedua sistem perairan tersebut menyebabkan muara sungai atau estuaria memiliki sejumlah karakteristik, seperti salinitas, substrat, detritus, aksi gelombang dan sifat lainnya.¹⁴

¹² *Ibid*

⁵ Fauji fitrianto, *Sifat Fisik Entuarin*, 2009, hal ,25

⁶ *ibid*

Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Ar-Furqaan ayat 53 yang berbunyi :

﴿ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ
وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا ﴾

*Terjemahnya: Dan Dialah yang membiarkan dua laut yang mengalir (berdampingan; yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit; dan Dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi.*¹⁵

Dan dalam surah Ar-Rahman ayat 19-20 yang berbunyi:

﴿ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ﴿١٩﴾
بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ ﴿٢٠﴾

*Terjemahnya: Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu, antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing*¹⁶

B. Ekosistem Perairan Sungai.

Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terdiri atas komponen-komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi sehingga membentuk satu

¹⁵ Departemaren Agama RI. *Alquran dan terjemahnya*. CV, Di Ponegoro , 2007.

¹⁶ Departemaren Agama RI. *Alquran dan terjemahnya*. CV, Di Ponegoro , 2007

kesatuan. Di dalam ekosistem perairan sungai terdapat faktor-faktor abiotik dan biotik (produsen, konsumen dan pengurai) yang membentuk suatu hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi. Perairan sungai merupakan salah satu bentuk ekosistem air tawar yang ada di permukaan bumi. Secara fisik, sungai merupakan suatu tempat yang luas yang mempunyai air yang mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah.¹⁷

Pada umumnya warna perairan dikelompokkan menjadi warna sesungguhnya dan warna tampak. Warna sesungguhnya dari perairan adalah warna yang hanya disebabkan oleh bahan-bahan terlarut, sedangkan warna tampak adalah warna yang tidak hanya disebabkan oleh bahan terlarut, tetapi juga oleh bahan tersuspensi. Warna perairan timbul disebabkan oleh bahan organik dan anorganik, keberadaan plankton, humus, dan ion-ion logam seperti besi(fe) dan mangan(Mn). Oksidasi fe dan Mn mengakibatkan perairan berwarna kemerahan dan kecoklatan atau kehitaman sedangkan oksidasi kalsium karbonat menimbulkan warna kehijauan. Bahan-bahan organik seperti tanin, lignin dan asam humus dapat menimbulkan warna kecoklatan di perairan. Perairan yang berwarna dapat menghambat penetrasi cahaya ke dalam air, sehingga proses fotosintesis menjadi terganggu.¹⁸

C. Tinjauan Umum Plankton

¹⁷ Southwood, T. R. E. dan P. A. Henderson. *Ecological methods 3 .ed, Blackwell science ltd. Oxford. UK.* 2000. h. 26.

¹⁸ Effendi, M. I. *Biologi Perikanan.* Yayasan Pustaka Nusatama, Yogyakarta. 2003. h. 21.

Plankton merupakan organisme permukaan yang terapung dan hanyut akibat pergerakan air. Istilah plankton baru diperkenalkan pada tahun 1887, tetapi penelitian plankton sudah lama dilakukan sejak tahun 1883 oleh J.V. thomsom.¹⁹

Plankton adalah suatu organisme yang terpenting dalam ekologi laut. Kemudian dikatakan bahwa plankton merupakan salah satu organisme yang berukuran kecil dimana hidupnya terombang-ambing oleh arus perairan laut.²⁰

Plankton adalah organisme yang hidupnya melayang atau mengambang di dalam air. Kemampuan geraknya, walaupun ada, sangat terbatas hingga organisme tersebut terbawa oleh arus namun, mempunyai peranan penting dalam ekosistem laut, karena plankton menjadi bahan makanan bagi berbagai jenis hewan laut lainnya. Selain itu hampir semua hewan laut memulai kehidupannya sebagai plankton terutama pada tahap masih berupa telur dan larva.²¹

Plankton dapat dibedakan dalam tiga jenis yaitu : plankton bakteri (Bacterioplankton), plankton hewani (zooplankton) dan plankton tumbuhan (fitoplankton). Untuk memudahkan penggolongan jenis plankton tersebut dibagi dalam tiga kategori berdasarkan lamanya siklus hidup, ukuran, dan habitat.²²

Berdasarkan lama siklus hidup plankton digolongkan dalam dua jenis.²³ :

¹⁹ Baugis, p, *Merine Plankton Ecology Elsevier*, 1976, h. 57.

²⁰ Hutabarat, S. dan S.M, Evans, *Pengantar Oseanografi*, (Universitas Indonesia Press Jakarta, 1985). h. 19.

²¹ Nontji, *Laut Nusantara*, (Djambatan. Jakarta, 2005). h , 76 .

²² Levinton, J. S, *Marine Ecology Prentice Hall Inc Englewood Cliffs New Jersey*, 1982, h, 34-36.

²³ *ibid*

a. Plankton sementara (*temporary plankton*) sering disebut *neuroplankton* yaitu telur dan larva plankton yang banyak terdapat di perairan pantai (*neritic*) misalnya Nauplius (*larva barnacle*), valigers (*larva pelecypoda*), lanula (*larva Coelenterata*) dan pluteus (*larva Echinodermata*). Plankton sementara ini adanya menurut musiman karena jumlah tergantung dari habitat pemijahan induknya.

b. Plankton tetap (*permanent plankton*) dimana seluruh hidupnya berupa plankton yang disebut *holoplankton* dan organisme ini meliputi hampir semua filum hewan.

Berdasarkan ukuran plankton ini dibedakan dalam empat ukuran yaitu.²⁴ :

a. Plankton Mega (*Megaplankton*) dapat ditangkap dengan jaring kasar dan dapat dilihat dengan mata , mempunyai ukuran lebih besar dari 2000 μm .

b. Plankton makro (*Macroplankton*) plankton dengan ukuran antara 200 μm -2000 μm .

c. Plankton mikro (*Microplankton*) plankton dengan ukuran antara 20 m-200 m. dapat ditangkap dengan jaring plankton. Ada juga plankton Nano (*Nanoplankton*) dengan ukuran 2 μm -20 μm .

d. Plankton ultra (*Ultra plankton*), plankton dengan ukuran lebih kecil dari 2 μm , dan hanya dapat disaring dengan kertas saring yang keras.

Berdasarkan sebaran horizontal, plankton dibagi menjadi.²⁵:

a. Plankton Neritik (*neritic plankton*) hidup di perairan pantai dengan salinitas (kadar garam) yang relatif rendah. Kadang-kadang masuk sampai ke perairan payau di

²⁴ *ibid*

²⁵ *ibid*

depan muara dengan salinitas sekitar 510 *psu* (*practical salinity unit*; dulu digunakan istilah ‰ atau permil, g/kg). Akibat pengaruh lingkungan yang terus-menerus berubah disebabkan arus dan pasang surut, komposisi plankton neritik ini sangat kompleks, bisa merupakan campuran plankton laut dan plankton asal perairan tawar. Beberapa di antaranya malah telah dapat beradaptasi dengan lingkungan estuaria (muara) yang payau, misalnya *Labidocera muranoi*.

b. Plankton oseanik (*oceanic plankton*) hidup di perairan lepas pantai hingga ke tengah samudra. Karena itu plankton oseanik ditemukan pada perairan yang salinitasnya tinggi. Karena luasnya wilayah perairan oseanik ini, maka banyak jenis plankton tergolong dalam kelompok ini. Penggolongan seperti di atas tidaklah terlalu kaku, karena ada juga plankton yang hidup mulai dari perairan neritik hingga oseanik hingga dapat disebut *neritik-oseanik*.

Berdasarkan sebaran vertikal plankton dapat dibagi menjadi ²⁶:

a. Epiplankton adalah plankton yang hidup di lapisan permukaan sampai kedalaman sekitar 100 m. Lapisan laut teratas ini kira-kira sedalam sinar matahari dapat menembus. Namun dari kelompok epilankton ini ada juga yang hanya hidup di lapisan yang sangat tipis di permukaan yang langsung berbatasan dengan udara. Plankton semacam ini disebut *neuston*, yang merupakan cianobakteri berantai panjang yang hidup di permukaan dan mempunyai keistimewaan dapat mengikat nitrogen langsung dari udara. Neuston yang hidup pada kedalaman sekitar 0-10 cm disebut *hiponeuston*. Ternyata lapisan tipis ini mempunyai arti yang penting karena bisa

²⁶ *Ibid.*

mempunyai komposisi jenis yang kompleks. Dari kelompok *neuston* ini ada juga yang mengambang di permukaan dengan sebagian tubuhnya dalam air dan sebagian lain lagi tersembul ke udara disebut *pleuston*.

b. Mesoplankton yakni plankton yang hidup di lapisan tengah, pada kedalaman sekitar 100 m - 400 m. Pada lapisan ini intensitas cahaya sudah sangat redup sampai gelap. Oleh sebab itu, di lapisan ini fitoplankton, yang memerlukan sinar matahari untuk fotosintesis, umumnya sudah tidak dijumpai. Lapisan ini dan lebih dalam didominasi oleh zooplankton. Beberapa *copepoda* seperti *Eucheuta marina* tersebar secara vertikal sampai ke lapisan ini atau lebih dalam. Dari kelompok *eufausid* juga banyak yang terdapat di lapisan ini, misalnya *Thysanopoda*, *Euphausia*, *Thysanoessa*, *Nematoscelis*. Tetapi *eufausid* ini juga dapat melakukan migrasi vertikal sampai ke lapisan di atasnya.

c. Hipoplankton adalah plankton yang hidupnya pada kedalaman lebih dari 400 m. Termasuk dalam kelompok ini adalah batiplankton (*bathylankton*) yang hidup pada kedalaman > 600 m, dan abisoplankton (*abyssoplankton*) yang hidup di lapisan yang paling dalam, sampai 3000 m – 4000 m. Sebagai contoh, dari kelompok *eufausid*, *Bentheuphausia ambylops* dan *Thysanopoda* adalah jenis tipikal laut-dalam yang menghuni perairan pada kedalaman lebih dari 1500 m. Kelompok *kaetognat* *Eukrohnia hamata*, dan *Eukrohnia bathypelagica* termasuk yang hidup pada kedalaman lebih dari 1000 m.

Berdasarkan daur hidupnya plankton dibagi menjadi.²⁷ :

a. Holoplankton. Dalam kelompok ini termasuk plankton yang seluruh daur hidupnya dijalani sebagai plankton, mulai dari telur, larva, hingga dewasa. Kebanyakan zooplankton termasuk dalam golongan ini. Contohnya : *copepoda*, *amfiphoda*, *salpa*, *kaetognat*. Fitoplankton termasuk juga umumnya adalah holoplankton.

b. Meroplankton. Plankton dari golongan ini menjadi kehidupannya sebagai plankton hanya pada tahap awal dari daur hidup biota tersebut, yakni pada tahap sebagai telur dan larva saja. Beranjak dewasa ia akan berubah menjadi nekton, yakni hewan yang dapat aktif berenang bebas, atau sebagai bentos yang hidup menetap atau melekat di dasar laut. Oleh sebab itu, meroplankton sering pula disebut sebagai plankton sementara. Pada umumnya ikan menjalani hidupnya sebagai plankton ketika masih dalam tahap telur dan larva kemudian menjadi nekton setelah dapat berenang bebas. Kerang dan karang adalah contoh hewan yang pada awalnya hidup sebagai plankton pada tahap telur hingga larva, yang selanjutnya akan menjalani hidupnya sebagai bentos yang hidup melekat atau manancap di dasar laut. Meroplankton ini sangat banyak ragamnya dan umumnya mempunyai bentuk yang sangat berbeda dari bentuk dewasanya. Larva *crustacea* seperti udang dan kepiting mempunyai perkembangan larva yang bertingkat – tingkat dengan bentuk yang sedikitpun tidak menunjukkan persamaan dengan bentuk yang dewasa. Pengetahuan mengenai meroplankton ini menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan upaya budidaya udang, dan ikan.

²⁷ *ibid*

c. Tikoplankton sebenarnya bukanlah plankton yang sejati karena biota ini dalam keadaan normalnya hidup di dasar laut sebagai bentos. Namun karena gerak air menyebabkan ia terlepas dari dasar dan terbawa arus mengembara sementara sebagai plankton.

1. Zooplankton

Zooplankton merupakan anggota plankton yang bersifat hewani, sangat beraneka ragam dan terdiri dari bermacam larva dan bentuk dewasa yang mewakili hampir seluruh filum hewan. Namun demikian dari sudut ekologi, hanya satu golongan dari zooplankton yang sangat penting artinya, yaitu subklas *copepoda* (klas *Crustaceae*, filum *Arthropoda*). *Copepoda* adalah *crustacea* haloplanktonik yang berukuran kecil yang mendominasi zooplankton disemua samudera dan laut. Hewan kecil ini sangat penting artinya bagi kelangsungan hidup ekosistem laut karena merupakan herbivora primer dalam laut. Dengan demikian, *copepoda* berperan sebagai mata rantai yang amat penting antara produksi primer fitoplankton dengan karnivora besar dan kecil.²⁸

Plankton digolongkan ke dalam beberapa kategori yaitu berdasarkan kemampuan membuat makanan, berdasarkan ukuran, berdasarkan daur hidupnya salah satunya yaitu zooplankton yang disebut juga plankton hewani, ini adalah hewan yang hidupnya mengapung, atau melayang didalam Perairan. Kemampuan renangnya sangat terbatas hingga keberadaannya sangat ditentukan kemana arus

²⁸ Nybakken, J. W, *Biologi Laut Suatu Pendekatan Ekologi*, (Gramedia Jakarta, 1992), h. 97.

membawanya. Zooplankton bersifat heterotrofik, yang maksudnya tak dapat memproduksi sendiri bahan organik dari bahan anorganik. Oleh karena itu, untuk kelangsungan hidupnya, ia sangat bergantung pada bahan organik dari fitoplankton yang menjadi makanannya. Jadi, zooplankton lebih berfungsi sebagai konsumen bahan organik.²⁹

Ukurannya yang paling umum berkisar 0,2 μm –2 μm , tetapi ada juga yang berukuran besar misalnya ubur-ubur yang bisa berukuran sampai lebih satu meter. Kelompok yang paling umum ditemui antara lain kopepod (*copepoda*), eufausid (*euphausid*), misid (*mysid*), amfipoda (*amphipod*), kaetognat (*aetognath*). Zooplankton dapat dijumpai mulai dari perairan pantai, perairan estuaria, sampai ke perairan di tengah samudera, dari perairan tropis hingga ke perairan kutub.³⁰



Gambar 2. Zooplanton jenis *Brine Shrimp*³¹

²⁹ Arinardi, O. H, *Status Pengetahuan Plankton di Indonesia*. (Oseanologi dan Limnologi di Indonesia, Puslitbang-LIPI. Jakarta, 1997), h. 33.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid*

Zooplankton ada yang hidup di permukaan dan ada pula yang hidup di perairan dalam. Ada pula yang dapat melakukan migrasi vertikal harian dari lapisan dalam ke permukaan. Hampir semua hewan yang mampu berenang bebas (*nekton*) atau yang hidup di dasar laut (*bentos*) menjalani awal kehidupannya sebagai zooplankton yakni ketika masih berupa telur dan larva. Baru dikemudian hari, menjelang dewasa, sifat hidupnya yang semula sebagai plankton berubah menjadi nekton atau bentos.³²

Crustacea merupakan jenis zooplankton yang terpenting bagi ikan-ikan baik di perairan tawar maupun perairan laut. Pada filum *Arthropoda*, hanya *crustacea* yang dapat hidup sebagai plankton dalam perairan. Zooplankton banyak terdapat di perairan pantai terutama dekat dengan muara sungai karena pada muara sungai banyak terdapat makanan zooplankton yaitu fitoplankton dan terdapat banyak zat hara yang terbawa oleh arus.³³

Siklus pembelahan sel pada fitoplankton relatif lebih singkat daripada zooplankton. Sehingga untuk mencapai jumlah yang banyak bagi zooplankton diperlukan waktu yang lama. Selanjutnya dikatakan bahwa *copepoda* merupakan hewan pemakan fitoplankton yang sangat efisien dan ternyata dapat menurunkan kepadatan populasi fitoplankton secara mencolok di perairan.³⁴

³² *Ibid.*

³³ Romimohtarto, Kasjian dan Srijuwana, *Biologi Laut*, (Djambatan. Jakarta. 2001), h. 22.

³⁴ Nybakken. *Loc. cit.*

2. Peranan Zooplankton dalam Ekosistem .

Pada ekosistem laut setidaknya ada tiga komponen organisme yang hidup di dalamnya bila diklasifikasikan berdasarkan kemampuan pergerakannya yaitu organisme plankton, organisme nekton, dan organisme bentik. Organisme plankton meliputi organisme yang memiliki pergerakan lemah dan tidak mampu mempertahankan posisinya dari pergerakan arus air termasuk di dalamnya adalah plankton baik yang bersifat nabati (fitoplankton) maupun hewani (zooplankton). Organisme nekton adalah organisme yang memiliki pergerakan yang kuat dan mampu mempertahankan posisinya dari pengaruh arus. Kemampuan pergerakan ini merupakan ciri khas organisme jenis ini sehingga organisme ini dapat memperoleh makanannya dengan memangsa, menghindari pemangsaan, serta menghindari kondisi lingkungan yang tidak cocok bagi kehidupannya.³⁵

Bahan organik hasil proses fotosintesis dapat dimanfaatkan oleh zooplankton yang menduduki tingkat tropik kedua pada piramida makanan. Pada tingkat tropik ini zooplankton berperan sebagai organisme herbivora atau konsumen primer. Sebagian besar zooplankton memakan fitoplankton atau detritus dan memiliki peran penting dalam dalam rantai makanan pada ekosistem perairan. Beberapa spesies memperoleh makanan melalui *uptake* langsung dari bahan organik yang terlarut. Zooplankton pada dasarnya mengumpulkan makanan melalui mekanisme *filter feeding* atau *raptorial feeding*.³⁶

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

Zooplankton *filter feeder* menyaring seluruh makanan yang melewati 'mulutnya' sedangkan pada *raptorial feeder* sebagian makanannya dikeluarkan kembali. Proses saling memangsa antar satu dengan yang lainnya disebut rantai makanan (*food chain*) sedangkan rangkaian rantai makanan disebut jaring makanan (*food web*). Pada rantai makanan maupun pada jaring makanan fitoplankton menempati tempat yang terendah sebagai produsen primer. Rantai makanan grazing di laut dimulai dari fitoplankton sebagai produsen dan zooplankton sebagai konsumen (*grazer*). Apabila terjadi kematian baik fitoplankton maupun zooplankton maka akan menjadi mata rantai pertama dalam rantai makan detritus (*detritus food chain*). Kedua rantai makanan tersebut menjadi siklus dasar dalam produksi di laut .³⁷

Secara taksonomi zooplankton meliputi beberapa filum hewan yaitu³⁸:

A. Filum Protozoa	
Kelas Mastigophora (flagellata)	
Sub kelas zoomatigophorea	
Ordo Choanoflagellida	<i>Diaphanoeca, Monosiga, Stephanoeca</i>
Kelas Sarcodinea	
Subkelas Rhizopoda	
Ordo Foraminifera	<i>Globigerina, Globorotalia</i>
Subkelas Actinopoda	
Ordo Radiolaria	<i>Acanthometron, Aulosphaera</i>
Kelas Ciliata	
Ordo Holotricha	<i>Mesodinium</i>
Ordo Spirotrica	<i>Condonella, Favella, Par Tintinnus</i>
B. Filum Cnidaria	
Kelas Hydrozoa	
Ordo filifera	<i>Turitopsis sp.</i>
Ordo Hydroida	<i>Luckartiara, Sarsia, obelia</i>
Ordo Limomedusae	<i>Craspedacusta</i>
Ordo Trachylina	<i>Aglantha, Geryonia, Rhopalonema</i>

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

Ordo Siphonophora	<i>Abyla, Mugiaea, Agalma, Physalia, Porpita, Valella</i>
Kelas Scyphozoa	
Ordo Stauromedusae	<i>Halyclists</i>
Ordo Cubomedusae	<i>Carybdea, Tamoya</i>
Ordo Coronatae	<i>Atolla, Atrella</i>
Ordo Semaestomeae	<i>Aurellia, Dactylometra</i>
Ordo Lobata	<i>Bolinopsis, leucothea, Mneiopsis</i>
Ordo Cestida	<i>Cestum</i>
Kelas Atentaculata	
Ordo Beroida	<i>Beroe</i>
C. Filum Nemertinea	
Kelas Enopla	
Subkelas Zoomastigophorea	
Ordo Hoplonemertea	<i>Nectonemertes, Pelagonemertes</i>
D. Filum Aschelminthes	
Kelas Rotatoria	
Ordo Monogononta	<i>Brachionus, Keratella, Nothloca</i>
E. Filum Mollusca	
Kelas Gastropoda	
Subkelas Prosobranchia	
Ordo Mesogastropoda	<i>Atlanta, Carinaria, Hydrobia, Janthina, Alvania</i>
Subkelas Ophistobranchia	
Ordo Thecosomata	<i>Cavolina, Clio, Creseis, Spiratella (limacina)</i>
Ordo Gymnosomata	<i>Clione, Pneumoderma</i>
Ordo Nudibranchia	<i>Glaucus</i>
F. Filum Annelida	
Kelas Polychaeta	
Ordo Errantia	<i>Aliciopa, Lepidametria, Poeobius,</i>
Ordo Aciculata	<i>Sagitella Tomopteris, Vanadis Tomopteridae</i>
Ordo Canalipalpata	<i>Spinodae sp.</i>
G. Filum Arthropoda	
Kelas Crustacea	
Subkelas Branchiopoda	
Ordo Cladocera	<i>Evadne, Penilia, Podon</i>
Subkelas Ostracoda	
Ordo Myodocopida	<i>Archiconchoecia, Conch, Gyganticypris</i>
Subkelas Copepoda	
Ordo Calanoida	<i>Acartia, calanus, Candacia, Centropages, Eucalanus, Euchaeta, Eurythemora, Haloptilus, Metridia, Paracalanus, Pseudocalanus, Scolecithric Sinocalanus, Temora, Undinula, Inachus Crustacean naphlius, maia, paragur, personathus, calamocia ampulla.</i>
Ordo Cyclopoida	<i>Corycaeus, Oithona, Oncaea, Sapphirina, Corytes</i>
Ordo Harpacticoida	<i>Diosuccus, Euterpina, Harpacticus, Microsetella,</i>

Ordo Monstrilloida	<i>Tigriopus, Tisbe</i>
Subkelas Malacostraca	<i>Monstrilla</i>
Ordo Mysidacea	<i>Archimysis, Holmesiella, Lophogaster, Mysis, Neomysis, Siriella</i>
Ordo Cumacea	<i>Dimophostylis</i>
Ordo Amphipoda	<i>Cyphocaris, Hyperid, Parathemisto, Phronima, stematopod, Themisto, Vibia</i>
Ordo Euphausiacea	<i>Euphausia, Meganyctiphanes Nematocelis, Thysanopoda, Nictichanes austarlis.</i>
Ordo Decapoda	<i>Bentheogenema, Gennadas, Acetes, Lucifer, Sergestes, sergia, Achanthephyra, Hymenodora</i>
H. Filum Chaetognata	
Kelas Sagittoidea	<i>Eukhronia, Krohnitta, Pterosagitta, Sagitta</i>
I. Filum Echinodermata	
Kelas Holothuroide	<i>Enypniaster, Pelagothuria</i>
Kelas Asterozoa	<i>Asteroidae.</i>
J. Filum Chordata	
Kelas Appendiculata	<i>Fritillaria, Oikopleura</i>
Ordo Appendicularia	
Kelas Thaliacea	<i>Pyrosoma</i>
Ordo Pyrosomata	<i>Doliolum</i>
Ordo Cyclomyaria	<i>Salpa, Thalia, Thetys</i>
Ordo Desmomyaria	

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyebaran Zooplankton.

Suhu di lautan adalah salah satu faktor yang amat penting bagi kehidupan organisme di lautan, karena suhu mempengaruhi baik aktivitas metabolisme maupun perkembangan dari organisme. Oleh karena itu tidak mengherankan jika banyak dijumpai bermacam-macam jenis hewan yang terdapat diberbagai tempat di dunia.³⁹

Suhu suatu badan air dipengaruhi oleh musim, lintang, ketinggian dari permukaan laut, sirkulasi udara, penutupan awan, dan aliran serta kedalaman dari badan air. Perubahan suhu berpengaruh terhadap proses fisika, kimia, dan biologi di

³⁹ Hutabarat dan Evans, *Loc. cit.*

badan air. Peningkatan suhu mengakibatkan peningkatan viskositas, reaksi kimia, evaporasi dan volatilisasi. Selain itu, peningkatan suhu air juga mengakibatkan penurunan kelarutan gas dalam air seperti O₂, CO₂, N₂, dan CH₄.⁴⁰

Walaupun plankton potensial berbahaya menyebar luas secara geografis dan hal ini mengidentifikasi adanya kisaran yang luas terhadap toleransi suhu, tetapi spesies alga potensial berbahaya daerah tropik mempunyai toleransi yang rendah terhadap perubahan suhu. Kisaran suhu optimal bagi spesies alga potensial berbahaya adalah 250–300⁰C dan kemampuan proses fotosintesis akan menurun tajam apabila suhu perairan berada diluar kisaran optimal tersebut.⁴¹

Salinitas adalah konsentrasi rata-rata seluruh garam yang terdapat didalam air laut. Konsentrasi ini biasanya sebesar 3% dari berat seluruhnya atau sering juga disebut bagian perseribu (permil) dan biasa ditulis dengan ‰. Konsentrasi garam-garam ini jumlahnya relatif sama dalam setiap contoh-contoh air laut, sekalipun mereka diambil dari tempat yang berbeda diseluruh dunia.⁴²

Hampir semua organisme laut dapat hidup pada daerah yang mempunyai perubahan salinitas yang sangat kecil, misalnya daerah estuaria adalah daerah yang mempunyai salinitas rendah karena adanya sejumlah air tawar yang masuk yang berasal dari daratan dan juga disebabkan karena adanya pasang surut di daerah ini kisaran salinitas yang normal untuk kehidupan organisme di laut adalah berkisar antara 30-35 ‰. Perubahan salinitas yang dapat mempengaruhi organisme terjadi

⁴⁰ Effendi, M. I. *loc. cit.*

⁴¹ Gross, G, *Oceanography*, (A view of the Earth. 5th edition, 1998), h. 56

⁴² Hutabarat, dan Evans, *Loc. cit.*

di zona intertidal melalui dua cara. Yang pertama karena zona intertidal terbuka pada saat pasang surut dan kemudian digenangi air atau aliran air akibat hujan lebat, akibatnya salinitas akan turun secara drastik.⁴³

pH merupakan pengukuran asam atau basa suatu larutan. Keasaman terjadi karena berlebihnya ion H^+ pada suatu larutan, sedangkan alkalinitas terjadi karena berlebihnya ion OH^- pada suatu larutan. Potensial hidrogen atau sifat keasaman atau basa (alkalinitas) suatu larutan sangatlah penting dalam faktor kelarutan dalam air laut terutama terhadap pengendapan mineral atau unsur-unsur dan kehidupan organisme pada suatu kondisi tertentu.⁴⁴

Derajat keasaman (pH) adalah nilai logaritma tentang besarnya konsentrasi ion hidrogen sehingga menunjukkan kondisi air atau tanah tersebut basa atau asam. Pada umumnya kedalaman dasar juga mencirikan nilai pH dari air laut dan substrat dasarnya sehingga dapat diketahui bahwa tingkat keasaman pada daerah yang lebih dalam akan lebih rendah dibandingkan pada daerah yang lebih dangkal.⁴⁵

Derajat keasaman merupakan gambaran jumlah atau aktivitas ion hidrogen dalam perairan. Secara umum nilai pH menggambarkan seberapa besar tingkat keasaman atau kebasaan suatu perairan. Perairan dengan nilai $pH = 7$ adalah netral, $pH < 7$ dikatakan kondisi perairan bersifat asam, sedangkan $pH > 7$ dikatakan kondisi perairan bersifat basa. Adanya karbonat, bikarbonat dan hidroksida akan menaikkan

⁴³ Gosari, Benny, *Skripsi Komposisi Jenis Fitoplankton Berbahaya di Sekitar Pelabuhan Soekarno Hatta*, (Universitas Hasanuddin, Makassar, 2002), h. 23.

⁴⁴ Hutabarat, dan Evans, *Loc. cit.*

⁴⁵ Usman, Hanapi, *Modul Kimia Dasar 1*, (Universitas Hasanuddin, Makassar, 2006), h. 22.

kebasaan air, sementara adanya asam-asam mineral bebas dan asam karbonat menaikkan keasaman suatu perairan. Limbah buangan industri dan rumah tangga dapat mempengaruhi nilai pH perairan. Nilai pH dapat mempengaruhi spesies senyawa kimia dan toksisitas dari unsur-unsur renik yang terdapat di perairan, sebagai contoh H₂S yang bersifat toksik banyak ditemui di perairan tercemar dan perairan dengan nilai pH rendah. Selain itu, pH juga mempengaruhi nilai BOD₅, fosfat, nitrogen dan nutrient lainnya.⁴⁶

Arus merupakan pergerakan massa air yang disebabkan oleh adanya perbedaan densitas atau angin. Arus dapat dibagi menjadi arus permukaan dan arus *upwelling*. Arus dapat disebabkan oleh angin, juga dipengaruhi oleh faktor topografi dasar laut, pulau-pulau yang ada disekitarnya, gaya *coriolis* dan perbedaan densitas air laut.⁴⁷

Kekeruhan menggambarkan sifat optik air yang ditentukan berdasarkan banyaknya cahaya yang diserap dan dipancarkan bahan-bahan yang terdapat dalam perairan. Kekeruhan air dapat disebabkan oleh lumpur, partikel tanah, serpihan tanaman, dan fitoplankton. Kekeruhan yang tinggi mengakibatkan pertumbuhan organisme yang menyesuaikan diri pada air yang jernih menjadi terhambat dan dapat pula menyebabkan kematian karena mengganggu proses respirasi.⁴⁸

⁴⁶ Effendi, M. I. *loc. cit.*

⁴⁷ Hutabarat, dan Evans. *Loc. cit.*

⁴⁸ Hutagalung, H, P, D, Setiapermana dan S.H. Riyono. *Metode Analisis Air Laut, Sedimen dan Biota*, Buku 2, (Puslitbang Oseanologi LIPI, Jakarta, 1997), h. 67.

Kekeruhan sebagai intensitas kegelapan di dalam air yang disebabkan oleh bahan-bahan yang melayang. Kekeruhan perairan umumnya disebabkan oleh adanya partikel-partikel suspensi seperti tanah liat, lumpur, bahan-bahan organik terlarut, bakteri, plankton dan organisme lainnya. Kekeruhan perairan menggambarkan sifat optik air yang ditentukan berdasarkan banyaknya cahaya yang diserap dan dipancarkan oleh bahan-bahan yang terdapat dalam air. Kekeruhan yang terjadi pada perairan tergenang seperti danau lebih banyak disebabkan oleh bahan tersuspensi berupa koloid dan partikel-partikel halus. Kekeruhan yang tinggi dapat mengakibatkan terganggunya sistem osmoregulasi seperti pernafasan dan daya lihat organisme akuatik serta dapat menghambat penetrasi cahaya ke dalam air. pengaruh kekeruhan yang utama adalah penurunan penetrasi cahaya secara mencolok, sehingga aktivitas fotosintesis fitoplankton dan alga menurun, akibatnya produktivitas perairan menjadi turun. Tingginya nilai kekeruhan juga dapat menyulitkan usaha penyaringan dan mengurangi efektivitas desinfeksi pada proses penjernihan air.⁴⁹

Kecerahan merupakan ukuran transparansi perairan yang ditentukan secara visual dengan menggunakan *secchi disk* . Kecerahan perairan sangat dipengaruhi oleh keberadaan padatan tersuspensi, zat-zat terlarut, partikel-partikel dan warna air. Pengaruh kandungan lumpur yang dibawa oleh aliran sungai dapat mengakibatkan tingkat kecerahan air sungai menjadi rendah, sehingga dapat menurunkan nilai produktivitas perairan.⁵⁰

⁴⁹ Effendi, M. I. *loc. cit.*

⁵⁰ Nybakken. *Loc. cit.*

Oksigen yang terdapat didalam air laut terdiri dari dua bentuk senyawa, yaitu terikat dengan unsur lain dan sebagai molekul bebas. Kelarutan molekul oksigen yang terdapat dalam air laut dipengaruhi secara fisika, sebagai contoh kelarutannya sangat dipengaruhi oleh suhu air. Sumber utama oksigen dalam air laut berasal dari udara melalui proses difusi dan dari hasil fotosintesis fitoplankton pada siang hari faktor-faktor yang dapat menurunkan kadar oksigen dalam air laut adalah kenaikan suhu air, respirasi (khususnya malam hari), adanya lapisan minyak di atas permukaan air laut dan masuknya limbah organik yang mudah terurai.⁵¹

Oksigen terlarut adalah gas oksigen yang terlarut dalam air. Oksigen terlarut dalam perairan merupakan faktor penting sebagai pengatur metabolisme tubuh organisme untuk tumbuh dan berkembang biak. Sumber oksigen terlarut dalam air berasal dari difusi oksigen yang terdapat di atmosfer, arus atau aliran air melalui air hujan serta aktivitas fotosintesis oleh tumbuhan air dan fitoplankton. Difusi oksigen atmosfer ke air bisa terjadi secara langsung pada kondisi air *stagnant* (diam) atau terjadi karena agitasi atau pergolakan massa air akibat adanya gelombang atau angin. Difusi oksigen dari atmosfer ke perairan pada hakekatnya berlangsung relatif lambat, meskipun terjadi pergolakan massa air atau gelombang. Sebagian besar oksigen pada perairan danau dan waduk merupakan hasil sampingan aktivitas fotosintesis. Pada proses fotosintesis, karbondioksida direduksi menjadi karbohidrat dan air mengalami dehidrogenasi menjadi oksigen. $6 \text{ CO}_2 + 6 \text{ H}_2\text{O} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6 \text{ O}_2$. Di perairan danau,

⁵¹ *Ibid.*

oksigen lebih banyak dihasilkan oleh fotosintesis alga yang banyak terdapat pada *zone epilimnion*, sedangkan pada perairan tergenang yang dangkal dan banyak ditumbuhi tanaman air pada *zone littoral*, keberadaan oksigen lebih banyak dihasilkan oleh aktivitas fotosintesis tumbuhan air. Keberadaan oksigen terlarut di perairan sangat dipengaruhi oleh suhu, salinitas, turbulensi air, dan tekanan atmosfer. Kadar oksigen berkurang dengan semakin meningkatnya suhu, ketinggian, dan berkurangnya tekanan atmosfer. Penyebab utama berkurangnya kadar oksigen terlarut dalam air disebabkan karena adanya zat pencemar yang dapat mengonsumsi oksigen. Zat pencemar tersebut terutama terdiri dari bahan-bahan organik dan anorganik yang berasal dari berbagai sumber, seperti kotoran (hewan dan manusia), sampah organik, bahan-bahan buangan dari industri dan rumah tangga sebagian besar dari zat pencemar yang menyebabkan oksigen terlarut berkurang adalah limbah organik. kandungan oksigen terlarut pada suatu perairan dapat digunakan sebagai indikator kualitas perairan.⁵²

Karbondioksida bebas merupakan istilah untuk menunjukkan CO₂ yang terlarut di dalam air. CO₂ yang terdapat dalam perairan alami merupakan hasil proses difusi dari atmosfer, air hujan, dekomposisi bahan organik dan hasil respirasi organisme akuatik. Tingginya kandungan CO₂ pada perairan dapat mengakibatkan terganggunya kehidupan biota perairan. Konsentrasi CO₂ bebas 12 mg/l dapat menyebabkan tekanan pada ikan, karena akan menghambat pernafasan dan pertukaran gas. Kandungan CO₂ dalam air yang aman tidak boleh melebihi 25 mg/l,

⁵² *ibid*

sedangkan konsentrasi CO₂ lebih dari 100 mg/l akan menyebabkan semua organisme akuatik mengalami kematian.⁵³

BOD₅ merupakan salah satu indikator pencemaran organik pada suatu perairan. Perairan dengan nilai BOD₅ tinggi mengindikasikan bahwa air tersebut tercemar oleh bahan organik. Bahan organik akan distabilkan secara biologi dengan melibatkan mikroba melalui sistem oksidasi aerobik dan anaerobik. Oksidasi aerobik dapat menyebabkan penurunan kandungan oksigen terlarut di perairan sampai pada tingkat terendah, sehingga kondisi perairan menjadi anaerob yang dapat mengakibatkan kematian organisme akuatik.⁵⁴

Selain BOD₅, kadar bahan organik juga dapat diketahui melalui nilai COD. COD sebagai jumlah total oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan organik secara kimiawi, baik yang dapat didegradasi secara biologis maupun yang sukar didegradasi menjadi CO₂ dan H₂O. Berdasarkan kemampuan oksidasi, penentuan nilai COD dianggap paling baik dalam menggambarkan keberadaan bahan organik baik yang dapat didekomposisi secara biologis maupun yang tidak.⁵⁵

Faktor lain yang mempengaruhi penyebaran plankton adalah faktor kimiawi. Penyebaran plankton dalam perairan dipengaruhi oleh sifat fototaksis. Fitoplankton bersifat fototaksis positif, dan zooplankton bersifat fototaksis negatif.⁵⁶

⁵³ Wardoyo, S. T. H. *Pengelolaan kualitas perairan (Water Quality Management)*. Proyek Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi. Institut Pertanian Bogor. Bogor. 1975.h. 77.

⁵⁴ *ibid*

⁵⁵ Effendi, M. I. *Loc. cit.*

⁵⁶ Sachlan, M, *Planktonologi. Correspondence Course Center*, (Jakarta, 1972), h. 43.

Dasar ketergantungan zooplankton pada fitoplankton dalam melengkapi bahan-bahan organik menunjukkan suatu hubungan yang kompleks dimana dapat dibentuk suatu rantai makanan. Populasi plankton senantiasa mengalami perubahan dalam komposisi jenis dan jumlahnya. Penyebab terjadinya fruktuasi plankton adalah karena adanya pengambilan oleh zooplankton dan ikan pemakan plankton serta akumulasi dari sisa metabolisme yang bersifat racun.⁵⁷

Nitrogen di perairan terdapat dalam bentuk gas N_2 , NO_2^- , NO_3^- , NH_3 dan NH_4^+ serta sejumlah N yang berikatan dalam organik kompleks. Sumber nitrogen terbesar berasal dari udara, sekitar 80% dalam bentuk nitrogen bebas yang masuk melalui sistem fiksasi biologis dalam kondisi aerobik. Keberadaan nitrogen di perairan dapat berupa nitrogen anorganik dan organik. Nitrogen anorganik terdiri atas ion nitrit (NO_2^-), ion nitrat (NO_3^-), ammonia (NH_3), ion ammonium (NH_4^+) dan molekul N_2 yang larut dalam air, sedangkan nitrogen organik berupa protein, asam amino dan urea akan mengendap dalam air. Bentuk-bentuk nitrogen tersebut mengalami transformasi (ada yang melibatkan mikrobiologi dan ada yang tidak) sebagai bagian dari siklus nitrogen.⁵⁸

Di antara beberapa nutrisi yang ada di air laut, yang paling penting untuk kebutuhan biologis ikan adalah fosfat, nitrat, dan silikat karena komponen ini merupakan nutrisi penting yang diperlukan untuk pertumbuhan plankton di laut. Nutrien diperlukan oleh tumbuhan untuk pembentukan molekul protein. Pada

⁵⁷ Buyd, C, E, *Water Quality in warmwater fish pond*, (Auburn University Agri Cultural Eksperimen Station , Alabama USA, 1979), h. 89.

⁵⁸ Effendi, M. I. *Loc. cit.*

umumnya hewan mendapatkan protein secara langsung atau tidak langsung dari tumbuhan. Permukaan laut mendapat pasokan nutrien-nutrien tersebut terutama dari air pedalaman yang dibawa oleh air sungai, dan dari dasar perairan yang dalam. Air dari perairan yang sangat dalam menuju ke permukaan laut selama terjadi arus naik (*upwelling*) yang disebabkan oleh arus sepanjang pantai, atau sebagai hasil dari perubahan suhu yang menghasilkan konveksi arus (sirkulasi vertikal air), atau yang lainnya sebagai konsekuensi dari pertemuan arus horizontal, suhu hangat dan dingin. Hal ini menyediakan zona photik di lautan yang kaya nutrien, dengan demikian menimbulkan pertumbuhan fitoplankton yang melimpah, diikuti zooplankton dan ikan yang melimpah pula di daerah tersebut.⁵⁹

Pada beberapa daerah tropis, pengaruh perbedaan musim terhadap konsentrasi fosfat pada perairan pantai lebih sedikit daripada pada daerah beriklim sedang. Selama periode monsoon, fosfat akan melimpah sepanjang pantai. Jumlah silikat di perairan pantai secara umum tinggi jika dibandingkan sebelumnya sebagai akibat *run off* dari daratan.⁶⁰

4. Produktivitas Zooplankton

Pada tiap tingkat tropik ada produksi. Pada tingkat tropik terbawah dimana terjadi proses fotosintesis oleh organisme autotrof di hasilkan produksi primer. Sedangkan seluruh produksi pada tingkat konsumen merupakan produksi sekunder. Produktivitas primer suatu sistem ekologi sebagai laju penyimpanan energi radiasi

⁵⁹ Buyd, C, E. *op, cit*

⁶⁰ *Ibid.*

melalui aktivitas fotosintesis dari produsen atau organisme (terutama tumbuhan hijau) dalam bentuk bahan organik yang dapat digunakan sebagai bahan pakan. Untuk menghasilkan produksi primer, produsen melakukan fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari yang ditangkap oleh pigmen-pigmen fotosintesis.⁶¹

Apabila produksi sekunder adalah produksi yang dihasilkan pada tingkat konsumen, maka produktivitas sekunder sebenarnya meliputi banyak organisme pada tingkat konsumen seperti herbivora dan karnivora. Akan tetapi biasanya produktivitas sekunder dihitung berdasarkan produksi konsumen primer dalam hal ini zooplankton.⁶²

Produksi dari populasi hewan mengacu pada pembentukan biomassa baru dalam periode waktu tertentu. Ada dua pendekatan yang telah diterapkan dalam studi produksi yaitu metode dinamika populasi dan metode pengaturan energi (*energy budget*). Pendekatan dinamika populasi terkonsentrasi pada pertumbuhan biomassa sedangkan pendekatan *energy budget* mengukur komponen-komponen konsumsi, respirasi dan ekresi. Ada permasalahan dalam menentukan produktivitas sekunder antara lain, perbedaan ukuran pada tiap individu menyebabkan jumlah individu/satuan volume berbeda antara satu jenis dengan jenis yang lain atau dalam jenis yang sama pada tahap siklus hidup yang berbeda. Sebagai contoh pada jenis *calanus* yang siklus hidupnya melewati 6 fase nauplii dan 6 fase kopepodite dengan masing-masing berbeda ukuran maka jumlah individu per satuan volume dari tiap

⁶¹ Odum, E.P, *Basic Ecology*, Saunders College Publishing, (Philadelpia,1983), h, 29.

⁶² *Ibid.*

fase akan berbeda. Oleh karena itu diperlukan ada perbedaan dalam penghitungan untuk masing masing jenis zooplankton.⁶³

5. Distribusi Zooplankton

Distribusi zooplankton secara horizontal lebih banyak dipengaruhi faktor fisik berupa pergerakan masa air. Oleh karena itu pengelompokan (*patchiness*) plankton lebih banyak terjadi pada daerah neritik terutama yang dipengaruhi estuaria dibandingkan dengan oseanik. Faktor-faktor fisik yang menyebabkan distribusi zooplankton yang tidak merata antara lain arus pasang surut, morfogeografi setempat, dan proses fisik dari lepas pantai berupa arus yang membawa masa air ke pantai akibat adanya hembusan angin. Selain itu ketersediaan nutrisi pada setiap perairan yang berbeda menyebabkan perbedaan kelimpahan zooplankton pada daerah-daerah tersebut. Pada daerah dimana terjadi *up welling* atau turbulensi, kelimpahan plankton juga lebih besar dibanding daerah lain yang tidak ada.⁶⁴

Distribusi vertikal plankton sangat berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitasnya, selain kemampuan pergerakan atau faktor lingkungan yang mendukung plankton mampu bermigrasi secara vertikal. Distribusi zooplankton di laut secara umum menunjukkan densitas maksimum dekat lapisan permukaan (lapisan fotik) dan pada waktu lain berada dibawahnya. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi vertikal sangat berhubungan dengan dimensi waktu (temporal). Selain faktor cahaya, suhu juga sangat mendukung pergerakannya secara

⁶³ Lewis, Jr, *Zooplankton Community Analysis*. 1985. h. 75.

⁶⁴. *Distribusi Zooplankton dilaut*, [www, Cnrsfr/presse/communique/564.htm](http://www.Cnrsfr/presse/communique/564.htm).

vertikal. Hal ini sangat berhubungan dengan densitas air laut yang mampu menahan plankton untuk tidak tenggelam. Perpindahan secara vertikal ini juga dipengaruhi oleh kemampuannya bergerak atau lebih tepat mengadakan adaptasi fisiologis sehingga terus melayang pada kolom air. Perpaduan kondisi fisika air dan mekanisme mengapung menyebabkan plankton mampu bermigrasi secara vertikal sehingga distribusinya berbeda secara vertikal dari waktu ke waktu.⁶⁵

Ada beberapa mekanisme mengapung yang dilakukan plankton untuk dapat mempertahankan diri tetap melayang dalam kolom air yaitu antara lain:

- a. Mengubah komposisi cairan-cairan tubuh sehingga densitasnya menjadi lebih kecil dibandingkan densitas air laut. Mekanisme ini biasa dilakukan oleh *Noctiluca* dengan memasukkan amonium klorida (NH_4Cl) kedalam tubuhnya.
- b. Membentuk pelampung berisi gas, sehingga densitasnya menjadi lebih kecil dari densitas air. Contoh untuk jenis ini adalah ubur ubur.
- c. Menghasilkan cairan yang densitasnya lebih rendah dari air laut. Cairan tersebut biasanya berupa minyak dan lemak. Mekanisme ini banyak dilakukan oleh diatom maupun zooplankton dari jenis *copepoda*.
- d. Memperbesar hambatan permukaan. Mekanisme ini dilakukan dengan mengubah bentuk tubuh atau membentuk semacam tonjolan/duri pada permukaan tubuhnya.⁶⁶

⁶⁵ Parsons, T, R, Takahashi, M, Hargrave, B. *Biological Oceanografic*, 1984, h. 125.

⁶⁶ Nybakken, J, W, *op, cit.*, h. 102.

Distribusi plankton dari waktu ke waktu lebih banyak ditentukan oleh pengaruh lingkungan. Distribusi temporal banyak dipengaruhi oleh pergerakan matahari atau dengan kata lain cahaya sangat mendominasi pola distribusinya. Distribusi harian plankton, terutama pada daerah tropis, mengikuti perubahan intensitas cahaya sebagai akibat pergerakan semu matahari. Pada pagi hari dimana intensitas cahaya masih rendah dan suhu permukaan air masih relatif dingin plankton berada tidak jauh dengan permukaan. Pada siang hari plankton berada cukup jauh dari permukaan karena 'menghindari' cahaya yang terlalu kuat. Pada sore hingga malam hari plankton bergerak mendekati bahkan berada pada daerah permukaan.⁶⁷

Seperti dijelaskan tentang migrasi vertikal, setidaknya ada dua teori yang dapat menjelaskan mengapa plankton dapat bergerak secara vertikal. Pertama plankton terangkat oleh mekanisme pergerakan air yang disebabkan oleh perbedaan densitas. Pada siang hari dimana air pada lapisan yang lebih dalam memiliki suhu yang relatif dingin dibandingkan pada daerah lebih atas. Dalam kondisi demikian maka plankton akan terapung diatas lapisan tersebut. Pada malam hari lapisan bagian atas mulai mendingin sehingga plankton terangkat pada lapisan tersebut karena densitas plankton yang lebih rendah dari densitas air. Alasan kedua adalah karena adanya mekanisme pergerakan yang dilakukan oleh plankton.⁶⁸

⁶⁷ Gross, G, *Oceanography*, A view of the Earth, 5th edition. 1990, h. 56

⁶⁸ Longhurst, A, R dan D, Pauly, *Ecology of Tropical Oceans*, (Academic Press Inc, Sandiego, 1987), h. 49.

Dengan pola migrasi tersebut maka plankton baik fitoplankton maupun zooplankton akan terdistribusi secara tidak merata di perairan baik siang maupun malam di daerah tropis Samudera Pasifik.⁶⁹

Sebagian besar diatom melakukan reproduksi melalui pembelahan sel vegetatif. Hasil pembelahan sel menjadi dua bagian yaitu bagian atas (*epiteka*) dan bagian bawah (*hipoteka*). Selanjutnya masing-masing belahan akan membentuk pasangannya yang baru berupa pasangan penutupnya. Bagian epiteka akan membuat hipoteka dan bagian hipoteka akan membuat epiteka. Pembuatan bagian-bagian tersebut disekresi atau diperoleh dari sel masing-masing sehingga semakin lama semakin kecil ukuran selnya. Dengan demikian ukuran individu-individu dari spesies yang sama tetapi dari generasi yang berlainan akan berbeda.⁷⁰

Reproduksi aseksual seperti ini menghasilkan sejumlah ukuran yang bervariasi dari suatu populasi diatom pada suatu spesies. Ukuran terkecil dapat mencapai 30 kali lebih kecil dari ukuran terbesarnya. Tetapi proses pengurangan ukuran ini terbatas sampai suatu generasi tertentu. Apabila generasi itu telah tercapai diatom akan meninggalkan kedua katupnya dan terbentuklah apa yang disebut *auxospore*.⁷¹

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Kennish, M, J, *Ecology of Estuaries*, Vol.II (Biological Aspect, CRC Press, Boston, 1969), h. 66.

⁷¹ *Ibid.*

Reproduksi seksual dan pembentukan spora mungkin juga terjadi pada diatom pengurangan ukuran sel selama pembelahan aseksual, reproduksi seksual dengan susunan gamet-gamet berflagel, pembentukan auxospore. Pembentukan spora non aktif (*resting spore*) mungkin juga terjadi secara langsung dari sel vegetatif.⁷²

Reproduksi diantara zooplankton *crustacea* pada umumnya unisexual melibatkan baik hewan jantan maupun betina, meskipun terjadi parthenogenesis diantara *Cladocera* dan *Ostracoda*. Siklus hidup *copepoda Calanus* dari telur hingga dewasa melewati 6 fase naupli dan 6 fase copepodit Perubahan bentuk pada beberapa fase naupli pertama terjadi kira-kira beberapa hari dan mungkin tidak makan. Enam fase copepodit dapat diselesaikan kurang dari 30 hari (bergantung suplai makan dan temperatur) dan beberapa generasi dari spesies yang sama mungkin terjadi dalam tahun yang sama (yang disebut siklus hidup *ephemeral*). Laju penggandaan sel diatom berlangsung sekitar 0.5 sampai 6 sel/hari.⁷³

6. Struktur Komunitas Zooplankton.

Kelimpahan plankton secara umum keberadaan plankton di perairan akan dipengaruhi oleh tipe perairannya (mengalir atau tenang), kualitas fisika dan kimia perairan, kandungan unsur hara dan adanya *competitor* atau pemangsa plankton. Pada perairan tergenang keberadaan zooplankton akan berbeda dan waktu ke waktu dan berbeda pula dalam menempati ruang dan kolom air. Sedangkan pada perairan

⁷² Parsons, T, R, M, Takahashi dan B, Hargrave, (Biological Oceanographic Processes, 3rd edition, Pergamon Press, Oxford. 1984), h. 95.

⁷³ Omori, M. Ikeda, T. *Methods In Marine Zooplankton Ecology*. Krieger Publishing Company: Malabar, USA. 1992. h. 30.

mengalir, unsur ke waktu dan ruang relatif tidak berpengaruh, kecuali jika ada kasus pencemaran sungai oleh aktivitas manusia. Kelimpahan zooplankton dihitung dengan melakukan penyaringan dengan plankton net kemudian hasil penyaringan yang tertinggal di dalam botol plankton net diamati dibawah mikroskop.⁷⁴

Indeks keanekaragaman spesies atau “*Diversity Index*” diartikan sebagai suatu gambaran secara matematik yang melukiskan struktur informasi-informasi mengenai jumlah spesies suatu organisme. Indeks keanekaragaman akan mempermudah dalam menganalisis informasi-informasi mengenai jumlah individu dan jumlah spesies suatu organisme. Suatu cara yang paling sederhana untuk menyatakan indeks keanekaragaman yaitu dengan menentukan persentase komposisi dari spesies di dalam sampel. Semakin banyak spesies yang terdapat dalam suatu sampel, semakin besar keanekaragaman, meskipun harga ini juga sangat tergantung dari jumlah total individu masing-masing spesies. Indeks keanekaragaman dapat dijadikan petunjuk seberapa besar tingkat pencemaran suatu perairan.⁷⁵

Indeks keseragaman spesies dalam suatu komunitas, pemerataan individu tiap spesies dapat diketahui dengan menghitung indeks keseragaman. Indeks keseragaman ini merupakan suatu angka yang tidak bersatuan, yang besarnya antara 0 – 1, semakin kecil nilai indeks keseragaman, semakin kecil pula keseragaman suatu populasi, berarti penyebaran jumlah individu tiap spesies tidak sama dan ada kecenderungan bahwa suatu spesies mendominasi populasi tersebut. Sebaliknya

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.*

semakin besar nilai indeks keseragaman, maka populasi menunjukkan keseragaman, yang berarti bahwa jumlah individu tiap spesies boleh dikatakan sama atau merata⁷⁶.

Indeks Dominansi jenis zooplankton dapat diketahui dengan menghitung Indeks Dominansi (d). Nilai indeks dominansi mendekati satu jika suatu komunitas didominasi oleh jenis atau spesies tertentu dan jika tidak ada jenis yang dominan, maka nilai indeks dominansinya mendekati nol.⁷⁷

35. ⁷⁶Odum, E. P. *Fundamentals of Ecology*. WB Saunders Company:Phyladelphia. 1971.h.

⁷⁷ *ibid*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian merupakan penelitian *deskriptif* yang menggambarkan tentang komposisi jenis zooplankton yang terdapat di perairan sungai Je'neberang.

B. Variabel Penelitian

Variabel penelitian ini adalah komposisi jenis zooplankton yang terdapat di perairan sungai Je'neberang.

C. Defenisi Operasional Variabel

Komposisi jenis zooplankton adalah keanekaragaman jenis zooplankton di tiga titik stasiun yang ada di perairan di sungai Je'neberang. Stasiun I (muara sungai), pada kedalaman 150 cm. Stasiun II (penambangan pasir) pada kedalaman 150 cm. Stasiun III (limbah dosmetik), pada kedalaman 100 cm.

D. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

1. Ruang lingkup

a. Pengambilan sampel pada tiga titik stasiun pengamatan di perairan sungai Je'neberang sungguminasa kec, Somba opu. kab. Gowa, dilaksanakan pada tanggal 06 juli 2010 di perairan sungai je'neberang

b. Parameter yang diukur meliputi parameter fisika: suhu dan kecerahan, kimia : pH dan oksigen terlarut, sedangkan biologi: zooplankton ind/ m³.

2. Batasan Penelitian

Pengambilan sampel hanya dilakukan pada tiga titik yaitu stasiun I (muara sungai), stasiun II (penambangan pasir), dan stasiun III (limbah dosmetik) di perairan sungai Je'neberang diambil pada malam hari jam 08.00-10.00. (lampiran 1).

E. Prosedur Penelitian

1. Alat dan Bahan

a. Alat

Adapun alat yang digunakan pada penelitian ini adalah mikroskop binokuler, thermometer air, botol, plankton net no 25, pipet tetes, sedgwick rafter, buku identifikasi, pH meter, dan DO meter , secchi disk.

b. Bahan

Adapun bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah zooplankton, formalin 4 %, H₂SO₄, NaOH + ki, mangan dan air.

2. Pengambilan Sampel

a. Pengambilan data parameter biologi yang dilakukan dengan pengambilan sampel zooplankton sebagai data utama. Air yang diambil langsung disaring dengan menggunakan jaring plankton (*plankton net*) yang diameter mulut jaring 45 cm, dengan mata jaring 0,33 mm (300 μ m) dengan panjang jaring 180 cm yang ujung jaringnya telah diikatkan dengan botol kemudian di masukkan ke dalam botol plastik 60 ml, lalu diawetkan dengan formalin 4 % sebanyak 2 tetes, setelah itu disimpan di tempat yang sejuk agar warnanya tidak berubah kemudian dibawa ke laboratorium Biologi laut FIKP UNHAS untuk diamati dibawah mikroskop binokuler dengan memasukkan ke dalam sedgwick rafter sebanyak 2 ml dengan lima kali pengulangan serta diidentifikasi dengan petunjuk buku identifikasi. Pengambilan sampel dilakukan dengan tiga kali pengulangan yaitu malam hari (pukul 20.00-22.00 wita). selama tiga malam berturut-turut.

b. Dalam Pengambilan data fisika dilakukan dengan mengukur suhu dan kecerahan. Pengukuran suhu dilakukan dengan menggunakan termometer air dengan cara mencelupkan termometer yang dipegang pada tali yang sudah diikatkan ke dalam perairan. Pengukuran kecerahan dilakukan dengan menggunakan *secchi disk* . Pengukuran ini dilakukan secara *in situ*.

c. .Dalam pengambilan data kimia dilakukan dengan pengukuran kandungan oksigen terlarut dilakukan dengan menggunakan DO meter ini dilakukan dilaboratorium Oseanografi FIKP UNHAS. Sedangkan pengukuran derajat keasaman (pH) dengan menggunakan pH meter dengan mencelupkan pH meter kedalam perairan. Pengukuran ini di lakukan secara *in situ*.

F. Analisis data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis secara *deskriptif* yang ditunjukkan dalam bentuk diagram komposisi zooplankton yang meliputi kelimpahan jenis, keanekaragaman jenis, dan indeks dominasi dihitung dengan menggunakan rumus :

1. Kelimpahan Plankton

Kelimpahan zooplankton dinyatakan dalam individu/m³. Rumus perhitungan kelimpahan zooplankton adalah sebagai berikut (Apha, 1979).

$$N = \frac{1}{v_s} \times F \times \frac{v_t}{v_d} \times \frac{J_a}{J_b}$$

Keterangan : N = jumlah individu zooplankton per liter

V_d = volume air yang disaring (l)

V_t = volume air yang tersaring (ml)

V_s = volume air pada Sedgwick – Rafter

J_a = jumlah total kolom pada Sedgwick – Rafter

J_b = jumlah kolom yang diamati

F = jumlah zooplankton

2. Indeks keanekaragaman jenis zooplankton

Indeks Keanekaragaman (H') jenis zooplankton dengan menggunakan rumus modifikasi dari (Shanon-Weiner, 1949):

$$H' = - \sum_{i=1}^s p_i \ln p_i$$

dimana :

H' = Indeks Keanekaragaman jenis

$P_i = n_i/N$

n_i = jumlah individu jenis ke-I

N = Jumlah total individu

3. Indeks dominansi zooplankton

Indeks dominansi (D) (Simpson, 1949) :

$$D = \frac{n_i^2}{N^2} \times 100\%$$

dimana :

D = Indeks Dominansi

n_i = jumlah individu jenis ke-i

N = Jumlah total individu

dengan kriteria (Odum, 1971) sebagai berikut :

D mendekati 0 tidak ada jenis yang mendominasi dan D mendekati 1 terdapat jenis yang mendominasi.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Pengamatan

Tabel 1. Pengamatan Parameter Pada Stasiun I Di Perairan Sungai Je'neberang Kec.Somba opu. Kab. Gowa.

No	Parameter	Stasiun I			Alat
		Hari ke -1	Ke-2	Ke-3	
1.	Fisika a. Suhu b. kecerahan	30 ⁰ c 150 cm	30 ⁰ c 150 cm	30 ⁰ c 150 cm	Thermometer Secchi disk
2.	Kimia a. pH b. Oksigen terlarut	8,25 5,60 Mg/l	8,30 5,60 Mg/l	8,52 4,48 Mg/l	pH meter Do meter
3.	Biologi a. Zooplankton	102 Ind/ m ³	702 Ind/m ³	309 Ind/ m ³	Zooplankton net

Tabel 2. Pengamatan Parameter Pada Stasiun II Di Perairan Sungai Je'neberang Kec.Somba Opu. Kab. Gowa.

No	Parameter	Stasiun II			Alat
		Hari ke -1	Ke-2	Ke-3	
1.	Fisika a.Suhu b.kecerahan	28 ⁰ c 150 cm	29 ⁰ c 150 cm	25 ⁰ c 150 cm	Thermometer Secchi disk
2.	Kimia a.pH b.Oksigen	7,26 3,10 Mg/l	8,29 3,52Mg/l	8,27 3,04Mg/l	pH meter Do meter
3.	terlarut	78 Ind/ m ³			

	Biologi a. Zooplankton		570 Ind/m ³	246 Ind/ m ³	Zooplankton net
--	---------------------------	--	---------------------------	-------------------------	--------------------

Tabel 3. Pengamatan Parameter Pada Stasiun III Di Perairan Sungai Je'neberang Kec.Somba opu. Kab. Gowa.

No	Parameter	Stasiun III			Alat
		Hari ke 1	Ke-2	Ke-3	
1.	Fisika a.Suhu b.kecerahan	25 ⁰ c 100 cm	27 ⁰ c 100 cm	26 ⁰ c 100 cm	Thermometer Secchi disk
2.	Kimia a.pH b.Oksigen terlarut	7,30 2,40 Mg/l	7,30 2,72Mg/l	7,10 2,56Mg/l	pH meter Do meter
3.	Biologi a. Zooplankton	174 Ind/ m ³	309 Ind/m ³	54 Ind/ m ³	Zooplankton net

Tabel 4. Pengamatan Komposisi Jenis Zooplankton Pada Stasiun I. Di Perairan Sungai Je'neberang Kec. Somba opu. Kab. Gowa

No	Jenis zooplankton	Waktu pengambilan	Ulangan					Jumlah
			1	2	3	4	5	
1.	<i>Lucifer</i>	Hari ke-1	2	2	1	2	2	9
2.	<i>Parasteno caris sp</i>		1	-	-	1	-	2
3.	<i>Spinodae sp</i>		1	1	1	1	-	4
4.	<i>Acartia tranteri</i>		2	-	-	-	-	2

5.	<i>Lucifer</i>	Hari ke-2	13	35	20	-	9	77	
6.	<i>Calanus firmanchicus naplius</i>		1	-	3	-	2	6	
7.	<i>Oitona tenuis</i>		1	2	-	-	-	3	
8.	<i>Maia squinode</i>		3	1	-	-	-	3	
9.	<i>Turitopsis sp</i>		1	-	-	-	-	1	
10.	<i>Inchanus dorsentensis</i>		-	-	-	1	-	1	
11.	<i>Anthomedusae</i>		-	1	-	-	1	2	
12.	<i>Crustacean naplius</i>		-	-	1	-	-	1	
13.	<i>Corystes caesivelanus</i>		-	1	1	-	-	2	
14.	<i>Acetes</i>		1	-	-	-	-	1	
15.	<i>Temora turbinate</i>		-	-	1	-	-	1	
16.	<i>Asteroidae</i>		1	1	-	-	-	2	
17.	<i>Stematopoda</i>		-	1	-	-	-	1	
18.	<i>Lucifer</i>		Hari ke-3	10	15	14	9	9	57
19.	<i>Spinodae sp</i>			1	1	3	-	-	5
20.	<i>Acetes</i>			-	-	1	-	-	1
21.	<i>Parragur priduaxi</i>			-	-	-	1	-	1
22.	<i>Calanus firmanchicus</i>	-		-	-	1	-	1	


Tabel 5. Pengamatan Komposisi Jenis Zooplankton Pada Stasiun II. Di Perairan Sungai Je'neberang Kec. Somba opu. Kab. Gowa

No	Jenis zooplankton	Waktu pengambilan	Ulangan					Jumlah
			1	2	3	4	5	
1.	<i>Mysis</i>	Hari ke-1	5	-	-	-	-	5
2.	<i>Hyperid</i>		-	1	-	1	-	2
3.	<i>Lucifer</i>		-	-	-	1	1	2
4.	<i>Spinodae sp</i>		-	-	1	-	-	1
5.	<i>Temora turbinate</i>		1	-	1	-	-	2


6.	<i>Evadne sp</i>	Hari ke-2	1	-	-	-	-	1
7.	<i>Lucifer</i>		17	17	15	20	19	88
8.	<i>Tomopteridae sp</i>		-	-	-	4	-	4
9.	<i>Hyperid</i>		1	1	-	-	-	2
10.	<i>Personatus megalopa</i>		1	-	-	-	-	1
11.	<i>Lucifer</i>	Hari ke-3	16	4	4	9	6	40
12.	<i>Stematopoda</i>		2	-	-	-	-	2
13.	<i>Alvania crassa</i>		-	-	1	-	-	1
14.	<i>Mysis</i>		1	-	-	-	-	1

Tabel 6. Pengamatan Komposisi Jenis Zooplankton Pada Stasiun III. Di Perairan Sungai Je'neberang Kec. Somba opu. Kab. Gowa


No	Jenis zooplankton	Waktu pengambilan	Ulangan					Jumlah
			1	2	3	4	5	
1.	<i>Lucifer</i>	Hari ke-1	-	2	1	-	2	5
2.	<i>Hyperid</i>		4	6	4	3	3	20
3.	<i>Alvania crassa</i>		-	-	-	-	1	1
4.	<i>Nictianes australis</i>		-	1	-	-	-	1
5.	<i>Paragur priduaxi</i>		-	-	-	1	-	1
6.	<i>Calamoecia ampulla</i>		1	-	-	-	-	1
7.	<i>Lucifer</i>	Hari ke-2	1	-	-	-	-	1
8.	<i>Hyperid</i>		6	16	13	16	11	62
9.	<i>Arcatia tranteri</i>		-	-	-	-	1	1
10.	<i>Spinodae sp</i>		1	-	-	-	-	1
11.	<i>Hyperid</i>	Hari ke-3	1	-	1	3	2	7
12.	<i>Spinodae sp</i>		-	-	-	1	-	1
13.	<i>Podon sp</i>		-	-	-	-	1	1



Gambar 3. Histogram Komposisi Jenis Zooplankton Pada Stasiun I Di Perairan Sungai Je'neberang .



Gambar 4. Histogram Komposisi Jenis Zooplankton Pada Stasiun II Di Perairan Sungai Je'neberang .



Gambar 5. Histogram Komposisi Jenis Zooplankton Pada Stasiun III Di Perairan Sungai Je'neberang .

B. Pembahasan

Pada penelitian dari tiga stasiun ditemukan zooplankton yang termasuk filum *Arthropoda*, *Cnidaria*, *Annelida*, *Echinodermata*. Pada stasiun I yaitu pada daerah estuaria ditemukan 17 jenis zooplankton dari empat kelas yaitu kelas *crustacea*, *polychaete*, *hydrozoa*, dan *asterozoa*. Filum *Arthropoda* yang paling banyak ditemukan di stasiun ini dari kelas *crustacea*, sub kelas *copepoda* dari ordo *Decapoda*. Jenis zooplankton yang paling mendominasi di stasiun ini adalah *Lucifer*. ini sesuai dengan teori yang menyatakan *Copepoda* adalah *crustacea* haloplanktonik yang berukuran kecil yang mendominasi zooplankton disemua perairan. Hewan kecil ini sangat penting artinya bagi ekonomi ekosistem-ekosistem laut karena merupakan herbivora primer dalam laut. Dengan demikian, *copepoda* berperan sebagai mata rantai yang amat penting antara produksi primer fitoplankton dengan karnivora besar dan kecil.⁷⁸

Dari hasil yang ditemukan pada muara sungai je'neberang ini ada yang sama jenisnya dan adapula yang berbeda dengan pengamatan zooplankton di perairan muara teluk Jakarta diperoleh 3 jenis yaitu : Filum *Arthropoda* yang terdiri dari 7 jenis class *Crustaceae* (*Copepoda*) yaitu *Acartia sp* , *Oithona sp* , dan, *Nauplius sp*, *Evadne sp*, *Sagitta sp*, *Calanus sp*, *Neomysis sp*, dan larva *Zoea*, filum *Annelida* 2 jenis yaitu *spinodae sp* dan *vanalis temopteridae*, 1 jenis dari Filum *Chaetognatha*, dan 1 jenis dari *Malacostraca* 1 jenis dari *Mollusca* 2 jenis dari *Protochordata* dan 2

⁷⁸ Levinton, J. S, *Marine Ecology Prentice Hall Inc Englewood Cliffs New Jersey*, 1982, h, 34-36.

jenis dari larva. Tetapi jenis zooplankton yg mendominasi di perairan ini didominasi dari jenis *Acartia Sp.*⁷⁹

Persentase komposisi jenis zooplankton dari kelas *crustacea* yaitu 86 %, dari kelas *polychaete* yaitu 3 %, dari kelas *hydrozoa* yaitu 3 %, sedangkan persentase dari komposisi jenis dari kelas *asterozoa* yaitu 2 %. Indeks keanekaragaman jenis zooplankton di stasiun ini mencapai 0,444683. Pada stasiun ini masih tergolong rendah karena $< 2,30$. Rumus modifikasi keanekaragaman yaitu apabila keanekaragaman jenis $< 2,30$ ini termasuk rendah, dan apabila $2,30 < H' < 6,08$ keanekaragaman ini termasuk sedang, dan apabila $H' > 6,08$ keanekaragaman ini termasuk tinggi. Kisaran nilai rata-rata kecerahan pada stasiun ini sebesar 150 cm. Kemampuan daya tembus sinar matahari ke dalam perairan sangat ditentukan oleh kandungan bahan organik dan anorganik tersuspensi di dalam perairan, warna perairan, kepadatan plankton, jasad renik dan detritus. Hal ini diduga yang menyebabkan kelimpahan zooplankton tertinggi pada stasiun I yaitu berkisar antara 702 ind/m^3 - 102 ind/m^3 , dengan kecerahan yang rendah kandungan zat hara banyak sehingga akan meningkatkan kelimpahan zooplankton.⁸⁰ Sedangkan kisaran nilai rata-rata suhu pada stasiun I yaitu 30°C . Pada umumnya spesies zooplankton dapat berkembang dengan baik yaitu pada suhu 25°C .⁸¹ Dengan meningkatnya suhu perairan menyebabkan zooplankton lebih aktif, sampai pada batas tertentu. Kisaran

⁷⁹ Suherman. *Struktur Komunitas Zooplankton Di Perairan Teluk Jakarta*.

⁸⁰ Wardoyo, S. T. H. *Pengelolaan kualitas perairan (Water Quality Management)*. Proyek Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi. Institut Pertanian Bogor. Bogor. 1975.h. 77.

⁸¹ Raymont, J. E. G. *Plankton and Productivity In The Ocean*. A Pergamon Press Book. The McMillan Co ; New York. 1963. h. 44.

nilai rata-rata DO sebesar 4,48 mg/l–5,60 mg/l, Hal ini sesuai dengan pernyataan NTAC.⁸² Kandungan oksigen terlarut di perairan tidak boleh kurang dari 2 mg/l karena dapat menyebabkan kematian. Kisaran pH pada stasiun I yaitu 8,25–8,52. Derajat keasaman (pH) pengamatan di stasiun ini, kisarannya masih cukup baik untuk kehidupan zooplankton.⁸³ pH perairan yang cocok untuk pertumbuhan organisme air berkisar antara 6 -9.⁸⁴

Pada stasiun II yaitu pada daerah penambangan pasir ditemukan 10 jenis zooplankton dari tiga kelas yaitu kelas *crustacea*, *polychaete*, dan *hydrozoa*. Filum *Arthropoda* juga yang paling banyak ditemukan di stasiun ini dari kelas *crustacea* dengan ordo *decapoda*. Jenis zooplankton yang paling mendominasi stasiun ini masih dari jenis *Lucifer*, hal ini diduga karena lokasi stasiun II dengan stasiun I masih memiliki karakteristik yang relatif sama yaitu berpasir, kedalaman yang hampir sama ± 150 m dan jarak antara stasiun I dengan stasiun II masih relatif dekat. Indeks keanekaragaman jenis zooplankton di stasiun ini rata-rata mencapai 1,59433, keanekaragaman pada stasiun ini juga masih tergolong rendah karena masih $< 2,30$ seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa indeks keanekaragaman dikatakan rendah jika $< 2,30$ dan dikatakan tinggi jika $>6,08$ Persentase komposisi jenis zooplankton dari kelas *crustacea* yaitu 94 %, dari kelas *polychaete* yaitu 5 %, sedangkan persentase komposisi jenis zooplankton dari kelas *hydrozoa* hanya 1 %.

⁸²Goldman, C. R. dan A. J. Horne. *Limnology. International Student Edition*. McGraw-Hill Book Company. Auckland. 1983. h. 34.

⁸³ Wardoyo, S. T. H. *loc. it*

⁸⁴ Odum, E.P, *Basic Ecology, Saunders College Publishing*, (Philadelphia,1983), h, 29

Kisaran nilai rata-rata kecerahan pada stasiun ini sebesar 150 cm, dan kisaran nilai rata-rata suhu pada stasiun II yaitu 25⁰C-29⁰C. Kelimpahan zooplankton pada stasiun ini berkisar antara 78 ind /m³- 570 ind/ m³, dan Kisaran nilai rata-rata DO sebesar 3,04 mg/l – 3,25 mg/l, sedangkan Kisaran pH pada stasiun I yaitu 7,26–8,29.

Pada stasiun III yaitu pada daerah limbah dosmetik ditemukan 9 jenis zooplankton dari tiga kelas yaitu dari kelas *crustacea*, *polychaete*, dan *gastrophoda*. filum *Arthropoda* yang yang paling banyak ditemukan dari kelas *crustacea* dengan ordo *Amphipoda*. Jenis zooplankton yang paling mendominasi di stasiun ini yaitu jenis *Hyperid* ini disebabkan oleh habitat dari *Hyperid* lebih dominan di air tawar. Indeks keanekaragaman jenis zooplankton di stasiun ini rata-rata mencapai 0,571458, keanekaragaman jenis zooplankton pada stasiun ini masih tergolong rendah karena masih < 2,30. Persentase komposisi jenis zooplankton dari kelas *crustacea* yaitu 93 %, dari kelas *polychaete* yaitu 6 %, sedangkan persentase komposisi jenis zooplankton dari kelas *gastrophoda* hanya 1%. Kisaran nilai rata-rata kecerahan pada stasiun ini sebesar 100 cm, dan kisaran nilai rata-rata suhu pada stasiun III yaitu 25⁰C- 27⁰C. Kelimpahan zooplankton pada stasiun ini berkisar antara 54 ind /m³- 309 ind/ m³, Sedangkan Kisaran pH pada stasiun III yaitu 7,10 – 7,30.⁸⁵ Kisaran nilai rata-rata DO pada stasiun ini sebesar 2,40 mg/l – 2,72 mg/l, hal ini karena perairan sungai Je'neberang diduga sudah tercemar suatu zat terlarut dari penggunaan pupuk dan pestisida dari kegiatan pertanian, industri, perkantoran, dan perdagangan. Kegiatan pada lahan tersebut pada umumnya mengeluarkan limbah dan menghasilkan

⁸⁵ Effendi, M. I. *Biologi Perikanan*. Yayasan Pustaka Nusatama, Yogyakarta. 2003. h. 21.

sampah yang langsung di buang ke dalam perairan sungai sehingga masuknya sumber-sumber pencemar tersebut menyebabkan penurunan kualitas perairan.⁸⁶ Pencemaran air dapat dikatakan sebagai turunnya kualitas air karena masuknya komponen-komponen pencemar dari kegiatan manusia atau proses alam, sehingga air tersebut tidak memenuhi syarat atau bahkan mengganggu pemanfaatannya. Terjadinya pencemaran perairan sungai dapat ditunjukkan oleh dua hal yaitu adanya pengkayaan unsur hara yang tinggi sehingga terbentuk komunitas biota dengan produksi yang berlebihan, dan air diracuni oleh zat kimia toksik yang menyebabkan lenyapnya organisme hidup bahkan mencegah semua kehidupan di perairan

Sebagaimana firman Allah dalam surah Ar rum ayat 41 yang berbunyi :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Terjemahnya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa kita sebagai makhluk ciptaan Allah SWT dan sebagai khalifah di muka bumi ini dilarang untuk melakukan kerusakan

⁸⁶ Hendrawan, D., M.F. Melati, and B. Bestari .*Kajian Kualitas Perairan Sungai*. Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah Lemlit Usakti 3 (15) . 2004, h. 54

baik di darat maupun di laut karena setiap perbuatan kita pasti akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT seperti firman Allah dalam Q.S surah Al Zalzalah ayat 7-8 yang artinya Maka barang siapa mengerjakan kebaikan walau seberat zarah niscaya dia akan melihat (balasannya). dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan akan melihat (balasannya).⁸⁷

⁸⁷ Departemen Agama R.I Alquran dan Terjemahnya. CV, Diponegoro, 2007.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

C. Hasil Pengamatan

Tabel 1. Pengamatan Parameter Pada Stasiun I Di Perairan Sungai Je'neberang Kec.Somba opu. Kab. Gowa.

No	Parameter	Stasiun I			Alat
		Hari ke -1	Ke-2	Ke-3	
1.	Fisika c. Suhu d. kecerahan	30 ⁰ c 150 cm	30 ⁰ c 150 cm	30 ⁰ c 150 cm	Thermometer Secchi disk
2.	Kimia c. pH d. Oksigen terlarut	8,25 5,60 Mg/l	8,30 5,60 Mg/l	8,52 4,48 Mg/l	pH meter Do meter
3.	Biologi a. Zooplankton	102 Ind/ m ³	702 Ind/m ³	309 Ind/ m ³	Zooplankton net

Tabel 2. Pengamatan Parameter Pada Stasiun II Di Perairan Sungai Je'neberang Kec.Somba Opu. Kab. Gowa.

No	Parameter	Stasiun II			Alat
		Hari ke -1	Ke-2	Ke-3	
1.	Fisika a. Suhu b. kecerahan	28 ⁰ c 150 cm	29 ⁰ c 150 cm	25 ⁰ c 150 cm	Thermometer Secchi disk
2.	Kimia a. pH b. Oksigen terlarut	7,26 3,10 Mg/l	8,29 3,52Mg/l	8,27 3,04Mg/l	pH meter Do meter
3.		78 Ind/ m ³			

	Biologi a. Zooplankton		570 Ind/m ³	246 Ind/ m ³	Zooplankton net
--	---------------------------	--	---------------------------	-------------------------	--------------------

Tabel 3. Pengamatan Parameter Pada Stasiun III Di Perairan Sungai Je'neberang Kec.Somba opu. Kab. Gowa.

No	Parameter	Stasiun III			Alat
		Hari ke 1	Ke-2	Ke-3	
1.	Fisika a.Suhu b.kecerahan	25 ⁰ c 100 cm	27 ⁰ c 100 cm	26 ⁰ c 100 cm	Thermometer Secchi disk
2.	Kimia a.pH b.Oksigen terlarut	7,30 2,40 Mg/l	7,30 2,72Mg/l	7,10 2,56Mg/l	pH meter Do meter
3.	Biologi a. Zooplankton	174 Ind/ m ³	309 Ind/m ³	54 Ind/ m ³	Zooplankton net

Tabel 4. Pengamatan Komposisi Jenis Zooplankton Pada Stasiun I. Di Perairan Sungai Je'neberang Kec. Somba opu. Kab. Gowa

No	Jenis zooplankton	Waktu pengambilan	Ulangan					Jumlah
			1	2	3	4	5	
1.	<i>Lucifer</i>	Hari ke-1	2	2	1	2	2	9
2.	<i>Parasteno caris sp</i>		1	-	-	1	-	2
3.	<i>Spinodae sp</i>		1	1	1	1	-	4
4.	<i>Acartia tranteri</i>		2	-	-	-	-	2

5.	<i>Lucifer</i>	Hari ke-2	13	35	20	-	9	77	
6.	<i>Calanus firmanchicus naplius</i>		1	-	3	-	2	6	
7.	<i>Oitona tenuis</i>		1	2	-	-	-	3	
8.	<i>Maia squinode</i>		3	1	-	-	-	3	
9.	<i>Turitopsis sp</i>		1	-	-	-	-	1	
10.	<i>Inchanus dorsentensis</i>		-	-	-	1	-	1	
11.	<i>Anthomedusae</i>		-	1	-	-	1	2	
12.	<i>Crustacean naplius</i>		-	-	1	-	-	1	
13.	<i>Corystes caesivelanus</i>		-	1	1	-	-	2	
14.	<i>Acetes</i>		1	-	-	-	-	1	
15.	<i>Temora turbinata</i>		-	-	1	-	-	1	
16.	<i>Asteroidae</i>		1	1	-	-	-	2	
17.	<i>Stematopoda</i>		-	1	-	-	-	1	
18.	<i>Lucifer</i>		Hari ke-3	10	15	14	9	9	57
19.	<i>Spinodae sp</i>			1	1	3	-	-	5
20.	<i>Acetes</i>			-	-	1	-	-	1
21.	<i>Parragur priduaxi</i>			-	-	-	1	-	1
22.	<i>Calanus firmanchicus</i>	-		-	-	1	-	1	


Tabel 5. Pengamatan Komposisi Jenis Zooplankton Pada Stasiun II. Di Perairan Sungai Je'neberang Kec. Somba opu. Kab. Gowa

No	Jenis zooplankton	Waktu pengambilan	Ulangan					Jumlah
			1	2	3	4	5	
1.	<i>Mysis</i>	Hari ke-1	5	-	-	-	-	5
2.	<i>Hyperid</i>		-	1	-	1	-	2
3.	<i>Lucifer</i>		-	-	-	1	1	2
4.	<i>Spinodae sp</i>		-	-	1	-	-	1
5.	<i>Temora turbinata</i>		1	-	1	-	-	2


6.	<i>Evadne sp</i>	Hari ke-2	1	-	-	-	-	1
7.	<i>Lucifer</i>		17	17	15	20	19	88
8.	<i>Tomopteridae sp</i>		-	-	-	4	-	4
9.	<i>Hyperid</i>		1	1	-	-	-	2
10.	<i>Personatus megalopa</i>		1	-	-	-	-	1
11.	<i>Lucifer</i>	Hari ke-3	16	4	4	9	6	40
12.	<i>Stematopoda</i>		2	-	-	-	-	2
13.	<i>Alvania crassa</i>		-	-	1	-	-	1
14.	<i>Mysis</i>		1	-	-	-	-	1

Tabel 6. Pengamatan Komposisi Jenis Zooplankton Pada Stasiun III. Di Perairan Sungai Je'neberang Kec. Somba opu. Kab. Gowa


No	Jenis zooplankton	Waktu pengambilan	Ulangan					Jumlah
			1	2	3	4	5	
1.	<i>Lucifer</i>	Hari ke-1	-	2	1	-	2	5
2.	<i>Hyperid</i>		4	6	4	3	3	20
3.	<i>Alvania crassa</i>		-	-	-	-	1	1
4.	<i>Nictianes australis</i>		-	1	-	-	-	1
5.	<i>Paragur priduaxi</i>		-	-	-	1	-	1
6.	<i>Calamoecia ampulla</i>		1	-	-	-	-	1
7.	<i>Lucifer</i>	Hari ke-2	1	-	-	-	-	1
8.	<i>Hyperid</i>		6	16	13	16	11	62
9.	<i>Arcatia tranteri</i>		-	-	-	-	1	1
10.	<i>Spinodae sp</i>		1	-	-	-	-	1
11.	<i>Hyperid</i>	Hari ke-3	1	-	1	3	2	7
12.	<i>Spinodae sp</i>		-	-	-	1	-	1
13.	<i>Podon sp</i>		-	-	-	-	1	1



Gambar 3. Histogram Komposisi Jenis Zooplankton Pada Stasiun I Di Perairan Sungai Je'neberang .



Gambar 4. Histogram Komposisi Jenis Zooplankton Pada Stasiun II Di Perairan Sungai Je'neberang .



Gambar 5. Histogram Komposisi Jenis Zooplankton Pada Stasiun III Di Perairan Sungai Je'neberang .

D. Pembahasan

Pada penelitian dari tiga stasiun ditemukan zooplankton yang termasuk filum *Arthropoda*, *Cnidaria*, *Annelida*, *Echinodermata*. Pada stasiun I yaitu pada daerah estuaria ditemukan 17 jenis zooplankton dari empat kelas yaitu kelas

crustacea, *polychaete*, *hydrozoa*, dan *asterozoa*. Filum *Arthropoda* yang paling banyak ditemukan di stasiun ini dari kelas *crustacea*, sub kelas *copepoda* dari ordo *Decapoda*. Jenis zooplankton yang paling mendominasi di stasiun ini adalah *Lucifer*. ini sesuai dengan teori yang menyatakan *Copepoda* adalah *crustacea* haloplanktonik yang berukuran kecil yang mendominasi zooplankton disemua perairan. Hewan kecil ini sangat penting artinya bagi ekonomi ekosistem-ekosistem laut karena merupakan herbivora primer dalam laut. Dengan demikian, *copepoda* berperan sebagai mata rantai yang amat penting antara produksi primer fitoplankton dengan karnivora besar dan kecil.⁸⁸

Dari hasil yang ditemukan pada muara sungai je'neberang ini ada yang sama jenisnya dan adapula yang berbeda dengan pengamatan zooplankton di perairan muara teluk Jakarta diperoleh 3 jenis yaitu : Filum *Arthropoda* yang terdiri dari 7 jenis class *Crustaceae* (*Copepoda*) yaitu *Acartia sp* , *Oithona sp* , dan, *Nauplius sp*, *Evadne sp*, *Sagitta sp*, *Calanus sp*, *Neomysis sp*, dan larva *Zoea*, filum *Annelida* 2 jenis yaitu *spinodae sp* dan *vanalis temopteridae*, 1 jenis dari Filum *Chaetognatha*, dan 1 jenis dari *Malacostraca* 1 jenis dari *Mollusca* 2 jenis dari *Protochordata* dan 2 jenis dari larva. Tetapi jenis zooplankton yg mendominasi di perairan ini didominasi dari jenis *Acartia Sp*.⁸⁹

Persentase komposisi jenis zooplankton dari kelas *crustacea* yaitu 86 %, dari kelas *polychaete* yaitu 3 %, dari kelas *hydrozoa* yaitu 3 %, sedangkan persentase dari

⁸⁸ Levinton, J. S, *Marine Ecology Prentice Hall Inc Englewood Cliffs New Jersey*, 1982, h, 34-36.

⁸⁹ Suherman. *Struktur Komunitas Zooplankton Di Perairan Teluk Jakarta*.

komposisi jenis dari kelas *asterozoa* yaitu 2 %. Indeks keanekaragaman jenis zooplankton di stasiun ini mencapai 0,444683. Pada stasiun ini masih tergolong rendah karena $H' < 2,30$. Rumus modifikasi keanekaragaman yaitu apabila keanekaragaman jenis $H' < 2,30$ ini termasuk rendah, dan apabila $2,30 < H' < 6,08$ keanekaragaman ini termasuk sedang, dan apabila $H' > 6,08$ keanekaragaman ini termasuk tinggi. Kisaran nilai rata-rata kecerahan pada stasiun ini sebesar 150 cm. Kemampuan daya tembus sinar matahari ke dalam perairan sangat ditentukan oleh kandungan bahan organik dan anorganik tersuspensi di dalam perairan, warna perairan, kepadatan plankton, jasad renik dan detritus. Hal ini diduga yang menyebabkan kelimpahan zooplankton tertinggi pada stasiun I yaitu berkisar antara 702 ind/m^3 - 102 ind/m^3 , dengan kecerahan yang rendah kandungan zat hara banyak sehingga akan meningkatkan kelimpahan zooplankton.⁹⁰ Sedangkan kisaran nilai rata-rata suhu pada stasiun I yaitu 30°C . Pada umumnya spesies zooplankton dapat berkembang dengan baik yaitu pada suhu 25°C .⁹¹ Dengan meningkatnya suhu perairan menyebabkan zooplankton lebih aktif, sampai pada batas tertentu. Kisaran nilai rata-rata DO sebesar 4,48 mg/l–5,60 mg/l, Hal ini sesuai dengan pernyataan NTAC.⁹² Kandungan oksigen terlarut di perairan tidak boleh kurang dari 2 mg/l karena dapat menyebabkan kematian. Kisaran pH pada stasiun I yaitu 8,25–8,52.

⁹⁰Wardoyo, S. T. H. *Pengelolaan kualitas perairan (Water Quality Management)*. Proyek Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi. Institut Pertanian Bogor. Bogor. 1975.h. 77.

⁹¹Raymont, J. E. G. *Plankton and Productivity In The Ocean*. A Pergamon Press Book. The McMillan Co ; New York. 1963. h. 44.

⁹²Goldman, C. R. dan A .J. Horne. *Limnology. International Student Edition*. McGraw-Hill Book Company. Auckland. 1983. h. 34.

Derajat keasaman (pH) pengamatan di stasiun ini, kisarannya masih cukup baik untuk kehidupan zooplankton.⁹³ pH perairan yang cocok untuk pertumbuhan organisme air berkisar antara 6 -9.⁹⁴

Pada stasiun II yaitu pada daerah penambangan pasir ditemukan 10 jenis zooplankton dari tiga kelas yaitu kelas *crustacea*, *polychaete*, dan *hydrozoa*. Filum *Arthropoda* juga yang paling banyak ditemukan di stasiun ini dari kelas *crustacea* dengan ordo *decapoda*. Jenis zooplankton yang paling mendominasi stasiun ini masih dari jenis *Lucifer*, hal ini diduga karena lokasi stasiun II dengan stasiun I masih memiliki karakteristik yang relatif sama yaitu berpasir, kedalaman yang hampir sama ± 150 m dan jarak antara stasiun I dengan stasiun II masih relatif dekat. Indeks keanekaragaman jenis zooplankton di stasiun ini rata-rata mencapai 1,59433, keanekaragaman pada stasiun ini juga masih tergolong rendah karena masih $< 2,30$ seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa indeks keanekaragaman dikatakan rendah jika $< 2,30$ dan dikatakan tinggi jika $>6,08$ Persentase komposisi jenis zooplankton dari kelas *crustacea* yaitu 94 %, dari kelas *polychaete* yaitu 5 %, sedangkan persentase komposisi jenis zooplankton dari kelas *hydrozoa* hanya 1 %. Kisaran nilai rata-rata kecerahan pada stasiun ini sebesar 150 cm, dan kisaran nilai rata-rata suhu pada stasiun II yaitu 25°C - 29°C . Kelimpahan zooplankton pada stasiun ini berkisar antara 78 ind / m^3 - 570 ind/ m^3 , dan Kisaran nilai rata-rata DO sebesar 3,04 mg/l – 3,25 mg/l, sedangkan Kisaran pH pada stasiun I yaitu 7,26–8,29.

⁹³ Wardoyo, S. T. H. *loc. it*

⁹⁴ Odum, E,P, *Basic Ecology*, Saunders College Publishing, (Philadelphia,1983), h, 29

Pada stasiun III yaitu pada daerah limbah dosmetik ditemukan 9 jenis zooplankton dari tiga kelas yaitu dari kelas *crustacea*, *polychaete*, dan *gastrophoda*. filum *Arthropoda* yang yang paling banyak ditemukan dari kelas *crustacea* dengan ordo *Amphipoda*. Jenis zooplankton yang paling mendominasi di stasiun ini yaitu jenis *Hyperid* ini disebabkan oleh habitat dari *Hyperid* lebih dominan di air tawar. Indeks keanekaragaman jenis zooplankton di stasiun ini rata-rata mencapai 0,571458, keanekaragaman jenis zooplankton pada stasiun ini masih tergolong rendah karena masih < 2,30. Persentase komposisi jenis zooplankton dari kelas *crustacea* yaitu 93 %, dari kelas *polychaete* yaitu 6 %, sedangkan persentase komposisi jenis zooplankton dari kelas *gastrophoda* hanya 1%. Kisaran nilai rata-rata kecerahan pada stasiun ini sebesar 100 cm, dan kisaran nilai rata-rata suhu pada stasiun III yaitu 25⁰C- 27⁰C. Kelimpahan zooplankton pada stasiun ini berkisar antara 54 ind /m³- 309 ind/ m³, Sedangkan Kisaran pH pada stasiun III yaitu 7,10 – 7,30.⁹⁵ Kisaran nilai rata-rata DO pada stasiun ini sebesar 2,40 mg/l – 2,72 mg/l, hal ini karena perairan sungai Je'neberang diduga sudah tercemar suatu zat terlarut dari penggunaan pupuk dan pestisida dari kegiatan pertanian, industri, perkantoran, dan perdagangan. Kegiatan pada lahan tersebut pada umumnya mengeluarkan limbah dan menghasilkan sampah yang langsung di buang ke dalam perairan sungai sehingga masuknya sumber-sumber pencemar tersebut menyebabkan penurunan kualitas perairan.⁹⁶ Pencemaran air dapat dikatakan sebagai turunnya kualitas air karena masuknya

⁹⁵ Effendi, M. I. *Biologi Perikanan*. Yayasan Pustaka Nusatama, Yogyakarta. 2003. h. 21.

⁹⁶ Hendrawan, D., M.F. Melati, and B. Bestari .*Kajian Kualitas Perairan Sungai*. Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah Lemlit Usakti 3 (15) . 2004, h. 54

komponen-komponen pencemar dari kegiatan manusia atau proses alam, sehingga air tersebut tidak memenuhi syarat atau bahkan mengganggu pemanfaatannya. Terjadinya pencemaran perairan sungai dapat ditunjukkan oleh dua hal yaitu adanya pengkayaan unsur hara yang tinggi sehingga terbentuk komunitas biota dengan produksi yang berlebihan, dan air diracuni oleh zat kimia toksik yang menyebabkan lenyapnya organisme hidup bahkan mencegah semua kehidupan di perairan.

Sebagaimana firman Allah dalam surah Ar rum ayat 41 yang berbunyi :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Terjemahnya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa kita sebagai makhluk ciptaan Allah SWT dan sebagai khalifah di muka bumi ini dilarang untuk melakukan kerusakan baik di darat maupun di laut karena setiap perbuatan kita pasti akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT seperti firman Allah dalam Q.S surah Al Zalzalah ayat 7-8 yang artinya Maka barang siapa mengerjakan kebaikan walau seberat zarah niscaya dia akan melihat (balasannya). dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan akan melihat (balasannya).⁹⁷

⁹⁷ Departemen Agama R.I Alquran dan Terjemahnya. CV, Diponegoro, 2007.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Komposisi jenis zooplankton pada tiga stasiun pengamatan ditemukan 26 jenis zooplankton yang termasuk dalam filum *Arthropoda*, *Annelida*, *Echinodermata*, dan *Cnidaria*. Dari filum diatas terbagi dalam 5 kelas yaitu *Crustacea*, *Polychaeta*, *Gastrophoda*, *Asterozoa*, *Hydrozoa* Komposisi jenis zooplankton pada semua stasiun pengamatan didominasi kelas *Crustacea*.
2. Kelimpahan zooplankton pada stasiun I berkisar antara 102 ind/m³-702 ind/m³, dan pada stasiun II berkisar antara 78 ind/m³-264 ind/m³, pada stasiun III berkisar antara 54 ind/m³-309 ind/m³. Sedangkan indeks keanekaragaman stasiun I rerata mencapai 0,444683, pada stasiun II rerata mencapai 1,59433, dan pada stasiun III rerata mencapai 0,571458. Nilai indeks keanekaragaman pada tiga stasiun tersebut tergolong rendah karena kurang dari < 2,30.

B. Saran

Untuk memperoleh gambaran komposisi dan kelimpahan jenis zooplankton pengambilan sampel di perairan sungai Je'neberang dilakukan baik, saat pasang dan saat surut dan diharapkan penelitian selanjutnya meneliti mengenai komposisi jenis fitoplankton.

DAFTAR PUSTAKA

- Arinardi, O. H. *Status Pengetahuan Plankton di Indonesia*. Oseanologi dan Limnologi di Indonesia. Puslitbang-LIPI. Jakarta. 1997.
- Basmi. J. *Planktonologi: Distribusi Plankton Dalam Perairan*. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. IPB. Bogor. 2000.
- Baugis. p. *Merine Plankton Ecology Elsevier*. 1976.
- Buyd. C. E. *Water Quality in Warinmater Fish Pound. Aubur University Agri Cultural Ekperimen Station*. Almaba USA. 1979.
- Charton, B dan J. Tietjen. *Seas and Oceans*. Collin. Glassglow and London. 1989
- Coleman. *Grouper Ecology*. Florida State University Coastal and Marine Laboratory. 2008
- Djarajah, A. S. *Pakan Ikan Alami*. Kanisius, Jakarta. 1995
- Effendi, M. I. *Biologi Perikanan*. Yayasan Pustaka Nusatama, Yogyakarta. 2003
- Fitrianto. F. *Sifat Fisik Entuarin*. 2009.
- Forti.G. *Light Energy Utilization in Photosynthesis*. In Goldman, C.R. 1969.
- Goldman, C. R. dan A .J. Horne. *Limnology. International Student Edition*. McGraw-Hill Book Company. Auckland. 1983.
- Gosari, Benny. *Skripsi Komposisi Jenis Fitoplankton Berbahaya di Sekitar Pelabuhan Soekarno Hatta*. Universitas Hasanuddin. Makassar. . 2002
- Gross, G. *Oceanography : A view of the Earth*. 5th edition. 1969.
- Hendrawan, D. M. F. Melati, and B. Bestari .*Kajian Kualitas Perairan Sungai*. Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah Lemlit Usakti. 2004.
- Hutabarat. S. dan S. M, Evans, *Pengantar Oseanografi*. Universitas Indonesia Press Jakarta. 1985.

- Hutagalung, H.P. D. Setiapermana dan S.H. Riyono. *Metode Analisis Air Laut, Sedimen dan Biota*. Buku 2. Puslitbang Oseanologi LIPI. Jakarta. 1997
- Kennish, M. J. *Ecology of Estuaries*. Vol.II. Biological Aspect. CRC Press. Boston. 1969.
- Levinton. J. S. *Marine Ecology Prentice Hall Inc Engglewood Cliffs New Jersey* 1982.
- Lewis, Jr. *Zooplankton Community Analysis*. 1985.
- Longhurst, A. R dan D. Pauly. *Ecology of Tropical Oceans*. Academic Press Inc. Sandiego. 1987.
- Nontji. *Laut Nusantara*. Djambatan Jakarta. 2005.
- Nybakken, J. W. *Biologi Laut Suatu Pendekatan Ekologi*. PT. Gramedia: Jakarta. 1992.
- Nybakken, J. W. *Biologi Laut Suatu Pendekatan Ekologi*. Gramedia Jakarta. 1988.
- Odum, E. P. *Fundamentals of Ecology*. WB Saunders Company:Phyladelphia. 1971.
- Odum, E. P. *Basic Ecology*. Saunders College Publishing. Philadelphia. 1983.
- Omori, M. Ikeda, T. *Methods In Marine Zooplankton Ecology*. Krieger Publishing Company: Malabar, USA. 1992.
- Parsons, T. R. M.Takahashi dan B. Hargrave. *Biological Oceanographic*. 1984.
- Raymont, J. E. G. *Plankton and Productivity In The Ocean*. A Pergamon Press Book. The McMillan Co ; New York. 1963.
- Richardson, A. J. *In hot water: zooplankton and climate change*. – ICES Journal of Marine Science. 2008.
- Romimohtarto, Kasjian dan Srijuwana. *Biologi Laut*. Djambatan. Jakarta. 2001
- Sachlan, M. *Planktonologi. Correspondense Course Center*. Jakarta. 1972.
- Sandy. *Republik Indonesia Geografi Regional*. Jakarta: Jurusan Geografi FMIPA UI-PT Indografi Bakti. 1996.

Shety, H. P. G. S. B Saha dan BB Chosh. *Observation The Distribution Of Planton And Fluctuation Estuarine System .*” With Notes on their Relation to Commercial Fish Landing Indian J. F. S. 1963.

Southwood, T. R. E. dan P. A. Henderson. *Ecologikal methods 3 .ed, Blackwell science ltd. Oxford. UK. 2000.*

“Trubus,” JakartaPusat. *Distribusi Zooplankton dilaut.*www.Cnrsfr/presse/communiqe /564.htm. (9 Mei 2010).


Wardoyo, S. T. H. *Pengelolaan kualitas perairan (Water Quality Management).* Proyek Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi. Institut Pertanian Bogor. Bogor. 1975.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Lampiran 1 Deskripsi lokasi pengambilan sampel.


No	Stasiun	Deskripsi lokasi
1.	Stasiun I Daerah muara sungai (estuaria)	Daerah ini adalah suatu daerah dimana bertemunya antara sungai dengan laut terbuka (muara sungai), dengan warna air yang masih jernih dan berpasir.
2.	Stasiun II (Daerah Penambangan Pasir)	Daerah ini adalah daerah dimana masyarakat disekitar tempat ini beraktivitas menambak pasir, dengan warna air yang agak keruh dan berpasir.
3.	Stasiun III (Daerah limbah dosmetik)	Daerah ini adalah daerah tempat pembuangan sampah rumah tangga, dengan warna air yang sangat keruh dan berlumpur.

B. lampiran 2. Gambar Peta Lokasi Pengambilan Sampel Di Perairan Sungai Je'neberang









C. Lampiran 3. Tabel Hasil Pengamatan Komposisi Jenis Zooplankton.

1. Hasil Pengamatan Pada stasiun I malam ke-1

No	Jenis Zooplankton	Jumlah Individu
1.	<i>Lucifer</i> 	9
2.	<i>Parasteno caris sp</i>  <i>Spinodae sp</i>	2
3.	 <i>Acartia tranteri</i>	4
4.		2


2. Tabel Pengamatan pada stasiun I malam ke -2



No	Jenis Zooplankton	Jumlah Individu
1.	<i>Lucifer</i> 	77
2.	<i>Calanus finmarchicus</i> <i>naplius</i> 	6
3.	<i>Oitona tenuis</i> 	3
4.	<i>Maia squinode</i> 	19
5.	<i>Turritopsis sp</i> 	1
6.	<i>Inachus dorsentensis</i>	1

		
7.	<i>Anthomedusae</i>	2
		
8.	<i>Crustacean nauplius</i>	1
		
9.	<i>Corystes caesivelanus megalopa</i>	2
		
10.	<i>Acetes</i>	1
		
11.	<i>Temoridae turbinate</i>	1
		
12.	<i>Asteroidae</i>	2



13.	 <p data-bbox="418 520 589 558"><i>Stomatopoda</i></p>	1
-----	---	---

3. Tabel pengamatan Pada Stasiun I Malam 3

No	Jenis Zooplankton	Jumlah Individu
1.	<p data-bbox="418 993 516 1031"><i>Lucifer</i></p> 	57
2.	<p data-bbox="418 1213 578 1251"><i>Spinodae sp</i></p> 	5
3.	<p data-bbox="418 1440 508 1478"><i>Acetes</i></p>  <p data-bbox="418 1839 670 1877"><i>Paragur prideauxi</i></p>	1





4.	<p><i>megapola</i></p>  <p><i>Calanus finmarchicus</i> <i>naplius</i></p>	1
5.		1

4. Tabel Pengamatan stasiun II. Malam ke -1



No	Jenis Zooplankton	Jumlah Individu
1.	<p><i>Mysis</i></p> 	5
2.	<p><i>Hyperid</i></p> 	2
3.	<p><i>Lucifer</i></p>  <p><i>Spinodae sp</i></p>	2
4.	 <p><i>Temoridae turbinata</i></p>	1
5.	 <p><i>Evadne sp</i></p> 	2

6.		1
----	--	---






5. Tabel Pengamatan Pada Stasiun II hari ke-2

No	Jenis Zooplankton	Jumlah Individu
1.	<p><i>Lucifer</i></p> 	88
2.	<p><i>Tomopteridae sp</i></p> 	4
3.	<p><i>Hyperid</i></p> 	2
4.	<p><i>Personatus megalopa</i></p> 	1

6. Tabel Pengamatan pada stasiun II Malam ke -3



No	Jenis Zooplankton	Jumlah Individu
1.	<p><i>Lucifer</i></p> 	40
2.	<p><i>Stematoda</i></p> 	2
3.	<p><i>Alvania Crassa</i></p>  <p><i>Mysis</i></p>	1
4.		1

7. Tabel Pengamatan Pada Stasiun III malam ke-1


No	Jenis Zooplankton	Jumlah Individu
1.	<p><i>Lucifer</i></p> 	5
2.	<p><i>Hyperid</i></p> 	20
3.	<p><i>Alvania Crassa</i></p> 	1
4.	<p><i>Nictianes australis</i></p> 	1
5.	<p><i>Paragur priduaxi megalopa</i></p>  <p><i>Calamoecia ampulla</i></p> 	1

6.		1
----	--	---

8. Tabel Pengamatan Pada Stasiun III malam ke-2

No	Jenis Zooplankton	Jumlah Individu
1.	<p><i>Lucifer</i></p> 	1
2.	<p><i>Hyperid</i></p> 	62
3.	<p><i>Arcatia tranteri</i></p>  <p><i>Spinodae sp</i></p>	1
4.		1

9. Tabel Pengamatan Pada Stasiun III Malam Ke-3

No	Jenis Zooplankton	Jumlah Individu
1.	<p><i>Hyperid</i></p> 	7
2.	<p><i>Spinodae sp</i></p> 	1
3.	<p><i>Podon sp</i></p> 	1

D. Analisis Data kelmpahan, keanekaragaman, dan indeks dominasi zooplankton

1) Kelimpahan Zooplankton Pada Stasiun 1.1 sebagai berikut :

Diketahui : $vs = 1$ $vt = 60 \text{ ml}$ $vd = 10 \text{ L}$ $Ja = 1000$

$$J_b = 1000 \quad F = 17$$

$$N = \frac{1}{1} \times 17 \times \frac{60}{10} \times \frac{1000}{1000}$$

$$N = 102 \text{ ind} / \text{m}^3$$

2) Kelimpahan Zooplankton Pada Stasiun 1.2 sebagai berikut :

$$\text{Diketahui : } v_s = 1 \quad v_t = 60 \text{ ml} \quad v_d = 10 \text{ L} \quad J_a = 1000$$

$$J_b = 1000 \quad F = 117$$

$$N = \frac{1}{1} \times 17 \times \frac{60}{10} \times \frac{1000}{1000}$$

$$N = 702 \text{ ind} / \text{m}^3$$

1). Indeks Keanekaragaman Jenis Zooplankton pada Stasiun 1.1 sebagai berikut :

$$\text{Diketahui } n_i = 4 \quad N = 17 \quad p_i = \frac{4}{17} = 0,23$$

$$H' = - \sum_{i=1}^S 0,23 \times 1 \times 17 \times 0,23 = 0,8993 \quad (H' < 2,30 = \text{keanekaragaman rendah})$$

2). Indeks Keanekaragaman Jenis Zooplankton pada Stasiun 1.2 sebagai berikut :

$$\text{Diketahui } n_i = 13 \quad N = 117 \quad p_i = \frac{13}{117} = 0,11$$

$$H' = - \sum_{i=1}^S 0,11 \times 1 \times 117 \times 0,11 = 0,0529 \quad (H' < 2,30 = \text{keanekaragaman rendah})$$

1). Indeks Dominasi Zooplankton pada stasiun 1.1 sebagai berikut :

Diketahui $n_i = 4$, $N = 17$ maka

$$D = \frac{(4)^2}{(17)^2} \times 100\%$$

$$D = \frac{16}{289} \times 100\% = 5,5$$

2). Indeks Dominasi Zooplankton pada stasiun 1.2 sebagai berikut :

Diketahui $n_i = 13$, $N = 117$ maka

$$D = \frac{(13)^2}{(117)^2} \times 100\%$$

$$D = \frac{169}{13689} \times 100\% = 1,23$$

E. Lampiran 4 Tabel Kelimpahan, Keanekaragaman, dan Dominasi jenis

Zooplankton Pada Tiga Stasiun pengamatan.

No	Stasiun	Kelimpahan(Ind /m ³)	Keanekaragaman(H')	Dominasi (D)
1.	I	102	0,8993	5,5
2.		702	0,0529	1,23
3.		309	0,38185	0,59
4.	II	78	2,7508	21,3
5.		570	1,6758	0,17
6.	III	264	0,3564	0,82
7.		174	1,23044	4,28
8.		309	0,241865	0,85
9.		54	0,98011	11,1

B. Analisis Data

1. Kelimpahan zooplankton

Kelimpahan zooplankton dinyatakan dalam individu/m³. Rumus perhitungan kelimpahan zooplankton adalah sebagai berikut (Apha, 1979).

$$N = \frac{1}{v_s} \times F \frac{v_t}{v_d} \times \frac{J_a}{J_b}$$

Keterangan : N = jumlah individu zooplankton per liter

Vd = volume air yang disaring (l)

Vt = volume air yang tersaring (ml)

Vs = volume air pada Sedgwick – Rafter

Ja = jumlah total kolom pada Sedgwick – Rafter

Jb = jumlah kolom yang diamati

F = jumlah zooplankton

3) Kelimpahan Zooplankton Pada Stasiun 1.1 sebagai berikut :

Diketahui : $v_s = 1$ $v_t = 60 \text{ ml}$ $v_d = 10 \text{ L}$ $J_a = 1000$

$J_b = 1000$ $F = 17$

$$N = \frac{1}{1} \times 17 \frac{60}{10} \times \frac{1000}{1000}$$

$$N = 102 \text{ ind / m}^3$$

4) Kelimpahan Zooplankton Pada Stasiun 1.2 sebagai berikut :

Diketahui : $v_s = 1$ $v_t = 60 \text{ ml}$ $v_d = 10 \text{ L}$ $J_a = 1000$

$J_b = 1000$ $F = 117$

$$N = \frac{1}{1} \times 17 \frac{60}{10} \times \frac{1000}{1000}$$

$$N = 702 \text{ ind / m}^3$$

5) Kelimpahan Zooplankton Pada Stasiun 1.3 sebagai berikut :

$$\text{Diketahui : } v_s = 1 \quad v_t = 60 \text{ ml} \quad v_d = 10 \text{ L} \quad J_a = 1000$$

$$J_b = 1000 \quad F = 65$$

$$N = \frac{1}{1} \times 17 \frac{60}{10} \times \frac{1000}{1000}$$

$$N = 309 \text{ ind / m}^3$$

6) Kelimpahan Zooplankton Pada Stasiun 2.1 sebagai berikut :

$$\text{Diketahui : } v_s = 1 \quad v_t = 60 \text{ ml} \quad v_d = 10 \text{ L} \quad J_a = 1000$$

$$J_b = 1000 \quad F = 13$$

$$N = \frac{1}{1} \times 13 \frac{60}{10} \times \frac{1000}{1000}$$

$$N = 78 \text{ ind / m}^3$$

7) Kelimpahan Zooplankton Pada Stasiun 2.2 sebagai berikut :

$$\text{Diketahui : } v_s = 1 \quad v_t = 60 \text{ ml} \quad v_d = 10 \text{ L} \quad J_a = 1000$$

$$J_b = 1000 \quad F = 95$$

$$N = \frac{1}{1} \times 95 \frac{60}{10} \times \frac{1000}{1000}$$

$$N = 570 \text{ ind / m}^3$$

8) Kelimpahan Zooplankton Pada Stasiun 2.3 sebagai berikut :

$$\text{Diketahui : } v_s = 1 \quad v_t = 60 \text{ ml} \quad v_d = 10 \text{ L} \quad J_a = 1000$$

$$J_b = 1000 \quad F = 44$$

$$N = \frac{1}{1} \times 44 \frac{60}{10} \times \frac{1000}{1000}$$

$$N = 264 \text{ ind / m}^3$$

9) Kelimpahan Zooplankton Pada Stasiun 3.1 sebagai berikut :

$$\text{Diketahui : } v_s = 1 \quad v_t = 60 \text{ ml} \quad v_d = 10 \text{ L} \quad J_a = 1000$$

$$J_b = 1000 \quad F = 29$$

$$N = \frac{1}{1} \times 29 \frac{60}{10} \times \frac{1000}{1000}$$

$$N = 174 \text{ ind / m}^3$$

10) Kelimpahan Zooplankton Pada Stasiun 3.2 sebagai berikut :

$$\text{Diketahui : } v_s = 1 \quad v_t = 60 \text{ ml} \quad v_d = 10 \text{ L} \quad J_a = 1000$$

$$J_b = 1000 \quad F = 65$$

$$N = \frac{1}{1} \times 65 \frac{60}{10} \times \frac{1000}{1000}$$

$$N = 309 \text{ ind / m}^3$$

11) Kelimpahan Zooplankton Pada Stasiun 3.3 sebagai berikut :

$$\text{Diketahui : } v_s = 1 \quad v_t = 60 \text{ ml} \quad v_d = 10 \text{ L} \quad J_a = 1000$$

$$J_b = 1000 \quad F = 9$$

$$N = \frac{1}{1} \times 9 \frac{60}{10} \times \frac{1000}{1000}$$

$$N = 54 \text{ ind / m}^3$$

2. Indeks keanekaragaman jenis zooplankton

Indeks Keanekaragaman (H') jenis zooplankton dengan menggunakan rumus modifikasi dari (Shanon-Weiner, 1949):

$$H' = - \sum_{i=1}^s p_i \ln p_i$$

dimana :

H' = Indeks Keanekaragaman jenis

$P_i = n_i/N$

n_i = jumlah individu jenis ke-I

N = Jumlah total individu

1). Indeks Keanekaragaman Jenis Zooplankton pada Stasiun 1.1 sebagai berikut :

$$\text{Diketahui } n_i = 4 \quad N = 17 \quad p_i = \frac{4}{17} = 0,23$$

$$H' = - \sum_{i=1}^s 0,23 \times 1 \times 17 \times 0,23 = 0,8993 \quad (H' < 2,30 = \text{keanekaragaman rendah})$$

2). Indeks Keanekaragaman Jenis Zooplankton pada Stasiun 1.2 sebagai berikut :

$$\text{Diketahui } n_i = 13 \quad N = 117 \quad p_i = \frac{13}{117} = 0,11$$

$$H' = - \sum_{i=1}^s 0,11 \times 1 \times 117 \times 0,11 = 0,0529 \quad (H' < 2,30 = \text{keanekaragaman rendah})$$

3). Indeks Keanekaragaman Jenis Zooplankton pada Stasiun 1.3 sebagai berikut :

$$\text{Diketahui } n_i = 5 \quad N = 65 \quad p_i = \frac{5}{65} = 0,07$$

$$H' = - \sum_{i=1}^s 0,07 \times 1 \times 65 \times 0,07 = 0,38185 \quad (H' < 2,30 = \text{keanekaragaman rendah})$$

4). Indeks Keanekaragaman Jenis Zooplankton pada Stasiun 2.1 sebagai berikut :

$$\text{Diketahui } n_i = 6 \quad N = 13 \quad p_i = \frac{6}{13} = 0,46$$

$$H' = - \sum_{i=1}^s 0,46 \times 1 \times 13 \times 0,46 = 2,7508 \quad (2,30 < H' < 6,08 = \text{keanekaragaman sedang})$$

5). Indeks Keanekaragaman Jenis Zooplankton pada Stasiun 2.2 sebagai berikut :

$$\text{Diketahui } n_i = 4 \quad N = 95 \quad p_i = \frac{4}{95} = 0,042$$

$$H' = - \sum_{i=1}^s 0,042 \times 1 \times 95 \times 0,042 = 1,6758 \quad (H' < 2,30 = \text{keanekaragaman rendah})$$

6). Indeks Keanekaragaman Jenis Zooplankton pada Stasiun 2.3 sebagai berikut :

$$\text{Diketahui } n_i = 4 \quad N = 44 \quad p_i = \frac{4}{44} = 0,090$$

$$H' = - \sum_{i=1}^s 0,090 \times 1 \times 44 \times 0,090 = 0,3564 \quad (H' < 2,30 = \text{keanekaragaman rendah})$$

7). Indeks Keanekaragaman Jenis Zooplankton pada Stasiun 3.1 sebagai berikut :

$$\text{Diketahui } n_i = 6 \quad N = 29 \quad p_i = \frac{6}{29} = 0,206$$

$$H' = - \sum_{i=1}^s 0,206 \times \ln 0,206 = 1,230644 \quad (H' < 2,30 = \text{keanekaragaman rendah})$$

8). Indeks Keanekaragaman Jenis Zooplankton pada Stasiun 3.2 sebagai berikut :

$$\text{Diketahui } n_i = 4 \quad N = 65 \quad p_i = \frac{4}{65} = 0,061$$

$$H' = - \sum_{i=1}^s 0,061 \times \ln 0,061 = 0,241865 \quad (H' < 2,30 = \text{keanekaragaman rendah})$$

9). Indeks Keanekaragaman Jenis Zooplankton pada Stasiun 3.3 sebagai berikut :

$$\text{Diketahui } n_i = 3 \quad N = 9 \quad p_i = \frac{3}{9} = 0,33$$

$$H' = - \sum_{i=1}^s 0,33 \times \ln 0,33 = 0,241865 \quad (H' < 2,30 = \text{keanekaragaman rendah})$$

3. Indeks dominansi zooplankton

Indeks dominansi zooplankton (D) (Simpson, 1949) sebagai berikut :

$$D = \frac{n_i^2}{N^2} \times 100\%$$

dimana :

D = Indeks Dominansi

n_i = jumlah individu jenis ke-i

N = Jumlah total individu

dengan kriteria (Odum, 1971) sebagai berikut :

D mendekati 0 tidak ada jenis yang mendominasi dan D mendekati 1 terdapat jenis yang mendominasi.

1). Indeks Dominasi Zooplankton pada stasiun 1.1 sebagai berikut :

Diketahui $n_i = 4$, $N = 17$ maka

$$D = \frac{(4)^2}{(17)^2} \times 100\%$$

$$D = \frac{16}{289} \times 100\% = 5,5$$

2). Indeks Dominasi Zooplankton pada stasiun 1.2 sebagai berikut :

Diketahui $n_i = 13$, $N = 117$ maka

$$D = \frac{(13)^2}{(117)^2} \times 100\%$$

$$D = \frac{169}{13689} \times 100\% = 1,23$$

3). Indeks Dominasi Zooplankton pada stasiun 1.3 sebagai berikut :

Diketahui $n_i = 5$, $N = 65$ maka

$$D = \frac{(5)^2}{(65)^2} \times 100\%$$

$$D = \frac{25}{4225} \times 100\% = 0,59$$

4). Indeks Dominasi Zooplankton pada stasiun 2.1 sebagai berikut :

Diketahui $n_i = 6$, $N = 13$ maka

$$D = \frac{(6)^2}{(13)^2} \times 100\%$$

$$D = \frac{36}{169} \times 100\% = 21,3$$

5). Indeks Dominasi Zooplankton pada stasiun 2.2 sebagai berikut :

Diketahui $n_i = 4$, $N = 95$ maka

$$D = \frac{(4)^2}{(95)^2} \times 100\%$$

$$D = \frac{16}{9025} \times 100\% = 0,17$$

6). Indeks Dominasi Zooplankton pada stasiun 2.3 sebagai berikut :

Diketahui $n_i = 4$, $N = 44$ maka

$$D = \frac{(4)^2}{(44)^2} \times 100\%$$

$$D = \frac{16}{1936} \times 100\% = 0,82$$

7). Indeks Dominasi Zooplankton pada stasiun 3.1 sebagai berikut :

Diketahui $n_i = 6$, $N = 29$ maka

$$D = \frac{(6)^2}{(29)^2} \times 100\%$$

$$D = \frac{16}{1936} \times 100\% = 4,28$$

8). Indeks Dominasi Zooplankton pada stasiun 3.2 sebagai berikut :

Diketahui $n_i = 4$, $N = 65$ maka

$$D = \frac{(4)^2}{(65)^2} \times 100\%$$

$$D = \frac{16}{4225} \times 100\% = 0,85$$

9). Indeks Dominasi Zooplankton pada stasiun 3.3 sebagai berikut :

Diketahui $n_i = 3$, $N = 9$ maka

$$D = \frac{(3)^2}{(9)^2} \times 100\%$$

$$D = \frac{9}{81} \times 100\% = 11,1$$



RIWAYAT HIDUP

Rabanai lahir di Sodoa, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Je'nepono pada Tanggal 13 Nopember 1986 merupakan buah hati pasangan Lemba dengan Basse. Anak ke-4 dari empat bersaudara.

Penulis menempuh pendidikan formal pada tahun 1994-1999 di SD Negeri Pallengu. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Bangkala pada tahun 2000-2002. Pada tahun 2004-2006 penulis melanjutkan pendidikan di SMA negeri 1 Bangkala Barat. Pada tahun 2006 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar melalui jalur SPMB dan diterima di fakultas Sains dan Teknologi di Jurusan Biologi. Pada tahun 2010 penulis menyelesaikan S/1 nya dalam kurung waktu tiga tahun enam bulan. Selama menjalani sebagai Mahasiswa penulis pernah aktif di berbagai organisasi HMJ Biologi, BEM FST UIN Alauddin Makassar, dan Organisasi UKM SB eSA.