

**KANDUNGAN LOGAM BERAT TIMBAL (Pb) PADA KERANG
KIMA SISIK (*Tridacna squamosa*) DI PERAIRAN
PELABUHAN FERI BIRA KABUPATEN
BULUKUMBA**



SKRIPSI

Diajukan untuk Uemenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains Jurusan
Biologi Pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar

Oleh :

KARNELI

NIM. 60300106022

**JURUSAN BIOLOGI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2010**

**KANDUNGAN LOGAM BERAT TIMBAL (Pb) PADA KERANG
KIMA SISIK (*Tridacna squamosa*) DI PERAIRAN
PELABUHAN FERI BIRA KABUPATEN
BULUKUMBA**



SKRIPSI

Diajukan untuk Uemenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains Jurusan
Biologi Pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar

Oleh :

KARNELI

NIM. 60300106022

**JURUSAN BIOLOGI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2010**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul, “Kandungan Logam Berat Timbal (Pb) Pada Kerang Kima Sisik (*Tridacna squmosa*) Di Sekitar Pelabuhan Feri Bira Kabupaten Bulukumba” yang disusun oleh Karneli, NIM: 60300106022, mahasiswi jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari rabu, tanggal 18 Agustus 2010 M, bertepatan dengan 25 Sya’ban 1431 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Sains dan Teknologi, Jurusan Biologi (dengan beberapa perbaikan).*

Makassar, 18 Agustus 2010 M
25 Sya’ban 1431 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Ir. Syarif Beddu M. T	(.....)
Sekretaris	: Drs. M. Arif Alim M. Ag	(.....)
Munaqisy I	: Hj Ernawati S Kaseng S. Pi., M. Si	(.....)
Munaqisy II	: Sitti Saenab S. Pd., M. Pd	(.....)
Munaqisy III	: Prof. Dr. H. Bahaking Rama, M. S	(.....)
Pembimbing I	: Fatmawati Nur K, S.Si., M. Si	(.....)
Pembimbing II	: Hafsan S. Si., M. Pd	(.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. Bahaking Rama ,M. S.
NIP. 19520709 198103100. 1

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, dibuat atau dibantu orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 18 Agustus 2010
Penulis

Karneli

NIM: 60300106022

KATA PENGANTAR
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah. SWT, karena atas berkah dan rahmatnyalah skripsi yang berjudul “ kandungan Logam Berat Timbal (Pb) pada kerang kima sisik (*Tridacna squamosa*) di Seikitar Pelabuhan Feri Bira Kabupaten Bulukumba dapat selesai tepat pada waktunya. Tidak lupa pula penulis kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad.SAW, karena atas usaha beliau kita dapat menikmati kemajuan teknologi dan dunia pendidikan seperti sekarang ini.

Penulis benar-benar berterimah kasih kepada pihak-pihak yang telah turut membantu pada penulisan skripsi ini:

1. Kepada orang tuaku , mama (alm. Ermawati) yang telah mengandung dan menghadirkanku kedunia,yang tak pernah lelah merawat dan mengajarku tentang kehidupan dan bagaimana menjadi bijak kelak, mama. Papa (Tamrin) yang selalu berjuang mencarikanku nafkah agar aku bisa seperti teman-teman yang lain, yang selalu diam dan percaya pada apa yang aku lakukan, untuk mereka terimah kasih dan cinta yang tidak akan pernah putus.
2. Kepada Rektor UIN Alauddin Makassar Prof, Dr, H. Azhar Arsyad, M.A. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di kampus Hijau UIN Alauddin Makassar.

3. Kepada Dekan fakultas Sains dan Teknologi UIN Prof, Dr. H. Bahaking rama, M.S. dan stafnya yang selalu membantu penulis untuk menyelesaikan segala urusan di kampus.
4. Kepada ketua Jurusan Biologi sains dan sekretaris jurusan, serta Dosen pengajar di jurusan Biologi yang selama ini banyak membantu dan selalu memberi arahan kepada penulis dalam mencapai cita-cita.
5. Kepada Pembimbing I. Ibu Fatmawati Nur.K. S.Si., Msi, terima kasih atas segala saran dan masukannya kepada penulis, atas kesabarannya membimbing penulis hingga skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya. Pembimbing II. Ibu Hafsan S.Si. M.pd, yang tidak pernah lelah memperhatikan penulisan skripsi ini, yang selalu meluangkan waktunya mengoreksi skripsi ini dan tidak pernah lelah memberi semangat kepada penulis, semoga yang terbaik selalu datang kepada beliau dan setiap langkahnya di berkahi oleh Allah, SWT. Amin.
6. Kepada kepala Laboratorium Kesehatan Makassar dan stafnya yang telah memberi izin kepada penulis untuk meneliti di sana dan banyak membantu dalam penelitian ini.
7. Kepada nenekku (Hj. Bongko salaki) terima kasih tanpa nenek aku tidak yakin bisa sampai pada tahap ini, senyuman nenek selalu membuatku bangkit saat terpuruk, aku ingin selalu membahagiakanmu, dorongan semangat darimu, petuah-petuahmu, dan doa-doamu membuatku mampu menatap masa depanku tanpa harus takut dan malu.

8. Kepada kakak (Mansur bodi) terima kasih atas semua fasilitas yang diberikan untukku, walau kadang kita tak sepaham tapi aku yakin kakak selalu menyayangiku, dan kakak juga harus tau aku akan selalu sayang kakak.
9. Kepada segenap keluarga yang selalu menyayangiku. Penulis berharap dapat membalas apa yang telah kalian berikan.
10. Kepada para penguji yang selalu mengoreksi dan memberi masukan kepada penulis sehingga skripsi ini menjadi layak untuk dibaca.
11. Kepada sahabat-sahabatku, Inna, Irna, Budi, Mala, Ida, Endi, Agus, Rendi, Naskur, Azma, Ida, Mila, Nisma, Ria, Anto, Sarif, didin, Esi, Rain, Izna, Fingki, Ekki, tanpa kalian aku lelah menghadapi kehidupanku yang penuh dengan rintangan, kalian adalah sumber motivasiku untuk selalu bangkit dan tersenyum saat diterpa masalah, terima kasih sudah membuat hidupku penuh warna.
12. Kepada keluarga besar Biologi dan Teman KKNku terutama angkatan 2006 penulis selalu menganggap kalian adalah keluarga yang tidak akan pernah terpahus oleh masa.
13. Kepada semua orang yang telah membantu yang tidak dapat disebut satu persatu.

Penulis sadar betul bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, jadi penulis mengharapkan saran dan masukan dari orang-orang yang telah membaca skripsi ini. Besar harapan penulis kelak skripsi ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi

orang-orang di dunia pendidikan. Dan menjadi informasi penting kepada masyarakat tentang bahaya logam yang terdapat pada makanan laut, terutama pada kerang.

Wassalam.

Makassar, 2010

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KEASLIHAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACTION.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Desa Bira Kabupaten Bulukumb.....	8
a.1. Tofografi Desa Bira Kabupaten Bulukumba.....	8
a.2. Pelabuhan Feri Bira.....	9
B. Pencemaran Laut.....	11
C. Kerang Familia Tridacnidae.....	28
D. Kerang kima Sisik (<i>Tridacna squamosa</i>).....	38
E. Logam Berat.....	42
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	48

B. Variabel Penelitian.....	48
C. Defenisi Oprasional Penelitian.....	48
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	49
E. Batasan Penelitian.....	49
F. Prosedur Penelitian.....	50
G. Analisis Data.....	51

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Hasl Penelitian.....	52
B. Pembahasan.....	53

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Toksitas Beberapa Logam Berat.....	42
Tabel 2. Rata-rata Kandungan Logam Berat Timbal (Pb) Pada semua stasiun.....	50
Tabel 3. Kandungan logam Berat Timbal (Pb)	

Pada stasiun 1.....	62
Tabel 4. Kandungan logam Berat Timbal (Pb)	
Pada stasiun 2.....	63
Tabel 5. Kandungan Logam Berat Timbal (Pb)	
Pada Stasiun 3.....	64
Tabel 5. Kandungan Logam Berat Timbal (Pb)	
Pada Stasiun 4.....	64
Tabel 5. Kandungan Logam Berat Timbal (Pb)	
Pada Stasiun 5.....	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar.1. Kerang Kima <i>Tridacna squamo</i>	34
Gambar 2. Kerang kima <i>Tridacna gigas</i>	35
Gambar 3. Kerang kima <i>Tridacna</i> dewasa.....	35
Gamba 4. Kerang kima <i>Tridacna maxima</i>	36

Gambar 5. Kerang kima <i>Tridacna crocea</i>	36
Gambar 6. Kerang kima <i>Tridacna squamosa</i>	40
Gambar 7. Peta Pelabuhan Feri Bira Kabupaten Bulukumba.....	43

ABSTRAK

Nama penyusun : Karneli

NIM : 60300106022

**Judul : Kandungan Logam Berat Timbal (Pb) Pada Kerang
Kima Sisik (*Tridacna squamosa*) Di Sekitar Pelabuhan Feri
Bira Kabupaten Bulukumba.**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kadar logam berat timbal (Pb) pada kerang kima sisik (*Tridacna squamosa*) di perairan pelabuhan feri Bira kabupaten Bulukumba. Kandungan logam berat timbal Pb yang terakumulasi ditubuh kerang kima *Tridacna squamosa* dilakukan pengujian dengan SSA (Spektrofotometer Serapan Atom). Hasil yang diperoleh menunjukkan, pada stasiun 1 rata-rata 0,0014 mg/kg, stasiun 2 rata-rata sebesar 0,0012 mg/kg, pada stasiun 3 rata-rata sebesar 0,00105 mg/kg, stasiun 4 rata-rata sebesar 0,00075 mg/kg, dan pada stasiun 5 rata-rata sebesar 0,0006 mg/kg. Hasil penelitian menunjukkan kerang kima *Tridacna squamosa* masih layak untuk dikonsumsi karena kadar logam timbalnya masih dibawah standar kelayakan menurut WHO yaitu 0,715 mg/kg.

Kata kunci: Kerang kima *Tridacna squamosa* (Familia Tridacnidae) dan Logam Timbal Pb.

ABSTRACT

Compiler Name : Karneli

NIM : 60300106022

**Title skripsi : Uterus of Heavy Timbale metal (Pb) at was Tendon Oysten
kima (*Tridacna squamosa*) of Territorial Harbour Fery Bira
Bulukumba Subdistrich**

This research aims to know the degree of heavy timbale metal (Pb) hat was tendon oyster kima (*Tridacna squamosa*) of territorial harbove fery Bira Bulukumba subdistrick. Analysis of timbale metal (Pb) degree at sampel of tendon oyster kima (*Triacna squamosa*) was done by using SSA method. The result of research showed that, at station 1 is 0,0014 mg/kg, station 2 is 0,0012 mg/kg, at statyon 3 is 0,00105 mg/kg, at statyon 4 is 0,00075 mg/kg, at statyon 5 is 0,0006 mg/kg. Base on the result of research, conten of timbale metal (pb) at tendon oyster kima (*Tridacna squamosa*) is still underneath of limit sill that was determined by WHO valuable 0,715 mg/kg.

Keyword: Oyster kima *Tidacna squamosa* (Familia Tridacnidae) dan Timbale (Pb).

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelabuhan feri Bira di kabupaten Bulukumba adalah salah satu pusat transportasi antar pulau di Sulawesi Selatan, dimana terdapat tiga kapal feri yang beroperasi, dan beberapa kapal motor nelayan yang berlabuh di sana. Limbah dari kapal-kapal yang berupa bensin, oli, solar, dan sampah organik dibuang langsung ke perairan sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan yang dapat berakibat langsung pada organisme lautan.¹

Air laut merupakan suatu komponen yang berinteraksi dengan lingkungan daratan, di mana buangan limbah dari daratan akan bermuara ke laut. Selain itu air laut juga sebagai tempat penerimaan polutan (bahan cemar) yang jatuh dari atmosfer. Limbah yang mengandung polutan akan masuk ke dalam ekosistem perairan pantai dan laut, sebagian larut dalam air, sebagian tenggelam ke dasar dan terkonsentrasi ke sedimen, dan sebagian masuk ke dalam jaringan tubuh organisme laut (termasuk fitoplankton, ikan, udang, cumi-cumi, kerang, rumput laut dan lain-lain). Ikan planktivores dimangsa oleh ikan karnivores (pemakan ikan atau hewan) sebagai tropik level ketiga, selanjutnya dimangsa oleh ikan predator sebagai tropik level tertinggi.²

¹*Skilas Tentang Pelabuhan Feri Bira*, <http://www.Bulukumba.com>, diakses pada tanggal 08 april 2009.

²*Dampak pencemaran air laut pada manusia*, <http://www.Pencemaran lingkungan. Com>, Diakses pada tanggal 16 mei 2009.

Perairan adalah salah satu wadah alami yang paling rentan terhadap pencemaran logam berat timbal, ini karena limbah industri yang berasal dari pemukiman ataupun pabrik yang dialirkan ke sungai akan bermuara ke laut. Selain itu kebiasaan masyarakat sekitar perairan yang membuang limbahnya ke perairan juga menjadi salah satu penyebab pencemaran. Pencemaran logam timbal (Pb) juga disebabkan oleh kegiatan transportasi dikarenakan oleh penggunaan tetrametil-Pb dan tetraetil-Pb dalam bahan bakar berkualitas rendah untuk menurunkan nilai oktan sebagai anti-knock mesin kendaraan. Premium mengandung Pb sebesar 0,45 g/L sehingga jumlah Pb yang terlepas ke lingkungan sangat besar.³

Di perairan pelabuhan feri Bira terdapat banyak jenis kerang, salah satu diantaranya adalah kerang kima sisik (*Tridana squamosa*). Kerang merupakan salah satu makanan favorit di daerah pelabuhan feri Bira dan sekitarnya karena selain daging kerang kima sisik (*Tridacna squamosa*) yang enak dan mengandung protein, makanan laut ini juga mudah didapatkan saat laut dalam keadaan surut. Selain kerang bermanfaat ada hal yang harus diperhatikan bahwa kerang kima sisik *Tridacna squamosa* juga mampu menampung logam-logam berat dalam tubuhnya, kemampuan kerang itu ditunjang oleh struktur anatomi tubuhnya yang dilengkapi dengan rongga yang terdapat antara epitel mantel dan permukaan cangkang bagian dalam yang berisi cairan ekstrapalial sehingga benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuhnya tertampung pada rongga tersebut. Hal ini diperkuat dengan penelitian terdahulu yang

³ Salim, *Relokasi Industri Harus di Kawasan Nonknveksi*, <http://www.pikiran-rakyat.com/> 15 juli 2006

dilakukan di laut Jawa yang menyatakan ikan dan kerang dari laut tersebut tidak layak untuk dikonsumsi, karena dalam tubuhnya mengandung logam berat yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Oleh karena itu, penelitian tentang kandungan logam berat timbal (Pb) pada kerang kima sisik (*Tridacna squamosa*) di sekitar pelabuhan feri Bira kabupaten Bulukumba dipandang perlu untuk dilakukan.⁴

Salah satu polutan yang paling berbahaya bagi kesehatan manusia adalah logam berat. *World Health Organization* (WHO) atau Organisasi Kesehatan Dunia dan *Food Agriculture Organization* (FAO) atau Organisasi Pangan Dunia merekomendasikan untuk tidak mengonsumsi makanan laut (*sea food*) yang tercemar logam berat. Logam berat telah lama dikenal sebagai suatu elemen yang mempunyai daya racun yang sangat potensial dan memiliki kemampuan terakumulasi dalam organ tubuh manusia. Bahkan tidak sedikit yang menyebabkan kematian. Beberapa logam berat yang berbahaya adalah air raksa atau mercury (Hg), Kadmium (Cd), Timbal (Pb), Tembaga (Cu), dan lain-lain.⁵

Timbal merupakan salah satu logam berat yang paling sering menjadi polutan pada lingkungan, karena merupakan limbah yang sering digunakan baik pada industri kecil misalnya limbah rumah tangga sampai pada industri besar seperti pabrik-pabrik penghasil produk. Logam berat timbal (Pb) bila terdapat pada lingkungan dalam jumlah yang banyak maka akan berbahaya bagi makhluk hidup disekitarnya atas tingkat toksitas logam berat timbal (Pb) terletak pada urutan ke dua dan ketiga

⁴ *Kerang kima indikator pencemaran lingkungan*, <http://biologi.com>, diakses pada tanggal 21 januari 2009.

⁵ *Ibid*

dimana kisaran tingkat racun (ppb) yaitu untuk timah hitam (anorganik) yaitu 1.000-100.000, dan timah hitam (organik) 0,02-300.⁶

Beberapa sifat logam berat timbal adalah terakumulasi di lingkungan, tidak dapat terurai secara biologis dan toksisitasnya tidak berubah sepanjang waktu. Timbal bersifat toksik jika terhirup atau tertelan oleh manusia dan di dalam tubuh akan beredar mengikuti aliran darah, diserap kembali di dalam ginjal dan otak, dan disimpan di dalam tulang dan gigi. Keracunan Pb secara kronis berjalan lambat. Kelelahan, kelesuan, dan iritabilitas merupakan tanda awal dari intoksikasi Pb secara kronis. Paparan dengan dosis rendah sudah menimbulkan efek yang merugikan pada perkembangan dan fungsi dari sistem saraf pusat. Gejala lainnya adalah kehilangan libido, gangguan menstruasi, serta aborsi spontan pada wanita.⁷

Berdasarkan hasil beberapa penelitian baik penelitian skripsi mahasiswa, penelitian perguruan tinggi, penelitian Litbang Pemerintah, serta penelitian LSM, menunjukkan bahwa beberapa perairan di Indonesia sudah mengalami tekanan pencemaran yang cukup serius. Oleh karena itu, pencemaran laut seharusnya perlu mendapat perhatian yang serius dari berbagai pihak, baik masyarakat awam, Lembaga Sosial Masyarakat, pemerhati lingkungan, peneliti, perguruan tinggi maupun pemerintah sebagai pengambil kebijakan. Agar kasus yang terjadi di wilayah pesisir Bandar Lampung tahun 2009 yang menyatakan biota laut yang menjadi pangan

⁶ Ricoversen, *Intoksikasi Logam Berat*, Blogpada wordpress.com. 2010. (Diakses 28 juni 2010).

⁷ *Ibid*

di perairan tersebut tidak layak dikonsumsi karena kadar logam berat yang terkandung dalam biota laut melebihi ambang batas yang telah ditentukan.⁸

Menurut pandangan islam tentang makanan yang layak untuk dikonsumsi tertuang pada Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 172, yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ
وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Terjemahnya : “Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah”.

B. Rumusan Masalah

Berapa kadar logam berat timbal (Pb) pada kerang kima sisik (*Tridacna squamosa*) di perairan pelabuhan feri Bira kabupaten Bulukumba?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui kadar logam berat timbal (Pb) pada kerang kima sisik (*Tridacna squamosa*) di perairan pelabuhan feri Bira kabupaten Bulukumba.

D. Manfaat Penelitian

⁸ Irfan Antoni, *Dampak Pencemaran Pantai dan Laut Terhadap Kesehatan Manusia*, [http://www.costal community proverti-Indonesia](http://www.costalcommunityproverti-Indonesia), 11 maret 2009, diakses pada tanggal 14 juli 2010.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah dapat menjadi informasi penting bagi masyarakat Bira kabupaten Bulukumba tentang bahaya logam berat Timbal (Pb) pada lingkungan, dan menjadi literatur tambahan untuk penelitian selanjutnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Desa Bira Kabupaten Bulukumba

1. Tofografi Desa Bira Kabupaten Bulukumba

Kabupaten Bulukumba terletak di ujung bagian selatan ibu kota propinsi Sulawesi Selatan, terkenal dengan industri perahu pinisi . Luas wilayah kabupaten Bulukumba 1.154,67 Km² dengan jarak tempuh dari kota Makassar sepanjang 153 Km. Secara geografis kabupaten Bulukumba terletak pada koordinat antara 5° 20” sampai 5° 40” Lintang Selatan dan 119° 50” sampai 120° 28” Bujur Timur. Batas-batas wilayah kabupaten Bulukumba yaitu Sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Sinjai, sebelah selatan berbatasan dengan laut Flores, sebelah timur berbatasan dengan teluk Bone, dan sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Bantaeng. Kabupaten Bulukumba mempunyai 10 kecamatan salah satu diantaranya adalah kecamatan Bontobahari, 24 kelurahan dan desa 123 buah salah satu diantaranya adalah desa Bira, dengan jumlah penduduk sebanyak 25.366 orang.⁹

Desa Bira terletak di daerah ujung paling selatan provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya di kecamatan Bonto Bahari, kabupaten Bulukumba. Tanjung Bira terletak sekitar 40 km dari kota Bulukumba, atau 200 km dari kota Makassar. Perjalanan dari kota Makassar ke kota Bulukumba dapat ditempuh dengan menggunakan angkutan

⁹ Zul Fikar, *Menyaksikan Pembuatan Perahu Pinisi Di Butta Panrita Lopi*, <http://www.SinarHarapan.co.id>. (Diakses 28 agustus 2010).

umum dengan tarif sebesar Rp. 40.000,-. Selanjutnya, dari Kota Bulukumba ke Tanjung Bira dapat ditempuh dengan menggunakan mobil pete-pete (mikrolet) dengan tarif berkisar antara Rp. 8.000,- sampai – Rp. 10.000,-. Total waktu perjalanan dari Kota Makassar ke Tanjung Bira sekitar 3 – 4 jam.¹⁰

2. Pelabuhan feri Bira

Pelabuhan feri yang terletak di kabupaten Bulukumba tepatnya di desa Bira, menjadi pusat penyeberangan antar pulau khususnya Selayar. Tiga kapal feri yang beroperasi di pelabuhan tersebut yaitu KM. Bonto Haru dengan rute Pulau Sembawa, KM. Belida dengan rute Tondasi dan KM. Sangke Pallanga dengan rute Pamatata Selayar. KM. Sangke Pallanga merupakan kapal feri yang beroperasi setiap hari, sedangkan dua kapal lainnya memiliki jadwal satu kali satu minggu transit (beroperasi) dipelabuhan Feri Bira.¹¹

Selain tiga kapal feri tersebut, terdapat banyak kapal motor kecil, milik nelayan setempat yang berlabuh di sekitar pelabuhan tersebut. Dari aktifitas perkapalan tersebut kita dapat menyaksikan pemandangan perairan yang mulai di banjiri limbah organik maupun non organik, limbah-limbah kapal Feri dan kapal motor nelayan, berupa logam-logam berat, sampah plastik, solar dan lain-lain, dibuang langsung keperairan, sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan terutama di sekitar pelabuhan feri Bira, selain dari kapal-kapal yang beroperasi di sekitar pelabuhan, limbah rumah tangga juga mengambil andil besar mencemari daerah pelabuhan feri Bira.¹²

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Ratnawati, *Pelabuhan ferry bira*, [http://www. Bulukumba.com](http://www.Bulukumba.com).(22 agustus 2009).

¹² *Ibid*

Limbah-limbah yang dibuang langsung ke perairan ini menimbulkan ketakutan pada sebagian masyarakat yang peduli terhadap lingkungan, karena jika perairan feri Bira ini benar-benar tercemar oleh logam berat maka akan berakibat fatal terhadap biota lautnya, masyarakat sekitar pelabuhan feri Bira memiliki kebiasaan mengambil lauk pauk di sekitar pelabuhan, misalnya jenis rumput laut yang biasa dijadikan sayur, dan beberapa jenis kerang-kerangan yang biasa diolah untuk makanan sehari-hari. Kebiasaan penduduk ini akan berakibat fatal pada mereka jika pelabuhan feri Bira benar-benar tercemar logam, karena logam-logam berat yang terkandung pada makanan itu, dengan sendirinya akan masuk kedalam tubuh manusia dan dapat merusak organ-organ dalam jika dikonsumsi.¹³

Dalam pandangan islam pencemaran merupakan salah satu bentuk kelalaian umat yang dapat membinasakan umat tersebut, seperti pada penjelasan hadis di bawah ini yang diriwayatkan dari Abi Hurairah:

مَنْ عَادَ إِلَى هُدَى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ م :
مَنْ عَادَ :م قَالَ .عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
إِلَى هُدَى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لَا
يَنْقُصُهُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَ مَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ

¹³ Aditya, *Keadaan Pelabuhan ferry Bira*, <http://www.jurnalpencemaran.com>, (09 mei 2009).

كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ إِثْمِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُضُ ذَلِكَ

مِنْ إِثْمِهِمْ شَيْئًا رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Abi Hurairah bahwasanya Rosulullah SAW bersabda : ”Barangsiapa yang menyerukan petunjuk kebaikan, ia akan memperoleh pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa sedikitpun mengurangi pahala pengikut-pengikutnya itu. Barangsiapa yang mengajak kepada kesesatan, maka kepadanya akan ditimpakan dosa seperti dosanya yang mengikuti seruannya, tanpa sedikitpun mengurangi dosa-dosa yang diderita pengikut-pengikutnya itu”. (H.R. Muslim)¹⁴.

Di dalam hadits ini memberikan pengertian bahwa orang yang menyerukan kepada kebaikan ia akan memperoleh pahala yang berlipat ganda, yakni pahala dirinya melakukan perbuatan baiknya dan pahala seseorang mengerjakan kebaikan atas seruannya. Begitu pula akan ditimpakan dosa yang berlipat ganda bagi orang yang menyerukan perbuatan sesat dosa bagi orang yang melakukan kesesatan itu sendiri dan dosa menganjurkan seseorang berbuat sesat, dosanya orang yang mengikuti kesesatan. Seperti halnya kebaikan untuk menyerukan keada sesama manusia untuk menjaga pelestarian lingkungan yang telah diserukan kepada umat manusai melalui kitab suci al-Quran. Di dalam Al-Qur’an, Allah telah memberikan informasi spiritual kepada manusia untuk bersikap ramah terhadap lingkungan. Informasi tersebut memberikan sinyalamen bahwa manusia harus selalu menjaga dan

¹⁴ Muh. Irsyad, *Hadis Tentang Pencemaran Lingkungan*, <http://www.Hadis.Com>, (22 februari 2009).

melestarikan lingkungan agar tidak menjadi rusak, tercemar bahkan menjadi punah, sebab apa yang Allah berikan kepada manusia semata-mata merupakan suatu amanah. Melalui Kitab Suci yang Agung ini (Al-Qur'an) membuktikan bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan kepada umatnya untuk bersikap ramah lingkungan.¹⁵

B. Pencemaran Laut

Laut Indonesia memiliki luas lebih kurang 5,6 juta km² dengan garis pantai sepanjang 81.000 km, dengan potensi sumber daya, terutama perikanan laut yang cukup besar, baik dari segi kuantitas maupun diversitasnya. Selain itu Indonesia tetap berhak untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam di laut lepas di luar batas 200 mil laut ZEE, serta pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam dasar laut perairan internasional di luar batas landas kontinen. Nampa bahwa kepentingan pembangunan ekonomi di Indonesia lebih memanfaatkan potensi sumberdaya daratan daripada potensi sumberdaya perairan laut. Sementara itu sumber daya laut sangat berpotensi menyumbangkan pendapatan yang sangat signifikan, karena alasan tersebut keadaan perairan tidak terlalu diperhatikan sehingga beberapa perairan telah dipastikan tercemar. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran beberapa pihak tentang bahaya pencemaran bagi kehidupan biota laut.¹⁶

Kemajuan teknologi yang serba canggih, membuat berbagai pihak mengeluhkan salah satu ancaman terhadap pencemaran lingkungan. Penyebab

¹⁵*Ibid*

¹⁶ Doni Purnomo. Logam Berat Sebagai Penyumbang Pencemaran Air Laut, [http://www. Dony Purnomo .com](http://www.DonyPurnomo.com), 2009 (Diakses pada tanggal 19 juli 2010).

utamanya yaitu industri besar yang kurang peduli dan beberapa kesalahan prosedur, namun tidak hanya itu semua punya potensi untuk mencemari laut. Berikut lebih jauh dibahas tentang seluk beluk pencemaran laut. Pencemaran laut didefinisikan sebagai peristiwa masuknya partikel kimia, limbah industri, pertanian dan perumahan, kebisingan, atau penyebaran organisme invasif (asing) ke dalam laut, yang berpotensi memberi efek berbahaya. Selain itu peningkatan jumlah penduduk yang melakukan berbagai aktivitas yang bermukim di sekitar perairan merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan perairan tercemar, air buangan dari pemukiman yang dibuang langsung ke perairan tanpa pengolahan dapat merubah kualitas perairan.¹⁷

Pencemaran air pada umumnya diakibatkan oleh kegiatan manusia. Besar kecilnya pencemaran akan tergantung dari jumlah dan kualitas limbah yang dibuang kesungai yang akhirnya bermuara di perairan, baik limbah padat maupun cair. Berdasarkan jenis kegiatannya maka sumber pencemaran air dibedakan menjadi dua yaitu pertama pencemaran Effluent industry pengolahan effluent adalah pencurahan limbah cair yang masuk kedalam air bersumber dari pembuangan sisa produksi, lahan pertanian, peternakan dan kegiatan domestik. Dari hasil statistik industri di DKI Jakarta, sumber industri pengolahan yang menjadi sumber pencemaran air yaitu agro industri (peternakan sapi, babi dan kambing), industri pengolahan makanan, industri minuman, industri tekstil, industri kulit, industri kimia dasar, industri mineral non logam, industri logam dasar, industri hasil olahan logam dan industri listrik,

¹⁷ Darmono, *Lingkungan Hidup dan Pencemaran* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2001), 16.

penggunaan bahan bakar transportasi yang menggunakan bahan logam berat timbal (Pb) dan gas. pencemar yang kedua adalah Sumber domestik/buangan rumah tangga Menurut peraturan Menteri Kesehatan, yang dimaksud dengan buangan rumah tangga adalah buangan yang berasal bukan dari industri melainkan berasal dari rumah tangga, kantor, hotel, restoran, tempat ibadah, tempat hiburan, pasar, pertokoan dan rumah sakit.¹⁸

Pencemaran, menurut SK Menteri Kependudukan Lingkungan Hidup No 23/MENKLH/1997, adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air/udara, dan/atau berubahnya tatanan (komposisi) air/udara oleh kegiatan manusia dan proses alam, sehingga kualitas air/udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan dan air tanah akibat aktivitas manusia. Pencemaran air dapat disebabkan oleh berbagai hal dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Meningkatnya kandungan nutrien dapat mengarah pada eutrofikasi. Sampah organik seperti air comberan (*sewage*) menyebabkan peningkatan kebutuhan oksigen pada air yang menerimanya yang mengarah pada berkurangnya oksigen yang dapat berdampak parah terhadap seluruh ekosistem. Industri membuang berbagai macam polutan ke dalam air limbahnya seperti logam berat, toksin organik, minyak, nutrien dan padatan. Air limbah tersebut memiliki efek termal, terutama yang dikeluarkan

¹⁸ Yunus Nuhammad, *Pencemaran air*, <http://www.Pencemaran air.com>.(Diakses 08 november 2007).

oleh pembangkit listrik, yang dapat juga mengurangi oksigen dalam air. Kualitas air sungai tercemar biasanya diukur melalui nilai *Biological Oxygen Demand* (BOD).¹⁹

Pada sebuah kasus pencemaran, banyak bahan kimia yang berbahaya berbentuk partikel kecil yang kemudian diambil oleh plankton dan binatang dasar laut, yang sebagian besar adalah pengurai ataupun *filter feeder*. Dengan cara ini, racun yang terkonsentrasi dalam laut masuk ke dalam rantai makanan, semakin panjang rantai yang terkontaminasi, kemungkinan semakin besar pula kadar racun yang tersimpan. Pada banyak kasus lainnya, banyak dari partikel kimiawi ini bereaksi dengan oksigen, menyebabkan perairan menjadi terkontaminasi. Sebagian besar sumber pencemaran laut berasal dari daratan, baik tertiuap angin, terhanyut maupun melalui tumpahan. Kapal sebagai alat transportasi laut, dapat memungkinkan mencemari sungai dan samudera dalam banyak cara, antara lain melalui tumpahan minyak, air penyaring dan residu bahan bakar. Polusi dari kapal dapat mencemari pelabuhan, sungai dan lautan. Kapal juga membuat polusi suara yang mengganggu kehidupan liar alam, dan air dari *ballast tank* dapat menyebarkan ganggang/alga berbahaya dan spesies asing yang dapat mempengaruhi ekosistem lokal.²⁰

Salah satu sumber yang mencemari wilayah perairan Indonesia adalah plastik dan turunan lain dari limbah plastik yang terdapat di laut berbahaya untuk satwa liar dan perikanan. Organisme perairan dapat terancam akibat terbelit, sesak napas, maupun termakan. Jaring ikan yang terbuat dari bahan plastik, kadang dibiarkan atau

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*

hilang di laut. Jaring ini dikenal sebagai hantu jala sangat membahayakan lumba-lumba, penyu, hiu, dugong, burung laut, kepiting, dan makhluk lainnya. Plastik yang membelit membatasi gerakan, menyebabkan luka dan infeksi, dan menghalangi hewan yang perlu untuk kembali ke permukaan untuk bernapas.²¹

Di Indonesia pencemaran logam berat cenderung mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya proses industrialisasi. Pencemaran logam berat dalam lingkungan bisa menimbulkan bahaya bagi kesehatan, baik pada manusia, hewan, tanaman maupun lingkungan. Terdapat 80 jenis logam berat dari 109 unsur kimia di muka bumi, dan salah satunya adalah logam berat timbal (Pb), logam berat yang mencemari lingkungan perairan adalah logam berat jenis non esensial, yaitu logam berat yang keberadaannya dalam tubuh masih belum diketahui manfaatnya, bahkan bersifat toksik, salah satu contohnya yaitu logam berat timbal (Pb), logam timbal dapat menyebabkan efek gangguan kesehatan manusia, tergantung pada bagian mana dari logam berat tersebut yang terkait dalam tubuh serta besar dosis paparannya.²²

Selain plastik, ada beberapa macam racun yang tidak hancur dengan cepat di lingkungan laut. Terbagi dua, pertama kelompok racun yang sifatnya cenderung masuk terus menerus seperti pestisida, furan, dioksin dan fenol. Terdapat pula logam berat, suatu unsur kimia metalik yang memiliki kepadatan yang relatif tinggi dan bersifat racun atau beracun pada konsentrasi rendah. Contoh logam berat yang sering mencemari adalah air raksa, timbal, timah, nikel, arsenik dan kadmium. Ketika

²¹ Arifin. .Ekosistem Pantai Kerajaan Polutan, Oseanologi-LIPI <http://www.Kompas.com.htm> 7 juli 2006.

²² *pencemaran laut*, <http://www.pencemaran logam berat.com>, (11 april 2007).

pestisida masuk ke dalam ekosistem laut, akan segera diserap ke dalam jaring makanan di laut. Dalam jaring makanan, pestisida ini dapat menyebabkan mutasi, serta penyakit, yang dapat berbahaya bagi hewan laut, seluruh penyusun rantai makanan termasuk manusia. Racun semacam itu dapat terakumulasi dalam jaringan berbagai jenis kehidupan air dalam proses yang disebut bioakumulasi, bioakumulasi adalah kemampuan organisme mengakumulasi bahan-bahan pencemar dalam tubuhnya tanpa mempengaruhi organisme tersebut. Racun ini juga diketahui terakumulasi dalam dasar perairan, seperti muara dan teluk berlumpur. Bahan-bahan ini dapat menyebabkan mutasi keturunan dari organisme yang tercemar serta penyakit dan kematian secara massal seperti yang terjadi pada kasus yang terjadi di Teluk Minamata. Peristiwa Eutrofikasi adalah kejadian peningkatan/pengkayaan nutrisi, biasanya senyawa yang mengandung nitrogen atau fosfor, dalam ekosistem. Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan produktivitas primer (ditandai peningkatan pertumbuhan tanaman yang berlebihan dan cenderung cepat membusuk). Efek lebih lanjut termasuk penurunan kadar oksigen, penurunan kualitas air, serta tentunya mengganggu kestabilan populasi organisme lain.²³

Penyumbang kontaminan yang menimbulkan ancaman besar pada lingkungan akuatik adalah air kotor, nutrient berlebih, senyawa organik sintesis, sampah, plastik, logam, hidrokarbon/minyak, dan hidrokarbon polisiklik aromatik. Selain itu nitrogen dan sulfur, organik yang terdapat dalam air buangan terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Kelebihan nutrient dalam perairan berdampak buruk pada

²³ *Ibid*

kelangsungan organism perairan. Nitrogen yang berlebih dalam perairan dapat menyebabkan peningkatan populasi fitoplanon, dengan peningkatan tersebut ketersediaan oksigen diperairan tidak cukup sehingga banyak organisme laut yang akan mengalami kematian.²⁴

Unsur N, P dan Si adalah merupakan elemen esensial terpenting yang dibutuhkan oleh organisme laut. Ketiga elemen tersebut berperan penting dalam metabolisme, proses fisiologis dan reaksi biokimiawi dalam tubuh. Nitrogen penting untuk membangun jaringan tubuh. Sedangkan fosfor dan silica penting dalam pembentukan cangkang terutama bagi kelompok Diatom, Coccolithofor dan Pteropod. Besi, Mangan, Tembaga, Seng, Kobal dan Molybdenum adalah mikro elemen esensial yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan sebagaimana ditemukan pada enzim. Meskipun memiliki konsentrasi yang sedikit dalam air laut, namun mikro elemen esensial tidak pernah menjadi faktor pembatas yang mengontrol populasi biota laut. Kadang-kadang konsentrasi mikro elemen esensial ditemukan dalam jumlah yang banyak dalam air laut, namun hal tersebut belum menjamin pemenuhan kebutuhan mikro elemen esensial bagi organisme laut. Hal ini karena mikro elemen esensial tersebut berada dalam bentuk yang tidak dapat diabsorpsi langsung oleh biota laut yang ada.²⁵

Besar kecilnya produktivitas primer suatu perairan ditentukan oleh beberapa faktor antara lain besarnya cahaya, kedalaman dan kekeruhan, disamping faktor lain

²⁴ Darmadi, *Mirror Elemen di Laut*, [http://www. Bloger Go Green 2010](http://www.BlogerGoGreen2010.com). (Diakses 30 juli 2010).

²⁵ *Ibid*

seperti suhu, pH, dan kadar CO₂ terlarut. Semakin dalam suatu perairan maka kemampuan menangkap intensitas cahaya semakin berkurang, hal ini menyebabkan perbedaan tingkat produktivitas di tiap kedalaman, produktivitas primer dari suatu ekosistem didefinisikan sebagai jumlah energi cahaya yang diserap dan kemudian disimpan oleh organisme-organisme produser melalui kegiatan fotosintesis dan kemosintesis dalam suatu periode waktu tertentu, jadi semakin dangkal dan jernih suatu perairan maka tingkat pertumbuhan tumbuhan laut semakin tinggi.²⁶

Muara merupakan wilayah yang paling rentan mengalami eutrofikasi karena nutrisi yang diturunkan dari tanah akan terkonsentrasi. Nutrisi ini kemudian dibawa oleh air hujan masuk ke lingkungan laut, dan cenderung menumpuk di muara. *The World Resources Institute* telah mengidentifikasi 375 hipoksia (kekurangan oksigen) wilayah pesisir di seluruh dunia. Laporan ini menyebutkan kejadian ini terkonsentrasi di wilayah pesisir di Eropa Barat, Timur dan pantai Selatan Amerika Serikat, dan Asia Timur, terutama di Jepang. Salah satu contohnya adalah meningkatnya alga merah secara signifikan (*red tide*) yang membunuh ikan dan mamalia laut serta menyebabkan masalah pernapasan pada manusia dan beberapa hewan domestik. Umumnya terjadi saat organisme mendekati ke arah pantai²⁷.

Lautan biasanya menyerap karbon dioksida dari atmosfer. Karena kadar karbon dioksida atmosfer meningkat, lautan menjadi lebih asam. Potensi peningkatan keasaman laut dapat mempengaruhi kemampuan karang dan hewan bercangkang

²⁶ Ilham faoji, Produktivitas perairan, <http://www.scribd.com>. 2010 (Diakses 02 juli 2010).

²⁷ *Ibid*

lainnya untuk membentuk cangkang atau rangka. Laut merupakan tempat bermuaranya berbagai saluran air termasuk sungai. Dengan demikian, laut akan menjadi tempat terkumpulnya zat-zat pencemar yang dibawa oleh aliran air. Banyak industri atau pabrik yang membuang limbah industrinya ke sungai tanpa penanganan atau mengolah limbah terlebih dahulu dan juga kegiatan rumah tangga yang membuang limbahnya ke sungai. Limbah-limbah berbahaya ini terbawa ke laut yang selanjutnya mencemari laut. Air laut adalah suatu komponen yang berinteraksi dengan lingkungan daratan, di mana buangan limbah dari daratan akan bermuara ke laut. Selain itu air laut juga sebagai tempat penerimaan polutan (bahan cemar) yang jatuh dari atmosfer. Limbah tersebut yang mengandung polutan kemudian masuk ke dalam ekosistem perairan pantai dan laut. Sebagian larut dalam air, sebagian tenggelam ke dasar dan terkonsentrasi ke sedimen, dan sebagian masuk ke dalam jaringan tubuh organisme laut (termasuk fitoplankton, ikan, udang, cumi-cumi, kerang, rumput laut dan lain-lain). Kemudian polutan tersebut yang masuk ke dalam air diserap langsung oleh fitoplanton.²⁸

Logam-logam yang mencemari perairan laut banyak jenisnya, diantaranya yang cukup banyak ditemukan adalah logam berat merkuri (Hg) dan tembaga (Cu), dan timbal (Pb). Pencemaran logam berat merkuri, tembaga, dan timbal yang dihasilkan perusahaan industri, sekarang telah menyatu dengan air laut Jawa, sebelah timur kota Surabaya. Akibat dari pencemaran itu, ikan dan kerang dari laut tersebut tidak layak untuk dimakan. Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian yang

²⁸ *Ibid*

dilakukan oleh Balai Teknik Kesehatan Lingkungan (BTKL) Surabaya dimana kawasan Pantai Kenjeran pada September 1997 menunjukkan kandungan merkuri, tembaga dan timbal dalam tubuh ikan-ikan sudah melebihi ambang batas kesehatan untuk dikonsumsi. Pada juni 1999, penelitian terhadap sampel darah ibu-ibu hamil dan menyusui dan anak-anak berusia di bawah lima tahun (balita) di kawasan tersebut, didapatkan bahwa darah mereka mengandung logam berat lebih dari ambang batas kesehatannya. Sumber logam berat itu berasal dari ikan-ikan yang berada di pantai Kenjeran yang mereka konsumsi yang dapat mengakumulasi logam berat seperti timbal (Pb) yang berbahaya bagi makhluk hidup jika terakumulasi dalam tubuh.²⁹

Polutan tersebut mengikuti rantai makanan mulai dari fitoplankton sampai ikan predator dan pada akhirnya sampai ke manusia. Bila polutan ini berada dalam jaringan tubuh organisme laut tersebut dalam konsentrasi yang tinggi, kemudian dijadikan sebagai bahan makanan maka akan berbahaya bagi kesehatan manusia. Karena kesehatan manusia sangat dipengaruhi oleh makanan yang dimakan. Makanan yang berasal dari daerah tercemar kemungkinan besar juga tercemar. Demikian juga makanan laut (*sea food*) yang berasal dari pantai dan laut yang tercemar juga mengandung bahan polutan yang tinggi.³⁰

Pencemaran yang dapat ditimbulkan oleh limbah ada berbagai macam bentuk. Ada pencemaran berupa bau, warna, suara bahkan pemutusan mata rantai dari suatu

²⁹ Dwiana, *Bahaya Pencemara Logam Timbal*. <http://www>. Pencemaran logam berat. Co.id, (01 februari 2007..

³⁰ *Ibid*

tatanan lingkungan hidup atau organisme yang ada, tingkat akhirnya akan menghancurkan tatanan ekosistemnya. Pencemaran tersebut biasanya berasal dari limbah kimia. Senyawa kimia yang sangat beracun bagi organisme hidup dan manusia adalah yang mempunyai bahan aktif dari logam-logam berat. Daya racun yang dimiliki oleh bahan aktif logam berat akan bekerja sebagai penghalang kerja enzim dalam proses fisiologis atau metabolisme tubuh sehingga menghambat pertumbuhan.³¹

Salah satu dampak negatif yang mengemuka dan perlu mendapat perhatian akibat berlangsungnya berbagai aktivitas tersebut adalah pencemaran perairan laut akibat limbah industri. Beberapa limbah yang dihasilkan oleh industri adakalanya berupa limbah B3, seperti jenis-jenis logam berat yang apabila masuk ke ekosistem pesisir dapat menimbulkan dampak yang fatal, baik bagi biota perairan maupun

manusia yang ada di wilayah tersebut. Polutan yang berupa logam-logam berat diketahui dapat menyebabkan keracunan, kelumpuhan, kelainan genetik, hingga kematian.³²

Salah satu polutan yang paling berbahaya bagi kesehatan manusia adalah logam berat. (*World Health Organization*) WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia dan (*Food Agriculture Organization*) FAO atau Organisasi Pangan Dunia

³¹ *Ibid*

³² Indra Gumay Yudha, Kandungan logam Berat Pb, Cu, Cd, dan Hg pada beberapa Ikan Laut di Wilayah Pesisir kota Bandar Lampung .<http://www.Pencemaran.com>. 2008. (19 juli 2010).

merekomendasikan untuk tidak mengonsumsi makanan laut (*sea food*) yang tercemar logam berat. Logam berat telah lama dikenal sebagai suatu elemen yang mempunyai daya racun yang sangat potensial dan memiliki kemampuan terakumulasi dalam organ tubuh manusia. Bahkan tidak sedikit yang menyebabkan kematian. Beberapa logam berat yang berbahaya adalah air raksa atau merkuri (Hg), Kadmium (Cd), Timbal (Pb), Tembaga (Cu), dan lain-lain.³³

Perairan merupakan tempat yang paling sering tercemar. Berbagai jenis pencemar baik yang berasal dari sumber rumah penduduk, industri, gejala alam, dan lainnya yang banyak memasuki badan air. Setelah terakumulasi maka secara langsung ataupun tidak langsung pencemar tersebut akan berpengaruh terhadap kualitas air.³⁴

Zoobentos merupakan hewan yang sebagian atau seluruh siklus hidupnya berada di dasar perairan, baik yang sesil, merayap maupun menggali lubang. Organisme yang termasuk makrozoobentos diantaranya adalah: Crustacea, Isopoda, Decapoda, Oligochaeta, Mollusca, Nematoda dan Annelida. Klasifikasi benthos menurut ukurannya : Makrobenthos merupakan benthos yang memiliki ukuran lebih besar dari 1 mm (0.04 inch), contohnya cacing, pelecypod, anthozoa, echinodermata, sponge, ascidian, and crustacea. Meiobenthos merupakan benthos yang memiliki ukuran antara 0.1 - 1 mm, contohnya polychaete, pelecypoda, copepoda, ostracoda, cumaceans, nematoda, turbellaria, dan foraminifera. Mikrobenthos merupakan benthos yang memiliki ukuran lebih kecil dari 0.1 mm, contohnya bakteri, diatom,

³³ Darmono, *Lingkungan Hidup dan Pencemaran* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2001), 23.

³⁴ Setiaty Pandia, Husin Amir, dan M. Zuhriana, *Kimia Lingkungan* (Jakarta: Pembinaan dan pengabdian masyarakat, 1996).

ciliata, amoeba, dan flagellata. Hewan bentos hidup relatif menetap, sehingga baik digunakan sebagai petunjuk kualitas lingkungan, karena selalu kontak dengan limbah yang masuk ke habitatnya. Kelompok hewan tersebut dapat lebih mencerminkan adanya perubahan faktor-faktor lingkungan dari waktu ke waktu karena hewan bentos terus menerus berada dalam air yang kualitasnya berubah-ubah.³⁵

Keberadaan hewan bentos pada suatu perairan, sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan, baik biotik maupun abiotik. Faktor biotik yang berpengaruh diantaranya adalah produsen, yang merupakan salah satu sumber makanan bagi hewan bentos dan interaksi spesies serta pola siklus hidup dari masing-masing spesies dalam komunitas. Adapun faktor abiotik adalah fisika-kimia air yang diantaranya: suhu, arus, oksigen terlarut, kebutuhan oksigen biologi dan kimia, serta kandungan nitrogen (N), kedalaman air, dan substrat dasar. Makrozoobentos dapat bersifat toleran maupun bersifat sensitif terhadap perubahan lingkungan. Organisme yang memiliki kisaran toleransi yang luas akan memiliki penyebaran yang luas juga. Sebaliknya organisme yang kisaran toleransinya sempit (sensitif) maka penyebarannya juga sempit. Makrozoobenthos yang memiliki toleran lebih tinggi maka tingkat kelangsungan hidupnya akan semakin tinggi. Tingkat pencemaran terhadap perairan dapat dilihat dengan identifikasi makrozoobenthos yang terdapat di wilayah tersebut.³⁶

³⁵ Aminuddin, *Distribusi Logam Berat Cd, Pb, Dan Hg Dalam Sedimen Permukaan Laut Dangkal*, FMIPA Unhas Makassar, hal, 23.

³⁶ Dwi Resti, *Bahaya Logam Pada organisme Laut*, <http://www.biologi.com> (02 Januari 2009).

Logam berat (Hg dan Pb) dalam air kebanyakan berbentuk ion dan logam tersebut diserap oleh kerang secara langsung melalui air yang melewati membran insang atau melalui makanan. Selain melalui insang, logam berat juga masuk melalui kulit (kutikula) dan lapisan mukosa yang selanjutnya diangkut darah dan dapat tertimbun dalam jantung dan ginjal kerang . Kemampuan biota laut (ikan, udang dan moluska) dalam mengakumulasi logam berat di perairan tergantung pada jenis logam berat, jenis biota, lama pemaparan serta kondisi lingkungan seperti pH, suhu dan salinitas. Semakin besar ukuran biota air, maka akumulasi logam berat semakin meningkat.³⁷

Manusia menderita suatu penyakit bukan hanya karena menghirup udara yang tercemar, tetapi juga akibat mengasup makanan yang tercemar logam berat. Akhir-akhir ini kasus keracunan logam berat yang berasal dari bahan pangan semakin meningkat jumlahnya. Pencemaran lingkungan oleh logam berat dapat terjadi jika industri yang menggunakan logam tersebut tidak memperhatikan keselamatan lingkungan, terutama saat membuang limbahnya. Logam-logam tertentu dalam konsentrasi tinggi akan sangat berbahaya bila ditemukan di dalam lingkungan (air, tanah, dan udara). Penyebab utama logam berat menjadi bahan pencemar berbahaya adalah karena sifatnya yang tidak dapat dihancurkan (*nondegradable*) oleh organisme hidup yang ada di lingkungan. Akibatnya, logam-logam tersebut terakumulasi ke lingkungan, terutama mengendap di dasar perairan membentuk

³⁷Crisna Indirawirata. *Bahaya Logam Berat Bagi kesehatan manusia*. [Http://www.Tabloidnova.com/Articles.Asp?Id =5720](http://www.Tabloidnova.com/Articles.Asp?Id =5720). 2008 (Diakses pada tanggal 19 juli 2010)

senyawa kompleks bersama bahan organik dan anorganik secara adsorpsi dan kombinasi.³⁸

Untuk mencegah terjadinya pencemaran terhadap lingkungan oleh berbagai aktivitas industri dan aktivitas manusia, maka diperlukan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan dengan menetapkan baku mutu lingkungan. Baku mutu lingkungan adalah batas kadar yang diperkenankan bagi zat atau bahan pencemar terdapat di lingkungan dengan tidak menimbulkan gangguan terhadap makhluk hidup, tumbuhan atau benda lainnya. Meluasnya kawasan pemukiman penduduk, semakin meningkatnya produk industri rumah tangga, serta semakin berkembangnya kawasan industri di kota besar, akan memicu terjadinya peningkatan pencemaran pada perairan pantai dan laut. Hal ini disebabkan karena semua limbah dari daratan, baik yang

berasal dari pemukiman perkotaan maupun yang bersumber dari kawasan industri, pada akhirnya bermuara ke pantai, sehingga secara tidak langsung pencemaran meningkat akibat kemajuan teknologi.³⁹

Limbah domestik yang berasal dari rumah tangga, perhotelan, rumah sakit dan industri rumah tangga yang terbawa oleh air sisa-sisa pencucian akan terbuang ke saluran drainase dan masuk ke kanal dan selanjutnya terbawa ke pantai. Limbah yang dibuang pada tempat pembuangan sampah akan terkikis oleh air hujan dan terbawa masuk ke kanal atau sungai dan selanjutnya juga bermuara ke pantai. Limbah yang

³⁸ *Ibid*

³⁹ *Ibid*

berasal dari kawasan industri baik yang sudah diolah maupun yang belum, juga pada akhirnya akan terbuang ke perairan. pantai. Banyak penyebab pencemaran air tetapi secara umum dapat dikategorikan sebagai sumber kontaminan langsung dan tidak langsung. Sumber langsung meliputi limbah yang keluar dari industri, TPA (Tempat Pembuangan Akhir Sampah), dan sebagainya. Sumber tidak langsung yaitu kontaminan yang memasuki badan air dari tanah, air tanah, atau atmosfer berupa hujan. Tanah dan air tanah mengandung sisa dari aktivitas pertanian seperti pupuk dan pestisida. Kontaminan dari atmosfer juga berasal dari aktivitas manusia yaitu pencemaran udara yang menghasilkan hujan asam.⁴⁰

Allah mengajari manusia tentang berbagai proses kejadian alam di dalam Al-Quran. Allah juga melarang manusia untuk berbuat kerusakan di muka bumi karena hal itu dapat berimbas negatif bagi kelangsungan hidup manusia sendiri. Dengan semua anugerah yang diberikan, Allah menguji manusia untuk menentukan siapa di antara mereka yang beriman dan siapa yang ingkar. Mereka yang beriman akan diberikan kebahagiaan di akherat dan mereka yang ingkar akan mendapatkan siksaan. Hal ini tersurat pada Al-Quran surah ar Rum: 41-42 sebagai berikut:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ

بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ

فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ



⁴⁰ *Ibid*

Terjemahnya:Telah Nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Katakanlah: "Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)." (ar Rum:41-42)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT. Membenci orang-orang yang merusak lingkungan karena akan berdampak buruk bagi kelangsungan makhluk hidup dimuka bumi ini.⁴¹

C. Kerang familia Tridacnae

Lingkungan perairan tropis Indonesia sangat mendukung kehidupan kerang mutiara sehingga pertumbuhannya dapat berlangsung sepanjang tahun. Kerang mutiara biasanya hidup di daerah [terumbu karang](#) atau substrat yang berpasir, dan pola penyebaran kerang mutiara biasanya terdapat pada daerah yang beriklim hangat di daerah tropis dan subtropis. Pertumbuhan kerang di daerah subtropis berlangsung di musim panas (*summer*) sedangkan di musim dingin (*winter*) pertumbuhannya berlangsung lambat atau terkadang tidak mengalami pertumbuhan sama sekali. Hal inilah yang menyebabkan waktu pertumbuhan kerang mutiara di Indonesia (daerah tropis) cenderung 4,6 kali lebih cepat dibandingkan dengan kerang mutiara Jepang (daerah subtropis). Pertumbuhan kerang mutiara sangatlah dipengaruhi oleh faktor-faktor alam sebagai parameternya antara lain biologis, [fisika](#) dan kimia. Beberapa

⁴¹ Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV penerbit Diponegoro, 2006.

faktor itu adalah suhu perairan, [salinitas](#), suplai makanan yang cukup dan persentase unsur kimia di laut. Suhu menjadi faktor yang mampu mempengaruhi pertumbuhan kerang mutiara, karena pada musim panas, saat suhu naik, kerang mutiara dapat tumbuh secara maksimal. Namun saat suhu dan [salinitas](#) sepanjang tahun stabil dengan lingkungan yang ideal, maka pertumbuhannya akan stabil pula.⁴²

Dalam ayat Allah tersirat bahwa mutiara yang dihasilkan oleh kerang kima adalah salah satu ornamen pilihan yang diambil dari laut. Proses pembentukan mutiara cukup menarik juga untuk diketahui: Beragam makhluk laut berdaging lunak tanpa tulang seperti kerang, siput, remis, menjajarkan bagian dalam tempurung mereka dengan benda-benda mulia warna keputihan yang disebut 'induknya-mutiara'. Makhluk-makhluk dasar laut ini menggunakan metode seragam dalam menaklukkan partikel (seperti pasir dan biji-bijian) untuk mencegah kerusakan daging di dalam tempurungnya, dan menyemburkan cairan ke sekeliling induk mutiara. Dengan begitu, mulailah pembentukan mutiara. Seperti mutiara, batu-batu mulia yang ditemukan di dasar lautan juga digunakan sebagai barang perhiasan oleh manusia. Dimana penjelasan di atas dicantumkan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rahman ayat 19-22 yang berbunyi;

⁴² Ayu Prasetya, *Kerang Kima Sebagai Indikator Pencemaran*, [Error! Hyperlink reference not valid.](#), (23 juli 2005).

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ﴿١٩﴾ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ ﴿٢٠﴾ فَبِأَيِّ
 ءَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكذَّبَانِ ﴿٢١﴾ مَخْرُجٌ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٢٢﴾

Terjemahnya: "Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu, antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Dari keduanya keluar mutiara dan marjan." (ar-Rahmaan [55]: 19-22)

Pertumbuhan dan perkembangan kerang familia tridacnidae berbeda-beda. Laju petumbuhannya dapat dibedakan menurut spesiesnya. Jenis kerang tridacnidae yang terbesar ukurannya, yaitu *Tridacna gigas* dapat mencapai ukuran lebih dari satu meter dan bobotnya sekitar 200 kg. Jenis kima lain yang berukuran besar adalah *Tridacna derasa* yang panjangnya 60 cm. Ukuran jenis-jenis lain, seperti *Tridacna squamosa* dan *Tridacna maxima* berisar 35-40 cm. Di antara ke-5 jenis *Tridacna* yang terkecil ukurannya adalah *Tridacna crocea*. Ukuran terpanjang dari jenis kima tersebut selitar 15 cm.⁴³

Tridacnidae merupakan jenis kekerangan yang terkenal karena ukurannya relatif besar dan cangkangnya dimanfaatkan sebagai bahan baku industri hiasan. Karena perburuan yang intensif, jenis kekerangan ini berkurang populasinya sehingga mendapat perlindungan dengan dimasukkannya ke dalam wadah budi daya. Jenis

⁴³ *Ibid*

kerang ini belum tercantum di dalam buku statistik produksi nasional maupun global.⁴⁴

Kima (*Tridacna/ Giant Clam*) adalah kerang terbesar (kerang raksasa) dari seluruh jenis kerang-kerangan. Ukuran besarnya dapat mencapai 1,5 meter dengan berat sekitar 250 kg. Fungsi Kima pada kehidupan ekosistem di lautan yang pada akhirnya untuk kepentingan kehidupan di muka bumi sangat luar biasa. Dengan sistem filter yang dimilikinya, maka setiap ekor Kima mampu membersihkan puluhan ton air laut setiap hari. Dari hasil pembersihannya tersebut kemudian menjadi penolong untuk pertumbuhan dan pewarnaan terumbu karang, ikan dan aneka biota laut lainnya. Selain itu, sel telur Kima yang jumlahnya jutaan ekor sekali bertelur, menjadi "santapan lezat" bagi ikan, sehingga Kima juga diberi "label" sebagai "pabrik makanan gratis" di lautan. Kelebihan lainnya, daging Kima dikenal berprotein tinggi, sehingga menjadi menu khusus dan mahal pada restoran terkenal di dunia. Warna daging Kima hidup sangat mempesona, sehingga menjadi buruan untuk menghuni aquarium pribadi para pesohor dan menjadi koleksi andalan pada wahana di jaringan usaha *Underwater Seaworld*. Namun karena kelebihannya itu, Kima pun diburu dan dieksploitasi berlebihan. Akibatnya, Kima diambang kepunahan, bahkan, disebagian besar negara berlaut hangat, beberapa spesis Kima, utamanya

⁴⁴ Ririn Izhatiqorima. *Kerang Family Tridacnidae*.http://www.budidaya_kerang.com.2009. (19 juli 2010)

Tridacna gigas dan *Tridacna derasa*, telah menghilang dari lautannya. Begitupun di Indonesia.⁴⁵

Kima adalah biota laut yang merupakan kerang terbesar (kerang raksasa) dari seluruh jenis kerang-kerangan. Biota laut ini hidup dikawasan terumbu karang dan pasir di laut hangat, hingga kedalaman 20 meter. Dari data yang kami peroleh, besarnya Kima dapat mencapai ukuran 135-150 cm (Kima raksasa). Namun untuk mencapai ukuran tersebut, Kima memerlukan masa pertumbuhan hingga ratusan tahun. Masa pertumbuhan Kima sangat lamban. Belum lagi, untuk dapat hidup, sejak dari sel telur hingga memiliki cangkang (Kima muda), Kima sangat rentan terhadap predator. Dari jutaan sel telur yang dihasilkan Kima dewasa, yang dapat hidup hingga memiliki cangkang hanya puluhan ekor saja. Sebagian besar sel telur tersebut menjadi santapan ikan. Dan setelah memiliki cangkang, Kima masih menjadi makanan empuk bagi kepiting, ikan karang dan gurita. Dengan perannya sebagai ‘santapan’ ini, maka Kima juga dikenal sebagai ‘pabrik makanan gratis’ di lautan. Dari jenisnya di dunia, Kima memiliki sembilan species, yaitu *Tridacna gigas*, *Tridacna derasa*, *Tridacna squamosa*, *Tridacna maxima*, *Tridacna crocea*, *Tridacna tevoroa*, *Tridacna roseate*, *Hippopus-Hippopus* dan *Hippopus Porcellanus*. Species ini dibedakan berdasarkan cangkangnya; bersisik, lunak, tebal, tipis, besar dan kecil. Dari tebarannya, Kima hanya ditemukan di Samudera Hindia dan Pasifik Selatan (indo-pacific), namun tidak semua wilayah berlaut hangat tersebut memiliki Kima, atau telah hilang dari lautannya. Dari hasil penelusuran kami, di Asia, Kima hanya ditemukan di Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand, Vietnam, Korea, India, China bagian timur dan pantai utara Australia serta Papua New Ginie.⁴⁶

Dari sembilan species Kima yang ada di dunia, tujuh diantaranya dapat ditemukan di Indonesia, yaitu; *Tridacna Gigas*, *Tridacna. derasa*, *Tridacna Squamosa*, *Tridacna maxima*, *Tridacna crocea*, *Hippopus-Hippopus* dan *Hippopus Pocellanus*. Namun untuk Sumatra, Jawa dan sebagian Kalimantan, species *Tridacna gigas* dan *Tridacna derasa* di duga telah punah. Daging Kima dikenal memiliki protein yang tinggi, sehingga selain dikonsumsi oleh masyarakat, daging Kima juga menjadi salah satu komoditas ekspor ke berbagai Negara, utamanya Jepang, Hongkong, Taiwan dan Singapura, dan menjadi menu andalan di restoran tingkat dunia. Sedang cangkangnya, disamping dipergunakan untuk perhiasan, juga menjadi bahan baku untuk keramik. Karena Kima hidup dapat mempertontonkan warna-warni yang meneduhkan pandangan mata, maka Kima pun banyak yang menghuni akuarium pribadi para pesohor dan menjadi wahana andalan pada jaringan usaha

⁴⁵ Indra Andriani, *Konservasi Taman Laut Kima Toli-Toli di Kendari*, <http://www.Andriani blog.com>. 2009 (Diakses pada 20 juli 2010).

⁴⁶ *Ibid*

Underwater Seaworld. Dengan kegunaan tersebut, Kima pun diburu dan dieksploitasi berlebihan.⁴⁷

Beberapa gambar kerang kima familia Tridacnidae aalah sebagai berikut:



Gambar.1. Kerang kima *Tridacna squamosa*



Gambar.2. Kerang kima *Tridacna gigas*

⁴⁷ *Ibid*



Gambar.3. kerang kima *Tridacna derasa*



Gambar.4. Kerang kima *Tridacna maxima*



Gambar.5. Kerang kima *Tridacna crocea*⁴⁸

Tridacna memiliki dua katup (kerang), seperti kerang normal. Perbedaan utama antara kerang normal dan tridacnids adalah adanya zooxanthellae. Mantel dari kerang meningkatkan luas permukaan yang tersedia untuk eksposur terhadap cahaya. Mantel ini merupakan perpanjangan dari exhalent sifon inhalansia dan juga disebut sebagai jaringan siphonal. Mantel ini berisi sebagian besar zooxanthellae serta sel tetap disebut iridophores yang mengandung pigmen. Pigmen ini terutama dalam kisaran warna biru untuk coklat atau hijau kuning. Kombinasi pigmen dan mereka adalah alasan untuk berbagai warna dan pola yang ditemukan dalam kerang. Fungsi utama pigmen adalah untuk melindungi kerang terhadap cahaya yang berlebihan dan radiasi UV. Jika kerang tidak menerima intensitas cahaya yang tepat dan berkualitas, mereka akan kehilangan warna-warna cerah mereka. Hal ini dapat terjadi sangat cepat. Ketika mereka kehilangan warna-warna cerah, warna coklat zooxanthellae menjadi terlihat. Kecuali kondisi ditingkatkan segera, zooxanthellae dapat mulai menghilang juga, dan kerang akan berlangsung pada warna coklat keputihan. Kondisi ini disebut pemutihan dan sekali ini terjadi, kematian akan mengikuti. Pencahayaan yang tidak benar tidak selalu menyebabkan pemutihan. Kima Dikelantang telah dilaporkan di bawah lampu halida logam intens. Pencahayaan ini biasanya ideal, tetapi pemutihan masih mungkin terjadi saat yodium telah habis. Kebanyakan kerang memenuhi kebutuhan gizi mereka dengan, antara lain, filter makan dan menyerap senyawa organik terlarut dari air. Kima Tridacnid telah melangkah lebih jauh dari ini dengan menggunakan zooxanthellae untuk memproduksi makanan untuk diri mereka sendiri.⁴⁹

⁴⁸ ⁴⁸ William, *Organisme aquatic*, [http://www. Aquatserch.net.Au](http://www.Aquatserch.net.Au). 2010. (Diakses 2 juli 2010).

⁴⁹ Gideon Yones, Konservasi Sumber Daya Alam, <http://www.cites.org/eng/app/appendes.com>. 2010 (Diakses 20 juli 2010).

Pembiakan pada kerang kima secara fertilisasi eksternal artinya terjadi di luar tubuh induknya. Mekanisme pembuahan terjadi mula-mula sel jantan (sperma) disemprotkan keluar tubuh terlebih dahulu, baru kemudian sel telur (ovum). Pengeluaran sel-sel gamet tersebut di atas pada umumnya dirangsang oleh keadaan fisik lingkungan perairan maupun zat-zat kimia yang terkandung di dalamnya. Hidrogen peroksida (H_2O_2) di duga merangsang pengeluaran sel-sel gamet. 21 jam setelah pembuahan terjadi, zygot yang berukuran $143,5 \pm 3,7$ mm tersebut menjadi trochopor (stadium trochopor). Pada hari kedua berkembang menjadi veliger (stadium veliger). Kemudian pada hari kelima terus berkembang menjadi pedveliger dan pada hari ke sepuluh akan mengikuti aliran arus laut dan burayak ini akan segera berubah bentuk (metamorfosa) menjadi anak kerang (juvenil) setelah mendapatkan dasar yang cocok untuk tempat hidupnya.⁵⁰

Pertumbuhan kerang kimasejak dari sel telur hingga memiliki cangkang (Kima muda), Kima sangat rentan terhadap predator. Dari jutaan sel telur yang dihasilkan Kima dewasa, yang dapat hidup hingga memiliki cangkang hanya puluhan ekor saja. Sebagian besar sel telur tersebut menjadi santapan ikan. Dan setelah memiliki cangkang, Kima masih menjadi makanan empuk bagi kepiting, ikan karang

⁵⁰ Rudi C Tarumingkeng, *Pengaruh Suhu Dan Salinitas Pada Metamorfosa Dan Lulus Hidup (Survival Rate) Burayak Kima Pasir*, Program Sarjana IPB, 2000, <http://www.Grameen Foundaion.org>. diakses tgl 1 juli 2010.

dan gurita. Dengan perannya sebagai makanan ini, maka Kima sangat sulit untuk tumbuh menjadi kima muda.⁵¹

D. Kerang Kima Sisik (Tridacna squamosa)

Kerang menumpuk bahan-bahan beracun berbahaya setelah penyaringan ganggang dari air sebagai makanan, jika memakannya kesehatan masyarakat beresiko. State and federal agencies monitor adalah sebuah perusahaan yang bekerja dibidang biotoxins dan pembersihan lingkungan terlidung. Negara dan lembaga federal ini menggunakan kerang untuk memantau dan biotoxins dekat daerah yang terkena dampak, posting tanda-tanda seperti ini. Perlu diingat bahwa walaupun air tampak jernih, namun terkadang di dalamnya mengandung bahan pencemar salah satu jenis kerang yang terdapat di Indonesia adalah kerang kima (*Tridacna squamosa*) seperti gambar di bawah ini.⁵²

Klasifikasi kerang kima sisik (*Tridacna squamosa*)

Kingdom : Animalia

Fillum : Molusca

Class : Pelecypoda

Ordo : Eulamellibranchia

Family : Tridacnidae

Species : *Tridacna squamosa*⁵³

⁵¹ Indra andari, *Pahlawan Laut Yang Terancam Punah*, http://www.konservasi_taman_laut_kimatoli-toli.com. Diakses pada tanggal 25 juli 2010.

⁵² *Ibid*

⁵³ Maskoeri Jasin, *Zoologi Invertebrata*, Sinar Wijaya:Surabaya, hal 192, 1984.



Keterangan:

1. Umbo
2. Garis pertumbuhan
3. Otot kerang

Kerang kima sisik (*Tridacna squamosa*) termasuk dalam kelas Pelecypoda, kebanyakan hidup di laut sampai kedalaman 5.000 m. Rongga mantel luas dan insang biasanya besar sekali karena selain berfungsi sebagai alat pernafasan, juga sebagai pengumpul makanan. Puncak cangkang disebut umbo dan merupakan bagian cangkang yang paling tua. Garis-garis melingkar sekitar umbo menunjukkan garis pertumbuhan cangkang. Biasanya cangkang berukuran sampai satu meter dengan berat lebih dari 1.100 kg, cangkang keras melindungi kerang dari bahaya predator, karena kerang kima tidak dapat berpindah tempat (melekat pada bebatuan).⁵⁴

⁵⁴ Sugiarti Suwignyo, dkk, Avertebrata Air, Penebar Swadaya: Bogor, 2005, hal.149.

Habitan kerang kima sisik (*Tridacna squamosa*) yaitu melekat pada bebatuan yang ada di laut, kerang kima menempel karena adanya *byssus* atau dengan salah satu keping cangkangnya tumbuh menyatu dengan substrat. Dengan cara hidup menempel, kaki kerang tidak berfungsi untuk merayap, sehingga kaki mengecil atau hilang sama sekali. Kerang bernafas dengan sepasang insang (*ctenidia*) dan mantel. Masing-masing filament insang disangga oleh sumbu insang. Jika insang kerang tampak seperti dua pasang, sebenarnya dalam evolusinya terjadi pelebaran filament dan pelipatan insang membagi rongga mantel menjadi dua bagian, bagian ventral yang luas dan bagian dorsal yang sempit.⁵⁵

Kerang kima sisik merupakan *ciliary feeder*, karena sabagai deposit feeder maupun *filter feeder*, cilia memegang peranan penting dalam mengalirkan makanan ke mulut. Sebagai *filter feeder*, kerang mampu menyaring makanannya menggunakan insang yang berlubang lubang. Saluran pencernaan terdiri atas mulut esophagus yang pendek, lambung yang dikelilingi kelenjar pencernaan, usus, rectum, dan anus. Lambung terbagi atas dua, bagian dorsal yang berhubungan dengan esophags dan kelear pencernaan , dan pada bagian ventral terdapat satu kantung style, lambung berfungsi memisahkan makanan dari gulungan lender. Partikel makanan yang halus mula-mula dicerna dengan amilase untuk dilanjutkan dengan pencernaan intraceluller

.⁵⁶

⁵⁵ *Ibid*, hal, 152.

⁵⁶ Radiopoetro, *Zoologi*, cetakan ke 2, Erlangga: Jakarta, hal. 87.

Ditinjau dari sisi agama kerang adalah makhluk hidup yang sangat bermanfaat bagi manusia, karena selain sebagai bahan konsumsi yang mengandung protein tinggi, kerang juga berperan sebagai indikator pada lingkungan. Menurut surah Al-Imran ayat 189-190 sebagai berikut:

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٨٩﴾
إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ
لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾

*Terjemahnya: “Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Perkasa atas segala sesuatu. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal”.*⁵⁷

Reproduksi pada kerang kima sisik adalah dioecious, mempunyai sepasang gonad yang terletak berdampingan dengan usus, kopulasi tidak ada. Pembuahannya eksternal, gamet dikeluarkan melalui sifon ekshalant. Faktor yang mempengaruhi pemijatan antara lain ialah suhu air, pasang surut dan zat yang dihasilkan oleh gamet dari lawan jenisnya. Masa hidup larva veliger sebagai plancton bervariasi dari beberapa hari sampai beberapa bulan tergantung spesiesnya, sebelum akhirnya turun

⁵⁷ *Op cit*

kesubstrat, metamorfosa dicirikan oleh lepasnya velum dengan tiba-tiba, untuk kemudian tumbuh menjadi kerang muda.⁵⁸

E. Logam Berat Timbal (Pb)

Logam timbal (Pb) merupakan logam yang sangat populer dan banyak dikenal oleh masyarakat awam. Hal ini disebabkan oleh banyaknya Pb yang digunakan di industri nonpangan dan paling banyak menimbulkan keracunan pada makhluk hidup. Pb adalah sejenis logam yang lunak dan berwarna coklat kehitaman, serta mudah dimurnikan dari pertambangan, dalam pertambangan, logam berbentuk sulfida logam (PbS) disebut galena.⁵⁹

Tabel 1. Toksisitas beberapa logam berat

Logam berat	Kisaran tingkat racun (ppb)
Ar / Arsen	3.000 – 60.000
Pb / Timah hitam (anorganik)	1.000 – 100.000
Pb / Timah hitam (organik)	0,02 – 300
Zn / Seng	200 – 20.000
Cu / Tembaga	20 – 100.000
Cd / Kadmium	0,1 – 50
Hg / Air raksa (anorganik)	5 – 4.000
Hg / Air raksa (organik)	0,2 – 8.000

Logam Pb mempunyai sifat bertitik lebur rendah, mudah dibentuk, mempunyai sifat kimia yang aktif, sehingga dapat digunakan untuk melapisi logam untuk mencegah perkaratan. Bila dicampur dengan logam lain, membentuk logam

⁵⁸ *Op.cit.*

⁵⁹ Sarmono, *Logam Timbal Dalam Sistem Biologi Makhluk Hidup*, <http://www.Biokimia.com>, (19 februari 2006).

campuran yang lebih bagus daripada logam murninya, mempunyai kepadatan melebihi logam lain. Logam Pb banyak digunakan pada industri-industri penghasil produk baik industri besar maupun industri kecil, dan yang paling banyak digunakan sebagai zat antiletup pada bensin. Pb juga digunakan sebagai zat penyusun patri atau solder dan sebagai formulasi penyambung pipa yang mengakibatkan air untuk rumah tangga mempunyai banyak kemungkinan kontak dengan Pb. Logam Pb dapat masuk ke dalam tubuh melalui pernapasan, makanan, dan minuman. Logam Pb tidak dibutuhkan oleh manusia, sehingga bila makanan tercemar oleh logam tersebut, tubuh akan mengeluarkannya sebagian. Sisanya akan terakumulasi pada bagian tubuh tertentu seperti ginjal, hati, kuku, jaringan lemak, dan rambut.⁶⁰

Logam timbal terletak pada golongan IV A dalam sistem periodik, logam timbal berwarna abu-abu, lunak, mudah dibentuk dan tahan terhadap korosi. Timbal banyak dipakai pada industri logam pembuatan mesiu, pelapisan kabel, logam cetak, patri atau solder. Selain itu digunakan untuk pembuatan lempengan, baterai dan aki. Timbal dalam alam terdapat sebagai unsur atau persenyawaan yaitu sebagai PbS (galena), $PbSO_4$ (anglesite), $PbCO_3$ (timbal putih). Logam timbal masuk ke perairan melalui pengendapan, jatuhnya debu yang mengandung tetraetil lead, erosi dan limbah industri.⁶¹

⁶⁰ Darmono, *Logam Dalam Sistem Biologi Mahluk Hidup* (Jakarta: Universitas Indonesia), 1995. hal 19.

⁶¹ H, Palar,, *Pencemaran dan Toksikologi Logam Berat* (cet. 4; Jakarta: Rieka Cipta, 2008), hal 21.

Sumber utama pencemaran Pb berasal dari emisi gas buangan kendaraan bermotor yang mencapai 90% dari total emisi Pb di atmosfer. Sekitar 10% Pb mengendap langsung di tanah dalam jarak 100 meter dari jalan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan Pb di udara di daerah lingkungan perkotaan yang padat lalu lintas adalah sebesar 0,1-0,2 ppm dan kandungan Pb dalam darah penduduknya adalah >0,3 ppm.⁶²

Logam timbal (Pb) adalah logam yang mendapat perhatian karena bersifat toksik melalui konsumsi makanan, minuman, udara, air, serta debu yang tercemar Pb. Intoksikasi Pb bisa terjadi melalui oral, lewat makanan, minuman, pernafasan, kontak lewat kulit, kontak lewat mata, serta lewat parenteral.⁶³

Timbal akan diabsorpsi oleh saluran cerna sekitar 8-10%. Dari jumlah yang diabsorpsi oleh saluran cerna. Pada fase distribusi pertama, konsentrasi timbal tertinggi ditemukan dalam ginjal dan hati, sebagian akan diekskresi melalui empedu. Dalam bagian usus yang lebih ujung, logam ini akan membentuk timbal sulfida yang diekskresi bersama tinja. Sebagian akan mengalami reabsorpsi kembali. Timbal yang beredar dalam darah sebagian besar terikat pada eritrosit dalam waktu paruh sekitar 35 hari, dalam jaringan ginjal dan hati selama 10 hari, sedangkan waktu paruh dalam

⁶² Ehrlich, *Ecocience Population Resources Environment*, San Fransisco,: W. H Freeman and Co. 1977.

⁶³ Rahde, A.F *Leard Inorganic*, Newcastle-Upon-Tyne, United KIndom, <http://www.inchen.org/documents/pims/chemical/inorglea.htm>.15 juli 2006

tulang adalah selama 30 hari. Tingkat ekskresi Pb melalui sistem urinaria adalah sebesar 76% sehingga dapat menyebabkan gangguan pada saluran kencing.⁶⁴

Timbal sebagai salah satu zat yang dicampurkan ke dalam bahan bakar (Premium dan premix), yaitu $(C_2H_5)_4Pb$ atau TEL, (Tetra Ethyl Lead) yang digunakan sebagai bahan adiktif, yang berfungsi meningkatkan angka tahan sehingga penggunaannya akan menghindarkan mesin dari gejala “ngelitik” yang berfungsi sebagai pelumas bagi kerja antar katup valve seat serta valve guide. Keberadaan Octane booster dibutuhkan dalam bensin agar mesin bisa bekerja dengan baik.⁶⁵

Keracunan akut karena timbal jarang terjadi dan ditandai dengan adanya muntah, kolik usus, suhu tubuh merendah dan penurunan tekanan darah. Disamping itu terjadi pula kerusakan yang parah pada hati, ginjal, dan sistem saraf pusat serta anemia hemolitik. Timbal (Pb) juga salah satu logam berat yang mempunyai daya toksitas yang tinggi terhadap manusia karena dapat merusak perkembangan otak pada anak-anak, menyebabkan penyumbatan sel-sel darah merah, anemia dan mempengaruhi anggota tubuh lainnya. Pb dapat diakumulasi langsung dari air dan dari sedimen oleh organisme laut. Dewasa ini pelepasan Pb ke atmosfer meningkat tajam akibat pembakaran minyak dan gas bumi yang turut menyumbang pembuangan Pb ke atmosfer. Selanjutnya Pb tersebut jatuh ke laut mengikuti air hujan. Dengan

⁶⁴ S.Fardiaz, *Polusi Air dan Udara* (Yogyakarta: kanisius, 1992)hal 21.

⁶⁵ Nasution, *Bahaya Timbal dan Permasalahannya*, ITB: Bandung: Departemen Teknik Lingkungan, 2004.hal 119

kejadian tersebut maka banyak negara di dunia mengurangi tetraetil Pb pada minyak bumi dan gas alam untuk mengurangi pencemaran Pb di atmosfer.⁶⁶

Plumbum (Pb) yang lebih dikenal nama Timbal atau timah merupakan salah satu logam berat yang beracun bagi manusia. Timbal dapat masuk ke tubuh manusia melalui pernafasan dan air yang terkontaminasi dengan Plumbum (timbal). Keracunan plumbum (Pb) biasanya diakibatkan oleh terjadinya akumulasi logam berat tersebut di dalam tubuh manusia yang akan menyebabkan penyakit anemia, kerusakan susunan saraf pusat dan ginjal. Tanda klasik dari keracunan logam Plumbum (Pb) adalah ataxia, koma dan gangguan pada pergerakan. Di samping pengaruh-pengaruh di atas racun Plumbum (Pb) diketahui juga berpengaruh terhadap sistem reproduksi. Hal ini sangat berbahaya karena racun yang terakumulasi dalam tubuh setelah mengkonsumsi makanan yang mengandung logam berat dapat merusak secara perlahan dan terus menerus dan dapat mematikan.⁶⁷

Keracunan Pb secara kronis berjalan lambat. Kelelahan, kelesuan, dan iritabilitas merupakan tanda awal dari intoksikasi Pb secara kronis. Dan paparan dengan dosis rendah sudah menimbulkan efek yang merugikan pada perkembangan dan fungsi dari sistem saraf pusat. Gejala lainnya adalah kehilangan libido, gangguan menstruasi, serta aborsi spontan pada wanita.⁶⁸

Pb memiliki titik lebur Rendah, mudah dibentuk , memiliki sifat kimia yang aktif, sehingga bisa digunakan untuk melapisi logam agar tidak timbul perkaratan.

⁶⁶ *Bahaya Logam Berat Timbal (Pb)*, <http://www.pencemaran.laut.com>, (07 maret 2003) .

⁶⁷ *Ibid*

⁶⁸ *Ibid*

Apabila dicampur dengan logam lain akan terbentuk logam campuran yang lebih bagus daripada logam murninya. Pb adalah logam lunak berwarna abu-abu kebiruan mengkilat serta mudah dimurnikan dari pertambangan. Timbal meleleh pada suhu 328°C (662°F); titik didih 1740°C (3164°F); dan memiliki gravitasi 11,34 dengan berat atom 207, 20.⁶⁹

Timbal (Pb) adalah logam yang bersifat toksik terhadap manusia, yang bisa berasal dari tindakan mengonsumsi makanan, minuman, atau melalui inhalasi dari udara, debu yang tercemar Pb, kontak lewat kulit, kontak lewat mata, dan lewat parenteral. Logam Pb tidak dibutuhkan oleh tubuh manusia sehingga bila makanan dan minuman tercemar Pb dikonsumsi, maka tubuh akan mengeluarkannya. Orang dewasa mengabsorpsi Pb sebesar 5-15 % dari keseluruhan Pb yang dicerna, sedangkan anak-anak mengabsorpsi Pb lebih besar yaitu 41,5%.⁷⁰

WHO dan FAO merekomendasikan bahwa konsentrasi Pb pada daging makanan laut yang layak konsumsi adalah lebih kecil dari 0,715 mg/kg. Sebaliknya Ditjen Pengawasan Obat dan Makanan merekomendasikan tidak lebih dari 2,0 mg/kg. Bila pada makanan terdapat logam berat melewati batas di atas maka makanan tersebut tidak layak untuk dikonsumsi, karena berbahaya bagi kesehatan manusia.⁷¹

⁶⁹ Wahy Widowati, Astiana Sationo, Raymond Juuf, Efek Toksik Logam, ANDI Yogyakarta: 2008, hal.109.

⁷⁰ H, Palar, . *Pencemaran dan Toksikologi Logam Berat*, Rineka cipta: Jakarta, hal.26. 1994.

⁷¹ Irfan antoni, *Dampak Pencemaran Laut Pada Kesehatan Manusia*, <http://www.Costalcommunityproverti-indonesia>, 11 maret 2009. Diakses (4 juli 2010).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggambarkan kadar pencemaran logam berat timbal (Pb) di perairan pelabuhan feri Bira kabupaten Bulukumba.

B. Variabel Penelitian

Variabel penelitian ini adalah kadar logam berat Timbal (Pb) pada kerang kima sisik (*Tridacna squamosa*) di perairan pelabuhan feri Bira kabupaten Bulukumba.

C. Defenisi Oprasional

Kadar logam berat timbal (Pb) pada kerang kima sisik (*Tridacna squamosa*) adalah ukuran kuantitas banyaknya timbal (Pb) yang terkandung dalam satuan mg/kg pada kerang kima sisik (*Tridacna squamosa*). Menurut organisasi pangan dunia (*World Health Organization*) atau WHO kadar kelayakan logam berat timbal dalam tubuh kerang dalam hewan laut adalah 0,715 mg/kg.

D. Ruang Lingkup

1. Logam timbal (Pb)

Timbal (Pb) merupakan salah satu jenis logam berat yang bila berada pada lingkungan dalam jumlah yang banyak dapat mengancam kelangsungan makhluk hidup karena bersifat racun dan tidak mudah terurai sehingga jika menumpuk dalam tubuh manusia dapat menyebabkan kerusakan organ dalam seperti ginjal, jantung, otak, dan lain-lain.

2. Kerang kima sisik (*Tridacna squamosa*)

Kerang kima sisik (*Tridacna squamosa*) adalah salah satu molusca yang mampu menampung logam-logam berat yang berbahaya, analisis kandungan logam timbal dilakukan pada kerang kima sisik (*Tridacna squamosa*) yang rata-rata panjangnya 15-20 cm, lebar 10-15 cm, dan berat 1-5 kg.

E. Batasan Penelitian

1. Pengambilan sampel

Pengambilan sampel dilakukan di sekitar pelabuhan feri Bira yang disebar pada lima titik secara vertikal dimana lokasi pengambilan sampel merupakan jalur yang dilewati kapal feri, setiap titik berjarak 10 meter dari titik awal pada tanggal 3 juli 2010.

2. Analisis kadar logam timbal (Pb)

Analisis kadar logam timbal (Pb) pada kerang kima sisik (*Tridacna squamosa*) dilakukan di Laboratorium Instalasi Kimia Kesehatan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Provinsi Sulawesi –Selatan Pada tanggal 4 juli 2010.

F. Prosedur Penelitian

1. Alat dan Bahan

a. Alat

Adapun alat yang digunakan pada penelitian ini adalah; Alat peimbang, Alat tulis, batang pengaduk, botol sampel, cawan petri 20 buah, cawan porselin 20 buah, corong, gelas ukur 50 ml, gelas kimia 500 ml, hot plate (pemanas listrik), Katter, karet penghisap, label, lampu berkatoda berongga Pb, pipet volume, pinset, ruangan asam, sendok, SSA shimadz A640 13, dan tanur dengan suhu 500°C.

b. Bahan

Adapun bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah, air suling, kerang, kertas saring , larutan asam nitrit (HNO_3), larutan standar Pb 1000bpj, .dan tissue.

2. Cara Kerja

1. Pengambilan Sampel

Pegambilan sampel kerang kima sisik dilakukan pada lima stasiun di sekitar pelabuhan feri Bira Kabupaten Bulukumba, setiap stasiun berjarak sepuluh

meter dari stasiun lainnya, stasiun pertama berjarak 100 meter dari lokasi tempat kapal feri bersandar di pelabuhan Feri Bira Kabupaten Bulukumba.

2. Persiapan Analisis Kandungan Logam Timbal (Pb)

Sampel yang diambil terlebih dahulu dibersihkan dari kotoran yang melekat, lalu dibilas dengan aquades hingga bersih. Bagian dalam kerang kima sisik (*Tridacna squamosa*) dipisahkan dari cangkangnya, kemudian kerang diletakkan pada cawan petri selanjutnya diberi label. Setelah selesai member label kerang lalu ditimbang, setiap sampel ditimbang sebanyak 5 gram lalu diletakkan pada cawan porselin lalu diberi label sesuai label yang tertera pada cawan petri sebelumnya.

Otot kerang yang telah ditimbang kemudia dipanaskan kedalam tanur yang bersuhu 500 °C selama 30 menit hingga terbentuk abu. Langkah selanjutnya otot kerang yang telah berbentuk abu didinginkan terlebih dahulu, setelah dingin abu sampel kemudin dilarutkan dengan menggunakan HNO₃ pekat sebanyak 5 ml dalam cawan porselin dan ditambahkan aquadest hingga volumenya menjadi 50 ml.

Kemudian disaring dengan menggunakan kertas filter, sehingga diperoleh filtrate sebanyak 50 ml kedalam botol sampel yang telah dilabel sesuai label pada cawan porselin. Langkah terakhir yaitu pembacaan sampel dimasukkan kedalam alat spektrofotometer serapan atom (shimadsu A640 13).

G. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh diolah secara deskriptif dalam bentuk tabel dengan parameter kadar logam berat timbal (Pb) pada kerang kima sisik (*Tridacna squamosa*).


BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Adapun hasil pada penelitian tentang analisis kandungan logam berat timbal (Pb) pada kerang kima sisik (*Tridacna squamosa*) di perairan pelabuhan feri Bira kabupaten Bulukumba adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Kadar Logam Berat Timbal (Pb) Pada otot kerang kima sisik (*Tridacna squamosa*) diperairan pelabuhan feri Bira kabupaten Bulukumba

No	Stasiun	Kadar logam Pb (mg/Kg)
1.	1	0,0014
2.	2	0,0012
3.	3	0,00105
4.	4	0,00075
5.	5	0,0006



Gambar 2. Histogram Kadar Logam Berat Timbal (Pb) Pada Otot Kerang Familia Tridacnidae di Perairan Pelabuhan Feri Bira Kabupaten Bulukumba.

B. Pembahasan

Logam berat timbal (Pb) dalam air kebanyakan dalam bentuk ion dan logam yang dapat langsung diserap oleh kerang secara langsung melalui air yang melewati membran insang dan makanan. Hal tersebut di atas terbukti dari penelitian yang telah dilakukan dimana pada stasiun 1 yaitu lokasi yang terdekat dari tempat berlabuhnya kapal feri ditemukan bahwa kerang yang berdomisili di lokasi itu cenderung memiliki rata-rata kandungan logam yang tinggi yaitu 0,0014 mg/kg. Hal ini disebabkan stasiun 1 merupakan tempat yang paling rentan tercemar logam timbal (Pb), dimana

logam timbal (Pb) terakumulasi dalam bahan bakar transportasi. Pada stasiun ini merupakan tempat pembuangan limbah oleh kapal feri dan kapal motor nelayan yang berlabuh disekitarnya, limbah biasanya berupa bensin, solar, dan limbah organik. Dimana limbah-limbah ini dapat merusak ekosistem laut.

Stasiun 2 berlokasi 100 meter dari stasiun 1. Pada lokasi ini didapatkan hasil uji kadar Pb yaitu rata-rata 0,0012 mg/kg. Jika dibandingkan dengan stasiun 1, stasiun 2 kandungan Pbnya jauh lebih rendah, hal ini disebabkan lokasi tersebut memiliki jarak yang lebih jauh dari sumber pencemaran yang mengandung logam Pb. Hal ini sejalan dengan penelitian yang diadakan di perairan Tanjung Balai dan Bagan Siapi-api tahun 2003 bahwa kandungan logam merkuri pada perairan Tanjung Balai yang berjarak 1 mil dari garis pantai lebih tinggi daripada yang berjarak 2 mil. Hal ini kemungkinan karena adanya aliran dari sungai Asahan yang membawa bahan-bahan hasil buangan dari aktivitas industri di daerah aliran sungai. Bahan-bahan buangan terutama yang mengandung merkuri terakumulasi terlebih dahulu pada jarak 1 mil baru menyebar ke 2 mil yang berarti terjadi pengenceran yang mengakibatkan pada jarak 2 mil kandungan merkurnya lebih rendah daripada yang berjarak 1 mil.⁷²

Stasiun 3 yang berlokasi 300 meter dari stasiun 1 rata-rata kandungan Pb pada sampel adalah 0,00105 mg/kg, pada stasiun 3 ini jika dibandingkan dengan stasiun 1 dan 2 kerang yang berdomisili di lokasi ini memiliki kandungan Pb yang jauh lebih sedikit. Pada stasiun 4 yang berjarak 400 meter dari stasiun 1 kadar Pb

⁷² Jovita, Analisis Kandungan Logam Berat Zn, Pb, dan Cu pada kerang Anadara Anadonta di perairan Tanjung Balai dan Bagan Siapi-api.<http://www.logsmberst.com>. (Diakses 29 juni 2010).

yang terabsorpsi dalam tubuh kerang yaitu rata-rata 0,00075 mg/kg, dan kerang yang berada pada stasiun 5 dengan jarak dari stasiun pertama 500 meter yaitu mampu mengabsorpsi logam Pb paling sedikit yaitu rata-rata 0,0006 mg/kg, ini dikarenakan stasiun ini berlokasi paling jauh dari pusat pencemaran.

Dengan membandingkan kelima stasiun pengambilan sampel, dimana setiap sampel berjarak 100 meter dari stasiun sebelumnya, membuktikan bahwa semakin dekat tempat kerang berdomisili dari sumber pencemaran maka semakin besar pula kadar logam yang terabsorpsi dalam tubuhnya. Dari rata-rata kandungan Pb pada setiap stasiun dimana kadar tertinggi yaitu 0,0014 mg/kg, ternyata masih dibawah standar kadar kelayakan konsumsi menurut organisasi kesehatan dunia (World Health Organization) atau WHO yang menyatakan bahwa batas ambang logam timbal pada otot kerang-kerangan dan hewan laut yang masih dapat dikonsumsi yaitu kecil dari 0,715 mg/kg. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan di Perairan Yogyakarta 22 november 2007 yang menyatakan bahwa kerang yang terdapat pada perairan tersebut masih layak untuk dikonsumsi karena kadar logam berat yang terkandung dalam kerang masih di bawah standar kelayakan konsumsi menurut badan POM.⁷³

Ekosistem pantai merupakan kawasan yang mendapat tekanan berat dari aktivitas di daratan (hulu) maupun hilir. Aktivitas industri menghasilkan limbah yang menjadi sumber bahan pencemar utama, baik pencemar kimia maupun mikrobiologi yang dapat mempengaruhi kualitas perairan. Penyebab dari pencemaran ini tidak saja

⁷³ Suprianto, Analisis cemaran Pb,Cd, Dan Cu Pada Ikan Dengan Metode Spektrofotometri Nyala serapan Atom (SSA). <http://www.Supriantoblogger.com>. 2007. (Diakses 23 juli 2010).

berasal dari buangan industri termasuk limbah industri domestik, limbah rumah tangga, dan bahan bakar transportasi yang kurang memperhatikan aspek pengolahan air limbahnya, tetapi juga kurangnya kesadaran sebagian masyarakat yang membuang langsung limbahnya ke dalam perairan.⁷⁴ Limbah yang mencemari lautan dipindahkan dari badan air melalui tiga proses yaitu pengendapan, adsorpsi, dan absorpsi oleh organism perairan, kemudian polutan tersebut akan diserap langsung oleh fitoplanton yang bertindak sebagai produsen dan sebagai tropic level pertama dalam rantai makanan, kemudian fitoplanton dimakan oleh zooplankton, dan kerang. Manusia sebagai Tropic level tertinggi bila mengkonsumsi kerang yang tercemar logam berat timbal dapat berdampak pada kesehatannya, karena logam timbal dalam tubuh terutama terikat dalam gugus $-SH$ molekul protein sehingga menghambat aktivitas kerja enzim. Pb mengganggu system sintesis Hb. Komponen Utama Hb adalah hem yang disintesis dari glisin dan suksinil koenzim A (KoA) dengan pridoksal sebagai kofaktor, setelah beberapa langkah bergabung bersama Fe membentuk hem, yang terjadi di mitokondria. Penghabatan sintesis Hb mengakibatkan terjadinya anemia. Waktu psruh Pb dalam eritrosit adalah selama 35 hari, dalam jaringan ginjal dan hati selama 40 hari, sedangkan waktu paruh dalam tulang selama 30 hari. Tingkat ekskresi Pb melalui sistem urinaria adalah sebesar 76 %, gastrointestinal 16%, dan rambut, kuku, serta keringat sebesar 8%.

⁷⁴ Yusma, yenni, Kandungan Logam Berat Pada kerang Darah (*Anadara granosa*), Air Laut dan Sedimen Diperairan Tanjung Balai dan Bagan Siapi-api.[http //www.Yusmayenni.com](http://www.Yusmayenni.com).2008. (Diakses 18 juli 2010).

Kerang adalah hewan yang tergolong *filter feeder* yaitu jenis hewan yang mendapatkan makanannya dengan cara menyaring air yang masuk ke dalam tubuhnya. Makanan yang masuk bersama air tadi digerakkan, diperas, lalu dicerna dengan bantuan cilia pada tubuhnya. Makanan kerang dapat berupa zooplankton, fitoplankton, bakteri, flagellata, protozoa, detritus, alga, dan berbagai zat yang tersuspensi dalam perairan tempat tinggalnya. Oleh karena kerang bersifat *filter feeder non selective* maka kerang dapat menampung logam berat dalam tubuhnya tanpa mengganggu sistem tubuhnya. Kerang dikenal sebagai bioakumulasi karena selain kerang tergolong *filter feeder* kerang hidupnya relatif menetap dan bukan termasuk organisme migratory.

Berdasarkan parameter yang digunakan dan hasil uji kadar logam Pb pada kerang yang diambil di sekitar pelabuhan feri Bira kabupaten Bulukumba maka dapat dipastikan bahwa kerang kima sisik (*Tridacna squamosa*) yang terdapat di lokasi tersebut masih layak untuk dikonsumsi, hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa semakin banyak polutan yang terdapat pada suatu perairan maka semakin banyak pula logam yang terkandung pada biota lautnya, namun perlu menjadi perhatian bagi masyarakat dan pemerintah untuk menanggulangi masalah pencemaran di sekitar pelabuhan feri Bira kabupaten Bulukumba sebelum pencemaran itu mengganggu biota laut. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengamatan pada waktu yang berbeda dan tempat berbeda walaupun dalam satu perairan memberikan hasil yang berbeda. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa kandungan logam berat pada kerang hijau di pantai Dadap (Teluk

Jakarta) pada bulan Juli 1991 sebesar 1,4 ppm yang jauh melebihi ambang batas yang diperbolehkan dan pada bulan November kandungan logam berat pada kerang hijau tersebut jauh menurun menjadi sebesar 0,39 ppm.⁷⁵ Begitu juga penelitian yang diadakan pada tahun 2001 menyatakan bahwa kandungan merkuri di perairan Dadap pada bulan Juni sebesar 8,54 ppb dan pada bulan Oktober sebesar 0,05 ppb.⁷⁶ Hal ini memperlihatkan bahwa kandungan logam berat biota laut (kekerangan) tidak selalu tetap setiap saat, sehingga monitoring kandungan logam berat pada biota laut sebaiknya dilakukan secara terus menerus selama kurun waktu tertentu. Dengan demikian jika pencemaran di kawasan pelabuhan feri Bira kabupaten Bulukumba ini tidak mendapat perhatian khusus maka beberapa tahun kemudian kerang familia Tridacnidae yang berada di perairan tersebut tidak dapat dikonsumsi lagi.

Dengan demikian jika kita mengaitkan dengan pandangan islam maka kerang kima sisik (*Tridacna squamosa*) yang terdapat di perairan pelabuhan feri Bira adalah makanan aman yang baik untuk kita konsumsi, karena bermanfaat bagi tubuh sesuai firman Allah pada surat an-Nahl ayat 14 yang berbunyi:

⁷⁵ Wahyuni, *Analisis Kandungan Logam Berat Cu, Cd, dan Pb Pada Kerang Hijau di Pantai Dadap (Teluk Jakarta)*.[http://www. Logam Berat pada Kerang Hijau.co.id](http://www.LogamBerat.padaKerangHijau.co.id).1991 (Diakses 28 agustus 2010).

⁷⁶ Murtini, *Kandungan Logam Mercury Pada Kerang Hijau Di Perairan Dadap Jakarta*.[http://www. Jakartatercemar.Com](http://www.Jakartatercemar.Com). 2001 (Diakses 03 juli 2010).

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا
مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاحِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ
فَضْلِهِ ۗ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya: “Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur”.

Dari ayat di atas seharusnya kita dapat bersyukur kepada Allah SWT, yaitu dengan jalan memanfaatkan kekayaan alam yang ada di lautan, serta kita di sarankan untuk mengonsumsi daging segar yang berada di lautan sesuai dengan kebutuhan tubuh yang dapat membantu pertumbuhan tubuh yang lebih baik, karena daging segar yang terdapat dalam laut mengandung protein tinggi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah kadar logam yang terdapat pada otot kerang kima sisik (*Tridacna squamosa*) yaitu, pada stasiun 1 rata-rata 0,0014 mg/kg, stasiun 2 rata-rata sebesar 0,0012 mg/kg, pada stasiun 3 rata-rata sebesar 0,00105 mg/kg, stasiun 4 rata-rata sebesar 0,00075 mg/kg, dan pada stasiun 5 rata-rata sebesar 0,0006 mg/kg. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kerang kima sisik (*Tridacna squamosa*) yang berada di perairan Pelabuhan feri Bira masih layak dikonsumsi karena kandungan logam timbal yang terdapat dalam kerang tersebut masih dibawah standar kelayakan konsumsi menurut WHO yaitu kadar kelayakan logam berat timbal dalam tubuh kerang dan hewan laut adalah 0,715 mg/kg.

B. Saran

1. Disarankan untuk diadakan penelitian yang lebih mendalam tentang histologi kerang kima sisik (*tridacna squaosa*), sehingga kerang yang terancam punah ini dapat dibudi dayakan .
2. Untuk mencegah rusaknya ekosistem perairan disekitar pelabuhan feri bira diharapkan agar pihak-pihak pengelola transportasi air pada lokasi tersebut tidak serta merta membuang limbahnya langsung keperairan.
3. Sebaiknya kerang yang dikonsumsi berada jauh dari lokasi utama pencemaran, karena semakin dekat lokasi pencemaran dengan tempat kerang

berdomisili semakin besar pula kadar logam Pb yang terkandung dalam tubuh kerang tersebut.

4. Agar diadakan penelitian setelah beberapa tahun kemudian untuk memastikan kembali bahwa kerang yang terdapat di perairan pelabuhan feri bira benar-benar layak untuk dikonsumsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya , *Keadaan pelabuhan Fery Bira*.<http://www.Jurnal pencemaran. Com>. 2007. (Diakses 09 mei 2009).
- Al-Hikmah. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. CV penerbit Diponegoro:Jogjakarta. 2006.
- Aminuddin, *Distribusi logam berat Cd , Pb, dan Hg Dalam Sedimen Permukaan Laut Dangkal*, FMIPA UNHAS: Makassar. 2001.
- Andari, Andra, *Pahlawan Laut Yang Terancam Punah*, <http://www.lingkunganlaut.com>. 2010. (Diakses 09 juli2010).
- Andriani, Indra, *Konservasi Taman Laut Kima Toli-Toli di Kendari*, <http://www.Andriani blog.com>. 2010, (20 juli 2010).
- Antoni, Irfan. *Dampak Pencemaran Pantai dan Laut Terhadap Kesehatan manusia*. <http://www.Coastal community proverty-Indonesia>. 2009. (4 juli 2010).
- Arifin, Z, *Ekosistem Pantai Kerajaan Polutan*, Oseanolgi-LIPI, <http://www.kompas.com.htm> . 2002. (7 juli 2006).
- Ayu, Prasetia. *Karang Kima Sebagai Indikator Pencemaran*.[http:// www, kekayaan laut.com](http://www.kekayaan laut.com). 2005.
- Bahaya Logam Berat Timbal (Pb)*, <http://www.toxictimbal. Com>. 2003.
- Darmono, *Lingkungan Hidup Dan Pencemaran*, Universitas Indonesia: Jakarta. 2001.
- Darmono, *Logam Dalam Sistem Biologi Mahluk Hidup*, (Jakarta: Universitas Indonesia). 1995.
- Dwi, Resti. *Bahaya Logam Bagi Organisme Laut*, <http://www.Bahaya logam.com>. (Diakses 02 januari 2009).
- Dwiyan. *Bahaya Pencemaran Logam Timbal*,<http://www.Pencemaran logam berat.co.id>. (Diakses 01 februari 2007).
- Ehrlich, *Ecoscience Population Resources Enviroment*, San Fransisco: W. H Freeman and Co.1997.

- Fardiaz, S, *Polusi Air dan Udara*, (Yogyakarta: Kanisius). 1992.
- Fauji, Ilham, *Produktivitas Perairan*, <http://www.scribd.com>. 2010. (Diakses 02 juli 2010).
- Fikar, Zul, *Menyaksikan Pembuatan Perahu Phinisi Di Butta Panrita Lopi*, <http://www.sinarharapan.co.id>. (Diakses 28 agustus 2010).
- Indirawirata, Crisna. *Bahaya Logam Berat Bagi Kesehatan*. <http://www.Tabloidnova.com/Articles.asp?Id=5720.com> 2008 (Diakses 19 juli 2010).
- Irsyad, Muh, *Hadis Tentang Pencemaran Lingkungan*, <http://www.Hadis.Com>. (Diakses 22 februari 2009).
- Jasin, Maskoeri, *Zoologi Invertebrata*, Sinar Wijaya: Surabaya.1984.
- Jovita, *Analisis Kandungan Logam Berat Zn, Pb, dan Cu pada kerang Anadara Anadonta di perairan Tanjung Balai dan Bagan Siapi-api*. [http://www.logsmberst di perairan.com](http://www.logsmberst.di.perairan.com). (Diakses 29 juni 2010).
- Logam Timbal*, (<http://www.Wikipedia.co.id>, 2008. (28 november 2008).
- Murtini, *Kandungan Logam Mercury Pada Kerang Hijau Di Perairan Dadap Jakarta*. <http://www.Jakartatercemar.Com>. 2001 (Diakses 03 juli 2010).
- Nasution, *Bahaya Timbal dan Permasalahannya*, ITB: Bandung. 2004.
- Palar, H, *Pencemaran dan Toksikologi Logam Berat*, Jakarta; Rineka Cipta. 1994.
- Purnomo, Dany, *Logam Berat Sebagai Penyumbang Pencemaran Laut*, <http://www.DanyPurnomo.com>. 2009. (Diakses 19 juli 2010).
- Pencemaran Laut*, [http://www.pencemaran logam berat](http://www.pencemaranlogamberat.com). 2007, (Diakses 11 april 2007).
- Prasetia, ayu. *Karang Kima Sebagai Indikator Pencemaran*.[http:// biologi.com](http://biologi.com). 2005.
- Qoirina, Ririn I, *Kerang Family Tridacnidae*, [ttp://www.budidaya kerang.com](http://www.budidaya.kerang.com). (diakses 19 juli 2010).
- Radio, Poetra. *Zoology*:Erlangga.Jakarta. 1987.

- Rahde, A.F. *Lead Inorganic*, Newcastle-Upon-Tyne, United Kindom: Inorglea. 1994.
- Ratnawati.2009.*Pelabuhan Fery Bira*.<http://www.Bulukumba.com>
- Ricoversen, *Intoksikasi Logam Berat*, Blogpada wordpress.com. 2010. (Diakses 28 juni 2010).
- Salim, *Relokasi Industri Harus di Kawasan Nonknveksi*, <http://www.pikiran-rakyat.com>. (Diakses 03 juli 2010).
- Sarmon. *Logam Timbal Dalam Sistem Biologi Makhluk Hidup*.Universitas Indonesia:Jakarta. 1995.
- Setiaty, pandia, Husain A. mir, dan M. Zuhrian, *Kimia Lingkungan*, (Jakarta: Pembinaan dan Pengabdian Masyarakat).1996.
- Sugiarti, Suwitnyo,dkk .*Avertebrata Air.Penebar Swadaya*: Bogor. 2005.
- Suprianto, *Analisis cemaran Pb,Cd, Dan Cu Pada Ikan Dengan Metode Spektrofotometri Nyala serapan Atom (SSA)*. <http://www.Supriantoblogger.com>. 2007. (Diakses 23 juli 2010).
- Syamsuddin. *Logam Berat Dalam Parmakologi Dan Terapi*.Erlangga: Bandung. 1987.
- Wahyuni, *Analisis Kandungan Logam Berat Cu, Cd, dan Pb Pada Kerang Hijau di Pantai Dadap (Teluk Jakarta)*. [http://www. Logam Berat pada Kerang Hijau.co.id](http://www.LogamBeratpadaKerangHijau.co.id).1991 (Diakses 28 agustus 2010).
- Wahyu Widowati. *Efek Taksonomi Logam*.Andi Yogyakarta. 2005.
- William, *Organisme Aquatik. Aquaserch*, net.AU. 2010. (Diakses 02 juli 2010).
- Yudha, Indra, *Kandungan Logam Berat Pb, Cu, Cd, dan Hg Pada Beberapa Ikan Laut di Wilayah Pesisir Kota*. [http://www. Pencemaran logam.com](http://www.Pencemaranlogam.com). 2009. (Diakses 9 juli 2010).
- Yones, Gideon, *Konservasi Sumber Daya Alam*, <http://www.cites.org/app/appendices.com>. 2010. (Diakses 20 juli2010).

Lampiran 1

Tabel 2. Kadar Logam Berat Timbal (Pb) pada stasiun 1

No	Kode Sampel	Kadar Pb (mg/Kg)	Konsentrasi Larutan sampel ($\mu\text{g/ml}$)	Absorban
1	KRG 1	0,001	0,105	0,0016
2	KRG 2	0,002	0,1627	0,0024
3	KRG 3	0,0015	0,167	0,0025
4	KRG	0,0012	0,1318	0,00195
Rata-rata		0,0014	0,1416	0,0021

Rata-rata diatas diperoleh dari perhitungan logam berat sebagai berikut:

Analisis Data

a. Stasiun 1

1. Sampel pertama dik:

$$V = 50 \text{ ml}$$

$$\text{Const sampel} = 0,105 \mu\text{g/ml}$$

Berat sampel = 5,5 gr

$C_{\text{const sampel}} \times \text{volume sampel}$

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Berat sampel}}{5,5 \text{ gr}} \\ &= \frac{0,105 \mu\text{g/ml} \times 50 \text{ ml}}{5,5 \text{ gr}} \\ &= 0,954 \mu\text{g/gr} \\ &= 1,0 \mu\text{g/gr} \\ &= 0,001 \text{ mg/kg} \end{aligned}$$

Tabel.3. Kadar Logam Berat Timbal (Pb) Pada Stasiun 2

No	Kode sampel	Kadar Pb (mg/Kg)	Konsentrasi Larutan sampel ($\mu\text{g/ml}$)	Absorban
1	KRG 5	0,0011	0,1133	0,0017
2	KRG 6	0,0018	0,1828	0,0027
3	KRG 7	0,0011	0,128	0,0019
4	KRG 8	0,0009	0,1081	0,0016
Rata-rata		0,0012	0,4504	0,0017

Lampiran 3

Tabel 4. Kadar Logam Berat

NO.	Kode sampel	Kadar Pb (mg/kg)	Konsentrasi Larutan Sampel ($\mu\text{g/ml}$)	Absorban
-----	-------------	---------------------	---	----------

1.	KRG 9	0,0007	0,0731	0,0011
2.	KRG 10	0,0012	0,1179	0,0018
3.	KRG 11	0,0002	0,0263	0,0004
4.	KRG 12	0,0014	0,1586	0,0012
Rata-rata		0,00105	0,4577	0,0014

Lampiran 4.

Tabel 5.Kadar Logam Berat Timbal (Pb) pada stasiun 4.

NO.	Kode sampel	Kadar Pb (mg/kg)	Konsentrasi Larutan Sampel (µg/ml)	Absorban
1.	KRG 13	0,0007	0,0747	0,0011
2.	KRG 14	0,0009	0,0927	0,0014

3.	KRG 15	0,0009	0,1014	0,0015
4.	KRG 16	0,0005	0,0566	0,00095
Rata-rata		0,00075	0,0814	0,0012

Lampiran 5

Tabel 6. Kadar Logam Berat Timbal (Pb) pada stasiun 5.

No.	Kode Sampel	Kadar Pb (mg/kg)	Konsentrasi Larutan sampel (µg/ml)	Absorban
1.	KRG 17	0,002	0,2142	0,0032
2.	KRG 18	0,0001	0,0834	0,0013
3.	KRG 19	0,0004	0,0417	0,0006
4.	KRG 20	0	0	0
Rata-rata		0,0006	0,0848	0,0013

Lampiran 6
Lokasi Pengambilan Sampel.



Gambar.2. Gambar sekitar pelabuhan feri Bira.









LAMPIRAN 7

Gambar.4. Gambar sampel kerang familia Tridacnidae



Gambar.a



Gambar. b



Gambar.c.

Gambar.d

LAMPIRAN 8

Gambar.4. Gambar peralatan Laboratorium



a



b



c



d



e



f



G



h

Keterangan:

- a. Penimbangan sampel
- b. Botol sampel
- c. Spektrofotometer Serapan Atom (SSA)
- d. Tanur
- e. Lampu berkatoda berongga Pb
- f. Sampel yang diletakkan pada hot plate.
- g. Proses pembacaan sampel
- h. Botol sampel

LAMPIRAN 9



Peta lokasi Pelabuhan Feri Bira Kabupaten Bulukumba



RIWAYAT HIDUP

Karneli, lahir di Desa Bira, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, pada tanggal 03 November 1987, merupakan buah hati dari pasangan Tamrin dan Alm. Ermawati.

Penulis menempuh Pendidikan Formal pada tahun 1994-1998 SDN 168 Dangke Desa Bira Kec. Bonto Bahari Kab. Bulukumba. Pada tahun 2000-2003 penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 3 Bontobahari, kemudian. Pada tahun 2003-2006 penulis melanjutkan Pendidikan di SMAN 2 Bulukumba, Sulawesi Selatan. Pada tahun 2006 penulis melanjutkan Pendidikan di Perguruan tinggi melalui jalur ujian SPMB di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dan diterima pada Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi. Selama menjalani kehidupan sebagai mahasiswi, penulis pernah menjabat sebagai asisten Laboratorium Biologi Sains.