

**EFEKTIFITAS WAKTU PERENDAMAN LARUTAN ASAM JAWA
DAN BELIMBING WULUH DALAM MENURUNKAN KADAR
LOGAM BERAT TIMBAL (Pb) PADA KERANG KEPAH
(*Polymesoda erosa*)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains
Pada Jurusan Untuk Memenuhi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar**

Oleh:

A.MIRNAYANTI
NIM. 60300112012

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A.Mirnayanti
NIM : 60300112012
Tempat /Tgl.Lahir : Bone/17 Desember 1995
Jurusan/Prodi : Biologi/S1
Fakultas : Sains dan Teknologi
Instansi : Universitas Islam Alauddin Makassar
Alamat : Jln. Tamangapa Raya 5 No. 27 Makassar.
Judul : Efektivitas Waktu Perendaman Larutan Asam Jawa Dan Belimbing Wuluh Dalam Menurunkan Kadar Logam Berat Timbal (pb) Pada Kerang Kepah (*Polymedosa erosa*)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang di peroleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, Januari 2018

Penyusun

A. Mirnayanti
NIM: 60300112012

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi yang berjudul, “Analisis Kadar Logam Berat Timbal (Pb) Pada Kerang Kepah (*Polymedosa erosa*) Setelah Perendaman Larutan Asam Jawa Dan Belimbing Wuluh”, yang disusun oleh A. Mirnayanti, NIM: 60300112012, mahasiswa Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari senin, tanggal 5 Februari 2018, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Sains dan Teknologi, Jurusan Biologi.

Makassar, 5 Februari 2018 M


19 Jumadil Awal 1439 H

DEWAN PENGUJI :

Ketua	: Dr. Wasilah, S.T., M.T.	(.....)
Sekretaris	: Hafsan, S. Si., M.Pd	(.....)
Munaqisy I	: Nurlailah Mappanganro, S.P., M.P.	(.....)
Munaqisy II	: Hasyimuddin, S.Si., M.Si.	(.....)
Munaqisy III	: Dr. Hasyim Haddade, S.Ag., M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Fatmawati Nur, S.Si., M.Si.	(.....)
Pembimbing II	: Ar. Syarif Hidayat S.Si., M.Kes.	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar,


Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag

NIP. 19691205 199303 1 001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi Saudara **A. Mirnayanti**, NIM: 60300112012, mahasiswa Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi dengan seksama skripsi yang berjudul “Analisis Kadar Logam Berat Timbal (Pb) Pada Kerang Kepah (*Polymedosa erosa*) Setelah Perendaman Larutan Asam Jawa Dan Belimbing Wuluh”, memandang bahwa hasil penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Makassar, 5 Februari 2018
19 Jumadil Awal 1439H

Pembimbing I


Dr. Fatmawati Nur, S.Si., M.Si.
NIP: 19720302200604001

Pembimbing II


Ar. Syarif Hidayat S.Si., M.Kes.
NIDN: 2008058701

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Efektivitas Waktu Perendaman Larutan Asam Jawa Dan Belimbing Wuluh Dalam Menurunkan Kadar Logam Berat Timbal (Pb) Pada Kerang Kepah (*Polymesoda erosa*)”** Shalawat dan salam tidak lupa penulis hanturkan kepada Rasulullah Muhammad saw, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sampai sekarang. Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada jurusan biologi, Fakultas Sains Dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ayahanda Andi Muhalis dan ibunda Hj. Bungatang tercinta dan tersayang, yang tak henti-hentinya mendoakan, memberi limpahan kasih sayang sejak penulis lahir hingga sekarang dan motivasi baik secara moril maupun materil, semoga Allah Swt memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat atas seluruh perjuangan yang ayah dan ibunda lakukan. Teruntuk paman Rahman, Bibi Hj. Jumarni, dan Adinda Andi Resaldi beserta keluarga-keluarga yang telah memberikan Do'a, semangat, dukungan, dan kasih sayang sehingga penulis mampu menyelesaikan study perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak hal-hal yang perlu di koreksi dan penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini bukanlah hal yang mudah sehingga peran dan partisipasi dari berbagai pihak sangat berarti dan berguna bagi penulis dalam membantu menyelesaikan skripsi ini dan penulis juga menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah swt. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar serta sejawarannya.
2. Prof. Dr. A.Qadir Gassing HT.,MS., selaku Rektor periode 2011-2015 Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
3. Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dan sejawarannya.
4. Dr. Mashuri Masri, S.Si., M.Kes., selaku Ketua Jurusan Biologi Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
5. Hasyimuddin, S.Si., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
6. Dr. Fatmawati Nur, S.Si., M.Si., sebagai Dosen Pembimbing I dan Ar Syarif Hidayat, S.Si., M.Kes., selaku Dosen Pembimbing II penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesabaran dan waktunya dalam memberikan bimbingan, arahan, masukan, dan telah meluangkan waktu membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

7. Nurlailah Mappanganro, S.Si., M.E., Hasyimuddin, S.Si., M.Si., dan Hasyim Haddade, S.ag., M.ag selaku Dosen Penguji I, II dan III terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala kritik, saran, dan arahan yang membangun selama penyusunan skripsi.
8. Seluruh Bapak/Ibu dosen Pengajar yang selama ini telah menjadi inspirator, mengajarkan banyak hal serta pengetahuan yang berlimpah kepada penulis kampus ini, serta kepada seluruh staf jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada kk Ati selaku operator jurusan Biologi yang telah membantu dalam pengurusan surat baik saat kuliah sampai penulis menyelesaikan study.
9. Eka Sukmawaty, S.Si., M.Si, selaku kepala Laboratorium Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar penulis juga mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingannya.
10. Ismawati, S.Si dan Awaluddin, S.Si selaku Laboran Laboratorium Kimia Analitik, yang sudah membantu dan membimbing penulis selama penelitian, dan penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Muliati, S.Si dan Erna Afdal yang telah membantu penulis saat penelitian.
11. Kepala Perpustakaan beserta jajarannya, penulis juga mengucapkan terima kasih atas bantuan dan partisipasi selama ini.
12. Terkhusus buat teman Pratu Yusuf, Nopiananti, S.Kep., Elma Rahmawati, Silvana Manan, Hariani dan Sulfiani penulis mengucapkan banyak terima kasih

atas segala bantuan baik dalam segi pemikiran, motifasi, dukungan dan doa Kalian selalu membantu di saat rasa malas datang menghantui.

13. Spesial buat keluarga besar Biologi 2012 (Ranvier) terima kasih banyak atas segala kenangan, dukungan, kebersamaan dan bantuannya, kalian tidak akan terlupakan.
14. Buat Kelas Biologi A 012 (Banta's) terima kasih banyak atas kenangan, Canda tawa dan semangat yang kalian berikan.
15. Teman-teman yang telah banyak memberikan inspirasi dan motivasi, keluarga besar Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi angkatan 2013, terkhusus buat Sumarni Rauf, Firdawati, Hasna dan Haslita, 2014, 2015 terkhusus buat Nurbianti, 2016 dan 2017 terima kasih atas segala kenangan selama masa perkuliahan.
16. Seluruh keluarga KKN Angkatan ke-51 Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, khususnya Posko Kelurahan Romanglasa yaitu Bapak dan Ibu posko sekeluarga, dan teman-teman posko penulis (Squad 27) juga mengucapkan banyak terima kasih atas kenangan yang telah di berikan masa KKN.
17. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan dan partisipasi dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga segala bantuan yang di berikan kepada penulis baik berupa moril maupun materi mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah Swt. Amin.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, baik dari segi penulisan maupun ruang lingkup pembahasannya. Maka dengan kerendahan hati,

segala bentuk koreksi, kritikan dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Demikian penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya sekaligus dapat menjadi bahan acuan mahasiswa Biologi, serta bagi pemerintah dan masyarakat

Makassar, Januari 2018
Penulis

A. Mirnayanti
NIM: 60300112012



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	1-8
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Ruang Lingkup	5
D. Kajian pustaka	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN TEORITIS	9-34
A. Pandangan Islam Tentang Laut	9
B. Kerang Kepah (<i>Polymedosa erosa</i>)	11
C. Logam Berat Timbal (Pb).....	14
D. Asam Jawa.....	23
E. Belimbing Wuluh	27
F. Pencemaran Laut	30
G. Kerangka fikir	33
H. Hipotesis	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	35-40
A. Jenis dan pendekatan Penelitian	35
B. Variabel Penelitian	35

	C. Definisi Operasional Variabel	36
	D. Metode Pengumpulan Data	36
	E. Instrumen Penelitian (Alat dan Bahan)	36
	F. Prosedur Kerja	37
	G. Teknik Pegolahan dan Analisis Data	39
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	41-50
	A. Hasil dan Penelitian	41
	B. Pembahasan	45
BAB V	PENUTUP	51-52
	A. Kesimpulan	51
	B. Implikasi Penelitian (Saran)	51
	KEPUSTAKAAN	53-57
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	58-68

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Konsentrasi logam berat timbal (Pb) pada kerang kepah yang direndam larutan asam jawa.....	42
Tabel 4.2. Konsentrasi logam berat timbal (Pb) pada kerang kepah yang direndam larutan belimbing wuluh.....	44



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerang Kepah (<i>Polymesodaerosa</i>).....	12
Gambar 4.1. Konsentrasi logam berat timbal (Pb) pada kerang kepah yang direndam larutan asam jawa.....	43
Gambar 4.2.. Konsentrasi logam berat timbal (Pb) pada kerang kepah yang di rendam larutan belimbing wuluh.....	45
Gambar 4.3. Penurunan konsentrasi Pb terhadap lama perendaman menggunakan larutan asam jawa.....	48
Gambar 4.4 Penurunan konsentrasi Pb terhadap lama perendaman menggunakan larutan belimbing wuluh.....	49



ABSTRAK

Nama : A. Mirnayanti
Nim : 60300112012
Judul Skripsi : **Efektifitas Waktu Perendaman Larutan Asam Jawa Dan Belimbing Wuluh Dalam Menurunkan Kadar Logam Berat Timbal (Pb) Pada Kerang Kepah (*Polymesoda erosa*)**

Akumulasi logam berat timbal (Pb) sering terjadi pada kerang mentah dan menyebabkan keracunan bagi masyarakat yang mengkonsumsinya karna toksisitasnya tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas waktu perendaman larutan asam jawa dan belimbing wuluh serta konsentrasi logam berat timbal (Pb) pada kerang kepah sebelum dan setelah perendaman pada larutan asam jawa dan belimbing wuluh. Pengujian perendaman larutan asam jawa dan belimbing wuluh dilakukan pada waktu 30, 60 dan 90 menit, selanjutnya hasil destruksi dianalisis menggunakan spektrometer serapan atom (SSA) dengan metode kurva kalibrasi. Kandungan timbal (Pb) pada sampel kerang kepah sebelum perlakuan yaitu 4,782 mg/kg. Setelah dilakukan perendaman dengan larutan asam jawa pada 30, 60 dan 90 menit, masing-masing adalah 3,14 mg/kg, 2,825 mg/kg dan 2,391 mg/kg dan belimbing wuluh adalah 3,858 mg/kg, 1,63 mg/kg dan 0,326 mg/kg. Penelitian perendaman larutan asam jawa dan belimbing wuluh dengan waktu perendaman 30, 60 dan 90 menit efektif dalam menurunkan kadar logam berat timbal (Pb) pada kerang kepah.

Kata Kunci : Efektifitas, Kerang Kepah, Belimbing Wuluh, Asam Jawa.

ABSTRACT

Name : A. Mirnayanti
Nim : 6030011201
Thesis Title : **Effectiveness of soaking time of javanese acid solution carambola wuluh in lower metal content lead weight (Pb) on Shellfish (*Polymedosa erosa*)**

The accumulation of heavy metal lead (Pb) is common in raw shellfish and causes poisoning for people who consume it because of high toxicity. This study aims to determine the effectiveness of soaking time of acid solution of Javanese and belimbing wuluh and the concentration of heavy metal of lead (Pb) on the shell of the crab before and after soaking in acid solution of java and belimbing wuluh. Testing of soaking of acid solution of java and star fruit wuluh was done at 30, 60 and 90 minutes, then the result of destruction was analyzed using atomic absorption spectrometer (SSA) with method of calibration curve. The content of lead (Pb) in the sample of shellfish before treatment was 4.782 mg / kg. After immersion with a solution of Javanic acid at 30, 60 and 90 minutes, each was 3.14 mg / kg, 2.825 mg / kg and 2.391 mg / kg and star fruit was 3.858 mg / kg, 1.63 mg / kg and 0.326 mg / kg. Soaking research of Javanese acid and belimbing wuluh with 30, 60 and 90 min soaking time was effective in decreasing lead weight (Pb) concentration in the shell.

Keywords: Effectiveness, Shellfish, Belimbing Wuluh, Javanese Acid.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah swt menegaskan bahwa kita wajib untuk senantiasa menjaga bumi dari kerusakan dengan tidak melakukan tindakan yang dapat membahayakan lingkungan. Kita harus menyadari bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah memiliki maksud dan tujuan serta segala sesuatu yang diberikan oleh Allah swt hanya merupakan titipan sehingga kita wajib untuk menjaganya. Sebagaimana firman Allah swt dalam QS al-A'raf/7 : 56 yang berbunyi:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (Kementerian Agama RI, 2012).

Alam raya telah diciptakan Allah swt dalam keadaan yang sangat harmonis, serasi dan memenuhi kebutuhan makhluk. Allah telah menjadikannya baik, bahkan memerintahkan hamba-hambanya untuk memperbaikinya. Merusak setelah diperbaiki jauh lebih buruk daripada merusaknya sebelum diperbaiki atau pada saat dia buruk (Shihab, 2002).

Laut merupakan tempat bermuaranya aliran sungai yang memiliki potensi sebagai tempat berkumpulnya zat-zat pencemar. Zat tersebut umumnya berasal dari kegiatan industri dan aktivitas manusia. Peningkatan jumlah industri dan aktivitas manusia akan selalu diikuti oleh pertambahan jumlah limbah. Limbah yang terbuang mengandung bahan kimia beracun dan berbahaya terbawa oleh aliran sungai, yang pada akhirnya bermuara ke laut sehingga akan mencemari lingkungan (Rahayu, 2014)

Masuknya limbah ke perairan dapat menimbulkan pencemaran terhadap perairan sehingga mengkontaminasi perairan sungai maupun laut dan akan berakumulasi dalam rantai makanan. Logam berat dapat masuk dan terakumulasi dalam tubuh biota akuatik misalnya udang, cumi-cumi, dan kerang-kerangan. Golongan moluska terutama jenis kerang-kerangan merupakan komoditas hasil perairan yang memiliki nilai ekonomis penting yang dapat dilihat dari volume produksi (Rahayu, 2014).

Kerang Kepah (*Polymesoda erosa*) merupakan salah satu biota yang hidup di daerah pasang surut hutan mangrove dan telah banyak dimanfaatkan oleh penduduk sekitar karena mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Sebagai salah satu biota yang hidup di daerah pasang surut, kerang Kepah (*Polymesoda erosa*) mempunyai karakteristik pertumbuhan dan pola pertumbuhan alami yang disesuaikan dengan pola adaptasi pada lingkungannya (Amin, 2011).

Salah satu polutan yang paling berbahaya bagi kesehatan manusia adalah logam berat. *World Health Organization* (WHO) atau Organisasi Kesehatan

Dunia dan *Food Agriculture Organization* (FAO) atau Organisasi Pangan Dunia merekomendasikan untuk tidak mengonsumsi makanan laut (*sea food*) yang tercemar logam berat. Logam berat telah lama dikenal sebagai suatu elemen yang mempunyai daya racun yang sangat potensial dan memiliki kemampuan terakumulasi dalam organ tubuh manusia. Bahkan tidak sedikit yang menyebabkan kematian (Nur, 2015).

Logam berat yang masuk kedalam perairan akan mencemari laut. Selain mencemari air, logam berat juga akan mengendap di dasar perairan yang mempunyai waktu tinggal (*residence time*) sampai ribuan tahun dan logam berat akan terkonsentrasi kedalam tubuh makhluk hidup dengan proses bioakumulasi dan biomagnifikasi melalui beberapa jalan yaitu: melalui saluran pernafasan, saluran makanan, dan melalui kulit (Apriadi, 2005).

Tingginya kandungan logam berat dalam kerang ini karena sifat kerang yang mobilitasnya rendah dan menetap dalam suatu habitat tertentu yaitu di sedimen atau dasar laut sehingga proses biokonsentrasi dan bioakumulasi terjadi secara lebih intensif. Akumulasi logam berat seperti timbal (Pb) sering terjadi pada kerang mentah dan menyebabkan keracunan bagi masyarakat yang mengkonsumsinya karena toksisitasnya tinggi (Prasetyo, 2009).

Besarnya kandungan logam berat yang terakumulasi dalam jaringan tubuh hewan air yang masih layak dikonsumsi manusia ditentukan oleh suatu standar, batas maksimum cemaran Pb dalam pangan mencapai 1,0 mg/kg (WHO).

Menurut Standar Nasional Indonesia (SNI) 7387 : 2009 logam berat timbal masuk ke dalam tubuh melalui pernafasan dan makanan. Konsumsi timbal dalam jumlah banyak secara langsung menyebabkan kerusakan jaringan pada tubuh. Pada bayi dan anak-anak, paparan terhadap timbal yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan otak. Batas maksimum cemaran Pb dalam pangan khususnya kekerangan (*Bivalve*) 2 mg/kg.

Asam jawa yang bernama ilmiah *Tamarindus indica L.* adalah tanaman daerah tropis dan termasuk tumbuhan berbuah polong. Daging buah asam jawa mengandung 8-14% asam tartarat, 30-40% gula, serta asam sitrat dan kalium bitaerat sehingga berasa sangat masam. Belimbing wuluh (*Averrhoa bilimbi*) yang secara tradisional telah digunakan oleh masyarakat sebagai bahan tambahan makanan dan obat-obatan. Adapun kandungan dari buah belimbing wuluh adalah asam format, asam sitrat, asam askorbat (vitamin C), saponin, tanin, glukosid, flavonoid, dan beberapa mineral terutama kalsium dan kalium dalam bentuk kalium sitrat dan kalsium oksalat (Hattu, 2014).

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dan perbandingan perendaman menggunakan larutan asam jawa dan belimbing wuluh dalam menurunkan kandungan logam berat Pb (timbal) pada kerang kepah sehingga dapat dikonsumsi oleh masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsentrasi logam berat timbal (Pb) pada kerang kepah sebelum dan sesudah perendaman dengan larutan asam jawa dan belimbing wuluh?
2. Bagaimana efektivitas waktu perendaman larutan asam jawa dan belimbing wuluh terhadap penurunan kadar logam berat timbal (Pb) pada kerang kepah?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pada penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini akan dilakukan di Laboratorium Kimia Analitik Fakultas Sains dan Teknologi UIN ALAUDDIN MAKASSAR yang dilaksanakan pada tanggal 10-22 oktober 2016.
2. Logam berat timbal (Pb) adalah yang terdapat dalam kerang kepah dalam jumlah banyak, apabila di konsumsi akan menyebabkan keracunan.
3. Kerang kepah merupakan indikator yang sangat baik untuk memonitor suatu pencemaran lingkungan karena sifatnya yang menetap, lambat untuk dapat menghindari diri dari pengaruh polusi dan mempunyai toleransi yang tinggi terhadap logam yang diperoleh dari pasar paotere.
4. Larutan asam jawa dan belimbing wuluh diperoleh dengan cara asam jawa di campur dengan aquades sedangkan belimbing wuluh di tumbuk, masing-masing diperas dan disaring. Filtrat hasil saringan itulah yang diambil dilakukan pengujian. Sedangkan ampasnya dibuang

D. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu

1. Fatimah Nisma (2012), “Efektifitas Air Perasan Buah Jeruk Nipis (*Citrus aurantifolia* Crism. & Panzer Swingle) Terhadap Penurunan Kadar Logam Timbal (Pb), Cadmium (Cd) Dan Tembaga (Cu) Pada Daging Kerang Hijau (*Perna viridis* L)” Kandungan utama jeruk nipis adalah asam sitrat yang dapat berfungsi sebagai kelator dengan logam, dengan merendam kerang ke dalam larutan air perasan jeruk nipis diharapkan akan membentuk kompleks antara asam sitrat jeruk nipis dengan logam dalam daging kerang, sehingga kandungan logam kerang akan berkurang. Daging kerang hijau direndam dalam larutan jeruk nipis pada berbagai variasi kadar masing-masingnya 10, 25, 50, 75, dan 100% v/v dan waktu perendaman masing-masing adalah 15, 30, 45, dan 60 menit. Sampai hasil perendaman didestruksi dan dianalisis dengan menggunakan Spektrofotometer Serapan Atom (SSA). Dapat disimpulkan bahwa larutan asam sitrat dapat menurunkan kadar logam Pb, Cd, dan Cu dalam daging kerang hijau.
2. Fatmawati Nur dan Karneli (2015), “Kandungan Logam Berat Timbal (Pb) Pada Kerang Kima Sisik (*Tridacna squamosa*) di Sekitar Pelabuhan Feri Bira”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kandungan logam timbal (Pb) pada kerang kima sisik di perairan sekitar Pelabuhan feri Bira yang merupakan satu pusat transportasi antar pulau di Sulawesi Selatan. Kandungan Pb yang terakumulasi ditubuh kerang dianalisis dengan menggunakan Spektrofotometer Serapan Atom (SSA). Hasil penelitian menunjukkan kerang kima sisik yang terdapat pada perairan sekitar pelabuhan feri Bira masih layak untuk dikonsumsi

karena kadar logam Pbnya dibawah standar kelayakan menurut WHO yaitu 0,715 mg/kg.

3. Jovita Tri Murtini dan Rosmawaty Peranginangin (2006), “Kandungan Logam Berat Pada Kerang Kepah Dan Air Laut Di Perairan Banjarmasin”. Sampel air dan sedimen diambil dari 3 stasiun diperairan laut sejauh 1 mil dari garis pantai dan dan 3 stasiun lain sejauh 2 mil dari garis pantai. Analisis logam berat pada contoh air laut dan sedimen yang dilakukan adalah Hg, sedangkan untuk daging kerang kepah adalah Hg, As, Cd, Cu dan Pb. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perairan banjarmasin pada bulan juni, agustus dan oktober 2003 mengandung Hg berturut-turut sebesar 6,06, 3,17 dan 4,91 ppb, yang menunjukkan perairan tersebut telah tercemar oleh Hg melebihi ambang batas 3 ppb, walaupun kandungan Hg pada sedimen masih di bawah ambang batas. Kerang kepah yang hidup diperairan Banjarmasin mengandung Hg 1,91 ppb, As 0,88 ppb, Cd 0,22 ppb, Cu 0,46 ppb dan Pb 0,32 ppb. Kandungan logam berat tersebut masih di bawah ambang batas yan berarti masih layak untuk di konsumsi.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsentrasi logam berat timbal (Pb) pada kerang kepah sebelum dan sesudah perendaman dengan larutan asam jawa dan belimbing wuluh.

2. Untuk mengetahui efektivitas waktu perendaman larutan asam jawa dan belimbing wuluh terhadap penurunan kadar logam berat timbal (Pb) pada kerang kepah

F. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan informasi masyarakat tentang logam berat timbal (Pb) pada kerang kepah (*Polymesoda erosa*) dapat diturunkan kadarnya dengan menggunakan larutan asam jawa dan belimbing wuluh.
2. Sebagai bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Pandangan Islam Tentang Laut

Limbah yang berasal dari kegiatan manusia terus berkembang dan mencemari darat maupun laut, Kerusakan yang terjadi didarat maupun dilaut yang disebabkan oleh ulah manusia dijelaskan dalam firman Allah swt sebagai berikut.

1. QS. Al- Ruum/30 : 41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Terjemahnya:

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)(Kementerian Agama RI, 2012).

Quraish Shihab dalam Tafsir AL-Mishbah menjelaskan bahwa terjadinya kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh tangan manusia. laut tercemar sehingga ikan mati dan hasil laut berkurang. Daratan semakin panas sehingga terjadi kemarau panjang. Ketidakseimbangan di darat dan di laut, mengakibatkan siksaan pula kepada manusia. Bila terjadi gangguan keharmonisan dan keseimbangan itu maka kerusakan akan terjadi baik besar maupun kecil pasti

berdampak pada seluruh bagian alam, termasuk manusia baik yang melakukan perusakan maupun yang tidak (Shihab, 2002).

Allah swt telah menciptakan bumi dan isinya dengan sempurna yang tidak ada satu mahlukpun dapat melakukannya. Termasuk menciptakan sungai dan laut, hal ini berkaitan dengan firman Allah swt berikut.

2. QS. Al Fathir/35 : 12

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شْرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ
أَجَاجٌ وَمِنْ كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا
وَتَرَى الْفَلَكَ فِيهِ مَوَازِرَ لَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ



Terjemahnya:

Dan tiada sama (antara) dua laut; yang ini tawar, segar, sedap diminum dan yang lain asin lagi pahit. Dan dari masing-masing laut itu kamu dapat memakan daging yang segar dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang dapat kamu memakainya, dan pada masing-masingnya kamu lihat kapal-kapal berlayar membelah laut supaya kamu dapat mencari karunia-Nya dan supaya kamu bersyukur (Kementerian Agama RI, 2012).

Quraish Shihab dalam Tafsir AL-Mishbah menjelaskan bahwa pengaturan Allah yang sangat teliti sekaligus membuktikan kuasa-Nya membangkitkan manusia. Kuasa Allah yakni menciptakan dua laut yakni sungai dan laut. Air sungai tawar, segar, sangat sedap diminum sedangkan air laut asin lagi pahit. Kendati keduanya berdampingan dan dari masing-masing air itu kamu dapat memakan daging yang segar dari binatang yang hidup disana walau di air

asin. Kamupun dapat mengeluarkan perhiasan seperti mutiara dan marjan. Pada laut dan sungai kamu dapat senantiasa melihat kapal-kapal berlayar itulah kemudahan-kemudahan yang di beri Allah supaya kamu mensyukurinya.

B. Kerang kepah (*Polymesoda erosa*)

Potensi kekerangan di Indonesia yang merupakan salah satu biota dari filum molusca, memiliki nilai ekonomi yang tinggi dengan total nilai pada tahun 2007 mencapai Rp. 1,86 trilyun dan perkembangan produksi dalam kurun waktu 2005-2007 mengalami peningkatan yaitu dari 144.634 ton pada tahun 2005 menjadi 171.595 ton pada tahun 2007 atau mengalami peningkatan sebesar 18,64%. Kerang Kepah (*Polymesoda erosa*) merupakan salah satu jenis kerang yang bernilai ekonomi dan sangat potensial untuk dikembangkan karena kerang ini memiliki nilai gizi yang tinggi. Kelompok kerang memiliki kandungan protein sebesar 7,06% - 16,87%, lemak sebesar 0,40-2,47%, karbohidrat sebesar 2,36-4,95% serta memberikan energi sebesar 69-88 kkal/100 gram daging (Amin, 2011).



Gambar 2.1. Kerang Kepah (*Polymesoda erosa*)

Pada umumnya hewan ini mempunyai cangkang setangkup dan sebuah mantel yang berupa dua daun telinga atau cuping. Mantel dilekatkan pada cangkang dengan bantuan otot-otot yang meninggalkan bekas garis melengkung (*pallial line*) dan biasanya berwarna putih mengkilat (Amin, 2010).

Klasifikasi kerang kepah menurut Jutting (1954) dalam Darussalam (2012) sebagai berikut:

Kerajaan : Animalia
Divisi : Mollusca
Kelas : Bivalvia
Ordo : Veroida
Bangsa : Corbiludae
Marga : Polymesoda
Spesies : *Polymesoda erosa*

Seperti pada hewan air lainnya (ikan dan udang) logam berat dapat juga terakumulasi pada jaringan kerang faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya derajat akumulasi logam tersebut sama dengan faktor yang mempengaruhi akumulasi logam pada hewan air lainnya. Perbedaannya, jenis kerang dapat mengakumulasi logam lebih besar daripada hewan air lainnya karena sifatnya yang menetap, lambat untuk dapat menghindari diri dari pengaruh polusi dan mempunyai toleransi yang tinggi terhadap konsentrasi logam tertentu. Karena itu jenis kerang ini merupakan indikator yang sangat baik untuk memonitor suatu pencemaran lingkungan (Darmono, 2010).

Pada kerang yang masih hidup, cangkang berada dalam keadaan tertutup rapat, atau akan tertutup apabila terkena sentuhan. Sedangkan pada kerang yang telah mati dan sedang mengalami proses kemunduran mutu, cangkang terbuka sedikit atau menganga dan bau yang busuk (Porsepwandi, 1998)

Kerang kepah merupakan kerang yang mempunyai karakteristik sebagai hewan budidaya laut diantaranya adalah sifat adaptatifnya yang tinggi terhadap perubahan lingkungan yang terlalu ekstrem dan tingkat survival ratenya yang tinggi (Amin, 2011).

Makanan kerang terutama terdiri atas plankton dan bahan organik terlarut, memperoleh makanan dengan cara *filter feeder* yang berupa fitoplankton dan zooplankton kecil. Kerang aktif menyaring makanan dari kolom air dengan insangnya. *Polymedosa erosa* hidup di daerah pasang surut, kegiatan pencarian makan akan dipengaruhi oleh gerakan pasang surut air. Selama air pasang, kerang

akan secara aktif menyaring makanan yang melayang dalam air, sedangkan selama air surut kegiatan pengambilan makanan akan sangat menurun bahkan terhenti sama sekali (Rizal, 2013).

C. Logam Berat Timbal (Pb)

Logam berasal dari kerak bumi yang berupa bahan-bahan murni, organik dan anorganik. Logam mula-mula diambil dari pertambangan di bawah tanah (kerak bumi), yang kemudian dicairkan dan dimurnikan dalam pabrik menjadi logam-logam murni. Dalam proses pemurnian logam tersebut yaitu dari pencairan sampai menjadi logam, sebagian darinya terbuang kedalam lingkungan (Darmono, 1995).

Dengan berkembangnya industri, di salah satu sisi memberikan aspek positif namun di sisi lain juga memberikan aspek negatif seperti tercemarnya lingkungan. Terdapat banyak unsur pencemar di lingkungan. Salah satu unsur pencemar yang berbahaya baik bagi makhluk hidup dan lingkungan adalah logam berat. Dampak pencemaran akibat logam-logam berat dikarenakan sifatnya yang tidak dapat terurai dan mudah diabsorpsi oleh biota laut sehingga dapat terakumulasi dalam tubuh. Absorpsi logam berat secara tidak langsung biasanya terjadi melalui rantai makanan dan cenderung terakumulasi di dalam jaringan tertentu pada organisme seperti di dalam hati, ginjal, dan limfa. Selain mengganggu ekosistem, unsur logam berat secara tidak langsung juga merusak perikanan dan kesehatan manusia (Supriharyono, 2000).

Istilah logam biasanya diberikan kepada semua unsur-unsur kimia dengan ketentuan atau kaidah-kaidah tertentu. Unsur ini dalam kondisi suhu kamar, tidak selalu berbentuk padat melainkan ada yang berbentuk cair (Palar, 2008).

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat toksisitas logam berat antara lain suhu, salinitas, pH dan kesadahan. Penurunan pH dan salinitas perairan menyebabkan toksisitas logam berat semakin besar. Peningkatan suhu menyebabkan toksisitas logam berat meningkat. Sedangkan kesadahan yang tinggi dapat mengurangi toksisitas logam berat, karena logam berat dalam air dengan kesadahan tinggi membentuk senyawa kompleks yang mengendap dalam air. Tingkat toksisitas logam berat untuk biota perairan dipengaruhi oleh jenis logam, spesies biota, daya permeabilitas biota dan mekanisme detoksikasi. Logam berat dapat mengumpul (terakumulasi) didalam tubuh suatu biota dan tetap tinggal dalam tubuh dalam jangka waktu yang lama sebagai racun. Pada batas dan kadar tertentu semua logam berat dapat menimbulkan pengaruh yang negatif terhadap biota perairan (Ferianita, 2002).

Logam berat dalam air mudah terserap dan tertimbun dalam fitoplankton yang merupakan titik awal dari rantai makanan, selanjutnya melalui rantai makanan sampai ke organisme lainnya (Fardiaz, 1992).

Kadar logam berat dalam air selalu berubah-ubah tergantung pada saat pembuangan limbah, tingkat kesempurnaan pengolahan limbah dan musim. Logam berat yang terikat dalam sedimen relatif sukar untuk lepas kembali melarut dalam air, sehingga semakin banyak jumlah sedimen maka semakin besar kandungan logam

berat didalamnya. Keberadaan logam dibadan perairan dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan diantaranya adalah suhu, pH dan salinitas (Palar, 1994).

Peningkatan kadar logam berat dalam air laut akan diikuti peningkatan kadar logam berat dalam biota laut yang pada gilirannya melalui rantai makanan akan menimbulkan keracunan akut dan khronik, bahkan bersifat karsinogenik pada manusia konsumen hasil laut (Muhajir, 2009).

Salah satu logam berat yang paling sering menjadi polutan pada lingkungan adalah Pb karena merupakan limbah yang sering digunakan baik pada industri kecil misalnya limbah rumah tangga hingga industri besar seperti pabrik-pabrik penghasil produk. Logam berat Pb bila terdapat pada lingkungan dalam jumlah yang banyak maka akan berbahaya bagi makhluk hidup di sekitarnya. Pencemaran logam berat Pb karena limbah industri yang berasal dari pemukiman ataupun pabrik yang dialirkan ke sungai akan bermuara ke laut. Selain itu kebiasaan masyarakat sekitar perairan yang membuang limbahnya ke perairan juga menjadi salah satu penyebab pencemaran. Pencemaran logam Pb juga disebabkan oleh kegiatan transportasi dikarenakan oleh penggunaan tetrametil-Pb dan tetraetil-Pb dalam bahan bakar berkualitas rendah untuk menurunkan nilai oktan sebagai anti-knock mesin kendaraan. Premium mengandung Pb sebesar 0,45 g/L sehingga jumlah Pb yang terlepas ke lingkungan sangat besar (Nur, 2015).

Selain dalam bentuk logam murni, timbal juga dapat ditemukan dalam bentuk senyawa anorganik dan organik. Semua bentuk timbal memiliki pengaruh yang sama terhadap toksisitas manusia. Timbal dalam tubuh terutama terikat dalam gugus -SH

dalam molekul protein hal ini menyebabkan hambatan pada aktivitas kerja sistem enzim. Timbal dapat mengganggu sistem sintesis Hb dengan jalan menghambat konversi delta aminolevulinik asid (delta-ALA) menjadi forfobilinogen dan juga menghambat korporasi dari Fe kedalam protoporfirin IX untuk membentuk Hb, dengan jalan menghambat enzim delta-aminolevulinik asid-dehidratase (delta-ALAD) dan ferokelatase. Hal ini mengakibatkan meningkatnya ekskresi koproporfirin dalam urin dan delta-ALA serta menghambat sintesis Hb (Muhajir, 2009).

Menurut Palar, 2012 logam timbal atau Pb mempunyai sifat-sifat yang khusus seperti berikut:

1. Merupakan logam yang lunak, sehingga dapat dipotong dengan menggunakan pisau atau dengan tangan dan dapat dibentuk dengan mudah.
2. Merupakan logam yang tahan terhadap peristiwa korosi atau karat, sehingga timbal sering digunakan sebagai bahan *coating*.
3. Mempunyai titik lebur rendah, hanya 327,5°C.
4. Mempunyai kerapatan yang lebih besar dibandingkan dengan logam-logam biasa, kecuali emas dan merkuri.
5. Merupakan penghantar listrik yang tidak baik..

Walaupun pengaruh toksisitas akut agak jarang dijumpai, tetapi pengaruh tosisitas kronis paling sering ditemukan. Pengaruh toksisitas kronis ini sering dijumpai pada pekerja pertambangan dan pabrik pemurnian logam, pabrik mobil (proses pengecatan), penyimpanan baterai, percetakan, pelapisan logam dan

pengecatan sistem semprot. Konsentrasi Pb dalam produk cat sudah sangat menurun sampai batas maksimum 0,06%, tetapi walaupun begitu bangunan tua yang masih ada sisa cat lamanya, kandungan Pb-nya masih cukup tinggi (Darmono 2010).

Timbal (Pb) yang terdapat di alam dapat masuk ke perairan melalui pengendapan dan jatuhnya debu yang mengandung Pb yang berasal dari hasil pembakaran bensin bertimbal, erosi dan limbah industri. Kation logam larut diendapkan oleh anion seperti sulfat, klorida, florida dan bikarbonat atau karbonat dalam air laut. Pb dapat redeposit dalam jaringan tubuh dan dapat menyebabkan gangguan sistem imun, reproduksi, syaraf dan perkembangan mental. Banyak reaksi biokimia dalam tubuh manusia dipengaruhi oleh logam Pb. Konsentrasi Pb sebesar 50 ppb dapat menimbulkan bahaya pada lingkungan laut (Murtini, 2006).

Menurut Murtini (2006) efek-efek Pb terhadap kesehatan dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut :

- a. Efek terhadap terjadinya Anemia oleh Pb Secara biokimiawi, keracunan timah hitam dapat menyebabkan :
 - 1) Peningkatan produksi *ALA (Amino Levulinic Acid)* Timah hitam akan menghambat enzim hemesintetase, yang mengakibatkan penurunan produksi heme. Penurunan produksi heme ini akan meningkatkan aktivitas *ALA sintetase*, dan akhirnya produksi *ALA* meningkat. Peningkatan produksi *ALA* ini dapat dilihat dari ekskresi *ALA* di urine.
 - 2) Peningkatan *Protoporphirin* Perubahan *protoporphirin IX* menjadi heme, akan terhambat dengan adanya timah hitam. Hal ini akan menyebabkan

terjadinya akumulasi dari *protoporphirin IX* yang dapat diketahui pada plasma dan feces.

3) Peningkatan *koproporphirin* Akumulasi dari *protoporphirin* akan meningkatkan akumulasi dari koproporphirin III. Hal ini diketahui dengan didaptkannya koproporphirin III pada urine dan feces.

b. Efek terhadap saraf (sistem saraf pusat)

Susunan saraf merupakan jaringan yang paling sensitif terhadap keracunan Pb. Setelah pajanan tinggi dengan kadar Pb darah di atas 80 µg/dl dapat terjadi ensefalopati. Terjadi kerusakan pada arteriol dan kapiler yang mengakibatkan oedema (adanya cairan) otak, meningkatnya tekanan cairan serebrospinal, degenerasi neuron dan perkembangbiakan sel glia. Secara klinis keadaan ini disertai dengan menurunnya fungsi memori dan konsentrasi, depresi, sakit kepala, *vertigo* (pusing berputar-putar), *tremor* (gerakan abnormal dengan frekuensi cepat), *stupor* (penurunan kesadaran ringan), koma, dan kejang-kejang.

c. Ensefalopati

Ensefalopati merupakan bentuk keracunan Pb yang sangat buruk dengan sindrom gejala neurologis yang berat dan dapat berakhir dengan kerusakan otak atau kematian. Paling sering dijumpai pada anak kecil atau orang yang mengkonsumsi makanan/minuman tercemar Pb. Anak-anak mempunyai resiko lebih besar terhadap paparan Pb dari orang dewasa. Hal ini mungkin disebabkan oleh adanya perbedaan aktivitas metabolik interna Ensefalopati akut pada manusia sangat dipengaruhi oleh : 1) jumlah partikel Pb yang terhisap, 2) lama pemaparan, dan

faktor-faktor lain. Yang ditandai dengan : 1) perubahan perilaku mental, 2) Pelemahan pada daya ingat dan pada aktivitas untuk berkonsentrasi, 3) hyperirritabel (hal yang sangat mengganggu), 4) kegelisahan, 5) depresi, 6) sakit kepala, 7) vertigo dan tremor, ensefalopati akut berkembang hanya pada dosis yang besar dan jarang terjadi pada level Pb dalam darah dibawah 100 µg/ 100 ml, pernah dilaporkan terjadi pada tingkat 70 µg/ 100ml.

d. Pendengaran

Kerusakan pada susunan saraf pusat dapat pula mengenai saraf kranial, kadar Pb dalam darah 15 µg/dl dapat menyebabkan gangguan saraf pusat, pada kadar 1 – 18 µg/dl menyebabkan gangguan pendengaran. Beberapa penelitian pada anak-anak dan dewasa memperlihatkan adanya hubungan paparan Pb dengan penurunan pendengaran tipe sensorineural. Pada individu yang sensitif kadang-kadang didapatkan adanya efek yang memburuk pada sistem tubuh, tetapi secara klinis efek tersebut tidak jelas sampai dicapai kadar Pb yang lebih tinggi lagi.

e. Efek terhadap ginjal

Keracunan berat Pb dalam waktu lama akan menyebabkan penyakit renal progresif dan tidak dapat disembuhkan. Ada beberapa laporan berisi interstisial nephritis kronis pada pekerja sering disertai dengan hasil yang fatal. Kebersihan suatu industri akan mengurangi jumlah dan besarnya komplikasi renal pekerja yang keracunan akan tetapi anak-anak yang menghirup Pb pada cat yang mengelupas dan konsumen yang mengkonsumsi makanan yang tercemar Pb tetap mempunyai resiko. Nephropati yang ditandai oleh gangguan fungsi ginjal

progresif sering disertai hipertensi. Kerusakan ginjal berupa *fibrosis interstitialis* kronis, degenerasi tubuler, dan perubahan vaskuler pada arteri kecil dan arteriol. Ditemukan gambaran khas, yaitu penuhnya badan inklusi intranuklear pada sel dinding tubulus. Badan inklusi merupakan kompleks protein Pb yang kemudian di ekskresi melalui urine. Degenerasi tubulus proksimal mengakibatkan menurunnya reabsorpsi asam amino, glukosa, fosfat dan asam sitrat. Pada kasus yang berat dapat terjadi sindrom *fanconi* yaitu *hiperamino uria* (air kencing mengandung asam amino berlebihan), glukosuria dan *hipofosfat uria* atau kadang-kadang *hiperfosfat uria*. Gangguan ginjal bersifat tidak menetap. *Saturnine gout* adalah sebuah konsekuensi pengurangan fungsi tubuler (ginjal *tubulus glomerulus*), Pb berpengaruh pada ekskresi urates. Maka meskipun angka formasi mereka normal, level asam uric disimpan dalam persendian, hampir menyerupai encok/ pegal.

f. Efek terhadap sistem cardiovasculer

Pada keracunan Pb akut beberapa pasien menderita *colic* yang disertai peningkatan tekanan darah. Kemungkinan timbulnya kerusakan miokard tidak dapat diabaikan. Perubahan elektro cardiografi dijumpai pada 70 % penderita dengan gejala umum berupa takikardia, disritmia atrium.

g. Efek terhadap sistem reproduksi

Telah diketahui bahwa Pb dapat menyebabkan gangguan reproduksi baik pada perempuan maupun pada laki-laki, Pb dapat menembus jaringan placenta sehingga menyebabkan kelainan pada janin. Peningkatan kasus infertil, abortus

spontan, gangguan haid dan bayi lahir mati pada pekerja perempuan yang terpajan Pb telah dilaporkan sejak abad 19, walaupun demikian data mengenai dosis dan efek Pb terhadap fungsi reproduksi perempuan, sampai sekarang masih sedikit.

Hubungan antara kadar Pb dalam darah dan kelainan yang diakibatkan terhadap kelainan reproduksi perempuan adalah

- 1) Kadar Pb darah 10 $\mu\text{g}/\text{dl}$ dapat mengakibatkan gangguan pertumbuhan.
- 2) Kadar Pb darah 30 $\mu\text{g}/\text{dl}$ mengakibatkan kelainan prematur.
- 3) Kadar Pb darah 60 $\mu\text{g}/\text{dl}$ mengakibatkan komplikasi kehamilan.

Senyawa teratogen termasuk Pb dapat menembus janin dan dapat mengganggu pertumbuhan mulai dari usia kehamilan pada minggu ke tiga hingga minggu ke 38. mulai minggu ke tiga hingga pertengahan minggu ke enam dapat mengganggu pertumbuhan susunan saraf pusat atau central nervous system (CNS), pada pertengahan minggu ke tiga sampai minggu ke enam dapat mengganggu pertumbuhan jantung, pada minggu ke empat hingga minggu ke delapan mengganggu pertumbuhan mata, lengan dan kaki, mulai pertengahan minggu ke enam sampai minggu ke delapan dapat mengganggu pertumbuhan gigi dan mulut, minggu ke sembilan mengganggu pertumbuhan tekak (langit-langit, mulai minggu ke tujuh sampai ke 12 mengganggu pertumbuhan alat kelamin bagian luar dan mulai minggu ke empat sampai minggu ke 12 mengganggu pertumbuhan pendengaran.

Efek Pb terhadap kesehatan terutama terhadap sistem haemotopoetic (sistem pembentukan darah), adalah menghambat sintesis hemoglobin dan memperpendek umur sel darah merah sehingga akan menyebabkan anemia. Pb juga menyebabkan gangguan metabolisme Fe dan sintesis globin dalam sel darah merah dan menghambat aktivitas berbagai enzim yang diperlukan untuk sintesis heme. Anak yang terpapar Pb akan mengalami degradasi kecerdasan alias idiot. Pada orang dewasa Pb mengurangi kesuburan, bahkan menyebabkan kemandulan atau keguguran pada wanita hamil, walaupun tidak keguguran, sel otak tidak bisa berkembang. Dampak Pb pada ibu hamil selain berpengaruh pada ibu juga pada embrio/ janin yang dikandungnya. Selain penyakit yang diderita ibu sangat menentukan kualitas janin dan bayi yang akan dilahirkan juga bahan kimia atau obat-obatan, misalnya keracunan Pb organik dapat meningkatkan angka keguguran, kelahiran mati atau kelahiran prematur (Alpatih, 2009).

D. Asam Jawa

Asam jawa (*Tamarindus indica*) merupakan salah satu tanaman yang dapat digunakan sebagai obat dimana tanaman ini tersebar luas di Indonesia. Tanaman tropis yang berasal dari Afrika namun dapat tumbuh dengan subur di Indonesia, kebanyakan digunakan sebagai pohon peneduh jalan. Batang pohon asam yang cukup keras dapat tumbuh menjadi besar dan daunnya rindang. Pohon Asam jawa bertangkai panjang, sekitar 117 cm dan bersirip genap, dan bunganya berwarna kuning kemerah-merahan dan buah polongnya berwarna coklat dan tentu saja berasa

khas asam. Biasanya didalam buah polong buah juga terdapat biji berkisar 2-5 yang berbentuk pipih dengan warna coklat agak kehitaman (Puspodewi, 2015).

Asam jawa adalah sejenis buah yang masam rasanya, biasa digunakan sebagai bumbu dalam banyak masakan indonesi sebagai perasa atau penambah rasa asam dalam makanan, misalnya pada sayur asam atau kadang-kadang kuah pempek (Hayati,2015).

Tanaman ini tumbuh baik di daerah semi kering dan iklim muson basah, dapat tumbuh di kisaran tipe tanah yang luas. Dapat hidup di tempat bersuhu sampai 47⁰ C, tapi sangat sensitif terhadap es. Umumnya tumbuh di daerah bercurah hujan 500 – 1.500 mm/tahun, bahkan tetap hidup pada curah hujan 350 mm jika diberi irigasi saat penanaman. Di daerah tropika basah bercurah hujan lebih dari 4.000 mm, pembungaan dan pematangan menurun dengan jelas (Gembong, 1989)

Nama lain dari asam jawa adalah bakme (Aceh), kayu asam cumalagi (Minangkabau), tangkal asem (Sunda), Acem (Madura), Camba (Makassar), Cempa (Bugis) dan asam jawa (Kalimantan). Asam jawa sering digunakan sebagai bumbu dapur atau dibuat manisan. Tanaman asam jawa termasuk tanaman yang berbuah polong. Batang pohonnya cukup keras dan dapat tumbuh menjadi besar, serta berdaun rindang. Daun asam jawa bertangkai panjang sekitar 17 cm dan bersirip genap. Bunganya berwarna kuning kemerah-merahan. Buah polongnya berwarna coklat dengan rasa khas asam. Di dalam buah polong terdapat kulit yang membungkus daging, buah dan terdapat biji yang berjumlah 2-5 yang berbentuk pipih dengan warna coklat agak kehitaman. Buah polong asam jawa mengandung senyawa kimia

antara lain: tannin, asam sitrat, asam anggur, asam suksinat, pectin dan gula invert. Pada kulit bijinya mengandung phlobatanin dan bijinya mengandung albuminoid serta pati. Sedangkan daunnya mengandung kimia saponin, flavonoid dan kanin (Hayati, 2015).

Asam jawa tergolong kedalam jenis pohon dan berumur panjang (menahun). Berperawakan besar, selalu hijau (tidak mengalami masa gugur daun), tinggi sampai 30 meter dan diameter batang di pangkal hingga 2 meter. Kulit batang berwarna coklat keabu-abuan, kasar dan memecah, bearlur-alur vertikal. Tajuknya rindang dan lebat berdaun, melebar dan membulat (Gembong, 1989).

Klasifikasi asam jawa menurut Gembong (1989) yaitu:

Kerajaan : Plantae
Divisi : Magnoliophyta
Kelas : Magnoliopsida
Ordo : Fabales
Bangsa : Fabaceae
Marga : *Tamarindus*
Spesies : *Tamarindus indica*

Daging buah asam jawa mengandung asam apel, asam sitrat, asam anggur, asam tartarat, asam suksinat, pectin dan gula invert. Buah Asam Jawa yang masak dalam 100 gram akan mengandung nilai kalori sebesar 239 kal, protein 2,8 gram, lemak 0,6 gram, hidrat arang 62,5 gram, kalsium 74 miligram, fosfor 113 miligram, zat besi 0,6 miligram, vitamin A 30 SI, vitamin B1 0,34 miligram, vitamin

C 2 miligram. Kulit biji Asam Jawa mengandung *phlobatannin* dan bijinya mengandung *albuminoid* serta pati. Warna asli daging asam adalah kuning kecoklat-coklatan. Pulp buah asam yang masak mengandung air sekitar 63,3-68,6%, bahan padat total 31,3-36,6%, protein 1,6-3,1%, lemak 0,27-0,69%, sukrosa 0,1-0,8%, selulosa 2,0-3,4% dan abu 1,2-1,6% (Glew, 2005).

Asam jawa memiliki manfaat yang banyak, semua bagian dari asam jawa dapat dimanfaatkan, baik daun, batang, akar, biji maupun buahnya. Asam jawa mengandung 15% asam sitrat. Asam sitrat merupakan asam organik yang dapat larut dalam air. Dalam kehidupan sehari-hari asam sitrat banyak dimanfaatkan dalam bidang industri pangan. Secara kimiawi asam sitrat dapat membentuk senyawa kompleks dengan logam karena memiliki gugus fungsional -OOH dan OH (Amri, 2004).

Buah yang telah masak dapat disimpan lama setelah dikupas dan sedikit dikeringkan dengan bantuan sinar matahari. Selain digunakan sebagai bumbu, digunakan juga untuk memberi rasa asam atau untuk menghilangkan bau amis ikan juga digunakan sebagai bahan sirup, selai, gula-gula dan jamu untuk mengurangi radang dan rasa sakit di persendian, di atas luka atau pada sakit rematik (Gembong, 1989).

E. *Belimbing wuluh*

Nama lain dari belimbing wuluh adalah limeng (Aceh), belimbingan (Batak), malimbi (Nias), limbi (Bima), balimbeng (Flores), lembetue (Gorontalo), bainang (Makassar), takurela (Ambon) dan uteke (Irian Jaya). Banyak ditanam sebagai pohon buah. Kadang-kadang tumbuh liar dan dapat ditemukan dari daratan rendah sampai 500 meter dari permukaan laut (Hemming, 2006).

belimbing wuluh (*Averrhoa bilimbi*) yang secara tradisional telah digunakan oleh masyarakat sebagai bahan tambahan makanan dan obat-obatan. Di Indonesia, belimbing wuluh sering dijadikan sebagai bumbu masakan karena rasa dan aromanya yang khas. Adapun kandungan dari buah belimbing wuluh adalah asam format, asam sitrat, asam askorbat (vitamin C), saponin, tanin, glukosid, flavonoid, dan beberapa mineral terutama kalsium dan kalium dalam bentuk kalium sitrat dan kalsium oksalat (Mursito dalam Hattu, 2014).

Belimbing wuluh tumbuh subur di Indonesia, Filipina, Sri Lanka, Myanmar dan Malaysia. Dapat ditemui di tempat yang banyak terkena sinar matahari langsung tetapi cukup lembap. Pohon belimbing bisa tumbuh dengan ketinggian mencapai 5-10 m. Belimbing wuluh salah satu tanaman yang tumbuh subur di Indonesia khususnya di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Tanaman ini termasuk salah satu tanaman tropis yang mempunyai kelebihan yaitu dapat berbuah sepanjang tahun (Susilo, 2012).

Buah belimbing wuluh berbentuk elips hingga seperti torpedo dengan panjang 4-10 cm. Warna buah ketika muda hijau, dengan sisa kelopak bunga

menempel diujungnya. Jika masak buahnya kuning pucat. Daun majemuk, menyirip, anak daun 25-45 helai, bulat telur, ujung meruncing, pangkal membulat, panjang 7-10cm, lebar 1-3cm, bertangkai pendek, pertulangan menyirip, hijau muda, hijau. Daging buahnya berair dan sangat asam. Kulit buah berkilap dan tipis. Bijinya kecil (6 mm) berbentuk pipih dan berwarna coklat, serta tertutup lendir. Biji lanset atau segitiga, masih muda hijau setelah tua kekuningan kehijauan (Marlianis, 2013).

Klasifikasi belimbing wuluh menurut Gembong (1989) yaitu:

Kerajaan : Plantae
Divisi : Spermatophyta
Subdivisi : Angiospermae
Kelas : Dicotyledoneae
Suku : Oxalidaceae
Marga : *Avverhoa*
Spesies : *Avverhoa bilimbi* L

Buah belimbing wuluh mengandung senyawa kimia asam format, asam sitrat, asam aksorbat (vitamin C), saponin, tanin, glukosid, flavonoid dan beberapa mineral terutama kalsium dan kalium dalam bentuk kalium sitrat dari kalium oksalat. Rasa asam belimbing wuluh terutama ditentukan oleh asam sitrat (Marlianis, 2013).

Asam sitrat adalah zat padat kristalin yang sangat larut dalam air, tidak berhidrat pada suhu 55⁰ dan melebur pada suhu 160⁰. Ia merupakan asam tribasa dan karenanya menghasilkan tiga deret garam. Sitrat normal dari logam-logam alkali mudah larut dalam air, sitrat logam lainnya larut sangat sedikit (Vogel, 1990).

Belimbing wuluh mengandung kadar vitamin C cukup tinggi. Kandungan vitamin C yang terdapat di dalamnya sekitar 25,8 mg/100 gram. Buah ini memiliki banyak manfaat di antaranya mampu menyembuhkan sariawan. Kandungan kalium yang juga dimilikinya menyebabkan buah ini berkhasiat melancarkan air seni dan menurunkan tekanan darah. Selain itu, adanya asam sitrat pada belimbing wuluh memiliki manfaat yang besar kandungan vitamin C dalam buah belimbing wuluh segar sebesar 25 miligram dalam 100 gram buah segar. Kandungan vitamin C ini mendekati kandungan vitamin C jeruk nipis sebesar 27.00 miligram dalam 100 gram buah segar. Kandungan vitamin C yang cukup tinggi tersebut dapat dijadikan acuan dalam pemanfaatan buah belimbing wuluh sebagai minuman kesehatan. Belimbing wuluh memiliki banyak potensi mendorong perlunya penelitian pemanfaatan belimbing wuluh agar lebih optimal. Salah satu pengolahan untuk memperpanjang umur simpan dan nilai kegunaan belimbing wuluh adalah dengan memanfaatkannya sebagai bahan baku dalam pembuatan minuman serbuk instan. Pengolahan belimbing wuluh menjadi minuman serbuk instan diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam mengkonsumsi dan memanfaatkan khasiat-khasiat belimbing wuluh. (Hattu, 2014).

Beberapa sifat dari belimbing wuluh adalah sebagai rasa asam dan sejuk. Dapat menghilangkan sakit (analgesik), memperbanyak pengeluaran empedu, antiradang dan juga sebagai astringent. Belimbing wuluh memiliki banyak manfaat bagi kesehatan manusia ataupun yang lainnya antara lain sebagai obat batuk, obat jerawat, diabetes, rematik, sariawan dan sakit gigi (Arisandi, 2008).

F. Pencemaran Laut

Laut merupakan tempat bermuaranya aliran sungai yang memiliki potensi sebagai tempat berkumpulnya zat-zat pencemar. Zat tersebut umumnya berasal dari kegiatan industri dan aktivitas manusia. Peningkatan jumlah industri dan aktivitas manusia akan selalu diikuti oleh penambahan jumlah limbah. Limbah yang dihasilkan sangat bervariasi tergantung dari jenis dan ukuran industri, pengawasan pada proses industri, derajat penggunaan air, dan derajat pengolahan air limbah yang ada. Banyaknya pabrik ataupun industri, seringkali membuang limbah ke sungai tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu. Limbah yang terbuang mengandung bahan kimia beracun dan berbahaya terbawa oleh aliran sungai, yang pada akhirnya bermuara ke laut sehingga akan mencemari lingkungan (Rahayu, 2014).

Pola akumulasi pencemaran logam berat lebih banyak pada spesies kerang daripada yang lain karena bersifat menetap. Logam berat pada hewan berasal dari makanan dan biolakumulasi yang tinggi. Logam berat berkonsentrasi dalam air dan masuk kedalam rantai makanan (Pandey, 2008).

Pencemaran lingkungan dan polutan yang paling penting adalah logam berat dalam jaringan akuatik karena toksisitas dan akumulasinya pada hewan laut. Aktivitas domestik, industri dan antropogenik yang luas dapat menjadi sumber terkontaminasinya air oleh logam berat (Mes J, 1993).

Pencemaran laut didefinisikan sebagai dampak negatif bagi kehidupan biota, sumber daya, kenyamanan ekosistem laut, serta kesehatan manusia dan nilai

guna ekosistem laut, disebabkan baik secara langsung maupun secara tidak langsung oleh pembuangan bahan-bahan atau limbah ke dalam laut yang berasal dari kegiatan manusia. Menurut definisi lain pencemaran laut adalah perubahan kondisi laut yang tidak menguntungkan yang disebabkan oleh adanya benda-benda asing sebagai akibat dari perbuatan manusia (Prasetyo, 2009).

Pencemaran laut menurut peraturan pemerintah No.19/1999 tentang dan/atau Perusakan Lautan: Masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan/atau fungsinya.

Sedangkan menurut surat Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor: KEP-02/MENKLH/I/1998 (pasal 1) Tentang penetapan Baku Mutu Lingkungan adalah : masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam air dan/atau berubahnya tatanan air oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air menjadi kurang atau sudah tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

Kontaminasi logam berat terhadap ekosistem perairan telah menjadi masalah dalam kesehatan lingkungan selama beberapa dekade. Kontaminasi logam berat pada ekosistem perairan secara intensif berhubungan dengan pelepasan logam berat oleh limbah domestik, industri dan aktivitas manusia lainnya. Kontaminasi logam berat dapat menyebabkan efek mematikan terhadap

organisme laut dan menyebabkan ketidakseimbangan ekologis dan keanekaragaman organisme laut. Pencemaran perairan ditandai dengan adanya perubahan sifat fisik, kimia dan biologi perairan. Bahan pencemar berupa logam berat di perairan akan membahayakan kehidupan organisme, maupun efeknya secara tidak langsung terhadap kesehatan manusia (Akbar, 2015).

Perairan pesisir selama ini menjadi tempat pembuangan limbah dari berbagai kegiatan manusia baik yang berasal dari dalam wilayah pesisir maupun diluarnya (lahan atas dan laut lepas). Pencemaran laut (Perairan pesisir) didefinisikan sebagai dampak negatif (pengaruh) yang membahayakan terhadap kehidupan biota, sumber daya dan kekayaan ekosistem laut serta kesehatan manusia (Nontji, 1993).

Dipandang dari sudut keseluruhan peredaman polusi (yaitu dari sudut ekosistem), dikenal 2 jenis polusi yaitu polutan yang tidak dapat berdegradasi atau (*nondegradable pollutants*), bahan dan racun, seperti kaleng aluminium, garam merkuri, bahan kimia dan phenolik yang panjang rantainya, dan DDT yang tidak dapat dikurangi kadarnya atau dapat diturunkan secara lamban sekali dilingkungan alami. Polutan yang tidak dapat berdegradasi tidak hanya menumpuk, tetapi seringkali juga secara biologi membesar ketika bergerak di dalam siklus biogeokimia dan disepanjang rantai makanan. Kedua adalah polutan yang dapat berbiodegradasi, seperti pembuangan limbah rumah tangga yang dapat mengalami penguraian secara cepat melalui proses alami atau dengan sistem rekayasa (seperti pengolahan limbah kota) (Odum, 1996).

Limbah yang berasal dari kegiatan hidup manusia dapat terus berkembang dan dengan mudah dapat mencemari sumber air baik yang ada di permukaan maupun dibawah tanah. Kalau sumber air sudah tercemar, kemungkinan terjadinya penyebaran penyakit menjadi besar. Apalagi pencemaran akibat kegiatan hidup manusia, keanekaragamannya amat besar hingga pendaurulangan tidak mungkin dapat dilakukan secara sederhana (Irda, 2014).

Berdasarkan pernyataan di atas maka jelas penggunaan larutan asam jawa dan larutan belimbing wuluh dapat diasumsikan memiliki daya pelarut yang cukup efektif terhadap logam berat Timbal, sehingga dapat menurunkan logam berat Timbal pada kerang kepah.

G. Kerangka Pikir

INPUT

- Kerang kepah merupakan salah satu jenis kerang yang digemari masyarakat.
- Kerang kepah dapat mengakumulasi logam berat timbal (Pb).
- Larutan asam jawa dan belimbing wuluh dapat menurunkan kadar logam berat.

PROSES

Menguji pengaruh waktu perendaman dengan menggunakan larutan asam jawa dan belimbing wuluh untuk menurunkan kandungan logam berat timbal (Pb) pada kerang kepah (*Polymesoda erosa*).

OUTPUT

Waktu perendaman dengan larutan asam jawa dan belimbing wuluh efektif menurunkan kadar logam berat timbal (Pb) pada kerang kepah.

H. Hipotesis

Adapun hipotesis dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Waktu perendaman dengan larutan asam jawa dan belimbing wuluh efektif menurunkan kadar logam berat timbal (Pb) pada kerang kepah.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif (*descriptive research*) adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau saat yang lampau.. Metode ini bersifat *validation* atau menguji, yaitu menguji pengaruh satu atau lebih variabel lain. Variabel yang memberi pengaruh dikelompokkan sebagai variabel bebas (*independent variables*) dan variabel yang dipengaruhi dikelompokkan sebagai variabel terikat (*dependent variables*).

Sampel kerang kepah diperoleh dari pasar paotere kota Makassar dan di analisis di Laboratorium Kimia Analitik Lantai 1 Fakultas Sains Dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.

B. Variabel Penelitian

1. Variabel bebas
 - Waktu perendaman kerang kepah pada larutan asam jawa dan belimbing wuluh.
2. Variabel terikat
 - Konsentrasi logam berat timbal (Pb) pada kerang kepah

C. Defenisi Operasional Variabel

1. Waktu perendaman adalah waktu yang di butuhkan untuk menurunkan kadar logam berat timbal (Pb) dengan menggunakan larutan asam jawa dan belimbing wuluh yang diukur pada menit ke 30, 60 dan 90.
2. Konsentrasi logam berat timbal adalah angka yang ditunjukkan setelah perlakuan perendaman kerang kepah pada larutan asam jawa dan belimbing wuluh.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menggunakan uji SSA (Spektropometri Serapan Atom) dimana sampel kerang kepah diambil di pasar paotere Kota Makassar kemudian dilakukan pengujian perendaman larutan jawa dan belimbing wuluh dengan waktu perendaman yang berbeda.

E. Instrumen Penelitian (Alat dan Bahan)


Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kantong plastik, erlenmeyer, teflon bomb, beaker glass, hot plate, labu ukur, freezer, oven, penangas air. Serta bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kerang kepah, HNO_3 , HClO_4 , aquabides, larutan asam jawa dan belimbing wuluh.

F. *Prosedur Kerja*

1. *Pengambilan sampel kerang kepah (Polymesoda erosa)*

Pengambilan sampel kerang kepah diambil langsung dari pasar potere Kota Makassar, dimasukkan ke kantong plastik yang berkedap udara untuk mencegah kontaminasi logam selama pengangkutan ke laboratorium.

Adapun perlakuan pada penelitian ini adalah kerang kepah direndam dalam larutan belimbing wuluh dan asam jawa pada waktu masing-masing 30, 60 dan 90 menit sebanyak 2 kali ulangan. Dan kontrol dengan perendaman air biasa (aquades) yang di tampilkan pada *lay out* sebagai berikut.



Keterangan:

Lo : Tanpa Larutan

L1 : Larutan Asam Jawa

L2 : Larutan Belimbing Wuluh

- W₀ : 0 Menit
W₁ : 30 Menit
W₂ : 60 Menit
W₃ : 90 Menit

2. Pembuatan larutan standar Pb

Sebelum dianalisis, terlebih dahulu dibuat larutan standar. Pembuatan larutan standar Pb dilakukan dengan memipet masing-masing 0 ml; 0,1 ml; 0,2 ml; 0,5 ml; 1 ml dan 2 ml larutan baku Pb 100 mg/l kedalam labu ukur 100 ml menambahkan air bebas mineral sampai tanda batas dan menghimpitkannya lalu menghomogenkannya.

3. Pengukuran konsentrasi timbal (Pb) pada sampel sebelum perlakuan

Pengukuran konsentrasi timbal (Pb) pada sampel sebelum perlakuan yaitu perendaman dengan air biasa.

4. Perendaman sampel

Perendaman daging menggunakan larutan asam jawa dan belimbing wuluh dengan cara ditimbang berat basah sampel sebanyak 5 gram, memasukkan daging ke dalam erlenmeyer yang telah di isi larutan asam jawa dan belimbing wuluh selama 30, 60 dan 90 menit. Sampel kerang di tiriskan pada saringan plastik kemudian di cuci untuk dianalisis.

5. Prevarasi sampel

Sampel yang telah direndam lalu dipanaskan di atas hot plate dengan suhu 100°C dan menambahkan asam nitrat (HNO_3) pekat sebanyak 5 ml sampai daging larut (hancur) dan uap nitrat habis hingga terlihat jernih.

Ditambahkan HClO_4 sebanyak 1 ml, lalu disaring menggunakan kertas saring Whatman kedalam labu ukur 100 ml dan menambahkan Aqua Bidestilata steril. Kemudian dihomogenkan, setelah itu diimpitkan sampai batas dengan menambahkan Aqua Bidestilata steril.

6. Pengukuran konsentrasi timbal (Pb) pada sampel

Setelah perlakuan pengukuran konsentrasi Pb dilakukan dengan menggunakan SSA pada panjang gelombang 217,0 Hz. Konsentrasi yang diperoleh dalam bentuk mg/l dikonversi kedalam bentuk mg/kg.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Hasil pengukuran seri larutan standar Pb, selanjutnya dibuatkan kurva standar/kalibrasi yang merupakan plot antara nilai absorbansi (sumbu y) dengan konsentrasi standar (sumbu x). Berdasarkan kurva standar ini, selanjutnya dapat diperoleh persamaan garis linear, yakni $y = ax + b$. Hasil pengukuran absorbansi larutan sampel kemudian dimasukkan pada persamaan garis linear di atas untuk memperoleh konsentrasi larutan sampel. Sementara itu, konsentrasi Pb dalam sampel dalam mg/kg berat sampel basah dihitung menurut persamaan berikut ini.

$$M = \frac{C \times V \times fp}{B}$$

dengan M adalah kandungan Pb dalam sampel (mg/kg), C adalah konsentrasi yang diperoleh dari kurva kalibrasi (mg/L), V adalah volume larutan sampel (L), fp adalah faktor pengenceran, dan B adalah bobot sampel (kg). Penurunan konsentrasi Pb akibat perlakuan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$MA-B = MA - MB$$

dengan MA-B adalah konsentrasi penurunan Pb akibat perlakuan (mg/kg), MA adalah konsentrasi Pb sebelum perlakuan (mg/kg), MB adalah konsentrasi Pb setelah perlakuan(mg/kg).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Analisis kandungan logam Pb dalam kerang kepah pada penelitian ini dilakukan dengan metode kurva kalibrasi. Dalam metode ini, dibuat sederetan larutan standar yang diketahui konsentrasinya kemudian diukur absorbansinya dengan spektrofotometer serapan atom. Absorbansi yang diperoleh kemudian diplotkan terhadap konsentrasi larutan standar untuk memperoleh kurva standar/kalibrasi. Berdasarkan kurva ini kemudian ditentukan persamaan garis linear. Larutan sampel yang tidak diketahui konsentrasinya selanjutnya diukur absorbansinya dengan instrumen pada kondisi yang sama. Absorbansi yang diperoleh kemudian dimasukkan ke dalam persamaan garis linear yang diperoleh untuk mendapatkan konsentrasi sampel yang ditentukan. Kurva standar pengukuran absorbansi larutan standar logam Pb pada berbagai konsentrasi diperlihatkan pada lampiran 1.

Kurva standar seperti pada lampiran 1 memperlihatkan bahwa absorbansi yang diukur merupakan fungsi dari konsentrasi larutan standar. Absorbansi larutan standar akan meningkat dengan meningkatnya konsentrasi atau dapat dikatakan bahwa adanya hubungan yang linier antara konsentrasi dengan serapan (absorbansi). Hal ini didukung dengan koefisien korelasi

pengukuran yang mendekati 1 yakni sebesar 0,9917. Persamaan garis linear yang diperoleh pada pengukuran ini adalah $y = 0,0184x - 0,0031$ dengan y adalah absorbans dan x adalah konsentrasi (ppm).


Berdasarkan kurva standar yang diperoleh selanjutnya diukur absorbansi larutan sampel. Kandungan rata-rata logam Pb dalam sampel kerang kepah pada berbagai variasi lamanya waktu perendaman dalam larutan asam jawa dan tanpa perendaman disajikan dalam Tabel 4.1. Konsentrasi yang dicantumkan merupakan konsentrasi rata-rata penelitian yang dilakukan dua kali pengulangan.

Tabel 4.1. Konsentrasi logam berat timbal (Pb) pada kerang kepah yang direndam larutan asam jawa

Waktu perendaman	Konsentrasi Pb (mg/kg)	Konsentarsi Pb yang dapat di reduksi (mg/kg)	Penurunan konsentrasi Pb (%)
0 menit	4,782	-	-
30 menit	3,314	1,468	30,69
60 menit	2,825	1,957	40,92
90 menit	2,391	2,391	50

Data pada Tabel 4.1. di atas memberikan gambaran bahwa konsentrasi logam Pb dalam kerang kepah tanpa perendaman (kontrol) lebih tinggi dibandingkan dengan yang direndam dalam larutan asam jawa. Konsentrasi Pb dalam daging kerang kepah tanpa perendaman adalah sebesar

4,782 mg/kg sedangkan konsentrasi Pb dalam daging kerang buluh yang direndam selama 30, 60 dan 90 menit yaitu 3,314 mg/kg; 2,825 mg/kg dan 2,391 mg/kg. Penurunan konsentrasi logam Pb dengan lamanya waktu perendaman seperti yang ditampilkan pada Tabel 1 di atas, disajikan dalam Gambar 4.1.



Gambar 4.1. Konsentrasi logam berat timbal (Pb) pada kerang kepah yang direndam larutan asam jawa.


standar yang diperoleh selanjutnya diukur absorbansi larutan sampel. Kandungan rata-rata logam Pb dalam sampel kerang kepah pada berbagai variasi lamanya waktu perendaman dalam larutan belimbing wuluh dan tanpa perendaman disajikan dalam Tabel 4.2.

Tabel 4. 2. Konsentrasi logam berat timbal (Pb) pada kerang kepah yang direndam larutan belimbing wuluh

Waktu perendaman	Konsentrasi Pb (mg/kg)	Konsentrasi Pb yang dapat di reduksi (mg/kg)	Penurunan konsentrasi Pb (%)
0 menit	4,782	-	-
30 menit	3,858	0,924	19,32
60 menit	1,63	3,152	65,91
90 menit	0,326	4,452	93,18*

Keterangan : * : Memenuhi standar untuk dikonsumsi

Data pada Tabel 4.2 di atas memberikan gambaran bahwa konsentrasi logam Pb dalam kerang kepah tanpa perendaman (kontrol) lebih tinggi dibandingkan dengan yang direndam dalam larutan belimbing wuluh. Konsentrasi Pb dalam daging kerang kepah tanpa perendaman adalah sebesar 4,782 mg/kg sedangkan konsentrasi Pb dalam daging kerang buluh yang direndam selama 30, 60 dan 90 menit yaitu 3,858 mg/kg; 1,63 mg/kg dan 0,326 mg/kg. Penurunan konsentrasi logam Pb dengan lamanya waktu perendaman seperti yang ditampilkan pada Tabel 2 di atas, disajikan dalam Gambar 4.2.



Gambar 4.2. Konsentrasi logam berat timbal (Pb) pada kerang kepah yang di rendam larutan belimbing wuluh

B. Pembahasan

Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), batasan maksimum cemaran logam Pb pada kerang-kerangan adalah sebesar 1,5 mg/kg (Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, 2004). Demikian juga batas kandungan maksimum Pb dalam makanan yang ditetapkan FAO membatasi sebesar 2 ppm (Darmono, 2001).. Hasil penentuan kandungan Pb dengan spektrometer Serapan Atom ternyata logam Pb telah melampaui ambang batas yang diperbolehkan yaitu sebesar 4,782 mg/kg, mengingat Pb merupakan salah satu logam beracun terhadap organisme. Hal ini disebabkan oleh sifat akumulatif logam non esensial seperti Pb dalam jaringan tubuh kerang

karena sifat logam tersebut yang cenderung membentuk ikatan kompleks dengan bahan organik. Tingginya kandungan Pb dalam jaringan tubuh kerang kepah tersebut karena jenis organisme ini tidak dapat mengekskresikan dengan baik logam Pb, sehingga akan terakumulasi terus menerus dalam jaringan tubuh kerang kepah yang hidup di Waduk Estuari Muara Sungai Badung, yang telah terkontaminasi Pb dengan konsentrasi yang cukup tinggi.

Kadar logam berat di dalam badan air akan naik sedikit demi sedikit karena ulah manusia, akibatnya logam itu dapat terserap dan tertimbun dalam jaringan ikan (bioakumulasi) (Palar, 1994). Pencemaran logam berat terhadap lingkungan merupakan suatu proses yang erat hubungannya dengan penggunaan logam tersebut oleh manusia. Dalam suatu proses produksi industri yang memerlukan suhu tinggi, seperti pemurnian minyak, pertambangan batubara, pembangkit tenaga listrik dengan energi minyak, dan pengecoran logam, banyak mengeluarkan limbah pencemar, terutama pada logam-logam yang relatif mudah menguap dan larut dalam air (bentuk ion), seperti timbal (Pb). Selain itu pencemaran juga dapat disebabkan oleh pabrik produksi semen, limbah pabrik peleburan besi baja, dan pengabuan sampah (Darmono, 1995).

Pb dapat masuk ke dalam tubuh kerang melalui rantai makanan, insang, dan difusi permukaan kulit, dan akumulasi Pb dalam tubuh kerang hijau dapat terjadi melalui proses absorpsi air, partikel, dan plankton. Di samping itu tingginya konsentrasi Pb dalam jaringan tubuh kerang tidak terlepas dari tingginya kandungan Pb di dalam air dan endapannya. Selain melalui sungai,

keberadaan logam berat di perairan juga dapat melalui udara, terutama unsur Pb yang digunakan dalam campuran bahan bakar. Meningkatnya laju pembangunan di segala sektor saat ini telah mengakibatkan meningkatnya pencemaran udara melalui emisi kendaraan bermotor. Peranan Pemerintah dan semua pihak sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan menekan laju pencemaran yang terus menerus (Suatini, 2007).


Perendaman daging kerang kepah menggunakan larutan asam jawa dan belimbing wuluh dalam menurunkan kadar logam berat timbal (Pb). Lamanya waktu perendaman menyebabkan semakin berkurangnya konsentrasi logam Pb didalamnya. Persentase penurunan kadar logam Pb dalam daging kerang kepah disajikan pada tabel 4.1 dan 4.2.

Tabel 4.1 memperlihatkan bahwa konsentrasi logam Pb yang dapat direduksi selama perendaman daging kerang kepah dalam larutan asam jawa dengan variasi waktu 30, 60 dan 90 menit masing-masing adalah 1,468 mg/kg; 1,957 mg/kg; dan 2,391 mg/kg. Besarnya penurunan konsentrasi logam Pb yang dapat direduksi tersebut memiliki persentase berturut-turut sebesar 30,69%, 40,92% dan 50% dari konsentrasi awal (kontrol) logam Pb dalam daging kerang kepah.


Tabel 4.2 memperlihatkan bahwa konsentrasi logam Pb yang dapat direduksi selama perendaman daging kerang kepah dalam larutan belimbing wuluh dengan variasi waktu 30, 60 dan 90 menit masing-masing adalah 0,924 mg/kg; 3,152 mg/kg; dan 4,456 mg/kg. Besarnya penurunan konsentrasi logam

Pb yang dapat direduksi tersebut memiliki persentase berturut-turut sebesar 19,32%, 65,92% dan 93,18% dari konsentrasi awal (kontrol) logam Pb dalam daging kerang kepah.

Dari tabel 4.1 dan 4.2 di atas Terlihat adanya kenaikan persentase reduksi logam Pb sejalan dengan lamanya waktu perendaman. Kenaikan persentase disajikan dalam gambar 4.3 dan 4.4.



Gambar 4.3 Penurunan konsentrasi Pb terhadap lama perendaman menggunakan larutan asam jawa.



Gambar 4.4. Penurunan konsentrasi Pb terhadap lama perendaman menggunakan larutan belimbing wuluh.

Persentase penurunan kadar Pb terhadap lama perendaman menggunakan larutan asam jawa dan belimbing wuluh dapat menurunkan batas maksimum konsentrasi logam Pb yang diperbolehkan dalam bahan pangan yang berasal dari laut. Persentase penurunan paling tinggi yaitu pada perendaman larutan asam jawa dalam waktu 90 menit yaitu 50% sedangkan perendaman larutan belimbing wuluh dalam waktu 90 menit yaitu 93,18%. Perendaman kerang kepah menggunakan larutan belimbing wuluh lebih efektif dari pada perendaman menggunakan larutan asam jawa. Hal ini disebabkan karna kandungan asam sitrat dalam belimbing wuluh lebih tinggi dari pada kandungan asam sitrat dalam asam jawa. asam sitrat juga dapat berfungsi sebagai senyawa kimia pengikat logam dalam bentuk ikatan kompleks. Sifat tersebut dapat

meminimalkan pengaruh buruk logam dalam bahan pangan. Dengan demikian senyawa ini dapat membantu mengurangi kadar logam berat seperti timbal pada kerang. Asam Sitrat dapat mengikat logam timbal melalui pasangan elektron bebas yang dimiliki dari tiga gugus karboksilat (-COOH) dan dari gugus hidroksil yang terikat pada atom karbon. Asam sitrat adalah salah satu zat sekuestran (zat pengikat logam). Asam sitrat memiliki rumus kimia $\text{CH}_2\text{COOH}-\text{COHCOOH}-\text{CH}_2\text{COOH}$ ($\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_7$). Gugus fungsional -OH dan COOH pada asam sitrat menyebabkan ion sitrat dapat bereaksi dengan ion logam membentuk garam sitrat.

Menurut Rusli (2010), ion sitrat akan mengikat logam sehingga dapat menghilangkan ion logam yang terakumulasi pada kerang sebagai kompleks sitrat. Semakin tinggi konsentrasi suatu larutan, semakin cepat larutan tersebut untuk bereaksi dengan senyawa lain. Begitu juga dengan lama perendaman. Semakin lama waktu suatu zat berinteraksi dengan senyawa lain, maka semakin cepat reaksi antara asam sitrat dengan logam. Hal ini sejalan dengan penelitian Buwono (2005) yang menyatakan bahwa waktu perendaman dengan larutan asam berpengaruh nyata terhadap penurunan logam pada kerang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsentrasi perendaman kerang kepah menggunakan larutan asam jawa selama waktu 30, 60 dan 90 menit berturut-turut adalah 3,314 mg/kg; 2,825 mg/kg; dan 2,391 mg/kg; sedangkan konsentrasi perendaman menggunakan larutan belimbing wuluh selama waktu 30, 60 dan 90 menit berturut-turut adalah 3,858 mg/kg; 1,63 mg/kg; dan 0,326 mg/kg.
2. Waktu perendaman larutan asam jawa dan belimbing wuluh efektif menurunkan kadar logam berat timbal (Pb) pada kerang kepah, pada menit ke 30, 60 dan 90, masing-masing asam jawa 30,69 %; 40,92%; dan 50%; serta belimbing wuluh 19,32%; 65,91% dn 93,18%.

B. Implikasi Penelitian (Saran)

1. Waktu perendaman perlu ditambah untuk mendapatkan hasil yang lebih baik
2. Takaran asam jawa dan belimbing wuluh yang efektif menurunkan kadar logam berat timbal (Pb).
3. Perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui perbedaan nilai gizi protein pada kerang kepah yang tidak direndam dan yang telah direndam dengan larutan asam jawa dan belimbing wuluh.

4. Implikasi penelitian ini yaitu perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penggunaan larutan asam jawa dan belimbing wuluh sebagai alternatif bahan tambahan makanan dalam menurunkan kandungan logam timbal (Pb) pada proses pengolahan kerang secara mudah dan sederhana



DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Rachmat dkk. *Sebaran Densitas Sumberdaya Kerang Kepah (Polymeosda erosa) Di Perairan Pemangkat Kabupaten Sambas Kalimantan Barat*. Fakultas Pendidikan Ilmu Keguruan UNDIP Semarang (April 2011).
- Akbar, A. W dkk. *Analisis Risiko Lingkungan Logam Berat Cadmium (Cd) Pada Sedimen Air Laut Di Wilayah Pesisir Kota Makassar*. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin (April 2014). <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/10579/ABDUL%20WAHID%20AKBAR%20K11110282.pdf?sequence=1> (Diakses pada 4 desember 2015).
- Alpatih, AM dkk. *Pengaruh Konsentrasi Larutan Asam Jeruk Nipis Dan Lama Perendaman Terhadap Penurunan Kadar Logam Berat Timbal (Pb) Dalam Daging Kerang Hijau (Perna viridis)*. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Semarang (Desember, 2009). [http://digilib.ump.ac.id/files/disk1/12/jhptump-a-wirantisri-597-18.ident-m.pdf](http://digilib ump.ac.id/files/disk1/12/jhptump-a-wirantisri-597-18.ident-m.pdf) (Diakses pada 5 Mei 2015).
- Amri A, Supranto, Fahrurrozi M. *Keseimbangan Adsorpsi Optional Campuran Biner Cd (II), Cr (III) dengan Zeolit Alam Terimpregnasi 2-Merkaptobenzotiazol*. Jurnal Natur Indonesia 6(2). (2004).
- Apriadi, Dandy. "Kandungan Logam Berat Hg, Pb Dan Cr Pada Air, Sedimen Dan Kerang Hijau (*Perna viridis* L) Di Perairan Kamal Muara, Teluk Jakarta" *Skripsi*. Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor, 2005.
- Arisandi, Yohana. *Khasiat Tanaman Obat*. Jakarta: Purtaka Buku Murah, 2008.
- Asikin, *Kerang Hijau*. Jakarta: PT. Penebar Swadaya, 1982.
- Badan Pusat statistik. *Distribusi Frekuensi Makan Responden Berdasarkan Jenis Bahan Makanan Sumber Zat Besi Heme*. Makassar: BPS, 2013.
- Buwono, ID. *Upaya Penurunan Kandungan Logam Hg (Merkuri) dan Pb (Timbal) pada kerang hijau (Mytilus viridis) dengan Konsentrasi dan Waktu Perendaman Na₂CaEDTA yang Berbeda*. Jurnal Bionatura Vol 7 No 3, 2005.
- Christina P, Maria. *Instrumentasi Kimia I*. Yogyakarta: STTN-BATAN, 2006.

- Darmono. *Logam Dalam Sistem Biologi Mahluk Hidup*. Jakarta: Universita Indonesia (UI-Press), 1995.
- Darmono. *Linkungan Hidup Dan Pencemaran Hubungannya Dengan Toksikologi Senyawa Logam*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2010.
- Darussalam. “Preferensi Pakan Kerang Totok (*Polymedosa erosa*) Di Laguna Segara Anakan Cilacap” *Skripsi* Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, 2012.
- Fardiaz, S. *Polusi Air dan Udara*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Ferianita, Fachrul. “Metode ekologi untuk Penentuan Pencemaran Perairan” *Skripsi*. Fakultas Arsitektur Lansekap dan Teknologi Lingkungan Universitas Trisakti Jakarta, 2009.
- Glew, dkk. *Nutrient Content Of Four Edible Wild Plants From West Africa*. 2005.
- Gembong, Tjitroesoepomo. *Morfologi Tumbuhan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1989.
- Hattu, Nikmans dkk. *Pengaruh Lamanya Perendaman Kernag Buluh (*Anadara antiquata*) Dalam Ekstrak Belimbing Wuluh (*Avverhoa bilimbi*) Terhadap Kandungan Logam Timbal (Pb)*. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pattimura (Agustus, 2014).
- Hayati, Etik Isman. “Pemanfaatan Serbuk Biji Asam Jawa (*Tamarindus indica* L) Untuk Pengolahan Limbah Cair Industri Tempe” *Skripsi*. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang, 2015.
- Hembing, Wijaya. *Ramuan Tradisional Untuk Pengobatan Darah Tinggi*. Jakarta: Penebar Swadaya, 2006.
- Hikmawati, Farida. “Kualitas Dan Daya Simpan Kerang Hijau (*Perna viridis*) Menggunakan Variasi Jenis Pengawet Alami Dan Lama Perendaman” *Skripsi*. Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.
- Irda. “Analisis Kadar Logam Berat Timbal (Pb) Pada Bivalvia Yang Terdapat Di Daerah Pesisir Kecamatan Ujung Tanah Makassar” *Skripsi*. Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. *Statistik Perikanan Tangkap Indonesia 2012*. Jakarta: Direktorat Jendral Perikanan Tangkap, 2013.

- Marlianis."Pengaruh Konsentrasi dan Waktu Pencampuran Belimbing Wuluh (*Avverhoa bilimbi* L) terhadap Penurunan Kadar Logam Timbal (Pb) yang Terdapat dalam Limbah Simulasi". UIN SUSKA RIAU 2013
- Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup. *Tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan*. Jakarta, 2004.
- Mess J, Conacher H. *Assessment of Human Exposure t Chemical Contaminants in Food Addict*. 1993.
- Muhajir Abdul. "Studi Kandungan Logam Berat Kadmium (Cd) Pada Kerang Darah (*Anadara granosa*) Dari Beberapa Pasar Kota Malang". *Skripsi*. Malang: Fakultas Sains Dan Teknologi UIN Maulana Malik Ibrahim, 2009.
- Murtini, Jovita Tri dan Rosmawaty Peranginangin. *Kandungan Logam Berat Pada Kerang Kepah (Meritrix meritrix) Dan Air Laut Di Perairan Banjarmasin*. Balai Besar Riset Pengolahan Produk Dan Bioteknologi Kelautan Dan Perikanan (2006).
- Nisma, Fatimah dkk. *Efektifitas Air Perasan Buah Jeruk Nipis (Citrus aurantifolia Cristm. & Panzer Swingle) Terhadap Penurunan Kadar Logam Timbal (Pb), Cadmium (Cd), Dan Tembaga (Cu) Pada Daging Kerang Hijau (Perna viridis L.)* FarmaSains Vol 1 No. 5 (Aprl 2012). [http://farmasains.uhamka.ac.id/wp-content/u/Fatimah Nisma-farmasains.uhamka.ac_.id-volume-1-no-5.pdf](http://farmasains.uhamka.ac.id/wp-content/u/Fatimah_Nisma-farmasains.uhamka.ac_.id-volume-1-no-5.pdf) (Diakses Pada 1 juli 2015).
- Nur, F dan Karneli. *Kandungan Logam Berat Timbal (Pb) Pada Kerang Kima Sisik (Tridacna squamosa) di Sekitar Pelabuhan Feri Bira*. UIN Alauddin Makassar (Januari 2015). <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/psb/article/download/491/468> (Diakses pada 23 Oktober 2015).
- Nontji. *Laut Nusantara*. Jakarta: Djambatan, 1993.
- Odum, E. P. *Fundamental of Ecology*. W. B. Saunder Com. Philadelphia 125 pp, 1971.
- Pandey S, dkk. Effects of Exposure to Multiple Trace Metals on Biochemical, Histological and Ultrastructural Features of Gills of A Freshwater Fish *Channa Puncate* Bloch. *Chem Biol*, 2008.
- Palar, H. *Pencemaran dan Toksikologi Logam Berat*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Puspodewi, Dini. DKK. "Daya Hambat Gaun Asam Jawa (*Tamarindus indica*) Terhadap Pertumbuhan *Salmonella typhi* Penyebab Demam Tifoid". Universitas Muhammadiyah Semarang 2015.


- Porsepwandi, W. "Pengaruh pH Larutan Perendaman Terhadap Penurunan Kandungan Hg dan Mutu Kerang Hijau (*Mytilus viridis*)" *Skripsi*. Fakultas Perikanan Institut Pertanian Bogor, 1998.
- Prasetyo, AD. "Penentuan Kandungan Logam (Hg, Pb dan Cd) Dengan Penambahan Bahan Pengawet Dan Waktu Perendaman Yang Berbeda Pada Kerang Hijau (*Perna viridis L.*) Di Perairan Muara Kamal, Teluk Jakarta" *Skripsi*. Fakultas Sains Dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah, 2009.
- Rahayu, Asih. "Distribusi Logam Berat Pada Kerang Hijau (*Perna viridis*) Dari Perairan Kamal Muara, Tangerang-Jakarta". *Skripsi*. Bogor: Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor, 2014.
- Rizal, Samsul dan Jailani. *Analisis Kelimpahan Plankton Dan Pertumbuhan Kerang Kepah Yang Dipelihara Pada Tambak Delta Mahakam*. Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman (2013).
- Sari, Ni Ketut. "*Analisa Instrumen*". Surabaya: Yayasan Humaniora, 2010.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- Standar Nasional Indonesia. *Batas Maksimum Cemaran Logam Berat Dalam Pangan*. (SNI 7387 – 2009).
- Suatini, Ni Made. *Pengaruh EDTA Dalam Penentuan Kadar Timbal dan Tembaga Pada Kerang Hijau (*Mytilus viridis*)*. FMIPA UNUD (2007).
- Supirman, dkk. *Pengaruh Perbedaan pH Perendaman Asam Jeruk Nipis (*Citrus aurifolia*) dengan Pengeringan Sinar Matahari Terhadap Kualitas Kimia Teh Alga Coklat (*Sargassum fillipendula*)*. Universitas Brawijaya 1. No. 1. (Mei 2013) <http://thpi.studentjournal.ub.ac.id/index.php/thpi/article/view/6/6> (Diakses 1 November 2015).
- Supriharyono, *Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2000.
- Susilo. *Pemanfaatan Ekstrak Dauh Belimbing Wuluh (*Avverhoa bilimbi*) Bahan Pengawet Ikan Bandeng Segar (*Chanos chanos*)*. *Skripsi*. Surakarta: Fakultas Biologi. Universitas Surakarta. 2012.
- Vogel. *Analisis Anorganik Kualitatif Makro dan Semimakro Edisi Kelima*. Jakarta: PT. Kalman Media Pusaka, 1990.

Yonvitner dan Sutrisno S. *Laju Pertumbuhan Dan Penempelan Kerang Hijau (Perna viridis, Linn, 1789)*. IPB (2003). <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/JBE/article/download/413/583> (Diakses pada 1 November 2015).



Lampiran 1

Kurva standar logam Pb



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 2

Pengambilan sampel



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 3

Preparasi sampel kerang kepah





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 4

Perendaman sampel






Lampiran 5

Pengukuran kadar logam berat timbal (Pb)





Lampiran 6

SNI

Standar Nasional Indonesia

SNI 7387:2009



**Batas maksimum cemaran logam berat
dalam pangan**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ICS 67.220.20

Badan Standardisasi Nasional



"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional. Copy standar ini dibuat untuk penayangan di website dan tidak untuk dikomersialkan"

	<ul style="list-style-type: none"> Thailand (1986) : 250 mg/kg – all food Hongkong (2005) : 230 mg/kg – all food in solid form
Daging dan hasil olahannya (dalam kemasan kaleng)	<ul style="list-style-type: none"> CAC (2003) 200,0 mg/kg EC 242/2004 : 200 mg/kg – canned foods other than beverages Canada (2005) 250 mg/kg – canned foods Thailand (1986) : 250 mg/kg – all food Hongkong (2005) : 230 mg/kg – all food in solid form
Minuman dalam kemasan kaleng	<ul style="list-style-type: none"> CAC 2007 (step 8) Canned beverages 150 mg/kg Indonesia (SK Dirjen POM 1989) dan Malaysia (1999) 40 mg/kg. Canada (2005) 250 mg/kg – canned foods Jepang (2004) – 150 mg/kg EC 242/2004 : 100 mg/kg – canned beverages, including fruit juices and vegetable juices Thailand (1986) : 250 mg/kg – all food Hongkong (2005) : 230 mg/kg – all food in liquid form
Makanan lain yang diolah dengan proses panas dan dikemas dalam kaleng	250 mg/kg (CAC 2006)

A.4.5 Cara uji

Cara uji timah sesuai SNI 01-2896-1998.

A5 Timbal (Lead)

A.5.1 Deskripsi

Timbal (Pb) memiliki nomor atom 82; bobot atom 207,21; Valensi 2-4. Timbal merupakan logam yang sangat beracun terutama terhadap anak-anak. Secara alami ditemukan pada tanah. Timbal tidak berbau dan tidak berasa. Timbal dapat bereaksi dengan senyawa-senyawa lain membentuk berbagai senyawa-senyawa timbal, baik senyawa-senyawa organik seperti timbal oksida (PbO), timbal klorida (PbCl₂) dan lain-lain. Sumber-sumber timbal antara lain cat usang, debu, udara, air, makanan, tanah yang terkontaminasi dan bahan bakar bertimbal. Penggunaan senyawa-senyawa timbal antara lain pembuatan gelas, penstabil pada senyawa-senyawa PVC, cat berbasis minyak, zat pengoksidasi, bahan bakar.

A.5.2 Toksisitas

LD₅₀ :

- Tikus 100-825 mg/kg (oral, timbal arsenat)
- Tikus 109 mg/kg (oral, tetrametil timbal)
- Kelinci 125 mg/kg (oral, timbal arsenat)
- Ayam 450 mg/kg (oral, timbal arsenat)

LD :

- Tikus 11000 mg/kg (oral, timbal asetat)
- Anjing 2000-3000 mg/kg (oral, timbal sulfat)

LDLo : Manusia perkiraan 1,70 mg/kg (trietil timbal)

PTWI : 0,025 mg/kg bb

A.5.3 Kajian Keamanan

	<ul style="list-style-type: none"> • Acar sayuran : SK Dirjen POM 1989 10,0 mg/kg • Selai dan sejenisnya : SK Dirjen POM 1989 1,5 mg/kg • Buah tropis dan subtropis : CAC (2003) 0,1 mg/kg, Singapura (2005) 1 mg/kg, Eropa (2006) 0,1 mg/kg • Buah kecil dan berries : CAC (2003) 0,2 mg/kg, Eropa 0,2 mg/kg, Jerman 0,5 mg/kg, Singapura (2005) 1 mg/kg • Buah dan sayur beku kecuali konsentrat tomat yang diawetkan : CAC (2000) 1,0 mg/kg • Tomat dan hasil olahannya (konsentrat tomat yang diawetkan) : Indonesia (SK Dirjen POM 1989) 1,0 mg/kg, Malaysia (1999) : 2,0 mg/kg, CAC (2000) 1,5 mg/kg, Canada (2005) 1,5 mg/kg-tomato paste & tomato sauce; 0,5 mg/kg – whole tomatoes, Singapura (2005) 2 mg/kg • Konsentrat tomat CAC (2000) 1,5 mg/kg • Sayuran buah selain tomat : CAC (2003) 0,1 mg/kg, Singapura (2005) 1 mg/kg, Eropa (2006) 0,1 mg/kg • Kubis dan sayuran daun : CAC (2003) 0,3 mg/kg, FSANZ, Eropa 0,3 mg/kg, Jerman 0,8 mg/kg, Singapura (2005) 1 mg/kg • Sayur dan buah dalam kaleng : Singapura (2005) 1 mg/kg • Buah dan hasil olahannya yang tidak tertera diatas : Indonesia (SK Dirjen POM 1989) 2,0 mg/kg • Sayur dan hasil olahannya yang tidak tertera diatas : Indonesia (SK Dirjen POM 1989) 2,0 mg/kg
Kembang gula/permen dan cokelat	Indonesia (SK Dirjen POM 1989) 2,0 mg/kg dihitung terhadap bahan yang sudah dikeringkan dan bebas lemak
Sereal dan produk sereal	Simulasi perhitungan : PTWI : $0,025 \text{ mg/kg} \times 60 \text{ kg} = 1,5 \text{ mg/minggu} = 0,21 \text{ mg/hari}$. Asumsi konsumsi sereal 0,2 kg/hari. Bila BM 0,3 mg/kg, maka paparan perhari : $0,3 \times 0,2 / 0,21 \times 100\% = 28,6\%$.
Produk bakeri	Indonesia (SK Dirjen POM 1989) tepung dan hasil olahannya 1,0 mg/kg
Daging dan hasil olahannya	<ul style="list-style-type: none"> • Indonesia (SK Dirjen POM 1989), Malaysia (1999) 2,0 mg/kg. • CAC (2003) 0,1 mg/kg • FSANZ, Eropa 0,1 mg/kg.
jeroan sapi, babi, kambing, unggas	<ul style="list-style-type: none"> • CAC (2003) 0,5 mg/kg. • FSANZ, Eropa : 0,5 mg/kg.
Ikan dan hasil olahannya	<ul style="list-style-type: none"> • Indonesia (SK Dirjen POM 1989), Malaysia (1999) 2,0 mg/kg. • FSANZ, 0,2 mg/kg. • CAC – step 8 (April 2006) 0,3 mg/kg • Eropa 2006 : 0,3 mg/kg • Singapura (2005) 2 mg/kg
Ikan predator misalnya cucut, tuna, marlin dan lain-lain	<ul style="list-style-type: none"> • EC 78/2005 : 0,4 mg/kg • Singapura (2005) 2 mg/kg
Kekerangan (bivalve) Moluska dan teripang	<ul style="list-style-type: none"> • Eropa (2006) 1,5 mg/kg bivalve mollusk, 1,0 mg/kg cephalopods. • Singapura (2005) 2 mg/kg
Udang dan krustasea lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • FSANZ 2,0 mg/kg • Eropa 0,5 mg/kg. • EC 78/2005 : 0,5 mg/kg • Singapura (2005) 2 mg/kg
Madu	Indonesia (SK Dirjen POM 1989) 10,0 mg/kg.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap A. Mirnayanti, Lahir di Desa Tungke Kecamatan Bengo Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan pada Tanggal 17 Desember 1995, merupakan anak ke pertama dari dua bersaudara. Penulis lahir dari buah cinta pasangan Andi Muhali dan Hj. Bungatang Penulis bersal dari kabupaten Bone dan sekarang bertempat tinggal di jalan Tamangapa Raya 5 Kabupaten Makassar.

Penulis menyelesaikan pendidikan formal di SDN I Tungke dan lulus pada tahun 2006, lalu melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama di SMP 1 Lappariaja dan lulus pada tahun 2009, selanjutnya penulis kembali melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di MAN 3 Bone dan lulus pada tahun 2012. Kemudian penulis melanjutkan study di UIN Alauddin Makassar untuk program Strata I Jurusan Biologi Sains Di Fakultas Sains Dan Tekhnologi Pada Tahun 2012. Selama menjalani sebagai mahasiswa penulis pernah menjadi asisten laboratorium biologi sains (Praktikum Botani Dasar). Penulis juga pernah PKL di Balai Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Makassar pada tahun 2015.

Penulis berharap dengan adanya skripsi ini dapat menambah refensi bagi pembaca untuk mengetahui Efektivitas Waktu Perendaman Larutan Asam Jawa Dan

Belimbing Wuluh Dalam Menurunkan Kadar Logam Berat Timbal (pb) Pada Kerang

Kepah (*Polymedosa erosa*)

