

**PENGARUH KONSUMSI MENTIMUN TERHADAP PENURUNAN  
TEKANAN DARAH PADA LANSIA DI PANTI SOSIAL TRESNA  
WERDHA GAU MABAJI KABUPATEN GOWA**



**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Keperawatan pada Fakultas Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

**Oleh:**

**NURLIN LAKAI**  
**NIM : 70300110078**


**PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN  
FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**2014**





## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nyayang tak terhingga sehingga penulis masih diberi nikmat iman, kesehatan, kesempatan dan kemampuan untuk menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengaruh Konsumsi Mentimun Terhadap Penurunan Tekanan Darah Pada Lansia Di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa”**. Dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditargetkan. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, sebagai *sang Rahmatan Lill Alamin* dan para sahabat, yang telah berjuang untuk menyempurnakan akhlak manusia diatas muka bumi ini.

Penelitian dan penulisan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar sarjana keperawatan (S.Kep) pada jurusan Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis merasa telah banyak dibantu oleh berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati penulis menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tuasaya yang tercinta,

**Bapak Lakai Lajawaradan Ibu Walua**, atas sentuhan cintanya, kasih sayang Do'a, bimbingan, semangat dan bantuan moril maupun materilnya. Kakak-Kakakku yang tercinta **Sahima, Ramdan, Napsia, Rikwan** terima kasih atas Do'a, bimbingan, semangat dan bantuan materilnya, terima kasih telah menjadi Inspirasi dalam hidupku dan kepada Adikku yang Tercinta **Nurlisa** terima kasih telah hadir memberi warna dalam hidupku. Dan segenap keluarga besar yang telah memberikan Doa, kasih sayang, arahan dan nasehatny dalam menghadapi tantangan dan rintangan selama melakukan penyelesaian studi.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada **Bapak Mahyudin, S.Kep, Ns, M.Kes** selaku pembimbing I dan **Ibu Rochfika, S.Kep, Ns, M.Kes, Sp.kv** selaku pembimbing II, yang dengan ikhlas dan sabarmeluangkan waktu kepada penulis dalam rangka memperbaiki penulisan baik dalam bentuk arahan, bimbingan dan pemberian informasi yang lebih aktual demi tercapainya harapan penulis. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada **Bapak Muh. Anwar Hafid, S.Kep, Ns, M.Kes** selaku pengujian dan **Bapak Prof. Dr. Abdul Rahim Yunus, M.A** selaku pengujian II atas saran, kritik, arahan dan bimbingan yang diberikan sehingga menghasilkan karya yang dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat.

Penulis juga menyadari sepenuhnya selama mengikuti perkuliahan di UIN Alauddin Makassar sampai penyelesaian skripsi ini, oleh sebab itu penulis merasa patut menghaturkan banyak ter

imakashidandanpenghargaan yang setinggi-tingginyakepadasemuapihak yang berjasa, khususnya kepada :

1. Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing, HT MS selaku rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc. selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Dr. Nur Hidayah S.Kep, Ns, M.Kes selaku ketua jurusan program studi SI Keperawatan UIN Alauddin Makassar.
4. dr. Asriani S.Kes selaku penasehat akademik (PA) yang telah membimbing penulis selama mengikuti pendidikan di jurusan Keperawatan UIN Alauddin Makassar.
5. Seluruh dosen di lingkungan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan ilmunya dengan ikhlas kepada penulis.
6. Kepada sepupu tercinta, Nurcahyadan Hartiningsih, terima kasih telah meminjamkan laptopnya dengan ikhlas kepada penulis
7. Kepada sahabat-sahabatku kastina, Nurul Fuadi Riadhy, Nudaningsih, Ratnawati, yang telah banyak memberikan masukan dan bantuan atas penyelesaian skripsi ini.
8. Teman-teman ANGIPOATI, khususnya keperawatan B yang telah memberikan semangat dan menjadi sahabat buat penulis.
9. Serta semua pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu per satu.

Tidak adasuatuberwujud yang penulis berikan,  
kecualidalambentukharapan, doadanmenyerahkansegalanyahanyakepada Allah  
SWT. Semogasegalaamalkebaikanyasertaniat yang  
ikhlasuntukmembantuakanmendapatkanbalasan yang setimpaldari-Nya.

Penulis menyadari tidak ada karya manusia yang sempurna di dunia  
ini.oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan  
masukan, baik berupa saran dan kritik yang sifatnya membangaun demi  
penyempurnaan penulisan skripsi ini  
selanjutnya.SemogaSkripsiini dapatbermanfaatbagikitasemua. *Amin*  
*YaaRabbalA'lamin*

Makassar, Agustus 2014

NurlinLakai

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Hipotesis .....	6
D. DefenisiOperasional .....	6
E. TujuanPenelitian .....	7
F. ManfaatPenelitian .....	8



## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Tentang Hipertensi .....	9
B. Hipertensi Pada Lansia .....	39
C. Tinjauan Umum Tentang Mentimun .....	41
D. Tinjauan Umum Tentang Lansia .....	51
E. Kerangka Konseptual .....	63

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	65
B. Populasi Dan Sampel .....	66
C. Teknik Pengambilan Sampel.....	67
D. Metode Pengumpulan Data .....	68
E. Pengelolaan Dan Analisa Data .....	70
F. Jadwal Penelitian.....	72
G. Etika Penelitian .....	72

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	74
B. Hasil Penelitian	74
C. Pembahasan .....	80
D. Keterbatasan Penelitian .....	86
E. Rekomendasi .....	87
F. Profil Penurunan Tekanan Darah .....	88

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	90
B. Saran .....	90

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	75
Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Usia .....	75
Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat Hipertensi .....	76
Tabel 4.4 Distribusi Perubahan Tekanan Darah HI Post Perlakuan .....	77
Tabel 4.5 Distribusi Perubahan Tekanan Darah H5 Post Perlakuan.....	77
Tabel 4.6 Pengaruh Pemberian Jus Mentimun Terhadap Perubahan Tekanan Darah.....	78
Tabel 4.7 Perbedaan Perubahan Tekanan Darah Antara Kelompok Perlakuan Dengan Kelompok Kontrol .....	79

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Proses TerjadinyaHipertensi .....	21
--	----

## **ABSTRAK**

**Nama : NurlinLakai**

**Nim : 70300110078**

**Judul : PengaruhKonsumsiMentimunTerhadapPenurunanTekanan  
DarahPadaLansia Di PnatiSosialTresnaWerdha (PSTW) Gau  
MabajiKabupatenGowa**

---

Hipertensipadalansiamerupakansuatupenyakit yang  
perlumendapatkanperhatiahkhusus, karenahipertensidapatmenyebabkanpenyakit yang  
lebihseriusseperti stroke dangagalginjal. Jus

mentimun merupakan salah satu bentuk terapan nonfarmakologis untuk menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari konsumsi mentimun terhadap penurunan tekanan darah pada lansia yang menderita hipertensi.

Penelitian ini menggunakan desain *Quasiexperiment design* dengan pendekatan *pretest and posttest with control group*. Penelitian ini dilaksanakan selama dua minggu, dari tanggal 3-14 juni 2014 dengan jumlah sampel sebanyak 10 orang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  $p \text{ value} = 0,083$  atau  $p \text{ value} > 0,05$  sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa secara statistik tidak ada pengaruh dari konsumsi mentimun terhadap penurunan tekanan darah pada lansia di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Gau Mabaji Kabupaten Gowa.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah secara statistik tidak ada pengaruh konsumsi mentimun terhadap penurunan tekanan darah pada lansia di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Gau Mabaji Kabupaten Gowa

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**

## LEMBAR OBSERVASI

### PENGARUH KONSUMSI MENTIMUN TERHADAP PENURUNAN TEKANAN DARAH PADA LANSIA

#### DI PSTW GAU MABAJI KAB. GOWA

Hari / Tanggal : 8-12 Juni 2014

Tempat : PSTW GauMabajiGowa

Kelompok :Perlakuan

No	Nama Responden (inisial)	TD Pre	Tekanan Darah Post Perlakuan (mmHg)				
			H1	H2	H3	H4	H5
1	Mn	165/100	170/100	160/95	155/95	155/95	150/90
2	D'ng	160/100	160/95	155/95	155/95	150/95	145/90
3	Amr	160/100	160/110	155/100	155/105	150/100	145/95
4	Nb	155/95	160/100	150/95	155/95	150/90	140/90
5	D'nl	170/110	170/110	165/105	165/105	160/100	160/100

## LEMBAR OBSERVASI

### PENGARUH KONSUMSI MENTIMUN TERHADAP PENURUNAN TEKANAN DARAH PADA LANSIA

#### DI PSTW GAU MABAJI KAB. GOWA

Hari / Tanggal : 8-12 Juni 2014

Tempat : PSTW GauMabajiGowa

Kelompok :Kontrol

No	Nama Responden (inisial)	TD Pre	Tekanan Darah Post Perlakuan (mmHg)				
			H1	H2	H3	H4	H5
1	Ma	160/100	160/100	160/100	160/100	160/100	160/100
2	Ta	165/100	170/110	160/100	165/100	165/100	165/100
3	Li	155/95	160/95	155/100	155/100	160/105	160/100
4	Pj	155/95	160/100	160/95	160/100	170/105	170/105
5	To	160/100	160/160	160/100	155/100	160/100	160/100



## ABSTRAK

**Nama : NurlinLakai**

**Nim : 70300110078**

**Judul : PengaruhKonsumsiMentimunTerhadapPenurunanTekanan  
DarahPadaLansia Di PnatiSosialTresnaWerdha (PSTW) Gau  
MabajiKabupatenGowa**

---

Hipertensipadalansiamerupakansuatupenyakit yang perlumendapatkanperhatiankhusus, karenahipertensidapatmenyebabkanpenyakit yang lebihseriusseperti stroke dangagalginjal.Jus mentimunmerupakansalahsatubentukterapinonfarmkologisuntukmenurunkantekanand arahpadapenderitahipertensi.Penelitianinibertujuanuntukmengetahuiapakahadapengar uhdarikonsumsimentimunterhadappenurunantekanandarahpadalansia yang menderitahipertensi.

Penelitianinimenggunakandesain*Quasiexperiment design* denganpendekatan*pretest and posttest with control group*. Penelitianinidilaksanakanselamaduaminggu, daritanggal 3-14 juni 2014 denganjumlahsampelsebanyak 10 rang.

Hasilpenelitianinimenunjukkanbahwa  $p \text{ value} = 0,083$  atau  $p \text{ value} = > 0,05$  sehinggadapatditarikkesimpulanbahwasecarastatistiktidakadapengaruhdarikonsumsim entimunterhadappenurunantekanandarahpadalansia di PantiSosialTresnaWerdha (PSTW) GauMabajiKabupatenGowa.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah secara statistik tidak ada pengaruh dari konsumsi mentimun terhadap penurunan tekanan darah pada lansia di Panti Sosial Tresna Werda Gau Mabaji Kabupaten Gowa.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan kesehatan merupakan upaya memenuhi salah satu hak dasar masyarakat, yaitu hak memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 H Ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan. Pembangunan kesehatan haruslah dipandang sebagai suatu investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang antara lain suatu komponen utama untuk pendidikan dan ekonomi serta kesehatan yang juga memiliki peran dalam penanggulangan kemiskinan (Idcuq Santoso, 2011).

Transisi epidemiologi yang paralel dengan transisi demografi dan transisi teknologi di Indonesia dewasa ini telah mengakibatkan perubahan pola penyakit dari penyakit infeksi ke penyakit tidak menular (PTM) meliputi penyakit degeneratif yang merupakan faktor utama masalah morbiditas dan mortalitas (Setiawan & Zamhir, 2006 dalam Ekowati & Sulistyowati, 2009).

Transisi epidemiologi ini disebabkan terjadinya perubahan sosial ekonomi, lingkungan dan perubahan struktur penduduk, saat masyarakat telah mengadopsi gaya hidup tidak sehat, misalnya merokok, kurang aktivitas fisik,

makanan tinggi lemak dan kalori, serta konsumsi alkohol yang diduga merupakan faktor risiko PTM. Pada abad ke-21 ini diperkirakan terjadi peningkatan insidensi dan prevalensi PTM secara cepat, yang merupakan tantangan utama masalah kesehatan dimasa yang akan datang. WHO memperkirakan, pada tahun 2020 PTM akan menyebabkan 73% kematian dan 60% seluruh kesakitan di dunia. Diperkirakan negara yang paling merasakan dampaknya adalah negara berkembang termasuk Indonesia (Syah B, 2002 dalam Ekowati & Sulistyowati, 2009).

Penyakit hipertensi sudah dialami hampir seluruh dunia. Tidak hanya di Indonesia, namun juga di dunia. Sebanyak 1 milyar orang di dunia atau 1 dari 4 orang dewasa menderita penyakit ini. Diperkirakan jumlah penderita hipertensi di seluruh dunia sekitar 982 juta orang atau 26,4% penghuni bumi mengidap hipertensi dengan perbandingan 26,6% pria dan 26,1% wanita. (WHO, 2012). Jumlah ini diperkirakan akan meningkat menjadi 29,2% atau 1,6 milyar di tahun 2025. Di Amerika hipertensi ditemukan pada satu dari setiap tiga orang. 60% dari penderita serangan jantung, 77% dari penderita stroke, dan 74% dari penderita gagal jantung di Amerika mengidap hipertensi. (AHA, 2010).

Hipertensi merupakan penyebab kematian nomor tiga setelah stroke dan tuberkulosis, dengan PMR (*proportional Mortality Rate*) mencapai 6,70% dari populasi kematian pada semua umur di Indonesia. Kenaikan prevalensi hipertensi sejalan dengan bertambahnya usia terutama pada usia lanjut. Prevalensi hipertensi di

kalangan usia lanjut cuku ptinggi sekitar 40 % dengan kematian 50 % di atas umur 60 tahun.

Data dari hasil Survei Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas 2013) jumlah penderita hipertensi di Indonesia sebesar 1.327.287 atau 26,5% berdasarkan hasil wawancara dan pengukuran langsung pada usia 18 tahun. Berdasarkan data Bidang Bina P2PL Dinkes Kota Makassar tahun 2012. Hipertensi adalah penyebab kedua kematian setelah, asma yaitu sebanyak 574 orang.

Data Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2012 menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Sulawesi Selatan berjumlah 687.972 jiwa dengan jumlah lansia yang berisiko tinggi sebanyak 275.873. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Makassar, jumlah penduduk lansia di kota Makassar pada tahun 2010 berjumlah 65.253 orang dan jumlah lansia di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Gau Mabaji Kabupaten Gowa pada tahun 2014 berjumlah 100 orang dengan persentase 25% lansia adalah penderita hipertensi.

Pada prinsipnya ada dua macam terapi yang bisa dilakukan untuk mengobati penyakit hipertensi, yaitu terapi farmakologi dengan menggunakan obat, dan terapi nonfarmakologi, yaitu dengan modifikasi pola hidup sehari-hari dan kembali ke produk alami (*Back To Nature*). Mengacu pada konsep *back to nature* yaitu dengan mengacu pada bahan lokal yang banyak terdapat di masyarakat. Salah satunya adalah mentimun, yang telah dipercaya oleh masyarakat dapat menurunkan tekanan darah (Lailatul, Bambang, 2007).

Penelitian yang dilakukan oleh Zauhani & Zainal pada tahun 2012, yang bertujuan untuk mengidentifikasi penurunan tekanan darah yang ditimbulkan oleh pemberian jus mentimun. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terbukti secara empiris ada efek dari pemberian jus mentimun terhadap penurunan tekanan darah. (Zauhani & Zainal, 2012).

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Lailatul, Bambang & Kuntoro, bagian Gizi fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga pada tahun 2007, yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemberian jus buah belimbing dan mentimun terhadap penurunan tekanan darah sistolik dan diastolik penderita hipertensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan penurunan tekanan darah diastolik antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. (Lailatul, Bambang & Kuntoro, 2012).

Di kalangan masyarakat umum, mentimun sudah lazim dikonsumsi untuk sekedar melengkapi hidangan maupun dengan maksud khusus untuk menurunkan tekanan darah. Kandungan pada mentimun yang mampu membantu menurunkan tekanan darah (Zuhaini, Zainal, 2012).

Kandungan pada mentimun diantaranya kalium (potassium), magnesium, dan fosfor efektif mengobati hipertensi. Selain itu, mentimun juga bersifat diuretik karena kandungan airnya yang tinggi sehingga membantu menurunkan tekanan darah (Dewi S & Familia.D, 2010). Kalium merupakan elektrolit intraselular yang utama, dalam kenyataan 98 % kalium tubuh berada dalam sel, 2% sisanya berada di luar sel.

Kalium mempengaruhi aktivitas baik otot skelet maupun otot jantung (Brunner & Suddarth, 2001).

Berdasarkan uraian di atas bahwa mentimun merupakan terapi nonfarmakologi herbal yang dapat dilakukan untuk menurunkan tekanan darah, maka peneliti tertarik untuk membuktikan secara langsung, apakah ada pengaruh pemberian jus mentimun terhadap penurunan tekanan darah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu, “ Apakah ada pengaruh konsumsi mentimun terhadap penurunan tekanan darah pada lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa ” ?

## **C. Hipotesis**

Ho : Ada pengaruh pemberian jus mentimun terhadap penurunan tekanan darah pada penderita hipertensi

Ha: Tidak ada pengaruh pemberian jus mentimun terhadap penurunan tekanan darah pada penderita hipertensi.

## **D. Definisi Operasional**

### 1. Tekanan Darah

Definisi Operasional :

Tekanan darah terkontrol adalah kembalinya tekanan darah dalam batas normal tekanan darah pada lansia (Pria : 145/95 mmHg, Wanita : 160/95 mmHg). (Kaplan, 1990)

Kriteria Objektif :

Tekanan Darah terkontrol jika:

Sistolik : 145-160 mm Hg

Diastolik : 90-95 mm Hg

Tekanan darah tidak terkontrol jika:

Sistolik : 161-179 mm Hg

Diastolik : 96-110 mm Hg

## 2. Pemberian Jus Mentimun

Definisi Operasional :

Jus mentimun adalah jus yang terbuat dari 100 gram mentimun yang di campurkan dengan 100 cc air tanpa tambahan bahan apapun dan di blender selama 30 detik. (Zuhaini & Zainal, 2012).

Kriteria Objektif :

Setiap responden kelompok perlakuan diberi jus mentimun satu kali sehari sebanyak 100 ml pada pukul 09:00 selama lima hari berturut-turut.

## E. Tujuan Penelitian

### 1. Tujuan Umum

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari pemberian jus mentimun terhadap penurunan tekanan darah pada lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa.

## **2. Tujuan khusus**

- a. Untuk mengidentifikasi efektifitas pemberian jus mentimun pada penderita hipertensi di PSTW Gau Mabaji Kabupaten Gowa.
- b. Diketahui perubahan tekanan darah sebelum dan setelah pemberian jus mentimun dari hari pertama sampai hari kelima post perlakuan.
- c. Diketahui perbedaan tekanan darah antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol.

## **F. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Bagi Peneliti**

Menambah pengetahuan mengenai manfaat dari mentimun yang dapat berpengaruh terhadap penurunan tekanan darah.

### **2. Manfaat Bagi Institusi Pendidikan**

Hasil penelitian ini dijadikan sebagai sumbangsih peneliti untuk institusi dan bisa dijadikan sebagai bahan masukan untuk kegiatan penelitian sejenis di kemudian hari.

### **3. Manfaat Bagi Profesi Keperawatan**



Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi untuk penelitian selanjutnya dan pengembangan keperawatan di masa mendatang, serta memberikan masukan khususnya bagi ilmu keperawatan medikal bedah tentang pengobatan nonfarmakologis bagi penderita hipertensi.

#### **4. Manfaat Bagi Tempat Penelitian**

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi informasi tambahan bagi seluruh masyarakat PSTW Gau Mabaji Gowa, khususnya petugas pelayanan kesehatan di poli klinik PSTW untuk senantiasa membudidayakan pengobatan herbal bagi lansia yang menderita hipertensi.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Tekanan Darah Tinggi(Hipertensi)**

##### **1. Pengertian Tekanan Darah**

Tekanan darah berarti daya yang dihasilkan oleh darah terhadap setiap satuan luas dinding pembuluh. Bila seseorang mengatakan bahwa tekanan dalam pembuluh adalah 50 mm Hg, hal itu berarti bahwa daya yang dihasilkan cukup untuk mendorong kolom air raksa melawan gravitasi sampai setinggi 50 mm. Bila tekanan darah 100 mm Hg, kolom air raksa akan didorong setinggi 100 milimeter. (Guyton & Hill, 2007).

Tekanan darah adalah tekanan yang ditimbulkan pada dinding arteri. Tekanan ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti curah jantung, ketegangan arteri, volume, laju serta kekentalan (viskositas) darah. tekanan sistolik adalah Tekanan yang terjadi saat ventrikel berkontraksi, sedangkan tekanan diastolik adalah tekanan terendah yang terjadi saat jantung relaksasi. Tekanan darah biasanya digambarkan sebagai rasio tekanan sistolik terhadap tekanan diastolik, dengan nilai dewasa normalnya berkisar 100/60 sampai 140/90. Rata-rata tekanan darah normal biasanya 120/80 mm Hg. (Brunner & Suddart, 2002).

Tekanan darah yang paling rendah terjadi saat tubuh dalam keadaan istirahat atau tidur dan akan naik sewaktu latihan atau berolahraga. Hal ini

disebabkan dalam latihan dan olahraga diperlukan aliran darah dan oksigen yang lebih banyak untuk otot-otot. Jika terdapat hambatan misalnya karena penyempitan pembuluh arteri, tekanan darah akan meningkat. Meningkatnya tekanan darah di dalam arteri bisa terjadi melalui beberapa cara :

- a. Jantung memompa lebih kuat sehingga mengalirkan lebih banyak cairan pada setiap detiknya.
- b. Arteri besar kehilangan kelenturannya dan menjadi kaku, sehingga mereka tidak dapat mengembang pada saat jantung memompa darah melalui arteri tersebut. Karena itu darah pada setiap denyut jantung dipaksa untuk melalui pembuluh yang sempit dan menyebabkan naiknya tekanan. Inilah yang terjadi pada usia lanjut, dimana dinding arterinya telah menebal dan kaku.
- c. Bertambahnya cairan dalam sirkulasi bisa menyebabkan meningkatnya tekanan darah. hal ini terjadi jika terjadi kelainan fungsi ginjal sehingga tidak mampu membuang sejumlah garam dan air dari dalam tubuh. (Sitti Roadhah, 2012).

Tekanan darah dalam kehidupan seseorang bervariasi secara alami. Bayi dan anak-anak secara normal memiliki tekanan darah yang jauh lebih rendah daripada dewasa. Tekanan darah juga dipengaruhi oleh aktivitas fisik, dimana akan lebih tinggi pada saat melakukan aktivitas dan lebih rendah ketika beristirahat. Adapun klasifikasi tekanan darah adalah sebagai berikut (Smeltzer, Suzanne C, 2002):

Klasifikasi tekanan darah pada orang dewasa berusia diatas 18 tahun keatas		
Kategori	Tekanan Darah Sistolik	Tekanan Darah Diastolik
Normal	< 130 mmHg	< 85 mmHg
Normal Tinggi	130-139 mmHg	85-89 mmHg
Hipertensi Stadium 1	140-159 mmHg	90-99 mmHg
Hipertensi Stadium 2	160-179 mmHg	100-109 mmHg
Hipertensi Stadium 3	180-209 mmHg	110 -119 mmHg
Hipertensi Stadium 4	210 mmHg	120 mmHg

## 2. Mekanisme Pemeliharaan Tekanan Darah

Menurut Wajan Juni Udijati (2010) terdapat empat sistem kontrol yang berperan dalam mempertahankan tekanan darah antara lain sistem baroreseptor areteri, pengaturan volume cairan tubuh, sistem renin-angiotensin dan autoregulasi vaskuler.

### a. Baroreseptor Arteri

Baroreseptor arteri banyak ditemukan disinus carotid, tapi juga terdapat dalam aorta dan dinding ventrikrl kiri. Baroreseptor ini memonitor derajat tekanan arteri. Sistem baroreseptor meniadakan peningkatan tekanan arteri melalui mekanisme perlambatan jantung oleh respons vegal (stimulasi parasimpatis) dan vasodilatasi dengan penurunan

tonus simpatis. Oleh karena itu, refleks kontrol sirkulasi meningkatkan tekanan arteri sistemik bila tekanan baroreseptor meingkat.

**b. Pengaturan volume cairan tubuh**

Perubahan volume cairan mempengaruhi tekanan arteri sistemik. Bila tubuh mengalami kelebihan garam dan air, tekanan darah meningkat melalui mekanisme fisiologi kompleks yang mengubah aliran balik vena ke jantung dan mengakibatkan peningkatan curah jantung (CO). Bila ginjal bekerja secara adekuat, peningkatan tekanan arteri mengakibatkan diuresis dan penurunan tekanan darah. kondisi patologis yang mengubah ambang tekanan pada ginjal dalam mengekskresikan garam dan air akan meningkatkan tekanan arteri sistemik.

**c. Autoregulasi Vaskuler**

Autoregulasi vaskuler merupakan mekanisme lain yang terlibat dala hipertensi. Autoregulasi vaskuler adalah suatu proses yang mempertahankan perfusi jaringan dalam tubuh relatif konstan. Jika aliran berubah, proses autoregulasi akan menurunkan tahanan vaskuler sebagai akibat dari peningkatan aliran. Autoregulasi vaskuler nampak mekanisme penting dalam menimbulkan hipertensi berkaitan dengan overload garam dan air.

**d. Sistem Renin-Angiotensin**

Renin dan angiotensin memegang peranan dalam pengaturan tekanan darah. ginjal memproduksi renin yaitu suatu enzim yang bertindak

pada substrat protein plasma untuk memisahkan angiotensin I, yang kemudian diubah oleh *converting enzim* dalam paru menjadi angiotensin II. Angiotensin II mempunyai aksi vasokonstriksi yang kuat pada pembuluh darah dan merupakan mekanisme kontrol terhadap pelepasan aldosteron. Melalui peningkatan aktivitas sistem saraf simpatis, angiotensin II juga mempunyai efek inhibiting atau pengahambatan pada sekresi natrium dengan akibat peningkatan tekanan darah. (Eka Nurwahyuni, 2011)

### **3. Pengukuran Tekanan Darah**

Pengukuran tekanan darah dilakukan dengan menggunakan sfigmomanometer dan stetoskop. Sfigmomanometer tersusun atas manset yang dapat dikembangkan dan alat pengukur tekanan yang berhubungan dengan rongga dalam manset. Manset dibalutkan dengan kencang dan lembut pada lengan atas dan dikembangkan dengan pompa. Tekanan dalam manset dinaikan sampai denyut radial atau brakial menghilang. Hilangnya denyutan menunjukkan bahwa tekanan sistolik darah telah dilampaui dan arteri brakhialis telah tertutup. Manset dikembangkan lagi sebesar 20-30 mmHg di atas titik hilangnya denyutan radial. Manset kemudian dikempiskan perlahan dan dilakukan pembacaan secara auskultasi maupun palpasi. (Brunner & Suddart, 2002).

**a. Secara Auskultasi**

- 1) Pastikan responden duduk atau berbaring dengan nyaman.
- 2) Pasang manset di lengan atas kanan, sekitar 3 cm di atas fossa cubiti (jangan terlalu ketat maupun terlalu longgar).
- 3) Menentukan *arteri brachialis dextra* secara palpasi pada *fossa cubiti* dan meletakkan stetoschope di atas *arteri brachialis dextra* tersebut.
- 4) Memompakan udara kedalam manset, maka akan terdengar suara bising *arteri brachialis dextra* melalui *stetoschope* sampai suara bising tersebut akan menghilang.
- 5) Memompakan terus udara kedalam manset sampai tinggi Hg pada manometer sekitar 20 mm Hg lebih tinggi dari titik dimana suara bising *arteri brachialis dextra* tadi menghilang.
- 6) Mengeluarkan udara dalam manset secara pelan dan berkesinambungan, maka akan terdengar lagi suara bising tersebut. Kemudian melihat tinggi Hg pada manometer, didapatkan tekanan darah sistolik. Dan setelah diturunkan lagi suara bising tersebut kembali lagi menghilang, itulah tekanan darah sistolik.

**b. Secara Palpasi**

- 1) Pastikan responden duduk atau berbaring dengan nyaman.
- 2) Pasang manset di lengan atas kanan, sekitar 3 cm di atas fossa cubiti (jangan terlalu ketat maupun terlalu longgar).
- 3) Meraba serta merasakan denyut *arteri radialis dextra*.

- 4) Memompakan udara kedalam manset sampai tinggi Hg pada manometer 20 mm Hg lebih tinggi dari titik dimana denyut *arteri radialis dextra* tidak teraba.
- 5) Mengeluarkan udara dalam manset secara pelan dan berkesinambungan. Mencatat tinggi Hg pada manometer dimana arteri radialis pertama kali teraba kembali. Nilai ini menunjukkan besarnya tekanan sistolik secara palpasi.

#### **4. Pengertian Hipertensi**

Hipertensi adalah gejala peningkatan tekanan darah yang mengakibatkan suplai oksigen dan nutrisi yang di bawah oleh darah terhambat sampai ke jaringan tubuh yang membutuhkan. Dikatakan tekanan darah tinggi jika tekanan sistolik mencapai 140 mmHg atau lebih, atau tekanan diastolic mencapai 90 mmHg atau lebih atau keduanya (Nur Khasanah 2012).

Hipertensi merupakan penyakit degenerative yang banyak diderita bukan hanya oleh usia lanjut saja, bahkan saat ini sudah menyerang orang dewasa muda. Bahkan diketahui bahwa 9 dari 10 orang yang menderita hipertensi tidak dapat diidentifikasi penyebab kematiannya. Itulah sebabnya hipertensi di juluki sebagai “Pembunuh Diam-Diam” (*Silent Killer*). (Darmojo 2001 dalam Zauhani, Zainal 2012). Penyakit ini dikenal juga sebagai *heterogeneous group of disease* karena dapat mneyerang siapa saja dari



berbagai kelompok umur dan kelompok sosial ekonomi (Astawan, 2002 dalam Lailatul, 2007).

Menurut *World Health Organization* (batasan tekanan darah masih dianggap normal adalah kurang dari 130/85 mmHg, bila tekanan darah lebih dari 140/90 mmHg dinyatakan hipertensi (batasan tersebut untuk orang dewasa diatas 18 tahun) (Adib, 2009 dalam Afdahal Ramadhi 2012).

Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan suatu gangguan pada pembuluh darah yang mengakibatkan suplai oksigen dan nutrisi yang dibawa oleh darah terhambat sampai ke jaringan tubuh (Sustrani 2006). Sedangkan menurut Smeltzer dan bare (2002) hipertensi adalah tekanan darah dalam batas tidak normal dimana tekanan sistolik diatas 140 mmHg dan tekanan diastolik di atas mmHg.

Hipertensi adalah salah satu faktor risiko terpenting pada penyakit jantung koroner dan *Cerebrovascular Accidents*, selain itu hipertensi juga dapat menyebabkan hipetrofi jantung dan gagal jantung (penyakit jantung hipertensif), diseksi aorta dan gagal ginjal.

## **5. Klasifikasi dan Penyebab Hipertensi**

Hipertensi berdasarkan penyebabnya dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

### a. Hipertensi Primer (Esensial) atau idiopatik

Hipertensi primer atau esensial adalah hipertensi yang tidak atau belum diketahui penyebabnya (terdapat pada kurang lebih 90 % dari seluruh hipertensi). (Siti Roadhah, 2012). Hipertensi esensial biasanya dimulai sebagai proses labil (intermiten) pada individu pada akhir 30-an dan awal 50-an dan secara bertahap “menetap”. Pada suatu saat juga dapat terjadi mendadak dan berat, perjalannya dipercepat (maligna) yang menyebabkan kondisi pasien memburuk dengan cepat. (Brunner & Suddarth, 2002).

Beberapa faktor yang pernah dikemukakan relevan terhadap mekanisme penyebab hipertensi adalah sebagai berikut:

#### 1) Genetik

Dibanding orang kulit putih, orang kulit hitam di negara barat lebih banyak menderita hipertensi, lebih tinggi tingkat hipertensinya, dan lebih besar tingkat morbiditas maupun mortalitanya, sehingga diperkirakan ada kaitan hipertensi dengan perbedaan genetik. Beberapa peneliti mengatakan terdapat kelainan pada gen angiotensinogen tetapi mekanismenya mungkin bersifat poligenetik.

#### 2) Geografi dan lingkungan

Terdapat perbedaan tekanan darah yang nyata antara populasi kelompok daerah kurang makmur dengan daerah maju, seperti bangsa indian amerika selatan yang tekanan darahnya rendah dan tidak

banyak meningkat sesuai dengan pertambahan usia dibandingkan dengan masyarakat barat.

### 3) Jenis Kelamin

Hipertensi lebih jarang ditemukan pada perempuan pra-menopause dibanding pria, yang menunjukkan adanya pengaruh hormon.

### 4) Stress dan pola hidup yang tidak seimbangan

Sikap yang dapat menyebabkan hipertensi seperti konsumsi tinggi, lemak, garam, aktifitas yang rendah, kebiasaan merokok, konsumsi alkohol dan kafein. Namun sebagian besar juga disebabkan karena faktor stress.

## **b. Hipertensi Sekunder**

Hipertensi sekunder adalah hipertensi yang disebabkan/sebagai akibat dari adanya penyakit lain. Beberapa hal yang menjadi penyebab hipertensi sekunder, yaitu:

### 1. Penyakit ginjal

- a) Stenosis Arteri Renalis
- b) Pielonefritis
- c) Glomerulonefritis
- d) Tumor ginjal
- e) Penyakit ginjal polikista (biasanya diturunkan)
- f) Trauma pada ginjal (luka yang mengenai ginjal)

- g) Terapi penyinaran yang mengenai ginjal
2. Kelainan Hormonal
    - a) Hiperaldosteronisme
    - b) Sindrom Chusing
    - c) Feokromositoma
  3. Obat-Obatan
    - a) Pil KB
    - b) Kortikosteroid
    - c) Siklosporin
    - d) Eritropoetin
    - e) Kokain
    - f) Penyalahgunaan Alkohol
    - g) Kayu manis (dalam jumlah sangat besar)
  4. Penyebab lainnya
    - a) Koartasio Aorta
    - b) Preeklamsia pada kehamilan
    - c) Porfiria intermiten akut
    - d) Keracunan timbal akut

Adapun klasifikasi hipertensi menurut WHO berdasarkan tekanan diastolik, yaitu:

- a) Hipertensi derajat I, yaitu jika tekanan diastoliknya 95-109 mmHg.

- b) Hipertensi derajat II. Yaitu jika tekanan diastoliknya 110-119 mmHg.
- c) Hipertensi derajat III, yaitu jika tekanan diastoliknya lebih dari 120 mmHg. (Meita Shanty, 2011).


## 6. Patofisiologi Hipertensi

Tugas utama darah adalah mengantarkan zat-zat gizi dan oksigen ke seluruh jaringan tubuh, serta membawa sisa-sisa metabolisme tubuh untuk dikeluarkan melalui kulit, paru-paru dan ginjal. Agar jaringan tubuh dapat berfungsi secara normal, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi terkait dengan sistem peredaran darah dalam tubuh.

- a. Sirkulasi darah harus normal sehingga zat-zat gizi dan oksigen dapat diantarkan ke seluruh jaringan tubuh tepat waktu.
- b. Harus ada keseimbangan cairan dalam pembuluh darah (darah tidak terlalu pekat).
- c. Adanya kadar normal komponen dalam darah, seperti jumlah sel darah merah, oksigen, zat gizi, dan komponen lainnya. Dengan begitu kebutuhan jaringan tubuh juga akan tercukupi.

Hipertensi atau tekanan darah tinggi terjadi karena adanya gangguan dalam sistem peredaran darah. Gangguan tersebut dapat berupa gangguan peredaran darah. Atau komponen dalam darah yang tidak normal. Adanya gangguan tersebut mengakibatkan darah tidak dapat

disalurkan ke seluruh tubuh dengan lancar. Agar darah tetap sampai ke seluruh tubuh, jantung akan memompa darah lebih keras. Dampaknya, tekanan darah pembuluh darah meningkat dan disebut sebagai tekanan darah tinggi atau hipertensi.



Gambar 2.1 Proses terjadinya hipertensi

(Price & Wilson, 2002 dalam Nur Khasanah, 2012)

Berikut penjabaran dari mekanisme terjadinya hipertensi :

a. Gangguan Keseimbangan Natrium

Natrium adalah salah satu komponen yang ada dalam darah. Kadar natrium dalam darah harus seimbangan, tidak boleh terlalu tinggi atau rendah. Pengaturan keseimbangan natrium dalam darah diatur oleh peran ginjal. Ketika kadar natrium dalam darah terlalu tinggi, ginjal akan mengeluarkannya melalui urine, bersamaan dengan air. Ketika kadar natrium dalam darah rendah, ginjal akan menahan natrium agar tidak keluar melalui urine.

Mekanisme pengaturan keseimbangan natrium sebenarnya bertujuan untuk mengontrol tekanan darah. Ginjal mengendalikan tekanan darah melalui beberapa cara. Jika tekanan darah meningkat, ginjal akan menambah pengeluaran natrium dan air, sehingga akan mengakibatkan berkurangnya volume darah dan mengembalikan tekanan darah kembali ke normal. Jika tekanan darah menurun, ginjal akan mengurangi pembuangan garam dan air, sehingga volume darah bertambah dan volume darah kembali normal.

Asupan natrium yang terlalu tinggi secara terus-menerus dapat menyebabkan keseimbangan natrium terganggu. Hal ini terjadi jika terjadi kelainan fungsi ginjal, dimana ginjal tidak mampu lagi membuang sejumlah air dan garam dari dalam tubuh. Pada kondisi ini, natrium tidak dapat atau hanya sedikit dikeluarkan, sehingga kadar natrium dalam

darah menjadi tinggi. Penurunan pengeluaran natrium akan diikuti dengan penambahan air. Bertambahnya cairan dalam sirkulasi bisa menyebabkan volume darah dalam tubuh meningkat, sehingga tekanan darah juga meningkat.

b. Kelenturan atau Elastisitas Pembuluh Darah Berkurang (Menjadi Kaku)

Pembuluh darah normalnya bersifat elastis, dimana diameternya bisa menyempit dan mengembang. Elastisitas ini bermanfaat dalam mempermudah proses pendistribusian darah ke seluruh tubuh. Pada usia lanjut, elastisitas pembuluh darah mulai berkurang, pembuluh darahpun kehilangan kelenturannya dan menjadi kaku. Akibatnya pembuluh darah tidak dapat mengembang pada saat jantung memompa darah. Hal ini akan memicu jantung untuk meningkatkan denyutnya agar aliran darah dapat mencapai seluruh bagian tubuh. Darah pada setiap denyutan jantung seolah dipaksa untuk melalui pembuluh yang lebih sempit. Inilah yang menyebabkan naiknya tekanan darah.

c. Penyempitan Pembuluh Darah

Kadar lemak tinggi dalam darah dapat menyebabkan penyumbatan pembuluh darah, sehingga mengganggu suplai oksigen dan zat makanan ke organ tubuh. Jumlah lemak dan kolesterol yang tinggi dalam darah juga akan menempel pada dinding pembuluh darah. Jika kadar lemak dan kolesterol terus menerus tinggi, maka lemak yang menempel dalam dinding pembuluh darah akan semakin banyak dan dapat menyebabkan



penyempitan pembuluh darah. Penyempitan dan sumbatan lemak ini kemudian memacu jantung untuk memompa darah lebih kuat lagi agar dapat memasok kebutuhan darah ke jaringan. Akibatnya, tekanan darah pun menjadi meningkat dan terjadilah hipertensi.

## **7. Manifestasi Klinik Hipertensi**

Penderita tekanan darah kadang merupakan satu-satunya gejala pada hipertensi esensial dan tergantung dari tinggi rendahnya tekanan darah. Gejala yang timbul dapat berbeda-beda. Kadang berjalan tanpa gejala dan baru timbul keluhan setelah menjadi komplikasi yang spesifik pada organ-organ tertentu. (Sitti Roadhah, 2012).

Perjalanan penyakit hipertensi sangat perlahan. Penderita hipertensi mungkin tidak menunjukkan gejala selama bertahun-tahun. Masa laten ini menyelubungi perkembangan penyakit sampai terjadi kerusakan organ yang bermakna. Jika hipertensinya berat atau menahun dan tidak diobati maka dapat menimbulkan gejala seperti berikut:

- a. Sakit kepala
- b. Kelelahan
- c. Mual, muntah
- d. Sesak napas
- e. Gelisah
- f. Pandangan menjadi kabur

- g. Mata berkunang-kunang
- h. Telinga berdengung

Terkadang penderita hipertensi berat juga dapat mengalami penurunan kesadaran, bahkan koma karena terjadi pembengkakan otak. Keadaan ini disebut *ensefalopati Hipertensif*, yang memerlukan penanganan medis segera. (EI Manan M, 2011).

## **8. Faktor Risiko Hipertensi**

### **a. Genetik**

Peran faktor genetik terhadap timbulnya hipertensi terbukti dengan ditemukannya kejadian bahwa hipertensi lebih banyak pada kembar monozigot (satu sel telur) daripada heterozigot (berbeda sel telur). Seorang penderita yang mempunyai sifat genetik hipertensi primer (esensial) apabila dibiarkan secara alamiah tanpa intervensi terapi, bersama lingkungannya akan menyebabkan hipertensinya berkembang dan dalam waktu sekitar 30-50 tahun akan timbul tanda dan gejala.

### **b. Umur**

Beberapa penelitian yang dilakukan mendapatkan hasil bahwa semakin tua usia seseorang maka semakin tinggi tekanan darahnya. Hal ini disebabkan elastis dinding pembuluh darah semakin menurun dengan bertambahnya usia.

Dengan bertambahnya umur, risiko terkena hipertensi lebih besar sehingga prevalensi hipertensi di kalangan usia lanjut cukup tinggi yaitu sekitar 40%. (Nurkhalida, 2003 dalam Idcuq Santoso, 2011)

**c. Jenis Kelamin**

Jenis kelamin mempunyai pengaruh penting dalam regulasi tekanan darah. Sejumlah fakta menyatakan hormon sex mempengaruhi sistem retina angiotensin. Secara umum tekanan darah pada laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Pada perempuan risiko hipertensi akan meningkat setelah masa monopause yang menunjukkan adanya pengaruh hormon. Menurut Arif Mansjoer, dkk, pria dan wanita manopause mempunyai pengaruh yang sama untuk terjadinya hipertensi. (Mansjoer, Arif, dkk, 2001).

**d. Kebiasaan Merokok**

Merokok dapat menaikkan beban kerja jantung dan tekanan darah. Hasil penilitan menunjukkan bahwa nikotin yang terdapat dalam rokok dapat meningkatkan penggumpulan darah dalam pembuluh darah dan dapat mengakibatkan pengapuran dalam dinding pembuluh darah. Nikotin bersifat toksik terhadap jaringan saraf yang menyebabkan peningkatan tekanan darah baik sistolik maupun diastolik, denyut jantung bertambah, kontraksi otot jantung seperti dipaksa, pemakaian O<sub>2</sub> bertambah, aliran darah pada koroner meningkat dan vasokonstriksi pada pembuluh darah perifer.

Selain dari lamanya, risiko merokok terbesar tergantung dari jumlah rokok yang dihisap perhari. Seseorang lebih dari 1 bungkus rokok perhari menjadi 2 kali lebih rentan hipertensi daripada mereka yang tidak merokok. (Price & Wilson, 2006).

**e. Obesitas**

Kelebihan lemak tubuh, khususnya lemak abdominal, erat kaitanya dengan hipertensi. Tingginya peningkatan tekanan darah tergantung pada besarnya penambahan berat badan. Akan tetapi tidak semua obesitas akan terkena hipertensi, tergantung pada individu masing-masing.

Makin besar massa tubuh, semakin besar darah yang dibutuhkan untuk memasok oksigen dan makanan ke jaringan tubuh. Ini berarti volume darah yang beredar melalui pembuluh darah menjadi meningkat sehingga memberi tekanan lebih besar pada dinding arteri. (Teadosha, dkk, 2000 dalam Iduq Santoso, 2011). Risiko relatif untuk menderita hipertensi pada orang obes 5 kali lebih tinggi dibandingkan dengan seorang yang berat badanya normal. Pada penderita hipertensi ditemukan sekitar 20-30% memiliki berat badan lebih.

**f. Stres**

Hubungan antara stres dengan hipertensi diduga melalui saraf simpatis yang dapat meningkatkan tekanan darah secara intermiten. Apabila stres berlangsung lama dapat mengakibatkan peninggian tekanan darah yang menetap. Stres dapat merangsang kelenjar anak ginjal

melepaskan hormon adrenalin dan memacu jantung berdenyut lebih cepat serta lebih kuat, sehingga tekanan darah akan meningkat. (Lani Gunawan, 2005).

**g. Konsumsi Alkohol**

Alkohol dapat mengganggu sistem kerja saraf pusat maupun saraf tepi. Jika kerja saraf simpatis terganggu, maka akan terjadi gangguan pula pada pengaturan tekanan darah. Orang yang gemar mengonsumsi alkohol dengan kadar yang tinggi akan memiliki tekanan darah yang cepat berubah dan cenderung meningkat tinggi. Alkohol juga memiliki efek yang hampir sama dengan karbon monoksida, yaitu dapat meningkatkan keasaman darah. Darah menjadi lebih kuat lagi agar darah yang sampai ke jaringan jumlahnya mencukupi. Ini berarti juga terjadi peningkatan tekanan darah.

**9. Komplikasi Hipertensi**

**a. Stroke**

Stroke merupakan manifestasi gangguan saraf umum yang timbul mendadak dalam waktu singkat akibat gangguan aliran darah ke otak karena penyumbatan (*ischemic stroke*) atau perdarahan (*hemoragic stroke*). Dengan kata lain, menurut cara terjadinya, stroke dibedakan menjadi dua macam, yaitu stroke iskemik dan stroke hemoragik. Stroke hemoragik inilah yang biasanya merupakan komplikasi hipertensi.

Hipertensi dapat menyebabkan tekanan yang lebih besar pada dinding pembuluh darah sehingga dinding pembuluh darah menjadi lemah dan pembuluh darah akan mudah pecah. Pecahnya pembuluh darah di otak dapat menyebabkan sel-sel otak yang seharusnya mendapatkan asupan oksigen dan nutrisi yang dibawah melalui pembuluh darah tersebut kekurangan nutrisi dan akhirnya mati. Darah yang keluar dari pembuluh darah yang pecah juga dapat merusak sel-sel otak yang berada disekitarnya.

**b. Penyakit Jantung**

Peningkatan tekanan darah secara sistemik meningkatkan resistensi terhadap pemompaan darah dari ventrikel kiri sehingga beban jantung bertambah. Sebagai akibatnya, terjadi hipertrofi ventrikel kiri untuk meningkatkan kontraksi. Akan tetapi kemampuan ventrikel untuk mempertahankan curah jantung dengan hipertrofi kompensasi akhirnya terlampaui dan terjadi dilatasi dan payah jantung. Jantung semakin terancam seiring parahnya aterosklerosis koroner. Angina pectoris juga dapat terjadi karena gabungan penyakit arterial koroner yang cepat dan kebutuhan oksigen miokard yang bertambah akibat penambahan massa miokard.

**c. Gagal Ginjal**

Gagal ginjal merupakan suatu keadaan klinis kerusakan ginjal yang progresif dan tidak dapat diperbaiki dari berbagai penyebab. Salah satunya

pada bagian yang menuju ke kardiovaskuler. Mekanisme terjadinya hipertensi pada gagal ginjal kronis karena penimbunan garam dan air atau sistem renin angiotensin aldosteron (RAA).

#### **d. Ensefalopati Hipertensi**

Ensefalopati hipertensi merupakan suatu keadaan peningkatan parah tekanan arteri disertai dengan mual, muntah dan nyeri kepala yang berlanjut ke koma dan disertai tanda klinik defisit neurologi.

### **10. Penatalaksanaan Hipertensi**

Dalam menghadapi persoalan hidup, kita semestinya tidak menunjukkan sikap pesimis dalam hal apapun. Termasuk dalam persoalan penyakit yang menimpa diri kita ataupun keluarga kita. Karena telah disampaikan oleh Rasulullah bahwa setiap penyakit itu ada obatnya kecuali kematian, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah bersabda :

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ دَاءٍ إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

*Artinya: "Tidaklah Allah menurunkan sebuah penyakit melainkan menurunkan pula obatnya" (HR. Bukhari & Muslim).*

Maksud dari hadis diatas adalah sebagai hamba yang percaya akan janji dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka seyogyanya kita harus tetap optimis untuk senantiasa mencari sebab-sebab kesembuhan dari setiap

penyakit yang kita derita seperti pergi ke pelayanan kesehatan ataupun melalui pengobatan-pengobatan alamiah disamping rasa harap dan optimis dalam menantikan pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Pada prinsipnya penanggulangan hipertensi meliputi dua cara, antara lain:

#### **a. Penatalaksanaan Farmakologis**

Tahap ini memberikan terapi berupa obat antihipertensi. Menurut Arif Mansjoer, penatalaksanaan dengan obat antihipertensi bagi sebagian besar pasien dimulai dengan dosis rendah kemudian ditingkatkan secara titrasi sesuai umur dan kekentuan.

##### 1) Obat Yang Mengubah Keseimbangan Natrium dan Air

- a) Diuretik thiazide, biasanya merupakan obat pertama yang diberikan untuk mengobati hipertensi. Diuretik membantu ginjal membuang garam dan air, yang akan mengurangi volume cairan diseluruh tubuh sehingga menurunkan tekanan darah. Diuretik juga menyebabkan pelebaran pembuluh darah. Diuretik menyebabkan hilangnya natrium melalui air kemih sehingga kadang diberikan tambahan kalium atau obat penahan kalium.

- (1) Penghambat Carbonic Anhydrase, menyekat reabsorpsi Natrium bikarbonat, menyebabkan diuresis natrium bikarbonat dan penurunan simpanan bikarbonat tubuh total. Penghambat *Carbonic Anhydrase* diabsorpsi dengan baik setelah pemberian



oral. Peningkatan PH urine karena diuresis bikarbonat terjadi dalam 30 menit, maksimal pada 2 jam, dan menetap selama 12 jam setelah pemberian dosis tunggal.

- (2) Diuretik Ansa (Loop), secara selektif menghambat reabsorpsi NaCl pada cabang meningkat yang tebal dari ansa Henle. Dua prototipe obat dari kelompok ini adalah *Furosemide* dan *ethacrynic acid*. Masa kerja *furosemide* biasanya 2-3 jam. Waktu paruhnya bergantung pada fungsi ginjal. Karena agen ansa bekerja pada sisi luminal tubulus, respon diuretic berkaitan secara positif dengan ekskresi urine.
- (3) Thiazide, menghambat reabsorpsi NaCl dari sisi luminasi epitel dalam tubulus berbelit distalis. Semua thiazide di reabsorpsi dalam pemberian oral. Tetapi terdapat perbedaan dalam metabolismenya. *Cholorothiazide*, induk dari kelompok tersebut kurang, kurang dapat larut dalam lipid, dan harus diberikan pada dosis yang relatif besar. *Cholortalidone*, diabsorpsi lambat dan mempunyai masa kerja yang lebih panjang.
- (4) Diuretik Hemat-Kalium, menurunkan absorpsi  $\text{Na}^+$  pada tubulus dan duktus pengumpul. *Sprinolactone* adalah suatu sintesis steroid yang bekerja sebagai antagonis kompetitif aldosterone. Mula dan lama kerjanya ditentukan oleh kinetic dari respon *aldosterone* pada jaringan target. Hasil keseluruhan merupakan

mula kerja yang agak lambat, membutuhkan beberapa hari sebelum efek terapeutik lengkap tercapai. *Triamterene* di metabolisme di hati, tetapi ekskresi ginjal adalah jalur utama eliminasi bentuk aktif dan metabolitnya. Karena dimetabolismenya secara luas, waktu paruhnya lebih pendek sehingga harus diberikan lebih sering dari pada *amiloride*.

## 2) Obat Yang Mengubah Sistem Saraf Simpatis

### a) Obat Simpatoplegik yang bekerja secara sentral

(1) *Methyldopa*, berguna untuk pengobatan hipertensi ringan sampai sedang. *Methyldopa* dapat menurunkan tekanan darah terutama dengan cara menurunkan tahanan vaskuler perifer, dengan variasi dalam penurunan curah jantung dan denyut jantung. *Methyldopa* memasuki otak melalui molekul yang secara aktif membawa asam-asam amino aromatic, dosis oral *methyldopa* menghasilkan efek antihipertensi maksimal dalam 4-6 jam, dan efek tersebut dapat bertahan sampai dengan 24 jam.

(2) *Clonidine*. Pada orang-orang sehat, bioavailabilitas *clonidine* sekitar 75 % dan waktu paruhnya adalah 8-12 jam. Karena waktu paruhnya relatif pendek dan kenyataan bahwa efek antihipertensi nya secara langsung berhubungan dengan konsentrasinya di dalam darah, *clonidine* oral harus diberikan 2

kali / hari untuk mempertahankan keteraturan tekanan darah.

Dosis terapeutik lazimnya adalah antara 0,2 dan 1,2 mg/hari.

b) Obat-Obat Penyakit Ganglion

- (1) Trimethaphan Camsylate diberikan secara intravena untuk mendapatkan reaksi cepat dalam penanganan krisis hipertensi, pembedahan aorta akut, dan untuk menginduksi hipertensi yang terkontrol pada operasi saraf.

c) Obat Penyakit Saraf Adrenergik

- (1) *Guanethidine* dapat menyebabkan simpatoplegi yang besar. Efektifitas maksimal yang tinggi dari obat tersebut menjadikannya bertahan sebagai pengobatan utama bagi pasien hipertensi rawat jalan yang parah selama bertahun-tahun. Dengan alasan sama, *Guannethidine* dapat mengakibatkan toksisitas yang diduga dapat terjadi pada “simpatektomi farmakologis” termasuk hipotensi postural yang parah, diare dan hambatan ejakulasi. Karena efek samping tersebut, *guanethidine* sekarang jarang dipakai. Waktu paruh *guanethidine* panjang (5 hari). Jadi, dengan dosis yang tetap setiap hari, efek simpatoplegi terjadi secara bertahap (efek maksimal dalam 1-2 minggu) dan simpatoplegi menetap dalam waktu yang sebanding setelah pemberhentian terapi.
- (2) *Reserpine*, adalah salah satu obat efektif yang pertama kali digunakan dalam skala besar untuk pengobatan hipertensi. Sekarang *reserpine* dianggap efektif dan obat yang relatif aman untuk pengobatan hipertensi ringan sampai sedang. Obat menghilang dari sirkulasi dengan cepat, akan tetapi efeknya bertahan lebih lama. Akibat dari inaktivasi ireversibel pada pembawa di granula penyimpanan *catecholamine*. Dosis harian

yang lazim digunakan adalah kurang dari 1 mg (tepatnya 0,25 mg) dan diberikan secara oral sebagai dosis tunggal.

b) Antagonis Adrenoreseptor Beta

(1) Propranolol, obat penyekat adrenoreseptor  $\beta_1$ , sangat berguna untuk menurunkan tekanan darah pada hipertensi ringan sampai sedang. Pada hipertensi parah, propranolol berguna khususnya untuk mencegah reflex takikardi yang sering terjadi akibat pengobatan dengan vasodilator langsung. Waktu paruhnya 3-6 jam.

d) Penyekat Adenoreseptor Alfa

1) *Prozasin* dapat direabsorpsi dengan baik di dalam hati, akan tetapi mengalami metabolisme lintas pertama yang sangat besar, hampir semua prozasin dieliminasi melalui metabolisme, dengan waktu paruh plasma 3-4 jam, meskipun masa kerja antihipertensinya lebih panjang. *Terazosin* dimetabolisme pula secara luas, tetapi metabolisme lintas pertamanya sangat kecil dan mempunyai waktu paruh 12 jam. *Doxazosin* mempunyai bioavailabilitas sedang dengan waktu paruhnya 22 jam.

e) Vasodilator

(1) Hydralazine, dapat digunakan dengan lebih efektif, terutama pada hipertensi yang parah. Waktu paruh *hydralazine* dalam rentang 2-4 jam, akan tetapi efek vaskulernya lebih panjang dari pada konsentrasinya di dalam darah. Rentang dosis lazimnya 40 mg – 200 mg / hari.

(2) Minoxidil merupakan vasodilator oral yang sangat bermanfaat. Minoxidil seyogyanya menggantikan hidralazine bilamana dosis maksimal tidak efektif atau untuk digunakan pada pasien-pasien dengan gagal ginjal dan hipertensi parah, yaitu mereka yang

tidak memberi respon hyralazine dengan baik. Waktu paruhnya rata-rata 4 jam, akan tetapi, efek hipotensinya pada dosis tunggal bertahan lebih dari 24 jam.

- (3) Natrium Nitroprusside merupakan vasodilator parenteral yang sangat kuat yang digunakan dalam pengobatan kedaruratan hipertensi seperti juga dengan pengobatan gagal jantung parah. Nitroprusside secara cepat menurunkan tekanan darah dan efeknya menghilang dalam 1-10 menit setelah penghentian obat. Obat diberikan dengan cara intravena.
- (4) Fenoldopam merupakan reseptor perifer yang digunakan untuk pengobatan kedaruratan hipertensi dan hipertensi pasca operasi. Waktu paruhnya 5 menit. Obat tersebut diberikan dengan infus intravena secara terus-menerus.

f) Penghambat Enzim Pengkonversi Angiotensin (ACE)

- (1) Captopril dan obat lain dalam kelas ini menghambat enzim pengkonversi peptidyl didehidrase yang menghidrolisis angiotensin I ke angiotensin II dan menyebabkan inaktivasi bradykinin, sesuatu vasodilator kuat, yang paling sedikit sebagian, bekerja dengan cara menstimulasi rilis nitric oxide dan prostacyclin. Captopril pada awalnya diberikan pada dosis 25 mg, 2 atau 3 kali sehari, 1-2 jam sebelum makan. Respon pada tekanan darah maksimal terjadi 2-4 jam setelah pemberian obat.
- (2) Enalapril adalah suatu prodrug yang dikonversi dengan deesterifikasi menjadi penghambat enzim pengkonversi. Enalaprilat hanya tersedia untuk penggunaan secara intravena, terutama pada kedaruratan hipertensi. Konsentrasi puncak terjadi 3-4 jam setelah pemberian enalapril. Waktu paruh sekitar

11 jam. Dosis enalapril yang lazim adalah 10-20 mg / hari atau 2 kali sehari.

#### **a. Penatalaksanaan Nonfarmakologis**

Pendekatan nonfarmakologis merupakan penanganan awal sebelum penambahan obat-obatan hipertensi. Disamping perlu diperhatikan oleh seorang yang sedang dalam terapi obat. Sedangkan pasien hipertensi yang terkontrol, pendekatan nonfarmakologis ini dapat membantu pengurangan dosis obat pada sebagian penderita. Oleh karena itu, modifikasi gaya hidup merupakan hal yang penting diperhatikan, karena berperan dalam keberhasilan penanganan hipertensi.

Menurut beberapa ahli, pengobatan nonfarmakologis sama pentingnya dengan pengobatan farmakologis, terutama pada pengobatan hipertensi derajat I, jika obat antihipertensi diperlukan, pengobatan nonfarmakologis dapat dipakai sebagai pelegkap untuk mendapatkan hasil pengobatan yang lebih baik. (Sitti Roadhah, 2012).

1. Menurunkan berat badan bila status gizi berlebih. Peningkatan berat badan di usia dewasa sangat berpengaruh terhadap tekanan darah. oleh karena itu, manajemen berat badan sangat penting dalam prevensi dan kontrol hipertensi.

2. Meningkatkan aktifitas fisik. Orang yang aktifitasnya rendah berisiko terkena hipertensi 30-50% daripada yang aktif. Oleh karena itu, aktifitas fisik selama 30-45 menit sebanyak > 3x / hari penting sebagai pencegahan primer dari hipertensi.
3. Mengurangi asupan natrium. Apabila diet tidak membantu selama dalam 6 bulan, maka perlu pemberian obat anti hipertensi oleh dokter.
4. Berhenti Merokok dan Hindari Konsumsi Alkohol Berlebih. Nikotin dalam tembakau adalah penyebab meningkatnya tekanan darah. Nikotin diserap oleh pembuluh-pembuluh darah di dalam paru-paru dan diedarkan ke aliran darah. dalam beberapa detik nikotin mencapai ke otak. Otak bereaksi kepada nikotin dengan memberi sinyal pada kelenjar adrenal untuk melepas epinefrin (adrenalin), sehingga dengan pelepasan hormon ini akan menyempitkan pembuluh darah dan memaksa jantung untuk bekerja lebih berat karena tekanan yang lebih tinggi.

Demikian juga dengan alkohol, semakin banyak mengonsumsi alkohol maka semakin tinggi tekanan darah, sehingga peluang terkena hipertensi semakin tinggi. Alkohol dalam darah merangsang pelepasan epinefrin (adrenalin dan hormon-hormon lain yang membuat pembuluh darah menyempit atau menyebabkan penumpukan lebih banyak natrium dan air.

## 5. Terapi Herbal

Ada beberapa tanaman obat yang dapat dipercaya dan sudah diteliti dapat menurunkan tekanan darah, diantaranya bawang putih, buah belimbing, murbei, seledri, mengkudu, dan mentimun. (El Manna M, 2011).

## 11. Pencegahan Hipertensi

- a. Membatasi asupan lemak dan kolesterol untuk mengantisipasi tingginya kadar lemak dan kolesterol dalam darah
- b. Mengatur pola makan antara lain dengan mengkonsumsi makanan berserat, rendah lemak dan mengurangi garam
- c. Menghentikan kebiasaan merokok dan meminum minuman beralkohol
- d. Olahraga secara teratur
- e. Memeriksa tekanan darah secara berkala.
- f. Mengurangi stres dengan melakukan relaksasi
- g. Menjaga berat badan dalam rentang normal

## B. Hipertensi Pada Lansia

### 1. Pengertian Hipertensi Pada Lansia

Menurut JNC (*Joint National Committee VI 1997*), Hipertensi pada lanjut usia didefinisikan sebagai tekanan sistolik lebih besar dari 140 mmHg dan atau tekanan diastolic lebih besar dari 90 mmHg di temukan dua kali atau lebih pada dua atau lebih pemeriksaan yang berbeda. (JNC VI,



1997). Hipertensi pada lanjut usia di bedakan menjadi dua macam yaitu hipertensi pada tekanan sistolik sama atau lebih besar dari 140 mmHg dan atau tekanan diastolik sama atau lebih 90 mmHg serta hipertensi sistolik terisolasi lebih besar dari 160 mmHg dan tekanan diastolik lebih rendah dari 90 mmHg. (Nugroho, 2008). Sedangkan menurut Kaplan (1990), pada pria usia lebih dari 45 tahun dikatakan hipertensi bila tekanan darah diatas 145/95 mmHg, sedangkan pada wanita dikatakan hipertensi bila tekanan darah di atas sama dengan 160/95 mmHg. (Syarif, 2012).

## **2. Patofisiologi Hipertensi Pada Lansia**

Mekanisme dasar peningkatan tekanan sistolik sejalan dengan peningkatan usia terjadinya penurunan elastisitas dan kemampuan meregang pada arteri besar. Tekanan aorta meningkat sangat tinggi dengan penambahan volume intravaskuler yang sedikit menunjukkan kekakuan pembuluh darah pada lanjut usia. Secara hemodinamik hipertensi sistolik ditandai dengan penurunan kelenturan pembuluh darah aretri besar, resistensi perifer yang tinggi, pengisian diastolik abnormal dan bertambahnya massa ventrikel kiri. Penurunan volume darah dan output jantung disertai kekakuan arteri besar menyebabkan penurunan tekanan diastolik.

Lanjut usia mengalami kerusakan struktural dan fungsional pada arteri besar yang membawa darah dari jantung menyebabkan semakin

parahnya pengerasan pembuluh darah dan tingginya tekanan darah. (Tuty, Kuswardhani RA, 2006).

### **3. Penatalaksanaan Hipertensi Pada Lanjut Usia**

Menurut Mansjoer (2002), kategori penatalaksanaan di kategorikan dalam kelompok risiko menjadi :

- a. Pasien tekanan darah perbatasan atau tingkat 1, 2, atau 3 tanpa gejala penyakit kardiovaskuler, kerusakan organ, atau faktor risiko lainnya. Bila dengan modifikasi gaya hidup tekanan darah belum dapat diturunkan, maka harus diberikan obat antihipertensi.
- b. Pasien tanpa penyakit kardiovaskuler atau kerusakan organ lainnya, tapi memiliki satu atau lebih faktor risiko, namun bukan diabetes mellitus. Jika terdapat beberapa faktor maka harus langsung diberikan obat antihipertensi.
- c. Pasien dengan gejala klinis penyakit kardiovaskuler atau kerusakan organ yang jelas.

Anderson (2011) menjelaskan mengenai pemakaian obat pada lanjut usia perlu diperkirakan kemungkinan adanya gangguan absorpsi dalam alat pencernaan, interaksi obat, efek samping obat dan gangguan akumulasi obat terutama obat-obatan yang ekskresinya melalui ginjal. Melaksanakan terapi antihipertensi perlu penetapan jadwal rutin harian minum obat, mencatat obat-

obatan yang diminum dan keefektifan informasi untuk tindak lanjut. (Tuty, Kuswardhani RA, 2006).

## **C. Tinjauan Umum Tentang Mentimun**

### **1. Pengertian Mentimun**

Mentimun, timun atau ketimun suku labu-labuan atau cucurbitaceae merupakan tumbuhan jenis sayuran yang menghasilkan buah yang dapat dimakan. Mentimun memiliki nama latin *Cucumis Sativus L.* Buahnya biasanya dipanen ketika belum masak benar untuk dijadikan sayuran atau penyegar. Tergantung jenisnya. Mentimun berasal dari india dan dapat ditemukan diberbagai hidangan diseluruh dunia dan memiliki kandungan air yang cukup banyak didalamnya sehingga berfungsi menyejukan. Potongan buah mentimun juga digunakan untuk membantu melembakan wajah. (savitri, 2008).

Ketimun di budidayakan dimana-mana, baik di ladang, di halaman rumah atau di rumah kaca. Tanaman ini tidak tahan terhadap hujan yang terus-menerus. Pertumbuhannya memerlukan kelembaban yang tinggi, tanah subur yang gembur dan mendapat sinar matahari penuh dengan drainage yang baik. Tanaman ini di duga berasal dari Pegunungan Himalaya di India Utara. Tanaman ini mempunyai sulur daun berbentuk spiral yang keluar disisi tangkai daun.

Daun tunggal, letak berseling, bertangkai panjang, bentuknya bulat telur, lebar bertaju 3-7, dengan pangkal berbentuk jantung, ujung runcing, tepi bergerigi. Buah bulat panjang, tumbuh bergantung, warnanya hijau berkilin putih, setelah tua warnanya kuning kotor, panjang 10-30 cm, bagian pangkal berbintil, banyak mengandung cairan. Bijinya banyak, bentuknya lonjong meruncing pipih, warnanya putih kotor. Buahnya bisa dimakan mentah, direbus, dikukus atau disayur.

## **2. Klasifikasi Mentimun**

Pada dasarnya mentimun dikelompokkan menjadi dua golongan sebagai berikut:

### **a. Mentimun Berbintil**

Mentimun ini memiliki bintil-bintil kecil dibagian pangkal buahnya. Mentimun berbintil dibagi lagi menjadi tiga jenis, yaitu:

- 1) Mentimun biasa. Kulit buah tipis dan lunak. Saat buah muda berwarna hijau keputih-putihan. Dan setelah tua menjadi cokelat.
- 2) Mentimun wuku. Kulit buah agak tebal dan berwarna kecoklatan
- 3) Mentimun watang. Kulit buah tebal, agak keras dan buah muda berwarna hijau keputihan.

### **b. Mentimun Halus**

Mentimun ini memiliki kulit yang halus tanpa berbintil, mentimun jenis ini dibedakan menjadi, dua macam, yaitu:

- 1) Mentimun suri atau puan. Buahnya sangat besar, bentuknya lonjong dan rasanya manis renyah.
- 2) Mentimun krai. Buahnya besar dan citra rasanya seperti mentimun biasa.

### **3. Manfaat Mentimun**

Mentimun memiliki nama Scientific Cucumis Sativus mengandung 0,65% protein, 0,15 lemak, dan karbohidrat sebanyak 2,2%. Juga mengandung kalsium, zat besi, magnesium, fosfor, vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, dan vitamin C. Biji timun sendiri mengandung racun alkaloid jenis hipoxanti yang berfungsi untuk mengobati anak-anak yang menderita cacangan. Mengandung saponin, flavonoida, polifenol, asam amlonat, vitamin E, kukurbitasin C. (savitri, 2008)

Mentimun memiliki banyak khasiat, diantaranya mampu menurunkan tekanan darah tinggi karena mentimun mengandung potassium, magnesium dan fosfor. Selain itu, mentimun juga berkhasiat untuk kecantikan, membantu mengeluarkan racun dalam tubuh, pelangsing badan, antiselulit, obat diare, obat sariawan, obat tifus, menyuburkan rambut, dan lain-lain. (Intan Nisa, 2012). Mentimun memiliki kemampuan meredam panas lambung yang meradang, selain tahan lama, berguna mengobati penyakit kandung kemih. Buahnya berkhasiat memperlancar buang air seni dan daunnya bila dibalutkan berguna juga mengobati gigitan anjing. (savitri, 2008)

#### **4. Manfaat Mentimun Terhadap Penurunan Tekanan Darah**

Untuk memahami lebih jelas tentang manfaat mentimun terhadap penurunan tekanan darah terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang fisiologi cairan tubuh dan mekanisme pengaturan tekanan darah untuk mengetahui kerja dari kandungan mentimun terhadap penurunan tekanan darah.

Dalam tubuh yang sehat, 60% dari berat badan terdiri atas air yang terdapat dalam dua komponen yaitu cairan intraseluler dan cairan ekstraseluler. Ekstraseluler dibagi menjadi dua yaitu intrastisial (di antara sel) dan intarvaskuler (dalam pembuluh darah). (Syarifuddin, 2009). Cairan ekstrasel mengandung banyak ion natrium, klorida dan bikarbonat plus berbagai nutrient untuk sel, seperti oksigen, glukosa, asam lemak dan asam amino. Adapun nilai normal ion natrium dalam cairan ekstrasel yaitu 142 mmol/L dan ion kalium sebesar 4,2 mmol/L. Cairan ekstrasel juga mengandung karbon dioksida yang diangkut dari sel ke paru untuk di ekskresi, ditambah berbagai produk sampah sel lainnya yang diangkut ke ginjal untuk di ekskresi. Cairan intrasel sangat berbeda dari cairan ekstrasel. Secara spesifik cairan intrasel mengandung banyak sekali ion kalium, magnesium dan fosfat dari pada ion natrium dan klorida yang banyak ditemukan dalam cairan ekstrasel. (Guyton, Arthur C, 2007).

Tekanan darah adalah daya yang dihasilkan oleh darah terhadap setiap satuan luas dinding pembuluh. Secara fisiologi tekanan darah dapat di rumuskan sebagai berikut :

$$\mathbf{BP = CO \times SVR}$$

Keterangan :

BP = Blood Pressure/tekanan darah

CO = Cardiac output/ Curah jantung (Jumlah darah yang keluar dari jantung dalam waktu 1 menit).

SVR = Systemic Vascular Resisten/ Tahanan perifer total

(resistensi dinding pembuluh darah terhadap aliran darah).

Sedangkan,  $\mathbf{CO = SV \times P}$

SV = Stroke Volume/volume sekuncup (jumlah darah yang dipompakan keluarjantung 1x pompaan)

P = Pulse/Nadi dalam satu menit


Dengan kata lain, dapat diambil kesimpulan bahwa

$$\mathbf{BP = SV \times P \times SVR}$$

Maka jelaslah bahwa kenaikan tahanan perifer total akan meningkatkan tekanan darah, begitu pula ketika cardiac output atau curah jantung meningkat maka tekanan darahpun akan meningkat. (Guyton, Arthur C, 2007). Peningkatan curah jantung mempunyai efek langsung dalam meningkatkan tekanan arteri sekaligus efek tidak langsung dalam

meningkatkan resistensi perifer total. Sehingga peningkatan cairan ekstrasel dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah.

Adapun urutan langkah-langkahnya sebagai berikut :



Timun atau mentimun merupakan salah satu tanaman yang dapat mengobati penyakit hipertensi. Meilinasari, M.Kes dari politeknik kesehatanjakarta telah mengemukakan bahwa mereka yang menderita hipertensi disarankan untuk mengkonsumsi mentimun. Menurutny mentimun dapat mengobati hipertensi karena kandungan mineral yang ada didalamnya yaitu potassium, magnesium, dan pospor.




Kalium merupakan ion bermuatan positif, akan tetapi berbeda dengan natrium, kalium terutama terdapat dalam sel, sebanyak 95% kalium berada dalam cairan intraseluler. Di dalam tubuh kalium mempunyai fungsi dalam menjaga keseimbangan cairan elektrolit dan keseimbangan asam basa. Bedanya kalium menjaga tekanan osmotik cairan intraseluler. Kadar kalium yang tinggi dapat meningkatkan ekskresi natrium, sehingga dapat menurunkan volume darah dan tekanan darah.

Adapun hubungan antara kandungan mentimun dalam hal ini kalium terhadap pengaturan tekanan darah adalah kalium berperan dalam menjaga keseimbangan natrium dalam cairan ekstraseluler. Dimana, ketika konsentrasi natrium di dalam cairan ekstraseluler meningkat maka akan terjadi peningkatan volume cairan ekstrasel, sehingga volume darah pun akan meningkat. Peningkatan volume darah akan meningkatkan tekanan pengisian sirkulasi rata-rata yang akan menyebabkan peningkatan aliran balik darah vena ke jantung, sehingga curah jantung akan meningkat, ketika curah jantung meningkat maka tekanan darah akan meningkat. Peran kalium disini adalah untuk meningkatkan ekskresi natrium dalam cairan ekstraseluler. Sehingga volume cairan dalam cairan ekstraseluler akan tetap seimbang.

## **5. Mentimun Dalam Pandangan Islam**

Dalam Al-Quran telah menjelaskan tentang makanan yang baik untuk dikonsumsi. Tidak hanya baik dari segi kehehatan tapi baik dari halal dan haramnya. Sebagaimana dijelaskan dalam QS Al-Baqarah/2: 172-173.




*Terjemahan: Wahai orang-orang yang beriman! makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepadanya. Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama selain Allah, tetapi barang siapa terpaksa (memakanya), bukan karena mengiinkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah maha pengampun, maha penyayang. (QS AlBaqarah/2: 172-173).*

Menurut M.Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah mengatakan bahwa yang dimaksud bangkai adalah binatang yang berembus nyawanya tidak melalui cara yang sah, seperti yang mati tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk, dan diterkam binatang buas, namun tidak sempat disembelih, dan (yang disembelih untuk berhala). Dikecualikan dari pengertian bangkai adalah binatang air (ikan dan sebagainya) dan belalang.

Yang dimaksud darah dalam ayat ini adalah darah yang mengalir bukan yang substansi asalnya membeku, seperti limpa dan hati. Daging babi, yakni seluruh tubuh babi, termasuk tulang, lemak, dan kulitnya. Dan binatang yang ketika disembelih disebut mana selain Allah, artinya bahwa

binatang semacam itu baru haram dimakan bila disembelih dalam keadaan menyebut nama Allah. Adapun bila tidak di sebut nama-Nya, binatang halal yang disembelih demikian, masih dapat di toleransi untuk dimakan. (Shihab, M. Quraish, 2002).

Keadaan terpaksa adalah keadaan yang diduga dapat mengakibatkan kematian; sedang tidak mengiinkannya adalah tidak memakanya padahal ada makanan halal yang dapat di makan, tidak pula memakanya memenuhi keinginan selernya. Sedang, yang dimaksud dengan tidak melampai batas adalah tidak memakanya dalam kadar yang melebihi kebutuhan menutup rasa lapar dan memenuhi jiwanya. (Shihab, M. Quraish, 2002).



*Terjemahan: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban) untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu medapat keberuntungan. (QS Al-Maidah;5: 90).*

Menurut Prof. Dr. Hamka yang dijelaskan dalam tafsir Al-Azhar, yang dimaksud dengan khamar adalah minuman yang menimbulkan dan menyebabkan mabuk, dalam bahasa kita disebut arak atau tuak. Meminum itu menimbulkan mabuk oleh karena telah ada alkoholnya. Alkohol timbul

dari ragi. Maka segala minuman yang memabukan atau bisa memabukan, menjadi haramlah diminum. (Hamka, 1983).

Dari penjelasan ayat di atas, terlihat bahwa tidak disebutkan mentimun di dalam makanan dan minuman yang dilarang untuk di konsumsi. Ini menunjukkan bahwa mentimun adalah halal untuk di konsumsi. Hal ini lebih diperjelas dalam hadist Riwayat Tirmidzi di bawah ini yang menjelaskan bahwa Rasulullah biasa menyantap mentimun dan kurma masak. Sehingga tidak ada keraguan lagi tentang boleh tidaknya mengkonsumsi mentimun maupun dalam hal untuk meneliti lebih dalam manfaat dari mentimun terhadap kesehatan.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ الْقَيْثَاءَ بِالرُّطْبِ .

*Artinya: Dari Abdullah bin Ja'far radiallahu anhu berkata: aku melihat Rasulullah makan mentimun dengan kurma masak (HR. Tirmidzi).*

Imam Nawawy mengomentari hadits di atas mengatakan: "Dalam hadits ini ada dalil bolehnya memakan dua jenis makanan berbeda baik berupa buah-buahan maupun yang lainnya, juga bolehnya memakan dua makanan sekaligus. Ini menunjukkan bahwa dari segi halanya, mentimun tidak menjadi keraguan lagi untuk dimakan. (Savitri, 2008).

## **D. Tinjauan Umum Tentang Lansia**

### **1. Pengertian Lansia**

Menua (menjadi tua) adalah suatu proses menghilangnya secara perlahan-lahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri/mengganti dan mempertahankan fungsi normalnya sehingga tidak dapat bertahan terhadap infeksi dan memperbaiki kerusakan yang di derita.

Batasan orang dikatakan lanjut usia berdasarkan UU No 13 Tahun 1998 adalah 60 tahun. Menurut WHO, usia lanjut dibagi menjadi 4 kriteria yaitu :

- a. Usia pertengahan (middle age) ialah 55-59 tahun
- b. Lanjut usia (elderly) ialah 60-74 tahun
- c. Lanjut usia tua (old) ialah 75-90 tahun
- d. Usai sangat tua (very old) ialah diatas 90 tahun.

### **2. Proses Penuaan**

Menua didefinisikan sebagai penurunan, kelemahan, meningkatnya kerentanan terhadap berbagai penyakit dan perubahan lingkungan, hilangnya mobilitas dan ketangkasan, serta perubahan fisiologis yang terkait dengan usia. (Aru,dkk, 2009)

Penuaan adalah proses normal yang ditandai dengan perubahan fisik dan tingkah laku yang dapat diramalkan dan terjadi pada semua orang pada saat mereka mencapai usai tahap perkembangan kronologis tertentu.

Proses penuaan merupakan suatu proses biologis yang tidak dapat dihindari dan akan dialami oleh setiap orang. Menua adalah suatu proses menghilangnya secara perlahan-lahan (gradual) kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri atau mengganti serta mempertahankan struktur dan fungsi secara normal, ketahanan terhadap cedera, termasuk adanya infeksi. Pengaruh proses menua dapat menimbulkan berbagai masalah, baik secara biologis, mental maupun ekonomi. Semakin lanjut usia seseorang, maka kemampuan fisiknya akan semakin menurun, sehingga dapat mengakibatkan kemunduran pada peran-peran sosial. (Tamher, 2009).

### **3. Teori Proses Penuaan**

Ada beberapa teori yang berkaitan dengan proses penuaan yaitu:

#### **a. Teori Biologis**

- 1) Teori Genetik dan Mutasi. Menurut teori genetik dan mutasi, semua terprogram secara genetik untuk spesies-spesies tertentu. Menua terjadi sebagai akibat dari perubahan biokimia yang diprogram oleh molekul-molekul DNA dan setiap sel pada saatnya akan mengalami mutasi.

- 2) *Immunology Slow Theori*. Menurut teori ini, sistem imun menjadi kurang efektif dengan bertambahnya usia dan masuknya virus ke dalam tubuh yang dapat menyebabkan kerusakan organ tubuh.
  - 3) Teori Stres. Teori ini mengatakan semua terjadi akibat hilangnya sel-sel yang biasa digunakan tubuh. Regenerasi jaringan tidak dapat mempertahankan kestabilan lingkungan internal, kelebihan usaha dan stres yang menyebabkan sel-sel tubuh lelah terpakai.
  - 4) Teori Radikal Bebas. Radikal bebas dapat terbentuk di alam bebas, tidak stabilnya radikal bebas (kelompok atom) mengakibatkan oksidasi oksigen bahan-bahan organik seperti karbohidrat dan protein. Radikal ini menyebabkan sel-sel tidak dapat melakukan regenerasi.
  - 5) Teori Rantai Silang. Teori ini mengatakan bahwa reaksi kimia sel-sel yang tua menyebabkan ikatan yang kuat, khususnya jaringan kolagen. Ikatan ini menyebabkan kurangnya elastisitas kekacauan, dan hilangnya fungsi sel.
- b. Teori Psikologi
- 1) Teori Kebutuhan manusia menurut Hirarki Maslow. Menurut teori ini, setiap individu memiliki hirarki dari dalam diri, kebutuhan yang memotivasi seluruh perilaku manusia. Kebutuhan ini memiliki urutan prioritas yang berbeda. Ketika kebutuhan dasar manusia sudah terpenuhi, mereka berusaha menemukannya pada tingkat selanjutnya sampai urutan yang paling tinggi dari kebutuhan tersebut tercapai.

2) Teori individual jung. Carl Jung (1960) Menyusun sebuah terori perkembangan kepribadian dari seluruh fase kehidupan yaitu mulai dari masa kanak-kanak , masa muda dan masa dewasa muda, usia pertengahan sampai lansia. Kepribadian individu terdiri dari Ego, ketidaksadaran sesorang dan ketidaksadaran bersama. Menurut teori ini kepribadian digambarkan terhadap dunia luar atau ke arah subyektif. Pengalaman-pengalaman dari dalam diri (introvert). Keseimbangan antara kekuatan ini dapat dilihat pada setiap individu, dan merupakan hal yang paling penting bagi kesehatan mental

c. Teori Sosial

- 1) Teori Aktifitas. Lanjut usia yang sukses adalah mereka yang aktif dan ikut banyak dalam kegiatan social.
- 2) Teori Pembebasan. Dengan bertambahnya usia, seseorang secara berangsur angsur mulai melepaskan diri dari kehidupan sosialnya. Keadaan ini mengakibatkan interaksi sosial lanjut usia menurun, baik secara kualitas maupun kwanntitas. Sehingga terjadi kehilangan ganda yakni :Kehilangan peran, Hambatan kontrol social dan Berkurangnya komitmen.
- 3) Teori Kesenambungan. Teori ini mengemukakan adanya kesinambungan dalam siklus kehidupan lansia. Dengan demikian pengalaman hidup seseorang pada usatu saat merupakan gambarannya kelak pada saat ini menjadi lansia.



d. Teori Spritual

Komponen spritual dan tumbuh kembang merujuk pada pengertian hubungan individu dengan alam semesta dan persepsi individu dengan arti kehidupan.

**4. Tipe Kepribadian Lansia**

a. Tipe Kperibadian Konstruktif

Orang ini memiliki integritas baik, menikmati hidupnya, toleransi tinggi dan fleksibel. Biasanya tipe ini tidak banyak mengalami gejala, tenang, bisa menerima fakta proses menua dan menghadapi masa pensiun dengan bijaksana dan menghadapi kematian dengan penuh kesiapan fisik dan mental.

b. Tipe Kperibadain Mandiri

Pada tipe ini ada kecenderungan post power syndrom, apalagi jika pada masa lansia tidak diisi dengan kegiatan yang dapat memberikan otonomi.

c. Tipe Kperibadian Tergantung

Tipe ini biasanya sangat dipengaruhi kehidupan keluarga, apabila kehidupan keluarga selalu harmonis maka pada lansia tidak bergejolak, tapi jika pasangan hidup meninggal maka pasangan yang ditinggalkan akan mengamali sedih yang mendalam. Tipe lansia ini senang mengalami pensiun, tidak punya inisatif, pasif tapi masih tau diri dan masih dapat

diterima oleh masyarakat.

d. Tipe Kepribadian Bermusuhan

Lanjut usia pada tipe ini, setelah memasuki lanjut usia tetap merasa tidak puas dengan kehidupannya, banyak keinginan yang tidak diperhitungkan sehingga menyebabkan kondisi ekonominya menurun. Mereka menganggap orang lain yang mengalami kegagalan, selalu mengeluh dan curiga. Menjadi tua tidak ada yang dianggap baik, takut mati dan iri hati dengan yang muda.

e. Tipe Kepribadian Defensive

Tipe ini selalu menolak bantuan, emosinya tidak terkontrol, bersifat kompulsif aktif. Mereka takut menjadi tua dan tidak menyenangi masa pensiun.

f. Tipe Kepribadian Kritik Diri

Pada lansia tipe ini umumnya terlihat sengsara, karena perilakunya sendiri sulit dibantu orang lain atau cenderung membuat susah dirinya. Selalu menyalahkan diri, tidak memiliki ambisi dan merasa korban dari keadaan.

## **5. Perubahan-Perubahan Yang Terjadi Pada lanjut Usia**

### **a. Perubahan-Perubahan Fisik**

- 1) Sel. Pada lansia ukuran sel akan membesar, jumlah sel lebih sedikit, jumlah cairan intraseluler berkurang, maka bisa menjadi penurunan

proporsi protein di otak, ginjal darah dan hati serta jumlah sel otak menurun. Karena tergantungnya mekanisme perbaikan sel otak menjadi atropis dimana beratnya berkurang 5-10%.

- 2) Sistem Persarafan. Lansia mengalami penurunan koordinasi dan kemampuan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Koordinasi keseimbangan, kekuatan otot, refleks, perubahan postur tubuh dan peningkatan waktu reaksi, kurang sensitif terhadap sentuhan.
- 3) Sistem Pendengaran. Presbiakusis (gangguan pada pendengaran), hilangnya kemampuan (daya) mendengar pada telinga dalam, terutama terhadap bunyi suara atau nada-nada yang tinggi, suara yang tidak jelas sulit mengerti kata-kata, 50% terjadi pada usia diatas 65 tahun, membran timpani atrofi menyebabkan oterosklerosis, pendengaran bertambah menurun pada lanjut usia yang menlamai ketegangan jiwa/stress.
- 4) Sistem Penglihatan. Sfingter pupil timbul sklerosis dan hilangnya respon terhadap sinar, kornea lebih berbentuk sferis (bola), kekeruhan pada lensa, hilangnya daya koordinasi, menurunnya lapangan pandang (berkurang laus pandang), menurunnya daya membedakan warna biru atau hijau pada skala.
- 5) Sistem Kardiovaskuler. Elastisitas dinding aorta menurun, katub jantung menebal dan menjadi kaku, kehilangan elastisitas pembuluh darah, kurangnya efektifitas pembuluh darah perifer.

- 6) Sistem Pengaturan Temperatur Tubuh. Temperatur tubuh menurun secara fisiologis kurang lebih  $35^{\circ}\text{C}$ , ini akibat metabolisme menurun, keterbatasan refleks, menggigil dan tidak dapat memproduksi panas yang banyak, sehingga terjadi rendahnya aktifitas otot.
- 7) Sistem Respirasi. Otot-otot pernafasan kehilangan kekuatan dan menjadi kaku, menurunnya aktivitas dari silia, paru-paru kehilangan elastisitas, kapasitas residu meningkat, menarik nafas lebih berat, kapasitas pernafasan maksimum menurun dan kedalaman bernafas menurun, alveoli ukurannya melebar dari biasa dan jumlahnya berkurang, kemampuan untuk batuk menurun.
- 8) Sistem Gastrointestinal. Pada lanjut usia perlahan akan kehilangan gigi, pengecap menurun, esopagus melebar, rasa lapar menurun karena kebutuhan nutrisi pada lansia lebih rendah dari pada anak-anak atau orang dewasa, peristaltik lemah dan biasanya timbul konstipasi. Pada wanita payudara menjadi atrofi, pada laki-laki usia diatas 65 tahun, terjadi pembesaran prostat kurang lebih 75%.
- 9) Sistem Muskuloskeletal. Tulang kehilangan cairan dan makin rapuh, penurunan kemampuan untuk meningkatkan kekuatan otot, kesulitan bergerak dari duduk ke berdiri, jongkok, berjalan, dan hambatan dalam melakukan kegiatan sehari-hari.

#### **b. Perubahan-Perubahan Mental**

- 1) Perubahan Kognitif


- a) Memori (daya ingat, ingatan). Kenangan jangka panjang, beberapa jam sampai beberapa hari yang lalu dan mencakup beberapa perubahan.
- b) IQ (Intellectual Quation). Tidak berubah dengan informasi matematika dan perkataan verbal, penampilan, persepsi dan keterampilan psikomotor berkurang, terjadi perubahan pada daya membayangkan karena tekanan faktor waktu.

#### c. Perubahan-Perubahan Psikososial

- 1) Terjadi gangguan identitas akibat perubahan kondisi fisik, usia dan kekuatan (bekerja).
- 2) Ekonomi akibat pemberhentian dari pekerjaan atau pensiun
- 3) Penyakit kronis dan ketidak mampuan
- 4) Perubahan dalam peran sosial di masyarakat.

#### d. Lansia Dalam Pandangan Islam

Dalam Al-Qur'an telah menyebutkan bahwa menjadi tua merupakan suatu keniscayaan bagi setiap manusia yang di panjangkan usianya oleh Allah Subhana huawatala, sebagaimana yang dijelaskan dalam QS Al-Mu'Min/23: 67.





*Terjemahan: Dialah yang telah menciptakan kamu dari tanah, kemudian itu dari nuthfah, kemudian itu dari ‘alaqa, kemudian itu dia keluarkan kamu jadi anak kecil (bayi), kemudian supaya sampailah kedewasaan kamu, kemudian supaya jadilah kamu orang tua. Maka setengah diantara kamu ada yang diwafatkan dari sebelumnya dan supaya sampai kamu kepada ajal yang telah ditentukan dan supaya kamu berfaham. (QS Al-Mu’Min/23: 67).*

Menurut Prof.Dr. Hamka dalam tafsir Al-Azhar, di jelaskan bahwa ketika Allah berkehendak maka ada sebagian manusia yang dimatikan sebelum sampai pada usia tua, dan ada juga sebagian dimatikan ketika sampai pada usia tua. Ini menunjukkan bahwa menjadi tua sudah merupakan ketentuan yang diatur oleh Allah dan sebagian manusia akan berada pada tahap ini, yaitu menjadi tua. (Hamka, 1983).

Sebagaimana Dalam hadis Rasulullah di bawah ini, yang menjelaskan bahwa ada satu penyakit yang tidak bisa di obati yaitu menjadi tua.

يَا رَسُولَ اللَّهِ، :كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَجَاءَتِ الْأَعْرَابُ، فَقَالَ نَعَمْ يَا عِبَادَ اللَّهِ، تَدَاوَوْا، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ : شِفَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ

*Artinya : Aku pernah berada di samping Rasulullah, Lalu datanglah serombongan Arab dusun. Mereka bertanya, “Wahai Rasulullah, bolehkah kami berobat?” Beliau menjawab: “Iya, wahai para hamba Allah, berobatlah. Sebab Allah tidaklah meletakkan sebuah penyakit*

*melainkan meletakkan pula obatnya, kecuali satu penyakit.” Mereka bertanya: “Penyakit apa itu?” Beliau menjawab: “Penyakit tua.” (HR. Ahmad, Tirmidzi, Bukhari)*

Hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk tetap berobat ketika sakit karena Allah SWT tidak menurunkan penyakit melainkan menurunkan pula obatnya dan hanya satu penyakit yang tidak ada obatnya yaitu penyakit tua. Dalam hal ini, menjadi tua merupakan suatu keniscayaan bagi setiap manusia yang dipanjangkan usianya oleh Allah SWT, namun tidak berarti bahwa penyakit yang di derita lansia juga tidak bisa di obati. Semau penyakit yang ada pada lansia bisa di obati sebagaimana dalam penjelasan Hadis Rasulullah bahwa semua penyakit ada obatnya kecuali penyakit tua. Sehingga kita harus tetap berusaha untuk mengobati penyakit-penyakit yang terjadi pada lansia.

Salah satu bentuk usaha kita dalam mengobati penyakit yang terjadi pada lansia, khususnya penyakit hipertensi adalah dengan mengkonsumsi tanaman herbal, salah satunya yaitu mentimun. Sebagaimana terdapat dalam Hadis Riwayat Tirmidzi yang menjelaskan bahwa Rasulullah biasanya mengkonsumsi mentimun dengan kurma masak, sebagai berikut :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ الْقِتَاءَ بِالرُّطْبِ .

*Artinya: Dari Abdullah bin ja'far radiallahu anbhuh berkata: aku melihat Rasulullah makan mentimun dengan kurma masak (HR. Tirmidzi).*


Walupun tidak secara spesifik menjelaskan tentang manfaat mentimun terhadap penurunan tekanan darah, setidaknya hadis memberikan gambaran kepada kita dalam mentimun terdapat banyak kandungan zat yang bermanfaat buat kesehatan, karena Rasulullah sendiri tidak akan mengonsumsi makanan kecuali yang baik dan bernilai manfaat buat kesehatan tubuh.



## E. Kerangka Konseptual

### 1. Kerangka Konseptual Penelitian

Terapi hipertensi



Keterangan :


  Variabel Independen


  Variabel Depende

  Variabel yang tidak diteliti

Dari skema diatas dapat dijelaskan bahwa yang menjadi variabel independen adalah terapi hipertensi non farmakologi, yaitu pemberian Jus Mentimun, sedangkan variabel dependennya adalah penurunan tekanan darah. ini merupakan landasan atau sumber dilaksanakannya penelitian ini.

## 2. Kerangka Kerja





### BAB III

#### METODOLOGI PENELITIAN

##### A. Jenis dan Lokasi Penelitian

###### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, desain yang digunakan adalah *Quasy Experimental Desigen* (eksperimen semu), dengan menggunakan pendekatan *pre-post test with control Group* yaitu membandingkan suatu hasil intervensi dengan subjek kontrol yang serupa (moch Imron & Amrul

Munif, 2010). Untuk lebih jelas dapat dilihat skema berikut:

	Pre Test	Intervensi	Post Test
Kel. Eksperimen	O	I	O1
Kel. Kontrol	O	-	O2

Keterangan :

O : observasi

I : intervensi

- : tidak diberikan intervensi

O1 : Observasi sesudah intervensi

O2 : Observasi tanpa intervensi

Dalam rancangan ini, kelompok eksperimental diberikan perlakuan sedangkan kelompok kontrol tidak. Pada kedua kelompok diawali dengan pra-test dan setelah pemberian perlakuan diadakan pengukuran kembali.

## **2. Lokasi dan waktu penelitian**

Penelitian dilaksanakan di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa pada tanggal 2 - 13 juni 2014.

## **B. Populasi dan Sampel**

### **1. Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulanya. (sugiyono, 2004 dalam A Azis Alimul Hidayat, 2009). Dalam penelitian ini populasinya adalah lansia yang menderita hipertensi di Panti Sosial Tresna Werdha Gua Mabaji Kabupaten Gowa.

### **2. Sampel**

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan diteliti atau sebagian jumlah dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi. (A Azis Alimul Hidayat, 2009). Dalam penelitian ini, besar populasinya 20 lansia dengan hipertensi dan hanya 10 orang yang akan di jadikan sampel yaitu 5 orang sebagai kelompok perlakuan dan 5 orang sebagai kelompok kontrol yang sesuai dengan kriteri inklusif.

## **C. Teknik Pengambilan Sampel**

### **1. Teknik Sampling**

Teknik sampling merupakan suatu proses seleksi sampel yang digunakan dalam penelitian dari populasi yang ada, sehingga jumlah sampel akan mewakili keseluruhan populasi yang ada. Dalam penelitian ini, pemilihan sampel dengan cara *nonprobability sampling*, jenis *Purposive sampling*,

### **2. Kriteria Inklusi dan Eksklusi**

#### **a. Kriteria Inklusi**

Kriteria inklusi adalah karakteristik umum subjek penelitian dari populasi target dan terjangkaunya yang akan diteliti. (Nursalam, 2008).

- 1) Bersedia diteliti dengan menandatangani surat persetujuan.
- 2) Tidak mengonsumsi obat hipertensi (farmakologi maupun nonfarmakologi).
- 3) Lansia dengan hipertensi ringan dan sedang
- 4) Tidak dalam keadaan sakit.

#### **b. Kriteria Eksklusi**

Kriteria eksklusi adalah mengeluarkan atau menghilangkan subjek yang tidak memenuhi kriteria inklusi dari studi (Nursalam, 2008).

- 1) Responden yang pada saat dilakukan intervensi tidak berada di tempat.
- 2) Responden dengan hipertensi stadium 3 dan 4 (sistolik :180 - 210 mmHg & diastolik : 120 - 130 mm Hg).

## **D. Metode Pengumpulan Data**

### **1. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian yang digunakan adalah satu set alat untuk mengukur tekanan darah dan peralatan untuk membuat jus mentimun.

### **2. Pengumpulan Data**

Setelah mendapatkan izin dari pimpinan Panti Sosial Trersna Werdha Gau Mabaji Gowa, peneliti mengadakan pendekatan atau membuat kontrak pertemuan kepada responden untuk mendapatkan persetujuan sebagai responden peneliti. Responden adalah lansia yang memiliki kriteria inklusi.

Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti sendiri (data primer). Observasi dilakukan pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol, kemudian memberi perlakuan pada kelompok perlakuan sedangkan pada kelompok kontrol tidak. Pada tahap post, observasi kembali kelompok perlakuan dan kelompok kontrol.

#### **a. Alat Pengukur Tekanan Darah**

Alat yang diperlukan dalam melakukan pengukuran tekanan darah, antara lain:

- 1) Spigmomanometer
- 2) Stetoskop
- 3) Kertas
- 4) Pen

b. Prosedur Kerja :

- 1) Jelaskan prosedur pada klien
- 2) Cuci tangan
- 3) Atur posisi klien
- 4) Letakan lengan yang hendak di ukur dengan posisi telentang
- 5) Pasang manset pada lengan kanan/kiri sekitar 3 cm dari fossa cubiti  
(jangan terlalu ketata atau terlalu longgar)
- 6) Letakan diafragma stetoskop diatas aretro brachialis dan dengarkan.
- 7) Pompa balon udara sampai denyut arteri brachialis tidak terdengar
- 8) Kempiskan kembali sampai denyut arteri brachialis pertama terdengar kembali (bunyi korotkoff I) sebagai tekanan sistolik, setelah ini denyut arteri brachialis akan kembali menghilang dan akan terdengar kembali (bunyi korotkoff II) sebagai tekanan diastolik.
- 9) Catat hasil pengukuran tekanan darah di lembar observasi.

c. Alat dan Bahan Membuat Jus Mentimun

- 1) Blender
- 2) Gelas ukur
- 3) Stopwatch
- 4) Timbangan
- 5) Mentimun
- 6) Air mineral
- 7) Gel



d. Proses kerja

1. Siapkan semua alat dan bahan
2. Cuci tangan
3. Mentimunnya di cuci dengan bersih
4. Masukkan mentimun 100 gram ke dalam blender bersamaan dengan tambahkan air sebanyak 100 cc.
5. Sebelum blender di hidupkan, pastikan bahwa stopwatch sudah siap digunakan.
6. Hidupkan blender dan tunggu selama 30 detik.
7. Setelah selesai di blender masukan jusnya ke dalam gelas

## **E. Pengelolaan dan Analisa Data**

### **1. Pengelolaan Data**

Setelah data terkumpul yang diperoleh dari hasil pengukuran tekanan darah, selanjutnya akan dilakukan pengolaan data. Pengolaan data tersebut dengan tahap-tahap sebagai berikut :

#### **a. Editing**

Proses editing dilakukan setelah data terkumpul, dengan memeriksa kelengkapan dan keseragaman data.

#### **b. Koding**

Koding dilakukan untuk memudahkan dalam pengolaan data, semua hasil pemeriksaan data perlu disederhanakan dengan simbol-simbol

tertentu. Pengkodean dilakukan dengan memberi nomor variabel, nama variabel dan kode.

**c. Tabulasi**

Setelah selesai pembuatan kode selanjutnya dengan pengolahan data kedalam satu tabel menurut sifat-sifat yang dimiliki.

**2. Analisa Data**

**a. Analisa Univariat**

Analisa univariat untuk menganalisis variabel yang ada secara deskriptif dengan menghitung distribusi frekuensi dan proporsi untuk mengetahui karakteristik subjek dari penelitian.

**b. Analisa Bivariat**

Analisa bivariat dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independent terhadap dependen dengan menampilkan label-label silang. Untuk mengetahui pengaruh mentimun terhadap penurunan tekanan darah, maka dilakukan uji statistik T test sample paired untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Derajat kemaknaan ditentukan 0,05. Artinya jika hasil uji statistik menunjukkan p 0,05 maka ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Analisa data menggunakan komputerisasi.

## **F. Jadwal Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Panti Sosial Tresna Werdha pada bulan Juni 2014 selama 2 minggu, yaitu mulai dari tanggal 2 –13 Juni 2014

## **G. Etika Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengajukan permohonan persetujuan kepada kepala Panti Sosial Tresna Werdha, setelah peneliti mendapatkan persetujuan, kemudian peneliti melakukan pendekatan pada lansia dengan menekankan pada masalah etik yang meliputi :

### **1. Lembar Persetujuan Menjadi Responden**

Tujuannya adalah lansia mengetahui maksud dan tujuan penelitian serta dampak yang diteliti selama pengumpulan data. Jika lansia bersedia untuk menjadi maka harus menandatangani lembar persetujuan dan jika lansia menolak untuk menjadi responden maka tidak akan memaksa dan tetap menghormati haknya.

### **2. Anonimity**

Untuk menjaga kerahasiaan identitas lansia, peneliti tidak akan mencantumkan nama pada lembar kuesioner. Lembar tersebut hanya diberi kode nomor tertentu.

### **3. Confidentiality**

Kerahasiaan informasi yang telah didapat oleh peneliti dari responden akan dijamin kerahasiaanya, hanya data tertentu saja yang berhubungan dengan apa yang akan disajikan sebagai hasil dari penelitian.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Panti Sosial Tresna Werdha terletak di jalan jurusan Malino KM. 29 Samaya, kabupaten Gowa. Luas Lokasi PSTW Sekitar 300 m<sup>2</sup>, dengan jumlah lansia sebanyak 100 orang yang terdiri dari 39 laki-laki dan 61 perempuan. Dan lansia yang menderita hipertensi sebanyak 20 orang, 8 laki-laki dan 12 perempuan. Namun yang berhasil menjadi responden sebanyak 10 orang yang sesuai dengan kriteria inklusi.

#### **B. Hasil Penelitian**

##### **1. Analisa Univariat**

Data primer diambil melalui teknik observasi langsung yaitu, mengukur tekanan darah, menetapkan tingkat hipertensi, dan menetapkan kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Dari hasil pengolahan data yang dilakukan, maka hasil penelitian dapat disajikan sebagai berikut:

## a. Karakteristik Responden

### 1) Distribusi Frekuensi Jenis Kelamin

**Tabel 4.1**  
**Distribusi frekuensi responden berdasarkan jenis kelamin**  
**Di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kab. Gowa**  
**Tahun 2014**

Jenis kelamin	f	%	Total
Laki-laki	4	40,0	4
Perempuan	6	60,0	6

*Sumber : Data Primer 2014*

Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 10 orang, dibagi dalam dua kelompok yaitu 5 orang untuk kelompok perlakuan dan 5 orang untuk kelompok kontrol. Dari hasil analisis univariat dapat dilihat presentasi responden perempuan sebanyak 6 orang (60%) dan laki-laki sebanyak 4 orang (40%). Distribusi frekuensi responden berdasarkan jenis kelamin di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel 4.1 di atas.

### 2) Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Usia

**Tabel 4. 2**  
**Distribusi frekuensi responden berdasarkan usia di Panti**  
**Sosial Trena Werdha Gau Mabaji Kab. Gowa**  
**Tahun 2014**

Usia	f	%	Total
Lanjut Usia	7	70,0	7
Lanjut Usia Tua	3	30,0	3

*Sumber : Data Primer 2014*

Dalam penelitian ini diperoleh responden yang tergolong dalam usia lanjut sebanyak 7 orang (70%) dan tergolong dalam lanjut usia tua sebanyak 3 orang (30%). Distribusi frekuensi responden berdasarkan usia di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel 4.2 di atas.

### 3) Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat Hipertensi

**Tabel 4.3**  
**Distribusi frekuensi responden berdasarkan tingkat hipertensi di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa Tahun 2014**

<b>Derajat Hipertensi</b>	<b>f</b>	<b>%</b>	<b>Total</b>
Ringan	3	30,0	3
Sedang	7	70,0	7

*Sumer : Data Primer 2014*

Pada hasil observasi diperoleh data bahwa lansia yang berada pada derajat hipertensi ringan sebanyak tiga orang (30%) dan derajat hipertensi sedang sebanyak tujuh orang (70%). Distribusi frekuensi responden berdasarkan tingkat hipertensi di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa, dapat dilihat pada tabel 4.3.

#### 4) Distribusi Perubahan Tekanan darah H1 Post Perlakuan

**Tabel 4. 4**  
**Distribusi Perubahan tekanan darah H1 Post Perlakuan**  
**di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Gowa**  
**Tahun 2014**

Tekanan Darah	Terkontrol		Tidak Terkontrol	
	f	%	f	%
<b>H 1</b>	1	20,0	4	80,0

*Sumber : Data Primer*

Berdasarkan tabel di atas, pada hari pertama post perlakuan terdapat satu responden (20%) yang tekanan darahnya terkontrol dan 4 responden (80%) tekanan darahnya masih belum terkontrol

#### 5) Distribusi Perubahan Tekanan darah H5 Post Perlakuan

**Tabel 4. 5**  
**Distribusi Perubahan tekanan darah H5 Post Perlakuan**  
**di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Gowa**  
**Tahun 2014**

Tekanan Darah	Terkontrol		Tidak Terkontrol	
	f	%	f	%
<b>H 5</b>	4	80,0	1	20,0

*Sumber : Data Primer*

Pada hari ke lima post perlakuan terjadi perubahan tekanan darah, empat responden (80%) berada pada kategori tekanan darah terkontrol dan satu (20%) responden tekanan darahnya masih tetap berada pada kategori tidak terkontrol.



## 2. Analisa Bivariat

### a. Pengaruh Pemberian Jus Mentimun Terhadap Perubahan Tekanan Darah

**Tabel 4. 6**  
**Distribusi pengaruh jus mentimun terhadap Perubahan tekanan darah pada Lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa Tahun 2014**

Tekanan Darah	Terkontrol		Tidak Terkontrol		P
	f	%	f	%	
H 1	1	20,0	4	80,0	0,083
H 5	4	80	1	20,0	

*Sumber :Data Primer*

Setelah dianalisa dengan menggunakan uji *T Test Sample Paired*, untuk melihat efektifitas dari pemberian jus mentimun pada responden kelompok perlakuan menunjukkan bahwa tidak ada nilai yang bermakna dari efek pemberian jus mentimun terhadap terkontrolnya tekanan darah dengan tingkat signifikansi  $p: 0,083$ . Karena nilai  $p > 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada efek pemberian jus mentimun terhadap perubahan tekanan darah.

Walaupun secara statistik tidak ada efek pemberian jus mentimun terhadap perubahan tekanan darah, namun secara deskriptif ditemukan adanya perubahan tekanan darah. Dimana pada hari pertama post pemberian jus mentimun terdapat satu responden (80%) tekanan darahnya terkontrol dan empat responden (80%) tekanan darahnya tidak terkontrol,

namun pada hari kelima post perlakuan mulai terjadi perubahan, dari empat responden (80%), yang tekanan darahnya tidak terkontrol berubah menjadi terkontrol dan hanya satu responden (20%) yang tekanan darah tidak terkontrol.

**b. Perbedaan Tekanan Darah Antara Kelompok Perlakuan dengan Kelompok Kontrol**

**Tabel 4. 7**  
**Distribusi Perbedaan Tekanan Darah Antara Kelompok Perlakuan**  
**dengan Kelompok Kontrol pada Lansia**  
**Di Panti Sosial Tresna Werdha**  
**Gau Mabaji Kabupaten Gowa**  
**Tahun 2014**

TD H5	Kel. Kontrol		Kel. Perlakuan		P
	f	%	f	%	
Terkontrol	-	-	4	80,0	0,014
Tidak terkontrol	5	100	1	20,0	

*Sumber : Data Primer*

Setelah di uji statistik dengan menggunakan uji *Mann-Whitney* antara kelompok kontrol dengan kelompok perlakuan terdapat nilai yang bermakna dengan tingkat signifikansi  $p$ : 0,014 karena nilai  $p < 0,05$ , ini berarti bahwa  $H_0$  ditolak sehingga ada perbedaan antara kelompok kontrol dengan kelompok perlakuan, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh dari pemberian jus mentimun terhadap penurunan tekanan darah

dilihat dari perbandingan antara kelompok kontrol dengan kelompok perlakuan.

### **C. Pembahasan**

Hasil dari penelitian ini adalah tidak ada pengaruh pemberian jus mentimun terhadap perubahan tekanan darah pada lansia yang menderita hipertensi. Dengan nilai signifikansi 0,083. Karena nilai  $p > 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh dari pemberian jus mentimun terhadap perubahan tekanan darah. Namun Di lihat secara deskriptif perubahan tekanan darah dari hari pertama post perlakuan sampai pada hari ke lima post perlakuan, di temukan bahwa ada pengaruh dari pemberian jus mentimun terhadap perubahan tekanan. Hal ini digambarkan pada perubahan yang terjadi pada tekanan darah hari pertama post perlakuan dengan hari kelima post perlakuan. Dimana dari semua responden kelompok perlakuan (100 %), yaitu sebanyak 5 orang, pada hari pertama post perlakuan di peroleh bahwa terdapat 4 responden (80%) yang tekanan darahnya berada pada kategori tidak terkontrol dan hanya satu responden (20%) yang berada pada kategori terkontrol. Namun pada hari ke lima post perlakuan terjadi perubahan tekanan darah, dimana dari empat responden (80%) yang tekanan darahnya tidak terkontrol pada hari pertama berubah 90% menjadi terkontrol pada hari ke lima.

Penelitian serupa juga telah dilakukan oleh Zauhani & Zainal pada tahun 2012, yang bertujuan untuk mengidentifikasi penurunan tekanan darah yang

ditimbulkan oleh pemberian jus mentimun. Dalam penelitian ini hanya terdapat kelompok perlakuan sebanyak 20 lansia yang menderita hipertensi tanpa komplikasi (seperti diabetes militus, dll) selama 5 hari berturut-turut. Dalam penelitian ini penentuan tekanan darah pre perlakuan hanya diambil satu kali yaitu pada hari pertama sebelum perlakuan, pengukurannya yaitu pada pagi hari, siang dan malam hari untuk mengetahui tekanan darah rata-rata pre perlakuan. Selama 5 hari setiap lansia mendapat perlakuan jus mentimun sebanyak 100 ml dan diberikan sekali sehari pada jam 09:00 pagi. Kemudian tekanan darah lansia diukur setelah 2 jam, 6 jam dan 9 jam setelah perlakuan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terbukti secara empiris ada efek dari pemberian jus mentimun terhadap penurunan tekanan darah. Dan penurunan yang paling bermakna terjadi pada hari ke-4 dan hari ke-5, pada 2 jam setelah perlakuan. (Zauhani & Zainal, 2012).

Terjadi perubahan tekanan darah secara deskriptif karena kemungkinan dipengaruhi oleh beberapa faktor disamping kandungan yang dimiliki oleh mentimun itu sendiri, diantaranya kondisi tempat tinggal lansia yang berada di satu unit pelayanan terpadu, yang memungkinkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan terkait dengan aktifitas dan pola makan lansia, selain itu juga lansia yang tinggal di panti sosial, biaya hidupnya di tanggulangi oleh pemerintah sehingga akan mengurangi stres lansia dalam masalah ekonomi atau pemenuhan kebutuhan hidup, yang merupakan salah satu faktor penyebab hipertensi atau meningkatnya tekanan darah. Stres merupakan salah satu penyebab peningkatan

tekanan darah pada pasien hipertensi. Stress merupakan suatu tekanan fisik maupun psikis yang tidak menyenangkan. Stress dapat merangsang kelenjar anak ginjal melepaskan hormon adrenalin dan memacu jantung berdenyut lebih cepat dan kuat, sehingga tekanan darah akan meningkat (Gunawan, 2001 dalam hesty dan dian, 2012). Ketika otak menerima sinyal bahwa seseorang sedang stress, perintah untuk meningkatkan sistem simpatetik berjalan dan mengakibatkan hormon stress dan adrenalin meningkat. Lever melepaskan gula dan lemak dalam darah untuk menambah bahan bakar, nafas menjadi lebih cepat sehingga jumlah oksigen bertambah menyebabkan kerja jantung semakin cepat. Susanto (2010) menjelaskan bahwa pelepasan hormon adrenalin oleh anak ginjal sebagai akibat stress berat akan menyebabkan naiknya tekanan darah dan meningkatkan kekentalan darah yang membuat darah mudah membeku atau mengumpal. Dalam penelitian Rinawang (2011) tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan hipertensi pada kelompok lanjut usia di peroleh bahwa diantara 65 responden yang mengalami stress, terdapat 47 responden (72,3%) yang terdiagnosis hipertensi. Sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Ali Mahmudi (2012) tentang hubungan stress dengan kejadian tingkat hipertensi. Terbukti bahwa dari 91 responden , terdapat 70 responden (76,9%) yang mengalami stress dan keseluruhanya mengalami hipertensi.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zuhaini dan zainal (2012) tentang efek jus mentimun terhadap penurunan tekanan darah. Dari 20 lansia yang menjadi responden, terbukti bahwa ada penurunan tekanan darah

selama dilakukan lima hari perlakuan. Sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Dendy,dkk (2012) tentang efek konsumsi jus mentimun terhadap penurunan tekanan darah pada pasien hipertensi yang menggunakan desain *Non-equivalent control group*. Terbukti bahwa ada perbedaan tekanan darah antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol, dimana pada kelompok eksperimen terjadi penurunan tekanan darah sedangkan pada kelompok kontrol tekanan darahnya senantiasa meningkat.

Natrium adalah salah satu komponen yang ada dalam darah.Kadar natrium dalam darah harus seimbangan, tidak boleh terlalu tinggi atau rendah.Pengaturan keseimbangan natrium dalam darah diatur oleh peran ginjal. Ketika kadar natrium dalam darah terlalu tinggi, ginjal akan mengeluarkanya melalui urine, bersamaan dengan air. Ketika kadara natrium dalam darah rendah, ginjal akan menahan natrium agar tidak agar tidak kelura melalui urine.

Mekanisme pengaturan keseimbangan natrium sebenarnya bertujuan untuk mengontrol tekanan darah. Ginjal menegndalikan tekanan darah melalui beberapa cara. Jika tekanan darah meningkat, ginjal akan menambah pengeluaran natrium dan air, sehingga akan mengakibatkan berkurangnya volume darah dan mengembalikan tekanan darah kembali ke normal. Jika tekanan darah menurun, ginjal akan mengurangi pembuangan garam dan air, sehingga volume darah bertambah dan volume darah kembali normal.

Asupan natrium yang terlalu tinggi secara terus-menerus dapat menyebabkan keseimbangan natrium terganggu.Hal ini terjadi jika terjadi

kelainan fungsi ginjal, dimana ginjal tidak mampu lagi membuang sejumlah air dan garam dari dalam tubuh. Pada kondisi ini, natrium tidak dapat atau hanya sedikit dikeluarkan, sehingga kadar natrium dalam darah menjadi tinggi. Penurunan pengeluaran natrium akan diikuti dengan penambahan air. Bertambahnya cairan dalam sirkulasi bisa menyebabkan volume darah dalam tubuh meningkat, sehingga tekanan darah juga meningkat.

Dari penjelasan mekanisme terjadinya peningkatan tekanan darah di atas, dimana kandungan mentimun kalium (potasium) dapat membantu menyeimbangkan keberadaan natrium di dalam tubuh yang merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya hipertensi.

Kalium merupakan ion bermuatan positif, akan tetapi berbeda dengan natrium, kalium terutama terdapat dalam sel, sebanyak 95% kalium berada dalam cairan intraseluler. Di dalam tubuh kalium mempunyai fungsi dalam menjaga keseimbangan cairan elektrolit dan keseimbangan asam basa. Kadar kalium yang tinggi dapat meningkatkan ekskresi natrium, sehingga dapat menurunkan volume darah dan tekanan darah. kalium berperan dalam menjaga keseimbangan natrium dalam cairan ekstraseluler. Dimana, ketika konsentrasi natrium di dalam cairan ekstraseluler meningkat maka akan terjadi peningkatan volume cairan ekstrasel, sehingga volume darah pun akan meningkat. Peningkatan volume darah akan meningkatkan tekanan pengisian sirkulasi rata-rata yang akan menyebabkan peningkatan aliran balik darah vena ke jantung, sehingga curah jantung akan meningkat, ketika curah jantung meningkat maka tekanan darah akan meningkat.

Peran kalium disini adalah untuk meningkatkan ekskresi natrium dalam cairan ekstraseluler. Sehingga volume cairan dalam cairan ekstraseluler akan tetap seimbang.

Pada kelompok perlakuan, responden yang tidak mengalami perubahan secara deskriptif dari efek pemberian jus mentimun, di sebabkan karena adanya faktor usia dan kebiasaan merokok. Sebagaimana yang digambarkan dalam analisa univariat pada distribusi frekuensi berdasarkan usia terdapat tujuh responden (70%) yang berada pada kategori lanjut usia dan tiga responden (30%) berada pada kategori lanjut usia tua. Menurut Sitti Roadhah (2012) semakin tua usia seseorang semakin tinggi tekanan darahnya, hal ini disebabkan karena elastisitas dinding pembuluh darah semakin menurun dengan bertambahnya usia. Penyakit hipertensi umumnya berkembang pada saat umur seseorang mencapai paruh baya yakni cenderung meningkat khususnya yang berusia lebih dari 40 tahun bahkan pada usia lebih dari 60 tahun ke atas. Setelah usia 45 tahun terjadi peningkatan resistensi perifer dan aktivitas simpatik. Dinding arteri akan mengalami penebalan oleh karena adanya penumpukan zat kolagen pada lapisan otot, sehingga pembuluh darah berangsur-angsur menyempit dan menjadi kaku. Disamping itu, pada usia lanjut sensitivitas pengaturan tekanan darah yaitu refleks baroreseptor mulai berkurang, demikian halnya juga dengan peran ginjal, dimana aliran darah ginjal dan laju filtrasi glomerulus menurun. (kumar, et all, 2005, dalam Rinawang 2011). Dalam penelitian Hesti Rahayu (2012) tentang faktor



risiko hipertensi, semakin tinggi usia seseorang tekanan darahnya akan semakin meningkat.

Selain faktor usia yang mempengaruhi efek dari pemberian jus mentimun terhadap penurunan tekanan darah, terdapat juga faktor kebiasaan merokok. Pada responden kelompok perlakuan yang terdiri dari dua orang perempuan dan tiga orang laki-laki, dimana terdapat satu responden yang memiliki kebiasaan merokok, sehingga peneliti berkesimpulan bahwa tidak adanya pengaruh dari pemberian jus mentimun disebabkan karena adanya faktor rokok. Nikotin dalam kandungan rokok dapat meningkatkan denyut jantung dan menyebabkan vasokonstriksi perifer, yang akan meningkatkan tekanan darah arteri pada jangka waktu yang pendek, selama dan setelah merokok (Black & Hawks, 2005, dalam Hesty Rahayu 2012).

Hasil penelitian hesty Rahayu (2012) tentang faktor risiko hipertensi, menjelaskan bahwa 54 dari 81(33,3%) menderita hipertensi. Ini menunjukkan bahwa yang merokok lebih berisiko menderita hipertensi dari pada yang tidak merokok. Hal ini sejalan dengan yang penelitian yang dilakukan oleh Rinawang (2011) tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan hipertensi pada kelompok lanjut usia. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa ada hubungan antara kebiasaan merokok dengan kejadian hipertensi.

#### **D. Keterbatasan Penelitian**


Selama penelitian ini dilakukan peneliti mengalami keterbatasan dan hambatan terkait pelaksanaan intervensi pemberian jus mentimun. Keterbatasan yang di hadapi peneliti adalah peneliti belum dapat secara maksimal mengontrol faktor-faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan tekanan darah antara lain : genetik, umur, jenis kelamin, pola hidup, obesitas, dan stress. Selain itu juga peneliti mempunyai keterbatasan dalam menemukan jumlah sampel yang lebih banyak, sehingga mungkin akan mempunyai nilai yang lebih bermakna ketika diuji secara statistik.

#### **E. Rekomendasi**


Buat yang ingin meneliti lebih jauh tentang manfaat mentimun terhadap penurunan tekanan darah, peneliti merekomendasikan untuk menggunakan jumlah sampel yang lebih banyak dan intervensi yang harus lebih lama dan juga harus diperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan tekanan darah.

## F. Profil Penurunan Tekanan Darah Pada Kelompok Perlakuan


### 1. Ny 'Mn'




### 2. Ny 'D'Ng'




## 3. Tn 'Amr'



## 4. Tn 'Nb'



## 5. Tn 'D'nl'



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa pada bulan Juli 2014 disimpulkan bahwa :

1. Tidak terdapat nilai yang signifikan dari pemberian jus mentimun terhadap kontrol nyatekanan darah pada lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa.
2. Terjadi perubahan tekanan darah pada hari kelima setelah pemberian jus mentimun, yakni dari tidak terkontrol menjadi terkontrol.
3. Terdapat perbedaan tekanan darah antar kelompok perlakuan dengan kelompok kontrol.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

##### **1. Bagi Peneliti**

Dalam melaksanakan penelitian ini, harus lebih diperbanyak sampelnya dan di kontrol faktor-faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan tekanan darah.

## **2. Bagi Instansi Pendidikan**

Demi meningkatkan keilmuan dan pendidikan keperawatan, diharapkan perlu diperhatikan pengembangan informasi dan keterampilan mahasiswa untuk mengutamakan terapi non farmakologi dalam memberikan asuhan keperawatan.

## **3. Bagi Profesi Keperawatan**

Sebagai bahan bacaan untuk mengembangkan ilmu keperawatan, khusus dalam memberikan intervensi secara mandiri.

## **4. Bagi Tempat Penelitian**

Sebagai pertimbangan dalam memilih untuk melakukan terapi pada lansia yang menderita hipertensi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Damayanti, Deni. 2013. *Pintar Meracik Sendiri Ramuan Herbal Untuk Penyakit Kanker, Diabetes Millitus, Hipertensi*. Yogyakarta: Araska.
- Dinas kesehatan kota makassar.  
<http://dinkeskotamakassar.net/download/884makassar-10.2010>
- El Manna M. 2011. *Basmil Keluhan-Keluhan Kesehatan Harian Dengan Obat-Obatan Alami*. Yogyakarta : Flash Books.
- Furi.Syaikh Syafiiyyur Al-Mubarak. 2006. *TAFSIR Ibnu Katsir*. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir
- Guyton, Hill. 2007. *Buku Ajar Fisiologi Kedokteran*. Jakarta : EGC
- Hamka. 1988. *Tafsil Alazhar*. Jakarta: Pustaka Panji Mas
- Hidayat, A.Aziz Alimul. 2011. *Metode Penelitian Keperawatan dan Teknik Analisa Data*. Jakarta : Salemba Medika
- Houn H, Gray, dkk. 2005. *Lecture Notes: Kardiologi Edisi Keempat*. Jakarta: Erlangga
- Katzung, Bertram G. 2001. *Farmakologi Dasar dan Klinik*. Jakarta : Salemba Medika
- Khasanah Nur. 2012. *Waspada Beragam Penyakit Degeneratif Akibat Pola Makan*. Jakarta : Laksana
- Komisi Nasional Lanjut Usia. *Profil Penduduk Lanjut Usia*. 2009. Jakarta
- Kusnul, Zauhani & Muni.r Zaenal. *Efektifitas Pemberian Jus Mentimun Terhadap Penurunan Tekanan Darah*.  
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/26951/4/Chapter%20I2.2012>.

- Mahdiana, Ratna. 2010. *Mencegah Penyakit Kronis Sejak Dini*. Yogyakarta : Tora Book
- MH, Raina. 2011. *Ensiklopei Tanaman Obat Untuk Kesehatan*. Yogyakarta : Absolut
- Muniroh, Lailatul, dkk. 2007. *Pengaruh Pemberian Jus Buah Belimbing & Mentimun Terhadap Penurunan Tekanan Darah Sistolik & Diastolik Penderita Hipertensi*. Bagian Gizi fakultas kesehatan masyarakat dan lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat Universitas Airlangga Surabaya.
- Nisa, Intan. 2012. *Ajaibnya terapi herbal tuntas penyakit darah tinggi*. Jakarta : Dunia Sehat
- Nugroho, Wahjudi. 2000. *Keperawatan Gerontik*. Jakarta : EGC
- Nursalam. 2008. *Konsep Dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan. Pedoman skripsi, tesis dan instrumen instrumen penelitian keperawatan*. Jakarta : Salemba Medika.
- Nurwahyuni, Eka. 2011. *Efek Refleksi Kaki Terhadap Perubahan Tekanan Darah Pada Lansia Di Panti Sosial Tersna Werdah*. Jurusan Keperawatan UIN Alauddin Makassar.
- Price, Sylvia Anderson. 2006. *Patofisiologi; KonsepKlinis Proses-Proses Penyakit*. Jakarta: EGC.
- Santoso, Hieronymus Budi. 2008. *Ragam & Khasiat Tanaman Obat*. Jakarta : Agro Media Pustaka
- Santosa, Idcuq. 2011. *Hipertensi pada Lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Kabupaten Gowa*. UIN Alauddin Makassar.
- Savitri, Evika Sandi. 2008. *Rahasia Tumbuhan Berkhasiat Obat Perspektif Islam*. Malang : UIN-Malang Press
- Shanty Maita. 2011. *Silent Killer Diseases*. Jokjakarta: Javalitera
- Shihab, M Quraish. 2002. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan dan keserasian Al-n*



*Qur'an / M. Quraish Shihab.* Jakarta: Lentera Hati

Smeltzer, Suzanne C. 2002. *Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah Brunner & Suddarth Edisi 8.* Jakarta : EGC.

Stein, Jay H. 2001. *Panduan Klinik Ilmu Penyakit Dalam Edisi 3.* Jakarta: EGC

Roadhah, Sitti. 2012. *Penyakit Tidak Menular, Faktor Risiko dan Pencegahannya.* Makassar: Alauddin University Press

Tim Pengobatan Alternatif Sehat dan Bugar. 2011. *Obat Herbal Lura Biasa.* Jakarta : Pustaka Agung Harapan.

Udjianti, Wajan Juni. 2010. *Keperawatan kardiovaskuler.* Jakarta : Salemba Medika.

**Tests of Normality**

	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
H1	.482	10	.000	.509	10	.000
H2	.381	10	.000	.640	10	.000

a. Lilliefors Significance Correction

**umur**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	lanjutusia	7	70.0	70.0	70.0
	lanjutusia tau	3	30.0	30.0	100.0
	Total	10	100.0	100.0	

**jeniskelamin**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	PEREMPUAN	6	60.0	60.0	60.0
	LAKI-LAKI	4	40.0	40.0	100.0
	Total	10	100.0	100.0	

**derajathipertensi**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	hipertensiringan	3	30.0	30.0	30.0
	hipertensisedang	7	70.0	70.0	100.0
	Total	10	100.0	100.0	

## Kelompokperlakuan

### H1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	terkontrol	1	10.0	20.0	20.0
	tidakterkontrol	4	40.0	80.0	100.0
	Total	5	50.0	100.0	

### H5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	terkontrol	4	40.0	80.0	80.0
	tidakterkontrol	1	10.0	20.0	100.0
	Total	5	50.0	100.0	

## UJI WILCOXON

### Test Statistics<sup>b</sup>

	H5 - H1
Z	-1.732 <sup>a</sup>
Asymp. Sig. (2-tailed)	.083

a. Based on positive ranks.

b. Wilcoxon Signed Ranks Test

## Kelompokkontrol

### H1

		Frequency	Percent	Cumulative Percent
Valid	terkontrol	1	20.0	20.0
	tidakterkontrol	4	80.0	100.0
	Total	5	100.0	

**H5**

		Frequency	Percent	Cumulative Percent
Valid	tidakterkontrol	5	100.0	100.0
	Total	5	100.0	

**UJI WILCOXON****Test Statistics<sup>b</sup>**

	H5 - H1
Z	-1.000 <sup>a</sup>
Asymp. Sig. (2-tailed)	.317

a. Based on negative ranks.

b. Wilcoxon Signed Ranks Test

**TEST MAN WHITNEY****Test Statistics<sup>b</sup>**

	VAR00001
Mann-Whitney U	2.500
Wilcoxon W	17.500
Z	-2.449
Asymp. Sig. (2-tailed)	.014
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	.032 <sup>a</sup>

a. Not corrected for ties.

b. Grouping Variable: kelompok

## A. MASTER TABEL

No	Inisial	Umur	JenisKelamin	DerajatHipertensi	H1	H5
1	Mn	(70 thn) 2	1	2	2	1
2	D'Ng	(67 thn) 2	1	2	1	1
3	Amr	(63 thn) 2	2	2	2	1
4	Nb	(71 thn) 2	2	1	2	1
5	D'nL	(77 thn) 3	2	2	2	2
6	Ma	(70 thn) 2	1	2	2	2
7	Ta	(69 thn) 2	1	2	2	2
8	Li	(64 thn) 3	1	1	1	2
9	Pj	(74 thn) 3	1	1	2	2
10	To	(62 thn) 2	2	2	2	2

Keterangan:

### Umur

1 = 55-59 tahun

2 = 60-70 tahun

3 = 75-90 tahun

### jeniskelamin

1 = perempuan

2 = laki-laki

### Derajathipertensi

1 = 140-159/ 90-99 mmHg (ringan)

2 = 160-179 / 100-109 mmHg (sedang)

3 = 180-209 / 110-119 mmHg (berat)

### H1 & H5

1 = terkontrol

2 = tidakterkontrol

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nurlin Lakai, Lahir di Jikotamo, 11 September 1992 Merupakan anak ke lima dari 6 bersaudara dari pasangan Lakai dan Walua. Penulis memulai Pendidikannya di SD Inpres Jikotamo Kabupaten Halmahera Selatan. Penulis melanjutkan Pendidikannya di SMP Negeri 1 Obi, selesai pada tahun 2007. Selanjutnya penulis melanjutkan ke sekolah SMA Negeri 1 Obi, selesai pada tahun 2010.

Penulis mulai aktif berorganisasi mulai dari SMP, bergabung dalam organisasi siswa atau Osis. Semasa di bangku SMA penulis aktif di Organisasi siswa (OSIS), dan Rohaniawan Islam (ROHIS). Setelah lulus SMA Tahun 2010 penulis melanjutkan ke Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Jurusan Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan. Selama kuliah penulis aktif dalam berberapa Organisasi, diantaranya KAMMI, KPOM, Desaster Nursing Maluku Utara. penulis berharap semua proses yang telah dilewati sampai pada jenjang Sarjana dapat menjadi pelajaran yang berharga buat penulis, dan semoga semangat untuk menuntut ilmu dan bekerja keras selalu tetap terjaga dan bisa lebih di tingkatkan. Amin

**“ Teruslah Bergerak Hingga Kelelahan Itu Lelah Mengikutimu “.**