

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran penyusun yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sri Wahyuningsih

Nim : 70200110096

Jurusan : Kesehatan Masyarakat

Judul : Faktor yang berhubungan dengan kejadian Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) pada balita di Wilayah Pesisir Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima Tahun 2014

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuatkan oleh orang lain sebagian dan seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, September 2014

SRI WAHYUNINGSIH
NIM : 70200110096

Kata Pengantar



Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh,

Segala puji dan syukur terpanjatkan kepada kehadiran Allah SWT, atas limpahan Berkah, Rahmat dan Hidayahnyalah, sehingga penulis di berikan kesempatan, Kesehatan serta Kemampuan sehingga dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “*Faktor yang berhubungan dengan kejadian Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) pada Balita di Wilayah Pesisir Desa Kore Kec.Sanggar Kab.Bima Tahun 2014*”.

Tak lupa juga terkirimnya Shalawat dan salam atas junjungan Kita Nabi Besar Muhammad SAW, yang menghantarkan kita dari zaman jahiliah menuju zaman peradaban saat ini.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis haturkan kepada Ayahanda Nurdin H.K S.pd M.pd dan ibunda Nuraini H.Thalib, yang telah memberikan do’a, bimbingan, curahan kasih sayang, motivasinya dan memberikan bantuan baik dari segi moril maupun material. Terima kasih pula untuk Adikku Sri Aida Sanggarwati, Sri Nurul Aini dan Sri Nurul Ainun atas segala perhatian dan dukungannya.

Terima kasih yang sama penulis sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. H. A.Qadir Gassing HT, MS., sebagai Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
2. Prof. Dr. H. Ahmad M. Sewang, MA, selaku dekan fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. M. Fais Satrianegara,SKM, M.Kes sebagai ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat UIN Alauddin Makassar.
4. Ibu Andi Susilawati, S.Si, M.Kes, sebagai pembimbing 1 yang penuh kasih sayang, kesabaran, pengertian dalam memberikan bimbingan,arahan serta bantuan selama penelitian hingga akhir penyusunan skripsi ini.
5. Ibu St.Raodhah, SKM, M.Kes sebagai pembimbing II yang penuh kasih sayang, kesabaran, pengertian dalam memberikan bimbingan,arahan serta bantuan selama penelitian hingga akhir penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Syahrul Basri., SKM.,M.Kes sebagai penguji 1 (Kompetensi) yang begitu banyak memberi arahan dan bimbingannya hingga selesainya skripsi ini.
7. Bapak Drs. Wahyudin G, M.ag sebagai penguji II (Agama) yang begitu banyak memberi arahan dan bimbingannya hingga selesainya skripsi ini.
8. Om Dr. Abdullah Thalib, S.Ag, M.Ag dan Sri Marlina S.Ag, M.Si yang telah banyak memberikan bimbingan dan bantuannya selama penyusunan skripsi ini.
9. Kepala Puskesmas Sanggar dan seluruh Jajarannya yang telah banyak membantu dalam proses penelitian ini.

10. Kepala Desa Kore dan seluruh Jajarannya yang telah banyak membantu dalam proses penelitian ini.
11. Keluarga besar Kesehatan Masyarakat angkatan 2010, teman-teman Kesehatan Lingkungan dan untuk saudari-saudariku *Syafirah Syam Amir, Hamdana, dan Teti Ervianti* yang telah banyak memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini
12. Untuk “***Muhlis Iskandar***” yang tidak pernah lelah memberikan dukungan dan Bantuan baik moril maupun fisik selama penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat dijadikan rujukan sekaligus referensi dalam penelitian berbasis masyarakat terhadap asset local daerah berkelanjutan dan dapat menjadi bukti pengaplikasian ilmu terapan khususnya di bidang Kesehatan Lingkungan sekaligus sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat sebagai pelengkap tri darma perguruan tinggi terkhusus dalam lingkup UIN Alauddin Makassar, Amin.

Samata, Gowa 2014

Penulis

DAFTAR ISI

Pernyataan Keaslian Skripsi.....	i
Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel	viii
Daftar Lampiran	ix
Abstrak	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Hipotesis	8
D. Definisi Operasional dan ruang lingkup Penelitian	10
E. Kajian Pustaka	13
BAB II TINJAUAN TEORI.....	17
A. Tinjauan umum tentang Bahan Bakar Biomassa	17
B. Tinjauan umum tentang Ventilasi	18
C. Tinjauan umum tentang Kepadatan hunian	22
D. Tinjauan Umum tentang Kebiasaan Merokok	23
E. Tinjauan Umum tentang Infeksi Salruan PernafasanAkut	24
F. Kerangka Pikir	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	36
A. Jenis dan lokasi	36
B. Pendekatan Penelitian.....	36

C. Populasi dan Sampel	37
D. Metode Pengumpulan Data	37
E. Instrumen Penelitian	37
F. Teknik pengolahan dan Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian	42
B. Hasil Penelitian.....	41
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
Daftar Pustaka	71
Lampiran	74

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.	Distribusi Frekuensi Jenis Kelamin Responden	43
2.	Distribusi Frekuensi Umur Responden	43
3.	Distribusi Frekuensi Pekerjaan Responden.....	44
4.	Distribusi Frekuensi Umur Balita	44
5.	Distribusi Frekuensi Jenis Kelamin Balita	45
6.	Distribusi Frekuensi Jenis Biomassa Yang di Gunakan	45
7.	Distribusi Frekuensi Frekuensi Memasak.....	46
8.	Distribusi Frekuensi Keberadaan Anak di Sekitar Tempat Memasak	47
9.	Distribusi Frekuensi Intensitas Keberadaan Anak di Sekitar Tempat Memasak	47
10.	Distribusi Frekuensi Letak Dapur Responden	48
11.	Distribusi Frekuensi ISPA.....	48
12.	Distribusi Frekuensi Keberadaan Anggota Keluarga yang Merokok	48
13.	Distribusi Frekuensi Tempat merokok.....	49
14.	Distribusi Frekuensi Banyaknya Anggota Keluarga yang Merokok	49
15.	Distribusi Kejadian ISPA pada Balita.....	50
16.	Distribusi Penggunaan Jenis Biomassa.....	51
17.	Pengukuran Luas Ventilasi	51
18.	Rasio Kepadatan Hunian.....	52
19.	Distribusi Perilaku merokok	53
20.	Distribusi jenis biomassa dengan kejadian ISPA pada balita	53
21.	Hasil Analisis Luas Ventilasi dengan Kejadian ISPA pada Balita	55
22.	Hasil Analisis Kepadatan Hunian dengan Kejadian ISPA pada Balita.....	56
23.	Hasil Analisis Perilaku Merokok dengan Kejadian ISPA pada Balita	58

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Kuisisioner Penelitian
- Lampiran 2 : Lembar Observasi
- Lampiran 3 : Master Tabel
- Lampiran 4 : Tabel Output Data
- Lampiran 5 : Persuratan
- Lampiran 6 : Dokumentasi
- Lampiran 7 : Riwayat Hidup

ABSTRAK

Nama Penyusun : Sri Wahyuningsih

Nim : 70200110096

Judul : Faktor yang berhubungan dengan kejadian Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) pada Balita di Wilayah Pesisir Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima Tahun 2014

Penelitian ini merupakan penelitian tentang faktor yang berhubungan dengan kejadian Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) pada balita di Wilayah Pesisir. Pokok permasalahan yang di bahas adalah mengenai faktor apa saja yang berhubungan dengan kejadian ISPA pada balita di wilayah pesisir Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima tahun 2014

Jenis Penelitian ini adalah survey analitik dengan pendekatan *cross sectional* . Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh balita yang bertempat tinggal di wilayah Pesisir Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima tahun 2014. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode simple random sampling dimana terdapat 70 orang balita sebagai sampel dalam penelitian ini.

Berdasarkan analisis *chi-square* didapatkan bahwa (1) Ada hubungan penggunaan jenis bahan bakar biomassa dengan kejadian ISPA pada balita di wilayah pesisir Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima tahun 2014 ($p = 0,001$) (2) Ada hubungan Luas ventilasi dengan kejadian Infeksi Saluran Pernafasan Akut

(ISPA) pada balita balita di wilayah pesisir Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima tahun 2014 ($p = 0,000$) (3) Ada hubungan Kepadatan Hunian dengan kejadian Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) pada balita di wilayah pesisir Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima tahun 2014 ($p = 0,000$) (4) Tidak ada hubungan Perilaku merokok dengan kejadian Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) pada balita di wilayah Pesisir Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima tahun 2014 ($p = 0,084$)

Implikasi dari penelitian ini (1) Disarankan kepada pihak puskesmas untuk melakukan penyuluhan kesehatan tentang ISPA pada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengurangi angka kejadian ISPA pada Balita (2) Disarankan kepada masyarakat agar mengingatkan anggota keluarganya merokok agar ketika merokok tidak berada bersama balita untuk mencegah balita terpapar dari asap rokok.

Kata Kunci : Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA), Jenis Biomassa yang digunakan, Luas Ventilasi, Kepadatan Hunian dan Perilaku merokok

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan dibidang kesehatan sebagai bagian dari pembangunan nasional yang ditata dalam Sistem Kesehatan Nasional diarahkan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal dan produktif sebagai perwujudan dari kesejahteraan umum seperti yang dimaksud dalam pembukaan Undang-undang dasar 1945 dan Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal bagi setiap penduduk, pelayanan kesehatan harus dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu dalam pelayanan kesehatan perorangan, pelayanan kesehatan keluarga maupun pelayanan kesehatan masyarakat (Depkes RI, 2006).

Upaya pemerintah untuk terus memperluas cakupan pembangunan kesehatan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, harus disertai upaya mendorong kemandirian individu, keluarga dan masyarakat untuk sehat. Sebagai upaya mewujudkan Visi Indonesia Sehat 2010, Pemerintah telah menyusun berbagai program pembangunan dalam bidang kesehatan antara lain kegiatan Pemberantasan Penyakit Menular (P2M) baik yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif di semua aspek lingkungan kegiatan pelayanan kesehatan (WHO, 2003).

Dalam Repelita VI, Penyehatan perumahan dan lingkungan merupakan salah satu kegiatan pokok dalam program penyehatan lingkungan pemukiman sebagai kelanjutan dari Pelita V. Penyehatan perumahan dan lingkungan itu sendiri diutamakan pada daerah yang mempunyai resiko tinggi terhadap kemungkinan penularan penyakit, seperti Diare, TB Paru, Kecacingan, Demam Berdarah Dengue (DBD), dan Infeksi saluran Pernafasan Akut (ISPA) dengan mencegah adanya rumah-rumah yang tidak memenuhi syarat kesehatan.

WHO menuturkan, ISPA merupakan salah satu penyebab kematian tersering pada anak di negara yang sedang berkembang. Infeksi Saluran Pernafasan Akut ini menyebabkan empat dari 15 juta perkiraan kematian pada anak berusia di bawah 5 tahun pada setiap tahunnya dan sebanyak dua pertiga dari kematian tersebut terjadi pada bayi. Penyakit ISPA masih merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang utama.

Dari tahun ke tahun, prevalensi ISPA di Indonesia tetap tinggi, yaitu sekitar 21,6% di daerah perkotaan. Hasil Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) menunjukkan jumlah balita penderita pneumonia menurun dari 804.937 pada tahun 1999 menjadi 479.283 pada tahun 2000. Namun dari tahun 2000 hingga 2003 jumlah balita penderita ISPA cenderung menetap di angka yang sama meski pemerintah telah mencanangkan program pemberantasan ISPA.

Hasil survei kesehatan nasional di Indonesia tahun 2001 menunjukkan bahwa proporsi kematian bayi akibat ISPA masih 28 % artinya bahwa dari 100 bayi meninggal 28 disebabkan oleh penyakit ISPA dan terutama 80 % kasus kematian ISPA pada balita adalah akibat *Pneumonia*. Angka kematian balita akibat pneumonia pada akhir tahun 2000 di perkirakan sekitar 4,9 / 1000 balita, berarti terdapat 140.000 balita yang meninggal setiap tahunnya akibat pneumonia, atau rata-rata 1 anak balita Indonesia meninggal akibat pneumonia setiap 5 menit (Wahyuni, 2008 dalam Winda 2006).

Secara global, tingkat kematian balita mengalami penurunan sebesar 41%, dari tingkat estimasi 87 kematian per 1000 kelahiran hidup pada tahun 1990 menjadi 51 kematian per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2011 (WHO, 2012). *World Health Organization* (WHO) memperkirakan insidensi ISPA di negara berkembang 0,29% (151 juta jiwa) dan negara industri 0,05% (5 juta jiwa) (WHO, 2012). ISPA menempati urutan pertama penyakit yang diderita pada kelompok bayi dan balita di Indonesia. Prevalensi ISPA di Indonesia adalah 25,5% dengan morbiditas pneumonia pada bayi 2,2% dan pada balita 3%, sedangkan mortalitas pada bayi 23,8% dan balita 15,5% (Depkes, 2007).

Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) diawali dengan panas disertai salah satu atau lebih gejala, tenggorokan terasa sakit atau nyeri saat menelan, pilek, batuk kering atau berdahak. *Period prevalence* ISPA dihitung dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Lima provinsi dengan ISPA tertinggi adalah Nusa Tenggara Timur (41,7%), Papua (31,1%), Aceh (30,0%), Nusa Tenggara

Barat (28,3%), dan Jawa Timur (28,3%). Pada Riskesdas 2007, Nusa Tenggara Timur juga merupakan provinsi tertinggi dengan ISPA. *Period prevalence* ISPA Indonesia menurut Riskesdas 2013 (25,0%) tidak jauh berbeda dengan 2007 (25,5%) (Riskesdes 2013).

Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) tersebar di seluruh Provinsi NTB dengan rentang prevalensi yang sangat bervariasi (14,5–42,8%). Prevalensi di atas 30% ditemukan di 4 Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Bima, Dompu dan Kota Bima (Riskesdes Provinsi NTB, 2007)

Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) diawali dengan panas disertai salah satu atau lebih gejala, tenggorokan terasa sakit atau nyeri saat menelan, pilek, batuk kering atau berdahak. *Period prevalence* ISPA dihitung dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Lima provinsi dengan ISPA tertinggi adalah Nusa Tenggara Timur (41,7%), Papua (31,1%), Aceh (30,0%), Nusa Tenggara Barat (28,3%), dan Jawa Timur (28,3%). Pada Riskesdas 2007, Nusa Tenggara Timur juga merupakan provinsi tertinggi dengan ISPA. *Period prevalence* ISPA Indonesia menurut Riskesdas 2013 (25,0%) tidak jauh berbeda dengan 2007 (25,5%) (Riskesdes 2013).

Pencemaran udara di dalam rumah banyak terjadi di negara-negara berkembang. Diperkirakan setengah dari rumah tangga di dunia memasak dengan bahan bakar yang belum diproses seperti kayu, sisa tanaman dan batubara sehingga akan melepaskan emisi sisa pembakaran di dalam ruangan

tersebut. Pembakaran pada kegiatan rumah tangga dapat menghasilkan bahan pencemar antara lain asap, debu, *grid* (pasir halus) dan gas seperti CO dan NO.

Tingkat polusi yang dihasilkan bahan bakar menggunakan kayu jauh lebih tinggi dibandingkan bahan bakar menggunakan gas. Sejumlah penelitian menunjukkan paparan polusi dalam ruangan meningkatkan risiko kejadian ISPA pada anak-anak. Hasil Penggunaan bahan bakar biomassa, menghasilkan antara lain CO, NO_x, SO₂, Ammonia, HCL dan Hidrokarbon antara lain Formal Dehide, Benzena dan Benzo (a) pyrene merupakan karsinogen potensial dan partikulat (SPM : Suspended Partikulate Mater), Hidrokarbon dan CO di hasilkan dalam kadar tinggi. Zat-zat yang dihasilkan dari penggunaan bahan bakar Biomassa merupakan zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan yang dapat menyebabkan timbulnya berbagai macam penyakit, contohnya Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA).

Berdasarkan hasil observasi awal peneiti, di wilayah Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima masih banyak masyarakat yang menggunakan Bahan bakar biomassa sebagai bahan bakar utama, Hal ini di karenakan jauhnya akses dari Wilayah pesisir menuju Kota, selain itu faktor kondisi sosial ekonomi juga menjadi penyebab masih banyaknya masyarakat yang menggunakan biomassa untuk memasak.

Selain berasal dari Asap pembakaran Bahan bakar Biomassa pencemaran udara dalam rumah juga dapat bersal dari Paparan Asap rokok.


Berdasarkan laporan Badan Lingkungan Hidup Amerika mencatat tidak kurang dari 300 ribu anak-anak berusia 1 sampai 5 tahun menderita bronchitis dan pneumonia, karena turut menghisap asap rokok yang dihembuskan orang di sekitarnya terutama ayah dan ibunya. Penelitian Winarni, dkk (2010), ada pengaruh perilaku merokok orang tua dan anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah dengan kejadian ISPA pada balita di wilayah kerja Puskesmas Sempor II.

Perumahan yang tidak dilengkapi dengan ventilasi udara yang baik akan menyebabkan sirkulasi udara tidak lancar dan suhu ruangan tidak sesuai. Apabila suhu ruangan tidak sesuai maka akan menyebabkan terjadinya radiasi panas yang langsung ke arah tubuh, atau hilangnya panas tubuh karena udara dingin. Faktor lingkungan rumah seperti ventilasi juga berperan dalam penularan ISPA, dimana ventilasi dapat memelihara kondisi udara yang sehat bagi manusia.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa banyak faktor yang dapat menjadi penyebab terjadinya Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA). Infeksi saluran Pernafasan Akut (ISPA) merupakan salah satu penyakit dengan angka kesakitan dan angka kematian yang cukup tinggi, maka perlu dilakukan penanganan yang terpadu, terarah yang di tuju pada perbaikan mutu lingkungan perumahan. Menurut HL Blum, faktor – faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan terdiri dari ; faktor lingkungan

(Environment), faktor perilaku (behavior), faktor pelayanan kesehatan (Health service) dan faktor keturunan (Heredity).

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Qashash ayat 77 :



Terjemahannya :

“dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan “ (Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya. 2000)

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah sangat tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna,hendaknya kita dapat menjaga apa yang telah dianugerahkan Allah kepada Kita.

Dari pemaparan diatas dapat dilihat bahwa banyak faktor yang berpengaruh terhadap kejadian ISPA, yang dapat meningkatkan angka kesakitan dan angka kematian. Hal inilah yang mendasari penulis untuk meneliti faktor-faktor mempengaruhi kejadian ISPA pada balita di Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka di tarik rumusan masalah “Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kejadian Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) pada Balita di Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima ?”

C. Hipotesis

Hipotesis adalah suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan sementara tentang hubungan antar dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2011)

1. Hipotesis Alternatif (Ha)
 - a. Ada hubungan penggunaan jenis Biomassa dengan kejadian Infeksi saluran Pernafasan Akut (ISPA) pada Balita di Desa Kore kecamatan Sanggar Kabupaten Bima
 - b. Ada hubungan Luas Ventilasi dengan Kejadian Infeksi saluran Pernafasan Akut (ISPA) pada balita di Desa Kore kecamatan Sanggar Kabupaten Bima
 - c. Ada hubungan Kepadatan Hunian dengan kejadian Infeksi saluran Pernafasan Akut (ISPA) pada balita di Desa Kore kecamatan Sanggar Kabupaten Bima

- d. Ada hubungan Perilaku merokok dengan kejadian Infeksi saluran Pernafasan Akut (ISPA) pada balita di Desa Kore kecamatan Sanggar Kabupaten Bima

2. Hipotesis Null (H0)

- a. Tidak ada hubungan jenis biomassa yang digunakan dengan kejadian Infeksi saluran Pernafasan Akut (ISPA) pada balita di Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima
- b. Tidak ada hubungan Luas Ventilasi dengan kejadian Infeksi saluran Pernafasan Akut (ISPA) pada balita di Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima
- c. Tidak ada hubungan Kepadatan hunian bukan dengan kejadian Infeksi saluran Pernafasan Akut (ISPA) pada balita di Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima
- d. Tidak ada hubungan Perilaku Merokok dengan kejadian Infeksi saluran Pernafasan Akut (ISPA) pada balita di Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima

D. Definisi Operasional dan ruang lingkup penelitian

1. Definisi Operasional

- a. Infeksi saluran pernafasan Akut (ISPA)

Infeksi saluran Pernafasan Akut (ISPA) adalah penyakit yang menyerang salah satu bagian dan atau lebih dari saluran pernafasan mulai dari hidung hingga alveoli termasuk jaringan adneksanya seperti sinus, rongga telinga tengah dan pleura yang dapat disebabkan oleh virus, bakteri dan sebagainya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data awal tentang Penderita Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) yang diperoleh dari Puskesmas Kecamatan Sanggar.

Menderita : Bila ditandai dengan adanya batuk, pilek, serak, demam dan disertai nafas cepat ataupun sesak berdasarkan *medical record* dari pelaksana kesehatan atau tenaga kesehatan yang kompeten

Kontrol : Bila tidak terdapat tanda seperti di atas

b. Ventilasi

Ventilasi adalah lubang angin yang berfungsi untuk pertukaran udara dan masuknya cahaya kedalam suatu ruangan dan luas minimalnya adalah 10% dari luas lantai dengan ukuran m^2 . Pengukuran dilakukan di tempat yang dominan atau sering di tempati

oleh balita, seperti Kamar, ruang tamu, ruang keluarga dan Dapur dengan menggunakan meteran.

Memenuhi syarat : Apabila luas ventilasi minimum
10% dari luas lantai

Tidak Memenuhi syarat : Apabila luas ventilasi kurang dari
10% luas lantai

c. Penggunaan bahan bakar biomassa

Bahan bakar biomassa adalah bahan bakar yang berasal dari sisa-sisa tanaman dari alam yang dapat dimanfaatkan untuk memasak dan menimbulkan polusi dalam rumah.

Menggunakan : Apabila menggunakan bahan bakar
biomassa (Kayu, sekam atau jerami)
untuk memasak

Tidak Menggunakan : Apabila tidak menggunakan bahan
bakar biomassa biomassa (Kayu,
sekam atau jerami) untuk memasak

d. Kepadatan Hunian

Berdasarkan Permenkes 829/ MENKES/ SK/ VII/ 1999 kepadatan hunian dikatakan memenuhi syarat apabila luas kamar tidur 8m^2 untuk dua orang Pengukuran luas ruangan dilakukan dengan menggunakan rollmeter.

Memenuhi Syarat : Apabila luas kamar tidur 8m^2 untuk dua orang

Tidak memenuhi syarat : Apabila luas kamar tidur kurang dari 8m^2 untuk dua orang

e. Perilaku merokok

Perilaku merokok anggota keluarga dapat menjadi salah satu faktor terjadinya Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) pada balita.

Ada : Apabila terdapat anggota keluarga yang merokok

Tidak Ada : Apabila tidak terdapat anggota keluarga yang merokok

2. *Ruang Lingkup Penelitian*

a. Lingkup Keilmuan

Lingkup penelitian adalah Bidang ilmu Kesehatan Masyarakat khususnya Kesehatan Lingkungan

b. Lingkup Masalah

Lingkup masalah adalah Hubungan Penggunaan bahan bakar Biomassa, luas ventilasi, Kepadatan Hunian dan perilaku merokok terhadap kejadian Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) pada balita di Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima

c. Lingkup Sasaran

Lingkup sasaran mencakup Balita yang berada di Wilayah Pesisir Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima

d. Lingkup Lokasi

Lokasi penelitian meliputi wilayah Pesisir Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima

f. Lingkup Metode

Metode penelitian merupakan Survei Analitik dengan pendekatan Cross Sectional

E. Kajian Pustaka

Adapun penelitian terdahulu yang meneliti tentang Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) pada balita antara lain :

Peneliti (Tahun)	Judul	Desain Penelitian	Hasil dan Kesimpulan
Vina Mairuhu Agus Bintara Birawida Syamsuar Manyyulei (2012) Jurnal yang di publikasikan	Faktor yang berhubungan dengan kejadian ISPA Pada Balita di Pulau Barrang Lompo	Desain penelitian pada penelitian ini menggunakan desain penelitian Cross Sectional	Terdapat hubungan penggunaan Obat nyamuk dan status Gizi dengan kejadian ISPA pada balita di pulau Barrang Lompo Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar, sedangkan tidak ada hubungan antara suhu ruangan dengan kejadian ISPA pada Balita di Pulau Barrang Lompo
Faktor yang berhubungan	Ribka Rerung Layuk	Jenis penelitian ini	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

dengan kejadian ISPA pada Balita di Lembang Batu Sura' (2012) Jurnal yang terpublikasikan	Nur Nasry Noer Wahiduddin	merupakan penelitian Observasional dengan desain Cross sectional Study	proporsi balita ISPA sebesar 59.4%, perilaku merokok anggota keluarga dalam rumah sebesar 49.0%, penggunaan kayu bakar sebagai bahan bakar dalam rumah tangga sebesar 78.1%, status imunisasi lengkap sebesar 95.8%, balita BBLR sebesar 13.5%, dan umur berisiko tinggi 50%. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa perilaku merokok anggota keluarga dalam rumah ($p=0,000$) dan penggunaan kayu bakar sebagai bahan bakar dalam rumah tangga ($p=0,000$) berhubungan dengan kejadian ISPA pada balita, sedangkan status imunisasi ($p=0,144$), BBLR ($p=0,436$), dan umur ($p=0,061$) tidak berhubungan secara signifikan dengan kejadian ISPA pada balita
Faktor yang berhubungan dengan kejadian ISPA pada Balita di desa Bontongan Kabupaten Enrekang (2012) Jurnal terpublikasikan	Marhamah A.Arsunan Arsin Wahidudin	Jenis penelitian ini merupakan penelitian Observasional dengan desain Cross sectional Study	Analisis data dilakukan dengan CI=95% serta menggunakan uji <i>Chi Square</i> dengan $\alpha=0,05$. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proporsi balita ISPA sebesar 44.9%, status imunisasi lengkap sebesar 70.9%,

			<p>pemberian kapsul vitamin A sebesar 82.7%, pengetahuan ibu cukup sebesar 57.5%, ventilasi rumah memenuhi syarat kesehatan sebesar 22.8%, dan terpapar asap rokok sebesar 62.2%. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa status imunisasi ($p=0.045$), pemberian kapsul vitamin A ($p=0.039$) dan keberadaan anggota keluarga yang merokok di dalam rumah ($p=0.026$) berhubungan dengan kejadian ISPA pada anak balita, sedangkan pengeahuan ibu ($p=0.790$) dan ventilasi rumah ($p=0.826$) tidak berhubungan dengan kejadian ISPA.</p>
--	--	--	---

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Tinjauan umum tentang Bahan bakar Biomassa

Biomassa di definisikan sebagai bagian dari tumbuhan yang dapat digunakan sebagai bahan bakar padat atau bisa juga terlebih dahulu di ubah ke dalam bentuk cair atau bentuk gas.

Bahan bakar biomassa adalah bahan bakar yang diperoleh dari biomassa organisme atau produk dari metabolisme, Biasanya bahan bakar biomassa di bakar untuk melepas energi kimia yang tersimpan di dalamnya.

Biomassa terutama dalam bentuk kayu bakar merupakan sumber energi dunia yang tertua. Bahkan di Negara berkembang yang bergerak menuju kearah industrialisasi, biomassa masih merupakan komponen yang besar dalam pola pemakaian energi yang berasal dari biomassa terutama pemanfaatan kayu bakar, limbah pertanian dan tinja hewan mencapai 60% seluruh konsumsi energi (Saleh L,2006)

Menurut WHO ada kesamaan antara asap rokok dengan asap dari pembakaran biomassa. Sedangkan menurut Wardhana (1995) asap rokok mengeluarkan CO dengan konsentrasi lebih dari 20.000 ppm. Asap pembakaran kayu bakar dapat menghasilkan antara lain CO, NO_x, SO₂, Ammonia, HCl dan hidrokarbon.

Aktifitas manusia berperan dalam penyebaran partikel udara yang berbentuk partikel – partikel kecil padatan dan droplet cairan, misalnya dalam bentuk asap dari proses pembakaran di dapur, terutama dari arang. Partikel dari pembakaran di dapur biasanya berukuran diameter antara 1 – 10 mikron. Polutan partikel masuk ke dalam tubuh manusia terutama melalui sistem pernafasan, oleh karena itu pengaruh yang merugikan langsung terjadi terutama pada sistem pernafasan.

Infeksi saluran Pernafasan Akut (ISPA) disebabkan oleh bakteri atau virus yang masuk ke saluran nafas. Salah satu penyebab ISPA yang lain adalah asap pembakaran bahan bakar kayu yang biasanya digunakan untuk memasak. Asap bahan bakar kayu ini banyak menyerang lingkungan masyarakat, terutama ibu-ibu rumah tangga yang selalu melakukan aktifitas memasak tiap hari dengan menggunakan bahan bakar kayu, gas maupun minyak. Timbulnya asap tersebut tanpa disadarinya telah mereka hirup sehari-hari, sehingga banyak masyarakat mengeluh batuk, sesak nafas dan sulit untuk bernafas. polusi dari bahan bakar kayu tersebut mengandung zat-zat seperti *Dry basis, Ash, Carbon, Hidrogen, Sulfur, Nitrogen* dan *Oxygen* yang sangat berbahaya bagi kesehatan (Depkes RI, 2002).

Pembakaran dari biomassa menghasilkan asap yang berbahaya bagi kesehatan. Dimana asap adalah partikel zat karbon yang ukurannya kurang dari 0,5 μm , sebagai akibat dari pembakaran yang tidak sempurna yang menghasilkan

karbon. Bahan pencemar dalam asap yang dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar biomassa dan dapat berbahaya bagi kesehatan antara lain:

1. Partikel dalam asap pembakaran antara lain Timbal (Pb), Besi (Fe), Mangan (Mn), Arsen (As), Cadmium (Cd). Paparan partikel dengan kadar tinggi akan menimbulkan endema pada trachea, bronchi dan bronchus, yang dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan sampai timbulnya kanker paru.
2. Senyawa-senyawa hidrokarbon yang bersifat karsinogenik.
3. Formaldehid dapat mengakibatkan iritasi pada mata, hidung, alat pernafasan bagian atas.
4. Karbon monoksida dapat mengakibatkan persediaan oksigen dalam tubuh berkurang akibat terbentuknya ikatan CO dengan hemoglobin.
5. Nitrogen dioksida (NO₂) paling banyak mempengaruhi kesehatan pada paru bagian dalam.
6. Sulfur dioksida (SO₂) dapat masuk ke dalam paru-paru dan mengganggu fungsi paru-paru

B. Tinjauan Umum Tentang Ventilasi

1. Pengertian Ventilasi

Ventilasi adalah tempat proses penyediaan udara segar ke dalam dan pengeluaran udara kotor dari suatu ruangan tertutup secara alamiah maupun mekanis. Tersedianya udara segar dalam rumah atau ruangan

amat dibutuhkan manusia, sehingga apabila suatu ruangan tidak mempunyai sistem ventilasi yang baik dan over crowded maka akan menimbulkan keadaan yang dapat merugikan kesehatan.

2. Fungsi Ventilasi

Fungsi dari ventilasi dapat dijabarkan sebagai berikut (Satwiko, 2005) :

- a. Mensuplai udara bersih yaitu udara yang mengandung kadar oksigen yang optimum bagi pernapasan.
- b. Membebaskan udara ruangan dari bau-bauan, asap ataupun debu dan zat-zat pencemar lain dengan cara pengenceran udara.
- c. Mensuplai panas agar hilangnya panas badan seimbang.
- d. Mensuplai panas akibat hilangnya panas ruangan dan bangunan
- e. Mengeluarkan kelebihan udara panas yang disebabkan oleh radiasi tubuh, kondisi, evaporasi ataupun keadaan eksternal.
- f. Mendisfungsikan suhu udara secara merata

3. Jenis Ventilasi Rumah

Berdasarkan kejadiannya, maka ventilasi dapat dibagi ke dalam dua jenis, yaitu :

- a. Ventilasi Alam

Ventilasi alam berdasarkan pada tiga kekuatan, yaitu: daya difusi dari gas-gas, gerakan angin dan gerakan massa di udara karena perubahan temperatur. Ventilasi alam ini mengandalkan

pergerakan udara bebas (angin), temperatur udara dan kelembabannya. Selain melalui jendela, pintu dan lubang angin, maka ventilasi pun dapat diperoleh dari pergerakan udara sebagai hasil sifat *porous* dinding ruangan, atap dan lantai.

b. Ventilasi Buatan

Pada suatu waktu, diperlukan juga ventilasi buatan dengan menggunakan alat mekanis maupun elektrik. Alat-alat tersebut diantaranya adalah kipas angin, *exhauster* dan AC (*air conditioner*).

4. Syarat Ventilasi

Persyaratan ventilasi yang baik adalah sebagai berikut (Mukono, 1997) :

- a. Luas lubang ventilasi minimal 10% luas lantai
- b. Ventilasi sering di buka untuk keluar masuk udara
- c. Udara yang masuk harus bersih, tidak dicemari asap dari sampah atau pabrik, knalpot kendaraan, debu dan lain-lain
- d. Aliran udara diusahakan *cross ventilation* dengan menempatkan lubang ventilasi berhadapan antar dua dinding. Aliran udara ini jangan sampai terhalang oleh barang-barang besar, misalnya lemari, dinding, sekat dan lain-lain.

5. Penilaian Ventilasi

Secara umum, penilaian ventilasi rumah dengan cara membandingkan antara luas ventilasi dan luas lantai rumah, dengan

menggunakan *Role meter*. Menurut indikator pengawasan rumah, luas ventilasi yang memenuhi syarat kesehatan adalah 10% luas lantai rumah dan luas ventilasi yang tidak memenuhi syarat kesehatan adalah $< 10\%$ luas lantai rumah.

Rumah dengan luas ventilasi yang tidak memenuhi syarat kesehatan akan membawa pengaruh bagi penghuninya. Luas ventilasi rumah yang $< 10\%$ dari luas lantai (tidak memenuhi syarat kesehatan) akan mengakibatkan berkurangnya konsentrasi oksigen dan bertambahnya konsentrasi karbondioksida yang bersifat racun bagi penghuninya. Disamping itu, tidak cukupnya ventilasi akan menyebabkan peningkatan kelembaban ruangan karena terjadinya proses penguapan cairan dari kulit dan penyerapan. Kelembaban ruangan yang tinggi akan menjadi media yang baik untuk tumbuh dan berkembang biaknya bakteri-bakteri patogen termasuk kuman.

Rumah yang memenuhi syarat ventilasi baik akan mempertahankan kelembaban yang sesuai dengan temperatur kelembaban udara (Azwar, 1990). Menurut Frinck (1993) setiap ruang yang di pakai sebagai ruang kediaman sekurang-kurangnya terdapat satu jendela lubang ventilasi yang langsung berhubungan dengan udara luar bebas rintangan dengan luas 10% luas lantai.

6. Akibat Yang Ditimbulkan Karena Ventilasi Yang Kurang

Kurangnya ventilasi akan menyebabkan kurangnya O₂ (oksigen) di dalam rumah yang berarti kadar CO₂ (karbondioksida) yang bersifat racun bagi penghuninya menjadi meningkat. Disamping itu tidak cukupnya ventilasi akan menyebabkan kelembaban udara di dalam ruangan naik. Luas ventilasi yang tidak memenuhi syarat kesehatan akan mengakibatkan terhalangnya proses pertukaran aliran udar dan sinar matahari yang masuk ke dalam rumah, akibatnya kuman yang ada di dalam rumah tidak dapat keluar dan ikut terhirup bersama udara yang dihirup oleh orang yang menempati rumah tersebut.

C. Tinjauan Umum Tentang Kepadatan Hunian

Setiap rumah harus mempunyai bagian ruangan yang sesuai dengan fungsinya. Penentuan bentuk, ukuran dan jumlah ruangan perlu memperhatikan standar minimal jumlah ruangan. Sebuah rumah tinggal harus mempunyai ruangan yaitu kamar tidur, ruang tamu, ruang makan, dapur, kamar mandi dan kakus. Berdasarkan Permenkes 829/MENKES/SK/VII /1999 Kepadatan hunian dikatakan memenuhi syarat apabila menyediakan luas kamar tidur 8m² untuk dua orang. Bangunan yang sempit dan tidak sesuai dengan jumlah penghuninya akan mempunyai dampak kurangnya oksigen di dalam ruangan sehingga daya tahan penghuninya menurun, dan dapat menyebabkan timbulnya penyakit saluran pernafasan seperti ISPA. Kepadatan di dalam kamar terutama kamar balita yang

tidak sesuai dengan standar akan meningkatkan suhu ruangan yang disebabkan oleh pengeluaran panas badan yang akan meningkatkan kelembaban akibat uap air dari pernapasan tersebut. Dengan demikian, semakin banyak jumlah penghuni ruangan tidur maka semakin cepat udara (Widoyono, 2008)

D. Tinjauan umum tentang Perilaku Merokok

Kesehatan yang kian mengkuatirkan di Indonesia adalah semakin banyaknya jumlah perokok yang berarti semakin banyak penderita gangguan kesehatan akibat merokok ataupun menghirup asap rokok (bagi perokok pasif) yang umumnya adalah perempuan dan anak-anak. Hal ini tidak bisa dianggap sepele karena beberapa penelitian memperlihatkan bahwa justru perokok pasiflah yang mengalami risiko lebih besar daripada perokok sesungguhnya (Dachroni, 2002).

Merokok dapat menyebabkan perubahan struktur dan fungsi saluran pernapasan dan jaringan paru-paru. Perubahan anatomi saluran pernapasan menyebabkan fungsi paru-paru terganggu. Paparan asap rokok pada ibu hamil, bayi, balita dan anak-anak dapat meningkatkan risiko bayi mengalami kondisi kesehatan yang buruk seperti terjadinya penyakit ISPA. Paparan asap rokok pada ibu hamil, bayi, balita dan anak-anak dapat meningkatkan risiko bayi mengalami kondisi kesehatan yang buruk seperti terjadinya penyakit ISPA.

Berdasarkan hasil penelitian Studi Epidemiologi menunjukkan bukti yang kuat kuat bahwa paparan asap rokok lingkungan terhadap anak berkaitan

peningkatan jumlah penyakit saluran nafas bawah, eksaserbasi asma, dan SIDS. Paparan semasa kanak-kanak juga dapat menyebabkan pertumbuhan kanker semasa dewasa. Paparan asap rokok lingkungan (salah satu keluarga adalah perokok) setelah bayi lahir menyebabkan peningkatan resiko penyakit pernafasan akut pada anak. Juga terbukti ada hubungan antara orang tua perokok khususnya dengan penyakit saluran nafas bawah akut pada tahun kedua dan tahun ketiga kehidupan anak (Rad Marssy,2007).

Terdapat seorang perokok atau lebih dalam rumah akan memperbesar risiko anggota keluarga menderita sakit, seperti gangguan pernafasan, memperburuk asma dan memperberat penyakit *angina pectoris* serta dapat meningkatkan resiko untuk mendapat serangan ISPA khususnya pada balita. Anak-anak yang orang tuanya perokok lebih mudah terkena penyakit saluran pernafasan seperti *flu*, *asma pneumonia* dan penyakit saluran pernafasan lainnya. Gas berbahaya dalam asap rokok merangsang pembentukan lendir, debu dan bakteri yang tertumpuk tidak dapat dikeluarkan, menyebabkan *bronchitis* kronis, lumpuhnya serat *elastin* di jaringan paru mengakibatkan daya pompa paru berkurang, udara tertahan di paru-paru dan mengakibatkan pecahnya kantong udara (Dachroni, 2002)

E. Tinjauan Umum Tentang Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA)

a. Definisi Infeksi saluran Pernafasan Akut (ISPA)

Istilah Infeksi saluran Pernafasan Akut (ISPA) mengandung tiga unsur yaitu infeksi, saluran pernafasan dan akut. Infeksi adalah

masuknya kuman atau mikroorganisme kedalam tubuh manusia dan berkembang biak sehingga menimbulkan gejala penyakit. Adapun saluran pernafasan adalah organ dimulai dari hidung sampai alveoli beserta organ adneksa seperti sinus-sinus, rongga telinga, dan pleura. Infeksi akut adalah infeksi yang berlangsung sampai dengan 14 hari. Batas 14 hari diambil untuk menunjukkan proses akut meskipun untuk beberapa penyakit yang dapat digolongkan dalam Infeksi saluran Pernafasan Akut (ISPA) proses ini dapat berlangsung lebih dari 14 hari. Dengan demikian Infeksi saluran Pernafasan Akut (ISPA) secara anatomis mencakup saluran pernafasan bagian bawah (termasuk jaringan paru-paru) dan organ adneksanya saluran pernafasan (Depkes RI, 2002).

Rumah yang tidak sehat erat kaitannya dengan peningkatan kejadian Infeksi saluran pernafasan Akut (ISPA) yang merupakan penyakit infeksi akut yang menyerang salah satu bagian atau lebih dari saluran nafas mulai dari hidung (saluran atas) hingga alveoli (saluran bawah) termasuk jaringan adneksanya seperti sinus, Rongga telinga tengah dan Pleura (Depkes RI, 2005).

Infeksi saluran pernafasan Akut (ISPA) merupakan salah satu penyebab kematian pada anak di Negara sedang berkembang. Infeksi saluran Pernafasan Akut (ISPA) di Indonesia merupakan salah satu masalah kesehatan yang utama karena masih tingginya angka kejadian

Infeksi saluran Pernafasan Akut (ISPA) terutama pada Balita. Setiap anak di perkirakan mengalami tiga sampai enam episode ISPA setiap tahunnya dan mengakibatkan sekitar 20-30% kematian (Rasmaliah, 2004).

b. Penyebab Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA)

Infeksi saluran pernafasan akut merupakan kelompok penyakit yang kompleks dan heterogen, yang disebabkan oleh berbagai etiologi. Etiologi ISPA lebih dari 300 jenis bakteri, virus, dan jamur. Bakteri penyebabnya antara lain :

- Genus *streptococcus*,
- *Stafilococcus*,
- *Pnemococcus*,
- *Hemofilus*,
- *Bordetella*,
- *Korinebacterium*

Virus penyebabnya antara lain :

- Golongan *mikovirus*,
- *Adenovirus*,
- *Koronavirus*,
- *Pikornavirus*,
- *Mikoplasma*,
- *Herpesvirus*

Namun dari sekian banyak mikroorganisme yang bisa menyebabkan timbulnya infeksi saluran pernafasan akut, ada beberapa

mikroorganisme yang merupakan penyebab utama kejadian ISPA diantaranya adalah :

- *B-hemolytic streptococcus*,
- *Staphylococcus*,
- *Haemophilus influenzae*,
- *Chlamydia trachomatis*,
- *Mycoplasma* dan
- *Pneumokokus*

Mikroorganisme tersebut yang terdapat di udara bebas menempel dan dengan kemampuannya menyerang, dan menginflamasi saluran pernafasan baik saluran pernafasan atas seperti *nasal, nasal cavity*, faring dan laring, dan juga melibatkan saluran pernafasan bawah seperti trakea, bronchi dan sebagainya yang kemudian melalui kemampuan menginfeksi, menimbulkan manifestasi klinik pada individu yang terserang (Depkes RI, 2002)

Kelompok virus umumnya menyerang saluran pernafasan bagian atas dengan kata lain, ISPA bagian atas umumnya disebabkan oleh virus, sedangkan ISPA bagian bawah dapat disebabkan oleh bakteri, virus dan *mycoplasma*. ISPA bagian bawah yang disebabkan oleh bakteri umumnya mempunyai manifestasi klinis yang berat sehingga menimbulkan beberapa masalah dalam penanganannya.

Terkait dengan penyebab infeksi saluran pernafasan, ternyata penyakit ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh multifaktor penyebab, artinya tidak hanya bakteri, virus dan sejenisnya saja yang dapat menyebabkan munculnya infeksi ini, tetapi udara yang tercemar pun dapat menjadi salah satu faktor penyebab timbulnya penyakit ini. Sebut saja asap pembakaran hutan yang selalu kontroversi akan dampaknya yang dapat meningkatkan proporsi penderita ISPA.

Diketahui bahwasannya dalam kandungan udara yang kita hirup setiap harinya tidak semata-mata hanya terdiri dari oksigen saja, tapi terdapat banyak partikel-partikel bebas yang juga ikut masuk ke dalam rongga hidung ketika bernafas. Namun memang Tuhan menciptakan manusia dengan segala kesempurnaannya, di dalam saluran pernafasan mulai dari hidung hingga bronkus terdapat membran mukosa bersilia (*silia*=rambut-rambut halus) yang dapat menahan partikel bebas tersebut masuk ke organ pernafasan vital sehingga partikel-partikel tadi tertahan dan yang tersisa masuk ke dalam organ pernafasan selanjutnya adalah udara.

Namun, ketika udara yang kita hirup adalah udara yang tercemar, dimana kandungan partikel bebas berada dalam jumlah yang lebih banyak dan dengan ukuran yang lebih besar belum lagi kandungan bahan kimia berbahaya akibat polusi baik itu dari hasil pembakaran,

industry dan sebagainya inilah yang bisa menyebabkan infeksi saluran pernafasan tersebut muncul. Ketika partikel bebas yang ikut masuk ke dalam nasal cavity dengan mudahnya difilter oleh membran mukosa yang bersilia jika dalam jumlah dan ukuran normal, akan menjadi masalah ketika partikel bebas tersebut masuk dalam jumlah yang tidak normal dan ukuran yang tidak normal pula karena memang silia yang bertugas memfilter memiliki ambang batas kemampuan. Ketika dipaparkan dengan keadaan yang demikian secara terus menerus maka akan terjadi “*decrease ability*” dan hal ini akan memperbesar peluang terjadinya infeksi pada saluran pernafasan karena terdapat banyak partikel tak terfilter dapat menyebabkan luka atau infeksi pada saluran pernafasan yang dilewatinya.

Masih berkaitan dengan udara tercemar, namun masalahnya kini adalah kandungan bahan kimia tertentu yang dapat membahayakan saluran pernafasan, sebut saja senyawa nitrogen oksida, sulfur oksida, Karbon monoksida dan sebagainya. Secara umum, efek pencemaran udara terhadap saluran pernafasan dapat menyebabkan pergerakan silia hidung menjadi lambat dan kaku bahkan dapat berhenti sehingga tidak dapat membersihkan saluran pernafasan akibat iritasi oleh bahan pencemar. Produksi lendir akan meningkat sehingga menyebabkan penyempitan saluran pernafasan dan rusaknya sel pembunuh bakteri di saluran pernafasan. Akibat dari hal tersebut akan menyebabkan kesulitan bernafas

sehingga benda asing tertarik dan bakteri lain tidak dapat dikeluarkan dari saluran pernafasan, hal ini akan memudahkan terjadinya infeksi saluran pernafasan. Dan tidak bisa dihindarkan jika memang senyawa kimia berbahaya yang dalam konsentrasi melebihi ambang batas dapat mengiritasi saluran pernafasan.

c. Klasifikasi Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA)

Klasifikasi (ISPA) dibedakan untuk golongan umur di bawah 2 bulan dan untuk golongan umur 2 bulan- 5 tahun.

a. Golongan Umur kurang Dua Bulan

a. Pneumonia Berat

Bila disertai salah satu tanda tarikan kuat di dinding pada bagian bawah atau napas cepat. Batas napas cepat untuk golongan umur kurang 2 bulan yaitu 6x per menit atau lebih.

b. Bukan Pneumonia (Batuk Pilek Biasa)

Bila tidak di temukan tanda tarikan kuat di dinding dada bagian bawah atau napas cepat. Tanda bahaya untuk umur kurang dari dua bulan yaitu :

a) Kurang bisa minum (kemampuan minumannya menurun sampai dengan kurang dari $\frac{1}{2}$ volume yang biasa di minum)

b) Kejang

- c) Kesadaran menurun
- d) Stridor
- e) Wheezing
- f) Demam / dingin

b. Golongan Umur 2 Bulan – 5 Tahun

1) Pneumonia Berat

Bila disertai napas sesak yaitu adanya tarikan di dinding dada bagian bawah ke dalam pada waktu anak menarik napas (pada saat diperiksa anak harus dalam keadaan tenang, tidak menangis atau meronta).

2) Pneumonia Sedang

Bila disertai napas cepat. Batas napas cepat ialah :

- a) Untuk usia 2 bulan-12 bulan = 50x permenit atau lebih
- b) Untuk usia 1-4 tahun = 40x permenit atau lebih

3) Bukan Pneumonia

Apabila tidak di temukan tarikan di dinding bagian bawah dan tidak ada napas cepat. Tanda bahaya untuk umur 2 bulan – 5 tahun yaitu :

- a) Tidak bisa minum
- b) Kejang
- c) Kesadaran menurun
- d) Stridor

e) Gizi Buruk

Klasifikasi ISPA menurut Depkes RI (2002) Adalah :

a. Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) Ringan

Seseorang yang menderita Infeksi saluran Pernafasan Akut (ISPA) ringan apabila ditemukan gejala batuk, pilek, dan sesak.

b. Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) Sedang

Infeksi saluran Pernafasan Akut (ISPA) sedang apabila timbul gejala sesak nafas, suhu tubuh lebih dari 39°C dan bila bernafas mengeluarkan suara seperti mengorok.

c. Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) Berat

Gejala meliputi : kesadaran menurun, nadi cepat atau tidak teraba, nafsu makan menurun, bibir dan ujung nadi membiru (sianosis) dan gelisah.


d. Penularan Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA)

Pada ISPA dikenal tiga cara penularan Infeksi, yaitu :

- a. Melalui aerosol aerosol (partikel halus) yang lembut, terutama oleh karena batuk-batuk.
- b. Melalui aerosol yang lebih kasar, terjadi pada waktu batuk dan bersin
- c. Melalui kontak langsung / tidak langsung dari benda yang telah di cemari jasad renik (hand to hand transmission)

Kuman Infeksi saluran Pernafasan Akut (ISPA) ditularkan dari penderita ke orang lain melalui udara pernapasan atau percikan ludah penderita. Pada prinsipnya kuman ISPA yang ada di udara terhisap oleh pejamu baru dan masuk ke seluruh saluran pernafasan. Dari saluran pernafasan kuman menyebar ke seluruh tubuh apabila orang yang terinfeksi ini rentan, maka ia akan terkena ISPA (Depkes RI, 2002)

Allah SWT berfirman dalam QS Shaad / 38 : 36 :



Terjemahannya :

“Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendakinya” (Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 2000).

Ayat diatas menjelaskan bahwa tuhan menghembuskan angin ke mana saja arah dan tujuannya, sehingga udara dapat menyegarkan lingkungan ataupun sebaliknya udara dapat tercemar. Itu merupakan kehendak tuhan dan terdapat pelajaran bagi yang berfikir dan beriman kepadanya

e. Pencegahan dan pengobatan Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA)

a. Pencegahan

Adapun pencegahan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Mengusahakan agar anak mempunyai gizi yang baik
 1. Bayi harus diberi ASI selama 2 tahun
 2. Pemberian makanan pada anak yang di sesuaikan dengan umurnya
 3. Makanan yang bergizi tidak mesti yang mahal yang penting mengandung unsur protein, karbohidrat, lemak, vitamin dan mineral
 4. Bayi dan balita secara teratur ditimbang
- 2) Mengusahakan kekebalan anak dengan imunisasi (BCG, DPT, Hepatitis B, polio dan campak)
- 3) Menjaga kebersihan perorangan dan lingkungan
 - a) Tubuh anak harus selalu bersih
 - b) Lingkungan hidup harus selalu bersih dan sehat
 - c) Aliran udara dalam rumah harus selalu cukup baik
 - d) Asap tidak boleh berkumpul dalam rumah


b. Pengobatan ISPA meliputi :

- 1) Anak yang menderita ISPA harus diobati segera dan dirawat dengan baik untuk mencegah penyakit menjadi bertambah buruk.
- 2) Memeriksa anak secara teratur ke puskesmas


- 3) ISPA ringan (bukan pneumonia) tanpa pemberian antibiotik.
Bila panas atau demam di berikan Paracetamol.
- 4) ISPA sedang (pneumonia) diberikan kotromoksasol atau obat pengganti seperti amoksilin per oral, ampisilin per oral dan prokin penisilin suntikan
- 5) ISPA berat (pneumonia berat) di rawat dirumah sakit di berikan oksigen, tetapi dengan antibiotik berupa kloramenikol suntikan atau oral, prokain penisilin, kotrimoksasol , ampisilin atau amoksilin. Untuk bayi kurang dari dua bulan diberikan prokain penisilin dan gentasimin suntikan.

F. Kerangka Pikir


Berdasarkan variabel yang di jelaskan di atas maka di buatlah Kerangka Variabel yang akan di teliti sebagai berikut :



Keterangan :



Variabel Bebas (*dependent variable*)



Variabel terikat (*independent variable*)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *survei Analitik* dengan pendekatan *Cross Sectional design* yang bertujuan untuk melihat hubungan sebab akibat, yaitu faktor - faktor yang berhubungan dengan kejadian Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) pada Balita, yaitu suatu rancangan study epidemiologi yang mempelajari hubungan penyakit dan paparan (Faktor Penelitian) secara serentak dalam waktu yang bersamaan (Notoadmodjo,2005)

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Kore Kecamatan SanggarKabupaten Bima tahun 2014. Pemilihan lokasi ini di dasarkan atas pertimbangan tingginya kejadian Infeksi saluran Pernafasan Akut (ISPA) dan kurangnya Penelitian tentang kejadian Infeksi saluran Pernafasan Akut (ISPA) di wilayah pesisir.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang di gunakan yaitu pendekatan “*Cross Sectional*” yang bertujuan untuk melihat hubungan sebab akibat, yaitu faktor - faktor yang berhubungan dengan kejadian Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) pada Balita.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi penelitian ini adalah semua balita yang bertempat tinggal di wilayah pesisir Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima.

2. Sampel

Sampel dari penelitian ini adalah sebagian balita yang bertempat tinggal di wilayah pesisir Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima. Rumus perhitungan besar sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah (Notoadmodjo, 2005) :

$$n = \frac{N}{1 + N(d^2)}$$

Keterangan :

n : Besar Sampel

N : Besar Populasi

d : Tingkat kepercayaan atau ketepatan yang di inginkan (0,1)

Diketahui :

N : 240

d : 0,1

n :?

$$n = \frac{N}{1 + N(d^2)}$$

$$n = \frac{240}{1 + 240(0,1^2)}$$

$$n = \frac{240}{1 + 240(0,01)}$$

$$n = \frac{240}{1 + 2,4}$$

$$n = \frac{240}{3,4}$$

$$n = 70,5 = 70$$

Dari hasil perhitungan didapatkan sampel sebesar 70 orang

Tehnik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode simple random sampling yaitu pengambilan sampel secara random atau acak.

Cara memilih element anggota sampel dengan cara lotere, yaitu besar populasi sebanyak 240 orang, di ambil sesuai jumlah sampel. Pertama-tama kertas di gunting sebnyak jumlah populasi yaitu 240, kemudian digulung dan dimasukkan kedalam kotak, kotak dikocok lalu keluar 1 buah gulungan, dilihat angkanya, misalkan angka 15 yang terpilih maka elemen terpilih, nomor yang telah terpilih tidak dimasukkan kembali kedalam kotak, kemudian ulangi sampai memenuhi jumlah sampel.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Data Sekunder

Data sekunder di peroleh dari data yang dimiliki Dinas Kesehatan Kabupaten Bima dan dari data sekunder puskesmas Sanggar serta dari kanto Desa Kore Kecamatan Sanggar Sebagai data Demografi lokasi penelitian.

2. Data Primer

Data primer di peroleh dari hasil observasi langsung dengan mendatangi orang tua balita untuk mendapatkan informasi lebih rinci dan melalui wawancara dengan menggunakan Kuisisioner.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Kuisisioner, dan Rollmeter. Kuisisioner di gunakan untuk mendapatkan informasi tentang balita, Penggunaan biomassa, kepadatan hunian dan perilaku merokok dari responden, sedangkan rollmeter di gunakan untuk menghitung Luas lubang ventilasi dan luas rumah responden.

F. Tehnik pengolahan dan analisis data

Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan Analisis Statistik. Selanjutnya data yang telah di ukur disusun dan disajikan

dalam bentuk tabel serta dilengkapi dengan narasi sebagai penjelas tabel. Jenis

Analisis yang dilakukan adalah :

a. Analisis Univariat

Analisis Univariat dilakukan untuk mendapatkan gambaran umum variabel yang diteliti. Dengan cara mendeskripsikan tiap-tiap variabel yang digunakan dalam penelitian sehingga akan terlihat gambaran distribusi frekuensi dalam bentuk tabel.

b. Analisis Bivariat

Analisis Bivariat dilakukan untuk melihat hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Dengan menghitung rasio prevalensi. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan uji *Chi Square*. Menurut Notoadmodjo (2005), rumus *chi square* dihitung dengan rumus :

$$X^2 = \sum \frac{(f_o - f_h)^2}{f_h}$$

Dimana :

X^2 : Chi Kuadrat

f_o : Frekuensi yang diperoleh

f_h : Frekuensi yang diharapkan

Dimana dasar pengambilan keputusan penerimaan Hipotesis berdasarkan tingkat signifikansi (nilai $\alpha = 0,05$) sebesar 95% , dimana :

- a. H_0 ditolak jika nilai $p < 0,05$, berarti ada hubungan yang bermakna
- b. H_0 diterima jika nilai $p > 0,05$, berarti tidak ada hubungan yang bermakna.

BAB 1V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Desa Kore merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang terletak pada titik Koordinat $188^{\circ}44^0 - 119^{\circ}22^{\circ}$ BT dan $8^{\circ}8 - 8^{\circ}57$ LS dengan luas wilayah 16,46% dari luas Kabupaten Bima atau sekitar 477,89 km².

Desa Kore terletak sekitar 133 km dari Kabupaten Bima, untuk menjangkau Desa Kore di butuhkan waktu selama 4 – 5 jam dari Pusat Kabupaten Bima.

2. Distribusi Penduduk

Jumlah penduduk di Desa Kore pada tahun 2013 adalah sebanyak 2.899 Jiwa, dengan perincian laki-laki sebanyak 1.449 jiwa dan perempuan sebanyak 1.450 Jiwa.

B. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data, maka hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Karakteristik Responden

a. Jenis Kelamin

Tabel 1.1
Distribusi Frekuensi Jenis Kelamin Responden di Wilayah
Pesisir Desa Kore Kec Sanggar Kab Bima Tahun 2014

Jenis Kelamin	Jumlah (n)	Persen (%)
Laki – Laki	40	57,1
Perempuan	30	42,9
Total	70	100

Sumber : Data Primer, 2014

Berdasarkan tabel 1.1, responden terbanyak adalah laki - laki yakni sebanyak 40 orang (57,1%) dan perempuan sebanyak 30 orang (42,9%).

b. Umur

Tabel 1.2
Distribusi Frekuensi umur Responden di Wilayah
Pesisir Desa Kore Kec Sanggar Kab Bima Tahun 2014

Umur Responden	Jumlah (n)	Persen (%)
15-20 Tahun	26	37,1
21-30 Tahun	29	41,4
30-35 Tahun	15	7,1
Total	70	100

Sumber : Data Primer, 2014

Berdasarkan tabel 1.2, kelompok umur tertinggi berada pada kelompok umur 21 -30 sebanyak 29 responden (41,4%) dan kelompok umur yang terendah berada pada kelompok umur 30 – 35 tahun sebanyak 15 responden (7,1%).

c. Pekerjaan

Tabel 1.3
Distribusi Frekuensi Pekerjaan Responden di Wilayah Pesisir Desa Kore Kec Sanggar Kab Bima Tahun 2014

Pekerjaan	Jumlah (n)	Persen (%)
Wiraswasta	9	15,0
Nelayan	61	85,0
Total	70	100

Sumber : Data Primer 2014

Berdasarkan tabel 1.3, responden yang bekerja sebagai Nelayan sebanyak 51 Responden (85,0%) dan responden yang bekerja sebagai wiraswasta sebanyak 9 responden (15,0%)

d. Umur Balita

Tabel 1.4
Distribusi Frekuensi Umur Responden di Wilayah Pesisir Desa Kore Kec Sanggar Kab Bima tahun 2014

Pekerjaan	Jumlah (n)	Persen (%)
0 – 12 Bulan	25	41,65
13 – 24 Bulan	20	33,0
25 – 37 Bulan	10	16,65
38 – 59 Bulan	15	8,3
Total	70	100

Sumber : Data Primer, 2014

Berdasarkan tabel 1.4, kelompok umur tertinggi Balita berada pada kelompok umur 0 -12 bulan sebanyak 25 balita (41,65%) dan kelompok umur terendah berada pada kelompok umur 38 – 59 bulan sebanyak 15 balita (8,3%)

e. Jenis kelamin balita

Tabel 1.5
Distribusi frekuensi Jenis Kelamin Balita di Wilayah Pesisir
Desa Kore Kec Sanggar Kab Bima tahun 2014

Jenis Kelamin	Jumlah (n)	Persen (%)
Laki – Laki	30	42,9
Perempuan	40	57,1
Total	70	100

Sumber : Data Primer, 2014

Berdasarkan tabel 1.5, responden balita terbanyak adalah berjenis kelamin perempuan sebanyak 40 balita (57,1%) dan laki – laki sebanyak 30 balita (42,9%).

f. Jenis biomassa yang di Gunakan

Tabel 1.6
Distribusi frekuensi jenis biomassa yang di Gunakan di
Wilayah Pesisir Desa Kore Kec Sanggar Kab Bima tahun 2014

Jenis Kelamin	Jumlah (n)	Persen (%)
Kayu	47	68,0
Sekam	20	26,25
Jerami	3	5,0
Total	70	100

Sumber : Data Primer, 2014

Berdasarkan tabel 1.6, jenis biomassa terbanyak yang digunakan adalah kayu dengan responden yang menggunakan sebanyak 47 responden (68,0%) dan jenis biomassa yang paling sedikit digunakan adalah jeramidengan responden yang menggunakan sebanyak 3 responden (5,0%).

g. Frekuensi Memasak

Tabel 1.7
Distribusi frekuensi memasak Responden di Wilayah Pesisir
Desa kore Kec Sanggar Kab Bima tahun 2014

Frekuensi Memasak	Jumlah (n)	Persen (%)
< 2 kali	57	81,4
> 2 kali	14	18,6
Total	70	100

Sumber : Data Primer, 2014

Berdasarkan tabel 1.7, frekuensi memasak responden rata-rata < 2 kali dalam sehari dengan responden sebanyak 57 responden (81,4%), sedangkan sisanya memasak sebanyak > 2 kali dalam sehari sebanyak 13 responden (18,6).

h. Keberadaan anak di sekitar tempat memasak

Tabel 1.8
Distribusi frekuensi keberadaan Anak di sekitar Tempat
Memasak di wilayah Pesisir Desa Kore Kec Sanggar Kab Bima
tahun 2014

Keberadaan Anak	Jumlah (n)	Persen (%)
Ya	59	84,3
Tidak	11	15,7
Total	70	100

Sumber ; Data Primer, 2014

Berdasarkan tabel 1.8, rata- rata keberadaan anak di sekitar tempat memasak sangat tinggi yakni sebanyak 59 balita (84,3%).

i. Intensitas Keberadaan anak di sekitar Tempat Memasak

Tabel 1.9
Distribusi Frekuensi Intensitas Keberadaan anak di sekitar Tempat memasak di Wilayah Pesisir Desa Kore Kec Sanggar Kab Bima Tahun 2014

Intensitas Keberadaan Anak	Jumlah (n)	Persen (%)
Selalu	58	72,9
Kadang-kadang	12	27,1
Total	70	100

Sumber : Data Primer, 2014

Berdasarkan tabel 1.9, intensitas keberadaan anak di sekitar Tempat memasak dengan kategoru Selalu sangat tinggi yakni sebanyak 58 responden atau (72,9 %) sedangkan sisanya dengan kategori kadang-kadang sebanyak 12 responden (29,1%).

j. Letak Dapur

Tabel 1.10
Distribusi frekuensi Letak Dapur Responden di Wilayah Pesisir Desa Kore Kec Sanggar Kab Bima tahun 2014

Letak Dapur	Jumlah (n)	Persen (%)
Dalam Rumah	60	85,7
Luar Rumah	10	14,3
Total	70	100

Sumber : Data Primer, 2014

Berdasarkan tabel 1.10, letak dapur responden terbanyak adalah di dalam rumah dengan jumlah responden sebanyak 60 responden (85,7%) dan yang berada di luar rumah sebanyak 10 responden (14,3%).

k. Keberadaan Anggota keluarga yang merokok

Tabel 1.11
Distribusi frekuensi Keberadaan Anggota Keluarga yang Merokok di Wilayah Pesisir Desa Kore Kec Sanggar Kab Bima tahun 2014

Anggota Keluarga yang merokok	Jumlah (n)	Persen (%)
Ya	42	46,65
Tidak	28	43,35
Total	70	100

Sumber : Data Primer, 2014

Berdasarkan tabel 1.11, rata-rata keberadaan anggota keluarga yang merokok sangat tinggi yakni sebanyak 42 responden (46,65%) dan sisanya yang tidak merokok sebanyak 28 responden (43,35%)

l. Tempat merokok

Berdasarkan hasil penelitian, rata-rata tempat merokok responden adalah berada di dalam rumah dengan responden sebanyak 42 orang (100%)

m. Banyaknya Anggota keluarga yang Merokok

Berdasarkan hasil penelitian , rata-rata jumlah anggota keluarga yang merokok adalah sebanyak 1 orang dengan jumlah responden sebanyak 42 orang (100%).

n. Keberadaan Balita ketika Anggota Keluarga merokok

Tabel 1.12

Distribusi frekuensi Keberadaan Balita ketika anggota Keluarga merokok di Wilayah Pesisir Desa Kore Kec Sanggar Kab Bima tahun 2014

Keberadaan Balita	Jumlah (n)	Persen (%)
Selalu	22	65,0
Kadang-kadang	20	35,0
Total	70	100

Sumber : Data Primer,2014

Berdasarkan tabel 1.12, diperoleh hasil keberadaan balita ketika anggota keluarga yang merokok terbanyak adalah kadang-kadang dengan jumlah responden sebanyak 20 orang responden (35,0%) dan keberadaan balita ketika anggota keluarga merokok adalah selalu dengan jumlah responden sebanyak 22 orang responden (65,0%).

2. Analisis Univariat

a. Kejadian Infeksi Saluran pernafasan Akut (ISPA)

Tabel 1.13

Distribusi responden berdasarkan kejadian ISPA pada Balita di Wilayah Pesisir Desa Kore Kec Sanggar Kab Bima Tahun 2014

Kejadian ISPA	Jumlah (n)	Persen (%)
Menderita	40	60,0
Tidak Menderita	30	40,0
Total	70	100

Sumber : Data Primer, 2014

Berdasarkan tabel 1.13, dapat diketahui mengenai jumlah kejadian Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) , dimana dari 70 orang Balita terdapat 40 Orang balita (60,0%) yang menderita ISPA dan 30 orang Balita (40,0%) yang tidak menderita ISPA.

b. Jenis Biomassa yang di Gunakan

Tabel 1.14

Distribusi Penggunaan Jenis bahan bakar Biomassa Responden di Wilayah Pesisir Desa Kore Kec Sanggar Kab Bima Tahun 2014

Jenis Biomassa	Jumlah (n)	Persen (%)
Kayu	47	68,0
Sekam	20	26,25
Jerami	3	5,0
Total	70	100

Sumber : Data Primer, 2014,

Berdasarkan tabel 1.14 kebanyakan responden menggunakan Jenis bahan bakar biomassa jenis kayu bakar sebagai bahan bakar dengan jumlah responden sebanyak 47 responden (67,31%), dan jenis biomassa yang paling sedikit digunakan adalah jerami dengan jumlah responden sebanyak 3 responden (6,08%)

c. Luas Ventilasi

Tabel 1.15
Hasil pengukuran Luas Ventilasi di Wilayah Pesisir
Desa Kore Kec Sanggar Kab Bima tahun 2014

Kepadatan Hunian	Jumlah (n)	Persen (%)
Memenuhi Syarat	27	45,0
Tidak memenuhi Syarat	43	55,0
Total	70	100

Sumber : Data Primer 2014

Berdasarkan tabel 1.15, hasil pengukuran luas ventilasi rumah responden yang memenuhi syarat lebih sedikit dibandingkan dengan yang tidak memenuhi syarat, dimana terdapat sebanyak 27 rumah responden (45,0%) yang tidak memenuhi syarat dan sebanyak 43 responden (55,0%) yang tidak memenuhi syarat.

d. Kepadatan Hunian

Tabel 1.16
Distribusi Kepadatan Hunian responden di Wilayah pesisir
Desa Kore Kec Sanggar Kab Bima Tahun 2014

Kepadatan Hunian	Jumlah (n)	Persen (%)
Memenuhi Syarat	34	43,3
Tidak Memenuhi Syarat	36	56,7
Total	70	100

Sumber : Data Primer, 2014

Berdasarkan tabel 1.16, kepadatan hunian yang tidak memenuhi syarat lebih banyak dibandingkan kepadatan hunian yang memenuhi syarat, dimana kepadatan hunian yang tidak memenuhi syarat sebanyak 34 responden (43,3%) dan yang memenuhi syarat sebanyak 36 responden (56,7%).

e. Perilaku merokok

Tabel 1.17
Distribusi perilaku merokok responden di Wilayah Pesisir
Desa Kore Kec Sanggar Kab Bima tahun 2014

Perilaku Merokok	Jumlah (n)	Persen (%)
Ada	42	46,65
Tidak Ada	28	43,35
Total	70	100

Sumber : Data Primer, 2014

Berdasarkan tabel 1.17, keberadaan anggota keluarga yang merokok adalah sebanyak 42 orang (46,65%) dan sisanya 28 orang (43,35%) tidak merokok.

3. Analisis Bivariat

Analisis bivariat dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat dengan menghitung rasio prevalensi. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan uji *chi square*, dasar pengambilan keputusan hipotesis berdasarkan tingkat signifikan nilai ($\alpha = 0,05$) sebesar 95%.

- a. Hubungan penggunaan jenis bahan bakar biomassa dengan kejadian ISPA pada Balita di Wilayah pesisir Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima tahun 2014

Tabel 1.18
Hubungan penggunaan bahan bakar biomassa dengan kejadian ISPA pada balita di Wilayah Pesisir Desa Kore Kec Sanggar Kab Bima tahun 2014

Jenis Biomassa	Kejadian ISPA				Total		Hasil Uji Statistik
	Menderita		Tidak Menderita				
	n	%	n	%	N	%	
Kayu	26	70,0	21	41,67	47	67,31	0,001
Sekam	11	30,0	9	23,3	20	36,61	
Jerami	3	10,0	0	0	3	6,08	
Total	40	55	30	35	70	100	

Sumber : Data Primer, 2014

Berdasarkan tabel 1. 18 diatas, dapat diketahui dari 70 balita terdapat 47 balita (67,31%) yang rumahnya menggunakan jenis biomassa kayu bakar, 20 balita (36,61%) yang rumahnya menggunakan jenis biomassa sekam dan

terdapat 3 balita (6,08%) yang dirumahnya menggunakan jenis biomassa jerami. Dari 70 balita terdapat 40 balita (55,0%) yang menderita ISPA dan 30 orang balita (35,0%) yang tidak menderita ISPA. Dari 47 orang balita yang menggunakan jenis Biomassa kayu bakar terdapat 26 (70,0%) orang balita yang menderita ISPA dan 21 (41,67%) orang balita menderita ISPA dan dari 20 orang balita yang dirumahnya menggunakan jenis biomassa sekam terdapat 11 orang balita (30,0%) yang menderita ISPA dan 9 orang balita (23,3%) yang tidak menderita ISPA.

Berdasarkan hasil uji statistik dengan menggunakan uji *chi square* diperoleh nilai $p = 0,001, (< 0,05)$, yang menunjukkan adanya hubungan antara jenis biomassa yang digunakan dengan kejadian ISPA pada balita di Wilayah Pesisir Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima Tahun 2014.

- b. Hubungan Luas Ventilasi dengan kejadian ISPA pada Balita di Wilayah pesisir Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima tahun 2014

Tabel 1.19
Hubungan Luas Ventiasi dengan kejadian ISPA pada balita di Wilayah PesisirDesa Kore Kec Sanggar Kab Bima tahun 2014

Luas Ventilasi	Kejadian ISPA				Total		Hasil Uji Statistik
	Menderita		Tidak Menderita				
	n	%	n	%	N	%	
Tidak Memenuhi Syarat	32	36,7	11	53,3	43	55,0	0,000
Memenuhi Syarat	8	63,3	19	46,7	27	45,0	
Total	40	70	30	30	70	100	

Sumber : Data Primer, 2014

Berdasarkan tabel 1.19 diatas, dapat diketahui dari 70 balita terdapat 43 balita (55,0%) yang ventilasi rumahnya tidak memenuhi syarat dan 27 orang balita (45,0%) yang ventilasi rumahnya tidak memenuhi syarat. Dari 70 orang balita, terdapat 40 balita (70,0%) yang menderita ISPA dan 30 orang balita (30,0%) yang tidak menderita ISPA. Dari 43 orang balita (55,0%) yang ventilasi rumahnya tidak memenuhi syarat terdapat 32 orang balita (45,0%) yang menderita ISPA dan 11 orang balita (36,7%) yang tidak menderita ISPA dan dari 27

orang balita (45,0%) yang ventilasi rumahnya memenuhi syarat terdapat 8 orang balita (63,3%) yang menderita ISPA dan 19 orang Balita (46,7%) yang tidak menderita ISPA.

Berdasarkan hasil uji statistik dengan menggunakan uji *chi square* diperoleh nilai $p = 0,000$ ($< 0,05$) yang menunjukkan adanya hubungan antara luas ventilasi dengan kejadian ISPA pada balita di Wilayah pesisir Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima tahun 2014

- c. Hubungan kepadatan hunian dengan kejadian Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) pada Balita di Wilayah Pesisir Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima tahun 2014

Tabel 1.20
Hubungan Kepadatan Hunian dengan kejadian ISPA pada balita di Wilayah Pesisir Desa Kore Kec Sanggar Kab Bima tahun 2014

Kepadatan Hunian	Kejadian ISPA				Total		Hasil Uji Statistik
	Menderita		Tidak Menderita				
	n	%	n	%	N	%	
Tidak Memenuhi Syarat	23	56,7	13	43,3	36	50,0	0,000
Memenuhi Syarat	13	43,3	21	56,7	34	50,0	
Total	36	60	34	40	70	100	

Sumber : Data Primer, 2014

Berdasarkan tabel 1.20 diatas, dapat diketahui dari 70 balita terdapat 36 balita (50,0%) yang kepadatan huniannya tidak memenuhi syarat dan 34 balita (50,0%) yang kepadatan huniannya memenuhi syarat. Dari 70 orang balita terdapat 36 orang balita (60,0%) yang menderita ISPA dan 34 orang balita (40,0%) yang tidak menderita ISPA. Dari 36 orang balita (50,0%) yang kepadatan huniannya tidak memenuhi syarat terdapat 23 orang balita (56,7%) yang menderita ISPA dan 13 orang balita (43,3%) yang tidak menderita ISPA dan dari 34 orang balita (50,0%) yang kepadatan huniannya memenuhi syarat terdapat 13 orang balita (43,3%) yang menderita ISPA dan 21 orang balita (56,7%) yang tidak menderita ISPA.

Hasil uji statistik dengan menggunakan uji *chi square* diperoleh nilai $p = 0,000$, yang menunjukkan adanya hubungan antara kepadatan hunian dengan kejadian ISPA pada balita di Wilayah pesisir Desa Kore Kecamatan Sanggar kabupaten Bima tahun 2014

- d. Hubungan Perilaku merokok dengan kejadian ISPA pada Balita di wilayah Pesisir Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima Tahun 2014

Tabel 1.21
Hubungan perilaku merokok dengan kejadian ISPA pada balita di Wilayah Pesisir Desa Kore Kec Sanggar Kab Bima tahun 2014

Perilaku Merokok	Kejadian ISPA				Total		Hasil Uji Statistik
	Menderita		Tidak Menderita				
	n	%	n	%	N	%	
Ada	28	53,35	14	46,7	42	53,3	0,084
Tidak Ada	12	46,7	16	53,3	28	46,7	
Total	40	70	30	30	70	100	

Sumber : Data Primer, 2014

Berdasarkan tabel 1.21 diatas, dapat diketahui dari 70 balita terdapat 42 balita (53,3%) yang dirumahnya terdapat anggota keluarga yang memiliki kebiasaan merokok dan 28 balita (46,7%) yang dirumahnya tidak ada anggota keluarga yang memiliki kebiasaan merokok. Dari 70 balita terdapat 40 orang balita (70,0%) yang menderita ISPA dan 30 orng balita (30,0%) yang tidak menderita ISPA. Dari 42 orang balita (53,3%) yang anggota keluarganya memiliki kebiasaan merokok terdapat 28 orang balita (53,35%) yang menderita ISPA dan 14 orang balita (46,7%) yang tidak menderita ISPA dan dari 28 orang Balita yang Anggota keluarganya tidak memiliki kebiasaan merokok

terdapat 12 orang balita (46,7%) yang menderita ISPA dan 16 orang balita (53,3%) yang tidak menderita ISPA.

Berdasarkan hasil uji statistik dengan menggunakan uji *chi square* diperoleh nilai $p = 0,084$, yang menunjukkan tidak ada hubungan antara perilaku merokok dengan kejadian Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) pada balita di Wilayah Peisir Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima tahun 2014.

4. Pembahasan

a. Jenis Biomassa yang di Gunakan

Dari hasil Uji statistik menunjukkan ada hubungan antara penggunaan jenis bahan bakar biomassa dengan kejadian ISPA pada balita, dengan nilai $p = 0,001$, hal ini membuktikan bahwa balita yang tinggal dirumah yang menggunakan bahan bakar biomassa jenis apapun berisiko menderita ISPA dibandingkan yang tidak menggunakan bahan bakar biomassa.

Berdasarkan hasil penelitian sebanyak 50 responden (83,52%) memiliki dapur yang terletak di dalam rumah, Letak dapur yang berada dalam rumah memudahkan asap menyebar ke penjuru rumah, dimana asap yang dihasilkan dari Pembakaran biomassa menghasilkan asap yang berbahaya bagi kesehatan. Asap adalah partikel zat karbon yang ukurannya kurang dari 0,5 μ m, sebagai akibat dari pembakaran yang tidak sempurna

yang menghasilkan karbon yang dapat menyebabkan Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) pada Balita. Efek pencemaran udara terhadap saluran pernafasan dapat menyebabkan pergerakan silia hidung menjadi lambat dan kaku sehingga tidak dapat membersihkan saluran pernafasan akibat iritasi oleh bahan pencemar, Produksi lendir akan meningkat menyebabkan penyempitan dan rusaknya sel pembunuh bakteri di saluran pernafasan yang menyebabkan kesulitan bernafas akibat benda asing tertarik dan bakteri lain tidak dapat dikeluarkan dari saluran pernafasan, keadaan tersebut akan memudahkan terjadinya Infeksi Saluran Pernafasan (Mukono,1977)

Ada 3 jenis Biomassa yang di gunakan responden di wilayah pesisir yakni Kayu Bakar, Sekam dan Jerami, Jenis Biomassa yang paling banyak di gunakan oleh responden adalah kayu bakar.

Berdasarkan hasil penelitian Intensitas keberadaan anak saat memasak sangat tinggi yakni sebanyak 58 Balita (96,65%) selalu berada di sekitar orang tuanya memasak. Berdasarkan hasil penelitian Profesor Loft partikel dari asap pembakaran biomassa dapat menyebabkan serangan jantung, penyakit paru-paru dan dapat merusak DNA manusia.

Berdasarkan hasil penelitian Sulviani (2012), hasil analisis statistik dengan uji *chi square* untuk hubungan antara jenis bahan bakar dengan kejadian ISPA pada Balita di wilayah Kerja Puskesmas Ralla, di dapatkan nilai p (0,039) lebih kecil dari nilai (0,05), dengan demikian terdapat hubungan yang signifikan antara jenis bahan bakar dengan kejadian ISPA, pada rumah yang menggunakan bahan bakar biomassa dihuni oleh 50 balita (61,7%) yang menderita ISPA, sedangkan pada rumah yang menggunakan bahan bakar non biomassa dihuni oleh 31 Balita (43,7%) yang menderita ISPA (Sulviani, 2012).

b. Luas Ventilasi

Ventilasi merupakan tempat proses penyediaan udara segar ke dalam rumah dan tempat pengeluaran udara kotor dari suatu ruangan tertutup secara alamiah maupun mekanis. Tersedianya udara segar / bersih dalam rumah atau ruangan amat dibutuhkan manusia, sehingga apabila suatu ruangan tidak mempunyai sistem ventilasi yang baik maka akan dapat menimbulkan keadaan yang dapat merugikan kesehatan.

Ventilasi rumah mempunyai banyak fungsi, salah satu fungsinya adalah untuk menjaga agar aliran udara didalam rumah tetap segar, hal ini untuk menjaga keseimbangan oksigen yang diperlukan oleh penghuni rumah tersebut. Kurangnya

ventilasi akan menyebabkan kurangnya oksigen dalam rumah yang berarti kadar karbondioksida yang bersifat racun bagi penghuninya meningkat.

Allah berfirman dalam Q.s Al-A'raf 7/57 yang berbunyi:



Terjemahannya :

“ Maka Sesungguhnya akan Kami kabarkan kepada mereka (apa-apa yang telah mereka perbuat), sedang (Kami) mengetahui (keadaan mereka), dan Kami sekali-kali tidak jauh (dari mereka) “(Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahannya, 2000)

Ayat di atas menjelaskan bahwa bahwa angin sebagai pembawa berita gembira, biasanya jika Al-Quran menggunakan bentuk jamak, angin yang dimaksud adalah angin yang membawa rahmat dalam pengertian umum, baik hujan maupun kesegaran (Shihab,2009)

Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) pada umumnya di sebabkan oleh bakteri dan virus, dimana proses penularannya melalui udara, dengan adanya ventilasi yang baik maka udara yang telah terkontaminasi kuman akan mudah di gantikan dengan udara yang segar.

Dari hasil uji statistik menunjukkan bahwa ada hubungan luas ventilasi dengan kejadian Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) pada balita dimana diperoleh nilai $p = 0,000$ atau $p > 0,05$.

Berdasarkan hasil penelitian Felisia Ferra Kustanti, di Kecamatan Wiyung Kota Surabaya, dengan desain *cross sectional*, berdasarkan hasil uji *chi square* Pengaruh kondisi rumah terhadap kejadian ISPA di Kecamatan Wiyung Kota Surabaya, untuk variabel luas ventilasi di peroleh nilai $p = 0,39$, secara statistik dapat dikatakan tidak ada hubungan yang signifikan antara luas ventilasi dengan kejadian ISPA di Kecamatan Wiyung Kota Surabaya. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Marhamah, A.Arsumar Arsin dan Wahidin dengan desain penelitian *cross sectional*, berdasarakan hasil uji *chi square*, Faktor yang berhubungan dengan kejadian ISPA pada Balita di Desa Bontongan Kabupaten Enrekang, di peroleh nilai $p = 0,0526$ untuk hubungan luas ventilasi dengan kejadian ISPA pada Balita secara statistik dikatakan ada hubungan antara Luas Ventilasi dengan kejadian ISPA pada Balita di Desa Bontongan Kabupaten Enrekang.

c. Kepadatan Hunian

Dari hasil uji statistik menunjukkan bahwa ada hubungan kepadatan hunian dengan kejadian Infeksi Saluran pernafasan Akut (ISPA) pada balita dimana diperoleh nilai $p= 0,000$ atau $p > 0,05$.

Berdasarkan Permenkes, 829/ MENKES/ SK/ VII/ 1999, Kepadatan hunian dikatakan memenuhi syarat apabila luas ruangan tidur $8m^2$ untuk dua orang. Bangunan yang sempit dan tidak sesuai dengan jumlah penghuninya akan mempunyai dampak kurangnya oksigen dalam ruangan sehingga daya tahan tubuh penghuninya menurun. Berdasarkan hasil Penelitian di lapangan, kepadatan hunian yang memenuhi syarat lebih dominan dibandingkan yang tidak memenuhi syarat, hal ini dikarenakan karakteristik dari rumah penduduk yang cukup luas.

Kepadatan hunian rumah akan meningkatkan suhu ruangan yang di sebabkan oleh pengeluaran panas badan yang akan meningkatkan kelembaban akibat uap air dari pernafasan tersebut. Dengan demikian semakin banyak penghuni rumah dan maka semakin cepat udara ruangan mengalami pencemaran gas atau bakteri. Dengan banyaknya penghuni, maka kadar oksigen dalam ruangan akan menurun di ikuti oleh peningkatan CO_2 ruangan dan dampak dari peningkatan CO_2 ruangan adalah

penurunan kualitas udara dalam rumah. Jumlah orang yang tinggal dalam satu rumah dapat mempengaruhi penyebaran Penyakit menular dalam kecepatan transmisi mikroorganisme. Kepadatan penghuni rumah yang terlalu tinggi dan kurangnya ventilasi menyebabkan kelembaban dalam rumah juga meningkat, dan dapat meningkatkan faktor polusi dalam rumah yang telah ada (Depkes, RI, 2001).


Hal ini sejalan dengan penelitian Sahriani (2010) yang menyimpulkan ada hubungan antara kamarisasi dengan kejadian ISPA pada balita dengan nilai $p = 0,001$

d. Perilaku Merokok

Hasil uji statistik menunjukkan tidak ada hubungan perilaku merokok dengan kejadian Infeksi Saluran pernafasan Akut (ISPA) pada balita diaman diperoleh nilai $p = 0,084$.

Berdasarkan hasil penelitian terdapat sebanyak 32 (43,35%) anggota keluarga responden yang merokok, dan rata-rata tempat merokok anggota keluarga yang merokok adalah di dalam rumah. Terdapat seorang perokok atau lebih dalam rumah akan memperbesar risiko anggota keluarga menderita sakit, seperti gangguan pernafasan, memperburuk Asma dan memperberat penyakit *angine pectoris* serta dapat meningkatkan risiko untuk mendapatkan serangan ISPA khususnya pada Balita.

Dalam Islam, segala sesuatu yang mudharotnya (bahaya) lebih besar dari manfaatnya di haramkan, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah 2/195 :



Terjemahannya :

“dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”(Departemen Agama RI, 2000)

Rokok sudah sangatlah jelas berbahaya dan mudarotnya lebih besar dari manfaatnya. Dalam kaidah Fiqih juga disebutkan “mencegah kerusakan/bahaya lebih di dahulukan dari pada mengambil manfaat”, Bahkan pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah mengeluarkan fatwa tentang rokok, Keputusan yang ditetapkan dalam siding pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III Menyatakan bahwa merokok hukumnya dilarang antara haram dan makruh, haram hukumnya ditempat umum

untuk ibu-ibu hamil dan anak-anak. Selain berbahaya bagi perokok aktif, paparan asap rokok juga sangat berbahaya bagi perokok pasif terutama balita yang mengalami risiko lebih besar.

Paparan Asap rokok merupakan penyebab signifikan masalah kesehatan seperti ISPA dan penyakit yang menyerang saluran pernafasan lainnya, sebatang rokok yang di bakar akan mengeluarkan 4000 bahan kimia seperti *nikotin, gas carbon monoksida, nitrogen oksida, hydrogen cianida, ammonia, Acrolein, Acetilen, benzol dehide, Urethane, Methanol, Peryline* dan lain-lain.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, balita sering berada tepat di samping anggota keluarga yang merokok. Paparan Asap rokok bukan hanya menjadi penyebab langsung kejadian ISPA pada balita, tetapi menjadi faktor tidak langsung yang diantaranya dapat melemahkan daya tahan tubuh balita. Asap rokok dapat menurunkan kemampuan makrofag membunuh bakteri. Asap rokok juga diketahui dapat merusak ketahanan lokal paru, seperti kemampuan pembersihan mukosiliaris, maka adanya anggota keluarga yang merokok terbukti merupakan faktor risiko yang dapat menimbulkan gejala gangguan pernafasan pada anak balita.

Berdasarkan hasil penelitian meta analisis yang dilakukan Starchan dan cook menyimpulkan bahwa hubungan orang tua perokok dan penyakit saluran nafas bawah akut pada bayi sangat mungkin. Paparan asap rokok lingkungan (salah satu anggota keluarga) setelah bayi lahir menyebabkan peningkatan risiko penyakit pernafasan akut pada anak (Rad Marsy, 2000).

Berdasarkan hasil Penelitian Mukono di Puskesmas Pati 1 tahun 2006, dengan desain *case control* berdasarkan hasil analisis bivariat, keberadaan anggota keluarga yang merokok dengan kejadian Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) pada balita di peroleh nilai $p = 0,000$ dan $OR = 4,63$ (95% $CI = 2,04 - 10,52$), secara statistik dapat dikatakan ada hubungan yang bermakna antara keberadaan anggota keluarga yang merokok dengan kejadian Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) pada Balita.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Wilayah pesisir Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima tahun 2014 dan pengolahan data dengan menggunakan analisis statistik dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Ada hubungan Penggunaan Jenis Bahan bakar Biomassa dengan Kejadian Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) pada Balita dengan Nilai $p = 0,001$ di wilayah Pesisir Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima tahun 2014
2. Ada Hubungan Luas Ventilasi dengan kejadian Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) pada Balita dengan nilai $p = 0,000$ di wilayah Pesisir Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima tahun 2014
3. Ada Hubungan Kepadatan Hunian dengan Kejadian Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) pada Balita dengan nilai $p = 0,000$ di Wilayah Pesisir Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima tahun 2014
4. Tidak Ada hubungan antara Perilaku merokok dengan Kejadian Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) pada Balita dengan nilai $p = 0,084$ di Wilayah pesisir Deas kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima tahun 2014

B. Implikasi

1. Bagi Masyarakat

Mengingatkan kepada Anggota keluarga yang merokok agar tidak merokok dalam rumah dan tidak merokok ketika berada bersama balita, hal ini mencegah balita terpapar asap rokok yang merupakan salah satu penyebab Terjadinya Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) pada Balita.

2. Bagi Instansi Kesehatan yang terkait

Memberikan penyuluhan terhadap masyarakat tentang Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) pada Balita sehingga masyarakat dapat mencegah terjadinya Infeksi Kejadian Saluran Pernafasan Akut (ISPA) pada Balita dan Agar dapat memeriksakan lebih dini ke petugas Kesehatan Apabila terdapat Gejala Klinis Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) pada Balita.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustama. 2005. *Kejadian Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) pada Balita*
- Al-Qur'an dan terjemahnya*. 2000. Departemen Agama Jakarta : UD Mekar Surabaya
- Aprinda, Dwi. 2007. *Hubungan tingkat kesehatan Rumah dengan kejadian ISPA pada anak Balita di desa Labuhan Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa*
- Azwar , Azrul. 1990. *Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan*. Jakarta : Mutiara
- Dachroni. 2002. *Jaangan biarkan hidup dikendalikan rokok*. Jakarta. Interaksi Media Promosi Kesehatan Indonesia No.XII
- Data Primer Puskesmas Sanggar Tahun 2012*
- Data Primer Puskesmas Sanggar Tahun 2013*
- Data primer Puskesmas Sanggar Tahun 2014*
- Dekes RI. 2000. *Informasi Tentanng ISPA pada Balita*. Jakarta : Pusat Penyuluhan Kesehatan Masyarakat
- Depkes RI. 2002. *Pedoman pemberantasan Penyakit ISPA untuk penanggulangan Pneumonia pada Balita*. Jakarta : Departemen Kesehatan RI
- Depkes RI. 2005. *Pemberantasan Penyakit dan penyehatan lingkungan di Indonesia*. Jakarta : Departemen Kesehatan RI
- Depkes RI. 2007. *Pedoman pemberantasan Penyakit ISPA* . Jakarta : Departemen Kesehatan RI
- Depkes. 2007. *Riskesdas 2007*. Jakarta: Depkes RI (Online) http://www.ppid.depkes.go.id/index.php?option=com_docman&task=doc_download&id=53&Itemid=87 Diakses 2 Mei 2014
- Depkes RI. 2009. *Perokok Pasif Mempunyai Resiko yang lebih besar*
- Frinck, Heinz (1993). *Ilmu Konstruksi Bangunan 2*, Yogyakarta : Kanisius

<http://nationalgeographic.co.id/berita/2012/06/asap-rumah-tangga-lebih-berbahaya-dari-rokok>

Ike Suhandayani. 2007. *Faktor yang berhubungan dengan kejadian ISPA di Puskesmas Pati Kabupaten Pati*

Keman, S. 2005. *Kesehatan Perumahan dan Lingkungan Pemukiman. Jurnal Kesehatan Lingkungan Vol.2 No.1 : 29-42*

Kassamsi, 2008. *Hubungan kondisi ventilasi dan penggunaan kayu bakar dengan kejadian ispa pada balita di wilayah kerja Puskesmas Rembon kecamatan rembon kabupaten Tana Toraja*. Skripsi sarjana tidak diterbitkan,FKM-Universitas hasanuddin

Likyanto, Karim. 2012. *Hubungan sanitasi Rumah dengan Kejadian ISPA pada Balita di wilayah Kerja Puskesmas Marisa kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwatu*

Marhamah, A.Arsunan Arsin, Wahidudin . 2012. *Faktor yang berhubungan dengan Kejadian ISPA pada anak Balita di Desa Bontongan Kabupaten Enrekang*

Mukono. 2006. *Faktor- faktor yang berhubungan dengan kejadian ISPA pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Pati I*

Mukono H.J , 1997 . *Pencemaran udara dan pengaruhnya terhadap Gangguan saluran pernapasan*. Surabaya : Yayasan Sarana Cipta

Notoatmodjo, S.2003. *Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Jakarta : Rineka Cipta

Notoatmodjo. S. 2005. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. PT.Rineka Cipta. Jakarta

Nur, Achmad. 2003. *Hubungan sanitasi Rumah secara fisik dengan kejadian Ispa pada Balita di kelurahan Panjaringan sari kecamatan Rungkut Kota Surabaya*

PERMENKES 829/MENKES/SK/VII/ 1999

Profil Desa Kore, 2013.

Puskesmas Sanggar , 2013. Laporan Tahunan Puskesmas sanggar

Rad Marssy. 2007. *Bahaya Asap Rokok terhadap Bayi dan Anak*. <http://radmarssy.wordpress.com>. [2 Februari 2014].

- Rasmaliah, 2004. *Infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) dan penanggulangannya* [online] library.usu.ac.id/download/fkm/fkm-rasmaliah9.pdf [diakses 15 Maret 2014]
- Ribka Rerung Layuk, Nur Nasry Noer, Waidudin 2012. *Faktor yang berhubungan dengan Kejadian ISPA pada Balita di Lembang Batu Sura'*
- Riskesdes Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2007*
- Riskesdes, Badan Penelitian dan Pengembangan kesehatan Kementerian Kesehatan RI 2013*
- Saleh, L .2006. *Faktor resiko penggunaan bahan bakar biomassa terhadap tuberculosis paru di kec galesong selatan kabupaten takalar*. Tesis Pasca Sarjana Unhas
- Satwiko. Prasasta. 2005. *Arsitektur sadar energy*, Yogyakarta : CV Andi Offset
- Shihab, M.Quraish. 2005. *Tafsir Al-Misbah*. Lentera Hati : Jakarta
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung : Alfabeta, 2011
- Sultan, Sulfiani, 2003 *Hubungan kondisi perumahan dan pengguna bahan bakar dengan kejadian ISPA pada balita diwilayah kerja puskesmas Tonjange Kabupaten soppeng*, Skripsi FKM-Universitas Hasanuddin
- Sulviani. 2012. *Hubungan antara jenis bahan bakar dengan Kejadian ISPA pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Ralla*
- Sukmawati. 2010. *Hubungan Status Gizi, Berat badan Lahir (Bbl), Imunisasi Dengan Kejadian Infeksi Saluran pernafasan Akut (ISPA) pada balita di Wilayah kerja Puskesmas Tunikamaseng Kabupaten Maros*
- Sugiyono. 2007. *Statistika untuk penelitian*. Cetakan kedua belas. Alfabeta. Bandung
- Vina, Mairuhu. Agus Bintara Birawida, Syamsuar Manyuleu. 2012. *Faktor yang berhubungan dengan kejadian ISPA pada Balita di Pulau Barrang Lompo kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar*
- Winarni, 2010. *Faktor yang berhubungan dengan Kejadian ISPA pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Sempor II*

- Winda, 2006. *Faktor yang berhubungan dengan kejadian ISPA di kelurahan Pampang Kecamatan Panakukang kota Makassar*. Skripsi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin
- WHO. 2012. *Acute Respiratory Infections (Update September 2009)*. (Online)http://www.who.int/vaccine_research/diseases/ari/en/index.html Diakses 2 Mei 2014