

**ANALISIS KANDUNGAN LOGAM BERAT TIMBAL (Pb) PADA
IKAN BANDENG (*Chanos-chanos*) DI BEBERAPA PASAR
TRADISIONAL KOTA MAKASSAR**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains
Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

AFNAN FADHLAN
NIM. 60300112007

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afnan Fadhlan
NIM : 60300112007
Tempat/ Tgl. Lahir : Ujung Pandang/ 23 Oktober 1993
Jur/Prodi : Biologi
Fakultas : Sains dan Teknologi
Alamat : Jl. A. P. Pettarani VI No. 84 Makassar
Judul : “Analisis Kandungan Logam Berat Timbal (Pb) pada Ikan Bandeng (*Chanos-chanos*) di Beberapa Pasar Tradisional Kota Makassar”

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 23 Juni 2016

Penyusun,

Afnan Fadhlan

NIM: 60300112007

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Analisis Kandungan Logam Berat Timbal (Pb) pada Ikan Bandeng (*Chanos-chanos*) di Beberapa Pasar Tradisional Kota Makassar”, yang disusun oleh Afnan Fadhlán, NIM: 60300112007, mahasiswa Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2016 M, bertepatan 18 Ramadhan 1437 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Sains dan Teknologi, Jurusan Biologi (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 23 Juni 2016 M
18 Ramadhan 1437 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag. (.....)

Sekretaris : St. Aisyah S, S.Pd., M.Kes. (.....)

Munaqisy I : Ulfa Triyani A.Latif, S.Si., M.Pd. (.....)

Munaqisy II : Hasyimuddin, S.Si., M.Si. (.....)

Munaqisy III : Dr. Kasjim Salenda, SH., M.TH.I. (.....)

Pembimbing I : Fatmawati Nur, S.Si., M.Si. (.....)

Pembimbing II : Baiq Farhatul Wahidah, S.Si., M.Si. (.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.
NIP. 19691205 199303 1 001

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT, atas rahmat dan hidayahnya. Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Kandungan Logam Berat Timbal (Pb) pada Ikan Bandeng (*Chanos-chanos*) di Beberapa Pasar Tradisional Kota Makassar**”.

Terlepas dari semua itu, kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka kami menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat memperbaiki skripsi ini.

Skripsi ini telah kami susun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan skripsi ini. Untuk itu kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan skripsi ini.

Sebuah persembahan dan terima kasih yang khusus penulis persembahkan kepada Ayahanda **Fadhlan Musthafa, S.Sos** dan Ibunda **Netri Muslim** yang telah mencurahkan seluruh kasih sayang, berkorban, yang telah bekerja keras sepenuh

hati membesarkan dan membiayai penulis hingga dapat menyelesaikan pendidikan pada bangku kuliah hingga mendapatkan gelar Sarjana.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat selesai berkat dukungan dan bantuan dari pihak-pihak langsung maupun tidak langsung yang memperlancar jalannya penyusunan skripsi ini. Olehnya secara mendalam saya sampaikan banyak terima kasih kepada semua yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini diantaranya adalah:

1. Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan kebijakan-kebijakan membangun UIN Alauddin Makassar agar lebih berkualitas sehingga dapat bersaing dengan Universitas lainnya.
2. Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, beserta Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III, dan seluruh staf administrasi yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada kami selama masa pendidikan.
3. Dr. Mashuri Masri S.Si., M.Si. selaku Ketua Jurusan Biologi dan Ibunda Baiq Farhatul Wahidah, S.Si., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi.
4. Fatmawati Nur, S.Si., M.Si. selaku penasehat akademik selama 8 semester sekaligus sebagai pembimbing I dan Baiq Farhatul Wahidah, S.Si., M.Si. selaku pembimbing II, terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala arahan dan bimbingannya selama penyusunan skripsi.

5. Ulfa Triyani A. Latif, S.Si., M.Pd. Hasyimuddin, S.Si., M.Si. dan Dr. Kasjim Salenda, SH., M.TH.I. selaku penguji I, II, dan III, terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala kritik, saran, dan arahan yang membangun selama penyusunan skripsi.
6. Seluruh Staf pengajar terkhusus dosen Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi dan pegawai akademik Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yang telah banyak membimbing dan membantu penulis selama kuliah pada Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Biologi.
7. Bapak dan Ibu dosen dalam jajaran Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yang selama ini telah mendidik penulis dengan baik, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikannya pada tingkat perguruan tinggi.
8. Pegawai Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar yang telah banyak membantu selama melakukan penelitian dan telah memberikan dukungannya.
9. Kepada saudaraku Arifah Fadhlana dan Arina Fadhlana yang selalu memberi semangat dan do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhirnya.
10. Saudara seperjuanganku Indah Putri Novalaila, Erna, Mirna, Saenab, Suriani, serta teman-teman kelas A **BANTA** ("*Biological An Nidus To Affection*") **2012** yang senantiasa memberikan semangat, saran dan bantuannya, serta setia menemani penulis dalam suka maupun duka, menghadirkan cerita warna warni dalam bingkai persaudaraan.

11. Teman-teman “**RANVIER**” (Biologi Angkatan 2012) yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat serta menghadirkan cerita kurang lebih 4 tahun.
12. Terkhusus buat Susanto Dwi Saputra yang telah memberikan segala dukungan, do’a, semangat, kebersamaan dan bantuannya.
13. Adik-adik Mahasiswa jurusan Biologi 2013, 2014, dan 2015.
14. Terima kasih kepada teman-teman KKN Angkatan ke-51 Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa yang memberikan banyak pelajaran dan kenangan selama KKN.
15. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penulisan tugas akhir ini yang tidak dapat dituliskan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa karya sederhana ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari pada pembaca, sebagai bahan perbaikan kedepannya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah yang dilimpahkan rahmat dan ridho-Nya. Amin.

Makassar, 23 Juni 2016

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR ILUSTRASI.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
BABI PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Tujuan Penelitian	9
F. Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN TEORITIS	10
A. Tinjauan Umum Logam Berat	10
B. Tinjauan Umum Timbal (Pb)	13
C. Karakteristik Timbal	15
D. Tingkat Pencemaran Timbal (Pb)	17
E. Toksisitas Timbal (Pb)	18
F. Tinjauan Bioakumulasi	20
G. Absorpsi dan Bioakumulasi Pb pada Ikan	21
H. Absorpsi dan Bioakumulasi Pb pada Manusia	22
I. Tinjauan Umum Ikan Bandeng (<i>Chanos-chanos</i>).....	23

	J. Tinjauan Umum Tiga Pasar Tradisional	32
	K. Ayat yang Relevan	34
	L. Kerangka Pikir	36
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	37
	A. Jenis dan Lokasi Penelitian	37
	B. Pendekatan Penelitian	37
	C. Populasi dan Sampel	37
	D. Variabel Penelitian	38
	E. Defenisi Operasional Variabel	38
	F. Metode Pengumpulan Data	38
	G. Instrumen Penelitian (Alat dan Bahan)	39
	H. Prosedur Kerja	39
	I. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	40
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	42
	A. Hasil Penelitian	42
	B. Pembahasan	48
BAB V	PENUTUP	52
	A. Kesimpulan	52
	B. Implikasi Penelitian (Saran)	52
	KEPUSTAKAAN	53
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	56
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	67

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Pasar 1 (Paotere) Kadar Pb pada Daging Ikan Bandeng	42
Tabel 4.2 Pasar 1 (Paotere) Kadar Pb pada Usus Ikan Bandeng	43
Tabel 4.3 Pasar 1 (Paotere) Kadar Pb pada Hati Ikan Bandeng	43
Tabel 4.4 Pasar 1 (Paotere) Kadar Pb pada Ginjal Ikan Bandeng	44
Tabel 4.5 Pasar 2 (Rajawali) Kadar Pb pada Daging Ikan Bandeng	44
Tabel 4.6 Pasar 2 (Rajawali) Kadar Pb pada Usus Ikan Bandeng	45
Tabel 4.7 Pasar 2 (Rajawali) Kadar Pb pada Hati Ikan Bandeng	45
Tabel 4.8 Pasar 2 (Rajawali) Kadar Pb pada Ginjal Ikan Bandeng	46
Tabel 4.9 Pasar 3 (Terong) Kadar Pb pada Daging Ikan Bandeng	46
Tabel 4.10 Pasar 3 (Terong) Kadar Pb pada Usus Ikan Bandeng	47
Tabel 4.11 Pasar 3 (Terong) Kadar Pb pada Hati Ikan Bandeng	47
Tabel 4.8 Pasar 3 (Terong) Kadar Pb pada Ginjal Ikan Bandeng	48



DAFTAR ILUSTRASI

Gambar 1. Ikan Bandeng (<i>Chanos-chanos</i>).....	24
Gambar 2. Peta Lokasi Pasar Paotere	33
Gambar 3. Peta Lokasi Pasar Rajawali	33
Gambar 4. Peta Lokasi Pasar Terong	34
Gambar 5. Histogram Rata-rata Pb pada Sampel Ginjal Ikan Bandeng	48
Gambar 6. Pasar 1 (Paotere).....	60
Gambar 7. Pasar 2 (Rajawali)	60
Gambar 8. Pasar 3 (Terong)	60
Gambar 9 (a). Sampel yang sudah dipisahkan organ-organnya (Pasar 1)	61
Gambar 9 (b). Sampel yang sudah dipisahkan organ-organnya (Pasar 2)	61
Gambar 9 (c). Sampel yang sudah dipisahkan organ-organnya (Pasar 3)	61
Gambar 10. Persiapan penimbangan	62
Gambar 11. Penambahan HNO ₃ pekat	62
Gambar 12. Persiapan Destruksi	63
Gambar 13 (a). Destruksi basah sampel.....	63
Gambar 13 (b). Sampel yang telah didestruksi	63
Gambar 14. Sampel diencerkan dengan aquadest	64
Gambar 15. Persiapan sampel untuk dianalisa AAS	65
Gambar 16. Sampel dimasukkan ke dalam AAS	65
Gambar 17. Sampel dianalisa menggunakan AAS	66



ABSTRAK

Nama : Afnan Fadhlán
NIM : 60300112007
Judul Skripsi : Analisis Kandungan Logam Berat Timbal (Pb) pada Ikan Bandeng (*Chanos- chanos*) di Beberapa Pasar Tradisional Kota Makassar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kandungan logam berat timbal (Pb) yang terkandung pada ikan bandeng (*Chanos-chanos*) di beberapa pasar tradisional kota Makassar. Analisis kadar logam berat dilakukan dengan menggunakan metode AAS. Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk tabel dan diagram. Hasil penelitian menunjukkan kandungan logam berat timbal (Pb) yang terkandung dalam tubuh ikan bandeng pada pasar 1 (Paotere) adalah 0 ppm pada semua organ yang diuji, pada pasar 2 (Rajawali) adalah 0,00052 ppm pada organ ginjal dan pada pasar 3 (Terong) adalah 0,00113 ppm pada organ ginjal. Semua organ yang terkandung pada ikan di tiga pasar masih dibawah standar SNI.

Kata Kunci : *Chanos-chanos*, HNO₃ Pekat dan AAS.



ABSTRACT

Name : Afnan Fadhlán

Student ID Number : 60300112007

Title : Content Analysis of Heavy Metals Lead (Pb) in milkfish (*Chanos-Chanos*) in some traditional markets at Makassar City

This study aims to determine the heavy metals lead (Pb) which contain in milkfish (*Chanos-Chanos*) in some traditional markets at Makassar city. Levels of heavy metals lead analysis were calculated using AAS. The obtained data is presented in tables and diagrams. The results showed that heavy metals lead (Pb) which contain in the body of milkfish on the first market (Paotere) is 0 ppm in all tested organs, on the second (Rajawali) is 0.00052 ppm in the kidney, and on the third market (Terong) is 0.00113 ppm in the kidney. All the organs of milkfish which contain the heavy metals lead (Pb) in the three markets are still below the Indonesian National Standard (SNI)

Keywords : *Chanos-chanos*, HNO₃ Concentrate and AAS.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan industri dan pertanian telah mengakibatkan peningkatan pencemaran sungai dan danau dengan logam berat yang telah diidentifikasi sebagai bahaya lingkungan yang signifikan untuk ikan dan manusia (Uluturhan E, Kucuksezgin F, 2007). Akibat pencemaran logam berat adalah menyebabkan penurunan tingkat kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan.

Logam berat merupakan salah satu unsur pencemar perairan yang bersifat toksik dan harus terus diwaspadai keberadaannya. Penyebab utama logam berat menjadi bahan pencemar berbahaya yaitu logam berat tidak dapat dihancurkan (*non degradable*) oleh organisme hidup di lingkungan dan terakumulasi ke lingkungan, terutama mengendap di dasar perairan membentuk senyawa kompleks bersama bahan organik dan anorganik secara adsorpsi dan kombinasi (Nontji, 1993).

Pencemaran logam berat dapat merusak lingkungan perairan dalam hal stabilitas, keanekaragaman, dan kedewasaan ekosistem. Kerusakan ekosistem perairan dari aspek ekologis akibat pencemaran logam berat dapat ditentukan oleh faktor kadar dan kesinambungan zat pencemar yang masuk dalam perairan, sifat toksisitas dan biokonsentrasi. Pencemaran logam berat dapat menyebabkan terjadinya perubahan struktur komunitas perairan, jaringan makanan, tingkah laku, efek fisiologi, genetik, dan resistensi. Berbeda dengan logam biasa, logam berat biasanya

menimbulkan efek khusus pada makhluk hidup. Logam berat dapat menjadi bahan racun yang akan meracuni tubuh makhluk hidup (Palar, 1994).

Islam memiliki kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan. Islam mengajarkan kepada umat manusia untuk senantiasa menjaga lingkungan. Sebagai khalifah, manusia memiliki tugas untuk memanfaatkan, mengelola, dan memelihara alam semesta. Manusia sebagai penduduk bumi adalah individu yang memiliki tanggung jawab atas keberadaan lingkungan hidup. Allah telah menciptakan alam semesta untuk kepentingan dan kesejahteraan semua makhluk-Nya, khususnya manusia. Allah SWT berfirman dalam **Q.S Al-Rum/30: 41** :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Terjemahnya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)” (Al-Qur’an dan Terjemahnya, Kementerian Agama RI, 2009).

Menurut (Shihab, 2010), makna dari Q.S Al-Rum/30: 41 yaitu telah terlihat kebakaran, kekeringan, kerusakan, kerugian perniagaan, dan ketertenggelaman yang disebabkan oleh kejahatan dan dosa-dosa yang diperbuat manusia. Allah menghendaki untuk menghukum manusia di dunia dengan perbuatan-perbuatan mereka, agar mereka bertobat dari kemaksiatan.

Adapun logam berat yang berbahaya dan sering mencemari lingkungan adalah merkuri (Hg), timbal (Pb), arsenik (As), kadmium (Cd), chromium (Cr), dan nikel

(Ni) (Darmono, 1995). Penyebaran logam berat di tanah, perairan, ataupun udara dapat melalui berbagai hal, seperti pembuangan secara langsung limbah industri, baik limbah padat maupun limbah cair, dapat pula melalui udara karena banyak industri yang membakar begitu saja limbahnya dan membuang hasil pembakaran ke udara tanpa melalui pengolahan lebih dulu (Maktoeld, 1983).

Salah satu logam berat yang bisa mencemari perairan adalah timbal. Timbal merupakan salah satu logam berat non esensial yang sangat berbahaya dan dapat menyebabkan keracunan (toksisitas) pada makhluk hidup. Racun ini bersifat kumulatif, artinya sifat racunnya akan timbul apabila terakumulasi dalam jumlah yang cukup besar dalam tubuh makhluk hidup. Di dalam tubuh manusia, timbal (Pb) bisa menghambat aktivitas enzim yang terlibat dalam pembentukan hemoglobin (Hb) dan sebagian kecil timbal (Pb) diekskresikan lewat urin atau feses karena sebagian terikat oleh protein, sedangkan sebagian lagi terakumulasi dalam ginjal, hati, kuku, jaringan lemak, dan rambut. Waktu paruh timbal (Pb) dalam eritrosit adalah selama 35 hari dalam jaringan ginjal dan hati selama 40 hari, sedangkan waktu paruh dalam tulang adalah selama 30 hari. Tingkat ekskresi Pb melalui sistem urinaria adalah sebesar 76%, gastrointestinal 16%, untuk rambut, kuku, serta keringat sebesar 8%. Timbal terdapat dalam air karena adanya kontak antara air dengan tanah atau udara tercemar timbal, air yang tercemar oleh limbah industri atau akibat korosi pipa (Fardiaz, 1992).

Timbal (Pb) diabsorpsi hewan air dari lingkungan atau pakan yakni fitoplankton, zooplankton, dan tumbuhan renik yang sudah terakumulasi timbal dan

akan terikat dengan protein (*ligand binding*) pada jaringan tubuhnya. Pengambilan awal timbal oleh organisme air dapat melalui tiga proses utama yakni melalui alat pernapasan (insang), permukaan tubuh, dan dari makanan atau air melalui sistem pencernaan. Jumlah absorpsi logam dan kandungan logam dalam air biasanya proporsional, yakni kenaikan kandungan logam dalam jaringan sesuai dengan kenaikan kandungannya dalam air. Pada logam-logam non esensial (termasuk timbal), kandungan dalam jaringan naik terus sesuai dengan kenaikan konsentrasi logam dalam air lingkungannya (Darmono, 1995).

Ikan merupakan organisme air yang dapat bergerak dengan cepat. Ikan pada umumnya mempunyai kemampuan menghindarkan diri dari pengaruh pencemaran air. Jika dalam tubuh ikan telah terkandung kadar logam berat yang tinggi dan melebihi batas normal yang telah ditentukan menunjukkan telah terjadi pencemaran lingkungan. Terkait dengan hal tersebut, secara umum logam berat masuk ke dalam jaringan tubuh ikan melalui beberapa jalan, yaitu saluran pencernaan, saluran pernapasan, dan penetrasi melalui kulit (Darmono, 1995). Banyaknya logam berat yang terserap dan terdistribusi pada ikan tergantung pada bentuk senyawa dan konsentrasi polutan, aktivitas mikroorganisme, tekstur sedimen, serta jenis, dan unsur ikan yang hidup di lingkungan tersebut. Nilai rata-rata kadar timbal pada ikan yang ditetapkan SNI dan WHO senilai 0,3 ppm.

Masyarakat kota Makassar suka mengonsumsi ikan, karena selain harganya yang dapat dijangkau oleh semua kalangan juga banyak mengandung protein yang bagus untuk otak. Salah satu ikan yang dikonsumsi masyarakat kota Makassar saat ini

adalah ikan bandeng (*Chanos-chanos*). Ikan ini biasanya dibeli di pasar tradisional ataupun pasar pelelangan ikan.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui kandungan logam berat timbal (Pb) pada ikan bandeng (*Chanos-chanos*) di beberapa pasar tradisional kota Makassar yaitu pasar Paotere, pasar Rajawali, dan pasar Terong.

B. Rumusan Masalah

Masalah yang dikaji pada penelitian ini adalah bagaimana kandungan logam berat timbal (Pb) pada ikan bandeng (*Chanos-chanos*) di beberapa pasar tradisional kota Makassar?

C. Ruang Lingkup Penelitian

1. Logam berat timbal (Pb) adalah logam yang bersifat toksik terhadap manusia, yang bisa berasal dari tindakan mengonsumsi makanan, minuman, atau melalui inhalasi udara, debu yang tercemar Pb, kontak lewat kulit, dan kontak mata.
2. Ikan bandeng dikenal juga dengan ikan bolu. Ikan bandeng merupakan salah satu spesies yang termasuk dalam familia chanidae. Bagian tubuh yang diperiksa adalah ginjal (ekskresi), hati (dimakan), usus (dimakan), dan daging (dimakan).
3. Sampel ikan bandeng (*Chanos-chanos*) diperoleh dari tiga pasar tradisional yaitu pasar Paotere, pasar Rajawali, dan pasar Terong.

4. Analisis kandungan timbal (Pb) pada sampel dilakukan di Instansi Kimia Kesehatan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar.
5. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 02 Desember 2015 di tiga pasar tradisional yaitu pasar Paotere, pasar Rajawali, dan pasar Terong. Pengujian kandungan Pb dilakukan pada tanggal 03 Desember - 23 Desember 2015 di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar.

D. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu

Pada penelitian sebelumnya yaitu “Analisis Kandungan Logam Berat Timbal (Pb) pada Ikan Bandeng (*Chanos-chanos*) di Pertambakan Kecamatan Pangkajene” yang diteliti oleh Isnania. Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, 2010. Adapun hasil penelitiannya yaitu berdasarkan data hasil pengamatan pada uji bahwa pada sampel air laut dan sungai mengandung logam berat timbal (Pb) dengan masing-masing air laut (0,158 ppm) dan sungai (0,022 ppm). Pada sedimen terlihat bahwa sedimen laut dan sungai mengandung logam timbal (Pb) yaitu 0,075 ppm dan 0,048 ppm. Semua sampel ginjal ikan bandeng yang diperoleh dari beberapa daerah pertambakan terdeteksi mengandung/menyerap logam berat timbal (Pb). Ginjal ikan bandeng yang berasal dari kelurahan Sibatua dekat pemukiman memiliki kandungan yang paling tinggi mencapai 1,571 ppm, sedangkan kandungan terendah yaitu pada sampel ginjal ikan bandeng dekat jalan kelurahan Sibatua yaitu 0,159 ppm. Kadar rata-rata kandungan logam berat timbal (Pb) pada sampel hati ikan bandeng di kelurahan Sibatua dekat jalan mempunyai kadar timbal (Pb) paling tinggi

dibandingkan yang lain (0,899 ppm), terendah 0,102 ppm (dekat pemukiman). Pada sampel usus ikan bandeng di kelurahan Anrong Appaka dekat jalan mempunyai kadar timbal (Pb) paling tinggi dibandingkan yang lain (0,455 ppm), sedangkan kadar terendah diperoleh 0,069 ppm (dekat pemukiman). Pada sampel otot ikan bandeng di kelurahan Sibatua yang berada di dekat sungai memiliki kadar timbal (Pb) lebih tinggi dibandingkan yang lain (1,44 ppm) dan terendah pada kelurahan Anrong Appaka dekat sungai yaitu 0,059 ppm. Nilai rata-rata kadar timbal yang diamati pada ikan bandeng melampaui batas yang ditetapkan WHO 0,1 ppm, namun kandungan logam berat timbal (Pb) dalam ikan bandeng masih relatif rendah sesuai standar yang ditetapkan oleh Dirjen POM No. 03725/B/SK/VI/89 senilai 2 ppm dan masih aman untuk dikonsumsi saat ini.

“Analisis Pb dalam Beberapa Jenis Ikan dari perairan Suppa kabupaten Pinrang” yang diteliti oleh Ima Rachmah Supardi, L. Musa Ramang, Rohani Bahar. Jurusan Kimia, FMIPA, Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Adapun hasil penelitiannya yang didapatkan maka diperoleh bahwa kandungan Pb pada ikan yang hidup di perairan sekitar Marabombang adalah ikan kerapu sunu sebesar 0,0398 mg/kg, ikan buntal sebesar 2,6717 mg/kg, dan ikan kerapu bebek sebesar 4,0772 mg/kg. Adanya kandungan logam pada ikan tersebut kemungkinan disebabkan oleh tumpahan bahan bakar dari kapal-kapal nelayan yang bersandar di dermaga Marabombang. Bahan bakar seperti bensin atau solar mengandung Pb yang ketika tumpah ke perairan dapat diserap oleh organisme air yang hidup di sekitar perairan tersebut. Cemaran Pb juga dapat berasal dari serpihan cat kapal-kapal kayu

nelayan yang jatuh ke perairan. Kandungan Pb pada ikan dari perairan ujung Lero adalah ikan baronang sebesar 3,7714 mg/kg dan ikan ekor kuning sebesar 2,6476 mg/kg. Kandungan Pb pada ikan dari perairan sekitar ujung lero merupakan terjadinya akumulasi kadar logam berat yang tinggi di dalam tubuhnya. Bahwa pada ikan bandeng yang berasal dari salah satu tambak milik warga dari ujung Lero memiliki kandungan Pb yang sangat tinggi, hal ini mungkin disebabkan karena lokasi tambak tempat mengambil ikan berada di pinggir jalan raya yang banyak dilalui oleh kendaraan bermotor. Asap kendaraan bermotor yang mengandung Pb dapat mencemari tambak tersebut. Selain itu, kandungan Pb mungkin juga disebabkan oleh tumpahan bahan bakar mesin pompa air yang digunakan pemilik tambak untuk memompa air masuk ke dalam tambak. Air yang digunakan mengisi tambak merupakan air laut sehingga hal ini menambah kemungkinan tingginya logam Pb pada tambak tersebut yang kemudian terakumulasi oleh ikan bandeng yang ada pada tambak tersebut.

“Biokonsentrasi Logam Berat Pb pada karang lunak (*Sinularia polydactyla*) di perairan Pulau Lae-lae, Pulau Bonebatang, dan Pulau Badi” yang diteliti oleh Haryanto Kadir dari Jurusan Ilmu Kelautan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin, Makassar 2013. Adapun hasil penelitian ini yaitu berdasarkan hasil penelitian didapatkan karang lunak *Sinularia polydactyla* mampu mengakumulasi logam berat Pb pada kolenkim untuk Pulau Laelae sebesar $8,382 \pm 1,205$ ppm (rata-rata \pm SDEV), Pulau Bonebatang $12,378 \pm 2,256$ ppm, dan Pulau Badi $10,127 \pm 2,955$ ppm, sementara pada polip karang lunak *Sinularia*

polydactyla untuk Pulau Laelae sebesar $0,029\pm 0,004$ ppm, Pulau Bonebatang $0,084\pm 0,043$ ppm, dan Pulau Badi $0,072\pm 0,035$ ppm. Biokonsentrasi di kolenkim lebih besar daripada di polip. Perbedaan konsentrasi logam Pb di air laut tidak mempengaruhi konsentrasi pada karang lunak *Sinularia polydactyla*.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kandungan logam berat timbal (Pb) yang terkandung pada ikan bandeng (*Chanos-chanos*) di beberapa pasar tradisional kota Makassar.

F. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat konsumen ikan bandeng (*Chanos-chanos*) yang diperoleh dari tiga pasar tradisional kota Makassar.
2. Sebagai bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Logam Berat

Logam berat dapat didefinisikan sebagai unsur-unsur yang mempunyai nomor atom 22-92 dan terletak pada periode 4 - 7 pada susunan berkala Mendeleev. Logam berat mempunyai efek racun terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya. Logam berat yang berbahaya dan sering mencemari lingkungan adalah merkuri (Hg), timbal (Pb), arsenik (As), kadmium (Cd), kromium (Cr), dan nikel (Ni). Logam-logam tersebut dapat menggumpal di dalam tubuh organisme dan tetap tinggal dalam tubuh dalam jangka waktu yang lama sebagai racun yang terakumulasi (Fardiaz, 1992).

Menurut (Connel dan Miller, 1995), kegiatan manusia merupakan suatu sumber utama pemasukan logam berat ke dalam lingkungan perairan. Masuknya logam berat berasal dari buangan langsung berbagai jenis limbah yang beracun.

Logam berasal dari kerak bumi yang berupa bahan-bahan murni, organik, dan anorganik. Logam mula-mula diambil dari pertambangan di bawah tanah (kerak bumi), yang kemudian dicairkan dan dimurnikan dalam pabrik menjadi logam-logam murni. Dalam proses pemurnian logam tersebut yaitu dari pencairan sampai menjadi logam, sebagian darinya terbuang ke dalam lingkungan (Darmono, 1995).

Umumnya logam-logam yang terdapat dalam tanah dan perairan dalam bentuk persenyawaan, seperti senyawa hidroksida, senyawa oksida, senyawa karbonat, dan senyawa sulfida. Senyawa-senyawa itu sangat mudah larut dalam air. Namun

demikian pada badan perairan yang mempunyai derajat keasaman mendekati normal atau pada daerah kisaran pH 7 sampai 8, kelarutan dari senyawa-senyawa ini cenderung stabil (Darmono, 2001).

Sumber terbarnya logam dalam lingkungan dan di udara karena proses digunakannya logam tersebut pada suhu yang tinggi. Misalnya, penggunaan batu bara dan minyak bumi untuk pembangkit tenaga listrik, proses industri, peleburan logam, pemurnian logam, pembakaran sampah, dan industri semen. Dalam proses tersebut logam dikeluarkan ke udara di daerah sekitarnya. Logam seperti As, Hg, Cd, dan Pb banyak dipelajari oleh para ilmuwan karena keempat logam tersebut sangat berbahaya terhadap kehidupan makhluk hidup. Emisi logam tersebut dalam proses penggunaan suhu tinggi akan merusak siklus biogeokimiawi sistem tata kehidupan manusia dan alam sekitarnya. Untuk mengetahui dan mengukur seberapa jauh kerusakan yang ditimbulkannya perlu diinventarisasikan seberapa besar jumlah konsentrasi emisi dari logam tersebut (Darmono, 2001).

Dalam kelompok inti polutan air logam berat memiliki sifat yang bioakumulatif dan *non biodegradable* (Kazim Uysal dkk, 2015).

Logam berat dalam air mudah terserap dan tertimbun dalam fitoplankton yang merupakan titik awal dari rantai makanan, selanjutnya melalui rantai makanan sampai ke organisme lainnya (Fardiaz, 1992). Kadar logam berat dalam air selalu berubah-ubah tergantung pada saat pembuangan limbah, tingkat kesempurnaan, pengelolaan limbah, dan musim. Logam berat yang terikat dalam sedimen relatif sukar untuk lepas

kembali melarut dalam air, sehingga semakin banyak jumlah sedimen maka semakin besar kandungan logam berat di dalamnya (Muchyiddin, 2007).

Keberadaan logam di badan perairan dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan di antaranya adalah suhu, pH, dan salinitas (Palar, 1994).

Menurut (Connell dan Miller, 1995), dalam lingkungan perairan ada tiga media yang dapat dipakai sebagai indikator pencemaran logam berat, yaitu air, sedimen, dan organisme hidup. Pemakaian organisme hidup sebagai indikator pencemaran inilah yang disebut bioindikator. Dalam pemilihan organisme laut sebagai bioindikator pencemaran, memberikan beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Harus dapat mengakumulasi bahan cemar tanpa dia sendiri mati terbunuh.
2. Harus terdapat dalam jumlah yang banyak di seluruh daerah penelitian.
3. Terikat pada suatu tempat yang keras agar bisa mewakili daerah yang diteliti.
4. Hidup dalam waktu yang lama untuk memungkinkan sampling lebih dari satu tahun jika dibutuhkan.
5. Mudah diambil dan tidak mudah rusak.

Akumulasi logam berat dalam tubuh organisme tergantung pada konsentrasi logam berat dalam air atau lingkungan, suhu, keadaan spesies, dan aktivitas fisiologis. Organisme laut lebih memiliki daya tahan dibandingkan dengan biota air tawar. Kelarutan timbal di air cukup rendah mengakibatkan kadarnya relatif sedikit. Kadar dan toksisitas timbal dipengaruhi oleh: kesadahan, pH, alkalinitas, dan kadar oksigen (Darmono, 1995).

Dalam jumlah debit yang besar logam akan terkontaminasi pada air limbah, industri bantalan logam berat, seperti Cd, Cr, Cu, Ni, As, Pb, dan Zn, yang paling berbahaya di antara industri kimia intensif. Karena kelarutan tinggi di lingkungan perairan, logam berat dapat diserap oleh organisme hidup setelah memasuki rantai makanan, konsentrasi besar logam berat dapat terakumulasi dalam tubuh manusia. Jika logam yang terserap di luar konsentrasi, maka dapat menyebabkan gangguan kesehatan yang serius (Babel dan Kurniawan, 2004).

Menurut (Laws, 1981), tingginya kandungan logam berat di suatu perairan dapat menyebabkan kontaminasi, akumulasi bahkan pencemaran terhadap lingkungan seperti biota, sedimen, air, dan sebagainya. Berdasarkan kegunaannya, logam berat dapat dibedakan atas dua golongan, yaitu :

1. Golongan yang dalam konsentrasi tertentu berfungsi sebagai mikronutrien yang bermanfaat bagi kehidupan organisme perairan, seperti Zn, Fe, Cu, dan Co.
2. Golongan yang sama sekali belum diketahui manfaatnya bagi organisme perairan, seperti Hg, Cd, dan Pb.

Menurut (Hamidah, 1980), limbah yang mengandung logam berat ini akan terbawa oleh sungai dan karenanya limbah industri merupakan sumber pencemar logam berat yang potensial bagi pencemaran laut. Dalam perairan, logam-logam ditemukan dalam bentuk :

1. Terlarut, yaitu ion logam bebas air dan logam yang membentuk kompleks dengan senyawa organik dan anorganik.

2. Tidak terlarut, terdiri dari partikel yang berbentuk koloid dan senyawa kompleks metal yang terabsorpsi pada zat tersuspensi.

Adanya logam berat di perairan, berbahaya baik secara langsung terhadap kehidupan organisme, maupun efeknya secara tidak langsung terhadap kesehatan manusia. Hal ini berkaitan dengan sifat-sifat logam berat yaitu sulit didegradasi, sehingga mudah terakumulasi dalam lingkungan perairan dan keberadaannya secara alami sulit terurai (dihilangkan), dapat terakumulasi dalam organisme termasuk kerang dan ikan, dan akan membahayakan kesehatan manusia yang mengkonsumsi organisme tersebut (Nontji, 1993).

Logam berat yang terlarut dalam air akan berpindah ke dalam sedimen jika berikatan dengan materi organik bebas atau materi organik yang melapisi permukaan sedimen, dan penyerapan langsung oleh permukaan partikel sedimen (Wilson, 1988).

Unsur-unsur logam berat dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan dan minuman serta pernafasan dan kulit. Peningkatan kadar logam berat dalam air laut akan diikuti oleh peningkatan logam berat dalam tubuh ikan dan biota lainnya, sehingga pencemaran air laut oleh logam berat akan mengakibatkan ikan yang hidup di dalamnya tercemar. Pemanfaatan ikan-ikan ini sebagai bahan makanan akan membahayakan kesehatan manusia (Hutagalung, 1991).

B. Tinjauan Umum Timbal (Pb)

Logam berat biasanya ditemukan sangat sedikit dalam air. Secara alamiah, yaitu kurang dari 1 µg/l. Bila terjadi erosi alamiah, konsentrasi logam tersebut dapat

meningkat. Beberapa macam logam biasanya lebih dominan daripada logam lainnya dan dalam air biasanya tergantung pada asal sumber air (air tanah dan air sungai). Di samping itu jenis air (air tawar, air payau, dan air laut) juga mempengaruhi kandungan logam di dalamnya (Darmono, 2001).

Timbal (Pb) pada awalnya adalah logam berat yang secara alami terdapat di dalam kerak bumi. Namun, timbal (Pb) juga biasa berasal dari kegiatan manusia bahkan mampu mencapai jumlah 300 kali lebih banyak dibandingkan Pb alami. Pb memiliki titik lebur rendah, mudah dibentuk, memiliki sifat kimia yang aktif, sehingga bisa digunakan untuk melapisi logam agar tidak timbul perkaratan. Apabila dicampur dengan logam lain akan terbentuk logam campuran yang lebih bagus daripada logam murninya. Pb adalah logam lunak berwarna abu-abu kebiruan mengkilap serta mudah dimurnikan dari pertambangan. Timbal (Pb) meleleh pada suhu 328°C (662°F), titik didih 1740°C (3164°F), dan memiliki gravitasi 11,34 dengan berat atom 207,20 (Wahyu, 2008).

Menurut (Wahyu, 2008), timbal (Pb) terdiri dari 4 macam yaitu :

1. Timbal 204 dengan jumlah sebesar 1,48% dari seluruh isotop timbal.
2. Timbal 206 sebanyak 23,06%.
3. Timbal 207 sebanyak 22,60%.
4. Timbal 208 yang merupakan hasil akhir dari peluruhan radioaktif thorium (Th).

Logam Pb banyak digunakan pada industri baterai, kabel, cat (sebagai zat pewarna), penyepuhan, pestisida, dan yang paling banyak digunakan sebagai zat antiletup pada bensin. Pb juga digunakan sebagai zat penyusun patri atau solder dan

sebagai formulasi penyambung pipa yang mengakibatkan air untuk rumah tangga mempunyai banyak kemungkinan kontak dengan Pb (Darmono, 1995).

Kadar ini dapat meningkat jika terjadi peningkatan limbah yang mengandung logam berat masuk ke dalam laut. Limbah ini dapat berasal dari aktivitas manusia di laut yang berasal dari pembuangan sampah kapal-kapal, penambangan logam di laut, dan lain-lain dan yang berasal dari darat seperti limbah perkotaan, pertambangan, pertanian, dan perindustrian (Kadir, 2013).

Kebanyakan logam berat secara biologis terkumpul dalam tubuh organisme, menetap untuk waktu yang lama dan berfungsi sebagai racun kumulatif (Darmono, 1995). Keberadaan logam berat dalam perairan akan berpengaruh negatif terhadap kehidupan biota. Logam berat yang terikat dalam tubuh organisme yaitu pada ikan akan mempengaruhi aktivitas organisme tersebut (Kadir, 2013).

Logam berat Pb yang masuk ke dalam lingkungan perairan akan mengalami pengendapan, pengenceran, dan dispersi, kemungkinan diserap oleh organisme yang hidup di perairan tersebut. Pengendapan logam berat di suatu perairan terjadi karena adanya anion karbonat hidroksil dan klorida. Logam berat mempunyai sifat yang mudah mengikat bahan organik dan mengendap di dasar perairan dan berikatan dengan partikel-partikel sedimen, sehingga konsentrasi logam berat dalam sedimen lebih tinggi dibanding dalam air (Hutagalung, 1991).

Senyawa Pb yang ada dalam badan perairan dapat ditemukan dalam bentuk ion-ion divalen atau ion-ion tetravalen (Pb^{2+} , Pb^{4+}). Ion Pb divalen (Pb^{2+}) digolongkan ke dalam kelompok ion logam kelas antara. Sedangkan ion Pb tetravalen

(Pb⁴⁺) digolongkan pada kelompok ion logam kelas B. Pengelompokan ion logam ini dibuat oleh Richardson. Bila didasarkan pada pengelompokan ion-ion logam Richardson itu, ion Pb tetravalen mempunyai daya racun yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan ion Pb divalen. Akan tetapi dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa ion Pb divalen lebih berbahaya dibandingkan dengan ion Pb tetravalen (Palar, 1994).

Organisme yang terekspos logam berat Pb dengan konsentrasi rendah biasanya tidak mengalami kematian, tetapi akan mengalami pengaruh sublethal, yaitu pengaruh yang terjadi pada organisme tanpa mengakibatkan kematian pada organisme tersebut. Pengaruh sublethal ini dapat dibedakan atas tiga macam, yaitu menghambat (misalnya pertumbuhan dan perkembangan, serta reproduksi), menyebabkan terjadinya perubahan morfologi dan merubah tingkah laku organisme. Logam berat yang dilimpahkan ke perairan, baik sungai ataupun laut, akan mengalami paling tidak tiga proses, yaitu pengendapan, adsorpsi, dan absorpsi oleh organisme-organisme perairan (Bryan, 1976).

Menurut (Rompas, 2010), timbal termasuk polutan di laut yang sangat berbahaya, tidak hanya bagi biota perairan, tetapi akan berdampak bagi manusia yang memakannya. Faktor yang menyebabkan logam tersebut dikelompokkan ke dalam zat pencemar ialah :

1. Logam tidak dapat terurai melalui biodegradasi seperti pencemar organik.
2. Logam dapat terakumulasi dalam lingkungan terutama dalam sedimen sungai dan laut, karena dapat terikat dengan senyawa organik dan anorganik, melalui proses

adsorpsi dan pembentukan senyawa kompleks. Karena logam dapat terakumulasi dalam sedimen, maka kadar logam dalam sedimen lebih besar dari logam dalam air.

Logam timbal di bumi jumlahnya sangat sedikit, yaitu 0,0002% dari jumlah kerak bumi bila dibandingkan dengan jumlah kandungan logam lainnya yang ada di bumi. Timbal adalah logam yang mendapat perhatian karena bersifat toksik melalui konsumsi makanan, minuman, udara, air serta debu yang tercemar timbal. Intoksikasi Pb biasa terjadi melalui jalur oral, lewat makanan, minuman, pernapasan, kontak lewat kulit, dan kontak lewat parenteral (Wahyu, 2008).

C. Karakteristik Timbal serta Keberadaannya dalam Air dan Makanan

Timbal atau timah hitam (*Plumbum* = Pb) termasuk jenis logam yang sudah sejak lama dikenal dan sangat populer. Hal tersebut disebabkan banyaknya timbal yang digunakan pada pabrik dan paling banyak menimbulkan keracunan pada makhluk hidup. Timbal yang mempunyai nomor atom 82, berat atom 207,19, dan berat jenis 11,34 merupakan logam lunak yang berwarna coklat kehitaman. Pada tekanan udara 1 atmosfer, titik cairnya adalah pada suhu $327,5^{\circ}\text{C}$, dan titik didihnya adalah pada suhu 174°C (Achmad, 2004).

Timbal dan persenyawaannya banyak digunakan dalam berbagai bidang. Persenyawaannya dengan logam Bismut (Pb-Bi) dengan perbandingan 93:7 digunakan sebagai grid dalam industri baterai. Timbal oksida (PbO_4) digunakan sebagai bahan aktif dalam mengalirkan arus elektron dalam industri baterai.

Persenyawaan timbal dengan 1% stibium (Sb) banyak digunakan sebagai bahan kabel telepon. Persenyawaan timbal dengan 0,15% As, 0,1% Sn, dan 0,1% Bi, banyak digunakan sebagai kabel listrik. Persenyawaan timbal dengan atom nitrogen untuk membentuk senyawa azida banyak digunakan sebagai detonator (bahan peledak). Senyawa $PbCrO_4$ digunakan dalam industri cat untuk mendapatkan warna kuning chrom, senyawa $Pb(OH)_2 \cdot 2PbCO_3$ untuk mendapatkan warna timah putih sedangkan senyawa Pb_3O_4 untuk mendapatkan warna timah merah. Senyawa silikat timbal (Pb silikat) digunakan sebagai bahan pengkilap keramik dan bahan tahan api. Persenyawaan antara timbal dengan arsenat dapat digunakan sebagai bahan insektisida. Persenyawaan timbal dengan Te (Telurium) digunakan sebagai komponen aktif pada pembangkit listrik tenaga panas. Persenyawaan yang dibentuk dari logam timbal sebagai aditif yaitu $(CH_3)_4Pb$ (tetrametil-timbal) dan $(C_2H_5)_4Pb$ (tetraetil-timbal) yang dicampurkan pada bahan bakar bensin untuk mengurangi letupan pada mesin kendaraan bermotor (Palar, 1994).

Timbal banyak digunakan untuk berbagai keperluan karena sifat-sifatnya antara lain : (1) mempunyai titik cair rendah sehingga jika digunakan dalam bentuk cair dibutuhkan teknik yang cukup sederhana dan tidak mahal; (2) sifat kimiawinya menyebabkan logam ini dapat berfungsi sebagai lapis dan pelindung jika kontak dengan udara lembab; (3) bersama-sama logam lainnya dapat membentuk Alloy yang mempunyai sifat berbeda dengan timbal murni; (4) kepadatannya lebih tinggi dibandingkan dengan logam lainnya kecuali emas dan merkuri (Fardiaz, 1992).

Timbal (Pb) dan persenyawaannya dapat berada di dalam badan perairan secara alamiah dan sebagai dampak dari aktivitas manusia. Secara alamiah, timbal dapat masuk ke dalam perairan melalui pengkristalan timbal di udara dengan bantuan air hujan. Di samping itu proses korosifikasi dari batuan mineral akibat hempasan gelombang dan angin, juga merupakan salah satu jalur sumber timbal yang akan masuk ke dalam badan perairan (Palar, 1994).

Timbal (Pb) yang ada dalam badan perairan dapat ditemukan dalam bentuk ion-ion divalen atau ion-ion tetravalen, ion timbal (Pb) divalen digolongkan dalam kelompok ion logam kelas antara sedangkan ion timbal (Pb) tetravalen digolongkan pada kelompok ion logam kelas B. Pengelompokan ion logam ini dibuat oleh Rhicardson. Bila didasarkan pada pengelompokan ion-ion logam Rhicardson itu, ion timbal tetravalen mempunyai daya racun yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan ion timbal divalen, akan tetapi dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa ion timbal divalen lebih berbahaya daripada ion timbal tetravalen (Palar, 1994).

D. *Tingkat Pencemaran Timbal (Pb)*

Emisi Pb dari lapisan atmosfer bumi berbentuk gas atau partikel. Emisi Pb bentuk gas, terutama berasal dari buangan gas kendaraan bermotor, merupakan hasil sampingan dari pembakaran mesin-mesin kendaraan dari senyawa tetrametil-Pb dan tetraetil-Pb dalam bahan bakar kendaraan bermotor. Emisi Timbal (Pb) dari pembakaran mesin menyebabkan jumlah timbal (Pb) udara dari asap buangan kendaraan meningkat sesuai meningkatnya jumlah kendaraan. Percepatan

pertumbuhan sektor transportasi, kepadatan arus lalu lintas. Dampak negatif kemacetan lalu lintas menyebabkan tingginya tingkat polusi udara di lingkungan kota. Hasil emisi gas pembuangan kendaraan bermotor akan meningkatkan pula kadar timbal (Pb) di udara. Asap kendaraan bermotor bisa mengeluarkan partikel timbal (Pb) yang kemudian bisa mencemari udara, tanaman di sekitar jalan raya, perairan, dan asap juga bisa terserap oleh manusia secara langsung melalui pernapasan kulit (Wahyu, 2008).

Pencemaran Pb dari kegiatan transportasi darat dikarenakan oleh penggunaan tetrametil-Pb dan tetraetil-Pb dalam bahan bakar berkualitas rendah untuk menurunkan nilai oktan sebagai *anti-knock* mesin kendaraan. Bahan aditif yang ditambahkan ke dalam bahan bakar kendaraan bermotor pada umumnya terdiri dari 62% tetraetil Pb, 18% etilenklorida, 18% etilenbromida, dan 2% campuran bahan lain. Jumlah senyawa Pb yang jauh lebih besar menyebabkan jumlah Pb yang dibuang ke udara sangat tinggi. Senyawa halogen (Br, Cl) mampu mengikat residu Pb setelah pembakaran sehingga dalam gas buangan terdapat Pb-halogen. $PbBrCl$ dan $PbBrCl \cdot 2PbO$ merupakan kandungan senyawa Pb utama pada saat pembakaran mesin (Palar, 1994).

E. Toksisitas Timbal (Pb)

Toksisitas Pb bersifat kronis dan akut. Toksisitas kronis sering dijumpai pada pekerja tambang dan pabrik pemurnian logam, pembuatan baterai, percetakan, pelapisan logam, dan pengecatan. Paparan timbal (Pb) secara kronis bisa

menyebabkan kelelahan, kelesuhan, gangguan iritabilitas, kehilangan libido, gangguan menstruasi serta aborsi spontan pada wanita, depresi, sakit kepala, sulit berkonsentrasi, daya ingat terganggu, dan sulit tidur. Toksisitas akut bisa terjadi bila Pb masuk ke dalam tubuh seseorang melalui makanan atau menghirup gas Pb dalam waktu yang relatif pendek dengan dosis atau kadar yang relatif tinggi (Wahyu, 2008).

Di dalam tubuh manusia, Pb bisa menghambat aktivitas enzim yang terlibat dalam pembentukan hemoglobin (Hb) dan sebagian kecil timbal (Pb) diekskresikan lewat urin atau feses karena sebagian terikat oleh protein, sedangkan sebagian lagi terakumulasi dalam ginjal, hati, kuku, jaringan lemak, dan rambut. Waktu paruh timbal (Pb) dalam eritrosit adalah selama 35 hari dalam jaringan ginjal dan hati selama 40 hari, sedangkan dalam tulang selama 30 hari. Tingkat ekskresi Pb melalui sistem urinaria adalah sebesar 76%, gastrointestinal 16%, dan untuk rambut, kuku, serta keringat sebesar 8% (Wahyu, 2008).

Timbal (Pb) dalam tubuh manusia terikat dalam gugus -SH molekul protein sehingga menghambat aktivitas kerja enzim. Keracunan akibat kontaminasi logam timbal (Pb) bisa menimbulkan berbagai macam hal, seperti meningkatnya kadar asam aminolevulinat dehidratase (ALAD) dalam darah dan urin, meningkatnya kadar protoporphin dalam sel darah merah, memperpendek umur sel darah merah, menurunkan jumlah sel darah merah dan kadar sel-sel darah merah yang masih muda (retikulosit), serta meningkatkan kandungan logam besi (Fe) dalam plasma darah (Wahyu, 2008).

Menurut (Wahyu, 2008), timbal bersifat kumulatif. Mekanisme toksisitas Pb berdasarkan organ yang dipengaruhinya adalah:

1. Sistem haemopoieti; dimana Pb menghambat sistem pembentukan hemoglobin (Hb) sehingga menyebabkan anemia.
2. Sistem saraf; dimana Pb bisa menimbulkan kerusakan otak dengan gejala epilepsi, halusinasi, kerusakan otak besar, dan delirium.
3. Sistem urinaria; dimana Pb bisa menyebabkan lesi tubulus proksimalis, *loop of Henle*, serta menyebabkan aminosiduria.
4. Sistem gastro-intestinal; dimana Pb menyebabkan kolik dan konstipasi.
5. Sistem kardiovaskuler; dimana Pb bisa menyebabkan peningkatan permeabilitas pembuluh darah.
6. Sistem reproduksi; berpengaruh terutama terhadap gametotoksitas atau janin belum lahir menjadi peka terhadap Pb. ibu hamil yang terkontaminasi Pb bisa mengalami keguguran, tidak berkembangnya sel otak embrio, kematian janin waktu lahir, serta hipospermia, dan teratospermia pada pria.
7. Sistem endokrin; dimana Pb mengakibatkan gangguan fungsi tiroid dan fungsi adrenal.
8. Bersifat karsinogenik dalam dosis tinggi.

Menurut (Wahyu, 2008), toksisitas akut bisa terjadi jika timbal (Pb) masuk ke dalam tubuh seseorang melalui makanan atau menghirup gas Pb dalam waktu yang relatif pendek dengan dosis atau kadar yang lebih tinggi. Gejala dan tanda-tanda klinis akibat paparan Pb secara akut bisa menimbulkan beberapa gejala, antara lain:

1. Gangguan gastrointestinal, seperti kram perut, dan biasanya diawali dengan sembelit, mual, muntah-muntah, dan sakit perut yang hebat.
2. Gangguan neurologi, berupa ensefalopati seperti sakit kepala, bingung atau pikiran kacau, sering pingsan, dan koma.
3. Gangguan fungsi ginjal, oliguria, dan gagal ginjal yang akut bisa berkembang dengan cepat.

Timbal (Pb) pada anak bisa merusak jaringan saraf, fungsi ginjal, menurunnya kemampuan belajar, dan membuat anak-anak bersifat hiperaktif. Selain itu, Pb juga mempengaruhi organ-organ tubuh, antara lain: sistem saraf, ginjal, sistem reproduksi, endokrin, dan jantung serta gangguan pada otak sehingga anak mengalami gangguan kecerdasan mental (Wahyu, 2008).

Keracunan Pb pada orang dewasa kebanyakan terjadi di tempat mereka bekerja. Prevalensi kejadiannya bervariasi untuk setiap jenis pekerjaannya. Gejala yang terlihat ialah penderita terlihat pucat, sakit perut, konstipasi, muntah, anemia, dan sering terlihat adanya garis biru tepat di daerah gusi di atas gigi. Pada pemeriksaan psikologi dan neuropsikologi ditemukan adanya gejala sulit mengingat (sistem memori sangat berkurang), konsentrasi menurun, kurang lancar berbicara, dan gejala saraf lainnya. Resiko terjadinya toksisitas Pb pada orang dewasa tergantung pada pekerjaannya yang biasanya bersifat kronis. Pada pemeriksaan darah para pekerja terhadap konsentrasi Pb akan diketahui seberapa jauh derajat toksisitas kronis Pb tersebut (Darmono, 2001).

F. Tinjauan Bioakumulasi

Logam berat menjadi berbahaya disebabkan oleh sistem bioakumulasi. Bioakumulasi berarti peningkatan konsentrasi unsur kimia tersebut dalam tubuh makhluk hidup sesuai piramida makanan. Ikan dapat mengadsorpsi metil merkuri melalui makanannya dan langsung dari air dengan melewati insang, merkuri juga dapat berikatan dengan protein di seluruh jaringan ikan, termasuk otot (Diliyana, 2008).

Akumulasi logam berat dalam jaringan ikan tergantung pada konsentrasi logam dalam air sekitarnya, di samping periode paparan (meskipun beberapa faktor lingkungan lain seperti salinitas, pH, kekeruhan, dan suhu juga ditemukan memainkan peran penting dalam akumulasi logam) (Yi YJ dkk, 2011).

Biokonsentrasi maupun bioakumulasi dapat menyebabkan peningkatan kepekaan bahan pencemar, sehingga umumnya berpengaruh masuknya di jaringan makhluk hidup (Connell dan Miller, 1995). Sedangkan menurut (Pratama, 2011), Biokonsentrasi adalah perpindahan senyawa kimia xenobiotik dari berbagai sumber di dalam lingkungan ke makhluk hidup yang menghasilkan suatu kepekatan yang umumnya lebih tinggi di dalam makhluk hidup dibandingkan sumbernya.

Faktor biokonsentrasi atau bioakumulasi dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan makhluk hidup dalam menyerap dan menyimpan suatu bahan pencemar (Connell dan Miller, 1995). Biokonsentrasi dapat dilihat sebagai proses kesetimbangan yang ditentukan jumlah pengambilan (biosorpsi) dan pelepasan (ekskresi) suatu senyawa oleh sel makhluk hidup di lingkungannya. Jadi memerlukan

proses perpindahan senyawa antara fase-fase di lingkungan dengan sel makhluk hidup. Jumlah pengambilan senyawa ditentukan kemampuan absorpsi sehingga jumlah senyawa yang diekskresikan menentukan konsentrasi senyawa tersebut pada sel. Senyawa dapat ditimbun dalam sel, dapat pula diubah atau didegradasi apabila sel mampu. Penimbunan senyawa persisten maupun logam berat umumnya terjadi karena sifat lipofilik dari senyawa tersebut. Dalam proses absorpsi oleh sel juga melalui membran (Chojnacka, 2005).

G. Absorpsi dan Bioakumulasi Timbal pada Ikan

Absorpsi ion-ion timbal ini umumnya berbentuk Pb^{2+} atau Pb^{4+} yang mudah terlarut dalam air oleh organisme air seperti ikan dan udang biasanya melalui insang, kulit (kutikula), dan melalui rantai makanan (Wahyu, 2008).

Hubungan antara jumlah absorpsi logam dan kandungan logam dalam air biasanya proporsional, dimana kenaikan kandungan logam dalam jaringan sesuai dengan kenaikan kandungan logam dalam air. Pada logam-logam esensial, kandungannya dalam jaringan biasanya mengalami regulasi, tetapi pada logam-logam tersebut dalam jaringan terus mengalami kenaikan sesuai dengan kenaikan konsentrasi logam dalam air lingkungannya. Dalam tubuh biota perairan jumlah logam yang terakumulasi akan terus mengalami peningkatan. Di samping itu, tingkatan biota dalam sistem rantai makanan turut menentukan jumlah timbal yang terakumulasi. Konsentrasi logam berat yang mematikan organisme akuatik tergantung pada sifat logam berat dan organisme itu sendiri (Setiady dkk, 1996).

H. Absorpsi dan Bioakumulasi Timbal (Pb) pada Manusia

Senyawa timbal (Pb) yang masuk ke dalam tubuh melalui makanan akan ikut dalam metabolisme tubuh. Penyerapan timbal melalui saluran pencernaan berkisar antara 1-20% dari total timbal yang berasal dari makanan dan minuman. Sistem porta hepatis membawa timbal tersebut dan dideposisi dan sebagian lagi diangkut oleh darah dan didistribusikan ke dalam jaringan (Darmono, 1995).

Secara intraseluler, timbal terikat pada kelompok sulfhidril dan ikut berperan dalam sejumlah enzim seluler, seperti dalam sintesis heme. Pengikatan seperti ini juga terdapat pada keberadaan timbal dalam rambut dan kuku. Timbal (terikat pada membran mitokondria dan bergabung dengan protein dan berperan dalam sintesis asam nukleat (Darmono, 1995).

Senyawa alkil Pb yang tidak dapat larut dalam air dapat diserap sampai ke kulit. Tetraetil Pb dan tetrametil Pb akan berubah menjadi metabolit trialkil dan responnya sangat tinggi terhadap toksisitas lemak. Senyawa Pb alkil pada akhirnya akan berubah menjadi Pb anorganik dan kemudian diekskresikan dalam urin (Darmono, 1995).

I. Tinjauan Umum Ikan Bandeng (*Chanos-chanos*)

Nama latin dari ikan bandeng adalah *Chanos-chanos*. Ikan bandeng dalam bahasa Inggris disebut milkfish yaitu sebuah ikan yang merupakan makanan yang penting di Asia Tenggara. Ikan bandeng merupakan satu-satunya spesies yang masih ada dalam famili chanidae. Dari data yang diperoleh bahwa kurang lebih 7 spesies ini

telah punah dalam 5 genus tambahan yang dilaporkan pernah ada spesies ini hidup di daerah samudra Hindia hingga samudra Pasifik. Ikan ini cenderung bergerombol disekitar pesisir dan pulau-pulau dengan koral. Ikan yang mudah dan baru menetas hidup di laut sekama 2-3 minggu, lalu berpindah ke rawa-rawa bakau, daerah payau, dan kadang kala di danau-danau (Arief dkk, 2008).

Ikan bandeng baru kembali ke laut kalau sudah dewasa dan bisa berkembang biak. Ikan muda atau nener yang dikumpulkan dari laut biasanya ditenakkan di tambak-tambak. Ikan bandeng di tambak diberi makanan apa saja dan tumbuh sangat cepat kurang lebih 3-4 bulan (Arief dkk, 2008).

Ikan bandeng dikenal juga sebagai ikan bolu merupakan jenis ikan air tawar yang sangat populer di Asia Tenggara, terkhusus di Sulawesi Selatan. Ikan bandeng (*Chanos-chanos*) merupakan salah satu spesies yang termasuk dalam familia chanidae. Bentuk tubuh ikan bandeng panjang dan ramping menyerupai torpedo. Dalam waktu kurang lebih enam bulan dalam kondisi normal, mampu berkembang hingga mencapai panjang antara 30-60 cm. Sistematika ikan bandeng sebagai berikut:

Kingdom : Animalia
Filum : Chordata
Kelas : Pisces
Sub Kelas : Teleostei
Ordo : Malacopterygii
Familia : Chanidae
Genus : Chanos

Spesies : *Chanos-chanos* (Jasin, 1992).



Gambar 1. Ikan Bandeng (Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016).



1. Morfologi dan Anatomi Ikan Bandeng (*Chanos-chanos*)

a. Bagian kepala ikan bandeng

Ikan bandeng memiliki ukuran kepala yang seimbang dengan ukuran tubuhnya, berbentuk lonjong. Bagian depan kepala semakin runcing. Adapun organ ikan bandeng pada bagian kepala antara lain:

- 1) Mulut: memiliki ukuran yang relatif kecil, karena hanya memakan plankton atau jasad renik.
- 2) Hidung: memiliki tonjolan tulang yang berfungsi untuk melepas karbondioksida, lubang hidung ini berhubungan dengan langsung dengan permukaan mulut. Hidung berukuran kecil dan terletak di atas mulut.
- 3) Mata: dilapisi oleh selaput bening yang berfungsi untuk menahan tekanan air. Mata terletak dibelakang lubang hidung.
- 4) Insang: merupakan organ yang berhubungan dengan pernapasan utama dari ikan yang terdiri atas penutup paling luar disebut *pro-coperculum*, penutup tengah disebut *intra-coperculum* dan paling belakang disebut *sub-coperculum*. Ketiga insang tersebut berfungsi sebagai penahan partikel-partikel air pada saat ikan bandeng bernapas dan mengisap makanan. Insang epithelium dari ikan adalah lokasi pertukaran gas yang utama, keseimbangan asam basa, regulasi ion. Fungsi organ pernapasan ini adalah hal yang penting bagi kehidupan ikan, dan untuk seluruh keberadaan ikan itu. Oleh karena itu, jika ikan diekspos ke

lingkungan tercemar akan membahayakan fungsi utama dari organ pernapasan ikan tersebut. Selain sebagai alat pernapasan ikan, insang juga digunakan sebagai alat pengukur tekanan air dan dalam tubuh ikan (osmoregulasi). Oleh sebab itu, insang sangat peka terhadap pengaruh toksisitas logam. Logam kelas B sangat reaktif terhadap ligan sulfur dan nitrogen, sehingga ikatan logam kelas B tersebut sangat penting bagi fungsi normal metaloenzim disibtitusi oleh logam yang bukan semestinya, maka akan menyebabkan protein mengalami deformasi dan mengakibatkan menurunnya kemampuan katalik enzim tersebut. Di samping gangguan sistem biokimiawi tersebut perubahan struktur morfologi insang juga terjadi. Insang merupakan komponen penting dalam pertukaran gas. Insang terbentuk dari lengkungan tulang rawan yang mengeras, dengan beberapa filamen insang di dalamnya. Tiap-tiap filamen insang terdiri atas banyak lamella. Struktur lamella tersusun atas sel-sel epitel yang tipis pada bagian luar, membran dasar dan sel-sel tiang sebagai penyangga pada bagian dalam. Pinggiran lamella yang tidak menempel pada lengkung insang sangat tipis ditutupi oleh epitelium dan mengandung jaringan pembuluh darah kapiler. Toksisitas logam-logam berat yang melukai insang dan struktur jaringan luar lainnya dapat menimbulkan kematian terhadap ikan yang disebabkan oleh proses anoxemia yaitu terhambatnya fungsi pernapasan yakni sirkulasi ekskresi dari insang (Jasin, 1992).

b. Sirip ikan bandeng

Sirip ikan bandeng terbagi atas beberapa bagian yaitu :

- 1) Sirip dada (*pectoral fin*): berbentuk dari lapisan semacam lilin, memiliki rumus jari-jari p 16-17, berbentuk segitiga terletak di belakang insang di samping perut. Sirip itu tersusun dari tulang lunak berjumlah antara 16-17 batang. Berfungsi sebagai tulang penyusun atau untuk mengembangkan sirip dalam menahan laju gerakannya.
- 2) Sirip punggung (*dorsal fin*): berbentuk dari kulit yang berlapis dan licin, terletak jauh dibelakang tutup insang dan memiliki rumus jari-jari D 14-16, berbentuk segiempat semakin ke bawah semakin sempit. Sirip tersusun dari tulang sebanyak 14 batang. Sirip ini terletak persis pada puncak punggung berfungsi untuk mengendalikan diri pada saat berenang.
- 3) Sirip perut (*ventral fin*): terletak pada bagian bawah tubuh, berfungsi untuk mengendalikan diri pada saat mencari makan.
- 4) Sirip anus (*anal fin*): terletak dibagian depan anus berfungsi untuk menahan sperma atau zat telur ketika terjadi pembuahan.
- 5) Sirip ekor: berukuran paling besar dibandingkan sirip-sirip lain. Pada bagian ujungnya berbentuk runcing, semakin ke pangkal ekor semakin lebar dan membentuk sebuah gunting terbuka, berfungsi

sebagai kemudi laju tubuhnya ketika bergerak, terletak dibagian paling belakang tubuh ikan bandeng (Jasin, 1992).

2. Lingkungan Hidup Ikan Bandeng (*Chanos-chanos*)

Lingkungan hidup ikan bandeng memerlukan temperatur atau suhu air optimal 4⁰C-15⁰C. Apabila temperatur air kurang dari 15⁰C, ikan bandeng bisa mengalami stres dan akhirnya mati. Namun memiliki sifat euryhalien, artinya dapat mudah dan cepat beradaptasi ke daerah air payau bahkan mampu melawan arus hingga mengatakan bahwa logam menapatkan air (Jasin, 1992).

Logam berat masuk ke dalam jaringan tubuh ikan melalui beberapa cara, yaitu: saluran pernapasan, pencernaan, dan penetrasi melalui kulit. Akumulasi logam yang tertinggi biasanya dalam detoksikasi (hati) dan ekskresi (ginjal). Akumulasi logam berat dalam tubuh organisme tergantung pada konsentrasi logam berat dalam air, lingkungan, suhu, keadaan spesies dan aktifitas fisiologi (Connel dan Miller, 1995).

3. Siklus Hidup Ikan Bandeng (*Chanos-chanos*)

Ikan muda (nener) dikumpulkan orang dari sungai-sungai dan dibesarkan di tambak-tambak. Di sana mereka bisa diberi makanan apa saja dan tumbuh dengan cepat. Pertumbuhan ikan bandeng relatif cepat yaitu 1,1-1,7% bobot badan/hari (Sudrajat, 2008). Ikan bandeng bisa mencapai berat rata-rata 0,60 kg pada usia 5-6 bulan jika dipelihara dalam tambak (Murtidjo, 2002). Ikan dapat tumbuh lebih cepat dengan diberi tambahan pakan pellet dengan kadar protein 25-35% (Buwono, 2000).

4. Manfaat Ikan Bandeng (*Chanos-chanos*)

Pengembangan agrobisnis ikan bandeng bertujuan untuk menghasilkan ikan bandeng yang mudah didapat di pasar dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Dengan demikian diharapkan masyarakat dapat lebih banyak makan ikan sebagai sumber protein hewani. Hal tersebut karena ikan bandeng merupakan sumber protein yang bermutu tinggi. Protein hewani sangat dibutuhkan oleh pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh serta mengembangkan daya pikir dan kecerdasan anak (Arief dkk, 2008).

Unsur gizi yang terdiri atas protein, karbohidrat, lemak, vitamin, air, dan mineral satu sama lain saling menunjang. Protein merupakan salah satu unsur gizi yang dibutuhkan oleh tubuh karena berperan dalam pembentukan jaringan tubuh, pengganti sel-sel tubuh yang rusak, pembentukan, dan mekanisme pertahanan tubuh serta mengatur keseimbangan nitrogen (Arief dkk, 2008).

Ikan merupakan sumber protein hewani yang sangat potensial dengan kandungan proteinnya sekitar 15-24%, tergantung jenis ikannya. Sumber protein hewani yang umum dikonsumsi oleh masyarakat adalah ikan. Ikan tersebut berasal dari perairan laut, payau maupun tawar. Ikan bandeng dikonsumsi semua golongan masyarakat. Dengan mengonsumsi ikan bandeng yang tinggi, tingkat konsumsi protein masyarakat dapat ditingkatkan. Tingkat konsumsi protein awal tahun 2000 adalah sekitar 11 gram perkapita/hari, sementara standar minimal yang seharusnya dipenuhi sebesar 15 gram

perkapita/hari, ikan bandeng adalah sumber protein non kolesterol (Arief dkk, 2008).

Ikan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Hal ini juga telah dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa sesungguhnya Allah menciptakan sesuatu dengan tidak sia-sia. Sebagaimana firman Allah SWT dalam **Q.S. Al-Nahl/16: 14** :

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٤﴾

Terjemahnya : “Dan Dialah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daging yang segar (ikan) darinya, dan (darinya itu) kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu (juga) melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur” (Al-Qur'an dan Terjemahnya, Kementerian Agama RI, 2009).

Menurut (Shihab, 2010), makna dari Q.S Al-Nahl/16: 14 yaitu Dialah yang menundukkan lautan untuk melayani kepentingan kalian. Kalian dapat menangkap ikan-ikan dan menyantap dagingnya yang segar. Dari situ kalian juga dapat mengeluarkan permata dan merjan sebagai perhiasan yang kalian pakai. Kamu lihat, hai orang yang menalar dan merenung, bahtera berlayar mengarungi lautan dengan membawa barang-barang dan bahan makanan. Allah menundukkan itu agar kalian memanfaatkannya untuk mencari rezeki yang dikaruniakan-Nya dengan cara berniaga dan cara-cara lainnya. Dan juga agar kalian bersyukur atas apa yang Allah sediakan dan tundukkan untuk melayani kepentingan kalian.

5. Bioakumulasi Logam Berat Timbal (Pb) pada Ikan Bandeng (*Chanos-chanos*)

Ikan merupakan salah satu hasil perairan yang banyak dimanfaatkan oleh manusia karena beberapa kelebihanannya. Salah satunya adalah mempunyai kadar lemak rendah dan merupakan sumber terbaik asam lemak omega 3. Tetapi ikan juga dapat menyerap racun yang berasal dari logam berat melalui bioakumulasi ke dalam tubuh ikan dari rantai makanan (Arief dkk, 2008).

Ikan merupakan hewan yang mempunyai kemampuan menyerap bahan atau senyawa kimia yang terlarut di dalam air melalui proses biokonsentrasi. Biokonsentrasi merupakan suatu proses partisi makhluk hidup ke dalam air yang diatur oleh proses difusi melalui membran bagian luarnya. Seluruh biota perairan yang memiliki organ-organ khusus akan bagian luarnya. Permukaan ini permeabel terhadap bahan-bahan kimia yang dapat terbiokonsentrasi (Connel dan Miller, 1995).

Bioakumulasi logam berat seperti timbal pada ikan bisa terjadi secara fisik maupun biologis (biokimia). Proses fisik adalah terpaparnya bagian tubuh atau luar tubuh ikan dan pori-pori membran lainnya oleh senyawa-senyawa logam berat, sedangkan proses biologi banyak terjadi melalui rantai makanan, dimana kadar timbal dalam air akan terakumulasi ke dalam tubuh ikan (Connel dan Miller, 1995). (*Ligand binding*) untuk logam kelas B. Logam kelas B masuk ke dalam tubuh ikan berturut-turut paling banyak

melalui insang, saluran pencernaan, dan kulit sehingga insang dari jenis binatang beruas ini paling banyak menderita oleh pengaruh toksisitas logam berat. Karena ikan bandeng ditutupi oleh sisik yang keras dari bahan kitin, penetrasi logam berat melalui kulit hanya sedikit (Connel dan Miller, 1995).

Aliran air yang mengandung logam dapat terakumulasi dalam sel insang dan sebagian masuk ke dalam tubuh ikan tersebut, dan didistribusikan dalam jaringan. Masuknya ion logam melalui jaringan insang akan mengakibatkan hewan air tersebut menjadi stres sehingga terjadi perubahan konsumsi oksigen pada jaringan insang (Darmono, 2001).


J. Tinjauan Umum Tiga Pasar Tradisional (Paotere, Rajawali dan Terong)

Pasar Paotere terletak di dekat pelabuhan paotere sebelah utara kota Makassar, tepatnya di jalan Ujung Tanah. Jaraknya kira-kira tiga kilometer jika Anda dari Pantai Losari. Tempat penjualan ikan di pasar ini letaknya agak dalam dari jalanan raya, di pasar ini dijual berbagai macam ikan yang dipasok dari berbagai daerah seperti Malili hingga ada yang dipasok dari pulau Kalimantan. Ciri khas di pasar ini adalah adanya warung ikan bakar yang dimana ikannya berasal dari pasar Paotere dan penjual seperti sepatu, tas, dompet, dan sandal.



Gambar 2. Peta Lokasi Pasar Paotere (Sumber: Google Maps, 2016).

Pasar Rajawali terletak di Jalan Rajawali, Makassar. Jaraknya kira-kira 3 menit dari pantai Losari. Letaknya tepat berada di depan jalan Raya. Ikan yang dijual di pasar ini juga terdapat berbagai macam ikan yang dipasok berasal dari Takalar, Barombong, dan pulau Barrang Lompo.



Gambar 3. Peta Lokasi Pasar Rajawali (Sumber: Google Maps, 2016).

Pasar Terong terletak di Jalan Terong. Jaraknya kira-kira 20 menit dari pantai Losari. Pasar ini juga letaknya tepat di jalan raya, tetapi jika kita mau mendapatkan penjual ikan kita harus masuk lagi ke dalam pasar di pasar ini hanya menjual 3-4 jenis

ikan saja berbeda jauh dari pasar Paotere dan pasar Rajawali. Ciri khas dari pasar ini adalah pasar ini menjual berbagai macam sayur-mayur, buah, kebutuhan rumah tangga, pakaian baru, dan bekas.



Gambar 4. Peta Lokasi Pasar Terong (Sumber: Google Maps, 2016).

K. Ayat yang Relevan

1. Q.S Al-Maidah/5: 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِء مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

Terjemahnya : “dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezeikkan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya” (Al-Qur’an dan Terjemahnya, Kementerian Agama RI, 2009).

Menurut (Shihab, 2010), makna dari Q.S Al-Maidah/5: 88 yaitu makanlah apa saja yang halal dan baik menurut selera kalian, dari makanan yang diberikan dan dimudahkan Allah untuk kalian. Takutlah dan taatlah selalu kepada Allah selama kalian beriman kepada- Nya.

2. Q. S Al-Baqarah/2: 168

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ


عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Terjemahnya : “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu” (Al-Qur’an dan Terjemahnya, Kementerian Agama RI, 2009).

Menurut (Shihab, 2010), makna dari Q.S Al-Baqarah/2: 168 yaitu wahai manusia, makanlah apa yang Kami ciptakan di bumi dari segala yang halal yang tidak Kami haramkan dan yang baik-baik yang disukai manusia. Janganlah mengikuti jejak langkah setan yang merayu kalian agar memakan yang haram atau menghalalkan yang haram. Kalian *Sesungguhnya* telah mengetahui permusuhan dan kejahatan-kejahatan setan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

L. Kerangka Pikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif (*qualitative research*) adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Lokasi penelitian di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar dengan pengambilan sampel jenis ikan di tiga pasar tradisional Makassar yaitu pasar Paotere, pasar Rajawali, dan pasar Terong.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan deskriptif (*descriptive research*), Pendekatan deskriptif (*descriptive research*) adalah suatu metode pendekatan yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau saat yang lampau.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua ikan bandeng yang terdapat di pasar-pasar tradisional kota Makassar.

Sampel dalam penelitian ini adalah ikan bandeng yang berada di pasar Paotere, pasar Rajawali, dan pasar Terong.

D. Variabel Penelitian

Variabel dari penelitian ini adalah logam berat timbal (Pb) pada ikan bandeng (*Chanos-chanos*).

E. Defenisi Operasional Variabel

Logam berat timbal (Pb) mempunyai nomor atom 82, berat atom 207,19 dan berat jenis 11,34 merupakan logam lunak yang berwarna coklat kehitaman, bersifat toksik terhadap manusia yang terdapat dalam tubuh ikan bandeng. Ikan bandeng merupakan salah satu spesies yang termasuk dalam familia chanidae. Ikan bandeng yang diteliti mempunyai panjang 32 cm dan berat 410 gram. Bagian tubuh yang diperiksa adalah ginjal, hati, usus, dan daging. Sampel ikan bandeng (*Chanos-chanos*) diambil dari tiga pasar tradisional Kota Makassar yaitu pasar Paotere, pasar Rajawali, dan pasar Terong.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penelitian ini adalah dengan cara observasi yaitu pengamatan melibatkan semua indera (penglihatan, pendengaran, penciuman, pembau, perasa). Pencatatan hasil dilakukan dengan bantuan alat rekam elektronik (kamera), dan analisis laboratorium, dimana ikan akan diteliti kandungan logam beratnya (Pb).

G. Instrumen Penelitian (Alat dan Bahan)

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah *cool box*, botol sampel, *microwave* beserta alat-alat di dalamnya, kantong plastik, pisau, piring, kamera, pipet volume, bulp, sarung tangan, masker, baju laboratorium, *Atomic Absorption Spectrophotometry* (AAS), dan timbangan analitik (*adventure ohaus*).

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah ikan bandeng (*chanos-chanos*), aquadest, larutan HNO₃ pekat, dan spidol.

H. Prosedur Kerja

1. Tahap persiapan

Pada tahap persiapan ini, penulis melakukan observasi di tiga pasar tradisional yaitu pasar Paotere, pasar Rajawali, dan pasar Terong. Hal ini dilakukan untuk memastikan sampel tersedia untuk dianalisis. Persiapan alat dan bahan.

2. Pengambilan sampel

Pengambilan sampel dilakukan pada tanggal 02 Desember 2015 yang diperoleh dari tiga pasar tradisional yaitu pasar Paotere, pasar Rajawali, dan pasar Terong. Ikan yang diperoleh dimasukkan ke dalam *cool box* untuk selanjutnya dibawa kemudian dianalisis di Laboratorium Kesehatan Makassar.

3. Persiapan Analisis Kadar Logam Timbal (Pb) Ikan Bandeng (*Channos-channos*)

Organ yang diuji adalah ginjal, hati, usus, dan daging. Sampel yang diambil terlebih dahulu dibersihkan dari kotoran yang melekat, lalu dibilas dengan menggunakan aquadest. Selanjutnya dipisahkan bagian-bagian yang akan diteliti yaitu ginjal, hati, usus, dan daging. Menimbang sampel organ menggunakan timbangan analitik (*adventure ohauss*) sebanyak 0,5 g kemudian sampel organ yang telah ditimbang ditambahkan HNO₃ pekat sebanyak 8 ml lalu didestruksi basah menggunakan *microwave* selama kurang lebih 30 menit lalu diencerkan dengan aquadest sebanyak 50 ml kemudian menganalisis data menggunakan metode AAS. Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk tabel dan diagram.

I. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengukuran konsentrasi timbal (Pb) dengan menggunakan metode *Atomic Absorption Spectrophotometry* (AAS), dilakukan di Laboratorium pada Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar.

Kadar logam timbal (Pb) pada sampel diperoleh dengan menggunakan rumus perhitungan berikut :

$$C = \frac{c \times V}{A}$$

Keterangan :


C : Kadar logam dalam sampel ($\mu\text{g}/\text{gr}$)

c : Konsentrasi larutan sampel (true value)

V : Volume penetapan/pengencer (ml)

a : Berat sampel basah (gram)

Sumber : Pedoman perhitungan kadar logam berat sampel, Instalasi Kimia Kesehatan Laboratorium Kesehatan Kota Makassar, 2015.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian terhadap organ Daging (D), Usus (U), Hati (H), dan Ginjal (G) ikan bandeng yang diperoleh dari pasar Paotere (A), pasar Rajawali (B) dan pasar Terong (C) terdapat pada tabel-tabel di bawah ini :

1. Pasar 1 (Paotere)

a. Sampel Daging

Tabel 4.1. Kadar Logam Timbal (Pb) pada Daging Ikan Bandeng

No.	Kode Sampel	Kadar Pb (ppm)
1.	DA 1	0
2.	DA 2	0
3.	DA 3	0

Sumber : Hasil Analisa Instalasi Kimia Kesehatan Laboratorium Kesehatan Makassar, 2015.

b. Sampel Usus

Tabel 4.2. Kadar Logam Timbal (Pb) pada Usus Ikan Bandeng

No.	Kode Sampel	Kadar Pb (ppm)
1.	UA 1	0
2.	UA 2	0
3.	UA 3	0

Sumber : Hasil Analisa Instalasi Kimia Kesehatan Laboratorium Kesehatan Makassar, 2015.

c. Sampel Hati

Tabel 4.3. Kadar Logam Timbal (Pb) pada Hati Ikan Bandeng

No.	Kode Sampel	Kadar Pb (ppm)
1.	HA 1	0
2.	HA 2	0
3.	HA 3	0

Sumber : Hasil Analisa Instalasi Kimia Kesehatan Laboratorium Kesehatan Makassar, 2015.

d. Sampel Ginjal

Tabel 4.4 Kadar Logam Timbal (Pb) pada Ginjal Ikan Bandeng

No.	Kode Sampel	Kadar Pb (ppm)
1.	GA 1	0
2.	GA 2	0
3.	GA 3	0

Sumber : Hasil Analisa Instalasi Kimia Kesehatan Laboratorium Kesehatan Makassar, 2015.

2. Pasar 2 (Rajawali)

a. Sampel Daging

Tabel 4.5. Kadar Logam Timbal (Pb) pada Daging Ikan Bandeng

No.	Kode Sampel	Kadar Pb (ppm)
1.	DB 1	0
2.	DB 2	0
3.	DB 3	0

Sumber : Hasil Analisa Instalasi Kimia Kesehatan Laboratorium Kesehatan Makassar, 2015.

b. Sampel Usus

Tabel 4.6. Kadar Logam Timbal (Pb) pada Usus Ikan Bandeng

No.	Kode Sampel	Kadar Pb (ppm)
1.	UB 1	0
2.	UB 2	0
3.	UB 3	0

Sumber : Hasil Analisa Instalasi Kimia Kesehatan Laboratorium Kesehatan Makassar, 2015.

c. Sampel Hati

Tabel 4.7. Kadar Logam Timbal (Pb) pada Hati Ikan Bandeng

No.	Kode Sampel	Kadar Pb (ppm)
1.	HB 1	0
2.	HB 2	0
3.	HB 3	0

Sumber : Hasil Analisa Instalasi Kimia Kesehatan Laboratorium Kesehatan Makassar, 2015.

d. Sampel Ginjal

Tabel 4.8. Kadar Logam Timbal (Pb) pada Ginjal Ikan Bandeng

No.	Kode Sampel	Kadar Pb (ppm)
1.	GB 1	0,0005
2.	GB 2	0,00052
3.	GB 3	0.00053
	Rata-rata	0,00052

Sumber : Hasil Analisa Instalasi Kimia Kesehatan Laboratorium Kesehatan Makassar, 2015.

3. Pasar 3 (Terong)

a. Sampel Daging

Tabel 4.9. Kadar Logam Timbal (Pb) pada Daging Ikan Bandeng

No.	Kode Sampel	Kadar Pb (ppm)
1.	DC 1	0
2.	DC 2	0
3.	DC 3	0

Sumber : Hasil Analisa Instalasi Kimia Kesehatan Laboratorium Kesehatan Makassar, 2015.

b. Sampel Usus

Tabel 4.10. Kadar Logam Timbal (Pb) pada Usus Ikan Bandeng

No.	Kode Sampel	Kadar Pb (ppm)
1.	UC 1	0
2.	UC 2	0
3.	UC 3	0

Sumber : Hasil Analisa Instalasi Kimia Kesehatan Laboratorium Kesehatan Makassar, 2015.

c. Sampel Hati

Tabel 4.11. Kadar Logam Timbal (Pb) pada Hati Ikan Bandeng

No.	Kode Sampel	Kadar Pb (ppm)
1.	HC 1	0
2.	HC 2	0
3.	HC 3	0


Sumber : Hasil Analisa Instalasi Kimia Kesehatan Laboratorium Kesehatan Makassar, 2015.

d. Sampel Ginjal

Tabel 4.12. Kadar Logam Timbal (Pb) pada Ginjal Ikan Bandeng

No.	Kode Sampel	Kadar Pb (ppm)
1.	GC1	0,00106
2.	GC 2	0,00129
3.	GC 3	0,00105
	Rata-rata	0,00113

Sumber : Hasil Analisa Instalasi Kimia Kesehatan Laboratorium Kesehatan Makassar, 2015.



Gambar 5. Histogram Kandungan Kadar Rata-rata Logam Timbal (Pb) pada Sampel Ginjal Ikan Bandeng di Pasar 1, Pasar 2, dan Pasar 3

B. Pembahasan

Salah satu jenis logam berat yang dapat menyebabkan pencemaran adalah logam timbal (Pb) dan macam-macam persenyawaannya, yang dapat masuk ke lingkungan terutama sebagai efek samping dari aktivitas manusia. Timbal merupakan salah satu logam non esensial yang dapat menyebabkan keracunan akut dan kronis karena sifat dari logam berat yaitu dapat terakumulasi dalam tubuh. Selain diduga karsinogenik, logam timbal (Pb) dapat menyebabkan gangguan pada pencernaan, terutama pada ginjal dan hati, serta kerusakan tulang (Palar, 1994).

Logam timbal di bumi jumlahnya sangat sedikit, yaitu 0,0002% dari jumlah kerak bumi bila dibandingkan dengan jumlah kandungan logam lainnya yang ada di bumi. Timbal adalah logam yang mendapat perhatian karena bersifat toksik melalui konsumsi makanan, minuman, udara, air serta debu yang tercemar timbal. Intoksikasi Pb biasa terjadi melalui jalur oral, lewat makanan, minuman, pernapasan, kontak lewat kulit, kontak lewat parenteral (Wahyu, 2008).

Berdasarkan penelitian terdahulu logam berat timbal (Pb) dalam tubuh ikan ditemukan pada organ daging, usus, hati, dan ginjal. Keberadaan logam berat timbal (Pb) pada usus disebabkan karena logam berat timbal (Pb) masuk ke dalam jaringan tubuh ikan salah satunya melalui saluran pencernaan. Absorpsi melalui saluran pencernaan lebih rendah dibandingkan melalui saluran pernapasan, tetapi logam yang masuk ke dalam saluran pencernaan biasanya cukup besar, walaupun absorpsinya kecil. Alat pencernaan seperti usus sebagai saluran pencernaan dan hati sebagai produksi enzim pencernaan selalu mengalami gangguan oleh pengaruh logam toksik

timbal (Pb). Toksisitas logam pada saluran pencernaan (hati dan usus) juga dapat terjadi melalui air yang mengandung dosis toksik logam. Perubahan patologi pada saluran pencernaan terutama pada hati memakan waktu yang lebih cepat (12 jam) dibandingkan pada insang (20 jam) (Darmono, 2001).

Sebagian besar dari Pb yang terhirup pada saat bernapas akan masuk ke dalam pembuluh darah paru-paru. Tingkat penyerapan itu sangat dipengaruhi oleh ukuran partikel dari senyawa Pb yang ada dan volume udara yang mampu dihirup pada saat peristiwa bernafas berlangsung (Palar, 1994).

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa pada pasar 1 (Paotere) sampel ikannya berasal dari Malili, Majene hingga sampai pulau Kalimantan. Pada sampel daging, usus, hati, dan ginjal ikan bandeng tidak mengandung atau menyerap timbal (Pb). Hal ini berarti sampel daging, usus, hati, dan ginjal ikan bandeng pada pasar 1 aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

Pada pasar 2 (Rajawali) sampel ikannya berasal dari Barombong, Takalar hingga ke pulau Barranglompo. Pada sampel daging, usus, dan hati ikan bandeng tidak mengandung atau menyerap timbal (Pb). Hal ini berarti sampel daging, usus, dan hati ikan bandeng pada pasar 2 aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Sedangkan pada sampel ginjal ikan bandeng pada pasar 2 mengandung atau menyerap timbal (Pb) yaitu dengan nilai rata-rata kadar timbal (Pb) sebanyak 0,00052 ppm.

Pada pasar 3 (Terong) sampel ikannya berasal dari pasar Rajawali dan pasar Paotere. Pada sampel daging, usus, dan hati ikan bandeng tidak mengandung atau

menyerap timbal (Pb). Hal ini berarti sampel daging, usus, dan hati ikan bandeng pada pasar 3 aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Sedangkan pada sampel ginjal ikan bandeng pada pasar 3 mengandung atau menyerap timbal (Pb) yaitu dengan nilai rata-rata kadar timbal (Pb) sebanyak 0,00113 ppm. Nilai rata-rata kadar timbal yang diamati pada ginjal ikan bandeng pada pasar 2 dan pasar 3 masih dibawah ambang batas. Batas kandungan logam berat timbal pada ikan yang ditetapkan WHO dan SNI yaitu 0,3 ppm.

Di dalam tubuh hewan air, logam diabsorpsi oleh darah, yang berikatan dengan protein darah yang kemudian didistribusikan ke seluruh jaringan tubuh. Akumulasi logam tertinggi biasanya dalam ekskresi (ginjal). Ginjal pada ikan berfungsi untuk filtrasi dan mengekskresikan bahan yang biasanya tidak dibutuhkan oleh tubuh, termasuk bahan racun seperti logam berat. Ginjal sebagai organ ekskresi utama dalam tubuh, sehingga organ ginjal menjadi organ sasaran keracunan logam.

Proses akumulasi Pb dalam jaringan ikan bandeng terjadi setelah absorpsi Pb dari air atau melalui pakan yang terkontaminasi. Pb akan terbawa oleh sistem darah dan didistribusikan ke dalam jaringan. Timbal di dalam tubuh akan terikat dalam gugus -SH dalam molekul protein dan hal ini menyebabkan hambatan pada aktivitas kerja sistem enzim (Darmono, 2001).

Halal berasal dari kata halla yang artinya melepaskan ikatan atau membuka ikatan suatu barang. Oleh sebab itu, kata halal sama dengan mubahan. Yang artinya dibebaskan atau diperbolehkan. Kata halal berasal dari akar, kata yang berarti lepas atau tidak terikat. Sesuatu yang halal adalah yang terlepas dari ikatan bahaya duniawi

dan ukhrawi. Karena itu kata halal juga berarti boleh. Dalam bahasa hukum, kata ini mengacu segala sesuatu yang diperbolehkan agama, baik bersifat sunnah, makruh maupun mubah. Oleh karena itu boleh ada sesuatu yang halal (boleh) tetapi tidak dianjurkan untuk menggunakannya, atau dengan kata lain hukumnya makruh. Misalnya melarang seseorang mendekati masjid apabila ia baru saja memakan bawang (Shihab, 1996).

Halal adalah salah satu nama bahasa Arab di mana kata kerjanya ialah halla, yahillu, hillan yang membawa arti membebaskan, melepaskan, memecahkan, membubarkan, dan membolehkan. Apabila digunakan di dalam bidang perundangan islam membawa maksud; pertamanya segala sesuatu yang menyebabkan seseorang itu tidak dihukum jika menggunakannya dan keduanya sesuatu yang boleh dikerjakan menurut syarak. Al-Jurjani dalam Kitab al-Ta'rifat sebagaimana dikutip Sri Suryati menjelaskan bahwa pengertian halal dengan maksud pertama merujuk kepada keharusan menggunakan benda-benda atau apa-apa yang diperlukan untuk memenuhi keperluan jasmani seperti makanan, minuman, dan obat-obatan. Manakala pengertian halal dengan maksud yang kedua adalah bersangkutan paut dengan keharusan memanfaatkan, memakan, meminum, dan mengerjakan sesuatu yang kesemuanya ditentukan berdasarkan nas.

Halal didefinisikan sebagai sesuatu yang dibenarkan (tidak dilarang) penggunaan atau pemakaiannya. Menurut Al-Qur'an, semua makanan yang baik dan bersih adalah halal (Jamaluddin, 2005). Selain itu Kata "halal" berasal dari akar yang berarti "lepas" atau "tidak terikat". Sesuatu yang halal adalah yang terlepas dari

ikatan bahaya duniawi dan ukhrowi. Karena itu kata “halal” juga berarti “boleh”. Dalam bahasa hukum, kata ini mencakup segala sesuatu yang dibolehkan agama, baik kebolehan itu bersifat sunnah, anjuran untuk dilakukan, makruh (anjuran untuk ditinggalkan) maupun mubah (netral atau boleh-boleh saja), tetapi tidak dianjurkan, atau dengan kata lain hukumnya makruh (Shihab, 1996).

Di dalam Al-Qur’an cara memperoleh rezeki yang halal dan yang baik yang disebut kata “*halalan thayyiban*” itu terdapat empat ayat yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 168, surat Al-Maidah ayat 88, surat Al-Anfaal ayat 69, dan surat An-Nahl ayat 114. Dari empat surat tersebut kata *halalan thayyiban* mengandung berbagai macam makna dalam menafsirkannya (Fuad, 1945). Dengan memahami *halalan thayyiban* dari empat ayat tersebut, menimbulkan perbedaan makna. Sehingga halal disini berarti membebaskan, melepaskan, memecahkan, membubarkan, dan membolehkan, dengan syarat: (1) tidak menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya; (2) boleh dikerjakan menurut syarat; (Aziz, 1996). (3) dihalalkan Allah di dalam kitabnya (Jarir, 1986).

Dalam Al-Qur’an, kata halal dan haram juga diungkapkan dengan kata lain, yaitu *thayyiban*, berdasarkan ayat-ayat di atas, yang termasuk kategori *thayyiban* mencakup semua yang dianggap baik dan dinikmati oleh manusia tanpa adanya nash atau dalil pengharamannya. Para ahli tafsir ketika menjelaskan kata *thayyiban* dalam konteks perintah makan mengatakan bahwa ia berarti makanan yang tidak kotor dari segi zatnya atau rusak (kadaluwarsa), atau dicampuri benda najis. Ada juga yang mengartikannya sebagai makanan yang mengundang selera bagi yang akan

memakannya dan tidak membahayakan fisik dan akalnya. Sehingga kata *thayyiban* dalam makanan adalah: (1) makanan sehat (makanan yang memiliki zat gizi dan cukup seimbang); (2) proporsional, sesuai dengan kebutuhan pemakan dengan tidak berlebihan dan tidak kurang; (3) aman (terhindar dari siksa Tuhan baik di dunia maupun di akhirat) tentunya sebelum itu adalah halal) (Shihab, 2000).

Dari keterangan tersebut, bahwa makanan seseorang sangat berpengaruh dalam perilakunya sehari-hari. Selanjutnya kalau makanan yang dimasukkannya ke perutnya itu bersih dan halal, maka dengan sendirinya ia akan selalu condong kepada perbuatan baik. Sebaliknya, kalau kotor dan haram, ia akan selalu condong kepada perbuatan buruk dan keji (Idrus, 1994). Islam menetapkan segala sesuatu yang diciptakan Allah adalah halal (Hamidy, 1980).



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa kandungan logam berat timbal (Pb) yang terkandung dalam tubuh ikan bandeng pada pasar 1 (Paotere) adalah 0 ppm dalam semua organ yang diuji, pasar 2 (Rajawali) adalah 0,00052 ppm dalam organ ginjal dan pasar 3 (Terong) adalah 0,00113 ppm dalam organ ginjal. Semua organ yang terkandung pada tiga pasar masih dibawah standar SNI.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat disampaikan yaitu :

1. Pasar Paotere memasok ikan bandeng yang saat ini aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Tetapi masa akan datang masyarakat harus waspada dan hati-hati dalam mengonsumsi ikan bandeng.
2. Perlunya pengawasan serius dari pemerintah setempat terhadap sumber pencemaran yang mengandung unsur atau senyawa logam berat seperti timbal (Pb) maupun logam lain yang berbahaya karena efek yang ditimbulkan dapat menyebabkan gangguan kesehatan.

KEPUSTAKAAN

- Achmad, R. *Kimia Lingkungan*. Jakarta: Andi Yogyakarta, 2004.
- Affandi R, Sjafei DS, Rahardjo MF, & Sulistiono. *Iktiologi. Suatu Pedoman Kerja Laboratorium*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Pusat Antar Universitas Ilmu Hayat. Bogor: Institut Pertanian Bogor, 1992.
- Arief, Prahasta dan Hasanawi Masturi. *Agribisnis Bandeng*. Bandung: CV Pustaka Grafika, 2008.
- Ashshiddiqi, Hasbi. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Kementerian Agama RI, 2009.
- Babel, S., Kurniawan, T.A. "Cr(VI) Removal from Synthetic Wastewater Using Coconut Shell Charcoal and Commercial Activated Carbon Modified with Oxidizing Agents and/or Chitosan". *Journal of Chemosphere* No.54 (Juli 2004): 951-967.
- Bryan, G. W. 1976. *Some Aspects Heavy Metal Tolerance in Aquatic Organism*. In : A. P. M. LOCKWOOD (ed.) *Effects of Pollutants on Aquatic Organisms*. Combridge.
- Budiman A, Arief AJ, & Tjakrawidjaya AH. "Peran Museum Zoologi dalam Penelitian dan Konservasi Keanekaragaman Hayati (ikan)". *J IktiologiIndonesia* No.2 (2002): 51-55.
- Burhanuddin AI. *Ikhtiologi: Ikan dan Aspek Kehidupannya*. Makassar: Yayasan Citra Emulsi, 2010.
- Buwono, I.D. *Kebutuhan Asam Amino Esensial dalam Ransum Ikan*. Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Connel. D. W. and Miller. *Kimia dan Ekotoksikologi Pencemaran*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1995.
- Chojnacka, K. "Biosorption of Cr (III) Ions by Eggshells". *J. Hazard Mater B*. (2005); 167-173.
- Darmono. *Logam dalam Sistem Biologi Makhluk Hidup*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1995.

- Darmono. *Lingkungan Hidup dan Pencemaran Hubungannya dengan Toksikologi Senyawa Logam*. Jakarta: UI Press, 2001.
- Diliyana, Yudha Fika. “Studi Kandungan Merkuri (Hg) pada Ikan Bandeng (*Chanos chanos*) di Tambak Sekitar Perairan Rejoso Kabupaten Pasuruan”. *Skripsi*. Malang: Fakultas Sains dan Teknologi UIN Malang, 2008.
- Fardiaz, S. *Polusi Air dan Udara*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Hamidah. 1980. *Pengaruh Logam Berat terhadap Lingkungan*. *Pewarta Oseana* (2).
- Hutagalung HP. *Pencemaran Laut Oleh Logam Berat*. Jakarta: Pencemaran Laut di Indonesia dan Teknik Pemantauannya. P30-LIPI, 1991.
- Isnania. “Analisis Kandungan Logam Berat Timbal (Pb) pada Ikan Bandeng (*Chanos-chanos*) di Pertambakan Kecamatan Pangkajene”. *Skripsi*. Makassar: Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin, 2010.
- Jasin, Maskoeri. *Zoologi Vertebrata*. Surabaya: Sinar Wijaya, 1992.
- Kadir, Haryanto. “Biokonsentrasi Logam Berat Pb pada Karang Lunak *Sinularia polydactyla* di Perairan Pulau Laelae, Pulau Bonebatang dan Pulau Badi”. *Skripsi*. Makassar: Ilmu Kelautan UNHAS, 2013.
- Kazim Uysal Esengul Kose, Mustafa Koyun, Cigdem Omeraglu, Ferda Ozmal. “The Comparison of Heavy Metal Accumulation Ratios of Some Fish Species in Enne Dame Lake (Kutahya/Turkey)”. *Procedia Environmental Sciences Jilid 30* (2015): 320-325.
- Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI, Keputusan Menteri Negara LH. No. KEP-51/MNKLH/I/2004 *Tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan, Sekretaris Menteri Negara KLH*. Jakarta, 2004.
- Kottelat M, Whitten AJ, Kartikasari SN & Wiroatmodjo S. *Freshwater Fishes of Western Indonesia and Sulawesi*. Jakarta, Indonesia: Edisi Dwi Bahasa Inggris Indonesia. Periplus Edition (HK) Ltd. Bekerjasama dengan Kantor Menteri KLH, 1993.
- Kottelat M & Whitten T. *Freshwater Biodiversity in Asia LTith Special Reference to Fish*. Washington DC: The World Bank, 1996.
- Laws EA. 1981. *Aquatic pollution*. John Willey and Sons. New York.

- Maktoeld, D. *Toksin Nabati dalam Bahan Makanan*. Yogyakarta: Liberty, 1983.
- Muchyiddin, Tarzan Purnomo. “Analisis Kandungan Timbal (Pb) pada Ikan Bandeng (*Chanos chanos* Forsk.) di Tambak Kecamatan Gresik”. *Neptunus* No. 1 (Juli 2007): 68-77.
- Nontji. *Laut Nusantara*. Jakarta: Djambatan, 1993.
- Palar, H. *Pencemaran dan Toksikologi Logam Berat*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Pratama, S.D., I. Raya, dan M. Zakir. “Pengaruh Penambahan Glutation Pada Bioakumulasi Ion Pb^{2+} Dan Cr^{6+} Oleh Fitoplankton Laut *Porphyridium Cruentum*”. *Jurnal Ilmu Perairan dan Perikanan Indonesia* No.1 (Desember 2011): 1-10.
- Rompas, M.R. *Toksikologi Kelautan*. Jakarta Pusat: Sekretariat Dewan Kelautan Indonesia, 2010.
- Sanusi HS, Kaswadji RF, Nurjaya IW, Rafni R. “Kajian Kapasitas Beban Pencemaran Organik dan Anorganik di Perairan Teluk Jobokuto Kabupaten Jepara Jawa Tengah”. *Jurnal Ilmu-ilmu Perairan dan Perikanan Indonesia Jilid 12* No.1 (2005): pp 9-16.
- Setiaty, Pandia, Husin, Amir dan Masyitah Zuhrina. *Kimia Lingkungan*. Jakarta: Pembinaan dan Pengabdian Pada Masyarakat, 1996.
- Shihab, Quraish M. *Tafsir Al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2010.
- Sudradjat, A. *Budidaya 23 Komoditas Laut Menguntungkan*. Jakarta: Penebar Swadaya, 2008.
- Uluturhan E, Kucuksezgin F. “Heavy Metal Contaminants in Red Pandora (*Pagellus erythrinus*) Tissues from the Eastern Aegean Sea”. *Journal Heavy Metals of Turkey* No. 41 (*Water Res* 2007) No. 41: 1185-92.
- Wahyu, Widowati, A. Sastiono, dan R. Jusuf. *Efek Toksik Logam*. Bandung: Andi Yogyakarta, 2008.
- Yi YJ, Yang ZF, Zhang SH. “Ecological Risk Assessment of Heavy Metals in Sediment and Human Health Risk Assessment of Heavy Metals in Fishes in the Middle and Lower Reaches of the Yangtze River Basin”. *Procedia Environmental Sciences Jilid 8* (2011): 1699-1707.




LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 1

Skema Alur Penelitian



Lampiran 2

Perhitungan Kadar Logam Timbal (Pb) Tiap Sampel

Kadar logam timbal (Pb) pada sampel diperoleh dengan menggunakan rumus perhitungan berikut :

$$C = \frac{c \times V}{a}$$

Keterangan :

C : Kadar logam dalam sampel ($\mu\text{g}/\text{gr}$)

c : Konsentrasi larutan sampel (true value)

V : Volume penetapan/pengencer (ml)

a : Berat sampel basah (gram)

✓ Sampel Ginjal Ikan Bandeng (*Chanos-chanos*) pada pasar 2 (Rajawali)

$$\text{GB 1} = \frac{0,0056 \times 50 \text{ ml}}{0,5554 \text{ g}} = 0,50 \mu\text{g}/\text{gr} = 0,0005 \text{ ppm}$$

$$\text{GB 2} = \frac{0,0059 \times 50 \text{ ml}}{0,5644 \text{ g}} = 0,52 \mu\text{g}/\text{gr} = 0,00052 \text{ ppm}$$

$$\text{GB 3} = \frac{0,0060 \times 50 \text{ ml}}{0,5644 \text{ g}} = 0,53 \mu\text{g}/\text{gr} = 0,00053 \text{ ppm}$$

Kadar rata-rata logam timbal (Pb) pada sampel ginjal pasar 2 adalah :

$$\begin{aligned} C &= \frac{C_1 + C_2 + C_3}{3} \\ &= \frac{0,0005 \text{ ppm} + 0,00052 \text{ ppm} + 0,00053 \text{ ppm}}{3} \\ &= 0,00052 \text{ ppm} \end{aligned}$$

✓ Sampel Ginjal Ikan Bandeng (*Chanos-chanos*) pada pasar 3 (Terong)

$$\text{GC 1} = \frac{0,0127 \times 50 \text{ ml}}{0,6 \text{ g}} = 1,06 \mu\text{g/gr} = 0,00106 \text{ ppm}$$

$$\text{GC 2} = \frac{0,0155 \times 50 \text{ ml}}{0,6 \text{ g}} = 1,29 \mu\text{g/gr} = 0,00129 \text{ ppm}$$

$$\text{GC 3} = \frac{0,0127 \times 50 \text{ ml}}{0,5788 \text{ g}} = 1,05 \mu\text{g/gr} = 0,00105 \text{ ppm}$$

Kadar rata-rata logam timbal (Pb) pada sampel ginjal pasar 3 adalah :

$$\begin{aligned} C &= \frac{C_1 + C_2 + C_3}{3} \\ &= \frac{0,00106 \text{ ppm} + 0,00129 \text{ ppm} + 0,00105 \text{ ppm}}{3} \\ &= 0,00113 \text{ ppm} \end{aligned}$$

Lampiran 3

Lokasi Pengambilan Sampel



Gambar 6. Pasar 1 (Paotere)



Gambar 7. Pasar 2 (Rajawali)



Gambar 8. Pasar 3 (Terong)

Lampiran 4

Ikan yang sudah dipisahkan organnya



Gambar 9 (a). Sampel yang sudah dipisahkan organ-organnya (Pasar 1)



Gambar 9 (b). Sampel yang sudah dipisahkan organ-organnya (Pasar 2)



Gambar 9 (c). Sampel yang sudah dipisahkan organ-organnya (Pasar 3)

Lampiran 5


Analisis Kadar Logam Timbal (Pb) pada Ikan Bandeng



Gambar 10. Persiapan penimbangan



Gambar 11. Penambahan HNO₃ pekat




Gambar 12 Persiapan destruksi



Gambar 13 (a). Destruksi basah sampel



Gambar 13 (b). Sampel yang telah didestruksi



Gambar 14. Sampel diencerkan dengan aquadest





Gambar 15. Persiapan sampel untuk dianalisa AAS




Gambar 16. Sampel dimasukkan ke dalam AAS





Gambar 17. Sampel dianalisa menggunakan AAS



Gambar 18. Lemari asam



RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Afnan Fadhlana, lahir di Ujung Pandang pada tanggal 23 Oktober 1993 merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak Fadhlana Musthafa, S.Sos., dan Netri Muslim. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SDN Sudirman 2 Makassar (Kelas 1-2), pindah studi ke SD Inpres Tamamung 1 Makassar (Kelas 3-6) lulus pada tahun 2006, lalu melanjutkan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 8 Makassar lulus pada tahun 2009 dan MAN 2 Model Makassar lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan jenjang pendidikan ke Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar pada tahun 2012. Penulis pernah menjadi Asisten Laboratorium selama 3 periode. Pada semester akhir tahun 2016 penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Analisis Kandungan Logam Berat Timbal (Pb) pada Ikan Bandeng (*Chanos-chanos*) di Beberapa Pasar Tradisional Kota Makassar” dan mendapat gelar S1 (S.Si) pada tanggal 23 Juni 2016.