

**UJI AKTIVITAS EKSTRAK ETANOL LUMUT HATI (*Hepaticiopsida sp*)
TERHADAP BAKTERI *Staphylococcus Aureus* dan
*Pseudomonas Aeruginosa***



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi
Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

OLEH :

ASRIANI EKA PUTRI
NIM. 70100109017

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2014**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Asriani Eka Putri
Nim : 70100109017
Tempat/Tgl Lahir : Ujung pandang, 26 April 1992
Jur/Prodi/Konsentrasi : Farmasi
Fakultas/Program : Ilmu Kesehatan/S1
Alamat : Perumahan Bukit Baruga jln. Sawo No. 3, Makassar
Judul : Uji Aktivitas Ekstrak Etanol Lumut Hati (*Hepaticiopsida sp*)
Terhadap Bakteri *Staphylococcus Aureus* Dan *Pseudomonas Aeruginosa*.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran, bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, Januari 2015

Penulis,

ASRIANI EKA PUTRI
NIM. 70100109017

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Uji Aktivitas Ekstrak Etanol Lumut Hati (*Hepaticiopsida sp*) Terhadap Bakteri *Staphylococcus Aureus* Dan *Pseudomonas Aeruginosa*.” yang disusun oleh Asriani Eka Putri, NIM: 70100109017, mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam Ujian Sidang Skripsi yang diselenggarakan pada hari Jum’at tanggal 25 Januari 2014 M yang bertepatan dengan Rabiul awal 1435 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Makassar, 26 November 2014 M
2 Rabiul awal 1435 H

DEWAN PENGUJI :

Ketua : **Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc.** (.....)

Sekretaris : **Nursalam Hamzah, S.Si., M.Si, Apt** (.....)

Pembimbing I : **Hj. Gemy Nastity Handayani, S.Si.,M.Si.,Apt.** (.....)

Pembimbing II : **Isriany Ismail, S.Si., M.Si., Apt.** (.....)

Penguji I : **Mukhriani, S.Si, M.Si,Apt.** (.....)

Penguji II : **DRS. H.Muh.Kurdi, M.HI** (.....)

Diketahui oleh:
Pjs. Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar,

Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc.

NIP. 19520811 198203 1 001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah swt. atas segala limpahan rahmat dan hidayah yang telah di berikan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, yang merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana di Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

Penulis menyadari tentang banyaknya kendala yang dihadapi dalam penyusunan skripsi ini. Namun berkat do'a dan motivasi dari berbagai pihak, maka kendala-kendala tersebut mampu teratasi dan terkendali dengan baik. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang membantu dalam menyusun penyelesaian skripsi ini.

1. Orang tua tercinta, Ayahanda Nursyam T. Kimin,S.Sos.,M.M, dan Ibunda Asniati Asyikin, SE yang telah merawat dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan serta seluruh keluarga, yang tak putus-putus memberikan dukungan sepenuhnya baik berupa materi, nasehat, dan doa yang tulus selama menempuh pendidikan hingga selesainya penyusunan skripsi ini.
2. Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT, MS selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Dr. dr. Andi Armyn Nurdin, M.SC, selaku pejabat sementara Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Fatmawaty Mallapiang,SKM.,M.Kes selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
5. Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci,M.Si.,Apt selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

6. Drs. Wahyuddin. G, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
7. Nursalam Hamzah,S.Si.,M.Si.,Apt selaku Ketua Prodi Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan bimbingan.
8. Ibu Surya Ningsi, S.Si.,M.Si.,Apt selaku Sekretaris Jurusan Farmasi yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan.
9. Ibu Gemy Nastity Handayany, S.Si.,M.Si.,Apt.selaku pembimbing pertama yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan.
10. Ibu Isriany Ismail, S.Si.,M.Si.,Apt selaku pembimbing kedua yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan.
11. Ibu Mukhriani, S.Si, M.Si,Apt sebagai Penguji Kompetensi yang telah banyak memberikan saran dan bimbingan dalam mengoreksi kekurangan pada skripsi.
12. Bapak Drs. H.Muh. Kurdi., MHI sebagai penguji keislaman yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan
13. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen serta staf dalam lingkungan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar selama mendidik di bangku kuliah.
14. Saudaraku Suherman, Asdhyati Dwi Putri, Asheryanti Tri Putri, Arfina, Endang Lestari, Haedar, Nurul Auliya, Mitra Pramini Rachmi, dan Sardiah Nur HS yang telah banyak membantu dan mendukung.

15. Rekan-rekan mahasiswa jurusan farmasi angkatan 2005, 2006, 2007, dan 2008 terkhusus kepada rekan-rekan angkatan 2009 dan para Laboran serta Adik-adik mahasiswa jurusan farmasi angkatan, 2010, 2011, dan 2012 yang selalu memberikan motivasi selama penyusunan skripsi ini.

Saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan bernilai ibadah di sisi Allah swt.

Makassar, JANUARI 2015

PENULIS

DAFTAR ISI

	Hal
JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	3
B. Rumusan Masalah	3
C. Defenisi Operasional Dan Ruang Lingkup Penelitian	3
D. Kajian Pustaka	4
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A.URAIAN TANAMAN.....	6
1.Klasifikasi Tanaman.....	6
2.Morfologi	6
3. Kandungan Kimia	7
4. Kegunaan.....	7
B. URAIAN BAKTERI UJI	7
1. <i>Staphylococcus aureus</i>	7
2. <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	12
C. MIKROORGANISME.....	13
D. ANTIMIKROBA	14
1. Pengertian Antimikroba	14
2. Sifat Antimikroba.....	15
3. Prinsip Kerja Antimikroba.....	15
4. Mekanisme Kerja Antimikroba.....	16
E. PENGUJIAN AKTIVITAS ANTIMIKROBA.....	17
F.STERILISASI.....	20
G. EKSTRAKSI.....	23
1. Pengertian.....	23
2. Mekanisme kerja	23

	3. Metode ekstraksi bahan alam	24
	H. TINJAUAN PENGOBATAN MENURUT ISLAM	26
	I. PEMANFAATAN TUMBUH-TUMBUHAN	31
BAB	III METODE PENELITIAN	34
	A. Jenis dan lokasi penelitian.....	34
	1. Jenis Penelitian.....	34
	2. Lokasi Penelitian.....	34
	B. Pendekatan penelitian.....	34
	C. Metode pengumpulan data	34
	1. Penyiapan Sampel.....	34
	2. Ekstraksi Lumut hati.....	34
	3. Sterilisasi Alat.....	35
	4. Pembuatan Medium.....	35
	5. Persiapan Bakteri Uji.....	36
	6. Pengujian Aktifitas Antibakteri Ekstrak Lumut Hati (<i>Hepaticiopsida sp</i>) Dengan Metode Difusi.....	37
	7. UJI MIC (<i>Minimum Inhibitory Concetration</i>) Ekstrak Lumut Hati (<i>Hepaticiopsida sp</i>).....	37
	D. Instrumen Penelitian	38
	1. Alat.....	38
	2. Bahan.....	38
	E. Validasi dan Rehabilitas Instrumen.....	38
BAB	IV HASIL DAN PEMBAHASAN	39
	A. Hasil Pengamatan.....	39
	B. Pembahasan	40
BAB	V PENUTUP	45
	A. Kesimpulan.....	45
	B. Saran	45
	DAFTAR PUSTAKA	46
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	48
	BIOGRAFI.....	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia yang beriklim tropis menyebabkan tanahnya subur sehingga banyak jenis tumbuhan yang dapat tumbuh. Di antara berbagai jenis tersebut beberapa jenis tumbuhan memiliki khasiat sebagai obat. Namun, sebagian besar dari tumbuhan itu tidak diketahui oleh manusia sehingga tidak pernah terawat dengan baik. Hal tersebut menyebabkan manusia semakin tidak mengenal jenis-jenis tumbuhan obat dan akhirnya tumbuhan obat berkesan sebagai tanaman liar yang keberadaannya sering dianggap mengganggu keindahan atau mengganggu kehidupan tumbuhan lainnya (Hariana, 2004: 1).

Tanaman yang dapat di jadikan sebagai Obat tradisional adalah merupakan bahan yang berasal dari tumbuhan, hewan, mineral atau campuran dari bahan tersebut yang diolah secara tradisional dan digunakan sebagai obat. Obat tradisional umumnya lebih mudah pembuatannya dan dapat dibuat atau ditanam sendiri dan menggunakan tanaman obat sebagai alternatif pengobatan. (Katno, 2002 : 2).

Salah satu tumbuhan yang dapat digunakan sebagai obat adalah Tumbuhan lumut merupakan tumbuhan tingkat rendah yang termasuk ke dalam bryophyta, termasuk tumbuhan darat sejati. Pada umumnya lumut menyukai tempat-tempat yang basah dan lembab di dataran rendah sampai dataran tinggi. Lumut hati mengandung bahan kimia isoflavonoid, flavonoid dan bioflavonoid yang efektif menghambat mikroorganisme, senyawa terpenoid dan fenolik serta unsur-unsur yang mudah menguap terdapat pada beberapa jenis lumut, Flavonoid termasuk pada golongan senyawa kimia fenolik, aromatis siklis. Golongan

terbesar senyawa fenolik pada tumbuhan adalah flavonoid itu sendiri. Secara umum, senyawa fenol adalah racun bagi mikroorganisme. Pada tumbuhan, senyawa ini berfungsi sebagai regulasi pertumbuhan dan fotosintesis, juga berfungsi untuk mengatur aktivitas antivirus, antimikroba. (Ilhan *et al.* 2006:239)

Penelitian antimikroba telah banyak dilakukan terutama dari berbagai jenis tanaman rempah-rempah. Namun para ilmuwan terus berusaha untuk mencari sumber antimikroba baru, terutama yang mudah tumbuh di Indonesia. Tumbuhan yang digunakan untuk obat tradisional dapat dijadikan alternatif pencarian zat anti mikroba, karena pada umumnya memiliki senyawa aktif yang sangat berperan dalam bidang kesehatan (Zuhud,2001:568).

Staphylococcus merupakan parasit pada manusia yang ada dimmana-mana, salah satu contoh adalah *Staphylococcus aureus* yang merupakan patogen utama pada manusia. Hampir setiap orang pernah mengalami berbagai infeksi *Staphylococcus aureus*, dari keracunan makanan berat atau infeksi kulit sampai infeksi yang tidak bisa di sembuhkan. Bakteri ini merupakan flora normal pada kulit, dan termasuk populasi yang paling besar pada kulit yang dapat menyebabkan bisul dan frunkel.(Jawetz,Melnick dan Adelbergs,2001:373)

Pseudomonas tersebar secara luas pada, tanah, air, tanaman, dan hewan. *Pseudomonas aeruginosa* sering ada dalam jumlah sedikit pada flora normal usus dan kulit manusia dan merupakan pathogen utama dari kelompoknya. *Pseudomonas aeruginosa* menjadi patogenik jika berada pada tempat dengan daya tahan tidak normal, misalnya di selaput lendir pada saluran kemih dan kulit yang rusak akibat kerusakan jaringan.(Jawetz,Melnick dan Adelbergs,2001:395)

Pandangan Islam dijelaskan bahwa segala ciptaan Allah tidak ada yang sia-sia termasuk tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam yang memerlukan penelitian. Islam telah menetapkan bahwa Allah menumbuhkan berbagai macam tanaman untuk di manfaatkan manusia.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang timbul dari uraian di atas adalah:

1. Apakah ekstrak Lumut Hati (*Hepaticiopsida sp*) dapat memberikan aktivitas antibakteri terhadap *Staphylococcus aureus* dan *Pseudomonas aeruginosa* ?
2. Pada konsentrasi berapa ekstrak lumut hati memberikan aktivitas antibakteri terhadap *Staphylococcus aureus* dan *Pseudomonas aeruginosa* ?
3. Bagaimana pandangan Islam tentang penelitian khasiat tumbuh-tumbuhan ?

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Batasan Masalah

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ekstrak Lumut Hati yang diperoleh di Air Terjun Sungai Takapala Malino, bakteri uji yang digunakan adalah jenis bakteri *Staphylococcus aureus* dan *Pseudomonas aeruginosa*, konsentrasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0,1%, 0,5%, 1%, 2%, 4%, 6% dan parameter yang diamati dalam penelitian ini adalah diameter zona hambat dari berbagai konsentrasi.

2. Penegasan istilah

- a. Daya antimikroba adalah kemampuan suatu zat untuk menghambat atau mencegah pertumbuhan atau metabolisme mikroba.
- b. Zona hambat yaitu daerah berbentuk lingkaran bening pada medium yang tidak di tumbuh oleh mikroorganisme akibat pengaruh antimikroba yang diberikan.

Konsentrasi terbaik yaitu konsentrasi yang mempunyai daya hambat paling optimal, efektif dan efisien.

D. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Ilmu

Ruang lingkup penelitian yaitu laboratorium Fitokimia dan Mikrobiologi Farmasi UIN Alauddin Makassar

2. Ruang Lingkup Tempat

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Biologi Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar dan Laboratorium Farmakologi Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

3. Ruang Lingkup Waktu

Penelitian dan pengumpulan data dilakukan kurang lebih selama 30 hari.

E. Kajian Pustaka

Beberapa hasil penelitian yang relevan dengan rencana penelitian ini,

Antara lain:

1. Berdasarkan penelitian Nova Yuliasari (2008) Universitas Sriwijaya menunjukkan bahwa Lumut hati dapat digunakan untuk penurunan kebutuhan oksigen kimiawi limbah jumptan Sumatera selatan.
2. Berdasarkan jurnal penelitian Sri winarsih (2010) Universitas brawijaya yang berjudul uji efek ekstrak etanol tumbuhan lumut hati (*Hepaticiopsida sp*) terhadap pertumbuhan koloni *salmonella typhi* secara *in vitro*. Di mana pada konsentrasi 15% tidak ada koloni yang tumbuh.
3. Berdasarkan penelitian Safitri faradillah (2013) berjudul efek antifungi ekstrak Lumut hati (*Hepaticiopsida sp*) terhadap efek antifungi terhadap secara *in vitro*.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui aktivitas antibakteri dari ekstrak Lumut Hati (*Hepaticiopsida sp*) terhadap bakteri uji *Staphylococcus aureus* dan *Pseudomonas aeruginosa*.
- b. Untuk mengetahui pada konsentrasi berapa ekstrak Lumut Hati (*Hepaticiopsida sp*) memberikan aktivitas antibakteri *Staphylococcus aureus* dan *Pseudomonas aeruginosa*.

2. Kegunaan Penelitian

Diperoleh hasil ekstraksi lumut hati sebagai penghambat pertumbuhan bakteri *Staphylococcus aureus* penyebab bisul dapat digunakan atau dikembangkan menjadi obat salep bisul dari ekstrak lumut hati yang digunakan oleh masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Uraian Tanaman Lumut Hati* (Tjitrosoepomo, gembong 2003:54)

1. Klasifikasi Tanaman

Regnum : Plantae

Division : Hepaticophyta

Class : Hepaticosida

Ordo : Hepaticoccales

Family : Hepaticoceae

Genus : Hepaticopsida

Species : *Hepaticopsida sp*

2. Morfologi

Golongan ini Bersifat dorsiventral (dapat dibedakan antara sisi dorsal dan sisi ventral) dengan karakteristik tubuh yang lunak, Terdapat 2 – 3 baris daun, Di tepi talus terdapat yang namanya daun lateral yang dibagi menjadi : daun tunggal dan daun bilobus. Daun bilobus dibagi lagi menjadi 2, yaitu *lobus postical* (atas) dan *lobus antical* (bawah), Daun ke 3 pada garis tengah di sisi ventral dinamai dengan *amfigastrium* yang bercirikan ukuran lebih kecil dari daun lateral, Daun umumnya terdiri atas 1 lapis sel, Terdapat kloroplas, Terdapat trigome (penebalan berbentuk segitiga pada sudut – sudut sel). Pada batang Epidermis, yaitu sel – selnya berdinding tebal dengan lapisan kutikula, Korteks, sel – selnya berdinding tebal namun berukuran kecil. Sifat jaringan korteks parenkimatis, berfungsi untuk fotosintesis, respirasi, dan juga sebagai tempat penimbunan zat makanan cadangan, Medula, dindingnya tipis akan tetapi lebar.(Tjitrosoepomo, gembong 2003:55)

3. Kandungan Kimia (Tjitrosoepomo, gembong 2003:55)

Isoflavonoid, bioflavonoid, dan flavonoid.

4. Kegunaan

Tumbuhan lumut tidak berperan langsung dalam kehidupan manusia, tetapi ada spesies tertentu yang dimanfaatkan oleh penduduk untuk mengobati hepatitis, yaitu *Marchantia polymorpha*. Selain itu jenis – jenis lumut gambut dari genus *Sphagnum* dapat digunakan sebagai pembalut atau pengganti kapas. Tumbuhan lumut juga memiliki peran dalam ekosistem sebagai penyedia oksigen, penyimpan air (karena sifat selnya yang menyerupai spons), dan sebagai penyerap polutan. (Tjitrosoepomo, gembong 2003:56)

B. Uraian Bakteri Uji

1. *Staphylococcus aureus*

a. Klasifikasi (Garrity. G. M., Bell. J. A., and Lilburn 2004)

Kingdom : protista

Devisio : protophyta

Class : schizomycetes

Ordo : eubakteriales

Familia : mikrococcaceae

Species : *Staphylococcus aureus*

b. Morfologi (Pelczar, 2008:58)

Staphylococcus aureus bakteri gram positif, tidak bergerak, tidak berspora. Bakteri ini berbentuk bulat dengan diameter 0,1-0,8 μm . Biasa hidup bergerombol berbentuk koloni mirip dengan kumpulan buah anggur ada juga yang letaknya berserakan. Zat (hidup menyendiri), tidak bergerak, tidak tahan asam, di

atas medium perbenihan padat tumbuh yang bulat-bulat dengan diameter 1µm, sedikit cembung, amorf dan tidak transparan.

c. Sifat dan pathogenesis (Jawetz, 2001:89)

Staphylococcus aureus merupakan sel gram positif berbentuk bulat biasanya tersusun dalam bentuk kluster yang tidak teratur seperti anggur. *Staphylococcus aureus* tumbuh dengan cepat pada beberapa tipe media dan dengan aktif melakukan metabolisme, melakukan fermentasi terhadap karbohidrat dan menghasilkan bermacam-macam pigmen dari warna putih hingga kuning dan menjadi hemolisis, tiga tipe *Staphylococcus* yang berkaitan dengan medis yang biasanya adalah *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermis*, *Staphylococcus saprophiticus*.

Staphylococcus aureus bersifat koagulase positif yang membedakan spesies lainnya. *Staphylococcus aureus* adalah pathogen utama dari manusia hampir semua orang mengalami infeksi *Staphylococcus aureus*, dari keracunan makanan yang berat atau infeksi kulit yang kecil, sampai infeksi yang tidak bisa di sembuhkan.

Staphylococcus aureus dapat menyebabkan penyakit dan menyebar luaskan kedalam jaringan melalui produksi beberapa bahan ekstrakulikuler, Beberapa contoh bahan tersebut adalah enzim yaitu Katalase : *Staphylococcus aureus* menghasilkan katalase yang mengubah hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen. Tes katalase untuk membedakan *Staphylococcus* positif dan *Streptococcus* negatif.

Uji ini dilakukan dengan langkah:

- 1) Mengambil kultur sampel dengan ose secara aseptis dari agar miring dengan memijarkan ose dan mendinginkannya.
- 2) Biarkan digoreskan pada piperdish agar sel rata dan tidak menumpuk.

- 3) Kultur mikroba kemudian di tetesi 1-2 tetes H_2O_2 3% agar aktivitas katalase pada mikroba dapat diketahui.
- 4) Piperdish ditutup kembali agar tidak ada kombinasi dan memaksimalkan mikroba untuk merombak H_2O_2 .
- 5) Amati ada tidaknya gelembung-gelembung kecil. Jika terdapat gelembung maka piperdish tersebut merupakan bakteri katalase positif. Sebaliknya jika tidak ada gelembung termasuk bakteri katalase negatif.

Keberadaan H_2O_2 pertama kali di deteksi pada kultur *Pneumococcus*, sebuah organisme yang tidak memproduksi katalase dan sedikit sensitif terhadap peroksida. Organisme yang tidak memproduksi katalase di lindungi oleh penanaman jaringan hewan atau tumbuhan atau organisme lain yang mempunyai kemampuan memproduksi enzim. Katalase diproduksi oleh beberapa bakteri. Beberapa bakteri di antaranya memproduksi katalase lebih banyak dari pada yang lain. Ini ditunjukkan dengan jumlah yang banyak pada bakteri untuk aerob. Sedangkan enzim tidak diproduksi oleh bakteri anaerob obligat karena mereka tidak memerlukan enzim tersebut.

Bakteri katalase positif seperti *Staphylococcus aureus* bisa menghasilkan gelembung-gelembung oksigen karena adanya pemecahan H_2O_2 (hidrogen peroksida) oleh enzim katalase yang dihasilkan oleh bakteri itu sendiri. Komponen H_2O_2 ini merupakan salah satu hasil respirasi aerobik bakteri, *Staphylococcus aureus*, dimana hasil respirasi tersebut justru dapat menghambat pertumbuhan bakteri karena bersifat toksik bagi bakteri itu sendiri. Oleh karena itu, komponen ini harus dipecah agar tidak bersifat toksik lagi.

Bakteri katalase negatif tidak menghasilkan gelembung-gelembung. Hal ini berarti H_2O_2 yang diberikan tidak di pecah oleh bakteri katalase negatif,

misalnya *L.casei* sehingga tidak menghasilkan oksigen. Bakteri katalase negatif tidak memiliki enzim katalase yang menguraikan H_2O_2 .

Mekanisme enzim katalase memecah H_2O_2 yaitu saat melakukan respirasi, bakteri menghasilkan berbagai macam komponen salah satunya H_2O_2 . Bakteri yang memiliki kemampuan memecah H_2O_2 dengan enzim katalase maka segera membentuk suatu sistem pertahanan dari toksik H_2O_2 yang dihasilkannya sendiri. Bakteri katalase positif akan memecah H_2O_2 menjadi H_2O dan O_2 dimana parameter yang menunjukkan adanya aktivitas katalase tersebut adalah adanya gelembung-gelembung oksigen seperti pada percobaan yang telah dilakukan.

Koagulase : *Staphylococcus aureus* menghasilkan koagulase, protein menyerupai enzim yang mampu menggumpalkan plasma yang ditambahkan oksalat atau sitrat dengan adanya suatu faktor yang terdapat dalam serum. Faktor serum bereaksi dengan koagulase untuk membentuk esterase dan aktifitas gumpalan. Koagulase dapat membentuk fibrin pada permukaan *Staphylococcus*, ini bisa mengubah bentuk ingestinya atau fagositik atau pengrusaknya dalam sel fagosit.

- a) Endotoksin: ini meliputi beberapa toksin yang bersifat letal disuntikkan pada binatang, menyebabkan netrosit pada kulit yang berisi larutan hemolisis yang dapat dipisahkan heterogen yang dapat melisis eritrosit.
- b) Lekosidin: toksin *Staphylococcus aureus* ini dapat membunuh sel darah putih pada berbagai binatang.
- c) Enterotoksi : sedikitnya ada enam (A-F) toksin larut yang dihasilkan oleh hampir 50% galur *Staphylococcus aureus*. Enterotoksin adalah super antigen yang berkaitan dengan molekul MHC kelas II, menimbulkan stimulasi sel T. Enterotoksin stabil terhadap panas (mereka bertahan pada air mendidih selama 30 menit) dan resisten terhadap aksi enzim. Penyebab penting pada keracunan

makanan, enterotoksin dihasilkan ketika *Staphylococcus aureus* tumbuh pada makanan yang mengandung karbohidrat dan protein.

Staphylococcus aureus merupakan bakteri gram positif, tumbuh berkelompok. Bakteri ini normal berada di kulit dan siap untuk tumbuh di jaringan yang dalam yang menimbulkan infeksi. Fakta menunjukkan bakteri ini sebagai penyebab tersering terjadinya infeksi pada kulit. Bakteri ini menghasilkan beberapa toksin penghancur membran yang mampu merusak eritrosit, leukosit, trombosit dan sel manusia (Pringgoutomo, dkk, 2002).

Bisul (furunkel) merupakan infeksi yang dalam pada folikel rambut yang disebabkan oleh *Staphylococcus aureus*. Timbul abses yang nyeri pada tempat infeksi, dan sesudah beberapa hari terjadi fluktuasi dan “titik-titik” yang merupakan pusat pustula. Begitu inti dibagian tengah nekrosis hancur, maka secara bertahap lesi tersebut menghilang (Brown, 2002).

Penyebabnya adalah bakteri *Staphylococcus aureus*. Paling sering ditemukan di daerah tubuh yang banyak terjadi gesekan misalnya ketiak dan bokong (Zulkoni, 2011 : 52). Ketiak merupakan bagian kulit yang lembab sehingga populasi mikroorganismenya jauh lebih padat dari pada bagian yang relatif kering seperti pada lengan (Djide. M.N, Sartini, 2008 : 251). Bisul akan terasa sangat nyeri jika timbul disekitar hidung atau telinga atau pada jari-jari tangan (Zulkoni, 2011 : 52)

Gejala bisul biasanya ditandai dengan kulit membengkak dan terasa sakit bila disentuh yang dikelilingi dengan suatu bagian yang merah. Dalam beberapa kasus satu bisul belum sembuh, didekatnya sudah timbul kembali bisul lain, kadang-kadang satu, dua atau lebih dan sering kambuhan maka keadaannya disebut furunkulosis.

1. *Pseudomonas aeruginosa*

a. Klasifikasi (Garrity. G. M., Bell. J. A., and Lilburn 2004)

Domain : Bacteria

Filum : Proteobacteria

Kelas : Gammaproteobacteria

Ordo : Pseudomonadales

Famili : Pseudomonadaccae

Genus : Pseudomonas

Spesies : *Pseudomonas aeruginosa*

b. Sifat dan morfologi

Pseudomonas aeruginosa merupakan bakteri gram negatif dengan berbentuk sel tunggal, batang lurus atau melengkung, namun tidak berbentuk heliks. Pada umumnya berukuran 0,5-0,1 μm . Motil dengan flagellum polar, monotrikus atau multitrikus. Tidak menghasilkan selongsong prosteka, tidak dikenal adanya stadium istirahat, kemoorganotrof. Metabolisme dengan respirasi, tidak pernah fermentative. Beberapa merupakan kemolitotrof fakultatif, dapat menggunakan H_2 sebagai sumber energi. Oksigen molekuler merupakan penerima elektron universal, beberapa dapat melakukan denitrifikasi dengan menggunakan nitrat sebagai penerima (pelczar, chan 2008).

c. Mekanisme penyerangan antibakteri (imunologi III)

Staphylococcus yang dapat masuk ke tubuh melalui pintu gerbang alami, atau melalui pecahnya kulit atau membran mukosa. bakteri dapat mengalami replikasi terbatas dan menyebabkan lesi setempat, yang dapat di ikuti dengan pembentukan abses (kumpulan leukosit polimorfonuklear). Beberapa bakteri dapat dibunuh secara efektif oleh leukosit polimorfonuklear, yang lain memerlukan adanya antibodi dan komplemen (osponin). Jika mekanisme

pertahanan hospes cukup untuk mengisi respons piogenik (pembentukan pus) secara lokal, penyusutan dan penyembuhan akan terjadi. Sebaliknya, jika mekanisme pertahanan hospes tidak cukup untuk mengendalikan bakteri ini secara lokal, infeksi dapat menyebar regional atau masuk ke sirkulasi sistemik, menyebabkan terjadinya sepsis yang berat.

Pseudomonas aeruginosa menyebabkan infeksi pada luka dan luka bakar, menimbulkan nanah hijau kebiruan, meningitis, dan infeksi saluran kemih dimana kuman masuk bersama kateter dan instrumen lain atau dalam larutan irigasi. Pada cedera dan pembedahan mata, seringkali terjadi infeksi mata yang dengan cepat dapat menyebabkan kerusakan mata (Jawetz, 2001: 373).

1. Mikroorganisme

Mikroorganisme atau mikroba adalah organisme hidup yang berukuran sangat kecil dan hanya dapat diamati menggunakan mikroskop. Organisme yang termasuk kedalam golongan mikroorganisme adalah bakteri, fungi (kapang dan khamir), protozoa, algae, dan virus. (pratiwi, 2008:97)

Fase pertumbuhan mikroorganisme, ada empat macam fase pertumbuhan mikroorganisme yaitu fase lag, fase log (fase eksponensial), fase stasioner dan fase kematian.

1. Fase lag merupakan fase adaptasi, yaitu fase penyesuaian mikroorganisme pada satu lingkungan baru. Ciri fase lag adalah tidak adanya peningkatan jumlah sel, yang ada hanyalah peningkatan ukuran sel.
2. Fase log merupakan fase di mana mikroorganisme tumbuh dan membelah pada kecepatan maksimum. Hal yang dapat menghambat laju pertumbuhan adalah bila satu atau lebih nutrisi dalam kultur habis, sehingga hasil

metabolism yang bersifat racun akan tertimbun dan menghambat pertumbuhan.

3. Fase stasioner merupakan fase dimana pertumbuhan mikroorganisme berhenti dan terjadi keseimbangan antara jumlah sel yang membelah dengan jumlah sel yang mati.
4. Fase kematian di mana jumlah sel yang mati meningkat. Faktor penyebabnya adalah ketidak tersediaan nutrisi dan akumulasi produk buangan yang toksik (Pratiwi,2008 : 102)

2. Antimikroba

1. Pengertian Antimikroba.

Antimikroba adalah bahan-bahan atau obat-obatan yang digunakan untuk membunuh infeksi mikroba pada manusia termasuk diantaranya antibiotik, antiseptik, dan desinfektan. Antibiotik adalah bahan yang diperoleh dari organisme, yang digunakan untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Antiseptik adalah senyawa kimia yang digunakan untuk menghambat atau mematikan mikroorganisme pada jaringan hidup, yang mempunyai efek membatasi dan mencegah infeksi agar tidak menjadi lebih parah. Desinfektansia adalah senyawa kimia yang digunakan untuk menghambat atau mematikan mikroorganisme, yang digunakan pada benda mati. (Djide, 2008 :101)

Obat-obat yang digunakan untuk membasmi mikroorganisme yang menyebabkan infeksi pada manusia, hewan ataupun tumbuhan harus bersifat toksisitas selektif artinya obat atau zat tersebut harus bersifat toksik terhadap mikroorganisme penyebab penyakit. (Djide, 2008:59).

Antimikroba (AM) adalah obat pembasmi mikroba, khususnya mikroba yang bersifat merugikan manusia (mikroba pathogen). Berdasarkan sifat toksisitas selektif, ada antimikroba yang bersifat menghambat pertumbuhan mikroba yang

dikenal sebagai aktifitas bakteriostatik, dan ada yang bersifat membunuh mikroba dikenal sebagai aktivitas bakterisid. Kadar minimal yang diperlukan untuk menghambat pertumbuhan mikroba atau membunuhnya, masing-masing dikenal sebagai kadar hambat minimal (KHM) dan kadar bunuh minimal (KBM). Antimikroba tertentu aktivitasnya dapat meningkat dari bakteriostatik menjadi bakterisid bila kadar antimikrobanya ditingkatkan melebihi KHM (Ganiswara, 1995 : 571).

2. Sifat Antimikroba

a. Bakteriostatik

Zat atau bahan yang dapat menghambat atau mematikan pertumbuhan mikroorganisme (bakteri). Dalam keadaan seperti jumlah mikroorganisme menjadi stasioner, tidak dapat bermultiplikasi dan berkembang biak. Contoh : Sulfonamid, tetrasiklin, kloramfenikol dan eritromisin.

b. Bakteriosida

Zat atau bahan yang dapat membunuh mikroorganisme (bakteri). Dalam hal ini jumlah mikroorganisme (bakteri) akan berkurang atau bahkan habis, tidak dapat lagi melakukan multiplikasi atau berkembang biak. Contoh penisilin, sefalosporin dan nikomisin. (Djide, 2008:78).

3. Prinsip Kerja Antimikroba

Suatu antimikroba memperlihatkan toksisitas yang selektif, dimana obatnya lebih toksik terhadap mikroorganismenya dibandingkan pada sel hospes. Hal ini dapat terjadi karena pengaruh obat yang selektif terhadap mikroorganisme atau karena obat reaksi-reaksi biokimia yang penting dalam sel parasit lebih unggul daripada pengaruhnya terhadap hospes. Disamping itu struktur sel mikroorganisme berbeda dengan struktur sel manusia (hospes inang). (Djide, 2008:98).

4. Mekanisme Kerja Antimikroba (Ganiswarna,1995:98)

a. Antimikroba yang menghambat metabolisme sel mikroba

Mikroba membutuhkan asam folat untuk kelangsungan hidupnya yang harus di sintesis dari Para Amino Bensoat Acid (PABA). Bila senyawa antimikroba memang bersaing dengan PABA untuk diikutsertakan dalam pembentukan asam folat maka akan terbentuk analog asam folat yang non fungsional. Akibatnya, kehidupan mikroba terganggu, anti mikroba yang termasuk dalam kelompok ini adalah sulfonil,trimetoprin,asam P-aminosalisilat (PAS) dan sulfon

b. Antimikroba yang menghambat sintesis dinding sel mikroba

Antimikroba ini menghambat reaksi dalam sintesis dinding sel, sehingga terjadi kerusakan yang menyebabkan terjadinya lisis, antimikroba yang termasuk dalam kelompok ini adalah penisilin,sefalosporin,basitaring,vankomisin dan sikloserin

c. Antimikroba yang mengganggu keutuhan membran sel mikroba

Antimikroba ini mempengaruhi sistem permeabilitas selektif dari membran sel mikroba, sehingga terjadi kerusakan membran sel yang menyebabkan keluarnya berbagai komponen penting dari dalam sel mikroba seperti asam nukleat,nukleatida, dan lain-lain ,antimikroba yang termasuk kelompok ini adalah polimiksin.

d. Antimikroba yang sangat menghambat sintesis protein sel mikroba

Sintesis protein berlangsung di ribosom dengan bantuan m-RNA. Pada bakteri , ribosom terdiri sub unit yang berdasarkan konstanta sedimentasi dinyatakan sebagai ribosom 30S dan 50S yang berfungsi pada sintesis protein, kedua komponen ini akan bersatu pada pangkal rantai m-RNA menjadi ribosom 70S. antimikroba berkaitan dengan komponen tersebut dan menghambat sintesis

protein, sehingga menghasilkan protein yang abnormal dan fungsional bagi sel mikroba. Antimikroba yang termasuk dalam kelompok ini adalah tetraksiklin dan kloramfenikol.

e. Antimikroba yang menghambat sintesis asam nukleat sel mikroba

Antimikroba yang memiliki mekanisme kerja ini pada umumnya mempunyai sifat toksisitas selektif karena bersifat sitotoksin, contoh rifampisin berkaitan dengan enzim polymerase-RNA (pada sub unit) sehingga menghambat sintesis RNA dan DNA oleh enzim tersebut, kuinolon menghambat enzim DNA girase pada kuman.

E. Pengujian aktivitas antimikroba

Pada uji ini diukur respons pertumbuhan populasi mikroorganisme terhadap agen antimikroba. Tujuan essay antimikroba adalah untuk menentukan potensi dan kontrol kualitas selama proses produksi, senyawa antimikroba di pabrik. Terdapat bermacam-macam metode uji antimikroba yaitu :

1. Metode difusi

a. Metode *disc diffusion* (tes Kirby dan Bauer)

Untuk menentukan aktivitas antimikroba, Piringan yang berisi agen antimikroba diletakkan pada media agar yang telah ditanami mikroorganisme yang akan berdifusi pada media agar tersebut. Area jernih mengindikasikan adanya hambatan pertumbuhan mikroorganisme oleh agen antimikroba pada permukaan media agar.

b. *E-test*

Digunakan untuk mengestimasi MIC (minimum inhibitory concentration) atau KHM (kadar hambat minimum), yaitu konsentrasi minimal suatu agen antimikroba untuk dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme.

c. *Ditch-plate technique*

Pada metode ini sampel uji berupa agen antimikroba yang diletakkan pada parit yang dibuat dengan cara memotong media Agar dalam cawan petri pada bagian tengah secara membujur dan mikroba uji digoreskan ke arah parit yang berisi agen antimikroba.

d. *Cup-plate technique*

Di mana dibuat sumur pada media Agar yang telah ditanami dengan mikroorganisme dan pada sumur tersebut diberi antimikroba yang akan diuji.

e. *Gradient-plate technique*

Pada metode ini konsentrasi agen antimikroba pada media Agar secara teoritis bervariasi dari 0 hingga maksimal. Media Agar dicairkan dan larutan uji ditambahkan. Campuran medium dituang ke dalam cawan petri dan diletakkan dalam posisi miring. Nutrisi kedua selanjutnya dituang di atasnya.

Plate diinkubasi selama 24 jam untuk memungkinkan agen antimikroba berdifusi dan permukaan media mengering. Mikroba uji digoreskan pada arah mulai dari konsentrasi tinggi ke rendah. Hasil diperhitungkan sebagai panjang total pertumbuhan mikroorganisme maksimum yang mungkin dibandingkan dengan panjang pertumbuhan hasil goresan. Yang perlu diperhatikan adalah

hasil perbandingan yang didapat dari lingkungan padat dan cair, faktor difusi agen antimikroba dapat mempengaruhi keseluruhan hasil pada media padat.

2. Metode Dilusi

a. Metode Dilusi Cair

Metode ini mengukur MIC (minimum inhibitory concentration) atau kadar hambat minimum (KHM) dan MBC (minimum bactericidal concentration) atau kadar bunuh minimum (KBM). Cara yang dilakukan adalah dengan membuat seri pengenceran agen antimikroba pada medium cair yang ditambahkan dengan mikroba uji. Larutan uji agen antimikroba pada kadar terkecil yang terlihat jernih tanpa adanya pertumbuhan mikroba uji ditetapkan sebagai KHM. Larutan yang ditetapkan sebagai KHM tersebut selanjutnya dikultur ulang pada media cair tanpa penambahan mikroba uji ataupun agen antimikroba, dan inkubasi selama 18-24 jam. Media cair yang tetap terlihat jernih setelah inkubasi ditetapkan sebagai KBM.

b. Metode Dilusi Padat

Metode ini serupa dengan metode dilusi cair namun menggunakan media padat (solid). Keuntungan metode ini adalah satu konsentrasi agen antimikroba yang diuji dapat digunakan untuk menguji beberapa mikroba uji (Pratiwi, 2008: 188-191).

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas antimikroba yaitu :
 - a. pH lingkungan
 - b. Komponen-komponen perbenihan
 - c. Stabilitas obat
 - d. Besarnya inokulum bakteri
 - e. Masa pengeraman
 - f. Aktivitas metabolik mikroorganismenya (Jawetz,1996)

F. Sterilisasi

Sterilisasi dalam mikrobiologi merupakan proses penghilangan semua jenis organisme hidup, dalam hal ini adalah mikroorganismenya (protozoa, fungi, bakteri, mycoplasma, virus) yang terdapat pada/di dalam suatu benda. Proses ini melibatkan proses fisik dengan tujuan untuk membunuh atau menghilangkan mikroorganismenya. (Jawetz, 2005: 18)

1. Secara fisik:

- a. Pemanasan basah

Beberapa pemanasan basah dapat menyebabkan denaturasi protein, termasuk enzim–enzim di dalam sel mikroorganismenya. Beberapa cara pemanasan basah yaitu:

- 1) Perebusan, air mendidih atau uap air pada suhu 100° C dapat membunuh bentuk vegetatif dari mikroorganismenya dan virus dalam waktu 5 menit, beberapa spora juga dapat terbunuh pada suhu tersebut selama beberapa menit, tetapi banyak spora bakteri yang tahan terhadap

panas dan masih tetap hidup setelah dilakukan perebusan selama beberapa jam.

2) Pemanasan dengan tekanan

Pemanasan dengan tekanan dapat dilakukan dengan menggunakan alat berupa autoklaf untuk membunuh spora bakteri yang paling tahan asam, spora yang paling tahan panas akan mati pada suhu 121°C selama 15 menit.

3) Tindalisasi

Proses sterilisasi dengan cara menggunakan pemanasan suhu 100°C selama 30 menit dan dilakukan setiap hari berturut-turut selama tiga hari.

4) Pasteurisasi

Proses pemanasan pada suhu rendah yaitu $63\text{--}70^{\circ}\text{C}$ selama 30 menit dan dilakukan setiap hari selama 3 hari berturut-turut. Proses pasteurisasi ini biasanya dilakukan terhadap bahan atau zat-zat yang tidak tahan terhadap pemanasan tinggi seperti susu.

a. Pemanasan kering

Pemanasan kering seharusnya kurang efektif untuk membunuh mikroorganisme dibandingkan dengan pemanasan basah, pada pemanasan kering menyebabkan dehidrasi sel dan juga dapat menyebabkan oksidasi komponen-komponen dalam sel.

b. Radiasi

Sinar matahari yang dipancarkan langsung kepada sel vegetatif mikroorganisme dapat menyebabkan kematian pada sel tersebut, sedangkan spora biasanya lebih tahan.

Radiasi ionisasi adalah radiasi yang mengandung energi jauh lebih tinggi daripada sinar ultra violet (UV), oleh karena itu mempunyai daya mematikan yang lebih kuat.

2. Cara mekanik

Penyaringan telah banyak dilakukan untuk mensterilkan medium laboratorium dan larutan-larutan yang dapat menyebabkan kerusakan jika dipanaskan. Penyaring yang banyak digunakan tersebut dibuat dari gelas sinter serat yang pori-porinya berukuran 0,22–10 mikron.

3. Cara kimia

Cara kimia sering disebut desinfeksi dan antiseptik. Bahan kimia ini menimbulkan pengaruh yang lebih selektif terhadap mikroorganisme dibandingkan dengan perlakuan fisik seperti panas dan radiasi. Untuk memilih bahan kimia sebagai bahan untuk desinfektansi dan antiseptika perlu diperhatikan yaitu sifat mikrosidalnya, sifat mikrostatik, kecepatan penghambatan, dan sifat-sifat lainnya seperti harga, aktivitasnya tetap stabil dalam jangka waktu lama, larut dalam air dan stabil dalam larutan (Djide dkk, 2008: 189 - 193).

G. Ekstraksi

1. Pengertian

Ekstraksi adalah penyarian zat-zat berkhasiat atau zat-zat aktif dari bagian tanaman obat, hewan dan beberapa jenis akan termasuk biota laut. Zat-zat aktif tersebut terdapat di dalam sel, namun sel tanaman dan hewan berbeda demikian pula ketebalannya sehingga, diperlukan metode ekstraksi dan pelarut tersebut dalam mengekstraksi. (Depkes,1986:678)

2. Mekanisme kerja

Proses terekstraksinya zat aktif dalam tanaman adalah larut organik akan menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat aktif, zat aktif akan terlarut sehingga terjadi perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif di dalam sel dan pelarut organik di luar sel. Maka larutan terpekat akan berdifusi keluar sel , dan proses ini akan berulang terus sampai terjadi keseimbangan antara konsentrasi zat aktif di dalam dan di luar sel.

3. Prinsip ekstraksi

Penyarian zat aktif yang dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari yang sesuai selama tiga hari pada temperatur kamar terlindung dari cahaya, cairan penyari akan masuk ke dalam sel melewati dinding sel. Isi sel akan larut karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan di dalam sel dengan di luar sel. Larutan yang konsentrasinya tinggi akan terdesak keluar dan diganti oleh cairan penyari dengan konsentrasi rendah (proses difusi). Peristiwa tersebut berulang sampai terjadi keseimbangan konsentrasi antara larutan di luar sel dan di dalam sel. Selama proses maserasi dilakukan pengadukan dan penggantian cairan penyari setiap hari. Endapan yang diperoleh dipisahkan dan filtratnya dipekatkan.

4. Metode ekstraksi bahan alam

a. Tujuan ekstraksi

Adalah untuk menarik komponen-komponen kimia yang terdapat dalam simplisia, proses ekstraksi ini di dasarkan atas perpindahan massa komponen-komponen zat padat dari simplisia ke dalam pelarut, setelah pelarut menembus permukaan dinding sel, kemudian berdifusi sehingga terjadi perbedaan tekanan di luar dan di dalam sel. (Depkes,1986:688) Secara umum terdapat empat situasi :

- 1) Secara kimia telah diketahui identitasnya untuk di ekstraksi dari organisme. Dalam kasus ini , prosedur yang telah dipublikasikan dapat di ikuti dan di buat modifikasi yang sesuai untuk mengembangkan proses atau menyesuainya dengan kebutuhan pemakai.
- 2) Bahan untuk menemukan kelompok senyawa kimia tertentu, misalnya alkaloid,flavonoid,atau saponin meskipun struktur kimia dari senyawa ini, bahkan keberadaan belum di ketahui. Dalam situasi seperti ini , metode umum yang di gunakan untuk senyawa kimia yang di minati dapat di peroleh dari pustaka.
- 3) Organisme (tanaman atau hewan) di gunakan dalam pengobatan tradisional dan biasanya di buat dengan berbagai cara misalnya Tradisional Chinese Medicine (TCM) seringkali membutuhkan herba yang di didihkan dalam air dan dekok dalam air untuk di berikan sebagai obat. Proses ini harus di tiru sedekat mungkin jika ekstrak akan melalui kajian ilmiah biologi atau kimia lebih lanjut , khususnya jika tujuannya untuk menvalidasi penggunaan tradisional.
- 4) Sifat senyawa yang akan diisolasi belum di tentukan sebelumnya dengan cara apapun. Situasi ini (utamanya dalam program skrining) dapat timbul jika tujuannya adalah menguji organisme, baik yang di pilih secara acak

maupun di dasarkan pada penggunaan tradisional untuk mengetahui adanya senyawa dengan aktifitas biologi tertentu.

b. Jenis-jenis ekstraksi

Jenis ekstraksi bahan alam yang sering di lakukan adalah ekstraksi secara panas dan dingin. Ekstraksi secara panas di lakukan dengan cara refluks, infudasi dan destilasi uap air, sedangkan ekstraksi secara dingin di lakukan dengan cara maserasi, perkolasi dan soxhletasi. (Depkes, 1986:690)

1) Ekstraksi secara infudasi

Infudasi adalah proses penyarian yang umumnya di gunakan untuk menyaring zat aktif yang larut dalam air dari bahan nabati, yang dilakukan dengan cara membasahi dengan air. Biasanya dua kali bobot bahan, kemudian di tambah dengan air secukupnya dan di panaskan dalam tangas air selama 15 menit dengan suhu 90-98^o C, sambil berkali-kali di aduk. Untuk mencukupi kekurangan air, di tambahkan melalui ampasnya. Umumnya 100 bagian sari di perlukan 10 bagian bahan (Depkes, 1986:692).


2) Ekstraksi secara refluks

Ekstraksi dengan metode refluks di gunakan untuk simplisia dengan kandungan zat aktif yang tahan terhadap pemanasan. Alat refluksi ini terbuat dari bahan gelas di mana bagian tengahnya di lengkapi dengan lingkaran gelas yang berbentuk spiral atau bola. Untuk mengekstraksi, bahan di masukkan ke dalam labu alas bulat bersama cairan penyaring kemudian di panaskan. Cairan penyari ini akan mendidih, menguap dan mengkondensasi pada pendingin tegak, lalu turun kembali pada labu dan sekaligus mengekstraksi kembali. Proses ini berlangsung secara berkesinambungan sampai bahan tersari sempurna. Pekerjaan ini di lakukan sebanyak 3-4 kali selama 3-4 jam (Depkes, 1986:693).

H. Tinjauan Islam Mengenai Penelitian Tanaman Obat

Allah menumbuhkan berbagai macam tanaman untuk di manfaatkan manusia. Peradaban islam di kenal sebagai perintis dalam bidang farmasi. Para ilmuwan muslim di masa kejayaan Islam sudah berhasil menguasai riset ilmiah mengenai komposisi,dosis,pengunaan dan efek dari obat-obatan sederhana dan campuran. Selain menguasai bidang farmasi masyarakat muslim pun tercatat sebagai peradaban pertama yang memiliki apotek dan toko obat. Kesehatan merupakan sumber daya yang paling berharga , serta kekayaan yang paling mahal harganya. (Rahman, 2007)

Para ahli dalam bidang ini mengetahui formula obat-obatan,karakteristik dan cara penggunaannya diiringi dengan keyakinan mereka bahwa obat itu hanya penyebab perantara kesembuhan saja dan Allah lah yang menjadikan penyebab itu semua, oleh karena itu hukumnya boleh mempelajari ilmu pengobatan Firman Allah swt dalam Q.S *Thaahaa* (20): 53



Terjemahnya :

“Yang Telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam.”(Departemen Agama RI, 2006: 408)

Ayat di atas menyatakan bahwa *Dia yang telah menjadikan bagi kamu sebagai hamparan* adalah isyarat bahwa keneradaan manusia dipentas bumi dalam rangka kehidupannya adalah bagian dari hidayah Allah. Firman-Nya : *menjadikan*

awan, air hujan untuk kamu manfaatkan. *Sebagianya menjadi minuman dan sebagian yang lainnya menyuburkan tumbuh-tumbuhan,yang padanya*, yakni di tempat tumbuhnya, *kamu menggembalakan ternak* kamu sehingga binatang itu dapat dimakan dan pada gilirannya dapat menghasilkan untuk kamu susu, daging, dan bulu (Shihab, 2002 ;542).

Berdasarkan ayat di atas diketahui bahwa Allah swt menciptakan aneka macam tumbuhan untuk dimanfaatkan manusia. Salah satunya sampel ekstrak Lumut Hati (*Hepaticiopsida sp*) sebagai sampel yang dapat digunakan sebagai bahan penelitian sehingga dapat diketahui manfaat dari tumbuhan sebagai bahan pengobatan.

Dan dalam firman Allah Q.S *Al An'aam* (6): 99



Terjemahnya :

“Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan Maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa.perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan (perhatikan pulalah) kematangannya.Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman.” (Departemen Agama RI, 2005: 348)

Kata *na-bata* pada ayat di atas memberikan makna atau mengisyaratkan kepada jenis-jenis tumbuhan yang memberikan manfaat sebagai obat. Secara Epistemologi Allah swt memerintahkan untuk merenungkan terhadap pepohonan bagaimana saat tumbuh subur dan saat masak. Keluarnya buah dari perantara kayu dan daun mengandung ayat qudrah (kekuasaan) yang luar biasa dan terang dengan rasa yang manis dan lezat.



Terjemahnya :

“(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka.” (Departemen Agama RI, 2006: 448)

Q.S. *Faathir* (35): 28



Terjemahnya:

“Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya, hanyalah ulama orang-orang yang mengetahui kebesaran dan kekuasaan Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.”(Departemen Agama RI, 2005: 248)

Ayat diatas, menjelaskan bahwa diantara penciptaan manusia terdapat pula ciptaan Allah yang lain yaitu binatang-binatang melata dan binatang ternak serta makhluk hidup lainnya yang memiliki bermacam-macam bentuk, ukuran, jenis dan warna. Salah satu dari makhluk ciptaan-Nya adalah mikroorganisme yang memiliki bentuk dan ukuran yang sangat kecil yang tidak dapat terlihat oleh mata kasar manusia dan semua itu Allah tiadalah menciptakan segala sesuatu dengan sia-sia.

Diriwayatkan oleh Abi Hurairah r.a bahwa Rasulullah bersabda :

() ...

Artinya :

... Allah yang menurunkan penyakit, dan Dia juga yang menurunkan obatnya.

(HR. Bukhari).

Setiap apa yang diciptakan oleh-Nya kemudian diperuntukkan kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Ini bukan berarti bahwa manusia boleh dengan seenaknya atau semaunya menggunakan apa yang telah diciptakan-Nya itu melainkan untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Diriwayatkan pula oleh Muslim dari Jabir r.a bahwa Rasulullah bersabda :

لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى (رواه مسلم)

Artinya :

... Setiap penyakit ada obatnya. Dan jika suatu obat mengenai tepat pada penyakitnya, ia akan sembuh dengan izin Allah Ta'ala. (HR. Muslim).

Jadi setiap penyakit yang diturunkan oleh Allah swt ada obatnya, dan setiap pengobatan itu harus sesuai dengan penyakitnya. Kesembuhan seseorang dari penyakit yang diderita memang Allah swt yang menyembuhkannya, akan tetapi Allah swt menghendaki agar pengobatan itu dipelajari oleh ahlinya agar sesuai dengan penyakit yang akan di obati sehingga akan mempermudah penyembuhannya.

Dari beberapa ayat dan hadis diatas dapat kita ketahui bersama bahwa Allah swt telah memperlihatkan kekuasaannya sebagai pencipta Alam dan seluruh isinya sehingga bagaimanapun kecerdasan manusia melakukan pengobatan dan rekayasa genetik belum mampu melewati ketentuan-ketentuan Sang Pencipta, sebab Allah swt yang mengetahui manusia dan apa yang ada di langit dan di bumi secara mendetail, sehingga dengan ayat dan hadist ini sebagai seorang hamba yang mempelajari ilmu pengobatan agar senantiasa bersyukur dan tidak

mengkufurinya serta mengharap ridho-Nya semoga apa yang telah diusahakan oleh manusia mampu menjadi obat yang dapat menyembuhkan manusia dengan izin dan kekuasaan Sang Pencipta sebab segala sesuatunya apa yang ada akan kembali kepada-Nya.

I. Pemanfaatan Tumbuh-tumbuhan

Flora atau segala tumbuh-tumbuhan yang terdapat dalam suatu daerah atau di suatu masa, yang mana merupakan sebutan untuk seluruh jenis tanaman dan tumbuhan. Sebagai padanan dari kata flora, dalam alqur'an di gunakan kata "nabaats" dan "haarts" yang berarti tumbuhan dan tanaman (Abu, 2006). Saat ini berbagai macam nama tumbuhan yang kita ketahui, nama tumbuh-tumbuhan tersebut sebenarnya telah Allah swt., ajarkan kepada manusia, dan manusia pertama yang diajarkan oleh Allah swt., tentang nama-nama tumbuhan adalah Nabiullah Adam, as.

Dalam Al-quran Allah swt., banyak menyebutkan tentang tanaman-tanaman yang ada di muka bumi ini. Diantaranya ayat yang mencantumkan tentang tanaman-tanaman

Allah swt., berfirman dalam QS. Lukman/31 :10




Terjemahnya:

Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya dan dia Meletakkan gunung-gunung (di permukaan) bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu; dan memperkembang biakkan padanya segala macam jenis binatang. dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.

Dewasa ini bahan alam khususnya tumbuhan telah banyak diteliti oleh para ahli untuk dikembangkan menjadi suatu bahan obat, mengingat bahwa negara kita kaya akan berbagai jenis tumbuhan yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia, salah satu diantaranya adalah dalam pengobatan yang biasa dikenal dengan obat tradisional (Abd ush shamad 2002, 141).

Relevansinya dengan itu, di dalam Al-quran Allah swt., berfirman QS.

Qaaf/50 : 7 yang berbunyi :



Terjemahnya :

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?

Maksud ayat tersebut adalah menghendaki agar manusia senantiasa bersyukur atas segala pemberian Allah swt., melalui tumbuh-tumbuhan yang memiliki manfaat untuk kepentingan manusia, tumbuhan yang telah diciptakan oleh Allah swt.,

Allah swt., berfirman dalam QS. Hijr/15 : 19



Terjemahnya :

“Dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran”.

Dipahami oleh sebagian ulama dalam arti bahwa Allah swt.,

Menumbuh kembangkan di bumi ini aneka ragam tanaman untuk kelangsungan hidup dan menetapkan bagi sebagian tanaman itu masa pertumbuhan dan penuaian tertentu. Sesuai dengan kuantitas dan kebutuhan makhluk hidup. Demikian juga, Allah swt, menentukan bentuknya sesuai dengan penciptaan dan habitat alamnya (Shihab, 2002 jilid 7; 119).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, jenis penelitian ini bersifat eksperimental dengan menguji daya hambat konsentrasi ekstrak lumut hati terhadap bakteri *Staphylococcus aureus* dan *Pseudomonas aeruginosa* yang ditandai dengan daerah berbentuk lingkaran bening pada medium.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi Farmasi, Laboratorium Fitokimia Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan eksperimentatif yaitu pengumpulan data berdasarkan hasil dari eksperimen yang dilakukan.

C. Metode Pengumpulan Data

1. Penyiapan Sampel

Pengambilan sampel dilakukan pada daerah yang lembab. Selanjutnya dicuci pada air yang mengalir sampai bersih setelah itu dilakukan proses sortasi basah lalu di keringkan dengan cara di angin-anginkan, setelah simplisia kering di lakukan sortasi kering di sini sampel tidak di blender tapi cuman di remes menjadi serbuk sehingga diperoleh serbuk Lumut hati (*Hepaticiopsida sp*).

2. Ekstraksi Lumut hati

Serbuk Lumut hati (*Hepaticiopsida sp*) ditimbang sebanyak 300 g dimasukkan dalam wadah maserasi, kemudian ditambahkan etanol hingga serbuk

terendam kurang lebih 2 cm di atas permukaan serbuk. Wadah maserasi ditutup dan disimpan selama 24 jam di tempat yang terlindung dari sinar matahari langsung. Selanjutnya disaring, dipisahkan antara ampas dan filtratnya. Ampas diekstraksi kembali dengan etanol yang baru dengan jumlah yang sama. Hal ini dilakukan sebanyak 3×24 jam. Ekstrak etanol yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan diuapkan cairan penyaringnya sampai diperoleh ekstrak etanol kering.

3. Sterilisasi Alat

Alat-alat yang diperlukan dicuci dengan detergen, dibersihkan, direndam dengan larutan panas selama 15-30 menit dan terakhir dengan air suling. Alat-alat dikeringkan dengan posisi terbalik di udara terbuka, setelah kering dibungkus dengan kertas. Tabung reaksi dan gelas erlenmeyer terlebih dahulu disumbat dengan kapas bersih. Alat-alat dengan kaca disterilkan di oven pada suhu 180⁰C selama 2 jam. Alat-alat suntik dan alat-alat plastik lainnya (tidak tahan pemanasan tinggi) disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121⁰C selama 15 menit dengan tekanan 2 atm. Jarum ose disterilkan dengan pemanasan langsung hingga memijar.

4. Pembuatan Medium

a. Medium Nutrien Agar (NA)

Komposisi :

Ekstrak Daging	5,0	gram
Pepton	10,0	gram
Agar	15,0	gram
Air suling hingga	1000	ml

Pembuatan :

Semua bahan dimasukkan ke dalam gelas Erlenmeyer dilarutkan dalam air suling hingga 800ml, dipanaskan sampai larut, lalu dicukupkan sampai 1000ml aquadest, kemudian disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121⁰ C selama 15 menit.

b. Medium Glukosa Nutrien Broth (GNB)

Komposisi :

Ekstrak Beef	5,0	gram
Glukosa	10,0	gram
Pepton	10,0	gram
Air suling hingga	1000	ml

Pembuatan :

Semua bahan di masukkan ke dalam gelas Erlenmeyer di Larutkan dalam air suling hingga 800ml di panaskan sampai larut, dicukupkan sampai 100ml aquadest, kemudian disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121⁰ C selama 15 menit. (Djide, 2008:56).

5. Persiapan Bakteri Uji

a. Peremajaan bakteri

Bakteri uji yang digunakan adalah *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermis* dari stok murni di ambil satu mata ose, diinokulasikan pada medium Nutrient agar (NA) dan diinkubasi pada suhu 37⁰ C selama 1x24 jam.

b. Pembuatan Suspensi Bakteri Uji

Bakteri uji yang telah dimurnikan berumur 24 jam disuspensikan kedalam larutan fisiologis NaCl 0,9% steril hingga tingkat kekeruhannya 25%T

pada spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 580nm (Harmita, 2008:578).

6. UJI MIC (*Minimum Inhibitory Concentration*) Ekstrak Lumut Hati (*Hepaticiopsida sp*)

Disediakan medium (Medium cair) biakan murni mikroba,dan sampel Ekstrak Lumut Hati (*Hepaticiopsida sp*) di buat konsentrasi 1 % lalu Tabung reaksi diisi dengan pengencer steril NB. Dilakukan pengenceran dengan menggunakan Deret ukur yaitu 0,1%, 0,5%, 1%, 2%, 4%, dan 6% lalu Diinokulasikan mikroba dalam jumlah sesuai pada tabung reaksi kemudian Diinkubasikan pada suhu 37 °C dan selama 1×24 jam setelah itu amati kekeruhan yang terjadi pada tabung reaksi dapat Dilihat pada batas konsentrasi berapa bakteri masih dapat tumbuh pada tabung reaksi.

7. Pengujian Daya Hambat Antibakteri Ekstrak Lumut Hati (*Hepaticiopsida sp*) Dengan Metode Difusi

Disiapkan ekstrak Lumut Hati (*Hepaticiopsida sp*). Medium NA dituang secara aseptik kedalam cawan petri steril sebanyak 10ml, setelah itu di ambil biakan suspensi bakteri dan dimasukkan ke dalam medium NA. biakan ini dicampur dengan baik supaya bakteri terdistribusi secara merata kemudian cawan petri digoyang-goyangkan dengan membentuk angka delapan sehingga biakan menutupi seluruh permukaan lempeng NA. Setelah itu paperdisk yang berisi sampel di masukkan secara aseptik dengan menggunakan pinset steril pada permukaan medium. Lalu di inkubasi pada suhu 37⁰ C selama 1x24 jam. Kemudian di amati daerah hambatan yang terbentuk di ukur diameternya dengan menggunakan mistar Geser.

D. Instrumen Penelitian

1. Alat

Alat – alat yang digunakan adalah cawan porselin, autoklaf (*SMIC model YX-28*), cawan petri (*Iwaki pyrex®*), enkas, erlenmeyer (*Pyrex®*), gelas ukur 100 ml (*Pyrex®*), inkubator (*Memmert®*), jangka sorong, kompor gas, lampu spiritus, Laminar Air Flow (LAF), lemari pendingin, ose bulat, oven (*Memmert®*), pinset, spoit 10ml (*One med*), tabung reaksi (*Pyrex®*), timbangan analitik (*AND*), dan vial

2. Bahan yang di gunakan

Air suling, etanol 70%, aluminium foil, kapas, medium NA, Kertas timbang, kultur murni *Staphylococcus aureus* dan *Pseudomonas aeruginosa*, medium NB, sampel tumbuhan Lumut Hati (*Hepaticiopsida sp*).

E. Validasi dan Rehabilitas Instrumen

Alat ukur yang digunakan untuk penentuan kadar adalah spektrofotometer UV-Vis. Validasi dijaga dengan cara menggunakan instrumen yang terkalibrasi. Reliabilitas dijaga dengan melakukan pengulangan pengukuran sampai tiga kali untuk konsentrasi yang sama.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian

Hasil pengujian aktivitas antibakteri ekstrak etanol lumut hati terhadap bakteri *Staphylococcus aureus* dan *Pseudomonas aeruginosa* dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Hasil ekstraksi Lumut hati (*Hepaticiopsida sp*)

Jenis ekstrak	Pelarut	Bobot sampel	Bobot Ekstrak	%Rendamen
Ekstrak Kering	Etanol (1,5L)	50gram	25gram	9,6

Tabel 2. Hasil uji minimum inhibitory concentration (MIC) antibakteri ekstrak etanol lumut hati (*Hepaticiopsida sp*)

Bakteri	Pengamatan					
	Konsentrasi Ekstrak Etanol Lumut Hati (%)					
	0,1%	0,5%	1%	2%	4%	6%
P.A	+	—	—	—	—	—
S.A	+	—	—	—	—	—

Keterangan :

+ = Keruh

- = Jernih

P.A = *Pseudomonas aureginosa*

S.A = *Staphylacoccus aureus*

Tabel 3. Hasil pengamatan Uji daya hambat Ekstrak etanol Lumut hati (*Hepaticiopsida sp*) terhadap bakteri *Staphylococcus aureus* dan *Pseudomonas aeruginosa*.

Bakteri	Replikasi	Konsentrasi ekstrak etanol Lumut hati					Jumlah
		6%	4%	2%	1%	0,5%	
		Diameter hambatan (mm)					
(P.A)	1	13,88	11,56	10,56	8,76	0	44,76
	2	13,54	11,48	10,43	8,56	0	44,01
	3	13,45	11,35	10,23	8,36	0	43,39
	x	40,87	34,90	31,22	25,68	0	128,67
	Rata-rata	13,62	11,96	10,40	8,56	0	44,54
(S.A)	1	12,42	11,6	6,6	4,63	0	35,25
	2	11,81	10,54	6,2	4,26	0	32,81
	3	11,81	9,66	6,1	4,2	0	31,77
	x	36,04	31,8	18,9	13,09	0	99,83
	Rata-rata	12,01	10,6	6,3	4,36		33,27

B. Pembahasan

Dalam penelitian ini digunakan bahan alam yaitu Lumut hati (*Hepaticiopsida sp*) untuk diketahui aktivitas antimikrobanya. Di mana mikroba uji yang di gunakan adalah bakteri *Staphylococcus aureus* dan *Pseudomonas aeruginosa*.

Penyarian dari sampel dilakukan dengan cara maserasi, karena maserasi merupakan metode ekstraksi yang paling mudah dan paling sederhana. Metode ini juga bertujuan untuk menghindari terjadinya penguraian senyawa aktif yang terkandung oleh pemanasan karena maserasi merupakan metode ekstraksi cara dingin.

Penelitian yang dilakukan dengan maserasi sebanyak 3 kali penyarian. Hasil dari penyarian yang diperoleh kemudian dipekatkan. Sehingga diperoleh ekstrak 25 gram. Cairan penyari yang digunakan adalah etanol karena etanol bersifat semi polar yang dapat melarutkan senyawa kimia memiliki kepolaran tinggi maupun kepolaran rendah dalam simplisia, sulit ditumbuhi oleh jamur dan bakteri, mudah diuapkan serta harganya murah.

Ekstrak etanol kental yang diperoleh dibebaskan dengan cara ekstrak ditambahkan dengan aquadest kemudian dipanaskan diatas penangas sambil diaduk-aduk dan etanol yang terkandung dalam ekstrak akan menguap bersamaan dengan pemanasan. Tujuan ekstrak dibebaskan dengan etanol agar pada saat dilakukan pengujian adalah benar-benar senyawa dari Lumut Hati (*Hepaticiopsida sp*) yang memiliki aktivitas antibakteri bukan etanolnya yang memberi efek.

Pada penelitian ini dilakukan pengujian uji MIC (Minimum inhibitory concentration) untuk mengetahui apakah ekstrak Lumut hati (*Hepaticiopsida sp*) tersebut memiliki aktivitas antibakteri dan juga untuk mengetahui konsentrasi terendah dari larutan uji yang dapat menghambat dan membunuh pertumbuhan bakteri.

Uji MIC menggunakan metode dilusi cair, parameter yang di gunakan adalah kekeruhan (ada pertumbuhan bakteri) dan kejernihan (tidak ada pertumbuhan bakteri) yang terlihat setelah diinkubasi selama 18-24 jam pada suhu 37⁰ C. Nilai uji MIC ditentukan dengan mengamati kadar terkecil yang masih jernih yang menunjukkan tidak adanya pertumbuhan bakteri. Setelah dilakukan pengujian MIC dilakukan dengan menggunakan bakteri uji *Staphylococcus aureus*. Pada pengujian ini dilakukan 5 konsentrasi sampel ekstrak etanol Lumut hati (*Hepaticiopsida sp*) (% v/v) yaitu : 6%, 4%, 2%, 1%, 0,5, 0,1%. Hasil yang di peroleh pada uji MIC yaitu pada konsentrasi 6%, 4%, 2%, 1%, 0,5% sampel mampu menghambat pertumbuhan *Staphylococcus aureus*. Dan *Pseudomonas aeruginosa*.

Dalam pengujian daya hambat antibakteri di gunakan paper disk dan medium Nutrien Agar (NA). Agar digunakan sebagai bahan pematat yang dapat membeku pada suhu 45⁰ C dan tidak diuraikan oleh mikroorganisme. Medium nutrient agar merupakan medium yang baik sebagai tempat tumbuh bakteri yang di manfaatkan sebagai sumber nutrisi bagi pertumbuhan bakteri. Metode ini bertujuan untuk mengetahui besarnya hambatan yang terbentuk pada medium yang telah diinokulasikan bakteri uji setelah masa inkubasi 1x24 jam. Pada pengamatan di tandai dengan adanya area jernih ini mengindikasikan adanya hambatan pertumbuhan mikroorganisme oleh agen antimikroba. Zona hambat yang terbentuk inilah yang kemudian akan diukur diameternya.

Paperdisk yang telah direndam sampel beberapa saat diletakkan medium, sampel yang terserap pada paper disk akan berdifusi keluar menghambat bakteri

sekitarnya yang ditandai dengan terbentuknya zona bening pada daerah sekitarnya. Pada metode ini dibuat 5 konsentrasi yang berbeda yaitu 6%, 4%, 2%, 1%, dan 0,5%.

Penelitian ini memperlihatkan hasil bahwa ekstrak etanol Lumut hati (*Hepaticiopsida sp*) dengan konsentrasi antara lain 1%, 2%, 4%, 6%, mampu menghambat pertumbuhan bakteri *Staphylacoccus aureus*. Hal ini disebabkan karena adanya senyawa kimia tertentu yang diduga terkandung dalam sampel Lumut hati yang bersifat sebagai antibakteri.

Pada pengujian daya hambat antibakteri dengan menggunakan metode difusi agar. Hasil yang diperoleh pada uji daya hambat yaitu bakteri *Staphylacoccus aureus* dengan diameter hambatan masing-masing konsentrasi 1%, 2%, 4%, 6%, yaitu 6,46 mm; 10,18 mm; 11,74 mm; 13,86 mm sedangkan untuk bakteri *Pseudomonas aeruginosa* dengan diameter hambatan masing-masing konsentrasi 1%, 2%, 4%, 6%, yaitu 4,36mm; 6,3 mm; 10,6 mm; 12,01 mm.

Adanya perbedaan diameter dapat dipengaruhi oleh jenis bakteri uji yang digunakan. Setiap bakteri memiliki kepekaan yang berbeda-beda terhadap sampel dalam hal ini senyawa antibakteri dimana suatu bakteri akan membentuk resistensi dalam dirinya yang merupakan mekanisme alamiah dalam mempertahankan hidupnya (Mutscler, 1991). Selain pengaruh jenis bakteri, perbedaan diameter hambatan juga disebabkan karena konsentrasi sampel dalam hal ini kemampuan dari zat yang diduga terkandung dalam sampel dalam menghambat pertumbuhan bakteri uji.

Hasil analisis statistik rancangan acak kelompok terlihat adanya hubungan antara konsentrasi ekstrak lumut hati dengan aktivitas penghambatan dimana $F_{hitung} > F_{tabel}$ pada taraf kepercayaan 5% dan 1% ini berarti terdapat perbedaan aktivitas penghambatan pada masing-masing konsentrasi sampel.

Dalam mengolah tumbuh-tumbuhan itu manusia bisa menciptakan berbagai macam resep yang bisa mengobati berbagai jenis penyakit, karena tak ada penyakit yang diturunkan oleh Allah swt kecuali memiliki obat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Ekstrak etanol Lumut Hati (*Hepaticiopsida sp*) mempunyai aktivitas penghambatan terhadap bakteri *Staphylococcus aureus* dan *Pseudomonas aeruginosa*
2. Pada konsentrasi minimum 1% ekstrak etanol Lumut hati (*Hepaticiopsida sp*) dapat memberikan aktivita spenghambatan terhadap bakteri *Staphylococcus aureus* dan *Pseudomonas aeruginosa* 1%.
3. Dalam pandangan Islam penggunaan bahan alam atau tanaman yang digunakan sebagai pengobatan sangat dianjurkan, karena Allah SWT. menciptakan alam semesta beserta isinya, maka dari itu sesuai dengan izin Allah SWT tanaman Lumut hati (*Hepaticiopsida sp*) dapat digunakan sebagai pengobatan.

B. Saran

Disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengisolasi senyawa antibakteri pada sampel lumut hati (*Hepaticiopsida sp*) sehingga dapat diperoleh senyawa tunggal yang berefek sebagai antibakteri.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Bukhari Abu" Abd Allah Muhammad bin ismail bin Ibrahim bin Al mujirahnbins bardazbah Aljafii shahih Al bukhari jilid 1-VII, Semarang, Maktabah ba'ah karta toha putra.
- AlAshar, 2002, Bahaya Makanan Haram bagi kesehatan jasmani dan Kesucian rohani, Jakarta Al Mawardi Prima (hal 97-99)
- Anonim, 1986. Sediaan Galenik, DirektoratJendral Pengawasan Obat Dan Makanan, Depkes RI., JakartaHalaman 10,16,,25,26.
- Brown, Robin. 2002. *Dermatologi*. Edisi Kedelapan. Erlangga : Jakarta
- Djide,M. N. 2003, Mikrobiologi Farmasi. Fakultas Matematika dan ilmu pengetahuan alam, Universal Hasanuddin , Makassar
- Djide,M.N, Sartini.2008. *Dasar-dasar Mikrobiologi Farmasi*. Makassar : Lembaga Penerbit Universitas Hasanuddin
- Departemen Agama RI. 2005. *Al-Qur"an dan Terjemahnya*. Bandung: PT Syaamil Cipta Media.
- Departemen Agama RI. 2006. *Al-Qur"an dan Terjemahnya*. Bandung: PT Syaamil Cipta Media.
- Ilhan S, Sarvaroulu S, Colak F, Iscen CF, Erderngil ZF. 2006 . *Antimicrobialactivity of palustrieella commutate (Hedw) ochyra extracts (Brophyta)* J Biol 30. 149-152.
- Garrity GM, Bell JA, Lilburn TG., Bergeys.2004. *Manual of Determinative Bacteriology*, Eight Edition The Williams.
- Ganiswara, 1995. *Farmakologi dan Terapi*, Edisi IV Bagian Farmakologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta, Halaman 571,572,573.
- Hariana, Arief, seri 1. 2004. *Tumbuhan Obat dan Khasiatnya* penebar Swadaya, Jakarta
- Harmita, 2008. Kepekaan Terhadap Antibiotik.: Dalam Buku ajar Analisis Hayati, Edisi 3 EGC, Jakarta.
- Jawest, Melnick dan alderberg 1996 *Mikrobiologi Kedokteran* edisi XX (Terjemahan) Buku Kedokteran EGC.
- Jawetz, Melnick, and adelberg. 2001 : *Mikrobiologi Kedokteran* ; Edisi 1 ; Salemba Medika, Jakarta.

- Katno, 2002. *Tingkat manfaat dan keamanan tanaman obat dan obat tradisional*. Fakultas farmasi. Universitas Gadhja Mada
- Merck.1994. *Mikrobiologi Manual* , pt E merck Germany, Halaman 153
- Pelczar, m.j.jr dan chan 2008 *Dasar-Dasar Mikrobiologi*. Universitas Indonesia press Jakarta.
- Pringgoutomo, dkk. 2002. *Buku Ajar Patologi 1 (Umum)*. Sagung Seto : Jakarta
- Pratiwi, Sylvia T. 2008. *Mikrobiologi Farmasi*. Penerbit Erlangga : Jakarta
- Rahman, MD. Anisur. 2007. *Einstensi Aja Baca Qur'an, 43 Keajaiban Ilmu Pengetahuan yang Terkandung dalam Al-Qur'an*. Balqist : Yogyakarta
- Shihab, Quraish M. 2002. *Tafsir Al-Misbah. Pesan, kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 12*. Lentera Hati. Jakarta
- Shihab Quraish. 2002. *Tafsir Al-misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 7*. Jakarta : Lentera Hati.
- Shihab Quraish. 2002. *Tafsir Al-misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 8*. Jakarta : Lentera Hati.
- Syahrahman, 1994. *Buku Ajar Mukrobiologi Kedokteran* . Edisi Revisi press rupa aksara, Jakarta. Halaman 103 – 104
- Tjitrosoepomo,Gembong, 2003, Taksonomi Tumbuhan. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Wijayakusuma H. 1996 *Tanaman bekhasiat obat Indonesia, JilidI*, Pustaka Kartini. Halaman 114-115
- Wirjowidigdo, 1993 *Penuntun Praktikum Fitokimia* Laboratorium Fitokimia Fakultas Matematika dan ilmu pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin Ujung Pandang hal 23-28.
- Zuhud, 2001, *Aktivitas antimikroba ekstrak kedaung (Parkia roxburghii G Don) terhadap bakteri pathogen*, Teknol & Indusri Pangan, XII(1): hal. 6-12
- Zulkoni, Akhsin. 2011. *Parasitologi*. Nuha Medika : Yogyakarta

LAMPIRAN


Lampiran 1. Gambar Tanaman Lumut Hati (*Hepaticopsida sp*)




Gambar 1. Tanaman Lumut Hati

Keterangan :


1. Batang (*Caulis*)
2. Daun (*Folium*)
3. Bunga (*Flos*)

Lampiran 2. Ekstraksi Lumut Hati (*Hepaticiopsida sp*)

Gambar 2. Skema Kerja Ekstraksi Lumut Hati (*Hepaticiopsida sp*) dengan metode Maserasi

Lampiran 3. Skema kerja penyiapan bakteri uji**Gambar 3. Skema kerja peyiapan bakteri uji**

Lampiran 4. Uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol Lumut Hati (*Hepaticiopsida sp*) terhadap bakteri *Pseudomonas aeruginosa* dan *Staphylococcus aureus*



Gambar 4. Skema kerja uji aktivitas Antibakteri Ekstrak etanol lumut hati (*Hepaticiopsida sp*) terhadap bakteri *Pseudomonas aeruginosa* dan *staphylococcus aureus*

Lampiran 5. Gambar uji MIC (Minimum Inhibitory Concentration) ekstrak etanol lumut hati (Hepaticiopsida sp) terhadap bakteri *Pseudomonas aeruginosa* dan *Staphylococcus aureus*

1. *Pseudomonas aeruginosa*

Konsentrasi 0,1% , 0,5%, 1%, 2%, 4%, dan 6%




2. *staphylococcus aureus*

Konsentrasi 0,1% , 0,5%, 1%, 2%, 4%, dan 6%




Lampiran 7. Gambar pengamatan zona hambat


- 1) Hasil pengamatan zona hambat ekstrak etanol lumut hati (*Hepaticiopsida* sp) terhadap bakteri *Pseudomonas aeruginosa* pada konsentrasi 0,5%, 1% dan 2%




- 2) Hasil pengamatan zona hambat ekstrak etanol lumut hati (*Hepaticiopsida* sp) terhadap bakteri *Pseudomonas aeruginosa* pada konsentrasi 4%, 6%, dan kontrol



- a. 1) Hasil pengamatan zona hambat ekstrak etanol lumut hati (*Hepaticiopsida* sp) terhadap bakteri *Staphylococcus aureus* pada konsentrasi 0,5%, 1% dan 2%



- 2) Hasil pengamatan zona hambat ekstrak etanol lumut hati (*Hepaticiopsida* sp) terhadap bakteri *Staphylococcus aureus* pada konsentrasi 4%, 6%, dan kontrol



Lampiran 5. Perhitungan daerah hambat ekstrak etanol lumut hati (*Hepaticiopsida sp*) dengan metode RAK (Rancangan acak kelompok)

Tabel 4. Hasil pengamatan uji daya hambat ekstrak etanol Lumut hati (*Hepaticiopsida sp*) terhadap bakteri *Staphylococcus aureus* dan *Pseudomonas aeruginosa*.

Bakteri	Diameter Hambatan (mm)					Jumlah	Rata-rata
	6%	4%	2%	1%	0,5%		
PA	13,62	11,96	10,40	8,56	0	44,54	11,13
SA	12,01	10,6	6,3	4,36	0	33,27	8,32
Jumlah	25,63	22,56	16,70	12,92	0	75,49	9,73

$$\text{Faktor Koreksi (FK)} = \frac{T_i^2}{K} = \frac{(7,4)^2}{3 \times 4} = 474,89$$

$$\begin{aligned} \text{Jumlah Kuadrat Total (JKT)} &= T(Y_{ij}^2) - F \\ &= [(13,62)^2 + (12,01)^2 + (11,96)^2 + (10,6)^2 + (10,40)^2 + \\ &\quad (6,3)^2 + (8,56)^2 + (4,36)^2] - 474,89 \\ &= 825,40 - 474,89 \\ &= 350,51 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Jumlah Kuadrat Kelompok (JKK)} &= \frac{T_i^2}{t} - FK \\ &= \frac{(4,5)^2 + (3,2)^2}{4} - 474,89 \\ &= 770,67 - 474,89 \\ &= 295,2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP)} &= \frac{T_j^2}{k} - FK \\ &= \frac{(2,6)^2 + (2,5)^2 + (1,7)^2 + (1,9)^2}{3} - 474,89 \\ &= 528,2 - 474,89 \\ &= 53,3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Jumlah Kuadrat Galat (JKG)} &= \text{JKT} - \text{JKK} - \text{JKP} \\ &= 350,51 - 295,2 - 53,3 \\ &= 2,01 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Derajat Bebas Total (DBT)} &= kt - 1 \\ &= (3 \times 4) - 1 \\ &= 11 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Derajat Bebas Kelompok (DBK)} &= K - 1 \\ &= 2 - 1 \\ &= 1\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Derajat Bebas Perlakuan (DBP)} &= t - 1 \\ &= 3 - 1 \\ &= 2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Derajat Bebas Galat (DBG)} &= DBT - DBK - DBP \\ &= 11 - 1 - 2 \\ &= 8\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Kuadrat Tengah Kelompok} &= \frac{J_u \quad K \quad K_i}{D \quad B \quad K_i} \\ &= \frac{2,2}{1} \\ &= 295,2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Kuadrat Tengah Perlakuan} &= \frac{J_u \quad K \quad P}{D \quad B \quad P} \\ &= \frac{5,3}{2} \\ &= 26,6\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Kuadrat Tengah Galat} &= \frac{J_u \quad K \quad G}{D \quad B \quad G} \\ &= \frac{2,0}{8} \\ &= 0,25\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{F Hitung Kelompok} &= \frac{K \quad T \quad K_i}{K \quad T \quad G} \\ &= \frac{2,2}{0,2} \\ &= 1.180,8\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{F Hitung Perlakuan} &= \frac{K \quad T \quad P}{K \quad T \quad G} \\ &= \frac{2,6}{0,2} \\ &= 106,4\end{aligned}$$

Tabel 5. Analisis Varians aktivitas penghambatan ekstrak etanol Lumut hati (*Hepaticiopsida sp*) terhadap bakteri *Staphylococcus aureus* dan *Pseudomonas aeruginosa*

Sumber Keseragaman	Derajat Bebas	Jumlah Kuadrat	Kuadrat Tengah	F Hitung	F Tabel	
					5%	1%
Kelompok	1	295,2	295,2	1.1180,8*	238,9	5.981
Perlakuan	2	53,3	26,6	106,4*	19,37	99,37
Galat	8	2,01	0,25			
Total	11	350,5				

Keterangan :

** :sangat signifikan

* : signifikan

Ns: tidak signifikan

Kesimpulan:

F hitung > F tabel pada taraf kepercayaan 99%, artinya semua perlakuan berbeda dengan yang lainnya (sangat signifikan).

$$\begin{aligned} \text{Koefisien Keragaman (KK)} &= \frac{\sqrt{K}}{R - r_1 - r_2} \times 100\% \\ &= \frac{\sqrt{0,2}}{9,7} \times 100\% \\ &= 5,1\% \end{aligned}$$

Analisis Tukey BNJ (Beda Nyata Jujur)

1. Hitung Nilai Tukey BNJ () perlakuan:

Untuk Tabel 5%

$$\begin{aligned} \omega &= q\alpha (p, v) \sqrt{\frac{K}{t}} \\ &= q0,05 (2,8) \sqrt{\frac{0,2}{3}} \\ &= 13,03 \times \sqrt{\frac{0,2}{3}} \\ &= 2,08 \text{ (BNJ 0,05)} \end{aligned}$$

Untuk Tabel 1%

$$\omega = q\alpha (p, v) \sqrt{\frac{K}{t}}$$

$$\begin{aligned}
 &= q_{0,01} (2,8) \sqrt{\frac{0,2}{5}} \\
 &= 9,04 \times \sqrt{\frac{0,2}{5}} \\
 &= 1,45 \text{ (BNJ } \mathbf{0,01})
 \end{aligned}$$

Tabel 6. Analisis Tukey BNJ aktivitas penghambatan perlakuan ekstrak etanol Lumut hati (*Hepaticiopsida sp*) terhadap bakteri *Pseudomonas aeruginosa* dan *Staphylococcus aureus*.

Bakteri	Perlakuan	Rata-rata	Perlakuan				
			1%	2%	4%	6%	0,5%
<i>P.Aeruginosa</i>	0,5%	0	0				
	1%	8,56	1,84*	0			
	2%	10,40	1,56*	0,28Ns	0		
	4%	11,96	1,66*	0,10Ns	0,18Ns	0	0
	6%	13,62	5,06**	3,4**	3,3**	1,5*	0
<i>S.aureus</i>	0,5%	0	0				
	1%	4,36	1,4Ns	0			
	2%	6,3	2,0*	0,6Ns	0		
	4%	10,6	3,4**	1,4Ns	2,9**	0	0
	6%	12,01	7,7**	4,3**	3,7**	0,8Ns	0

BNJ 0,05 = 2,08

BNJ 0,01 = 1,45

Keterangan :

** :sangat signifikan

* : signifikan
Ns: tidak signifikan

2. Hitung Nilai Tukey BNJ () kelompok:

Untuk Tabel 5%

$$\begin{aligned}\omega &= q\alpha (k, v) \sqrt{\frac{K}{k}} \\ &= q0,05 (2,8) \sqrt{\frac{6,2}{2}} \\ &= 13,03 \times \sqrt{\frac{6,2}{2}} \\ &= 3,25 \text{ (BNJ 0,05)}\end{aligned}$$

Untuk Tabel 1%

$$\begin{aligned}\omega &= q\alpha (k, v) \sqrt{\frac{K}{k}} \\ &= q0,01 (2,8) \sqrt{\frac{6,2}{2}} \\ &= 9,04 \times \sqrt{\frac{6,2}{2}} \\ &= 2,26 \text{ (BNJ 0,01)}\end{aligned}$$

Tabel 7. Analisis Tukey BNJ aktivitas penghambatan ekstrak etanol daun mahkota ekstrak Lumut Hati (*Hepaticiopsida sp*) terhadap bakteri *Pseudomonas aeruginosa* dan *Staphylococcus aureus*.

Bakteri	Rata-rata	Bakteri	
		P.Aeruginosa	S. Aureus
<i>P.Aeruginosa</i>	11,13	0	
<i>S.aureus</i>	8,32	2,81*	0

BNJ 0,05 = 3,25

BNJ 0,01 = 2,26

Keterangan :

** :sangat signifikan

* : signifikan

Ns: tidak signifikan

BIOGRAFI



Asriani Eka Putri biasa dipanggil Eka, lahir di Ujung Pandang pada tanggal 26 April 1992. Kedua orang tua tercinta ayahanda Nursyam tarekat kimin, S. Sos, MM dan Ibunda Asniati Asyikin, SE adalah motivator terbaik bagi penulis. Anak Pertama dari Tiga bersaudara mengawali jenjang pendidikan pertamanya di TK Aisyiah bustanul athfal pada tahun 1996 dan pada tahun 1997 melanjutkan sekolah dasar di SD.Inpres Bertingkat mamajang 2 Makassar. Pada tahun 2003, melanjutkan pendidikan di SMP. Pesantren Modern Immim Putri Pangkep. dan menduduki bangku pendidikan menengah atas diSMF Farmasi Yamasi Makassar Tahun 2009 melalui Tes SNMPTN, penulis terdaftar sebagai mahasiswi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan. Dan pada tahun 2014 berhasil menyandang gelar Sarjana dalam Fakultas Ilmu Kesehatan, jurusan Farmasi.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Akan tetapi, besar harapan penyusun kiranya dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan. Amin

Wassalam. Wr. Wb.

ABSTRAK

Nama Penulis : Asriani Eka Putri

NIM : 70100109017

Jurusan : Farmasi

Judul Skripsi : Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Lumut Hati
(*Hepaticiopsida sp*) Terhadap Bakteri *Pseudomonas aeruginosa*
dan *Staphylococcus aureus*

Telah dilakukan penelitian untuk mengetahui uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol Lumut Hati (*Hepaticiopsida sp*) terhadap bakteri *Pseudomonas aeruginosa* dan *Staphylococcus aureus* dengan metode difusi agar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas ekstrak Lumut Hati (*Hepaticiopsida sp*) yang dapat dijadikan sebagai data ilmiah yang memperkuat manfaat Lumut Hati (*Hepaticiopsida sp*). Dilakukan uji MIC (*Minimum inhibitory concentration*) untuk kedua bakteri dengan menggunakan metode difusi cair dan didapatkan hasil dengan konsentrasi 0,5%, 1%, 2%, 4%, dan 6% . Setelah itu uji daya hambat menggunakan metode difusi agar (*paper disc*) didapatkan hasil pada konsentrasi 1%, 2%, 4% dan 6%. Pada uji daya hambat menunjukkan hasil bahwa semakin besar konsentrasi yang digunakan maka semakin besar pula diameter hambatan yang dihasilkan.

Dapat disimpulkan bahwa ekstrak Lumut Hati (*Hepaticiopsida sp*) memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri *Staphylococcus aureus* dan *Pseudomonas aeruginosa*.

Kata Kunci : Lumut hati, Bakteri *Staphylococcus aureus* dan *Pseudomonas aeruginosa*, Konsentrasi

ABSTRAC

Name : Asriani Eka Putri

Reg. Number : 70100109017

Departement : Farmasi

Title of Thesis : Antibacterial activity of ethanol extract of Livertwort
(*Hepaticiopsida sp*) against bacteria *Pseudomonas aeruginosa*
and *Staphylococcus aureus*

A study testing the antibacterial activity of ethanol extract of Livertwort (*Hepaticiopsida sp*) against the bacteria *Pseudomonas aeruginosa* and *Staphylococcus aureus* agar diffusion metod. Purpose of this study was to determine the activity of the liver moss exctract that can be made as scientific data that reinforce the benefits of liveworts. MIC (*Minimum inhibitory concentration*) test bacteria to both using diffusion and in order to get result with concentration 0,5%, 1%, 2%, 4%, dan 6%. Afterwards in the inhibition test using agar diffusion method (paper disc) is obtained at a concentration 1%, 2%, 4% dan 6%. The inhibition test result show that the greater the concentration that is in use, the greater the diameter of the barriers that produced

It can be concluded that the ethanol extract of leaves of Livertwort (*Hepaticiopsida sp*) has antibacterial activity against *Staphylococcus aureus* and *Pseudomonas aeruginosa*.

Key word : Livewort, Bacterial *Staphylococcus aureus* and *Pseudomonas aeruginosa*, concentration

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Tanaman Lumut Hati (<i>Hepaticiopsida sp</i>)	48
2. Skema kerja ekstraksi Lumut Hati (<i>Hepaticiopsida sp</i>)	49
3. Skema kerja penyiapan bakteri uji	50
4. Skema kerja uji aktivitas ekstrak etanol Lumut Hati (<i>Hepaticiopsida sp</i>)	51
5. Hasil uji Minimum inhibitory concentration (MIC) ekstrak etanol Lumut Hati (<i>Hepaticiopsida sp</i>).....	52
6. Hasil uji Aktivitas ekstrak etanol Lumut Hati (<i>Hepaticiopsida sp</i>) terhadap bakteri <i>Staphylococcus aureus</i> dan <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	53

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Tabel ekstraksi Lumut hati (<i>Hepaticiopsida sp</i>).....	39
2. Uji minimum inhibitory concentration (MIC) antibakteri ekstrak etanol lumut hati (<i>Hepaticiopsida sp</i>)	39
3. Pengamatan Uji daya hambat Ekstrak etanol Lumut hati (<i>Hepaticiopsida sp</i>).	40
4. Analisis Varians daerah hambat ekstrak etanol lumut hati (<i>Hepaticiopsida sp</i>).....	55
5. Analisis Hasil uji beda nyata jujur daerah hambat ekstrak lumut hati (<i>Hepaticiopsida sp</i>).....	57