

**PENGARUH LAMA PENYIMPANAN TERHADAP STABILITAS
FISIK DAN MIKROBIOLOGI
SARABBA EFERVESEN**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi
Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar**

Oleh

**WAHYUNA
NIM. 70100107038**

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2011**

ABSTRAK

Nama Penyusun : **WAHYUNA**
NIM : 70100107038
Judul Skripsi : Pengaruh Lama Penyimpanan Terhadap Stabilitas Fisik dan Mikrobiologi *Sarabba* Efervesen

Telah dilakukan penelitian pengaruh lama penyimpanan terhadap stabilitas fisik dan mikrobiologi *sarabba* efervesen. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan pengaruh lama penyimpanan terhadap sifat fisik dan mikrobiologi dari sediaan *sarabba* efervesen. Pengujian stabilitas fisik meliputi, uji kandungan lembab, uji reaksi efervesen dan uji hedonik sedangkan pengujian mikrobiologi meliputi uji ALT bakteri, uji *Escherichia coli*, uji *Salmonella typhi* dan uji *Staphylococcus aureus*.

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa sediaan *sarabba* efervesen selama penyimpanan 2 bulan stabil secara fisik karena tidak mengalami perubahan kandungan lembab dan reaksi Efervesen. Uji mikrobiologi menunjukkan nilai ALT sebesar $0,7 \times 10^2$ CFU/g dan memenuhi standar yang dipersyaratkan oleh Departemen Kesehatan RI pada tahun 1992, dan bebas dari mikroba patogen seperti, *Salmonella typhi*, *Escherichia coli* dan *Staphylococcus aureus*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, taufiq hidayah dan Inayah-Nya sehingga skripsi dengan judul :

“Pengaruh Lama Penyimpanan Terhadap Stabilitas Fisik dan Mikrobiologi *Sarabba* Efervesen “ dapat diselesaikan.

Dengan segala kerendahan hati, melalui kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada :

1. Orang tua tercinta, ayahanda Sukardi dan ibunda Halimatang yang telah membesarkan dan mendidik saya. Saya mutlak berterima kasih dan sekaligus meminta maaf kepada beliau berdua karena hanya dengan dukungan beliau berdua saya dapat melanjutkan pendidikan saya hingga perguruan tinggi. Saya menyadari, tanpa beliau berdua, mustahil saya bisa menjadi seperti sekarang. Pengorbanan serta kasih sayang yang tak terhitung dan tak terhingga banyaknya. Adikku Nurnaini, Nuralim dan Samsul Bahri serta keluarga besarku yang juga memberiku dukungan serta doa restu.
2. Bapak Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT., MS selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Bapak Drs. H. Syamsul Bahri, M.Si selaku Pembantu Dekan 2 dan Bapak Drs. Supardin, M. Hi selaku Pembantu Dekan 3 Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar serta para staf pada fakultas kesehatan.
4. Ibu Gemy Nastity Handayany S.Si., M.Si., Apt selaku Ketua Jurusan Farmasi UIN Alauddin Makassar, Bapak, Ibu Dosen, serta Seluruh Staf Jurusan Farmasi

atas curahan ilmu pengetahuan dan segala bantuan yang diberikan pada penulis sejak menempuh pendidikan farmasi, melaksanakan pendidikan hingga selesainya skripsi ini.

5. Ibu Isriany Ismail S.Si., M.Si., Apt. Selaku Pembimbing pertama dan Ibu Gemy Nastity handayani S.Si., M.Si., Apt. selaku pembimbing kedua yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis sejak awal perencanaan penelitian sampai selesainya penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Dra. Hj. Faridha Yenny nonci. Apt. Selaku Kepala Laboratorium Terpadu Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar sekaligus selaku penguji kompetensi yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam mengoreksi apa-apa yang perlu diperbaiki pada skripsi penulis.
7. Bapak Dr. Abdullah, S.Ag., M.Ag. Selaku Penguji Agama yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam mengoreksi apa-apa yang perlu diperbaiki pada skripsi penulis.
8. Ibu Haeria, S.Si, M.Si selaku penasehat akademik yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan.
9. Terima kasih untuk laboran Laboratorium Farmasi Fakultas Ilmu kesehatan UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian penelitian dan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat, baik itu bagi penulis pribadi, dunia Farmasi, dunia pendidikan dan masyarakat pada umumnya. Amiin...

Wabillahitaufiq walhidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makassar, 8 Agustus 2011

WAHYUNA
NIM. 70100107038



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
A. <i>Sarabba</i>	5
1. Jahe	5
2. Sereh	8
3. Kelapa.....	10
B. Granul efervesen.....	12
C. Uji stabilitas fisik	16
D. Uji mikrobiologi sediaan obat tradisional	17
E. Tinjauan islam tentang penggunaan minuman <i>sarabba</i> bagi kesehatan	20
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Alat dan Bahan Penelitian	28


B. Prosedur kerja.....	28
1. Pengambilan Sampel	28
2. Pengolahan Sampel	29
3. Formulasi granul.....	29
4. Pengujian <i>sarabba</i> efervesen	29
A. Stabilitas fisik	30
1. Uji kandungan lembab.....	30
2. Uji reaksi efervesen	30
3. Uji hedonik	30
B. Pengujian mikrobiologi	31
1. Pembuatan medium	31
2. Pengujian Angka lempeng total.....	33
3. Uji <i>Escherichia coli</i>	34
4. Uji <i>Salmonella typhi</i>	35
5. Uji <i>Staphylococcus aureus</i>	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	37
A. Hasil Penelitian.....	37
1. Hasil pengujian stabilitas fisik granul	37
2. Hasil pengujian mikrobiologi	39
B. Pembahasan	41
BAB V PENUTUP.....	47
A. Kesimpulan.....	47
B. Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	48
LAMPIRAN.....	50

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Hasil analisis kandungan lembab	37
2. Hasil analisis reaksi efervesen	37
3. Hasil analisis hedonik	38
4. Hasil analisis angka lempeng total bakteri.....	39
5. Hasil analisis <i>Escherichia coli</i>	39
6. Hasil analisis <i>Salmonella typhi</i>	40
7. Hasil analisis <i>Staphylococcus aureus</i>	40
8. Hasil analisis kandungan lembab	61
9. Analisis varians	62
10. Hasil analisis reaksi efervesen	63
11. Analisis varians	64

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
1. Skema kerja pembuatan <i>sarabba</i>	50
2. Skema kerja pembuatan granul efervesen.....	51
3. Skema kerja pengujian Angka Lempeng Total Bakteri	52
4. Skema kerja Pengujian <i>Escherichia coli</i>	53
5. Skema kerja Pengujian <i>Salmonella typhi</i>	54
6. Skema kerja Pengujian <i>Staphylococcus aureus</i>	55



DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Halaman
1. Pembuatan <i>sarabba</i>	50
2. Pembuatan granul efervesen	51
3. Pengujian Angka Lempeng Total Bakteri.....	52
4. Pengujian <i>Escherichia coli</i>	53
5. Pengujian <i>Salmonella typhi</i>	54
6. Pengujian <i>Staphylococcus aureus</i>	55
7. Komposisi medium	56
8. Angket penilaian uji hedonik	59
9. Rekapitulasi hasil uji hedonik.....	60
10. Uji kandungan lembab	61
11. Uji reaksi efervesen.....	63
12. Jumlah Koloni ALT Bakteri.....	65
13. Daftar ringkasan	66
14. Bakteri pada medium NA bulan ke- 0.....	67
15. Bakteri pada medium NA bulan ke I.....	68
16. Bakteri pada medium NA bulan ke II	69
17. Bakteri <i>Escherichia coli</i> , <i>Salmonella typhi</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> bulan ke- 0.....	70
18. Bakteri <i>Escherichia coli</i> , <i>Salmonella typhi</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> bulan ke I.....	72
19. Bakteri <i>Escherichia coli</i> , <i>Salmonella typhi</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> bulan ke II	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Minuman kesehatan adalah segala sesuatu yang dikonsumsi selain dapat menghilangkan rasa haus dan dahaga juga mempunyai efek menguntungkan terhadap kesehatan tubuh manusia. Efek kesehatan yang dimaksud adalah dapat mencegah atau mengobati berbagai macam penyakit, atau dapat menjaga kesehatan secara prima apabila dikonsumsi secara rutin. Adapun beberapa minuman yang mempunyai efek menguntungkan untuk kesehatan antara lain minuman isotonik, panjare isotonik, velva fruit, kombucha tea, cidear jahe (buah), rosella drink dan *sarabba* yang merupakan sediaan instan. Sediaan instan adalah suatu sediaan yang siap dikonsumsi (siap saji) dengan penambahan air hangat atau air panas dan penambahan satu atau lebih bahan tambahan, sehingga sediaan instan lebih disukai oleh masyarakat dan rasanya juga lebih enak. Sediaan instan menghasilkan produk yang dapat larut dalam air tanpa pembentukan gumpalan, mudah dibasahi dan cepat larut. Sediaan instan berlangsung melalui proses berulang serbuk yang diperoleh dan diakhiri dengan pengeringan. Pembuatan sediaan instan dilakukan dengan penambahan bahan tambahan.

Sarabba adalah minuman penghangat badan yang sangat dikenal dikalangan masyarakat Bugis-Makassar. Minuman ini dibuat dengan

menggunakan jahe sebagai bahan utamanya serta sereh, kayu manis, santan, gula merah sebagai bahan untuk penambah cita rasa. Minuman ini begitu disukai karena dapat memberikan efek kesegaran dan kehangatan bagi tubuh sehingga sangat cocok dinikmati pada malam hari atau di daerah yang udaranya dingin (Fauziah, M. 2010).

Sarabba ini telah diformulasi dalam bentuk sediaan granul efervesen dengan konsentrasi Asam Sitrat 0,7 gram, Asam Tartrat 0,475 gram, dan Natrium Bikarbonat 1,42 gram (Fauziah, M. 2010). Granul efervesen memiliki keunggulan yaitu penyiapan larutan dalam waktu seketika yang mengandung dosis obat yang tepat. Menghasilkan rasa yang enak karena adanya karbonat yang membantu memperbaiki rasa beberapa obat tertentu. Mudah untuk digunakan dan nyaman. Pada pemakaian sediaan efervesen timbul kesukaran untuk menghasilkan produk yang stabil secara fisika dan kimia. Adanya kandungan lembab selama produksi dan penyimpanan dapat menyebabkan reaksi efervesen yang prematur dan perubahan warna, bau dan rasa pada sediaan yang dihasilkan (Ansel. 1989).

Setiap sediaan makanan dan minuman mensyaratkan batas angka bakteri tertentu yang masih dianggap aman untuk dikonsumsi, menurut Prosedur operasional baku pengujian mikrobiologi Pusat pemeriksaan obat dan makanan Direktorat Jenderal Pengawasan obat dan makanan Departemen Kesehatan RI menetapkan batas angka lempeng total yaitu $< 10^6$ koloni per g untuk bakteri. Hasil penghitungan angka lempeng total bakteri dibandingkan dengan standar yang ditetapkan.

Angka lempeng total harus ditekan sekecil mungkin. Meskipun mikroba tersebut tidak membahayakan bagi kesehatan tapi kadang-kadang karena pengaruh sesuatu dapat menjadi mikroba yang membahayakan. Yang jelas angka lempeng total tersebut dapat digunakan sebagai petunjuk sampai tingkat berapa industri tersebut melaksanakan cara pembuatan obat tradisional yang baik. Makin kecil angka lempeng total bagi setiap produk, makin tinggi nilai pengetrapan CPOTB di industri tersebut. Jumlah bakteri yang besar, menunjukkan kemunduran dari mutu obat tradisional. Bakteri akan berkembang biak bila tempat tumbuhnya cocok untuk pertumbuhan. Cemar mikroba tersebut dapat berasal dari bahan baku yang digunakan, peralatan, ruangan saat produksi atau selama penyimpanan.

Mikroba patogen merupakan semua mikroba yang dapat menyebabkan orang menjadi sakit, bila kemasukan mikroba tersebut. Obat tradisional untuk penggunaan obat dalam perlu diwaspadai adanya mikroba seperti: *Salmonella typhi*, *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*. Obat tradisional untuk penggunaan obat luar perlu diwaspadai adanya mikroba seperti: *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Candida albicans*, *Clostridium perfringens*, *Bacillus anthracis*. Kadar aflatoxin tidak boleh lebih dari persyaratan yang ditetapkan. Aflatoxin selain meracuni organ tubuh bersifat karsinogenik.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dilakukan penelitian untuk melihat pengaruh lama penyimpanan terhadap stabilitas dan mikrobiologi sediaan sarabba efervesen.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh lama penyimpanan terhadap stabilitas fisik dan mikrobiologi sediaan *sarabba* efervesen?
2. Apakah cemaran mikroba yang terdapat pada sediaan *sarabba* efervesen masih memenuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI)?
3. Bagaimana tinjauan Islam mengenai minuman yang sehat dan halal?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran stabilitas fisik dan keamanan sediaan *sarabba* efervesen terhadap cemaran mikroba.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh penyimpanan terhadap sediaan *sarabba* efervesen yang merupakan minuman tradisional khas masyarakat Sulawesi Selatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sarabba

Sarabba adalah minuman penghangat badan yang sangat dikenal dikalangan masyarakat Bugis-Makassar. Dikatakan sebagai minuman penghangat badan karena komposisi bahan yang digunakan terdiri dari jahe (*Zingiberis officinale*), serih (*Cymbopogon nardus*), serta lada yang dapat memberi rasa hangat pada tubuh ketika diminum. Selain bahan-bahan tersebut adapun bahan-bahan lain yang digunakan dalam pembuatan *sarabba* seperti santan daging kelapa (*Cocos nucifera*), gula merah (gula palm), serta kayu manis (Fauziah, M. 2010).

1. Jahe

Tanaman jahe termasuk dalam suku zingiberis atau temu-temuan. Nama botani jahe diberikan oleh William Roxburgh dari bahasa Yunani yaitu Zingiberi, dari bahasa Sansekerta yaitu Singaberi (Soenanto, H. 2001. 5).

Jahe mulanya berasal dari asia Pasifik yang tersebar dari India sampai Cina. Oleh karena itu kedua bangsa ini disebut-sebut sebagai bangsa yang pertama kali memanfaatkan jahe terutama sebagai minuman, bumbu masak dan obat tradisional (Santoso. 1991. 11).

a) Klasifikasi

Dunia	: Plantae
Divisi	: Spermatophyta
Anak divisi	: Angiospermae

Kelas : Monocotyledonae
Bangsa : Zingiberales
Suku : Zingiberaceae
Marga : Zingiber
Jenis : *Zingiber officinale* Rosc (Senanto,H. 2001.5).

b) Morfologi

Jahe termasuk tanaman tahunan. Berakar serabut yang menyatu dengan rimpang. Rimpang sesungguhnya adalah batang beserta daunnya yang terdapat didalam tanah, bercabang-cabang dan tumbuh mendatar. Rimpang disamping sebagai alat perkembangbiakan juga merupakan tempat penimbunan zat-zat makanan (Santoso. 1991.14-16).

Tanaman jahe berdaun tunggal berbentuk lonjong dan ujungnya lancip, berselang-seling teratur. Panjang daun sekitar 15-23 cm dan lebar 0,8-2,5 cm. Panjang tangkai daun 2-4 mm namun tidak berbulu. Warna permukaan daun bagian atas lebih tua daripada bagian bawah. Bila daun mati maka pangkal tangkai tetap hidup dalam tanah, lalu bertunas dan menjadi rimpang baru (Suprapti.,2003.13).

Bunga tumbuh dari rimpangnya, terpisah dari daun atau batang semunya. Bunganya majemuk, berupa malai yang tersembul dari permukaan tanah, berbentuk tongkat atau kadang-kadang bulat telur. Mahkota bunga berbentuk tabung, helainya agak sempit dan berwarna

kuning kehijauan. Kelapa sari berwarna ungu berukuran panjang 9 mm, sedang tangkai putihnya berjumlah dua buah (Heyne. 1987. 13).

c) Kandungan kimia

Jahe mengandung minyak atsiri 1-2%, dan 5-8% resin, pati, dan lender. Rasa pedas jahe disebabkan oleh adanya gingerol, suatu zat berbentuk cair yang terdiri atas homolog fenol. Komponen lain adalah gingediol, metilgingediol, gingediasetat, dan metilgingediasetat (Wiryowidogadi. 2005).

d) Manfaat Jahe

Sejak dulu jahe dipergunakan sebagai obat, atau bumbu dapur dan aneka keperluan lainnya. Jahe dapat merangsang kelenjar pencernaan, baik untuk membangkitkan nafsu makan.

Penelitian modern telah membuktikan secara ilmiah berbagai manfaat jahe, antara lain: Menurunkan tekanan darah. Hal ini karena jahe merangsang pelepasan hormon adrenalin dan memperlebar pembuluh darah, akibatnya darah mengalir lebih cepat dan lancar dan memperingan kerja jantung memompa darah, Membantu pencernaan, karena jahe mengandung enzim pencernaan yaitu protease dan lipase, yang masing-masing mencerna protein dan lemak, Glingerol pada jahe bersifat antikoagulan, yaitu mencegah penggumpalan darah. Jadi mencegah tersumbatnya pembuluh darah, penyebab utama stroke, dan serangan jantung. Glingerol juga diduga membantu menurunkan kadar kolesterol, Mencegah mual, karena jahe

mampu memblok serotonin, yaitu senyawa kimia yang dapat menyebabkan perut berkontraksi, sehingga timbul rasa mual. Termasuk mual akibat mabok perjalanan, Membuat lambung menjadi nyaman, meringankan kram perut dan membantu mengeluarkan angin, Jahe juga mengandung antioksidan yang membantu menetralkan efek merusak yang disebabkan oleh radikal bebas didalam tubuh (Koswara.2009).

2. Sereh

Tanaman sereh termasuk golongan rumput-rumputan yang disebut *Andropogon nardus* atau *Cymbopogon nardus*.

a. Klasifikasi

Dunia	: Plantae
Divisi	: Spermatophyta
Anak divisi	: Angiospermae
Kelas	: Monocotyledonae
Bangsa	: Poales
Suku	: Poleaceae
Marga	: <i>Cymbopogon</i>
Jenis	: <i>Cymbopogon nardus</i> L (Yuniarti.2001.368)

b. Morfologi

Tanaman sereh termasuk golongan rumput-rumput tegak, menahun, perakarannya sangat dalam dan kuat. Batangnya tegak atau condong, membentuk rumpun, pendek, massif, bulat (silindris), gundul seringkali

dibawah buku-bukunya berlilin. Penampang lintang batang berwarna merah. Tinggi tanamannya sekitar 50-100 meter.

Daunnya tunggal, lengkap, dan pelepah daunnya silindris, gundul, seringkali bagian permukaan dalam berwarna merah, ujung berlidah (ligula). Helaiannya lebih dari separuh menggantung, remasan berbau aromatik.

Habitat dan budidaya tumbuh pada daerah dengan ketinggian 50-2700 meter diatas permukaan laut. Tanaman sereh dapat diperbanyak dengan potongan rimpang. Pemanenan dilakukan bila tinggi tanaman telah mencapai 1-1,5 meter. Tinggi tanaman dipengaruhi oleh intensitas cahaya matahari dan dosis pemupukan nitrogen dan keduanya terdapat interaksi dalam mempengaruhi tinggi tanaman (Yuniarti.2001.368).

c. Kandungan Kimia

Daun dan akar sereh mengandung saponin, flavonoida dan polifenol, di samping itu daunnya juga mengandung minyak atsiri. Sereh mengandung senyawa berbentuk padat dan berbau khas. Minyak atsiri yang merupakan produksi sereh, terdiri dari berbagai senyawa. Salah satu senyawa yang dapat membunuh nyamuk adalah sitronela. Sitronela mempunyai sifat racun (*desiscant*), menurut cara kerjanya racun ini seperti racun kontak yang dapat memberikan kematian karena kehilangan cairan secara terus-menerus sehingga tubuh nyamuk kekurangan cairan (Yuniarti. 2001.369-370).

d. Manfaat Sereh

Bagian akar dari tanaman ini digunakan sebagai peluruh air seni, peluru keringat, peluru dahak/obat batuk, bahan untuk kumur, dan penghangat badan. Sedangkan daunnya digunakan sebagai peluru angin perut, penambah nafsu makan, pengobatan pasca persalinan, penurunan panas dan pereda kejang (Yuniarti. 2001.369).

3. Kelapa

Kelapa merupakan salah satu jenis tumbuhan dari golongan *Arecaceae*. Tanaman ini adalah satu-satunya spesies dalam genus *Cocos* dan pohonnya mencapai ketinggian 30 meter. Kelapa juga adalah sebutan untuk buah pohon ini yang berkulit keras dan berdaging warna putih. Pohon kelapa biasanya tumbuh di pinggir pantai (Yuniarti. 2001.198).

a. Klasifikasi

Dunia : Plantae
Divisi : Spermatophyta
Anak Divisi : Angiospermae
Kelas : Monocotyledonae
Bangsa : Arecales
Suku : Arecaceae
Marga : *Cocos*
Jenis : *Cocos nucifera* (Yuniarti. 2001.197).

b. Morfologi

Kelapa termasuk jenis tanaman palma yang mempunyai buah berukuran cukup besar. Batang pohon kelapa umumnya berdiri tegak dan tidak bercabang, dan dapat mencapai 10–14 meter lebih. Daunnya berpelelah, panjangnya dapat mencapai 3–4 meter lebih dengan sirip-sirip lidi yang menopang tiap helaian.

Buahnya terbungkus dengan serabut dan batok yang cukup kuat sehingga untuk memperoleh buah kelapa harus dikuliti terlebih dahulu. Kelapa yang sudah besar dan subur dapat menghasilkan 2–10 buah kelapa setiap tangkainya (Yuniarti. 2001.197-198).

c. Kandungan Kimia

Buah kelapa yang sudah tua mengandung kalori yang tinggi, sebesar 359 kal per 100 gram, daging kelapa setengah tua mengandung kalori 180 kal per 100 gram dan daging kelapa muda mengandung kalori sebesar 68 kal per 100 gram. Sedang nilai kalori rata-rata yang terdapat pada air kelapa berkisar 17 kalori per 100 gram. Air kelapa hijau, dibandingkan dengan air kelapa lain banyak mengandung tannin atau antidotum (anti racun) yang paling tinggi.

Kandungan zat kimia lain yang menonjol yaitu berupa enzim yang mampu mengurai sifat racun. Komposisi kandungan zat kimia yang terdapat pada air kelapa antara lain asam askorbat atau vitamin C, protein, lemak, hidrat arang, kalsium atau potassium. Mineral yang terkandung pada air kelapa ialah

zat besi, fosfor, dan gula yang terdiri dari glukosa, fruktosa dan sukrosa. Kadar air yang terdapat pada buah kelapa sejumlah 95,5 gram dari setiap 100 gram (Yuniarti. 2001.200).

d. Manfaat Kelapa

Ada beberapa komoditi yang dapat diperoleh dari pohon kelapa yaitu batang, daun, buah, dan bagian-bagian lainnya. Untuk buahnya sendiri dapat diambil bagian daging kelapanya yang merupakan bagian yang paling penting dari komoditi asal pohon kelapa. Daging kelapa yang cukup tua diolah menjadi kelapa parut, santan, kopra, dan minyak goreng.

Tanaman kelapa dapat mengobati penyakit panas dalam, keracunan, demam berdarah, sakit panas, influenza, kencing batu, sakit saat haid, cacing kremi, sakit gigi, ubanan, dan ketombe (Yuniarti. 2001.198-199).

B. Granul Efervesen

Efervesen didefinisikan sebagai bentuk sediaan yang menghasilkan gelembung gas sebagai hasil reaksi kimia dalam larutan antara senyawa asam dan karbonat atau bikarbonat, dimana gas yang dihasilkan adalah karbondioksida (CO_2) (Pulungan. 2004, 4).

Efervesen dimaksudkan untuk menghasilkan larutan secara cepat dengan menghasilkan CO_2 secara serentak. Efervesen khususnya dibuat dengan cara mencampurkan bahan-bahan aktif dengan campuran asam-asam organik seperti asam sitrat atau asam tartrat dan natrium bikarbonat.

Jika granul efervesen dimasukkan kedalam air, mulailah terjadi reaksi kimia antara asam dan natrium bikarbonat sehingga terbentuk garam natrium dari asam dan menghasilkan CO₂ serta air. Reaksinya cukup cepat dan biasanya selesai dalam waktu satu menit atau kurang. Disamping menghasilkan larutan yang jernih, efervesen juga menghasilkan rasa yang enak karena adanya karbonat yang membantu memperbaiki rasa beberapa obat tertentu (Lachman. 1994. 715)

Granulasi adalah proses dari pembesaran ukuran partikel. Pada proses ini partikel-partikel kecil dikumpulkan menjadi lebih besar sehingga terbentuk gumpalan-gumpalan permanen, tetapi partikel-partikel yang awalnya tetap teridentifikasi. Dalam banyak hal, proses ini digunakan untuk memproduksi tablet atau kapsul. Granul juga dapat digunakan secara langsung sebagai suatu bentuk sediaan untuk membuat bahan-bahan obat untuk diberikan dalam bentuk sachet, kapsul, atau produk-produk yang dilarutkan secara instant (Swarbrick and Boylan. 1988. 121).

Granul mengalir lebih baik dibandingkan dengan serbuk karena memiliki bentuk yang lebih bulat. Dari bahan asal yang sama, bentuk granul biasanya lebih stabil secara fisik dan kimia daripada serbuk dan biasanya lebih tahan terhadap pengaruh udara. Granul dibuat bukan hanya mengandung unsur-unsur obat saja tetapi juga zat warna, zat penambah rasa dan bahan penambah lainnya yang diinginkan (Ansel. 1989).

Garam efervesen merupakan granul atau serbuk kasar sampai kasar sekali dan mengandung unsur obat dalam campuran yang kering, biasanya terdiri dari

natrium bikarbonat, asam sitrat, dan asam tartrat, bila ditambah dengan air asam dan biasanya bereaksi membebaskan karbondioksida sehingga menghasilkan buih. Larutan dengan karbonat yang dihasilkan menutupi rasa yang tidak diinginkan dari zat obat, sehingga granul efervesen sangat cocok untuk produk yang pahit dan asin.

Garam-garam efervesen biasanya diolah dari suatu kombinasi asam sitrat dan asam tartrat daripada hanya satu macam asam saja, karena penggunaan bahan asam tunggal saja akan menimbulkan kesukaran. Apabila asam tartrat sebagai asam tunggal, granul yang dihasilkan akan mudah kehilangan kekuatannya dan akan menggumpal. Jika asam sitrat saja akan menghasilkan campuran lekat dan sukar menjadi granul (Ansel. 1989).

Pada pembuatan Efervesen diperlukan beberapa bahan tambahan diantaranya:

1. Asam sitrat

Rumus molekul : $C_6H_8O_7 \cdot H_2O$

Asam sitrat merupakan asam dengan rasa yang cukup kuat dan stabil didalam wadah. Dapat meningkatkan sinergis kerja dari antioksidan. Berupa hablur tak berwarna atau serbuk putih, tidak berbau, rasa sangat asam, agak higroskopik, merapuh dalam udara kering dan panas. Asam sitrat digunakan dalam persiapan pembuatan tablet efervesen. Larut dalam kurang dari 1 bagian air dan dalam 1,5 bagian etanol (95%) P, sukar larut dalam eter P (DEPKES RI. 1979, 50 dan Kibbe. 2000. 140).

2. Asam tartrat

Rumus molekul : $C_6H_6O_6$

Asam tartrat merupakan asam yang banyak digunakan dalam produksi minuman. Berupa hablur tak berwarna, serbuk hablur halus sampai granul warna putih, tidak berbau, rasa asam, dan stabil diudara. Sangat mudah larut dalam air dan etanol dalam formulasi obat, lebih luas digunakan dalam kombinasi dengan bikarbonat, sebagai komponen asam pada granulasi efervesen, serbuk, dan tablet (DEPKES RI. 1995, 50 dan Kibbe. 2000).

3. Natrium Bikarbonat

Rumus molekul : $NaHCO_3$

Natrium bikarbonat merupakan sumber karbondioksida pada tablet dan granulasi efervesen. Pada tablet dan granulasi, sodium bikarbonat biasanya diformulasikan dengan asam sitrat dan asam tartrat. Berupa serbuk putih atau serbuk monocular kecil, buram, tidak berbau, rasa asin (DEPKES RI. 1979. 424 dan Kibbe.2000).

4. Sukrosa

Rumus molekul : $C_{12}H_{22}O_{11}$

Sukrosa merupakan sweetening agent (pemanis) yang berupa hablur kristal, tidak berwarna atau kecoklatan, tidak berbau dan rasa manis. Mudah larut dalam air dan lebih larut dalam air panas (DEPKES RI. 1979).

C. Uji Stabilitas Fisik

Pengujian stabilitas fisik meliputi uji kandungan lembab, uji reaksi efervesen dan uji hedonik. Granulat tidak hanya merupakan produk antara pada proses tabletasi, tetapi juga merupakan sediaan obat tersendiri. Dalam skala yang semakin tinggi, banyak campuran serbuk diubah menjadi campuran granulat, agar lebih baik penggunaannya dan takarannya lebih eksak. Dengan menambahkan korigensia rasa atau melalui penyalutan, penggunaannya menjadi semakin mudah. Granulat sebagai sediaan obat mandiri, umumnya memiliki ukuran butiran yang sedikit lebih besar daripada granulat yang digunakan dalam pencetakan tablet. Granul juga lebih tahan secara mekanik. Butir-butiran kasar diperoleh melalui pelembaban dan pelekatan serbuk.

Pembuatannya berlangsung dalam empat tahap, yaitu agregasi campuran serbuk dengan menambahkan cairan penggranul, pembagian masa, pengeringan granulat dan pengayakan bagian yang halus, memfinalkan granulat membebaskan butiran granulat yang masih melekat bersama setelah proses pengeringan melalui gerakan-gerakan lemah diayakan.

Persyaratan bagi granul dirumuskan sebagai berikut, granul sebaiknya dalam bentuk dan warna yang sedapat mungkin homogen, sedapat mungkin memiliki distribusi yang sempit dan tidak > 10% mengandung komponen berbentuk serbuk, memiliki daya luncur yang baik, menunjukkan kekompakan mekanis yang memuaskan, tidak terlampau kering, mudah hancur dalam air (Voigt. 1994).

D. Uji Mikrobiologi Sediaan Obat Tradisional

Untuk melindungi masyarakat terhadap hal-hal yang dapat mengganggu dan merugikan kesehatan perlu dicegah beredarnya obat tradisional yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan dan mutu dan perlu adanya persyaratan-persyaratan terhadap obat tradisional.

Setiap sediaan makanan dan minuman mensyaratkan batas angka bakteri tertentu yang masih dianggap aman untuk dikonsumsi, menurut Prosedur operasional baku pengujian mikrobiologi Pusat pemeriksaan obat dan makanan Direktorat Jenderal Pengawasan obat dan makanan Departemen Kesehatan RI menetapkan batas angka lempeng total yaitu $< 10^6$ koloni per ml untuk bakteri. Hasil penghitungan angka lempeng total bakteri dibandingkan dengan standar yang ditetapkan.

Angka lempeng total harus ditekan sekecil mungkin. Meskipun mikroba tersebut tidak membahayakan bagi kesehatan tapi kadang-kadang karena pengaruh sesuatu dapat menjadi mikroba yang membahayakan. Yang jelas angka lempeng total tersebut dapat digunakan sebagai petunjuk sampai tingkat berapa industri tersebut melaksanakan cara pembuatan obat tradisional yang baik. Makin kecil angka lempeng total bagi setiap produk, makin tinggi nilai pengetrapan CPOTB di industri tersebut. Angka kapang dan khamir. Kapang dan khamir akan berkembang biak bila tempat tumbuhnya cocok untuk pertumbuhan. Mikroba patogen merupakan semua mikroba yang dapat menyebabkan orang menjadi sakit, bila

kemasukan mikroba tersebut. Obat tradisional untuk penggunaan obat dalam perlu diwaspadai adanya mikroba seperti: *Salmonella typhi* , *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*. Obat tradisional untuk penggunaan obat luar perlu diwaspadai adanya mikroba seperti: *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Candida albicans*, *Clostridium perfringens*, *Bacillus anthracis*. Kadar aflatoksin tidak boleh lebih dari persyaratan yang ditetapkan. Aflatoksin selain meracuni organ tubuh bersifat karsinogenik. Bahan tambahan dapat dibedakan menjadi bahan tambahan alami dan bahan tambahan kimia. Bahan tambahan kimia pada umumnya bersifat racun karena itu perlu ada pembatasan penggunaannya. Oleh karena itu pemakaian bahan tambahan jika tidak diperlukan agar dihindari.

a. Uji Angka Lempeng Total

Metode kuantitatif digunakan untuk mengetahui jumlah mikroba yang ada pada suatu sampel, umumnya dikenal dengan Angka Lempeng Total (ALT). Uji Angka Lempeng Total (ALT) dan lebih tepatnya ALT bakteri adalah bilangan yang menyatakan perkiraan jumlah bakteri aerob. Tujuan pengujian ini adalah untuk menilai tingkat kebersihan bahan baku, simplisia maupun sediaan obat tradisional. Cemaran mikroorganisme dapat terjadi mulai penanganan bahan baku sampai teknik penyimpanan (Djine, Natsir M, 2006. 174).

Hasil pengamatan dan perhitungan yang diperoleh dinyatakan sesuai persyaratan berikut :

1. Dipilih cawan petri dari satu pengenceran yang menunjukkan jumlah koloni antara 25-250. Jumlah koloni rata-rata dari kedua cawan dihitung lalu

dikalikan dengan faktor pengencerannya. Hasil dinyatakan sebagai Angka Lempeng Total dari tiap gram atau tiap ml sampel.

2. Bila salah satu dari cawan petri menunjukkan jumlah koloni kurang dari 25 atau lebih dari 250, dihitung jumlah rata-rata koloni, kemudian dikalikan faktor pengencerannya. Hasil dinyatakan sebagai Angka Lempeng Total dari tiap gram atau tiap ml sampel.
3. Jika terdapat cawan-cawan dari dua tingkat pengenceran yang berurutan menunjukkan jumlah koloni antara 25-250, maka dihitung jumlah koloni dari masing-masing tingkat pengenceran, kemudian dikalikan dengan faktor pengencerannya. Apabila hasil perhitungan pada tingkat yang lebih tinggi diperoleh jumlah koloni rata-rata lebih besar dari dua kali jumlah koloni rata-rata pengenceran dibawahnya, maka ALT dipilih dari tingkat pengenceran yang lebih rendah. Bila hasil perhitungan pada tingkat pengenceran lebih tinggi diperoleh jumlah koloni rata-rata kurang dari dua kali jumlah rata-rata pada penenceran dibawahnya maka ALT dihitung dari rata-rata jumlah koloni kedua tingkat pengenceran tersebut.
4. Bila tidak ada satupun koloni dari cawan maka ALT dinyatakan sebagai $<$ dari 1 dikalikan faktor pengenceran terendah.
5. Jika seluruh cawan menunjukkan jumlah koloni lebih dari 250, dipilih cawan dari tingkat pengenceran tertinggi kemudian dibagi menjadi beberapa sektor (2, 4 dan 8) dan dihitung jumlah koloni dari satu sektor. ALT adalah jumlah

koloni dikalikan dengan jumlah sektor, kemudian dihitung rata-rata dari kedua cawan dan dikalikan dengan faktor pengencerannya.

6. Jumlah koloni rata-rata dari 1/8 bagan cawan lebih dari 200, maka ALT dinyatakan lebih besar dari 200 x 8 dikalikan faktor pengenceran.
7. Perhitungan dan pencatatan hasil ALT hanya ditulis dalam dua angka. Angka berikutnya dibulatkan kebawah bila kurang dari 5 dan dibulatkan ke atas apabila lebih dari 5.
8. Jika dijumpai koloni “spreader” meliputi seperempat sampai setengah bagian cawan , maka dihitung koloni yang tumbuh diluar daerah spreader. Jika 75 % dari seluruh cawan mempunyai koloni spreader dengan seperti diatas, maka dicatat sebagai “spr”. Untuk keadaan ini harus dicari penyebabnya dan diperbaiki cara kerjanya (pengujian diulang).
9. Jika dijumpai koloni spreader tipe rantai maka tiap 1 deret koloni yang terpisah dihitung sebagai 1 koloni, dan bila dalam kelompok spreader terdiri dari beberapa rantai, maka tiap rantai dihitung sebagai 1 koloni (BPOM RI, 2006).

E. Tinjauan Islam Tentang Penggunaan Minuman *Sarabba* Bagi Kesehatan.

Minuman *sarabba* merupakan minuman penghangat badan yang sangat dikenal dikalangan masyarakat Bugis-Makassar. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan *Sarabba* seperti jahe (*Zingiber officinale Rosc.*), sereh (*Cymbopogon nardus L*), santan daging kelapa. Semua bahan ini merupakan tumbuh-tumbuhan.

Tumbuh-tumbuhan mengandung banyak vitamin dan mineral serta unsur-unsur alami lainnya yang memungkinkan bagi tubuh untuk menyerapnya. Unsur-unsur yang terkandung dalam tumbuhan banyak sekali dan tidak sesederhana yang dibayangkan banyak orang. Pengaruh tumbuhan sangat selektif, karena mengandung zat-zat penting bagi pertumbuhan manusia (As Sayyid 2006, 7).

Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nahl (16) : 1

يُنَبِّتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman; zaitun, korma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan (QS. An-Nahl (16) : 11).

Ayat tersebut menggambarkan kekuasaan Allah dalam menciptakan keanekaragaman tanaman yang bermanfaat sebagai perhiasan, makanan dan obat-obatan.

Salah satu tanaman yang relevan dengan penelitian ini adalah tanaman jahe (*Zingiber officinale Rosc*). Tanaman jahe adalah bagian dari tanaman yang disebutkan secara tersirat dalam Al-Qur'an tersebut. Di dalam tanaman jahe terdapat bagian tanamannya yang disebut rimpang jahe yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Setelah diteliti, di dalam rimpang jahe terkandung beberapa senyawa kimia yang dapat berfungsi sebagai obat antara lain sebagai peluruh

angin atau karminatif. Oleh karena itu, jika ayat tersebut dikaji secara mendalam maka seseorang akan memperoleh hasil bahwa di dalamnya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau memikirkannya.

Allah berfirman dalam QS. An-Nahl (16) : 67

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾

Terjemahnya:

Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan (QS. An-Nahl (16): 67).

Allah berfirman dalam QS. An-Nahl (16) : 69

ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلَالًا تَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ
أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٩﴾

Terjemahnya:

Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). Dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan (QS. An-Nahl (16): 69).

Ayat tersebut menjelaskan tentang manfaat sari buah dan kisah lebah yang mengeluarkan minuman yang berfungsi sebagai obat dan minuman memabukkan yang berasal dari buah korma dan anggur.

Di dalam madu terdapat sari tumbuh-tumbuhan yang baik menghasilkan obat untuk kehidupan manusia. Hubungannya dan maksud ayat tersebut dalam setiap tumbuh-tumbuhan/tanaman yang memiliki kandungan gizi dan obat yang terdapat pada daun dan buahnya. Keduanya merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah untuk manusia yang berfikir. Berfikir yang dimaksud adalah orang selalu meneliti secara ilmiah tentang kandungan yang terdapat pada tanaman dan lebah tersebut, sehingga pengobatan yang diperoleh dengan penelitian melalui mencari saripati tumbuh-tumbuhan yang ada dipermukaan bumi sebagai bentuk upaya pencarian fungsi dan pendayagunaan dari tumbuh-tumbuhan yang diciptakan Allah SWT, hingga saat ini banyak pengobatan herbal dan mencari tumbuh-tumbuhan sebagai bahan utama pembuatan obat-obatan.

Adapun bahan dasar yang dianjurkan untuk obat-obatan yaitu bahan aktif yang disarikan dari tumbuhan obat disamping bahan kimiawi yang diproduksi manusia. Allah menghendaki penempatan zat-zat aktif itu pada sejumlah tumbuh-tumbuhan biasa yang mudah didapat, sehingga memungkinkan bagi tubuh berinteraksi dengannya secara perlahan dan alami.

Dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. Dari Rasulullah Saw bahwa beliau bersabda :

عَنْ يَرْبُوعِ رَهْضِيِّ اللَّهِ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا
أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً (ارَوَاهُ الْبُخَّ)

Terjemahnya:

Dari Abu Hurairah ra. Dari Nabi Saw. bersabda: Allah tidak akan menurunkan penyakit kecuali dia juga menurunkan obatnya (H.R. Al-Bukhari, VII, 12).

Hadis ini mengandung penegasan dan perintah bagi yang sakit untuk berobat serta penjelasan bahwa pengobatan adalah sebab kesembuhan, bahwa obat tidak lain hanyalah sebab yang diciptakan Allah SWT. sebagai sarana untuk mendapatkan kesembuhan dan sebagai media ikhtiar demi mematuhi sunnatullah atau hukum alam yang berlaku.

Setiap tanaman memiliki kelebihan dengan tanaman yang lain sehingga hanya orang yang menggali dan mencari tahu mengenai tumbuhan tersebut yang mengetahui secara benar mengenai manfaat tumbuhan tersebut. Walhasil tuntutan untuk membaca tanda-tanda kekuasaan Allah SWT adalah untuk kelangsungan kehidupan manusia.

Dalam Al Qur'an Allah berfirman

خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ۗ وَالْقِيٰمِ فِي الْأَرْضِ رَوٰسِي ۚ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ ۚ وَبَثَّ فِيهَا
مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ۚ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿١٠١﴾

Terjemahnya:

Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya dan Dia meletakkan gunung-gunung (di permukaan) bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu; dan memperkembang biakkan padanya segala

macam jenis binatang. dan Kami turunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. (QS. Al-Luqman (31): 10).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa segala yang diciptakan di bumi ini termasuk tumbuh-tumbuhan ada manfaatnya, tugas manusia mencari dan meneliti manfaat dari tumbuhan tersebut.

Ungkapan Nabi “ *Setiap penyakit pasti ada obatnya*”, merupakan penguat jiwa kepada orang yang sakit dan juga dokter yang mengobatinya, selain juga mengandung anjuran untuk mencari obat dan menyelidikinya. Karena kalau orang sakit sudah merasakan pada dirinya satu keyakinan bahwa ada obat yang akan dapat menghilangkan sakitnya, ia akan bergantung pada harapan, rasa panas dari keputus asaan akan menjadi dingin dan terbukalah baginya pintu harapan. Bilamana jiwanya sudah kuat, suhu panas insting seseorang akan meningkat. Itulah yang bisa menimbulkan semangat kebinatangan, kejiwaan dan semangat alamiah dalam tubuh.

Sabda Rasulullah Saw yang begitu populer di kalangan umat Islam itu tampaknya telah memicu para ilmuwan untuk berlomba meracik dan menciptakan beragam obat-obatan di era kekhalifahan hingga sekarang ini. Yang menyebabkan berkembangnya ilmu di bidang farmasi.

Selain berlandaskan dari sabda Rasulullah Saw, dalam Al Qur`an juga banyak mengisyaratkan tentang pengobatan karena Al Qur`an itu sendiri diturunkan sebagai penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Disamping Al Qur`an mengisyaratkan tentang pengobatan juga menceritakan tentang keindahan

alam semesta yang dapat kita jadikan sumber dari pembuat obat-obatan. Seperti yang tertera pada Q.S. Al-Luqman (31) ayat 10 maupun pada Q.S An-Nahl (16) ayat 11 yang menjelaskan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat bagi manusia. Jadi, sebagai seorang farmasis yang Islami sudah selayaknya menjadikan Al Qur'an sebagai petunjuk atau pedoman dalam mengkaji, mempelajari, meneliti dan meracik bahan alam sebagai obat, kosmetik, makanan maupun minuman yang bermanfaat bagi manusia. Dan bukankah produk-produk baik obat-obatan maupun kosmetik yang beredar di masyarakat juga sebagian berasal dari alam.

Kata *zanjabiil* disebutkan dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah,

وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا

Terjemahnya:

Di dalam surga itu mereka diberi minum segelas (minuman) yang campurannya adalah jahe (QS. Al-Insan (76): 17).

Ayat ini menganalogikan kenikmatan yang akan dijumpai manusia beriman di surga kelak. Allah telah memberikan penjabaran mengenai minuman-minuman yang ada di surga, minuman yang akan disuguhkan kepada mereka (penghuni surga) sebagai bentuk kenikmatan yang diberikan Allah kepada umatnya atas semua upaya yang telah dilakukan didunia ini untuk meraih kenikmatan tersebut. Ayat tersebut menyebutkan sebuah minuman yang ada di surga yang didalamnya terdapat campuran jahe. Dan adapun kaitanya *sarabba* dengan minuman yang

disebutkan pada ayat diatas adalah masing-masing memiliki campuran jahe. Abu Al-Naim, dalam bukunya “*At-Thibu Al-Nabawi*”, disebutkan satu hadits dari Abi Sai’d Al-Khudri, ia berkata, ” bahwa raja Romawi menghadiahkan setangkai jahe kepada Rasulullah lalu Nabi memberikan sepotong kepada setiap orang, ketika itu untuk dimakan, dan beliau memberiku sepotong” (Hasan, Mahir.2007.152).

Ajaran Islam mengatur sedemikian rupa tentang makanan dan minuman. Makanan dan minuman dapat dikategorikan sebagai halal, haram, atau syubhat. Bahan yang diharamkan dalam ajaran Islam adalah bangkai, darah, babi dan hewan yang disembelih dengan nama selain Allah sedangkan minuman yang dikategorikan haram adalah semua bentuk khamr (minuman yang memabukkan). Para ulama mendefinisikan khamr sebagai segala sesuatu, baik minuman atau wujud lain yang dapat menghilangkan akal dan digunakan untuk bersenang-senang sehingga dari definisi ini penyalahgunaan obat-obatan termasuk obat bius termasuk dalam katagori khamr. Jadi minuman yang aman bagi kesehatan yaitu minuman yang tidak mengandung khamr (Santana, S. 2010).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Alat dan Bahan

1. Alat

Blender, Cawan petri, Gelas ukur, Erlenmeyer, neraca O’Haus, oven, spatel tahan asam, timbangan analitik, inkubator, otoklaf, tabung durham, tabung reaksi, pipet,

2. Bahan

Rimpang jahe (*Zingiberis officinale* Rose), sereh (*Cymbopogon nardus* L), gula palm (Palm suikker[®]), asam sitrat, asam tartrat, natrium bikarbonat, santan kelapa instan (Kara[®]), sukrosa, air suling steril, pepton water (PW), medium Nutrien Agar (NA), medium Mannit Kochsalz Phenolrot Agar (MKPA), medium Lactose Broth (LB), Medium Salmonella Shigella Agar (SSA), Medium Selenite Cystein Broth (SCB), medium Eosin Metilen Blue Agar (EMBA).

B. Prosedur kerja

1. Pengambilan sampel

Sampel berupa rimpang jahe dan sereh diperoleh dari salah satu pasar tradisional di kota Makassar, sedangkan gula palm (Palm suikker[®]) dan santan kelapa instan (Kara[®]) diperoleh dari salah satu supermarket yang berada di kota Makassar.

2. Pengolahan Sampel (Fausiah, M. 2010)

Rimpang jahe (*Zingiberis officinale* Rosc) dan sereh (*Cymbopogon nardus* L) dibersihkan dari kotoran dengan air mengalir selanjutnya 500 g jahe dan 125 g sereh dipotong-potong kemudian dimasukkan dalam juicer lalu ditambahkan air secukupnya untuk mendapatkan jusnya. Kemudian jus tersebut dipekatkan dengan pemanasan suhu $\pm 40^{\circ}\text{C}$ sambil diaduk secara terus menerus dan ditambahkan 500 g sukrosa. Pemanasan dan pengadukan terus dilakukan hingga diperoleh massa kering. Serbuk kering selanjutnya digerus dan diayak dengan ayakan mesh 60.

3. Formulasi Granul (Fauziah, M. 2010)

Ditimbang ekstrak *sarabba* lalu dimasukkan dalam wadah yang terbuat dari aluminium foil, ditambahkan dengan santan kelapa instan dan gula palm lalu diaduk hingga homogen. Selanjutnya dimasukkan asam sitrat, asam tartrat, dan natrium bikarbonat lalu dicampur hingga homogen. Campuran tersebut dimasukkan dalam oven suhu 31°C lalu lebur selama 10 menit hingga diperoleh massa kering. Campuran dikeluarkan dari oven digerus dan diayak dengan ayakan mesh 60. Granul kemudian dikemas dalam wadah kedap udara, masing-masing kemasan berisi 13 gram granul *sarabba* efervesen.

4. Pengujian *sarabba* efervesen

Pengujian granul *sarabba* efervesen dilakukan selama penyimpanan 0, I, dan II bulan. Pengujiannya meliputi:

A. Stabilitas fisik granul

Pengujian stabilitas fisik granu meliputi kandungan lembab, reaksi efervesen dan tingkat kesukaan.

1. Uji kandungan lembab (Moiture Content)

Ditimbang granul kemudian dipanaskan dalam oven sampai bobot konstan pada suhu 100°C selama 1 jam, lalu ditimbang kembali granul yang telah dikeringkan dan hitung % kandungan lembab (Anonim, 1979). sebagai berikut:

$$\% \text{ MC} = \frac{W_o - W_i}{W_i} \times 100\%$$

W_o = bobot granul awal

W_i = bobot granul setelah pengeringan

2. Uji reaksi efervesen

Satu bungkus granul efervesen dimasukkan dalam 180 ml air. Dicatat waktu larut seluruhnya, dilakukan sebanyak 3 kali kemudian hasilnya dirata-rata, pengukuran dilakukan menggunakan stopwatch.

3. Uji Hedonik

Pengujian ini melibatkan 10 panelis yang diminta tanggapan pribadinya tentang kesukaan atau ketidak sukaannya terhadap warna, bau dan rasa sarabba efervesen. Hasil penilaian panelis dihitung berdasarkan total nilai kesukaan, kemudian diinterpretasi berdasarkan hasil yang diperoleh.

B. Pengujian Mikrobiologi

a. Pembuatan medium

1. Nutrien Agar (NA)

Masing-masing bahan dilarutkan dalam 1.000 cc aquadest hingga menjadi larutan yang homogen, dipanaskan dalam penangas air hingga medium tersebut mendidih selama 5 menit, didinginkan kemudian dinetralkan larutan medium dengan menggunakan NaOH 1 N sedikit demi sedikit sampai warna indikator phenolphthalein berubah menjadi merah jambu, ditambahkan aquadest sampai volumenya 1.000 cc, kemudian disaring dengan kapas atau kain penyaring yang bersih, ditimbang agar-agar sebanyak 15-20 gram untuk setiap 1.000 cc medium (1,5-2%), dimasukkan agar-agar ke dalam medium kemudian dipanaskan dalam penangas air selama 20-30 menit sambil diaduk hingga semua agar mencair dan larut, dalam keadaan panas medium Nutrien Agar disaring dengan kapas atau kain saring yang bersih, dimasukkan medium tersebut ke dalam tabung-tabung reaksi yang steril, banyaknya medium yang diisikan tergantung pada keperluannya, untuk medium agar miring diisikan 5 cc sedangkan untuk medium agar tegak diisikan 10 cc, kemudian disterilkan dengan otoklaf pada temperatur 121°C selama 20 menit. Untuk medium agar miring setelah sterilisasi diletakkan miring 30°C

terhadap bidang datar sedang untuk medium agar tegak diletakkan secara tegak.

2. Lactose broth (LB)

Dicampur ekstrak daging, pepton, laktosa, dan aquadest dan didihkan, diatur pH=7,0, ditambahkan indikator phenol red 1,6% dan disaring. Dimasukkan dalam tabung fermentasi (tabung Durham) dan disterilisasi pada temperatur 100°C selama 20 menit. Diulangi 3 kali berturut-turut dengan selang waktu 24 jam.

3. Eosin Methylene Blue Agar (EMBA)

Dicampur ekstrak daging, pepton, laktosa dan aquadest dan didihkan kemudian agar dimasukkan dan diaduk, ditambahkan indikator metilen blue dan eosin dan disaring ke dalam tabung yang steril lalu di sterilkan dalam otoklaf dengan suhu 121°C selama 15 menit.

4. Selenite Cystein Broth (SCB)

Dicampur bahan Bacto-Tryptone, disodium phosphate, Bacto lactose, sodium selenite, disuspensikan ke dalam 1.000 ml aquadest, dipanaskan sampai mendidih hingga bahan larut sempurna. Kemudian dituangkan ke dalam tabung reaksi steril, kemudian disterilkan dalam otoklaf dengan suhu 121° C selama 15 menit.

5. Salmonella Shigella Agar (SSA)

Dicampur bahan Lab-Lemco powder, pepton, laktosa, bile salts, sodium citrate, sodium thiosulphate, brilliant green, neutral red, agar, disuspensikan ke dalam 1000 ml aquadest yang telah disterilkan terlebih dahulu.

6. Mannit Kochsalz phenolrot Agar (MKPA)

Dicampur semua bahan pepton, mannitol, sodium chlorida, meat extract, agar-agar, phenol red disuspensikan dalam 1000 ml aquadest, dipanaskan hingga homogen kemudian disterilkan dalam otoklaf dengan suhu 121° C selama 15 menit.

7. Pepton Water (PW)

Dicampur Pepton dan Sodium chloride, disuspensikan dengan 1000 ml aquadest, dihomogenkan kemudian disterilkan dalam otoklaf dengan suhu 121°C selama 15 menit.

b. Pengujian Angka Lempeng Total (Djide, N. 2009)

Prosedur pengujian angka lempeng total menurut metode analisis mikrobiologi yaitu dengan cara aseptik ditimbang 1 gram sampel lalu masukkan ke dalam botol steril. Setelah itu ditambahkan 9 ml air steril, dan dihomogenkan sehingga diperoleh suspensi dengan pengenceran 10^{-1} . Disiapkan 4 tabung atau lebih yang masing-masing telah diisi dengan 9 ml air steril. Hasil dari homogenisasi pada penyiapan sampel

yang merupakan pengenceran 10^{-1} dipipet sebanyak 1 ml kedalam tabung air steril pertama, dikocok homogen hingga diperoleh pengenceran 10^{-2} . Dibuat pengenceran selanjutnya hingga 10^{-5} atau sesuai dengan pengenceran yang diperlukan. Dari setiap pengenceran dipipet 1ml kedalam cawan petri dan dibuat duplo, ke dalam setiap cawan dituangkan 15-20 ml media NA suhu 45°C . Cawan petri segera digoyang dan diputar sedemikian rupa hingga suspensi tersebar merata. Untuk mengetahui sterilitas media dan pengencer dibuat uji kontrol media dan uji kontrol ruangan. Uji kontrol media dengan cara satu cawan diisi medium NA dengan pengerjaan cawan ditutup sedangkan uji kontrol ruangan pada pengerjaannya dibiarkan terbuka. Setelah media memadat, cawan diinkubasi suhu $35-37^{\circ}\text{C}$ selama 24 jam dengan posisi dibalik. Setelah itu jumlah koloni yang tumbuh diamati dan dihitung.

c. Uji *Escherichia coli*

Disiapkan dua tabung reaksi masing-masing berisi 9 ml air steril. Dari hasil homogenisasi pada penyiapan sampel dipipet 1 ml pengenceran 10^{-1} ke dalam tabung air steril pertama hingga diperoleh suspensi dengan pengenceran 10^{-2} lalu dikocok sampai homogen. Selanjutnya dibuat pengenceran 10^{-3} . Untuk mendapatkan pengenceran disiapkan 3 tabung reaksi berisi 9 ml LB yang dilengkapi tabung

durham. Ke dalam tiap tabung dari masing- masing seri dimasukkan 1 ml suspensi pengenceran. Diiinkubasi pada suhu 37°C selama 24 jam. Setelah 24 jam dicatat dan diamati adanya gas yang terbentuk dalam tiap tabung, kemudian inkubasi dilanjutkan hingga 48 jam dan dicatat tabung-tabung yang menunjukkan uji positif. Lactose Broth yang menghasilkan gas positif diambil 1 ose dan digoreskan pada medium Agar EMBA, selanjutnya diinkubasi pada suhu 35°C selama 24-48 jam. Hasilnya menunjukkan positif jika koloni berwarna hijau metalik.

d. Uji *Salmonella typhi*

Hasil pengenceran masing-masing diinokulasikan ke dalam Selenite Cystein Broth (SCB) yang telah dipanaskan sebelumnya pada suhu 42-43°C, kemudian diinkubasikan pada suhu 42-42°C selama 24-48 jam. Setelah itu dilakukan inokulasi ke dalam medium Salmonella Shigella Agar (SSA), diinkubasi pada suhu 37°C selama 24 jam. Diamati timbulnya koloni berwarna merah muda (positif mengandung *Salmonella typhi*).

e. Uji *Staphylococcus aureus*

Sampel hasil pengenceran diinokulasikan ke dalam medium Pepton Water dan selanjutnya diinkubasi pada suhu 37°C selama 24 jam. Hasil yang diperoleh diinokulasikan pada medium Mannit Koschsalz phenolrot Agar (MKPA) dan diinkubasi pada suhu 37°C selama 24-48

jam, diamati koloni yang tumbuh dan dinyatakan positif apabila tumbuh koloni hitam dengan zona kuning.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Hasil pengujian Stabilitas Fisik Granul

a. Uji Kandungan Lembab

Tabel 1. Hasil analisis kandungan lembab

Penyimpanan (Bulan ke-)	Pengulangan MC (%)			Total (%)	Rata- rata (%)
	I	II	III		
0	7,75	7,22	7,35	22,32	7,44
I	8,14	7,41	7,50	23,05	7,863333
II	8,32	7,70	8,00	24,02	8,006667

b. Uji reaksi Efervesen

Tabel 2. Hasil analisis reaksi Efervesen

Penyimpanan (Bulan ke-)	Pengulangan (menit)			Total (Menit)	Rata- rata (Menit)
	I	II	III		
0	3,45	3,47	3,49	10,41	3,47
I	3,45	3,50	3,55	10,50	3,50
II	3,55	3,58	4,00	11,13	3,71

c. Uji Hedonik

Tabel 3. Hasil analisis Hedonik

Penyimpanan (Bulan ke-)	Kesukaan														
	Warna (%)					Bau (%)					Rasa (%)				
	AS	S	C	K	TS	AS	S	C	K	TS	AS	S	C	K	TS
0	30	70	-	-	-	20	60	20	-	-	40	50	10	-	-
I	-	60	40	-	-	-	60	40	-	-	-	60	40	-	-
II	-	30	50	20	-	-	30	40	30	-	-	30	40	30	-

Keterangan:

AS = Amat suka

S= Suka

C = Cukup suka

K = Kurang suka

TS = Tidak suka

Jumlah panelis sebanyak 10 orang

2. Hasil Pengujian Mikrobiologi

a. Uji ALT bakteri

Tabel 4. Hasil analisis Angka lempeng total

Pengenceran	Nilai ALT Bulan 0	Nilai ALT Bulan I	Nilai ALT Bulan II
10 ⁻¹	1,0 x 10 ¹ CFU/g	1,0 x 10 ¹ CFU/g	7,0 x 10 ¹ CFU/g

b. Pengujian *Escherichia coli*

Tabel 6. Hasil analisis *Escherichia coli*

Penyimpanan (Bulan ke-)	Medium	Pengenceran			
		10^{-2}	10^{-3}	10^{-4}	10^{-5}
0	LB	+	-	+	+
	EMBA	-	-	-	-
I	LB	+	-	+	+
	EMBA	-	-	-	-
II	LB	-	+	+	+
	EMBA	-	-	-	-

Keterangan :

LB (+) Medium menjadi kuning dan terbentuk gas (-) tidak berubah

EMBA (+) Koloni berwarna hijau metalik positif *Escherichia coli*

c. Pengujian *Salmonella typhi*

Tabel 7. Hasil analisis *Salmonella typhi*

Penyimpanan (Bulan ke-)	Medium	Pengenceran			
		10^{-2}	10^{-3}	10^{-4}	10^{-5}
0	SCB	+	-	+	+
	SSA	-	-	-	-
I	SCB	-	-	+	-
	SSA	-	-	-	-
II	SCB	-	-	-	-
	SSA	-	-	-	-

Keterangan :

SCB (+) Terjadi kekeruhan (-) Tidak ada perubahan

SSA (+) Terbentuk koloni merah muda positif *Salmonella typhi*.

d. Pengujian *Staphylococcus aureus*

Tabel 8. Hasil analisis *Staphylococcus aureus*

Penyimpanan (Bulan ke-)	Medium	Pengenceran			
		10 ⁻²	10 ⁻³	10 ⁻⁴	10 ⁻⁵
0	PW	+	+	-	-
	MKPA	-	-	-	-
I	PW	-	+	-	+
	MKPA	-	-	-	-
II	PW	-	-	+	-
	MKPA	-	-	-	-

Keterangan:

PW (+) Terjadi kekeruhan (-) Tidak ada perubahan

MKPA (+) Terbentuk koloni hitam zona kuning positif *Staphylococcus aureus*

e. Pembahasan

Ekstrak *sarabba* dibuat dari jahe dan sereh dengan cara pengkristalan dengan penambahan sukrosa. Ekstrak *sarabba* yang dihasilkan kemudian diformulasikan menjadi minuman instan dalam bentuk granul efervesen. Formulasi dilakukan dengan dengan penambahan bahan pembentuk efervesen

yaitu asam sitrat, asam tartrat dan natrium bikarbonat dengan konsentrasi yang berbeda. *Sarabba* ini telah diformulasi dalam bentuk sediaan granul efervesen dengan konsentrasi Asam Sitrat (28%) 0,7 gram, Asam Tartrat (19%) 0,475 gram dan Natrium Bikarbonat (53%) 1,42 gram (Fauziah, M. 2010). Pada umumnya formula efervesen yang biasa dibuat mengacu kepada formula garam efervesen resmi yang ada, terdiri dari kira-kira 53% campuran natrium bikarbonat, 28% asam tartrat, dan sekitar 19% asam sitrat (Ansel. Howard. 1989).

Kualitas granul *sarabba* efervesen selama masa penyimpanan 2 bulan, terdiri dari stabilitas fisik dan cemaran mikroba. Pengujian stabilitas fisik meliputi: uji kandungan lembab, uji reaksi efervesen dan uji hedonik sedangkan pengujian mikrobiologi meliputi: pengujian ALT bakteri, uji *Escherichia coli*, uji *Salmonella typhi*, uji *Staphylococcus aureus* yang ditentukan pada SNI. Umur simpan suatu produk berdasarkan Robertson (1991) dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu (1) karakteristik produk (sifat fisik, sifat kimia, sifat mikrobiologi), (2) lingkungan (suhu dan kelembaban) dan (3) bahan pengemas atau sistem pengemasan.

Uji kandungan lembab (MC) merupakan evaluasi kadar air dalam granul efervesen. Kandungan lembab granul *sarabba* efervesen sesaat setelah pembuatan (pada bulan ke- 0) 7,44 %, pada bulan I 7,683333% dan pada bulan II 8,006667%. Tingginya kandungan lembab dimungkinkan karena proses pembuatan granul efervesen dilakukan dalam ruangan yang memiliki kelembaban yang tinggi, padahal seharusnya proses pembuatan efervesen dilakukan di ruangan dengan kelembaban relatif maksimal 25% (Mohrle, 1989). Dari hasil tersebut

menunjukkan bahwa kadar lembab tidak meningkat signifikan selama penyimpanan 2 bulan. Artinya jika granul ini dibuat dalam kondisi yang memungkinkan maka granul *sarabba* efervesen akan tetap memenuhi syarat kelembaban. Hasil statistik rancangan acak lengkap terhadap kandungan lembab menunjukkan bahwa lama penyimpanan tidak mempengaruhi kandungan lembab karena nilai F hitung < F tabel taraf 5% dan 1 %.

Uji reaksi efervesen (waktu melarut) yaitu waktu yang diperlukan oleh sediaan granul *sarabba* efervesen untuk melarut sempurna pada suhu kamar. Dari hasil penelitian diperoleh waktu melarut pada pengujian bulan ke-0 3,47 menit, pada bulan I 3,50 dan pada bulan II 3,71. Dari hasil statistik rancangan acak lengkap menunjukkan bahwa lama penyimpanan tidak berpengaruh terhadap waktu larut sediaan *sarabba* efervesen karena nilai F hitung < F tabel taraf 5% dan 1%.

Pengujian hedonik bertujuan untuk menilai kualitas sediaan *sarabba* efervesen meliputi warna, bau dan rasa. Pengujian ini melibatkan 10 orang panelis yang dimintai tanggapan pribadinya terhadap *sarabba* efervesen kemudian memberikan nilai. Dalam penelitian ini kategori nilai yaitu angka 5 untuk amat suka, angka 4 untuk suka, angka 3 untuk cukup suka, angka 2 untuk kurang suka dan angka 1 untuk tidak suka.

Warna *sarabba* efervesen dipengaruhi oleh warna ekstrak jahe dan sereh serta warna gula yang mengalami reaksi browning (kecoklatan). Secara umum warna *sarabba* efervesen tidak berubah hingga penyimpanan 2 bulan, yaitu warna

kuning kecoklatan. Hasil uji kesukaan terhadap warna menunjukkan bahwa warna *sarabba* efervesen bulan ke- 0 lebih disukai dari pada penyimpanan bulan I dan bulan II. Bau *sarabba* efervesen berasal dari ekstrak jahe dan sereh serta bahan lainnya. Secara umum bau *sarabba* efervesen tidak mengalami perubahan selama penyimpanan 2 bulan. Berdasarkan hasil uji kesukaan, panelis lebih menyukai bau *sarabba* efervesen bulan ke-0 dari pada bulan I dan bulan II. Namun bulan I dan II panelis masih ada yang menyukai bau *sarabba* efervesen tapi memiliki tingkat kesukaan yang berbeda dengan bulan ke-0. Rasa *sarabba* efervesen berdasarkan hasil uji kesukaan, panelis lebih menyukai rasa pada bulan ke-0, namun bulan I dan bulan II masih ada panelis yang menyukai rasa *sarabba* efervesen.

Uji kesukaan terhadap *sarabba* efervesen relatif karena tingkat kesukaan para panelis yang berbeda-beda. Tidak semua panelis menyukai warna kuning kecoklatan dari *sarabba* efervesen begitu pula dengan rasa dan bau dari *sarabba* efervesen.

Uji mikrobiologi meliputi uji ALT bakteri, uji *Escherichia coli*, uji *Salmonella typhi*, uji *Staphylococcus aureus*. Pengujian ini dilakukan untuk menilai tingkat kebersihan bahan baku, simplisia maupun sediaan. Cemaran mikroorganisme berasal dari bahan baku yang digunakan tidak bersih, lingkungan seperti udara, air dan tanah merupakan mediator untuk perkembangan dan penyebaran bakteri, pengerjaan/pengolahan yang kurang baik dapat menyebabkan keberadaan bakteri pada sediaan, pengemasan dan penyimpanan juga perlu diperhatikan untuk mencegah kontaminasi pada sediaan. Untuk menghindari

cemaran yang tinggi maka penyiapan bahan baku dan pengerjaan harus dikerjakan dalam keadaan bersih dan steril begitu pula dengan penyimpanannya. Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh nilai ALT bakteri untuk pengujian bulan ke-0 yaitu $0,1 \times 10^2$ CFU/g, bulan I yaitu $0,1 \times 10^2$ CFU/g dan pada bulan II yaitu $0,7 \times 10^2$ CFU/g, ini menunjukkan bahwa sediaan ini layak dikonsumsi karena setiap sediaan makanan dan minuman mensyaratkan batas angka lempeng total bakteri $< 10^6$ koloni per gram (Anonim, 1992).

Pengujian *Escherichia coli*. *Escherichia coli* merupakan flora normal yang terdapat di dalam saluran pencernaan hewan dan manusia. Mikroorganisme berada diman-mana dan bisa saja berasal dari lingkungan maupun dari bahan-bahan yang digunakan untuk membuat suatu makanan dan minuman. Adanya mikroorganisme dalam makanan dan minuman dapat menyebabkan perubahan organoleptik. Baik mikroba patogen maupun non patogen bila terdapat dalam jumlah yang berlebihan akan sangat berbahaya, seperti halnya *Escherichia coli* yang dapat menyebabkan diare. Dari hasil pengujian, sediaan ini bebas dari *Escherichia coli* hingga penyimpanan 2 bulan.

Pengujian *Salmonella typhi*. Bakteri *Salmonella* merupakan bakteri penyebab infeksi, jika tertelan dan masuk ke dalam tubuh akan menimbulkan gejala yang disebut salmonellosis. Gejala salmonellosis yang paling sering adalah gastroenteritis. Selain menyebabkan gejala gastroenteritis, beberapa spesies *Salmonella* juga dapat menimbulkan gejala-gejala penyakit lainnya, misalnya yang digolongkan dalam demam enterik seperti demam tipoid dan demam para

tipoid serta infeksi lokal. Dari hasil pengujian *Salmonella typhi* menunjukkan bahwa sediaan ini bebas dari *Salmonella typhi* hingga penyimpanan 2 bulan.

Pengujian *Staphylococcus aureus*. *Staphylococcus aureus* termasuk bakteri osmotoleran, yaitu bakteri yang dapat hidup di lingkungan dengan rentang konsentrasi zat terlarut (contoh garam) yang luas, dan dapat hidup pada konsentrasi NaCl sekitar 3 molar. Hábitat alami *Staphylococcus aureus* pada manusia adalah di daerah kulit, hidung, mulut, dan usus besar, dimana pada keadaan sistem imun normal, *Staphylococcus aureus* tidak bersifat patogen (mikroflora normal manusia). Dari hasil pengujian, sediaan ini bebas dari *Staphylococcus aureus* hingga penyimpanan 2 bulan.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa sediaan granul *sarabba* efervesen telah memenuhi syarat karakteristik granul seperti, waktu larut dan uji hedonik serta bebas dari cemaran mikroba patogen (*Escherichia coli*, *Salmonella typhi*, *Staphylococcus aureus*).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian pengaruh lama penyimpanan terhadap stabilitas fisik dan mikrobiologi *sarabba* efervesen dapat disimpulkan bahwa:

1. Lama penyimpanan selama 2 bulan tidak berpengaruh terhadap stabilitas fisik dan mikrobiologi pada sediaan *sarabba* efervesen.
2. Granul *sarabba* efervesen telah memenuhi persyaratan menurut standar nasional Indonesia (SNI) dengan jumlah bakteri $< 10^6$ CFU/g serta tidak terdapat bakteri *Escherichia coli*, *Salmonella typhi*, dan *Staphylococcus aureus* hingga penyimpanan selama 2 bulan.
3. Dalam Islam, telah memberikan petunjuk-petunjuk yang universal tentang makanan dan minuman yang sehat dan halal (Halalan-Thayibah). Minuman *sarabba* adalah bagian dari minuman yang sehat dan halal yang disebut dalam Al Qur'an: "Makan dan minumlah yang Allah berikan dengan cara yang halal dan Thayibah".

B. Saran

Perlu dilakukan pengujian untuk menentukan kadar aflatoksin pada sediaan *sarabba* efervesen.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Departemen Agama Republik Indonesia. Semarang.
- Anonim, 1979, *Materia Medika Indonesia*, Edisi III, 68-69, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Anonim, 1992, *Prosedur Operasional baku Pengujian Mikrobiologi*. Pusat Pemeriksaan Obat dan makanan. Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan RI, 14–15, 21–25.
- Ansel, Howard C. 1989. *Pengantar Buku Sediaan Farmasi*. UI- Press. Jakarta.
- Arthur, Sutikno. 2009. *Cara Menghitung Nilai MPN Uji Coliform*. [http://sutikno.Blog. Uns.ac.id](http://sutikno.Blog.Uns.ac.id). diakses tanggal 25 Desember 2010.
- As-Sayyid, Abdul basith Muhammad. 2006. *Pola Makan Rasulullah, Edisi Indonesia*. Jakarta
- BPOM. 2008. *Pengujian Mikrobiologi Pangan*. <http://www.pilciran-rakyat.com>. Diakses tanggal 26 Desember 2010.
- BPOM RI. 2006. *Metode Analisis Mikrobiologi Suplemen 2000*. Pusat Pengujian Obat Dan Makanan Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Republik Indonesia : Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 1979. *Farmaope Indonesia Edisi III*. Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan. Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 1995. *Farmaope Indonesia Edisi IV*. Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan. Jakarta.
- Djide, Natsir M DKK., 2006. *Analisis Mikrobiologa Farmasi*. Laboratorium Mikrobiologi Farmasi UNHAS. Makassar.
- Fauziah, Miftah. 2010. *Formulasi granul effervescent minuman instant sarabba*. Makassar.
- Heyne, K. 1987. *Tumbuhan Berguna Indonesia Jilid I*. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan. Departemen Kehutanan. Jakarta
- Hasan, Mahmud.2007. *Mukjizat Kedokteran Nabi*. Qultum media. Jakarta.
- Kibbe, Arthur. H. 2000. *Handbook of pharmaceutical excipient*. American pharmaceutical press London.
- Koswara, Sutrisno. 2009. *Jahe, Rimpang dengan Sejuta Khasiat*. www.Ebookpangan.com, diakses 6 Desember 2010.
- Lachman, leon dkk. 1994. *Teori dan Praktek Farmasi Industri 2*. UI-Press. Jakarta.
- Pulungan, H.M.2004. *Membuat effervescent Tanaman Obat*. Trubus Agrisana. Surabaya.

- Rahmawan, Obin. 2010. *Ruang Lingkup Mikroorganisme*. http://www.iptek.net.id/ind/pustaka_pangan/index.php. Diakses tanggal 26 Desember 2010.
- Santana, S. 2010. http://id.wikipedia.org/wiki/LPPOM_MUI. diakses 1 Agustus 2011.
- Santoso, B. H. 1991. *Jahe*. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.
- Soenanto, H. 2001. *Budi Daya Jahe dan Peluang Usaha*. Penerbit Aneka Ilmu. Semarang.
- Sukarta, Wayan. 2008. *Mikroorganisme Dalam Bahan Makanan*. <http://mawarmawar.wordpress.com/2009/03/03/mikroorganisme-dalam-bahan-makanan/>. Diakses tanggal 26 Desember 2010.
- Suprpti, L. M. 2003. *Aneka Awetan Jahe*. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.
- Swarbrick, J. and Boylan, J.C. 1988. *Encyclopedia of Pharmaceutical Technology*, Volume 7, Marcel Dekker, Inc., New York.
- Voigt, R., 1994, *Lehrbuch Der Pharmazeutschen Technologie*, 5th Ed., terjemahan Soewandhi, S.N., UGM press, Yogyakarta.
- Wiryowidagado, Sumali. 2005. *Kimia dan Farmakologi Bahan Alam Edisi 2*. Penerbit Kedokteran EGC. Jakarta.
- Yuniarti, Titin. 2001. *Ensiklopedia Tanaman Obat Tradisional*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.