

**GAMBARAN ASUPAN ZAT GIZI IBU HAMIL YANG MENDERITA
KURANG ENERGI KRONIK (KEK) DI WILAYAH KECAMATAN
POLONGBANGKENG SELATAN KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2011**



Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Kesehatan Masyarakat Jurusan Gizi Kesehatan Masyarakat
Program Studi Kesehatan Masyarakat
Fakultas Ilmu Kesehatan*

Oleh

**MUSTA'INA NUNTUNG
70200107092**

**JURUSAN KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR
2011**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri, jika kemudian terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat dengan bantuan orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi ini atau gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, Juli 2011

Penyusun

Musta'ina Nuntung
NIM. 70200107092

ABSTRAK

Nama : Musta'ina Nuntung
Nim : 70200107092
Judul : Gambaran Asupan Zat Gizi Ibu Hamil Yang Menderita Kurang Energi Kronik (KEK) di Wilayah Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar Tahun 2011

Asupan makanan adalah banyaknya bahan makanan sumber zat gizi yang dikonsumsi oleh seseorang yang berguna bagi kesehatannya. Zat gizi adalah ikatan kimia yang diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya, yaitu menghasilkan energi, membangun dan memelihara jaringan serta mengatur proses-proses kehidupan. Asupan zat gizi ibu selama hamil maupun sebelum hamil mempunyai peranan penting terhadap gizi janin dalam kandungan. KEK merupakan keadaan status gizi kurang pada ibu hamil karena ketidakseimbangan asupan zat-zat gizi. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran asupan zat gizi ibu hamil yang menderita kurang energi kronik (KEK) di wilayah Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar tahun 2011.

Penelitian ini menggunakan survey deskriptif (*exploratory study*). Populasi penelitian ini adalah ibu hamil di 2 puskesmas di wilayah Kecamatan Polongbangkeng Selatan. Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* dan besarnya sampel diperoleh 40 sampel. Penilaian kejadian KEK dilakukan dengan pengukuran Lingkar lengan atas (LILA) dan pengukuran asupan zat gizi dengan menggunakan formulir recall 24 jam.

Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa dari 40 ibu hamil yang menderita Kurang Energi Kronik, terdapat 36 ibu hamil (90,0 %) dengan asupan energi yang kurang dan 4 ibu hamil (10,0%) dengan asupan energi yang cukup. Dan terdapat 39 orang (97,5 %) yang kurang asupan karbohidratnya dan 1 orang (2,5 %) dengan asupan karbohidrat yang cukup. Dari hasil penilaian, jumlah asupan lemak ibu hamil yang cukup sama dengan jumlah asupan lemak ibu hamil yang kurang yakni masing-masing 20 orang (50,0 %). Serta terdapat 12 orang (30,0 %) dengan asupan protein yang cukup dan 28 orang (70,0 %) dengan asupan protein yang kurang.

Kesimpulan bahwa sebagian besar ibu hamil mengkonsumsi makanan dengan asupan energy, karbohidrat, lemak dan protein yang kurang. Saran yang dapat diberikan yaitu bagi pasangan usia subur (PUS) yang menginginkan kehamilan sebaiknya dipersiapkan secara menyeluruh terutama kebutuhan akan zat gizi yang dibutuhkan ibu selama hamil sehingga tidak terjadi defisiensi zat gizi terutama kebutuhan akan energy dan sebaiknya usia ibu untuk hamil jangan kurang dari 20 tahun atau jangan lebih dari 35 tahun

Kata Kunci : Asupan Zat Gizi, Ibu Hamil, KEK

Daftar Pustaka : 24 (1995 – 2010)

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran **ALLAH SWT** atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam tak lupa penulis persembahkan kepada **Nabi Muhammad SAW** atas inspirasi dan petunjuk yang diberikan sehingga kita mencapai kebenaran hakiki dan keselamatan dunia akhirat.

Sebagai hamba, kita hanyalah berusaha dan setiap usaha senantiasa ada ujian dan tambahan. Begitu pula dengan penulisan skripsi yang berjudul ***“Gambaran Asupan Zat Gizi Ibu Hamil yang Menderita Kurang Energi Kronik di Wilayah Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar Tahun 2011”***, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat pada Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Sebagai peneliti pemula, penulis menyadari telah banyak kisah sedih dan bahagia yang terukir indah dalam menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini, tidak sedikit kendala yang dialami penulis dalam menyusun skripsi ini, namun berkat pertolongan Allah SWT dan bantuan dari berbagai pihak baik berupa materi, bimbingan, sumbangan, pemikiran, tenaga dan do'a sehingga kendala tersebut dapat diatasi. Untuk itu melalui karya sederhana ini, terisitimewa penulis ucapkan terima kasih kepada Ayahanda H. Jawani, S.Pd. MH dan Ibunda Hj. St. Nuraeni, S.Pdi atas curahan cinta dan kasih sayangnya serta keikhlasan dalam membesarkan, mendidik, membiayai, memberikan kepercayaan, do'a restu yang

tak henti-hentinya demi kebaikan penulis, selain itu penulis ucapkan terima kasih kepada adikku tercinta Abdul Rauf Nuntung atas dukungannya, serta tak lupa pula penulis ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh keluarga besarku yang sudah banyak berkorban, mensupport dan tanpa mengenal lelah membantu sampai penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, kiranya Allah SWT melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Selanjutnya ucapan terima kasih penulis dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada Ibu Hj. Syarfaini, SKM, M.Kes selaku Penasehat Akademik yang senantiasa memberikan dorongan untuk penyelesaian studi pada Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Tak lupa pula penulis sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Andi Susilawaty, S.Si, M.Kes selaku Pembimbing I dan Ibu Hj. Syarfaini, SKM, M.Kes selaku Pembimbing II, atas segala bantuan, waktu, dorongan dan bimbingan yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya, penulis berikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H.A. Qadir Gassing H.T, M.S selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
2. Bapak Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, beserta Bapak Pembantu Dekan, seluruh staf, dosen dan pegawai atas bantuannya selama penulis menjalani masa studi.
3. Ibu Andi Susilawaty, S.Si, M.Kes sebagai Ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin

Makassar atas bantuan dan arahannya selama ini.

4. Bapak Drs. Supardin, M.HI selaku penguji I dan Ibu St. Sahariah Rowa, S.Si, M.Kes selaku penguji II yang telah banyak memberikan masukan dalam perbaikan skripsi ini.
5. Ibu Hj. Mardiana, SKM selaku kepala puskesmas Bulukunyi dan dr. Indrawaty Alimuddin selaku kepala Puskesmas Polongbangkeng Selatan yang telah membantu penulis selama melakukan penelitian.
6. Para bidan dan pegawai di puskesmas Polongbangkeng Selatan dan Puskesmas Bulukunyi yang telah banyak membantu penulis selama melakukan penelitian.
7. Sahabat-sahabatku tercinta Waty, Tina, Anty, Wiwi, Atry, Putri dan semua sahabat yang tidak bisa disebutkan satu persatu dalam memotivasi penulis selama penyusunan skripsi, kebaikan kalian penulis belum bisa membalasnya.
8. Saudara-saudaraku di lokasi KKN Posko Desa Gentungang Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa terima kasih untuk semua kenangan dan kebersamaannya.
9. Saudara-saudaraku di Jurusan Gizi Kesehatan Masyarakat angkatan 2007 yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu atas masukan dan kritiknya beserta canda tawanya selama ini.
10. Seluruh teman-teman Kesmas angkatan 2007 yang senantiasa memberikan kebersamaan di Fakultas ungu ini.

Penulis menyadari bahwa persembahan tugas akhir ini tidak ada artinya dibanding dengan pengorbanan mereka, hanya do'a yang penulis panjatkan semoga amal ibadah serta niat yang ikhlas mendapatkan balasan yang berlipat

ganda oleh Allah SWT.

Akhirnya disadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Namun penulis berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang berkepentingan.

Makassar, Juni 2011

Penulis

MUSTA'INA NUNTUNG

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Asupan Zat Gizi	7
B. Tinjauan Umum Tentang Ibu Hamil Yang Menderita KEK	31
C. Kerangka Teori	38
BAB III KERANGKA KONSEP	
A. Kerangka Konsep Penelitian	39

B. Definisi Operasional Variabel	43
--	----

BAB IV METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	46
---------------------------	----

B. Lokasi Penelitian	46
----------------------------	----

C. Populasi dan Sampel	46
------------------------------	----

D. Cara Pengumpulan Data	47
--------------------------------	----

E. Instrumen Penelitian	49
-------------------------------	----

F. Pengolahan dan Analisis Data	49
---------------------------------------	----

G. Penyajian Data	51
-------------------------	----

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum	52
------------------------	----

B. Hasil Penelitian	52
---------------------------	----

C. Pembahasan	56
---------------------	----

D. Keterbatasan Penelitian	76
----------------------------------	----

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	77
---------------------	----

B. Saran	78
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA	79
----------------------	----

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel 1.1	Angka Kecukupan Gizi Rata-rata yang dianjurkan perorang perhari khusus ibu hamil (WNPG VIII, 2004)	16
Tabel 1.2	Distribusi Frekuensi Karakteristik Ibu Hamil Penderita KEK Menurut Umur di Wilayah Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar Tahun 2011...	52
Tabel 1.3	Distribusi Frekuensi Karakteristik Ibu Hamil Penderita KEK Menurut Usia Kehamilan di Wilayah Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar Tahun 2011...	53
Tabel 1.4	Distribusi Frekuensi Karakteristik Ibu Hamil Penderita KEK Menurut Pendidikan di Wilayah Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar Tahun 2011...	53
Tabel 1.5	Distribusi Frekuensi Karakteristik Ibu Hamil Penderita KEK Menurut Pekerjaan di Wilayah Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar Tahun 2011...	54
Tabel 1.6	Distribusi Frekuensi Asupan Energi Ibu Hamil di Wilayah Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar Tahun 2011.....	54
Tabel 1.7	Distribusi Frekuensi Asupan Karbohidrat Ibu Hamil di Wilayah Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar Tahun 2011.....	55
Tabel 1.8	Distribusi Frekuensi Asupan Lemak Ibu Hamil di Wilayah Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar Tahun 2011.....	55
Tabel 1.9	Distribusi Frekuensi Asupan Protein Ibu Hamil di Wilayah Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar Tahun 2011.....	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
Gambar 1	Kerangka Teori	38
Gambar 2	Kerangka Konsep Penelitian	42

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Formulir Recall 24 Jam
- Lampiran 2. Ukuran Rumah Tangga dan Daftar Bahan Makanan Penukar
- Lampiran 3. Tabel Angka Kecukupan Gizi 2004 Bagi Orang Indonesia
- Lampiran 4. Output SPSS
- Lampiran 5. Master Tabel Asupan Zat Gizi Ibu Hamil
- Lampiran 6. Surat Izin Penelitian dari Fakultas Ilmu Kesehatan
- Lampiran 7. Surat Izin Penelitian dari Badan Penelitian dan Pengembangan
Daerah Prov. Sulawesi Selatan
- Lampiran 8. Surat Izin Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Linmas Kabupaten Takalar
- Lampiran 9. Surat Keterangan dari Puskesmas Polongbangkeng Selatan
- Lampiran 10 Surat Keterangan dari Puskesmas Bulukunyi
- Lampiran 11 Dokumentasi Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehamilan merupakan masa kehidupan yang penting. Pada masa itu ibu harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menyambut kelahiran bayinya. Ibu sehat akan melahirkan bayi yang sehat. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan ibu adalah gizi ibu (Depkes RI, 2000)

Masa hamil adalah masa di mana seorang wanita memerlukan berbagai unsur gizi yang jauh lebih banyak daripada yang di perlukan dalam keadaan biasa (Sjahmien Moehji dalam Setianingrum, 2005). Disamping untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya sendiri berbagai zat gizi itu juga diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan janin yang ada dalam kandungannya, sebab defisiensi gizi selama kehamilan dapat memberikan efek yang merugikan ibu maupun anaknya (Courtney Moor Marie dalam Setianingrum, 2005).

Status gizi ibu hamil sangat mempengaruhi pertumbuhan janin dalam kandungan, apabila status gizi ibu buruk sebelum dan selama kehamilan akan menyebabkan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) (Supariasa, 2001). Untuk menghindari terjadinya kelahiran bayi BBLR atau di bawah 2500 gram, seorang ibu harus menjaga kondisi fisiknya dengan mencukupkan kebutuhan gizinya. Di samping itu harus berusaha menaikkan berat badannya sedikitnya

11 Kg (bertahap sesuai dengan usia kehamilan) (Widjaya dalam Surasih, 2005).

Berdasarkan data UNICEF diperoleh prevalensi ibu hamil yang kurang energi kronik sebesar 41 % berdasarkan estimasi pada 2,0 juta populasi. Data SUSENAS tahun 1999 menunjukkan bahwa status gizi pada wanita usia subur (WUS) mendapat resiko KEK dengan LILA <23,5 cm sebanyak 24,2%.

Di negara-negara berkembang seperti Bangladesh, India, Indonesia, Myanmar, Nepal, Srilangka dan Thailand, prevalensi wanita yang mengalami KEK adalah 15-47% yaitu dengan BMI <18.5. Adapun negara yang mengalami prevalensi tertinggi adalah Bangladesh yaitu 47%, sedangkan Indonesia menjadi urutan ke empat terbesar setelah India dengan prevalensi 35.5% dan yang paling rendah adalah Thailand dengan prevalensi 15-25%. Hal ini terjadi karena sebagian besar wanita yang mengalami kekurangan energi disebabkan kurangnya asupan makanan yang dikonsumsi tidak sesuai dengan kebutuhan mereka (WHO, 1997).

Krisis ekonomi di Indonesia yang terjadi pada tahun 1998-2000 telah menjadikan asupan zat gizi ibu hamil dari masyarakat kurang mampu khususnya menurun secara signifikan dan menjadikan mereka mengalami Kurang Energi Kronis (KEK) yang didefinisikan dengan Lingkar Lengan Atas (LILA) <23,5 cm (HKI, 2000). Meskipun tidak ada penelitian khusus yang mendokumentasikan efek dan krisis ekonomi terhadap *outcome* kehamilan, tetapi penelitian yang dilakukan akhir-akhir ini menunjukkan

dengan jelas bahwa bayi yang lahir dari ibu-ibu yang mengalami KEK mempunyai rata-rata berat badan lahir 2.568 gram atau 390,9 gram lebih rendah dibandingkan rata-rata berat badan lahir bayi yang lahir dari ibu-ibu yang tidak mengalami KEK. Ibu Hamil (BUMIL) yang mengalami KEK mempunyai risiko melahirkan bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) 5 kali lebih besar dibandingkan ibu hamil yang tidak KEK (Hadi, 2005).

Prevalensi ibu hamil KEK mengalami kenaikan selama krisis ekonomi yaitu mencapai 24,9%. Meski mengalami penurunan yang cukup signifikan dengan adanya perbaikan ekonomi Indonesia pasca krisis, sampai dengan saat ini prevalensi BUMIL KEK masih cukup tinggi yaitu 16,7% (Depkes, 2003). Tingginya angka kurang gizi pada ibu hamil ini mempunyai kontribusi terhadap tingginya angka BBLR di Indonesia yang diperkirakan mencapai 350.000 bayi setiap tahunnya (Depkes, 2004).

Berdasarkan Laporan Riset Kesehatan Dasar Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2007 menunjukkan bahwa risiko KEK di Provinsi Sulawesi Selatan adalah 12,5%, sedikit lebih rendah dibanding angka nasional (13,6%). Kabupaten Takalar termasuk dalam kelompok kabupaten/kota yang angka risiko KEK lebih tinggi dari angka Provinsi Sulawesi Selatan yakni 15,4 % bersama dengan delapan kabupaten/kota lainnya yakni Selayar (17,0%), Bantaeng (17,7%), Gowa (19,9%), Bulukumba (13,5%), Pangkep Kepulauan (16,5%), Barru (16,1%), Tana Toraja (33,7%), dan Luwu (15,0%).

Ibu hamil yang menderita KEK kemungkinan akan melahirkan bayi dengan berat lahir rendah. Presentase berat bayi lahir rendah untuk Provinsi Sulawesi Selatan menurut riset kesehatan dasar provinsi Sulawesi Selatan tahun 2007 adalah 14,5%, lebih tinggi dibanding angka nasional (11,5%). Sedangkan persentase BBLR untuk Kabupaten Takalar adalah berat bayi <2500 gram sebanyak 15,0%, 2500-3999 gram sebanyak 85,0%, dan \geq 4000 gram sebanyak 0,0 %. Presentase BBLR lebih tinggi pada bayi perempuan (17,3%) dibanding laki-laki (16,8%), dan sedikit lebih tinggi di perdesaan (17,0%) dibanding di perkotaan (16,6%). Menurut karakteristik rumah tangga, proporsi BBLR tertinggi pada kelompok dengan tingkat pengeluaran per kapita.

Kecamatan Polongbangkeng Selatan merupakan salah satu kecamatan yang ada di kabupaten Takalar. Kecamatan ini mencakup dua wilayah kerja puskesmas yaitu Puskesmas Bulukunyi dan Puskesmas Polongbangkeng Selatan. Berdasarkan data yang diperoleh di Puskesmas Bulukunyi sampai dengan bulan Februari tahun 2011 tercatat 25 kasus ibu hamil KEK yang belum melahirkan. Sedangkan data yang diperoleh di puskesmas Polongbangkeng Selatan tercatat 20 kasus ibu hamil KEK yang belum melahirkan.

Berdasarkan latar belakang di atas dan dari hasil pengamatan sementara masih ditemukan adanya Ibu hamil yang menderita KEK di kedua wilayah kerja puskesmas tersebut maka penulis mengadakan penelitian berjudul **“Gambaran Asupan Zat Gizi Ibu Hamil yang Menderita**

Kurang Energi Kronik (KEK) di Wilayah Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar Tahun 2011”.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Gambaran Asupan Zat Gizi Ibu Hamil yang Menderita Kurang Energi Kronik (KEK) di Wilayah Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar Tahun 2011 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian, penulis membagi menjadi dua bagian, antara lain :

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui gambaran asupan zat gizi ibu hamil yang menderita kurang energi kronik (KEK) di wilayah Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar tahun 2011.

2. Tujuan Khusus

a. Untuk menilai asupan energi ibu hamil yang menderita KEK di wilayah Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar Tahun 2011.

b. Untuk menilai asupan karbohidrat ibu hamil yang menderita KEK di wilayah Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar Tahun 2011.

- c. Untuk menilai asupan lemak ibu hamil yang menderita KEK di wilayah Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar Tahun 2011.
- d. Untuk menilai asupan protein ibu hamil yang menderita KEK di wilayah Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar Tahun 2011.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat institusi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi puskesmas Bulukunyi, Puskesmas Polongbangkeng Selatan dan instansi terkait lainnya dalam mengarahkan kebijaksanaan perbaikan gizi masyarakat serta pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil.
2. Manfaat teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu kesehatan masyarakat pada umumnya dan gizi kesehatan masyarakat khususnya mengenai gambaran asupan zat gizi ibu hamil yang menderita KEK.
3. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi bagi pemerintah setempat dalam rangka penentuan arah kebijakan tentang perbaikan status gizi ibu hamil.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Asupan Zat Gizi

Pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang dibutuhkan tubuh setiap hari dalam jumlah tertentu sebagai sumber energi dan zat-zat gizi. Kekurangan atau kelebihan dalam jangka lama akan berakibat buruk terhadap kesehatan. Makanan sehari-hari yang dipilih dengan baik akan memberikan semua zat gizi yang dibutuhkan untuk fungsi normal tubuh. Adapun fungsi dari zat gizi dalam tubuh ada tiga yaitu memberi energi, pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan tubuh, serta mengatur proses tubuh (Almatsier, 2001).

Asupan makanan adalah banyaknya bahan makanan sumber zat gizi yang dikonsumsi oleh seseorang yang berguna bagi kesehatannya. Asupan makanan seseorang antara lain dipengaruhi oleh ketersediaan bahan pangan, jumlah yang dimakan dan mutu atau nilai gizi bahan makanan tersebut. Sebaliknya jumlah dan mutu nilai gizi tidak akan cukup jika ketersediaan bahan pangan dalam rumah tangga kurang. Jumlah dan mutu zat gizi merupakan salah satu faktor penyebab utama dalam menentukan status gizi seseorang, di samping faktor kemampuan tubuh untuk memanfaatkan zat gizi. Jumlah dan mutu zat gizi yang dikonsumsi seseorang dapat diketahui jumlah dan macamnya (Tarwotjo dalam Setianingrum, 2005).

Zat gizi adalah ikatan kimia yang diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya, yaitu menghasilkan energi, membangun dan memelihara jaringan serta mengatur proses-proses kehidupan. Macam-macam zat gizi adalah karbohidrat, protein, lemak, dan lain-lain (Almatsier, 2001).

Asupan zat gizi ibu selama hamil maupun sebelum hamil mempunyai peranan penting terhadap gizi janin dalam kandungan. Konsumsi makanan yang tidak adekuat serta adanya penyakit yang diderita selama hamil dapat berakibat buruk terhadap pertumbuhan janin. Perbaikan konsumsi makan ibu pada waktu hamil serta pemeliharaan kesehatan akan memperlancar suplai gizi bagi bayi dalam kandungan (Alisyahbana dalam Agustian, 2010).

1. Kebutuhan Gizi Ibu Hamil

Tujuan penataan gizi pada ibu hamil adalah menyiapkan : (1) cukup kalori, protein yang bernilai biologi tinggi. Vitamin, mineral, dan cairan untuk memenuhi kebutuhan zat gizi ibu, janin, serta plasenta; (2) makanan padat kalori dapat membentuk lebih banyak jaringan tubuh bukan lemak; (3) cukup kalori dan zat gizi untuk memenuhi pertambahan berat baku selama hamil; (4) perencanaan perawatan gizi yang memungkinkan ibu hamil untuk memperoleh dan mempertahankan status gizi optimal sehingga dapat menjalani kehamilan dengan aman dan berhasil, melahirkan bayi dengan potensi fisik dan mental yang baik, dan memperoleh cukup energi untuk menyusui serta merawat bayi kelak; (5) perawatan gizi yang dapat mengurangi atau menghilangkan reaksi yang tidak diinginkan, seperti mual dan muntah; dan (6) mendorong ibu hamil

sepanjang waktu untuk mengembangkan kebiasaan makan yang baik yang dapat diajarkan kepada anaknya selama hidup (Arisman, 2010).

Berdasarkan Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi VI tahun 2004 ditentukan angka 285 Kkal perhari selama kehamilan. Angka ini tentunya tidak termasuk penambahan akibat perubahan temperatur ruangan, kegiatan fisik, dan pertumbuhan (Depkes, 2002).

Seperti yang kita ketahui kehamilan menyebabkan meningkatnya metabolisme energi, karena itu kebutuhan energi dan zat gizi lainnya meningkat selama kehamilan. Peningkatan energi dan zat gizi tersebut diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan janin, pertambahan besarnya organ kandungan, perubahan komposisi dan metabolisme tubuh ibu. Kekurangan zat gizi tertentu yang diperlukan pada saat hamil dapat menyebabkan janin tumbuh tidak sempurna (Zulhaida Lubis, 2003). Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. Ar-Rad(36) : 8 yang mengatakan bahwa Allah SWT mengetahui apa yang dikandung oleh perempuan, dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah, Dan segala sesuatu pada sisi-Nya dan ukurannya.

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيصُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزِدَادُ^ط وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ﴿٨﴾

Terjemahnya :

Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah. dan segala sesuatu pada sisi-Nya ada ukurannya.

Ayat di atas menguraikan ilmu-Nya yang sangat luas lagi mencakup segala yang kecil dan yang besar. Salah satu objek pengetahuan-Nya adalah tentang kandungan. *Allah*, sejak dahulu, sekarang dan terus menerus, *mengetahui* keadaan janin sejak masih berbentuk sperma. Allah mengetahui juga *apa yang dikandung oleh setiap perempuan* atau betina setelah pertemuan sperma dan ovum yang kemudian menempel di dinding rahim. Allah mengetahui, bukan saja jenis kelaminnya, tetapi berat badan dan ukurannya, keindahan dan keburukannya, usia dan rezekinya, masa kini dan masa depannya, dan lain-lain (Shihab, 2002).

Kebutuhan energi untuk kehamilan yang normal perlu tambahan kira-kira 80.000 kalori selama masa kurang lebih 280 hari. Kebutuhan energi ini memperhitungkan kebutuhan energi untuk pertumbuhan janin dan plasenta serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan lain karena perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh ibu selama kehamilan. Hal ini berarti perlu tambahan ekstra sebanyak kurang lebih 300 kalori setiap hari selama hamil (Nasoetion dalam Lubis, 2003).

Kebutuhan akan energi pada trimester I sedikit sekali meningkat. Setelah itu, sepanjang trimester II dan III, kebutuhan akan terus membesar sampai pada akhir kehamilan. Energi tambahan selama trimester II diperlukan untuk pemekaran jaringan ibu, yaitu penambahan volume darah, pertumbuhan uterus dan payudara, serta penumpukan lemak. Sepanjang trimester III, energi tambahan dipergunakan untuk

pertumbuhan janin dan plasenta. Karena banyaknya perbedaan kebutuhan energi selama hamil, WHO menganjurkan jumlah tambahan sebesar 150 kkal sehari pada trimester I, dan 350 kkal selama trimester II dan III (Arisman, 2010).

Sama seperti energi, kebutuhan wanita akan protein membubung sampai 68%. Jumlah protein yang harus tersedia sampai akhir kehamilan diperkirakan sebanyak 925 gr yang tertimbun dalam jaringan ibu, plasenta, serta bayi. Kebutuhan protein yang lebih tinggi terjadi pada trimester kedua dan ketiga. Tambahan sebesar 10-16 gr/hari dianjurkan untuk menutupi kebutuhan pembentukan jaringan pada bayi dan ibunya. Hampir 70% protein dipakai untuk kebutuhan anak yang dikandungnya (Nadesul dalam Setianingrum, 2005). Sementara Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi V 1993 menganjurkan penambahan 12 gr/hari. Dengan demikian, dalam satu hari asupan protein dapat mencapai 75-100 gr atau sekitar 12% dari jumlah total kalori (Arisman, 2010). Asupan protein yang sangat rendah dalam makanan ibu hamil berpengaruh terhadap berat dan panjang badan bayi yang kelak dilahirkan (Sjahmien Moehji dalam Setianingrum, 2005).

Sebagaimana Islam telah menganjurkan mereka untuk memanfaatkan dan mensyukuri segala sesuatu yang telah Allah ciptakan, termasuk daging dan ikan segar yang berasal dari lautan ciptaan Allah. Makanan ini sebagai sumber protein hewani yang baik bagi ibu hamil. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nahl(16) : 14.

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا ﴿١٤﴾

Terjemahnya :

Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan).....

Penggalan ayat di atas menyatakan bahwa : *Dan dia*, yakni Allah SWT, yang menundukkan lautan dan sungai serta menjadikannya arena hidup binatang dan tempatnya tumbuh berkembang. Hal itu dijadikan demikian agar kamu dapat menangkap hidup-hidup atau yang mengapung dari ikan-ikan dan sebangsanya yang berdiam di sana sehingga kamu dapat memakannya daging yang segar, yakni binatang-binatang laut itu (Shihab, 2002).

Energi yang tersembunyi dalam protein ditaksir sebanyak 5180 Kkal, dan lemak 36.337 Kkal. Agar energi ini bisa ditabung masih dibutuhkan tambahan energi sebanyak 26.244 Kkal, yang digunakan untuk mengubah energi yang terikat dalam makanan menjadi energi yang bisa dimetabolisme. Dengan demikian jumlah total energi yang harus tersedia selama kehamilan adalah 74.537 Kkal. Untuk memperoleh besaran energi per hari, hasil penjumlahan ini kemudian dibagi dengan angka 250 (perkiraan lamanya kehamilan dalam hari) sehingga diperoleh angka 300 Kkal (Nasoetion dalam Lubis, 2003).

Seseorang ibu yang kekurangan vitamin A tidak akan dapat memberikan cadangan vitamin ini untuk anaknya. Hal ini menyebabkan

lebih mudah bagi bayinya untuk menderita kekurangan vitamin A kelak (Nadesul dalam Setianingrum, 2005).

Oleh karena itu, kebutuhan ibu hamil akan vitamin A harus tercukupi. Vitamin A dapat diperoleh dari pangan hewani seperti hati sapi, susu, telur, dsb. Sedangkan karoten terutama di dalam pangan nabati. Sebagaimana Islam telah menganjurkan untuk meminum susu yang dihasilkan dari binatang-binatang ternak. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Mu'minuun(23) : 21

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۚ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنفَعٌ كَثِيرٌ ۖ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya :

Dan Sesungguhnya pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu, kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan (juga) pada binatang-binatang ternak itu terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian daripadanya kamu makan.

Ayat di atas menguraikan anugerah serta bukti kuasa-Nya yang lain dengan menyatakan bahwa : Dan, di samping anugerah yang lalu, Kami juga menganugerahkan binatang-binatang untuk kamu, antara lain ternak. *Sesungguhnya pada binatang-binatang ternak*, unta, atau juga sapi dan kambing, *benar-benar terdapat Ibrah*, yakni pelajaran *bagi kamu*. Melalui pengamatan dan pemanfaatan binatang-binatang itu, kamu dapat memperoleh bukti kekuasaan Allah dan karunia-Nya. *Kami memberi kamu minum dari sebagian*, yakni susu murni yang penuh gizi, *yang ada dalam perutnya, dan juga selain susunya, padanya* yakni pada binatang-binatang ternak itu, secara khusus *terdapat juga faedah yang*

banyak untuk kamu, seperti daging, kulit dan bulunya. Semua itu dapat kamu manfaatkan untuk berbagai tujuan *dan sebagian darinya*, atas berkat Allah, *kamu makan* dengan mudah lagi lezat dan bergizi (Shihab, 2002).

Di samping itu, asam folat juga merupakan salah satu vitamin yang kebutuhannya selama hamil berlipat dua. Preparat suplementasi sebaiknya diberikan sekitar 28 hari setelah ovulasi atau pada 28 hari pertama kehamilan karena otak dan sumsum tulang belakang dibentuk pada minggu pertama kehamilan. Dengan demikian, pemberian suplementasi harus dilaksanakan sebelum konsepsi terjadi. Besarnya suplementasi ialah 280, 660, dan 470 μg per hari, masing-masing pada trimester I, II, dan III (Arisman, 2010).

Selain itu, kebutuhan ibu hamil akan zat besi juga meningkat. Zat besi ini digunakan untuk pembentukan plasenta dan sel darah merah sebesar 200-300%. Perkiraan besaran zat besi yang perlu ditimbun selama hamil ialah 1.040 mg. Dari jumlah ini, 200 mg Fe tertahan oleh tubuh ketika melahirkan dan 840 mg sisanya hilang. Sebanyak 300 mg besi ditransfer ke janin, dengan rincian 50-75 mg untuk pembentukan plasenta, 450 mg untuk menambah sel darah merah, dan 200 mg lenyap ketika melahirkan. Jumlah sebanyak ini tidak mungkin tercukupi hanya melalui diet. Karena itu, suplementasi zat besi perlu sekali diberlakukan bahkan kepada wanita yang berstatus gizi baik. Kebutuhan zat besi ibu hamil lebih meningkat pada kehamilan trimester II dan III, sementara

cadangan besi dalam tubuh ibu akan habis pada akhir kehamilan. Untuk menjaga agar stok ini tidak terkuras dan mencegah kekurangan, setiap ibu hamil dianjurkan menelan besi sebanyak 30 mg per hari. Takaran ini tidak akan terpenuhi melalui makanan. Oleh karena itu, suplementasi sebesar 30-60 mg, dimulai pada minggu ke-12 kehamilan yang diteruskan sampai 3 bulan pascapartum (Arisman, 2010).

Kekurangan zat besi pada ibu hamil, meningkatkan risiko kematian ibu hamil. Hal ini berarti keselamatan anak yang dikandungnya akan terancam (Nadesul dalam Setianingrum, 2005).

Kekurangan iodium selama hamil akan berefek pada keguguran, penyimpangan perkembangan otak janin, berat bayi lahir rendah dan kretinisme. Anjuran asupan per hari untuk ibu hamil dan menyusui adalah sebesar 200 μ g, dalam bentuk pemberian garam beryodium, pemberian suplementasi pada hewan ternak, pemberian minyak beryodium per oral atau injeksi (Arisman, 2010).

Dengan meningkatnya kebutuhan zat gizi pada masa kehamilan, maka angka kecukupan gizi rata-rata yang dianjurkan per orang per hari untuk ibu hamil lebih besar dibandingkan dengan wanita tidak hamil seperti tabel 1.1 di bawah ini.

Tabel 1.1 Angka Kecukupan Gizi Rata-rata yang dianjurkan perorang perhari khusus ibu hamil (WNPG VIII, 2004)

Zat Gizi	Wanita tidak hamil (20-45 tahun)	Ibu hamil
Energi (Kkal)	2200	+ 180 (trimester I) + 300 (trimester II, III)
Protein (gram)	50	+ 17
Vitamin A (RE)	500	+ 300
Vitamin D (μg)	5	5
Vitamin E (mg)	15	15
Vitamin K (mg)	55	55
Tiamin (mg)	1	+ 0,3
Riboflavin (mg)	1,1	+ 0,3
Niasin (mg)	14	+ 4
Vitamin B12 (mg)	2,4	+ 0,2
Asam folat (μg)	400	+ 200
Vitamin C (mg)	75	+ 10
Kalsium (mg)	800	+ 150
Fosfor (mg)	600	600
Besi (mg)	26	+ 0 (trimester I) + 9 (trimester II) + 13 (trimester III)
Seng (mg)	15	5
Yodium (μg)	150	50
Selenium (μg)	30	10

Sumber : Almtsier, 2001

2. Prinsip Gizi pada Ibu Hamil

Kehamilan adalah suatu hal dalam kehidupan yang dapat membuat keluarga bahagia. Pada kehamilan terjadi perubahan fisik dan mental yang bersifat alami. Para calon ibu harus sehat dan mempunyai gizi cukup (berat badan normal) sebelum dan setelah hamil, harus mempunyai kebiasaan makan yang teratur dan bergizi, berolahraga teratur dan tidak merokok. Jika ibu tidak mendapat gizi yang cukup selama kehamilan, maka bayi yang dikandungnya akan menderita kekurangan gizi. Jadi meskipun sudah cukup bulan, bayi tersebut akan

lahir dengan berat badan di bawah 2500 gram atau bayi berat lahir rendah, ibu yang menderita kekurangan gizi juga akan kekurangan ASI bila telah menyusui.

Jadi ibu hamil harus mendapat gizi yang cukup untuk diri dan janinnya. Agar kehamilan berjalan dengan baik maka gizi ibu pada waktu konsepsi harus cukup dan selama hamil harus mendapatkan tambahan protein, mineral, zat besi, kalsium, vitamin, asam folat dan energi.

Makanan ibu hamil harus sesuai dengan kebutuhan yaitu makanan yang seimbang sesuai dengan perkembangan kehamilan. Kebutuhan kalori ibu hamil sekitar 2500 kkal. Makanan yang dikonsumsi ibu hamil dipergunakan untuk pertumbuhan janin sebesar 40% dan 60% untuk ibu (Paath, 2004).

Sebagaimana Islam telah menganjurkan mereka untuk mengkonsumsi makanan dengan tidak berlebih-lebihan. Hal itu sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Al-A'raf(7) : 31

..... وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

Terjemahnya :

.....Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Penggalan ayat di atas merupakan salah satu prinsip yang diletakkan agama menyangkut kesehatan dan diakui pula oleh para ilmuwan terlepas apa pun pandangan hidup atau agama mereka. Perintah makan dan minum, lagi tidak berlebih-lebihan, yakni tidak melampaui

batas, merupakan tuntunan yang harus disesuaikan dengan kondisi setiap orang. Hal ini karena kadar tertentu yang dinilai cukup untuk seseorang, boleh jadi telah dinilai melampaui batas atau belum cukup buat orang lain. Atas dasar itu, kita dapat berkata bahwa penggalan ayat tersebut mengajarkan sikap proporsional dalam makan dan minum (Shihab, 2002).

Hal ini juga dijelaskan dalam salah satu hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan At-Tirmidzi melalui miqdam bin ma'di karib yang artinya :

Tidak ada yang dipenuhi manusia lebih buruk dari perut, cukuplah bagi anak Adam beberapa suap yang dapat menegakkan tubuhnya. Kalaupun harus (memenuhi perut), maka hendaklah sepertiganya untuk makanan, sepertiga untuk minuman dan sepertiga untuk pernapasan.

3. Asupan Zat Gizi Selama Kehamilan

Bahan pangan yang digunakan harus meliputi enam kelompok, yaitu (1) makanan yang mengandung protein (hewani dan nabati), (2) susu dan olahannya, (3) roti dan biji-bijian, (4) buah dan sayur yang kaya akan vitamin C, (5) sayuran berwarna hijau tua, (6) buah dan sayur lain. Jika keenam bahan makanan ini digunakan, seluruh zat gizi yang dibutuhkan oleh ibu hamil akan terpenuhi, kecuali zat besi dan asam folat. Itulah sebabnya mengapa suplementasi kedua zat ini tetap diperlukan meskipun status gizi ibu yang hamil itu terposisi pada jalur hijau KMS ibu hamil (Arisman, 2010).

Kebutuhan ibu hamil selama kehamilannya antara lain sebagai berikut (Almatsier, 2001) :

a. Asupan Energi

Besaran energi yang terasup merupakan faktor gizi paling penting jika dikaitkan dengan berat badan lahir bayi. Banyaknya energi yang harus disiapkan hingga kehamilan berakhir sekitar (dibulatkan) 80.000 kkal (National Academy of Sciences, 1980), atau kira-kira 300 kkal tiap hari di atas kebutuhan wanita tidak hamil. Nilai ini dihitung berdasarkan kesetaraan dengan protein dan lemak yang tertimbun untuk pertumbuhan janin dan keperluan ibu.

Energi yang tersembunyi dalam protein ditaksir sebanyak 5.180 kkal dan lemak 36.337 kkal. Agar energi ini dapat ditabung, masih dibutuhkan suntikan energi sebanyak 26.244 kkal yang digunakan untuk mengubah energi yang terikat dalam makanan menjadi energi yang dapat dimetabolisir. Dengan demikian, jumlah total energi yang harus tersedia selama kehamilan ialah 74.537 kkal. NAS menggenapkannya menjadi 80.000 kkal.

Kebutuhan akan energi pada trimester I sedikit sekali meningkat. Setelah itu, sepanjang trimester II dan III, kebutuhan akan terus membesar sampai pada akhir kehamilan. Energi tambahan selama trimester II diperlukan untuk pemekaran jaringan ibu, yaitu penambahan volume darah, pertumbuhan uterus dan payudara, serta penumpukan lemak. Sepanjang trimester III, energi tambahan

dipergunakan untuk pertumbuhan janin dan plasenta. Karena banyaknya perbedaan kebutuhan energi selama hamil, WHO menganjurkan jumlah tambahan sebesar 150 kkal sehari pada trimester I, dan 350 kkal selama trimester II dan III (Arisman, 2010).

b. Asupan Karbohidrat

Karbohidrat memegang peranan penting dalam alam karena merupakan sumber energi utama. Semua jenis karbohidrat terdiri atas unsur *karbon*, *hidrogen*, dan *oksigen* yang berasal dari tumbuh-tumbuhan melalui proses *fotosintesis*, klorofil tanaman dengan bantuan sinar matahari mampu membentuk karbohidrat dari karbon dioksida yang berasal dari udara dan air dari tanah akan menghasilkan karbohidrat sederhana glukosa disamping itu dihasilkan juga oksigen yang lepas dari udara. Produk yang dihasilkan terutama dalam bentuk gula sederhana yang masih mudah larut dalam air dan mudah diangkut ke seluruh sel-sel guna penyediaan energi.

Jenis-jenis karbohidrat terdiri dari :

(1) *Monosakarida*, yang terdiri atas jumlah atom C yang sama dengan molekul air termasuk karbohidrat terpenting dalam makanan karena sejak lahir, manusia menyukai rasa manis, alat kecap pada ujung lidah merasakan rasa manis tersebut. Yang termasuk ke dalam monosakarida adalah :

(a) *Glukosa*, dinamakan juga dekstrosa atau gula anggur yang memegang peranan penting dalam ilmu gizi, merupakan hasil

akhir dari pencernaan pati, sukrosa, maltosa, dan laktosa pada hewan dan manusia. Dalam proses metabolisme, glukosa merupakan karbohidrat yang beredar dalam tubuh dan di dalam sel merupakan sumber energi. Seperti di dalam sayur, buah, sirup jagung, sari pohon dan bersamaan dengan fruktosa dalam madu.

(b) *Fruktosa*, dinamakan juga levulosa atau gula buah, adalah gula paling manis. Gula ini terutama terdapat dalam madu bersama glukosa dalam buah, nektar bunga, dan juga di dalam sayur.

(c) *Galaktosa*, tidak terdapat bebas di alam seperti hanya glukosa dan fruktosa, akan tetapi terdapat dalam tubuh sebagai hasil pencernaan laktosa.

(2) *Disakarida*, terdiri atas dua unit monosakarida yang terikat satu sama lain melalui reaksi kondensasi. Yang termasuk disakarida, yaitu :

(a) *Sukrosa*, dinamakan juga gula tebu atau gula bit. Gula pasir yang 99% terdiri atas sukrosa dibuat dari kedua macam bahan makanan tersebut melalui proses penyulingan dan kristalisasi. Gula merah yang banyak digunakan di Indonesia dibuat dari tebu, kelapa atau enau melalui proses penyulingan tidak sempurna. Sukrosa juga terdapat di dalam buah, sayuran dan

madu. Bila dicernakan atau dihidrolisis, sukrosa pecah menjadi satu unit glukosa dan satu unit fruktosa.

(b) *Maltosa*, terbentuk pada setiap pemecahan pati, seperti yang terjadi pada tumbuh-tumbuhan bila benih atau bijian berkecambah dan di dalam usus manusia pada pencernaan pati.

(c) *Laktosa*, hanya terdapat dalam susu, merupakan gula yang rasanya paling tidak manis dan lebih sukar larut daripada disakarida lain.

(d) *Trehalosa*, terdiri atas dua mol glukosa dan dikenal sebagai gula jamur. Trehalosa juga terdapat dalam serangga.

(3) *Polisakarida*, merupakan karbohidrat kompleks yang mengandung sampai tiga ribu unit gula sederhana yang tersusun dalam bentuk rantai panjang lurus atau bercabang. Jenis karbohidrat yang termasuk dalam polisakarida adalah :

(a) *Pati*, merupakan simpanan karbohidrat dalam tumbuh-tumbuhan dan merupakan karbohidrat utama yang dimakan manusia di seluruh dunia. Pati terutama terdapat dalam padi-padian, biji-bijian, dan umbi-umbian.

(b) *Dekstrin*, merupakan produk antara pada pencernaan pati atau dibentuk melalui hidrolisis parsial pati. Dekstrin lebih manis daripada pati dengan daya larut lebih tinggi dan lebih mudah dicerna.

(c) *Glikogen*, dinamakan juga pati hewan karena merupakan bentuk simpanan karbohidrat di dalam tubuh manusia dan hewan, yang terutama terdapat di dalam hati dan otot. Tubuh mempunyai kapasitas terbatas untuk menyimpan glikogen, yaitu hanya sebanyak 350 gram.

(d) *Polisakarida Nonpati/serat*, akhir-akhir ini banyak mendapat perhatian karena peranannya dalam mencegah berbagai penyakit.

Fungsi utama karbohidrat adalah menyediakan energi bagi tubuh, selain itu juga sebagai pemberi rasa manis pada makanan, penghemat protein, pengatur metabolisme lemak, dan membantu pengeluaran feses.

Sumber utama karbohidrat di dalam makanan berasal dari padi-padian atau sereal, umbi-umbian, kacang-kacang kering, dan gula. Hasil olahan bahan-bahan ini adalah bihun, mie, roti, tepung-tepungan, selai, sirup, dan sebagainya. Sebagian besar sayur dan buah tidak banyak mengandung karbohidrat. Sayur umbi-umbian seperti wortel, dan bit serta sayur kacang-kacangan relatif lebih banyak mengandung karbohidrat daripada sayur daun-daunan. Bahan makanan hewani seperti daging, ayam, ikan, telur, dan susu sedikit sekali mengandung karbohidrat. Sumber karbohidrat yang banyak dimakan sebagai makanan pokok di Indonesia adalah beras, jagung, ubi, singkong, talas, dan sagu (Almatsier, 2001).

Sebagaimana Islam telah menganjurkan mereka untuk memakan biji-bijian. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Yaasin(36) : 33

وَأَيُّةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿٣٣﴾

Terjemahnya :

Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah bumi yang mati. kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan dari padanya biji-bijian, Maka daripadanya mereka makan.

Ayat di atas menyatakan : *Dan*, di samping pelajaran yang dapat mereka petik dari pengalaman sejarah yang menunjukkan keesaan dan kuasa Allah, *suatu tanda* besar lainnya *bagi mereka adalah bumi yang mati*, yakni kering kerontang, lalu *Kami menghidupkannya* dengan menurunkan air dan menumbuhkan tumbuhan *dan Kami keluarkan darinya biji-bijian, maka darinya*, yakni dari biji-bijian itu, *mereka* senantiasa *makan* (Shihab, 2002).

c. Asupan Lemak

Lemak adalah sekelompok ikatan organik yang terdiri atas unsur-unsur karbon, oksigen, hidrogen yang mempunyai sifat dapat larut dalam zat-zat pelarut tertentu. Lemak dalam makanan yang memegang peranan penting adalah lemak netral atau *trigliserida* yang molekulnya asam lemak yang diikatkan pada gliserol tersebut dengan ikatan *ester*. Jaringan lemak dalam tubuh dianggap tidak aktif jadi tidak ikut di dalam metabolisme sehari-hari tetapi merupakan

cadangan energi yang berlebihan yang tidak terpakai. Klasifikasi lemak adalah :

- (1) Menurut struktur kimiawinya :
 - (a) Lemak netral atau *Trigliserida*
 - (b) *Fosfolipida*
 - (c) *Lesitin*
 - (d) *Sfingomielin*
- (2) Menurut Sumbernya (bahan makanan) :
 - (a) Lemak nabati
 - (b) Lemak Hewani
- (3) Menurut konsistensinya :
 - (a) Lemak padat
 - (b) Lemak cair
- (4) Menurut wujudnya :
 - (a) Lemak tak terlihat (*Invisible Fat*)
 - (b) Lemak terlihat (*Visible Fat*)

Adapun fungsi lemak dalam tubuh adalah terutama sebagai cadangan energi dalam bentuk jaringan lemak yang ditimbun di tempat-tempat tertentu. Asam lemak tak jenuh ganda merupakan zat gizi yang esensial bagi kesehatan kulit dan rambut, lemak sebagai pelarut vitamin-vitamin yang larut dalam lemak (A, D, E, dan K) (Paath, 2004). Selain itu, lemak juga berfungsi untuk menghemat

protein, pelumas, memelihara suhu tubuh, pelindung organ tubuh, memberi rasa kenyang dan kelezatan (Almatsier, 2001).

Sumber utama lemak adalah minyak tumbuh-tumbuhan (minyak kelapa, kelapa sawit, kacang tanah, kacang kedelai, jagung dan sebagainya), mentega, margarin, lemak hewan (lemak daging dan ayam). Sumber lemak lain adalah kacang-kacangan, biji-bijian, daging dan ayam gemuk, krim, susu, dan kuning telur, serta makanan yang dimasak dengan lemak atau minyak. Sayur dan buah (kecuali alpukat) sangat sedikit mengandung lemak (Almatsier, 2001).

Sebagaimana terdapat dalam firman Allah SWT Q.S. Al-Mu'minuun(23) : 20

وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالذُّهْنِ وَصَبَّغٍ لِلْأَكْلِينَ ﴿٢٠﴾

Terjemahnya :

Dan pohon kayu keluar dari Thursina (pohon zaitun), yang menghasilkan minyak, dan pemakan makanan bagi orang-orang yang makan.

Salah satu anugerah Allah SWT adalah menciptakan pohon zaitun yang keluar pertama kali dari Thur Sina. Buah ini banyak manfaatnya dan dia juga adalah buah yang menghasilkan minyak, dan di samping itu ia pun merupakan pemakan makanan bagi orang-orang yang makan (Shihab, 2002).

d. Asupan Protein

Protein adalah bagian dari sel hidup dan merupakan bagian tubuh terbesar sesudah air, seperlima bagian tubuh adalah protein, sebagian ada di dalam otot, seperlima di dalam tulang rawan, sepersepuluh di dalam kulit dan selebihnya di dalam jaringan lain dan cairan tubuh. Klasifikasi protein dapat dilakukan berdasarkan :

(1) Protein Bentuk Serabut adalah protein yang daya larutnya rendah.

Mempunyai kekuatan mekanis yang tinggi dan tahan terhadap enzim pencernaan, terdapat dalam unsur-unsur struktur tubuh.

Protein bentuk serabut, dibagi menjadi empat yaitu :

(a) *Kolagen*, merupakan protein utama jaringan ikat sebanyak 30%.

(b) *Elastin*, terdapat dalam urat, otot, arteri (pembuluh darah) dan jaringan elastis lain.

(c) *Keratin*, adalah protein rambut dan kuku.

(d) *Miosin*, merupakan protein utama serat otot.

(2) *Protein Globular*, berbentuk bola terdapat dalam cairan jaringan tubuh. Protein ini larut dalam larutan garam dan asam encer, dibagi menjadi empat yaitu :

(a) *Albumin*, terdapat dalam telur, susu, plasma, dan hemoglobin

(b) *Globulin*, terdapat dalam otot, serum, kuning telur, dan biji tumbuh-tumbuhan.

- (c) *Histon*, terdapat dalam jaringan-jaringan kelenjar tertentu seperti *timus* dan *pankreas*.
 - (d) *Protamin*, dihubungkan dengan *asam nukleat*.
- (3) *Protein Konjugasi*, adalah protein sederhana yang terikat dengan bahan-bahan nonasam amino. Dibagi menjadi empat, yaitu :
- (a) *Nukleoprotein*, adalah kombinasi protein dengan asam nukleat dan mengandung 9-10% fosfat. *Hidrolisis* asam nukleat menghasilkan *purin*, *pirimidin*, gula dan *asam fosfat*.
 - (b) *Lipoprotein*, adalah protein larut air yang berkonjugasi dengan *lipida* seperti *lesitin* dan kolesterol. Berfungsi sebagai pengangkut lipida dalam tubuh.
 - (c) Fosfoprotein, adalah protein yang terikat melalui ikatan *ester* dengan asam fosfat seperti kasein dalam susu.
 - (d) *Metaloprotein*, adalah protein yang terikat dengan mineral, seperti *feritin* dan *hemosiderin*.

Secara umum, sumber protein diperoleh dari :

- (1) Protein hewani, berasal dari hewan seperti daging, telur, ikan dan susu.
- (2) Protein nabati, berasal dari kacang-kacangan, diantaranya : kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelai, kacang merah, tahu dan tempe (Paath, 2004). Hal ini sebagaimana terdapat dalam firman Allah SWT Q.S. A' Basa(80) : 27-32 tentang ciptaan Allah

berupa biji-biji, buah-buahan, dan sayur-sayuran sebagai sumber protein nabati yang baik.

فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ④ وَعِنَبًا وَقَضْبًا ⑤ وَزَيْتُونًا وَخَلًّا ⑥ وَحَدَاقٍ غُلْبًا ⑦
وَفِكَهَةً وَأَبًّا ⑧ مَتَّعًا لَكُمْ وَلَا نَعْمِكُمْ ⑨

Terjemahnya :

(27)Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu (28) Anggur dan sayur-sayuran,(29) Zaitun dan kurma,(30). Kebun-kebun (yang) lebat,(31) Dan buah-buahan serta rumput-rumputan, (32) Untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

Ayat-ayat di atas menyebut aneka tumbuhan dan buah-buahan. *Biji-bijian dan anggur serta sayur-sayuran dan juga pohon zaitun serta pohon kurma, dan kebun-kebun yang lebat serta buah-buahan dan rumput-rumputan untuk kesenangan kamu dan untuk binatang-binatang ternak kamu* (Shihab, 2002).

Fungsi protein yaitu Sebagai sumber energi, pertumbuhan dan pemeliharaan, pembentukan ikatan-ikatan esensial tubuh, mengatur keseimbangan air, memelihara netralitas tubuh, pembentukan antibodi, dan mengangkut zat-zat gizi.

Kekurangan protein banyak terdapat pada masyarakat sosial ekonomi rendah. Kekurangan protein murni pada stadium berat menyebabkan *kwasiorkor* pada anak-anak di bawah lima tahun (balita). Kekurangan protein sering ditemukan secara bersamaan dengan kekurangan energi yang menyebabkan kondisi yang

dinamakan *marasmus*. Sindroma gabungan antara dua jenis kekurangan ini dinamakan kurang energi protein (KEP) (Almatsier, 2001).

4. Bahaya Kekurangan Gizi Selama Hamil

Masa hamil adalah masa dimana seorang wanita memerlukan berbagai unsur gizi yang jauh lebih banyak dari pada yang diperlukan dalam keadaan biasa. Disamping untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya sendiri, berbagai zat gizi itu juga diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan janin yang ada dalam kandungan (Sjahmien Moehji, dalam Setianingrum, 2005). Apabila kebutuhan gizi itu tidak dipenuhi maka akan terjadi berbagai gangguan baik pada ibunya sendiri maupun pada janinnya.

a. Pada Ibu

Pada setiap tahap kehamilan, seorang ibu hamil membutuhkan makanan dengan kandungan zat-zat gizi yang berbeda dan disesuaikan dengan kondisi tubuh dan perkembangan janin. Tambahan makanan untuk ibu hamil dapat diberikan dengan cara meningkatkan baik kualitas maupun kuantitas makanan ibu hamil sehari-hari, bisa juga dengan memberikan tambahan formula khusus untuk ibu hamil. Apabila makanan selama hamil tidak tercukupi maka dapat mengakibatkan kekurangan gizi sehingga ibu hamil mengalami gangguan. Gizi kurang pada ibu hamil dapat menyebabkan risiko dan komplikasi pada ibu hamil, antara lain anemia, KEK, berat badan

tidak bertambah secara normal dan terkena infeksi. Pada saat persalinan gizi kurang dapat mengakibatkan persalinan sulit dan lama, persalinan sebelum waktunya (premature), perdarahan setelah persalinan, serta operasi persalinan.

b. Pada Janin

Untuk pertumbuhan janin yang baik diperlukan zat-zat makanan yang adekuat, dimana peranan plasenta besar artinya dalam transfer zat-zat makanan tersebut. Suplai zat-zat makanan ke janin yang sedang tumbuh tergantung pada jumlah darah ibu yang mengalir melalui plasenta dan zat-zat makanan yang diangkutnya. Gangguan suplai makanan dari ibu mempengaruhi proses pertumbuhan janin dan dapat menimbulkan keguguran (abortus), bayi lahir mati (kematian neonatal), cacat bawaan, lahir dengan berat badan lahir rendah (BBLR) (Arisman, 2010).

B. Tinjauan Umum tentang Ibu Hamil yang menderita KEK

1. Pengertian

Ibu adalah seorang wanita yang telah melahirkan seseorang (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007).

Kehamilan didefinisikan sebagai fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa dan ovum dan dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi. Ibu hamil adalah seorang wanita yang mengandung dimulai dari fertilisasi sampai lahirnya janin. Kehamilan terbagi dalam 3 trimester,

dimana trimester I berlangsung dalam 12 minggu, trimester II berlangsung 15 minggu dan trimester III berlangsung 13 minggu.

Ibu hamil adalah salah satu kelompok di dalam masyarakat yang paling mudah menderita gangguan kesehatan atau rawan kekurangan gizi, sehingga pada masa kehamilan ibu hamil, memerlukan unsur-unsur gizi lebih banyak dibandingkan dengan keadaan biasanya. Selama kehamilan, ibu hamil akan mengalami proses fisiologis yaitu keadaan kesehatan fisik dan mental sebelum dan selama hamil berpengaruh terhadap keadaan janin dan waktu persalinan (Hall dalam Surasih, 2005).

Menurut Depkes RI (1995) dalam Program Perbaikan Gizi Makro menyatakan bahwa Kurang Energi Kronis merupakan keadaan dimana ibu menderita kekurangan makanan yang berlangsung menahun (kronis) yang mengakibatkan timbulnya gangguan kesehatan pada ibu.

KEK dapat terjadi pada wanita usia subur (WUS) dan pada ibu hamil (bumil). Pada ibu hamil lingkaran lengan atas digunakan untuk memprediksi kemungkinan bayi yang dilahirkan memiliki berat badan lahir rendah. Ibu hamil diketahui menderita KEK dilihat dari pengukuran LILA, adapun ambang batas LILA WUS (ibu hamil) dengan risiko KEK di Indonesia adalah 23,5 cm. Apabila ukuran LILA kurang dari 23,5 cm atau dibagian merah pita LILA, artinya wanita tersebut mempunyai risiko KEK dan diperkirakan akan melahirkan berat bayi lahir rendah (BBLR). BBLR mempunyai risiko kematian, gizi kurang, gangguan pertumbuhan dan gangguan perkembangan anak (Supariasa, 2001). Ibu KEK adalah

ibu yang ukuran LILA nya < 23,5 cm dan dengan salah satu atau beberapa kriteria sebagai berikut :

- a. Berat badan ibu sebelum hamil < 42 kg.
- b. Tinggi badan ibu < 145 cm.
- c. Berat badan ibu pada kehamilan trimester III < 45 kg.
- d. Indeks masa tubuh (IMT) sebelum hamil < 17,00
- e. Ibu menderita anemia ($Hb < 11 \text{ gr } \%$) (DepKes RI, 1995).

2. Diagnosis Kehamilan

Kehamilan normal berlangsung selama 38-40 minggu. Jika dihitung dengan ukuran hari, kehamilan akan berakhir sesudah 266 hari, atau 38 minggu pascaovulasi, atau kira-kira 40 minggu dari akhir hari pertama haid terakhir. Seorang wanita baru dapat dipastikan hamil jika pemeriksaan telah melihat (dengan ultrasonografi/USG), dan meraba bentuk janin. Namun, pemeriksaan fisik harus pula memasukkan tanda anggapan dan kemungkinan hamil. Penentuan kadar HCG (Human Chorionic Gonadotropin) di dalam urine merupakan petunjuk adanya kehamilan. Uji terhadap urine cukup peka untuk menentukan kadar HCG yang ditemukan 4 minggu sesudah HPHT (hari pertama haid terakhir), atau sekitar 2 minggu setelah pembuahan (Arisman, 2010)

3. Tanda-tanda Kehamilan

Tanda-tanda awal dari kehamilan yaitu sebagai berikut :
(Wiknjosastro dalam Agustian, 2010)

- a. Sering pening, mual, dan muntah

- b. Libido yang berubah
- c. Memiliki keinginan berbeda dari biasa (ngidam)
- d. Seringnya frekuensi buang air kecil
- e. Bertambah besarnya ukuran payudara, payudara mengencang dan puting susu mengeras yang terjadi setelah dua atau tiga minggu
- f. Kejang perut disertai bercak merah diman bercak merah sebagai tanda bahwa embrio sedang menanamkan diri pada dinding rahim yang terjadi setelah hari kedelapan hingga kesepuluh sejak evolusi bulan berjalan
- g. Areola (lingkaran sekitar puting payudara) berwarna lebih gelap
- h. Lelah berlebihan dan mudah mengantuk

4. Fisiologi Kehamilan

Kehamilan adalah periode khusus di mana kebutuhan akan sebagian nutrisi meningkat selama masa tersebut. Penambahan berat badan yang terjadi selama kehamilan disebabkan oleh peningkatan ukuran jaringan reproduksi, adanya janin dalam kandungan dan cadangan lemak dalam tubuh ibu. Selama hamil, seorang ibu akan bertambah beratnya sebanyak kurang lebih 12,5 kg (rentang 9-15 kg), di mana penambahan sebesar kurang lebih 9 kg diantaranya terjadi dalam 20 minggu terakhir (Hadyanto dalam Agustian, 2010).

Penambahan berat badan tersebut merupakan bagian dari kehamilan yang normal, karena pada kehamilan terjadi perubahan-perubahan berganda dalam tubuh wanita hamil. Perubahan-perubahan itu

terutama akan berhubungan dengan sistem endokrin, saluran pencernaan, kardiovaskular, kantong empedu, hati, ginjal dan saluran kemih (Arisman, 2010).

Kehamilan akan menyebabkan meningkatnya daya metabolisme energi. Dua proses anabolik fundamental yang bebas satu sama lain terjadi selama kehamilan. Ibu akan menjalani penyesuaian fisiologik dan metabolik selama kehamilan, yang sebenarnya serasi dengan proses-proses anabolik yang terjadi dalam janin dan plasenta. Hal tersebut dikatalisis oleh perubahan kelenjar-kelenjar endokrin pada ibu hamil sehingga memperbesar ukuran uterus, payudara, dan volume cairan darah, cairan ketuban dan massa jaringan adiposa (Nasoetion dan Darwin dalam Lubis, 2003).

4. Pengukuran LILA

Lingkar lengan atas mencerminkan tumbuh kembang jaringan lemak dan otot yang tidak berpengaruh banyak oleh cairan tubuh. Pengukuran ini berguna untuk skrining malnutrisi protein yang biasa digunakan oleh Depkes untuk mendeteksi ibu hamil dengan risiko melahirkan BBLR bila LILA < 23,5 cm (Supariasa, 2001).

Lingkar lengan atas merupakan indikator status gizi yang digunakan terutama untuk mendeteksi kurang energi protein pada anak-anak dan merupakan alat yang baik untuk mendeteksi wanita usia subur dan ibu hamil dengan risiko melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah. Hal ini sesuai dengan Depkes RI (1994) yang dikutip oleh I

Dewa Nyoman Supriasa, bahwa pengukuran LILA pada kelompok wanita usia subur (WUS) adalah salah satu cara deteksi dini yang mudah dan dapat dilaksanakan oleh masyarakat awam, untuk mengetahui kelompok berisiko kekurangan energi kronis (KEK). Adapun Tujuan Pengukuran LILA, yaitu :

- a. Mengetahui risiko KEK WUS, baik ibu hamil maupun calon ibu, untuk menepis wanita yang mempunyai risiko melahirkan BBLR.
- b. Meningkatkan perhatian dan kesadaran masyarakat agar lebih berperan dalam mencegah dan penanggulangan risiko KEK.
- c. Meningkatkan peran petugas kesehatan lintas sektoral dalam upaya perbaikan gizi WUS.
- d. Mengarahkan pelayanan kesehatan pada kelompok sasaran WUS dengan risiko KEK.

Pengukuran LILA tidak dapat digunakan untuk memantau perubahan status gizi dalam jangka pendek. Pengukuran LILA digunakan karena pengukurannya sangat mudah dan cepat. Hasil pengukuran LILA ada dua kemungkinan yaitu kurang dari 23,5 cm dan diatas atau sama dengan 23,5 cm. Apabila hasil pengukuran $< 23,5$ cm berarti risiko KEK dan $\geq 23,5$ cm berarti tidak berisiko KEK (Supriasa, 2001).

Adapun cara pengukuran LILA, yaitu :

- a. Tetapkan posisi bahu dan siku
- b. Letakkan pita antara bahu dan siku
- c. Tentukan titik tengah lengan

- d. Lingkarkan pita LILA pada tengah lengan
- e. Pita jangan terlalu ketat
- f. Pita jangan terlalu longgar
- g. Cara pembacaan skala yang benar

Dalam pengukuran LILA, ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu : pengukuran dilakukan di bagian tengah antara bahu dan siku lengan kiri (kecuali orang kidal kita ukur lengan kanan, lengan harus dalam posisi bebas, lengan baju dan otot lengan dalam keadaan tidak tegang atau kencang. Alat pengukur dalam keadaan baik dalam arti tidak kusut atau sudah dilipat-lipat sehingga permukaannya sudah tidak rata

Bagi wanita usia subur yang berisiko KEK dengan LILA $< 23,5$ cm, maka dianjurkan untuk :


- a. Makan cukup, dengan pedoman umum gizi seimbang
- b. Hidup sehat
- c. Tunda kehamilan
- d. Bila hamil segera dirujuk sedini mungkin
- e. Diberi penyuluhan dan melaksanakan anjuran

Sedangkan bagi mereka yang tidak berisiko KEK, dengan LILA $\geq 23,5$ cm, maka dianjurkan :

- a. Pertahankan kondisi kesehatan
- b. Hidup sehat

- c. Bila hamil periksakan kehamilan kepada petugas kesehatan (Supariasa, 2001).

C. Kerangka Teori



Gambar 1. Kerangka Teori

BAB III

KERANGKA KONSEP

A. Kerangka Konsep Penelitian

Kerangka konsep penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang akan diamati melalui penelitian yang dimaksud. Kerangka konsep penelitian perlu dirumuskan untuk memperoleh gambaran secara jelas ke arah mana penelitian itu berjalan, atau data apa yang dikumpulkan (Notoatmodjo, 2010). Kerangka konsep penelitian terbagi menjadi dua, yaitu :

1. Dasar Pemikiran Variabel

Berikut ini adalah penjelasan mengenai dasar pemikiran dari setiap variabel dalam penelitian ini.

a. Kurang Energi Kronik (KEK)

Salah satu masalah gizi yang dihadapi ibu hamil adalah kekurangan energi kronik (KEK). Kurang energi kronik adalah keadaan dimana ibu hamil menderita kekurangan makanan yang berlangsung menahun (kronis) yang mengakibatkan timbulnya gangguan kesehatan pada ibu (Depkes, 2002). Dengan kata lain kurang energi kronik adalah apabila asupan zat gizi yang dikonsumsi oleh ibu hamil tidak sebanding dengan kebutuhan zat gizi yang

diperlukan selama kehamilan. Asupan zat gizi sangat mempengaruhi apakah ibu hamil menderita KEK atau tidak.

Ibu hamil yang menderita KEK diperkirakan akan melahirkan berat bayi lahir rendah (BBLR). Zat-zat gizi yang diperlukan selama kehamilan terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Kebutuhan zat gizi ini akan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya usia kehamilan.

b. Asupan Energi

Kehamilan menyebabkan meningkatnya metabolisme energi, karena itu kebutuhan energi dan zat gizi lainnya meningkat selama kehamilan. Peningkatan energi dan zat gizi tersebut diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan janin, penambahan besarnya organ kandungan, perubahan komposisi dan metabolisme tubuh ibu. Kebutuhan energi untuk kehamilan yang normal perlu tambahan kira-kira 80.000 kalori selama masa kurang lebih 280 hari. Hal ini berarti perlu tambahan ekstra sebanyak kurang lebih 300 kalori setiap hari selama hamil.

Kebutuhan ibu hamil akan energi berbeda-beda setiap trimester, dan kebutuhan tersebut akan terus membesar sampai akhir kehamilan.

c. Asupan Karbohidrat

Karbohidrat merupakan sumber utama untuk tambahan kalori yang dibutuhkan selama kehamilan. Pertumbuhan dan

perkembangan janin selama dalam kandungan membutuhkan karbohidrat sebagai sumber kalori utama. Pilihan yang dianjurkan adalah karbohidrat kompleks seperti roti, sereal, nasi dan pasta. Selain mengandung vitamin dan mineral, karbohidrat kompleks juga meningkatkan asupan serat yang dianjurkan selama hamil untuk mencegah terjadinya konstipasi atau sulit buang air besar dan wasir.

d. Asupan Lemak

Energi yang tersembunyi dalam lemak ditaksir sebanyak 36.337 Kkal. Pertumbuhan dan perkembangan janin selama dalam kandungan membutuhkan lemak sebagai sumber kalori utama. Lemak merupakan sumber tenaga yang vital dan untuk pertumbuhan jaringan plasenta. Pada kehamilan yang normal, kadar lemak dalam aliran darah akan meningkat pada akhir trimester III. Tubuh wanita hamil juga menyimpan lemak yang akan mendukung persiapannya untuk menyusui setelah bayi lahir.

e. Asupan Protein

Kebutuhan wanita akan protein juga membubung sampai 68%. Jumlah protein yang harus tersedia sampai akhir kehamilan diperkirakan sebanyak 925 gr yang tertimbun dalam jaringan ibu, plasenta, serta bayi. Kebutuhan protein yang lebih tinggi terjadi pada trimester kedua dan ketiga. Tambahan sebesar 10-16 gr/hari dianjurkan untuk menutupi kebutuhan pembentukan jaringan pada bayi dan ibunya. Hampir 70% protein dipakai untuk kebutuhan anak


yang dikandungnya. Asupan protein yang cukup sangat penting bagi ibu hamil sebab jika kandungan protein dalam makanan ibu hamil sangat rendah maka akan berpengaruh terhadap berat dan panjang badan bayi yang kelak dilahirkan.

Berdasarkan penjelasan di atas, sehingga pada penelitian ini, gambaran asupan zat gizi ibu hamil yang menderita KEK menjadi perhatian peneliti. Kekurangan energi kronik (KEK) adalah variabel dependen, yang dipengaruhi oleh asupan zat gizi ibu hamil (variabel independen). Asupan zat gizi ibu hamil terdiri dari energi, karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral.

Apalagi melihat kenyataan masih tingginya prevalensi KEK saat ini. Jika tidak ditangani sebaik mungkin maka angka ini akan semakin meningkat, dan tentunya pula akan semakin banyak bayi yang lahir dengan berat lahir rendah.

2. Model Hubungan antara Variabel

Berdasarkan kerangka teori pada bab sebelumnya, maka dapat dibuat model hubungan antar variable dalam bentuk kerangka konsep penelitian seperti gambar 2 berikut ini.



Gambar 2. Kerangka Konsep

B. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah definisi untuk membatasi ruang lingkup atau pengertian variabel-variabel yang diamati atau diteliti yang bermanfaat untuk mengarahkan kepada pengukuran atau pengamatan terhadap variabel-variabel yang bersangkutan serta pengembangan instrumen (Notoatmodjo, 2010).

Variabel adalah sesuatu yang digunakan sebagai ciri, sifat atau ukuran yang dimiliki atau didapatkan oleh satuan penelitian tentang sesuatu konsep pengertian tertentu. Di samping variabel harus dioperasionalkan juga perlu dijelaskan cara atau metode pengukuran, hasil ukur atau kategorinya, serta skala pengukuran yang digunakan (Notoatmodjo, 2010). Definisi Operasional penelitian ini adalah :

1. Kurang Energi Kronik

Adalah suatu kondisi ibu hamil mengalami kekurangan asupan atau tidak yang diukur menggunakan pita LILA. Dengan kriteria objektif sebagai berikut :

KEK : Bila hasil pengukuran LILA $< 23,5$ cm

Tidak KEK : Bila hasil pengukuran LILA $\geq 23,5$ cm

2. Asupan Zat Gizi

Jumlah zat-zat gizi yang terkandung dalam makanan yang dikonsumsi ibu hamil dalam jangka waktu 24 jam yang terdiri dari energi, karbohidrat, lemak dan protein.

a. Asupan Energi

Ketercukupan konsumsi makanan sumber energi yang diukur dengan menggunakan formulir recall 24 jam, dilakukan selama 2x24 jam yang mencakup makanan yang dikonsumsi ibu hamil sejak sarapan pagi, makanan selingan, makan siang, selingan, makan malam dan makanan selingan kemudian dianalisis menggunakan program world food dengan kriteria objektif sebagai berikut :

Cukup : Bila asupan energi \geq 80% dari AKG

Kurang : Bila asupan energi $<$ 80% dari AKG

b. Asupan Karbohidrat

Ketercukupan konsumsi makanan sumber karbohidrat yang diukur dengan menggunakan formulir recall 24 jam, dilakukan selama 2x24 jam yang mencakup makanan yang dikonsumsi ibu hamil sejak sarapan pagi, makanan selingan, makan siang, selingan, makan malam dan makanan selingan kemudian dianalisis menggunakan program world food dengan kriteria objektif sebagai berikut :

Cukup : Bila asupan karbohidrat \geq 80% dari AKG

Kurang : Bila asupan karbohidrat $<$ 80% dari AKG

c. Asupan Lemak

Ketercukupan konsumsi makanan sumber lemak yang diukur dengan menggunakan formulir recall 24 jam, dilakukan

selama 2x24 jam yang mencakup makanan yang dikonsumsi ibu hamil sejak sarapan pagi, makanan selingan, makan siang, selingan, makan malam dan makanan selingan kemudian dianalisis menggunakan program world food dengan kriteria objektif sebagai berikut :

Cukup : Bila asupan lemak \geq 80% dari AKG

Kurang : Bila asupan lemak $<$ 80% dari AKG

d. Asupan Protein

Ketercukupan konsumsi makanan sumber protein yang diukur dengan menggunakan formulir recall 24 jam, dilakukan selama 2x24 jam yang mencakup makanan yang dikonsumsi ibu hamil sejak sarapan pagi, makanan selingan, makan siang, selingan, makan malam dan makanan selingan kemudian dianalisis menggunakan program world food dengan kriteria objektif sebagai berikut :

Cukup : Bila asupan protein \geq 80% dari AKG

Kurang : Bila asupan protein $<$ 80% dari AKG

(Supriasa, 2001).

BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah observasional dengan pendekatan deskriptif yaitu jenis penelitian yang diarahkan untuk mendeskripsikan atau menguraikan suatu keadaan di dalam suatu komunitas atau masyarakat (Notoatmodjo, 2010).

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menjelaskan tempat atau lokasi penelitian dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk membatasi ruang lingkup penelitian. (Notoatmodjo, 2010). Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar yang mencakup dua puskesmas yakni Puskesmas Bulukunyi dan Puskesmas Polongbangkeng Selatan.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu hamil yang berada di wilayah Kecamatan Polongbangkeng Selatan dari bulan Maret-Mei 2011 dengan jumlah 95 orang.

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian ibu hamil yang berada di wilayah Kecamatan Polongbangkeng Selatan. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan non random sampling dengan teknik purposive sampling. Dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Ibu hamil yang menderita kurang energi kronik (KEK)
- b. Bersedia diwawancarai

Sehingga diperoleh 40 sampel ibu hamil yang menderita kurang energi kronik.

D. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data primer yaitu pengumpulan data dilakukan secara langsung oleh peneliti (Budiarto, 2001). Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara sebagai berikut:

a. Metode Wawancara

Wawancara adalah suatu metode yang dipergunakan untuk mengumpulkan data, di mana peneliti mendapatkan keterangan atau informasi secara lisan dari seseorang sasaran penelitian (responden), atau bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tersebut (*face to face*). (Notoatmodjo, 2010). Metode ini digunakan untuk memperoleh

data primer. Data primer yang dimaksud adalah data mengenai asupan zat gizi ibu hamil dengan menggunakan formulir recall 24 jam. Sementara untuk data sekunder berupa data secara umum mengenai ibu hamil (nama, alamat, dll) dapat diperoleh di puskesmas Bulukunyi dan Puskesmas Polongbangkeng Selatan.

b. Metode Pengukuran

Pengukuran merupakan suatu metode pengambilan data dengan pengukuran secara langsung parameter-parameter yang diinginkan. Dalam penelitian ini pengukuran yang dilakukan adalah pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA) pada ibu hamil dengan menggunakan pita LILA dengan cara pengukuran sebagai berikut :

- (1) Tetapkan posisi bahu dan siku
- (2) Letakkan pita antara bahu dan siku
- (3) Tentukan titik tengah lengan
- (4) Lingkarkan pita LILA pada tengah lengan
- (5) Pita jangan terlalu ketat
- (6) Pita jangan terlalu longgar
- (7) Cara pembacaan skala yang benar

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah bila pengumpulan data yang diinginkan diperoleh dari orang lain atau tempat lain dan tidak dilakukan oleh peneliti sendiri (Budiarto, 2001). Data sekunder dalam penelitian ini

meliputi gambaran umum Puskesmas Bulukunyi dan Puskesmas Polongbangkeng Selatan, data kohort Ibu hamil dan KMS Ibu hamil.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang akan digunakan untuk pengumpulan data (Notoatmodjo, 2010). Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Formulir Recall 24 jam digunakan untuk mengetahui asupan zat gizi yang dikonsumsi ibu hamil selama 2 x 24 jam.
2. Pita LILA digunakan untuk mengukur lingkaran lengan atas ibu hamil

F. Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Dalam suatu penelitian, pengolahan data merupakan salah satu langkah yang penting sebab data yang diperoleh dari penelitian masih mentah, belum memberikan informasi apa-apa dan belum siap untuk disajikan. Pengolahan data tergantung pada kualitas data itu sendiri. Secanggih apa pun program komputer yang digunakan, hasilnya ditentukan oleh kualitas data itu sendiri. Proses pengolahan data melalui tahap-tahap sebagai berikut :

a. Editing

Dalam tahap ini dilakukan pemeriksaan antara lain kesesuaian jawaban dan kelengkapan pengisian responden. Secara umum editing merupakan kegiatan untuk pengecekan dan perbaikan isian formulir atau kuesioner (Notoatmodjo, 2010)

b. Coding

Setelah semua kuesioner diedit atau disunting, selanjutnya dilakukan pemberian kode, yakni mengubah data berbentuk kalimat atau huruf menjadi data angka atau bilangan. Misalnya jenis kelamin : 1 = laki-laki, 2 = perempuan. Koding atau pemberian kode sangat berguna dalam memasukkan data (Notoatmodjo, 2010).

c. Memasukkan Data

Data yakni jawaban-jawaban dari masing-masing responden yang dalam bentuk kode dimasukkan ke dalam program komputer yang telah ditetapkan. (Notoatmodjo, 2010).

2. Analisis Data

Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan program komputerisasi dan program world food. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode Analisis Univariate. Analisis ini bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik setiap variabel penelitian. Analisis ini berupa distribusi frekuensi dan persentase

dari tiap variabel seperti umur, tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan, status ekonomi, dan sebagainya (Notoatmodjo, 2010).

G. Penyajian Data

Data yang telah diolah dan dianalisis kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan dideskriptifkan dalam bentuk kalimat.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 95 ibu hamil dengan metode purposive sampling maka diperoleh sampel sebanyak 40 ibu hamil yang menderita kurang energi kronik. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar yang mencakup dua wilayah kerja Puskesmas, yakni Puskesmas Polongbangkeng Selatan dan Puskesmas Bulukunyi. Data sekunder sampel diperoleh dari data di bagian KIA kedua puskesmas tersebut yang tercatat sampai bulan Mei 2011. Sedangkan data primer diperoleh dengan pengukuran LILA dan pengisian formulir recall 24 jam di lokasi atau rumah sampel, data primer diambil mulai bulan Maret 2011.

B. Hasil Penelitian

1. Umur Ibu Hamil

Tabel 1.2 Distribusi Frekuensi Karakteristik Ibu Hamil Penderita KEK Menurut Umur di Wilayah Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar Tahun 2011

Umur	Frekuensi (n)	Persentase (%)
< 20 tahun	1	2,5
20-35 tahun	33	82,5
> 35 tahun	6	15,0
Total	40	100,0

Sumber : Data Primer, 2011

Dari tabel 1.2 di atas diperoleh bahwa proporsi ibu hamil penderita KEK tertinggi yakni pada umur 20-35 tahun sebanyak 33 orang (82,5%), dan terendah yakni pada umur < 20 tahun sebanyak 1 orang (2,5%).

2. Usia Kehamilan

Tabel 1.3 Distribusi Frekuensi Karakteristik Ibu Hamil Penderita KEK Menurut Usia Kehamilan di Wilayah Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar Tahun 2011

Usia Kehamilan	Frekuensi (n)	Persentase (%)
≤ 12 minggu	6	15,0
13-24 minggu	16	40,0
≥ 25 minggu	18	45,0
Total	40	100,0

Sumber : Data Primer, 2011

Dari tabel 1.3 di atas diperoleh bahwa ibu hamil dengan usia kehamilan tertinggi yakni ≥ 25 minggu sebanyak 18 orang (45,0 %) dan terendah yakni ibu hamil dengan usia kehamilan ≤ 12 minggu sebanyak 6 orang (15,0 %).

3. Pendidikan Ibu Hamil

Tabel 1.4 Distribusi Frekuensi Karakteristik Ibu Hamil Penderita KEK Menurut Pendidikan di Wilayah Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar Tahun 2011

Pendidikan	Frekuensi (n)	Persentase (%)
SD	9	22,5
SMP	19	47,5
SMA	9	22,5
S1	3	7,5
Total	40	100,0

Sumber : Data Primer, 2011

Dari tabel 1.4 di atas diperoleh bahwa proporsi ibu hamil penderita KEK dengan pendidikan tertinggi yakni SMP sebanyak 19 orang (47,5 %), dan ibu hamil dengan pendidikan terendah yakni S1 sebanyak 3 orang (7,5 %).

4. Pekerjaan Ibu Hamil

Tabel 1.5 Distribusi Frekuensi Karakteristik Ibu Hamil Penderita KEK Menurut Pekerjaan di Wilayah Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar Tahun 2011

Pekerjaan	Frekuensi (n)	Persentase (%)
IRT	35	87,5
PNS	2	5,0
Wiraswasta	1	2,5
Petani	2	5,0
Total	40	100,0

Sumber : Data Primer, 2011

Dari tabel 1.5 di atas diperoleh bahwa proporsi ibu hamil tertinggi pada pekerjaan IRT sebanyak 35 orang (87,5 %), dan ibu hamil dengan pekerjaan terendah yakni wiraswasta sebanyak 1 orang (2,5 %).

5. Asupan Energi

Tabel 1.6 Distribusi Frekuensi Asupan Energi Ibu Hamil Penderita KEK di Wilayah Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar Tahun 2011

Asupan Energi	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Cukup	4	10,0
Kurang	36	90,0
Total	40	100,0

Sumber : Data Primer, 2011

Berdasarkan tabel 1.6 di atas menunjukkan bahwa dari hasil food recall 24 jam diperoleh asupan energi ibu hamil yang cukup sebanyak 4

orang (10,0 %) dan ibu hamil yang kurang asupan energinya sebanyak 36 orang (90,0 %).

6. Asupan Karbohidrat

Tabel 1.7 Distribusi Frekuensi Asupan Karbohidrat Ibu Hamil Penderita KEK di Wilayah Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar Tahun 2011

Asupan Karbohidrat	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Cukup	1	2,5
Kurang	39	97,5
Total	40	100,0

Sumber : Data Primer, 2011

Berdasarkan tabel 1.7 di atas menunjukkan bahwa dari hasil food recall 24 jam diperoleh asupan karbohidrat ibu hamil yang cukup sebanyak 1 orang (2,5 %) dan ibu hamil yang kurang asupan karbohidratnya sebanyak 39 orang (97,5 %).

7. Asupan Lemak

Tabel 1.8 Distribusi Frekuensi Asupan Lemak Ibu Hamil Penderita KEK di Wilayah Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar Tahun 2011

Asupan Lemak	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Cukup	20	50,0
Kurang	20	50,0
Total	40	100,0

Sumber : Data Primer, 2011

Berdasarkan tabel 1.8 di atas menunjukkan bahwa dari hasil food recall 24 jam diperoleh asupan lemak ibu hamil yang cukup sebanyak 20 orang (50,0 %) dan ibu hamil yang kurang asupan lemaknya sebanyak 20 orang (50,0 %).

8. Asupan Protein

Tabel 1.9 Distribusi Asupan Protein Ibu Hamil Penderita KEK di Wilayah Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar Tahun 2011

Asupan Protein	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Cukup	12	30,0
Kurang	28	70,0
Total	40	100,0

Sumber : Data Primer, 2011

Berdasarkan tabel 1.9 di atas menunjukkan bahwa dari hasil food recall 24 jam diperoleh asupan protein ibu hamil yang cukup sebanyak 12 orang (30,0 %) dan ibu hamil yang kurang asupan proteinnya sebanyak 28 orang (70,0 %).

C. PEMBAHASAN

1. Asupan Energi

Asupan makanan adalah kebiasaan seseorang dalam mengkonsumsi jumlah makanan untuk memenuhi kebutuhan energi, karbohidrat, lemak dan protein dari berbagai jenis bahan makanan. Tujuan penataan gizi pada ibu hamil adalah untuk memenuhi kebutuhan energi, protein, karbohidrat, dan lemak yang berguna untuk pertumbuhan dan perkembangan janin.

Seperti yang kita ketahui kehamilan menyebabkan meningkatnya metabolisme energi, karena itu kebutuhan energi dan zat gizi lainnya meningkat selama kehamilan. Peningkatan energi dan zat gizi tersebut diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan janin, penambahan

besarnya organ kandungan, perubahan komposisi dan metabolisme tubuh ibu. Kekurangan zat gizi tertentu yang diperlukan pada saat hamil dapat menyebabkan janin tumbuh tidak sempurna (Zulhaida Lubis, 2003).

Energi ibu hamil harus sesuai dengan kebutuhan yaitu energi yang seimbang dengan perkembangan masa kehamilan. Kebutuhan akan energi pada trimester I sedikit sekali meningkat. Setelah itu, sepanjang trimester II dan III, kebutuhan akan terus membesar sampai pada akhir kehamilan. Energi tambahan selama trimester II diperlukan untuk pemekaran jaringan ibu, yaitu penambahan volume darah, pertumbuhan uterus dan payudara, serta penumpukan lemak. Sepanjang trimester III, energi tambahan dipergunakan untuk pertumbuhan janin dan plasenta (Arisman, 2010).

Kebutuhan kalori wanita normal umur 19-29 tahun menurut Angka Kecukupan Gizi 2004 sekitar 1900 kkal, kebutuhan kalori ibu hamil pada trimester II membutuhkan 300 kkal sehingga menjadi sekitar 2200 kkal, artinya penelitian ini disimpulkan bahwa semakin banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung zat gizi yang sesuai dengan kebutuhan zat gizi maka ibu hamil dapat terjaga kesehatannya selama masa kehamilan.

Sebagaimana Islam telah menganjurkan mereka untuk memanfaatkan dan mensyukuri tanda kekuasaan Allah berupa zaitun, korma, anggur dan segala macam buah-buahan sebagai sumber energi

yang baik bagi ibu hamil. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Nahl(16) : 11.

يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾

Terjemahnya :

Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman; zaitun, korma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan.

Ayat di atas menguraikan anugerah serta bukti kuasa-Nya yang lain dengan menyatakan bahwa : Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanaman berupa *zaitun, korma, anggur* dan *segala macam buah-buahan*. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan (Shihab, 2002).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar ibu hamil mengkonsumsi makanan dengan asupan energi yang kurang. Hal ini dapat dilihat berdasarkan persentase, dari 40 ibu hamil yang menderita kurang energi kronik hanya sebanyak 4 orang (10,0 %) yang asupan energinya cukup sedangkan 36 orang lainnya memiliki asupan energi yang kurang.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni, 2007 bahwa asupan energi berhubungan dengan kejadian KEK pada ibu hamil dengan analisis statistik diperoleh nilai $p(0,000) < (0,05)$.

2. Asupan Karbohidrat

Karbohidrat sebagai salah satu zat gizi merupakan nama kelompok zat-zat organik yang mempunyai struktur molekul yang berbeda-beda, meski terdapat persamaan-persamaan dari sudut kimia dan fungsinya.

Sumber karbohidrat adalah padi-padian atau sereal, umbi-umbian, kacang-kacang kering, dan gula. Hasil olahan bahan-bahan ini adalah bihun, mie, roti, tepung-tepungan, selai, sirup, dan sebagainya. Sebagian besar sayur dan buah tidak banyak mengandung karbohidrat. Sayur umbi-umbian seperti wortel, dan bit serta sayur kacang-kacangan relatif lebih banyak mengandung karbohidrat daripada sayur daun-daunan. Bahan makanan hewani seperti daging, ayam, ikan, telur, dan susu sedikit sekali mengandung karbohidrat. Sumber karbohidrat yang banyak dimakan sebagai makanan pokok di Indonesia adalah beras, jagung, ubi, singkong, talas, dan sagu (Almatsier, 2001).

Sebagaimana terdapat dalam Firman Allah SWT Q.S ‘Abasa (80) : 27 tentang ciptaan Allah berupa biji-bijian sebagai sumber karbohidrat.

فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا

Terjemahnya :

Lalu Kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu,

Ayat di atas menunjukkan tanda kekuasaan Allah yang lain yakni *lalu kami tumbuhkan biji-bijian di muka bumi itu* (Shihab, 2002).

Sumber utama karbohidrat di dalam makanan berasal dari tumbuh-tumbuhan, dan hanya sedikit saja yang termasuk bahan makanan hewani. Di dalam tumbuhan karbohidrat mempunyai dua fungsi utama, ialah sebagai simpanan energi dan sebagai penguat struktur tumbuhan tersebut. Yang merupakan sumber energi terutama terdapat dalam bentuk zat tepung (*amylum*) dan zat gula (mono dan disakarida). Timbunan zat tepung terdapat di dalam biji, akar, dan batang. Gula terdapat di dalam daging buah atau di dalam cairan tumbuhan di dalam batang (tebu).

Fungsi utama karbohidrat adalah menyediakan energi bagi tubuh, selain itu juga sebagai pemberi rasa manis pada makanan, penghemat protein, pengatur metabolisme lemak, dan membantu pengeluaran feses. Karbohidrat juga merupakan bagian dari struktur sel dalam bentuk glikoprotein. Reseptor selular yang terdapat pada permukaan membran sel, adalah suatu glikoprotein dan di antaranya merupakan reseptor bagi hormon. Simpanan energi di dalam otot dan hati terdapat sebagai glikogen, salah satu bentuk karbohidrat yang mudah dimobilisasikan bila badan memerlukan banyak energi. Cadangan karbohidrat ini tidak begitu besar, sehingga cepat menjadi susut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar ibu hamil mengkonsumsi asupan karbohidrat yang kurang. Dari 40 ibu hamil, hanya 1 orang (2,5%) yang mempunyai asupan karbohidrat yang cukup.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Rahmi, 2010 dengan hasil analisis bivariat menggunakan uji-chi

square $P < 0,05$ diperoleh ada hubungan asupan karbohidrat dengan status gizi pada ibu hamil, artinya ibu hamil yang asupan karbohidratnya kurang akan lebih rentan mengalami status gizi kurang dibandingkan ibu hamil yang asupan karbohidratnya cukup.

3. Asupan Lemak

Lemak adalah sekelompok ikatan organik yang terdiri atas unsur-unsur Carbon (C), Hidrogen (H) dan Oksigen (O), yang mempunyai sifat dapat larut dalam zat-zat pelarut tertentu. Menurut sumbernya kita membedakan lemak nabati dan lemak hewani. Lemak nabati berasal dari bahan makanan tumbuh-tumbuhan, sedangkan lemak hewani berasal dari binatang, termasuk ikan, telur dan susu.

Sebagaimana Islam telah menganjurkan untuk meminum susu yang dihasilkan dari binatang-binatang ternak. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nahl(16) : 66

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۗ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِمْ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ ﴿١٦﴾

Terjemahnya :

Dan Sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari pada apa yang berada dalam perutnya (berupa) susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya.

Ayat di atas menguraikan anugerah serta bukti kuasa-Nya yang lain dengan menyatakan bahwa : Kami juga menganugerahkan binatang-

binatang untuk kamu, antara lain ternak. Dan *Sesungguhnya pada binatang-binatang ternak benar-benar terdapat Ibrah*, yakni pelajaran bagi kamu. Melalui pengamatan dan pemanfaatan binatang-binatang itu, kamu dapat memperoleh bukti kekuasaan Allah dan karunia-Nya. *Kami memberi kamu minum dari sebagian*, yakni susu murni yang penuh gizi, yang ada dalam perutnya (Shihab, 2002).

Fungsi lemak di dalam makanan yakni sebagai sumber energi. Lemak dan minyak merupakan sumber energi yang paling padat yang menghasilkan 9 kkalori untuk tiap gram, yaitu 2 ½ kali besar energi yang dihasilkan oleh karbohidrat dan protein dalam jumlah yang sama. Sebagai simpanan lemak, lemak merupakan cadangan energi tubuh paling besar. Simpanan ini berasal dari konsumsi berlebihan salah satu atau kombinasi zat-zat energi : karbohidrat, lemak, dan protein. Lemak tubuh pada umumnya disimpan sebagai berikut : 50 % di jaringan bawah kulit (subkutan), 45 % di sekeliling organ dalam rongga perut dan 5 % di jaringan intramuskuler.

Selain itu lemak juga berfungsi sebagai sumber asam lemak esensial (asam linoleat dan asam linolenat), pelumas, alat angkut vitamin larut lemak, menghemat protein, memelihara suhu tubuh, pelindung organ tubuh dan memberi rasa kenyang dan lezat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah ibu hamil yang mempunyai asupan lemak yang cukup sama jumlahnya dengan ibu hamil yang kurang asupan lemaknya yaitu masing-masing 20 orang (50,0%).

Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Supariasa, 2001 bahwa perubahan jaringan lemak akan menggambarkan perubahan keseimbangan energi. Artinya konsumsi lemak yang kurang akan mengganggu keseimbangan energi.

4. Asupan Protein

Protein adalah bagian dari semua sel hidup dan merupakan bagian terbesar tubuh sesudah air. Seperlima bagian tubuh adalah protein, separuhnya ada di dalam otot, seperlima di dalam tulang dan tulang rawan, sepersepuluh di dalam kulit dan selebihnya di dalam jaringan lain dan cairan tubuh. Semua enzim berbagai hormon, pengangkut zat-zat gizi dari darah, matriks intraseluler dan sebagainya adalah protein. Di samping itu asam amino yang membentuk protein bertindak sebagai prekursor sebagian besar koenzim hormon, asam nukleat, dan molekul-molekul yang esensial dalam kehidupan.

Protein adalah zat yang tersusun dari berbagai asam amino. Protein di dalam tubuh diubah menjadi asam amino. Asam amino di dalam tubuh diedarkan melalui pembuluh darah dan jantung. Dari 26 macam asam amino, tubuh kita membutuhkan 10 macam asam amino yang tidak dapat dibuat oleh tubuh kita. Jika satu saja dari kesepuluh itu tidak ada, maka tubuh akan mengalami gangguan seperti penyakit HO (*hongerodema*) atau busung lapar, yaitu tertimbunnya cairan dalam jaringan tubuh sedangkan kekurangan protein yang diderita oleh balita disebut *kwasiorkor*.

Protein dalam makanan terlihat dalam pembentukan jaringan dan berbagai fungsi metabolisme yang spesifik. Protein merupakan sumber energi yang memberikan 4 kkal/gr sama dengan karbohidrat.

Fungsi protein yaitu sebagai sumber energi, pertumbuhan dan pemeliharaan, pembentukan ikatan-ikatan esensial tubuh, mengatur keseimbangan air, memelihara netralitas tubuh, pembentukan antibodi, dan mengangkut zat-zat gizi.

Menurut sumbernya, protein terbagi menjadi protein nabati dan protein hewani. Protein nabati berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti kacang-kacangan, diantaranya : kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelai, kacang merah, tahu dan tempe dan protein hewani berasal dari hewan seperti daging, telur, ikan dan susu.

Sebagaimana Islam telah menganjurkan mereka untuk memanfaatkan dan mensyukuri segala sesuatu yang telah Allah ciptakan, termasuk binatang ternak yang dapat kamu makan. Makanan ini sebagai sumber protein hewani yang baik bagi ibu hamil. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nahl(16) : 5.

وَاللّٰهُمَّ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٥﴾

Terjemahnya :

Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan.

Penggalan ayat di atas menyatakan bahwa : *Dan dia*, yakni Allah SWT, yang telah menciptakan binatang ternak untuk kamu, padanya ada

bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat dan sebagiannya kamu makan (Shihab, 2002).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar ibu hamil mempunyai asupan protein yang kurang. Berdasarkan persentase terdapat 28 ibu hamil (70,0 %) yang kurang asupan proteinnya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Syahrini, 2009 dengan hasil analisis statistik diperoleh nilai p (0,029) < 0,05, hal ini berarti ada hubungan asupan protein dengan kejadian KEK pada ibu hamil.

5. Asupan Makanan dalam Islam

Terdapat ungkapan mengatakan, siapa Anda adalah apa yang Anda makan. Bagaimana Anda juga apa yang Anda makan. Makanan demikian penting dalam kehidupan manusia sepanjang masa sehingga dibicarakan oleh semua orang dalam berbagai stratanya. Sejumlah jenis makanan dianjurkan untuk dikonsumsi sedangkan sejumlah lainnya diwanti-wanti agar tidak dikonsumsi baik karena pantangan kesehatan maupun karena pantangan kepercayaan. Oleh karena itu, akan dibahas mengenai makanan halal dan thayyib dan pola makan dalam Islam.

a. Makanan Halal dan Thayyib

Makanan adalah bahan selain obat yang mengandung zat-zat gizi dan atau unsur-unsur/ikatan kimia yang dapat diubah menjadi zat gizi oleh tubuh, yang berguna bila dimasukkan ke dalam tubuh. Kata halalan, dalam bahasa Arab berasal dari kata halla yang berarti 'lepas'

atau 'tidak terikat'. Secara etimologi kata halalan berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya. Atau diartikan sebagai segala sesuatu yang bebas dari bahaya duniawi dan ukhrawi. Sedangkan kata thayyib berarti 'lezat', 'baik', 'sehat', 'menentramkan' dan 'paling utama.' Dalam konteks makanan kata thayyib berarti makanan yang tidak kotor dari segi zatnya atau rusak (kadaluarsa), atau bercampur benda najis. Ada juga yang mengartikan sebagai makanan yang mengundang selera bagi yang akan mengkonsumsinya dan tidak membahayakan fisik serta akalnya. Juga ada yang mengartikan sebagai makanan yang sehat, proporsional dan aman.

Dalam Islam, asupan makanan yang dikonsumsi seorang muslim tidak hanya harus baik menurut standar higienis (thayyib) melainkan juga baik menurut substansi dan cara memperolehnya (halal). Selain menjadi prasyarat asupan bagi seorang Muslim, kethayyiban juga dituntut agar mengonsumsi yang halal. Sebab, makanan yang secara higienis memenuhi standar empat sehat lima sempurna memang dapat menyehatkan tubuh tetapi jika tidak halal baik substansi maupun cara mendapatkannya akan dapat memberi pengaruh pada kemajalan jiwa dan penyimpangan perilaku.

Makanan yang halal, yaitu makanan yang diijinkan bagi seorang muslim untuk memakannya. Islam menghalalkan sesuatu yang baik-baik. Makanan yang haram adalah terlarang seorang

muslim untuk memakannya. Banyak pendapat yang menterjemahkan makanan "halal" tersebut. Akan tetapi pada umumnya dapat dikatakan makanan tersebut halal bila :

- (1) Tidak berbahaya atau mempengaruhi fungsi tubuh dan mental yang normal.
- (2) Bebas dari "najis (filth)" dan produk tersebut bukan berasal dari bangkai dan binatang yang mati karena tidak disembelih atau diburu.
- (3) Bebas dari bahan-bahan yang berasal dari babi dan beberapa binatang lain yang tidak dapat dimakan oleh seorang muslim kecuali dalam keadaan terpaksa.
- (4) Diperoleh sesuai dengan yang sudah ditentukan dalam Islam

Makanan sehat adalah makanan yang mengandung gizi cukup dan seimbang sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an, diantaranya Q.S An-Nahl(16) : 14 yang menganjurkan untuk mengkonsumsi daging segar, ikan. Sementara Q.S Al-Mu'minuun(23) : 19 untuk mengkonsumsi makanan nabati. Q.S Al-Mu'minuun(23) : 21 untuk mengkonsumsi daging hewan ternak berikuk air susunya, sedangkan Q.S An-Nahl(16): 69 memerintahkan untuk mengkonsumsi madu sebagai pengobatan. Makanan yang seimbang artinya sesuai dengan kebutuhan konsumen tidak terlalu berlebihan (tabdzir) atau berkekurangan, tidak melampaui batas yang wajar.

Mengonsumsi makanan yang halal dan thayyib sangat erat kaitannya dengan masalah iman dan takwa. Keterikatan ini telah Allah SWT tegaskan dalam QS. Al-Maidah(4) : 88. Penggalan pertama ayat ini memerintahkan orang-orang beriman untuk mengonsumsi makanan yang halal dan thayyib yang telah Allah sediakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sementara penggalan kedua dari ayat ini mengingatkan agar orang-orang beriman berhati-hati dan waspada dalam memilih makanan yang hendak dikonsumsinya, dan selalu berupaya meraih karunia Allah SWT pada saat mengkonsumsinya. Ayat di atas menekankan kecuali substansi materi makanan harus halal dan thayyib juga segi kehalalan dalam mendapatkannya.

Makanan halal dan thayyib akan mendatangkan berkah. Yaitu berkah (barakah) yang secara harfiah berarti suatu kebaikan yang membawa kebaikan lain dalam kaitan makanan yang halal dan thayyib berdampak positif terhadap jiwa dan perilaku manusia. Sebaliknya, makanan yang haram atau diperoleh melalui cara yang tidak halal akan berdampak negatif. Inilah rizki halal dan thayyib yang diperintahkan di banyak ayat dan surah berbeda dalam Al-Qur'an yang mengandung berkah namun sering kita abaikan, yang hakikatnya mengabaikan perintah Al-Qur'an. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S An-Nahl(16) : 114 tentang perintah memakan makanan yang halal dan baik.

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ



Terjemahnya :

Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.

Pemilihan kata makan di samping karena merupakan kebutuhan pokok manusia juga karena makanan mendukung aktifitas manusia. Tanpa makanan, manusia lemah dan tidak dapat melakukan kegiatan.

Ayat di atas memerintahkan untuk memakan yang halal lagi baik. Tidak semua makanan halal otomatis baik karena yang dinamakan halal terdiri dari empat macam yaitu wajib, sunah, mubah, dan makruh. Selanjutnya, tidak semua yang halal sesuai dengan kondisi masing-masing pribadi. Ada yang halal buat si A karena memiliki kondisi kesehatan tertentu, dan ada yang kurang baik untuknya walau baik untuk yang lain. Ada makanan yang halal tetapi tidak bergizi, dan ketika itu pula menjadi kurang baik. Yang diperintahkan oleh Al-Qur'an adalah yang halal dan baik (Shihab, 2002).

b. Pola Makan dalam Islam

Pola makan dapat diartikan suatu sistem, cara kerja atau usaha untuk melakukan sesuatu. Dengan demikian, pola makan yang sehat dapat diartikan sebagai suatu cara atau usaha untuk melakukan

kegiatan makan secara sehat. Jadi pola makan juga ikut menentukan kesehatan bagi tubuh kita.

Sedangkan yang dimaksud pola makan sehat dalam penelitian ini adalah suatu cara atau usaha dalam pengaturan jumlah dan jenis makanan dengan maksud tertentu seperti mempertahankan kesehatan, status nutrisi, mencegah atau membantu kesembuhan penyakit. Dalam pola makan sehari-hari seseorang harus menjaga dan berhubungan dengan kebiasaan kesehariannya.

Nutrisi sangat berguna untuk menjaga kesehatan dan mencegah penyakit. Selain karena faktor kekurangan nutrisi, akhir-akhir ini juga muncul penyakit akibat salah pola makan seperti kelebihan makan atau makan makanan yang kurang seimbang. Bahkan, kematian akibat penyakit yang timbul karena pola makan yang salah / tidak sehat belakangan ini cenderung meningkat. Penyakit akibat pola makan yang kurang sehat tersebut diantaranya diabetes melitus, hiperkolesterolemia, penyakit kanker, penyakit arteri koroner, sirtrosis, osteoporosis, dan beberapa penyakit kardiovaskuler.

Untuk menghindari penyakit-penyakit akibat pola makan yang kurang sehat, diperlukan suatu pedoman bagi individu, keluarga, atau masyarakat tentang pola makan yang sehat. Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa pola makan itu dibentuk sejak masa kanak-kanak yang akan terbawa hingga dewasa. Oleh karena itu, untuk membentuk pola makan yang baik sebaiknya dilakukan sejak masa kanak-kanak.

Namun sebagai orang tua harus mengetahui bagaimana kebiasaan dan karakteristik anaknya.

Pedoman pola makan sehat untuk masyarakat secara umum yang sering digunakan adalah pedoman Empat Sehat Lima Sempurna, Makanan Triguna, dan pedoman yang paling akhir diperkenalkan adalah 13 Pesan dasar Gizi Seimbang. Pengertian makanan triguna adalah bahwa makanan atau diet sehari-hari harus mengandung: 1) karbohidrat dan lemak sebagai zat tenaga; 2) protein sebagai zat pembangun; 3) vitamin dan mineral sebagai zat pengatur.

Pedoman 13 Pesan Dasar Gizi Seimbang menyampaikan pesan-pesan untuk mencegah masalah gizi ganda dan mencapai gizi seimbang guna menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang andal. Garis besar pesan-pesan tersebut seperti dijelaskan oleh Dirjen Binkesmas Depkes RI (1997) antara lain:

- (1) Makanlah makanan yang beraneka ragam. Makanan yang beraneka ragam harus mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan bahkan serat makanan dalam jumlah dan proporsi yang seimbang menurut kebutuhan masing-masing kelompok (bayi, balita, anak, remaja, ibu hamil dan menyusui, orang dewasa dan lansia).
- (2) Makanlah makanan untuk memenuhi kebutuhan energi. Energi dan tenaga dapat diperoleh dari makanan sumber karbohidrat, lemak serta protein. Energi dibutuhkan untuk metabolisme dasar

(seperti untuk menghasilkan panas tubuh serta kerja organ-organ tubuh) dan untuk aktivitas sehari-hari seperti belajar, bekerja serta berolah raga. Kelebihan energi akan menghasilkan obesitas, sementara kekurangan energi dapat menyebabkan kekurangan gizi seperti marasmus.

- (3) Makanlah makanan sumber karbohidrat setengah dari kebutuhan energi. Karbohidrat sederhana, seperti gula dan makanan manis sebaiknya dikonsumsi dengan memperhatikan azas tepat waktu, tepat indikasi dan tepat jumlah. Makanan ini sebaiknya dimakan pada siang hari ketika kita akan atau sedang melakukan aktivitas dan jumlahnya tidak melebihi 3-4 sendok makan gula/hari. Karbohidrat kompleks sebaiknya dikonsumsi bersama makanan yang merupakan sumber unsur gizi lain seperti protein, lemak/minyak, vitamin dan mineral. Seyogyanya 50-60% dari kebutuhan energi diperoleh dari karbohidrat kompleks.
- (4) Batasi konsumsi lemak dan minyak sampai seperempat dari kecukupan energi. Konsumsi lemak dan minyak berlebihan, khususnya lemak/minyak jenuh dari hewan, dapat beresiko kegemukan atau dislipidemia pada orang-orang yang mempunyai kecenderungan ke arah tersebut. Dislipidemia atau kenaikan kadar lemak (kolesterol atau trigliserida) dalam darah merupakan faktor untuk terjadinya penyakit jantung koroner dan stroke. Konsumsi lemak/minyak dianjurkan tidak melebihi 20% dari total kalori dan

perlu diingat bahwa unsur gizi ini juga memiliki peran tersendiri sebagai sumber asam lemak esensial serta juga membantu penyerapan beberapa vitamin yang larut dalam lemak.

- (5) Gunakan garam beryodium. Penggunaan garam beryodium dapat mencegah Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY). Namun, penggunaan garam yang berlebihan juga tidak dianjurkan karena garam mengandung natrium yang bisa meningkatkan tekanan darah. Sebaiknya konsumsi garam tidak melebihi 6 gram atau 1 sendok teh per hari.
- (6) Makanlah makanan sumber zat besi. Makanan seperti sayuran hijau, kacang-kacangan, hati, telur dan daging banyak mengandung zat besi dan perlu dikonsumsi dalam jumlah yang cukup untuk mencegah anemia gizi.
- (7) Berikan ASI saja pada bayi sampai berumur 4 bulan. Untuk dapat memberikan ASI dengan baik, ibu menyusui harus meningkatkan jumlah dan mutu gizi makanannya selama hamil dan menyusui. Makanan Pendamping ASI (PASI) hanya boleh diberikan setelah usia bayi lebih dari 4 bulan dan pemberiannya harus bertahap menurut umur, pertumbuhan badan serta perkembangan kecerdasan.
- (8) Biasakan makan pagi. Makan pagi dengan makanan yang beraneka ragam akan memenuhi kebutuhan gizi untuk mempertahankan kesegaran tubuh dan meningkatkan

produktifitas dalam bekerja. Pada anak-anak, makan pagi akan memudahkan konsentrasi belajar sehingga prestasi belajar bisa lebih ditingkatkan.

(9) Minumlah air bersih, aman dan cukup jumlahnya. Air minum harus bersih dan bebas kuman. Minumlah air bersih sampai 2 liter per hari sehingga metabolisme tubuh kita bisa berjalan lancar mengingat air sangat dibutuhkan sebagai pelarut unsur gizi bagi keperluan metabolisme tersebut. konsumsi air yang cukup dapat menghindari dehidrasi dan akan menurunkan resiko infeksi serta batu ginjal.

(10) Lakukan kegiatan fisik atau olah raga yang teratur. Kegiatan itu akan membantu mempertahankan berat badan normal disamping meningkatkan kesegaran tubuh, memperlancar aliran darah dan mencegah osteoporosis khususnya pada lansia.

(11) Hindari minum minuman beralkohol. Alkohol bersama-sama rokok dan obat-obatan terlarang lainnya harus dihindari karena dapat membawa risiko untuk terjadinya berbagai penyakit degeneratif, vaskuler dan kanker.

(12) Makanlah makanan yang aman bagi kesehatan. Makanan yang tidak tercemar, tidak mengandung kuman atau parasit lain, tidak mengandung bahan kimia berbahaya dan makanan yang diolah dengan baik sehingga unsur gizi serta cita rasanya tidak rusak, merupakan makanan yang aman bagi kesehatan.

(13) Bacalah label pada makanan yang dikemas. Label pada makanan kemasan harus berisikan tanggal kadaluwarsa, kandungan gizi dan bahan aktif yang digunakan. Konsumen yang berhati-hati dan memperhatikan label tersebut akan terhindar dari makanan rusak, tidak bergizi dan makanan berbahaya. Selain itu, konsumen dapat menilai halal tidaknya makanan tersebut (Dirjen Binkesmas Depkes RI, 1997).

Selain itu, Islam juga telah membuat pengaturan waktu makan dengan pengaturan jadwal shalat. Tidur sesudah makan akan menafikan pencernaan cara fisika karena menyusahkan aliran makanan dari lambung ke usus 12 jari. Sesudah makan siang, akan mubazir karena saat itu getah cerna minimal dikeluarkan. Pembersihan kuman oleh asam lambung pun tidak tuntas. Berbagai penyakit infeksi dating menyerang yang akan berakhir dengan tukak lambung.

Sesudah makan malam, makanan akan dicerna terlalu baik hingga membawa kegemukan. Islam mencegah cara tidak sehat ini dengan pengaturan jadwal shalat, seperti shalat dhuha sesudah makan pagi dan tahajjud sesudah makan malam (Azwar, 2005).

D. Keterbatasan Penelitian

1. Dalam melakukan penelitian, peneliti tidak mengukur berat badan dari responden. Padahal keadaan kurang energi kronik erat kaitannya dengan penambahan berat badan ibu selama hamil.
2. Penelitian ini menggunakan metode recall 24 jam. Metode ini menuntut responden untuk mengingat kembali semua makanan yang dikonsumsi, sehingga diperlukan kerja sama dan keseriusan responden sangat menentukan hasil yang diperoleh.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam ajaran Islam, mencakup seluruh aspek kehidupan tak terkecuali masalah makanan. Oleh karena itu, bagi kaum muslimin, makanan di samping berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, juga berkaitan dengan ruhani, iman dan ibadah juga identitas diri, bahkan dengan perilaku. Allah memerintahkan manusia memakan apa saja di dunia ini yang diciptakan-Nya, sepanjang batas-batas yang halal dan baik (*thayyib*).

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan gambaran asupan zat gizi ibu hamil yang menderita kurang energi kronik di wilayah kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar Tahun 2011 maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dari 40 ibu hamil yang menderita Kurang Energi Kronik, terdapat 36 ibu hamil (90,0 %) dengan asupan energi yang kurang dan 4 ibu hamil (10,0%) dengan asupan energi yang cukup
2. Dari 40 responden, terdapat 39 orang (97,5 %) yang kurang asupan karbohidratnya dan 1 orang (2,5 %) dengan asupan karbohidrat yang cukup.

3. Berdasarkan penilaian, jumlah asupan lemak ibu hamil yang cukup sama dengan jumlah asupan lemak ibu hamil yang kurang yakni masing-masing 20 orang (50,0 %).
4. Dari 40 responden, terdapat 12 orang (30,0 %) dengan asupan protein yang cukup dan 28 orang (70,0 %) dengan asupan protein yang kurang.

B. Saran

Saran yang dapat peneliti berikan adalah :

1. Bagi pasangan usia subur (PUS) yang menginginkan kehamilan sebaiknya dipersiapkan secara menyeluruh terutama kebutuhan akan zat gizi yang dibutuhkan ibu selama hamil sehingga tidak terjadi defisiensi zat gizi terutama kebutuhan akan energi.
2. Diharapkan adanya penelitian lanjutan, sehingga permasalahan lain terkait dengan keadaan kurang energi kronik dapat diketahui.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya

Aguztian, Efrinita Nur. 2010. *Hubungan Antara Asupan Protein Dengan Kekurangan Energi Kronik (Kek) Pada Ibu Hamil Di Kecamatan Jebres Surakarta*. FK : Universitas Sebelas Maret.

Almatsier, Sunita. 2001. *Prinsip Dasar Ilmu Gizi*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

Arisman. 2010. *Gizi Dalam Daur Kehidupan*. Jakarta : EGC

Azwar, Bahar. 2005. *Fiqih Kesehatan Dari Ibadah, Pengobatan Sampai Penyakit Flu Burung*. Jakarta : Qultum Media.

Departemen Kesehatan RI. SKRT 1995. *Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan RI*. 1997

Departemen Kesehatan RI. 2000. *Pedoman Umum Gizi Seimbang (Panduan Untuk Petugas)*. Jakarta: Departemen Kesehatan.

Departemen Kesehatan RI. 2002. *Panduan Makan untuk Hidup Sehat*. Jakarta : Depkes RI.

Departemen Kesehatan RI. 2003. *Program Penanggulangan Anemia Gizi Pada Wanita Usia Subur (WUS)*. Jakarta : Depkes RI.

Departemen Kesehatan RI. 2004. *Kecenderungan Masalah Gizi dan Tantangan di Masa Datang*. Jakarta : Depkes RI.

Hadi, Hamam. 2005. *Beban Ganda Masalah Gizi dan Implikasinya terhadap Kebijakan Pembangunan Nasional*. FK : UGM.

Hamid, Warno. 1999. *Ibadah Puasa : Sudah Betulkah Ibadah Puasa Anda*. Surabaya : Insan Cendekia.

Harahap, Syahrin. 2001. *Hikmah Puasa : Berpuasalah Agar Hidup Dibimbing Nurani Menuju-Nya*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Helen Keller International (HKI). 2000. *Monitoring the Economic Crisis: Impact and Transition 1998-2000*. Jakarta.

Lubis, Zulhaida. 2003. *Status Gizi Ibu Hamil Serta Pengaruhnya terhadap Bayi*

yang Dilahirkan. Zulhaida@telkom.net.

- Notoatmodjo, Soekidjo. 2010. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Rahmi. 2010. *Hubungan Asupan Zat Gizi Makro dan Pengetahuan Ibu dengan Status Gizi Ibu Hamil di RS Ibu dan Anak Fatimah Makassar Tahun 2010*. FIKES : UIN Alauddin.
- Riskesdas. 2007. *Laporan Provinsi Sulawesi Selatan (2007), Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan, Republik Indonesia Desember 2008*.
- Paath, E.F.Y Rumdasih. 2004. *Gizi Dalam Kesehatan Reproduksi*. Jakarta : EGC
- Setianingrum, Susiana Iud Winanti. 2005. *Hubungan Antara Kenaikan Berat Badan, Lingkar Lengan Atas, Dan Kadar Hemoglobin Ibu Hamil Trimester Iii Dengan Berat Bayi Lahir Di Puskesmas Ampel I Boyolali*. FIK : UNNES.
- Shihab, Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta : Lentera Hati.
- Supariasa, I Dewa Nyoman. 2001. *Penilaian Status Gizi*. Jakarta : EGC.
- Surasih, Halym. 2005. *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Keadaan Kurang Energi Kronis (Kek) Pada Ibu Hamil Di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005*. FIK : UNNES.
- Syahruni. 2009. *Hubungan Asupan Zat Gizi Dan Pengetahuan Ibu Dengan Kejadian Kekurangan Energi Kronik Pada Ibu Hamil Di Rumah Sakit Bersalin Pertiwi Tahun 2009*. FIKES : UIN Alauddin Makassar.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta : Balai Pustaka.
- World Health Organization. 1997. *International Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death, Based on The Recommendation of The Ninth Revision Conference 1975 and Adopted by The Twenty Ninth WHA, volume 1*.

L

A

M

P

I

R

A

N

KARAKTERISTIK RESPONDEN

KODE SAMPEL :

PUSKESMAS :

HARI / TGL :

1) IDENTITAS IBU HAMIL

NAMA BUMIL :

UMUR :

LILA :

PEKERJAAN :

PENDIDIKAN :

UMUR HMIL :

2) IDENTITAS SUAMI

NAMA SUAMI :

UMUR :

PEKERJAAN :

PENDIDIKAN :

ALAMAT :

FORMULIR RECALL 24 JAM KONSUMSI

WAKTU	JENIS MAKANAN/BHN MAKANAN	CARA PENGOLAHAN	JUMLAH (UKURAN)	
			URT	GRAM
PAGI				
SELINGAN				
SIANG				
SELINGAN				
MALAM				
SELINGAN				

PAGI				
SELINGAN				
SIANG				
SELINGAN				
MALAM				
SELINGAN				

Lampiran 2

UKURAN RUMAH TANGGA

Untuk memudahkan menggunakan daftar ini, maka bahan makanan dalam daftar dinyatakan dalam ukuran rumah tangga (URT). Cara ini cukup praktis untuk dipakai dalam pembuatan diet khusus. Daftar bahan penukar ini disusun atas dasar buku penuntun diet oleh bagian gizi RSCM dan ensargi, 1987.

Keterangan Singkat

bh	= buah
bj	= biji
btg	= batang
bks	= bungkus
pk	= pak
kcl	= kecil
btr	= butir
bsr	= besar
ptg	= potong
sdm	= sendok makan
gl	= gelas
ckr	= cangkir
sdg	= sedang
sdt	= sendok teh

Keterangan Besar Porsi

1 sdm gula pasir	= 10 gram
1 sdm tepung susu	= 5 gram
1 sdm tepung beras	= 6 gram
Tepung terigu	
1 sdm terigu, maizena	= 5 gram
Hunkwe	
1 sdm minyak goreng,	= 10 gram
Margarin	
1 sdm	= 10 ml
1 gls	= 240 ml
1 ckr	= 240 ml

1 gls nasi = 140 gram	= 70 gram beras
1 ptg pepaya (15x15 cm)	= 100 gram
1 ptg sdg pisang (3x15 cm)	= 50 gram
1 ptg sdg tempe (4x6x1 cm)	= 25 gram
1 ptg sdg daging (6x5x2 cm)	= 50 gram
1 ptg sdg ikan (6x5x2 cm)	= 50 gram
1 bj bsr tahu (6x6x2 ½ cm)	= 100 gram

DAFTAR BAHAN MAKANAN PENUKAR

Berikut ini dicantumkan 7 golongan bahan makanan. Bahan makanan dalam tiap golongan dalam jumlah yang dinyatakan pada daftar bernilai sama. Oleh karena itu, satu sama lain dapat saling menukar. Untuk singkatnya disebut dengan istilah 1 satuan menukar.

Golongan I Bahan Makanan Sumber Hidrat Arang

Bahan makanan ini digunakan sebagai makanan pokok : 1 satuan penukar mengandung 175 kalori, 4 gram protein dan 40 gram hidrat arang.

Bahan Makanan	Berat (g)	URT
Nasi	100	¾ gls
Nasi Tim	200	1 gls
Bubur Beras	400	2 gls
Nasi Jagung	100	¾ gls
Kentang	200	2 bj sdg
Singkong (*)	100	1 ptg sdg
Biskuit meja	50	4 bh
Roti putih	80	4 ins
Kraker	50	4 bh besar
Maizena (*)	40	8 sdm
Tepung beras	50	8 sdm
Tepung singkong (*)	40	8 sdm
Tepung sagu (*)	40	7 sdm
Tepung terigu	50	8 sdm
Tepung hunkwe (*)	40	8 sdm
Mie basah	100	1 ½ gls
Mie kering	50	1 gls
Havermout	50	6 sdm
bihun	50	½ gls

Keterangan :

Bahan makanan yang ditandai (*) kurang mengandung protein, hingga perlu ditambah ½ sayuran penukar bahan makanan sumber protein.

Golongan II Bahan Makanan Sumber Protein Hewani

Umumnya digunakan sebagai lauk pauk satuan penukar mengandung 95 kalori, 10 gram protein dan 6 gram lemak.

Bahan Makanan	Berat (g)	URT
daging sapi	50	1 ptg sdg

daging babi	25	1 ptg kcl
daging ayam	50	1 ptg sdg
hati sapi	50	1 ptg sdg
dadih sapi	50	1 ptg sdg
babat sapi	60	2 ptg sdg
usus sapi	75	3 bulatan
telur ayam kampung	75	2 btr
telur ayam negeri	60	1 btr besar
telur bebek	60	1 btr
ikan segar	50	1 ptg sdg
ikan asin	25	1 ptg sdg
ikan teri	25	2 sdm
udang basah	50	¼ gls
keju	30	1 ptg sdg
bakso daging	100	10 bj besar 20 bj kecil

Golongan III Bahan Makanan Sumber Protein Nabati

Umumnya digunakan juga sebagai lauk. Satu satuan penukar mengandung 80 kalori, 6 gram protein, 3 gram lemak, dan 8 gram hidrat arang.

Bahan Makanan	Berat (g)	URT
Kacang hijau	25	2 ½ sdm
Kacang kedelai	25	2 ½ sdm
Kecang merah	25	2 ½ sdm
Kacang tanah terkelupas	20	2 sdm
Keju kacang tanah	20	2 sdm
Kacang tolo	25	2 ½ sdm
Oncom	50	2 ptg sdg
Tahu	100	1 bj bsr
tempe	50	2 ptg sdg

Golongan IV Sayuran

Merupakan sumber vitamin terutama karotin dan vitamin C dan juga mineral (kalsium, zat besi, zat fosfor). Hendaknya digunakan campuran dari daun-daunan seperti bayam, kangkung, daun singkong, dan sebagainya, dengan kacang panjang, buncis, wortel, labu kuning, dan sebagainya. Sayuran campur 100 gram banyaknya = 1 gelas (setelah dimasak dan ditiriskan).

Sayuran kelompok A, mengandung sedikit protein dan hidrat arang. Sayuran ini boleh digunakan sekehendak tanpa diperhitungkan banyaknya. Sayuran yang termasuk kelompok ini adalah :

Baligo	Kembang kol
Daun bawang	Labu air
Daun kacang panjang	Lobak
Daun koro	Pepaya
Daun labu siam	Pecay
Daun waluh	Rebung
Daun lobak	Sawi
Jamur segar	Seledri
Oyong (gambas)	Selada
Kangkung	Taoge
Ketimun	Tebu terubuk
Tomat	Terong
Kecipir muda	Cabe hijau besar
kol	

Sayuran kelompok B, dalam 1 satuan penukar mengandung 50 kalori, 3 gram protein dan 10 gram hidrat arang. Satu satuan penukar = 100 gram sayuran mentah (*)= 1 gls setelah direbus dan ditiriskan (**). Sayuran yang termasuk kelompok ini adalah :

Bayam	Jagung muda
Biet	Jantung pisang
Buncis	Genjer
Daun bluntas	Kacang panjang
Daun ketela rambat	Kacang kapri
Daun kecipir	Katuk
Daun leunca	Kuca
Daun lompong	Labu siam
Daun mangkogan	Labu waluh
Daun melinjau	Nangka muda
Daun pakis	Pare
Daun singkong	Tekokak
Daun pepaya	wortel

Keterangan :

(*) sayuran ditimbang bersih dan dipotong biasa seperti di rumah tangga

(**) sayuran ditakar setelah dimasak dan ditiriskan

Golongan V Buah-buahan

Merupakan sumber vitamin terutama kordin, vitamin B₁, B₆, dan C. Juga merupakan sumber mineral. 1 satuan penukar, mengandung 40 gram kalori dan 10 gram hidrat arang.

Bahan Makanan	Berat (g)	URT
Alpukat	50	½ bh bsr

Apel	75	½ bh sdg
Anggur	75	10 bj
Belimbing	125	1 bh bsr
Jambu biji	100	1 bh bsr
Jambu air	100	2 bh sdg
Jambu bol	75	¾ bh sdg
Duku	75	15 bh
Durian	50	3 bj
Jeruk manis	100	1 bh sdg
Kedondong	100	1 bh bsr
Kemang	100	1 bh bsr
Mangga	50	½ bh bsr
Nanas	75	1/6 bh sdg
Nangka masak	50	3 bj
Pepaya	100	1 ptg sdg
Pisang ambon	50	1 bh sdg
Pisang raja sereh	50	2 bh kcl
Salak	75	1 bh bsr
Sawo	50	1 bh sdg
Sirsak	75	½ gls
semangka	100	1 ptg bsr

Keterangan :

Buah-buahan ditimbang tanpa kulit dan biji

Golongan VI Susu

Merupakan sumber protein, lemak, hidrat arang, vitamin (terutama vitamin A dan niasin), serta mineral (kalsium dan fosfor).

Bahan Makanan	Berat (g)	URT
Susu sapi	200	1 gls
Susu kambing	150	¾ gls
Susu kerbau	100	½ gls
Susu kental tak manis	100	½ gls
Yogurt	200	1 gls
Tepung susu whole	25	5 sdm
Tepung susu skim (*)	20	4 sdm
Tepung saridele	25	4 sdm

Keterangan :

Yang ditandai (*) perlu tambahan 1 ½ satuan penukar minyak untuk melengkapi lemaknya.

Golongan VII
Minyak

Bahan makanan ini hampir seluruhnya terdiri dari lemak. 1 satuan penukar mengandung 45 kalori dan 5 gram lemak.

Bahan Makanan	Berat (g)	URT
Minyak goreng	5	½ sdm
Minyak ikan	5	½ sdm
Margarin	5	½ sdm
Kelapa	30	1 ptg kcl
Kelapa parut	30	5 sdm
Santan	50	½ gls
Lemak sapi	5	1 ptg kcl
Lemak babi	5	1 ptg kcl

Sumber : Supriasa. 2001. Penilaian Status Gizi. Jakarta : EGC

Frequencies

[DataSet1] D:\skripsiqyu_inhacweet\hasil penelitian.sav

Statistics

		umur bumil	usia kehamilan ibu	pekerjaan bumil	pendidika n bumil	asupan energi bumil	asupankarbo hidrat	asupan protein bumil	asupanle mak bumil
N	Valid	40	40	40	40	40	40	40	40
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0

Frequency Table

umur bumil

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< 20 tahun	1	2.5	2.5	2.5
	20-35 tahun	33	82.5	82.5	85.0
	> 35 tahun	6	15.0	15.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

usia kehamilan ibu

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	<= 12 minggu	6	15.0	15.0	15.0
	13-24 minggu	16	40.0	40.0	55.0
	>= 25 minggu	18	45.0	45.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

pekerjaan bumil

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	BEKERJA	5	12.5	12.5	12.5
	TIDAK BEKERJA	35	87.5	87.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

pendidikan bumil

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SD	9	22.5	22.5	22.5
	SMP	19	47.5	47.5	70.0
	SMA	9	22.5	22.5	92.5
	Sarjana	3	7.5	7.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

asupan energi bumil

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	CUKUP	4	10.0	10.0	10.0
	KURANG	36	90.0	90.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

asupankarbohidrat

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	CUKUP	1	2.5	2.5	2.5
	KURANG	39	97.5	97.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

asupan protein bumil

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	CUKUP	12	30.0	30.0	30.0
	KURANG	28	70.0	70.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

asupan lemak bumil

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	CUKUP	20	50.0	50.0	50.0
	KURANG	20	50.0	50.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	