

**PENGARUH *DISCHARGE PLANNING* TERHADAP PERILAKU
IBU DALAM PERAWATAN ANAK
DIARE DI RSUD HAJI MAKASSAR
2014**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Keperawatan Jurusan Keperawatan
Pada Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar*

**Disusun Oleh :
RIDHAYANTI
70300110087**

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR**

2014

ABSTRAK

Nama : Ridhayanti
NIM : 70300110087
Judul : Pengaruh *Discharge Planning* Terhadap Perilaku Ibu Dalam Perawatan Anak Diare Di Ruang Ar-Rahim RSUD Haji Makassar
2014 (Dibimbing Oleh Arbianingsih dan H.Suradi Efendi)

Diare adalah suatu keadaan abnormal dari pengeluaran berak dengan frekuensi tiga kali atau lebih dengan melihat konsisten lembek, cair sampai dengan atau tanpa darah dan lendir dalam tinja. Penyakit diare sampai saat ini masih merupakan salah satu penyebab utama kesakitan dan kematian.

Discharge planning adalah suatu tindakan dalam persiapan pulang yang diberikan oleh pasien untuk pulang ke rumah dengan memberikan edukasi berupa cara pembuatan dan pemberian oralit dan zink, serta bagaimana tanda-tanda diare pada anak.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *discharge planning* terhadap perilaku ibu dalam perawatan anak diare di ruang Ar-Rahim RSUD Haji Makassar 2014. Desain penelitian ini *Pra Eksperimen one group pre-post tes design*. Pengambil sampel menggunakan *Accidental Sampling* dengan jumlah responden 30 orang. Penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara, dan hasil kuesioner yang disebarkan kepada responden, kemudian diolah dan dianalisis menggunakan *Uji Wilcoxon* dengan tingkat pemaknaan ($\alpha = 0,05$)

Hasil analisa penelitian ini menggunakan *Uji Wilcoxon* didapatkan ada pengaruh terhadap perilaku ibu dalam merawat anak diare di RSUD Haji Makassar 2014, dimana nilai *pvalue* $0,000 < 0,005$.

Kesimpulan penelitian ini adalah ada pengaruh *discharge planning* Signifikan terhadap perilaku ibu dalam perawatan anak diare sebelum dan sesudah diberikan edukasi kesehatan tentang diare.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusunan yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusunan sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal hukumnya.



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **"Pengaruh *Discharge Planning* Terhadap Perilaku Ibu Dalam Perawatan Anak Diare di Ruang Ar-Rahim RSUD Haji Makassar Tahun 2014"** yang disusun oleh **Ridhayanti**, NIM : 70300110087.

Mahasiswa Jurusan Ilmu Keperawatan pada Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada Rabu tanggal 13 Agustus 2014 M, bertepatan dengan 17 Syawal 1435 H dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Keperawatan.

Makassar, 13 Agustus 2014

17 Syawal 1435 H

DEWAN PENGUJI :

- Ketua : Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc. ()
- Sekretaris : Fatmawaty Mallapiang, SKM., M.Kes ()
- Munaqisy I : Risnah.SKM., S.Kep.,Ns.,M.Kes ()
- Munaqisy II : Drs. H. Muh. Saleh Ridwan, M.Ag ()
- Pembimbing I : Arbianingsih, S.Kep.,Ns., M.Kes ()
- Pembimbing II : H. Suradi Efendi, S.Kep.,Ns.,M.Kes.,CWCC ()

Diketahui oleh :
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Dr.dr.H. Andi Armyn Nurdin. M.Sc
NIP. 19550203 198312 1 001

KATA PENGANTAR

Dengan segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi penelitian ini. Penyusunan skripsi penelitian ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Keperawatan pada Jurusan Ilmu Keperawatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dimana peneliti sangat menyadari akan mengalami kesulitan dalam penyusunan skripsi penelitian ini apabila tanpa bantuan dari berbagai pihak.

Peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan maupun bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih peneliti menyampaikan kepada:

1. Bapak dan Ibu tercinta yang selalu memberikan kasih sayangnya, dukungan, dan doa yang tiada henti-hentinya, serta kakak dan adik yang selalu memberikan semangat.
2. Bapak Prof. Dr. H. Qadir Gasing HT., M. S. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Bapak Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin. M.Sc. selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Ibu Fatmawaty.SKM., M.Kes. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Ibu Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, M.Si.,A.Pt selaku Wakil Dekan II

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

6. Bapak Drs. Wahyuddin.M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
7. Ibu Dr.Nur Hidayah,S.Kep.,Ns.,M.Kes selaku Ketua Jurusan Ilmu Keperawatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
8. Ibu Arbianingsih, S.Kep.,Ns.,M.Kes selaku pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan masukan, motivasi, bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi penelitian ini.
9. Bapak H.Suradi Efendi, S.Kep.,Ns.,M.Kes.,CWCC selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan, motivasi, dan pemahaman dalam penyusunan skripsi penelitian ini.
10. Ibu Risnah, SKM., S.Kep., Ns., M.Kes selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Keperawatan dan selaku Penguji I.
11. Bapak Drs. H.Muh. Saleh Ridwan, M.Ag selaku Penguji II.
12. Bapak dan Ibu Dosen Keperawatan yang telah banyak memberikan ilmunya.
13. Ayu Ruqayyah, Hj.Nurul Faizah, Idha Rosyani, Fatma Yulianti Ekasari, Nurdianah Achmad, Rosidah Aprilianti, Amalia Oktaviani selaku sahabat yang selalu memberikan saran dan masukannya.
14. Nur Ayu Soraya, selaku kembarku yang selalu memberikan semangat dan masukan dalam penyusunan skripsi ini, seperjuangan dari ujian proposal, ujian hasil, dan sampai ujian tutup.
15. Surianti.S, Ummi Kalsum, Thahirah, Sitti Munadirah, Rismawati Sy,

St.Kurnia Fatmayani, Utari Karlinda, Sri Mutmainnah, Suci Ramadhani selaku sahabat yang selalu memberikan bimbingan dan mengajarkan kepada saya dalam penyusunan skripsi ini.

16. K'undy, K'Ramlan, K'Chya, K'Anha, K'Maul, K'dhilla, K'etty, dan K'Ifha yang selalu memberikan semangat dan banyak memberikan masukannya.
17. Bontomate'ne Crew yang juga memberikan banyak masukannya.
18. Teman-teman seperjuangan angkatan 2010 Ilmu Keperawatan.

Semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan dari semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Peneliti sangat berharap semoga hasil skripsi ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu dan peningkatan pelayanan keperawatan.

Makassar, 2014

Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Hipotesis Penelitian	4
D. Kajian Pustaka	4
E. Defenisi Operasional dan Kriteria Objektif	4
F. Tujuan Penelitian	5
G. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Tinjauan Umum Tentang Perilaku.....	7
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Discharge Planning</i>	22
C. Tinjauan Umum Tentang Perawatan Anak Diare.....	30

D. Kerangka Konsep	49
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Desain Penelitian	50
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	50
C. Populasi, Sampel, dan Sampling	51
D. Metode Pengumpulan Data.....	52
E. Kerangka Kerja	53
F. Instrumen Penelitian	53
G. Pengolahan Data	53
H. Analisa Data	54
I. Penyajian Data	55
J. Etika Penelitian	55
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	58
B. Pembahasan	61
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	68
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar 1 Cara Membuat dan Memberikan Cairan Oralit	16
Gambar 2 Cara Mencuci Tangan	20
Gambar 3 Komponen Paradigma Keperawatan Anak	
33	
Gambar 4 Variabel Dependent dan Variabel Independent	49
Gambar 5 Kerangka Kerja	53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Permohonan Izin Penelitian
Lampiran 2	Izin Penelitian
Lampiran 3	Surat Keterangan Telah Meneliti
Lampiran 4	Lembar Persetujuan Seminar Proposal
Lampiran 5	Lembar Persetujuan Seminar Hasil
Lampiran 6	Lembar Permohonan Menjadi Responden Penelitian
Lampiran 7	Lembar Persetujuan Menjadi Responden Penelitian
Lampiran 8	Lembar Kuesioner
Lampiran 9	Standar Operasional Prosedur Pemberian <i>Discharge Planning</i> Terhadap Perilaku Ibu Dalam Perawatan Anak Diare
Lampiran 10	Leaflet
Lampiran 11	Identitas Responden
Lampiran 12	Identitas Sampel
Lampiran 13	Hasil Pre Test
Lampiran 14	Hasil Post Test
Lampiran 15	Hasil Analisa Data

DAFTAR TABEL

		Hal.
Tabel 2.1	Pemberian Oralit	16
Tabel 2.2	Pemberian Cairan Ringer Laktat	17
Tabel 3.1	Desain Penelitian <i>One Group Pre and Post Design</i>	
50		
Tabel 4.1	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Umur	
58		
Tabel 4.2	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pendidikan	
59		
Tabel 4.3	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pekerjaan	
59		
Tabel 4.4	Uji Normalitas	60
Tabel 4.5	Distribusi Responden Berdasarkan Pengaruh <i>Discharge Planning</i> terhadap perilaku ibu dalam perawatan anak diare Di Ruang Ar-Rahim RSUD Haji Makassar 2014	
60		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diare adalah suatu keadaan abnormal dari pengeluaran berak dengan frekuensi tiga kali atau lebih dengan meliur konsisten lembek, cair sampai dengan atau tanpa darah dan lendir dalam tinja. Penyakit diare sampai saat ini masih merupakan salah satu penyebab utama kesakitan dan kematian. Hampir seluruh daerah geografis dunia dan semua kelompok usia diserang diare, terutama pada bayi dan anak hingga mencapai 1 miliar kasus tiap tahun dengan korban meninggal sekitar 5 juta jiwa (WHO, 2009)

Diare sampai saat ini masih merupakan penyebab kematian di dunia, sebanyak 6 juta anak meninggal setiap tahunnya karena diare, sebagian kematian tersebut terjadi di Negara berkembang. Di perkirakan lebih dari 10 juta anak berusia kurang dari 5 tahun meninggal setiap tahunnya, sekitar 20% meninggal karena infeksi diare (KemeKes RI,2011).

Penyakit diare masih merupakan masalah kesehatan masyarakat di Negara berkembang seperti Indonesia, karena morbiditas dan mortalitasnya masih tinggi. Survei morbiditas yang dilakukan oleh Subdit Diare, Departemen Kesehatan dari tahun 2000 s/d 2010 terlihat kecenderungan insidens naik. Pada tahun 2000 IR penyakit Diare 301/

1000 penduduk, tahun 2003 naik menjadi 374/ 1000 penduduk, tahun 2006 naik menjadi 423/ 1000 penduduk dan tahun 2010 menjadi 411/ 1000 penduduk. Salah satu langkah dalam pencapaian target ke-4 MDG's (*The Millenium Development Gols*) adalah menurunkan kematian anak menjadi 2/3 bagian dari tahun 1990 sampai 2015. Berdasarkan Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT), Studi Mortalitas dan Riset Kesehatan Dasar dari tahun ke tahun diketahui bahwa diare masih menjadi penyebab utama kematian balita di Indonesia. Penyebab utama kematian akibat diare adalah tata laksana yang tidak tepat baik di rumah maupun di sarana kesehatan. Untuk menurunkan kematian karena diare perlu tata laksana yang cepat dan tepat (Depkes, 2011).

Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia, provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi dengan penemuan kasus diare pada anak yang cukup tinggi dengan menempati urutan ke enam, Data yang diperoleh dari Bidang P2PL Dinas Kesehatan Kota Makassar tahun 2011 jumlah penderita diare sebanyak 37.940 orang atau sebesar 68%, Salah satu kecamatan tertinggi penderita diare adalah kecamatan Tamalanrea sebanyak 3591 kasus. Diare merupakan penyakit menular yang dapat ditularkan melalui perilaku hidup bersih dan sehat (Dinas kesehatan Kota Makassar, 2012).

Dari hasil survei di RSUD Haji Prov.Sul-Sel, insidensi penyakit diare pada tahun 2012 penderita penyakit diare pada anak sebanyak 473 pasien, terjadi peningkatan terjadinya diare pada tahun 2013 sebanyak

503 pasien, dan pada tahun 2014 bulan Januari telah terdapat 53 pasien mengalami diare.

Dari aspek asuhan keperawatan, pemberian edukasi juga merupakan bagian dari upaya untuk pengendalian diare. *Discharge planning* merupakan suatu rencana yang disusun untuk klien, sebelum keluar dari rumah sakit yang dimulai dari pengumpulan data sampai dengan masuk area perawatan yaitu meliputi pengkajian, rencana perawatan, implementasi dan evaluasi (Nursalam, 2013).

Menurut Koziar (2004), *Discharge planning* adalah suatu proses dimulainya pasien mendapatkan pelayanan kesehatan yang diikuti dengan kesinambungan perawatan baik dalam proses penyembuhan maupun dalam mempertahankan derajat kesehatannya sampai pasien merasa siap untuk kembali ke lingkungannya. Sedangkan menurut Sommerfeld (2001) *Discharge planning* dilakukan sejak pasien diterima di suatu pelayanan kesehatan di rumah sakit dimana rentang waktu pasien untuk menginap semakin diperpendek (Rahmi, 2011).

Discharge planning perlu dilakukan di rumah sakit agar pasien dan keluarga dapat mengetahui bagaimana cara manajemen pemberian perawatan di rumah dan mengetahui apa yang diharapkan didalam memperhatikan masalah fisik yang berkelanjutan sebelum menghadapi pemulangan. Oleh karena itu, pasien perlu dipersiapkan untuk menghadapi pemulangan dengan melakukan *discharge planning* dimana pasien mampu melakukan perawatan diri di rumah demi

kesembuhannya.

Berdasarkan hal diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh *discharge planning* terhadap perilaku ibu dalam perawatan diare di RSUD Haji Prov. Sul-Sel. Dimana peneliti sangat ingin mengetahui tentang bagaimana pengaruh *discharge planning* yang dilakukan oleh perawat dalam persiapan pemulangan terhadap perilaku ibu dalam perawatan anak diare.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka perumusan masalah adalah: Adakah pengaruh *discharge planning* terhadap perilaku ibu dalam perawatan anak diare di Rumah Sakit?

C. Hipotesis Penelitian

Ada pengaruh *Discharge planning* terhadap perilaku ibu dalam perawatan anak diare di ruang Ar-Rahim, RSUD Haji Prov.Sul-Sel.

D. Kajian Pustaka

Menurut Rahmi (2011) menjelaskan bahwa beberapa penelitian yang telah dilakukan menunjukkan mensosialisasikan dan melaksanakan *discharge planning* yang komprehensif dalam tatanan pelayanan kesehatan di rumah sakit, dimana perawat harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan pemahaman akan pentingnya memberikan *discharge planning* yang komprehensif dan perawat harus memiliki kemampuan dalam melaksanakan *discharge planning* sesuai kebutuhan pasien dan keluarga sehingga dapat memberikan motivasi

dan merubah perilaku.

E. Defenisi Operasional dan Kriteria Objektif

1. *Discharge Planning*:

- a. Suatu tindakan yang diberikan kepada pasien dan keluarga sebelum pemulangan agar pasien dan keluarga dapat mengetahui tindakan apa yang dilakukan dalam perawatan diri dirumah demi kesembuhan.
- b. Suatu tindakan dalam persiapan pulang pada pasien untuk pulang ke rumah dengan memberikan edukasi berupa cara pembuatan dan pemberian oralit dan zink, serta bagaimana tanda-tanda dehidrasi pada anak diare.

2. Perilaku : Perilaku adalah suatu tindakan oleh ibu dalam merawat anak yang menderita diare, seperti pemenuhan cairan, pemberian oralit dan zink, serta pemberian anti diare.

Kriteria Objektif :Dalam penelitian ini jika ibu mengisi kuisisioner yang terdiri dari 9 pertanyaan alternatif.

Perilaku baik = jika jumlah skor responden > 12

Perilaku kurang baik = jika jumlah skor responden ≤ 12

F. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *discharge planning* terhadap perilaku ibu dalam persawatan anak diare di Rumah Sakit.

2. Tujuan Khusus

Pada tujuan khusus ada beberapa, yaitu:

- a. Diketuainya perilaku ibu sebelum diberikan *discharge planning* dalam perawatan anak diare di Rumah Sakit.
- b. Diketuainya perilaku ibu setelah diberikan *discharge planning* dalam perawatan anak diare di Rumah Sakit.
- c. Diketuainya pengaruh *discharge planning* terhadap perilaku ibu.

G. Manfaat Penelitian

1. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian yang diperoleh sangat diharapkan untuk digunakan oleh perawat di ruangan manapun baik di ruangan perawatan anak, perawatan internal, perawatan bedah, dll. Untuk melakukan *discharge planning* dalam mempersiapkan pasien dan keluarga menghadapi pemulangan, dimana pasien dan keluarga mampu melakukan perawatan lanjutan di rumah dengan baik.

2. Bagi Institusi

Hasil penelitian ini diharapkan akan digunakan oleh pendidikan keperawatan, sehingga dapat memberikan bahan materi penelitian selanjutnya tentang *discharge planning* kepada mahasiswa

3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu pengalaman

berharga bagi peneliti yang dapat menambah wawasan serta pengetahuan baru tentang penelitian ilmiah.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tentang Perilaku

1. Pengertian Perilaku

Menurut Chaplin, perilaku adalah kumpulan reaksi, perbuatan, aktivitas, gabungan gerakan, tanggapan ataupun jawaban yang dilakukan seseorang, seperti protes berpikir, bekerja, hubungan seks, dan sebagainya.

Menurut Ian Pavlov, perilaku adalah keseluruhan atau totalitas kegiatan akibat belajar dari pengalaman sebelumnya dan dipelajari melalui proses penguatan dan pengkondisian.

Menurut Katini Kartono, perilaku merupakan proses mental dari reaksi seseorang yang sudah tampak atau masih sebatas keinginan (Pieter dan Lubis, 2010).

Menurut Skinner seorang ahli psikologi, merumuskan bahwa perilaku merupakan respons atau reaksi seseorang terhadap stimulus (rangsangan dari luar). Oleh karena perilaku ini terjadi melalui proses adanya stimulus terhadap organisme tersebut merespon, maka Skinner ini disebut dengan teori "S-O-R" atau stimulus organisme respon (Notoatmodjo, 2007).

2. Bentuk Perilaku

Secara operasional, perilaku dapat diartikan sebagai respon seseorang terhadap rangsangan dari luar subjek tersebut. Bentuk

respons perilaku ada 2 yaitu:

- a. Bentuk pasif (*respon interna*) terjadi di dalam diri manusia dan tidak secara langsung dapat terlihat dari orang lain. Misal: berpikir, tanggapan atau sikap batin dan pengetahuan. Perilakunya masih berselubung (*covert behaviour*)
- b. Bentuk aktif, yaitu apabila perilaku tersebut jelas dapat diobservasi secara langsung. Oleh karena itu perilaku mereka sudah tampak dengan Teori Pembentukan Perilaku

Menurut Pieter dan Lubis (2010), didalam pembentukan perilaku dibagi menjadi empat teori, yaitu:

- a. Teori Kebutuhan

Pembentukan perilaku manusia adalah akibat kebutuhan-kebutuhan dalam diri yang dimulai dari kebutuhan fisiologi, rasa aman, harga diri, sosial, dan aktualisasi diri. Apabila usaha dalam memenuhi kebutuhan tercapai, maka orang itu tidak mengalami ketegangan dan cenderung mengarah kepada kebahagiaan. Namun sebaliknya pula, saat usaha pemenuhan kebutuhan tidak tercapai akan membuat seseorang mengalami frustrasi terhadap unsur-unsur kebutuhan. Jadi, kebutuhan merupakan motif, dorongan ataupun keinginan seseorang dalam bertindak laku.

- b. Teori Dorongan

Perilaku adalah respon seseorang terhadap stimulus luar diri

(lingkungan). Perilaku muncul akibat stimulus organisme dan organisme memberikan respons. Respon-respon yang diberikan yaitu:

- 1) Respondent respons (*reflexive*), adalah respons yang muncul akibat stimulus tertentu (*eliciting stimulation*) yang relative menetap.
- 2) Operant respons (*instrumental respons*) adalah respon yang timbul akibat ada rangsangan *reinforcing stimulation* yang memperkuat respons.

c. Teori Belajar

Teori belajar dikembangkan oleh *Bandura*. Pembentukan perilaku akibat interaksi antara respon dan lingkungannya dan adanya proses imitasi perilaku model. Perilaku model yang mampu memberikan pengalaman yang menyenangkan akan menimbulkan perilaku positif. Akan tetapi perilaku model yang memberikan pengalaman kurang menyenangkan akan dihilangkan. Peniruan perilaku model sangat dipengaruhi kesenangan, minat, keyakinan, karakter, sikap, atau perilaku dominan model.

d. Teori Sikap

Green mengatakan bahwa pembentukan perilaku sangat dipengaruhi perilaku dalam diri (*behavior cause*) dan perilaku luar diri (*behavior causes*). Perilaku manusia akibat:

- 1) Faktor predisposisi (*predisposing factors*), adalah faktor

pencetus terjadinya suatu sebab, seperti pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai, dan sebagainya.

2) Faktor pendukung (*enabling factors*), adalah faktor yang turut serta mendorong timbulnya suatu sebab, seperti lingkungan fisik dan fasilitas.

3) Faktor pendorong (*reinforcing factors*) adalah faktor yang berhubungan dengan referesi sikap dan perilaku secara umum.

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku

Menurut Pieter dan Lubis (2010), terdapat faktor yang mempengaruhi perilaku, yaitu:

a. Emosi

Perubahan perilaku manusia juga dapat timbul akibat kondisi emosi. Emosi adalah reaksi kompleks yang berhubungan dengan kegiatan atau perubahan-perubahan secara mendalam dan hasil pengalaman dari eksternal dan keadaan fisiologis. Dengan emosi seseorang terangsang untuk memahami objek atau perubahan yang disadari sehingga memungkinkannya mengubah sifat dan perilakunya. Bentuk-bentuk emosi yang berhubungan dengan perubahan perilaku yaitu rasa marah, gembira, bahagia, sedih, cemas, takut, benci, dan sebagainya.

b. Persepsi

Persepsi adalah pengalaman-pengalaman yang dihasilkan melalui indra penglihatan, pendengaran, penciuman, dan

sebagainya. Setiap orang memiliki persepsi yang berbeda meskipun objek persepsi sama. Melalui persepsi seseorang mampu untuk mengetahui atau mengenal objek melalui alat penginderaan. Persepsi dipengaruhi oleh minat, kepentingan, kebiasaan yang dipelajari, bentuk, latar belakang (*background*), kontur kejelasan, atau kontur letak.

c. Motivasi

Motivasi diartikan sebagai dorongan untuk bertindak guna mencapai suatu tujuan tertentu. Hasil motivasi akan diwujudkan dalam bentuk perilakunya, karena dengan motivasi individu terdorong memenuhi kebutuhan fisiologis, psikologis, dan sosial.

d. Belajar

Belajar adalah salah satu dasar memahami perilaku manusia, karena belajar berkaitan dengan kematangan dan perkembangan fisik, emosi, motivasi, perilaku sosial dan kepribadian. Melalui belajar orang mampu mengubah perilaku dari perilaku sebelumnya dan menampilkan kemampuannya sesuai kebutuhan.

Akan tetapi perilaku model yang memberikan pengalaman kurang menyenangkan akan dihilangkan. Peniruan perilaku model sangat dipengaruhi kesenangan, minat, keyakinan, karakter, sikap, atau perilaku dominan model.

Dalam Surah Al- Luqman Ayat 13 yang berbunyi :

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾

Terjemahannya:

“Dan (Ingatlah) ketika Luqman Berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: “Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar”.

e. Inteligensi

Inteligensi adalah kemampuan dalam membuat kombinasi, berpikir abstrak, ataupun kemampuan menentukan kemungkinan dalam perjuangan hidup. Adapun secara definitif teori, intelegensi adalah kesatuan daya-daya jiwa yang formal dan daya khusus, seperti daya mengukur, mengamati, memproduksi, atau menyelesaikan masalah.

4. Strategi Perubahan Perilaku

Didalam program-program kesehatan, agar diperoleh perubahan perilaku yang sesuai dengan norma-norma kesehatan, sangat diperlukan usaha-usaha konkret dan positif. Beberapa strategi untuk memperoleh perubahan perilaku tersebut oleh WHO dikelompokkan menjadi tiga.

a. Menggunakan Kekuatan/Kekuasaan atau Dorongan

Dalam hal ini perubahan perilaku dipaksakan kepada sasaran atau masyarakat sehingga ia mau melakukan (berperilaku) seperti yang diharapkan. Cara ini dapat ditempuh misalnya dengan peraturan-peraturan / perundang-undangan yang harus dipatuhi

oleh anggota masyarakat. Cara ini akan menghasilkan perilaku yang cepat, akan tetapi perubahan tersebut belum tentu akan berlangsung lama karena perubahan perilaku yang terjadi tidak atau belum didasari oleh kesadaran sendiri.

b. Pemberian Informasi

Dengan memberikan informasi-informasi tentang cara-cara mencapai hidup sehat, cara pemeliharaan kesehatan, cara menghindari penyakit, dan sebagainya akan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hal tersebut.

Selanjutnya dengan pengetahuan-pengetahuan itu akan menimbulkan kesadaran mereka, dan akhirnya akan menyebabkan orang berperilaku sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya itu. Hasil atau perubahan perilaku dengan cara ini memakan waktu lama, tetapi perubahan yang dicapai akan bersifat langgeng karena didasari oleh kesadaran mereka sendiri (bukan karena paksaan).

c. Diskusi Partisipasi

Cara ini adalah sebagai peningkatan cara yang kedua yang dalam memberikan informasi tentang kesehatan tidak bersifat searah saja, tetapi dua arah. Hal ini berarti bahwa masyarakat tidak hanya pasif menerima informasi, tetapi juga harus aktif berpartisipasi melalui diskusi-diskusi tentang informasi yang diterimanya. Dengan demikian maka pengetahuan kesehatan

sebagai dasar perilaku mereka diperoleh secara mantap dan lebih mantap juga, bahkan merupakan referensi perilaku orang lain. Sudah barang tentu cara ini akan memakan waktu yang lebih lama dari cara yang kedua tersebut, dan jauh lebih baik dengan cara yang pertama.

Diskusi partisipasi adalah salah satu cara yang baik dalam rangka memberikan informasi-informasi dan pesan-pesan kesehatan (Notoatmodjo, 2007).

5. Perilaku Perawatan Anak Diare Di Rumah

Dalam perilaku ibu memberikan perawatan anak diare ada beberapa yang mesti diperhatikan, yaitu:

a. Pemberian Cairan

Sebelum memberikan terapi rehidrasi pada pasien, perlu dinilai dulu derajat dehidrasinya. Derajat dehidrasi terdiri dari ringan, sedang, dan berat. Dikatakan dehidrasi ringan bila pasien mengalami kekurangan cairan 2-5% dari berat badan. Sedang bila pasien kehilangan cairan 5-8% dari berat badan. Berat bila pasien kehilangan cairan 8-10% dari berat badan.

Bila pasien kehilangan banyak cairan yang banyak dan dehidrasi, pemberian cairan intravena dan rehidrasi oral dengan cairan isotonik mengandung elektrolit dan gula yang mesti diberikan.

Terapi rehidrasi oral antara lain: pedialit, oralit, dan lain-lain. Cairan infus seperti Ringer Laktat. Cairan diberikan cairan per oral atau selang nasogastrik, kecuali bila ada kontraindikasi atau saluran cerna atas tak dapat dipakai. Prinsip menentukan jumlah cairan yang akan diberikan yaitu sesuai dengan dengan jumlah cairan yang keluar dari tubuh. Resusitasi cairan & elektrolit sesuai derajat dehidrasi dan kehilangan elektrolitnya (Growupclinic,2012)

Dimana kita dapat mengenal tanda-tanda dehidrasi, dari dehidrasi ringan, sedang, dan berat;

1) Dehidrasi Ringan

Bila terdapat dua tanda atau lebih. Tanda-tanda dari dehidrasi ringan, yaitu:

- a) Keadaan umum baik, sadar
- b) Mata tidak cekung
- c) Minum biasa, tidak haus
- d) Cubitan kulit perut/ turgor kembali segera.

Jumlah cairan yang diberikan lebih banyak dari biasanya pada dehidrasi ringan yaitu:

- Teruskan ASI lebih sering dan lebih lama
- Anak yang mendapatkan ASI eksklusif, beri oralit atau air matang sebagai tambahan

- Anak yang tidak mendapatkan ASI eksklusif, beri susu yang biasa diminum dan oralit atau cairan rumah tangga seperti kuah sayur, air matang, dan sebagainya
- Beri oralit sampai diare berhenti. Bila muntah, tunggu 10 menit dan dilanjutkan sedikit demi sedikit
 - Umur < 1 tahun diberi 50-100 ml setiap kali berak
 - Umur > 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali berak
 (Depkes:2011).

Cara pembuatan oralit di rumah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Sumber :Buku Panduan Lintas Diare

Gambar 1. Cara Membuat dan Memberikan Cairan Oralit

2) Dehidrasi Sedang

Bila terdapat dua tanda atau lebih. Tanda-tanda dehidrasi sedang yaitu:

- a) Gelisah, rewel
- b) Mata cekung

- c) Ingin minum terus, ada rasa haus
- d) Cubitan kulit perut/ turgor kembali lambat.

Jumlah oralit yang diberikan dalam 3 jam pertama di sarana kesehatan :

ORALIT yang diberikan = 75ml X Berat Badan Anak

- Bila BB tidak diketahui berikan oralit sesuai dengan tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
Pemberian Oralit

Umur Sampai	4 bulan	4-12 bulan	12-24 bulan	2-5 tahun
Berat Badan	<6 kg	6-10 kg	10-12 kg	12-19 kg
Jumlah Cairan	200-400	400-700	700-900	900-1400

- Bila anak menginginkan lebih banyak oralit, berikanlah
- Bujuk ibu untuk meneruskan ASI
- Untuk bayi < 6 bulan yang tidak mendapatkan ASI berikan juga 100-200 ml air masak selama masa ini
- Untuk anak >6 bulan, tunda pemberian makan selama 3 jam kecuali ASI dan Oralit.

3) Dehidrasi Berat

Bila terdapat dua tanda atau lebih. Tanda-tanda dehidrasi berat yaitu:

- a) Lesu, lunglai/ tidak sadar
- b) Mata cekung
- c) Malas minum

d) Cubitan kulit perut/ turgor kembali sangat lambat

Untuk terapi diare dehidrasi berat di sarana kesehatan yaitu :

- Berikan segera cairan intravena

Ringer Laktat atau NaCl 0,9%(bila RL tidak tersedia) 100ml/kg BB, dibagi sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pemberian Cairan Ringer Laktat

Umur	Pemberian I 30ml/kg BB	Kemudian 70ml/kg BB
Bayi <1 tahun	1 Jam*	5 jam
Anak ≥ 1 tahun	30 menit*	2 ¹ / ₂ jam

- Nilai kembali tiap 15-30 menit. Bila nadi belum teraba, beri cepattetesan lebih cepat.
- Juga beri oralit (5 ml/kg/jam) bila penderita bisa minum; biasanya setelah 3-4 jam (bayi) atau 1-2 jam (anak) (Depkes, 2011).

b. Pemberian Makan/ ASI

Pemberian makanan selama diare bertujuan untuk memberikan gizi pada penderita terutama pada anak agar tetap kuat dan tumbuh serta mencegah berkurangnya berat badan. Anak yang masih minum ASI harus lebih sering di beri ASI. Anak yang minum susu formula juga diberikan makanan yang mudah dicerna dan diberikan sedikit lebih sedikit dan lebih sering. Setelah diare

berhenti, pemberian makanan ekstra diteruskan selama 2 minggu untuk membantu pemulihan berat badan (KemKes, 2011).

Kita dapat memberikan anak makanan untuk mencegah kurang gizi, yaitu:

- 1) Beri makan sesuai umur anak dengan menu yang sama pada waktu anak sehat
- 2) Tambahkan 1-2 sendok teh minyak sayur setiap porsi makan
- 3) Beri makanan kaya kalium seperti sari buah segar, pisang, air kelapa hijau.
- 4) Beri makan lebih sering dari biasanya dengan porsi lebih kecil (3-4 jam)
- 5) Setelah diare berhenti, berikan makanan yang sama dan makanan tambahan selama 2 minggu (Depkes, 2011).

c. Pemberian Obat di Rumah

Antibiotik hanya diberikan jika ada indikasi, seperti diare berdarah atau diare karena kolera, atau diare dengan disertai penyakit lain. Ini sangat penting karena seringkali ketika diare, masyarakat langsung membeli antibiotic seperti Tertrasiklin atau Ampicilin. Selain tidak efektif, tindakan ini berbahaya, karena jika antibiotik tidak dihabiskan sesuai dosis akan menimbulkan resistensi kuman terhadap antibiotik.

Ketika terkena diare, tubuh akan memberikan reaksi berupa peningkatan motilitas atau pergerakan usus untuk mengeluarkan

kotoran atau racun. Perut akan terasa banyak gerakan dan berbunyi. Anti diare akan menghambat gerakan itu sehingga kotoran yang seharusnya dikeluarkan, justru dihambat untuk keluar. Selain itu anti diare dapat menyebabkan komplikasi yang disebut prolapsus pada usus (terlipat/terjepit). Kondisi ini berbahaya karena memerlukan tindakan operasi. Oleh karena itu anti diare seharusnya tidak diberikan kecuali antibiotik tersebut diresepkan oleh dokter (Depkes, 2011).

d. Pencegahan Infeksi Berulang

Kebiasaan yang berhubungan dengan kebersihan perorangan yang penting dalam penularan kuman diare adalah mencuci tangan. Mencuci tangan dengan sabun, terutama sesudah buang air besar, sesudah membuang tinja anak, sebelum menyiapkan makanan, sebelum menyuapi makan anak dan sebelum makan, mempunyai dampak dalam kejadian diare (menurunkan angka kejadian diare) (Depkes, 2011).

Adapun cara mencuci tangan yang baik,yaitu :



Gambar 2.Cara Mencuci Tangan

e. Perawatan Perianal

Menurut Mueser (2013), perawatan daerah *Perianal* atau perawatan daerah yang tertutup popok dapat dilakukan dengan mengganti popok setelah mengompol, membiarkan daerah alat kelamin terkena udara bebas. Hal ini yang perlu dilakukan adalah jangan memaksakan menggosok alat kelamin bayi laki-laki yang belum dikhitam agar kelihatan bersih dan jangan membuka lebar-lebar bibir vagina bayi perempuan untuk membersihkannya (Nurhayati dan Mariyam, 2013).

Cara-cara perawatan *Perianal* pada anak diare menurut Hidayat (2006) adalah sebagai berikut:

- 1) Hindari penggunaan sabun yang berlebihan untuk membersihkan daerah pantat/bokong. Sabun yang berlebihan dan keras dapat menyebabkan iritasi.
- 2) Sebaiknya gunakan kapas dengan air hangat setelah buang air

besar.

- 3) Bila terdapat bintik kemerahan, berikan krem atau saleb, dan biarkan terbuka untuk beberapa saat.
- 4) Bersihkan bokong perlahan-lahan dengan sabun lunak, non-alkali dan air atau celupkan anak dalam bak untuk membersihkan yang lembut karena feses diare sangat mengiritasi kulit.
- 5) Beri salep seperti oksida untuk melindungi kulit dari iritasi (tipe salep sangat bervariasi dari setiap anak dan memerlukan periode percobaan).
- 6) Hindari penggunaan tissue basah yang dijual bebas yang mengandung alkohol pada kulit yang terekskroriasi karena akan menyebabkan rasa menyengat.
- 7) Observasi bokong dan perineum akan adanya infeksi, seperti *candida* sehingga terapi yang tepat akan dimulai.
- 8) Berikan obat anti jamur yang tepat untuk mengobati infeksi jamur kulit.

Adapun manfaat dari pemberian perawatan *perianal* pada anak diare, adalah sebagai berikut:

- a) Mengatasi segera agar tidak terjadi gangguan integritas kulit dengan ketentuan keadaan kulit membaik yaitu tidak ditemukan kemerahan (lecet), hidrasi baik, tidak lembap (Hidayat, 2006).
- b) Mencegah terjadinya kerusakan dan meningkatkan

penyembuhan (Nursalam, 2005).

- c) Tidak terbentuknya ruam pada pantat (Nursalam, 2005).
- d) Meningkatkan kebersihan dan kenyamanan daerah anal (Nursalam, 2005).
- e) Melindungi kulit dari asam usus (Doenges, 2004).
- f) Mencengah terjadinya kemungkinan alergi terhadap allergen (Doenges, 2004).
- g) Kulit pasien tetap utuh (Doenges, 2004).

B. Tinjauan Umum Tentang *Discharge Planning*

1. Pengertian *Discharge Planning*

Discharge planning merupakan suatu rencana yang disusun untuk klien, sebelum keluar dari rumah sakit yang dimulai dari pengumpulan data sampai dengan masuk area perawatan yaitu meliputi pengkajian, rencana perawatan, implementasi dan evaluasi (Nursalam, 2013).

Menurut Kozier 2004, *Discharge planning* adalah suatu proses dimulainya pasien mendapatkan pelayanan kesehatan yang diikuti dengan kesinambungan perawatan baik dalam proses penyembuhan maupun dalam mempertahankan derajat kesehatannya sampai pasien merasa siap untuk kembali ke lingkungannya. Sedangkan menurut Sommerfeld 2001 *Discharge planning* dilakukan sejak pasien diterima di suatu pelayanan kesehatan di rumah sakit dimana rentang waktu pasien untuk menginap semakin diperpendek (Rahmi,

2011).

Discharge planning atau perencanaan pulang merupakan suatu bentuk perilaku perawat dalam pelayanan keperawatan. Sering dijumpai pelaksanaan perencanaan pulang hanya diberikan pada saat pasien akan pulang dari rumah sakit. Studi deskriptif mengenai perencanaan pulang menyatakan bahwa perawat yang melakukan perencanaan pulang pada hari kepulangan klien dari rumah sakit sebanyak 89,47%.

Perencanaan pulang keperawatan merupakan komponen yang terkait dengan rentang keperawatan dari pasien masuk rumah sakit hingga kepulangannya. Perencanaan pulang dilaksanakan selama dalam perawatan dan evaluasi pada saat pasien dipersiapkan untuk pulang, dengan mengkaji kemungkinan rujukan atau perawatan lanjut di rumah sesuai kebutuhan (Purnamasari dan Ropyanto, 2012).

Perencanaan pulang (*discharge planning*) akan menghasilkan sebuah hubungan yang terintegrasi yaitu antara perawatan yang diterima pada waktu di rumah sakit dengan perawatan yang diberikan di rumah. Namun sampai dengan saat ini perencanaan pulang bagi klien yang dirawat di rumah sakit belum optimal dilaksanakan, dimana peran perawat terbatas pada kegiatan rutinitas saja, yaitu hanya berupa informasi kontrol ulang. Klien memerlukan perawatan kesehatan di rumah, konseling kesehatan, atau penyuluhan dan pelayanan komunitas tetapi tidak dibantu dalam

upaya memperoleh pelayanan sebelum pemulangan sering kembali ke ruang kedaruratan dengan masalah minor, sering kali diterima kembali dalam waktu 24 jam sampai 48 jam dan kemudian pulang kembali (Ferry, Nursalam, 2008).

Menurut *American Nurses Association* (ANA) tahun 1992, pelayanan kesehatan di rumah adalah perpaduan perawatan kesehatan masyarakat dan keterampilan teknis yang terpilih dari perawat spesialis yang terdiri dari perawat komunitas, perawat gerontologi, perawat psikiatri, perawat maternitas, dan perawat medical bedah (Efendi dan Makhfudli, 2009).

2. Tujuan *Discharge Planning*

Menurut Jipp dan Siras (1986) perencanaan pulang bertujuan:

- a. Menyiapkan pasien dan keluarga secara fisik, psikologis, dan sosial;
- b. Meningkatkan kemandirian pasien dan keluarga;
- c. Meningkatkan perawatan yang berkelanjutan pada pasien;
- d. Membantu rujukan pasien pada sistem pelayanan yang lain;
- e. Membantu pasien dan keluarga memiliki pengetahuan dan keterampilan serta sikap dalam memperbaiki serta mempertahankan status kesehatan primer;
- f. Melaksanakan rentang perawatan antara rumah sakit dan pelayanan.

Menurut Nursalam (2013) yang dikutip dalam Rorden dan Traf (1993) mengungkapkan bahwa perencanaan pulang bertujuan membantu pasien dan keluarga untuk dapat memahami permasalahan dan upaya pencegahan yang harus ditempuh sehingga dapat mengurangi risiko kambuh, serta menukar informasi antara pasien sebagai penerima pelayanan dengan perawat dari pasien masuk sampai keluar rumah sakit.

3. Prinsip-Prinsip *Discharge Planning*

Menurut Nursalam (2013) prinsip-prinsip perencanaan pulang, yaitu:

- a. Pasien merupakan fokus dalam perencanaan pulang sehingga nilai keinginan dan kebutuhan dari pasien perlu dikaji dan evaluasi.
- b. Kebutuhan dari pasien diidentifikasi lalu dikaitkan dengan masalah yang mungkin timbul pada saat pasien pulang nanti, sehingga kemungkinan masalah yang timbul di rumah dapat segera diantisipasi.
- c. Perencanaan pulang dilakukan secara kolaboratif karena merupakan multidisiplin dan setiap tim harus saling bekerja sama.
- d. Tindakan atau rencana yang akan dilakukan setelah pulang disesuaikan dengan pengetahuan dari tenaga/ sumber daya maupun fasilitas yang tersedia di masyarakat.
- e. Perencanaan pulang dilakukan pada setiap sistem atau tatana pelayanan kesehatan.

4. Manfaat Pemberian *Discharge Planning*

Menurut Nursalam (2013) manfaat dari pemberian discharge planning, yaitu:

- a. Meningkatkan kemandirian klien dalam melakukan perawatan di rumah.
- b. Meningkatkan perawatan yang berkelanjutan pada klien.
- c. Membantu klien memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam memperbaiki serta mempertahankan status kesehatan klien.

5. Komponen *Discharge Planning*

Menurut Nursalam (2013) yang dikutip dalam Jipp dan Sirass (1986), komponen perencanaan pulang terdiri atas:

- a. Perawatan di rumah meliputi pemberian pengajaran atau pendidikan kesehatan (*health education*) mengenai diet, mobilitas, waktu kontrol, dan tempat kontrol pemberian pelajaran sesuai dengan tingkat pemahaman dan keluarga mengenai perawatan selama pasien di rumah nanti.
- b. Obat-obatan yang masih diminum dan jumlahnya, meliputi dosis, cara pemberian dan waktu yang tepat minum obat.
- c. Obat-obat yang dihentikan, karena meskipun ada obat-obat tersebut sudah tidak diminum lagi oleh pasien, obat-obat tersebut tetap dibawa pulang pasien.
- d. Hasil pemeriksaan, termasuk hasil pemeriksaan luar sebelum masuk rumah sakit dan hasil pemeriksaan selama masuk rumah

sakit, semua diberikan ke pasien saat pulang.

e. Surat-surat seperti surat keterangan sakit dan surat keterangan kontrol.

6. Penatalaksanaan *Discharge Planning*

Proses *discharge planning* mencakup kebutuhan fisik pasien, psikologis, sosial, budaya, dan ekonomi. Perry dan Potter (2004) membagi proses *discharge planning* atas tiga fase yaitu akut, transisional, dan pelayanan berkelanjutan. Pada fase akut, perhatian utama berfokus pada usaha *discharge planning*. Sedangkan pada fase transisional, kebutuhan pelayanan akut selalu terlihat, tetapi tingkat urgensinya semakin berkurang dan pasien mulai dipersiapkan untuk pulang dan merencanakan kebutuhan perawatan selanjutnya. Pada fase pelayanan selanjutnya, pasien mampu untuk beradaptasi dalam perencanaan dan penatalaksanaan aktivitas perawatan berkelanjutan yang dibutuhkan setelah pemulangan. Perry dan Potter (2004) menyusun format *discharge planning* sebagai berikut:

a. Pengkajian

1) Sejak pasien masuk, kaji kebutuhan pemulangan pasien dengan menggunakan riwayat keperawatan, berdiskusi dengan pasien; fokus pada pengkajian berkelanjutan terhadap kesehatan fisik pasien, status fungsional, sistem pendukung sosial, sumber-sumber finansial, nilai kesehatan, latar belakang budaya dan etnis tingkat pendidikan, serta rintangan terhadap perawatan.

- 2) Kaji kebutuhan pasien dan keluarga terhadap pendidikan kesehatan berhubungan dengan bagaimana menciptakan terapi di rumah, penggunaan alat-alat medis di rumah, larangan sebagai akibat gangguan kesehatan, dan kemungkinan terjadinya komplikasi. Kaji cara pembelajaran yang lebih diminati pasien (seperti membaca, menonton video). Jika materi tertulis yang digunakan, pastikan materi tertulis layak tersedia. Tipe materi pendidikan yang berbeda-beda dapat mengefektifkan cara pembelajaran yang berbeda pada pasien.
- 3) Kaji bersama-sama dengan pasien dan keluarga terhadap setiap faktor lingkungan di dalam rumah yang mungkin menghalangi dalam perawatan diri seperti ukuran ruangan, kebersihan jalan menuju pintu, lebar jalan, fasilitas kamar mandi, ketersediaan alat-alat yang berguna.
- 4) Berkolaborasi dengan dokter dan staf pada profesi lain (seperti dokter pemberian terapi) dalam mengkaji kebutuhan untuk rujukan kepada pelayanan perawatan rumah atau fasilitas perawatan.
- 5) Kaji persepsi pasien dan keluarga terhadap keberlanjutan perawatan kesehatan di rumah. Mencakup pengkajian terhadap kemampuan keluarga untuk dalam memberikan perawatan kepada pasien.
- 6) Kaji penerimaan pasien terhadap masalah kesehatan.

7) Konsultasikan dengan tim layanan kesehatan yang lain tentang kebutuhan setelah pemulangan (seperti ahli gizi, Pekerja sosial, rehabilitasi, perawat pemberi perawatan kesehatan di rumah). Tentukan kebutuhan rujukan pada waktu yang berbeda (Rahmi, 2011)

b. Diagnosa Keperawatan

Diagnosa keperawatan didasarkan pada pengkajian *discharge planning*, dikembangkan untuk mengetahui kebutuhan klien dan keluarga. Keluarga sebagai unit perawatan memberi dampak terhadap anggota keluarga yang membutuhkan perawatan.

Hasil yang diharapkan jika seluruh prosedur telah lengkap dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Pasien atau keluarga mampu menjelaskan bagaimana keberlangsungan pelayanan kesehatan dirumah, penatalaksanaan atau pengobatan apa yang dibutuhkan, dan kapan mencari pengobatan akibat masalah yang timbul.
- 2) Pasien mampu mendemonstrasikan aktivitas perawatan diri (atau anggota keluarga mampu melakukan perawatan).
- 3) Rintangan terhadap pergerakan pasien dan ambulasi telah diubah sesuai keadaan rumah sehingga tidak membahayakan pasien (Rahmi, 2011)

c. Penatalaksanaan

Menurut Rahmi (2011) penatalaksanaan dapat dibedakan dalam dua bagian yaitu penatalaksanaan yang dilakukan sebelum hari pemulangan, dan penatalaksanaan yang dilakukan pada hari pemulangan.

- 1) Persiapan sebelum hari pemulangan pasien; mempersiapkan pasiendan keluarga dengan memberikan informasi tentang sumber-sumber pelayanan kesehatan, setelah menentukan segala hambatan untuk belajar seta kemauan untuk belajar, mengadakan sesi pengajaran dengan pasien dan keluarga secepat mungkin selama dirawat di rumah sakit (seperti tanda dan gejala terjadinya komplikasi, kepatuhan terhadap pengobatan, kegunaan alat-alat medis, perawatan lanjutan, diet, komunikasikan respon pasien dan keluarga terhadap penyuluhan dan usulan perencanaan pulang kepada anggota tim kesehatam lain yang terlibat dalam perawatan pasien).
- 2) Penatalaksanaan pada hari pemulangan; jika beberapa aktivitas berikut ini dapat dilakukan sebelum hari pemulangan, perencanaan yang dilakukan akan lebih efektif. Adapun aktivitas yang dilakukan pada hari pemulangan anatara lain; biarkan pasien dan keluarga bertanya dan diskusikan isu-isu yang berhubungan dengan perawatan di rumah, periksa intruksi pemulangan dokter, terap, atau kebutuhan akan alat-alat medis yang khusus. Persiapkan kebutuhan dalam perjalanan dan

sediakan alat-alat yang dibutuhkan sebelum pasien sampai di rumah, tentukan apakah pasien dan keluarga telah dipersiapkan dan dalam kebutuhan transportasi menuju ke rumah, jaga privasi pasien sesuai kebutuhan.

d. Evaluasi

Pasien dan anggota keluarga menjelaskan tentang penyakit, pengobatan yang dibutuhkan, tanda-tanda fisik atau gejala yang harus dilaporkan kepada dokter, pasien atau anggota keluarga mendemostrasikan setiap pengobatan yang akan dilanjutkan di rumah, perawat yang melakukan perawatan di rumah memperhatikan keadaan rumah, mengidentifikasi rintangan yang dapat membahayakan bagi pasien dan mengajurkan perbaikan.

C. Tinjauan Umum Tentang Keperawatan Anak Diare

Keperawatan anak telah mengalami pergeseran yang sangat mendasar. Anak sebagai klien tidak lagi dipandang sebagai individu tunggal yang merupakan replika mini orang dewasa. Akan tetapi, anak merupakan makhluk unik yang memiliki kebutuhan spesifik yang berbeda dengan orang dewasa (Arbianingsih, 2011).

Keluarga merupakan unsur penting dalam perawatan anak mengingat anak bagian dari keluarga, dengan demikian dalam pemberian asuhan keperawatan diperlukan keterlibatan keluarga. Hal

ini sangat penting mengingat anak selalu membutuhkan orang tua selama di rumah sakit seperti dalam aktivitas bermain atau program perawatan lainnya seperti pengobatan (Hidayat, 2008).

Terkait dengan anak Al-quran mengingatkan dengan kehadiran anak, Allah SWT mencoba menguji manusia dengan tanggung jawab untuk merawat, mengasuh dan mendidiknya sebagai generasi penerus agar mereka kelak menjadi insan yang taqwa kepada Allah, sehat jasmani rohani, cerdas dan terampil.

Dalam hal ini Allah berfirman dalam Surat At-Taghabun ayat 15:

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Terjemahannya:

“Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu) dan disisi Allah-lah pahala yang besar”.

1. Peran Perawat Dalam Keperawatan Anak

Dalam melaksanakan asuhan keperawatan anak, perawat mempunyai peran dan fungsi sebagai perawat anak, di antaranya:

- a. Pemberi perawatan, peran utama perawat adalah memberikan pelayanan keperawatan anak, sebagai perawat anak, pemberian pelayanan keperawatan dapat dilakukan dengan memenuhi kebutuhan dasar anak seperti kebutuhan asah, asih, dan asuh.
- b. Sebagai advokat keluarga, selain melakukan tugas utama dalam merawat anak, perawat juga mampu sebagai advokat keluarga sebagai pembela keluarga dalam beberapa hal seperti dalam

menentukan haknya sebagai klien.

- c. Pencegahan penyakit, upaya pencegahan merupakan bagian dari bentuk pelayanan keperawatan sehingga setiap dalam melakukan asuhan keperawatan perawat harus selalu mengutamakan tindakan pencegahan terhadap timbulnya masalah baru sebagai dampak dari penyakit atau masalah yang diderita.
- d. Pendidikan, dalam memberikan asuhan keperawatan pada anak, perawat harus mampu berperan sebagai pendidik, sebab beberapa pesan dan cara mengubah perilaku pada anak atau keluarga harus selalu dilakukan dengan pendidikan kesehatan khususnya dalam keperawatan. Melalui pendidikan ini diupayakan anak tidak lagi mengalami gangguan yang sama dan dapat mengubah perilaku yang tidak sehat.
- e. Konseling, merupakan upaya perawat dalam melaksanakan perannya dengan memberikan waktu untuk berkonsultasi terhadap masalah yang dialami oleh anak maupun keluarga. Berbagai masalah tersebut diharapkan mampu diatasi dengan cepat dan diharapkan pula tidak terjadi kesenjangan antara perawat keluarga maupun anak itu sendiri. Konseling ini dapat memberikan kemandirian keluarga dalam mengatasi masalah kesehatan.
- f. Kolaborasi, merupakan tindakan kerja sama dalam menentukan tindakan yang akan dilaksanakan oleh perawat dengan tim


kesehatan lain. Pelayanan kesehatan anak tidak dapat dilaksanakan secara mandiri oleh tim perawat tetapi harus melibatkan tim kesehatan lain seperti dokter, ahli gizi, psikolog dan lain-lain, mengingat anak merupakan individu yang kompleks yang membutuhkan perhatian dalam perkembangan.

- g. Pengambilan keputusan etik, dalam mengambil keputusan perawat mempunyai peran yang sangat penting sebab perawat selalu berhubungan dengan anak kurang lebih 24 jam selalu disamping anak, maka peran sebagai pengambilan keputusan etik dapat dilakukan oleh perawat, seperti akan melakukan tindakan pelayanan keperawatan.
- h. Peneliti, peran ini sangat penting yang harus dimiliki oleh semua perawat anak. Sebagai peneliti perawat harus melakukan kajian-kajian keperawatan anak, yang dapat dikembangkan untuk perkembangan teknologi keperawatan. Peran sebagai peneliti dapat dilakukan dalam meningkatkan mutu pelayanan keperawatan anak (Hidayat, 2008).

2. Paradigma Keperawatan Anak

Paradigma keperawatan anak merupakan suatu landasan berpikir dalam penerapan ilmu keperawatan anak. Tanpa ini batasan dan lingkup keperawatan tidak mudah dipahami sejak jelas. Penggunaan paradigma keperawatan anak tetap mengacu pada konsep paradigma keperawatan secara umum yang merupakan cara

pandang dalam suatu ilmu. Landasan berpikir tersebut terdiri dari empat komponen, diantaranya manusia dalam hal ini anak, keperawatan, sehat-sakit dan lingkungan yang dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3. Komponen Paradigma Keperawatan Anak

Dalam perawatan anak, yang terjadi individu (klien) dalam hal ini adalah anak-anak diartikan sebagai seseorang yang berusia kurang dari delapan belas tahun dalam masa tumbuh kembang dengan kebutuhan khusus baik kebutuhan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual.

Anak merupakan individu yang berada dalam satu rentang perubahan perkembangan yang dimulai dari bayi hingga remaja. Masa anak merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai dari bayi (0-1 tahun) usia bermain (1-2,5 tahun), pra sekolah (2,5-5 tahun), usia sekolah (5-11 tahun), hingga remaja (11-18 tahun). Rentang ini berbeda antara anak satu dengan yang lain mengingat latar anak berbeda. Pada anak terdapat rentang perubahan pertumbuhan dan perkembangan yaitu rentang cepat dan lambat.

Dalam proses berkembang anak memiliki ciri fisik, kognitif, konsep diri, pola koping, dan perilaku sosial.

Rentang sehat-sakit merupakan balasan yang dapat diberikan bantuan pelayanan keperawatan pada anak, adalah suatu kondisi anak berada dalam status kesehatan yang meliputi sejahtera, sehat optimal, sehat, sakit kronis, dan meninggal. Rentang ini suatu alat ukur dalam menilai status kesehatan yang bersifat dinamis dalam setiap waktu, selama dalam batas rentang tersebut anak membutuhkan bantuan perawat baik secara langsung merupakan tidak langsung, seperti bila anak berada pada rentang sehat maka upaya perawat untuk meningkatkan derajat kesehatan sampai mencapai taraf kesejahteraan baik fisik, sosial maupun spiritual. Demikian sebaliknya, apabila kondisi anak dalam kondisi kritis atau meninggal maka perawat selalu memberikan bantuan dan dukungan pada keluarga. Jadi, batasan sehat secara umum dapat diartikan suatu keadaan yang sempurna baik fisik mental dan sosial serta tidak hanya bebas dari penyakit dan kelemahan (WHO, 1974) yang memiliki ciri sebagai berikut, memiliki kemampuan merefleksikan perhatian individu sebagai manusia, memiliki pandangan terhadap sehat dalam konteks lingkungan baik secara internal maupun eksternal dan memiliki hidup yang kreatif dan produktif.

Lingkungan dalam paradigma keperawatan anak yang dimaksud adalah lingkungan eksternal maupun internal yang

berperan dalam perubahan status kesehatan anak, seperti keturunan, jenis kelamin, emosi, dan lain-lain. Contoh lingkungan internal yang dapat berperan dalam perubahan status kesehatan seperti pada anak lahir dengan memiliki kasus penyakit bawaan maka dikemudian hari akan terjadi perubahan status kesehatan yang cenderung mudah sakit. Kemudian contoh faktor lingkungan eksternal yang berperan dalam status kesehatan anak adalah gizi anak, peran orang tua, saudara, teman sebaya atau masyarakat yang berada dalam lingkungan tersebut juga memiliki potensi untuk mempengaruhi status kesehatan anak seperti apabila lingkungan anak tidak ada dukungan untuk berkembang selalu tertekan, dibiarkan tanpa kontrol yang jelas, tidak aman dan tanpa adanya kasih sayang, maka status kesehatan anak tidak akan dapat mencapai tingkat kesejahteraan, dan bahkan anak cenderung mudah terjadi sakit.

Komponen ini merupakan pelayanan keperawatan yang diberikan kepada anak dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan secara optimal dengan melibatkan keluarga seperti adanya dukungan, pendidikan kesehatan, dan upaya dalam rujukan kesehatan dalam program perawatan anak. Upaya tersebut dapat dengan keterlibatan secara langsung pada keluarga meningkat keluarga merupakan sistem terbuka yang anggotanya dapat dirawat secara efektif, dan dalam keperawatan anak keluarga sangat berperan dalam menentukan keberhasilan asuhan keperawatan,

disamping keluarga sendiri mempunyai peran yang sangat penting bagi perlindungan anak dan mempunyai peran untuk memenuhi kebutuhan anak, keluarga juga mempunyai peran seperti peran dalam mempertahankan kelangsungan hidup bagi anak dan keluarga, menjaga keselamatan anak dan kesejahteraan anak untuk mencapai masa depan yang lebih baik, melalui interaksi tersebut dalam terwujud kesejahteraan anak (Hidayat, 2008).

3. Prinsip Keperawatan Anak

Prinsip perawatan anak didasarkan pada perspektif keperawatan anak. Saat ini keperawatan anak telah mengalami pergeseran yang sangat mendasar. Anak sebagai klien tidak lagi dipandang sebagai individu tunggal yang merupakan replika mini orang dewasa. Akan tetapi, anak merupakan makhluk unik yang memiliki kebutuhan spesifik dan berbeda dengan orang dewasa. Hal yang sama juga terjadi pada keluarga. Anggota keluarga klien tidak lagi dipandang hanya sebagai pengunjung bagi anak yang sakit tetapi keluarga merupakan mitra bagi perawat dalam menentukan kebutuhan anak dan menyusun perencanaan secara bersama-sama tehnik pemenuhannya dalam bentuk pelayanan keperawatan yang berpusat pada keluarga (*family centered care*). Asuhan keperawatan yang diberikan kepada klien anak dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasarnya, harus berlandaskan pada prinsip *atraumatic care* (asuhan yang terapeutik). Memahami prinsip keperawatan anak

merupakan hal yang penting bagi seorang perawat anak pada khususnya. Hal diperuntukkan agar perawat dapat memberikan asuhan keperawatan yang senantiasa berpegang pada prinsip perawatan anak. Hal ini yang kemudian berkembang juga adalah prinsip *case management* pada asuhan keperawatan anak.

Dimana prinsip *Family centered care*, sistem asuhan keperawatan yang diberikan adalah dalam rangka mendukung, menghargai, mendorong, dan meningkatkan kekuatan dan kompetensi keluarga melalui pemberdayaan, pendekatan dan pemberian bantuan efektif. *Atraumatic care* adalah bentuk perawatan terapeutik yang diberikan oleh tenaga kesehatan dalam tatanan pelayanan kesehatan anak, melalui penggunaan tindakan yang dapat mengurangi distress fisik maupun distress psikologis yang dialami anak maupun orang tuanya. *Atraumatic care* bukan satu intervensi yang nyata terlihat, tetapi memberi perhatian pada apa, siapa, dimana, mengapa dan bagaimana prosedur dilakukan pada anak dengan tujuan mencegah dan mengurangi stress fisik dan psikologis. Selanjutnya, *Case manajemen* kasus dimulai dari pelayanan keperawatan dewasa. Namun, dengan cepat dapat diterapkan pada pelayanan keperawatan pediatrik. Dimana manfaat penatalaksanaan manajemen kasus ialah meningkatkan kepuasan pasien, mengurangi fragmentasi pelayanan, dan memudahkan untuk mengurai dan mengukur hasil yang dicapai pada sekelompok pasien

yang homogeny (Arbianingsih, 2011).

4. Perawatan dan Pengobatan Diare pada Anak

Selama anak diare terjadi peningkatan hilangnya cairan dan elektrolit (natrium, kalium dan bikarbonat) yang terkandung dalam tinja cair anak. Dehidrasi terjadi bila hilangnya cairan dan elektrolit ini tidak diganti secara adekuat, sehingga timbullah kekurangan cairan dan elektrolit. Derajat dehidrasi diklasifikasikan sesuai dengan gejala dan tanda yang mencerminkan jumlah cairan yang hilang. Rejimen dehidrasi dipilih sesuai dengan derajat dehidrasi yang ada. Selama diare penurunan asupan makanan dan penyerapan nutrisi dan peningkatan kebutuhan nutrisi, sering secara bersama-sama menyebabkan penurunan berat badan dan berlanjut ke gagal tumbuh. Pada gilirannya, gangguan gizi dapat menyebabkan diare menjadi lebih parah, lebih lama dan lebih sering terjadi, dibandingkan dengan kejadian diare pada anak yang tidak menderita gangguan gizi. Lingkaran setan ini dapat diputus dengan memberikan makanan kaya gizi selama anak diare dan ketika anak sehat (WHO, 2009).

Perawatan dapat dilakukan sebagai berikut:

a. Berikan Oralit

Untuk mencegah terjadinya dehidrasi dapat dilakukan mulai dari rumah tangga dengan memberikan oralit osmolaritas rendah, dan bila tidak tersedia berikan cairan rumah tangga air tajin, kuah sayur, air matang. Oralit saat ini yang beredar dipasaran sudah

oralit yang baru dengan osmoalaritas yang rendah, yang dapat mengurangi rasa mual dan muntah. Oralit merupakan cairan yang terbaik bagi penderita diare untuk mengganti cairan yang hilang. Bila penderita tidak bisa minum harus segera di bawa ke sarana kesehatan untuk mendapat pertolongan cairan melalui infus.

Derajat dehidrasi dibagi dalam 3 klasifikasi:

1) Diare tanpa dehidrasi

Tanda diare tanpa dehidrasi, bila terdapat 2 tanda di bawah ini atau lebih :

- a) Keadaan umum : baik
- b) Mata : normal
- c) Rasa haus : normal, minum biasa
- d) Turgor kulit : kembali cepat

Dosis oralit bagi penderita diare tanpa dehidrasi sebagai berikut:

Umur < 1 tahun : $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ gelas setiap kali anak mencret

Umur 1-4 tahun : $\frac{1}{2}$ - 1 gelas setiap kali anak mencret

Umur diatas 5 tahun : 1 - 1 $\frac{1}{2}$ gelas setiap kali anak mencret

2) Diare dehidrasi ringan / sedang

Diare dengan dehidrasi Ringan/Sedang, bila terdapat 2 tanda di bawah ini atau lebih:

- a) Keadaan umum : Gelisah, rewel

- b) Mata : Cekung
- c) Rasa haus : Haus, ingin minum banyak
- d) Turgor kulit : kembali lambat

Dosis oralit yang diberikan dalam 3 jam pertama 75 ml/ kg bb dan selanjutnya diteruskan dengan pemberian oralit seperti diare tanpa dehidrasi.

3) Diare dehidrasi berat

Diare dehidrasi berat, bila terdapat 2 tanda di bawah ini atau lebih:

- a) Keadaan umum : Lesu, lunglai, atau tidak sadar
- b) Mata : Cekung
- c) Rasa haus : Tidak bisa minum atau malas minum
- d) Turgor Kulit : Kembali sangat lambat (lebih dari 2 detik)

Penderita diare yang tidak dapat minum harus segera dirujuk ke Puskesmas untuk di infus.

b. Berikan Obat Zinc

Zinc merupakan salah satu mikronutrien yang penting dalam tubuh. Zinc dapat menghambat enzim INOS (*Inducible Nitric Oxide Synthase*), dimana ekskresi enzim ini meningkat selama diare dan mengakibatkan hipersekresi epitel usus. Zinc juga berperan dalam epitelisasi dinding usus yang mengalami kerusakan morfologi dan fungsi selama kejadian diare.

Pemberian Zinc selama diare terbukti mampu mengurangi lama dan tingkat keparahan diare, mengurangi frekuensi buang air besar, mengurangi volume tinja, serta menurunkan kekambuhan kejadian diare pada 3 bulan berikutnya.(Black, 2003). Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa Zinc mempunyai efek protektif terhadap diare sebanyak 11 Zinc mempunyai tingkat hasil *pilot study* menunjukkan bahwa Zinc mempunyai tingkat hasil guna sebesar 67% (Hidayat 1998 dan Soernarto 2007). Berdasarkan bukti ini semua anak diare harus diberi Zinc segera saat anak mengalami diare.

Dosis pemberian Zinc pada balita:

- 1) Umur < 6 bulan : ½ tablet (10 Mg) per hari selama 10 hari
- 2) Umur > 6 bulan : 1 tablet (20 Mg) per hari selama 10 hari

Zinc tetap diberikan selama 10 hari walaupun diare sudah berhenti. Cara pemberian tablet Zinc: Larutkan tablet dalam 1 sendok makan air matang atau ASI, sesudah larut berikan pada anak diare.

c. Pemberian ASI / Makanan:

Pemberian makanan selama diare bertujuan untuk memberikan gizi pada penderita terutama pada anak agar tetap kuat dan tumbuh serta mencegah berkurangnya berat badan. Anak

yang masih minum ASI harus lebih sering diberi ASI. Anak yang minum susu formula juga diberikan lebih sering dari biasanya. Anak usia 6 bulan atau lebih termasuk bayi yang telah mendapatkan makanan padat harus diberikan makanan yang mudah dicerna dan diberikan sedikit lebih sedikit dan lebih sering. Setelah diare berhenti, pemberian makanan ekstra diteruskan selama 2 minggu untuk membantu pemulihan berat badan.

d. Pemberian Antibiotika hanya atas indikasi

Antibiotika tidak boleh digunakan secara rutin karena kecilnya kejadian diare pada balita yang disebabkan oleh bakteri. Antibiotika hanya bermanfaat pada penderita diare dengan darah (sebagian besar karena shigellosis), suspek kolera.

Obat-obatan Anti diare juga tidak boleh diberikan pada anak yang menderita diare karena terbukti tidak bermanfaat. Obat anti muntah tidak dianjurkan kecuali dehidrasi ataupun meningkatkan status gizi anak, bahkan sebagian besar menimbulkan efek samping yang berbahaya dan bisa berakibat fatal. Obat anti protozoa digunakan bila terbukti diare disebabkan oleh parasit (*amuba, giardia*).

e. Pemberian Nasehat

Ibu atau pengasuh yang berhubungan erat dengan balita harus diberi nasehat tentang:

1) Kapan harus membawa kembali balita ke petugas kesehatan

bila:

- a) Diare lebih sering
- b) Muntah berulang
- c) Sangat haus
- d) Makan/minum sedikit
- e) Timbul demam
- f) Tinja berdarah
- g) Tidak membaik dalam 3 hari (Depkes, 2011).

5. Pencegahan Diare

Kegiatan pencegahan penyakit diare yang benar dan efektif yang dapat dilakukan adalah:

a. Perilaku Sehat

1) Pemberian ASI

ASI adalah makanan paling penting baik untuk bayi. Komponen zat makanan tersedia dalam bentuk yang ideal dan seimbang untuk dicerna dan diserap secara optimal oleh bayi. ASI saja sudah cukup untuk menjaga pertumbuhan sampai 6 bulan. Tidak ada makanan lain yang dibutuhkan selama masa ini.

ASI bersifat steril, berbeda dengan sumber susu lain seperti susu formula atau cairan lain yang disiapkan dengan air atau bahan-bahan dapat terkontaminasi dalam botol yang kotor. Pemberian ASI saja, tanpa cairan atau makanan lain dan tanpa menggunakan botol, menghindarkan anak dari bahaya bakteri dan organisme lain yang akan menyebabkan diare. Keadaan seperti ini disebut disusui secara penuh (Memberikan ASI Eksklusif).

2) Makanan Pendamping ASI

Pemberian makanan pendamping ASI adalah saat bayi secara bertahap mulai dibiasakan dengan makanan orang dewasa. Perilaku pemberian makanan pendamping ASI yang baik meliputi perhatian terhadap kapan, apa, dan bagaimana makanan pendamping ASI diberikan. Adapaun beberapa saran untuk meningkatkan pemberian makanan pendamping ASI adalah, pengenalan makanan lunak ketika anak berumur 6 bulan dan dapat teruskan pemberian ASI, tambahkan minyak, lemak dan gula ke dalam nasi/bubur dan biji-bijian untuk energy, cuci tangan sebelum menyiapkan makanan dan menyuapi anak, dan yang terakhir masak makanan dengan benar

Dalam Surah Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ ﴾

Terjemahannya:

"Para ibu hendaklah menyusuhkan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan." (Qs.Al-Baqarah: 233).

Ajaran Islam juga memberikan perhatian cukup kepada kebersihan makanan dan minuman. Orang muslim dianjurkan memilih makanan yang baik dan dilarang memakan segala yang najis dan apa saja yang mengancam kesehatan dan keselamatannya. Sebagaimana dalam Q.S Al-baqarah/2 ayat 172 :

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ،

Terjemahnya :

Makanlah diantara rezki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu (Dikutip).

3) Menggunakan Air Bersih Yang Cukup

Penularan kuman infeksius penyebab diare ditularkan melalui Face-oral kuman tersebut dapat ditularkan bila masuk ke dalam mulut melalui makanan, minuman atau benda yang tercemar dengan tinja, misalnya jari-jari tangan, makanan yang wadah atau tempat makan-minum yang dicuci dengan air tercemar.

Masyarakat yang terjangkau oleh penyediaan air yang benar-benar bersih mempunyai risiko menderita diare lebih kecil disbanding dengan masyarakat yang tidak mendapatkan air bersih.

4) Mencuci Tangan

Kebiasaan yang berhubungan dengan kebersihan perorangan yang penting dalam penularan kuman diare adalah mencuci tangan. Mencuci tangan dengan sabun, terutama sesudah buang air besar, sesudah membuang tinja anak, sebelum menyiapkan makanan, sebelum menyuapi makan anak dan sebelum makan, mempunyai dampak dalam kejadian diare (menurunkan angka kejadian diare).

Dalam Hadist HR.Muslim mengemukakan bahwa: "*Apabila salah satu darimu bangun tidur hendaknya dia mencuci tangannya*". (HR. Muslim).

Dimana hadist ini menjelaskan bahwa membasuh tangan ada juga didalam rukun wudhu yang dilakukan minimal 5 kali dalam sehari, hadist diatas menunjukkan bahwa islam sangat memperhatikan masalah kebersihan diri terutama tangan.

5) Menggunakan Jamban

Pengalaman di beberapa Negara membuktikan bahwa upaya penggunaan jamban mempunyai dampak yang besar dalam menurunkan risiko terhadap penyakit diare. Keluarga yang tidak mempunyai jamban harus membuat jamban dan keluarga harus buang air besar di jamban.

Yang harus diperhatikan adalah, keluarga harus mempunyai jamban yang berfungsi baik dan dapat dipakai oleh

seluruh anggota keluarga, bersihkan jamban secara teratur, dan gunakan alas kaki bila akan membuang air besar.

6) Membuang Tinja Bayi Dengan Benar

Banyak orang beranggapan bahwa tinja bayi itu tidak berbahaya. Hal ini tidak benar karena tinja bayi dapat pula menularkan penyakit pada anak-anak dan orang tuanya. Tinja bayi harus dibuang secara benar.

Dalam Hadist HR. Abu Dawud dan Ibnu Majjah: "*Takutlah tiga tempat yang dilaknat, buang kotoran pada sumber air yang mengalir, dijalan dan tempat berteduh*". (HR. Abu Dawud dan Ibu Majjaah).

Dimana hadist ini menjelaskan bahawa sumber air yang mengalir adalah sungai, artinya kita dilarang membuang kotoran termasuk tinja kedalam sungai, baik secara langsung atau mengalirkannya melalui pipa, melalui selokan, kolam atau lainnya yang akhirnya air itu bermuara ke sungai. Sesuai sifatnya, air akan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah, sungai yang bersumber dari pergunungan akan mengalir jauh sampai ke muarah dan masuk ke laut. Disepanjang itu sungai tersebut akan banyak sekali orang yang memanfaatkannya untuk berbagai keperluan hidup. Jika tercemar oleh kotoran/tinja kita, maka kita telah menyebarkan berbagai penyakit. Mengapa kita juga dilarang BAB di jalan dan

tempat berteduh, termasuk pinggir sungai, pematang/galengan sawah, kebun atau belukar yang dilalui orang dan tempat berteduh misalnya di pohon rindang. Bau kotoran kita akan mengganggu orang lain, bahkan dapat menyebarkan penyakit melalui lalat atau diterbangkan angin. (Pemerintah Indonesia, MUI).

7) Pemberian Imunisasi Campak

Pemberian imunisasi campak pada bayi sangat penting untuk mencegah agar bayi tidak terkena penyakit campak. Anak yang sakit campak sering disertai diare, sehingga pemberian imunisasi campak juga dapat mencegah diare. Oleh karena itu berilah imunisasi campak segera setelah bayi berumur 9 bulan.

b. Penyehatan Lingkungan

1) Penyediaan Air Bersih

Mengingat bahwa ada beberapa penyakit yang dapat ditularkan melalui air antara lain adalah diare, kolera, disentri hepatitis, penyakit kulit, penyakit mata, dan berbagai penyakit lainnya, maka penyediaan air bersih baik secara kuantitas dan kualitas mutlak diperlukan dalam memenuhi kebutuhan air sehari-hari termasuk untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Untuk mencegah terjadinya penyakit tersebut, penyediaan air bersih cukup disetiap rumah tangga harus tersedia. Disamping itu perilaku hidup bersih harus tetap

dilaksanakan.

2) Pengelolaan Sampah

Sampah merupakan sumber penyakit dan tempat berkembang biaknya vektor penyakit seperti lalat, nyamuk, tikus, kecoa dan sebagainya. Selain itu, sampah dapat mencemari tanah dan menimbulkan gangguan kenyamanan dan estetika seperti bau yang tidak sedap dan pemandangan yang tidak enak dilihat. Oleh karena itu pengelolaan sampah sangat penting, untuk mencegah penularan penyakit tersebut. Tempat sampah harus disediakan, sampah harus dikumpulkan setiap hari dan dibuang ke tempat penampungan sementara. Bila tidak terjangkau oleh pelayanan pembuangan sampah ke tempat pembuangan terakhir dapat dilakukan pemusnahan sampah dengan cara ditimbun atau dibakar.

Begitu pentingnya kebersihan menurut Islam, sehingga orang yang membersihkan diri atau mengusahakan kebersihan akan dicintai oleh Allah swt sebagaimana firmanya dalam Q.S Al-baqarah/2 ayat **إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ**

Terjemahnya :

“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang yang mensucikan/membersihkan diri” (Dikutip)

3) Sarana Pembuangan Air Limbah


Alir limbah baik limbah pabrik atau limbah rumah tangga harus dikelola sedemikian rupa agar tidak menjadi sumber

penularan penyakit.

Sarana pembuangan air limbah yang tidak memenuhi syarat akan menimbulkan bau, mengganggu estetika dan dapat menjadi tempat perindukan nyamuk dan bersarangnya tikus, kondisi ini dapat berpotensi menularkan penyakit seperti leptospirosis, filariasis, untuk daerah yang endemis filaria. Bila ada saluran pembuangan air limbah di halaman, secara rutin harua dibersihkan, agar air limbah dapat mengalir, sehingga tidak menimbulkan bau yang tidak sedap dan tidak menjadi tempat perindukan nyamuk (Depkes, 2011).

D. KERANGKA KONSEP

Berdasarkan tinjauan pustaka, secara sistematis dapat disusun kerangka konsep penelitian yang digambarkan dalam bentuk skema sebagai berikut:



Gambar 4. Variabel Dependent dan Variabel Independen

Keterangan :

□ : Variabel tidak diteliti

→ : Variabel yang diteliti

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian *eksperimen one group pre-post test design* yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh *discharge planning* terhadap perilaku ibu dalam perawatan anak diare ruangan Ar-Rahim, RSUD Haji Prov.Sul-Sel.

Tabel 3.1
Desain Penelitian *One Group Pre and Post Design*

Subjek	Pra-Test	Intervensi	Post-Test
KP	O1	X	O2

Keterangan :

- KP : Kelompok Perlakuan
- X : Diberikan *discharge planning*
- O1 : Observasi sebelum perlakuan
- O2 : Observasi setelah perlakuan

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Ruang Ar-Rahim RSUD Haji Prov. Sul-Sel. Alasan pemilihan tempat karena ingin mengetahui perilaku ibu dalam perawatan anak diare yang diberikan *discharge planning*.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 05 Juni – 03 Juli 2014.

C. Populasi, Sampel, dan Sampling

1. Populasi

Populasi adalah semua ibu yang memiliki anak diare pada saat penelitian di ruang Ar-Rahim, RSUD Haji Makassar pada tanggal 05 Juni sampai dengan 03 Juli 2014.

Berdasarkan dari pengambilan data awal bahwa pasien anak diare di bulan Januari 2014 terdapat 53 anak yang mengalami diare.

2. Sampel

Sampelnya adalah Sebagian Ibu yang memiliki anak diare pada saat penelitian di ruang Ar-Rahim RSUD Haji Makassar sebanyak 30 orang responden. Hasil penelitian dapat ditentukan dengan kriteria sampel inklusi dan eksklusi.

Kriteria Inklusi:

- a. Anak yang dirawat inap dengan mengalami diare di ruangan Ar-Rahim, RSUD Haji Makassar pada tanggal 05 Juni sampai dengan 03 Juli 2014.
- b. Anak yang dirawat inap lebih dari 3 Hari.
- c. Ibu bersedia menjadi responden.

Kriteria Eksklusi:

- a. Anak yang tidak rawat inap kurang dari 3 hari.
- b. Ibu yang menolak sebagai responden.

3. Sampling

Penelitian ini menggunakan sampling *non-probability* dengan menggunakan metode *accidental sampling* yaitu teknik penetapan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dimana pemilihan sekelompok subjek didasarkan atas kriteria-kriteria tertentu yang memiliki kaitan dengan kriteria populasi yang telah kita ketahui sebelumnya.

D. Metode Pengumpulan Data


1. Data primer

Data yang diperoleh langsung dari responden dengan menggunakan kuesioner yang telah tersedia untuk mendapatkan identitas umum pasien dan mengobservasi perilaku ibu.

2. Data sekunder

Data yang diperoleh langsung dari ruang perawatan anak ruangan Ar-Rahim RSUD Haji Prov.Sul-Sel dan data-data yang dapat mendukung penelitian ini.

E. Kerangka Kerja



Gambar 5. Kerangka Kerja

F. Instrument Penelitian

Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang wajib dijawab oleh responden. Instrument pengumpulan data berupa kuesioner tersebut antara lain memuat indikator tentang pengaruh discharge planning terhadap perilaku ibu dalam perawatan anak diare ruangan Ar- Rahim di RSUD Haji Prov.Sul-Sel

G. Pengolahan Data

1. Mengedit (*Editing*)

Kuisisioner yang diisi oleh responden terlebih dahulu dilakukan editing untuk mengecek kebenaran data berdasarkan pengisian lembar kuisisioner dan juga kelengkapan data. Apabila terdapat ketidaksesuaian dapat dilengkapi segera oleh peneliti.

2. Pengkodean (*Coding*)

Suatu metode untuk mengkonfirmasi data yang dikumpulkan selama penelitian ke dalam simbol yang cocok untuk keperluan analisis terhadap lembar observasi jawaban yang diajukan.

3. Entry

Memasukkan data yang diperoleh menggunakan fasilitas komputer dengan menggunakan program SPSS versi 11,5.

4. Tabulasi (*Tabulating*)

Sebelum data klasifikasi, data dikelompokkan terlebih dahulu untuk kepentingan penelitian ini. Selanjutnya data ditabulasikan sehingga diperoleh frekuensi dari masing-masing kelompok pertanyaan dan setiap alternatif jawaban yang tersedia.

H. Analisa Data

1. Analisis Univariat

Dilakukan dengan menggunakan tabel distribusi dan persentase dari masing-masing variable.

2. Analisis Bifariat

Ada pengaruh antara variable *discharge planning* dengan variable perilaku ibu dalam perawatan anak diare. dalam pengambilan keputusan yaitu nilai $p < 0,05$ maka Hipotesis diterima.

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan *uji Wilcoxon* untuk menentukan pengaruh *discharge planning* terhadap perilaku ibu dalam perawatan anak diare di ruangan Ar-Rahim RSUD Haji Makassar 2014

I. Penyajian Data

Dalam penyajian data penelitian ini, peneliti menyajikan dalam bentuk tabel dan narasi.

J. Etika Penelitian

Menurut Yurisa (2008) dalam bukunya Etika Penelitian Kesehatan, bahwasanya Komite Nasional Etika Penelitian telah membagi empat etika yang harus ada dalam melakukan penelitian kesehatan yaitu:

1. Menghormati harkat dan martabat manusia (*respect for human dignity*).

Peneliti perlu mempertimbangkan hak-hak subyek untuk mendapatkan informasi yang terbuka berkaitan dengan jalannya penelitian serta memiliki kebebasan menentukan pilihan dan bebas dari paksaan untuk berpartisipasi dalam kegiatan penelitian (*autonomy*). Beberapa tindakan yang terkait dengan prinsip menghormati harkat dan martabat manusia adalah peneliti mempersiapkan formulir persetujuan subyek (*informed consent*).

2. Menghormati privasi dan kerahasiaan subyek penelitian (*respect for privacy and confidentiality*).

Setiap manusia memiliki hak-hak dasar individu termasuk privasi dan kebebasan individu. Pada dasarnya penelitian akan memberikan akibat terbukanya informasi individu termasuk informasi yang bersifat pribadi. Sedangkan, tidak semua orang menginginkan informasinya diketahui oleh orang lain, sehingga peneliti perlu memperhatikan hak-hak dasar individu tersebut. Dalam aplikasinya, peneliti tidak boleh menampilkan informasi mengenai identitas baik nama maupun alamat asal subyek dalam kuesioner dan alat ukur apapun untuk menjaga anonimitas dan kerahasiaan identitas subyek. Peneliti dapat menggunakan koding (inisial atau identification number) sebagai pengganti identitas responden.

3. Keadilan dan inklusivitas (*respect for justice and inclusiveness*).

Prinsip keadilan memiliki konotasi keterbukaan dan adil. Untuk memenuhi prinsip keterbukaan, penelitian dilakukan secara jujur, hati-hati, profesional, berperikemanusiaan, dan memperhatikan faktor-faktor ketepatan, keseksamaan, kecermatan, intimitas, psikologis serta perasaan religius subyek penelitian. Lingkungan penelitian dikondisikan agar memenuhi prinsip keterbukaan yaitu kejelasan prosedur penelitian.

Keadilan memiliki bermacam-macam teori, namun yang terpenting adalah bagaimanakah keuntungan dan beban harus didistribusikan di

antara anggota kelompok masyarakat. Prinsip keadilan menekankan sejauh mana kebijakan penelitian membagikan keuntungan dan beban secara merata atau menurut kebutuhan, kemampuan, kontribusi dan pilihan bebas masyarakat. Sebagai contoh dalam prosedur penelitian, peneliti mempertimbangkan aspek keadilan gender dan hak subyek untuk mendapatkan perlakuan yang sama baik sebelum, selama, maupun sesudah berpartisipasi dalam penelitian.

4. Memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan (*balancing harms and benefits*)

Peneliti melaksanakan penelitian sesuai dengan prosedur penelitian guna mendapatkan hasil yang bermanfaat semaksimal mungkin bagi subyek penelitian dan dapat digeneralisasikan di tingkat populasi (*beneficence*). Peneliti meminimalisasi dampak yang merugikan bagi subyek (*nonmaleficence*). Apabila intervensi penelitian berpotensi mengakibatkan cedera atau stres tambahan maka subyek dikeluarkan dari kegiatan penelitian untuk mencegah terjadinya cedera, kesakitan, stres, maupun kematian subyek penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini mengenai Pengaruh *Discharge Planning* terhadap perilaku ibu dalam perawatan anak diare diruang Ar-Rahim RSUD Haji Makassar, dimulai dari tanggal 05 Juni sampai dengan 03 Juli 2014. Para ibu yang memiliki anak menderita diare yang menjadi responden (sampel) pada penelitian ini adalah 30 orang. Data tersebut selanjutnya dilakukan *editing, coding, scoring* dan *tabulating*.

Semua data kuesioner tidak ada yang rusak, sehingga semua dapat dilakukan perhitungan. Dari hasil pengolahan data yang dilakukan, maka hasil penelitian dapat disajikan sebagai berikut:

1. Analisis Univariat

a. Distribusi responden berdasarkan umur

Tabel. 4.1
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Umur
Di Ruang Ar-Rahim RSUD Haji Makassar 2014

Umur	f	%
<20 Tahun	4	13,3
20-30 Tahun	16	53,4
31-40 Tahun	9	30,0
>40 Tahun	1	3,3
Jumlah	30	100,0

Sumber data : Data Primer 2014

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa responden berada pada rentang umur 20-30 tahun sebanyak 16 orang (53,4%) dan paling sedikit

responden dengan umur >40 tahun sebanyak 1 orang (3,3%).

b. Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan

Tabel.4.2
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pendidikan
Di ruang Ar-Rahim RSUD Haji Makassar 2014

Pendidikan	f	%
SD	12	40,0
SMP	8	26,7
SLTA	7	23,3
DIPLOMA/S1	3	10,0
Jumlah	30	100,0

Sumber data: Data Primer 2014

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa kebanyakan responden dengan pendidikan SD sebanyak 12 orang (40,0%) dan yang berpendidikan Diploma atau Perguruan Tinggi sebanyak 3 orang (10,0%).

c. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pekerjaan

Tabel.4.3
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pekerjaan
Di Ruang Ar-Rahim RSUD Haji Makassar 2014

Pendidikan	f	(%)
IRT	30	100,0
Jumlah	30	100,0

Sumber Data : Data Primer 2014

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa semua responden memiliki pekerjaan sebagai Ibu rumah tangga sebanyak 30 orang (100,0%)

2. Analisis

Untuk melihat apakah ada pengaruh *discharge planning*

terhadap perilaku ibu dalam perawatan anak diare di ruang Ar-Rahim RSUD Haji Makassar 2014 maka dilakukan dengan *Uji Paired Sampel t test*. Sebelum dilakukan *Uji Paired Sampel t test* data terlebih dahulu dilakukan uji normalitasnya. Uji normalitas menggunakan uji *Saphiro-Wilk* karena termasuk penelitian yang memiliki sampel kecil atau <50 sampel.

Tabel.4.4
Uji Normalitas

Variabel	Shapiro-Wilk		
	Statistic	Df	Sig
Pre test	0,890	30	0,005
Post test	0,913	30	0,018

Sumber data :Data Primer 2014

Berdasarkan tabel 4.4 dimana uji normalitas menggunakan uji *Saphiro-Wilk* didapatkan nilai pre test sebesar $p = 0,005$ dan nilai posttest sebesar 0,018. Hal ini berarti nilai $p < 0,05$ yang menunjukkan bahwa data berdistribusi tidak normal, sehingga data tidak dapat dilanjutkan dengan menggunakan *uji paired sampel t test* sehingga data dilanjutkan dengan *uji Wilcoxon* untuk mengetahui pengaruh *discharge planning* terhadap perilaku ibu dalam perawatan anak diare di Ruang Ar-Rahim RSUD Haji Makassar 2014

Tabel.4.5

Distribusi Responden Berdasarkan Pengaruh *Discharge Planning* terhadap Perilaku Ibu dalam Perawatan Anak Diare di Ruang Ar-Rahim RSUD Haji Makassar 2014

Variabel	Z-test	p Value
----------	--------	---------

Pretest – Posttest	-4,651	0,000
--------------------	--------	-------

Sumber Data: Data Primer 2014

Hasil analisis uji statistik *Uji Wilcoxon* dengan tingkat kepercayaan 95 % ($\alpha=0,05$) diperoleh nilai p value 0,000. Hal ini berarti bahwa ada pengaruh *discharge planning* terhadap perilaku ibu dalam perawatan anak diare di ruang Ar-Rahim RSUD Haji Makassar 2014 secara bermakna ($p<0,05$).

B. Pembahasan

Untuk menguji pengaruh *Discharge planning* terhadap perilaku ibu dalam perawatan anak diare di Ruang Ar-Rahim RSUD Haji Makassar 2014 dilaksanakan penelitian ini mulai dari tanggal 05 Juni sampai dengan 03 Juli pada anak diare yang datang pada saat penelitian di Ruang Ar-Rahim RSUD Haji Makassar 2014.

1. Karakteristik Responden

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Dari hasil penelitian yang dapat dilihat pada tabel 4 tingkat umur responden terbanyak yaitu berada pada umur 20-30 tahun sebanyak 16 orang (53,3%) dan tingkat umur responden terendah yaitu >40 tahun sebanyak 1 orang (3,3%). Menurut Dinas Kesehatan umur atau usia adalah satuan waktu yang mengukur waktu keberadaan suatu benda atau makhluk, baik yang hidup

maupun yang mati. (Depkes,2009)

Gunarsa (2008) mengatakan bahwa tingkat kematangan, umur seseorang akan mempengaruhi dan menentukan sikap/perilaku orang tersebut. Dengan demikian, dengan bertambah matangnya umur seseorang dapat mempengaruhi pola pikir dalam merawat anak diare.

Peneliti berpendapat bahwa semakin seseorang memiliki umur yang cukup sebagai ibu, maka semakin banyak pula pengetahuan dan pengalaman yang terkait dengan merawat anak diare. Sehingga perilaku merawat anak diare semakin baik.

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Menurut Hidayat (2005) bahwa pendidikan merupakan penuntun manusia untuk berbuat dan mengisi kehidupan yang dapat digunakan untuk mendapat informasi, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup. Menurut Notoadmodjo (2010) sebagaimana umumnya semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang semakin mudah mendapatkan informasi dan akhirnya mempengaruhi perilaku seseorang (Firmansyah dan Mahmudah, 2012).

Konsep dasar pendidikan adalah suatu proses belajar yang berarti dalam pendidikan itu terjadi proses pertumbuhan, perkembangan, atau perubahan kearah yang lebih dewasa, lebih

baik, dan lebih matang pada diri individu, kelompok atau masyarakat (Notoadmodjo, 2007)

Pengetahuan sangat erat dengan pendidikan seseorang. Dengan pendidikan yang tinggi, maka biasanya akan mempunyai tingkat pengetahuan yang tinggi dan perilaku yang lebih baik dibandingkan dengan seseorang yang berpendidikan rendah. Namun, perlu ditekankan bahwa seseorang yang berpendidikan rendah tidak mutlak berpengetahuan rendah pula (Widayatun, 2004).

Dari hasil penelitian yang dapat dilihat pada tabel 5 tingkat pendidikan Ibu sebagian berpendidikan SD sebanyak 12 orang (40,0%) akan tetapi perilaku ibu dalam merawat anak yang menderita diare tergolong baik. Hal ini sangat dipengaruhi banyaknya informasi dari berbagai sumber baik itu dari media televisi, radio, maupun media cetak yang terkait dengan bagaimana cara merawat anak yang mengalami diare, sehingga ibu pengetahuan dan perilaku ibu tentang cara merawat anak menderita diare semakin baik.

Dalam hadist Rasulullah SAW yang tertulis

اطلبوا العلم من المهد إلى الأخر

Artinya: Tuntutlah ilmu dari buaian sampai keliatan lahat.

Ayat yang pertama turun bukanlah perintah untuk shalat misalnya, akan tetapi ayat pertama-tam diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ialah perintah untuk membaca. Menurut riwayat

pada waktu itu Nabi Muhammad SAW sedang i'tikaf di Gua Hira. Maka datanglah malaikat Jibril kepada beliau dan memberikan wahyunya :”Iqra” yang berarti bacalah. Nabi Muhammad SAW kita ketahui adalah seseorang yang ummi atau buta huruf. Sudah tentu beliau menjawab “Ma ana bi qariin” (aku tidak dapat membaca). Mendengar jawaban ini marahlah malaikat Jibril dan dipeluknya erat-erat Nabi Muhammad SAW, sehingga hampir tidak dapat bernafas. Kemudian diulangnya perintah “Iqra” dan didapatinya jawaban yang sama. Demikian berulang sampai tiga kali, baru diteruskannya wahyunya berupa surah Al-Alaq:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ
 الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ
 اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ
 الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ
 الْإِنْسَانَ
 مَا كَانَ يَكْفُرُهُ

Artinya :

”Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan manusia dari ‘alaq. Bacalah dan Tuhanmu Yang Maha Mulia. Yang memberi ilmu dengan pena, memberi ilmu kepada manusia tentang hal-hal yang mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. (QS. 96:1-5) .

Jadi jelaslah bahwa ayat-ayat yang pertama diturunkan bukanlah perintah puasa atau lainnya. Tetapi ayat pertama diturunkan ialah perintah untuk membaca, sekali lagi membaca. Ayat kedua dan ketiga juga belum perintah zakat,haji, shalat atau lainnya. Ayat Kedua tentang kejadian manusia yang harus kita selidiki dengan seksama, sedangkan ayat ketiga tentang kemuliaan Allah yang harus kita alami, sehingga kita benar-benar

menjadi orang yang bertakwa. Ayat keempat dan kelima, jelas sekali juga memperlihatkan pentingnya ilmu pengetahuan.

Jadi jelaslah bahwa mendapatkan tempat dan waktu yang pertama dalam Islam adalah ilmu. Dan juga menuntut banyaknya yang disebut, maka tentang ilmu pengetahuan adalah yang terbanyak (Su'dan, 1997).

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 6 menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini memiliki pekerjaan sebagai Ibu Rumah Tangga yaitu sebanyak 30 orang (100,0%) responden dalam penelitian ini memiliki perilaku yang cukup baik dalam merawat anak yang mengalami diare.

Menurut Notoadmodjo (2010), mengatakan bahwa pekerjaan adalah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh responden sehingga memperoleh penghasilan.

Menurut Istiari (2000) pengetahuan seseorang dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti media massa maupun elektronik dan semakin banyak orang berinteraksi dengan orang lain, maka semakin banyak pula informasi yang didapat. Sehingga dalam hal ini, walaupun dengan pekerjaan sebagai IRT, responden tetap mendapatkan informasi dari berbagai sumber yang dapat mempengaruhi perilaku ibu terkait cara merawat anak yang menderita diare.

2. Pengaruh *Discharge Planning* terhadap Perilaku

Dari hasil analisis dengan menggunakan *Uji Wilcoxon* diperoleh nilai p value 0,000 dengan demikian berdasarkan analisis tersebut dapat dilihat bahwa $p < 0,05$. Hal ini dapat dikatakan ada Pengaruh *Discharge Planning* terhadap perilaku ibu dalam perawatan anak diare di ruang Ar-Rahim RSUD Haji Makassar 2014. Dimana dalam penelitian ini, aspek-aspek yang diteliti yaitu perilaku ibu dalam merawat anak diare, pemenuhan nutrisi dengan cara yang tetap, dan bagaimana dengan penggunaan obat tradisional pada anak diare.

Dari 30 responden dalam hal ini ibu, semua dapat dikatakan baik dan mengerti dalam hal merawat anak diare. Melalui hasil wawancara, observasi, dan wawancara, semua responden dan mengerti dalam hal melakukan pemenuhan cairan pada anak yang menderita diare.

Pada pemenuhan nutrisi, dalam hal ini responden memahami cara memenuhi kebutuhan nutrisi pada anak yang menderita di rumah sakit diare dimana ibu memberikan asupan makanan dalam jumlah porsi sedikit dan lunak, tetapi sering. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Nasution (2010) bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang adalah pengalaman. Hasil penelitian sebelumnya oleh Anisa Dewati (2010) bertujuan penelitian mengetahui hubungan antara pengetahuan seseorang dan perilaku

ibu dalam pemenuhan nutrisi.

Pada pemberian obat tradisional, hanya sebagian kecil ibu yang mengetahui bahwa ada beberapa obat tradisional yang dapat mengurangi kejadian diare seperti buah jambu, baik daunnya yang direbus atautkah buahnya yang dijadikan jus.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah Al Israa' ayat 82 yang artinya :”Dan Kami menurunkan dari Al-Qur'an apa yang menjadi obat dan tidak menambah orang zalim kecuali kerugian”. (QS.17:82) (Su'dan, 1997).

Terkait dengan perilaku ibu dalam perawatan anak diare di rumah sakit, menurut Supartini (2005) orang tua diharapkan mempunyai kesempatan untuk meneruskan peran dan tugasnya merawat anak. Konsep mendasari asuhan yang berpusat pada keluarga adalah memfasilitasi keterlibatan orang tua dalam perawatan dan peningkatan kemampuan keluarga dalam merawat anak diare.

Perilaku dari pandangan biologis merupakan suatu kegiatan atau aktivitas organisme yang bersangkutan. Jadi, perilaku manusia pada hakikatnya adalah suatu aktivitas dari manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, perilaku manusia itu mempunyai bentangan yang sangat luas, berjalan, berbicara, bereaksi, berpakaian dan lain sebagainya. Bahkan kegiatan internal seperti berpikir, persepsi dan emosi juga merupakan perilaku manusia. Untuk kepentingan kerangka analisis

dapat dikatakan bahwa perilaku adalah apa yang dikerjakan oleh organisme tersebut, baik dapat diamati secara langsung atau secara tidak langsung (Notoadmodjo,2007).

Menurut Pieter dan Lubis (2010) terdapat beberapa yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang yaitu *Emosi* adalah suatu reaksi kompleks yang berhubungan dengan kegiatan atau perubahan-perubahan secara mendalam dan hasil pengalaman dari eksternal dan keadaan fisiologis, *Persepsi* adalah pengalaman-pengalaman yang dihasilkan melalui indra penglihatan, pendengaran, penciuman, dan sebagainya diman setiap orang memiliki persepsi masing-masing meskipun objek persepsi sama, *Motivasi* akan dihasilkan dalam bentuk perilakunya karena dengan motivasi individu terdorong memenuhi kebutuhan fisiologi, psikologis, dan sosial, dan *Belajar* adalah salah satu dasar memahami perilaku manusia karena belajar berkaitan dengan kematangan dan perkembangan fisik, emosi, motivasi, perilaku sosial, dan kepribadian.

Hal ini sejalan dengan tujuan dilakukan pendidikan kesehatan yakni peningkatan pengetahuan masyarakat dibidang kesehatan, tercapainyaperubahan perilaku individu, keluarga dan masyarakat sebagai sasaran utama pendidikan kesehatan dalam membina dan memelihara perilaku sehat dan lingkungan sehat serta berperan aktif dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan yang optimal sesuai

dengan konsep hidup sehat sehingga dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian (Notoatmodjo, 2007).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *discharge planning* terhadap perilaku ibu dalam perawatan anak diare di RSUD Haji Makassar. Dari rumusan masalah yang diajukan, maka analisis data yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Perilaku ibu sebelum diberikan *Discharge Planning* dalam perawatan anak menderita diare di RSUD Haji Makassar didapatkan hasil responden 0,005.
2. Perilaku ibu setelah diberikan *Discharge planning* dalam perawatan anak menderita diare di RSUD Haji Makassar terjadi peningkatan hasil responden 0,018.
3. Terdapat pengaruh *Discharge Planning* terhadap perilaku ibu berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan *Uji Wilcoxon* nilai p value 0,000. Hal ini berarti bahwa ada pengaruh *discharge planning* terhadap perilaku ibu dalam perawatan anak diare di ruang Ar-Rahim RSUD Haji Makassar 2014 secara bermakna ($p < 0,05$).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa hal yang dapat dijadikan rekomendasi adalah :

1. Mensosialisasikan dan melaksanakan *discharge planning* yang komprehensif dalam tatanan pelayanan kesehatan di rumah sakit.
2. Perawat harus memiliki kemampuan dalam melaksanakan *discharge planning* sesuai dengan kebutuhan pasien sehingga dapat memberikan motivasi dan merubah perilaku ibu dalam merawat anak diare.
3. Perlu dilakukan penelitian selanjutnya dengan jumlah subjek yang lebih besar serta mengikutsertakan variabel-variabel yang belum diteliti untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abata Aina'Qorry. 2013. *Resep Dokter Penyembuhan Penyakit yang Diderita Anak-anak*. Yayasan PP Al-Furqon: Madiun.
- Adnani Harisa. 2011. *Buku Ajar "Ilmu Kesehatan Masyarakat"*. Nuha Medika: Yogyakarta.
- Arbianigsih. 2011. *Keperawatan Anak "Konsep dan Prosedur Tindakan"*. Alauddin University Press: Makassar.
- Apriadji Harry Wied, 2012. *Panduan MPASI* . Sumber : <http://www.bayi.web.id/panduan-mpasib.html> diakses pada tanggal 9 Mei 2014 Pukul 11.00 WITA.
- Doenges, Marilyn E. dkk, 2004. *Rencana Keperawatan*. EGC : Jakarta
- Dinas Kesehatan RI. 2009. *Profil Kesehatan Indonesia*. Jakarta: Departemen Republik Indonesia.
- Departemen Kesehatan RI. 2011. *Buku Saku Petugas Kesehatan "Lima Langkah Tuntaskan Diare"*.
- Dewati, Anisa. 2010. *Hubungan Antara Pengetahuan Dengan Perilaku Ibu Dalam Pemenuhan Nutrisi Anak Balita Malnutrisi di Posyandu Desa Sembungan Boyolali*. Sumber : <http://www.publikasiilmiah.ums.ac.id> diakses pada tanggal 26 Januari 2014.
- Efendi Ferry, Nursalam. 2008. *Pendidikan Dalam Keperawatan*. Salemba Medika: Jakarta.
- Efendi Ferry, Makhfudli. 2009. *Keperawatan Kesehatan Komunitas "Teori dan Praktik dalam Keperawatan"*. Salemba Medika: Jakarta.
- Firmansyah Nurhuda, Mahmudah. 2012. *Jurnal Biometrik dan Kedudukan*. Volume I Nomor 1, Sumber : journal.unair.ac.id diakses pada tanggal 2 Agustus 2014 Pukul 12.45 WITA.
- Grow Up Klinik. 2012. *Penatalaksanaan Terkini Diare Pada Anak*. Sumber: <http://growupclinic.com> diakses pada tanggal 19 Februari 2014 Pukul. 21.00 WITA .
- Hidayat, Alimul Aziz, A. 2008. *Pengantar Ilmu Keperawatan Anak 1*.

Salemba Medika: Jakarta.

Hidayat, Alimul Aziz, A. 2008. *Pengantar Ilmu Keperawatan Anak 2*. Salemba Medika: Jakarta.

James,S.R, Aswhwill. J.W. 2007. *Nursing Care Of Children: Principles and Practice*. Third Edition. Saunders Elsevier : Canada

Kementerian Kesehatan RI. 2011. *Buletin Jendela Data & Informasi Kesehatan Vol.2 Triwulan.2 "Situasi Diare Di Indonesia"*.

Kementerian Kesehatan RI. 2011. *Panduan Sosialisasi Tatalaksana Diare Balita untuk Petugas Kesehatan. "Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan"*.

Musliha. 2010. *Keperawatan Gawat Darurat*. Nuha Medika:Yogyakarta.

Nasution. 2010. *Perilaku Manusia*. EGC : Jakarta

Notoatmodjo.2007. *Kesehatan Masyarakat"Ilmu dan Seni"*. Rineka Cipta: Jakarta.

Notoatmodjo. 2007. *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*. Rineka Cipta: Jakarta.

Notoadmodjo. 2010. *Ilmu Perilaku Kesehatan*. Rineka Cipta: Jakarta.

Nursalam. 2008. *Pendidikan Dalam Keperawatan*. Salemba Medika: Jakarta.

Nursalam. 2013. *Manajemen Keperawatan "Aplikasi dalam Praktik Keperawatan Profesional"*. Salemba Medika: Jakarta.

Nurhayati Sri, Mariyam. 2013. *Jurnal Keperawatan Anak. Volume 1, No.1;37-43"Pengetahuan dan Kemampuan Ibu Dalam Perawatan Daerah Perianal Pada Usia 0-12 Bulan di Desa Surokonto Wetan Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal"*. Sumber: <http://jurnal.unismu.ac.id>. Diakses pada tanggal 24 Februari 2014, pukul 18.00 WITA

Pediatri, Sari. 2011. *Insidens Diare Pada Anak Dengan Pneumonia, Studi Retrospektif*. Vol.13, No.3.

Pieter, Herri Zan dan Lubis, Namora Lumongga. 2010. *Pengantar Psikologi Dalam Keperawatan*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.

Purbasari Endah, 2009." *Tingkat Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Ibu Dalam Penanganan Awal Diare Pada Balita di Puskesmas Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten Pada Bulan September 2009*". Sumber: <http://www.google.co.id/#q=tingkat+pengetahuan%2C+dan+perilaku+ibu+dalam+penanganan+awal+diare+oleh+endah+purbasari> diakses pada tanggal 24 Desember 2013, pukul 13.23 WITA.

Purnamasari, Liliana Dewi dan Ropyanto, Chandra Bagus. 2012. *Jurnal Nursing Studies Vol.1 No.1 "Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pulang"*. Sumber: <http://ejournal-S1.unip.ac.id/index.php/jnurcing>. Hal.213-218. Diakses pada tanggal 22 Desember 2013, pukul 22.45 WITA.

Rahmi, Upik. 2011. *Pengaruh Discharge Planning Terstruktur Terhadap Kualitas Hidup Pasien Stroke Iskemik Di RSUD Al-Ihsan dan RS Al-Islam*.

Su'dan. 1997. *Al-Quran & Panduan Kesehatan Masyarakat*. Penerbit PT Dana Bhakti Yasa :Yogyakarta.

WHO, 2009, *Pelayanan Kesehatan Anak di Rumah Sakit*, <http://www.gizikia.depkes.go.id/wp-content/upl> diakses tanggal 22 Desember 2013, Pukul 22.30 WITA.

L

A

M

P

I

R

A

N

LEMBAR KUESIONER
PENGARUH *DISCHARGE PLANNING* TERHADAP PERILAKU IBU DALAM
PERAWATAN ANAK DIARE DI RUANGAN Ar-RAHIM RSUD HAJI
PROV.SUL-SEL TAHUN 2014

Tanggal Pengambilan Data :

Kode :

Petunjuk Pengisian :

1. Bacalah setiap pertanyaan dengan seksama
2. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memberikan tanda silang (X) bila jawaban yang dianggap sudah benar atau sesuai.

A. Identitas Responden

Nama Orang Tua/ Ibu :

Umur :

Pekerjaan :

Alamat :

Pendidikan Terakhir :

Agama :

Suku :

B. Identitas Sampel

Nama :

Tempat/Tanggal Lahir :

Umur :

Jenis Kelamin :

C. Perilaku Ibu dalam Perawatan Anak Diare

NO	Pertanyaan Tentang Perilaku Ibu dalam Perawatan Anak Diare	Jawaban
1.	Apa yang ibu lakukan saat anak diare	<input type="checkbox"/> Memuaskan <input type="checkbox"/> Tetap memberi makanan seperti biasa <input type="checkbox"/> Mengganti makanan dengan yang lebih lunak
2.	Apakah ibu langsung membawa anak berobat pada saat awal diare?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
3.	Apakah ibu memberikan obat antidiare pada awal anak ibu diare?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
4.	Apakah ibu memberikan air minum lebih banyak?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
5.	Apakah ibu memberikan oralit saat anak ibu diare?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
6	Apakah yang ibu lakukan jika anak ibu mengalami kekurangan cairan atau dehidrasi?	<input type="checkbox"/> Memberi minum air lebih banyak dari biasa <input type="checkbox"/> Tetap memberikan ASI <input type="checkbox"/> Memberikan cairan oralit (cairan rehidrasi oral) <input type="checkbox"/> Memberi makanan yang

		banyak mengandung air (sup, bubur)
7	Apakah ibu memberikan suplemen zinc pada anak ibu saat diare?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
8	Apakah ibu memberikan obat tradisional saat anak ibu diare?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
9	Jika Ya, obat tradisional apa yang ibu berikan?

**LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN
PENGARUH *DISCHARGE PLANNING* TERHADAP PERILAKU IBU DALAM
PERAWATAN ANAK DIARE DI RSUD HAJI PROV.SUL-SEL TAHUN 2014**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ridhayanti
NIM : 70300110087
Judul : Pengaruh *discharge planning* terhadap perilaku ibu dalam perawatan anak diare diruangan Ar-Rahim, RSUD Haji Prov. Sul-Sel tahun 2014

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh *discharge planning* terhadap perilaku ibu dalam perawatan anak diare diruangan Ar-Rahim, RSUD Haji Prov,Sul-Sel tahun 2014. Agar terlaksananya penelitian ini, saya mengharapkan kepada Anda bersedia menjadi responden dalam penelitian ini dan mengisi pertanyaan yang ada pada kuesioner dengan jujur. Informasi yang Anda berikan akan dijaga kerahasiannya, dan penelitian ini akan digunakan untuk kepentingan dalam penelitian ini, namun apabila Anda tidak bersedia maka saya akan tetap menghargainya.

Demikianlah surat pernyataan permohonan ini saya buat dengan sadar dan tanpa ada paksaan siapapun. Atas bantuan dan kerjasamanya, saya ucapkan banyak terima kasih.

Makassar, 2014

Peneliti

(Ridhayanti)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMBERIAN *DISCHARGE PLANNNING* TERHADAP PERILAKU IBU DALAM
PERAWATAN ANAK DIARE

A. Definisi

Discharge planning atau yang lebih dikenal dengan perencanaan pulang merupakan suatu proses dimulainya pasien mendapatkan pelayanan kesehatan yang diikuti dengan kesinambungan perawatan

baik dalam proses penyembuhan maupun dalam mempertahankan derajat kesehatannya sampai pasien merasa siap untuk kembali ke lingkungannya.

Perilaku ibu dalam perawatan anak diare adalah merupakan suatu aktivitas atau tingkah laku yang dilakukan oleh ibu demi kesembuhan anak, dimana ibu bisa mengetahui cara pemberian cairan, pemberian makanan, pemberian obat di rumah, cara pencegahan infeksi berulang, dan cara perawatan perianal.

B. Tujuan

1. Menyiapkan pasien dan keluarga secara fisik, psikologis, dan sosial;
2. Meningkatkan kemandirian pasien dan keluarga;
3. Meningkatkan perawatan yang berkelanjutan pada pasien;
4. Membantu rujukan pasien pada sistem pelayanan yang lain;
5. Membantu pasien dan keluarga memiliki pengetahuan dan keterampilan serta sikap dalam memperbaiki serta mempertahankan status kesehatan primer;
6. Melaksanakan rentang perawatan antara rumah sakit dan pelayanan

C. Indikasi

Ibu yang memiliki anak diare dan bersedia diberikan *discharge planning* dan perilaku perawatan diare.

D. Persiapan

1. Persiapan Pasien
 - a. Salam terapeutik
 - b. Jelaskan prosedur tindakan yang diberikan kepada klien/ keluarga.

- c. Perhatikan privasi klien
- d. Atur posisi yang nyaman bagi klien/keluarga.

2. Persiapan Alat

- a. Oralit
- b. Zinc
- c. Air matang 200 ml(secukupnya)

E. Prosedur Kerja

1. Cara Pemberian Cairan

a. Cara mengenal dehidrasi , yaitu:

- 1) Dehidrasi ringan : Keadaan umum baik dan sadar, mata tidak cekung, minum biasa tidak merasa haus, dan cubitan kulit perut/ turgor kembali segera.
- 2) Dehidrasi Sedang : gelisah, rewel, mata cekung, ingin minum terus, ada rasa haus, cubitan turgor perut/ turgor kembali lambat.
- 3) Dehidrasi Berat : lesu, lunglai, tidak sadar, mata cekung, malas minum, turgor kembali sangat lambat.

b. Jenis cairan yang dapat diberikan yaitu:

- 1) Teruskan ASI lebih sering dan lebih lama
- 2) Anak yang mendapatkan ASI eksklusif, beri oralit atau air matang sebagai tambahan
- 3) Anak yang tidak mendapatkan ASI eksklusif, beri susu yang biasa diminum dan oralit atau cairan rumah tangga seperti kuah sayur, air matang,dan sebagainya
- 4) Beri oralit sampai diare berhenti. Bila muntah, tunggu 10 menit dan dilanjutkan sedikit demi sedikit.

- Umur < 1 tahun diberi 50-100 ml setiap kali berak

- Umur > 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali berak
(Depkes:2011).

c. Cara Pembuatan Oralit



Sumber:Depkes,2011

2. Pemberian Makanan

a. Memberikan makanan tinggi karbohidrat, protein dan sayur

Secara bertahap pencernaan bayi diperkenalkan dengan bahan makanan lain, yaitu pati (nasi,kentang,dan makanan pokok lainnya) serta serat (beragam sayur-sayuran). Jika buah mengandung karbohidrat sederhana yang mudah dicerna,beras dan makanan pokok lainnya mengandung karbohidrat kompleks yang proses pencernaannya lebih rumit. Sayuran juga mengandung serat, salah satu jenis karbohidrat yang tidak tercerna.

Pada tahap awal pengenalan nasi dan sayuran, sebaiknya tidak ditambah protein hewani. Sama seperti makanan pokok, proses pencernaan sumber protein hewani terutama daging sapi dan daging ayam cukup rumit. Oleh karena itu, biarlah bayi mengenai citarasa makanan secara bertahap. Selain itu, agar organ

pencernaannya tidak bekerja berat mencerna pati dan protein hewani sekaligus.

Jika pada tahap ini Anda menginginkan tambahan protein dalam makanan bayi, Anda bisa menambahkan sumber protein mudah cerna, yaitu tempe yang dihaluskan. Protein tempe telah diuraikan oleh kapang (jamur) tempe menjadi asam amino sederhana yang lebih mudah dicerna dan diserap tubuh bayi. Kelebihan lain tempe mengandung zat antidiare.

Selain menjadi sumber serat, sayuran merupakan pemasok beragam mineral dan vitamin. Sayuran berlimpah zat besi, kalsium dan betakaroten yang merupakan zat-zat gizi yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi. Manfaat utama serat adalah membantu membuang kotoran kaya zat-zat sampah yang bisa membahayakan kesehatan. Asupan sayuran juga menyumbang kecukupan serat yang penting untuk pertumbuhan bakteri-bakteri baik dalam usus bayi. Walaupun serat sayuran penting untuk bayi, sebaiknya sayuran dipilih yang tidak mengandung serat berlebihan.

b. Memberikan makanan yang rendah lemak dan gula.

Hindari menambahkan gula ke dalam jus atau pure buah. Biarkan bayi mengenali keragaman cita rasa manis asli buah. Gula mematikan cita rasa dasar buah sehingga bayi tidak memiliki kekayaan perbendaharaan citarasa makanan. Tidak

menambahkan gula juga penting untuk melatih kepekaan saraf perasa bayi agar kelak tidak menjadi ketagihan gula dan makanan manis. Selain tidak berguna (karena rasa jus/pure buah sudah manis), gula hanya akan membebani kerja pankreas dan hati (liver) bayi anda (Apriadji, 2012).

3. Periberian Obat di Rumah

a. Cara pemberian obat dengan tepat waktu

Sangat penting, khususnya bagi obat yang efektifitasnya tergantung untuk mencapai atau mempertahankan kadar darah yang memadai, bahwa obat itu diberi pada waktu yang tepat. Jika obat itu harus diminum sebelum makan (*ante cimum* a. c) untuk memperoleh kadar yang diperlukan, harus diberi satu jam sebelum makan. Hal ini berlaku untuk banyak antibiotic. Misalnya, tetrasiklin dikhelasi (yaitu berbentuk senyawa yang tidak larut) jika diberi bersama susu atau makanan tertentu, yang meningkat sebagian besar.



b. Cara pembuatan zinc



Sumber: Depkes,2011

4. Pencegahan Infeksi Berulang

Cuci tangan 5 titik kritis



5. Perawatan Perianal

Menurut Mueser (2013), perawatan daerah *Perianal* atau perawatan daerah yang tertutup popok dapat dilakukan dengan mengganti popok setelah mengompol, membiarkan daerah alat kelamin terkena udara bebas. Hal ini yang perlu dilakukan adalah jangan memaksakan menggosok alat kelamin bayi laki-laki yang

belum dikhitam agar kelihatan bersih dan jangan membuka lebar-lebar bibir vagina bayi perempuan untuk membersihkannya (Nurhayati dan Mariyam, 2013).

Cara-cara perawatan *Periana*/pada anak diare menurut Hidayat (2006) adalah sebagai berikut:

- 1) Hindari penggunaan sabun yang berlebihan untuk membersihkan daerah pantat/bokong. Sabun yang berlebihan dan keras dapat menyebabkan iritasi.
- 2) Sebaiknya gunakan kapas dengan air hangat setelah buang air besar.
- 3) Bila terdapat bintik kemerahan, berikan krem atau saleb, dan biarkan terbuka untuk beberapa saat.
- 4) Bersihkan bokong perlahan-lahan dengan sabun lunak, non-alkali dan air atau celupkan anak dalam bak untuk membersihkan yang lembut karena feses diare sangat mengiritasi kulit.
- 5) Beri salep seperti oksida untuk melindungi kulit dari iritasi (tipe salep sangat bervariasi dari setiap anak dan memerlukan periode percobaan).
- 6) Hindari penggunaan tissue basah yang dijual bebas yang mengandung alkohol pada kulit yang terekskroriasi karena akan menyebabkan rasa menyengat.
- 7) Observasi bokong dan perineum akan adanya infeksi, seperti

candida sehingga terapi yang tepat akan dimulai.

- 8) Berikan obat anti jamur yang tepat untuk mengobati infeksi jamur kulit.

PENGARUH *DISCHARGE PLANNING* TERHADAP PERILAKU IBU DALAM PERAWATAN ANAK DIARE



Oleh:
Ridhayanti
70300110087

Jurusan Ilmu Keperawatan
Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar
2014

Discharge Planning ...???

Discharge Planning adalah suatu rencana yang disusun untuk klien, sebelum keluar dari rumah sakit yang dimulai dari pengumpulan data sampai dengan masuk area perawatan yaitu meliputi pengkajian, rencana perawatan, implementasi dan evaluasi (Nursalam, 2013).

Perilaku Ibu ...???

Perilaku adalah suatu yang dilakukan oleh ibu dalam perawatan anak yang dilihat dari sikap, tingkah laku, dan aktivitasnya

Derajat diare dan peneanganannya terbagi tiga, yaitu :

1. Dehidrasi Ringan

Bila terdapat dua tanda atau lebih.

Tanda-tanda dari dehidrasi ringan, yaitu:

- Keadaan umum baik, sadar
- Mata tidak cekung
- Minum biasa, tidak haus
- Cubitan kulit perut/ turgor kembali segera.

Cara pembuatan oralit di rumah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Sumber :Buku Panduan Lintas Diare

2. Dehidrasi Sedang

Bila terdapat dua tanda atau lebih.

Tanda-tanda dehidrasi sedang yaitu:

- Gelisah, rewel
- Mata cekung
- Ingin minum terus, ada rasa haus
- Cubitan kulit perut/ turgor kembali lambat.

Jumlah oralit yang diberikan dalam 3 jam pertama di sarana kesehatan :

ORALIT yang diberikan = 75ml X Berat

3. Dehidrasi Berat

Bila terdapat dua tanda atau lebih.

Tanda-tanda dehidrasi berat yaitu:

- Lesu, lunglai/ tidak sadar
- Mata cekung
- Malas minum
- Cubitan kulit perut/ turgor kembali sangat lambat

Cara Pembuatan Zinc

Cara Memberikan Obat ZINC





1
Larutkan tablet ZINC kedalam satu sendok air minum atau air susu ibu (ASI).

2
Bila anak muntah, sekitar 30 menit setelah pemberian obat ZINC ulangi pemberian obat ZINC dengan cara memberikan potongan lebih kecil dan dilarutkan beberapa kali hingga satu dosis peruh.



Percengahan Infeksi Berulang

Kebiasaan yang berhubungan dengan kebersihan perorangan yang penting dalam penularan kuman diare adalah mencuci tangan. Mencuci tangan dengan sabun, terutama sesudah buang air besar, sesudah membuang tinja anak, sebelum menyiapkan makanan, sebelum menyuapi makan anak dan sebelum makan, mempunyai dampak dalam kejadian diare (menurunkan angka kejadian diare) (Depkes, 2011).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Ridhayanti, Lahir di Ujung Pandang, 07 September 1992 adalah anak ke empat dari lima bersaudara dari pasangan Hj. St.Jawiah dan H.Zaenal Abidin S.

Penulis memulai menempuh pendidikan formal pada SDN Pongtiku I Makassar dan tamat pada tahun 2004, kemudian melanjutkan ke Pondok Pesantren IMMIM Putri Minasate'ne Pangkep selama 6 tahun. Pada tahun 2010 penulis tercatat sebagai mahasiswa pada Penguruan Tinggi Jurusan Keperawatan pada Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar melalui jalur PMJK.

Penulis memiliki pengalaman organisasi diantaranya,

1. Ketua Seksi Kebersihan dalam Pengurusan OSIS Pesantren IMMIM Putri Minasate'ne Pangkep.
2. Anggota Drum Band Pesantren IMMIM Putri selama 3 Tahun.
3. Pengurus Himpinan Mahasiswa Jurusan (HJM) Keperawatan dalam Bidang Wakil Bendahara Umum.
4. Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Kesehatan dalam Bidang Pembinaan Bakat dan Minat.

~ Don't Cry before Try ~