

**PENETAPAN KADAR PROTEIN DENGAN METODE
SPEKTROFOTOMETRI DAN KADAR LEMAK DENGAN
METODE SOKLETASI PADA TERUNG KOPEK UNGU DAN
TERUNG KOPEK HIJAU**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Sains Jurusan Kimia pada Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

KARTIKA HASAN
NIM. 60500106013

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2010

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, Desember 2010
Penulis

Kartika Hasan
NIM: 60500106013

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya yang terakumulasi dalam pengaktualisasian kehidupan kita sehari-hari khususnya kegiatan akhir sehingga skripsi dengan judul **“Penentuan Kadar Protein dengan Metode Spektrofotometri dan Kadar Lemak dengan Metode Sokletasi pada Terung Kopek Ungu dan Hijau”** dapat diselesaikan.

Sebagai sebuah karya tulis ilmiah, skripsi ini bersifat terbuka, didalamnya memuat banyak pemikiran yang mungkin dapat menimbulkan kontroversi. Karenanya segala sumbangsih baik saran maupun kritik yang bersifat konstruktif sangat diharapkan. Selanjutnya dalam dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Ayahanda tercinta Ahmatu Hasan, Ibunda tercinta Nursachina, dan semua saudara kandung penulis kakak Zul Wirman, adik-adik tersayang Diah, Ni'mah dan Ikhsan atas dorongan moril, materil serta persembahan do'a kepada penulis hingga dapat menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

2. Bapak Prof. Dr. H. Azhar Arsyad, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, beserta para Pembantu Rektor.
3. Bapak Prof. Dr. H. Bahaking Rama, M.S, selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, beserta Pembantu Dekan.
4. Ibu Maswati Baharuddin, S.Si., M.Si, selaku Ketua Jurusan Kimia dan Asriani Ilyas S.Si., M.Si, selaku Sekertaris Jurusan Kimia beserta jajarannya yang telah banyak membantu dan senantiasa memberikan semangat dan motivasi hingga tersusunnya skripsi ini.
5. Ibu Maswati Baharuddin S.Si., M.Si dan Ibu Suriani S.Si., M.Si selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Muchammad Arief Setyabudi, M.Kes selaku kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) Makassar yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) Makassar.
7. Ibu Nelly Maning, SKM, selaku Kepala Instalasi Kimia Kesehatan pada Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) Makassar yang bersedia membantu, dan membimbing penulis selama penelitian.
8. Bapak Donatus dan Ibu Nuraeni serta ibu Wara sebagai pembimbing lapangan atas segala bantuan, bimbingan, serta saran terbaiknya selama penulis melakukan penelitian.

9. Para Dosen Jurusan Kimia Fak. Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang tidak ternilai harganya.
10. Seluruh Staf Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) Makassar, terutama buat Kak Ina dan Bu Nuraeni atas saran, bimbingan, serta waktu luang yang selalu diberikan kepada kami dan tidak bosan-bosan memberi bantuan yang tidak ternilai harganya.
11. Terkhusus untuk kakanda tercinta Syahrir Ramadhan, yang dengan segenap hati mensupport penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta segala pengorbanan dan bantuannya yang tidak ternilai harganya penulis mengucapkan terima kasih.
12. Senior-senior, saudara- saudaraku di HIPPMAL yang telah memberi dorongan moril dan berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Senior-senior, saudara- saudaraku di FOKMIM yang telah memberi dorongan moril dan berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.
14. Sahabat tercinta Mujriani dan Kasmiah Kasim serta rekan-rekan seperjuangan jurusan Kimia angkatan 2006 Sudarmi, Haerati, Karmila, Sahriani, Sumarni, A.Nurisma Tendriani, Wahyuni, Mawardi, Muh. Ridho Modeong, Firdaus Latif, Firdaus, Hadi Gunawan, Suhrawaty, Anna Handayani, A.Nur Rahma, Bau Mayasari, Herawati, N.K Nurdianti Putri, Siti Hapiya yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.

15. Kepada Junior-junior angkatan 2007 sampai 2009 yang setia memberikan semangat dan dukungan kepada penulis. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu.

Akhirnya ke hadirat Allah SWT jualah penulis memanjatkan do'a semoga segala bantuan dan partisipasi dari semua pihak bernilai pahala disisi Allah SWT dan menjadi amal ibadah tersendiri disisi-Nya. Amin.

Makassar, Desember 2010

Penulis,

Kartika Hasan

NIM : 60500106013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Tinjauan Umum Tanaman Terung.....	7-11
1. Tanaman Terung (<i>Solanum melongena L</i>).....	7
2. Klasifikasi Buah Terung	8
3. Jenis-jenis Buah Terung.....	9
B. Terung Kopek	11-13
C. Kandungan Gizi Terung.....	13
D. Protein	14- 21
1. Penggolongan Protein	16
2. Struktur Protein.....	18
3. Sifat- sifat Protein	19
4. Fungsi dan Peranan Protein	20
E. Lemak	21- 30
1. Penggolongan Lipid	23
2. Struktur Lemak	24
3. Sifat- Sifat Lemak	25
4. Peran dan Fungsi Lemak.....	26
5. Pengaruh Lemak Terhadap Kesehatan.....	29

F. Analisis Protein dan Lemak	30-48
1. Analisis Protein	33
2. Analisis Lemak	37
3. Spektrofotometri	40
4. Sokletasi	46
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Jenis dan Varabel Penelitian	49
B. Definisi Operasional Variabel.....	49
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	50
D. Alat Penelitian.....	50
E. Bahan Penelitian	50
F. Prosedur Penelitian	51
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	54
A. Hasil Penelitian	54-55
1. Hasil Analisis Kadar Protein.....	54
2. Hasil Analisis Kadar Lemak	55
B. Pembahasan	56-62
1. Kadar Protein pada Terung Kopek Ungu dan Hijau	56
2. Kadar Lemak pada Terung Kopek Ungu dan Hijau	59
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65-66
LAMPIRAN.....	67-80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	81

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Kandungan Gizi Buah Terung dalam 100gr	13
Tabel 4.1. Hasil Analisis Larutan Sampel	54
Tabel 4.2. Hasil Penetapan Kadar Lemak	55

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Terung Kopek Ungu dan Terung Kopek Hijau	11
Gambar 2.2. Gambar Struktur Asam Amino.....	17
Gambar 2.3. Gambar Struktur Protein.....	18
Gambar 2.4. Gambar Struktur Lemak	25

ABSTRAK

Nama Penyusun : Kartika Hasan
Nim : 60500106013
Judul Skripsi : Penetapan Kadar Protein dengan Metode Spektrofotometri dan Kadar Lemak dengan Metode Sokletasi pada Terung Kopek Ungu dan Hijau.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif yang berkaitan dengan penetapan berapa banyak suatu zat tertentu yang terkandung dalam suatu sampel. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah seberapa besar kadar protein dan kadar lemak yang terkandung dalam terung kopek ungu dan terung kopek hijau. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kadar protein dan kadar lemak yang terkandung pada terung kopek ungu dan terung kopek hijau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode spektrofotometri (Lowry) untuk penetapan kadar protein dan salah satu metode ekstraksi panas yaitu sokletasi untuk penetapan kadar lemak. Berdasarkan hasil analisis, kadar protein pada 50 gr sampel terung kopek ungu sebesar 0,0323 gr. Dan pada 50 gr sampel terung kopek hijau kadar protein yang diperoleh yaitu sebesar 0,0375 gr. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kadar protein pada terung kopek ungu dan terung kopek hijau tidak memenuhi standar Data Kandungan Bahan Makanan (DKBM) yaitu sebesar 1,4 - 2 gr/ 100 gr. Sedangkan kadar lemak yang diperoleh memenuhi standar DKBM yaitu sebesar 1,1 gr/ 100 gr.

Kata Kunci : Lemak, Protein, Sokletasi, Spektrofotometri, Terung Kopek Ungu dan Hijau.

ABSTRACT

Name of Composer : Kartika Hasan
Reg. No. : 60500106013
Thesis Title : Determination of Protein with Spectrophotometric and Fat Content in with Method Soxhletasi in the Eggplant Purple Kopeks and Eddplant Green Kopeks.

Type of research is quantitative research related to determining how much of certain substances contained in a sampel. As for formulation of the problem in this research is how much protein and fat levels contained in eggplant purple kopeks ang eggplant green kopeks. Research was conducted to determine how many grams of protein and fat content in samples of eggplant purple kopeks and eggplant green kopeks. With spectrophotometric (Lowry) method for determination of protein content and one of extractions hot method that is soxhletasi method for determination of fat content. Result obtained show the protein content in 50 gr eggplant purple kopeks is 0,0323 gr and 50 gr eggplant green kopeks is 0,0375 gr. The fat content in 10 gr eggplant purple kopeks is 0,1794% and 10 gr eggplant green kopeks is 0,1612%. Based on research results that have been done, obtained on eggplant kopeks protein content did not meet the standards of DKBM that is 1,4-2 gr in the 100 gr sample. While the fat content of the standards obtained DKBM that is 1,1 gr in the 100 gr sample.

Key Words : Fat, Protein, Soxhletasi, Spectrophotometric, Eggplant Purple Kopeks and Eggplant Green Kopeks.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Protein, karbohidrat dan air merupakan kandungan utama dalam bahan pangan. Protein dibutuhkan terutama untuk pertumbuhan dan memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Karbohidrat dan lemak merupakan sumber energi dalam aktivitas tubuh manusia, sedangkan garam-garam mineral dan vitamin juga merupakan vaktor penting dalam kelangsungan hidup.¹

Minyak dan lemak yang dioksidasi secara sempurna dalam tubuh menghasilkan 9,3 kalori/g lemak, sedangkan protein dan karbohidrat masing-masing menghasilkan 4,1 dan 4,2 kalori/g.²

Lemak terdiri atas trigliserida campuran, yang merupakan ester dari gliserol dan asam lemak rantai panjang. Lemak dan minyak dapat diperoleh dari hewan maupun tumbuhan. Lemak nabati terdapat dalam buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian, akar tanaman dan sayuran. Trigliserida dapat berwujud padat atau cair, bergantung pada komposisi asam lemak yang menyusunnya. Sebagian besar lemak nabati berbentuk cair karena mengandung sejumlah asam lemak tidak jenuh,

¹F. G. Winarno, *Kimia Pangan dan Gizi* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1997), h. 12

²Sediatama, *Gizi* (Jakarta: Dian Rakyat, 1987), h. 20.

sedangkan lemak hewani pada umumnya berbentuk padat pada suhu kamar karena banyak mengandung asam lemak jenuh.³

Terung atau terong (Jawa), torung (Batak), cuang, taung (Bali) atau nasubi (Jepang) termasuk salah satu sayuran buah yang banyak digemari berbagai kalangan di seluruh pelosok tanah air. Buah terung yang merupakan hasil panen utama, tanaman ini memiliki cita rasa yang enak, bernilai gizi diantaranya A, B1, B2, C, P dan Fosfor. Jenis terung yang paling banyak terdapat di masyarakat dan mudah harganya mudah dijangkau oleh masyarakat pada umumnya adalah jenis terung koprk. Terung kopek terdiri dari dua macam yaitu terung kopek ungu dan terung kopek hijau.⁴

Banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia, diantaranya adalah makanan. Makanan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia. Melalui makanan, manusia dapat memperoleh nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuhnya. Nutrisi tersebut berupa karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan garam mineral. Nutrisi-nutrisi tersebut telah disediakan oleh Allah SWT melalui ciptaannya yaitu berbagai tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam jenis dan manfaatnya. Sebagaimana dalam Q.S An-‘Aam[6] ayat 99 Allah SWT berfirman :

³Danuwarsa, “ Analisis Proksimat dan Asam Lemak Pada Beberapa Komoditas Kacang-kacangan”, *Buletin Teknik Pertanian vol. II No. 1*. <http://> (19 Mei 2010).

⁴Liana Dwi Sri Hastuti , Terung Tinjauan Langsung Beberapa Pasar di Kota Bogor (Sumatera Utara : program studi Biologi, Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam USU, 2007) .

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ
 خَضِرًا نُخْرَجُ مِنْهُ حَبًّا كَثِيرًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ
 أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ^٤ أَنْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ
 وَيَنْعِمِ^٥ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٩٩﴾

Terjemahan :

“Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah, dan (perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kejasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman.” (QS. An-‘Aam[6]: 99)⁴

Ayat tersebut mengandung makna bagaimana Allah SWT memerintahkan kita untuk merenungkan pepohonan saat berbuah dan saat masak. Keluarnya buah dari perantara kayu dan daun mengandung ayat qudrah (kekuasaan) yang luar biasa. Kemudian dari yang awalnya pahit lagi masam menjadi berwarna cemerlang dan

⁴Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Syaamil Al-Qur'an). Q.S. An-‘Aam [6] : 99.

terang dengan rasa yang manis dan lezat juga benar-benar mengandung ayat bagi kaum yang beriman.

Ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang pangan kini telah berkembang cukup maju. Berbagai hasil pertanian terus diupayakan untuk ditangani dan diolah agar dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan manusia. Al-Qur'an merujuk fenomena-fenomena alamiah yang dapat dijumpai manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu Kimia merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang mendapatkan perhatian dan dorongan dari Al-Qur'an untuk dikembangkan. Manusia dan seluruh lingkungan hidupnya terbentuk dari elemen-elemen dan substansi-substansi yang tergabung menjadi sebuah ikatan kimia menurut hukum Allah.

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ تَخْرِجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۗ وَالَّذِي خَبُثَ لَا تَخْرِجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ
نُصِّرَفُ الْأَيَّاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴿٥٨﴾

Terjemahan :

“Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (kami) bagi orang-orang yang bersyukur” (Q.S Al-A'raf [7]: 58)⁵

Ayat diatas tentu saja menunjuk pada kemungkinan ditemukannya substansi yang lebih unggul dan lebih bermanfaat lewat percampuran berbagai unsur, dan

⁵ *Ibid*, Q.S. Al-A'raf [7] ayat 58, h. 158.

bahkan kemungkinan menemukan sebuah bentuk kehidupan yang merupakan hasil interaksi kimiawi dari beberapa komponen yang beranekaragam. Singkatnya, ayat-ayat tersebut jelas-jelas menggugah manusia agar melakukan penelitian lebih jauh dan lebih mendalam mengenai persoalan ini.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu kiranya dilakukan suatu penelitian untuk menentukan kadar lemak dan protein yang terdapat dalam buah terung kopek ungu dan terung kopek hijau.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Berapa besar kadar protein yang terdapat pada terung kopek ungu dan terung kopek hijau?
2. Berapa besar kadar lemak yang terdapat pada terung kopek ungu dan terung kopek hijau?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui besarnya kadar protein yang terdapat pada terung kopek ungu dan terung kopek hijau.
2. Untuk mengetahui besarnya kadar lemak yang terdapat pada terung kopek ungu dan terung kopek hijau.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian ini maka diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang kadar protein dan lemak yang terdapat pada terung kopek ungu dan terung kopek hijau.
2. Sebagai acuan dan bahan pembandingan untuk penelitian yang relevan bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tanaman Terung

1. Tanaman Terung (*Solanum melongena L*)

Terung merupakan sejenis tumbuhan yang dikenal sebagai sayur-sayuran dan ditanam untuk dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Terung dikenal dengan nama ilmiah *Solanum melongena L*. Buah terung merupakan buah sejati tunggal, berdaging tebal, lunak, dan berair. Buah tergantung pada tangkai buah. Dalam satu tangkai umumnya terdapat satu buah terung, tetapi ada juga yang memiliki lebih dari satu buah. Biji terdapat dalam jumlah banyak dan tersebar di dalam daging buah. Daun kelopak melekat pada dasar buah, berwarna hijau atau keunguan.

Terung merupakan tanaman asli daerah tropis yang cukup dikenal di Indonesia. Sebagai salah satu sayuran pribumi, buah terung hampir selalu ditemukan dipasar tani atau pasar tradisional yang relatif murah. Di Nigeria, buah terung mendapat tempat yang cukup baik di masyarakat. Pengobatan tradisional di Nigeria percaya khasiat lain dari buah terung dapat menyembuhkan atau setidaknya mengurangi serangan rematik tertentu. Bahkan tidak hanya di Nigeria, di Koreapun terung dikenal memiliki keajaiban untuk mengobati beberapa gangguan kesehatan. Fungsi lain dari terung adalah sebagai obat anti kejang yang relatif sulit diketahui dengan pasti kapan terjadinya serangannya. Selain itu di Nigeria, terung juga dipercaya

sebagai obat untuk meredam penyakit gugup. Manfaat pengusir kepanikan ini telah dibuktikan secara ilmiah terhadap marmot dengan menggunakan sari terung mentah. Terung yang mengandung striknin dan skopolamin, juga skopoletin dan skoparon yang berfungsi sebagai penghambat serangan sawan dan gugup.⁶

Dr. GHA Mitschek, seorang ilmuwan dari Universitas Graz telah melakukan pemeriksaan berseri terhadap hewan sampai beberapa kali, ternyata menemukan hasil yang sama baiknya akan manfaat terung. Penelitian ini telah memberikan diet tinggi kolesterol pada beberapa kelinci meskipun dosis yang diberikan tidak terlalu besar ternyata terung mampu menghambat pembentukan plak-plak lemak, mencegah dan mengobati ateroklerosis. Selain itu, ditemukan pula bahwa terung dapat menghambat atau membatasi asupan kolesterol dalam saluran cerna, bahkan mampu mengangkat kolesterol yang terdapat dalam aliran darah.⁷

2. Klasifikasi Buah Terung

Berdasarkan berbagai jenis buah terung yang ada, maka buah terung dapat diklasifikasikan sebagai berikut⁸:

Divisi : Spermatophyta

Sub Divisi : Angiospermae

Kelas : Dycotyledonae

Bangsa : Solanales

⁶Koko Triantoro, "Pembuatan Manisan Berbahan Dasar Terung Sebagai Makanan Khas Prodi IPA" (Proposal Penelitian Prodi IPA Universitas Negeri Yogyakarta 2008, Yogyakarta, 2008), h.8.

⁷*Ibid.*, h. 9.

⁸*Ibid.*

Suku : Solanaceace
Marga : Solanum
Jenis : Solanum melongena L

3. Jenis-jenis Buah Terung

Buah terung sangat beragam, baik dalam bentuk, ukuran, maupun warna kulit, tergantung pada varietasnya. Dari segi bentuk buah, ada yang bulat, bulat-panjang dan setengah bulat. Ukuran buah bervariasi dari kecil, sedang, dan besar. Warna kulit buah bervariasi dari ungu, hijau keputih-putihan, putih, putih keunguan, serta hitam atau ungu tua. Di dalam buah terdapat biji dalam jumlah banyak, berbentuk pipih, berwarna cokelat muda. Biji tersebut merupakan alat reproduksi atau perbanyak tanaman secara generatif.⁹

Berdasarkan buah terung yang ada, buah terung terdiri dari berbagai macam jenis yaitu sebagai berikut:

a. Terung Telunjuk

Terung ini oleh masyarakat disebut terung telunjuk karena bentuknya yang mirip dengan jari telunjuk. Berwarna hijau dan ukurannya tidak terlalu besar.

b. Terung gelatik ungu

Sebagian orang menyebutnya terung lalap karena biasa dikonsumsi langsung tanpa diproses terlebih dahulu sebagai lalapan. Rasanya tidak pahit dan aromanya tidak terlalu langu. Berbentuk bulat sebesar bola bekel berwarna ungu.

⁹R Adawyah, "Tanaman Terung," www.kompas.com (22 Agustus 2010).

c. Terung Gelatik Putih

Bentuk dan ukurannya sama dengan terung gelatik ungu. Perbedaannya terletak pada warna kulit yang hijau dengan semburat putih pada bagian ujung buah.

d. Terung Jepang

Banyak digunakan oleh masyarakat Jepang sebagai bahan untuk membuat tempura sayuran. Berbentuk mirip seperti terung kopek namun warnanya lebih gelap(ungu tua) dan lebih kecil.

e. Terung Tekokak dan Leunca

Tekokak (*Solanum Torvum*) dan Leunca (*Solanum Nigrum*), keduanya termasuk golongan terung namun bentuknya mini.

f. Terung Putih

Terung jenis ini adalah terung jenis baru yang belum banyak di pasaran. Bentuknya hampir menyerupai terung Jepang namun sedikit lebih besar. Warna kulit terung putih bersih

g. Terung Belanda

Terung Belanda (*Cyphomandra betacea*) berbentuk oval sebesar telur. Sewaktu muda berwarna kuning dan seiring dengan matangnya buah, kulit buah berubah menjadi kekuningan.

h. Terung Kopek

Terung kopek terdiri dari dua jenis, yaitu terung kopek ungu dan terung kopek hijau. Terung jenis ini sangat banyak dikonsumsi oleh masyarakat.¹⁰

B. Terung Kopek



Gambar 2.1. Terung Kopek Ungu dan Hijau

Sebagian besar petani menggunakan benih dari hasil seleksinya sendiri, sehingga sering menghasilkan keragaman tanaman dan tipe buah yang sangat berbeda. Beberapa terung varietas lokal yang dianjurkan untuk sayur adalah jenis terung kopek. Ada dua jenis terung kopek, yaitu terung kopek hijau dan terung kopek ungu. Buah terung yang merupakan hasil panen utama ini memiliki cita rasa yang enak, bernilai gizi diantaranya vitamin A, B1, B2, C dan fosfor. Selain itu, jenis terung kopek memiliki harga yang relatif murah sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat lapisan bawah. Umumnya terung ini dikonsumsi dengan cara dimasak

⁵Budi Sutomo, "Terong Terbukti Mampu Mendongkrak", *Blog Budi*. <http://budiboga.blogspot.com/2006/05/terong-terbukti-mampu-mendongkrak.html> (19 Mei 2010).

hingga menjadi sayur. Buahnya berbentuk bulat-panjang dan ujungnya meruncing, berwarna ungu muda, hijau dan tekstur daging buahnya lembut.

Terung kopek ungu dan terung kopek hijau merupakan jenis terung yang paling banyak ditemui. Desa Kaloling merupakan desa yang penduduknya banyak menanam varietas terung kopek. Desa Kaloling merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Gantarangeke Kabupaten Bantaeng. Sebagian besar masyarakat desa Kaloling bermatapencarian sebagai petani. Penghasilan utama dari masyarakat desa Kaloling adalah jagung dan kakao. Berdasarkan sumber informasi desa, desa Kaloling biasanya mengekspor hasil jagungnya hingga ke mancanegara seperti Australia.

Desa kaloling merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Gantarangeke Kabupaten Bantaeng. Kabupaten Bantaeng terbagi atas 8 kecamatan serta 46 desa dan 21 kelurahan. Pada bagian utara daerah ini terdapat dataran tinggi yang meliputi pegunungan Lompobattang. Sedangkan di bagian selatan membujur dari barat ke timur terdapat dataran rendah yang meliputi pesisir pantai dan persawahan. Kabupaten Bantaeng yang luasnya mencapai 0,63% dari luas Sulawesi Selatan, masih memiliki potensi alam untuk dikembangkan lebih lanjut. Lahan yang dimilikinya ±39.583 Ha. Di Kabupaten Bantaeng mempunyai hutan produksi terbatas 1.262 Ha dan hutan lindung 2.773 Ha. Secara keseluruhan luas kawasan hutan menurut fungsinya di kabupaten Bantaeng sebesar 6.222 Hektar (2006). Karena sebagian besar penduduknya petani, maka wajar bila Bantaeng sangat mengandalkan

sektor pertanian. Masuk dalam pengembangan Karaeng Lompo sebab memang jenis tanaman sayur-sayurannya sudah berkembang pesat selama ini.

C. Kandungan Gizi Terung

Adapun kandungan gizi buah terung dalam 100 gr menurut hasil analisis lengkap yaitu¹¹:

Tabel 2.1. Kandungan gizi buah terung dalam 100 gr

No	Kandungan	Jumlah
1	Kalori	24 kal
2	Lemak	1,1 gr
3	Karbohidrat	5,5 gr
4	Kalsium	15 mg
5	Fosfor	37 mg
6	Zat Besi	0,4 mg
7	Vitamin A	30 mg
8	Vitamin B1	0,04 mg
9	Vitamin C	5 mg
10	Protein	1,4-2 gr
11	Air	92,7 gr

⁶Data Kandungan gizi Bahan Makanan, “Kandungan Gizi Buah Terung”
<http://www.indonesia.com/sripo/2003/06/22/2206bog1.htm> (19 Mei 2010).

D. Protein

Komponen bahan pangan adalah merupakan senyawa kimia yang memiliki karakteristik tertentu. Komponen utama bahan pangan terdiri dari air, protein, karbohidrat, vitamin, mineral dan beberapa senyawa minor lain. Akan tetapi, komponen bahan pangan tersebut sering dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu: air, makronutrien dan mikronutrien.¹² Menurut Sudarmaji *et. al.*, (1996) komponen bahan pangan selain air dapat dikelompokkan lebih lengkap yaitu:

1. Kelompok Makronutrien
 - a. Karbohidrat
 - b. Lemak
 - c. Protein
2. Kelompok Mikronutrien
 - a. Vitamin
 - b. Mineral
3. Kelompok Bahan Ikutan
 - a. Alkaloid (kafein, nikotin dll)
 - b. Anti Gizi (Antripsin, Fitat, dll)
 - c. Warna Alami
 - d. Aroma Alami

¹²Anang M Legowo, Nurwantoro, dan Sutaryo, *Analisis Pangan* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005), h. 3.

4. Kelompok Bahan Tambahan

- a. Pengawet
- b. Penstabil
- c. Pengental
- d. Pewarna
- e. Penyedap Rasa dll

5. Kelompok Bahan Metabolit

- a. Disengaja (Alkohol, Laktat)
- b. Tak disengaja (Aflatoksin, senyawa beracun yang lain).

Protein merupakan komponen utama dalam sel hidup yang memegang peranan penting dalam proses kehidupan. Protein berperan dalam struktur dan fungsi semua sel makhluk hidup dan virus. Protein dalam bentuk enzim berperan sebagai katalis dalam bermacam-macam proses biokimia. Sebagai alat transport, yaitu protein hemoglobin mengikat dan mengangkut oksigen dalam bentuk (Hb-O) ke seluruh bagian tubuh. Protein juga berfungsi sebagai pelindung, seperti antibodi yang terbentuk jika tubuh memasukkan zat asing, serta sebagai sistem kendali dalam bentuk hormon, Protein pembangun misalnya glikoprotein yang terdapat dalam dinding sel, keratin yang terdapat pada kulit, kuku dan rambut. Sebagai komponen penyimpanan dalam biji-bijian. Protein juga merupakan sumber gizi, protein berperan sebagai sumber asam amino bagi organisme yang tidak mampu membentuk asam amino. Dalam tinjauan kimia protein adalah senyawa organik yang kompleks berbobot

molekul tinggi berupa polimer dengan monomer asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Molekul protein mengandung karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen dan sulfur serta posfor.¹³

Istilah protein diperkenalkan pada tahun 1830-an oleh pakar kimia Belanda bernama Gerardus Mulder, yang merupakan salah satu dari orang-orang pertama yang mempelajari kimia dalam protein secara sistematis. Ia secara tepat menyimpulkan peranan inti dari protein dalam sistem hidup dengan menurunkan nama dari bahasa Yunani *proteios*, yang berarti “pertama”. Protein merupakan makromolekul yang menyusun lebih dari separuh bagian dari sel. Protein menentukan ukuran dan struktur sel, komponen utama dari sistem komunikasi antar sel serta sebagai katalis berbagai reaksi biokimia di dalam sel. Karena itulah sebagian besar aktivitas penelitian biokimia tertuju pada protein khususnya hormon, antibodi dan enzim.¹⁴


1. Penggolongan Protein

Protein adalah molekul yang sangat vital untuk organisme dan terdapat di semua sel. Terdapat 21 asam amino yang dijumpai dalam protein tumbuhan dan hewan, namun keduapuluh satu asam amino ini dapat digabungkan menurut pelbagai cara, membentuk otot, urat, kulit, kuku, bulu, sutera, hemoglobin, enzim, antibodi, dan berbagai hormon.¹⁵

¹³ Zulfikar, *Kimia Kesehatan* (Jakarta: Departemen Pendidikan, 2008), h. 292.

¹⁴ H Rivai, *Asas Pemeriksaan Kimia*, (Jakarta: UI Press, 1995), h.25

¹⁵ Fessenden& Fessenden, *Kimia Organik* Edisi 3 Jilid 2 (Jakarta : Erlangga, 1986), h. 363.



Gambar 2.2. Struktur Asam Amino

Protein adalah suatu polipeptida yang mempunyai bobot molekul yang sangat bervariasi, dari 5000 hingga lebih dari satu juta. Di samping berat molekul yang berbeda-beda, protein mempunyai sifat yang berbeda pula. Ada protein yang mudah larut dalam air, tetapi ada juga yang sukar larut dalam air. Rambut dan kuku adalah suatu protein yang tidak larut dalam air dan tidak mudah bereaksi, sedangkan protein yang terdapat dalam bagian putih telur mudah larut dalam air dan mudah bereaksi.¹⁶

Ditinjau dari strukturnya protein dapat dibagi dalam dua golongan besar, yaitu golongan protein sederhana dan protein gabungan. Yang dimaksud dengan protein sederhana adalah protein yang hanya terdiri atas molekul-molekul asam amino, sedangkan protein gabungan ialah protein yang terdiri atas protein dan gugus bukan protein. Gugus ini disebut gugus prostetik dan terdiri atas karbohidrat, lipid atau asam nukleat.¹⁷


¹⁶ Anna Poedjiadi dan F.M. Titin Supriyanti, *Dasar-dasar Biokimia* (Jakarta : UI-Press, 1994) h, 109.

¹⁷ H. Santoso, "Protein dan Enzim". <http://www.heruswn.technology.com> (16 Juni 2010).

Protein sederhana dapat dibagi dalam dua bagian menurut bentuk molekulnya, yaitu protein fiber dan protein globular. Protein fiber mempunyai bentuk molekul panjang seperti serat atau serabut, sedangkan protein globular berbentuk bulat.¹⁸

2. Struktur Protein

Setiap protein mempunyai struktur tiga dimensi yang unik, yang ditentukan oleh urutan asam amino penyusunnya. Struktur protein sederhana merupakan molekul berantai panjang penggabungan ratusan atau ribuan dari 21 jenis asam amino. Penggabungan ini terjadi melalui ikatan peptida antara gugus karboksil dan gugus amino. Ada empat tingkat struktur dasar protein yaitu struktur primer, sekunder, tersier dan kuartener.¹⁹



Gambar 2.3. Struktur Protein

¹⁸Anna Poedjiadi dan F.M. Titin Supriyanti, *op. cit.*

¹⁹Abdul Hamid A. Toha, *Biokimia: Metabolisme Biomolekul* (Bandung : Alfabeta, 2005) h,

Struktur primer menunjukkan jumlah, jenis dan urutan asam amino dalam molekul protein. Oleh karena ikatan antar asam amino adalah ikatan peptida, maka struktur primer protein juga menunjukkan ikatan peptida yang urutannya diketahui. Struktur tersier menunjukkan kecenderungan polipeptida membentuk lipatan atau gulungan, dan dengan demikian membentuk struktur yang lebih kompleks. Struktur ini dimantapkan oleh adanya beberapa ikatan antar gugus R pada molekul asam amino yang membentuk protein. Beberapa jenis ikatan tersebut misalnya ikatan elektrostatik, ikatan hydrogen, interaksi hidrofob antara rantai samping non polar, interaksi dipol-dipol dan ikatan sulfida yaitu suatu ikatan kovalen. Struktur kuartener menunjukkan derajat persekutuan unit-unit protein. Sebagian besar protein globular terdiri atas beberapa rantai polipeptida yang terpisah. Rantai polipeptida ini saling berinteraksi membentuk persekutuan.²⁰

3. Sifat-sifat protein

Beberapa sifat fisik dan kimia protein adalah sebagai berikut :

- a. Protein merupakan ion dipolar amfoterik (*zwitterions*) dan mengandung gugus asam dan basa seperti asam amino. Protein akan membentuk ion positif dalam larutan asam dan membentuk ion negatif pada suasana basa.
- b. Kebanyakan protein labil dan mudah dimodifikasi akibat perubahan lingkungannya, pH, radiasi ultraviolet, pemanasan dan sebagainya. Akibat perubahan lingkungan ini, maka suatu protein akan mengalami perubahan komformasi alamiah yang tidak menentu (denaturasi). Protein dalam air

²⁰ Anna Poedjiadi dan F.M. Titin Supriyanti, *op. cit.*

mempunyai viskositas atau kekentalan yang relatif lebih besar daripada viskositas air pelarutnya. Viskositas protein ini tergantung pada jenis protein, bentuk molekul, konsentrasi serta suhu larutan.²¹

4. Fungsi dan Peranan Protein

Protein memegang peranan penting dalam berbagai proses biologi. Peran peran tersebut antara lain:

a. Katalisis Enzimatik

Hampir semua reaksi kimia dalam sistem biologi dikatalisis oleh enzim dan hampir semua enzim adalah protein.

b. Transportasi dan penyimpanan

Berbagai molekul kecil dan ion-ion ditransport oleh protein spesifik. Misalnya transportasi oksigen di dalam eritrosit oleh hemoglobin dan transportasi oksigen di dalam otot oleh mioglobin.

c. Koordinasi gerak

Kontraksi otot dapat terjadi karena pergeseran dua filamen protein. Contoh lainnya adalah pergerakan kromosom saat proses mitosis dan pergerakan sperma oleh flagela.

d. Penunjang mekanis

Ketegangan kulit dan tulang disebabkan oleh kolagen yang merupakan protein fibrosa.

²¹Abdul Hamid A. Toha, *loc. cit.*

e. Proteksi imun

Antibodi merupakan protein yang sangat spesifik dan dapat mengenal serta berkombinasi dengan benda asing seperti virus, bakteri dan sel dari organisme lain.

f. Membangkitkan dan menghantarkan impuls saraf

Respon sel saraf terhadap rangsang spesifik diperantarai oleh protein reseptor. Misalnya rodopsin adalah protein yang sensitif terhadap cahaya ditemukan pada sel batang retina. Contoh lainnya adalah protein reseptor pada sinapsis.

g. Pengaturan pertumbuhan dan diferensiasi

Pada organisme tingkat tinggi, pertumbuhan dan diferensiasi diatur oleh protein faktor pertumbuhan. Misalnya faktor pertumbuhan saraf mengendalikan pertumbuhan jaringan saraf. Selain itu, banyak hormon merupakan protein.²²

E. Lemak

Salah satu kelompok senyawa organik yang terdapat dalam tumbuhan, hewan atau manusia dan sangat berguna bagi kehidupan manusia adalah lipid. Untuk memberikan definisi yang jelas tentang lipid sangat sukar, sebab senyawa yang termasuk lipid tidak mempunyai rumus struktur yang serupa atau mirip. Sifat kimia dan fungsi biologinya juga berbeda-beda. Walaupun demikian, para ahli biokimia bersepakat bahwa lemak dan senyawa organik yang mempunyai sifat fisika seperti lemak, dimasukkan dalam satu kelompok yang disebut lipid.²³

²²H. Santoso, "Protein dan Enzim". <http://www.heruswn.technology.com> (16 Juni 2010).

²³A. Poedjadi, *Dasar-dasar Biokimia*. Cet. II. (Jakarta : UI Press, 1994), h. 51

Lipida berasal dari kata *lipos* (bahasa Yunani) yang berarti lemak. Lipida memiliki sifat kelarutan yang berbeda dengan tiga golongan utama biomolekul yang lain yaitu karbohidrat, protein dan asam nukleat, yang umumnya larut dalam air dan tidak larut dalam pelarut organik.²⁴

Lipid adalah senyawa organik berminyak atau berlemak yang tidak larut dalam air, dapat diekstrak dari sel dan jaringan oleh pelarut nonpolar, seperti kloroform dan eter. Asam lemak adalah komponen unit pembangun pada hampir semua lipid. Asam lemak adalah asam organik berantai panjang yang mempunyai atom karbon dari 4 sampai 24. Asam lemak memiliki gugus karboksil tunggal dan ekor hidrokarbon nonpolar yang panjang. Hal ini membuat kebanyakan lipid bersifat tidak larut dalam air dan tampak berminyak atau berlemak.²⁵

Lipid secara umum dapat dibagi ke dalam dua kelas besar, yaitu lipid sederhana dan lipid kompleks. Yang termasuk lipid sederhana antara lain adalah: 1) trigliserida dari lemak atau minyak seperti ester asam lemak dan gliserol, contohnya adalah lemak babi, minyak jagung, minyak biji kapas, dan butter, 2) lilin yang merupakan ester asam lemak dari rantai panjang alkohol, contohnya adalah beeswax, spermaceti, dan carnauba wax, dan 3) sterol yang didapat dari hidrogenasi parsial atau menyeluruh fenantrena, contohnya adalah kolesterol dan ergosterol.²⁶

²⁴Zulfikar, *Kimia Kesehatan* (Jakarta: Departemen Pendidikan, 2008), h. 301.

²⁵Lehninger AL. 1982. *Dasar-Dasar Biokimia Jilid I*. Maggy Thenawijaya, penerjemah. Jakarta: Erlangga. Terjemahan dari: *Principles of Biochemistry*. Pramarsh. 2008. http://www.planetayurveda.com/cholesterol_remedies.html. (19 Juni 2010).

²⁶Scy Tech Encyclopedia. 2008. Acrolein test. http://www.answers.com/topic/acrolein_test.html. (19 Juni 2010).

1. Penggolongan Lipid

Senyawa yang termasuk lipid ini dapat dibagi dalam beberapa golongan. Ada beberapa cara penggolongan yang dikenal. Bloor membagi lipid dalam tiga golongan besar yakni :

- a. Lipid sederhana, yakni ester asam lemak dengan rantai pendek, contohnya lemak atau gliserida.
- b. Lipid gabungan, yakni ester asam lemak dengan rantai panjang, contohnya fosfolipid.
- c. Derivat lemak, yakni senyawa yang diperoleh dari proses hidrolisis lipid, contohnya lemak, gliserol dan sterol.

Disamping itu, berdasarkan sifat kimia yang penting dapat dibagi dalam dua golongan besar yaitu lipid yang dapat disabun yakni dapat dihidrolisis dengan basa contohnya lemak. Dan lipid yang tidak dapat disabun contohnya steroid.²⁷

Lipid yang paling sederhana dan paling banyak mengandung asam lemak sebagai unit penyusunnya adalah triasilgliserol, juga sering disebut lemak, lemak netral, atau trigliserida. Jenis lipid ini merupakan contoh lipid yang paling sering dijumpai baik pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Triasilgliserol adalah komponen utama dari lemak penyimpan atau depot lemak pada sel tumbuhan dan hewan, tetapi umumnya tidak dijumpai pada membran. Triasilgliserol adalah molekul hidrofobik nonpolar, karena molekul ini tidak mengandung muatan listrik atau gugus fungsional

²⁷*Ibid.*

dengan polaritas tinggi.²⁸

Triasilgliserol terakumulasi di dalam beberapa area, seperti jaringan adiposa, dalam tubuh manusia dan biji tanaman, dan triasilgliserol ini mewakili bentuk penyimpanan energi. Lipid yang lebih kompleks berada dekat dan berhubungan dengan protein dalam membran sel dan partikel subselular. Jaringan yang lebih aktif mengandung lipid kompleks yang lebih banyak, contohnya adalah dalam otak, ginjal, paru-paru, dan darah yang mengandung konsentrasi fosfatida dalam jumlah tinggi pada mamalia.²⁹


2. Struktur Lemak

Yang dimaksud dengan lemak disini adalah suatu ester asam lemak dengan gliserol. Gliserol ialah suatu trihidroksi alkohol yang terdiri atas tiga atom karbon. Jadi tiap atom karbon mempunyai gugus –OH. Satu molekul gliserol dapat mengikat satu, dua atau tiga molekul asam lemak dalam bentuk ester, yang disebut monogliserida, digliserida atau trigliserida. Pada lemak, satu molekul gliserol mengikat tiga molekul asam lemak oleh karena itu lemak adalah suatu trigliserida.³⁰

²⁸*op., cit.*

²⁹*op., cit.*

³⁰Departemen Gizi dan Kesehatan Masyarakat FKM UI., *Gizi dan Kesehatan Masyarakat*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007). h. 18.



Gambar 2.4 Struktur Lemak

Sumber lemak dapat berasal dari hewan dan disebut dengan lemak hewani, misalnya lemak daging, mentega, susu, ikan basah, telur dan minyak ikan. Sumber lemak yang bersal dari tumbuhan disebut lemak nabati. Contohnya adalah kelapa, kemiri, kacang-kacangan, dan alpukat. Lemak berfungsi sebagai cadangan energi dan pelarut vitamin A, D, E, dan K. Lemak disimpan dalam jaringan bawah kulit. Setiap satu gram lemak dapat menghasilkan energi sekitar 9 kilokalori atau 38 kilojoule.³¹

3. Sifat-sifat Lemak

Secara kimiawi lemak adalah senyawa yang sama dengan minyak, namun lemak padat pada suhu kamar sedangkan minyak berbentuk cair. Kedua senyawa itu terdiri atas asam lemak berantai panjang yang teresterifikasi oleh gugus karboksilnya ke gugus hidroksil dari gliserol yaitu alkohol berkarbon-tiga. Ketiga-tiga gugus

³¹Gunawan Andang. *Kombinasi Makanan Serasi*. (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 77.

karboksil dari gliserol diesterifikasi, sehingga lemak dan minyak sering disebut trigliserida.³²

Titik leleh dan sifat-sifat lain lemak ditentukan oleh macam asam lemak yang dikandungnya. Lemak biasanya mengandung tiga asam lemak yang berbeda walaupun kadang-kadang dua asam lemak sama. Asam lemak ini selalu mempunyai jumlah atom karbon genap, biasanya 16 atau 18 dan beberapa tidak jenuh (mempunyai ikatan rangkap). Titik leleh naik dengan bertambah jenuh dan panjangnya asam lemak, sehingga lemak padat biasanya mempunyai asam lemak jenuh.³³

Lemak merupakan kelompok senyawa heterogen yang berkaitan dengan asam lemak, baik secara aktual maupun potensial. Sifat umum lemak yaitu relatif tidak larut dalam air dan larut dalam pelarut non polar seperti eter, kloroform, alcohol dan benzene.³⁴

4. Peran dan Fungsi Lemak

Lemak jarang disimpan di dalam daun, batang dan akar tetapi banyak dalam biji dan beberapa buah. Dalam tumbuhan berbiji tertutup, lemak disimpan dalam endosperma atau kotiledon biji, tetapi juga dalam embrio. Dalam tumbuhan berbiji terbuka, lemak disimpan dalam gametofit betina. dibandingkan dengan karbohidrat,

³² Drs. Darjat Sasmitamihardja dan Dra. Arbayah Siregar, MSc, *Fisiologi Tumbuhan* (Bandung : ITB-Departemen Pendidikan dan kebudayaan, 1996), h. 232.

³³ *Ibid.*

²⁸ Wawan Junaidi, “ Metabolisme Lemak”, *Blog Wawan*, <http://wawan-junaidi.blogspot.com/2009/07/metabolisme-lemak.html> (19 Mei 2010).

lemak mengandung lebih banyak karbon atau hydrogen serta sedikit oksigen. Jika lemak direspirasi, lebih banyak O₂ digunakan per unit berat. Akibatnya, lebih banyak ATP dihasilkan, yang menunjukkan bahwa lebih banyak energy dapat disimpan dalam volume kecil lemak dari pada karbohidrat dengan volume yang sama. Mungkin karena inilah biji yang kecil mengandung lemak sebagai bahan cadangan utama yang disimpan. Jika lemak tersebut direspirasi, akan dilepaskan energi yang cukup untuk membentuk kecambah, walaupun karena ringannya biji seperti itu sering tersebar secara baik oleh angin.³⁵

Fungsi lemak umumnya yaitu sebagai sumber energi, bahan baku hormon, membantu transport vitamin yang larut, lemak sebagai bahan insulasi terhadap perubahan suhu, serta pelindung organ-organ tubuh bagian dalam. Sebuah penelitian pernah melaporkan bahwa hewan-hewan percobaan yang tidak mendapatkan jumlah lemak yang cukup dalam makanannya akan mengalami hambatan pertumbuhan, bahkan ada yang berhenti tumbuh dan akhirnya mati. Kurangnya lemak dalam makanan juga akan menyebabkan kulit menjadi kering dan bersisik. Dalam saluran pencernaan, lemak dan minyak akan lebih lama berada di dalam lambung dibandingkan dengan karbohidrat dan protein, demikian juga proses penyerapan lemak yang lebih lambat dibandingkan unsur lainnya. Oleh karena itu, makanan yang mengandung lemak mampu memberikan rasa kenyang yang lebih lama dibandingkan

³⁵ Drs. Darjat Sasmitamihardja dan Dra. Arbayah Siregar, MSc, Fisiologi Tumbuhan (Bandung : ITB-Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996), h. 235..

makanan yang kurang atau tidak mengandung lemak³⁶.

Salah satu fungsi lemak memang untuk mensuplai sejumlah energi, dimana satu gram lemak mengandung 9 kalori, sedangkan 1 gram karbohidrat hanya mengandung 4 kalori. Fungsi lain dari lemak adalah untuk membantu absorpsi vitamin yang larut dalam lemak. Selain itu, lemak juga merupakan sumber asam lemak esensial yang tidak dapat dihasilkan tubuh dan harus disuplai dari makanan. Fungsi lemak sebagai bahan baku hormon juga sangat berpengaruh terhadap proses fisiologis di dalam tubuh, contohnya yaitu pembuatan hormon seks.³⁷

Lemak tubuh dalam jaringan lemak (jaringan adipose) mempunyai fungsi sebagai insulator untuk membantu tubuh mempertahankan temperaturnya, sedangkan pada wanita dapat memberikan kontur khas feminim seperti jaringan lemak di bagian bokong dan dada. Selain itu, lemak tubuh dalam jaringan lemak juga berperan sebagai bantalan yang melindungi organ-organ seperti bola mata, ginjal, dan organ lainnya. Sedangkan fungsi lemak dalam makanan yaitu dapat memberikan rasa gurih, memberikan kualitas renyah (terutama pada makanan yang digoreng), serta memberikan sifat empuk pada kue. Lemak yang terdapat dalam bahan makanan sekitar 90% nya merupakan lemak dalam bentuk trigliserida, sedangkan sisanya 10% adalah dalam bentuk kolesterol dan fosfolipid.³⁸

³⁰Wawan Junaidi, “ Metabolisme Lemak”, *Blog Wawan*, <http://wawan-junaidi.blogspot.com/2009/07/metabolisme-lemak.html> (19 Mei 2010).

³⁷*Ibid.*

³⁸*Ibid.*

Lemak yang berasal dari produk hewani umumnya mengandung sejumlah besar asam lemak jenuh. Sebaliknya produk makanan nabati, kecuali minyak kelapa, mengandung sejumlah besar asam lemak tidak jenuh berantai panjang. Perlu diketahui, semakin banyak lemak jenuh yang kita konsumsi, maka akan semakin tinggi pula kadar kolesterol dalam darah kita.

5. Pengaruh Lemak Terhadap Kesehatan

a. Penyakit Jantung Koroner

Penyakit jantung koroner dianggap sebagai salah satu penyebab kematian yang menakutkan. Terdapat sejumlah faktor resiko yang diidentifikasi menyebabkan penyakit jantung koroner, seperti meningkatnya kadar lipida utamanya kolesterol darah, hipertensi, perokok berat dan aktifitas fisik.

b. Peningkatan Kadar Kolesterol Dalam Darah

Kadar kolesterol dalam darah manusia beragam dan mengalami peningkatan dengan bertambahnya umur. Penambahan kolesterol darah berbeda menurut jenis kelamin. Pada wanita dimulai umur duapuluhan, sedangkan pada pria dapat lebih awal. Untuk menghindari timbulnya penyakit jantung koroner, kadar kolesterol darah dipertahankan kurang dari 200 mg/ dl. Untuk mrnghindari kadar kolesterol darah yang tinggi, dianjurkan mengganti sumber lemak jenuh dengan makanan sumber lemak tak jenuh.

c. Peningkatan Kadar Lipida Darah

Tingginya kadar trigliserida dalam darah atau dikensl hipertrigliserida merupakan

salah satu faktor resiko Penyakit Jantung Koroner (PJK). Komposisi karbohidrat dan obesitas merupakan faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan trigliserida dalam darah.³⁹

F. Analisis Protein dan Lemak

Analisis berasal dari kata “*analisis*” dari bahasa Yunani. Istilah tersebut kemudian diserap ke dalam bahasa Latin yang mempunyai arti yaitu: *Ana* = kembali, dan *Luein* = melepas. Berdasarkan asal kata itulah analisis kini diartikan sebagai upaya pemisahan atau penguraian suatu kesatuan materi bahan menjadi komponen senyawa-senyawa penyusunnya, sehingga hasil (data) yang diperoleh dapat dikaji lebih lanjut.⁴⁰

Ilmu Kimia merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang mendapatkan perhatian dan dorongan dari Al-Qur’an untuk dikembangkan. Manusia dan seluruh lingkungan hidupnya terbentuk dari elemen-elemen dan substansi-substansi yang tergabung menjadi sebuah ikatan kimia menurut hukum Allah. Manusia sendiri tercipta dari tanah liat kemungkinan melalui sebuah proses kimia interaktif antara berbagai unsur dalam tanah yang bekerja menurut hukum-hukum Allah melalui proses perubahan dan kombinasi tertentu. Penciptaan langit dan bumi dalam enam “periode” dan penciptaan alam semesta dari air juga terjadi menurut hukum kombinasi dan perubahan yang diciptakan Allah Swt. Ayat-ayat Al-Qur’an yang

³⁹Departemen Gizi dan Kesehatan Masyarakat FKM UI , *Gizi dan Kesehatan Masyarakat*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 21.

⁴⁰Anang M Legowo, Nurwantoro, dan Sutaryo, *Analisis Pangan* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005), h. 1.

menuturkan bagaimana Tuhan menciptakan langit, bumi, manusia, dan sebagainya, memberikan petunjuk yang kuat kepada para ilmuwan tentang membuat substansi baru dengan menggabungkan berbagai unsur dan tentang kemungkinan mempelajari reaksi kimia dari penggabungan unsur-unsur itu dengan berbagai proporsinya. Ayat berikut mengemukakan kekuatan “pewarnaan” yang dilakukan Tuhan dan memberikan inspirasi kepada para ilmuwan untuk melakukan proses kimiawi dengan mencampurkan berbagai unsur kimia dengan proporsi tertentu untuk membuat hal yang mirip dengan itu. Firman Allah dalam Q.S Al-An’am ayat 95 :

إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ ۗ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ۗ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ فَاِنَّی تُوْفِكُوْنَ ﴿٩٥﴾

Terjemahan :

Sesungguhnya Allah menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan, Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. (Yang memiliki sifat-sifat) demikian ialah Allah, maka mengapa kamu masih berpaling? (Q.S Al-An’am [6]: 95)

Selain itu firman Allah yang menjelaskan mengenai ciptaan-Nya yaitu tumbuh-tumbuhan terdapat pula dalam Q.S Al-An’am/6 :141⁴¹

⁴¹Toha Putra, *Al-Qur’an Al Karim dan Terjemahnya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2006), Q.S. Al-An’am / 6 : 141.

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا
 أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالزَّمَانَ مِثْلَهَا وَغَيْرَ مُتَشَبِهَةٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا
 أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Terjemahan :

”Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” (QS. Al-An’am / 6 : 141).

Sebagaimana telah dikemukakan pada urain sebelumnya, Al-Qur’an bukanlah kitab ilmu pengetahuan atau kitab kimia dalam pengertian harfiahnya. Akan tetapi, Al-Qur’an adalah kitab petunjuk bagi umat manusia. Dalam berbagai konteks, Al-Qur’an memberikan petunjuk mengenai berbagai permasalahan yang dihadapi manusia dan sekaligus menjadi gudang ilmu pengetahuan serta menjadi pintu pembuka untuk melakukan penelitian tentang berbagai aspek kehidupan manusia. Dengan demikian, dalam Al-Qur’an di sana-sini kita temukan ayat-ayat yang

mendorong pembacanya untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuk ilmu kimia.

1. Analisis Protein

Salah satu penentuan kualitas bahan makanan dan kaitannya dengan kebutuhan obyektif teknologi pengolahan maupun nilai gizi dapat dilakukan melalui analisis kadar makronutrien dan mikronutrien. Analisis makronutrien dapat dilakukan dengan analisis proksimat, yaitu merupakan analisis kasar yang meliputi kadar abu total, air total, lemak total, protein total dan karbohidrat total, sedangkan untuk kandungan mikronutrien difokuskan pada kandungan provitamin A (β - karoten). Analisis vitamin A dan provitamin A secara kimia dalam buah-buahan dan produk hasil olahan dapat ditentukan dengan berbagai metode diantaranya kromatografi lapis tipis, kromatografi kolom absorpsi, kromatografi cair kinerja tinggi, kolorimetri dan spektrofotometri sinar tampak.⁴²

Analisis protein dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu ; secara kualitatif terdiri atas ; reaksi Xantoprotein, reaksi Hopkins-Cole, reaksi Millon, reaksi Nitroprusida, dan reaksi Sakaguchi. Secara kuantitatif terdiri dari ; metode Kjeldahl,

⁴²Ida Musfiroh, "Analisis Proksimat dan Penetapan Kadar β - Karoten dalam Selai Lembaran Terung Belanda (*Cyphomandra betacea* Sendtn.) Dengan Metode Spektrofotometri Sinar Tampak"(Skripsi Sarjana, Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran, Padjadjaran, 2002), h. 1.

metode titrasi formol, metode Lowry, metode spektrofotometri visible (Biuret), dan metode spektrofotometri UV.⁴³

a. Analisa Kualitatif

1) Reaksi Xantoprotein

Larutan asam nitrat pekat ditambahkan dengan hati-hati ke dalam larutan protein. Setelah dicampur terjadi endapan putih yang dapat berubah menjadi kuning apabila dipanaskan. Reaksi yang terjadi ialah nitrasi pada inti benzena yang terdapat pada molekul protein. Reaksi ini positif untuk protein yang mengandung tirosin, fenilalanin dan triptofan.

2) Reaksi Hopkins-Cole

Larutan protein yang mengandung triptofan dapat direaksikan dengan pereaksi Hopkins-Cole yang mengandung asam glioksilat. Pereaksi ini dibuat dari asam oksalat dengan serbuk magnesium dalam air. Setelah dicampur dengan pereaksi Hopkins-Cole, asam sulfat dituangkan perlahan-lahan sehingga membentuk lapisan di bawah larutan protein. Beberapa saat kemudian akan terjadi cincin ungu pada batas antara kedua lapisan tersebut.

3) Reaksi Millon

Pereaksi Millon adalah larutan merkuro dan merkuri nitrat dalam asam nitrat. Apabila pereaksi ini ditambahkan pada larutan protein, akan menghasilkan endapan

⁴³Nurlaela Abd. Kadir, Nurhayati Bialangi dan Netty Ischak, "Analisis Protein Ikan Nike Asal Gorontalo"(Laporan Penelitian Jurusan Pendidikan Kimia Fakultas Matematika dan Ipa UNG, Gorontalo, 2000). <http://ilmu-kimiakimia.blogspot.com/2010/05/analisis-protein-ikan-nike-asal.html> (28 Mei 2010).

putih yang dapat berubah menjadi merah oleh pemanasan. Pada dasarnya reaksi ini positif untuk fenol-fenol, karena terbentuknya senyawa merkuri dengan gugus hidroksifenil yang berwarna.

4) Reaksi Natriumnitroprusida

Natriumnitroprusida dalam larutan amoniak akan menghasilkan warna merah dengan protein yang mempunyai gugus $-SH$ bebas. Jadi protein yang mengandung sistein dapat memberikan hasil positif.

5) Reaksi Sakaguchi

Pereaksi yang digunakan ialah naftol dan natriumhipobromit. Pada dasarnya reaksi ini memberikan hasil positif apabila ada gugus guanidin. Jadi arginin atau protein yang mengandung arginin dapat menghasilkan warna merah.

6) Metode Biuret

Larutan protein dibuat alkalis dengan NaOH kemudian ditambahkan larutan $CuSO_4$ encer. Uji ini untuk menunjukkan adanya senyawa-senyawa yang mengandung gugus amida asam yang berada bersama gugus amida yang lain. Uji ini memberikan reaksi positif yaitu ditandai dengan timbulnya warna merah violet atau biru violet.

b. Analisa Kuantitatif

Analisis protein dapat digolongkan menjadi dua metode, yaitu: Metode konvensional, yaitu metode Kjeldahl (terdiri dari destruksi, destilasi, titrasi), titrasi formol. Digunakan untuk protein tidak terlarut. Metode modern, yaitu metode Lowry,

metode spektrofotometri visible, metode spektrofotometri UV. Digunakan untuk protein terlarut.

1) Metode Kjeldahl

Metode ini merupakan metode yang sederhana untuk penetapan nitrogen total pada asam amino, protein, dan senyawa yang mengandung nitrogen. Sampel didestruksi dengan asam sulfat dan dikatalisis dengan katalisator yang sesuai sehingga akan menghasilkan amonium sulfat. Setelah pembebasan alkali dengan kuat, amonia yang terbentuk disuling uap secara kuantitatif ke dalam larutan penyerap dan ditetapkan secara titrasi.

2) Metode Titrasi Formol

Larutan protein dinetralkan dengan basa (NaOH) lalu ditambahkan formalin akan membentuk dimethylol. Dengan terbentuknya dimethylol ini berarti gugus aminonya sudah terikat dan tidak akan mempengaruhi reaksi antara asam dengan basa NaOH sehingga akhir titrasi dapat diakhiri dengan tepat. Indikator yang digunakan adalah p.p., akhir titrasi bila tepat terjadi perubahan warna menjadi merah muda yang tidak hilang dalam 30 detik.

3) Metode lowry

Reaksi antara Cu^{2+} dengan ikatan peptida dan reduksi asam fosfomolibdat dan asam fosfotungstat oleh tirosin dan triptofan (merupakan residu protein) akan menghasilkan warna biru. Warna yang terbentuk terutama dari hasil reduksi fosfomolibdat dan fosfotungstat, oleh karena itu warna yang terbentuk tergantung

pada kadar tirosin dan triptofan dalam protein. Metode lowry memiliki keuntungan karena 100 kali lebih sensitif dari metode biuret. Senyawa fenol juga dapat mengganggu hasil penetapan. Gangguan ini dapat dihilangkan dengan cara mengendapkan protein dengan TCA, hilangkan supernatannya lalu melarutkannya kembali endapan protein yang diendapkan oleh TCA tadi, kemudian dianalisis selanjutnya.

4) Metode Spektrofotometri Visible (Biuret)

5) Metode Spektrofotometri UV

Asam amino penyusun protein diantaranya adalah triptofan, tirosin dan fenilalanin yang mempunyai gugus aromatik. Triptofan mempunyai absorpsi maksimum pada 280 nm, sedang untuk tirosin mempunyai absorpsi maksimum pada 278 nm. Fenilalanin menyerap sinar kurang kuat dan pada panjang gelombang lebih pendek. Absorpsi sinar pada 280 nm dapat digunakan untuk estimasi konsentrasi protein dalam larutan. Supaya hasilnya lebih teliti perlu dikoreksi kemungkinan adanya asam nukleat dengan pengukuran absorpsi pada 260 nm. Pengukuran pada 260 nm untuk melihat kemungkinan kontaminasi oleh asam nukleat. Rasio absorpsi 280/260 menentukan faktor koreksi yang ada dalam suatu tabel.

2. Analisis Lemak

Lemak dan minyak adalah salah satu kelompok yang termasuk pada golongan lipid, yaitu senyawa organik yang terdapat di alam serta tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik non-polar, misalnya dietil eter ($C_2H_5OC_2H_5$),

Kloroform(CHCl_3), benzena dan hidrokarbon lainnya, lemak dan minyak dapat larut dalam pelarut yang disebutkan di atas karena lemak dan minyak mempunyai polaritas yang sama dengan pelaut tersebut.⁴⁴

Bahan-bahan dan senyawa kimia akan mudah larut dalam pelarut yang sama polaritasnya dengan zat terlarut . Tetapi polaritas bahan dapat berubah karena adanya proses kimiawi. Misalnya asam lemak dalam larutan KOH berada dalam keadaan terionisasi dan menjadi lebih polar dari aslinya sehingga mudah larut serta dapat diekstraksi dengan air. Ekstraksi asam lemak yang terionisasi ini dapat dinetralkan kembali dengan menambahkan asam sulfat encer (10 N) sehingga kembali menjadi tidak terionisasi dan kembali mudah diekstraksi dengan pelarut non-polar.⁴⁵

Ekstraksi adalah suatu proses pemisahan kandungan senyawa kimia dari jaringan tumbuhan maupun hewan. Sebelum ekstraksi dilakukan biasanya bahan-bahan dikeringkan terlebih dahulu kemudian dihaluskan pada derajat kehalusan tertentu.⁴⁶

⁴¹Herlina *et al.*, eds., *Lemak Dan Minyak* (Sumatra: Jurusan Teknik Kimia Universitas Sumatra Utara, 2002), (19 Mei 2010).

⁴⁵*Ibid.*

⁴³J.B. Harbone, *Metode Fitokimia, Penuntun Cara Modern Menganalisa Tumbuhan*. Terj.K.Padmawinata. Eds. II (Bandung : ITB Press, 1987). h. 71.

Metode ekstraksi dipilih berdasarkan beberapa faktor seperti sifat dari bahan mentah, daya penyesuaian dengan tiap macam metode ekstraksi dan kepentingan dalam memperoleh ekstrak yang sempurna atau mendekati sempurna.⁴⁷

Beberapa metode ekstraksi dengan menggunakan pelarut yaitu⁴⁸ :

a. Cara Dingin

1) Maserasi

Maserasi adalah proses penyarian simplisia dengan cara perendaman menggunakan pelarut dengan sesekali pengadukan pada temperature kamar. Maserasi yang dilakukan dengan pengadukan secara terus menerus disebut maserasi kinetik sedangkan yang dilakukan pengulangan penambahan pelarut setelah dilakukan penyarian terhadap maserat pertama dan seterusnya disebut remaserasi.

2) Perkolasi

Perkolasi adalah proses penyarian simplisia dengan pelarut yang selalu baru sampai terjadi penyarian sempurna yang umumnya dilakukan pada temperatur kamar. Tahap perkolasi terdiri dari tahap pelembapan bahan, tahap perendaman antara, tahap perkolasi sebenarnya (penetesan/penampungan ekstrak) terus-menerus sampai diperoleh perkolat yang jumlahnya 1-5 kali bahan.

⁴⁷Novika Auris Endah Putri, “ Optimasi Pembuatan Ekstrak Daun Dewandaru (*Eugenia uniflora L*) Menggunakan Metode Soxhletasi Dengan Parameter Kadar Total Senyawa Fenolik Dan Flavanoid”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Farmasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008), h. 6.

⁴⁸ Departemen Kesehatan RI, *Farmakope Indonesia*. Edisi: III (Jakarta : DepKes RI, 1979) h. 29.

3) Cara Panas

a) Refluks

Refluks adalah proses penyarian simplisia dengan menggunakan alat pada temperatur titik didihnya, selama waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas yang relative konstan dengan adanya pendingin balik.

b) Digesti

Digesti adalah proses penyarian dengan pengadukan kontinu pada temperatur lebih tinggi dari temperatur ruangan, yaitu secara umum dilakukan pada temperatur 40 -50°C.

c) Sokletasi

Sokletasi adalah proses penyarian dengan menggunakan pelarut yang murni, dilakukan menggunakan alat soklet sehingga terjadi ekstraksi kontinu dengan pelarut relatif konstan dengan adanya pendingin balik.

d) Infundasi

Infundasi adalah proses penyarian dengan menggunakan pelarut air pada temperatur 90°C selama 15 menit.

e) Dekoktasi

Dekoktasi adalah proses penyarian dengan menggunakan pelarut air pada temperature 90°C selama 30 menit.

3. Spektrofotometri

Spektrofotometri merupakan suatu metode analisa yang didasarkan pada pengukuran serapan sinar monokromatis oleh suatu lajur larutan berwarna pada panjang gelombang spesifik dengan menggunakan monokromator prisma atau kisi difraksi dengan detektor *phototube*. Spektrofotometri dapat dianggap sebagai perluasan suatu pemeriksaan visual dengan studi yang lebih mendalam dari absorbs energi. Absorpsi radiasi oleh suatu sampel diukur pada berbagai panjang gelombang dan dialirkan oleh suatu perekam untuk menghasilkan spectrum tertentu yang khas untuk komponen yang berbeda.⁴⁹

a. Pemilihan panjang gelombang

Pelbagai satuan digunakan untuk panjang gelombang, bergantung pada daerah spektrum, untuk radiasi UV dan Vis digunakan satuan Angstrom dan nanometer dengan meluas. Sedangkan micrometer merupakan satuan yang lazim untuk daerah IR. Benda bersahaya seperti matahari atau bohlam listrik memancarkan spectrum yang lebar terdiri atas panjang gelombang. Panjang gelombang yang dikaitkan dengan cahaya tampak itu mampu mempengaruhi selaput pelangi mata manusia dan karenanya menimbulkan kesan subyektif akan ketampakan (*vision*). Namun, banyak radiasi yang dipancarkan oleh benda panas terletak di luar daerah di mana mata itu peka, mengenai daerah UV dan inframerah dari spectrum yang terletak di kiri dan kanan daerah tampak. Dalam analisis secara spektrofotometri terdapat tiga daerah panjang gelombang elektromagnetik yang digunakan yaitu:

⁴⁹ Hendayana, *Kimia Analitik Instrument*, Edisi I (Semarang : IKIP Semarang Press, 1994)


Daerah UV; $\lambda = 200-380 \text{ nm}$

Daerah Visible (tampak); $\lambda = 380 - 700 \text{ nm}$

Daerah inframerah (IR); $\lambda = 700 - 0,3 \mu$

b. Aspek kuantitatif absorpsi

Spektra serapan dapat diperoleh dengan menggunakan sampel dalam pelbagai bentuk gas, lapisan tipis cairan, larutan dalam pelbagai pelarut dan bahkan zat padat. Kebanyakan analisis melibatkan larutan, dengan cara mengembangkan pemeriksaan kuantitatif dari hubungan antara konsentrasi suatu larutan dan kemampuannya menyerap radiasi. Prinsip kerja spektrofotometri berdasarkan hukum Lambert Beer, bila cahaya monokromatik (I_0) melalui suatu metode (larutan), maka sebagian cahaya tersebut diserap (I_a), sebagian dipantulkan (I_r), dan sebagian lagi dipancarkan (I_t). Ilustrasi jalannya sinar pada spektrofotometer dapat di lihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2.5. Ilustrasi jalannya sinar spektrofotometri

Keterangan gambar :

I_0 = cahaya monokromatik

I_r = cahaya yang dipantulkan

I_t = cahaya yang dipancarkan

I_a = cahaya yang diserap

$$I_o = I_a + I_r + I_t$$

Besarnya I_a oleh media tergantung pada kepekatandan jenis media serta panjang media yang dilalui. Biasanya panjang media sudah tetap dalam suatu alat.

c. Spektrofotometer UV-Vis

Spektrofotometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur absorbansi dengan cara melewatkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu pada suatu obyek kaca atau kuarsa yang disebut kuvet. Sebagian dari cahaya tersebut akan diserap dan sisanya akan dilewatkan. Nilai absorbansi dari cahaya yang dilewatkan akan sebanding dengan konsentrasi larutan di dalam kuvet.⁵⁰

Spektrofotometer merupakan gabungan dari alat optik dan elektronika serta sifat-sifat kimia fisiknya dimana detector yang digunakan secara langsung dapat mengukur intensitas dari cahaya yang dipancarkan (I_t) dan secara tidak langsung cahaya yang diabsorpsi (I_a), jadi tergantung pada spectrum elektromagnetikl yang diabsorbs oleh benda. Tiap media akan menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu tergantung pada senyawa atau warna terbentuk.

Secara garis besar spektrofotometer terdiri dari 4 bagian penting yaitu:

1) Sumber cahaya

Sebagai sumber cahaya pada spektrofotometer, haruslah memiliki pancaran radiasi yang stabil dan intensitasnya tinggi. Sumber energy cahaya yang biasa digunakan untuk daerah tampak, Ultraviolet dan inframerah adalah sebuah lampu

⁵⁰Ida Musfiroh, *loc. cit.*

pijar dengan kawat rambut terbuat dari wolfram(tungstat). Lampu ini mirip dengan lampu pijar biasa, daerah panjang gelombang (λ) adalah 350 – 2200 nanometer (nm).

Dibawah kira-kira 350 nm, keluaran lampu wolfram tidak memadai untuk spektrofotometer dan harus digunakan sumber yang berbeda. Paling lazim adalah lampu tabung tidak bermuatan (disca) hydrogen (atau deuterium) 175 sampai 375 atau 400 nm. Lampu hydrogen atau lampu deuterium digunakan untuk sumber pada daerah ultraviolet (UV). Keuntungan lampu wolfram adalah energy radiasi yang dibebaskan tidak bervariasi pada berbagai panjang gelombang. Sumber cahaya untuk spektrofotometer inframerah sekitar 2 sampai 15 μm menggunakan pemijar Nernst (Nernst glower).

2) Monokromator

Monokromator adalah alat yang berfungsi untuk menguraikan cahaya polikromatis menjadi beberapa komponen panjang gelombang tertentu (monokromatis) yang berbeda (terdispersi). Ada dua macam monokromator yaitu prisma dan grating (kisi difraksi). Keuntungan menggunakan kisi difraksi yaitu dispersi sinar merata, dispersi lebih baik dengan ukuran pendispersi yang sama, dapat digunakan dalam seluruh jangkauan spectrum.

Cahaya monokromatis ini dapat dipilih panjang gelombang tertentu yang sesuai untuk kemudian dilewatkan melalui celah sempit yang disebut slit. Ketelitian dari monokromator dipengaruhi juga oleh lebar celah (slit width) yang dipakai.

3) Kuvet

Kuvet spektrofotometer adalah suatu alat yang digunakan sebagai tempat contoh atau cuplikan yang akan dianalisis. Kuvet harus memenuhi syarat- syarat sebagai berikut:

- a) Tidak berwarna sehingga dapat mentransmisikan semua cahaya
- b) Permukaannya secara optis harus benar- benar sejajar
- c) Harus tahan (tidak bereaksi) terhadap bahan- bahan kimia.
- d) Tidak boleh rapuh.
- e) Mempunyai bentuk (design) yang sederhana.

Kuvet biasanya terbuat dari kwarsa, plexiglass, kaca, plastic dengan bentuk tabung empat persegi panjang 1x1 cm dan tinggi 5 cm. Pada pengukuran didaerah UV dipakai cuvet kwarsa atau plexiglass, sedangkan kuvet dari kaca tidak dapat dipakai sebab kaca mengabsorpsi sinar UV. Semua macam kuvet dapat dipakai untuk pengukuran didaerah sinar tampak (visible)

4) Detektor

Peranan detector penerima adalah memberikan respon terhadap cahaya pada berbagai panjang gelombang. Detektor akan mengubah cahaya menjadi sinyal listrik yang selanjutnya akan ditampilkan oleh penampil data dalam bentuk jarum penunjuk atau angka digital. Syarat- syarat sebuah detektor yang ideal yaitu kepekaan yang tinggi, respon konstan pada berbagai panjang gelombang, waktu respon cepat dan

signal minimum tanpa radiasi, signal listrik yang dihasilkan harus sebanding dengan tenaga radiasi.

Sebagai detektor untuk spektrofotometer UV-Vis biasanya digunakan Photo Tube, Barrier Layer Cell, Photo Multiplier Tube. Arus listrik yang dihasilkan oleh detector kemudian diperkuat dengan amplifier dan akhirnya diukur oleh indikator biasanya berupa rekorder analog atau komputer.

d. Jenis Spektrofotometer

Spektrofotometer dibagi menjadi dua jenis, yaitu spektrofotometer *single-beam* dan spektrofotometer *double-beam*. Perbedaan kedua jenis spektrofotometer tersebut hanya pada pemberian cahaya, dimana pada *single-beam*, cahaya hanya melewati satu arah sehingga nilai yang diperoleh hanya nilai absorbansi dari larutan yang dimasukkan. Berbeda dengan *single-beam*, pada spektrofotometer *double-beam*, nilai blanko dapat langsung diukur bersamaan dengan larutan yang diinginkan dalam satu kali proses yang sama. Prinsipnya adalah dengan adanya *chopper* yang akan membagi sinar menjadi dua, dimana salah satu melewati blanko (disebut juga *reference beam*) dan yang lainnya melewati larutan (disebut juga *sample beam*). Dari kedua jenis spektrofotometer tersebut, spektrofotometer *double-beam* memiliki keunggulan lebih dibanding *single-beam*, karena nilai absorbansi larutannya telah mengalami pengurangan terhadap nilai absorbansi blanko. Selain itu, pada *single-*

beam, ditemukan juga beberapa kelemahan seperti perubahan intensitas cahaya akibat fluktuasi voltase.⁵¹

4. Sokletasi

Metode ekstraksi menggunakan alat soklet merupakan penyarian secara berkesinambungan dengan menggunakan pelarut yang murni. Keuntungan metode ini yaitu cairan penyari yang diperlukan lebih sedikit, secara langsung diperoleh hasil yang lebih pekat, serbuk simplisia disari oleh cairan penyari yang murni, penyarian dapat diteruskan sesuai dengan keperluan tanpa menambah volume cairan penyari. Namun kerugian dari metode ini yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mengekstraksi cukup lama sampai beberapa jam sehingga kebutuhan energinya (listrik, gas) tinggi, cairan penyari dipanaskan terus menerus sehingga kurang cocok untuk zat aktif yang tidak tahan panas, cairan yang digunakan harus murni.⁵²

Pemilihan cairan penyari harus mempertimbangkan banyak faktor. Cairan penyari yang baik harus memenuhi criteria antara lain, murah dan mudah diperoleh, stabil secara fisika dan kimia, bereaksi netral, tidak mudah menguap dan tidak mudah terbakar, selektif yaitu hanya menarik zat berkhasiat yang dikehendaki, tidak mempengaruhi zat berkhasiat, serta diperbolehkan oleh peraturan.

Cara sokletasi, padatan yang akan diekstraksi dibungkus dalam suatu wadah khusus yang disebut thimble yang terbuat dari kertas saring tebal. Thimble ditempatkan dalam alat, dan sokletasi ekstraktor ditempatkan diatas labu bulat yang

⁵¹Nurlaela Abd. Kadir, Nurhayati Bialangi dan Netty Ischak, *op. cit.*, h.10.

⁵²*Ibid*

berisi pelarut organik. Sebuah kondensor refluks ditempatkan pada puncak atas ekstraktor soxhlet. Labu dipanaskan dengan penangas air atau penangas uap atau dengan beberapa bentuk pemanas listrik, sehingga pelarut mendidih. Uap pelarut naik ke atas melewati pipa luar berdiameter besar, dan pelarut yang terkondensasi kemudian jatuh ke bawah memenuhi thimble yang berisi padatan. Zat-zat akan terekstraksi keluar dari padatan ke dalam pelarut panas. Jika tinggi larutan telah mencapai puncak pipa *shipon*, larutan mengalir secara otomatis turun ke bawah labu dimana zat-zata yang terekstraksi terakumulasi. Proses ini efisien karena sekumpulan pelarut yang sama berulang-ulang melalui padatan tersebut. Jika ekstraksi dilakukan dalam waktu yang panjang maka memungkinkan mengekstraksi zat-zat sampai sangat sedikit zat-zat lagi yang larut dalam pelarut organik. Teknik ini seringkali digunakan untuk mengekstraksi bahan alam dari bahan-bahan seperti dedaunan atau kecambah.⁵³

⁵³Firdaus Zenta dan H.A.S. Kumanireng, *Teknik Laboratorium Kimia Organik* (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2000), h.39.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Variabel Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dilakukan di Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) Makassar yang bertujuan untuk menentukan kadar protein dan lemak pada terung kopek ungu dan terung kopek hijau dengan menggunakan metode spektrofotometri dan soxhletasi.

B. Definisi Operasional Variabel

Terung kopek memiliki bentuk buah bulat panjang, bagian ujungnya tumpul, lurus, berwarna ungu, hijau keunguan, atau hijau muda. Rasanya agak manis dan tekstur daging buahnya lunak.

Varietas terung kopek terdiri dari dua jenis, jenis terung kopek ungu dan terung kopek hijau. Terung jenis ini sangat banyak dikonsumsi oleh masyarakat.

Kadar protein adalah jumlah protein dalam buah terung dengan menggunakan metode spektrofotometri.

Kadar lemak adalah jumlah lemak dalam buah terung dengan menggunakan metode soxhletasi.

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian dilakukan pada bulan April 2010 hingga bulan Oktober 2010 bertempat di Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) Makassar dengan menggunakan sampel terung kopek ungu dan terung kopek hijau yang berasal dari desa Kaloling Kecamatan Gantarangeke Kabupaten Bantaeng.

D. Alat Penelitian

1. Analisis protein
 - a. Spektrofotometer UV-Vis
 - b. Neraca analitik
 - c. Alat- alat Gelas
 - d. Sentrifuge
2. Analisis Lemak
 - a. Soklet
 - b. Desikator
 - c. Oven
 - d. Neraca Analitik
 - e. Penangas Listrik

E. Bahan Penelitian

1. Analisis Protein
 - a. Sampel Terung
 - b. Larutan Bovin Serum Albumin (BSA) 250 $\mu\text{g/mL}$

- c. Reagen Lowry A dan B
 - d. Buffer Asam Asetat
 - e. Aquades
2. Analisis Lemak
- a. Sampel Terung
 - b. Pelarut n-Heksan
 - c. Aquades

F. Prosedur Penelitian

1. Analisis Kadar Protein
1. Penyiapan kurva standar protein
1. Masukkan ke dalam tabung reaksi 0 (blanko), 0,1 ; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 dan 1 ml BSA sehingga diperoleh konsentrasi masing-masing 6,25 μ g/mL, 12,5 μ g/mL, 25 μ g/mL, 37,5 μ g/mL, 50 μ g/mL dan 62,5 μ g/mL. Kemudian ditambahkan air hingga volume total masing-masing 4 mL.
 2. Kedalam tabung reaksi masing-masing ditambahkan 5,5 mL reagen Lowry B kemudian dihomogenkan dan didiamkan selama 10-15 menit pada suhu kamar.
 3. Kemudian ditambahkan 0,5 ml pereaksi reagen Lowry A ke dalam masing-masing tabung reaksi. Dihomogenkan dengan cepat setelah penambahan.
 4. Biarkan selama \pm 30 menit hingga terbentuk warna biru

5. Larutan kemudian dimasukkan ke dalam Kuvet dan dilakukan pembacaan pada Spektrofotometer UV-Vis untuk mencari panjang gelombang maksimum.
 6. Dibuat kurva standar.
2. Penyiapan sampel untuk penetapan protein
1. Menimbang sebanyak 50 gr sampel terung, kemudian dihaluskan dengan menambahkan 40 ml aquades dan disaring ekstraknya.
 2. Protein yang mengendap dipisahkan dengan sentrifuge 11.000 rpm selama 10 menit. Dipisahkan supernatannya.
 3. Presipitat yang merupakan protein kemudian perlu dilarutkan kembali dengan buffer asam asetat pH 5,0 hingga mencapai volume 10 ml.
 4. Kemudian diambil 4 ml dari protein sampel dan dilakukan prosedur seperti pada perlakuan penyiapan kurva standar mulai dari penambahan reagen lowry B dan seterusnya.
 5. Kemudian ditentukan kadar protein dari absorban yang didapat dari larutan sampel dengan menggunakan kurva standar di atas. Tidak lupa memperhitungkan pengenceran sampel yang telah dilakukan.
2. Analisis Lemak
- a. Sampel terung kepek ditimbang sebanyak 10 gr, kemudian dihaluskan
 - b. Sampel yang telah halus kemudian dimasukkan ke thimble.

- c. Memasukkan labu dasar bulat yang telah bersih kedalam oven, lalu ditimbang sebagai bobot kosong.
- d. Thimble dimasukkan kedalam soklet dan ditambahkan pelarut n-Heksan 150 mL melewati soklet.
- e. Labu dasar bulat dan soklet dihubungkan dengan penangas dan diekstrak selama 6 sirkulasi.
- f. Setelah ekstraksi selesai, labu dasar bulat dan hasil ekstrak dievaporasi untuk menghilangkan pelarut.
- g. Selanjutnya labu dasar bulat yang berisi lemak hasil ekstrak dimasukkan ke dalam oven pada suhu 105°C selama 1 jam.
- h. Setelah dingin, ditimbang sebagai bobot akhir (bobot labu dasar bulat dan lemak).

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Hasil analisis kadar protein

Berdasarkan hasil pengukuran larutan sampel untuk penetapan kadar protein pada sampel terung kopek ungu dan terung kopek hijau yang tumbuh di Desa Kaloling Kecamatan Gantarangeke Kabupaten Bantaeng dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 600 nm dan dianalisis di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar diperoleh data sebagai berikut.

Tabel 4.1. Hasil analisis larutan sampel pada 50 gr terung kopek untuk penetapan kadar protein.

Sampel	Absorbansi			Rata-rata absorbansi	Konsentrasi sampel (ppm)	Kadar protein (gr)
	I	II	III			
Terung kopek ungu	0,386	0,382	0,377	0,382	40,403	0,0323
Terung kopek hijau	0,414	0,411	0,421	0,415	46,975	0,0375

Larutan sampel untuk penetapan kadar protein yang terdapat pada tabel 4.1 terdiri dari dua sampel terung kopek yaitu terung kopek ungu dan terung kopek hijau dengan perlakuan tiga kali pengulangan atau triplo.

2. Hasil analisis kadar lemak

Hasil penetapan kadar lemak pada 10 gr terung kopek ungu dan terung kopek hijau yang tumbuh di desa Kaloling kecamatan Gantarangeke kabupaten Bantaeng dengan metode sokletasi yang dianalisis di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar dapat dilihat pada table 4.2.

Tabel 4.2. Hasil penetapan kadar lemak pada 10 gr terung kopek ungu dan hijau

Sampel	W (gr)	W ₂ (gr)	W ₁ (gr)	Kadar lemak (%)	Rata-rata kadar lemak (%)
Terung kopek ungu	10,0311	94,9501	94,9311	0,1894	0,1794
		94,9440	94,9265	0,1744	
		94,9435	94,9260	0,1744	
Terung kopek hijau	10,0215	94,9481	94,9315	0,1656	0,1612
		94,9468	94,9308	0,1596	
		94,9463	94,9304	0,1586	

Sampel untuk penetapan kadar lemak pada tabel 4.2 terdiri dari dua sampel terung kopek. Yaitu terung kopek ungu dan terung kopek hijau yang tumbuh di desa Kaloling Kecamatan Gantarangeke Kabupaten Bantaeng dengan perlakuan tiga kali pengulangan atau triplo.

B. Pembahasan

1. Penetapan kadar protein pada sampel terung kopek ungu dan hijau

Pada penelitian ini, digunakan presipitat sampel yang diperoleh dari hasil sentrifuge 40 mL ekstrak sampel terung. Presipitat kemudian ditambahkan 10 mL buffer asetat. Adapun fungsi penambahan larutan buffer yaitu sebagai larutan penyangga untuk mempertahankan pH larutan sampel agar tetap dalam suasana asam pada saat dianalisis. Kemudian memipet 4 mL larutan dan dilanjutkan dengan penambahan 5,5 mL reagen Lowry B. Setelah didiamkan selama 10 menit pada suhu kamar larutan sampel kemudian ditambahkan dengan 0,5 mL reagen Lowry A. Warna yang terbentuk diawal penambahan yaitu berwarna kuning sebagaimana warna reagen Lowry A. Setelah didiamkan selama 30 menit pada suhu kamar warna larutan sampel berubah menjadi biru.

Warna biru ini terbentuk akibat reaksi antara Cu^{2+} dengan ikatan peptida dan reduksi asam fosfomolibdat dan asam fosfotungstat oleh tirosin dan triptofan (merupakan residu protein) Warna yang terbentuk terutama dari hasil reduksi asam fosfomolibdat dan asam fosfotungstat. Oleh karena itu, warna yang terbentuk tergantung pada kadar tirosin dan triptofan dalam protein.⁵⁴

⁵⁴Anang M Legowo, Nurwantoro, dan Sutaryo, *Analisis Pangan* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005), h. 31.

Kadar protein pada setiap bahan berbeda-beda. Oleh karena itu, pengukuran kadar protein suatu bahan sangat diperlukan. Untuk dapat menghitung kadar protein, maka diperlukan spektrofotometer dengan cara penembakan sampel. Pada penelitian ini, penetapan kadar protein dilakukan pada dua sampel terung kopek yaitu terung kopek ungu dan terung kopek hijau. Penetapan kadar protein ini dilakukan dengan metode spektrofotometri (Lowry) yaitu menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 600 nm.

Pengukuran kadar protein dengan menggunakan Spektrofotometer UV-Vis pada dasarnya menggunakan metode Lowry. Kurva yang menunjukkan standar merupakan kurva kalibrasi dari sederet larutan standar. Larutan itu sebaiknya mempunyai komposisi yang sama dengan komposisi cuplikan. Jarang sekali digunakan satu larutan pada literatur absorsivitas molar. Protein dengan garam fosfotungstat pada suasana alkalis akan memberikan warna biru yang intensitasnya tergantung pada konsentrasi protein yang tertera. Konsenttrasi protein diukur berdasarkan atas Optical Dencity (OD) atau absorbans pada panjang gelombang tertentu untuk mengetahui banyaknya protein dalam larutan.⁵⁵

Berdasarkan hasil analisis, kadar protein pada 50 gr sampel terung kopek ungu sebesar 0,0323 gr. Dan pada 50 gr sampel terung kopek hijau kadar protein yang diperoleh yaitu sebesar 0,0375 gr. Dari hasil yang diperoleh, maka dapat di simpulkan bahwa kandungan protein pada terung kopek hijau lebih besar

⁵⁵Hendayana, *Kimia Analitik Instrument* Edisi I (Semarang : IKIP Semarang Press, 1994) h. 56.

dibandingkan terung kopek ungu. Perbedaan ini disebabkan karena kondisi buah terung kopek hijau yang masih segar dibandingkan terung kopek ungu yang disebabkan oleh faktor lama penyimpanan. Namun perbedaan kadar protein pada kedua sampel terung kopek ini tidak signifikan. Karena kedua jenis terung ini masih dalam satu varietas yaitu terung kopek. Hanya bentuk fisik yaitu warna dari varietas terung kopek ini yang membedakan keduanya. Kadar protein yang diperoleh berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan tidak sesuai dengan standar yang tercantum dalam DKBM yaitu kadar protein pada terung dalam 100 gr sebesar 1,4 – 2 gr.⁵⁶ Hal ini disebabkan karena, standar yang tercantun pada DKBM yang telah disebutkan sebelumnya merupakan standar kandungan gizi tanaman terung secara umum tanpa ada spesifikasi jenis terung dan metode yang digunakan dalam penetapannya.

2. Kadar lemak pada sampel terung kopek ungu dan terung kopek hijau.


Lemak merupakan salah satu kelompok senyawa organik yang terdapat dalam tumbuhan, hewan atau manusia. Lemak dapat diperoleh dari makanan yang berasal dari hewan atau tumbuhan. Lemak jarang disimpan di dalam daun, batang dan akar tetapi banyak dalam biji dan beberapa buah.

Lemak hewan pada umumnya berupa zat padat pada suhu ruangan, sedangkan lemak yang berasal dari tumbuhan berupa zat cair. Lemak yang mempunyai titik lebur tinggi mengandung asam lemak jenuh, sedangkan lemak cair atau yang biasa

³Data Kandungan Gizi Bahan Makanan, “Kandungan Gizi Buah Terung” <http://www.indonesia.com/sripo/2003/06/22/2206bog1.htm> (19 Mei 2010).

disebut minyak mengandung asam lemak tidak jenuh. Sebagai contoh tristearin, yaitu ester gliserol dengan tiga molekul asam stearat, mempunyai titik lebur 71°C , sedangkan triolein yaitu ester gliserol dengan tiga molekul asam oleat, mempunyai susunan asam lemak yang berbeda-beda. Seperti halnya lipid pada umumnya, lemak atau gliserida asam lemak pendek dapat larut dalam air, sedangkan gliserida asam lemak panjang tidak larut. Semua gliserida larut dalam ester, kloroform atau benzene. Alkohol panas adalah pelarut lemak yang baik.

Asam lemak adalah asam organik yang terdapat sebagai ester trigliserida atau lemak., baik yang berasal dari hewan atau tumbuhan. Asam ini adalah asam karboksilat yang mempunyai rantai karbon panjang dengan rumus umum :



dimana R adalah rantai karbon yang jenuh atau tidak jenuh dan terdiri atas 4 sampai 24 buah atom karbon. Rantai karbon yang jenuh ialah rantai karbon yang tidak mengandung ikatan rangkap, sedangkan yang mengandung ikatan rangkap disebut rantai karbon tidak jenuh. Pada umumnya asam lemak mempunyai jumlah atom karbon genap. Asam lemak jenuh yang mempunyai rantai karbon pendek, yaitu asam butirrat dan kaproat mempunyai titik lebur yang rendah. Ini berarti bahwa kedua asam tersebut berupa zat cair pada suhu kamar. Makin panjang rantai karbon, makin tinggi titik leburnya. Apabila dibandingkan dengan asam lemak jenuh, asam lemak tidak

jenuh mempunyai titik lebur lebih rendah. Selain itu, makin banyak jumlah ikatan rangkap, makin rendah titik leburnya. Kelarutan asam lemak dalam air berkurang dengan bertambah panjangnya rantai karbon. Umumnya asam lemak larut dalam eter atau alkohol panas. Asam lemak adalah asam lemah. Apabila dapat larut dalam air molekul asam lemak akan terionisasi sebagian dan melepaskan ion H^+ .⁵⁷

Penetapan kadar lemak pada sampel terung kopek ungu dan hijau ini menggunakan metode sokletasi dengan menggunakan pelarut n-Heksan. Pada prinsipnya, metode sokletasi merupakan penyarian secara berkesinambungan dengan menggunakan pelarut yang murni. Pemilihan cairan penyari harus mempertimbangkan banyak faktor. Bahan-bahan dan senyawa kimia mudah larut dalam bahan pelarut yang sama polaritasnya dengan bahan pelarut yang akan dilarutkan. Zat ekstraktif adalah senyawa organik yang telah mengalami dekomposisi dan bukan merupakan bagian struktural dinding sel dan termasuk komponen mikromolekul dalam tumbuhan. Sifat dari zat ekstraktif ini adalah mudah larut dalam pelarut netral atau pelarut organik. Pelarut n-heksan merupakan golongan pelarut netral sama seperti air dan aseton.

Pada penelitian ini, ditimbang sebanyak 10 gr masing-masing sampel terung kopek ungu dan terung kopek hijau yang dimasukkan ke dalam thimble yang dimasukkan kedalam rangkaian alat soklet dan dilanjutkan dengan mengalir 150 ml pelarut n-Heksan. Dari hasil analisis diperoleh kadar lemak pada sampel terung kopek

⁵⁷Anna Poedjiadi dan F.M. Titin Supriyanti, *Dasar-dasar Biokimia* (Jakarta : UI-Press, 1994) h, 109.

ungu sebesar 0,1794 % dan pada sampel terung kopek hijau sebesar 0,1612%. Dari hasil yang diperoleh dapat diketahui bahwa kadar lemak pada terung kopek ungu sedikit lebih besar dibandingkan pada sampel terung kopek hijau. Hal ini disebabkan karena sampel terung kopek ungu lebih banyak terdapat biji dibandingkan sampel terung kopek hijau. Menurut teori yang telah disebutkan sebelumnya bahwa lemak pada tumbuhan lebih banyak tersimpan pada biji dan buahnya. Dari hasil penetapan kadar lemak ini dapat diketahui pula bahwa hasil yang diperoleh memenuhi standar yang tercantum dalam Data Komposisi Bahan Makanan (DKBM) yaitu 1,1 gr dalam 100 gr sampel.⁵⁸

Titik leleh dan sifat-sifat lain lemak ditentukan oleh macam asam lemak yang dikandungnya. Lemak yang berasal dari produk hewani umumnya mengandung sejumlah besar asam lemak jenuh. Sebaliknya produk nabati, kecuali minyak kelapa, mengandung sejumlah besar asam lemak tidak jenuh berantai panjang. Untuk menghindari kadar kolesterol yang tinggi, dianjurkan mengganti sumber lemak jenuh dengan sumber lemak tidak jenuh dengan cara sering mengkonsumsi sayur-sayuran.

⁵Data Kandungan Gizi Bahan Makanan, “ Kandungan Gizi Buah Terung” <http://www.indonesia.com/sripo/2003/06/22/2206bog1.htm> (19 Mei 2010).

BAB V

PENUTUP

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam 50 gr sampel terung kopek ungu mengandung protein sebesar 0,0323 gr. Dan pada 50 gr sampel terung kopek hijau mengandung protein sebesar 0,0375 gr.
2. Dapat pula disimpulkan bahwa kadar lemak pada 10 gr sampel terung kopek ungu sebesar 0,1794% atau sebesar 1,794% dalam 100 gr dan pada 10 gr sampel terung kopek hijau memiliki kadar lemak sebesar 0,1612% atau sebesar 1,612% dalam 100 gr sampel.

Berdasarkan hasil penelitian, terung kopek sangat baik dikonsumsi karena mengandung protein yang cukup untuk pertumbuhan dan memperbaiki jaringan tubuh yang rusak dan lemak yang mengandung asam lemak tidak jenuh dan sesuai dengan standar dalam Daftar Kandungan gizi Bahan Makanan (DKBM) tentang kandungan gizi 100 gr buah terung.

D. *Saran*

Untuk mengetahui lebih jauh tentang kadar protein dan lemak pada tanaman terung serta sebagai bahan pembandingan, sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan varietas terung yang berbeda dan dengan perlakuan atau metode yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- AGRO Business &Community pri/bbs, “Budidaya Terong Belanda, Berbuah lebat mudah patah” AGRO Business&Community ed 010/Th II0September/ 2007 (19 Mei 2010).
- Andang, Gunawan. *Kombinasi Makanan Serasi*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Auris Endah Putri, Novika. “Optimasi Pembuatan Ekstrak Daun Dewandaru (*eugenia uniflora* L.) Menggunakan Metode Soxhletasi Dengan Parameter Kadar Total Senyawa Fenolik dan Flavonoid”, Skripsi Sarjana, Fakultas Farmasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008.
- Batubara, Ulfa Nazmi. “Analisis Protein, Kalsium dan Lemak Pada Ikan Pora-pora”, Skripsi Sarjana, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sumatra Utara, 2009.
- Danuwarsa. “ Analisis Proksimat dan Asam Lemak Pada Beberapa Komoditas Kacang-kacangan”, *Buletin Teknik Pertanian vol. II No. 1.* (19 Mei 2010).
- Departemen Agama R.I., *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Syaamil Al-Qur’an).
- Departemen Gizi dan Kesehatan Masyarakat FKM UI,. *Gizi dan Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Departemen Kesehatan dan Kesehatan Sosial RI. *Inventaris Tanaman Obat Indonesia*. Cet. I Jilid II; Jakarta : Badan Peneliti dan Pengembangan Kesehatan, 2001.
- DKBM, “Kandungan Gizi Buah Terung” <http://www.indomedia.com/sripo /2003/06/22/2206bog1.htm> (19 Mei 2010).
- Fessenden& Fessenden, *Kimia Organik* Edisi 3 Jilid 2, Jakarta : Erlangga, 1986.
- Fithrotul Millah, Sukei. “Produksi Abon Ikan Pari (*Rayfish*): Penentuan Kualitas Gizi Abon”, Prosiding Shripsi Sarjana, Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan, Alam Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2009.
- Hamid A.Toha, Abdul. *Biokimia Metabolisme Biomolekul*. Bandung : Alfabeta, 2005.
- Harbone, J.B. *Metode Fitokimia, Penuntun Cara Modern Menganalisa Tumbuhan*. Terj. K. Padmawinata. Edisi II; Bandung : ITB press, 1987.
- Herlina *et al., eds., Lemak Dan Minyak*. Sumatra: Jurusan Teknik Kimia Universitas Sumatra Utara, 2002.
- Junaidi, Wawan. “Metabolisme Lemak”, *Blog Wawan*, <http://wawan-junaidi.blogspot.com/2009/07/metabolisme-lemak.html> (19 Mei 2010).
- Kumalaningsih S, Suprayogi. *Tamarillo(Terung Belanda)*, Surabaya : Trubus Agrisarana, 2006.


- Lehninger, AL. 1982. *Dasar-Dasar Biokimia Jilid I*. Maggy Thenawijaya, penerjemah. Jakarta: Erlangga. Terjemahan dari: Principles of Biochemistry. Pramars. 2008. Test for cholesterol. (19 Juni 2010).
- M Legowo, Anang, Nurwantoro, dan Sutaryo. *Analisis Pangan* . Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005.
- Musfiroh, Ida. “Analisis Proksimat dan Penetapan Kadar β - Karoten dalam Selai Lembaran Terung Belanda (*Cyphomandra betacea* Sendtn.) Dengan Metode Spektrofotometri Sinar Tampak.” Skripsi Sarjana, Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran, Padjadjaran, 2002.
- Nugraha, Arie. “Terong Belanda Terung Kori”, *Blog Arie*. <http://arienugraha.wordpress.com/2008/05/06/terung-belanda-terung-kori/> (19 Mei 2010).
- Poedjadi, Anna. *Dasar-dasar Biokimia*. Cetakan Pertama; Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1994.
- Rivai, H. *Asas Pemeriksaan Kimia*. Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1995.
- Sasmitamihardja, Darjat dan Siregar, Arbayah. *Fisiologi Tumbuhan*. Bandung : ITB-Departemen Pendidikan dan kebudayaan, 1996
- Sediatama. *Gizi*, Jakarta: Dian Rakyat, 1987.
- Sudarmadji, Slamet, Haryono, Bambang dan Suhardi. *Prosedur Analisa Untuk Bahan Makanan dan Pertanian*. Yogyakarta: Liberty, 1997.
- Sutomo, Budi. “Terong Terbukti Mampu Mendongkrak”, *Blog Budi*.<http://budiboga.blogspot.com/2006/05/terong-terbukti-mampu-mendongkrak.html> (19 Mei 2010).
- Triantoro, Koko. “Pembuatan Manisan Berbahan Dasar Terung Sebagai Makanan Khas Prodi IPA”. Proposal Penelitian Prodi IPA Universitas Negeri Yogyakarta 2008, Yogyakarta, 2008.
- Winarno, F. G. *Kimia Pangan dan Gizi*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Zenta, Firdaus dan H.A.S. Kumanireng. *Teknik Laboratorium Kimia Organik*. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2000.
- Zulfikar. *Kimia Kesehatan* . Jakarta: Departemen Pendidikan, 2008.

Lampiran 1:


Skema Kerja

1. Analisis Kadar Protein


a. Penyiapan kurva standar protein



b. Penyiapan Sampel



2. Analisa Kadar Lemak



Lampiran 2 :

Pembuatan pereaksi

1. Reagen Lowry B

Mencampurkan 100 mL larutan 2% Na_2CO_3 dalam larutan NaOH 0,1 N dengan 1 mL $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 1% dan 1,0 mL Natrium-kalim-tartrat 2%.

2. Reagen Lowry A

Merupakan larutan asam phospho-tungstic-phospho-molybdic. Dengan pengenceran 1;1.

3. Standar Bovin Serum Albumin (BSA) 250 $\mu\text{g}/\text{mL}$

Memipet 2,5 mL larutan standar BSA 1000 $\mu\text{g}/\text{mL}$ dan melarutkan dalam labu takar 10 mL.

4. Larutan Buffer Asetat pH 5,0

Larutan A: 0,2 M larutan Asam Asetat (1,15 mL dalam 100 mL)

Larutan B: 0,2 M larutan Na-asetat (2,72 gr $\text{C}_2\text{H}_3\text{O}_2\text{Na} \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ dalam 100 mL)

Untuk pH 5,0 :

14,8 mL larutan A + 35,2 mL larutan B, mengencerkan sampai 100 mL.

Lampiran 3:

Hasil Penelitian

1. Penetapan kadar protein pada sampel terung kopek ungu dan terung kopek hijau


a. Larutan standar untuk penetapan kadar protein

Konsentrasi standar (ppm)	Absorbansi
0,0000	0,076
6,2500	0,156
12,500	0,202
25,000	0,290
37,500	0,371
50,000	0,437
62,500	0,526


b. Larutan sampel untuk penetapan kadar protein

Sampel	Absorbansi
Terung kopek ungu	0,386
	0,382
	0,377
Terung kopek hijau	0,414
	0,411
	0,421

c. Spektrum untuk panjang gelombang maksimum



d. Kurva standar untuk penetapan kadar protein




e. Hasil pengukuran untuk kadar protein sampel

Quantitation			600.0nm	0.382
Smpl No.	A B S	Conc. (ppm)		
1	0.414	46.75		
2	0.411	46.5		
3	0.421	47.5		
4	0.382	40.394		
5	0.377	39.546		

Smpl No.	DataFile	DataDisp	Equation
----------	----------	----------	----------

f. Kalibrasi kurva standar untuk penetapan kadar protein



2. Penetapan kadar lemak pada sampel terung kopek ungu dan terung kopek hijau

Sampel	W (gr)	W ₂ (gr)	W ₁ (gr)
Terung kopek ungu	10,0311	94,9501	94,9311
		94,9440	94,9265
		94,9435	94,9260
Terung kopek hijau	10,0215	94,9481	94,9315
		94,9468	94,9308
		94,9463	94,9304

Lampiran 4:

Perhitungan

1. Penetapan kadar protein

Untuk menentukan besarnya konsentrasi sampel, setelah dimasukkan data kurva standar maka diperoleh nilai

$$R^2 = 0,996 \quad b = 0,003 \quad a = 0,074$$

Dengan persamaan linear :

$$Y = 0,074x - 0,003$$

Maka kadar protein masing-masing sampel dapat ditentukan :

a. Sampel terung kopek ungu

Rata-rata absorbansi sampel 3 kali pengulangan pada tabel 4.1. untuk sampel terung kopek ungu adalah 0,382 dan diperoleh konsentrasi sampel sebesar 40,403 $\mu\text{g/mL}$.

Faktor pengenceran pada perlakuan adalah 10 kali, maka konsentrasi sampel harus dikalikan dengan faktor pengenceran

$$10 \times 40,403 \mu\text{g/mL} = 404,03 \mu\text{g/mL}$$

$$\text{Berat protein} = \text{Volume sampel} \times \text{Konsentrasi protein sampel}$$

$$= 40 \text{ mL} \times 404,03 \text{ } \mu\text{g/mL}$$

$$= 16161,2 \text{ } \mu\text{g} = 0,0161612 \text{ gr}$$

$$\text{Kadar protein} = \frac{\text{Berat protein}}{\text{Berat sampel}} \times 100\%$$

$$= \frac{0,0161612 \text{ gr}}{50 \text{ gr}} \times 100\%$$

$$= 0,0323 \text{ \% dalam } 50 \text{ gr.}$$

b. Sampel terung kopek hijau

Rata-rata absorbansi sampel 3 kali pengulangan pada tabel 4.1. untuk sampel terung kopek hijau adalah 0,415 dan diperoleh konsentrasi sampel sebesar 46,975 $\mu\text{g/mL}$.

Faktor pengenceran pada perlakuan adalah 10 kali, maka konsentrasi sampel harus dikalikan dengan faktor pengenceran

$$10 \times 46,975 \mu\text{g/mL} = 469,75 \text{ } \mu\text{g/mL}$$

$$\text{Berat protein} = \text{Volume sampel} \times \text{konsentrasi protein sampel}$$

$$= 40 \text{ mL} \times 469,75 \text{ } \mu\text{g/mL}$$

$$= 18790 \text{ } \mu\text{g} = 0,01879 \text{ gr}$$

$$\text{Kadar protein} = \frac{\text{Berat protein}}{\text{Berat sampel}} \times 100\%$$

$$= \frac{0,01879 \text{ gr}}{50 \text{ gr}} \times 100\%$$

$$= 0,0375 \% \text{ dalam } 50 \text{ gr}$$

2. Penetapan kadar lemak

$$\text{Kadar lemak} = \frac{W_2 - W_1}{W} \times 100\%$$

Keterangan :

W_2 = Berat labu dan lemak yang telah dikeringkan (gr)

W_1 = Berat labu kosong (gr)

W = Berat sampel yang dianalisis

a. Sampel terung kopek ungu

$$1. \text{ Kadar lemak} = \frac{94,9501 \text{ gr} - 94,9311 \text{ gr}}{10,0311 \text{ gr}} \times 100\%$$

$$= \frac{0,019 \text{ gr}}{10,0311 \text{ gr}} \times 100\%$$

$$= 0,1894\%$$

$$2. \text{ Kadar lemak} = \frac{94,9440 \text{ gr} - 94,9265 \text{ gr}}{10,0311 \text{ gr}} \times 100\%$$

$$= \frac{0,0175 \text{ gr}}{10,0311 \text{ gr}} \times 100\%$$

$$= 0,1744\%$$

$$1. \text{ Kadar lemak} = \frac{94,9435 \text{ gr} - 94,9260 \text{ gr}}{10,0311 \text{ gr}} \times 100\%$$

$$= \frac{0,0175 \text{ gr}}{10,0311 \text{ gr}} \times 100\%$$

$$= 0,1744\%$$

a. Sampel terung kopek hijau

$$1. \text{ Kadar lemak} = \frac{94,9481 \text{ gr} - 94,9315 \text{ gr}}{10,0215 \text{ gr}} \times 100\%$$

$$= \frac{0,0166 \text{ gr}}{10,0215 \text{ gr}} \times 100\%$$

$$= 0,1656\%$$

$$2. \text{ Kadar lemak} = \frac{94,9468 \text{ gr} - 94,9308 \text{ gr}}{10,0215 \text{ gr}} \times 100\%$$

$$= \frac{0,0160 \text{ gr}}{10,0215 \text{ gr}} \times 100\%$$

$$= 0,1596\%$$

$$1. \text{ Kadar lemak} = \frac{94,9463 \text{ gr} - 94,9304 \text{ gr}}{10,0215 \text{ gr}} \times 100\%$$

$$= \frac{0,0159 \text{ gr}}{10,0215 \text{ gr}} \times 100\%$$

$$= 0,1586\%$$

Lampiran 5 :

Kegiatan Penelitian

1. Penetapan kadar protein

a. Pembuatan standar



Bahan –bahan Reagen lowry B



Menimbang bahan Reagen lowry B



Penambahan reagen lowry A



Perubahan warna larutan standar

b. Preparasi sampel



Sampel dipotong dan ditimbang



Sampel dihaluskan



Menyaring ekstrak sampel



Ekstrak sampel disentrifuge



Memisahkan presipitat sampel



Penambahan buffer asetat



Penambahan reagen lowry B dan A



Perubahan warna sampel

2. Penetapan Kadar Lemak



Sampel dipotong dan ditimbang



Proses sokletasi



Hasil sokletasi dievaporasi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Kartika Hasan dilahirkan di Maumere, Kabupaten Sikka, Propinsi NTT pada tanggal 10 Oktober 1989, merupakan putri kedua dari lima bersaudara pasangan bapak Ahmatu Hasan dan Ibu Nur Sachina. Riwayat karir pendidikannya dimulai dari SD Inpres Wairklau Maumere dan lulus pada tahun 2000. Tahun 2003 penulis menyelesaikan studi di MTS At-Taqwa Maumere. Tahun 2006 penulis menyelesaikan pendidikan menengah tingkat atas pada Madrasah 'Aliyah Negeri (MAN) Ende dan pada tahun yang sama penulis mengikuti Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dan diterima sesuai dengan pilihan pertama yaitu di Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Kimia.

Selama menuntut ilmu pada Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar jurusan Kimia, penulis pernah menjabat sebagai wakil sekretaris Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Kimia pada periode 2006-2007. Bergabung di organisasi HIPPMAL pada tahun 2006. Menjabat sebagai ketua III pada Organisasi FOKMIM periode 2008-2009. Menjabat sebagai anggota Dewan Penasehat Organisasi (DPO) pada organisasi FOKMIM periode 2009-2010. Penulis menyelesaikan serangkaian studi akhir masing-masing, Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) Makassar pada tahun 2009 dan melaksanakan salah satu tridarma perguruan tinggi yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2010 di Desa Kaloling Kecamatan Gantarangeke Kabupaten Bantaeng. Terakhir, sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Kimia pada Fakultas Sains dan Teknologi, penulis menyusun karya tulis ilmiah yaitu skripsi dengan judul **“Penetapan Kadar Protein dengan Metode Spektrofotometri dan Kadar Lemak dengan Metode Sokletasi pada Terung Kopek Ungu dan Terung Kopek Hijau.”**