

**UJI POTENSI ANTI DIABETES EKSTRAK ETANOL BUAH OKRA
(*Abelmoschus esculentus* L) PADA MENCIT PUTIH JANTAN
(*Mus musculus*) YANG DI INDUKSI GLUKOSA**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi
Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

OLEH :

NOFRIANI SAFITRI
NIM. 70100111055

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2015**

**UJI POTENSI ANTI DIABETES EKSTRAK ETANOL BUAH OKRA
(*Abelmoschus esculentus* L) PADA MENCIT PUTIH JANTAN
(*Mus musculus*) YANG DI INDUKSI GLUKOSA**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi
Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

OLEH :

NOFRIANI SAFITRI
NIM. 70100111055

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2015**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nofriani Safitri
Nim : 70100111055
Tempat/Tgl Lahir : Ujung Pandang, 27 November 1994
Jur/Prodi/Konsentrasi : Farmasi
Fakultas/Program : Ilmu Kesehatan/S1
Alamat : Jl. AMD Kompleks Graha Sejahtera Blok B2 No 8/
Makassar.
Judul : Uji Potensi Anti Diabetes Ekstrak Etanol Buah Okra
(*Abelmoschus esculentus* L) Pada Mencit Putih Jantan
(*Mus musculus*) Yang Di induksi Glukosa

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran, bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, Desember 2015
Penulis,

NOFRIANI SAFITRI
NIM. 70100111055

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Uji potensi Anti Diabetes Ekstrak Etanol Buah Okra (*Abelmoschus esculantus* L) Pada Mencit Putih Jantan (*Mus musculus*) Yang Di Induksi Glukosa” yang disusun oleh Nofriani Safitri, NIM: 70100111055, mahasiswa Jurusan Farmasi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian Munaqasah yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 M yang bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1437 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, 10 Desember 2015
27 Shafar 1437H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc (.....)
Sekretaris : Mukhriani S.Si.,M.Si.,Apt (.....)
Pembimbing I : Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci , M.Si., Apt. (.....)
Pembimbing II: Burshalati Tahar, S.Farm.,M.Si.,Apt (.....)
Penguji I : Isriany Ismail.,S.Si.,M.Si.,Apt (.....)
Penguji II : Drs. Syamsul Bahri, M.si (.....)

Diketahui oleh :

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu
Kesehatan UIN Alauddin Makassar

Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc
NIP.19550203 198312 1 001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah swt. atas segala limpahan rahmat dan hidayah yang telah di berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana di Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar ‘sarjana’ di bidang pendidikan Strata 1 (S1). Besar harapan penulis agar skripsi ini menjadi penunjang ilmu pengetahuan kedepannya dan bermanfaat bagi orang banyak. Terima kasih yang setulusnya kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda M. Addin S.Si dan Ibunda Siti Asmah S.Pd atas segala do’a, kesabaran, kegigihan, materi serta pengorbanan yang diberikan dalam membesarkan dan mendidik penulis hingga saat ini.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak/ibu:

1. Prof. Dr. Musafir Pababbari. M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Dr. dr. H. A. Armyn Nurdin, M.Sc.,selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Dr. Nurhidayah S.Kep., Ns., M.Kes., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
4. Dr. Andi Susilawaty S.Si., M.Kes.,selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
5. Dr. Mukhtar Luffi, M.Pd.,selakuWakil Dekan III Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
6. Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci,M.Si.,Apt selaku pembimbing pertama atas segala arahan dan bimbingannya yang tidak bisa dinilai dengan materi dan telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran beliau dalam membimbing penyusun hingga terselesaikan penyusunan skripsi ini.

7. Haeriah, S.Si., M.Si selaku Ketua Prodi Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan bimbingan dan arahan.
8. Drs. Syamsul Bahri, M.Si, sebagai penguji agama yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan.
9. Nurshalati Tahar, S.farm., M.Si.Apt selaku Pembimbing keduanya telah banyak meluangkan waktu memberikan bimbingan dan arahan.
10. Isriani Ismail, S.Si., M.Si., Apt., sebagai Penguji Kompetensi yang telah banyak memberikan saran dan bimbingan serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam mengoreksi kekurangan pada skripsi.
11. Bapak dan ibu dosen serta staf dalam lingkungan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar atas bantuannya selama ini.
12. Rekan-rekan mahasiswa jurusan farmasi angkatan 2005 sampai dengan angkatan 2014. Dan khususnya rekan-rekan angkatan 2011, para Laboran dan yang telah memberikan bantuan selama penelitian.
13. Ketiga adik adikku yang tercinta Chaerul Ikhsan, Muh Urwatul Wusqa, dan Khusnul Khatimah yang banyak membantuku selama ini.

Dengan kerendahan hati, penulis berharap agar skripsi ini mendapat ridha dari Allah swt. dan memberi manfaat bagi masyarakat dan penikmat ilmu pengetahuan, khususnya kepada penulis sendiri. *Aamiin yaa Rabbal Aalamin..*

Makassar, Desember 2015

Penyusun,

NOFRIANI SAFITRI

NIM. 70100111055

DAFTAR ISI

	Hal
JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Defenisi Operasional Dan Ruang Lingkup Penelitian	6
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan dan kegunaan penelitian	9
F. Manfaat penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Uraian Tumbuhan.....	10
1. Klasifikasi Tumbuhan.....	10
2. Nama Daerah	10
3. Morfologi	11
4. Kandungan Kimia.....	11
5. Kegunaan Tumbuhan.....	12
B. Uraian Hewan Uji.....	13
1. Taksonomi Hewan Uji	13
2. Morfologi	13
3. Karakteristik Hewan Uji	14
C. Uraian Farmakologi.....	14
1. Diabetes Militus.....	14
2. Epidemiologi.....	15
3. Klasifikasi.....	15
4. Patogenesis.....	16
5. Tanda dan Gejala.....	19
6. Diagnosis.....	19

7. Hiperglikemia.....	20
8. Penggolongan Oral Obat Antidiabetik.....	22
9. Glibenklamid.....	23
10.Flavonoid	23
D. Penyarian	24
1. Ekstraksi	25
2. Maserasi.....	25
3. Perkolasi	26
4. Refluks	26
5. Sokletasi	26
6. Infus	27
E. Tanaman Obat dalam Pandangan Islam	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	34
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	34
B. Pendekatan Penelitian	34
C. Populasi dan Sampel	34
D. Metode Pengumpulan Data	35
E. Instrumen Penelitian	35
F. Prosedur Uji Anti Diabetes	35
G. Pengolahan Dan Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	39
A. Hasil Penelitian.....	39
B. Pembahasan	40
BAB V PENUTUP	44
A. Kesimpulan	44
B. Saran	44
KEPUSTAKAAN	45
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	48
RIWAYAT HIDUP.....	71

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
1. Pengaruh pemberian Na CMC, ekstrak etanol buah okra, glibenklamid.....	39
2. Kadar glukosa darah mencit yang diberi Na CMC	54
3. Kadar glukosa darah mencit yang diberi ekstrak etanol buah okra 42mg.....	54
4. Kadar glukosa darah mencit yang diberi ekstrak etanol buah okra 84mg	54
5. Kadar glukosa darah mencit yang diberi ekstrak etanol buah okra 168 mg.....	55
6. Kadar glukosa darah mencit yang diberi suspensi glibenklamid 0,02 mg	55
7. Pengaruh pemberian Na.CMC 1%, ekstrak etanol buah okra 42 mg, 84 mg 168 mg dan suspensi glibenklamid 0,02 mg pada menit ke-15	56
8. Pengaruh pemberian Na.CMC 1%, ekstrak etanol buah okra 42 mg, 84 mg 168 mg dan suspensi glibenklamid 0,02 mg pada menit ke-30	57
9. Pengaruh pemberian Na.CMC 1%, ekstrak etanol buah okra 42 mg, 84 mg 168 mg dan suspensi glibenklamid 0,02 mg pada menit ke-45	58
10. Pengaruh pemberian Na.CMC 1%, ekstrak etanol buah okra 42 mg, 84 mg 168 mg dan suspensi glibenklamid 0,02 mg pada menit ke-60	59
11. Perhitungan Statistik dengan Rancangan Acak kelompok	60
12. Tabel Anava.....	64
13. Tabel Analisis BNT	66

DAFTAR GAMBAR

	Gambar	Hal
1	Skema kerja.....	48
2	Tanaman buah okra.....	68
3	Buah okra.....	68
4	Sampel dimaserasi selama 2×24 jam.....	68
5	Hasil maserasi.....	68
6	Ekstrak kental buah okra.....	69
7	Penimbangan ekstrak kental buah okra.....	79
8	Mencit yang digunakan.....	69
9	Alat dan bahan.....	69
10	Pengukuran kadar glukosa darah.....	70
11	Pemberian sampel melalui oral mencit.....	70

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Hal
1 Skema kerja.....	48
2 Perhitungan dosis Glibenklamid.....	51
3 Data kadar glukosa darah dengan pemberian perlakuan.....	52
4 Persen penurunan kadar glukosa darah pada menit ke 15,30,45,60	54
5 Perhitungan statistik dan rancangan acak kelompok.....	60
6 Perhitungan Anava.....	62
7 Gambar.....	68



ABSTRAK

Nama Penyusun : Nofriani Safitri
NIM : 70100111055
Judul Skripsi : “Uji Potensi Anti Diabetes Ekstrak Etanol Buah Okra (*Abelmoschus esculentus* L) Pada Mencit Putih Jantan (*Mus musculus*) Yang Diinduksi Glukosa”

Telah dilakukan penelitian tentang uji potensi Anti Diabetes ekstrak etanol buah okra (*Abelmoschus esculentus* L) pada mencit putih jantan (*Mus musculus*) yang di induksi glukosa. Tujuan penelitian untuk mengetahui potensi ekstrak etanol buah okra dalam menurunkan kadar glukosa darah mencit.

Penelitian ini menggunakan metode rancangan acak kelompok (RAK). Sebagai hewan coba digunakan mencit putih jantan 20-30 g per ekor, dikelompokkan menjadi 5 kelompok masing masing 3 ekor untuk setiap kelompok perlakuan. Sebagai kelompok pelakuan adalah pemberian ekstrak etanol buah okra (yang di ekstraksi secara maserasi) dosis 42 mg/30gBB, 84 mg/30gBB, 168 mg/30gBB, kontrol positif (glibenklamid 0,02 mg), kontrol negatif (Na CMC 1%), diberikan secara oral setiap 15, 30, 45, 60 menit setelah di induksi terlebih dahulu dengan Glukosa. Analisis data menggunakan perhitungan ANAVA dilanjutkan dengan analisis beda nyata terkecil (BNT)

Hasil penelitian menunjukkan pemberian ekstrak etanol buah okra dengan dosis 42 mg/30gBB, 84 mg/30gBB, 168 mg/30gBB dapat menurunkan kadar glukosa darah mencit putih jantan (*Mus musculus*) berbeda secara bermakna terhadap kontrol negatif dan sebanding dengan kontrol positif

Kata kunci : Anti Diabetes, ekstrak etanol, buah okra.

ABSTRACT

Author name : Nofriani Safitri
NIM : 70100111055
Title of Script : "Test Potential Anti Diabetic of Ethanol Extract of Okra Fruit (Abelmoschus esculentus L) in Mice White Males (Mus musculus) The induced Glucose "

Has conducted research on the Anti Diabetic potency test of ethanol extract of okra fruit (*Abelmoschus esculentus* L) on male white mice (*Mus musculus*) were in the induction of glucose. The aim of research to determine the potential of the ethanol extract of okra fruit in lowering blood glucose levels in mice.

This study uses method completely randomized design (CRD) As experimental animals used male white mice of 20-30 g per head, grouped into 5 groups each 3 heads unruk each treatment group. As the carrying group is the ethanol extract of okra fruit (which is extracted by maceration) dose of 42 mg /30gBB, 84 mg /30gBB, 168 mg/ 30gBB, positive control (glibenclamide 0.02 mg), negative control (Na CMC 1%) , given orally every 15, 30, 45, 60 min after induction in advance with Glucose. Data analysis using ANOVA followed by analysis calculation least significant difference (LSD)

The results showed okra fruit ethanol extract at a dose of 42 mg / 30gBB, 84 mg / 30gBB, 168 mg / 30gBB body weight can lower blood glucose levels male white mice (*Mus musculus*) was significantly different to the negative control and comparable to the positive control

Keywords: Anti Diabetic, ethanol extract, okra fruit.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak zaman dahulu masyarakat sudah mengenal dan memanfaatkan tumbuhan sebagai obat untuk mengobati beberapa penyakit. Dewasa ini pengetahuan tentang tumbuhan obat merupakan budaya bangsa yang diwariskan secara turun temurun. Sebagian masyarakat lebih menyukai pengobatan dengan tumbuhan obat dari pada paten hasil sintesis. Mereka meyakini bahwa tumbuhan obat lebih aman dikonsumsi dan kurang menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan, sehingga memilih menggunakan obat herbal untuk menyembukan penyakitnya (Togobu,dkk, 2013: 24).

Diabetes Militus atau disingkat diabetes, adalah gangguan kesehatan berupa kumpulan gejala yang disebabkan oleh peningkatan kadar gula (glukosa) darah akibat kekurangan ataupun resistensi insulin. Penyakit ini sudah lama dikenal terutama di kalangan keluarga, khususnya keluarga ‘berbadan besar’ (kegemukan) bersama dengan gaya hidup ‘tinggi’. Kenyataannya kemudian, DM menjadi penyakit masyarakat umum, menjadi beban kesehatan masyarakat, meluas dan membawa banyak kematian (Bustan, 2007: 101).

Beberapa diantara penderita diabetes baru mengetahui sakit yang diderita ketika sudah mengalami komplikasi. Ketidaktahuan ini disebabkan karena kebanyakan penyakit diabetes terus berlangsung tanpa keluhan sampai beberapa tahun dan disebabkan karena minimnya informasi yang diperoleh masyarakat tentang

penyakit diabetes itu sendiri. Diabetes merupakan penyakit dimana tubuh penderita sudah tidak mampu mengendalikan kadar gula dalam darah. Penderita mengalami gangguan metabolisme pada proses penyerapan gula oleh tubuh, karena tubuh tidak dapat melepaskan atau menggunakan insulin secara normal. Insulin adalah hormon yang dilepaskan oleh pankreas, merupakan zat utama yang bertanggung jawab dalam mempertahankan kadar gula darah (Thandra 2008: 2).

Penurunan hormon insulin mengakibatkan glukosa dalam darah yang dikonsumsi di dalam tubuh akan meningkat. Peningkatan kadar glukosa darah disebabkan oleh kerusakan pankreas yang tidak dapat menghasilkan insulin. Kerusakan pankreas ini dapat disebabkan oleh senyawa radikal bebas yang merusak sel-sel pada pankreas sehingga tidak dapat berfungsi (Ririn, 2012: 2)

Pada keadaan setelah penyerapan makanan, kadar glukosa darah pada manusia dan mamalia berkisar antara 4,5–5,5 mmol/L. Setelah ingesti makanan yang mengandung karbohidrat, kadar tersebut naik hingga 6,5–7,2 mmol/L. Saat puasa kadar glukosa darah akan turun menjadi sekitar 3,3–3,9 mmol/L. Penurunan mendadak kadar glukosa darah akan menyebabkan konvulsi, seperti terlihat pada keadaan overdosis insulin, karena pengaturan otak secara langsung pada pasokan glukosa. Namun, kadar yang jauh lebih rendah dapat ditoleransi asalkan terdapat adaptasi yang progressif. Sebagian besar karbohidrat yang dapat dicerna di dalam makanan akhirnya akan membentuk glukosa. Karbohidrat di dalam makanan yang dicerna secara aktif mengandung residu glukosa, galaktosa, dan fruktosa yang akan dilepas di intestinum. Zat-zat ini lalu diangkut ke hati lewat vena porta hati.

Galaktosa dan fruktosa segera dikonversi menjadi glukosa di hati. Glukosa dibentuk dari senyawa-senyawa glukogenik yang mengalami glukoneogenesis. Senyawa ini dapat di golongkan menjadi dua kategori yaitu: senyawa yang melibatkan konversi langsung menjadi glukosa tanpa daur ulang yang bermakna, seperti beberapa asam amino serta propionat dan senyawa yang merupakan produk metabolisme parsial glukosa pada jaringan tertentu dan yang diangkut ke hati serta ginjal untuk disintesis kembali menjadi glukosa. Alanin merupakan asam amino yang paling dominan ditranspor dari otot ke hati selama masa kelaparan. Kenyataan ini kemudian menghasilkan postulasi siklus glukosa alanin, yang berefek pendaaran glukosa dari hati ke otot dengan pembentukan piruvat yang diikuti dengan transaminase menjadi alanin, lalu transpor alanin ke hati, dan kemudian diikuti oleh glukoneogenesis kembali menjadi glukosa. Glukosa juga dibentuk dari glikogen hati melalui glikogenolisis (Stryer L, 2000: 50-79).

Dalam jumlah pravalensi penduduk dunia dengan DM diperhitungkan mencapai 250 juta dalam 10 tahun mendatang. Peningkatan pravalensi akan lebih menonjol perkembangannya di negara berkembang di bandingkan dengan negara maju. Kecenderungan peningkatan prevalensi akan membawa perubahan posisi DM yang akan semakin menonjol. (Bustan,2007:101).

Diabetes melitus merupakan masalah kesehatan global yang insidensinya semakin meningkat. Sebanyak 346 juta orang di dunia menderita diabetes, dan diperkirakan mencapai 380 juta jiwa pada tahun 2025. Di Amerika Serikat, berdasarkan “ 2011 National Diabetes Fact Sheet ” sebanyak 25,8 juta orang (8,3%

dari populasi) menderita diabetes. Kasus baru yang didiagnosis pada tahun 2010 sebanyak 1,9 juta kasus (Ada,2011, Who 2011).

Pada tahun 1995 Indonesia menempati urutan tertinggi ke-tujuh untuk prevalensi diabetes, sebagian besar merupakan diabetes tipe 2. Menurut WHO tahun 2000, Indonesia menempati peringkat keempat negara dengan prevalensi diabetes terbanyak di dunia setelah India, Cina, dan Amerika dengan jumlah penderita sebesar 8,4 juta orang. Jumlah ini diasumsikan akan meningkat tiga kali lipat pada tahun 2030. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia pada tahun 2003 prevalensi diabetes pada penduduk di atas 20 tahun sebanyak 13,7 juta (PERKENI, 2011)

Meskipun insidensi diabetes di dunia tinggi, banyak kasus diabetes yang belum terdiagnosis. Di Amerika Serikat, menurut “2011 NationalDiabetes Fact Sheet” sebanyak 18,8 juta orang didiagnosis diabetes dan 7 juta orang tidak terdiagnosis, sedangkan di Indonesia diperkirakan separuh kasus diabetes belum terdiagnosis (ADA, 2011).

Sekelompok orang yang menjadi tenaga ahli pengobatan sudah ada semenjak masa kenabian, juga sebelum itu dan sesudahnya. Salah satu bidang pengobatan yang sudah ada sejak itu adalah ilmu obat alam atau disebut juga dengan farmakognosi. Adapun yang dimaksud dengan farmakognosi adalah ilmu yang mempelajari tentang obat/bahan obat yang berasal dari alam baik dari tumbuhan, hewan maupun mineral. Para ahli dalam bidang ini mengetahui formula obat-obatan, karakteristik dan cara penggunaannya. Diiringi dengan keyakinan mereka bahwa obat itu hanya penyebab perantara kesembuhan saja. Dan Allah lah yang menjadikan penyebab itu semua.

Oleh karena itu, hukumnya boleh mempelajari ilmu pengobatan ini dan berobatlah dengannya. (Ar-Rumaikhon, 2008;99).

Tumbuhan sebagai bahan obat tradisional telah banyak digunakan untuk pemeliharaan kesehatan, pengobatan maupun kecantikan. Dunia kedokteran juga banyak mengkaji obat tradisional dan hasil-hasilnya yang mendukung bahwa tumbuhan obat memiliki kandungan zat-zat yang secara klinis yang bermanfaat bagi kesehatan.

Salah satu tanaman tradisional yang digunakan sebagai obat adalah buah okra (*Abelmoschus esculentus* L.). Ekstrak buah okra (*Abelmoschus esculentus* L.) dilaporkan mempunyai efek menurunkan kadar glukosa darah disebabkan adanya kandungan polifenol didalamnya, dengan demikian diharapkan buah okra (*Abelmoschus esculentus* L.) dapat menambah perbendaharaan obat-obat tradisional sebagai penurun kadar glukosa darah.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui potensi Anti Diabetes dari buah okra itu sendiri dalam menurunkan kadar glukosa darah jika dibandingkan obat glibenklamid, serta dosis minimum ekstrak yang nantinya dapat digunakan sebagai dasar penggunaan Buah tanaman okra (*Abelmoschus esculentus* L.) sebagai obat tradisional sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai obat antidiabetes.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana potensi Anti Diabetes ekstrak etanol buah okra (*Abelmoschus esculentus* L.) jika di bandingkan dengan obat glibenklamid dalam menurunkan kadar glukosa darah mencit yang dibebani glukosa?
2. Berapa dosis optimum ekstrak etanol buah okra (*Abelmoschus esculentus* L.) yang dapat digunakan untuk menurunkan kadar glukosa darah pada mencit?
3. Bagaimanakah pandangan Islam terhadap obat tradisional buah okra dalam mengobati penyakit diabetes militus?

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

- a. Uji potensi adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi potensinya.
- b. Mencit merupakan hewan pengerat yang cepat berbiak, mudah dipelihara dalam jumlah yang bervariasi, genetiknya cukup besar, serta anatomi fisiologinya terkarakterisasi dengan baik.
- c. Diabetes mellitus (DM) ialah suatu keadaan yang timbul karena defisiensi insulin relatif maupun absolut. Penyakit ini merupakan suatu penyakit menahun yang ditandai oleh kadar glukosa darah yang melebihi normal. DM dapat disebabkan oleh sejumlah faktor risiko.
- d. hipoglikemia sebagai keadaan di mana kadar gula darah di bawah 60 mg/dl

- e. Hiperglikemia kronis merupakan tanda umum pada diabetes melitus. Hiperglikemia mengakibatkan peningkatan fluk glukosa dan siklus *Tricarboxylic Acid* (TCA), dimana hal ini akan menambah rantai transpor elektron pada mitokondria sehingga akan memproduksi lebih banyak radikal oksigen (O_2^-) dari pada mitokondria SOD
- f. Ekstraksi adalah kegiatan penarikan kandungan kimia yang dapat larut sehingga terpisah dari bahan yang tidak larut dengan pelarut cair. Senyawa aktif yang terdapat dalam berbagai simplisia dapat digolongkan ke dalam golongan minyak atsiri, alkaloid, flavonoid, dan lain-lain. Dengan diketahuinya senyawa aktif yang dikandung simplisia akan mempermudah pemilihan pelarut dan cara ekstraksi yang tepat
- g. Ekstrak buah okra (*Abelmoschus esculentus* L.) merupakan hasil ekstraksi dari sampel, dengan menggunakan etanol.
- h. Etanol merupakan penyari yang bersifat universal yaitu dapat melarutkan senyawa polar maupun senyawa nonpolar. Etanol adalah senyawa yang mudah menguap, jernih (tidak berwarna), berbau khas, dan menyebabkan rasa terbakar pada lidah.
- i. Metode maserasi merupakan cara penyarian yang sederhana, yang dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari selama beberapa hari pada temperatur kamar terlindung dari cahaya. Metode maserasi digunakan untuk menyari simplisia yang mengandung komponen kimia yang mudah larut dalam cairan penyari, tidak mengandung benzoin, tiras dan lilin.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Disiplin ilmu penelitian ini meliputi bidang farmasi fitokimia dan Farmakologi terkait uji potensi Anti Diabetes ekstrak etanol buah okra (*Abelmoschus esculentus L.*) terhadap penurunan kadar glukosa darah pada mencit.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan jurnal (Huitag,dkk 2012 *Herbal medicines used in the treatment of diabetes mellitus in Arunachal Himalaya, northeast, India*). Dengan menggunakan metode kuesioner semi terstruktur di dapatkan data empiris dari 100 tabib terkenal di kabupaten lohit ditemukan 42 jenis tanaman yang bisa di gunakan sebagai obat antidiabetes salah satunya adalah okra (*Abelmoschus esculentus L.*).

Sri peni dkk (2012), dalam jurnalnya uji efek hipoglikemik ekstrak air kulit buah buah pisang ambon putih *Musa* (AAA Group) terhadap mencit model hiperglikemik galur Swiss webster dengan menggunakan induksi glukosa. Didapatkan hasil ekstrak air kulit buah pisang ambon putih yang di induksi glukosa bisa menurunkan kadar glukosa darah mencit karena tingginya karbohidrat pada buah pisang sehingga dapat menurunkan kadar glukosa darah.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, belum ada yang meneliti tentang uji potensi Anti Diabetes ekstrak etanol buah okra (*Abelmoschus esculentus L.*) pada mencit putih jantan (*Mus musculus*) yang di bebani Glukosa

E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Mengetahui potensi ekstrak etanol buah okra (*Abelmoschus esculentus* (L.) dalam menurunkan kadar glukosa darah mencit yang dibebani Glukosa
2. Menentukan dosis minimum ekstrak etanol buah okra (*Abelmoschus esculentus* (L.) yang dapat digunakan untuk menurunkan kadar glukosa darah pada mencit.
3. Mengetahui pandangan islam terhadap obat tradisional buah okra dalam mengobati penyakit diabetes militus.

F. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat terhadap penggunaan buah okra (*Abelmoschus esculentus* (L.) sebagai anti diabetes.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Uraian Tumbuhan

1. Klasifikasi Tumbuhan

Regnum	: <i>Plantae</i>
Divisi	: <i>Magnoliophyta</i>
Sub di vision	: <i>Spermatophyta</i>
class	: <i>Magnoliopsida</i>
Ordo	: <i>Malvales</i>
Famili	: <i>Malvaceae</i>
Genus	: <i>Abelmoschus</i>
Spesies	: <i>Abelmoschus esculentus</i> (L.) Moench (Mulyati dan Diah, 2008).

2. Nama Daerah.

Buah okra (*Abelmoschus Esculentus* L.) banyak terdapat diberbagai daerah di Indonesia dan mempunyai nama-nama daerah antara lain: Bima : Rabamea, Jawa : Kopi jawa, Maluku : Obitara magare-garehe, Sulawesi tenggara : Hoinu, Sulawesi : Kopi arab (Mulyati dan Diah, 2008: 81).

3. Morfologi

Okra (*Abelmoschus Esculentus* L) merupakan salah satu jenis tumbuhan tergolong dalam suku Malvaceae. Perawakannya berupa herba menahun, tegak, kuat, tingginya mencapai 4 m.

Daunnya tersusun secara spiral; tunggal; diameter helaian daun mencapai 50 cm, tepi daun berlekuk 3-5-7, berbulu halus dan jarang; panjang tangkai daun 50 cm. Destilasi minyak essential dari daunnya menghasilkan kamper kristal yang umum disebut sebagai “basil- camphor”

Bunga tunggal atau tersusun dalam bentuk tandan semu, besar dan lunak, muncul di ketiak daun pada bagian daun yang mengarah ke atas; daun kelopak berbentuk seperti cawan, berwarna hijau, tidak luruh; daun mahkota berjumlah 5, ukuran panjang dan lebar 3 – 7cm, berwarna kuning dengan di bagian tengah berwarna ungu tua. Kapsul, berlekuk 5, berbulu halus, berbentuk silinder atau seperti piramid, panjangnya 5 – 35 cm, diameter 1 – 5 cm, berwarna hijau atau ungu kehijauan, ungu di waktu muda, coklat dan merekah setelah tua. Biji berjumlah banyak, bentuknya bulat, berwarna kehitaman (Mulyati dan Diah, 2008: 81).

4. Kandungan Kimia

Buahnya merupakan sumber vitamin, mineral dan kaya akan kandungan Ca (70-90 mg per 100 gram). Setiap 100 gram bagian buah yang dapat dimakan, mengandung 90 gram air, 2 gram protein, 1 gram serat dan 7 gram karbohidrat (KH) Sedangkan komponen kimia yang terdapat dalam buahnya antara lain dgalaktosa, 1-rhamnosa dan d-asam galakturonik, ambrettosida, a-cephalin, farnesol, furfural, methionin sulphoxida ,lecithin, asam myristik, asam palmitik, plavonoid, (Mulyati dan Diah, 2008: 81). Hydroxy cinnamic derivatives, lycosides, Quercetin, Myricetinand, abelesculin, Stearic, Palmitic, Capric, Caprylic, Lauric (udoamaka dan jose,2014: 11).

5. Kegunaan Tumbuhan

Pemanfaatan “Okra” bukan hanya sebagai bahan pangan (sayuran), namun juga berpotensi sebagai bahan obat tradisional. Di Indo-China, akar, bunga dan buahnya digunakan sebagai peluruh air kencing; di Malay , buahnya digunakan sebagai obat penyakit kelamin dan disurai, sedangkan di Philifina, sirup dari buahnya digunakan sebagai obat radang tenggorokan dan tumbukan bijinya yang dibuat seperti pasta digunakan dalam perawatan kulit karena gatal-gatal dan di India, sari buah mudanya digunakan dalam pengobatan radang saluran hidung dan tenggorokan (*catarrh*), penyakit kelamin dan gangguan pada saluran kencing, bijinya digunakan sebagai tonik, memperlancar pengeluaran angin perut dan penyejuk. Bijinya mengandung substansi seperti kopi dan umum digunakan dalam campuran kopi, dan di Sulawesi (Indonesia) dikenal dengan nama “kopi arab”. (Mulyati dan Diah, 2008: 82). Sedangkan menurut jurnal *The use of plants in the traditional management of diabetes in Nigeria: Pharmacological and toxicological considerations* (udoamaka dan jose,2014: 11) buah okra juga bisa digunakan pada penyakit infeksi, imonumodulator, demam, gonorrhoea dan disentri.

B. Uraian Hewan Uji

1. Klasifikasi Hewan Uji (Malole,1988: 94)

Kingdom	: Animalia
Division	: Vertebrata
Class	: Mammalia
Sub class	: Theria

Ordo : Rodentia
 Famili : Muridae
 Genus : Mus
 Spesies : *Mus musculus* Linn

2. Morfologi

Mencit/mouse *Mus musculus* adalah hewan pengerat (Rodentia) yang cepat berbiak, mudah dipelihara dalam jumlah banyak, bervariasi genetiknya cukup besar serta sifat anatomis dan fisiologisnya terkarakterisasi dengan baik (Malole,1988: 94).

3. Karakteristik Hewan Uji

Kriteria	Nilai
Berat badan : - Jantan	20-40 g
Luas Permukaan tubuh	20g : 36 cm ²
Temperatur tubuh	36,5-38,0°C
Konsumsi makanan	15 g/100 g/hari
Konsumsi air minum	15 ml/100 g/hari
Detak Jantung	325-780/menit
Glukosa dalam darah	62-175 /dl

(malole, 1988: 97)

C. Uraian Farmakologi

1. Diabetes Melitus

Menurut jurnal *the use of plants in the tradisional managenet of diabetes in Nigeria:Pharmacological and toxicological considerations*, (udoemaka,2014:1)

Diabetes adalah gangguan metabolisme kronis yang ditandai dengan kadar glukosa darah yang tinggi, ini adalah sebagai akibat dari tidak cukupnya produksi insulin endogen oleh sel-sel beta pankreas atau sekresi insulin terganggu.

Berdasarkan kriteria diagnostik PERKENI (Perkumpulan Endokrinologi Indonesia) tahun 2011, seseorang dikatakan menderita diabetes jika ada gejala diabetes melitus dengan glukosa plasma sewaktu ≥ 200 mg/dL atau adanya gejala klasik diabetes melitus dengan kadar glukosa plasma puasa ≥ 126 mg/dL atau kadar gula plasma 2 jam pada tes toleransi glukosa oral (TTGO) ≥ 200 mg/dL (PERKENI, 2011).

Dari berbagai definisi yang disebutkan, dapat disimpulkan bahwa diabetes melitus adalah suatu penyakit metabolisme kronis yang disebabkan adanya kelainan dari produksi, sekresi dan kerja insulin yang ditandai dengan peninggian kadar glukosa darah (hiperglikemia). Seseorang dikatakan menderita diabetes jika memiliki kadar glukosa darah ≥ 126 mg/dL dan ≥ 200 mg/dL pada tes glukosa darah sewaktu

2. Epidemiologi

World Health Organization (WHO) menyatakan terdapat 347 juta orang di dunia didiagnosis mengidap DM. WHO memperkirakan DM akan menjadi penyebab kematian nomor tujuh di seluruh dunia pada tahun 2030. Prevalensi DM di dunia

diperkirakan sekitar 6,4% pada tahun 2010 dan diprediksi meningkat menjadi 7,7% pada tahun 2030. Sebagian besar peningkatan prevalensi DM tersebut terjadi di negara berkembang (J.E Shaw, dkk. 2010: 87).

3. Klasifikasi

Klasifikasi DM yang dianjurkan oleh Perkeni adalah yang sesuai dengan anjuran klasifikasi DM *American Diabetes Association* (ADA), klasifikasi etiologi Diabetes Melitus, menurut ADA adalah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Klasifikasi Etiologi Diabetes Melitus

Tipe	Keterangan
Diabetes Tipe 1	Tipe diabetes dengan defisiensi insulin absolut akibat kerusakan sel sel β pankreas
Diabetes Tipe 2	Mulai dari yang pre dominan resistensi insulin dengan defisiensi insulin relatif sampai dominan defek sekresi insulin dengan resistensi insulin.
Diabetes Tipe lain	<ol style="list-style-type: none"> 1. Defek genetik fungsi sel beta 2. Defek genetik kerja insulin 3. Penyakit eksokrin pankreas

	<ol style="list-style-type: none"> 4. endokrinopati 5. karena obat atau zat kimia 6. infeksi 7. imunologi 8. sindrom genetik lain yang berhubungan dengan diabetes militus
Diabetes Gestasional (DMG)	Diabetes semasa kehamilan

(Harrison's Principles of Internal Medicine, 17 th edition, 2008)

4. Patogenesis

Apabila jumlah atau dalam fungsi insulin mengalami defisiensi, hiperglikemik akan timbul sehingga menyebabkan Diabetes. Kekurangan insulin bisa absolut apabila pankreas tidak menghasilkan sama sekali insulin atau menghasilkan insulin, tetapi dalam jumlah yang tidak cukup, misalnya yang terjadi pada DM tipe 1. Kekurangan insulin dikatakan relatif apabila pankreas menghasilkan insulin dalam jumlah yang normal, tetapi insulinnya tidak bekerja secara efektif. Hal ini terjadi pada penderita DM tipe 2, dimana telah terjadi resistensi insulin. Baik kekurangan insulin absolut maupun relatif akan mengakibatkan gangguan metabolisme, untuk melangsungkan fungsinya, membangun jaringan baru, dan memperbaiki jaringan. Hormon insulin adalah hormon anabolik yang mendorong penyimpanan zat gizi, penyimpanan glukosa sebagai glikogen di hati dan otot, perubahan glukosa menjadi

triasgliserol di hati dan penyimpanannya di jaringan adiposa, serta penyerapan asam amino dan sintesis protein di otot rangka. Hormon ini juga meningkatkan sintesis albumin dan protein darah lainnya oleh hati. Insulin meningkatkan penggunaan glukosa sebagai bahan bakar dengan merangsang transpor glukosa ke dalam otot dan jaringan adiposa. Hormon insulin merupakan hormon polipeptida yang di sintesis oleh sel beta pankreas endokrin yang terdiri dari kelompok mikroskopis kelenjar kecil atau pulau Langerhans, tersebar di seluruh pankreas eksokrin. Insulin bekerja pada lemak, serta protein, dan kerja insulin ini pada dasarnya bertujuan untuk mengubah arah lintasan metabolik sehingga gula, lemak, dan asam amino dapat disimpan serta tidak terbakar habis. Jika tidak ada insulin, lemak, gula, dan asam-asam amino tidak dapat masuk ke dalam sel sehingga unsur-unsur gizi tersebut tetap berada di dalam plasma. Sebagai akibatnya, sel-sel tubuh mengalami starvasi dan terjadi peningkatan kadar glukosa, kolesterol, serta lemak. Selain kadar glukosa darah, faktor lain seperti asam amino, asam lemak, dan hormon gastro intestina merangsang sekresi insulin dalam derajat berbeda-beda. Fungsi metabolisme utama insulin untuk meningkatkan kecepatan transport glukosa melalui membran sel ke jaringan terutama sel –sel otot, fibroblas dan sel lemak (Najah, 2014: 18-19).

Menurut buku belajar mudah farmakologi (2003: 191). Diabetes melitus tidak tergantung insulin (Tipe 2) disebabkan oleh penurunan pelepasan insulin atau penurunan respons jaringan terhadap insulin (misalnya penurunan jumlah reseptor insulin) yang mengakibatkan hiperglikemia tetapi tidak ketoasidosis.

Diabetes melitus tipe 2 merupakan penyakit kronis yang progresif, dimulai dengan resistensi insulin yang mengarah ke peningkatan produksi glukosa hepatic dan berakhir dengan kerusakan sel beta. Resistensi insulin didefinisikan sebagai ketidakmampuan jaringan target seperti otot dan jaringan adiposa untuk merespon sekresi insulin endogen dalam tubuh (WHO, 2004). *Lipotoxicity* dapat berkontribusi terhadap resistensi insulin. *Lipotoxicity* mengacu kepada tingginya konsentrasi asam lemak bebas yang terjadi sebagai akibat tekanan hambatan *hormonesensitive lipase* (HSL). Normalnya insulin menghambat lipolisis dengan menghambat HSL, namun pada resistensi insulin tidak terjadi secara efisien. Hasil dari peningkatan lipolisis adalah peningkatan asam lemak bebas, dan inilah yang menyebabkan obesitas dan peningkatan adiposa. Asam lemak bebas menyebabkan resistensi insulin dengan mempromosikan fosforilasi serin pada reseptor insulin yang dapat mengurangi aktivitas *insulin signalling pathway*. Fosforilasi reseptor insulin pada asam amino tirosin penting untuk mengaktifkan *insulin signalling pathway*, jika tidak, maka GLUT-4 akan gagal untuk translokasi, dan penyerapan glukosa ke jaringan akan berkurang, menyebabkan hiperglikemia (Santoso, 2008: 24).

5. Tanda dan Gejala

a. Gejala Akut

Gejala penyakit DM dari satu penderita ke penderita lain bervariasi, bahkan mungkin tidak menunjukkan gejala apapun sampai saat tertentu. Pada permulaan gejala yang ditunjukkan meliputi serba banyak (*tripoli*) yaitu: banyak makan (*poliphagia*), banyak minum (*polidipsia*), banyak kencing (*poliuria*). Bila keadaan

tersebut tidak segera diobati, akan timbul gejala nafsu makan mulai berkurang, berat badan turun dengan cepat (turun 5 – 10 kg dalam waktu 2 – 4 minggu), dan mudah lelah. Bila tidak lekas diobati, akan timbul rasa mual, bahkan penderita akan jatuh koma yang disebut dengan koma diabetik (Gunawan, 2007: 28).

b. Gejala Kronik

Gejala kronik yang sering dialami oleh penderita DM adalah kesemutan, kulit terasa panas, atau seperti tertusuk-tusuk jarum, rasa tebal di kulit, kram, mudah mengantuk, mata kabur, gatal di sekitar kemaluan terutama wanita, gigi mudah goyah dan mudah lepas, kemampuan seksual menurun bahkan impotensi (Hingkua, 2004:26).

6. Diagnosis

Dapat ditegakkan melalui tiga cara dengan melihat dari tabel dibawah ini :

Tabel. Kriteria Diagnostik Diabetes Mellitus

Kriteria Diagnostik Diabetes Mellitus
Gejala klasik DM + Glukosa plasma sewaktu > 200 mg/dl (11,1 mmol/L)
Gejala klasik DM + Glukosa plasma puasa > 126 mg/dl atau (7,0 mmol/L)
Glukosa plasma 2 jam pada TTGO (Test Toleransi Glukosa Oral) > 200 mg/dl, menggunakan beban glukosa 75gr anhidrus yang dilarutkan dalam air

(perkeni, 2011)

Pada diabetes, terjadi kerusakan pada lapisan endotel arteri dan dapat disebabkan secara langsung oleh tingginya kadar glukosa dalam darah, metabolit glukosa, atau tingginya kadar asam lemak dalam darah yang sering dijumpai pada pasien diabetes. Akibat kerusakan tersebut, permeabilitas sel endotel meningkat sehingga molekul yang mengandung lemak masuk ke arteri. Kerusakan sel-sel endotel akan mencetuskan reaksi imun dan inflamasi sehingga akhirnya terjadi pengendapan trombosit, makrofag, dan jaringan fibrosis. Sel-sel otot polos berproliferasi. Penebalan dinding arteri menyebabkan hipertensi, yang semakin merusak lapisan endotel arteri karena menimbulkan gaya yang merobek sel-sel endotel (perkeni. 2011: 21).

7. Hiperglikemia

Hiperglikemia merupakan tanda umum pada diabetes melitus. Hiperglikemia mengakibatkan peningkatan fluk glukosa dan siklus *Tricarboxylic Acid* (TCA), dimana hal ini akan menambah rantai transpor elektron pada mitokondria sehingga akan memproduksi lebih banyak radikal oksigen (O_2^-) dari pada mitokondria SOD (Erejuwa, 2012). Hiperglikemia akan menyebabkan peningkatan oksidatif stres melalui berbagai macam cara, antara lain melalui autooksidasi glukosa, pembentukan AGE (*Advanced Glycation End-product*), melalui *polyol pathway* (Tjay,2007:34).

Peningkatan metabolisme glukosa akibat hiperglikemia intraseluler menghasilkan produksi yang berlebihan dari NADH (*Nicotinamide Adenine Dinucleotide*) dan *flavin adenosine dinucleotide*, yang akan menggunakan rantai transpor elektron untuk membentuk ATP (*Adenosine Triphosphate*). Peningkatan

NADH akan meningkatkan tingginya proton mitokondria dan elektron akan ditransfer menuju oksigen, menghasilkan superoksida (O_2^-). Mitokondria superoksida ini akan meningkatkan sintesis diasilgliserol (DAG) dan protein kinase C (Tjay, 2007: 35). Melalui reaksi *non-enzimatic glycation*, glukosa dan bereaksi dengan protein membentuk AGE. Pada DM level AGE menjadi tinggi akibat dari hiperglikemia kronis. AGE dapat menghambat efek antiproliferasi dari nitrit oksida. Pada vaskuler, AGE berinteraksi dengan protein pada permukaan sel atau komponen matrik ekstrasel menghasilkan *cross-linked* protein, dimana akan meningkatkan pengerasan dari pembuluh arteri. AGE juga dapat memodifikasi protein plasma dan akan merubah aksi reseptor AGE pada sel seperti makrofag, endotel vaskular, dan sel otot halus menghasilkan ROS. AGE telah banyak dihubungkan dengan kejadian lesi aterosklerosis pada pasien diabetes (Erejuwa, 2012).

8. Penggolongan Obat Oral Anti Diabetik

a. obat-obat hipoglikemik Tradisional

Obat-obat yang paling berefek hipoglikemik antara lain adalah: buah okra (*Abelmoschus esculentus* (L.)), daun teh (*Camelia sinensis* L.), lidah buaya (*Aloe vera* L.), brotowali (*Tinospora trispa* L.), buncis (*Phageolus vulgaris* L.), pare (*Momordica charantia*), daun salam (*Syzigum polyantum*), sambiloto (*Andrographis paniculata*), alpukat (*Percea American*), mengkudu (*Morinda citrifolia*), tapak dara (*Vinca rosea*).

b. obat-obat hipoglikemik oral sintetis

Obat-obat hipoglikemik ini berguna dalam pengobatan pasien diabetes tidak tergantung insulin yang tidak dapat diperbaiki hanya dengan diet. Pasien yang

mungkin berespon terhadap obat hipoglikemik oral adalah mereka yang diabetesnya berkembang setelah berumur 40 tahun dan telah menderita diabetes kurang dari 5 tahun. Namun obat-obat hipoglikemik oral ini harusnya tidak diberikan pada penderita diabetes tipe 1. Obat-obat berefek hipoglikemik tersebut antara lain adalah :

- 1) Kelompok Sulfonilurea yaitu, tolbutamida, klorpropamida, tolazamida, glibenklamida, gliklazida, glinizida, dan glikidon bekerja dengan menstimulasi sel-sel beta dari pulau langerhans sehingga sekresi insulin ditingkatkan
- 2) Kelompok Biguanida: yaitu metmorfin, bekerja dengan menekan nafsu makan atau efek anoreksia. Sehingga berat badan tidak meningkat sehingga layak diberikan pada pasien over weigh.
- 3) Kelompok Glikosidase inhibitor: yaitu akarbose dan militol. Obat ini bekerja berdasarkan persaingan inhibisi enzim alfaglukosidase di mukosa duodenum sehingga reaksi penguraian terhambat.
- 4) Kelompok Thiazolidinedion yaitu troglitazon. Bekerja dengan menurunkan kadar glukosa dan insulin dengan jalan meningkatkan kepekaan bagi insulin dari otot, jaringan lemak dan hati.
- 5) Kelompok Miglitinida yaitu repaglinida. Bekerja dengan mekanisme khusus yakni mencetuskan pelepasan insulin dari pankreas segera sesudah makan. Ekspresinya cepat karena dalam waktu 1 jam sudah dikeluarkan oleh tubuh (Tan dan Rahardja, 2002: 693,695,701-708)

9. Glibenklamid

Glibenklamid adalah hipoglikemik oral derivat sulfonil urea yang bekerja aktif menurunkan kadar gula darah. Glibenklamid bekerja dengan merangsang sekresi insulin dari pankreas. Oleh karena itu glibenklamid hanya bermanfaat pada penderita diabetes dewasa yang pankreasnya masih mampu memproduksi insulin pada penggunaan per oral, sebagian glibenklamid di absorpsi ke cairan ekstrasel dan sebagian terikat dengan protein plasma. Pemberian glibenklamid dosis tunggal akan menurunkan darah selama 3 jam dan kadar ini dapat bertahan selama 15 jam. Glibenklamid dieksresikan bersama feses dan sebagai metabolit bersama urin. Glibenklamid menstimulasi sel-sel beta dari pulau langerhans pankreas sehingga sekresi insulin ditingkatkan. Di samping itu kepekaan sel-sel beta bagi kadar glukosa darah juga diperbesar melalui pengaruhnya atas protein transpor glukosa. Ada indikasi bahwa obat ini juga memperbaiki kepekaan organ tujuan bagi insulin dan menurunkan absorpsi oleh hati (Nurjannah,2010, 36).

10. Flavanoid

Flavonoid diketahui mampu berperan menangkap radikal bebas atau berfungsi sebagai antioksidan alami. Aktivitas antioksidan tersebut memungkinkan flavonoid untuk menangkap atau menetralkan radikal bebas (seperti ROS atau RNS) terkait dengan gugus OH fenolik sehingga dapat memperbaiki keadaan jaringan yang rusak dengan kata lain proses inflamasi dapat terhambat. Flavonoid juga memiliki efek penghambatan terhadap enzim alfa glukosidase melalui ikatan hidroksilasi dan substitusi pada cincin β . Prinsip penghambatan ini serupa dengan acarbose yang selama ini digunakan sebagai obat untuk penanganan diabetes mellitus, yaitu dengan

menghasilkan penundaan hidrolisis karbohidrat dan disakarida dan absorpsi glukosa serta menghambat metabolisme sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa.

D. *Penyarian*

Penyarian merupakan peristiwa pemindahan masa. Zat aktif yang semula berada di dalam sel, ditarik oleh cairan penyari sehingga terjadi larutan zat aktif dalam cairan penyari tersebut (DIRJEN POM, 1986: 2)

Secara umum proses penyarian pada sel yang dindingnya masih utuh, zat aktif larut pada cairan penyari untuk keluar dari sel, harus melewati dinding sel. Peristiwa osmosa dan difusi berperan pada proses penyarian tersebut (DIRJEN POM, 1986: 4).

1. Ekstraksi

Ekstrak merupakan sediaan pekat yang diperoleh dengan menarik zat aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut yang sesuai. Metode penarikan zat aktif ini berupa pemisahan senyawa di mana komponen-komponen terlarut dari suatu campuran dipisah dari komponen yang tidak larut dengan pelarut sesuai, sedangkan proses perpindahan massa zat aktif yang semula berada dalam sel yang ditarik oleh cairan penyari sehingga didapatkan zat aktif larut dalam penyari disebut dengan penyarian. Pembuatan ekstrak dimaksudkan agar zat berkhasiat yang terdapat di dalam simplisia terdapat dalam bentuk yang mempunyai kadar yang tinggi dan hal ini memudahkan zat berkhasiat tersebut dapat diatur dosisnya (Kar, 2003).

Pada dasarnya metode ekstraksi ada beberapa macam di antaranya yaitu maserasi (perendaman), perkolasi, digesti, infusi, dan dekoksifikasi. Ekstraksi dilakukan dengan pelarut organik dengan kepolaran yang semakin meningkat secara

berurutan. Pelarut yang digunakan harus memenuhi syarat tertentu yaitu tidak toksik, tidak meninggalkan residu, harga murah, tidak korosif, aman, dan tidak mudah meledak (Kar, 2003: 32).

Etanol adalah penyari yang bersifat universal yaitu dapat melarutkan senyawa polar maupun senyawa nonpolar. Etanol adalah senyawa yang mudah menguap, jernih (tidak berwarna), berbau khas, dan menyebabkan rasa terbakar pada lidah. Etanol mudah menguap baik pada suhu rendah maupun pada suhu mendidih (78°C), mudah terbakar, serta larut air, dan semua pelarut organik. Bobot jenis etanol tidak lebih dari 0,7964 (Voight, 1995: 54).

Etanol dipertimbangkan sebagai penyari karena lebih selektif dari pada air. Sukar ditumbuhi mikroba dalam etanol 20% ke atas. Memiliki beberapa kelebihan lain yaitu tak beracun, netral, absorpsi baik, bercampur dengan air pada segala perbandingan, memperbaiki stabilitas bahan obat terlarut, dan tidak memerlukan panas tinggi untuk pemekatan. Penggunaan etanol sebagai cairan penyari biasanya dicampur dengan pelarut lain, terutama campuran dengan air (Voight, 1995: 54).

2. Maserasi

Metode maserasi merupakan penyarian sederhana yang dilakukan dengan merendam simplisia dalam penyari yang sesuai selama beberapa hari dalam temperatur kamar dan terlindung cahaya. Maserasi digunakan untuk menyari komponen kimia simplisia yang mudah larut dalam penyari (Buckingham, 2006).

Maserasi umumnya dilakukan dengan cara memasukkan simplisia yang sudah diserbukkan dengan derajat halus tertentu sebanyak 10 bagian ke dalam bejana

maserasi, kemudian ditambahkan 75 bagian cairan penyari, ditutup, kemudian ditutup dan dibiarkan selama lima hari pada temperatur kamar terlindung dari cahaya sambil berulang-ulang diaduk. Setelah 5 hari, disaring ke dalam wadah penampung kemudian ampasnya diperas dan ditambah cairan penyari lagi secukupnya dan diaduk kemudian disaring lagi hingga diperoleh sari sebanyak 100 bagian. Sari yang diperoleh ditutup dan disimpan pada tempat yang terlindung dari cahaya selama 2 hari, endapan yang diperoleh dipisah dan filtrat dipekatkan (Buckingham, 2006 16).

3. Perkolasi

Perkolasi adalah ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru sampai sempurna (*exhaustive extraction*) yang umumnya dilakukan pada temperatur ruangan. Proses terdiri dari tahapan pengembangan bahan, tahap maserasi antara, tahap perkolasi sebenarnya (penetesan atau penampungan ekstrak), terus menerus sampai diperoleh ekstrak (perkolat) (Parameter, 2000).

4. Refluks

Refluks adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik didihnya, selama waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas yang relatif konstan dengan adanya pendingin balik. Umumnya dilakukan pengulangan proses pada residu pertama sampai 3-5 kali sehingga dapat termasuk proses ekstraksi sempurna.

5. Sokletasi

Sokletasi adalah metode ekstraksi untuk bahan yang tahan pemanasan dengan cara meletakkan bahan yang akan diekstraksi di dalam sebuah kantung ekstraksi (kertas saring) di dalam sebuah alat ekstraksi dari gelas yang bekerja kontinu (Voight, 1955).

6. Infus

Infus adalah ekstraksi dengan pelarut air pada temperatur penangas air (bejana infus tercelup dalam penangas air mendidih, temperatur terukur (96-98⁰C) selama waktu tertentu (15-20 menit) (Parameter, 2000).

E. Tanaman Obat dalam Pandangan Islam

Kehidupan manusia yang begitu kompleks akan terasa mudah dan ringan bila umat manusia berpegang teguh pada ajaran agama Islam. Peradaban Islam dikenal sebagai perintis dalam bidang farmasi. Para ilmuwan Muslim pada kejayaan Islam sudah berhasil menguasai riset ilmiah mengenai komposisi, dosis, penggunaan, dan efek dari obat-obat sederhana dan campuran. Selain menguasai bidang farmasi, masyarakat muslim pun tercatat sebagai peradaban pertama yang memiliki apotek atau toko obat (Masood, 2009: 7).

Dalam ilmu pengetahuan modern disebutkan bahwa Al-Qur'an memiliki beberapa tumbuhan yang dapat mencegah sampai menyembuhkan penyakit. Allah subhānahu wata'āla menyuruh manusia supaya memperhatikan keragaman dan keindahan di sertai dengan seruan agar merenungkan ciptaan-Nya yang menakjubkan

Obat setiap penyakit itu diketahui oleh orang yang ahli di bidang pengobatan, dan tidak diketahui oleh orang yang bukan ahlinya. Oleh karena itu Allah Swt menghendaki agar pengobatan itu dipelajari oleh ahlinya agar sesuai dengan penyakit yang akan diobati sehingga akan mendorong kesembuhan.

وَإِذَا مَرَضْتُ فَبُهِدْتُ

Terjemahnya:

“Dan apabila aku tertimpa sakit, maka Dialah yang menyembuhkan diriku.”
(Q.S. Asy Syu’ara / 26: 80).

Ayat tersebut menjelaskan kepada manusia untuk terus berusaha meski Allah swt yang menentukan hasilnya. Seperti dalam dunia kesehatan, jika penyakit datang dianjurkan untuk mencari pengobatan baik dengan obat tradisional maupun obat sintetik karena berobat adalah salah satu bentuk usaha untuk mencapai kesembuhan.

Islam menentang pengobatan versi dukun dan para tukang sihir atau pengobatan yang mengarah ke musyrikan. Sebaliknya islam sangat menghargai bentuk-bentuk pengobatan yang didasarkan oleh ilmu pengetahuan, penelitian eksperimen ilmiah dan hukum sebab akibat. Setiap apa yang diciptakan oleh-Nya kemudian diperuntukkan kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Ini bukan berarti bahwa manusia boleh dengan seenaknya atau semaunya menggunakan apa yang telah diciptakan-Nya itu melainkan untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Dalam Firman Allah SWT di dalam Q.S.asy-Syu’araa’(26): 7

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمَا أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ

Terjemahnya :

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik”
(Departemen Agama RI, 2002; 368).

Ayat ini membuktikan melalui uraiannya keniscayaan keesan Allah swt. Karena, aneka tumbuhan yang terhampar di muka bumi sedemikian banyak dan bermanfaat lagi berbeda-beda jenis rasa dan warna, namun keadannya konsisten. Itu semua tidak mungkin tercipta dengan sendirinya, pasti ada Penciptanya Yang Maha Esa lagi Mahakuasa. Di sisi lain, tanah yang gersang melalui hujan yang diturunkannya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. (Shihab volume 9, 2002; 189).

Dari ayat di atas, dapat dipahami bahwa Allah SWT senantiasa mengisyaratkan kepada manusia untuk mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan khususnya ilmu yang membahas obat yang berasal dari alam, baik dari tumbuh-tumbuhan, hewan maupun mineral. Dimana ketiganya telah dijelaskan didalam Al-Qur'an mengandung suatu zat / obat yang dapat digunakan untuk menyembuhkan manusia dari penyakit. Meskipun tidak semua tumbuhan yang diciptakan oleh Allah swt di bumi dapat menyembuhkan penyakit tertentu. Seperti pada tanaman buah Okra yang dapat digunakan dalam pengobatan Diabetes millitus Firman Allah swt yang terkait dengan pengobatan tradisional dapat dilihat dalam Q.S. an-Nahl (16) ; 69

ثُمَّ كُلِّي مِنْ كُلِّ الشَّمْرَاتِ فَاسْأَلِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ۗ تَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ
مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٩﴾

Terjemahnya :

“Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu), dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat

obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan” (Departemen Agama RI, 2002; 219).

Fihi syifa' linnas, di dalamnya terdapat obat penyembuhan bagi manusia dijadikan alasan oleh para ulama untuk menyatakan bahwa madu adalah obat bagi segala macam penyakit. Mereka juga menunjuk pada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa salah seorang sahabat Rasul SAW. Mengadu bahwa saudaranya sedang sakit perut. Rasul saw. Menyarankan agar memberinya minum madu. Saran Rasul saw. dia laksanakan, tetapi sakit perut saudaranya juga belum sembuh. Sekali lagi, sang sahabat mengadu dan sekali lagi juga Rasul SAW. menyarankan hal yang sama. Hal serupa berulang untuk ketiga kalinya, Rasul SAW. Kali ini bersabda:” Allah Maha benar, perut saudaramu berbohong. Beri minumlah ia madu.” Sang sahabat kembali memberinya madu dan kali ini ia sembuh. (HR. Bukhari dan Muslim melalui Abu Said al-Khudri). (Shihab volume 6, 2002; 649).

Banyak dokter menasihati pengidap penyakit diabetes –misalnya- untuk tidak mengonsumsi madu. Ini menunjukkan bahwa madu tidak menjadi obat penyembuhan untuk semua penyakit. Memang boleh saja yang dimaksud dengan kata *an-Nas/manusia* pada ayat di atas adalah sebagian manusia, bukan semuanya.(Shihab volume 6, 2002; 649).

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa telah dilakukan usaha pencarian obat oleh orang-orang terdahulu, seperti pada kisah yang ada pada hadits di atas. Selain itu, penggunaan satu macam jenis obat untuk mengobati segala macam penyakit,

seperti yang dijadikan landasan oleh para ulama pun kurang tepat. Hal ini jelas dalam penjelasan tafsir di atas. Dan juga Firman Allah swt dalam Q.S.al-A'raf (7) ; 31

كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

Terjemahnya :

“...Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan... (Departemen Agama RI,2002; 155).

Ayat ini mengajak untuk memakan makanan yang halal, enak, bermanfaat lagi bergizi, berdampak baik serta minumlah apa saja, yang kamu sukai selama tidak memabukkan tidak juga mengganggu kesehatan kamu dan janganlah berlebih-lebihan dalam segala hal, baik dalam beribadah dengan menambah cara atau kadarnya demikian juga dalam makan dan minum atau apa saja, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai, yakni tidak melimpahkan rahmat dan ganjaran bagi orang-orang yang berlebih-lebihan dalam hal apapun. (Shihab volume 4,2002;87).

Perintah makan dan minum, lagi tidak berlebih-lebihan, yakni tidak melampaui batas, merupakan tuntunan yang harus disesuaikan dengan kondisi setiap orang. Ini karena kadar tertentu yang dinilai cukup untuk seseorang, boleh jadi telah dinilai melampaui batas atau belum cukup buat orang lain. Atas dasar itu, kita dapat berkata bahwa penggalan ayat tersebut mengajarkan sikap proporsional dalam makan dan minum. (Shihab volume 4, 2002;87)

Berdasarkan ayat diatas, yang menjadi perhatian yaitu “ makan dan minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-

orang yang berlebihan”. Hiperglikemia merupakan salah satu kelainan yang sangat erat kaitannya dengan sistem metabolisme. Sebagai dampak adanya pergeseran perilaku pola konsumsi gizi makanan. Hiperglikemia bisa disebabkan karena pola konsumsi makanan yang berlebih-lebihan, misalnya banyak mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung gula. Oleh karena itu, pola makan dan minum harus di jaga.

Beragam cara yang digunakan masyarakat untuk berobat, dan salah satunya adalah dengan memanfaatkan tumbuh-tumbuhan karena selain murah juga efek samping yang ditimbulkan juga sangat jarang. Olehnya itu para peneliti mulai bermunculan untuk melakukan penelitian terhadap tumbuh-tumbuhan yang biasanya bermanfaat sebagai obat. Apalagi mengingat negara kita yang kaya akan tumbuh-tumbuhan yang mengandung obat.

Dalam penelitian ini, maka ditemukan spesies tanaman buah okra (*Abelmoschus esculentus* (L.) sebagai penurun kadar glukosa darah yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh manusia.

Di samping itu, bahan-bahan tradisional juga bisa digunakan sebagai obat, karena memang sudah turun-temurun digunakan oleh masyarakat dan biasa dimanfaatkan dalam kehidupan rumah tangga. Misalnya kunyit, temulawak, daun sirih, kayu manis, cengkeh, buah mengkudu dan lain sebagainya. Bahan-bahan seperti ini mudah ditanam sebagai tanaman obat keluarga yang memang dipersiapkan untuk anggota keluarga. Semua yang diciptakan Allah Swt memiliki manfaat, termasuk tumbuh-tumbuhan. Untuk pemanfaatan tumbuhan tersebut, diperlukan ilmu dan

pengalaman (teoritis dan empiris) dengan penelitian dan eksperimen. Salah satunya dalam pemanfaatannya sebagai obat.

Bila ditinjau kembali tentang hukum mempelajari ilmu pengobatan tradisional bahwa para ahli pengobatan tradisional dari masa ke masa telah bereksperimen terhadap obat-obatan. Mereka merujuk dari berbagai buku medis yang disusun para pakar pengobatan. Ini termasuk satu cabang ilmu di antara berbagai ilmu lainnya.

Mereka mengetahui sediaan obat dan penggunaannya. Diiringi keyakinan bahwa obat hanya penyebab perantara kesembuhan, sebab Allah satu-satunya yang menjadikan semua yang ada di alam semesta (Ar-Rumaikhon, 2008: 15).



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis Faul Recory Kuantitatif yang bersifat eksperimental laboratorik, dengan melakukan ekstraksi sampel buah okra (*Abelmoschus esculentus* L.) menggunakan etanol. Kemudian diamati potensi Anti Diabetes dari ekstrak buah okra (*Abelmoschus esculentus* L.) terhadap penurunan kadar glukosa darah.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Biologi farmasi dan Laboratorium Farmakologi Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental di laboratorium, yaitu penelitian yang menguraikan atau menggambarkan suatu keadaan dalam suatu fenomena yang belum pernah dilaporkan sebelumnya.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi ini diambil dari kecamatan woha, kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat.

2. Sampel

Sampel penelitian ini adalah buah okra (*Abelmoschus esculentus* L.)

D. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi. Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap proses yang sedang berlangsung.

E. Instrumen Penelitian

1. Alat

Cawan porselen, gelas erlenmeyer 100 ml (pyrex[®]), glukometer(*East touch*[®]), gelas kimia (pyrex[®]), gelas ukur (pyrex[®]), jarum oral, kompor listrik, labu tentukur, penangas, pengaduk elektrik, rotary evaporation(*KIA*[®]), timbangan hewan analitik (*Kern ALJ 220-4 NM*).

2. Bahan

Air suling, aluminium foil, glukosa, buah okra (*Hibiscus esculentus* L.), etanol 70%, larutan koloidal NaCMC 1%, tablet glibenklamid 0,02 mg/30 g BB menciit.

F. Prosedur Uji Anti Diabetes

1. Penyiapan Sampel

a. Pengambilan Sampel

Buah okra (*Abelmoschus esculentus* L.) Diperoleh di Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Pengambilan sampel dilakukan pada pagi hari jam 09.00-10.00. Diambil buahnya yang masih muda berukuran sedang dan panjangnya kira kira 10-15 cm. Buahnya di petik seminggu setelah bunganya mekar.

b. Pengolahan Sampel

Buah okra (*Abelmoschus esculentus* L.) yang telah diambil dicuci bersih dengan air mengalir, dipotong kecil-kecil dan dikeringkan tanpa sinar matahari. Lalu diekstraksi menggunakan etanol 70 %

2. Ekstraksi

Simplisia buah okra (*Abelmoschus esculentus* L.) ditimbang sebanyak 500 g dimasukkan dalam wadah maserasi, kemudian ditambahkan etanol 70% hingga simplisia terendam. Wadah maserasi ditutup dan disimpan selama 24 jam di tempat yang terlindung sinar matahari langsung sesekali diaduk. Selanjutnya disaring, dipisahkan antara ampas dan filtratnya. Ampas diekstraksi kembali dengan etanol 70% yang baru dengan jumlah yang sama. Hal ini dilakukan selama 3×24 jam. Ekstrak etanol yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan diupkan cairan penyarinya sampai diperoleh ekstrak etanol kental.

3. Penyiapan Hewan Uji

Hewan yang digunakan adalah mencit putih jantan dengan bobot sekitar 20-30 gram. Mencit yang digunakan harus sehat dan belum pernah mengalami suatu perlakuan. Sebelum dilakukan penelitian, hewan yang diuji hendak dipakai dalam penelitian harus diadaptasikan dulu selama seminggu dengan kondisi lingkungan, makanan dan minuman yang sama. Hewan uji dipuaskan dulu selama 8-12 jam sebelum digunakan. Mencit yang digunakan sebanyak 15 ekor, dibagi dalam 5 kelompok perlakuan dimana masing-masing kelompok terdiri dari 3 ekor mencit

jantan. Kemudian masing-masing ditimbang berat badannya dan tiap 3 ekor hewan uji disimpan dalam 1 kandang.

4. Pembuatan Larutan Koloidal NaCMC 1%

Sebanyak 1 g NaCMC dimasukkan sedikit demi sedikit kedalam 50 ml air suling diaduk dengan pengaduk elektrik hingga terbentuk larutan koloidal. Volumennya dicukupkan dengan air suling hingga 100 ml.

5. Pembuatan Suspensi Glibenklamid 0,002%

Tablet glibenklamid ditimbang sebanyak 20 tablet, kemudian dihitung bobot rata-rata tiap tablet. Setelah itu semua tablet glibenklamid dimasukkan kedalam lumpang dan digerus hingga halus sampai homogen. Kemudian ditimbang setara dengan 2 mg serbuk glibenklamid. Dimasukkan kembali kedalam lumpang lalu ditambahkan sedikit demi sedikit larutan koloidal NaCMC 1% b/v sambil diaduk hingga homogen. Hasilnya dimasukkan ke dalam labu tentukur 100 ml dan dicukupkan volumenya menggunakan larutan koloidal NaCMC 1% b/v hingga 100 ml.

6. Pembuatan Larutan Glukosa 20 %

Glukosa sebanyak 20 g di larutkan ke dalam 100 ml aquadest sambil diaduk hingga terbentuk larutan yang homogen.

7. Pemilihan Dan Penyiapan Hewan Uji

Hewan uji yang digunakan adalah mencit putih jantan (*Mus musculus*) yang sehat dengan bobot badan 20-30 g sebanyak 15 ekor dibagi dalam 5 kelompok terdiri atas 3 ekor.

8. Perlakuan Terhadap Hewan Uji

Sebelum perlakuan, mencit dipuaskan selama 8 jam kemudian diberi larutan glukosa secara oral 60 menit kemudian di ambil darahnya melalui ekor lalu ukur kadar glukosa darah awal.

Kelompok I sebagai kontrol negatif diberikan NaCMC 1%, kelompok 2 diberi sediaan pembanding yaitu suspensi glibenklamid 0,002% b/v. Kelompok 3-5 diberi sediaan ekstrak etanol buah okra (*Abelmoschus esculentus* L.) dengan dosis ekstrak secara berturut-turut 42 mg/30gBB mencit, 84mg/30gBB mencit dan 168 mg / 30gBB mencit

Bahan diberikan secara dosis tunggal sebanyak 1 ml/30 g BB masing-masing mencit. Setelah itu setiap 15, 30, 45, 60 menit dilakukan pengukuran kadar glukosa darah mencit dengan menggunakan glukometer.

9. Penentuan Kadar Glukosa Darah Mencit

Glukometer dikalibrasi dengan menggunakan kunci kode strip kemudian strip dipasang pada alat tersebut. Darah diambil melalui pembuluh darah vena pada ujung ekor mencit jantan kemudian diteteskan pada strip glukometer dan secara otomatis kadar glukosa darah mencit akan terukur dan hasilnya dapat dibaca pada monitor glukometer.

G. Pengolahan Dan Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara statistika dengan menggunakan rancangan acak kelompok

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Tabel 1. Hasil Penelitian Pengaruh Pemberian Na.CMC 1%, Ekstrak etanol buah Okra (*Abelmoschus esculentus* L) 42 mg/30 g BB; 84 mg/30 g BB; 168 mg/30 g BB, dan Suspensi Glibenklamid 0,02 mg/30 g BB.

No	Perlakuan	Kadar Glukosa Darah (mg/dl)	Glukosa Awal	Persentase Penurunan rata-rata Kadar Glukosa (%)			
				Menit ke 15	Menit ke 30	Menit ke 45	Menit ke 60
1.	Na.CMC 1%	207,33		203	198,66	193	188,33
2.	Ekstrak etanol buah okra (<i>Abelmoschus esculentus</i> L) 42mg /30 g BB	241,33		142,67	113	85,67	76,67
3.	Ekstrak etanol buah okra (<i>Abelmoschus esculentus</i> L) 84 mg /30 g BB	234		139,33	115	88,33	74,33
4.	Ekstrak etanol buah okra (<i>Abelmoschus esculentus</i> L) 168mg/30 g BB	222,33		145,33	110,67	93,67	75,33
5.	Suspensi Glibenklamid 0,02 mg/30 g BB	215,33		136,33	112,66	88,33	74,66

B. Pembahasan

Diabetes Melitus adalah suatu gejala penyakit metabolik sebagai akibat kekurangan insulin baik karena disfungsi pankreas (pankreas tidak mampu memproduksi insulin) ataupun disfungsi insulin absolut (pankreas masih mampu memproduksi insulin tapi tidak aktif).

Pengujian efek Anti Diabetes dalam penelitian ini dilakukan secara enzimatik dengan menggunakan metode toleransi glukosa oral dan pengukuran kadar glukosa darah dengan prinsip kerja glukometer yang menggunakan metode elektrokimia, yaitu berdasarkan pada pengukuran potensial (daya listrik) yang disebabkan oleh reaksi dari glukosa dengan bahan pereaksi glukosa pada elektrode strip. Sampel darah diserap masuk ke dalam ujung strip uji berdasarkan reaksi kapiler. Apabila darah mengisi ruang reaksi pada strip uji, kalium ferisianida diuraikan dan glukosa sampel dioksidasi oleh enzim glukosa oksidase. Menyebabkan penurunan bilangan oksidasi (kalium heksasianoferat (III) menjadi kalium heksasianoferat (II)). Aplikasi jumlah voltase yang konstan dari meteran mengoksidasi kalium heksasianoferat (II) kembali pada kalium heksasianoferat (III), dan memberikan elektron. Elektron yang di hasilkan untuk menimbulkan arus sebanding dengan kadar glukosa pada sampel. Setelah waktu 10 detik konsentrasi glukosa dalam sampel di tayangkan pada layar monitor. Penelitian ini dilakukan untuk melihat efek Anti Diabetes ekstrak etanol buah Okra (*Abelmoschus esculentus* L) pada hewan coba yang digunakan yaitu mencit (*Mus Musculus*). Adapun dosis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 42 mg/kgBB, 84mg/kgBB dan 168mg/kgBB mencit. Selain itu juga

digunakan juga 2 kelompok hewan coba untuk kontrol, yaitu kontrol positif dan kontrol negatif.

Sebagai kontrol positif digunakan Glibenklamid yang merupakan obat antidiabetes oral golongan sulfonilurea. Glibenklamid memiliki efek hipoglikemik yang kuat dengan dosis yang rendah bekerja dengan menstimulasi sel-sel beta dari pulau langerhans sehingga sekresi insulin ditingkatkan. Kontrol positif ini digunakan dengan maksud untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang penurunan kadar glukosa darah. Glibenklamid disuspensikan dengan Na.CMC 1% karena sifatnya yang praktis tidak larut dalam air.

Hewan uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencit jantan karena memiliki sistem hormonal yang lebih stabil dibanding mencit betina yang mana memiliki kadar glukosa darah lebih tinggi pada saat hamil, sebab terjadi peningkatan hormon hiperglikemik. Selain itu kebutuhan nutrisi pada saat hamil meningkat sehingga glukosa yang dihasilkan lebih banyak dibandingkan pada saat tidak hamil sehingga dapat mempengaruhi hasil penelitian.

Sebelum perlakuan mencit di puasakan terlebih dahulu selama 8 jam. Hal ini di maksudkan untuk menghindari pengaruh makanan pada saat dilakukan pengukuran glukosa darah.

Hewan uji yang dipuasakan di ukur kadar glukosa darah awalnya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kadar glukosa darah mencit sebelum diberi perlakuan lebih lanjut. Larutan glukosa 20 g/30 g BB diberikan pada mencit 60 menit sebelum

pemberian sediaan uji yang bertujuan untuk menaikkan kadar glukosa darah yang merupakan kadar glukosa awal, sehingga kemampuan menurunkan glukosa darah dari sediaan uji dapat diamati. Dalam penelitian ini kadar glukosa darah mencit diukur dengan interval waktu 15, 30, 45, 60 menit menggunakan glukometer. Yang dimana cuplikan darah mencit yang dijadikan sampel diambil melalui ujung ekor mencit yang dilukai.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh hasil rata-rata kadar glukosa darah mencit untuk tiap perlakuan yang diukur setiap sebelum diberi perlakuan serta setiap menit 15, 30, 45, 60 menit yaitu untuk kontrol negatif yang di beri induksi NaCMC masing-masing sebesar 207,33 mg/dl, 203 mg/dl, 198,66 mg/dl, 193 mg/dl, 188,33 mg/dl. Untuk kelompok hewan coba yang di induksi ekstrak etanol buah okra 42 mg/kgBB masing-masing sebesar 241,33 mg/dl, 142,67 mg/dl, 113 mg/dl, 85,67 mg/dl, 76,67 mg/dl,. Untuk kelompok hewan coba yang di induksi ekstrak etanol buah okra 84 mg/kgBB masing masing sebesar 234 mg/dl, 139,33 mg/dl, 115 mg/dl, 88,33 mg/dl, 74 mg/dl. Untuk kelompok hewan coba yang di induksi ekstrak etanol buah okra 168 mg/kgBB masing masing sebesar 222,33 mg/dl, 145,33 mg/dl, 110,67 mg/dl, 93,67 mg/dl, 75,33 mg/dl. Untuk kelompok hewan coba yang di induksi suspensi glibenklamid 0,02 mg/30 gBB masing masing sebesar 215 mg/dl, 136,33 mg/dl, 112,66 mg/dl, 88,33 mg/dl, 74,66 mg/dl

Dari hasil yang telah dipaparkan di atas, dapat dilihat bahwa semua dosis ekstrak yang diinduksikan pada hewan coba ternyata memberi efek mampu

menurunkan kadar glukosa darah serta dapat mengembalikan kadar glukosa darah seperti kadar glukosa awal, bahkan lebih rendah. Hal ini dapat dilihat penggambarannya pada grafik perubahan kadar glukosa darah. Jika ketiga kelompok perlakuan kelompok dibandingkan dengan kelompok kontrol positif, akan terlihat kemiripan pergerakan perubahan kadar glukosa darah menjadi turun. Seperti pada data tersebut juga dapat dilihat bahwa pada menit ke 45 terlihat penurunan persentase kadar glukosa darah mencit yang sama antara dosis 84 mg dan glibengklamid,

Hasil analisis statistika dengan menggunakan RAK (Rancangan Acak Kelompok) pada perlakuan hewan uji sebanyak 4 kali perlakuan dengan interval waktu 15, 30, 45, 60 menit, memperlihatkan perbedaan yang sangat nyata. Hal ini dapat dilihat pada tabel ANAVA dimana nilai F hitung $>$ F table pada taraf 5% dan $<$ 1%.

Setelah itu digunakan uji BNT untuk melihat perbedaan antar perlakuan. Dari hasil uji BNT ini, ditemukan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara ketiga konsentrasi ekstrak terhadap kontrol positif, namun terdapat perbedaan yang signifikan antara ekstrak dan kontrol positif terhadap kontrol negatif. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ekstrak 42 mg/30gBB, 84 mg/30gBB, serta 168 mg/30gBB mempunyai efek yang sama terhadap glibenklamid, namun berbeda terhadap Na CMC sebagai kontrol negatif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka disimpulkan bahwa:

1. Ekstrak etanol buah okra (*Abelmoschus esculentus* L.), mampu menurunkan kadar glukosa darah mencit (*Mus musculus*) yang di induksi glukosa.
2. Didapatkan dosis optimum ekstrak etanol buah okra (*Abelmoschus esculentus* L.), yakni 42 mg, 84 mg dan 168 mg yang setara dengan dosis pembandingnya (glibenklamid) yang menunjukkan adanya efek penurunan glukosa darah.
3. Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya yang ada di muka bumi ini, sehingga manusia dapat memanfaatkan segala jenis ciptaan Allah, seperti buah okra yang dapat di manfaatkan untuk menurunkan kadar glukosa darah.

B. Saran

1. Diharapkan penambahan bahan di lengkapi di laboratorium untuk membantu lancarnya penelitian.
2. Saran untuk peneliti selanjutnya diharapkan ada yang melanjutkannya ketahap formulasi karena telah di dapatkan bahwa ekstarak etanol buah okra dengan dosis 42 mg, 84 mg, dan 168 mg dapat menurunkan kadar glukosa darah mencit.
3. Sebagai seorang muslim diharapkan dapat dikaji kembali bagaimana potensi buah okra dalam pengobatan diabetes millitus menurut pandangan islam.

KEPUSTAKAAN

AL-Qur'an

ADA. 2011. "*Diagnosis and classification of diabetes militus*": diabetes.org.

Ashar, nurjannah, A. 2010. "*uji efektivitas penurunan kadar glukosa darah seduhan gabungan teh-hitam dan teh hijau pada mencit (Mus musculus) dengan induksi aloksan*". Skripsi sarjana S1 pada FIKES UNAIM: tidak diterbitkan.

Bustan. M. N. 2007. "*Epidemiologi penyakit tidak menular*". Jakarta: Rineka cipta.

Departemen Agama republik Indonesia.2008."*Al-Qura'nul-Karim Al-Hadis Al-Nabawi*".Bandung:CV.Penerbit J-ART.

Departemen Agama republik Indonesia.2005."*Al-Qur'an dan Terjemahannya*".Bandung:CV.Penerbit Diponegoro.

Dirjen POM. 1986."*Sediaan Galenik*"Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Dr. Ir. Kemas Ali Hanafiah,M.S.. 2012. "*Rancangan Perobaan*". Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya Palembang

Erejuwa,o.o, Sulaiman, S.A, dkk. 2012. "*honey a novel antidiabetic agen*" :Int J Biol Sci.

Fauci Anthony, Eugene Braunwald,dkk. 2008. "Horrison's principles of internal medicine 17th editor": MC graw-hill.

Grover, J.K. dan Yadan S.P. 2002. "Medicinal Plants of India With antidiabetic potensial" *Journal of Ethnopharmacology*

Gunawan, Sulistia Gan.(Edt). 2007."*Farmakologi dan Terapi*". Jakarta: Universitas Indonesia.

G.V. Subrahmanyam, M. Sushma, dkk. 2011. "*Activity of abelmoschus esculentus fruit extract*". India: Vishwabharthi College of Pharmaceutical Sciences.


- Hingkua, Selly,O. 2004. “*Penelusuran Senyawa Antidiabetes Dari Biji Alpukat (Persea americana MILL)*”. Skripsi Sarjana S1 pada FMIPA UNIMA TONADO Manado: tidak diterbitkan.
- Kar, Ajit. *Et al.* 2003. “Comparative Evaluation of Hypoglycaemic Activity of Some Indian Meicinal Plants 45 AlloxanDiabetic Rat”. *Journal of Ethnopharmacology*.
- Malole M.B.M dan Pramono. 1988. “*penggunaan hewan-hewan percobaan di laboratorium*”. Bogor: IPB.
- Mulyati rahayu dan Diah sulistiarini. 2008. “*ilmuetnobotani ‘ hoinu’ abelmoschusesculentus (l.) moench. : pemanfaatan,prospek dan pengembangannya, di sulawesitenggara*”. Jakarta: Lembaga ilmu pengetahuan Indonesia.
- Perkeni. 2011. “*pengolahan dan pencegahan diabetes militus tipe 2 di Indonesia: perkumpulan endikronologi Indonesia*”.
- Ririn chairunisa. 2012. “*Pengaruh jumlah pasta tomat terhadap penurunan kadar gula darah pada mencit diabetes* ”.Fakultas Teknologi Industri Pertanian, PASCA UNAND
- Santoso, Mardi. 2008. “*Penyakit Kencing Manis dan Penanganannya Kini*”. Seputar Indonesia
- Shangjie fan. Yuz hang, dkk. 2014. “*Ekstract of okra lowers blood glucose and serum lipid in high-fat-diet-induced obese C57BL/6 mice* ”.*Journal of Nutritional Biochemistry*.
- Shaw.J.E, Sictree RA, dkk. 2010. “*global estimates the estimates of the prevalence of diabetes for 2010 and 2030*”: Diabetes Research and Clinical Practice.
- Shihab, M.Q. 2002. “*Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*”. Jakarta: Penerbit Lentera Hati
- Soegondo, Sidartawan dan Sukardji, Kartini. 2008. “*Hidup secara mandiri dengan Diabetes Melitus;Kencing manis;Sakit gula*”. Jakarta: Fakultas Kedokteran UniversitasIndonesia.

- Sri peni, leni Purwanto. 2012. “*uji efek hipoglikemik ekstrak air kulit buah pisang ambon putih MSA (AAA GROUP) terhadap mencit model hiperglikemik galur swisswebster*”. Bandung: FMIPA UNISBA.
- Stryer L, alih bahasa Sadikin Mohamad dkk. 2000. “*Glikolisis*”. Dalam: Biokimia. Jakarta : EGC,
- Syaniyah, Najah. 2014. “*Faktor resiko kejadian diabetes mellitustipe 2 pada wanita di puskesmas kecamatan pesanggrahan jakarta selatan tahun 2014*”. Jakarta: UIN SYARIF HIDAYAHTULLAH
- Tandra, Hans.2008. “*Segala sesuatu yang harus anda ketahui diabetes*”. Jakarta: PT Gramedia pustaka utama.
- Tjay, T.H., dan Rahardja, K. 2002. “*Obat-Obat Penting, Khasiat, Penggunaan dan Efek-efek Sampingnya. Edisi VI*”. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Tjay. H.T dan Rahardja, Kirana. 2003.“*Obat-Obat Penting*”.Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Togobu, Sariyana. Dkk. 2013. “*Aktifitas antihiperglikemik dari ekstrak etanol dan heksana tumbuhan suruhan (Peperomia pellucida (L.) Kunth) pada tikus wistar (Rattus norvegicus L) yang hiperglikemik*”. Manado: FMIPA UNSTRAT.
- Udoamaka F. Ezuruike dan Jose M. Pretio. 2014. “*The use of plants in the traditional management of diabetes in Nigeria: Pharmacological and toxicological considerations*” *Journal of Ethnopharmacology*.
- Voight, Rudolf. 1995. “*Buku Pelajaran Teknologi Farmasi*”. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.


Lampiran 1
Skema Pembuatan Simplisia



Skema cara kerja



Skema Perlakuan Pada Mencit



Lampiran 2

PERHITUNGAN DOSIS

A. Perhitungan Dosis Pemberian Glibenklamid

1. konversi dosis manusia (70 kg) ke mencit (30 kg)

Konversi dosis mencit dan manusia	: 0,005 g = 5 mg
Faktor konversi untuk mencit	: 0,0026 dengan bobot 20 g
Dosis mencit 20 g	: $5 \text{ mg} \times 0,0026 = 0,013 \text{ mg}$
Volume pemberian untuk	: 1 ml untuk 30 g BB mencit
Dosis untuk mencit 30 g	: $\frac{30 \text{ g}}{20 \text{ g}} \times 0,013 \text{ mg} = 0,0195 \text{ mg}$
Dibuat stok sebanyak 100 ml	: 100 ml
Jumlah glibenklamid yang dibuat	: $0,0195 \text{ mg} \times 100 \text{ ml} = 1,95 \text{ mg}$
setara 2 mg untuk 100 ml = 0,002 g/ 100 ml = 0,002%	

2. Penyediaan sediaan glibenklamid

Perhitungan glibenklamid yang setara dengan 2 mg

- Berat rata-rata tablet : (x)
- Berat yang ditimbang : $\frac{2 \text{ mg}}{5 \text{ mg}} \times x \text{ mg} = (Xx) \text{ mg}$

Jadi untuk mendapatkan glibenklamid 2 mg ditimbang bobot tablet sebanyak

(x) mg yang disuspensikan hingga 100 ml menggunakan NaCMC

B. Perhitungan Dosis Ekstrak Etanol Buah Okra

Dosis buah okra pada tikus 200 mg

Dosis tikus 200 mg/ 200 g BB

Faktor konversi tikus ke mencit 20 g = 0,14

$$\begin{aligned} \text{Dosis mencit awal} &: DT \times FK \times 30 \text{ g} / 20 \text{ g} \\ &: 200 \text{ mg} \times 0,14 \times 30 \text{ g} / 20 \text{ g} \\ &: 42 \text{ mg} / 30 \text{ g BB} \end{aligned}$$

1. Untuk kelompok I

Kelompok I diberikan dosis yang sama dengan dosis awal mencit

$$\begin{aligned} \text{Dosis mencit I} &= \text{dosis awal mencit} \\ &= 42 \text{ mg} \end{aligned}$$

2. Untuk kelompok II

Kelompok II di berikan 2 kali dari dosis awal mencit

$$\begin{aligned} \text{Dosis mencit 2} &: 2 \times 42 \text{ mg} / 30 \text{ g BB} \\ &: 84 \text{ mg} / 30 \text{ g BB} \end{aligned}$$

3. Untuk kelompok III

Kelompok III di berikan 4 kali dari dosis awal mencit


$$\begin{aligned} \text{Dosis mencit 3} &: 4 \times 42 \text{ mg} / 30 \text{ g BB} \\ &: 168 \text{ mg} / 30 \text{ g} / \text{BB} \end{aligned}$$

C. Perhitungan Dosis dan Pemberian NaCMC 1%

$$\text{NaCMC 1\%} = \frac{1 \text{ g}}{100 \text{ ml}}$$

D. Perhitungan Dosis dan Pemberian Glukosa 20%

$$\text{Glukosa} = \frac{20 \text{ g}}{100 \text{ ml}}$$



Lampiran 3

Tabel 2. Data kadar glukosa darah mencit yang di beri NaCMC

Mencit	Kadar Glukosa Darah (mg/dl)					
	Normal	Awal	Setelah menit ke			
			15	30	45	60
I	62-175/dl	220	214	210	200	194
II		200	197	194	190	188
III		202	198	192	189	183
Jumlah		622	609	596	579	565
Rata-rata		207,33	203	198,66	193	188,33

Tabel 3 Data kadar glukosa darah mencit yang diberi ekstrak etanol Buah Okra 42 mg/30 g BB

Mencit	Kadar Glukosa Darah (mg/dl)					
	Normal	Awal	Setelah menit ke			
			15	30	45	60
I	62-175/dl	200	136	121	77	70
II		202	131	92	80	77
III		322	161	126	100	83
Jumlah		724	428	339	257	230
Rata-rata		241,33	142,67	113	85,67	76,67

Tabel 4. Data kadar glukosa darah mencit yang diberi ekstrak etanol Buah Okra 84 mg/30 g BB

Mencit	Kadar Glukosa Darah (mg/dl)					
	Normal	Awal	Setelah menit ke			
			15	30	45	60
I	62-175/dl	202	140	120	85	70
II		240	148	125	90	83
III		260	130	100	90	70
Jumlah		702	418	345	265	223
Rata-rata		234	139,33	115	88,33	74,33

Tabel 5. Data kadar glukosa darah mencit yang diberi ekstrak etanol Buah Okra 168 mg/30 g BB

Mencit	Kadar Glukosa Darah (mg/dl)					
	Normal	Awal	Setelah menit ke			
			15	30	45	60
I	62-175/dl	238	186	145	115	87
II		251	162	105	87	71
III		178	88	82	79	68
Jumlah		667	436	332	281	226
Rata-rata		222,33	145,33	110,67	93,67	75,33

Tabel 6. Data kadar glukosa darah mencit yang diberi suspensi glibenklamid 0,02 mg/30 g BB

Mencit	Kadar Glukosa Darah (mg/dl)					
	Normal	Awal	Setelah menit ke			
			15	30	45	60
I	62-175/dl	202	129	100	88	70
II		207	140	124	91	79
III		237	140	114	86	75
Jumlah		646	409	338	265	224
Rata-rata		215,33	136,33	112,66	88,33	74,66

Lampiran 4

Tabel 7. Pengaruh pemberian Na.CMC 1%, ekstrak etanol buah okra 42 mg/30 g BB, 84 mg/30 g BB, 168 mg/30 g BB dan suspensi glibenklamid 0,02 mg /30 g BB.

a. Pada menit ke – 15

No	Perlakuan	Kadar glukosa darah rata-rata (mg/dl)		Penurunan kadar glukosa darah (mg/dl)	Penurunan kadar glukosa darah (%)
		Awal	menit ke 15		
1	Na.CMC 1%	207,33	203	4,33	2,08
2	Ekstrak etanol buah okra 42 mg	241,33	142,66	98,67	40,88
3	Ekstrak etanol buah okra 84 mg	234	139,33	94,67	40,45
4	Ekstrak etanol buah okra 168 mg	222,33	145,33	77	34,63
5	Suspensi glibenklamid 0,02 mg	215,33	136,33	62,67	36,68

Tabel 8. Pengaruh pemberian Na.CMC 1%, ekstrak etanol buah okra 42 mg/30 g BB, 84 mg/30 g BB, 168 mg/30 g BB dan suspensi glibenklamid 0,02 mg /30 g BB.

b. Pada menit ke-30

No	Perlakuan	Kadar glukosa darah rata-rata (mg/dl)		Penurunan kadar glukosa darah (mg/dl)	Penurunan kadar glukosa darah (%)
		Awal	menit ke 30		
1	Na.CMC 1%	207,33	198,66	8,67	4,18
2	Ekstrak etanol buah okra 42 mg	241,33	113	128,33	53,17
3	Ekstrak etanol buah okra 84 mg	234	115	119	50,85
4	Ekstrak etanol buah okra 168 mg	222,33	110,66	111,67	50,22
5	Suspensi glibenklamid 0,02 mg	215,33	112,66	102,7	47,68

Tabel 9. Pengaruh pemberian Na.CMC 1%, ekstrak etanol buah okra 42 mg/30 g BB, 84 mg/30 g BB, 168 mg/30 g BB dan suspensi glibenklamid 0,02 mg /30 g BB.

c. Pada menit ke-45

No	Perlakuan	Kadar glukosa darah rata-rata (mg/dl)		Penurunan kadar glukosa darah (mg/dl)	Penurunan kadar glukosa darah (%)
		Awal	menit ke 45		
1	Na.CMC 1%	207,33	193	14,33	6,91
2	Ekstrak etanol buah okra 42 mg	241,33	85,66	155,67	64,50
3	Ekstrak etanol buah okra 84 mg	234	88,33	145,67	62,25
4	Ekstrak etanol buah okra 168 mg	222,33	93,66	128,67	57,87
5	Suspensi glibenklamid 0,02 mg	215,33	88,33	127	58,97

Tabel 10. Pengaruh pemberian Na.CMC 1%, ekstrak etanol buah okra 42 mg/30 g BB, 84 mg/30 g BB, 168 mg/30 g BB dan suspensi glibenklamid 0,02 mg /30 g BB.

d. Pada menit ke-60

No	Perlakuan	Kadar glukosa darah rata-rata (mg/dl)		Penurunan kadar glukosa darah (mg/dl)	Penurunan kadar glukosa darah (%)
		Awal	menit ke 60		
1	Na.CMC 1%	207,33	188,33	19	9,16
2	Ekstrak etanol buah okra 42 mg	241,33	76,66	164,67	68,23
3	Ekstrak etanol buah okra 84 mg	234	74,33	159,67	68,23
4	Ekstrak etanol buah okra 168 mg	222,33	75,33	147	66,11
5	Suspensi glibenklamid 0,02 mg	215,33	104,66	140,67	65,32

- Ket:
- A1 = Na.CMC 1%
 - A2 = Ekstrak etanol buah okra 42 mg
 - A3 = Ekstrak etanol buah okra 84 mg
 - A4 = Ekstrak etanol buah okra 168 mg
 - A5 = Suspensi glibenklamid 0,02 mg
 - B0 = Kadar glukosa darah awal
 - B1 = Kadar glukosa darah pada menit ke 15
 - B2 = Kadar glukosa darah pada menit ke 30
 - B3 = Kadar glukosa darah pada menit ke 45
 - B4 = Kadar glukosa darah pada menit ke 60
 - DB = Derajat Bebas
 - JK = Jumlah Kuadrat
 - S = Signifikan
 - NS = Non Signifikan
 - ΣX = Jumlah rata-rata
 - \bar{X} = Rata-rata

Lampiran 6.

1. Perhitungan Anava

$$\text{Faktor Koreksi (FK)} = \frac{T_{ij}^2}{k \times t \times r} = \frac{(10765)^2}{75} = 1.545.136$$

$$\begin{aligned} \text{JK Total} &= T(Y_{ij}^2) - \text{FK} \\ &= (220^2 + 200^2 + 202^2 + \dots + 75^2) - 1.545.136 \\ &= 251.586 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{JK (Kelompok)} &= \frac{\sum(\sum y_j^2)}{RB} - \text{FK} \\ &= \frac{(3361^2 + 2300^2 + \dots + 1468^2)}{15} - 1.545.136 \\ &= 1.683763 - 1.545.136 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{JK (Perlakuan)} &= \frac{\sum(\sum y_j^2)}{RA} - \text{FK} \\ &= \frac{(2971^2 + 1978^2 + \dots + 1921^2)}{15} - \text{FK} \\ &= 1.591.121 - 1.545.136 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Jumlah Kuadrat Galat} &= \text{JK Total} - \text{JK kel} - \text{JK per} \\ &= 251.586 - 138.627 - 45.986 \\ &= 66.973 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Derajat Bebas Total (dbt)} &= (k \times t \times r) - 1 \\ &= (5 \times 5 \times 3) - 1 = 74 \end{aligned}$$

$$\text{Derajat Bebas Perlakuan (dbp)} = k - 1$$

$$= 5 - 1 = 4$$

$$\begin{aligned} \text{Derajat bebas kelompok (dbk)} &= t - 1 \\ &= 5 - 1 = 4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Derajat Bebas Galat (dbg)} &= dbt - dbp \\ &= 74 - 4 = 70 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Kuadrat Tengah Perlakuan} &= \frac{\text{Jumlah Kuadrat Perlakuan}}{\text{dbp}} \\ &= \frac{45.986}{4} = 11.496 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Kuadrat Tengah Kelompok} &= \frac{\text{Jumlah Kuadrat Kelompok}}{\text{dbp}} \\ &= \frac{138.627}{4} = 34.656 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Kuadrat Tengah Galat (KTG)} &= \frac{\text{Jumlah Kuadrat Galat}}{\text{dbg}} \\ &= \frac{66.973}{70} = 956,75 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Koefisien Keseragaman (KK)} &= \frac{\sqrt{\text{KT Galat}}}{\text{rata-rata total}} \times 100\% \\ &= \frac{\sqrt{956,75}}{429,04} \times 100\% \\ &= 7,20\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{F Hitung Perlakuan} &= \frac{\text{Kuadrat Tengah Perlakuan}}{\text{Kuadrat Tengah Galat}} \\ &= \frac{11.496}{956,75} = 12,01 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{F Hitung Kelompok} &= \frac{\text{kuadrat Tengah Kelompok}}{\text{Kuadrat Tengah Galat}} \\ &= \frac{34.656}{956,75} = 36,22 \end{aligned}$$


Tabel 13. Tabel Anava

Sumber keseragaman	Derajat bebas	Jumlah kuadrat	Kuadrat tengah	F Hitung	F Tabel	
					5%	1%
Kelompok	4	138.627	34.656	36,22**	2,50	3,60
Perlakuan	4	45.986	11.496	12,01**	2,50	3,60
Galat	70	66.973	956,75			

Keterangan:

** = Sangat Signifikan (F hitung > F 1%)

F Hitung > F Tabel pada taraf kepercayaan 5% dan 1%, artinya ada perbedaan sangat nyata dengan yang lainnya (sangat signifikan).



Lampiran 7.

Analisis Beda Nyata Terkecil (BNT)

Dik : $t_{0,05}(\alpha,70) = 1,99$ $t_{0,01}(\alpha,70) = 2,64$

a. Nilai BNT

$$\text{BNT (0.05)} = t(\alpha,70) \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot \text{KTG}}{r}}$$

$$= 1,99 \cdot \sqrt{\frac{1913,5}{3}}$$

$$= 50,24$$

$$\text{BNT (0.01)} = t(\alpha,85) \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot \text{KTG}}{r}}$$

$$= 2,64 \cdot \sqrt{\frac{1913,5}{3}}$$

$$= 66,66$$

Tabel 14. Tabel Analisis Beda Nyata Terkecil (BNT) efektivitas penurunan kadar glukosa darah terhadap mencit (*Mus musculus*) jantan.

Perlakuan	Rata-rata	Beda riil pada jarak P			
		2	3	4	5
Glibenklamid	376,4	-	-	-	-
168 mg	388,4	12 ^{ns}	-	-	-
84 mg	390,6	13,6 ^{ns}	2,2 ^{ns}	-	-
42 mg	395,6	19,2 ^{ns}	7,2 ^{ns}	5 ^{ns}	-
Na.CMC	594,2	217,8 ^{**}	205,8 ^{**}	203,6 ^{**}	198,6 ^{**}

Keterangan

** = sangat signifikan, $F_h > F_t$ (0,05 dan 0,01)


* = signifikan, $F_h > F_t$ (0,05 dan 0,01)

ns = Non signifikan, $F_h < F_t$

BNT (0,05) = 50,24

BNT (0,01) = 66,61

Grafik penurunan kadar glukosa darah antara Na.CMC 1%, ekstrak etanol buah okra 42 mg, 84 mg, 168 mg dan glibenklamid 0,02 mg.



Lampiran 8. Gambar




Gambar 1. Tanaman buah okra Gambar 2. Buah okra



Gambar 3. Sampel di masererasi
Selama 24 jam



Gambar 4. Hasil masererasi



Gambar 5. Ekstrak kental buah okra Gambar 6. Penimbangan ekstrak kental buah okra



Gambar 7. Mencit yang digunakan gambar 8. Alat dan Bahan



Gambar 9. Pengukuran kadar glukosa darah mencit



Gambar 10. Pemberian sampel melalui oral mencit

RIWAYAT HIDUP



Nofriani safitri biasa di panggil ophy, lahir di kota makassar pada tanggal 27 November 1994, kedua orang tua hebat yaitu ayahandanya M. Addin S.Si dan ibunda Siti Asmah S.Pd adalah sosok yang selalu menjadi motivator terbaik bagi penulis.

Anak pertama dari 4 bersaudara ini memulai jenjang pendidikannya di SD inp. Borong Jambu II, menyelesaikan pendidikan selama 6 tahun di sekolah dasar ini ia melanjutkan ke sekolah menengah pertama di SMP Negeri 6 Makassar. 3 tahun bergelut dengan seragam putih biru, penulis memutuskan untuk melanjutkan jenjang pendidikannya di dunia kesehatan. Tepatnya melanjutkannya ke SMK Samudera Nusantara dan mengambil jurusan Keperawatan. Namun pada tingkat universitas penulis memutuskan untuk menjadi mahasiswi UIN Alauddin Makassar Fakultas Ilmu Kesehatan jurusan Farmasi pada tahun 2011 melalui seleksi nasional.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan kelemahan. Akan tetapi, besar harapan penyusun agar kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan. Amin.

Wassalam Wr. Wb.