

**PRODUKSI SERAT PANGAN LARUT DARI BUAH BELIMBING WULUH
(*Averrhoa bilimbi* L.) DENGAN MENGGUNAKAN BERBAGAI VARIASI
KONSENTRASI ASAM KLOORIDA**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Farmasi Pada Jurusan Farmasi
Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Oleh:
A.SITI NURALAM
NIM. 70100113004

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2017

**PRODUKSI SERAT PANGAN LARUT DARI BUAH BELIMBING WULUH
(*Averrhoa bilimbi* L.) DENGAN MENGGUNAKAN BERBAGAI VARIASI
KONSENTRASI ASAM KLOORIDA**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Farmasi Pada Jurusan Farmasi
Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar



Oleh:

A.SITI NURALAM

NIM. 70100113004

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : A. Siti Nuralam
Nim : 70100113004
Tempat/Tgl Lahir : Bone, 7 Mei 1995
Jur/ Prodi Konsentrasi : Farmasi
Fakultas/ Program : Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Antang, BTN Makkiobaji D4/14
Judul : Produksi Serat Pangan Larut dari Buah Belimbing
Wuluh (*Averrhoa bilimbi* L.) dengan Menggunakan
Berbagai Variasi Konsentrasi Asam Klorida

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adanya hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, November 2017

Penyusun,



A.SITI NURALAM
NIM. 70100113004

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Produksi Serat Pangan Larut dari Buah Belimbing Wuluh (*Averrhoa bilimbi* L.) dengan Menggunakan Berbagai Variasi Konsentrasi Asam Klorida” yang disusun oleh A.Siti Nuralam, NIM: 70100113004, mahasiswa Jurusan Farmasi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, diuji dan dipertahankan dalam Ujian Sidang Skripsi yang diselenggarakan pada hari Kamis, 23 November 2017 M yang bertepatan pada tanggal 18 Rabiul Awal 1439 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, 23 November 2017 M
18 Rabiul Awal 1439 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. H. Andi Armyun Nurdin, M.Sc	(.....)
Sekretaris	: Mukhriani S.Si., M.Si., Apt.	(.....)
Pembimbing I	: Isriany Ismail, S.Si., M.Si., Apt	(.....)
Pembimbing II	: Karlina Amir Tahir, S.Si., M.Si., Apt	(.....)
Penguji I	: Surya Ningsi, S.Si., M.Si., Apt	(.....)
Penguji II	: Dra. St. Aisyah BM, M.Sos I	(.....)



Dr. dr. H. Andi Armyun Nurdin, M.Sc

NIP. 19550203 198312 1 001

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb. Segala puji bagi Allah SWT atas nikmat akal dan pikiran yang diberikan serta limpahan ilmu yang tiada hentinya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Salawat dan salam juga tak lupa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad saw., keluarga dan para sahabat serta para pengikutinya.

Skripsi dengan judul “Produksi Serat Pangan Larut dari Buah Belimbing Wuluh (*Averrhoa bilimbi* L.) dengan Menggunakan Berbagai Variasi Konsentrasi Asam Klorida.” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Farmasi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Jurusan Farmasi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini bukanlah tujuan akhir dari belajar karena belajar adalah sesuatu yang tidak terbatas.

Besar harapan penulis agar skripsi ini menjadi penunjang ilmu pengetahuan ke depannya dan bermanfaat bagi orang banyak. Penulis sadari, skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Banyak terima kasih penulis haturkan kepada pihak yang telah membantu selama penulis menjalani pendidikan kuliah hingga selesainya perampungan skripsi ini.

Skripsi ini dengan terselesaikannya, tentu tak lepas dari dorongan doa dan restu dari Orang tua, yaitu Ayahanda tercinta Nasruddin Halim dan Ibunda

tercinta A.Wasilawati, Dra. Pasiha Halim serta keluarga besar Andi Halim terima kasih untuk semua dukungan berharga yang pasti takkan pernah bisa kubalaskan setimpal, baik berupa kasih sayang, materi, nasehat dan do'a yang tulus.

Penulis menyadari banyaknya kendala yang dihadapi dalam penyusunan skripsi ini. Namun berkat do'a, motivasi dan kontribusi dari berbagai pihak, maka kendala tersebut mampu teratasi dan terkendali dengan baik.

Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababari, M.Si selaku Rektor UIN Alauddin Makassar dan Prof. Dr. Mardan, M.Ag selaku Wakil Rektor I, Prof. Dr. H. Lomba Sultan, M.A selaku Wakil Rektor II, serta Prof. Siti Aisyah, M.A.,Ph.D. selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
2. Bapak DR. dr. Andi Armyn Nurdin, M.Sc. selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dan Ibu Dr. Nurhidayah, S.Kep., Ns, M.Kes selaku Wakil Dekan I, ibu Dr. Andi Susilawaty, S.Si., M.Kes selaku Wakil Dekan II, dan bapak Dr. Mukhtar Lutfi, M.Ag. selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
3. Ibu Haeria, S.Si., M.Si. selaku Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dan Ibu Mukhriani, S.Si., M.Si., Apt selaku Sekretaris Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

4. Ibu Isriany Ismail, S.Si., M.Si., Apt. selaku pembimbing pertama dan Ibu Karlina Amir Tahir, S.Si., M.Si., Apt. selaku pembimbing kedua yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan, serta meluangkan banyak waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis. Semoga Allah swt. membalas bantuan ibu dengan pahala bahkan hal yang lebih baik, di dunia dan akhirat.
5. Ibu Surya Ningsi., M.Si., Apt. selaku penguji kompetensi yang telah banyak memberikan saran dan kritiknya demi perbaikan dan kelengkapan skripsi ini dan Ibu Dra. St. Aisyah BM., M.Sos I. selaku penguji agama yang telah banyak memberikan pengarahan sekaligus bimbingan terhadap kelengkapan dan perbaikan khususnya, tinjauan agama skripsi ini.
6. Bapak, Ibu Dosen, serta seluruh Staf Jurusan Farmasi atas curahan ilmu pengetahuan dan segala bantuan yang diberikan pada penulis sejak menempuh pendidikan Farmasi hingga saat ini.
7. Teman-teman FARBION 2013, untuk kebersamaan, kepercayaan serta persahabatan berharga yang selalu kudapatkan,
8. Kakak-kakak dan adik-adik di Farmasi UIN Alauddin Makassar, Alumni SMP N 1 Salomekko 2010, Alumni SMA N 1 Tonra 2013, Teman-teman Posko Desa Borong Loe, Teman-teman KKN Angk. 53 Kecamatan Bontomarannu, serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.


Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekuangan pada skripsi ini. Oleh karena, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan skripsi ini kedepan-Nya. Besar harapan penulis kiranya skripsi ini

dapat bernilai ibadah disisi Allah SWT. dan bermanfaat bagi bagi semua pihak.

Aamiin

Gowa, November 2017

TTD



Penyusun



DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACK	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	5
1. Definisi Operasional.....	5
2. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka	6
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian.....	9
2. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN TEORITIS	10
A. Belimbing Wuluh.....	10
1. Klasifikasi Belimbing wuluh (Kumar, 2013: 136).....	10
2. Deskripsi.....	11
3. Nama Daerah.....	12
4. Khasiat.....	13
5. Kandungan Kimia	13
B. Serat	13
1. Jenis- Jenis Serat Larut.....	17
2. Jenis- Jenis Serat Tidak Larut	21

C. Proses Pencernaan Dan Penyerapan Dietary Fiber	22
D. Manfaat Serat Pangan	24
E. Pembuatan Tepung Serat	26
1. Sortasi.....	26
2. Pencucian	26
3. Pengeringan.....	26
F. Ekstraksi.....	27
G. Tinjauan Islam Tentang Serat	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	34
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	34
1. Jenis Penelitian.....	34
2. Lokasi Penelitian.....	34
B. Pendekatan Penelitian.....	34
C. Populasi dan Sampel.....	35
1. Populasi.....	35
2. Sampel.....	35
D. Instrumen Penelitian dan Pengumpulan Data.....	35
1. Alat yang Digunakan.....	35
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	35
2. Bahan yang Digunakan	35
1. Pengambilan Sampel.....	35
2. Pembuatan Tepung Serat Belimbing Wuluh.....	36
3. Ekstraksi Serat Pangan Larut dari Tepung Buah Belimbing Wuluh..	36
4. Pengukuran Data.....	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	39
A. Hasil Pengamatan.....	39
1. Pembuatan Tepung.....	39
2. Ekstraksi Serat Larut	39
3. Penentuan Kadar Air	40
4. Penentuan Kadar Abu.....	40

5. Penentuan Kadar Serat Kasar.....	41
6. Penentuan Daya Serap Air	41
7. Analisis Data dengan Menggunakan Metode Anova.....	43
B. Pembahasan.....	46
C. Tinjauan islam.....	53
BAB V PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	56
KEPUSTAKAAN.....	57
LAMPIRAN.....	60
Lampiran 1. Pengambilan sampel.....	60
Lampiran 2. Pembuatan Tepung Serat Belimbing wuluh.....	61
Lampiran 3. Ekstraksi Serat Larut Tepung Buah Belimbing Wuluh.....	62
Lampiran 4. Perhitungan	64
Lampiran 5. Gambar Pengamatan	74
A. Pengambilan Sampel.....	74
B. Pembuatan Tepung Buah Belimbing Wuluh.....	75
C. Ekstraksi Serat Tepung Buah Belimbing Wuluh	76
BIOGRAFI.....	79

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Kandungan buah belimbing wuluh	13
2. Perbedaan Serat Larut dan Serat Tidak Larut	17
3. Standar Mutu Pektin berdasarkan standar mutu International Pectin.....	18
4. Standar Mutu Gum.....	19
5. Hasil Tepung dari Buah Belimbing Wuluh.....	39
6. Hasil (%) rendamen ekstrak belimbing wuluh;.....	39
7. Hasil (%) penentuan kadar air ekstrak belimbing wuluh (<i>A. bilimbi</i> L.)	40
8. Hasil (%) Penentuan kadar abu ekstrak belimbing wuluh (<i>A. bilimbi</i> L.)	40
9. Hasil (%) Kadar serat kasar ekstrak belimbing wuluh (<i>A. bilimbi</i> L.).....	41
10. Hasil (%) Daya Serap Air Ekstrak Belimbing wuluh (<i>A. bilimbi</i> L.)	41
11. Hasil Analisis Data Metode Anova.....	43
12. Hasil Uji BNT	43



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Pohon Belimbing.....	11
2. Buah Belimbing	12
3. Sampel Buah Belimbing Dipanen.....	74
4. Sortasi Basah.....	74
5. Belimbing dicuci dengan Air mengalir	75
6. Belimbing Wuluh Dipotong-potong $\pm 0,5$ cm	75
7. Dikeringkan dalam oven Suhu 60°C selama 18 jam.....	75
8. Buah Kering dihancurkan dengan Blender	75
9. Sampel diayak dengan ukuran 60 mesh	76
10. Perendaman Sampel sebanyak 50 gr selama ± 12 jam	76
11. Penyaringan dan Pembilasan Ekstrak Tepung setelah perendaman	76



DAFTAR GRAFIK

Lampiran	Halaman
1. Hubungan antara konsentrasi asam dengan % Rendamen.....	44
2. Hubungan antara konsentrasi asam dengan % Kadar Air.....	49
3. Hubungan antara konsentrasi asam dengan % Kadar Abu	44
4. Hubungan antara konsentrasi asam dengan % Kadar Serat Kasar.....	51
5. Hubungan antara konsentrasi asam dengan % Daya Serap Air	52



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Pengambilan sampel.....	60
2. Pembuatan Tepung Serat Belimbing wuluh.....	61
3. Ekstraksi Serat Larut Tepung Buah Belimbing Wuluh.....	62
4. Perhitungan	64
5. Gambar Pengamatan	74



ABSTRAK

Nama : A.Siti Nuralam
NIM : 70100113004
Judul Skripsi : **PRODUKSI SERAT PANGAN LARUT DARI BUAH BELIMBING WULUH (*Averrhoa bilimbi* L.) DENGAN MENGGUNAKAN BERBAGAI VARIASI KONSENTRASI ASAM KLORIDA**

Telah dilakukan penelitian tentang Produksi Serat Pangan Larut dari Buah Belimbing Wuluh (*Averrhoa bilimbi* L.) dengan menggunakan Berbagai Variasi Konsentrasi Asam Klorida. Tujuan penelitian ini untuk memproduksi serat pangan larut dari Buah Belimbing Wuluh (*Averrhoa bilimbi* L.) dan mengetahui konsentrasi asam klorida berapa yang dapat menghasilkan serat pangan larut yang berkualitas. Prosedur dimulai dengan pembuatan tepung buah belimbing wuluh dengan metode pengeringan, dilanjutkan dengan ekstraksi serat larut tepung buah belimbing wuluh dengan menggunakan pelarut asam klorida dengan menggunakan 5 variasi konsentrasi (0,2%, 0,4%, 0,6%, 0,8% dan 1%). Hasil ekstraksi serat larut kemudian diuji parameter seperti % rendamen, % kadar air, % kadar abu, % kadar serat kasar dan % daya serap air. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua sampel uji bisa dibuat serat pangan larut. Serat pangan larut yang menunjukkan kualitas paling baik terdapat pada konsentrasi 1% dengan jumlah rendamen sebanyak 1,81%, kadar air sebanyak 3%, kadar abu sebanyak 4,75%, kadar serat kasar sebanyak 10,25% dan daya serap air sebanyak 41,4%.

Kata kunci : Belimbing wuluh (*Averrhoa bilimbi* L.), serat pangan larut.

ABSTRACK

Name : A. Siti Nuralam
NIM : 70100113004
Title : **Production of Soluble Dietary Fiber From The Belimbing Wuluh Fruit (*Averrhoa Bilimbi* L.) Using Various Variations of Concentration Hydrochloride Acid**

A study has been about Production of Soluble Dietary Fiber From The Belimbing Wuluh Fruit (*Averrhoa bilimbi* L.) Using Various Variations of Concentration Hydrochloride Acid . The purpose of this researc is production soluble dietary fiber for The Belimbing Wuluh (*Averrhoa bilimbi* L.) and can be made hidrokloride acid soluble dietary fiber and know which concentration can produce quality soluble dietary fiber. The procedure begins with the manufacture of starfruit starch flour by drying method, followed by extracting soluble fiber of star fruit starfruit by using a hydrochloric acid solvent using 5 variations of concentration (0.2%, 0.4%, 0.6%, 0.8 % and 1%). The soluble fiber extraction results were then tested for parameters such as % rendaments, % moisture content, % ash content, % crude fiber content and % water absorption. The results of this study indicate that all test samples can be made soluble dietary fiber. The soluble dietary fiber that shows the best quality is found at concentrations of 1% with the amount of rendamen of 1.81%, moisture content of 3%, ash content 4,75%, crude fiber 10,25% dan water absorption 41,4%.

Keywords: Belimbing wuluh (*Averrhoa bilimbi* L.), *dietary fiber soluble*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Serat pada awalnya hanya dianggap sebagai senyawa yang inert secara gizi didasarkan bahwa senyawa tersebut tidak dapat dicerna serta hasil fermentasinya tidak dapat digunakan oleh tubuh dan hanya dianggap sebagai sumber energi yang tidak tersedia serta hanya dikenal mempunyai efek sebagai pencakar perut. Beberapa penelitian terdahulu menyebutkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara konsumsi serat makanan dan insiden timbulnya berbagai penyakit (Raharja, 2012: 30).

Serat adalah bagian dari tanaman yang tidak dapat diserap oleh tubuh. Meskipun tidak mengandung zat gizi, serat pangan menguntungkan bagi kesehatan yaitu berfungsi mengontrol berat badan atau kegemukan (obesitas), penanggulangan penyakit diabetes, mencegah gangguan gastrointestinal, kanker kolon, serta mengurangi tingkat kolesterol darah dan penyakit kardiovaskuler (Santoso, 2011:36).

Agar jumlah serat yang dikonsumsi tidak kurang, juga tidak berlebihan, dianjurkan mengonsumsi makanan yang mengandung serat tinggi secara bervariasi, seperti kacang-kacangan, biji-bijian, sayuran dan buah-buahan. Konsumsi serat 30-45 gr perhari cukup untuk menjaga kebugaran tubuh (Hazal, 2016: 233).

Serat dalam makanan atau biasa disebut serat makanan terdiri dari serat kasar (*crude fiber*) dan serat pangan (*dietary fiber*) serat kasar adalah serat yang secara

laboratorium dapat menahan asam kuat dan basa kuat sedangkan serat pangan adalah bagian dari makanan yang tidak dapat dicerna oleh enzim-enzim pencernaan (Sinaga, 2009: 1).

Komposisi kimia serat pangan bervariasi tergantung dari komposisi dinding sel tanaman penghasilnya. Pada dasarnya komponen-komponen dinding sel tanaman terdiri dari selulosa, hemiselulosa, pektin, lignin, mucilago yang kesemuanya termasuk dalam serat pangan. Serat pangan terbagi menjadi dua kelompok, yaitu: Serat pangan larut (*soluble dietary fiber*) termasuk dalam serat ini adalah pektin dan gum yang merupakan bagian dalam dari sel pangan nabati, serat ini banyak terdapat pada buah dan sayur dan serat tidak larut (*insoluble dietary fiber*), termasuk dalam serat ini adalah selulosa, hemiselulosa dan lignin (Santoso, 2011: 37).

Serat larut adalah jenis serat yang dapat larut dalam air panas, sehingga dapat melewati usus halus dengan mudah dan difermentasi di mikroflora usus besar. Sedangkan, serat tidak larut adalah jenis serat yang tidak dapat larut dalam air. Jenis serat ini tidak dapat membentuk gel ketika melewati usus halus dan sangat sulit difermentasi oleh mikroflora usus besar manusia (Fairudz, 2015: 124).

Di Indonesia itu sendiri terdapat buah-buahan yang mengandung banyak serat, diantaranya buah naga, jeruk, jambu, manggis, apel, berbagai jenis pisang, pepaya dan belimbing (Santoso, 2011: 38).

Berdasarkan hasil pemeriksaan kandungan kimia buah belimbing wuluh yang dilakukan *Patil, et al.* (2010) menunjukkan bahwa buah belimbing wuluh matang mengandung pektin yang tinggi yaitu 5% berat kering (Roikah, 2016: 30).

Belimbing wuluh banyak dimanfaatkan masyarakat sebagai pengobatan seperti batuk, demam, sariawan, gusi berdarah, perut sakit, beguk, encok, jerawat, panu, tekanan darah tinggi, biduran dan lumpuh. Karena tumbuhnya gampang dan bukan merupakan tanaman musiman buah belimbing wuluh biasanya hanya terbuang dan akhirnya menjadi limbah.

Dari segi agama Islam telah memberikan kepedulian terhadap kesehatan umat manusia, sebab pada kenyataannya Islam merupakan agama yang memperhatikan dua sisi kebaikan yaitu kebaikan dunia dan akhirat. Jadi, dalam hal ini, Islam sebenarnya sangat memperhatikan yang namanya kesehatan. Seperti yang dijelaskan dalam Q.S. Asy-syuara (26) ayat 7 :

أَوْ لَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمَا أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ

Terjemahnya :

“Dan Apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik”(Kementrian Agama RI. 2009).

Dalam kitab Tafsir Al-Mishbah (2009), dijelaskan bahwa ayat ini membuktikan melalui uraiannya-keniscayaan ke-Esaan Allah Swt. Dimana mereka (orang kafir) tidak memperhatikan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang beraneka warna, masing-masing mempunyai kekhususan sendiri baik daun, bunga dan buahnya. Padahal semuanya tumbuh di tanah yang sejenis dan diairi dengan air

yang sama, tetapi menghasilkan buah-buahan yang berlainan bentuk, warna dan rasanya. Tidakkah yang demikian itu menunjukkan kekuasaan dan kebijaksanaan Pencipta-Nya (Kementrian Agama. 2009). Sehingga kita sebagai manusia telah diberi akal untuk mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan tersebut khususnya ilmu yang membahas tentang pengobatan yang berasal dari tanaman seperti tanaman belimbing wuluh.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari beberapa literatur diatas maka dilakukan penelitian yang berjudul “Produksi Serat Pangan Larut dari Buah Belimbing Wuluh (*Averrhoa bilimbi* L.) dengan Menggunakan Berbagai Variasi Konsentrasi Asam Klorida”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah serat pangan larut dapat diproduksi dari Buah Belimbing Wuluh (*Averrhoa bilimbi* L.)?
2. Berapakah konsentrasi asam klorida yang dapat menghasilkan serat pangan larut yang berkualitas?
3. Bagaimana tinjauan Islam terhadap pemanfaatan Buah Belimbing Wuluh (*Averrhoa bilimbi* L.) sebagai serat pangan larut?

C. *Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian*

1. Definisi Operasional

a. Belimbing

Belimbing wuluh (*Averrhoa bilimbi* L.) merupakan pohon yang tingginya mencapai 10 m dengan batang yang tidak begitu besar dan mempunyai garis tengah sekitar 30 cm (Luthfiyah, 2007: 3)

b. Serat

Serat adalah bagian dari tanaman yang tidak dapat diserap oleh tubuh (Kusharto, 2006: 46)

c. Serat Pangan

Serat pangan, dikenal juga sebagai serat diet atau dietary fiber, merupakan bagian dari tumbuhan yang dapat dikonsumsi dan tersusun dari karbohidrat yang memiliki sifat resistan terhadap proses pencernaan dan penyerapan di usus halus manusia serta mengalami fermentasi sebagian atau keseluruhan di usus besar atau serat pangan merupakan bagian dari bahan pangan yang tidak dapat dihirolisis oleh enzim-enzim pencernaan (Santoso, 2011: 37)

d. Serat Pangan Larut

Serat pangan larut adalah jenis serat yang dapat larut dalam air panas, sehingga dapat melewati usus halus dengan mudah dan difermentasi di mikroflora usus besar (Fairudz, 2015: 124)

2. Ruang Lingkup Penelitian

Disiplin ilmu yang terkait dengan penelitian ini adalah pembuatan serbuk serat dan uji parameter terhadap serbuk serat buah belimbing (*Averrhoa bilimbi* L.).

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Nitjaree Manee, *et al* tahun 2016 yang dipublikasikan oleh Association of Food Scientists & Technologists (India) tentang “*Effect of extraction condition on properties of pectin from banana peels and its function as fat replacer in salad cream*”. Cara ekstraksi pektin yaitu kulit pisang dicampur dengan 0,05 M HCl aquadest dengan perbandingan 1:2. pH campuran yang dihasilkan disesuaikan menjadi 1,5 dan 6,0 pada suhu $90 \pm 5^\circ \text{C}$ dengan agitat ion di piring panas selama 30, 60, atau 120 menit. Setelah ekstraksi, campuran disaring menggunakan kain. Filtrat dicampur dengan 95% etanol dengan volume rasio etanol:filtrat adalah 1:2 dan dibiarkan tak terganggu di ruang dengan suhu 28°C selama 12 jam. Diulang dua kali dengan 95% etanol pada rasio volume 1:1, dan dikeringkan pada suhu 50°C pada oven sampai kering (10% kelembaban). Pektin yang kering, dikemas dan disegel dan peptin disimpan pada desikator dengan suhu kamar sampai akan dianalisis.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sapta Raharja, *et al*, tahun 2012 yang dipublikasikan oleh Pusat Pengkajian dan Penerapan Teknologi Farmasi dan Medika pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang “*Ekstraksi Dan Analisa Dietary Fiber Dari Buah Mengkudu (Morinda Citrifolia)*” Cara pembuatan dietary fiber menggunakan hidrolisis asam dan hidrolisis basa dengan konsentrasi

masing-masing 0,1%, 0,25%, 0,5% dan 1% dengan menggunakan pelarut H_2SO_4 untuk hidrolisis asam dan NaOH untuk hidrolisis basa. Hasil yang didapatkan untuk serat makanan larut pada serat mengkudu yaitu hasil hidrolisis asam lebih tinggi dari hasil hidrolisis basa. Hasil analisa keragaman menunjukkan faktor jenis pelarut memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap nilai serat makanan larut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Meng-mei Ma dan Tai-hua Mu tahun 2016 yang dipublikasikan oleh Laboratory of Food Chemistry and Nutrition Science, tentang "*Effects of extraction methods and particle size distribution on the structural, physicochemical, and functional properties of dietary fiber from deoiled cumin*". Cara ekstraksi serat pangan menggunakan Metode Alkali Dietary Fiber Ekstraktion (ADFE) yaitu menggunakan 1.5 L NaOH 0.5 M dan diaduk pada kecepatan 150 rpm selama 2 jam pada suhu 50°C. Di netralisasi dengan HCl 0.5 M dan disentrifugasi pada 7000 rpm selama 15 menit.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Firawandel Sinaga tahun 2009 tentang "*Studi Pembuatan Serat Makanan Dari Tongkol Jagung*". Cara pembuatan serat yaitu serbuk tongkol jagung yang sudah dihaluskan sebanyak 50 gram direndam dengan larutan asam asetat, asam klorida dan asam sulfat dengan masing-masing konsentrasi 0,2%, 0,4%, 0,6% 0,8% dan 1% selama 12 jam. Kemudian disaring dan dibilas dengan air mengalir sampai tidak berbau asam. Setelah itu masing-masing residu hasil saringan dimasukkan dalam beker glass yang berisi air 500 ml dan ditambahkan asam asetat 0,5% sampai pH 6. Kemudian dipanaskan pada suhu 90°C

selama 45 menit, lalu disaring sampai diperoleh filtrat. Filtrat yang diperoleh dikeringkan dalam oven pada suhu 40°C selama 6 jam, dihaluskan dengan blender dan diayak dengan ukuran mesh 60. Hasil yang diperoleh kemudian dianalisis % Rendamen, % kadar abu, % kadar air, % kadar serat kasar, % daya serap air dan uji organoleptik.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rini Pakaya, *et al*, tahun 2015 yang dipublikasikan oleh Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan dengan judul penelitian "*Pengaruh Penambahan Jantung Pisang Goroho (Musa Sp.) Terhadap Kandungan Gizi Dan Organoleptik Abon Ikan Cakalang (Katsuwonus pelamis)*" menggunakan uji organoleptik, kadar protein, kadar lemak, kadar air dan kadar abu sebagai parameter yang akan diamati.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Saragih, Bernatal tahun 2013 yang dipublikasikan oleh Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan dengan judul. "*Analisis Mutu Tepung Bonggol Pisang Dari Berbagai Varietas Dan Umur Panen Yang Berbeda*" menggunakan kadar air (%), kadar abu (%), rendemen (%), daya kembang tepung dan daya serap air (%) sebagai parameter yang akan diamati.

Belum ada penelitian sebelumnya tentang Produksi Serat Larut dari Buah Belimbing Wuluh (*Aropea Balimbi*) dengan menggunakan berbagai Variasi Konsentrasi Asam Klorida.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui apakah serat pangan larut dapat diproduksi dari buah belimbing wuluh (*Averrhoa bilimbi* L).
- b. Mengetahui konsentrasi asam klorida berapa yang dapat menghasilkan serat pangan larut yang berkualitas.
- c. Mengetahui bagaimana tinjauan islam terhadap pemanfaatan Buah Belimbing Wuluh (*Averrhoa bilimbi* L.) sebagai serat pangan larut

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada masyarakat tentang manfaat serat pangan larut dari buah belimbing sebagai pengobatan alternatif untuk kolesterol
- b. Diharapkan dapat digunakan sebagai acuan peneliti lain dalam melakukan pengembangan penelitian serat larut dari buah belimbing wuluh ini.

BAB II TINJAUAN TEORITIS

A. *Belimbing Wuluh*

Belimbing Belimbing wuluh (*Averrhoa bilimbi* L.) termasuk pohon yang tingginya mencapai 10 m dengan batang yang tidak begitu besar dan mempunyai garis tengah sekitar 30 cm. Pohon ini ditanam sebagai pohon buah. Pohon yang berasal dari benua Amerika ini membutuhkan tempat tumbuh yang cukup lembab dan tidak dinaungi oleh pohon lain (Luthfiyah, 2007: 3).

Bagian tanaman belimbing wuluh yang sering dimanfaatkan sebagai obat adalah bagian bunga, daun dan buah. Bagian buah dan bunga berkhasiat sebagai ekspektoran. Selain itu, buahnya dapat digunakan sebagai bahan obat tradisional seperti, batuk, sariawan, gusi berdarah, jerawat, panu, tekanan darah tinggi (hipertensi) serta dapat memperbaiki fungsi pencernaan. (Luthfiyah, 2007: 3).

1. **Klasifikasi Belimbing wuluh** (Kumar, 2013: 136)

Kingdom	: Plantae
Subkingdom	: Tracheobionta
Superdivision	: Spermatophyta
Division	: Magnoliophyta
Class	: Dicotyledonae
Subclass	: Rosidae
Order	: Oxalidales
Family	: Oxalidaceae
Genus	: <i>Averrhoa</i>
Species	: <i>Averrhoa bilimbi</i> L.


2. Deskripsi



Gambar 1. Pohon Belimbing (Kumar, 2013: 137)

Belimbing wuluh mempunyai batang kasar berbenjol-benjol, percabangan sedikit dan arahnya condong ke atas. Cabang muda berambut halus seperti beludru dan berwarna coklat muda. Daunnya berupa daun majemuk menyirip ganjil dengan 21-45 pasang anak daun. Anak daun bertangkai pendek, bentuknya bulat telur sampai jorong, ujung runcing, pangkal membundar, tepi rata dan mempunyai panjang 2-10 cm, lebar 1-3 cm, warnanya hijau, permukaan bawah hijau muda. (Luthfiyah, 2007: 3).

Bunga berbentuk malai, berkelompok, keluar dari batang atau percabangan yang besar. Bunganya kecil-kecil berbentuk bintang dan warnanya ungu kemerahan. Buahnya berupa buah buni, bentuknya bulat lonjong bersegi, warnanya hijau kekuningan, bila masak berair banyak, rasanya asam dan bijinya berbentuk bulat telur serta gepeng (Luthfiyah, 2007: 3).



Gambar 2. Buah Belimbing (Kumar, 2013: 137)

Buah muda belimbing wuluh mengkilap seperti lilin dan hijau, sementara jika matang akan nampak kekuningan. Buah berbentuk elips, lonjong atau hampir silinder, dalam struktur buah memiliki 4-5 pegunungan. Ukuran panjang berkisar 5,5-7 cm panjang dan lebar 2-3 cm. Rata-rata terdapat 7 biji dalam buah (Dangat, 2014: 10).

3. Nama Daerah

Sumatera: Limeng, selimeng, thlimeng (Aceh), selemeng (Gayo), asom belimbing (Karo), balingbing (Toba), balimbingan (Simelungun), malimbi (Nias), balimbieng (Minangkabau) balimbing (Lampung); Jawa: Balingbing, calincing (Sunda), balimbing, blimbing, b.wuluh (Jawa), bhalingbing bulu (Madura); Kalimantan: Beliwit (Dayak); Nusa Tenggara: Limbi (Bima), libi (Sawu), balimbeng (Flores); Bali: blimbing buloh (Bali); Sulawesi: Lembetue (Gorontalo), lombituko (Buol), sanggulera (Parigis), bainang (Makasar), kulirang, pulirang (Selayar), calene (Bugis); Maluku: Ninilu dae lok (Roti), baknil (Kai),

ahurela (Seram barat), haurela (Seram Selatan), balimbing (Nusa laut); Irian: Uteke (Mimik), balibi (Halmahera Utara), ifel milo (Masarete) (Badan POM, 2012: 134).

4. Khasiat

Kegunaan secara empiris Belimbing wuluh yaitu, batuk, batuk rejan, demam, sariawan, gusi berdarah, perut sakit, beguk, encok, jerawat, panu, tekanan darah tinggi, biduran, lumpuh (Badan POM, 2012: 134).

5. Kandungan Kimia

Tabel 1. Kandungan buah belimbing wuluh (Kumar, 2013: 138)

Kandungan	Tiap 100 gr
Vitamin B1 (thiamine)	0.010 mg
Asam Askorbat	15.6 mg
Vitamin A	0.036 mg
Minyak Atsiri	94.2-94.7g
Protein	0.61g
Serat	0.6g
Abu	0.31-0.40g
Kalsium	3.4g
Fosfor	11.1mg
Besi	1.01mg
Karoten	0.035mg
Tiamin	0.010mg
Riboflavin	0.302mg
Niasin	0.302mg

B. Serat

Dalam ilmu gizi, serat sayuran dan buah yang kita makan disebut serat kasar (*crude fiber*). Selain serat kasar, terdapat juga serat pangan. Serat makanan tidak hanya terdapat pada sayur dan buah, tetapi juga ada dalam makanan lain misalnya beras, kentang, kacang-kacangan dan umbi-umbian. Serat dalam makanan lazim

disebut sebagai dietary fiber sangat baik untuk kesehatan manusia. Serat makanan ini semakin mendapat perhatian sejak tahun 1970-an yaitu sejak kelompok peneliti *Burkitt et al* (1972) dan *Trowel* (1972) memelopori penelitian serat dengan pendekatan epidemiologi. Hasil penemuannya menunjukkan bahwa pada masyarakat dengan *western diet* yang umumnya rendah serat, banyak ditemukan orang yang mengidap berbagai penyakit seperti diverticulitis, kanker kolon, atherosklerosis, coronary heart disease, diabetes mellitus dan appendicitis (Kusharto, 2006: 46).

Serat adalah bagian dari tanaman yang tidak dapat diserap oleh tubuh. Namun akhir-akhir ini istilah serat mengalami perkembangan dengan pengertian yang lebih tepat sehubungan dengan perannya di dalam tubuh. Dalam ilmu gizi, pengertiannya dijelaskan sebagai *all structural materials of the plant cell taken in our diet which are resistant to digestive tract* (Speller, 1975). Dalam kepastakaan terakhir disebut sebagai *unavailable carbohydrates* dan bagian tanaman yang disebut lignin, yang tidak dapat diserap tubuh sebagai crude fiber adalah non-karbohidrat (Kusharto, 2006: 46)

Sedangkan Meyer (2004) mendefinisikan serat sebagai bagian integral dari bahan pangan yang dikonsumsi sehari-hari dengan sumber utama dari tanaman, sayur-sayuran, sereal, buah-buahan, kacang-kacangan (Santoso, 2011: 36).

Definisi terbaru diusulkan oleh *Komite Codex Nutrisi dan Makanan untuk Penggunaan Diet Khusus* (2009) adalah sebagai berikut: “Serat pangan adalah polimers karbohidrat dari bahan baku pangan dengan perawatan fisiologis atau kimia dan telah terbukti memiliki efek fisiologis (Hazal, 2016: 234).

Komposisi kimia serat pangan bervariasi tergantung dari komposisi dinding sel tanaman penghasilnya. Pada dasarnya komponen-komponen dinding sel tanaman terdiri dari selulosa, hemiselulosa, pektin, lignin, mucilago yang kesemuanya termasuk dalam serat pangan. Serat pangan terbagi menjadi dua kelompok yaitu: Serat pangan larut (*soluble dietary fiber*), termasuk dalam serat ini adalah pektin dan gum yang merupakan bagian dalam dari sel pangan nabati. Serat ini banyak terdapat pada buah dan sayur, dan serat tidak larut (*insoluble dietary fiber*), termasuk dalam serat ini adalah selulosa, hemiselulosa dan lignin, yang banyak ditemukan pada sereal, kacang-kacangan dan sayuran. (Santoso, 2011: 37).

Serat pangan memiliki berbagai macam manfaat untuk kesehatan, meliputi melancarkan pencernaan dan mencegah kanker kolon, menurunkan kadar glukosa darah, berfungsi sebagai prebiotik, mengontrol kegemukan dan obesitas serta mengurangi kadar kolesterol dalam darah (Fairudz, 2015: 123)

Serat larut adalah jenis serat yang dapat larut dalam air panas, sehingga dapat melewati usus halus dengan mudah dan difermentasi dimikroflora usus besar. Sedangkan, serat tidak larut adalah jenis serat yang tidak dapat larut dalam air. Jenis serat ini tidak dapat membentuk gel ketika melewati usus halus dan sangat sulit difermentasi oleh mikroflora usus besar manusia (Fairudz, 2015: 123).

Serat makanan mempunyai daya serap air yang tinggi. Adanya serat makanan dalam feses menyebabkan feses dapat menyerap air yang banyak sehingga volumenya menjadi besar dan teksturnya menjadi lunak. Adanya

volume feses yang besar akan mempercepat kontraksi usus untuk lebih cepat buang air sehingga waktu transit makanan lebih cepat (Fairudz, 2015: 123).

Pada keterkaitannya dengan level kolesterol, serat larut air dapat menjerat lemak di dalam usus halus, dengan begitu serat dapat menurunkan tingkat kolesterol dalam darah sampai 5% atau lebih. Dalam saluran pencernaan serat dapat mengikat garam empedu (produk akhir kolesterol) kemudian dikeluarkan bersamaan dengan feses. Dengan demikian, serat pangan mampu mengurangi kadar kolesterol dalam plasma darah. Ketika terjadi peningkatan ekskresi kolesterol dalam feses, maka akan menurunkan jumlah kadar kolesterol yang menuju ke hati. Penurunan jumlah kolesterol di hati akan meningkatkan pengambilan kolesterol di darah yang akan disintesis untuk menjadi asam empedu. Hal ini yang menjadi faktor semakin berkurangnya kadar kolesterol dalam plasma darah (Fairudz, 2015: 123).

Sebelumnya telah dikemukakan terdapat berbagai jenis serat didasarkan dari kelarutannya. Berbagai macam jenis serat pangan ini mampu mempengaruhi kadar kolesterol dengan mekanisme yang berbeda-beda. Pada serat pangan yang larut air, akan dengan mudah terfermentasi. Produk hasil fermentasi serat pangan oleh bakteri usus, yaitu *Short Chain Fatty Acids* (SCFA) atau disebut juga asam lemak rantai pendek juga memiliki pengaruh terhadap penurunan kolesterol, yaitu dari pembentukan propionate, yang dapat menghambat enzim HMG-koA reduktase, sehingga menghambat sintesis kolesterol (Fairudz, 2015: 124).

Tabel 2. Perbedaan Serat Larut dan Serat Tidak Larut

Larut air (SDF)	Tidak larut air (IDF)
Pektin, gum, dan mucilage	Selulosa, hemiselulosa dan lignin (penyusun dinding sel tanaman)
Tidak termasuk serat kasar	Termasuk serat kasar
Berperan utama dalam menurunkan kolesterol darah dan konstipasi (sulit buang air besar)	Kontribusi terhadap volume feses dan waktu transit di usus, mencegah konstipasi dan hemoroid (wasir)
Umumnya dapat difermentasi oleh bakteri usus	Umumnya tidak dapat difermentasi oleh bakteri usus
Sumber: buah, sayur, oat bran, barley, flaxseed, psyllium, kacang-kacangan, susu kedelai dan produk kedelai	Sumber: wheat bran, corn bran, rice bran, kulit buah dan sayur, biji-bijian.

1. Jenis- Jenis Serat Larut

Jenis- Jenis Serat Larut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pektin

Pektin adalah suatu kelompok dari komponen yang mengandung pektin yang terdiri dari pektin, asam pektin dan asam pektinik yang merupakan *dietary fiber* sekaligus *functional fiber*. Pektin adalah kelompok polisakarida yang unsur utamanya asam D-galakturonat dengan ikatan 1,4 yang terdapat pada rantai utama sedangkan pada rantai cabang terdapat ramnosa, arabinosa, xylosa, fruktosa dan galaktosa. Pektin membentuk sebagian dinding utama sel tumbuhan dan sebagian lamella bagian tengah. Merupakan serat larut air yang membentuk gel dan hampir seluruhnya dapat dimetabolisir oleh bakteri kolon (Zaimah, 2009: 4).

Pektin merupakan kompleks polisakarida anion yang terdapat pada dinding sel primer dan interseluler pada tanaman tingkat tinggi. Asam D-galakturonat

merupakan molekul utama penyusun polimer pektin, dan biasanya gula netral juga terdapat dalam pektin (Hariyanti, 2006: 2)

Pektin digunakan secara luas sebagai komponen fungsional pada industri makanan karena kemampuannya membentuk gel encer dan menstabilkan protein (May, 1990). Penambahan pektin pada makanan akan mempengaruhi proses metabolisme dan pencernaan khususnya pada adsorpsi glukosa dan tingkat kolesterol (Hariyanti, 2006: 2)

Stabil pada pH rendah oleh karena itu dapat dijumpai pada makanan yang asam. Bahan makanan yang mengandung banyak pektin adalah apel, strawberi dan jeruk. Saat ini pektin dapat diekstraksi dari jeruk atau apel dan dipakai sebagai bahan tambahan makanan disamping dipakai untuk membentuk jel pada pembuatan jelli dan selai. Pektin juga ditambahkan pada beberapa makanan enteral sebagai sumber serat (Zaimah, 2009: 4).

Tabel 3. Standar Mutu Pektin berdasarkan standar mutu *International Pectin Producers Association*

Faktor Mutu	Kandungan (%)
Kekuatan Gel, grade min	150
Kandungan metoksil:	
Pektin metoksil tinggi	>7.12
Pektin metoksil rendah	2.5-7.12
Kadar asam galakturonat	<35
Kadar air	<12
Kadar abu	<10

Derajat esterifikasi untuk:	
pektin ester tinggi	<50
pektin ester rendah	<50
Bilangan asetil	0,15-0,45
Berat ekivalen	600-800

b. Gum

Gum adalah salah satu kelompok senyawa yang dapat disebut sebagai hidrokoloid. Gum terdiri dari berbagai jenis gula dan derivatnya. Jenis gula yang paling utama adalah galaktosa, asam glukuronat, asam uronat, arabinosa, ramnosa dan manosa. Di usus besar difermentasi dengan sangat baik oleh bakteri usus. Gum arabikum merupakan hidrokoloid tumbuhan yang paling sering digunakan sebagai bahan tambahan makanan. Gum sangat dikenal karena mudah larut, pH stabil dan sifat khasnya pada pembentukan gel. Gum ditemukan dalam bahan makanan seperti oat, barley dan tumbuhan polong (Zaimah, 2009: 5).

Tabel 4. Standar Mutu Gum

Standar Mutu	Kandungan (%)
Kadar Abu	4
Serat Kasar	5
Kadar Air	1

c. B-glukan

B-glukan adalah polimer glukosa yang mempunyai ikatan campuran antara ikatan β 1,4 D-glukosa dengan ikatan β 1,3 D-glukosa. Setiap 2 atau 3 unit kelompok β 1,4 D-glukosa dipisahkan oleh 1 unit kelompok ikatan β 1,3 D-glukosa. β -glukan ini

sangat baik difermentasi oleh bakteri di dalam usus besar. Saat ini ekstraksi β -glukan dipakai sebagai functional fiber (Zaimah, 2009: 5).

B-Glukan, salah satu jenis serat larut air yang banyak ditemukan pada oat, telah mendapat banyak perhatian karena potensinya dalam mengurangi level kolesterol. Viskositas usus halus yang lebih besar dan kecendrungan absorpsi asam empedu yang lebih menurun adalah salah satu mekanisme yang diduga terjadi pada konsumsi B-glukan (Fairudz, 2015: 124).

d. Fructans – Inulin, Oligofruktosa dan fruktooligosakarida

Fruktans termasuk ke dalamnya inulin, oligofruktosa dan fruktooligosakarida mengandung rantai fruktosa dengan panjang yang bervariasi. Inulin terdiri dari 2–60 unit fruktosa. Oligofruktosa berasal dari hidrolisis parsial inulin dan biasanya mengandung 2–8 unit fruktosa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumsi fruktooligosakarida dapat merangsang pertumbuhan bifidobakteria yang bekerja sebagai prebiotik (Zaimah, 2009: 6).

Jenis serat lain yang berpotensi untuk mengurangi kadar kolesterol adalah inulin. Inulin memiliki beberapa mekanisme untuk menurunkan kadar kolesterol. Mekanisme pertama adalah dengan menghambat emulsifikasi lemak dan kolesterol oleh garam empedu (Fairudz, 2015: 125).

Kedua, melalui pembentukan asam lemak rantai pendek. Asam-asam lemak rantai pendek (SCFA) memiliki kemampuan dalam menghambat sintesis kolesterol dan menurunkan sekresi trigliserol, sehingga pembentukan asam-asam lemak rantai

pendek tersebut berpotensi dapat menurunkan kapasitas kolesterol (Fairudz, 2015: 125).

Proses regulasi lipid oleh SCFA dapat dijelaskan sebagai berikut: propionate menghambat HMG-KoA reduktase yang merupakan katalis pembentukan mevalonic acid dan dari β -hydroxy β -methyl glutaryl coA. Mevalonic acid adalah prekursor pembentukan kolesterol. Adanya inhibisi mevalonic acid akan menghambat sintesis kolesterol (Fairudz, 2015: 125).

2. Jenis- Jenis Serat Tidak Larut

a. Selulosa

Selulosa adalah bahan penyusun utama dari jaringan serat dan dinding sel tanaman. Bahan ini terdiri atas sejumlah besar molekul glukosa yang saling berikatan melalui gugus B-glukosa dari molekul yang satu dengan gugus hidroksil C4 dari molekul glukosa yang lain (Tjokoroadikoesoema, 1986: 56).

Dalam dinding sel, senyawa ini terdapat dalam bentuk mikrofibril yang terdiri dari beberapa rantai molekul. Konfigurasi molekulnya berupa suatu kumpulan yang sangat kokoh tersebut disebabkan ikatan hydrogen yang kuat diantara rantai-rantai molekul paralel. Ciri-ciri struktural selulosa inilah yang menyebabkan mempunyai kekuatan mekanis yang tinggi dan bersifat tahan terhadap reaksi-reaksi kimia (Southgate, 1976: 83).

b. Hemiselulosa

Hemiselulosa adalah polisakarida yang mempunyai derajat polimerisasi yang lebih rendah dari selulosa. Hemiselulosa merupakan polimer dari sejumlah sakarida-

sakarida yang berbeda-beda. Susunan dari bahan-bahan tersebut di dalam hemiselulosa sangat tidak teratur/heterogen (Tjokoroadikoesoema. 1986: 56).

Rantai utama dalam struktur kimia hemiselulosa dapat terdiri dari xilosa, manosa, galaktosa dan glukosa, sedangkan rantai cabangnya dapat terdiri dari arabinosa, galaktosa, dan asam glukoronat (Southgate, 1976: 83).

Rantai hemiselulosa bercabang-cabang dengan gugus β -glukosa di dalam molekul yang satu dapat berikatan dengan gugus hidroksil C₂, C₃ atau C₄ dari molekul lain (Tjokoroadikoesoema, 1986: 56).

C. Proses Pencernaan Dan Penyerapan Dietary Fiber

Ada berbagai komponen kimiawi dan sifat-sifat fisik spesifik yang ditemukan dalam serat makanan, dan hal ini akan mempengaruhi kondisinya di dalam usus. Menurut Mendeloff (1975), meskipun proses pengunyahan sayuran dan buah di dalam mulut dapat menstimulir kerja maksimal dari bagian pharynx, namun saat terjadi proses penelanan (*swallowing*) seratnya belum mengalami perubahan. Demikian juga pada *bread-cereals* tidak berbeda nyata dengan yang ada pada *white-bread*. Di dalam lambung, kelompok sayuran berserat tinggi, bila dimakan mentah akan lama berada di lambung dibandingkan dengan yang sudah dimasak sedangkan kelompok kacang-kacangan (*nuts*) yang berserat tinggi membutuhkan waktu pengosongan lebih lama dibandingkan dengan jenis makanan lainnya, karena lebih banyak mengandung lemak (Kusharto, 2006: 50)

Dengan penelitian mempergunakan radio isotop, diketahui bahwa diet yang relatif kaya karbohidrat akan lebih cepat meninggalkan lambung dan lebih cepat

melalui usus halus dibandingkan dengan diet yang mengandung roti yang terbuat dari tepung rendah ekstraksi (Mc Cance *et al*, 1953). Namun demikian, sulit memperlihatkan kontribusi serat pada fungsi normal organ pencernaan lain, seperti pankreas dan kantong empedu dan penyerapan dalam usus halus berkaitan dengan zat-zat gizi lainnya (Southgate, 1975: 231).

Hampir semua fungsi metabolisme serat makanan berkaitan dengan kolon. Flora bakteri bekerja aktif di dalam kolon. Setelah mencapai kolon, serat relatif tidak ada perubahan saat di lambung dan usus halus. Metabolisme bakteri ini menyebabkan pemecahan serat makanan di dalam kolon. Lebih kurang separuh dari serat makanan (terutama yang termasuk *unavailable carbohydrate*) dalam *western diet* akan diurai oleh kerja enzim dan bakteri usus menjadi produk-produk sebagai berikut:

1. Dirombak menjadi: (Kusharto, 2006: 50)
 - a. 50 % serat tidak tercerna (*undigested cellulose*).
 - b. % asam lemak berantai pendek (*short chain fatty acid*), air, CO₂, H dan metana.
2. Dipergunakan oleh tubuh: (Kusharto, 2006: 50)
 - a. Sedikit fraksi air akan diserap oleh bakteri usus atau diserap oleh serat melalui *hydrophobic binding*.
 - b. Asam empedu deoksikolat (*deoxy cholic acid*), asam litokolat (*litho-colic acid*) diserap untuk membentuk koloni bakteri. Kedua asam empedu ini bersifat ko-karsinogen atau membantu mempercepat pertumbuhan

karsinoma. Stalder (1984) membuktikan korelasi positif antara kadar asam empedu dengan insiden kanker kolon.

- c. Asam lemak volatil (asetat, butirat, propianat) merupakan anion utama didalam feses, kemurnian lemak larut air mempunyai efek osmotik, dan efek pencahar untuk peristalsis.
- d. Hidrogen dan CO₂, gas metana yang meningkatkan flatulens, sebagai hidrogen bebas melalui nafas/breath hidrogen
- e. Meningkatkan kandungan dan berat/volume feses.

D. Manfaat Serat Pangan

Beberapa manfaat serat pangan (*dietary fiber*) untuk kesehatan yaitu (Santoso, 2011: 39):

1. Mengontrol berat badan atau kegemukan (obesitas)

Serat larut air (*soluble fiber*), seperti pektin serta beberapa hemiselulosa mempunyai kemampuan menahan air dan dapat membentuk cairan kental dalam saluran pencernaan. Sehingga makanan kaya akan serat, waktu dicerna lebih lama dalam lambung, kemudian serat akan menarik air dan memberi rasa kenyang lebih lama sehingga mencegah untuk mengkonsumsi makanan lebih banyak. Makanan dengan kandungan serat kasar yang tinggi biasanya mengandung kalori rendah, kadar gula dan lemak rendah yang dapat membantu mengurangi terjadinya obesitas.

2. Penanggulangan Penyakit Diabetes

Serat pangan mampu menyerap air dan mengikat glukosa, sehingga mengurangi ketersediaan glukosa. Diet cukup serat juga menyebabkan terjadinya kompleks

karbohidrat dan serat, sehingga daya cerna karbohidrat berkurang. Keadaan tersebut mampu meredam kenaikan glukosa darah dan menjadikannya tetap terkontrol.

3. Mencegah Gangguan Gastrointestinal

Konsumsi serat pangan yang cukup, akan memberi bentuk, meningkatkan air dalam feses menghasilkan feces yang lembut dan tidak keras sehingga hanya dengan kontraksi otot yang rendah feces dapat dikeluarkan dengan lancar. Hal ini berdampak pada fungsi gastrointestinal lebih baik dan sehat.

4. Mencegah Kanker Kolon (Usus Besar)

Penyebab kanker usus besar diduga karena adanya kontak antara sel-sel dalam usus besar dengan senyawa karsinogen dalam konsentrasi tinggi serta dalam waktu yang lebih lama. Beberapa hipotesis dikemukakan mengenai mekanisme serat pangan dalam mencegah kanker usus besar yaitu konsumsi serat pangan tinggi maka akan mengurangi waktu transit makanan dalam usus lebih pendek, serat pangan mempengaruhi mikroflora usus sehingga senyawa karsinogen tidak terbentuk, serat pangan bersifat mengikat air sehingga konsentrasi senyawa karsinogen menjadi lebih rendah.

5. Mengurangi Tingkat Kolesterol dan Penyakit Kardiovaskuler

Serat larut air menjerat lemak di dalam usus halus, dengan begitu serat dapat menurunkan tingkat kolesterol dalam darah sampai 5% atau lebih. Dalam saluran pencernaan serat dapat mengikat garam empedu (produk akhir kolesterol) kemudian dikeluarkan bersamaan dengan feses. Dengan demikian

serat pangan mampu mengurangi kadar kolesterol dalam plasma darah sehingga diduga akan mengurangi dan mencegah resiko penyakit kardiovaskuler.

E. Pembuatan Tepung Serat

1. Sortasi

Sortasi dan penggolongan mutu sangat diperlukan untuk menggolongkan bahan pangan sesuai dengan ukuran dan ada tidaknya cacat. Penggolongan mutu adalah klasifikasi komoditi dan kelompok menurut standar yang secara komersil dapat diterima (Satuhu, 1996:156).

2. Pencucian

Pencucian meningkatkan penampakan hasil, dimana sering sekali pada hasil terdapat kotoran, tanah, serangga, jamur, dan sebagainya yang mengakibatkan hasil tidak sedap dipndang. Tidak jarang pula masih terdapat sisa-sisa fungisida dan insektisida pada hasil (Pantastico, 1993: 65)

Pencucian bertujuan untuk menghilangkan kotoran (tanah) yang menempel, residu fungisida atau insektisida. Pencucian dapat dilakukan dengan menggunakan air atau dengan sikat (Baliwati et, al, 2004: 187).

3. Pengeringan

Pengeringan sebagai cara suatu cara untuk menghilangkan atau mengeluarkan sebagian air dari dalam bahan pangan dengan menggunakan energi panas sampai batas dimana mikroorganisme tidak dapat tumbuh didalamnya (Winarno, 1993: 67).

Kegiatan–kegiatan bakteri membutuhkan kelembaban. Jadi, pengeringan pangan, yang menurunkan kandungan air secara berarti, membantu menghentikan

kegiatan bakteri. Dalam bahan-bahan pangan yang telah dikeringkan, nilai gizi meningkat untuk zat-zat makanan yang tahan terhadap panas, cahaya, dan pengaruh udara dalam jangka waktu lama (Harper, 1986: 145).

Keuntungan pengeringan adalah bahan menjadi lebih awet dan volume bahan menjadi lebih kecil sehingga mempermudah dan menghemat ruang pengangkut dan pengepakan, berat bahan juga menjadi berkurang (Winarno, 1993: 145).

F. Ekstraksi

Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi bau yang ditetapkan (Dirjen POM, 2014: 89)

Ekstraksi adalah kegiatan penarikan kandungan kimia yang dapat larut sehingga terpisah dari bahan yang tidak dapat larut dengan pelarut cair. Simplisia yang diekstrak mengandung senyawa kimia yang dapat larut dan senyawa yang tidak dapat larut seperti serat, karbohidrat, protein dan lain-lain. Struktur kimia yang berbeda-beda akan mempengaruhi kelarutan serta stabilitas senyawa-senyawa tersebut terhadap pemanasan, udara, cahaya, logam berat, dan derajat keasaman. Dengan diketahuinya senyawa aktif yang dikandung simplisia akan mempermudah pemilihan pelarut dan cara ekstraksi yang tepat (Dirjen POM, 2000: 78).

Keberhasilan proses ekstraksi salah satunya dikarenakan pemilihan solvent yang tepat. Kriteria pemilihan solvent antara lain adalah selektivitas, kelarutan,

kekampuan tidak saling bercampur, reaktivitas, titik didih dan kriteria-kriteria pendukung lainnya seperti murah, tersedia dalam jumlah besar, tidak beracun, tidak dapat terbakar, tidak eksplosif bila bercampur dengan udara, tidak korosif, memiliki viskositas yang rendah, serta stabil secara kimia dan termis (Dirjen POM, 2000: 78).

Jenis bahan yang diekstraksi Jika bahan yang diekstraksi memiliki struktur yang lunak maka ekstraksi dapat berlangsung lebih cepat dan banyak molekul yang akan terlarut. Tetapi jika bahan yang diekstraksi memiliki struktur yang keras maka diperlukan perlakuan khusus agar bahan tersebut mudah diekstraksi (Dirjen POM, 2000: 78).

Ekstraksi dilakukan pada suasana sedikit asam. Proses pengasaman bertujuan untuk memecahkan dinding sel sehingga memudahkan proses ekstraksi. Pengasaman dapat dilakukan dengan menggunakan asam sulfat, asam asetat, atau asam sitrat (Winarno, 1993: 67).

Proses pemasakan mengukur pH sampai pH 6. Selama pemasakan akan terjadi penghancuran dinding sel yang terjadi akibat hidrolisis pada waktu pengasaman maupun pada waktu ekstraksi. Proses penghancuran dinding sel bertujuan untuk memperluas permukaan bahan sehingga mempermudah proses pelarutan (Astawan, 1991:98).

Maserasi merupakan cara penyarian yang sederhana. Maserasi dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari. Cairan penyari akan menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat aktif, zat aktif akan larut dan karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif

didalam sel dengan yang di luar sel, maka larutan yang terpekat terdesak ke luar. Peristiwa tersebut berulang sehingga terjadi keseimbangan konsentrasi antara di luar sel dan di dalam sel (Dirjen POM, 2000: 78).

Maserasi digunakan untuk penyarian simplisia yang mengandung zat aktif yang mudah larut dalam cairan penyari, tidak mengandung zat yang mudah larut dalam cairan penyari, tidak mengandung zat yang mudah mengembang dalam cairan penyari, tidak mengandung benzoin, stirok dan lain-lain. Cairan penyari yang digunakan dapat berupa air, etanol atau pelarut lain. Bila cairan penyari digunakan air maka untuk mencegah timbulnya kapang, dapat ditambahkan bahan pengawet, yang diberikan pada awal penyarian (Dirjen POM, 2000: 68).

Pada penyarian dengan cara maserasi, perlu dilakukan pengadukan. Pengadukan diperlukan untuk meratakan konsentrasi larutan di luar butir serbuk simplisia, sehingga dengan pengadukan tersebut tetap terjaga adanya derajat perbedaan konsentrasi yang sekecil-kecilnya antara larutan di dalam sel dengan larutan di luar sel (Dirjen POM, 2000: 68).

Hasil penyarian dengan cara maserasi perlu dibiarkan selama waktu tertentu. Waktu tersebut diperlukan untuk mengendapkan zat-zat yang tidak diperlukan tetapi ikut terlarut dalam cairan penyari (Dirjen POM, 2000: 68).

Agar diperoleh rendamen yang maksimal dan bermutu baik, dilakukan ekstraksi yang tepat. Faktor yang sangat berpengaruh terhadap jumlah dan mutu pektin yang terekstrak adalah suhu, waktu dan keasaman selama ekstraksi berlangsung. Faktor lain seperti jenis asam harus mendapat perhatian, karena

semakin kuat asam yang digunakan maka akan meningkatkan jumlah rendemen (Hanifah, 2002: 16).

G. Tinjauan Islam Tentang Serat

Bumi diciptakan dari satu sistem yang kompleks yang tersusun dari beberapa sistem kecil yang belum tentu diketahui secara pasti oleh manusia. Oleh karena itu, Allah SWT selalu memerintahkan kepada hambanya untuk menuntut ilmu secara tersirat maupun tersurat. Hal ini seiring dengan Firman Allah SWT dalam QS Ali-Imran (3): 191

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ فِيمَا وُقُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَطْلًا سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Terjemahnya;

“Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka (Kementrian Agama, 2007: 51).

Ayat ini menjelaskan sebagian dari ciri-ciri siapa yang dinamai *Ulul Albab*. Mereka adalah orang-orang yang terus mengingat Allah, dengan ucapan dan atau hati dalam seluruh situasi kondisi saat bekerja atau istirahat, sambil berdiri atau duduk dan dalam keadaan baring, atau bagaimana pun dan mereka memikirkan penciptaanya, yakni kejadian dan sistem kerja langit dan bumi dan setelah itu berkata sebagai kesimpulan: *“Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan alam raya dan segala isinya ini dengan sia-sia”* tanpa tujuan yang hak (Shihab, 2009: 356)

Kalimat diatas, terlihat bahwa objek zikir adalah Allah, sedangkan objek befikir adalah makhluk-makhluk Allah berupa fenomena alam. Ini berarti pengenalan kepada Allah lebih banyak didasarkan kepada kalbu, sedangkan pengenalan akal, yakni berpikir. Akal memiliki kebebasan yang seluas-luasnya untuk memikirkan fenomena alam, tetapi ia memiliki keterbatasan dalam memikirkan zat Allah (Shihab, 2009: 357).

Jadi Allah SWT menciptakan alam raya tidak sia-sia. Segala apa yang ada dimuka bumi memiliki manfaat. Tinggal bagaimana kita mencari tahu dengan menuntut ilmu agar kita mengetahuinya. Dan adapun manusia yang menyia-nyiakan ciptaan Allah SWT maka celakalah ia.

Banyak penelitian yang telah dilakukan oleh manusia untuk menemukan berbagai hal yang mungkin sebelumnya belum pernah terpikirkan oleh manusia itu sendiri. Seharusnya hal ini bisa menjadi dasar untuk tiap-tiap manusia menyadari kekuasaan dan kebesaran Allah SWT. Allah berfirman dalam QS. Al- An'am (6): 99

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا
 تُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنَ النَّخْلِ قِنَوانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ
 وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۗ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۗ إِنَّ فِي
 ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٩٩﴾

Terjemahnya:

“dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumubuh-tumbuhan maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami

keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai dan kebun-kebun anggur dan Kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya diwaktu pohonnya berbuah dan (perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman.” (Kementrian Agama, 2007: 129)

Dalam komentarnya tentang ayat ini, kitab *al-Muntakhab fi at-Tafsir* yang ditulis oleh sejumlah pakar mengemukakan bahwa: ayat tentang tumbuh-tumbuhan ini menerangkan proses penciptaan buah yang tumbuh. Pada saat menapai fase kematangan itu, suatu jenis buah mengandung komposisi zat gula, minyak, protein, berbagai zat karbohidrat dan zat tepung (Shihab, 2009: 357).

Allah berfirman dalam Q.S. Asy-syuara (26): 7

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ۝٧

Terjemahnya :

“Dan Apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik”. (Kementrian Agama, 2007: 368)

Dalam kitab *Tafsir Al-Mishbah* (2009), dijelaskan bahwa ayat ini membuktikan melalui uraiannya-keniscayaan ke-Esaan Allah Swt. Dimana mereka (orang kafir) tidak memperhatikan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang beraneka warna, masing-masing mempunyai kekhususan sendiri baik daun, bunga dan buahnya. Padahal semuanya tumbuh di tanah yang sejenis dan diairi dengan air yang sama, tetapi menghasilkan buah-buahan yang berlainan bentuk, warna dan

rasanya. Tidakkah yang demikian itu menunjukkan kekuasaan dan kebijaksanaan Pencipta-Nya (Shihab, 2009: 278).

Obat-obatan yang digunakan dalam pengobatan dapat berasal dari bahan sintetik maupun dari bahan alam. Dewasa ini bahan alam khususnya tumbuhan telah banyak diteliti oleh para ahli untuk dikembangkan menjadi suatu bahan obat, mengingat bahwa negara kita kaya akan berbagai jenis tumbuhan yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia, salah satu diantaranya adalah dalam pengobatan yang biasa dikenal dengan obat tradisional. Allah berfirman dalam QS Luqman (31): 10

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ

Terjemahnya;

“Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan adanya segala pasangan yang baik. (Kementrian Agama, 2007: 412)

Dari beberapa ayat diatas dapat diketahui bahwa Allah SWT menciptakan berbagai macam tumbuhan untuk dimanfaatkan manusia. Dalam hal ini, dimanfaatkan sebagai sampel yang dapat digunakan sebagai bahan penelitian untuk diketahui manfaatnya sebagai bahan pengobatan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif eksperimental laboratorium

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Laboratorium Farmasi Biologi dan Kimia Analisa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Berlangsung mulai dari bulan Juli 2017 sampai Oktober 2017. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu tahap persiapan dan pelaksanaan. Tahap persiapan meliputi persiapan bahan. Sementara itu, tahap pelaksanaan terdiri atas tahap pembuatan, tahap pengamatan dan tahap analisis data.

B. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan eksperimental. Pendekatan eksperimental adalah pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian eksperimen. Pendekatan eksperimental dilakukan dengan membuat tepung dan serat larut air serta dilakukan pengujian terhadap serat tersebut. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mengetahui cara produksi serat pangan larut dan konsentrasi berapa serat pangan larut yang menghasilkan kualitas yang paling bagus.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian. Populasi penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah buah belimbing wuluh (*Averrhoa bilimbi* L.) yang diperoleh dari Kabupaten Bone, Kecamatan Salomekko.

2. Sampel

Sampel yang digunakan pada penelitian adalah belimbing wuluh (*Averrhoa bilimbi* L.) matang.

D. Instrumen Penelitian dan Pengumpulan Data

1. Alat yang Digunakan

Alat yang digunakan yaitu alat-alat gelas (Pyrex®), gelas ukur (Pyrex®), erlenmeyer (Pirex®), ayakan, blender, desikator, krus, kondensor, labu alas bulat (Pyrex®), oven, pH meter, pipet mikro 100-1000 µl (Socorex® Isba S.A), rotary evaporator, statif klem, tanur, timbangan analitik, dan vorteks.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

2. Bahan yang Digunakan

Bahan-bahan yang digunakan yaitu aquadest, asam asetat, asam sulfat, asam klorida 0,2%, 0,4%, 0,6%, 0,8% dan 1%, buah belimbing wuluh matang dan natrium hidroksida.

1. Pengambilan Sampel

Sampel buah belimbing wuluh (*Averrhoa bilimbi* L) yang sudah matang dipanen dan dibersihkan kemudian disortasi basah dan dicuci.

2. Pembuatan Tepung Serat Belimbing Wuluh

Buah belimbing wuluh kemudian dipotong-potong dengan pisau dengan tebal $\pm 0,5$ cm. Buah belimbing wuluh yang telah dipotong-potong lalu dikeringkan dengan menggunakan oven pada suhu 60°C selama 18 jam. Buah belimbing wuluh kering yang dihasilkan kemudian dihaluskan dengan menggunakan blender hingga menghasilkan bentuk tepung kemudian diayak dengan ukuran ayakan 60 mesh (Daryono, 2012: 23).

3. Ekstraksi Serat Pangan Larut dari Tepung Buah Belimbing Wuluh

Serbuk buah belimbing wuluh yang sudah dihaluskan sebanyak 50 gram direndam dengan larutan asam klorida dengan konsentrasi masing- masing 0,2%, 0,4%, 0,6%, 0,8% dan 1% selama 12 jam. Kemudian disaring dan dibilas dengan air mengalir sampai tidak berbau asam. Setelah itu masing-masing residu hasil saringan dimasukkan dalam beker glass yang berisi air 500 ml dan ditambahkan asam asetat 0,5% sampai pH 6. Kemudian dipanaskan pada suhu 90°C selama 45 menit, lalu disaring sampai diperoleh filtrat. Filtrat yang diperoleh dikeringkan dalam oven pada suhu 40°C selama 5 hari, dihaluskan dengan blender dan diayak dengan ukuran mesh 60. Hasil yang diperoleh kemudian dianalisis dengan parameter yaitu % rendamen, % kadar abu, % kadar air, % kadar serat kasar, dan % daya serap air (Sinaga, 2009: 19).

4. Pengukuran Data

- a. Penentuan % rendamen (Sinaga, 2009: 22)

Rendamen dihitung atas dasar rumus sebagai berikut:

$$\text{Rendamen (\%)} = \frac{\text{berat awal}}{\text{berat akhir}} \times 100\%$$

- b. Penentuan % kadar air (Dirjen POM, 2014: 1865)

Ditimbang bahan sebanyak 2 gram didalam aluminium foil yang telah diketahui berat kosongnya. Kemudian dikeringkan dalam oven dengan suhu sekitar 105°C – 110°C selama 3 jam, lalu didinginkan didalam desikator selama 15 menit kemudian ditimbang kembali. Selanjutnya dipanaskan kembali didalam oven selama 30 menit, kemudian di dinginkan di dalam desikator dan ditimbang. Perlakuan ini diulang sampai diperoleh berat yang konstan.

$$\text{kadar air (\%)} = \frac{\text{berat awal} - \text{berat akhir}}{\text{berat awal}} \times 100\%$$

- c. Penentuan % kadar abu (Dirjen POM, 2014: 1975)

Sampel ditimbang sebanyak 2 gram dalam kurs porselin yang kering dan telah diketahui beratnya, kemudian dipijarkan dalam tanur pada suhu 400°C selama 3 jam hingga diperoleh abu dan dimasukkan ke dalam deikator. Ditimbang berat abu setelah dingin.

$$\text{kadar abu (\%)} = \frac{\text{berat abu}}{\text{berat sampel}} \times 100\%$$

- d. Penentuan % kadar serat kasar (Dirjen POM, 2014: 23)

Sampel ditimbang sebanyak 2 gram dan dimasukkan ke dalam gelas erlenmeyer, kemudian ditambahkan 200 ml larutan H_2SO_4 0,2 N dan refluks selama 30 menit, lalu disaring dengan kertas saring dan residu yang tertinggal didalam erlenmeyer dicuci dengan aquadest mendidih. Residu pada kertas saring dipindahkan ke dalam labu alas bulat kembali dengan spatula dan dicuci dengan larutan NaOH 0,3 N sebanyak 200 ml sampai semua residu masuk kedalam labu, kemudian refluks kembali selama 30 menit. Disaring dengan kertas saring yang telah diketahui beratnya, dicuci lagi residu dengan aquadest mendidih, setelah itu kertas saring beserta isinya dikeringkan pada suhu $110^\circ C$ selama 1-2 jam sampai beratnya konstan, didinginkan dalam desikator dan ditimbang dengan rumus sbb:

1. Berat residu = berat serat kasar
2. Dihitung persentase kadar serat

$$\text{kadar serat kasar (\%)} = \frac{\text{berat serat kasar}}{\text{berat sampel}} \times 100\%$$

- e. Penentuan % daya serap air (Dirjen POM, 2014: 1762)

Daya serap air ditentukan dengan metode sentrifuge 1 gram contoh dicampur dengan 10 ml aquadest dalam tabung sentrifuge yang telah diketahui beratnya, kemudian dikocok selama 30 detik. Didiamkan selama 30 menit lalu air yang berada diatas endapan dibuang kemudian berat endapan dicatat. Selisih antara berat endapan dengan berat contoh merupakan jumlah penyerapan oleh serat.

$$\text{daya serap air (\%)} = \frac{\text{berat endapan-berat contoh}}{\text{berat air}} \times 100\%$$

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Pengamatan

1. Pembuatan Tepung

Buah Belimbing wuluh sebanyak 10 kg dibuat tepung menggunakan metode pengeringan.

Tabel 5. Hasil Tepung dari Buah Belimbing Wuluh

Berat Basah	Berat Kering
10 kg	350 g

2. Ekstraksi Serat Larut

Ekstraksi serat larut dari 50 gram tepung belimbing wuluh dengan menggunakan asam klorida menghasilkan serat larut ekstrak belimbing wuluh (*Averrhoa bilimbi L.*), yaitu sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil (%) rendamen ekstrak belimbing wuluh;

Konsentrasi HCl (%)	Berat Awal	I (g)	II (g)	% I	% II	% Rata-Rata
A	50 g	0,64	0,63	1,28	1,26	1,27
B		0,69	0,71	1,38	1,42	1,40
C		0,74	0,78	1,48	1,56	1,52
D		0,79	0,85	1,58	1,70	1,64

I : Berat Akhir Penimbangan I
II : Berat Akhir Penimbangan II

% I : %Rata2 Kadar Abu I
% II : %Rata2 Kadar Abu II

5. Penentuan Kadar Serat Kasar

Tabel 9. Hasil (%) Kadar serat kasar ekstrak belimbing wuluh (*Averrhoa bilimbi* L.);

Konsentrasi HCl (%)	Berat Awal	I (g)	II (g)	% I	% II	% Rata-Rata
A	2 g	0,10	0,11	5	5,5	5,25
B		0,13	0,12	6,5	6	6,25
C		0,14	0,14	7	7	7
D		0,18	0,18	9	9	9
E		0,26	0,21	13	10,5	11,75

Ket : A : konsentrasi HCl 0,2 %

B : konsentrasi HCl 0,4 %

C : konsentrasi HCl 0,6 %

I : Berat Akhir Penimbangan I

II : Berat Akhir Penimbangan II

D: konsentrasi HCl 0,8 %

E: konsentrasi HCl 1 %

% I : %Rata2 Serat Kasar I

% II : %Rata2 Serat Kasar II

6. Penentuan Daya Serap Air

Tabel 10. Hasil (%) Daya Serap Air Ekstrak Belimbing wuluh (*Averrhoa bilimbi* L.);

Konsentrasi HCl (%)	Berat Awal	I (g)	II (g)	% I	% II	% Rata-Rata
A	1 g	3,37	3,50	23,7	25	24,35
B		4,42	4,72	34,2	37,2	35,7
C		4,57	4,79	35,7	37,9	36,8
D		4,80	4,93	38	39,3	38,65
E		4,97	5,31	39,7	43,1	41,4

Ket : A : konsentrasi HCl 0,2 %

B : konsentrasi HCl 0,4 %

C : konsentrasi HCl 0,6 %

I : Berat Akhir Penimbangan I

D: konsentrasi HCl 0,8 %

E: konsentrasi HCl 1 %

% I : %Rata2 Daya Serap Air I

II : Berat Akhir Penimbangan II

%II : %Rata2 Daya Serap Air II



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

7. Analisis Data dengan Menggunakan Metode Anova

Tabel 11. Hasil Analisis Data Metode Anova

		ANOVA				
		Sum of Squares	df	Mean Square	F Tabel F Hitung	Sig.
Rendamen	Between Groups	.350	4	.088	33.159	.001
	Within Groups	.013	5	.003	6.3913	*
	Total	.363	9			
Kadar Air	Between Groups	55.850	4	13.963	8.865	.017
	Within Groups	7.875	5	1.575	6.3913	*
	Total	63.725	9			
Kadar Serat Kasar	Between Groups	53.150	4	13.288	19.685	.003
	Within Groups	3.375	5	.675	6.3913	*
	Total	56.525	9			
Kadar Abu	Between Groups	13.750	4	3.438	3.618	.095
	Within Groups	4.750	5	.950	6.3913	Ns
	Total	18.500	9			
Daya Serap Air	Between Groups	341.426	4	85.357	29.658	.001
	Within Groups	14.390	5	2.878	6.3913	*
	Total	355.816	9			

Apabila $F_{Tabel} > F_{Hitung}$ maka H_0 diterima (NS)

Apabila $F_{Tabel} < F_{Hitung}$ maka H_0 ditolakP (*)

Tabel 12. Hasil Uji BNT

Konsentrasi	Rendamen	Kadar Air	Kadar Serat Kasar	Daya Serap Air
A	C, D, dan E	D dan E	D dan E	C, D dan E
B	D dan E	D dan E	D dan E	A dan E
C	A dan E	-	E	A dan E
D	A, B dan E	A dan B	A, B dan E	E
E	A, B, C dan D	A dan B	A, B, C dan D	A, B dan C


A : Konsentrasi 0,2%

B : Konsentrasi 0,4%


C : Konsentrasi 0,6%

D : Konsentrasi 0,8%


E : Konsentrasi 1%




Grafik.1. Hubungan antara konsentrasi asam dengan % Rendamen




Grafik.2. Hubungan antara konsentrasi asam dengan % Kadar Air



Grafik.3. Hubungan antara konsentrasi asam dengan % Kadar Abu



Grafik.4. Hubungan antara konsentrasi asam dengan % Kadar Serat Kasar



Grafik.5. Hubungan antara konsentrasi asam dengan % Daya Serap Air

B. Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah serat pangan larut dapat diproduksi dari Buah Belimbing Wuluh (*Averrhoa bilimbi* L.). Hasil dari pembuatan serat pangan larut ini nantinya akan diuji parameternya untuk mengetahui konsentrasi asam klorida manakah yang dapat menghasilkan serat pangan larut yang berkualitas. Penelitian ini menggunakan sampel Buah Belimbing Wuluh (*Averrhoa bilimbi* L.).

Sampel yang digunakan adalah buah belimbing wuluh yang matang karena menurut penelitian *Petil et al (2010)* buah belimbing wuluh yang matang mengandung pektin yang tinggi. Adapun ciri-cirinya yaitu nampak kekuningan. Sampel buah belimbing wuluh (*Averrhoa bilimbi* L.) yang sudah dipanen kemudian disortasi basah dan dicuci dengan air mengalir. Pencucian bertujuan untuk menghilangkan kotoran (tanah) yang menempel, residu fungisida atau insektisida. Pencucian dapat dilakukan dengan menggunakan air atau dengan sikat (*Baliwati et al, 2004*). Buah belimbing wuluh dipotong-potong dan dikeringkan dengan menggunakan oven pada suhu 60°C selama 18 jam. Keutungan pengeringan adalah agar bahan lebih awet dan volume bahan menjadi lebih kecil serta membantu menghentikan kegiatan bakteri sehingga bahan menjadi tidak cepat rusak (*Winarno, 1993*). Buah belimbing wuluh kering yang dihasilkan kemudian dihancurkan kembali hingga halus dengan menggunakan blender hingga menghasilkan bentuk tepung kemudian diayak dengan ukuran ayakan 60 mesh. Pengayakan dimaksudkan untuk menghasilkan campuran butir dengan ukuran tertentu agar dapat diolah lebih

lanjut atau agar diperoleh penampilan atau bentuk komersial yang diinginkan (Bernasconi *et al*, 1995).

Tahap selanjutnya adalah ekstraksi serat makanan larut dari tepung buah belimbing wuluh yaitu serbuk buah belimbing wuluh yang sudah dihaluskan sebanyak 50 gram direndam dengan larutan asam klorida dengan konsentrasi masing-masing 0,2%, 0,4%, 0,6%, 0,8% dan 1% selama 12 jam. Menurut Kertesz (1951), asam yang digunakan dalam ekstraksi adalah asam tartrat, asam malat, asam sitrat, asam laktat, asam asetat, asam fosfat tetapi ada kecenderungan untuk menggunakan asam mineral yang murah seperti asam sulfat, asam klorida, dan asam nitrat sedangkan menurut Marwan (2006) asam klorida lebih cepat mengkatalis hidrolisis komponen pati dibandingkan dengan polisakarida non-pati lainnya. Kemudian disaring dan dibilas dengan air mengalir sampai tidak asam yaitu diukur dengan pH meter sampai pH 7. Hal ini dilakukan agar asam klorida hasil ekstraksi hilang karena asam klorida bersifat merusak dan tidak boleh dikonsumsi (Nurhayati *et al*, 2016). Setelah itu masing-masing residu hasil saringan dimasukkan dalam beker glass yang berisi air 500 ml dan ditambahkan asam asetat 0,5% sampai pH 6. Asam asetat digunakan untuk ekstraksi serat larut karena aman digunakan sebagai preservasi bahan makanan dan tidak ada batasan maksimal yang telah ditentukan untuk dikonsumsi manusia (Sinaga. 2009). Kemudian dipanaskan pada suhu 90°C selama 45 menit karena ekstraksi serat biasa dilakukan dengan cara memanaskan bahan pada suhu tertentu dalam larutan asam (Akhmalludin dan Kurniawan, 2008). Lalu disaring sampai diperoleh filtrat. Filtrat yang diperoleh dikeringkan dalam oven

pada suhu 40°C selama 5 hari, dihaluskan dengan blender dan diayak dengan ukuran mesh 60 untuk mendapatkan ukuran partikel yang seragam.

Ekstraksi dengan menggunakan asam mineral menghasilkan rendemen yang lebih tinggi dibandingkan asam organik. Rendemen merupakan rasio antara hasil yang diperoleh dengan bahan dasarnya. Dalam setiap proses produksi diharapkan menghasilkan rendemen yang tinggi (Hariyanti, 2006: 21).

Dari data yang diatas untuk Rendamen (%) dapat dilihat bahwa rendamen tertinggi terdapat pada perlakuan konsentrasi asam klorida 1% yaitu sebesar 1,81% dan yang terendah terdapat pada perlakuan konsentrasi asam klorida 0,2% yaitu sebesar 1,27%.

Dari hasil uji ANOVA (Tabel 11) menunjukkan bahwa interaksi jenis asam dan konsentrasi asam memberikan pengaruh berbeda nyata ($p > 0,05$) terhadap rendamen yang dihasilkan, sehingga uji dilanjutkan. Dari Hasil Uji BNT (Tabel 12) konsentrasi E (1%) memberikan pengaruh yang sangat nyata ($p > 0,05$) dibanding dengan konsentrasi A, B, C, dan D.

Jumlah rendamen juga tergantung dari konsentrasi asam yang digunakan. Semakin tinggi konsentrasi pelarut, maka semakin banyak kadar rendamen yang dihasilkan. Peranan asam dalam ekstraksi pektin adalah untuk memisahkan ion polivalen, memutus ikatan antara asam pektinat dengan selulosa, menghidrolisa protopektin menjadi molekul yang lebih kecil dan menghidrolisa gugus metil ester pektin (Kertesz. 1951). Konsentrasi pelarut yang tinggi akan meningkatkan pelepasan protopektin dari buah belimbing wuluh sehingga kadar pektin yang

didapatkan semakin besar pula (Fakhrizal. 2015) Selain itu, dari Grafik 1 juga dapat diketahui bahwa rendamen dihasilkan paling banyak pada konsentrasi pelarut 1% dibandingkan pelarut pada variasi konsentrasi lainnya. Menurut Hanifah (2002), bahwa faktor yang sangat berpengaruh terhadap jumlah dan mutu serat yang terekstrak adalah suhu, waktu dan keasaman selama ekstraksi berlangsung.

Kadar air merupakan salah satu parameter penting yang menentukan daya tahan produk pangan dan terkait dengan aktifitas mikroorganisme selama penyimpanan. Produk yang mempunyai kadar air tertinggi lebih mudah rusak karena produk tersebut dapat menjadi media yang kondusif bagi pertumbuhan mikroorganisme. Produk dengan kadar air yang rendah relatif lebih stabil dalam penyimpanan jangka panjang dari pada produk yang berkadar air tinggi (Nurviani. 2014). Dalam upaya memperpanjang masa simpan, dilakukan pengeringan sampai dengan batas kadar air tertentu. Pengeringan pada suhu rendah bertujuan meminimalkan degradasi pektin (Hariyanti, 2006: 22)

Dari data kadar air (%) (tabel 6 dan Grafik 2) dapat dilihat bahwa kadar air tertinggi terdapat pada perlakuan konsentrasi asam klorida 0,2% yaitu sebesar 8,75% dan yang terendah terdapat pada perlakuan konsentrasi asam klorida 1% yaitu sebesar 3%. Adapun standar mutu kadar air dari serat pangan larut adalah 1-12%.

Hasil uji ANOVA (Tabel 11) menunjukkan bahwa interaksi jenis asam dan konsentrasi asam memberikan pengaruh berbeda nyata ($p > 0,05$) terhadap kadar air yang dihasilkan, sehingga uji dilanjutkan. Dari hasil uji BNT (Tabel 12) konsentrasi

A (0,2 %) memberikan pengaruh yang sangat nyata ($p>0.05$) dibanding dengan konsentrasi B, C, D dan E

Ikatan polimer yang panjang mengandung air yang lebih banyak dengan adanya asam dapat memutuskan ikatan polimer yang panjang menjadi pendek sehingga airnya menguap. Konsentrasi asam yang digunakan dalam ekstraksi juga berpengaruh terhadap kadar air yang dihasilkan. Hal ini tergantung pada kemampuan asam dalam memutus ikatan polimer suatu bahan. Konsentrasi asam yang semakin tinggi maka kadar air akan cenderung menurun. Hal ini disebabkan karena asam yang ditambahkan menyebabkan terjadinya proses difusi (Daryono, 2012: 20).

Belimbing wuluh matang mengandung mineral yang terdapat pada belimbing wuluh. Kadar abu merupakan salah satu penentu tingkat kemurnian suatu sampel. Semakin tinggi kadar abu tingkat kemurniannya semakin rendah (Roikah, et al, 2016: 31)

Dari data untuk kadar abu (%) (Tabel 7 dan Grafik 3) dapat dilihat bahwa kadar abu tertinggi terdapat pada perlakuan konsentrasi asam klorida 1% yaitu sebesar 4,75% dan yang terendah terdapat pada perlakuan konsentrasi asam klorida 0,2% yaitu sebesar 1,5%. Adapun standar mutu kadar abu dari serat pangan larut adalah 4-10%.

Hasil uji ANOVA (Tabel 11) menunjukkan bahwa interaksi jenis asam dan konsentrasi asam memberikan pengaruh berbeda tidak nyata ($p>0,05$) terhadap kadar abu yang dihasilkan, sehingga uji tidak dilanjutkan.

Abu adalah zat anorganik sisa hasil pembakaran suatu bahan organik. Kandungan abu dan komposisinya tergantung pada jenis bahan dan cara pengabuan. Mineral dalam suatu bahan merupakan garam organik (seperti garam-garam malak, oksalat, asetat dan pektat) dan garam anorganik (seperti garam fosfat, karbonat, klorida, sulfat dan nitrat). Kadar abu ada hubungannya dengan mineral suatu bahan. Jika kadar abu dalam suatu bahan makin rendah kandungan mineralnya akan semakin rendah dan juga sebaliknya (Hariyanti. 2006). Menurut Afrianti (2004) Semakin tinggi kadar abu pada serat maka semakin tinggi kandungan nutrisi serat tersebut (Arifanti. 2004).

Serat kasar adalah senyawa yang biasa di analisa di laboratorium yaitu senyawa yang tidak dapat dihidrolisa oleh asam atau alkali. Di dalam buku daftar komposisi bahan makanan, yang dicantumkan adalah kadar serat kasar bukan kasar serat makanan. Kadar serat kasar dalam suatu makanan dapat dijadikan indeks kadar serat makanan karena umumnya didalam serat kasar ditemukan sebanyak 0,2-0,5 bagian jumlah serat makanan (Sinaga, 2009: 40).

Dari data kadar serat kasar (%) (Tabel 8 dan Grafik 4) dapat dilihat bahwa kadar serat kasar tertinggi terdapat pada konsentrasi asam klorida 1% yaitu sebesar 11,75% dan yang terendah terdapat pada konsentrasi asam klorida 0,2% yaitu sebesar 5,25%. Adapun standar mutu kadar serat kasar dari serat pangan larut adalah 5%.

Hasil uji ANOVA (Tabel 11) menunjukkan bahwa interaksi jenis asam dan konsentrasi asam memberikan pengaruh berbeda nyata ($p > 0,05$) terhadap kadar serat

kasar yang dihasilkan, sehingga uji dilanjutkan. Dan dari Hasil Uji BNT (tabel 12) konsentrasi E (1%) memberikan pengaruh yang sangat nyata ($p>0.05$) dibanding dengan konsentrasi A, B, C, dan D.

Serat kasar merupakan indikator dari daya cerna suatu bahan. Serat kasar merupakan senyawa yang tidak larut jika direbus berturut-turut dalam H_2SO_4 dan NaOH (Sinaga, 2009: 40)

Daya serap air merupakan kemampuan bahan dalam menyerap air. Serat makanan yang baik mempunyai kemampuan-kemampuan menyerap air yang baik pula karena di dalam tubuh akan menyerap komponen-komponen yang tidak penting bagi tubuh (Sinaga, 2009: 45).

Dari data daya serap air (%) (Tabel 9 dan Grafik 5) dapat dilihat bahwa daya serap air yang paling tertinggi terdapat pada konsentrasi asam klorida 1% yaitu sebesar 41,4% dan yang terendah terdapat pada konsentrasi asam klorida 0,2% yaitu sebesar 24,35%.

Hasil uji ANOVA (Tabel 11) menunjukkan bahwa interaksi jenis asam dan konsentrasi asam memberikan pengaruh berbeda nyata ($p>0,05$) terhadap daya serap air yang dihasilkan, sehingga uji dilanjutkan. Dari Hasil Uji BNT (Tabel 12) konsentrasi E (1%) memberikan pengaruh yang sangat nyata ($p>0.05$) dibanding dengan konsentrasi A, B, C, dan D

Pada penggunaan konsentrasi asam yang lebih kecil, ukuran partikel serat yang akan dihasilkan akan semakin kecil dan kemampuannya untuk mengikat air akan semakin rendah sejalan dengan ukuran partikel serat (Raharja. 2012).

Penggunaan konsentrasi asam yang tinggi dapat memutus ikatan hidrogen dengan lebih cepat dan menghasilkan struktur serat yang renggang sehingga daya serap air yang tinggi (Sinaga, 2009: 45).

C. Tinjauan islam

Kesehatan lingkungan mempunyai pengaruh yang sangat besar baik terhadap manusia maupun terhadap keseimbangan ekologi dan sumber daya alam. Oleh karena itu, kesehatan lingkungan pada dasarnya merupakan upaya untuk mengendalikan semua faktor yang ada pada lingkungan fisik manusia yang diperkirakan menimbulkan berbagai hal yang merugikan pertumbuhan dan perkembangan fisiknya, kesehatannya, kesejahteraannya, atau untuk kelangsungan hidupnya (Ali, 2010: 56)

Limbah sering dianggap tidak bermanfaat dan mengganggu kenyamanan lingkungan. Limbah sering dianggap sebagai sesuatu yang kotor, menimbulkan bau yang tidak sedap dan mengundang penyakit. Manusia sering memandang sebelah mata terhadap limbah tanpa berpikir dibalik citra negatif limbah ternyata memiliki sebuah potensi besar yang luput terlihat (Ali, 2010:56)

Seperti HR. Al-Bukhari dan Muslim yang berbunyi: *“Sementara seorang laki-laki berjalan di jalan raya, ia dapati sepotong duri di atasnya, lalu dia membuangnya dari jalan raya, maka Allah menyukai dan mengampuni dosanya”*. Maksud dari hadits tersebut adalah Allah sangat menyukai orang-orang bersih sampai-sampai Dia akan mengampuni dosa hambanya yang menyukai kebersihan (Ali, 2010: 57).

Allah berfirman dalam QS. Ali-Imran (3): 191

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾

Terjemahnya:

”(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka”

Seperti halnya limbah yang diolah menjadi bahan yang berguna karena semua makhluk hidup tidak diciptakan sia-sia, karena ada makhluk yang baik dan yang jahat, ada yang durhaka dan ada pula yang taat.

Allah berfirman dalam QS. Al-Isra (17): 44

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ۗ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا
يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ۗ إِنَّهُ كَانَ خَلِيمًا غَفُورًا

Terjemahnya:

”Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada suatupun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun”

Maksud dari ayat tersebut adalah sesungguhnya segala yang ada di dalam bumi itu semuanya memuji Allah. Hanya saja kita tidak mengerti bagaimana mereka bertasbih. Limbah itu juga adalah salah satu makhluk Allah yang tidak bisa kita analisis bagaimana bertasbihnya. Hal ini memperkuat keyakinan kita bahwa segala

sesuatu yang ada disekitar kita semuanya bertasbih, apapun itu bentuknya, dimanapun dan kapanpun (Shihab, 2009: 459).

Dari uraian-uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Allah sangat menyukai orang-orang yang senantiasa menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan bisa dilakukan dengan berbagai cara contohnya yaitu mengolah limbah. Karena limbah merupakan salah satu makhluk Allah dan Allah tidak menciptakan sesuatu dengan sia-sia sehingga buah belimbing wuluh yang tadinya hanya sebuah limbah dapat dijadikan serat pangan larut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Serat pangan larut dapat diproduksi dari Buah Belimbing Wuluh (*Averrhoa bilimbi* L.).
2. Konsentrasi asam klorida 1% merupakan konsentrasi yang paling berkualitas dalam pembuatan serat pangan larut dari Buah Belimbing Wuluh (*Averrhoa bilimbi* L.).
3. Menurut Islam tumbuhan yang diciptakan oleh Allah memiliki banyak manfaat baik itu dari daun, kulit buah, akar dan batang. Manfaat dari buah belimbing wuluh, yaitu dapat dijadikan serat pangan. Dimana, dalam buah belimbing wuluh (*Averrhoa bilimbi* L.) terdapat senyawa serat pangan larut yang bermanfaat sebagai penurunan kolesterol dan diabetes melitus.

B. Saran

1. Sebaiknya dilakukan pembuatan serat larut buah belimbing wuluh (*Averrhoa bilimbi* L.) dengan menggunakan metode enzimatik.
2. Sebaiknya dilakukan penelitian mengenai pengaruh suhu dan lama ekstraksi dari Buah Belimbing Wuluh (*Averrhoa bilimbi* L.).

KEPUSTAKAAN


- Al-Qur'an Al-karim. Kementerian Agama RI. 2007
- Ali, Zainal. Agama, Kesehatan dan Keperawatan. Jakarta Timur: CV. Trans Info Media. 2010.
- Astawan, M dan M. Wahyuni. *Tehnologi Pengolahan Pangan Nabati Tepat Guna*. Jakarta: Akademika Pressindo. 1991
- Badan POM RI. *Formularium Ramuan Etnomedisin Obat Asli Indonesia*. Direktorat Obat Asli Indonesia. 2012
- Beliwati, et.al. *Pengantar Pangan dan Gizi*. Jakarta: Penebar Swadaya. 2004
- Bernasconi, et al. *Teknologi Kimia Bagian 2. Terjemahan I*. Jakarta: Pradya Paramita 1995.
- Dalimartha, Setiawan. *36 Resep Tumbuhan Obat*. Depok: Penebar Swadaya, 2008
- Dirjen POM. *Farmakope Indonesia*, Edisi V, Jakarta: Departemen Kesehatan RI. 2014
- Dirjen POM. *Parameter Standar Umum Ekstrak Tumbuhan Obat*. Cetakan Pertama. Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 2000
- Dangat, Bhaurav. et al. *Mineral Analysis Of Averrhoa Bilimbi L. – A Potential Fruit India*: Department of Botany Shivaji University. 2014
- Daryono, Elvianto Dwi. *Ekstraksi Pektin Dari Labu Siam*. Malang: Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Nasional. 2012
- Fakhrizal et al. *Pengaruh Konsentrasi Pelarut Hcl Pada Ekstraksi Pektin Dari Kulit Pisang Ambon*. Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat. 2015
- Fairudz, Alyssa dan Khairun Nisa. *Pengaruh Serat Pangan terhadap Kadar Kolesterol Penderita Overweight*. Lampung: Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, 2015
- Harper, L.J, Deaton, B.J and J.Adriskel. *Pangan, Gizi dan Pertanian*. Jakarta: UI-Press. 1986
- Hanifah N. *Kajian Sifat Fisik dan Organolptik Pektin Kulit Pisang dari Beberapa Varietas dan Tingkat Kematangan*. Jakarta: Jurnal Sains dan Tehnologi Indonesia. 2002.
- Hazal, Ozyurt, et al. *Effect Of Food Processing On The Physicochemical Properties Of Dietary Fibre*. Turkey: Faculty of Engineering, 2016

- Hariyanti, Mauliyah Nur. *Ekstraksi Dan Karakterisasi Pektin Dari Limbah Proses Pengolahan Jeruk Pontianak (Citrus Nobilis Var Microcarpa)*. Bogor: Fakultas Teknologi Pertanian IPB. 2006
- Kusharto, Clara M. *Serat Makanan Dan Peranannya Bagi Kesehatan (Dietary Fiber and Its Role for Health)*. Bandung: Fakultas Ekologi Manusia (FEMA), 2006
- Kumar, Ashok, et al. *A Review On Phytochemical Constituents And Biological Assays Of Averrhoa Bilimbi*. India: Department of Biotechnology, Krishna University, Machilipatnam, 2013
- Kertesz, Z.I. *The Pectin Substances*. New York: Interscience Pub. Inc., 1951.
- Lei, Wang, et.al. Comparison of physicochemical characterization of five types of citrus dietary fibers. China: Beijing Research Institute of Nutritional Resources, 2015
- Luthfiya dan Iffa Hidayati. *Formulasi Tablet Effervescent Dari Ekstrak Daun Belimbing Wuluh (Averrhoa Bilimbi L.) Sebagai Anti Hipertensi*. Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2007
- Maneerat, Nitjaree, et al. *Effect of extraction condition on properties of pectin from banana peels and its function as fat replacer in salad cream* India: Association of Food Scientists & Technologists, 2016
- Meng-mei Ma dan Tai-hua Mu. *Effects of extraction methods and particle size distribution on the structural, physicochemical, and functional properties of dietary fiber from deoiled cumin*. China: Laboratory of Food Chemistry and Nutrition Science, 2015
- Nurhidajah, et al. *Kadar Serat Pangan Dan Daya Cerna Pati Nasi Merah Yang Diperkaya Kappa-Karagenan Dan Ekstrak Antosianin Dengan Variasi Metode Pengolahan*. Semarang: FIKKES Universitas Muhammadiyah Semarang, 2015
- Nurviani, et al. *Ekstraksi Dan Karakterisasi Pektin Kulit Buah Pepaya (Carica Papaya L.) Varietas Cibinong, Jingga Dan Semangka*. Palu: Universitas Tadulako. 2014
- Nurhayati et.al. *Pectin Extraction from Banana Peels and Bunch with Various Temperatures and Methods*. Jember: Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Jember. 2016
- Pakaya, Rini, et al. *Pengaruh Penambahan Jantung Pisang Goroho (Musa Sp.) Terhadap Kandungan Gizi Dan Organoleptik Abon Ikan Cakalang (Katsuwonus Pelamis)*. Manado: Universitas Sam Ratulangi: 2015


- Pantastico, ER.B. *Fisiologi Pasca Panen Penanganan dan Pemanfaatan Buah-Buahan dan Sayur-Sayuran Tropika dan Sub Tropika*. Yogyakarta: UGM Press. 1993.
- Prasetyowati, et.al. *Ekstraksi Pektin Dari Kulit Mangga* Jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya. 2009.
- Raharja, Sapta, et al. *Ekstraksi Dan Analisa Dietary Fiber Dari Buah Mengkudu (Morinda Citrifolia)*. Fakultas Teknologi Pertanian: Departemen Teknologi Industri Pertanian. 2012
- Roikah, Sri, et al. *Ekstraksi dan Karakterisasi Pektin Dari Belimbing Wuluh (Averrhoa Bilimbi,L)*. Semarang: Universitas Negeri Semarang. 2016
- Santoso, Agus. *Serat Pangan (Dietary Fiber) Dan Manfaatnya Bagi Kesehatan*. Unwidha Klaten. Fakultas Teknologi Pertanian. 2011
- Saragih, Bernatal. *Analisis Mutu Tepung Bonggol Pisang Dari Berbagai Varietas Dan Umur Panen Yang Berbeda*. Samarinda: Universitas Mulawarman, 2013
- Satuhu. S. *Penanganan dan Pengolahan Buah*. Jakarta: Penebar Swadaya. 1996
- Sinaga, Ferawalden. *Studi Pembuatan Serat Makanan dari Tongkol Jagung*. Medan: Universitas Sumatra Utara, 2009
- Shihab, M.Quraish. *Tafsir Al-Mishbah Vol.1*. Jakarta: Lantera Hati. 2009.
- Shihab, M.Quraish. *Tafsir Al-Mishbah Vol.2*. Jakarta: Lantera Hati. 2009.
- Shihab, M.Quraish. *Tafsir Al-Mishbah Vol.3*. Jakarta: Lantera Hati. 2009.
- Shihab, M.Quraish. *Tafsir Al-Mishbah Vol.9*. Jakarta: Lantera Hati. 2009.
- Shihab, M.Quraish. *Tafsir Al-Mishbah Vol.10*. Jakarta: Lantera Hati. 2009.
- Southgate DAT. *Determination of Food Carbohydrates*. London” Applied Science Publisher Ltd. 1976.
- Southgate DAT. *Fiber and other Available Carbohydrate and Energy Effects in the Diet 1975*. Proc.western Hemisphere Nutr. Con. 1975
- Tjokroadikoesoemo, P. Soebiyanto. *HFS dan Industri Ubi Kayu Lainnya*. Jakarta: PT.Gramedia. 1986
- Winarno, F.G.,. *Gizi, Tehnologi dan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1993
- Zaimah. *Manfaat Serat bagi Kesehatan*. Medan: Universitas Sumatra Utara, 2009


LAMPIRAN


Lampiran 1. Pengambilan sampel



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 2. Pembuatan Tepung Serat Belimbing wuluh

Lampiran 3. Ekstraksi Serat Larut Tepung Buah Belimbing Wuluh



Lampiran 4. Perhitungan

1. Rendamen (%)

$$\text{Rendamen (\%)} = \frac{\text{berat akhir}}{\text{berat awal}} \times 100 \%$$

a. Perlakuan I

1. Untuk konsentrasi 0,2 %

$$\text{Rendamen (\%)} = \frac{0,64}{50} \times 100 \% = 1,28 \%$$

2. Untuk konsentrasi 0,4 %

$$\text{Rendamen (\%)} = \frac{0,69}{50} \times 100 \% = 1,38 \%$$

3. Untuk konsentrasi 0,6 %

$$\text{Rendamen (\%)} = \frac{0,74}{50} \times 100 \% = 1,48 \%$$

4. Untuk konsentrasi 0,8 %

$$\text{Rendamen (\%)} = \frac{0,79}{50} \times 100 \% = 1,58 \%$$

5. Untuk konsentrasi 1 %

$$\text{Rendamen (\%)} = \frac{0,89}{50} \times 100 \% = 1,78 \%$$

b. Perlakuan II

1. Untuk konsentrasi 0,2 %

$$\text{Rendamen (\%)} = \frac{0,63}{50} \times 100 \% = 1,26 \%$$

2. Untuk konsentrasi 0,4 %

$$\text{Rendamen (\%)} = \frac{0,71}{50} \times 100 \% = 1,42 \%$$

3. Untuk konsentrasi 0,6 %

$$\text{Rendamen (\%)} = \frac{0,78}{50} \times 100 \% = 1,56 \%$$

4. Untuk konsentrasi 0,8 %

$$\text{Rendamen (\%)} = \frac{0,85}{50} \times 100 \% = 1,70 \%$$

5. Untuk konsentrasi 1 %

$$\text{Rendamen (\%)} = \frac{0,92}{50} \times 100 \% = 1,84 \%$$

c. % Rata-rata Rendamen

$$\text{Rendamen (\%)} = \frac{\text{Konsentrasi I} + \text{Konsentrasi II}}{2}$$

1. Untuk konsentrasi 0,2 %

$$\text{Rendamen (\%)} = \frac{1,28 + 1,26}{2} = 1,27 \%$$

2. Untuk konsentrasi 0,4 %

$$\text{Rendamen (\%)} = \frac{1,38 + 1,42}{2} = 1,40 \%$$

3. Untuk konsentrasi 0,6 %

$$\text{Rendamen (\%)} = \frac{1,48 + 1,56}{2} = 1,52 \%$$

4. Untuk konsentrasi 0,8 %

$$\text{Rendamen (\%)} = \frac{1,58 + 1,70}{2} = 1,64 \%$$

5. Untuk konsentrasi 1 %

$$\text{Rendamen (\%)} = \frac{1,78 + 1,84}{2} = 1,81 \%$$

2. Penentuan Kadar Air (%)

$$\text{Kadar Air (\%)} = \frac{\text{berat awal} - \text{berat akhir}}{\text{berat awal}} \times 100 \%$$

a. Perlakuan I

1. Untuk konsentrasi 0,2 %

$$\text{Kadar Air (\%)} = \frac{2 - 1,82}{2} \times 100 \% = 9 \%$$

2. Untuk konsentrasi 0,4 %

$$\text{Kadar Air (\%)} = \frac{2 - 1,83}{2} \times 100 \% = 8,5 \%$$

3. Untuk konsentrasi 0,6 %

$$\text{Kadar Air (\%)} = \frac{2 - 1,89}{2} \times 100 \% = 5,5 \%$$

4. Untuk konsentrasi 0,8 %

$$\text{Kadar Air (\%)} = \frac{2 - 1,90}{2} \times 100 \% = 5 \%$$

5. Untuk konsentrasi 1 %

$$\text{Kadar Air (\%)} = \frac{2 - 1,91}{2} \times 100 \% = 4,5 \%$$

b. Perlakuan II

1. Untuk konsentrasi 0,2 %

$$\text{Kadar Air (\%)} = \frac{2 - 1,83}{2} \times 100 \% = 8,5 \%$$

2. Untuk konsentrasi 0,4 %

$$\text{Kadar Air (\%)} = \frac{2 - 1,83}{2} \times 100 \% = 8,5 \%$$

3. Untuk konsentrasi 0,6 %

$$\text{Kadar Air (\%)} = \frac{2 - 1,88}{2} \times 100 \% = 6 \%$$

4. Untuk konsentrasi 0,8 %

$$\text{Kadar Air (\%)} = \frac{2 - 1,95}{2} \times 100 \% = 2,5 \%$$

5. Untuk konsentrasi 1 %

$$\text{Kadar Air (\%)} = \frac{2 - 1,97}{2} \times 100 \% = 1,5 \%$$

c. % Rata-rata Kadar Air

$$\text{Kadar Air (\%)} = \frac{\text{Konsentrasi I} + \text{Konsentrasi II}}{2}$$

1. Untuk konsentrasi 0,2 %

$$\text{Kadar Air (\%)} = \frac{9 + 8,5}{2} = 8,75 \%$$

2. Untuk konsentrasi 0,4 %

$$\text{Kadar Air (\%)} = \frac{8,5 + 8,5}{2} = 8,5 \%$$

3. Untuk konsentrasi 0,6 %

$$\text{Kadar Air (\%)} = \frac{5,5 + 6}{2} = 5,75 \%$$

4. Untuk konsentrasi 0,8 %

$$\text{Kadar Air (\%)} = \frac{5 + 2,5}{2} = 3,75 \%$$

5. Untuk konsentrasi 1 %

$$\text{Kadar Air (\%)} = \frac{4,5 + 1,5}{2} = 3 \%$$

3. Kadar Abu (%)

$$\text{Kadar Abu (\%)} = \frac{\text{berat abu}}{\text{berat sampel}} \times 100 \%$$

a. Perlakuan I

1. Untuk konsentrasi 0,2 %

$$\text{Kadar Abu (\%)} = \frac{0,05}{2} \times 100 \% = 2,5 \%$$

2. Untuk konsentrasi 0,4 %

$$\text{Kadar Abu (\%)} = \frac{0,05}{2} \times 100 \% = 2,5 \%$$

3. Untuk konsentrasi 0,6 %

$$\text{Kadar Abu (\%)} = \frac{0,08}{2} \times 100 \% = 4 \%$$

4. Untuk konsentrasi 0,8 %

$$\text{Kadar Abu (\%)} = \frac{0,08}{2} \times 100 \% = 4 \%$$

5. Untuk konsentrasi 1 %

$$\text{Kadar Abu (\%)} = \frac{0,10}{2} \times 100 \% = 5 \%$$

- b. Perlakuan II

1. Untuk konsentrasi 0,2 %

$$\text{Kadar Abu (\%)} = \frac{0,01}{2} \times 100 \% = 0,5 \%$$

2. Untuk konsentrasi 0,4 %

$$\text{Kadar Abu (\%)} = \frac{0,03}{2} \times 100 \% = 1,5 \%$$

3. Untuk konsentrasi 0,6 %

$$\text{Kadar Abu (\%)} = \frac{0,04}{2} \times 100 \% = 2 \%$$

4. Untuk konsentrasi 0,8 %

$$\text{Kadar Abu (\%)} = \frac{0,07}{2} \times 100 \% = 3,5 \%$$

5. Untuk konsentrasi 1 %

$$\text{Kadar Abu (\%)} = \frac{0,09}{2} \times 100 \% = 4,5 \%$$

- c. % Rata-rata Kadar Abu

$$\text{Kadar Abu (\%)} = \frac{\text{Konsentrasi I} + \text{Konsentrasi II}}{2}$$

1. Untuk konsentrasi 0,2 %

$$\text{Kadar Abu (\%)} = \frac{2,5 + 0,5}{2} = 1,5 \%$$

2. Untuk konsentrasi 0,4 %

$$\text{Kadar Abu (\%)} = \frac{2,5+1,5}{2} = 2 \%$$

3. Untuk konsentrasi 0,6 %

$$\text{Kadar Abu (\%)} = \frac{4 + 2}{2} = 3 \%$$

4. Untuk konsentrasi 0,8 %

$$\text{Kadar Abu (\%)} = \frac{4 + 3,5}{2} = 3,75 \%$$

5. Untuk konsentrasi 1 %

$$\text{Kadar Abu (\%)} = \frac{5 + 4,5}{2} = 4,75 \%$$

4. Kadar Serat Kasar (%)

$$\text{Kadar Serat Kasar (\%)} = \frac{\text{Kadar Serat Kasar}}{\text{berat sampel}} \times 100 \%$$

a. Perlakuan I

1. Untuk konsentrasi 0,2 %

$$\text{Kadar Serat Kasar (\%)} = \frac{0,10}{2} \times 100 \% = 5 \%$$

2. Untuk konsentrasi 0,4 %

$$\text{Kadar Serat Kasar (\%)} = \frac{0,13}{2} \times 100 \% = 6,5 \%$$

3. Untuk konsentrasi 0,6 %

$$\text{Kadar Serat Kasar (\%)} = \frac{0,14}{2} \times 100 \% = 7 \%$$

4. Untuk konsentrasi 0,8 %

$$\text{Kadar Serat Kasar (\%)} = \frac{0,18}{2} \times 100 \% = 9 \%$$

5. Untuk konsentrasi 1 %

$$\text{Kadar Serat Kasar (\%)} = \frac{0,26}{2} \times 100 \% = 13 \%$$

b. Perlakuan II

1. Untuk konsentrasi 0,2 %

$$\text{Kadar Serat Kasar (\%)} = \frac{0,11}{2} \times 100 \% = 5,5 \%$$

2. Untuk konsentrasi 0,4 %

$$\text{Kadar Serat Kasar (\%)} = \frac{0,12}{2} \times 100 \% = 6 \%$$

3. Untuk konsentrasi 0,6 %

$$\text{Kadar Serat Kasar (\%)} = \frac{0,14}{2} \times 100 \% = 7 \%$$

4. Untuk konsentrasi 0,8 %

$$\text{Kadar Serat Kasar (\%)} = \frac{0,18}{2} \times 100 \% = 9 \%$$

5. Untuk konsentrasi 1 %

$$\text{Kadar Serat Kasar (\%)} = \frac{0,21}{2} \times 100 \% = 10,5 \%$$

c. % Rata-rata Kadar Serat Kasar

$$\text{Kadar Serat Kasar (\%)} = \frac{\text{Konsentrasi I} + \text{Konsentrasi II}}{2}$$

1. Untuk konsentrasi 0,2 %

$$\text{Kadar Serat Kasar (\%)} = \frac{5 + 5,5}{2} = 5,25 \%$$

2. Untuk konsentrasi 0,4 %

$$\text{Kadar Serat Kasar (\%)} = \frac{6,5 + 6}{2} = 6,25 \%$$

3. Untuk konsentrasi 0,6 %

$$\text{Kadar Serat Kasar (\%)} = \frac{7 + 7}{2} = 7 \%$$

4. Untuk konsentrasi 0,8 %

$$\text{Kadar Serat Kasar (\%)} = \frac{9 + 9}{2} = 9 \%$$

5. Untuk konsentrasi 1 %

$$\text{Kadar Serat Kasar (\%)} = \frac{13 + 10,5}{2} = 11,75 \%$$

5. Daya Serap Air (%)

$$\text{Daya Serap Air (\%)} = \frac{\text{berat endapan} - \text{berat sampel}}{\text{berat air}} \times 100 \%$$

a. Perlakuan I

1. Untuk konsentrasi 0,2 %

$$\text{Daya Serap Air (\%)} = \frac{3,37-1}{10} \times 100 \% = 23,7 \%$$

2. Untuk konsentrasi 0,4 %

$$\text{Daya Serap Air (\%)} = \frac{4,42-1}{10} \times 100 \% = 34,2 \%$$

3. Untuk konsentrasi 0,6 %

$$\text{Daya Serap Air (\%)} = \frac{4,57-1}{10} \times 100 \% = 35,7 \%$$

4. Untuk konsentrasi 0,8 %

$$\text{Daya Serap Air (\%)} = \frac{4,80-1}{10} \times 100 \% = 38 \%$$

5. Untuk konsentrasi 1 %

$$\text{Daya Serap Air (\%)} = \frac{4,97-1}{10} \times 100 \% = 39,7 \%$$

b. Perlakuan II

1. Untuk konsentrasi 0,2 %

$$\text{Daya Serap Air (\%)} = \frac{3,5-1}{10} \times 100 \% = 25 \%$$

2. Untuk konsentrasi 0,4 %

$$\text{Daya Serap Air (\%)} = \frac{4,72-1}{10} \times 100 \% = 37,2 \%$$

3. Untuk konsentrasi 0,6 %

$$\text{Daya Serap Air (\%)} = \frac{4,79-1}{10} \times 100 \% = 37,9 \%$$

4. Untuk konsentrasi 0,8 %

$$\text{Daya Serap Air (\%)} = \frac{4,93-1}{10} \times 100 \% = 39,3 \%$$

5. Untuk konsentrasi 1 %

$$\text{Daya Serap Air (\%)} = \frac{5,31-1}{10} \times 100 \% = 41,4 \%$$

- c. % Rata-rata Daya Serap Air

$$\text{Daya Serap Air (\%)} = \frac{\text{Konsentrasi I} + \text{Konsentrasi II}}{2}$$

1. Untuk konsentrasi 0,2 %

$$\text{Daya Serap Air (\%)} = \frac{23,7 + 25}{2} = 24,35 \%$$

2. Untuk konsentrasi 0,4 %

$$\text{Daya Serap Air (\%)} = \frac{34,2 + 37,2}{2} = 35,7 \%$$

3. Untuk konsentrasi 0,6 %

$$\text{Daya Serap Air (\%)} = \frac{35,7 + 37,9}{2} = 36,8 \%$$

4. Untuk konsentrasi 0,8 %

$$\text{Daya Serap Air (\%)} = \frac{38 + 39,3}{2} = 38,65 \%$$

5. Untuk konsentrasi 1 %

$$\text{Daya Serap Air (\%)} = \frac{39,7 + 43,1}{2} = 41,4 \%$$



Lampiran 5. Gampar Pengamatan

A. *Pengambilan Sampel*



Gambar.3. Sampel Buah Belimbing Dipanen



Gambar.4. Sortasi Basah



Gambar.5. Belimbing dicuci dengan Air mengalir

B. Pembuatan Tepung Buah Belimbing Wuluh



Gambar.6. Belimbing Wuluh Dipotong-potong $\pm 0,5$ cm



Gambar.7. Dikeringkan dalam oven Suhu 60°C selama 18 jam



Gambar.8. Buah Kering dihancurkan dengan Blender



Gambar 9. Sampel diayak dengan ukuran 60 mesh

C. Ekstraksi Serat Tepung Buah Belimbing Wuluh



Gambar 10. Perendaman Sampel sebanyak 50 gr selama \pm 12 jam



Gambar.11. Penyaringan dan Pembilasan Ekstrak Tepung setelah perendaman



Gambar.12. Residu Ditambahkan 500ml Air



Gambar.13. Pemanasan diatas Water Bath suhu 90°C selama 45 menit



Gambar.14. Pengeringan Filtrat pada suhu 40°C



Gambar.15. Filtrat Kering yang telah diayak 60 Mesh



BIOGRAFI



Nama Lengkap : A. Siti Nuralam
Tanggal Lahir : Bone, 7 Mei 1995
Umur : 22 Tahun
Alamat : Kelurahan Pancaitana, Kecamatan
Salomekko, Kabupaten Bone
Nomor Hp : 082311612155
Email : annur.qween@gmail.com

Penulis merupakan anak ketiga dari lima bersaudara pasangan Bapak Nasruddin A.Halim, dan Ibu A.Wasilawati Pt. Bunga. Pernah menempuh jenjang pendidikan di TK Swadaya Banjarmasin, SDN Inp. 10/73 Pancaitana, dan SMP Negeri 1 Salomekko, serta SMA Negeri 1 Tonra. Penulis kini tengah menempuh jenjang pendidikan di UIN Alauddin Makassar dan menyusun tugas akhirnya. Penulis berharap, serangkaian tugas akhir ini dapat bermanfaat dalam bidang Farmasi khususnya dan bagi masyarakat dan ilmu pengetahuan umumnya. Motto dari penulis adalah *"Dimana ada kemauan disitu ada jalan"*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R