

**UJI EFEKTIVITAS ANTIHIPERGLIKEMIA TEH KOMBUCHA LIMBAH
RAMBUT JAGUNG (*Zea mays*) TERHADAP MENCIT (*Mus musculus*)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Farmasi
Pada Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh

ABDILLAH DOLLANGENG

NIM.70100113101

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2017

**UJI EFEKTIVITAS ANTIHIPERGLIKEMIA TEH KOMBUCHA LIMBAH
RAMBUT JAGUNG (*Zea mays*) TERHADAP MENCIT (*Mus musculus*)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Farmasi
Pada Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh

ABDILLAH DOLLANGENG

NIM.70100113101

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abdillah Dollangeng
NIM : 70100113101
Tempat, Tanggal lahir : Kolaka, 24 Agustus 1994
Jur/Prodi/Kosentrasi : Farmasi
Alamat : Jl Patunnuang, Antang
Judul : Uji Efektivitas Antihiperqlikemia Teh Kombucha Limbah Rambut Jagung (*Zea mays*) Terhadap Mencit (*Mus musculus*).

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa tulisan ini merupakan duplikat, tiruan, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya dibatalkan demi hukum.

Makassar, 23 November 2017

Penyusun,



Abdillah Dollangeng
NIM. 70100113101

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “Uji Efektivitas Antihiperqlikemia Teh Kombucha Limbah Rambut Jagung (*Zea mays*) Terhadap Mencit (*Mus musculus*)” disusun oleh **Abdillah Dollangeng**, NIM: 70100113101, Mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam Ujian Sidang Skripsi yang diselenggarakan pada hari, **Kamis, 23 November 2017 M** yang bertepatan dengan **4 Rabiul Awal 1439 H**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, 23 November 2017 M
4 Rabiul Awal 1439 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc	(.....)
Sekretaris	: Mukhriani, S.Si., M.Si., Apt.	(.....)
Pembimbing I	: Isriany Ismail, S.Si., M.Si., Apt.	(.....)
Pembimbing II	: Andi Tenriugi S.Si, M.Si	(.....)
Penguji I	: Karlina Amir Tahir, S.Si., M.Si., Apt.	(.....)
Penguji II	: Dra. St. Aisyah BM, M.Sos.I	(.....)



Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc
NIP. 19550203 198312 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt. atas segala nikmat kesehatan, kekuatan serta kesabaran yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Rasa syukur yang tiada terhingga kepadaNya atas segala hidayah dan karunia yang penulis dapatkan. Salawat dan salam juga tak lupa penulis haturkan kepada Rasulullah Muhammad saw., keluarga dan para sahabat beliau.

Skripsi dengan judul **“Uji Efektivitas Antihiperqlikemia Teh Kombucha Limbah Rambut Jagung (*Zea mays*) Terhadap Mencit (*Mus musculus*).”** ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Farmasi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Jurusan Farmasi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Besar harapan penulis agar skripsi ini menjadi penunjang, pengembangan ilmu pengetahuan ke depannya dan bermanfaat bagi orang banyak. Penulis sadari, skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Banyak terima kasih penulis haturkan kepada pihak yang telah membantu selama penulis menjalani pendidikan kuliah hingga selesainya perampungan skripsi ini.

Terima kasih yang setulusnya kepada kedua orangtua penulis, Ayahanda Dollangeng, S.Pd dan Ibunda Atika, atas segala do'a, kesabaran, kegigihan, bantuan materi serta pengorbanan yang diberikan dalam membesarkan dan mendidik sehingga

penulis dapat berada pada titik pencapaian saat ini. Terima kasih pula kepada Bapak/Ibu :

1. Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si., Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dan Prof. Dr. Mardan, M.Ag., Wakil Rektor I, Prof. Dr. H. Lomba Sultan, M.A., Wakil Rektor II, serta Prof. Siti Aisyah, M.A., Ph.D., Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
2. Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc., Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) UIN Alauddin Makassar dan Dr. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes., Wakil Dekan (Bidang Akademik), Dr. Andi Susilawaty, S.Si., M.Kes., Wakil Dekan (Bidang Administrasi dan Keuangan), dan Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd., Wakil Dekan (Bidang KeSmahasiswaan) Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Haeria, S.Si., M.Si., Ketua Jurusan Farmasi UIN Alauddin Makassar dan Mukhriani, S.Si., M.Si., Apt., Sekretaris Jurusan Farmasi.
4. Isriany Ismail, S.Si., M.Si., Apt., Pembimbing I penelitian ini yang sangat banyak memberi bimbingan, saran, arahan, motivasi dan bantuan selama penelitian serta meluangkan waktu, tenaga, pikiran kepada penulis sejak rencana penelitian sampai tersusunnya skripsi ini dan Andi Tenriugi S.Si, M.Si., Pembimbing II penelitian ini yang sangat banyak memberi bimbingan, saran arahan, motivasi dan bantuan selama penelitian serta meluangkan waktu, tenaga, pikiran kepada penulis sejak rencana penelitian sampai tersusunnya skripsi ini.
5. Karlina Amir Tahir, S.Si., M.Si., Apt., Penguji Kompetensi, terima kasih untuk ilmu dan saran yang telah diberikan demi kesempurnaan skripsi ini dan Dra. St.

- Aisyah BM, M.Sos.I., Penguji dan pembimbing agama yang telah memberikan tuntunan dan pengarahan dalam mengoreksi seluruh kekurangan pada skripsi ini.
6. Seluruh dosen, staf, civitas dan keluarga besar Farmasi atas sokongan dan informasi yang diberikan kepada penulis saat melaksanakan penelitian.
 7. Keluarga besar Jurusan Farmasi UIN Alauddin Makassar atas segala bantuan selama penulis selama menempuh pendidikan, kakak-kakak 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 dan 2010, 2011, 2012 serta adik-adik angkatan 2014, 2015, 2016, 2017
 8. Keluarga besar Jurusan Farmasi UIN Alauddin Makassar angkatan 2013 “*Fal3ion*” terima kasih atas do’a, dukungan, semangat, dan motivasi kalian semua tanpa terkecuali.
 9. Semua pihak yang tidak sempat disebutkan namanya satu-persatu, terima kasih atas perhatian dan bantuan yang diberikan pada penulis selama ini.

Dengan kerendahan hati, penulis berharap agar skripsi ini mendapat ridha dari Allah swt. dan memberi manfaat bagi masyarakat dan penikmat ilmu pengetahuan, khususnya kepada penulis sendiri. *Aamiin ya Rabbal Aalamin.*

Samata-Gowa, Oktober 2017
Penyusun,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



Abdillah Dollangeng
NIM. 70100113101

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1-7
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8-56
A. Uraian Tanaman	8
B. Uraian Hewan Coba.....	12
C. Kombucha.....	15
D. Diabetes Mellitus.....	29
E. Insulin	41
F. Diagnosa Diabetes.....	45
G. Pengobatan	46
H. Tinjauan Islam.....	51

BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	57-62
A. Jenis Dan Lokasi Penelitian	57
B. Pendekatan Penelitian.....	57
C. Instrumen Penelitian	57
D. Populasi Dan Sampel.....	58
E. Metode Pengumpulan Data.....	58
F. Teknik Pengolahan	62
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	63-70
A. Hasil Penelitian.....	63
B. Pembahasan	64
C. Kajian Keislaman	69
BAB V PENUTUP.....	71-72
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	71
KEPUSTAKAAN	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	90



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. Nilai Fisiologis Mencit.....	13
Tabel 2. Tempat injeksi, Volume sediaan dan ukuran jarum.....	15
Tabel 3. Mikroorganisme dan Kultur Kombucha	16
Tabel 4. Perbedaan DM Tipe 1 dan DM Tipe 2.....	35
Tabel 5. Kriteria Diagnostik Gula Darah	46
Tabel 6. Golongan senyawa hipoglikemik oral beserta mekanisme kerjanya	50
Tabel 7. Hasil Penurunan Glukosa Darah Mencit yang Diberi Perlakuan..	63
Tabel 8. Interval Penurunan Glukosa Darah Mencit.....	84
Tabel 9. Analisis Keseragaman dan F Tabel glukosa darah Mencit Jantan	87
Tabel 10. Analisis RAK, BNT, Hubungan Penurunan Glukosa Darah Mencit Dengan Sampel Uji.....	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1. Grafik Aktivitas Antihiperqlikemik Teh Kombucha Rambut Jagung (<i>Zea mays</i>)	64
Gambar 2. Pohon Jagung	82
Gambar 3. Rambut Jagung.....	82
Gambar 4. Teh Kombucha Rambut Jagung	82
Gambar 5. Proses Penginduksian.....	82
Gambar 6. Pengukuran Kadar Glukosa Darah Mencit.....	82
Gambar 7. Glukometer.....	82
Gambar 8. Grafik Penurunan Glukosa Darah Mencit	83



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Lampiran 1. Skema Kerja Penyiapan Sampel.....	77
Lampiran 2. Skema Kerja Pembuatan Teh Kombucha Rambut Jagung.....	78
Lampiran 3. Skema Kerja Perlakuan Hewan	79
Lampiran 4. Perhitungan Dosis Glibenkelamid Dan Dosis Teh Kombucha Yang Diindusikan	80
Lampiran 5. Gambar	82
Lampiran 6. Grafik Penurunan Glukosa Darah Mencit	83
Lampiran 7. Hasil Penurunan Glukosa darah mencit	84
Lampiran 8. Analisis Variasi Dan F Tabelnya.....	87
Lampiran 9. Analisis RAK, BNT Hubungan Penurunan Glukosa Darah Mencit dengan Sampel Uji.....	89

ABSTRAK

Nama : ABDILLAH DOLLANGENG
NIM : 70100113101
Judul : UJI EFEKTIVITAS ANTIHIPERGLIKEMIA TEH KOMBUCHA LIMBAH RAMBUT JAGUNG (*Zea mays*) TERHADAP MENCIT (*Mus musculus*).
Pembimbing I : Isriany Ismail, S.Si., M.Si., Apt.
Pembimbing II : Andi Tenriugi S.Si, M.Si

Peningkatan jumlah kematian akibat penyakit diabetes mellitus telah menjadi salah satu masalah kesehatan dunia terutama di negara maju. Penyakit ini tidak lagi mendominasi kelompok usia tua saja tetapi juga orang-orang yang lebih mudah. Pengobatan penyakit ini memerlukan waktu yang Panjang dan biaya yang relatife mahal, selain itu penderita penyakit ini beresiko mengalami komplikasi akibat efek samping dari obat-obat kimiawi yang dikonsumsi setiap hari. Sehingga pentingnya menemukan alternatif pengobatan yang baru. Rambut jagung merupakan tanaman yang secara tradisional digunakan untuk terapi penderita diabetes dan teh fermentasi (kombucha) dipercaya memiliki berbagai macam khasiat salah satunya sebagai antidiabetik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas teh kombucha limbah rambut jagung (*Zea mays*) dalam menurunkan kadar glukosa darah pada mencit (*Mus musculus*). Prosedur dimulai dari ekstraksi dengan metode infusa, lalu ditambahkan 10% sukrosa, 10% starter cair dan 2,5 b/v starter padat dan difermentasikan selama 14 hari. Penelitian ini menggunakan 5 kelompok uji yaitu, kelompok kontrol negative (K1), kelompok kontrol positif (K2), dan kelompok perlakuan dengan dosis teh kombucha limbah rambut jagung berturut-turut 0,26 ml/20gBB (K3), 0,52 ml/20gBB (K4), dan 0,78 ml/20gBB (K5). Data diperoleh dari pemeriksaan kadar glukosa darah puasa, 30 menit setelah induksi dengan glukosa, dan pada 30, 60, 90, dan 120 menit setelah pemberian kelompok perlakuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teh kombucha limbah rambut jagung (*Zea mays*) dapat menurunkan kadar glukosa darah dan dosis 0,78 ml/20gBB menunjukkan aktivitas tertinggi dalam penurunan kadar glukosa darah pada mencit (*Mus musculus*).

Kata kunci: Antihiperlikemik, Teh kombucha limbah rambut jagung (*Zea mays*), Glukosa darah

ABSTRACT

Name : ABDILLAH DOLLANGENG
NIM : 70100113101
Title : **TEST THE EFFECTIVENESS ANTIHIPERGLIKEMIA KOMBUCHA TE DISPOSAL OF HAIR MAIZE (*Zea mays*) ON MICE (*Mus musculus*).**
Advisor I : **Isriany Ismail, S.Si., M.Si., Apt.**
Advisor II : **Andi Tenriugi S.Si, M.Si**

Increasing in the number of deaths due to diabetes mellitus has become one of the world health problems, especially in developed countries. This disease no longer dominates the old age group but also the easier ones. Treatment of this disease takes a long time and cost is relative expensive. In addition, people with this disease at risk of complications due to side effects of chemical drugs are consumed every day. So the importance of finding new treatment alternatif. Corn hair is a plant traditionally used for the therapy of diabetics and fermented tea (kombucha) is believed to have a variety of properties one of them as antidiabetik. This study aims to determine the effectiveness of kombucha tea waste corn hair (*Zea mays*) in lowering blood glucose levels in mice (*Mus musculus*). The procedure starts from extraction with infusa method, then added 10% sucrose, 10% starter liquid and 2.5 b / v solid starter and fermented for 14 days. This study used 5 groups of test ie negative control group (K1), positive control group (K2), and treatment group with dosage of kombucha tea of corn hair waste were 0.26 ml / 20gBB (K3), 0.52 ml / 20gBB (K4), and 0.78 ml / 20gBB (K5). The data were obtained from fasting glucose, 30 min after induction with glucose, and at 30, 60, 90, and 120 min after administration of the treatment group. The results showed that kombucha tea corn waste (*Zea mays*) can lower blood glucose and dose 0,78 ml / 20gBB showed the highest activity in decreasing blood glucose level in mice (*Mus musculus*).

Key Words: Antihyperglycaemia, Kombucha Tea Of Corn Hair Waste (*Zea mays*), Blood Glucose

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan gaya hidup dan sosial ekonomi akibat urbanisasi dan modernisasi terutama masyarakat di kota-kota besar di Indonesia menjadi penyebab meningkatnya prevalensi penyakit degeneratif dan disinyalir menjadi salah satu yang harus diwaspadai adalah diabetes melitus. Diabetes melitus dikenal di Indonesia sebagai penyakit kencing manis, penyakit ini dapat diderita oleh siapa saja, baik tua maupun muda. Diabetes melitus (DM) adalah gangguan metabolik kronis yang ditandai dengan hiperglikemia. Hiperglikemia merupakan salah satu penanda terjadinya kelainan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein. Hiperglikemia mengakibatkan peningkatan radikal bebas di dalam sel dan dalam jumlah berlebihan dapat bersifat toksik yang mendorong terjadinya stres oksidatif yang mengakibatkan terjadinya komplikasi kronis. Hiperglikemia kronis diabetes berhubungan dengan kerusakan jangka panjang seperti mata, ginjal, saraf, jantung, dan pembuluh darah. Disfungsi dan kegagalan berbagai organ pada kasus ini adalah ketika organ pankreas tidak mampu memproduksi hormon insulin sesuai kebutuhan tubuh. Insulin adalah salah satu hormon yang diproduksi oleh pankreas yang bertanggung jawab untuk mengontrol jumlah atau kadar gula dalam darah dan insulin dibutuhkan untuk mengubah karbohidrat, lemak, dan protein menjadi energi yang diperlukan tubuh manusia (Demarco, 2015).

Obat antidiabetes oral kebanyakan memberikan efek samping yang tidak diinginkan sebab dapat menyebabkan resistensi serta kerusakan organ, maka terapi herbal diyakini relatif lebih aman. Berdasarkan data insidensi, epidemiologi dan komplikasi penyakit DM yang telah diperoleh maka sebaiknya masyarakat harus menyadari pentingnya tindakan pencegahan dan penatalaksanaan dini terhadap penyakit tersebut. Oleh karena itu diperlukan suatu pemeriksaan untuk mendiagnosi penyakit DM dengan pemeriksaan glukosa dalam darah menjadi pilihan utamanya (Yuliarisma, 2012).

Pengobatan penyakit ini memerlukan waktu yang panjang dan biaya yang relatif mahal, penderita berisiko menderita komplikasi yang disebabkan efek samping dari obat-obatan kimiawi yang dikonsumsi seumur hidup sehingga perlu dicari obat antidiabetik yang tidak memiliki efek samping, relatif murah dan mudah dijangkau masyarakat. Salah satu alternatifnya yaitu melakukan penelitian tentang obat tradisional yang dapat menurunkan kadar glukosa darah. World Health Organization (WHO) telah merekomendasikan penggunaan obat herbal dalam bidang kesehatan guna melakukan pencegahan serta penanganan suatu penyakit terhadap penyakit kronis serta degeneratif. WHO juga memperkirakan 80% penduduk dunia saat ini bergantung pada penggunaan obat herbal dalam aspek kesehatan primer (Yuliarisma, 2012).

Kombucha dalam istilah asing “jamur” kombu disebut dengan *SCOBY* (*symbiotic colon of bacteria yeast*). merupakan suatu ramuan tradisional berbentuk minuman yang merupakan hasil simbiosis bakteri dan ragi. Menurut beberapa ahli,

minuman ini berasal dari asia timur (cina dan india), kemudian menyebar ke afrika dan eropa hingga benua amerika. Kombucha terdiri dari lapisan gelatinoid serta membran yang liat dan berbentuk piring bulat (sesuai dengan bentuk tempatnya), berwarna putih, bertekstur kenyal seperti karet serta hidup dalam lingkungan nutrisi manis dan tumbuh terus-menerus membentuk susunan piringan berlapis dan bila dirawat dengan baik akan tumbuh sehat dan dapat mempunyai usia sangat lama. Pada proses fermentasi, bakteri akan mengubah gluosa menjadi jenis asam, vitamin, dan alkohol yang berkhasiat bagi tubuh (Naland, 2004).

Minuman fermentasi ini telah banyak diteliti dan diketahui memberikan banyak manfaat bagi kesehatan dalam menstimulasi sistem imun tubuh, meningkatkan sistem pencernaan dan fungsi hati. Potensi teh kombucha sebagai mencegah *diabetes melitus* selain disebabkan oleh keberadaan antioksidan penghambat radikal bebas juga disebabkan oleh adanya kandungan asam glukonat. Asam glukonat memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi membran sel dan memperkuat dinding usus agar dapat melawan infeksi. Selain itu, asam glukonat juga berfungsi dalam penyerapan kalsium dalam tubuh dan berperan dalam menurunkan kadar glukosa didalam darah (Dufresne & Farnworth, 2000).

Flavonoid merupakan salah satu golongan senyawa yang dapat mengatasi diabetes melitus. Khasiat dari flavonoid telah banyak diteliti dan terbukti secara ilmiah memiliki pengaruh yang bermakna pada penurunan kadar glukosa dalam darah. Salah satu tanaman yang mengandung flavonoid adalah rambut jagung (*Zea mays L.*). Rambut jagung merupakan bagian dari tanaman jagung yang belum dimanfaatkan

secara efektif Karena dianggap sebagai limbah. Rambut jagung memiliki khasiat sebagai obat tradisional. Khasiat yang terkandung dalam rambut jagung dapat diperoleh melalui olahan dari rambut jagung, salah satunya adalah minuman herbal. Ekstrak rambut jagung mengandung komponen bioaktif seperti minyak volatile, steroid, alkaloid, alantoin, tannin, flavonoid, asam klorogenat, dan senyawa fenolik lainnya. Rambut jagung mengandung protein karbohidrat, serta, vitamin B, vitamin C, vitamin K, minyak atsiri, garam mineral seperti: Na, Fe, Si, Zn, K, Ca, Mg, dan P, steroid seperti sitosterol dan stigmasterol, alkaloid, saponin, tanin, flavonoid, antosianin, protokatekin, vanilic acid, derivat hesperidin dan queretin, Fenol, terpenoid, dan glikosida. Komponen tersebut menunjukkan bahwa senyawa yang ditemukan pada ekstrak rambut jagung berkontribusi terhadap bidang farmasi (Sholihah, et al., 2012).

Rambut jagung digunakan secara empiris oleh masyarakat sebagai pengobatan tradisional diabetes melitus namun masih sangat sedikit penelitian secara ilmiah yang membuktikan khasiat tanaman tersebut sehingga perlu dilakukan pengembangan penelitian lebih lanjut tentang efek hiperglikemik limbah rambut jagung (*Zea mays* L.) dalam bentuk teh fermentasi menggunakan kultur bakteri tertentu atau yang lebih dikenal teh kombucha.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh pemberian teh kombucha limbah rambut jagung terhadap penurunan kadar gula darah pada mencit (*Mus musculus*)?
2. Berapa konsentrasi optimum teh kombucha limbah rambut jagung terhadap penurunan kadar gula darah pada mencit (*Mus musculus*)?
3. Bagaimana pandangan Islam terhadap uji efektivitas hiperglikemia teh kombucha limbah rambut jagung (*zea mays*) terhadap mencit (*mus musculus*)

C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

- a. Hiperglikemia adalah suatu kondisi dimana kadar glukosa dalam plasma darah melebihi batas normal.
- b. Diabetes melitus merupakan suatu kelompok penyakit metabolik yang ditandai dengan hiperglikemia, yang terjadi akibat kelainan sekresi insulin dan kerja insulin maupun keduanya.
- c. Rambut jagung merupakan bagian dari tanaman jagung yang belum dimanfaatkan secara efektif Karena dianggap sebagai limbah
- d. Teh kombucha adalah teh fermentasi dari simbiosis bakteri dan ragi

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian terbatas hanya untuk mengetahui efektivitas teh kombucha limbah rambut jagung dalam menurunkan kadar gula darah pada mencit (*Mus musculus*), dan mengetahui kosentrasi optimum teh limbah rambut jagung dalam menurunkan kadar gula darah mencit (*Mus musculus*), serta

membandingkan tingkat keefektifitasan teh kombucha limbah rambut jagung dengan teh limbah rambut jagung dalam menurunkan kadar gula darah mencit (*Mus musculus*).

D. Kajian Pustaka

Pada penelitian ini digunakan sampel rambut jagung dalam menurunkan kadar gula darah pada mencit karena telah dilakukan penelitian oleh (Koloay, et al., 2015) Tentang Uji Efektivitas Ekstrak Etanol Rambut Jagung (*Zea mays* L.) Terhadap Penurunan Kadar Gula Darah Tikus Putih Jantan Galur Wistar (*Rattus novergicus* L.) Yang Diinduksi Aloksan, menunjukkan bahwa ekstrak etanol rambut jagung (*Zea mays* L.) memiliki efek untuk menurunkan kadar darah pada tikus putih jantan galur wistar (*Rattus novergicus* L.) yang diinduksi aloksan dan dosis yang paling efektif ialah 2,52/KgBB.

Dalam penelitian (Hasanuddin, et al., 2012) Tentang *Corn Silk (Stigma maydis) in Healthcare: A Phytochemical and Pharmacological Review* menyatakan bahwa rambut jagung mengandung banyak komponen bioaktif yang dapat menjadi antioksidan dan mengobati berbagai macam penyakit seperti diuresis dan kaliuresis, mereduksi kadar gula darah, anti depresan, anti hiperlipidemia, anti diabetes, anti inflamasi dan sebagai neuroprotectif.

Dalam penelitian dibuat dalam bentuk teh kombucha untuk menurunkan kadar gula darah pada mencit udah dilakukan (Lukitawati, 2013) Tentang Pengaruh Teh Kombucha Terhadap Kadar Gula Darah *Rattus novergicus*, menunjukkan bahwa

minuman teh kombucha menyebabkan dampak menurunkan kadar glukosa darah *Rattus novergicus* dengan kadar 5,5 ml dan 8 ml.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Mengetahui efek pemberian teh kombucha limbah rambut jagung terhadap penurunan kadar gula darah pada mencit (*Mus musculus*).
- b. Menentukan konsentrasi optimum teh kombucha limbah rambut jagung terhadap penurunan kadar gula darah pada mencit (*Mus musculus*).
- c. Mengetahui pandangan Islam terhadap uji efektivitas hiperglikemia teh kombucha limbah rambut jagung (*zea mays*) terhadap mencit (*mus musculus*)

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah dapat menjadi alternatif pengobatan dalam menurunkan kadar gula darah pada pasien yang menderita diabetes melitus yang berasal dari limbah rambut jagung yang difermentasikan dengan kultur bakteri kombu.
- b. Dapat meningkatnya pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dalam mencari alternatif pengobatan penyakit-penyakit lainnya
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bukti ilmiah tentang manfaat teh kombucha limbah rambut jagung dalam menurunkan kadar gula darah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Uraian Tanaman

1. Klasifikasi Tanaman (Milind & Isha, 2013).

Regnum	: Plantae
Divisi	: Spermatophyta
Subdivisi	: Angiospermae
Kelas	: Monocotyledoneae
Ordo	: Poales
Famili	: Poaceae
Genus	: <i>Zea</i>
Spesies	: <i>Zea mays</i>

2. Nama Daerah

Jagung (Aceh, Pakpak), jaung (Karo), jagul (Toba), rigi (Nias), milu (Manado), jagueng (Minangkabau), jagong (Lubu, Sunda), jagung, janggal (Jawa), jhagung bun tebhun (Madura), jagung (Bali), binte (Gorontalo), binde (Buol), bite (Tolitoli), kastela (Ternate), tel (Tidore) (Purwono & Purnamawati, 2009).

3. Morfologi

Jagung merupakan tanaman semusim. Dalam satu siklus hidupnya terjadi selama 80-150 hari. Paruh pertama dari siklus merupakan tahap pertumbuhan vegetatif dan paruh kedua untuk tahap pertumbuhan generatif. Tanaman jagung merupakan

salah satu jenis tanaman pangan biji-bijian (*serelia*) dari keluarga rumput-tumputan (Staller, 2010).

a. Biji

Biji tanaman jagung dikenal sebagai kernel terdiri dari 3 bagian utama, yaitu dinding sel, endosperma, dan embrio. Bagian biji ini merupakan bagian yang terpenting dari hasil pemanenan. Bagian biji rata-rata terdiri dari 10% protein, 70% karbohidrat, 2.3% serat. Biji jagung juga merupakan sumber dari vitamin A dan E (Befield, 2008).

b. Daun

Pada awal fase pertumbuhan, batang dan daun tidak bisa dibedakan secara jelas. Ini dikarenakan titik tumbuh masih dibawah tanah. Daun baru dapat dibedakan dengan batang ketika 5 daun pertama dalam fase pertumbuhan muncul dari tanah. Daun terbentuk dari pelepah dan daun (leaf blade & sheath). Daun muncul dari ruas-ruas batang. Pelepah daun muncul sejajar dengan batang. Pelepah daun bewarna kecoklatan yang menutupi hampir semua batang jagung. Daun baru akan muncul pada titik tumbuhnya. Titik tumbuh daun jagung berada pada ruas batang. Daun jagung berjumlah sekitar 20 helai tergantung dari varietasnya. Sejalan dengan pertumbuhan jagung, diameter batang akan meningkat. Pertumbuhan diameter pada tanaman jagung menyebabkan 7-8 daun pada bagian bawah tanaman jagung mengalami kerontokan (Befield, 2008).

c. Batang

Jagung berbentuk ruas. Ruas-ruas berjajet secara vertikal pada batang jagung. Pada tanaman jagung yang sudah tua, jarak antar ruas semakin berkurang. Batang tanaman

jagung beruas-ruas dengan jumlah 10-40 ruas. Tanaman jagung umumnya tidak bercabang. Batang memiliki dua fungsi yaitu sebagai tempat daun dan sebagai tempat pertukaran unsur hara. Unsur hara dibawa oleh pembuluh bernama xilem dan floem. Floem bergerak dua arah dari atas kebawah dan dari bawah ke atas. Floem membawa sukrosa menuju seluruh bagian tanaman dengan bentuk cairan (Befield, 2008).

d. Akar

Akar tanaman jagung merupakan akar serabut yang tumbuh di bagian pangkal batang dan menyebar luas sebagai akar lateral. Kemudian akar seminal yang tumbuh ke bawah dari lembaga biji jagung. Batang tanaman jagung bulat silindris dan beruas-ruas, dan pada bagian pangkal batang beruas cukup pendek dengan jumlah sekitar 8 – 20 ruas. Dan rata-rata tinggi tanaman jagung antara satu sampai tiga meter di atas permukaan tanah. Sedangkan daun tanaman jagung berbentuk pita atau garis dan jumlah daunnya sekitar 8 – 48 helai tiap batangnya, tergantung pada jenis atau varietas yang ditanam. Panjang daun 30 cm – 45 cm dan lebarnya antara 5 cm – 15 cm (Milind & Isha, 2013).

e. Bunga

Setiap tanaman jagung biasanya terdapat bunga jantan dan bunga betina yang letaknya terpisah. Bunga jantan terdapat pada malai bunga di ujung tanaman, sedangkan bunga betina terdapat pada tongkol jagung. Bunga jantan yang terdapat di ujung tanaman masak lebih dahulu dari pada bunga betina. Persarian yang terbaik terjadi pada pagi hari, jumlah serbuk sari yang ada diperkirakan sekitar dua sampai lima juta per tanaman. Pada waktu itu terjadi proses penempelan serbuk sari pada

rambut. Serbuk sari terbentuk selama 7 – 15 hari. Persarian jagung umumnya dibantu oleh angin (Milind & Isha, 2013).

4. Kandungan Kimia

Ekstrak rambut jagung mengandung komponen bioaktif seperti minyak volatile, steroid, alkaloid, alantoin, tannin, flavonoid, asam klorogenat, dan senyawa fenolik lainnya. Rambut jagung mengandung protein karbohidrat, serta, vitamin B, vitamin C, vitamin K, minyak atsiri, garam mineral seperti: Na, Fe, Si, Zn, K, Ca, Mg, dan P, steroid seperti sitosterol dan stigmasterol, alkaloid, saponin, tanin, flavonoid, antosianin, protokatekin, vanilic acid, derivat hesperidin dan queretin, Fenol, terpenoid, dan glikosida. Komponen tersebut menunjukkan bahwa senyawa yang ditemukan pada ekstrak rambut jagung berkontribusi terhadap bidang farmasi (Sholihah, et al., 2012).

5. Manfaat

Rambut jagung digunakan sebagai obat tradisional di belahan dunia seperti cina, turki, amerika dan prancis. Rambut jagung digunakan untuk terapi sistitis, edema, batu ginjal, diuretik, gangguan prostat, infeksi saluran kemih, malaria, kelainan pada hati serta obesitas. Selain itu rambut jagung dalam bentuk teh memiliki banyak manfaat bagi kesehatan manusia seperti menurunkan tekanan darah tinggi, penurunan inflamasi prostat, diabetes, dan infeksi saluran kemih, edema, dan obesitas (Hasanuddin, et al., 2012) Selain itu rambut jagung digunakan untuk terapi Diuresis dan efek kaliuresis, penurunan glukosa darah, aktifitas antifatigue, aktifitas

antiinflamasi, penurunan nephrotoksit, dan aktifitas antioksidan, analgetik, astrigen, antialergi, antiagina, pelembut, antihipertensi, antitumor, dll. (Milind & Isha, 2013).

B. Uraian Hewan Coba

1. Klasifikasi Hewan Uji (Vanderlip, 2001).

Kingdom : Animalia
Phylum : Chordata
Sub Phylum : Vertebrata
Kelas : Mammalia
Famili : Muridae
Genus : Mus
Spesies : *Mus musculus*

2. Karakteristik Hewan Uji

Mencit (*Mus musculus*) adalah anggota Muridae (tikus-tikusan) yang berukuran kecil. Mencit mudah dijumpai di rumah-rumah dan dikenal sebagai hewan pengganggu Karena kebiasaannya mengigit mebel dan barang-barang kecil lainnya, serta bersarang di sudut-sudut lemari. Hewan ini diduga sebagai mamalia terbanyak kedua di dunia, setelah manusia. Mencit sangat mudah menyesuaikan diri dengan perubahan yang dibuat manusia, bahkan jumlahnya yang hidup liar di hutan lebih sedikit daripada yang tinggal di perkotaan. Ada lebih 500 galur murni jenis mencit didunia. Mencit dewasa biasanya memiliki berat 25-40 gram dan mempunyai berbagai macam warna, anara lain albino, hitam, coklat, dan abu-abu. Mayoritas mencit laboratorium adalah strain albino tang mempunyai warna bulu putih dan mata merah

muda. Mencit merupakan hewan yang tidak mempunyai kelenjar keringan. Jantung terdiri dari empat ruang dengan dinding atrium yang tipis dan dinding vatrikel yang lebih tebal. Mencit mempunyai karateristik lebih aktif daripada malam hari (nocturnal). Beberapa strain mencit antara lain swiss, bulb-C, DDY (Vanderlip, 2001).

Mencit laboratorium adalah turunan dari mencit liar yang telah mengalami pembiakan secara selektif. Mencit dikelompokkan ke dalam kingdom animalia, phylum chordata. Hewan ini termaksud hewan bertulang belakang dan menyusui sehingga dimasukkan ke dalam subphylum vetebrata dan kelas mamalia. Selain itu hewan ini juga memiliki kebiasaan mengerat (ordo rodentia), dan merupakan family muridae, dengan genus *Mus* serta memiliki nama spesies *Mus musculus* L (Priyambodo, 2003).

3. Data Biologis Hewan Uji

Tabel 1. Nilai Fisiologis Mencit

Kriteria	Nilai
- Konsumsi pakan per hari	5 g (umur 8 minggu)
- Konsumsi air minum per hari	6-7 ml (umur 8 minggu)
- Diet protein	20-25%
- Ekskresi urine per hari	0,5-1 ml
- Lama hidup	1,5 tahun
- Bobot badan dewasa	
* Jantan	25-40 g
* Betina	20-40 g
- Bobot lahir	1-1,5 g
- Dewasa kelamin (jantan=betina)	28-49 hari

- Siklus estrus (menstruasi)	4-5 hari (polyestrus)
- Umur sapih	21 hari
- Mulai makan pakan kering	10 hari
- Rasio kawin	1 jantan - 3 betina
- Jumlah kromosom	40
- Suhu rectal	37,5 °C
- Laju respirasi	163 kali/menit
- Denyut jantung	310 - 840 kali/menit
- Pengambilan darah maksimum	7,7 ml/Kg
- Jumlah sel darah merah (Eritrosit)	8,7 - 10,5 x 10 ⁶ /μl
- Kadar haemoglobin(Hb)	13,4 g/dl
- Jumlah sel darah putih (Lekosit)	8,4 x 10 ³ /μl

(Syamsudin, 2011)

4. Pengambilan Darah

Pada umumnya pengambilan darah terlalu banyak pada hewan kecil dapat menyebabkan syok hipovolemik, stress dan bahkan dapat menyebabkan kematian. Tetapi bila dilakukan pengambilan sedikit darah tapi sering, juga dapat menyebabkan anemia. Pada umumnya pengambilan darah dilakukan sekitar 10% dari total volume darah dalam tubuh dan dalam selang waktu 2-4 minggu. Atau sekitar 1% dengan interval 24 jam. Total darah yang diambil sekitar 7,5% dari bobot badan. Diperkirakan pemberian darah tambahan sekitar setengah dari total volume darah. Contohnya: bobot 25 g, total volume darah 1,8751 ml, maksimum pengambilan darah 0,1875 ml. maka pemberian darah tambahan 0,9375 ml. pengambilan darah dapat dilakukan pada lokasi tertentu dari tubuh, yaitu vena lateral dari eor, sinus orbitalalis mata, vena saphena

(kaki), dan langsung dari jantung. Sedangkan tempat atau lokasi untuk injeksi, volume sediaan dan ukuran jarum adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Tempat injeksi, Volume sediaan dan ukuran jarum

	IV	IP	IM	SC	Oral
Lokasi	Lateral ekor	-	Tidak direkomendasikan	Belakang leher	-
Volume	0,2 ml	2-3 ml	-	2-3 ml	5-10 ml/kg
Ukuran Jarum	< 25 gauge	< 21 gauge		< 20 gauge	Jarum tumpul 22-24 gauge

(Syamsudin, 2011)

C. Kombucha

Teh kombucha merupakan minuman yang berasal dari cina dan dikenal ke beberapa negara seperti rusia, korea dan japan. Teh ini sering disebut dengan teh 1001 manfaat, atau teh panjang usia karena memiliki beragam khasiat. Jenis teh ini hampir dikenal oleh seluruh dunia dengan panggilan yang berbeda-beda. Ada yang menyebutnya *Imanchurian*. Teh mushroom, fungus japonicum, olga tea atau mogu tea. Di jawa orang mengenalnya dengan jamur dipo atau jamur super. Teh kombucha merupakan produk minuman tradisional hasil fermentasi larutan teh dan gula dengan menggunakan starter mikroba kombucha (simbiosis bakteri dengan khamir) dan difermentasi selama 7-14 hari (Naland, 2008).

1. Fermentasi Kombucha

a. Kultur bakteri

Kultur kombucha adalah sekumpulan bakteri dan khamir yang hidup bersama secara simbiotik membentuk matriks miselium seperti benang. Kultur kombucha ini biasa disebut SCOBY (*Simbiotic Culture of Bacteria and Yeast*). Bakteri utama berasal dari genus *Acetobacter*, khususnya (*Acetobacter xylinum*, *Acetobacter xylinoides*, dan *Bacterium gluconium*) dan komponen khamir (*Saccharomyces pombe*, *Saccharomyces ludwigii*, *Saccharomyces cerevisiae*, *Pichia fermentant* dan sebagainya). Mikroorganisme yang berperan dalam fermentasi minuman kombucha adalah *Acetobacter xylinum* dan dua khamir yaitu *Pichia fermentans* dan *Kloeckera apiculata* (Dufresne & Farnworth, 2000).

Tabel 3. Mikroorganisme dan Kultur Kombucha

Mikroorganisme	Spesies
Bakteri	<i>Acetobacter xylinum</i> , <i>Acetobacter aceti</i> , <i>Acetobacter pasteurianus</i> , <i>Gluconobacter</i> .
Khamir	<i>Brettanomyces</i> , <i>Bretanomyces bruxellensis</i> , <i>Brettanomyces intermedius</i> , <i>Candida</i> , <i>Candida fatama</i> , <i>Mycoderma</i> , <i>Mycotorula</i> , <i>Phichia</i> , <i>Pichia membrana efaciis</i> , <i>Saccharomyces</i> , <i>Saccharomyces cerevisiae</i> , <i>Saccharomyces cerevisiae subp. Aceti</i> , <i>Schizosaccharomyces</i> , <i>Torula</i> , <i>Torulaspota delbbrueckii</i> , <i>Torulopsis</i> , <i>Zygosaccharomyces</i> , <i>Zygosaccharomyces bailii</i> , <i>Zigosaccharomyces rouziz</i> .


(GreenWalt, et al., 2000)

b. Mekanisme Fermentasi

Acetobacter xylinum dan *Saccharomyces cerevisiae* mengawali perombakan dengan memecah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Kemudian, terjadi pemecahan glukosa dan fruktosa menjadi asam-asam organik dan alkohol secara terus-menerus sampai gula yang terdapat pada larutan kombucha habis. Sehingga asam yang dihasilkan akan terus meningkat pada waktu fermentasi yang semakin lama. Pada proses fermentasi terjadi pemecahan karbohidrat, asam amino dan lemak dengan bantuan enzim dari mikroba tertentu yang dapat menghasilkan asam organik, karbon dioksida dan zat-zat lainnya. Proses fermentasi dapat menyebabkan perubahan sifat fisika dan kimia bahan pangan yang meliputi kadar pati, kadar alkohol, total asam dan pH. Fermentasi kombucha yang semakin lama akan menghasilkan asam yang semakin tinggi (Aditiwati & Kusnadi, 2003).

Khamir yang ditumbuhkan dalam medium dengan konsentrasi gula yang tinggi akan mensintesis glukosa sebanyak 3-20%, sedangkan glukosa yang tersisa akan dimanfaatkan melalui jalur fermentasi (Moat et. al., 2002; 15). Proses fermentasi melalui jalur glikolisis untuk menghasilkan asam piruvat. Asam piruvat dalam kondisi anaerob akan mengalami penguraian oleh piruvat dekarboksilase menjadi etanol dan karbon dioksida (Madigan, et al., 2002).

Proses fermentasi gula (pengubahan glukosa menjadi alkohol dan O_2 oleh khamir terjadi melalui reaksi berikut :






Kemampuan khamir memfermentasikan gula ditentukan oleh adanya sistem transport dan sistem enzim yang dapat menghidrolisis gula dengan akseptor elektron alternatif selain oksigen, yakni pada kondisi anaerob fakultatif. Pada proses fermentasi khamir *Saccharomyces cerevisiae* memproduksi alkohol secara anaerob, kemudian alkohol menstimulasi pertumbuhan *Acetobacter xylinum* untuk memproduksi asam asetat secara aerob, sedangkan asam asetat akan menstimulasi pertumbuhan *Saccharomyces cerevisiae*. Hal ini berlangsung secara terus menerus sampai gula yang terdapat pada larutan kombucha berubah menjadi asam-asam organik yang diperlukan oleh tubuh seperti asam asetat dan lain-lain. *Saccharomyces cerevisiae* dapat menghasilkan 70% asam organik seperti asam asetat, asam malat, asam suksinat dan asam piruvat pada saat melakukan fermentasi Khamir dari genus *Issatchenkia*, *Kluyveromyces*, *Saccharomyces* dan *Zygosaccharomyces* juga memiliki kemampuan untuk memfermentasikan glukosa (Sjamsuridzal, 2006).

Bakteri *Acetobacter xylinum* mampu mengoksidasi glukosa menjadi asam glukonat dan asam organik lain pada waktu yang bersamaan. Selain itu, *Acetobacter xylinum* juga dapat mensintesis glukosa menjadi polisakarida atau selulosa yang berupa serat-serat putih. Selulosa membentuk lapisan nata secara bertahap hingga

mencapai ketebalan sekitar 12 mm pada akhir fermentasi yang dapat digunakan sebagai inokulum pada proses fermentasi selanjutnya (Aditiwati & Kusnadi, 2003).

Mikroorganisme dalam kombucha menggunakan sumber karbon dan memproduksi selulosa yang tampak sebagai lapisan tipis dipermukaan. Pemeriksaan mikroskopis menunjukkan bahwa kandungan pada nata kombucha yang utama adalah khamir, bakteri dan selulosa. Selama proses fermentasi, khamir dan bakteri melakukan metabolisme terhadap sukrosa dan menghasilkan sejumlah asam-asam organik seperti asam asetat dan asam glukonat, oleh karena itu terjadi peningkatan kadar asam-asam organik dan penurunan pH air seduhan teh menurun dari 5 menjadi 2,5 selama 6 hari fermentasi dan setelahnya menjadi stabil. Meskipun tidak ada sumber nitrogen lain yang ditambahkan pada teh sebelum fermentasi, kadar protein sedikit meningkat seiring dengan semakin lamanya waktu fermentasi. Protein-protein ini tampaknya adalah protein ekstraseluler yang disekresikan oleh khamir dan bakteri selama proses fermentasi. Glukosa yang dihasilkan dari sukrosa akan dimetabolisme oleh strain *Acetobacter* untuk sintesa selulosa dan asam glukonat (Screeramulu, et al., 2000).

Reaksi oksidasi etanol menjadi asetaldehid dan kemudian asam asetat serta glukosa menjadi asam glukonat adalah sebagai berikut :



Fermentasi kombucha sebaiknya dilakukan dalam wadah yang steril yang terbuat dari kaca, karena wadah yang terbuat dari logam dapat bereaksi dengan asam yang terkandung dalam kombucha. Suhu fermentasi kombucha yang ideal adalah antara 27 ± 30 °C. Hal ini disebabkan karena aktivitas pertumbuhan dan metabolisme mikroorganisme pada kombucha tumbuh optimal pada suhu 30°C. Pada suhu inkubasi 25 °C dibutuhkan energi aktivasi yang lebih tinggi untuk kerja enzim, sehingga aktivitas mikroorganisme dalam membentuk asam asetat akan terhambat. Sedangkan pada suhu inkubasi yang cukup tinggi dapat terjadi inaktivasi enzim, karena diduga sebagian protein-enzim terdenaturasi pada suhu yang tinggi, sehingga akan mengurangi produksi asam asetat oleh mikroorganisme (Aditiwati & Kusnadi, 2003).

Proses pematangan kombucha terjadi antara 7-14 hari, karena pada saat ini rasa kombucha sudah terasa nikmat. Jika kurang dari 7 hari, kenikmatan kombucha belum terasa dan jika lebih dari 14 hari, kombucha sudah terasa cukup asam. Kombucha merupakan agen penghasil senyawa biokimia karena mikroorganisme yang ada dalam kultur kombucha mengubah kandungan gula didalamnya menjadi berbagai jenis asam dan vitamin yang berkhasiat (Naland, 2004).

Pada proses fermentasi kombucha terdapat aktivitas dari khamir untuk merombak gula yang terdapat pada medium sebagai energi bagi pertumbuhannya. Sebagai akibat dari aktifitas ini, maka akan terbentuk sebuah lapisan yang terapung pada bagian atas medium yang disebut sebagai nata. Persentase gula 10% pada kombucha akan memberikan hasil nata yang paling tebal. Konsentrasi gula yang berada dibawah atau diatas kebutuhan optimum akan menyebabkan pembentukan

selulosa tidak optimal sehingga nata yang akan dihasilkan mempunyai ketebalan yang rendah. Proses fermentasi dimulai ketika *Acetobacter xylinum* dan *Saccharomyces cerevisie* mengawali perombakan dengan memecah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa dengan bantuan enzim ekstraseluler invertase, dan selanjutnya glukosa akan direduksi menjadi etanol dan CO₂, kemudian beraksi dengan air membentuk asam karbonat. *Acetobacter* akan mengoksidasi etanol menjadi asetaldehida kemudian menjadi asam asetat. Aktivitas biokimia yang kedua dari bakteri *Aceobacter* adalah pembentukan asam glukonat yang berasal dari oksidasi glukosa. Pada pembentukan etanol oleh khamir dan pembuatan selulosa oleh bakteri *Aceobacter sp.* Glukosa dikonversi menjadi asam glukonat melalui jalur fosfat pentose oleh bakteri asam asetat, sebagian besar fruktosa di metabolisme menjadi asam asetat dan sejumlah kecil asam glukonat. Selain itu, bakteri akan mengoksidasi glukosa menjadi rantai atau polimer yang panjang yang disebut polisakarida atau selulosa berupa serat-serat putih, yang terbentuk secara bertahap dari lapisan tipis pada awal fermentasi hingga mencapai ketebalan 12 mm pada akhir fermentasi. Kemudian disebut sebagai nata yang termaksud metabolit sekunder. Selain metabolit sekunder, *Aceobacter sp.* Juga menghasilkan metabolit primer berupa asam asetat air dan energi yang digunakan kembali dalam siklus metabolismenya (Dufresne & Farnworth, 2000).

2. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba

a. Suplai Nutrisi

Mikroba sama dengan makhluk hidup lainnya, memerlukan suplai nutrisi sebagai energi dan pertumbuhan selnya. Unsur-unsur dasar tersebut adalah karbon, nitrogen, hydrogen, oksigen, sulfur, fosfor, zat besi, dan sejumlah kecil logam lainnya. Ketiadaan atau kekurangan sebagai sumber-sumber nutrisi ini dapat mempengaruhi pertumbuhan mikroba hingga pada akhirnya dapat menyebabkan kematian.

b. Suhu

Suhu merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme. Suhu dapat mempengaruhi mikroba dalam dua cara berlawanan, yaitu apabila suhu naik maka kecepatan metabolisme naik dan pertumbuhan dipercepat. Sebaliknya apabila suhu turun, maka kecepatan metabolisme akan menurun dan pertumbuhan diperlambat. Selain itu, apabila suhu naik atau turun secara drastis, tingkat pertumbuhan akan terhenti, komponen sel menjadi tidak aktif dan rusak, sehingga sel-sel menjadi mati.

c. Keasaman atau Kebasahan (pH)

Setiap organisme memiliki kisaran pH masing-masing dan memiliki pH optimum yang berbeda-beda. Kebanyakan mikroorganisme dapat tumbuh kisaran pH 6,6 dan 7,5 (netral).

d. Ketersediaan Oksigen

Mikroorganisme memiliki karakteristik sendiri-sendiri didalam kebutuhannya akan oksigen. Mikroorganisme dalam hal ini digolongkan menjadi aerobik, anaerob,

anaerob fakulatatif, dan mikroaerofilik. Aerobik adalah mikroorganisme yang hanya dapat tumbuh apabila ada oksigen bebas. Anaerob adalah mikroorganisme yang hanya dapat tumbuh apabila tidak ada oksigen bebas. Anaerob fakulatatif adalah mikroorganisme yang dapat tumbuh baik dengan adanya atau tanpa adanya oksigen bebas. Sedangkan mikroaerofilik, adalah mikroorganisme yang dapat tumbuh apabila ada oksigen dalam jumlah kecil.

e. Bahan Bentuk Gas

Jenis dan konsentrasi gas dalam lingkungan sangat mempengaruhi pertumbuhan mikroba. Selain dari oksigen, karbondioksida yang sangat penting untuk nutrisi bakteri, nitrogen dan ammonia esensial untuk siklus nitrogen dan H_2S dalam siklus sulfur, selain gas-gas yang diperlukan mikroorganisme untuk pertumbuhannya, gas-gas lain dapat berfungsi sebagai toksik.

f. Tekanan Osmotik

Tekanan osmotik yang seimbang (isotonic) antara lingkungan dan isi sel sangat diperlukan untuk mempertahankan kehidupan sel. Apabila cairan disekitar sel tekanan osmosisnya lebih rendah disebut hipotonik sebaliknya jika lebih tinggi disebut hipertonik (GreenWalt, et al., 2000).

3. Kandungan Kimia

Menurut (Naland, 2008) Kandungan kombucha secara umum adalah

a. Vitamin B1 (Tiamin)

Vitamin B1 berperan dalam metabolisme karbohidrat untuk pembentukan energi. Kecukupan vitamin B1 yang dianjurkan dikaitkan dengan kecukupan energi,

yakni sekitar 0,4 mg untu setiap 1000 kalori. Tiamin tidak bias disimpan banyak dalam tubuh dan dalam jumlah terbatas dapat disimpan didalam hati, ginjal, jantung, otot dan otot, jika tiamin terlalu banyak dikomsumsi, elebihannya akan dibuang melalu air kemih, pada prinsipnya, tamin berperan sebagai koenzim dalam reaksi-reaksi yang menghasilkan energi dari karbohidrat dan memindahkan energi untuk membentuk senyawa kaya energi yang disebut adenosine trifosfat (ATP).

b. Vitamin B2 (Riboflavin)

Vitamin B2 diperlukan oleh tubuh untuk memproses asam amino, lemak dan karbohidrat sehingga menghasilkan energi ATP, energi ATP diperlukan sel tubuh kita juga berfungsi sebagai antioksidan. Penyerapan riboflavin paling banyak terjadi diusus kecil. Vitamin ini disimpan didalam tubuh dan sebagian kecil disimpan dihati dan ginjal.

c. Vitamin B3 (Niasin)

Vitamin B3 berfungsi membantu memetabolisme dalam menghasilkan energi. Niasin juga berperan dalam metabolisme lemak untuk menurunkan kadar kolesterol jahat, yakni LDL (Low Density Lipoprotein) dan triglyserida, serta meningkatkan kadar HDL (High Density Lipoprotein) hingga bias mengurangi penyakit pembuluh darah dan jantung.

d. Vitamin B6 (Piridoksin)

Vitamin B6 terdapat dalam 3 bentuk yaitu: vitamin B6 yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dinamakan piridoksin. Sedangkan yang berasal dari hewan dinamakan piridosal dan piridoksamin. Ketiga bentuk vitamin didalam tubuh diubah

menjadi piridoksal fosfat yang merupakan koenzim dalam memetabolisme berbagai asam amino.

e. Vitamin B12 (Sianokobalamin)

Vitamin B12 dibantu dengan asam folat berperan didalam metabolisme antar sel didalam tubuh. Kekurangan vitamin B12 membuat perkembangan tubuh menjadi lambat dalam waktu yang cukup lama. Keadaan ini ditandai dengan gangguan pembentukan dan pengembangan sel darah (hematopoiesis) yang menimbulkan anemia megaloblastic (anemia pernisirosa) gangguan neurologi seperti berkurangnya daya ingat dan gangguan keseimbangan, kerusakan sel epitel terutama epitel saluran cerna, serta debilitas umum atau kelemahan secara umum.

f. Vitamin B15

Vitamin B15 juga disebut asam pangamic. Vitamin B15 berasal dari asam amino glycine. Asam pangamik merupakan dimethyl glycine (DMG). Vitamin B15 berperan sebagai oksigenator jaringan tubuh dan sebagai penangkap radikal bebas.

g. Vitamin C

Vitamin C berperan dalam pembentukkan substansi antar sel dan berbagai jaringan, serta meningkatkan daya tahan tubuh, milasnya aktifitas fagositosis sel darah putih dan transportasi zat besi dari transferrin didalam darah ke ferritin didalam sumsum tulang, hati dan limpa.

h. Asam Folat (Citraforum Factor atau Leucovorin)

Asam folat berfungsi untuk membantu produksi sel-sel darah, menyembuhkan luka, membentuk otot, serta membantu proses pembelahan sel. Asam folat sangat

penting untuk pembentukan DNA dan RDA (zat-zat pembentuk dinding sel).

Kekurangan asam folat dapat

menyebabkan kerusakan DNA yang dapat mengarah ke penyakit kanker.

i. Asam Glukoronat (Glucuronic Acid)

Asam ini berfungsi mengkonjugasi atau mengikat toksin (racun) dan logam-logam berat, sehingga lemak mudah larut dalam air dan mudah dikeluarkan oleh tubuh.

j. Asam Glukonat (Gluconic Acid)

Asam Glukonat dalam kombucha berfungsi untuk mengawetkan makanan dalam tubuh. Selain itu asam glukoronat juga dapat mengsekresikan pengeluaran insulin.

k. Asam asetat (Asam Etanoat atau Asam cuka)

Asam asetat merupakan bagian terbesar dari asam yang dihasilkan oleh proses fermentasi Kombucha. Asam inilah yang memberikan rasa masam pada minuman kombucha. Peran utama asam asetat adalah mengikat toksin dan bisa menjadi bentuk ester yang mudah larut dalam air, sehingga mudah dikeluarkan oleh tubuh. Didalam tubuh, peranan asam asetat diperkirakan lebih besar dibandingkan dengan asam glukoronat.

l. Asam Chondrotin sulfat

Asam ini merupakan bagian dari tulang rawan yang melapisi permukaan sendi, berperan menjaga keutuhan dan kesehatan persendian.

m. Asam Hyaluronic atau Asam Hyaluronidase

Asam ini juga berada dicairan sendi dan berperan sebagai pelumas, sehingga fungsi sendi tetap terjaga dengan baik.

n. Asam Laktat (Asam 2-Hidroksipropanoat)

Asam laktat yang dihasilkan dalam proses fermentasi kombucha sangat tinggi, sehingga dapat mencegah serangan penyakit kanker.

o. Acetaminophen (Parasetamol)

Kombucha mengandung senyawa yang sangat mirip dengan Acetaminophen. Fungsinya sebagai analgetik atau penghilang rasa nyeri yang sangat kuat.

p. Asam Amino Esensial

Selain mengandung jenis protein tertentu, kombucha juga mengandung berbagai macam asam amino. Asam amino berperan sebagai bahan untuk

q. Asam asetat (Asam Etanoat atau Asam cuka)

Asam asetat merupakan bagian terbesar dari asam yang dihasilkan oleh proses fermentasi Kombucha. Asam inilah yang memberikan rasa masam pada minuman kombucha. Peran utama asam asetat adalah mengikat toksin dan bisa menjadi bentuk ester yang mudah larut dalam air, sehingga mudah dikeluarkan oleh tubuh. Didalam tubuh, peranan asam asetat diperkirakan lebih besar dibandingkan dengan asam glukoronat.

r. Asam Chondrotin sulfat

Asam ini merupakan bagian dari tulang rawan yang melapisi permukaan sendi, berperan menjaga keutuhan dan kesehatan persendian.

s. Asam Hyaluronic atau Asam Hyaluronidase

Asam ini juga berada dicairan sendi dan berperan sebagai pelumas, sehingga fungsi sendi tetap terjaga dengan baik.

t. Asam Laktat (Asam 2-Hidroksipropanoat)

Asam laktat yang dihasilkan dalam proses fermentasi kombucha sangat tinggi, sehingga dapat mencegah serangan penyakit kanker.

u. Acetaminophen (Parasetamol)

Kombucha mengandung senyawa yang sangat mirip dengan Acetaminophen. Fungsinya sebagai analgetik atau penghilang rasa nyeri yang sangat kuat.

v. Asam Amino Esensial

Selain mengandung jenis protein tertentu, kombucha juga mengandung berbagai macam asam amino. Asam amino berperan sebagai bahan untuk

4. Mekanisme Kombucha Menurunkan Glukosa Darah

Penurunan kadar glukosa darah oleh kombucha di sebabkan karena adanya kandungan asam glukonat pada kombucha dimana asam glukonat ini menjaga penyerapan kalsium untuk sekresi insulin oleh sel-sel β pankreas. Insulin disekresikan oleh sel-sel β pada pulau-pulau Langerhans membutuhkan Ca^{2+} dan tahap akhirnya adalah pelepasan isi granula-granula sekresi empat insulin dan C-peptida dibentuk. Ketika rangsangan glukosa menyebabkan penutupan saluran K_{ATP} dan pembukaan Ca^{2+} -Channel dan butiran RRP (*readily releasable pool*) terletak tepat di bawah Ca^{2+} -Channel yang terkena konsentrasi tinggi Ca^{2+} menyebabkan RRP melepas granula atau eksositosis (Lukitawati, 2013).

D. Diabetes Mellitus

1. Pengertian

Diabetes berasal dari Bahasa Yunani yang berarti “mengalirkan atau mengalihkan” (Siphon). Mellitus berasal dari Bahasa latin yang bermakna manis atau madu. Penyakit diabetes mellitus dapat diartikan individu yang mengalirkan volume urin yang banyak dengan kadar glukosa tinggi (Crowin, 2009).

Diabetes mellitus (DM) atau kencing manis merupakan penyakit fisiologis dengan ciri utama adanya abnormalitas metabolisme glukosa. Kadar gula darah pada penderita DM mengalami kenaikan melebihi batas normal (hiperglikemia). Diabetes mellitus disebabkan karena kekurangan hormon insulin yang berfungsi memanfaatkan glukosa sebagai sumber energi dan mensintesis lemak (syamsudin, et al., 2010) Akibatnya glukosa menumpuk di dalam darah (hiperglikemia) dan akhirnya dikeluarkan bersama kemih (glikosuria) tanpa digunakan tubuh (Tjay & Rahardja, 2003).

Pankreas adalah suatu kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon peptide insulin. Glucagon dan somatostatin, dan suatu kelenjar eksokrin yang menghasilkan enzim pencernaan. Hormone peptida disekresikan dari sel-sel yang berkolasi dalam pulau-pulau Langerhans (sel-B yang menghasilkan insulin, sel-B menghasilkan insulin, sel-A yang menghasilkan glucagon dan sel-D yang menghasilkan somatostatin). Hormon-hormon ini memegang peranan penting dalam pengaturan aktivitas metabolik tubuh, dan dengan demikian, membantu memelihara homeostatis glukosa darah (Mycek, 2001).

Pankreas endokrin pada orang dewasa terdiri dari sekitar 1 juta pulau Langerhans yang tersebar di seluruh kelenjar pankreas. Terdapat paling sedikit empat sel penghasil hormone. Produk-produk hormone mereka mencakup insulin, hormon penyimpanan dan anabolic tubuh; amylin, yang memodali nafsu makan, pengosongan lambung, serta sekresi glucagon dan insulin; glukagon, factor hiperglikemik yang memobilisasi simpanan glikogen; somatostatin, suatu inhibitor universal sel-sel sekretorik; gastrin, yang merangsang sekresi asam lambung; dan peptida pankreas, suatu protein kecil yang mempermudah proses pencernaan melalui mekanisme yang belum diketahui pasti (Katzung, 2014).

Karbohidrat terdapat dalam berbagai bentuk, termaksud gula sederhana atau monosakarida, dan unit-unit kimia kompleks, seperti disakarida dan polisakarida. Karbohidrat yang sudah ditelan akan dicerna menjadi monosakarida dan diabsorpsi, terutama dalam duodenum dan jejunum proksimal. Sesudah diabsorpsi, kadar glukosa darah akan meningkat untuk sementara waktu dan akhirnya akan kembali lagi ke kadar semula. Pengaturan fisiologis kadar glukosa darah sebagian besar tergantung pada hati yang mengekstraksi glukosa, mensintesis glikogen, dan melakukan glikogenolisis. Dalam jumlah yang lebih sedikit, jaringan perifer-otot dan adiposa juga menggunakan ekstrak glukosa sebagai sumber energi sehingga jaringan-jaringan ini ikut berperan dalam mempertahankan kadar glukosa darah (Price & Wilson, 2005).

Setiap makanan yang kita santap akan diubah menjadi energi oleh tubuh. Dalam lambung dan usus, makanan diuraikan menjadi beberapa elemen dasarnya, termaksud salah satu jenis gula, yaitu glukosa. Jika terdapat gula, maka pankreas

menghasilkan insulin, yang membantu mengalirkan gula ke dalam sel-sel tubuh. Kemudian, gula tersebut dapat diserap dengan baik dalam tubuh dan dibakar untuk menghasilkan energi (Damayanti, 2013).

Glukosa Darah dalam tubuh berfungsi sebagai sumber energi atau kalori. Glukosa dalam darah berasal dari penyerapan usus dari makanan yang mengandung zat tepung/ karbohidrat dari nasi, ubi, jagung, kentang dan lain-lain, dan sebagian dari pemecahan simpanan energi dalam jaringan (glikogen). Menurut kriteria International Diabetes Federation (IDF), American Diabetes Association (ADA), dan Perkumpulan Endokrinologi Indonesia (Perkeni), apabila gula darah pada saat puasa di atas 126 mg/dl atau dua jam sesudah makan di atas 200 mg/dl, berarti orang tersebut menderita DM. Komplikasi DM bisa timbul pada semua organ dan semua sistem tubuh, dari kepala sampai kaki. Ini tergantung cara menjaga gula darah agar selalu normal. Semakin buruk kontrol gula darah, semakin mudah terkena komplikasi. Sebaliknya, kontrol gula yang baik dapat mencegah/menghambat terjadinya komplikasi. Pemeriksaan kadar glukosa darah yang dilakukan di laboratorium dengan uji strip glukosa darah baik yang menggunakan glukometer. Gula darah tinggi menyebabkan kerusakan bermacam-macam sistem dan organ tubuh. Bisa merusak mata, otak, rongga mulut, paru-paru, jantung, lambung, usus, hati, empedu, ginjal, kandung kemih, sistem saraf, serta anggota gerak. Termasuk menimbulkan impotensi dan luka yang tidak kunjung sembuh. Bagaimana terjadinya komplikasi seperti ini, semua berawal dari kerusakan pembuluh darah. Gula darah tinggi merusak dinding pembuluh darah, baik pembuluh darah berukuran besar (arteri) maupun paling kecil (kapiler). Statistik

menunjukkan, ketika berobat ke dokter, dua sampai tiga dari lima pasien menderita satu atau beberapa komplikasi lantaran penyakit DM. Namun, dengan kontrol gula darah yang baik, komplikasi-komplikasi tersebut bisa dikalahkan, atau setidaknya dikurangi. Bahkan bila disiplin dan bersungguh-sungguh, komplikasi lain yang belum tibul bisa dicegah (Tandra, 2007).

Diabetes mellitus merupakan suatu grup sindrom heterogen yang semua gejalannya ditandai dengan peningkatan gula darah yang disebabkan oleh defisiensi sekresi dan sekresi insulin (Nugroho, 2012).

Diabetes mellitus (DM) disebabkan menurunnya fungsi pankreas untuk memproduksi insulin atau reseptor insulin tidak mampu mengenali glukosa sehingga terjadi gangguan metabolisme. Glukosa yang masuk tidak dirubah menjadi glikogen menyebabkan glukosa darah meningkat. DM berhubungan dengan abnormalitas metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein pada keadaan komplikasi kronik dapat memicu mikrovaskular, makrovaskular, dan kelainan neuropati (Dipiro, et al., 2008).

2. Klasifikasi

Penggolongan diabetes mellitus berdasarkan etiologi dan diagnosa klinik dibagi menjadi empat tipe yaitu :

a. Diabetes mellitus (DM) Tipe 1

Diabetes tipe ini merupakan diabetes yang jarang atau sedikit populasinya, diperkirakan kurang dari 5-10% dari keseluruhan populasi penderita diabetes. Diabetes mellitus tipe 1 disebabkan karena pankreas sebagai pabrik insulin tidak dapat atau kurang mampu memproduksi insulin. Akibatnya, insulin tubuh berkurang atau tidak

ada sama sekali. Glukosa menjadi menumpuk dalam peredaran darah karena tidak dapat diangkut ke dalam sel. Diabetes tipe 1 biasanya kerusakan autoimun dari produksi sel beta pankreas ada pula yang disebabkan oleh berbagai macam virus, diantaranya virus Cocksakie, Rubella, CMVirus, Herpes, dan lain sebagainya. Pada keadaan normal sel beta pankreas mensekresi insulin yang berfungsi untuk mengontrol metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein

Diabetes tergantung insulin umumnya menyerang anak-anak tetapi IDDM dapat juga terjadi di antara orang dewasa. Penyakit ini ditandai dengan defisiensi insulin absolut yang disebabkan oleh lesi atau nekrosis sel- β berat. Hilangnya fungsi sel- β mungkin disebabkan oleh invasi virus, kerja toksin kimia atau umumnya, melalui kerja antibody autoimun yang ditujukan untuk melawan sel- β . Akibat dari destruksi sel sel- β , pankreas gagal berespon terhadap masukan glukosa, dan diabetes tipe 1 menunjukkan gejala klasik defisiensi insulin (polidipsia, polifagia, dan poliuria) (Mycek, 2001).

Pada diabetes mellitus tipe 1, kadar glukosa darah sangat tinggi, namun ironisnya tubuh tidak dapat memanfaatkannya sebagai sumber energi. Sebagai sumber energi alternatif melalui peningkatan katabolisme protein dan lemak. Seiring dengan itu terjadi perangsangan lipolysis serta peningkatan kadar asam lemak bebas dan gliserol darah, untuk keperluan pembuatan energi melalui siklus krebs. Hasil samping dari proses tersebut adalah terbentuknya produk-produk keton, yang biasa dijumpai pada urin penderita DM tipe 1. padahal, hanya dibutuhkan kadar insulin rendah untuk mencegah lipolisis dan pembentukan produk keton tersebut (Nugroho, 2012).

b. Diabetes mellitus (DM) Tipe 2

Diabetes tipe 2 merupakan tipe diabetes yang umum dan lebih banyak penderitanya dibandingkan dengan DM tipe 1. Biasanya terjadi pada usia di atas 40 tahun, tetapi biasa pula timbul pada usia di atas 20 tahun. Sekitar 90-95% penderita diabetes adalah penderita diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 ditandai dengan adanya gangguan sekresi insulin dan resistensi kerja sel reseptor terhadap insulin. Dengan adanya resistensi insulin pemanfaatan glukosa oleh jaringan akan mengalami gangguan sedangkan produksi glukosa di pankreas untuk memproduksi lebih banyak insulin dalam mengatasi resistensi insulin

Diabetes tipe 2, disebabkan oleh dua hal, yaitu: a) penurunan respon jaringan terhadap insulin, kondisi ini dinamakan resistensi insulin; dan b) penurunan produksi insulin akibat regulasi sekresinya terganggu atau terjadi kerusakan fungsional pada sel β Langerhans. Faktor yang pertama mengakibatkan efek insulin berkurang meskipun kadar insulin normal, sedangkan faktor yang kedua mengakibatkan penurunan sekresi insulin. Kedua faktor akhirnya menyebabkan kenaikan konsentrasi glukosa darah (Nugroho, 2012).

Pada NIDDM, pankreas masih mempunyai beberapa fungsi sel- β , yang menyebabkan kadar insulin bervariasi, tetapi tidak cukup untuk memelihara homeostatis glukosa. Pasien dengan diabetes tipe 2 seringkali gemuk. Diabetes tipe 2 sering dihubungkan dengan resistensi organ target yang membatasi respon insulin endogen dan eksogen. Pada beberapa kasus, resistensi insulin disebabkan oleh penurunan jumlah atau mutasi respon insulin. Walaupun begitu, cacat yang tak terbatas

pada peristiwa yang terjadi setelah insulin terikat pada reseptor, dipercaya menyebabkan resistensi pada kebanyakan penderita (Mycek, 2001).

Penderita DM tipe 2 tidak tergantung insulin namun untuk mencegah meningkatnya glukosa dalam darah perlu kontrol makanan atau dengan agen penurun glukosa darah (Unwin, et al., 2009).

Tabel 4. Perbedaan DM Tipe 1 dan DM Tipe 2

	DM Tipe 1	DM Tipe 2
Awal Muncul	Umumnya masa kanak-kanak dan remaja, walaupun ada juga pada masa dewasa < 40 tahun	Pada usia tua, umumnya > 40 tahun
Keadaan klinis saat diagnosis	Berat	Ringan
Kadar insulin darah	Rendah, tidak ada	Cukup tinggi, normal
Berat badan	Biasanya kurus	Berat atau normal
Pengelolaan yang disarankan	Terapi insulin, diet, olahraga	Diet, olahraga, hipoglikemik oral

(Muchid, et al., 2005)

c. Diabetes mellitus (DM) Gestational

Diabetes mellitus Gestasional (GDM) adalah intoleransi glukosa yang timbul selama masa kehamilan dan bagaimanapun juga insulin tetap diberikan untuk pengobatan jika keadaan tetap setelah masa kehamilan. Kontrol gula darah untuk mengurangi resiko kenaikan gula darah pada ibu dan janin sehingga dapat menyebabkan komplikasi pada bayi seperti peningkatan bobot bayi ketika lahir, hipoglikemi, dan jaundice. Wanita yang telah mengalami GDM dapat meningkatkan faktor resiko menderita diabetes tipe 2 beberapa tahun kemudian (Unwin, et al., 2009).

Diabetes mellitus gestational terjadi karena pembentukan beberapa hormon pada ibu hamil yang menyebabkan resistensi insulin. Diabetes semacam ini terjadi pada 2-5% kehamilan. Biasanya baru diketahui setelah kehamilan bulan keempat ke atas, pada trisemester ketiga (tiga bulan terakhir). Setelah persalinan, pada umumnya glukosa darah akan kembali normal (Tandra, 2007).

d. Diabetes mellitus (DM) Tipe Lain

DM tipe lain adalah penyakit gangguan metabolik ditandai oleh kenaikan kadar gula darah akibat kelainan genetik fungsi sel beta, kelainan genetik kerja insulin, penyakit eksokrin pankreas, endokrinopati, karena obat atau zat kimia, infeksi, sebab imunologi yang jarang, dan sindrom genetik lain yang berkaitan dengan DM (Tandra, 2007).

3. Etiologi

Determinan genetik dianggap sebagai faktor penting pada kebanyakan penderita diabetes. Pada pasien-pasien yang menderita diabetes mellitus insulin dependen, determinan genetic ini dinyatakan oleh peningkatan atau penurunan frekuensi antigen histokompatibilitas tertentu (HLA), dan respon imunitas abnormal yang akan mengakibatkan pembentukan autoantibodi sel pulau Langerhans. Pada penderita diabetes mellitus insulin dependen, penyakit mempunyai kecenderungan familial yang kuat. Penyakit ini sering menyerang anak-anak, remaja dan dewasa dari keluarga yang sama secara autosom-dominan. Kelainan yang diturunkan ini dapat langsung mempengaruhi sel beta dan mengubah kemampuannya untuk mengenali dan menyebarkan rangsangan sekretoris serta atau serangkaian langkah kompleks yang

merupakan dari sintesis atau pelepasan insulin. Besar kemungkinan keadaan ini meningkatkan kerentanan individu yang terserang penyakit tersebut terhadap kegiatan faktor-faktor lingkungan di sekitarnya, termasuk virus atau diet tertentu (Graber, et al., 2010).

Hiperglikemia timbul akibat berkurangnya insulin sehingga glukosa darah tidak dapat masuk ke sel-sel otot, jaringan adiposa atau hepar dan metabolismenya juga terganggu. Dalam keadaan normal, kira-kira 50% glukosa yang dimakan mengalami metabolisme sempurna menjadi CO₂ dan air, 5% diubah menjadi glikogen dan kira-kira 30-40% diubah menjadi lemak. Pada DM semua proses tersebut terganggu, glukosa tidak dapat masuk ke sel sehingga energi terutama yang diperoleh dari metabolisme protein dan lemak menjadi berkurang. Sebenarnya hiperglikemia sendiri relatif tidak berbahaya, kecuali bila hiperglikemia yang parah hingga darah menjadi hiperosmotik terhadap cairan intra sel. Yang berbahaya adalah glukosuria yang timbul, karena glukosa bersifat diuretik osmotik, sehingga diuresis sangat meningkat disertai hilangnya berbagai elektrolit. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya dehidrasi dan hilangnya elektrolit pada pasien DM yang diobati karena adanya dehidrasi, maka badan berusaha mengatasi dengan banyak minum (polidipsi). Badan kehilangan 4 kalori untuk setiap gram glukosa yang disekresi. Polifagia timbul karena perangsangan pusat saraf nafsu makan di hipotalamus oleh kurangnya pemakaian glukosa di kelenjar tersebut (Suherman, 2001).

Ledakan sekresi insulin pada keadaan normal terjadi setelah menelan makanan sebagai respon terhadap peningkatan sekilas kadar glukosa dan asam amino yang

bersirkulasi pada periode pasca aborsi, kadar insulin basal rendah yang bersirkulasi dipelihara melalui sekresi sel- β . Walaupun begitu, diabetes tipe 1 sebenarnya tidak mempunyai fungsi sel- β , dan juga tidak berespon terhadap variasi bahan bakar yang bersirkulasi maupun memelihara kadar sekresi basal insulin. Sedangkan pada NIDDM, pankreas masih mempunyai beberapa fungsi sel- β , yang menyebabkan kadar insulin bervariasi yang tidak cukup untuk memelihara homeostatis glukosa (Mycek, 2001).

Diabetes tipe 1 diperkirakan terjadi akibat destruksi autoimun sel-sel beta pulau Langerhans. Individu yang memiliki kecenderungan genetik penyakit ini tampaknya menerima faktor pemicu dari lingkungan yang menginisiasi proses autoimun. Sebagai contoh faktor pencetus yang mungkin antara lain infeksi virus seperti gondongan (mumps), rubela, atau sitomegalovirus (CMV) kronis. Penggunaan terhadap obat atau toksin tertentu juga diduga dapat memicu serangan autoimun ini (Crowin, 2009).

Diabetes tipe 2 ditandai dengan kelainan sekresi insulin serta kerja insulin. Pada awalnya tampak terdapat resistensi dari sel-sel sasaran terhadap kerja insulin. Insulin mula-mula mengikat dirinya kepada reseptor-reseptor permukaan sel tertentu, kemudian terjadi reaksi intraselular yang menyebabkan mobilisasi pembawa GLUT 4 glukosa dan meningkatkan transpor glukosa menembus membran sel. Pada pasien dengan diabetes tipe 2 terdapat kelainan dalam pengikatan insulin dengan reseptor. Kelainan ini dapat disebabkan oleh berkurangnya jumlah tempat reseptor pada membran sel yang selnya responsif terhadap insulin atau akibat ketidaknormalan reseptor insulin intrinsik. Akibatnya, terjadi penggabungan abnormal antara kompleks reseptor insulin dengan sistem transpor glukosa. Ketidaknormalan postreseptor dapat

mengganggu kerja insulin. Pada akhirnya, timbul kegagalan sel beta dengan menurunnya jumlah insulin yang beredar dan tidak lagi memadai untuk mempertahankan euglikemia (Price & Wilson, 2005).

Penyebab diabetes gestasional dianggap berkaitan dengan peningkatan kebutuhan energi dan kadar estrogen serta hormon pertumbuhan yang terus menerus tinggi selama kehamilan. Hormon pertumbuhan dan estrogen menstimulasi pelepasan insulin yang berlebihan mengakibatkan penurunan responsivitas seluler. Hormon pertumbuhan juga memiliki beberapa efek anti-insulin, misalnya sebagai contoh perangsangan glikogenolisis (penguraian glikogen) dan stimulasi jaringan lemak adiposa. Adinonektin, derivat protein plasma dari jaringan adiposa, berperan penting dalam pengaturan konsentrasi insulin terhadap perubahan metabolisme glukosa dan hiperglikemia yang terlihat pada diabetes gestasional. Wanita yang mengidap diabetes gestasional mungkin sudah memiliki gangguan subklinis pengendalian glukosa bahkan sebelum diabetesnya muncul (Crowin, 2009).

4. Patofisiologi

a. Diabetes mellitus tipe 1 (Diabetes mellitus tergantung insulin atau IDDM).

Diabetes mellitus ini disebabkan oleh kegagalan sel pulau beta langerhans oleh penyebab multifaktorial misalnya predisposisi genetik, serangan virus dan autoimun pada sel pulau beta langerhans.

b. Diabetes mellitus tipe 2 (Diabetes mellitus tak tergantung insulin atau NIDDM).

Diabetes mellitus ini terjadi dengan fungsi sel pulau beta langerhans yang normal, tetapi jaringan perifer resisten terhadap insulin. Mungkin terjadi sedikit penurunan pembentukan insulin atau keadaan hiperinsulin (Graber, et al., 2010).

Hiperglikemia dianggap paling bertanggung jawab atas terjadinya berbagai kerusakan fungsi dan struktur jaringan. Diawali oleh kelainan vaskuler, baik mikro maupun makrovaskuler, akhirnya berlanjut menjadi kerusakan jaringan. Secara patobiologis, kerusakan tersebut terbukti erat kaitannya dengan ketidakterkendalian kadar glukosa darah. Komplikasi kardiovaskuler, penyebab kematian tersering pada diabetes tipe 2 (Reusch, 2003).

5. Gejala Klinik

Diabetes seringkali muncul tanpa gejala. Namun demikian ada beberapa gejala yang harus diwaspadai sebagai isyarat kemungkinan diabetes. Gejala tipikal yang sering dirasakan penderita diabetes antara lain poliuria (sering buang air kecil), polidipsia (sering haus), dan polifagia (banyak makan/mudah lapar). Selain itu sering pula muncul keluhan penglihatan kabur, koordinasi gerak anggota tubuh terganggu, kesemutan pada tangan atau kaki, timbul gatal-gatal yang seringkali sangat mengganggu dan berat badan menurun tanpa sebab yang jelas (Muchid, et al., 2005).

Disamping naiknya kadar gula darah, gejala kencing manis bercirikan adanya “gula” dalam kemih dan banyak berkemih karena glukosa yang diekskresikan mengikat banyak air. Akibatnya timbul rasa sangat haus, kehilangan energi dan turunnya berat badan serta rasa letih. Tubuh mulai membakar lemak untuk memenuhi

kebutuhan energinya, yang disertai pembentukan zat-zat perombakan, antara lain aseton, asam hidroksibutirat dan diasetat, yang membuat darah menjadi asam. Keadaan ini yang disebut ketoasidosis, amat berbahaya, karena akhirnya dapat menyebabkan kehilangan kesadaran. Napas penderita yang sudah menjadi sangat kasus seringkali juga berbau aseton (Tjay & Rahardja, 2003).

Pada DM Tipe I gejala klinik yang umum dikeluhkan adalah poliuria, polidipsia, polifagia, penurunan berat badan, cepat merasa lelah, iritabilitas dan gatal-gatal pada kulit (Muchid, et al., 2005) Antara 20-40% pasien mengalami ketoasidosis setelah beberapa hari mengalami poliuri, polidipsi, polifagia dan kehilangan berat badan. Gejala klinik dari sedang sampai berat yang berkembang dengan cepat. Gejala yang dikeluhkan pada DM tipe 2 umumnya hampir tidak ada. DM tipe II seringkali muncul tanpa diketahui, dan penanganan baru dimulai beberapa tahun kemudian ketika penyakit sudah berkembang dan komplikasi sudah terjadi. Penderita DM tipe II umumnya lebih mudah terkena infeksi, sukar sembuh dari luka, daya penglihatan makin buruk, dan umumnya menderita hipertensi, hiperlipidemia, obesitas dan juga komplikasi pada pembuluh darah dan syaraf (Muchid, et al., 2005).

E. Insulin

Insulin merupakan protein kecil yang mengandung 2 rantai polipeptida yang dihubungkan oleh ikatan disulfida. Disintesis sebagai protein prekursor (pro-insulin) yang mengalami pemisahan proteolitik untuk membentuk insulin dan peptide C, keduanya disekresi oleh sel beta pancreas (Mycek, 2001).

1. Sekresi Insulin

Sekresi insulin diatur tidak hanya oleh kadar glukosa darah tetapi juga oleh hormon lain dan mediator autonomik. Sekresi insulin umumnya dipacu oleh ambilan glukosa darah yang tinggi dan difosforilasi dalam sel beta pankreas. Kadar adenosine trifosfat (ATP) meningkatkan dan menghambat saluran K^+ , menyebabkan membran sel depolarisasi dan influx Ca^+ , yang menyebabkan pulsasi eksositosis insulin. Glukosa yang diberikan secara suntikan mempunyai efek lebih rendah terhadap sekresi insulin dari pada glukosa yang diberikan per-oral, karena pemberian glukosa per-oral merangsang produksi hormon pencernaan oleh usus, yang kemudian merangsang sekresi insulin oleh pankreas (Mycek, 2001).

2. Distribusi dan Metabolisme Insulin

Insulin dalam darah beredar sebagai monomer, volume distribusi hampir sama dengan volume cairan ekstra sel. Pada keadaan puasa sekresi insulin ke vena porta sekitar 40 μg per jam, untuk mencapai kadar 2-4 ng/ml (50-100 $\mu\text{U/ml}$) atau sekitar 0,1 nM. Setelah makan, kadarnya dalam darah portal cepat meningkatkan tetapi peningkatannya di perifer sedikit lebih rendah. Tujuan terapi insulin untuk mencapai seperti keadaan di atas tetapi ini sukar dicapai dengan penyuntian subkutan.

Pada orang normal dan pasien DM tanpa komplikasi, masa paruh insulin di plasma sekitar 5-6 menit, pada DM yang mempunyai antibodi antiinsulin nilai tersebut memanjang. Proinsulin masa paruhnya lebih panjang (± 17 menit). Insulin dalam peredaran darah didistribusi ke seluruh tubuh melalui cairan ekstrasel.

Degradasinya terjadi di hepar, ginjal dan otak, dan sekitar 50% insulin di hepar akan dirusak dan tidak akan mencapai sirkulasi sistemik. Klirens peptide-C di hepar lebih rendah, karenanya masa paruhnya lebih panjang (\pm 30 menit). Hormon ini mengalami filtrasi glomeruli dan reabsorpsi serta degradasi di tubuli ginjal.

3. Mekanisme Kerja Insulin

Organ target insulin dalam mengatur kadar glukosa adalah hepar, otot, dan adipose. Peran utamanya uptake, utilisasi, dan penyimpanan nutrient di sel. Efek anabolik insulin meliputi stimulasi, utilisasi dan penyimpanan glukosa, asam amino, asam lemak intrasel. Sedangkan proses katabolisme (pemecahan glikogen, lemak dan protein) dihambat. Semua efek ini dilakukan dengan stimulasi transport substrat dan ion ke dalam sel, menginduksi translokasi protein, mengaktifkan dan menonaktifkan enzim spesifik, merubah jumlah protein dengan mempengaruhi kecepatan transkripsi gen dan translasi mRNA spesifik.

4. Peran Insulin

Adapun peran insulin adalah sebagai berikut:

a. Pengatur Kadar Glukosa Dalam Darah

Kadar glukosa dalam darah sangat dipengaruhi fungsi hepar, pankreas, adenohipofisis, dan adrenal. Kkecuali itu fungsi tiroid, kerja fisik, faktor imunologi dan genetic dapat berpengaruh pada kadar glukosa darah.

b. Peran Insulin Pada Transport Zat Melalui Membran

Pada otot dan jaringan adipose, insulin memudahkan penyerapan berbagai zat melalui membrane, termasuk glukosa dan monosakarida lain, serta asam amino ion K, nukleosida, dan fosfat anorganik.

Beberapa jaringan tubuh memberikan respon berbeda terhadap insulin. Hormon ini dibutuhkan untuk penyerapan glukosa pada otot skelet, otot polos, otot jantung, jaringan lemak, leukosit, lensa mata, humor akuosa, dan hipofisis. Sedangkan penyerapan glukosa di otak (kecuali mungkin bagian hipotalamus), tubuli ginjal, mukosa intestinal, eritrosit, tidak dipengaruhi insulin. Jadi insulin merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi mekanisme penyerapan zat melalui membran.

c. Pengaruh Insulin Pada Enzim

Banyak enzim yang aktivitas perangsangan atau penghambatan dipengaruhi oleh insulin. Enzim yang aktivitas perangsangannya dipengaruhi oleh insulin adalah enzim yang penting untuk proses glikogen, yaitu glikokinase, enzim yang perlu untuk sintesis glikogen, juga diaktifkan oleh insulin. Enzim yang dihambat aktivitasnya oleh insulin adalah enzim yang penting untuk gluconeogenesis, yaitu glukosa-6-fosfatase, fruktosa-difosfatase, fosfoenolpiruvatkinase dan piruvatkarboksilase. Semua enzim tersebut berperan pada reaksi yang sebaliknya dari proses glikolisis (Ganiswara, 2007).

F. Diagnosa Diabetes

1. Glukosa Urin

Pengujian sederhana atau pengujian laboratorium kuantitatif yang lebih kompleks dapat digunakan untuk menjelaskan jumlah glukosa yang lolos dalam urin. Pada umumnya glukosa tidak terdeteksi dalam urin pada manusia normal, namun pada penderita diabetes, glukosa dalam urinya akan terdeteksi.

2. Glukosa Puasa dan Kadar Insulin

Kadar normal glukosa darah puasa pada pagi hari adalah 80-100 mg/100 ml, dan 110 mg/100 ml dianggap lebih tinggi diatas normal. Kadar gluosa darah puasa yang diatas nilai ini sering diindikasikan diabetes mellitus atau sediit tunda resisten insulin. Pada diabetes tipe 1, kadar plasma insulin sangat rendah atau tidak terdeteksi selama puasa dan bahkan setelah makan. Pada diabetes tipe 2, kosentrasi glukosa darah lebih tinggi di atas normal dan sealu meningkat pada batas terbesar setelah pemberian glukosa selama uji toleransi.

3. Uji Toleransi Glukosa

Secara normal glukosa yang diberikan kepada orang puasa sebanyak 1 gram/kg BB akan meningkatkan kadar glukosa dari 90 mg/100 ml sampai 120-140 mg/100 ml dan kembali pada keadaan normal sekitar 2 jam. Sedangkan pada penderita diabetes, kada glukosa darah puasa hamper selalu datas 110 mg/100 ml dan sering di atas 140/100 ml.

4. Nafas Berbau Aseton

Asam asetoasetik yang meningkat di dalam darah penderita diabetes dikonversi menjadi aseton. Hal ini berubah menjadi gas dan keluar melalui pernapasan. Akibatnya, seseorang mendiagnosa diabetes tipe 1 hanya dengan mencium bau aseton pada napas penderita (Gyuton & Hall, 2006).

Tabel 5. Kriteria Diagnostik Gula Darah

	Glukosa Plasma	Glukosa Plasma 2 jam setelah makan
Normal	< 100 mg/dL	< 140 mg/dL
Pra diabetes	100-125 mg/dL	-
IFG atau IGT	-	140-199 mg/dL
Diabetes	> 126 mg/dL	>200 mg/dL

Keterangan :

IFG : *Impaired Fasting Glucose*

IGT : *Impaired Glucose Tolerance*

(Muchid, et al., 2005))

H. Pengobatan

Ada tiga komponen utama dalam pengobatan diabetes: diet nutrisi, olahraga, dan obat-obatan (insulin dan obat hipoglikemik oral). Masing-masing obat dapat berinteraksi dengan yang lain dan kadang dilakukan modifikasi keduanya. Target kadar gula darah pada ibu hamil yang diabetes sangat diperhatikan. Penderita diabetes seharusnya menerima pengetahuan pengobatan sendiri atau Diabetes Self-Management Education (DSME) yang saat ini menjadi elemen penting dalam program diabetes care salah satunya yaitu pengetahuan dalam terapi nutrisi. Bagi penderita diabetes tantangan terbesar terletak pada apa yang dikonsumsi, namun tujuan dari

terapi nutrisi yaitu meningkatkan pola makan sehat untuk mencapai gula darah yang terkontrol, status gizi, dan mempertahankan berat badan ideal. Penurunan berat badan terbukti dapat mengurangi resistensi insulin dan memperbaiki respon sel-sel beta terhadap stimulus glukosa. Pada uji klinis telah memberikan bukti yang kuat untuk penurunan glukosa darah pada penderita diabetes tipe 2. Penderita DM tipe 1 latihan intensif dapat menyebabkan hipoglikemi jika dosis obat atau konsumsi karbohidrat tidak diubah (Demarco, 2015).

Olahraga akan memperbanyak jumlah dan meningkatkan aktivitas reseptor insulin dalam tubuh dan juga meningkatkan penggunaan glukosa. Pada penderita DM tipe 1 insulin sangat dibutuhkan dari luar dikarenakan sel beta mengalami kerusakan sehingga tidak mampu memproduksi insulin untuk memenuhi kebutuhan dalam mengatur glukosa darah dalam tubuh. Insulin dari luar juga mungkin dibutuhkan bagi penderita DM tipe 2 yang tubuhnya membutuhkan lebih banyak insulin sedangkan sel beta hanya mampu memproduksi sedikit insulin (Unwin, et al., 2009).

1. Terapi Insulin

Insulin merupakan pengobatan andalan untuk hampir semua pasien DM tipe 1 dan DM tipe 2. Jika diperlukan, insulin dapat diberikan secara intravena atau intramuscular. Namun, pengobatan jangka panjang bergantung terutama pada injeksi hormone secara subkutan. Insulin adalah protein kecil yang dimana tujuan pemberiannya adalah untuk memelihara konsentrasi glukosa mendekati kadar normal dan mencegah besarnya belokan kadar glukosa darah yang dapat menyokong timbulnya komplikasi jangka panjang (Mycek, 2001).

2. Terapi Antidiabetik Oral

Berdasarkan mekanisme kerjanya, obat-obat hipoglikemik oral dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu:

a. Obat-obat yang meningkatkan sekresi insulin

Meliputi obat hipoglikemik oral golongan sulfonilurea dan glinida (meglitinida dan turunan fenilalanin).

b. Sensitiser insulin

Golongan biguanida dan tiazolidindion, yang dapat membantu tubuh untuk memanfaatkan insulin secara lebih efektif.

c. Inhibitor katabolisme karbohidrat

Inhibitor α -glukosidase yang bekerja menghambat absorpsi glukosa dan umum digunakan untuk mengendalikan hiperglikemia post-prandial (post-meal hiperglikemia).

Berdasarkan penggolongannya obat antidiabetik oral (ADO) dibagi atas 5 golongan yang dapat digunakan untuk DM dan telah dipasarkan di Indonesia yakni golongan sulfonilurea, moglitinid, biguanid, penghambat α -glukosidase dan tiazolidindion. Kelima golongan ini dapat diberikan pada DM tipe 2 yang tidak dapat dikontrol hanya dengan diet dan latihan fisik saja (Ganiswara, 2007).

a. Sulfonilurea

Obat sulfonilurea dikembangkan setelah penggunaan sulfonamid pada terapi demam tifoid menyebabkan penurunan glukosa darah. Obat sulfonilurea mempunyai aksi terutama pada sel Langerhans pankreas. Obat ini secara pankreatik dengan

menstimulasi sel β Langerhans pankreas untuk mengsekresi insulin. Sulfonilurea juga mempunyai aksi di luar pankreas, yaitu menurunkan kadar glukagon serum dan meningkatkan aksi insulin pada jaringan (Nugroho, 2012).

b. Biguanid

Metformin mungkin digunakan sendiri atau dalam kombinasi dengan sulfonilurea. Metformin bekerja terutama dengan jalan mengurangi pengeluaran glukosa hati, sebagian besar dengan menghambat gluconeogenesis. Efek yang sangat penting adalah kemampuannya untuk mengurangi hiperlipidemia (konsentrasi kolesterol LDL dan VLDL menurun dan kolesterol HDL meningkat) (Mycek, 2001).

c. Penghambat α -glukosidase

Enzim α -glukosidase berfungsi untuk peruraian polisakarida atau oligosakarida dan sukrosa menjadi glukosa. Hanya karbohidrat dalam bentuk glukosa dan fruktosa yang dapat diabsorpsi, sehingga hambatan peruraian polisakarida atau oligosakarida menjadi glukosa akan menghambat absorpsi glukosa

d. Meglitinid

Repaglinid adalah anggota pertama golongan meglitinid. Obat-obat ini memodulasi pelepasan insulin sel beta dengan mengatur efluks kalium melalui saluran kalium yang telah dibahas. Terjadi tumpang tindih tempat kerja molekuler dengan sulfonilurea karena meglitinid memiliki dua tempat pengikatan yang sama dengan sulfonilurea dan satu tempat pengikatan yang khas (Katzung, 2014).

e. Tiazolidinedion

Obat ini beraksi mengaktivasi *Peroksidase Proliferasi Aktivatasi Reseptor Gamma* (PPAR γ), suatu reseptor intraseluler yang terdapat pada jaringan adipose, otot dan hati. Fungsi PPAR γ adalah memperantarai diferensiasi sel lemak, meningkatkan proses lipogenesis, dan meningkatkan pengambilan asam lemak dan glukosa (Nugroho, 2012).

Tabel 6. Golongan senyawa hipoglikemik oral beserta mekanisme kerjanya

Golongan	Contoh Senyawa	Mekanisme Kerja
Sulfonilurea	Gliburida Glibenklamida Glipizida Glikazida Glimepirid Glikuidon	Merangsang sekresi insulin di kelenjar pankreas, sehingga hanya efektif pada penderita diabetes yang sel-sel β pankreasnya masih berfungsi dengan baik.
Meglitinida	Repaglinide	Merangsang sekresi insulin di kelenjar pankreas
Turunan fenilalanin	Nateglinide	Meningkatkan kecepatan sintesis insulin oleh pankreas
Biguanida	Metformin	Bekerja langsung pada hati menurunkan produksi glukosa hati. Tidak merangsang sekresi insulin oleh kelenjar pankreas.
Tiazolidindion	Troglitazone Pioglitazon	Meningkatkan kepekaan tubuh terhadap insulin, berikatan dengan PPAR γ (<i>peroxisome proliferator activates receptor-gamma</i>) di otot.

Inhibitor α -Glukosidase	Acarbose Militol	Menghambat kerja enzim-enzim pencernaan yang mencerna karbohidrat, sehingga memperlambat absorpsi glukosa ke dalam darah.
---------------------------------	---------------------	---

(Muchid, et al., 2005)

H. Tinjauan Islam

Peradaban Islam dikenal sebagai perintis dalam bidang farmasi. Para ilmuwan Muslim di era kejayaan Islam sudah berhasil menguasai riset ilmiah mengenai komposisi, dosis, penggunaan dan efek dari obat-obatan sederhana dan campuran. Selain menguasai bidang farmasi, masyarakat Muslim pun tercatat sebagai peradaban pertama yang memiliki apotek atau toko obat. Penelitian Metode Penyembuhan: Rasulullah saw. mengatakan sebuah prinsip dasar dalam pengobatan untuk setiap penyakit adalah perawatan. Hal ini mendorong kita untuk mencari cara pengobatan. Dengan demikian, tradisi pengobatan ala Nabi tidak hanya berhenti pada pengajaran pengobatan oleh Rasulullah saw., melainkan mendorong manusia agar terus mencari dan bereksperimen dengan ilmu pengobatan baru. Hal tersebut merupakan implikasi bahwa pengobatan ala Nabi tidaklah statis. Ada ruang untuk berkembang, bahkan memunculkan dasar ilmu yang baru. Implikasi-implikasi lainnya dari hadits ini adalah pengobatan tidak bertentangan dengan qadar (ketentuan awal). Keduanya baik penyakit maupun penyembuhannya adalah bagian dari qadar (Hasan, 2007).

Dari Abu Hurairah r.a. berkata: Rasulullah saw bersabda

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

Artinya :

“Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit melainkan Allah menurunkan obatnya pula” (H.R. Al-Bukhari).

Dalam hadis tersebut menjelaskan bahwa setiap penyakit yang Allah berikan pasti ada obatnya atau penawarnya. Allah swt. telah menjadikan untuk penyakit tersebut obat-obatan yang dapat menyembuhkannya. Oleh sebab itu, kesembuhan terhadap penyakit dikaitkan oleh Rasulullah saw. dengan proses kesesuaian obat dengan penyakit yang diobati. Karena setiap penyakit itu pasti ada anti penawarnya. Itu merupakan lebih dari hanya sekedar dari keberadaan obat itu. Karena jika obat itu diberikan dengan cara yang salah, misalnya dengan dosis yang berlebih dari stadium penyakitnya dalam pemakaiannya atau jumlahnya, atau kuantitasnya lebih dari yang seharusnya, justru itu bisa menyebabkan penyakit lain. Namun kalau dosisnya kurang juga tidak bisa mengobati (Ar-Rumaikhon, 2008).

Kebutuhan akan obat-obatan di era modern seperti sekarang sangat besar seiring munculnya berbagai macam penyakit yang belum ditemukan obatnya. Tumbuhan merupakan salah satu jenis makhluk ciptaan Allah swt. yang dapat digunakan sebagai obat. Allah swt. berfirman dalam QS. Lukman (31); 10:

.....وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ١٠

Terjemahnya :

“Dan Kami turunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dari padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik” (Kementerian Agama, 2015).

Bila kita memiliki ilmu pengetahuan, maka dari tumbuh-tumbuhan tersebut dapat dihasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, manusia harus selalu senantiasa mengembangkan ilmu pengetahuannya seperti ilmu yang membahas tentang obat yang berasal dari alam, misalnya tumbuh-tumbuhan. Sehingga mampu memecahkan penyakit masyarakat modern tersebut (Djailani, 1997).

Saat ini, tanaman obat menjadi salah satu alternatif obat yang dipilih oleh masyarakat luas. Hal ini karena tanaman obat tidak mempunyai efek samping yang besar bila dibandingkan dengan obat modern yang terbuat dari bahan kimia sintetis. Selain itu, tanaman obat pun semakin populer dengan makin meluasnya informasi dan penanganan medis secara tradisional yang ditayangkan di televisi sehingga membuat masyarakat luas makin tertarik untuk mencoba dan memanfaatkan tanaman obat (Raina, 2011).

Firman Allah swt dalam QS Al-Yunus/10 : 101

قُلْ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا

يُؤْمِنُونَ ١١

Terjemahnya:

Katakanlah: "Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman" (Kementerian Agama, 2015).

Dalam ayat tersebut, Allah SWT memerintahkan kita untuk memerhatikan apa yang ada di langit dan di bumi sebab Allah telah memberikan banyak manfaat didalamnya, salah satunya manfaat akan penawar/obat dari penyakit yang diturunkannya.

Firman Allah SWT dalam QS Al-Imran/ 2 : 191

.....رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ١٩١

Terjemahnya:

"Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, Maka peliharalah kami dari siksa neraka" (Kementerian Agama, 2015).

Ayat diatas menjelaskan bahwa segala apa yang diciptakan oleh Allah tidak ada yang bersifat sia-sia, baik dari hal yang terkecil sampai pada yang terbesar, hal ini Allah SWT jelaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 26:

Firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah/ 2 : 164

۞ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةٌ فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا

فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا

مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ٢٦

Terjemahnya:

"Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. adapun orang-orang yang beriman, Maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka, tetapi mereka yang kafir mengatakan: "Apakah maksud Allah menjadikan Ini untuk perumpamaan?." dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu (pula) banyak orang yang diberi-Nya petunjuk. dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik" (Kementrian Agama, 2015).

Kalimat yang mempunyai arti "Perumpamaan nyamuk atau yang lebih rendah dari itu". Kalimat ini dapat diartikan bahwa sesuatu yang lebih kecil dari pada nyamuk adalah mikroorganisme. Kombucha adalah jenis minuman yang memanfaatkan mikroorganisme dalam proses pembuatannya, yaitu pemanfaatan hasil simbiosis mutualisme antara bakteri (*Acetobacter xylinum*) dan khamir (*Saccharomyces cerevisiae*) yang berupa asam- asam penting yang dapat dimanfaatkan untuk menstabilkan metabolisme tubuh. Pada proses pembuatan minuman ini juga dibutuhkan medium yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Fermentasi kombucha menghasilkan berbagai jenis zat asam, terutama asam asetat (cuka) yang merupakan jenis zat asam terbesar yang dihasilkan selama proses fermentasi ini berlangsung. Asam asetat adalah zat asam yang mempunyai banyak manfaat (An-Najjar, 2006).

Dari beberapa ayat diatas dapat diketahui bahwa Allah SWT menciptakan segala sesuatu secara berpasang-pasangan, begitupula dengan penyakit, setiap penyakit yang Allah turunkan pasti ada penawarnya, adapun penawar dari penyakit tersebut dapat ditemukan dengan memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada pada langit dan di bumi. Segala sesuatu yang Allah ciptakan dimuka bumi tidak ada kesia-siaan didalamnya, baik yang terkecil sekalipun maupun yang terbesar,

sehingga kita sebagai kaum muslim dituntut untuk senantiasa mengembangkan ilmu pengetahuan salah satunya dengan cara menggali potensi ciptaan Allah berupa tumbuh-tumbuhan yang baik dan mikroorganisme yang dapat digunakan sebagai obat dengan sebaik mungkin.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimental laboratorium

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Laboratorium Farmakologi Farmasi dan Biologi Farmasi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu metode eksperimental di laboratorium, yaitu penelitian yang mengungkapkan pengaruh atau suatu gejala yang timbul, dengan ciri khusus, yaitu dengan melakukan percobaan.

C. Instrumen Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, digunakan beberapa alat dan bahan yang dapat menunjang, antara lain:

1. Alat Penelitian

Alat yang digunakan antara lain adalah Alat ukur glukosa darah (*easy touch multy*®), Batang pengaduk, Cawan porselin, Corong kaca, Gelas kimia 1000 ml (*Pyrex*®), Gelas kimia 250 ml (*Pyrex*®), Gelas ukur 250 ml (*Pyrex*®), Gelas ukur 5 ml (*Pyrex*®), Inkubator, Jarum sonde, Kamere digital (*Nicon*®), Labu tentukur 100 ml

(Pyrex®), Laminar Air Flow (LAF), Neraca analitik, Otoklaf, Oven, Panci *stainless steel*, Penangas, Ph meter, Pipet tetes, Refraktometer, Sendok tanduk, Spuit 1 ml, Termometer air 120°C, Timbangan sampel, Toples Kaca 2,5 L.

2. Bahan Penelitian

Aluminium foil (Klin Pak®), Air Suling, Etanol 70% (One Med®), Kain Kasa (Hexa Husada®), Kapas (Sari Bunga®), Karet Gelang, Kertas Label (Fox ®), Kertas Perkamen, Limbah Rambut Jagung, Starter Kombucha, Strip Glukosa (*easy touch multy*®), Sukrosa (Gulaku®), dan Tissue (Nice®)

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Tanaman Jagung (*Zea mays*) dari Sulawesi Selatan

2. Sampel

Rambut jagung manis yang difermentasikan menggunakan starter padat dan starter cair kombucha.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Penyiapan Sampel

Sampel limbah rambut jagung diambil di desa Parrasangang Beru, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Jagung yang dipetik dari batang tanaman jagung yang masih utuh lalu dipisahkan rambut jagungnya dan ditimbang sebanyak 1 kg kemudian dibersihkan dari kotoran dan dicuci dengan air mengalir, kemudian dikeringkan dengan cara mengangin-anginkan kemudian dimasukkan dalam oven dengan suhu 50° selama 3 hari.

2. Starter Kombucha

Starter kombucha dipesan di jalan Gede Desa II Sading, Kecamatan Mengwi Kabupaten Bandung, Bali dengan diameter 25 cm dengan ketebalan 1-2 cm. kemudian dibiakkan dulu untuk mendapatkan starter yang dibutuhkan.

3. Pembuatan Teh Kombucha (Aloulou, et al., 2012)

Pembuatan kombucha dilakukan sesuai prosedur dari Naland (2004). Yaitu dengan metode infusa. Pertama-tama Ditimbang simplisia kering rambut jagung 24 gram dan sukrosa 200 gram, lalu rebus 3 liter air hingga mendidih dan diturunkan suhunya hingga 70°C lalu tambahkan 24 gram rambut jagung kedalam air dengan suhu 70°C. Teh dibiarkan selama 15 menit dan kemudian disaring dengan kertas penyaring kedalam toples hingga 2 liter dan ditambahkan 200 gram sukrosa hingga homogen dan didinginkan sampai suhunya mencapai 27°C. Setelah dingin, starter cair kombucha sebanyak 200 ml dan starter padat kombucha sebanyak 50 gram dimasukkan kedalam toples kaca yang berisi teh limbah rambut jagung, kemudian wadah ditutup dengan kain kasa steril dan diikatkan dengan karet gelang, lalu difermentasi dalam inkubator dengan suhu 70°C selama 14 hari. Setelah fermentasi selesai, larutan kombucha siap untuk diujikan.

4. Pembuatan Larutan Kolodial Na CMC 1% (Rasyid, et al., 2012)

Sebanyak 1 gr Na CMC dimasukkan sedikit demi sedikit ke dalam 50 ml air suling panas (suhu 70°C) sambil diaduk dengan menggunakan batang pengaduk hingga terbentuk larutan koloidal dan dicukupkan volumenya dengan air suling hingga 100 mL.

5. Pembuatan Suspensi Glibenklamid mg/30 gBB 0,0095 mencit (Fahri, et al., 2005)

Tablet Glibenklamid ditimbang sebanyak 10 tablet, kemudian dihitung bobot rata-rata tiap tablet. Kemudian semua tablet Glibenklamid dimasukkan ke dalam lumpang dan digerus hingga halus dan homogen. Setelah itu, ditimbang setara dengan 2 mg serbuk Glibenklamid. Serbuk Glibenklamid dimasukkan kembali ke dalam lumpang lalu ditambahkan sedikit demi sedikit larutan koloidal Na CMC 1% b/v sambil diaduk hingga homogen. Hasilnya dimasukkan ke dalam labu ukur 100 mL dan dicukupkan volumenya menggunakan larutan Na CMC 1% b/v hingga 100 mL.

6. Pembuatan Larutan Glukosa 50% (Rasyid, et al., 2012)

Glukosa sebanyak 50 g dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml dan tambahkan dengan air suling sebanyak 50 ml. aduk hingga larut cukupkan volumenya dengan air suling hingga 100 mL.

7. Pemilihan dan Penyiapan Hewan Coba

Hewan yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencit putih jantan yang sehat berumur 2-3 bulan dengan berat badan 20-30 gram sebanyak 15 ekor. Hewan diaklimatisasi selama 7 hari sebelum perlakuan. Hewan dinyatakan sehat apabila selisih berat sebelum dan sesudah di adaptasikan tidak lebih dari 10% dan secara visual menunjukkan perilaku normal.

8. Perlakuan Dan Penyiapan Hewan Uji

Mencit jantan, sebanyak 15 ekor, dengan bobot badan antara 20-30 gram. Sampel dibagi menjadi 5 kelompok perlakuan dan masing-masing kelompok terdiri dari 3 ekor mencit. Hewan uji dibuat dalam kondisi hiperglikemia dengan memberikan glukosa 50%.

- a. Kelompok 1 (K1), mencit diberikan NaCMC 1% sebagai kontrol negatif.
- b. Kelompok 2 (K2), mencit diberikan Glibenklamid mg/30 gBB 0,0095 mencit sebagai kontrol positif.
- c. Kelompok 3 (K3), mencit diberikan teh kombucha rambut jagung dengan dosis 0,26 mL/20 gBB
- d. Kelompok 4 (K4), mencit diberikan teh limbah rambut jagung dengan dosis 0,52 mL/20 gBB
- e. Kelompok 5 (K5), mencit diberikan teh kombucha rambut jagung dengan dosis 0,78 mL/20 gBB

Kemudian diambil darahnya melalui ekor, kadar glukosa darahnya ditentukan menggunakan alat glukometer tiap interval 30 menit.

9. Penentuan Kadar Glukosa Darah Mencit

Glukometer dikalibrasi dengan menggunakan kunci kode strip kemudian strip dipasang pada alat tersebut. Penentuan kadar glukosa dilakukan pada menit ke 30, 60, 90, dan 120. Pengukuran dilakukan dengan cara mengambil darah pada pembuluh darah vena yang terletak pada ujung ekor mencit. Sampel darah yang diperoleh

kemudian diteteskan pada strip glukometer dan kadar glukosa darah mencit akan terukur secara otomatis pada layar.

F. Teknik Pengolahan Data

Data diperoleh dari hasil pengukuran kadar glukosa darah. Data dikumpulkan dan dianalisis secara statistik menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK).



BAB IV


HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Aktivitas Antihiperlikemik Teh Kombucha Rambut Jagung (*Zea mays*)

Tabel 7. Hasil Penurunan Glukosa darah Mencit yang Diberi Perlakuan

Sampel Uji	Replikasi	Kadar Glukosa Darah Puasa (mg/dL)	Kadar Glukosa Sesudah diinduksi glukosa 50% (mg/dL)	Kadar Glukosa Darah (mg/dL)				Penurunan Kadar Glukosa Darah (mg/dL)
				Waktu (Menit)				
				30	60	90	120	
NaCmC	1	70	226,8	207	225	228,6	216	10,8
	2	61,2	185,4	225	216	203,4	180	5,4
	3	68,4	210,6	216	216	198	203,4	7,2
Glibenklamid	1	86,4	216	153	138,6	126	120,6	95,4
	2	108	207	106,2	102,6	86,4	82,8	124,2
	3	82,8	268,2	167,4	153	144	138,6	129,6
Kombucha 0,26 mL/20KgBB	1	72	180	163,8	149,4	144	140,4	39,6
	2	70,2	180	167,4	163,8	156,6	144	36
	3	102,6	207	180	162	153	144	63
Kombucha 0,52 mL/20KgBB	1	108	225	183,6	180	180	176,4	48,6
	2	104,4	216	207	183,6	167,4	167,4	48,6
	3	97,2	219,6	190,8	167,4	153	144	75,6
Kombucha 0,78 mL/20KgBB	1	68,4	180	138,6	118,8	111,6	100,8	79,2
	2	102,7	207	127,8	127,8	122,4	118,8	88,9
	3	108	183,6	120,6	111,6	106,2	104,4	79,2



Grafik 1. Aktivitas Antihiperqlikemik Teh Kombucha Rambut Jagung (*Zea mays*)

B. Pembahasan

Diabetes mellitus (DM) merupakan penyakit fisiologis dengan ciri utama adanya abnormalitas metabolisme glukosa. Kadar gula darah pada penderita DM mengalami kenaikan melebihi batas normal (hiperglikemia). Diabetes mellitus disebabkan karena kekurangan hormon insulin yang berfungsi memanfaatkan glukosa sebagai sumber energi dan mensintesis lemak (Syamsudin, 2011) Akibatnya glukosa menumpuk di dalam darah (hiperglikemia) dan akhirnya dikeluarkan bersama kemih (glikosuria) tanpa digunakan tubuh (Tjay & Rahardja, 2003)

Diabetes mellitus (DM) disebabkan menurunnya fungsi pankreas untuk memproduksi insulin atau reseptor insulin tidak mampu mengenali glukosa sehingga terjadi gangguan metabolisme. Glukosa yang masuk tidak dirubah menjadi glikogen menyebabkan glukosa darah meningkat. DM berhubungan dengan abnormalitas

metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein pada keadaan komplikasi kronik dapat memicu mikrovaskular, makrovaskular, dan kelainan neuropati (Dipiro, et al., 2008)

Penurunan kadar glukosa darah oleh kombucha di sebabkan selain karena karena adanya antioksidan, kombucha juga mengandung asam glukonat, dimana asam glukonat ini menjaga penyerapan kalsium untuk sekresi insulin oleh sel-sel β pankreas. Insulin disekresikan oleh sel-sel β pada pulau-pulau Langerhans membutuhkan Ca^{2+} dan tahap akhirnya adalah pelepasan isi granula-granula sekresi empat insulin dan C-peptida dibentuk. Ketika rangsangan glukosa menyebabkan penutupan saluran K_{ATP} sehingga kalium akan bertumpuk didalam sel yang menyebabkan depolarisasi. Depolarisasi ini menyebabkan pembukaan Ca^{2+} -Channel dan butiran RRP (*readily releasable pool*). Pembukaan Ca^{2+} -Channel kedalam sel beta menyebabkan peningkatan konsentrasi tinggi Ca^{2+} di dalam sel sehingga menyebabkan RRP melepas granula atau eksositosis (Lukitawati, 2013)

Pada penelitian ini, digunakan sampel rambut jagung karena rambut jagung karena menurut penelitian (Ghada, et al., 2014) rambut jagung memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi, selain itu dibuat dalam bentuk kombucha, karena menurut (Lukitawati, 2013) kombucha mengandung berbagai macam asam yang baik untuk kesehatan tubuh salah satunya adalah asam glukonat. Asam glukoronat dapat meningkatkan sekresi insulin pada sel β pankreas sehingga dapat menurunkan kadar glukosa dalam darah. Sampel rambut jagung yang sudah dipanen disortasi basah dan dicuci dengan air yang mengalir. Pencucian bertujuan untuk menghilangkan kotoran (tanah) yang menempel, residu fungisida atau insektisida. Pencucian dilakukan dengan

menggunakan air (Baliwati, et al., 2004) Rambut jagung dipotong-potong dan dikeringkan dengan menggunakan oven pada suhu 50°C selama 3 hari. Keuntungan pengeringan adalah agar bahan lebih awet dan volume bahan menjadi lebih kecil serta membantu menghentikan kegiatan bakteri sehingga bahan tidak mudah rusak (Winarno, 1993)

Tahapan selanjutnya adalah ekstraksi teh rambut jagung. Adapun jenis ekstraksi yang digunakan adalah metode ekstraksi infusa, karena infusa merupakan metode yang sederhana yang umumnya digunakan dalam pembuatan teh (Lidia, 2013) Dalam proses pembuatannya semua alat disterilisasi terlebih dahulu untuk menghindari kontaminasi bakteri lainnya. Sebanyak 24 gram rambut jagung direbus didalam 3 liter air pada suhu 70°C selama 15 menit, sebab semakin tinggi suhu dan semakin lama waktu perebusan maka aktivitas antioksidan juga semakin rendah (Wicaksono & Zubaidah, 2015) Berdasarkan hasil penelitian (Ismiati, 2015) dengan menggunakan metode FRAP (*Ferric Reduction Antioxidant Power*) menyatakan bahwa perebusan rambut jagung pada suhu 70°C selama 15 menit memiliki aktivitas antioksidan 98,01. Kemudian teh disaring dengan menggunakan kertas saring agar Larutan teh rambut jagung dari rambut jagung, lalu masukkan 2 liter teh rambut jagung kedalam toples ditambahkan sukrosa 200 gram dan dihomogenkan, penggunaan sukrosa bertujuan sebagai nutrisi untuk bakteri dan digunakan konsentrasi 10% karena dari hasil penelitian (Karyantina & Suhartatik, 2008) menyatakan bahwa kadar sukrosa 10% menghasilkan asam glukonat yang tinggi. Selanjutnya didinginkan larutan teh rambut jagung hingga 27°C lalu masukkan starter padat 50 gram dan starter cair 200 ml.

penggunaan suhu 27°C dikarenakan suhu aktivitas bakteri *SCOBY* berkisar antara 23°C-28°C lalu digunakan kombinasi 10% starter cair dan 2,5 b/v starter padat untuk memaksimalkan hasil asam dari fermentasi. Setelah itu difermentasikan di dalam inkubator selama 14 hari untuk memaksimalkan pembuatan asam dan mengurangi kadar gula pada teh, sebab pada mekanismenya *Acetobacter xylinum* dan *Saccharomyces cerevisiae* mengawali perombakan dengan memecah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Kemudian, terjadi pemecahan glukosa dan fruktosa menjadi asam-asam organik dan alkohol secara terus-menerus sampai gula yang terdapat pada larutan kombucha habis. Sehingga asam yang dihasilkan akan terus meningkat pada waktu fermentasi yang semakin lama (Aditiwati & Kusnadi, 2003)

Teh kombucha rambut jagung selanjutnya diujikan pada mencit jantan yang dimaksudkan untuk melihat efektivitas teh kombucha rambut jagung sebagai antihiperqlikemia. Pada penelitian ini digunakan 5 kelompok perlakuan yaitu kelompok kontrol negative (K1), kelompok kontrol positif (K2), dan kelompok teh kombucha rambut jagung dengan dosis berturut-turut 0,26 ml/20gBB (K3), 0,52 ml/20gBB (K4), dan 0,78 ml/20gBB (K5). Penggunaan kelompok kontrol positif dan kelompok kontrol negatif dimaksudkan untuk menjadi pembanding efektivitas sampel dalam menurunkan kadar glukosa darah. Sebelumnya semua mencit dipuasakan selama 16 jam tetapi tetap diberi minum, untuk melihat kadar glukosa darah puasa pada mencit. Selanjutnya mencit diinduksi glukosa 50% untuk membuat kondisi hiperqlikemia pada mencit. 30 menit kemudian diukur kadar glukosa darahnya. Setelah pemberian sediaan diukur kadar glukosa darah pada mencit 30, 60, 90, dan

120 menit, untuk melihat kadar glukosa darah pada mencit. Kadar gluosa darah mencit diukur dengan menggunakan alat glukometer.

Berdasarkan hasil penurunan glukosa darah mencit yang diberi perlakuan yang telah dilakukan, diperoleh data rata-rata penurunan glukosa darah mencit oleh NaCMC sebesar 1,95 mg/dL, Glibenklamid sebesar 29,1 mg/dL, teh kombucha rambut jagung 0,26 ml/20gBB sebesar 11,55 mg/dL, teh kombucha rambut jagung 0,52 ml/20gBB sebesar 14,4 mg/dL dan teh kombucha rambut jagung 0,78 ml/20gBB sebesar 20,55 mg/dL. Sehingga rata-rata penurunan gluosa darah mencit diurut dari yang terbesar ke yang terendah adalah; Glibenklamid, teh kombucha rambut jagung 0,78 ml/20gBB, teh kombucha rambut jagung 0,52 ml/20gBB, teh kombucha rambut jagung 0,26 ml/20gBB, dan NaCMC.

Berdasarkan dari grafik aktivitas antihiperglikemik Teh Kombucha Rambut Jagung (*Zea mays*), pada menit ke 30 Glibenklamid memiliki aktivitas antihiperglikemik paling tinggi lalu kombucha rambut jagung 0,78 ml/20gBB, teh kombucha rambut jagung 0,52 ml/20gBB, teh kombucha rambut jagung 0,26 ml/20gBB, dan NaCMC. Pada menit ke 60, teh kombucha rambut jagung 0,52 ml/20gBB memiliki aktivitas antihiperglikemik tertinggi lalu teh kombucha rambut jagung 0,26 ml/20gBB, Glibenklamid, teh kombucha rambut jagung 0,78 ml/20gBB, dan NaCmC. Pada menit ke 90, Glibenklamid memiliki aktivitas antihiperglikemik tertinggi, lalu teh kombucha rambut jagung 0,52 ml/20gBB, NaCmC, kombucha rambut jagung 0,78 ml/20gBB dan teh kombucha rambut jagung 0,26 ml/20gBB. Pada menit ke 120 NaCmC memiliki aktivitas antihiperglikemia tertinggi, lalu teh

kombucha rambut jagung 0,26 ml/20gBB, Glibenklamid, teh kombucha rambut jagung 0,78 ml/20gBB dan teh kombucha rambut jagung 0,52 ml/20gBB.

Berdasarkan hubungan antara statistik rancangan acak kelompok (RAK) terhadap variasi kombucha dengan penurunan glukosa darah mencit jantan persatuan waktu, diperoleh F hitung perlakuan $< F$ tabel (tidak signifikan), sedangkan pada F hitung perlakuan $> F$ tabel pada taraf kepercayaan 95%. Hal ini menunjukkan bahwa teh kombucha limbah rambut jagung (*Zea mays*) memiliki efek menurunkan kadar glukosa darah mencit jantan dengan penurunan kadar glukosa darah pada menit ke 30, 60, 90 dan 120 adalah sama.

Hasil uji Beda Nyata Terkecil (BNT) menunjukkan bahwa efek dosis teh kombucha limbah rambut jagung 0,78 ml/20gBB tidak berbeda nyata dengan kontrol positif dan berbeda nyata dengan kontrol negatif.

Hasil analisis menunjukkan bahwa teh kombucha limbah rambut jagung 0,78 ml /20 gBB merupakan konsentrasi optimum yang dapat menurunkan kadar glukosa darah mencit.

C. Kajian Keislaman

Alkohol dalam minuman keras hukumnya haram untuk dikonsumsi karena rata-rata kadarnya di atas 1%. Keputusan ini merupakan ketetapan yang merupakan ketetapan yang merupakan hasil ijtihad Komisi Fatwa MUI. Sedangkan kadar alkohol pada teh kombucha berkisar dibawah 1% karena sesudah ragi memakan habis glukosamaka tidak ada lagi yang bias dimakan, sedangkan alkohol yang dihasilkan oleh ragi kemudian akan diproses oleh bakteri menjadi asam.

Pada hakekatnya Islam mengajarkan pada umatnya untuk menyayangi binatang dan melestarikan kehidupannya.

Firman Allah swt dalam QS Al-Baqarah/2 : 29

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ

فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu (Kementrian Agama, 2015)

Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan Sesungguhnya Allah yang harus disembah dan ditaati adalah yang memberikan karunia kepada kalian dengan menjadikan seluruh kenikmatan di bumi untuk kemaslahatan kalian. Kemudian bersamaan dengan penciptaan bumi dengan segala manfaatnya, Allah menciptakan tujuh lapis langit bersusun. Di dalamnya terdapat apa-apa yang bisa kalian lihat dan apa-apa yang tidak bisa kalian lihat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Dari terjemahan tersebut dapat dikatakan penggunaan hewan coba dalam penelitian dapat dilakukan asal untuk kemaslahatan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Teh kombucha rambut jagung (*Zea mays*) dapat menurunkan kadar glukosa darah mencit (*Mus musculus*).
2. Konsentrasi optimum teh kombucha rambut jagung (*Zea mays*) untuk menurunkan kadar glukosa darah mencit (*Mus musculus*) adalah 0,78 ml/ 20 gBB
3. Apa yang telah diciptakan oleh Allah dimuka bumi ini, tidak ada kesia-siaan didalamnya sehingga kita harus senantiasa memanfaatkan dan mengembangkan potensi tumbuh-tumbuhan dan mikroorganisme yang dapat digunakan sebagai obat dengan sebaik mungkin. Salah satunya Teh Kombucha Limbah Rambut Jagung (*Zea mays*) yang dapat digunakan sebagai obat antihiperlikemik.

B. Saran

1. Disarankan dapat melanjutkan penelitian pada teh kombucha limbah rambut jagung (*Zea mays*) dengan jenis penyakit yang berbeda.
2. Disarankan untuk melanjutkan penelitian dengan mengidentifikasi kandungan kimia dari teh kombucha limbah rambut jagung (*Zea mays*)

3. Segala sesuatu harus dikembalikan dalam Al-Quran.



KEPUSTAKAAN

- Aditiwati, P. & Kusnadi, 2003. Kultur Campuran dan Faktor Lingkungan Mikroorganisme yang Berperan dalam Fermentasi Tea Cider. *Journal ITB Sains and Teknologi*, Volume 35, pp. 147-162.
- Aloulou, A. et al., 2012. Hypoglycemic and Antilipidemic Properties of Kombucha Tea in Alloxan-Induced Diabetic Rats.. *Journal of the International Society for Complementary Medicine Research*.
- An-Najjar, Z., 2006. *Pembuktian Sains Dalam Sunnah*. Jakarta: Amzah.
- Ar-Rumaikhon, A. B. S., 2008. *Fiqh Pegobatan Islami*. Solo: Al-Qowam.
- Baliwati, Y. F., Khomsan, A. & Dwiriani, C. M., 2004. *Pengantar Pangan dan Gizi*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Befield, S., 2008. *Field Crop Manual: A Guide to Upland Production in Cambodia*. Australia: NSW Departement of Primary Industries.
- Crowin, E., 2009. *Buku Saku Patofisiologi Edisi Revisi Ke-3*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC.
- Damayanti, D., 2013. *Pintar Meracik Sendiri Ramuan Herbal Untuk Penyakit Kanker, Diabetes Mellitus, dan tekanan Darah Tinggi*. Yogyakarta: Arsaka.
- Demarco, D. A., 2015. Standards of Medical care In Diabetes. *Journal of Clinical and Applied and education*, Volume 38, pp. 45-593.
- Dipiro, J. T. et al., 2008. *A Pathophysiologic Approach*. New York: The McGraw-Hill.
- Djailani, A. K., 1997. *Konsepsi Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Putra Harapan.
- Dufresne, C. & Farnworth, E., 2000. Tea, Kombucha, and Health: A Review. *Food Research International*, pp. 409-421.
- Fahri, C., Sutarno & Listyawati, S., 2005. Kadar Glukosa dan Kolesterol Total Darah Tikus Putih (*Rattus novergicus L.*) Hiperglikemik Setelah Pemberian Ekstrak Metanol Akar Meniran (*Phyllanthus niruri L.*). *Biofarmasi*, pp. 1-6.
- Ganiswara, 2007. *farmakoterapi Edisi V*. Jakarta: Balai Penerbit UI.
- Ghada, M., Eltohami, M., Adurahman, H. & Mudawi, M., 2014. In Vitro Study of the Effect pf Cron Silk On Glucose Uptake By Isolated Rat Hemi-Diaphragm. *World Journal of Pharmaceutical Research* , pp. 2190-2195.
- Graber, L. A., Brown, A. W. & Wolff, K., 2010. *A Life of Control: Stories of Living With Diabetes*. Singapore: Vanderbilt University Press.

GreenWalt, C., Ledford, R. & Steinkraus, K., 2000. Determination and Characterization of the Anti-Microbial Activity of the Fermented Tea Kombucha. *Food Science*, pp. 1-8.

Gyuton, A. C. & Hall, J. E., 2006. *Human Physiology and Mechanisms of Disease*. Jakarta : EGC.

Hasan, M. M. M., 2007. *Mukjizat Kedokteran Nabi*. Jakarta: Qultumedia.

Hasanuddin, K., Hasim, P. & Mustafa, S., 2012. Corn Silk (Stigma Maydis) In Healthcare: A Phytochemical and Pharmacological Review. *Journal Molecules*, pp. 9697-9715.

Ismiati, E. R., 2015. *Aktivitas Antioksidan Minuman Herbal Rambut Jagung Dengan Variasi Kondisi dan Lama Perebusan*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Karyantina, M. & Suhartatik, N., 2008. Kombucha From Different Coconut Sugar Concentration As a Carbon Source. *Jurnal Teknologi dan Industri Pangan*, Volume 19, pp. 165-169.

Katzung, B. G., 2014. *Farmakologi Dasar dan klinik Buku 2*. Jakarta: Salemba Medika.

Kementrian Agama, 2015. *Al Qur'anul Karim*. Jakarta: Kementrian Agama RI.

Koloay, K., Citraningtyas, G. & Lolo, W. A., 2015. Uji Efektivitas Ekstrak Etanol Rambut Jagung (*Zea mays L.*) Terhadap Penurunan Kadar Gula Darah Tikus Putih Jantan Galur Wistar (*Rattus norvegicus L.*) Yang Diinduksi Aloksan. *PHARMACON Jurnal Ilmiah Farmasi*, 4(2302-2493), pp. 34-40.

L, A., Graber, Brown, A. W. & Wolff, K., 2006. *A Life of Control: Stories of Living With Diabetes*. Singapore: Stallion Press.

Lidia, 2013. Pengaruh Infusa Buah Mengkudu (*Morinda citrifolia L.*) Terhadap Kadar Glukosa Darah Tikus Putih Jantan Galur Wistar yang Dibebeani Glukosa. *Jurnal Peneliti sains*, Volume 16, pp. 16104-16114.

Lukitawati, W., 2013. Pengaruh Teh Kombucha Terhadap Kadar Glukosa Darah. *UNESA Journal of Chemistry*, Volume 2, pp. 119-124.

Madigan, M. T., Martinko, P. & Parker, J., 2002. *Brock Biologi of Microorganisms*. New York: Prentice Hall International Inc.

Milind, P. & Isha, D., 2013. ZEA MAIZE: A MODERN CRAZE. *International Research Journal of Pharmacy*, 4(6), pp. 39-43.

- Muchid, A. et al., 2005. *Pharmaceutical Care Diabetes Melitus 1*. Jakarta: Departement kesehatan RI.
- Mycek, M. J., 2001. *Farmakologi Ulasan Bergambar*. Jakarta: Widya Medika.
- Naland, H., 2004. *Kombucha Teh Ajaib Pencegah dan Penyembuh Aneka Penyakit*. Jakarta: PT Agro Medika Pustaka.
- Naland, H., 2008. *Kombucha Teh Dengan Seribu Khasiat*. Jakarta: PT Agro Media Pustaka.
- Nugroho, A. E., 2012. *Farmakologi Obat-Obatan Penting Dalam Pembelajaran Ilmu Farmasi dan Dunia Kesehatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Price, S. A. & Wilson, L. M., 2005. *Patofisiologi Konsep Klinis Proses-Proses Penyakit*. Jakarta : EGC.
- Priyambodo, 2003. *Pengendalian Hama Tikus Terpadu*. Jakarta: Penebar swadaya.
- Purwono & Purnamawati, H., 2009. *Budidaya 8 Jenis Tanaman Pangan Unggul*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Raina, 2011. *Ensiklopedia Tanaman Obat Untuk Kesehatan*. Yogyakarta: Absolut Jogja.
- Rasyid, Murniyanti, Usmar & Subhan, 2012. Uji Toksisitas Akut Ekstrak Etanol Lempuyung Wangi (*Zingiber aromaticum* Val.) Pada Mencit. *Majalah farmasi dan Farmakologi*, Volume 16, pp. 13-20.
- Reusch, J. E., 2003. Diabetes, Microvascular Complications and Cardiovascular Complications. *JCI*, 112(7), pp. 986-988.
- S., Priambodo., 2003. *Pengendalian Hama Tikus Terpadu*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Screeramulu, G., Zhu, Y. & Knol, W., 2000. Kombucha Fermentation and Its Antimicrobial Activity. *J Agric Food Chem*, Volume 6, pp. 2589-2594.
- Sholihah, M., Wan Rosli, W. & Nurhanan, 2012. Phytochemicals Screening and Total Phenolic Content of Malaysian Zea Mays Hair Extrac. *International Food Reasearch Journal*.
- Sjamsuridzal, G. d., 2006. *Mikologi Dasar dan Terapan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Staller, J. E., 2010. *Maize Cobs and Cultures: History pf Zea Maize L.*. Chicago: Springer .

Suherman, S. K., 2001. *Farmakologi Dan Terapi Edisi 4*. Sulistia G. Ganiswarna ed. Jakarta: Gaya Baru.

Syamsudin, 2011. *Farmakologi Eksperimental: Buku Ajar*. Jakarta: Universitas Indonesia.

syamsudin, Sumarny, R. & Simanjuntak, P., 2010. Antidiabetic Activity of Active Fractions of *Leucaena Leucocephala* (Imk) Dewit Seed in Experiment Model. *European Journal of Scientific Research*, pp. 384-391.

Tandra, H., 2007. *Segala Sesuatu Yang Harus Anda Ketahui Tentang Diabetes*. Jakarta: Gramedia .

Tjay, T. H. & Rahardja, K., 2003. *Obat-Obat Penting, Khasiat, Penggunaan dan Efek-efek Samping Edisi VI*. Jakarta: Elex Media.


Unwin, N. et al., 2009. IDF Diabetes Atlas Fourth Edition. *Epidemiology and Research*, pp. 1-104.


Vanderlip, L. S., 2001. *Mice: Everything About History, Care, Nutrition, handling, and Behavior..* China: Barron's Educational Series Inc..


Wicaksono, G. S. & Zubaidah, E., 2015. Pengaruh Keragenan dan Lama Perebusan Daun Sirsak Terhadap Mutu dan Karakteristik Jelly Drink Daun Sirsak. *Jurnal Pangan dan Agroindustri*, Volume 3, pp. 281-291.

Winarno, F., 1993. *Pangan, Gizi Teknologi dan Konsumen*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Yuliarisma, M., 2012. *Pengaruh Rebusan Sarang Semut (Myrmecodia sp) Terhadap Kadar Glukosa Darah Mencit Jantan (Mus musculus) Yang Diinduksi Aloksan*, Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala.

Lampiran 1. Skema Kerja Penyiapan Sampel

Lampiran 2. Skema Kerja Pembuatan Teh Kombucha Limbah Rambut Jagung

Lampiran 3. Skema Kerja Perlakuan Hewan Uji

Lampiran 4. Perhitungan Dosis Glibenklamid dan Dosis Teh Kombucha Yang Diinduksi

A. Perhitungan Dosis Konversi Glibenklamid

1. Konversi Dosis Mencit dan Manusia

- a. Dosis lazium untuk manusia : 5 mg
- b. Faktor konversi untuk mencit dengan bobot 20 g : 0,0026
- c. Dosis untuk mencit 20 g : 5 mg x 0,0026

2. Penyediaan Sediaan Glibenklamid

- a. Volume pemberian untuk mencit 30 g : 1 ml
- b. Dosis untuk mencit 30 g : $\frac{30 \text{ g}}{20 \text{ g}} \times 0,013 \text{ mg} = 0,0195 \text{ mg}$
- c. Dibuat stok sebanyak 100 ml : 100 ml
- d. Jumlah glibenklamid yang dibuat : $0,0195 \text{ mg} \times 100 \text{ ml} = 1,95 \text{ mg}$
 $\approx 2 \text{ mg}$ untuk 100 ml = 0,002 g/100 ml
 = 0,002%

3. Perhitungan Glibenklamid setara dengan 2 mg

$$\text{Berat rata-rata tablet} = \frac{1,967 \text{ g}}{10} = 0,1967 \text{ g} = 196,7 \text{ mg}$$

$$\text{Berat yang ditimbang} = \frac{2 \text{ mg}}{5 \text{ mg}} \times 196,7 \text{ mg} = 78,68 \text{ mg}$$

Jadi, untuk mendapatkan Glibenklamid 2 mg ditimbang bobot tablet sebanyak 78,68 mg yang disuspensikan dengan 100 ml NaCMC 1%

B. Perhitungan Dosis Konversi Teh Kombucha Limbah Rambut Jagung**1. Dosis Pada Manusia**

Dosis empiris rata-rata manusia meminum teh adalah ± 300 ml yang di bagi dalam 3 waktu; pagi, siang dan malam.

Sehingga setiap meminum teh rata-rata manusia meminum ± 100 ml dalam satu waktu.

2. Dosis Pada Mencit

$$\begin{aligned} \text{Dosis Mencit } 20 \text{ gBB} &= \text{Dosis rata-rata manusia meminum teh} \times \text{FK} \\ &= 100 \text{ ml} \times 0,0026 \\ &= 0,26 \text{ ml} / 20 \text{ gBB} \end{aligned}$$

Lampiran 5. Gambar



Gambar 1. Pohon Jagung (*Zea mays*)



Gambar 2. Rambut Jagung



Gambar 3. Teh Kombucha Limbah Rambut Jagung




Gambar 4. Proses Penginduksian



Gambar 5. Pengukuran Kadar Glukosa Darah Mencit



Gambar 6. Glukometer

Lampiran 6. Grafik Penurunan Glukosa Darah Mencit

Grafik 2. Penurunan Glukosa Darah Mencit

Lampiran 7. Hasil Penurunan Glukosa Darah Mencit

Tabel 8. Interval Penurunan Glukosa Darah Mencit

Perlakuan	Waktu				Jumlah	Rata-rata
	30'	60'	90'	120'		
Na CMC	-8,4	-3	9	10,2	7,8	1,96
Glibenklamid	88,77	10,8	12,6	4,8	116,4	29,1
Teh Kombucha 0,26 ml/ 20gBB	18,6	12	7,2	8,4	46,2	11,55
Teh Kombucha 0,52 ml/ 20gBB	26,4	16,8	10,2	4,2	57,6	14,4
Teh Kombucha 0,78 ml/ 20gBB	61,2	9,6	6	5,4	82,2	20,55
Jumlah	186	46,2	45	33	310	77,56

$$\begin{aligned}
 \text{A. Faktor Koreksi (FK)} &= \frac{(\text{Jumlah})^2}{\text{Banyaknya perlakuan} \times \text{ulangan}} \\
 &= \frac{(310)^2}{5 \times 4} \\
 &= \frac{96224,04}{20} \\
 &= 4811,202
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{B. Jumlah Kuadrat Total (JKT)} &= \sum Y_{ij}^2 - \text{FK} \\
 &= [(-8,4)^2 + (-3)^2 + \dots + (5,4)^2 - 4811,202] \\
 &= -13799,16 - 4811,202 \\
 &= 8987,958
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{C. Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP)} &= \frac{(\text{Tij})^2}{\text{Jumlah Replikasi}} - \text{FK} \\
 &= \frac{[(7,8)^2 + (116,4)^2 + \dots + (82,2)^2]}{3} - \text{FK} \\
 &= \frac{25818,84}{3} - 4811,202
 \end{aligned}$$

$$= 8606,28 - 4811,202$$

$$= 3795,078$$

$$\text{D. Jumlah Kuadrat Kelompok (JKK)} = \frac{(\sum T_{ij})^2}{\text{Jumlah Replikasi}} - \text{FK}$$

$$= \frac{[(186)^2 + (46,2)^2 + \dots + (33)^2]}{5} - \text{FK}$$

$$= \frac{39844,44}{5} - 4811,202$$

$$= 7968,888 - 4811,202$$

$$= 3157,686$$

$$\text{E. Jumlah Kuadrat Galat (JKG)} = \text{JKT} - \text{JKP} - \text{JKK}$$

$$= 8987,958 - 3795,078 - 3157,686$$

$$= 2035,194$$

$$\text{F. Derajat Bebas Total (DBT)} = (\text{Banyak perlakuan} \times \text{jumlah replikasi}) - 1$$

$$= (5 \times 3) - 1$$

$$= 14$$

$$\text{G. Derajat Bebas Perlakuan (DBP)} = \text{Banyak perlakuan} - 1$$

$$= 3 - 1$$

$$= 2$$

$$\text{H. Derajat Bebas Kelompok (DBK)} = \text{Banyak perlakuan} - 1$$

$$= 5 - 1$$

$$= 4$$

$$\text{I. Derajat Bebas Galat (DBG)} = \text{DBT} - \text{DBP} - \text{DBK}$$

$$= 14 - 2 - 4$$

$$= 8$$

$$\text{J. Kuadrat Tengah Kelompok} = \frac{\text{Jumlah Kuadrat Kelompok}}{\text{Derajat Bebas Kelompok}}$$

$$= \frac{3157,686}{4}$$

$$= 789,422$$

$$\text{K. Kuadrat Tengah Perlakuan} = \frac{\text{Jumlah Kuadrat Perlakuan}}{\text{Derajat Bebas Perlakuan}}$$

$$= \frac{3795,078}{2}$$

$$= 1897,539$$

$$\text{L. Kuadrat Tengah Galat} = \frac{\text{Jumlah Kuadrat Galat}}{\text{Derajat Bebas Galat}}$$

$$= \frac{2035,194}{8}$$

$$= 254,399$$

$$\text{M.F Hitung Kelompok} = \frac{\text{Kuadrat Tengah Kelompok}}{\text{Kuadrat Tengah Galat}}$$

$$= \frac{789,4215}{254,3993}$$

$$= 3,10$$

$$\text{N. F Hitung Perlakuan} = \frac{\text{Kuadrat Tengah Perlakuan}}{\text{Kuadrat Tengah Galat}}$$

$$= \frac{1897,539}{254,3993}$$

$$= 7,46$$

Lampiran 8. Analisis Varians dan F Tabelnya

Tabel 9. Analisis Keseragaman dan F Tabel Glukosa Darah Mencit Jantan

Standar Keseragaman	Derajat Bebas	Jumlah Kuadrat	Kuadrat Tengah	F Hitung	F Tabel	
					5%	1%
Kelompok	4	3157,686	789,422	3,10	3,84	7,01
Perlakuan	2	3795,078	1897,539	7,46*	4,46	8,65
Galat	8	2035,194	254,399			
Total	14					

Ket. ^{NS} : Tidak Signifikan

* : Signifikan

F Hitung signifikan pada taraf kepercayaan 95%. F hitung dinyatakan tidak signifikan jika F hitung > F table, artinya tidak terdapat perbedaan yang nyata dari setiap perlakuan.

$$\begin{aligned} \text{Koefisien Keseragaman} &: \frac{\sqrt{KTG}}{\gamma} \times 100\% \\ &: \frac{\sqrt{254,399}}{15,512} \times 100\% \\ &: \frac{15,95}{15,512} \times 100\% \end{aligned}$$

$$: 1.03 \%$$

Perhitungan Nilai BNT 0,05

$$\text{BNT} = t(0,05) ; 8 \sqrt{\frac{2KTG}{r}}$$

$$= 1,860 \sqrt{\frac{2 \times 254,399}{3}}$$

$$= 1,860 \sqrt{\frac{508,8}{3}}$$

$$= 1,860 \times 7,482$$

$$= 13,92$$

Perhitungan Nilai BNT 0,01

$$\text{BNT} = t(0,01) ; 8 \sqrt{\frac{2KTG}{r}}$$

$$= 2,896 \sqrt{\frac{2 \times 254,399}{3}}$$

$$= 2,896 \sqrt{\frac{508,8}{3}}$$

$$= 2,528 \times 7,482$$

$$= 21,67$$

Lampiran 9. Analisis RAK, BNT Hubungan Penurunan Glukosa Darah Mencit dengan Sampel Uji

Tabel 10. Analisis RAL, BNT Hubungan Penurunan Glukosa Darah Mencit dengan Sampel Uji

Perlakuan	Rata-Rata	Kontrol Negatif	Teh Kombucha 0,26 ml	Teh Kombucha 0,56 ml	Teh Kombucha 0,78 ml	Kontrol Positif
		1,95	11,55	14,4	20,55	29,1
Kontrol Negatif	1,95	0	9,6 ^{Ns}	12,45 ^{Ns}	18,6*	27,15**
Teh Kombucha 0,26 ml	11,55		0	2,85 ^{Ns}	9 ^{Ns}	17,55*
Teh Kombucha 0,56 ml	14,5			0	6,15 ^{Ns}	14,7*
Teh Kombucha 0,78 ml	20,55				0	8,55 ^{Ns}
Kontrol Positif	29,1					0

BNT/ LSD 0,05 : 13,92

BNT/ LSD 0,01 : 21,67

Keterangan * = Signifikan (Berbeda nyata)

** = Sangat Signifikan (Sangat berbeda nyata)

Ns = Non Signifikan (Tidak Berbeda Nyata)

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Abdillah Dollangeng, lahir di Kolaka, Sulawesi Tenggara 24 Agustus 1994. Merupakan anak ketiga dari tujuh bersaudara dari pasangan Dolangeng, S.Pd dan Atika.

Pada tahun 2000 penulis menempuh dekolah dasar di SDN 1 Kolakasi, dan melanjutkan Pendidikan ke sekolah menengah pertama pada tahun 2006 di MTSN Kolaka, setelah lulus di sekolah menengah pertama, penulis melanjutkan Pendidikan di sekolah menengah atas pada tahun 2009 di SMAN 1 Kolaka. Di sekolah menengah atas penulis mengikuti beberapa perlombaan dan pelatihan-pelatihan, diantaranya pelatihan jurnalistik, pada tahun 2011 dan perlombaan *Rover Scout Competition*. Setelah lulus di sekolah menengah tingkat atas, penulis melanjutkan Pendidikannya di universitas islam negeri alauddin makassar pada jurusan farmasi, fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan.

Prinsip hidup yang selalu penulis pegang adalah “ *Kita adalah Prodak dari pemikiran kita* ” yang berarti bahwa apa yang anda pikirkan tentang diri anda maka akan jadi begitulah anda.