

**ANALISIS SPASIAL KEJADIAN TUBERKULOSIS DI DAERAH  
DATARAN TINGGI KABUPATEN GOWA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Kesehatan  
Masyarakat Jurusan Kesehatan Masyarakat Peminatan Kesehatan Lingkungan  
Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
MAKASSAR  
OLEH :  
MULI REZKY  
70200113122

**JURUSAN KESEHATAN MASYARAKAT  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
2017**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Analisis Spasial Kejadian Tuberkulosis di Daerah Dataran Tinggi Kabupaten Gowa", yang disusun oleh Muli Rezky, NIM: 70200113122, mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munawaziyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis, 14 Desember 2017 M bertepatan dengan 25 Rabiul Awal 1439 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat.

Samata-Gowa, 14 Desember 2017 M  
25 Rabiul Awal 1439 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr.H. Andi Armyrn Nurdin, M.Sc	(.....)
Sekretaris	: Hasbi Ibrahim, SKM., M.Kes	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Andi Susilawaty, S.Si., M.Kes	(.....)
Pembimbing II	: Dr. St. Raodhah, SKM., M.Kes	(.....)
Penguji I	: Muh. Saleh Jastam, SKM., M.Kes	(.....)
Penguji II	: Dr. Zulfahmi Alwi, M. Ag., Ph.D	(.....)

Diketahui oleh:  
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. H. Andi Armyrn Nurdin, M.Sc.  
NIP: 198002031983121001

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muli Rezky  
NIM : 70200113122  
Tempat/Tanggal Lahir : Ujung Pandang/30 April 1995  
Jurusan/Konsentrasi : Kesehatan Masyarakat/Kesehatan Lingkungan  
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Alamat : Bontobila, Desa Julubori, Kec. Pallangga, Kab. Gowa  
Judul : Analisis Spasial Kejadian Tuberkulosis di Daerah  
Dataran Tinggi Kabupaten Gowa.

Menyatakan dengan penuh kesadaran, bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 11 Desember 2017

Penyusun

**Muli Rezky**

**NIM: 70200113122**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu Alaikum wr.wb*

*Alhamdulillah.* Segala puji hanya milik Allah *Subhanahu wa Ta'ala* atas segala limpahan rahmat, karunia dan kekuatan dari-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Skripsi kesehatan lingkungan yang berjudul “Analisis Spasial Kejadian Tuberkulosis di Daerah Dataran Tinggi Kabupaten Gowa Tahun 2017. Oleh karena itu, pujian dan rasa syukur kepada-Nya sebanyak makhluk yang diciptakan-Nya, seberat Arsy-Nya dan sebanyak tinta yang dipergunakan untuk menulis kalimatnya yang tidak pernah mengantuk lagi tidur mengurus makhluk-Nya. Maha Besar Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

Shalawat dan salam kepada Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* sebagai *uswahtun hasanah* dalam menjalankan aktivitas keseharian di atas permukaan bumi ini dengan meneladani keindahan akhlak Beliau, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan orang-orang mukmin yang senantiasa istiqomah meniti jalan hidup ini hingga akhir zaman dengan islam sebagai satu-satunya agama yang diridai Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

Ucapan terima kasih tak terhingga kepada Ayahanda Sunusi dan Ibunda Nursiah atas doa, dukungan dan motivasi untuk selalu bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan senantiasa bertakwa kepada Allah swt. dan memberikan bantuan baik dari segi moril maupun material.

Tidak lupa pula penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pabbabari, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar  
Dr.dr. H. Andi Armyn Nurdin., M.Sc, Wakil Dekan, seluruh staf termasuk staf akademik yang mengatur pengurusan surat dan pengumpulan berkas serta memberikan bantuan yang berarti kepada penulis selama mengikuti pendidikan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Bapak Hasbi Ibrahim, SKM., M.Kes selaku ketua jurusan beserta seluruh staf akademik yang telah membantu selama penulis mengikuti pendidikan.
4. Ibu Dr. Andi Susilawaty, S.Si., M.Kes selaku Pembimbing I yang dengan ikhlas menyediakan waktu, pikiran dan selalu memotivasi serta sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dr. St Raodhah, SKM., M.Kes selaku Pembimbing II yang dengan ikhlas menyediakan waktu, pikiran dan selalu memotivasi serta sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Muh. Saleh Jastam, SKM., M.Kes selaku Penguji Kompetensi yang dengan ikhlas menyediakan waktu, pikiran dan selalu memotivasi serta sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Zulfahmi Alwi, M.Ag., Ph.D selaku Penguji Integrasi Keislaman yang dengan ikhlas menyediakan waktu, pikiran dan selalu memotivasi serta sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Para dosen Kesehatan Masyarakat yang senantiasa membimbing dan mendidik penulis selama mengikuti pendidikan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, khususnya di Jurusan Kesehatan Masyarakat.
9. Pihak Puskesmas Parangloe beserta para kader puskesmas yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan di lokasi penelitian.
10. Pihak Puskesmas Tinggimoncong beserta para kader puskesmas yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan di lokasi penelitian.
11. Pihak Puskesmas Tombolopao beserta para kader puskesmas yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan di lokasi penelitian.
12. Kakanda Yusfi Yusuf dan Ilham Akbar yang telah menyediakan banyak waktu untuk membantu Penulis menyelesaikan skripsi ini.
13. Kakak-kakakku tercinta yang tak henti-hentinya memberikan motivasi yang luar biasa sehingga Penulis tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Saudari-saudariku tercinta Mutassirah, Titi Ismawati, St. Hardiyanti. M, dan Andi Ratnasari yang telah memotivasi dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Teman-teman Kesehatan Lingkungan 2013 yang telah memberikan motivasi, semangat yang luar biasa serta mengajarkan bahwa lingkungan juga ingin dimengerti.
16. Teman-teman seperjuangan Kesehatan Masyarakat Angkatan 2013 (Dimension), khususnya Kesmas D 2013 yang telah memberikan motivasi, semangat dan mewarnai keseharian di dunia kampus.

17. Posko 7 KKN Desa Samangki, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros serta semua pihak yang telah banyak memberikan saran dan motivasi baik moril dan materil pada proses penulisan skripsi hingga selesai.

Segala sesuatu yang telah diberikan beberapa pihak tersebut, penulis tidak mampu untuk membalasnya. Maka dari itu peneliti hanya dapat menyerahkan semua itu kepada Allah swt, semoga semua amal ibadahnya diterima dan dicatat sebagai suatu pahala.

Terakhir, harapan dan doa penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan para pembaca pada umumnya. *Amin Ya Rabbal Alamin*.  
Kritikan dan saran yang bersifat membangun senantiasa penulis harapkan.

Makassar, 11 Desember 2017

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R  
**Muli Rezky**  
NIM.70200113122

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
ABSTRAK .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian .....	7
D. Kajian Pustaka .....	11
E. Tujuan Penelitian .....	16
F. Manfaat Penelitian .....	16
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS</b>	
A. Tinjauan Umum tentang Tuberkulosis .....	18
1. Pengertian Tuberkulosis .....	18
2. Etiologi Tuberkulosis .....	18
3. Patogenesis Tuberkulosis .....	19
4. Gejala-gejala Tuberkulosis .....	19
5. Penularan Tuberkulosis .....	20
6. Diagnosis Tuberkulosis .....	21



7. Penemuan Penderita Tuberkulosis .....	22
8. Klasifikasi Tuberkulosis .....	22
9. Faktor Risiko Tuberkulosis .....	25
10. Upaya pencegahan Tuberkulosis .....	34
11. Pengobatan Tuberkulosis .....	35
B. Tinjauan Umum tentang Rumah Sehat .....	39
C. Tinjauan Umum tentang Analisis Spasial .....	49
D. Pandangan Islam terhadap Penyakit Tuberkulosis .....	55
E. Kerangka Teori .....	60
F. Kerangka Konsep .....	61
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	62
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	62
C. Populasi dan Sampel .....	62
D. Metode Pengumpulan Data .....	63
E. Instrumen Penelitian .....	64
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	65
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	66
B. Hasil Penelitian .....	69
C. Pembahasan .....	92
D. Keterbatasan Penelitian .....	114
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	115
B. Saran .....	116
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	117
<b>LAMPIRAN</b> .....	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sintesa Tinjauan Pustaka Terkait Penelitian Tuberkulosis dan Analisis Spasial .....	11
Tabel 4.1 Distribusi Responden Berdasarkan Lokasi Penelitian di Daerah Dataran Tinggi Kabupaten Gowa .....	70
Tabel 4.2 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin di Daerah Dataran Tinggi Kabupaten Gowa .....	70
Tabel 4.3 Distribusi Responden Berdasarkan Kelompok Umur di Daerah Dataran Tinggi Kabupaten Gowa .....	71
Tabel 4.4 Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Daerah Dataran Tinggi Kabupaten Gowa .....	72
Tabel 4.5 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan di Daerah Dataran Tinggi Kabupaten Gowa .....	73
Tabel 4.6 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Rumah di Daerah Dataran Tinggi Kabupaten Gowa .....	74
Tabel 4.7 Distribusi Responden Berdasarkan Suhu Rumah di Daerah Dataran Tinggi Kabupaten Gowa .....	74
Tabel 4.8 Distribusi Responden Berdasarkan Kelembaban di Daerah Dataran Tinggi Kabupaten Gowa .....	76
Tabel 4.9 Distribusi Responden Berdasarkan Luas Ventilasi di Daerah Dataran Tinggi Kabupaten Gowa .....	78
Tabel 4.10 Distribusi Responden Berdasarkan Kepadatan Hunian di Daerah Dataran Tinggi Kabupaten Gowa .....	80

Tabel 4.11 Distribusi Responden Berdasarkan Kondisi Lantai di Daerah	
Dataran Tinggi Kabupaten Gowa .....	82
Tabel 4.12 Distribusi Responden Berdasarkan Kondisi Dinding di Daerah	
Dataran Tinggi Kabupaten Gowa .....	84
Tabel 4.13 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kasus di Daerah Dataran	
Tinggi Kabupaten Gowa .....	87
Tabel 4.14 Distribusi Responden Berdasarkan Jarak Rumah Responden	
dari Puskesmas di Daerah Dataran Tinggi Kabupaten Gowa .....	88
Tabel 4.15 Distribusi Responden Berdasarkan Jarak Rumah Responden dengan	
Rumah PMO di Daerah Dataran Tinggi Kabupaten Gowa .....	90
Tabel 4.16 Distribusi Responden Berdasarkan Ketinggian Wilayah Tempat	
Tinggal di Daerah Dataran Tinggi Kabupaten Gowa .....	90



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Teori .....	60
Gambar 2.2 Kerangka Konsep .....	61
Gambar 4.1 Peta penyebaran tuberkulosis berdasarkan suhu rumah penderita tuberkulosis .....	75
Gambar 4.2 Peta penyebaran tuberkulosis berdasarkan kelembaban rumah penderita tuberkulosis .....	77
Gambar 4.3 Peta penyebaran tuberkulosis berdasarkan luas ventilasi rumah penderita tuberkulosis .....	79
Gambar 4.4 Peta penyebaran tuberkulosis berdasarkan kepadatan hunian rumah penderita tuberkulosis .....	81
Gambar 4.5 Peta penyebaran tuberkulosis berdasarkan kondisi lantai rumah penderita tuberkulosis .....	83
Gambar 4.6 Peta penyebaran tuberkulosis berdasarkan kondisi dinding rumah penderita tuberkulosis .....	85
Gambar 4.7 Peta penyebaran tuberkulosis berdasarkan persyaratan rumah sehat....	86
Gambar 4.8 Peta penyebaran tuberkulosis berdasarkan akses pelayanan kesehatan ..	89
Gambar 4.9 Peta penyebaran tuberkulosis berdasarkan ketinggian wilayah tempat tinggal penderita tuberkulosis .....	91

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Lembar Observasi

Lampiran 2 Master tabel

Lampiran 3 Analisis univariat

Lampiran 4 Dokumentasi penelitian

Lampiran 5 Surat izin pengambilan data awal

Lampiran 6 Surat permohonan izin penelitian

Lampiran 7 Surat Izin penelitian dari BKPM Sulawesi Selatan

Lampiran 8 Surat rekomendasi penelitian dari Kesbang Kabupaten Gowa.

Lampiran 9 Surat keterangan telah melakukan penelitian dari Puskesmas Parangloe

Lampiran 10 Surat keterangan te telah melakukan penelitian dari Puskesmas  
Tinggimoncong

Lampiran 11 Surat keterangan telah melakukan penelitian dari Puskesmas  
Tombolopao



## **Analisis Spasial Kejadian Tuberkulosis Di Daerah Dataran Tinggi Kabupaten Gowa**

*Muli Rezky<sup>1</sup>, Andi Susilawaty<sup>2</sup>, St. Raodhah<sup>3</sup>*

*<sup>1,2</sup> Bagian Kesehatan Lingkungan Jurusan Kesehatan Masyarakat  
FKIK UIN Alauddin Makassar*

*<sup>3</sup> Bagian Administrasi Kebijakan Kesehatan Jurusan Kesehatan Masyarakat  
FKIK UIN Alauddin Makassar  
[mulirezky555@gmail.com](mailto:mulirezky555@gmail.com)*

---

### **ABSTRAK**

Suhu yang rendah dan kelembaban udara yang tinggi di daerah dataran tinggi merupakan keadaan yang dapat mendukung perkembangbiakan bakteri *Mycobacterium tuberculosis*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kejadian tuberkulosis berdasarkan kondisi fisik rumah di daerah dataran tinggi Kabupaten Gowa. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan rancangan observasional deskriptif dengan menggunakan pendekatan Sistem Informasi Geografis (SIG). Jumlah populasi adalah seluruh pasien tuberkulosis yang tercatat pada rekam medik di Puskesmas Parangloe, Tinggimoncong dan Tamaona mulai bulan Januari-Desember 2016. Jumlah sampel sebanyak 57 orang. Teknik pengambilan sampel yaitu *total sampling*. Analisis data spasial menggunakan *Quantum GIS* sedangkan analisis deskriptif menggunakan SPSS 17.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi kejadian tuberkulosis berdasarkan lingkungan fisik rumah yang memenuhi syarat yaitu: suhu sebanyak 43 rumah (75.4%), kelembaban sebanyak 17 rumah (29.8%), luas ventilasi sebanyak 11 rumah (19.3%), kepadatan hunian sebanyak 50 rumah (87.7%), kondisi lantai sebanyak 22 rumah (38.6%), dan kondisi dinding sebanyak 21 rumah (36.8%). *Overlay* kondisi lingkungan fisik rumah dan kejadian tuberkulosis tertinggi 33% sebanyak 18 rumah. *Buffer* jarak rumah responden dengan puskesmas, jauh sebanyak 33 rumah (57.9%) dan dekat sebanyak 24 rumah (42.1%). Gradasi ketinggian wilayah tempat tinggal penderita tuberkulosis yaitu <200 m dpl sebanyak 14 rumah (24.6%) dan >200 m dpl sebanyak 43 rumah (75.4%). Kesimpulan dari penelitian ini adalah faktor lingkungan fisik rumah yang memenuhi syarat adalah suhu dan kepadatan hunian sedangkan yang tidak memenuhi syarat adalah kelembaban, luas ventilasi, kondisi lantai dan kondisi dinding. Sebagian besar rumah penderita tuberkulosis tidak memenuhi syarat, jauh dari pusat pelayanan kesehatan, dan berada di ketinggian >200 m dpl. Diperlukan penelitian lebih lanjut terkait analisis spasial kejadian tuberkulosis di daerah dataran tinggi dengan melihat faktor-faktor penyebab tuberkulosis lainnya.

*Kata Kunci : Kondisi fisik lingkungan rumah, SIG, Tuberkulosis, Dataran Tinggi*

## **Spatial Analysis of Tuberculosis Incidence in the Highland Areas of Gowa Regency**

*Muli Rezky<sup>1</sup>, Andi Susilawaty<sup>2</sup>, St. Raodhah<sup>3</sup>*

*<sup>1,2</sup>Environmental Health Division of Public Health Department  
FKIK UIN Alauddin Makassar*

*<sup>3</sup>Health Policy Administration Division of Public Health Department  
FKIK UIN Alauddin Makassar  
[mulirezky555@gmail.com](mailto:mulirezky555@gmail.com)*

---

### **ABSTRACT**

*Low temperatures and high air humidity in the highland areas are the condition that can support the proliferation of *Mycobacterium tuberculosis* bacteria. The study is aimed at analyzing the incidence of tuberculosis based on the physical condition of houses in the highland areas of Gowa Regency. The study was quantitative research with descriptive observational design using Geographic Information System (GIS) approach. The total population was all tuberculosis patients recorded in the medical record at Parangloe, Tinggimoncong, and Tamaona Public Health Center from January to December 2016. The number of sample was 57 people taken by using total sampling technique. The data were analysed by spatial data analysis using Quantum GIS, while the descriptive analysis using SPSS 17.0. The results of the study revealed that the distribution of the tuberculosis incidence based on the physical environment of the houses that met the requirements were: temperature of 43 houses (75.4%), humidity of 17 houses (29.8%), ventilation area of 11 houses (19.3%), occupancy density of 50 houses (87.7%), floors' condition of 22 houses (38.6%), and wall's condition of 21 houses (36.8%). The overlay of home physical environment condition and the highest incidence of tuberculosis were 33% of 18 houses. The buffer distance of respondents' houses with the Public Health Center was far of 33 houses (57.9%) and close of 24 houses (42.1%). The gradation of the height of residence areas of tuberculosis sufferers was <200 m dpl of 14 houses (24.6%) and >200 m dpl of 43 houses (75.4%). The conclusion of the study was the physical environment factors of the houses that met the requirements were the temperature and occupancy density, while the unqualified ones were humidity, ventilation area, and floor and wall condition. Most of the tuberculosis patients' houses were not eligible, away from health care centers, and located at an altitude of >200 m dpl. Further research was needed regarding the spatial analysis of tuberculosis incidence in the highland areas by looking at other causes of tuberculosis.*

*Keywords : Physical condition of houses, environment, GIS, Tuberculosis, Highland Areas*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang***

Tuberkulosis merupakan penyakit yang menjadi perhatian global. Dengan berbagai upaya pengendalian yang dilakukan, insidensi dan kematian akibat tuberkulosis telah menurun, namun tuberkulosis diperkirakan masih menyerang 9,6 juta orang dan menyebabkan 1,2 juta kematian pada tahun 2014. India, Indonesia dan China merupakan negara dengan penderita tuberkulosis terbanyak yaitu berturut-turut 23%, 10% dan 10% dari seluruh penderita di dunia (WHO, 2016).

Epidemi kejadian tuberkulosis lebih besar dari perkiraan sebelumnya yang terlihat dari pengawasan dan data baru hasil survei dari India. Namun, jumlah kejadian dan kematian akibat tuberkulosis terus menurun secara global. Pada tahun 2015, terdapat 20,4 juta kasus baru tuberkulosis di seluruh dunia yang terdiri dari 5,9 juta (56%) laki-laki, 3,5 juta (34%) perempuan, dan 1,0 juta (10%) anak-anak (WHO 2016). Banyak faktor yang dapat membuat orang lebih rentan terhadap infeksi TB. Faktor risiko yang paling penting secara global adalah HIV. Di Afrika sub-Sahara, tingkat penderita HIV sangat tinggi dan penderita HIV menyumbang 13% dari semua orang yang terinfeksi TB. Sedangkan orang-orang tanpa HIV yang terinfeksi TB menyumbang sekitar 5-10% (Fenta, 2016).

Penderita HIV menyumbang 1,2 juta (11%) dari seluruh kasus baru tuberkulosis. Enam negara menyumbang 60% dari kasus baru tuberkulosis yaitu China, India, Indonesia, Nigeria, Pakistan, dan Afrika Selatan. Di seluruh dunia, angka kejadian tuberkulosis hanya mengalami penurunan sebesar 1,5% pada tahun



2014-2015. Penurunan jumlah kasus tuberkulosis harus ditingkatkan menjadi 4-5% pada tahun 2020 agar mencapai target *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu strategi mengakhiri kejadian tuberkulosis (*The End Tuberculosis Strategy*) (WHO, 2016).

Pada tahun 2015, jumlah kasus baru *Multidrug Resistant Tuberculosis* (MDR-TB) sebesar 480.000 dan jumlah kasus baru penderita yang resisten terhadap rifamfislin atau *Rifampicin-Resistant Tuberculosis* (RR-TB) sebesar 100.000. Pada tahun 2015, terdapat 1,4 juta orang yang meninggal akibat tuberkulosis dan 0,4 juta orang yang meninggal akibat penyakit tuberkulosis yang disertai dengan penyakit HIV. Meskipun jumlah kematian akibat penyakit tuberkulosis mengalami penurunan sebesar 22% pada tahun 2000-2015, penyakit tuberkulosis tetap menjadi salah satu dari 10 penyebab kematian di seluruh dunia pada tahun 2015 (WHO, 2016).

Di Indonesia, pada tahun 2015 ditemukan jumlah kasus tuberkulosis sebanyak 330.910 kasus, meningkat bila dibandingkan semua kasus tuberkulosis yang ditemukan pada tahun 2014 yang sebesar 324.539 kasus. Jumlah kasus tertinggi yang dilaporkan terdapat di provinsi dengan jumlah penduduk yang besar yaitu Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kasus tuberkulosis di tiga provinsi tersebut sebesar 38% dari jumlah seluruh kasus baru di Indonesia. Menurut jenis kelamin, jumlah kasus pada laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan yaitu 1,5 kali dibanding pada perempuan. Pada masing-masing provinsi di seluruh Indonesia kasus tuberkulosis lebih banyak terjadi pada laki-laki dibandingkan perempuan. Menurut kelompok umur, kasus tuberkulosis pada tahun 2015 paling banyak ditemukan pada kelompok umur 25-34 tahun yaitu sebesar 18,65% diikuti kelompok umur 45-54 tahun sebesar

17,33% dan pada kelompok umur 35-44 tahun sebesar 17,18% (Kementerian Kesehatan RI, 2016).

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu Provinsi kabupaten/kota yang menyumbang angka kejadian tuberkulosis yang cukup tinggi. Prevalensi TB Paru berdasarkan hasil Riskesdas tahun 2010 secara nasional dengan diagnosis 0,7% (D) dan gejala (DG) sebesar 3,3%. sedangkan untuk Sulawesi Selatan tahun 2010 dengan diagnosis (D) 0,6%, dan (DG) 5,2%. Untuk tahun 2011 angka insidens TB Paru BTA positif sebesar 9.162 per 100.000 penduduk yaitu 5.367 laki-laki dan 3.795 perempuan, prevalensi TB paru sebesar 107 per 100.000 penduduk yaitu 127 laki-laki dan 87 perempuan dan kematian akibat TB Paru BTA positif sebesar 322 (3,7%) per 100.000 penduduk, angka penemuan penderita TB Paru BTA positif *Case Detection Rate* (CDR) sebesar 55,13% sedangkan angka kesuksesan (*Success Rate*) sebesar 89,18% bila dibandingkan pada tahun 2010 mengalami penurunan (Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, 2015).

Menurut H.L Blum, ada 4 faktor yang dapat mempengaruhi derajat kesehatan baik individu, kelompok, maupun masyarakat yaitu lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan dan keturunan. Keempat faktor tersebut saling berkaitan dalam mempengaruhi kesehatan (Notoatmodjo, 2010).

Kelembaban dan pencahayaan alami rumah merupakan faktor risiko kejadian tuberkulosis paru di Kabupaten Enrekang dengan nilai OR masing-masing kelembaban (OR= 19.519) dan pencahayaan alami (OR= 6.172) (Kalsum, Arsin, dan Ishak 2014). Beberapa faktor yang mempengaruhi kejadian tuberkulosis yaitu ventilasi rumah dengan nilai  $P=0,001$  ( $P<0,05$ ), pencahayaan alami dengan nilai

$P=0,000$  ( $P<0,05$ ), dan kelembaban dengan nilai  $P=0,000$  ( $P<0,05$ ) (Sujana, Patra, dan Mahayana, 2014).

Penelitian lain menyatakan bahwa terdapat hubungan bermakna antara kepadatan hunian ( $p$  value = 0,001; OR = 3,500), kelembaban ( $p$  value = 0,000; OR = 3,795), luas ventilasi ( $p$  value = 0,002; OR 3,065), dan pencahayaan alami ( $p$  value = 4,111; OR= 0,000) dengan kejadian tuberkulosis paru tidak terdapat hubungan antara jenis lantai dengan kejadian tuberkulosis paru ( $p$  value = 0,088; OR = 1,906) (Hamidah, Kandau, dan Posangi, 2015). Penelitian menyatakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara lantai rumah, ventilasi rumah, pencahayaan alami, suhu rumah, kelembaban rumah, dan kepadatan hunian pada kejadian TB (Wanti, Sholihah, dan Djapawiji, 2015).

Wilayah administrasi Kabupaten Gowa terdiri dari 18 kecamatan dan 167 kelurahan/desa dengan luas wilayah 1.883,33 kilometer persegi atau sama dengan 3,01 persen dari luas Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar terletak di dataran tinggi yaitu sekitar 72,26%, ada 9 wilayah kecamatan yang merupakan dataran tinggi yaitu Kecamatan Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolopao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu (Dinas Kabupaten Gowa 2014). Kasus tuberkulosis di daerah pedesaan lebih besar 2.447 (84,8%) dan di daerah perkotaan 439 (15,2%) (Fenta, 2016).

Daerah dataran tinggi berpotensi sebagai lingkungan yang mendukung kejadian tuberkulosis. Hal ini dikarenakan, suhu yang rendah dapat menyebabkan kelembaban udara tinggi sehingga bakteri patogen seperti *Mycobacterium tuberculosis* dapat berkembang biak dengan baik. Kondisi geografis pada dataran

tinggi tidak datar seperti di dataran rendah. Di daerah dataran tinggi banyak masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pelayanan kesehatan sehingga akses ke tempat pelayanan kesehatan menjadi sulit bagi masyarakat. Hal ini juga merupakan salah satu faktor yang dapat menghambat masyarakat dalam mencari pengobatan khususnya pada penderita penyakit tuberkulosis.

Di Kabupaten Gowa, pada tahun 2014 jumlah kasus tuberkulosis sebanyak 1.016 kasus, meningkat pada tahun 2015 sebanyak 1.229 kasus, dan pada tahun 2016 terdapat 1.021 kasus (Dinas Kabupaten Gowa, 2014). Meskipun pada tahun 2016 telah mengalami penurunan kasus sebanyak 208 kasus, namun jumlah kasus tuberkulosis di Kabupaten Gowa masih sangat tinggi.

Dalam Islam, kesehatan mendapatkan perhatian yang begitu penting. Karena dengan sehat manusia dapat beraktivitas secara produktif. Islam dan seluruh ajarannya, memberikan sebuah pandangan yang tegas mengenai kesehatan. Kesehatan bukan hanya sebuah anjuran tetapi juga merupakan kewajiban. Kesehatan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya adalah kebersihan. Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi nilai kebersihan.

Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW bersabda:

الإِسْلَامُ نَظِيفٌ فَتَنْظِفُوا فَإِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَظِيفٌ. (رواه البيهقي)

Artinya :

*“Agama Islam itu (agama) yang bersih, maka hendaklah kamu menjaga kebersihan, karena sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang bersih”.* (H.R. Baihaqy).

Dalam hadits di atas sangat jelas dikatakan bahwa Rasulullah SAW telah diutus oleh Allah SWT untuk membawa petunjuk bagi seluruh alam. Hal ini tercermin dari hadits di atas yang menerangkan bahwa agama Islam itu adalah agama yang bersih. Oleh karena itu, sebagai orang yang beriman maka hendaklah kita menjaga kebersihan, sebab tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang bersih baik secara jasmani maupun rohani. Dengan menjaga kebersihan maka kita akan terhindar dari berbagai penyakit seperti *Mycobacterium tuberculosis*. Kesucian dan kebersihan merupakan bagian dari kesempurnaan nikmat yang diberikan Allah kepada hamba-Nya, karena bersih merupakan modal awal dari hidup sehat, kesehatan merupakan nikmat yang tidak ternilai harganya.

Salah satu instrumen yang dapat dilakukan dalam membantu proses pencegahan dan pemberantasan penyakit tuberkulosis adalah dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG). SIG mempunyai kemampuan untuk menghubungkan berbagai data pada suatu titik tertentu di bumi, menggabungkannya, menganalisa dan akhirnya memetakan hasilnya. Data yang akan diolah pada SIG merupakan data spasial yaitu sebuah data yang berorientasi geografis dan merupakan

lokasi yang memiliki sistem koordinat tertentu, sebagai dasar referensinya sehingga aplikasi SIG dapat menjawab beberapa pertanyaan seperti; lokasi, kondisi, trend, analisis dan pemodelan. Kemampuan inilah yang membedakan SIG dari sistem informasi lainnya (Astrini dan Oswald, 2012).

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana analisis spasial kejadian tuberkulosis di daerah dataran tinggi Kabupaten Gowa tahun 2017?”

### ***C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian***

#### **1. Definisi Operasional**

Untuk menghindari bias dalam memahami istilah-istilah yang akan digunakan dalam penelitian ini, maka akan dirumuskan dan dijelaskan istilah-istilah tersebut.

- a. Analisis spasial adalah suatu proses pengolahan data keruangan yang diperoleh dengan cara penentuan titik koordinat di lokasi penelitian menggunakan alat bantu GPS dan perangkat lunak *Quantum GIS* untuk pemetaan.
- b. *Global position system* (GPS) adalah alat yang digunakan untuk menentukan titik koordinat rumah penderita tuberkulosis di daerah dataran tinggi kabupaten Gowa.
- c. Dataran tinggi adalah wilayah daratan luas yang terdiri dari daerah perbukitan dan pegunungan.
- d. Suhu adalah keadaan panas atau dingin di dalam rumah yang diukur dengan menggunakan *thermo-hygrometer* dalam satuan derajat celcius (°C) dan diukur pada ruang keluarga atau tempat berkumpul anggota keluarga.

Kriteria objektif:

- 1) Memenuhi syarat : Apabila suhu udara berkisar 18-30°C (Kepmenkes No. 829, 1999).
  - 2) Tidak memenuhi syarat : Apabila suhu udara kurang dari 18°C dan lebih dari 30°C.
- e. Kelembaban adalah keadaan basah keringnya udara di dalam rumah responden yang diukur dengan menggunakan *thermo-hygrometer* dan dinyatakan dalam satuan %.

Kriteria objektif:

- 1) Memenuhi syarat : Apabila kelembaban berkisar 40%-70% (Kepmenkes No. 829, 1999).
  - 2) Tidak memenuhi syarat : Apabila kelembaban kurang dari 40% atau lebih dari 70%.
- f. Kepadatan hunian adalah perbandingan antara luas lantai rumah dengan jumlah orang yang tinggal di dalam satu rumah yang dinyatakan dalam satuan m<sup>2</sup>/orang.

Kriteria objektif:

- 1) Memenuhi syarat : Apabila hasil perhitungan kepadatan hunian  $\geq 9 \text{ m}^2 / \text{orang}$  (Kepmenkes No. 829, 1999).
  - 2) Tidak memenuhi syarat : Apabila hasil perhitungan kepadatan hunian  $< 9 \text{ m}^2 / \text{orang}$ .
- g. Luas ventilasi adalah jumlah tempat keluar atau masuknya udara berupa jendela atau lubang angin pada rumah responden. Pengukuran luas ventilasi dengan menggunakan meteran dan dibandingkan dengan luas lantai.

Kriteria objektif:

- 1) Memenuhi syarat : Apabila luas ventilasi rumah  $\geq 10\%$  dari luas lantai rumah (Kepmenkes No. 829, 1999).
  - 2) Tidak memenuhi syarat : Apabila luas ventilasi  $< 10\%$  dari luas
- h. Kondisi lantai adalah keadaan lantai di dalam rumah yang diukur dengan melihat kondisi kedap air (dilapisi semen atau tegel/ubin/keramik/teraso), tidak kedap air apabila lantai terluas dari dalam rumah masih berupa tanah atau bahan lain yang tiak kedap air.

Kriteria objektif:

- 1) Memenuhi syarat : Apabila lantai kedap air (Kepmenkes No.829, 1999).
  - 2) Tidak memenuhi syarat : Apabila lantai tidak kedap air.
- i. Kondisi dinding adalah keadaan pelindung atau bagian luar rumah baik terbuat dari kayu, tembok dan lain-lain.

Kriteria objektif:

- 1) Memenuhi syarat : Apabila dinding kedap air (Kepmenkes No.829, 1999).
- 2) Tidak memenuhi syarat : Apabila dinding tidak kedap air.

## 2. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mempermudah peneliti dalam penulisan skripsi dan penelitian ini lebih terarah dan berajalan dengan baik maka perlu menetapkan batasan masalah.



Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Penelitian ini merupakan penelitian ilmu kesehatan lingkungan.
- b. Masalah penelitian dibatasi pada analisis spasial kejadian tuberkulosis di daerah dataran tinggi Kabupaten Gowa tahun 2017.
- c. Penelitian ini dilaksanakan pada tiga wilayah kerja puskesmas, yaitu Puskesmas Parangloe, Puskesmas Tinggimoncong dan Puskesmas Tamaona.



#### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka menguraikan hasil – hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan penelitian bisa dinarasikan atau dalam bentuk tabel sintesa.

**Tabel 1.1 Sintesa  
Tinjauan Pustaka Terkait Penelitian Tuberkulosis dan Analisis Spasial**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Karakteristik Penelitian			
			Variabel	Jenis Penelitian	Sampel	Hasil
1	Selviana, Andri Dwi Hernawan, Irvan Khitama	Analisis Spasial Sebaran Kasus dan Lingkungan Berpotensi Penularan Tuberkulosis Paru	Suhu kamar tidur, kelembaban kamar tidur, pencahayaan kamar tidur, ventilasi kamar tidur dan kepadatan hunian rumah, dan akses pelayanan kesehatan.	Survei observasional dengan pendekatan deskriptif.	Jumlah sampel sebanyak 30 pasien tuberkulosis paru BTA positif yang masih dalam pengobatan.	Hasil penelitian menunjukkan sebaran kasus pada Desa Kuala Dua 42%, Limbung 17%, Arang Limbung 17%, Mekar Sari 11%, Tembang Kacang 8% dan Teluk Kapuas 8%, dimana Desa Kuala Dua, Arang Limbung, Desa Limbung dan Mekar Sari memiliki persentasi tinggi pada kasus TB paru selain itu juga memiliki penyebaran yang rapat, diketahui 17% diantaranya kasus baru. Analisis spasial menunjukkan suhu kamar

						tidur 60%, kelembaban kamar tidur 66,7%, pencahayaan kamar tidur 56,7%, ventilasi kamar tidur 73,3% dan kepadatan hunian rumah 60% tidak memenuhi syarat kesehatan. Akses pelayanan kesehatan 46,7% tidak terjangkau.
2	Hamidah, Grace D. Kandau, Jimmy Posangi	Hubungan Kualitas Lingkungan Fisik Rumah Dengan Kejadian Tuberkulosis Paru Di Wilayah Kerja Puskesmas Perawatan Siko Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate Provinsi Maluku Utara	Kepadatan hunian, kelembaban, luas ventilasi, pencahayaan alami, dan jenis lantai.	Observasional dengan rancangan penelitian kasus kontrol.	Sampel kasus yaitu penderita yang telah didiagnosis menderita tuberkulosis paru BTA (+) di Kecamatan Ternate Utara dan tercatat di register TB pada Puskesmas Perawatan Siko sejak tahun 2014 sedangkan sampel kontrol yaitu penderita dengan hasil pemeriksaa BTA (-) dan	Terdapat hubungan bermakna antara kepadatan hunian (p value = 0,001; OR = 3,500), kelembaban (p value = 0,000; OR = 3,795), luas ventilasi (p value = 0,002; OR 3,065), dan pencahayaan alami (p value = 4,111; OR= 0,000) dengan kejadian tuberkulosis paru. Tidak terdapat hubungan antara jenis lantai dengan kejadian tuberkulosis paru (p value = 0,088; OR = 1,906).

					tinggal di Kecamatan Ternate Utara, dimana keadaan rumahnya secara fisik identik atau mendekati kesamaan dengan kasus.	
3	I Ketut Sujana, I Made Patra, I Made Bulda Mahayana	Pengaruh Sanitasi Rumah dengan Kejadian Penyakit TB Paru di Wilayah Kerja UPT Puskesmas Mengwi I Tahun 2013	Luas ventilasi ruangan, pencahayaan alami dan kelembaban.	Observasional retrospektif dengan rancangan kasus kontrol ( <i>case control study</i> ) bersifat analitik.	Sampel kasus yaitu pasien TB Paru yang tercatat di buku register UPT Puskesmas Mengwi I, Kecamatan Mengwi yang berjumlah 26 orang. Sedangkan sampel kontrol yaitu pasien UPT Puskesmas Mengwi I yang tidak menderita TB Paru dan tinggal di sekitar rumah penderita TB.	Ventilasi, pencahayaan alami, dan kepadatan hunian mempunyai pengaruh terhadap kejadian penyakit TB dengan nilai $p=0,001$ , $OR=9,048$ untuk ventilasi, $p=0,000$ , $OR=11,4$ untuk pencahayaan alami, dan $p=0,000$ , $OR=14,929$ untuk kepadatan hunian.
4	Atnafu	Prevalence of HIV-	Umur, daerah	Kuantitatif	Subjek penelitian	Beban PTB tinggi pada

	Temesgen Fenta	co infection and multiple Drug Resistance of Pulmonary tuberculosis among patients attending Debre Markos Referral Hospital, Ethiopia.	tempat tinggal, jenis kelamin, status HIV, kategori TB, kejadian MDR TB.	dengan rancangan <i>cross sectional</i> yang bersifat deskriptif.	adalah pasien rawat jalan tuberkulosis paru yang terdaftar dari Januari 2011 - Desember 2015 di klinik DOTS Rumah Sakit Rujukan Debre Markos sebanyak 2886 pasien.	kelompok usia 16-30 tahun (44,3%) dibandingkan kelompok usia lainnya. Selain itu 84,8% berasal dari daerah pedesaan dan 15,2% dari penduduk perkotaan. Tren infeksi Tb yang kambuh menurun dari 5,9% (2011) menjadi 2,0% (2015). Prevalensi TB-MDR adalah 2,3%. Pengobatan sebelumnya menunjukkan hubungan yang kuat dengan munculnya TB-MDR.
5	Wanti, Qomariyatus Solihah, Martha Djapawiji	Relationship between House Condition and Tuberculosis Incidence in Timor Tengah Utara District	Lantai, pencahayaan alami, ventilasi, suhu, kelembaban, kepadatan hunian.	Observasional analitik dengan rancangan <i>case control</i> dan dianalisis menggunakan uji <i>chi square</i> .	Semua pasien tuberkulosis (+) pada Januari-Desember 2013 dan Januari-Februari 2014 sebanyak 35 orang merupakan sampel kasus. Sampel kontrol adalah kelompok tetangga yang	Penelitian ini menemukan hubungan yang signifikan antara lantai rumah ( $X^2$ 19.227; OR 16.9), ventilasi rumah ( $X^2$ 35.979; OR 16.3), pencahayaan alami ( $X^2$ 35.076; OR 4.5), suhu rumah ( $X^2$ 11.748; OR 0.176 ), Kelembaban rumah ( $X^2$ 7,851; OR 4.2), dan kepadatan

				tidak pernah menderita kasus TB sebanyak 70 orang.	populasi ( $X^2$ 19.227; OR 15.4) dengan kejadian TB. Nilai OR menunjukkan orang yang memiliki kondisi rumah tidak memenuhi syarat berisiko terkena TB lebih besar dari orang dengan kondisi rumah yang memenuhi syarat, kecuali variabel suhu rumah.
--	--	--	--	--	---

### ***E. Tujuan Penelitian***

#### 1. Tujuan Umum

Menggambarkan spasial kejadian tuberkulosis di daerah dataran tinggi Kabupaten Gowa tahun 2017.

#### 2. Tujuan Khusus

- a. Memetakan kejadian tuberkulosis berdasarkan suhu di dalam rumah penderita tuberkulosis.
- b. Memetakan kejadian tuberkulosis berdasarkan kelembaban di dalam rumah penderita tuberkulosis.
- c. Memetakan kejadian tuberkulosis berdasarkan kepadatan hunian di dalam rumah penderita tuberkulosis.
- d. Memetakan kejadian tuberkulosis berdasarkan luas ventilasi di dalam rumah penderita tuberkulosis.
- e. Memetakan kejadian tuberkulosis berdasarkan kondisi lantai di dalam rumah penderita tuberkulosis.
- f. Memetakan kejadian tuberkulosis berdasarkan kondisi dinding di dalam rumah penderita tuberkulosis.

### ***F. Manfaat Penelitian***

#### 1. Manfaat bagi masyarakat

Sebagai bahan informasi untuk masyarakat umum dalam upaya pencegahan penyakit tuberkulosis di lingkungan sekitarnya.

#### 2. Manfaat Teoritis

Dapat dijadikan salah satu referensi ilmu pengetahuan tentang penyakit Tuberkulosis khususnya di daerah dataran tinggi.

### 3. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu dasar bagi pemerintah Kabupaten Gowa melalui instansi terkait dalam pembuatan perencanaan kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit tuberkulosis khususnya di wilayah kerja Puskesmas Parangloe, Puskesmas Tinggimoncong dan Puskesmas Tamaona, Kabupaten Gowa.





## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### ***A. Tinjauan Umum tentang Tuberkulosis***

##### **1. Pengertian Tuberkulosis**

Tuberkulosis adalah suatu penyakit menular yang sebagian besar disebabkan oleh kuman *Mycobacterium tuberculosis*. Kuman tersebut biasanya masuk ke dalam tubuh manusia melalui udara pernapasan ke dalam paru, kemudian kuman tersebut dapat menyebar dari paru ke bagian tubuh lain melalui sistem peredaran darah, sistem saluran limfa, melalui saluran pernapasan (*bronchus*) atau penyebaran langsung ke bagian-bagian tubuh lainnya (Notoatmodjo, 2007).

##### **2. Etiologi Tuberkulosis**

Penyebab infeksi penyakit tuberkulosis adalah bakteri *Mycobacterium tuberculosis* dan *Mycobacterium bovis*. Kuman tersebut mempunyai ukuran 0,5-4 mikron x 0,3-0,6 mikron dengan bentuk batang tipis, lurus atau agak bengkok, bergranular atau tidak mempunyai selubung, tetapi mempunyai lapisan luar tebal yang terdiri dari *lipoid* (terutama asam mikolat) (Widoyono, 2011).

Bakteri *Mycobacterium tuberculosis* dapat bertahan terhadap pencucian warna dengan asam dan alkohol, sehingga disebut basil tahan asam (BTA), serta tahan dalam keadaan kering dan dingin, bersifat dorman (dapat tertidur lama) dan aerob. Bakteri *Mycobacterium tuberculosis* ini mati pada pemanasan 100°C selama 30 menit dan dengan alkohol 70-95% selama 15-30 detik. Bakteri ini tahan selama 1-2 jam di udara terutama di tempat yang lembab dan gelap (bisa berbulan-bulan), namun tidak tahan terhadap sinar atau aliran udara (Widoyono, 2011).

### 3. Patogenesis Tuberkulosis

Alur masuknya kuman *Mycobacterium tuberculosis* ke dalam tubuh adalah kuman masuk lewat saluran pernapasan dengan ukuran yang sangat kecil (1-2  $\mu\text{m}$  atau lebih kecil) untuk dapat mencapai saluran pernapasan paling bawah sehingga dapat menyebabkan kerusakan jaringan. *Droplet infection* yang lebih banyak dihalau oleh saluran nafas bagian bawah melalui pertahanan fisik. Epitel saluran nafas mempunyai resistensi yang paling tinggi terhadap infeksi *Mycobacterium tuberculosis*. *Mycobacterium tuberculosis* yang *virulen* mempunyai sifat *sitotoksik* terhadap sel alveoli tipe *IL*. Sifat antimikroba sel epitel saluran napas (*bronchus*) terhadap *Mycobacterium tuberculosis* secara langsung tidak ada, namun epitel *bronchus* mengeluarkan atau membentuk *peptide antimicrobial* yang mempunyai aktivitas sangat luas (Widoyono, 2011).

Penyakit tuberkulosis dapat terjadi di hampir semua organ selama seminggu pertama infeksi. Pada kebanyakan pasien, infeksi primer terjadi asimtomatik atau gejala yang timbul sangat sedikit seperti demam, produksi sputum sedikit atau kering dan kadang-kadang nyeri retrosternal. Infeksi primer menyebabkan pneumonia klinis pada 5%-10% pasien dewasa dan anak-anak. Tuberkulosis sekunder sering kali disebut sebagai *reaktivasi* penyakit dan terjadi pada 90% pasien tuberkulosis (Widoyono, 2011).

### 4. Gejala-gejala Tuberkulosis

Untuk menentukan tentang penderita tuberkulosis dengan baik harus dikenali tanda dan gejalanya. Seseorang ditetapkan sebagai tersangka penderita tuberkulosis apabila ditemukan gejala klinis utama (*cardinal symptom*) pada dirinya.

Gejala utama pada penderita penyakit tuberkulosis adalah:

- a. Batuk berdahak lebih dari tiga minggu.
- b. Batuk berdarah.
- c. Sesak napas dan rasa nyeri pada dada.

Gejala utama dari penyakit tuberkulosis adalah anoreksi dan penurunan berat badan, tubuh terasa lelah dan lesu, demam dan sering kedinginan (Soedarto, 2009). Gejala lainnya adalah berkeringat pada malam hari, demam tidak tinggi/meriang, dan penurunan berat badan. Dengan strategi yang baru yaitu *Directly Observed Treatment and Shortcourse* (DOTS), gejala utamanya adalah batuk berdahak terus menerus selama 3 minggu atau lebih. Berdasarkan keluhan tersebut, seseorang sudah dapat ditetapkan sebagai penderita tuberkulosis. Dahak penderita harus diperiksa dengan pemeriksaan mikroskopis (Widoyono, 2011).

#### 5. Penularan Tuberkulosis

Penularan penyakit tuberkulosis terjadi melalui udara yang mengandung basil *tuberculosis* dalam percikan ludah yang dikeluarkan oleh penderita tuberkulosis pada waktu penderita batuk atau bersin (Kunoli, 2012). Penyakit Tuberkulosis dapat menular melalui percikan ludah dan udara pernapasan terutama di daerah yang kumuh dan padat penduduk (Chandra, 2011). Bakteri akan berkembangbiak dalam paru-paru, terutama pada orang yang memiliki daya tahan tubuh yang rendah. Tuberkulosis dapat menyebar melalui pembuluh darah atau kelenjar getah bening. Oleh sebab itu, infeksi tuberkulosis dapat menginfeksi hampir ke seluruh organ tubuh lain, seperti: paru-paru, otak, ginjal, saluran pencernaan, tulang, dan kelenjar getah bening. Meski demikian, organ tubuh yang paling sering terkena adalah paru-paru (Sandina, 2011).

Saat bakteri *Mycobacterium tuberculosis* berhasil menginfeksi paru-paru dengan segera koloni bakteri yang berbentuk *globular* atau bulat akan tumbuh. Melalui serangkaian reaksi imunologis, pertumbuhan bakteri *Mycobacterium tuberculosis* bisa dihambat melalui pembentukan dinding disekeliling bakteri oleh sel-sel paru. Mekanisme pembentukan dinding tersebut membuat jaringan di sekitarnya menjadi jaringan parut (Sandina, 2011).

#### 6. Diagnosis Tuberkulosis

Diagnosis tuberkulosis paru pada orang dewasa dapat ditegakkan dengan ditemukannya BTA Positif pada pemeriksaan dahak secara mikroskopis. Hasil pemeriksaan dinyatakan positif apabila sedikitnya dua dari tiga spesimen hasilnya positif. Bila hanya satu spesimen yang positif perlu diadakan pemeriksaan lebih lanjut yaitu foto rontgen dada atau pemeriksaan dahak Sewaktu, Pagi, Sewaktu (SPS) diulang :

- a. Jika hasil rontgen mendukung tuberkulosis paru, maka penderita di diagnosis sebagai penderita tuberkulosis paru BTA Positif.
- b. Jika hasil rontgen tidak mendukung tuberkulosis paru, maka pemeriksaan dahak ulangi dengan SPS lagi.

Apabila fasilitas memungkinkan maka dapat dilakukan pemeriksaan biakan. Bila tiga spesimen dahak hasilnya negatif, diberikan antibiotik spektrum luas (misal: kotrimoksazol atau amoksisillin) selama 1-2 minggu, bila tidak ada perubahan, namun gejala klinis tetap mencurigakan tuberkulosis paru, ulangi pemeriksaan dahak SPS.

- a. Jika hasil SPS positif, maka didiagnosis sebagai penderita tuberkulosis paru BTA positif.

b. Jika hasil SPS tetap negatif, dilakukan pemeriksaan foto rontgen dada, untuk mendukung diagnosis tuberkulosis paru.

- 1) Bila hasil *rontgen* mendukung tuberkulosis paru, di diagnosis sebagai penderita tuberkulosis paru BTA negatif rontgen positif
- 2) Bila hasil rontgen tidak mendukung tuberkulosis paru, penderita tersebut bukan tuberkulosis paru (Kementerian Kesehatan RI, 2014).

#### 7. Penemuan Penderita Tuberkulosis

Penemuan penderita tuberkulosis paru menurut (Kementerian Kesehatan RI, 2014) dilakukan secara:

##### a. *Passive promotif case finding*

Yaitu penemuan penderita secara pasif dengan promotif aktif pada pengunjung (tersangka atau suspek) di unit pelayanan kesehatan. Penemuan secara pasif tersebut didukung dengan penyuluhan secara aktif baik oleh petugas kesehatan maupun masyarakat, untuk meningkatkan cakupan penemuan tersangka penderita tuberkulosis paru.

##### b. Pemeriksaan pada tersangka yang kontak dengan penderita

Yaitu semua orang yang kontak dengan penderita Tuberkulosis Paru dengan BTA positif dengan gejala yang sama, kemudian diperiksa dahaknya meliputi 3 spesimen dahak Sewaktu, Pagi, Sewaktu (SPS), dilakukan selama 2 hari berturut-turut dan dahak yang terkumpul dikirim ke laboratorium.

#### 8. Klasifikasi tuberkulosis

Ada beberapa klasifikasi tuberkulosis menurut Kementerian Kesehatan RI (2014), yaitu:

a. Klasifikasi berdasarkan lokasi anatomi penyakit

Adapun klasifikasi tuberkulosis berdasarkan lokasi anatomi penyakit yaitu sebagai berikut:

1) Tuberkulosis paru

Tuberkulosis paru adalah tuberkulosis yang menyerang jaringan (*parenkim*) paru, tidak termasuk pleura (selaput paru) dan kelenjar pada hilus. Jenis tuberkulosis ini dianggap sebagai tuberkulosis paru karena adanya lesi pada jaringan paru.

2) Tuberkulosis ekstra paru

Tuberkulosis ekstra paru adalah tuberkulosis yang menyerang organ tubuh lain selain paru, misalnya pleura, selaput otak, selaput jantung (*pericardium*), kelenjar limfe, tulang, persendian, kulit, usus, ginjal, saluran kencing, alat kelamin, dan lain-lain. Diagnosis tuberkulosis ekstra paru dapat ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan bakteriologis atau klinis. Diagnosis tuberkulosis ekstra paru harus diupayakan berdasarkan penemuan *Mycobacterium tuberculosis*. Pasien tuberkulosis ekstra paru yang menderita tuberkulosis pada beberapa organ, diklasifikasikan sebagai pasien tuberkulosis ekstra paru pada organ menunjukkan gambaran tuberkulosis yang terberat.

b. Klasifikasi berdasarkan hasil pemeriksaan dahak mikroskopis

Adapun klasifikasi tuberkulosis Paru berdasarkan hasil pemeriksaan dahak mikroskopis, yaitu sebagai berikut:

1) Tuberkulosis paru BTA positif

Kriteria diagnostik tuberkulosis paru BTA positif harus meliputi:

- a) Sekurang-kurangnya 2 dari 3 spesimen dahak SPS (sewaktu, pagi, sewaktu) hasilnya BTA positif.

- b) 1 spesimen dahak SPS (sewaktu, pagi, sewaktu) hasilnya BTA positif dan foto toraks dada menunjukkan gambaran tuberkulosis.
- c) 1 spesimen dahak SPS (sewaktu, pagi, sewaktu) hasilnya BTA positif dan biakan kuman tuberkulosis positif.
- d) 1 atau lebih spesimen dahak hasilnya positif setelah 3 spesimen dahak SPS (sore, pagi, sewaktu) pada pemeriksaan sebelumnya hasilnya BTA negatif dan tidak ada perbaikan setelah pemberian antibiotika non Obat Anti Tuberkulosis (OAT).

#### 2) Tuberkulosis paru BTA negatif

Kriteria diagnostik tuberkulosis paru BTA negatif harus meliputi:

- a) Paling tidak 3 spesimen dahak SPS (sewaktu, pagi, sewaktu) hasilnya BTA negatif.
- b) Foto toraks abnormal menunjukkan gambaran tuberkulosis.
- c) Tidak ada perbaikan setelah pemberian antibiotika non Obat Anti Tuberkulosis (OAT). Ditentukan (dipertimbangkan) oleh dokter untuk diberi pengobatan.
- c. Klasifikasi berdasarkan tipe pasien ditentukan berdasarkan riwayat pengobatan sebelumnya

Ada beberapa tipe pasien tuberkulosis berdasarkan riwayat pengobatan sebelumnya yaitu:

##### 1) Kasus baru

Adalah pasien yang belum pernah diobati dengan OAT atau sudah pernah menelan OAT kurang dari satu bulan (4 minggu).

##### 2) Kasus kambuh (*relaps*)

Adalah pasien tuberkulosis yang sebelumnya pernah mendapat pengobatan tuberkulosis dan telah dinyatakan sembuh tetapi kambuh lagi.

3) Kasus setelah putus berobat (*default*)

Adalah pasien yang telah berobat dan putus berobat 2 bulan atau lebih dengan BTA positif.

4) Kasus setelah gagal (*failure*)

Adalah pasien yang hasil pemeriksaan dahaknya tetap positif atau kembali menjadi positif pada bulan kelima atau lebih selama pengobatan.

5) Kasus lain

Adalah semua kasus yang tidak memenuhi ketentuan diatas, dalam kelompok ini termasuk kasus kronik, yaitu pasien dengan hasil pemeriksaan masih BTA positif setelah selesai pengobatan ulangan.

9. Faktor Risiko Tuberkulosis

a. Faktor Risiko Karakteristik Penduduk

Kejadian penyakit tuberkulosis paru merupakan hasil interaksi antara komponen lingkungan yakni udara yang mengandung basil tuberkulosis, dengan masyarakat serta dipengaruhi berbagai faktor variabel yang mempengaruhinya. Variabel pada masyarakat secara umum dikenal sebagai variabel kependudukan. Banyak variabel kependudukan yang memiliki peran dalam timbulnya atau kejadian penyakit tuberkulosis paru, yaitu:

1) Jenis Kelamin

Menurut jenis kelamin, kasus tuberkulosis terjadi dua kali lebih sering terjadi pada laki-laki dibandingkan perempuan (William dan Wilkins, 2011). Kasus BTA+ pada laki-laki lebih tinggi daripada perempuan yaitu hampir 1,5 kali dibandingkan kasus BTA+ pada perempuan. Laki-laki berisiko lebih besar untuk terkena penyakit TB paru di bandingkan dengan perempuan. Dimana laki-laki lebih banyak yang



merokok dan minum alkohol dibandingkan dengan perempuan, merokok dan alkohol dapat menurunkan imunitas tubuh sehingga lebih mudah terkena penyakit TB paru (Ruswanto, 2010).

## 2) Umur

Lingkungan kerja yang padat serta berhubungan dengan banyak orang juga dapat meningkatkan risiko terjadinya TB paru. Kondisi kerja yang demikian ini memudahkan seseorang yang berusia produktif lebih mudah dan lebih banyak menderita TB paru (Ruswanto, 2010).

Kekuatan untuk melawan infeksi adalah tergantung pertahanan tubuh dan ini sangat dipengaruhi oleh umur penderita. Pada awal kelahiran pertahanan tubuh sangat lemah dan akan meningkat secara perlahan sampai umur 10 tahun, setelah masa pubertas pertahanan tubuh lebih baik dalam mencegah penyebaran infeksi melalui darah, tetapi lemah dalam mencegah penyebaran infeksi di paru. Tingkat umur penderita dapat mempengaruhi kerja efek obat, karena metabolisme obat dan fungsi organ tubuh kurang efisien pada bayi yang sangat mudah dan pada orang tua, sehingga dapat menimbulkan efek yang lebih kuat dan panjang pada kedua kelompok umur ini (Crofton, 2002).

## 3) Status Gizi

Status gizi merupakan variabel yang sangat berperan dalam timbulnya kejadian tuberkulosis paru, tentu saja hal ini masih tergantung variabel lain yang utama yaitu ada tidaknya kuman tuberkulosis pada paru. Seperti diketahui kuman tuberkulosis merupakan kuman yang suka tidur hingga bertahun-tahun, apabila memiliki kesempatan untuk bangun dan menimbulkan penyakit maka timbulah

kejadian penyakit tuberkulosis paru. Oleh karena itu salah satu kekuatan daya tangkal adalah status gizi yang baik, baik pada wanita, laki-laki, anak-anak maupun dewasa.

Status gizi yang buruk merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kejadian tuberkulosis paru, kekurangan kalori dan protein serta kekurangan zat besi dapat meningkatkan risiko terkena tuberkulosis paru, cara pengukurannya adalah dengan membandingkan berat badan dan tinggi badan atau Indek Masa Tubuh (IMT). IMT merupakan alat yang sederhana untuk memantau status gizi orang dewasa khususnya yang berkaitan dengan kekurangan dan kelebihan berat badan, maka mempertahankan berat badan normal memungkinkan seseorang dapat mencapai usia harapan hidup lebih panjang. Penggunaan IMT hanya berlaku untuk orang dewasa berumur diatas 18 tahun, IMT tidak dapat diterapkan pada bayi, anak, remaja, ibu hamil dan olahragawan, disamping itu pula IMT tidak bisa diterapkan pada keadaan khusus (penyakit) lainnya seperti edema, asites dan hepatomegali. Adapun rumus perhitungan IMT adalah sebagai berikut:

Berat badan (kg)

$$\text{IMT} = \frac{\text{Berat badan (kg)}}{\text{Tinggi Badan (m)} \times \text{Tinggi Badan (m)}}$$

Batas ambang IMT ditentukan dengan merujuk ketentuan WHO, yang membedakan batas ambang untuk laki-laki dan perempuan. Batas ambang normal laki-laki adalah 20,1-25,0 dan untuk perempuan adalah 18,7-23,8. Untuk batas ambang IMT orang Indonesia adalah < 17-18,4 (kurus), 18,5-25,0 (normal), 25,0-27,0 (gemuk).

#### 4) Kondisi Sosial Ekonomi

Penderita tuberkulosis paru di dunia menyerang kelompok dengan sosial ekonomi lemah atau miskin. Hubungan antara kemiskinan dengan penyakit tuberkulosis bersifat timbal balik, tuberkulosis merupakan penyebab kemiskinan dan karena miskin maka manusia menderita tuberkulosis. Kondisi sosial ekonomi itu sendiri, mungkin tidak hanya berhubungan secara langsung, namun dapat merupakan penyebab tidak langsung seperti adanya kondisi gizi memburuk, perumahan yang tidak sehat, dan akses terhadap pelayanan kesehatan juga menurun kemampuannya. Menurut perhitungan rata-rata penderita tuberkulosis kehilangan 3 sampai 4 bulan waktu kerja dalam setahun, dan juga kehilangan penghasilan setahun secara total mencapai 30% dari pendapatan rumah tangga (Ruswanto, 2010).

Tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan sangat mempengaruhi terjadinya kasus tuberkulosis paru atau keberhasilan pengobatan, status sosial ekonomi keluarga diukur dari jenis, keadaan rumah, kepadatan penghuni per kamar, status pekerjaan dan harta kepemilikan. Penyebab terbesar menurunnya kasus tuberkulosis paru adalah meningkatnya tingkat sosial ekonomi keluarga tetapi faktor lain akibat sosial ekonomi adalah pengaruh lingkungan rumah secara fisik baik pada ventilasi, pencahayaan, kepadatan rumah dan pemenuhan gizi (Smith dalam Ruswanto, 2010).

#### b. Faktor Risiko Lingkungan

##### 1) Kepadatan Hunian

Kepadatan hunian adalah perbandingan antara luas lantai rumah dengan jumlah anggota keluarga dalam satu rumah tinggal. Kepadatan penghuni dalam satu rumah tinggal akan memberikan pengaruh bagi penghuninya. Luas rumah yang tidak sebanding dengan jumlah penghuninya akan menyebabkan berjubelan (*overcrowded*).

Hal ini tidak sehat karena disamping menyebabkan kurangnya konsumsi oksigen, juga bila salah satu anggota keluarga terkena penyakit infeksi, terutama tuberkulosis akan mudah menular kepada anggota keluarga yang lain, dimana seorang penderita rata-rata dapat menularkan kepada 2-3 orang di dalam rumahnya.

Kepadatan merupakan *pre-requisite* untuk proses penularan penyakit, semakin padat maka perpindahan penyakit khususnya penyakit melalui udara akan semakin mudah dan cepat. Oleh sebab itu kepadatan hunian dalam rumah tempat tinggal merupakan variabel yang berperan dalam kejadian tuberkulosis.

## 2) Lantai Rumah

Lantai tanah cenderung menimbulkan kelembaban, dengan demikian viabilitas kuman tuberkulosis di lingkungan juga sangat dipengaruhi. Lantai merupakan dinding penutup ruangan bagian bawah. Konstruksi lantai rumah harus rapat air dan selalu kering agar mudah dibersihkan dari kotoran dan debu. Selain itu lantai juga dapat digunakan untuk menghindari naiknya tanah yang dapat menyebabkan meningkatnya kelembaban dalam ruangan.

Untuk mencegah masuknya air ke dalam rumah, maka lantai rumah sebaiknya dinaikkan 20 cm dari permukaan tanah. Keadaan lantai rumah perlu dibuat dari bahan yang kedap terhadap air sehingga lantai tidak menjadi lembab dan selalu basah seperti tegel, semen, keramik. Lantai yang tidak memenuhi syarat dapat dijadikan tempat hidup dan perkembangbiakan kuman dan vektor penyakit, menjadikan udara dalam ruangan lembab, pada musim panas lantai menjadi kering sehingga dapat menimbulkan debu yang berbahaya bagi penghuninya. Keadaan lantai rumah perlu dibuat dari bahan yang kedap terhadap air seperti tegel, semen atau keramik.

### 3) Ventilasi

Ventilasi adalah usaha untuk memenuhi kondisi atmosfer yang menyenangkan dan menyehatkan manusia. Berdasarkan kejadiannya, maka ventilasi dapat dibagi ke dalam dua jenis, yaitu:

#### a) Ventilasi alami

Ventilasi alami berdasarkan pada tiga kekuatan, yaitu: daya difusi dari gas-gas, gerakan angin dan gerakan massa di udara karena perubahan temperatur. Ventilasi alami ini mengandalkan pergerakan udara bebas (angin), temperatur udara dan kelembabannya.

#### b) Ventilasi buatan

Pada suatu waktu, diperlukan juga ventilasi buatan dengan menggunakan alat mekanis maupun elektrik. Alat-alat tersebut diantaranya adalah kipas angin, *exhauster* dan AC (*air conditioner*).

Secara umum, penilaian ventilasi rumah dengan cara membandingkan antara luas ventilasi dan luas lantai rumah, dengan menggunakan *Role meter*. Menurut indikator pengawaan rumah, luas ventilasi yang memenuhi syarat kesehatan adalah  $\geq 10\%$  luas lantai rumah dan luas ventilasi yang tidak memenuhi syarat kesehatan adalah  $< 10\%$  luas lantai rumah (Kementerian Kesehatan RI, 1999). Rumah dengan luas ventilasi yang tidak memenuhi syarat kesehatan akan membawa pengaruh bagi penghuninya, salah satu fungsi ventilasi adalah menjaga aliran udara di dalam rumah tersebut tetap segar. Luas ventilasi rumah yang  $< 10\%$  dari luas lantai (tidak memenuhi syarat kesehatan) akan mengakibatkan berkurangnya konsentrasi oksigen dan bertambahnya konsentrasi karbondioksida yang bersifat racun bagi penghuninya.

Disamping itu, tidak cukupnya ventilasi akan menyebabkan peningkatan kelembaban ruangan karena terjadinya proses penguapan cairan dari kulit.

Kelembaban ruangan yang tinggi akan menjadi media yang baik untuk tumbuh dan berkembang biaknya bakteri-bakteri patogen termasuk kuman tuberkulosis. Selain itu, fungsi kedua ventilasi adalah untuk membebaskan udara ruangan dari bakteri-bakteri, terutama bakteri patogen seperti tuberkulosis, karena di situ selalu terjadi aliran udara yang terus menerus. Bakteri yang terbawa oleh udara akan selalu mengalir. Selain itu, luas ventilasi yang tidak memenuhi syarat kesehatan akan mengakibatkan terhalangnya proses pertukaran aliran udara dan sinar matahari yang masuk ke dalam rumah, akibatnya kuman tuberkulosis yang ada di dalam rumah tidak dapat keluar dan ikut terhisap bersama udara pernafasan (Notoatmodjo, 2007).

Ventilasi bermanfaat bagi sirkulasi pergantian udara dalam rumah serta mengurangi kelembaban, keringat manusia juga dikenal mempengaruhi kelembaban. Semakin banyak manusia dalam satu ruangan kelembaban semakin tinggi khususnya karena uap air baik dari pernapasan maupun keringat. Kelembaban dalam ruang tertutup dimana banyak terdapat manusia di dalamnya lebih tinggi dibanding kelembaban di luar ruangan. Ventilasi mempengaruhi proses difusi udara juga dengan kata lain mengencerkan konsentrasi kuman tuberkulosis dan kuman lain terbawa keluar dan mati terkena sinar ultra violet. Ventilasi juga dapat merupakan tempat untuk memasukkan cahaya ultra violet, hal ini akan semakin baik apabila konstruksi rumah menggunakan genteng kaca, maka hal ini merupakan kombinasi yang baik (Ruswanto, 2010).

#### 4) Pencahayaan

Rumah sehat memerlukan cahaya yang cukup khususnya cahaya alam berupa cahaya matahari yang berisi antara lain ultra violet. Cahaya matahari minimal masuk 60 *lux* dengan syarat tidak menyilaukan. Orang yang tinggal pada rumah dengan pencahayaan alaminya tidak memenuhi syarat memiliki risiko terhadap kejadian tuberkulosis paru 11,4 kali lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang memiliki pencahayaan alami rumah yang memenuhi syarat (Sujana, Patra, dan Mahayana 2014). Semua cahaya pada dasarnya dapat mematikan, namun tentu tergantung jenis dan lama cahaya tersebut (Ruswanto, 2010).

Pencahayaan alami ruangan rumah adalah penerangan yang bersumber dari sinar matahari (alami), yaitu semua jalan yang memungkinkan untuk masuknya cahaya matahari alamiah, misalnya melalui jendela atau genteng kaca (Notoatmodjo, 2007). Cahaya berdasarkan sumbernya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

##### a) Cahaya Alamiah

Cahaya alamiah yakni matahari. Cahaya ini sangat penting, karena dapat membunuh bakteri-bakteri patogen di dalam rumah, misalnya kuman *Mycobacterium tuberculosis*. Perlu diperhatikan agar sinar matahari dapat langsung ke dalam ruangan, tidak terhalang oleh bangunan lain. Fungsi jendela disini selain sebagai ventilasi, juga sebagai jalan masuk cahaya. Selain itu jalan masuknya cahaya alamiah juga diusahakan dengan genteng kaca.

##### b) Cahaya Buatan

Cahaya buatan yaitu cahaya yang menggunakan sumber cahaya yang bukan alamiah, seperti lampu minyak tanah, listrik, api dan lain-lain. Kualitas dari cahaya buatan tergantung dari terangnya sumber cahaya (*brightness of the source*). Secara

umum pengukuran pencahayaan terhadap sinar matahari adalah dengan menggunakan *lux meter*, yang diukur ditengah-tengah ruangan, pada tempat setinggi <84 cm dari lantai, dengan ketentuan tidak memenuhi syarat kesehatan bila <60 lux atau >300 lux, dan memenuhi syarat kesehatan bila pencahayaan rumah antara 60-300 lux. Cahaya matahari mempunyai sifat membunuh bakteri, terutama kuman *Mycobacterium tuberculosis*. Kuman tuberkulosa hanya dapat mati oleh sinar matahari langsung. Oleh sebab itu, rumah dengan standar pencahayaan yang buruk sangat berpengaruh terhadap kejadian tuberkulosis. Kuman tuberkulosis dapat bertahan hidup pada tempat yang sejuk, lembab dan gelap tanpa sinar matahari sampai bertahun-tahun lamanya. Kuman *Mycobacterium tuberculosis* akan mati dalam waktu 2 jam oleh sinar matahari, ethanol 80% dalam waktu 2-10 menit serta mati oleh fenol 5% dalam waktu 24 jam (Ruswanto, 2010).

#### 5) Kelembaban

Kelembaban udara adalah presentase jumlah kandungan air dalam udara. Kelembaban terdiri dari 2 jenis, yaitu:

- a) Kelembaban absolut, yaitu berat uap air per unit volume udara.
- b) Kelembaban nisbi (relatif), yaitu banyaknya uap air dalam udara pada suatu temperatur terhadap banyaknya uap air pada saat udara jenuh dengan uap air pada temperatur tersebut.

Secara umum penilaian kelembaban dalam rumah dengan menggunakan *hygrometer*. Menurut indikator pengawasan perumahan, kelembaban udara yang memenuhi syarat kesehatan dalam rumah adalah 40-60 % dan kelembaban udara yang tidak memenuhi syarat kesehatan adalah <40 % atau >60 % (Kementerian Kesehatan RI, 1999). Rumah yang tidak memiliki kelembaban yang memenuhi syarat



kesehatan akan membawa pengaruh bagi penghuninya. Rumah yang lembab merupakan media yang baik bagi pertumbuhan mikroorganisme, antara lain bakteri, spiroket, ricketsia dan virus. Mikroorganisme tersebut dapat masuk ke dalam tubuh melalui udara.

Selain itu kelembaban yang tinggi dapat menyebabkan membran mukosa hidung menjadi kering sehingga kurang efektif dalam menghadang mikroorganisme. Bakteri *Mycobacterium tuberculosis* seperti halnya bakteri lain, akan tumbuh dengan subur pada lingkungan dengan kelembaban tinggi karena air membentuk lebih dari 80% volume sel bakteri dan merupakan hal yang esensial untuk pertumbuhan dan kelangsungan hidup sel bakteri (Gould dan Brooker, 2003).

#### 10. Upaya pencegahan

Mencegah lebih baik dari pada mengobati, kata-kata itu selalu menjadi acuan dalam penanggulangan penyakit tuberkulosis di masyarakat. Adapun upaya pencegahan yang harus dilakukan yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk penderita agar tidak menularkan kepada orang lain
  - 1) Menutup mulut pada waktu batuk dan bersin dengan sapu tangan atau tisu.
  - 2) Tidur terpisah dari keluarga terutama pada dua minggu pertama pengobatan.
  - 3) Tidak meludah di sembarang tempat, tetapi dalam wadah yang diberi *lysol*, kemudian dibuang dalam lubang dan ditimbun dalam tanah.
  - 4) Menjemur alat tidur secara teratur pada pagi hari.
  - 5) Membuka jendela pada pagi hari, agar rumah mendapat udara bersih dan cahaya matahari yang cukup sehingga kuman tuberkulosis paru dapat mati.

b. Untuk masyarakat agar tidak tertular tuberkulosis paru

- 1) Meningkatkan daya tahan tubuh, antara lain dengan makan-makanan yang bergizi.
- 2) Tidur dan istirahat yang cukup.
- 3) Tidak merokok dan tidak minum-minuman yang mengandung alkohol.
- 4) Membuka jendela dan mengusahakan sinar matahari masuk ke ruang tidur dan ruangan lainnya.
- 5) Imunisasi BCG pada bayi.
- 6) Segera periksa bila timbul batuk lebih dari tiga minggu.
- 7) Menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

Upaya pencegahan menggunakan vaksinasi BCG 80% mencegah terjangkitnya bakteri *Mycobacterium tuberculosis* (Mandal et al. 2004). Upaya pencegahan adalah upaya kesehatan yang dimaksudkan agar setiap orang yang terhindar dari terjangkitnya suatu penyakit dan dapat mencegah terjadinya penyebaran penyakit. Tujuannya adalah untuk mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya penyakit yaitu penyebab penyakit (*agent*), manusia (*host*) dan faktor lingkungan (*environment*) (Notoatmodjo, 2007).

#### 11. Pengobatan

Pengobatan penderita tuberkulosis paru harus dengan panduan beberapa Obat Anti Tuberkulosis (OAT), berkesinambungan dan dalam waktu tertentu agar mendapatkan hasil yang optimal (OAT dalam bentuk kombinasi atau FDC (*Fixed Dose Combination*)). Kesembuhan yang baik akan memperlihatkan sputum BTA negatif, adanya perbaikan radiologi dan menghilangnya gejala penyakit. Tujuan pengobatan tuberkulosis paru dengan jangka pendek adalah untuk memutus rantai

penularan dengan menyembuhkan penderita tuberkulosis paru minimal 80% dari seluruh kasus tuberkulosis paru BTA positif yang ditemukan, serta mencegah *resistensi* (kekebalan kuman terhadap OAT) (Kementerian Kesehatan RI, 2014). Adapun jenis dan dosis OAT yaitu sebagai berikut:

a. *Isoniasid (H)*

Dikenal dengan INH, bersifat *bakterisid*, dapat membunuh 90% populasi kuman dalam beberapa hari pertama pengobatan. Obat ini sangat efektif terhadap kuman dalam keadaan metabolik aktif yaitu kuman yang sedang berkembang. Dosis yang dianjurkan 5 mg/kg Berat Badan (BB), sedangkan pengobatan *intermiten* tiga kali seminggu diberikan dengan dosis 10 mg/kg BB.

b. *Rifampisin (R)*

Bersifat *bakterisid*, dapat membunuh kuman semi dormant (*persiter*) yang tidak dapat di bunuh oleh isoniasid. Dosis 10 mg/kg BB diberikan sama untuk pengobatan harian maupun intermiten tiga kali seminggu.

c. *Pirasinamid (Z)*

Bersifat *bakterisid*, dapat membunuh kuman yang berada dalam sel dengan suasana asam. Dosis harian yang dianjurkan 25 mg/kg BB, sedangkan untuk pengobatan *intermiten* tiga kali seminggu diberikan dengan dosis 35 mg/kg BB.

d. *Streptomisin (S)*

Bersifat *bakterisid*, dosis harian yang dianjurkan 15 mg/kg BB, sedangkan untuk pengobatan *intermiten* tiga kali seminggu digunakan dosis yang sama. Penderita berumur sampai 60 tahun dosisnya 0,75 gr/hari, sedangkan untuk umur 60 tahun atau lebih diberikan 0,50 gr/hari.

e. *Etambutol (E)*

Bersifat sebagai *bakteriostatik*, dosis harian yang dianjurkan 15 mg/kg BB, sedangkan untuk pengobatan *intermiten* tiga kali seminggu digunakan dosis 30 mg/kg BB.

Obat tuberkulosis paru diberikan dalam bentuk kombinasi dari beberapa jenis, dalam jumlah cukup dan dosis tepat selama enam bulan, supaya semua kuman (termasuk kuman *persiter*) dapat di bunuh. Dosis tahap awal (*intensif*) dan dosis tahap lanjutan (*intermiten*) diberikan sebagai dosis tunggal. Apabila paduan obat yang diberikan tidak adekuat (jenis, dosis dan jangka waktu pengobatan), kuman tuberkulosis akan berkembang menjadi kuman yang kebal terhadap OAT (*resisten*). Untuk menjamin kepatuhan penderita menelan obat, pengobatan perlu didampingi oleh seorang Pengawas Menelan Obat (PMO).

Pengobatan diberikan dalam dua tahap yaitu tahap awal (*intensif*) dan tahap lanjutan (*intermiten*).

- a. Pada tahap intensif penderita mendapat OAT setiap hari selama dua bulan. Bila tahap intensif diberikan secara tepat, biasanya penderita menular menjadi tidak menular dalam kurun waktu dua minggu. Sebagian besar penderita tuberkulosis paru BTA positif menjadi BTA negatif (*konversi*) pada akhir pengobatan intensif.
- b. Pada tahap lanjutan (*intermiten*) penderita mendapat jenis OAT tiga kali dalam seminggu, namun dalam jangka waktu selama empat bulan (Depkes, 2014).

WHO dan IUATLD (*International Union Against Tuberculosis and Lung Disease*) merekomendasikan paduan OAT standar, yaitu:

a. Kategori-1 (2HRZE/4H3R3)

Tahap intensif terdiri dari *Isoniasid (H)*, *Rifampisin (R)*, *Pirasinamid (Z)*, dan *Etambutol (E)*. Obat-obat tersebut diberikan setiap hari selama dua bulan (2HRZE). Kemudian diteruskan dengan tahap lanjutan yang terdiri dari *Isoniasid (H)*, dan *Rifampisin (R)*, diberikan tiga kali seminggu selama empat bulan (4H3R3).

Obat ini diberikan untuk:

- 1) Penderita baru tuberkulosis paru BTA positif.
- 2) Penderita tuberkulosis paru BTA negatif rontgen positif yang sakit berat.
- 3) Penderita tuberkulosis ekstra paru berat.

b. Kategori-2 (2HRZES/HRZE/5H3R3ES)

Tahap intensif diberikan selama tiga bulan, yang terdiri dari dua bulan dengan *Isoniasid (H)*, *Rifampisin (R)*, *Pirasinamid (Z)*, *Etambutol (E)* dan suntikan *streptomisin* setiap hari. Dilanjutkan satu bulan dengan *Isoniasid (H)*, *Rifampisin (R)*, *Pirasinamid (Z)* dan *Etambutol (E)* setiap hari. Setelah itu diteruskan dengan tahap lanjutan selama lima bulan dengan HRE yang diberikan tiga kali dalam seminggu.

Obat ini diberikan untuk:

- 1) Penderita kambuh (*relaps*)
- 2) Penderita gagal (*failure*)
- 3) Penderita dengan pengobatan setelah lalai (*after default*).

c. Kategori-3 (2HRZ/4H3R3)

Tahap intensif terdiri dari *Isoniasid (H)*, *Rifampisin(R)* dan *Pirasinamid (Z)*, diberikan setiap hari selama dua bulan (2HRZ), diteruskan dengan tahap lanjutan terdiri dari HR selama empat bulan, diberikan tiga kali seminggu (4H3R3).

Obat ini diberikan untuk:

- 1) Penderita baru BTA negatif dan rontgen positif sakit ringan.
- 2) Penderita ekstra paru ringan, yaitu tuberkulosis kelenjar limfe (*limfadenitis*), *pleuritis eksudativa unilateral*, tuberkulosis tulang (kecuali tulang belakang), sendi dan kelenjar adrenal.

d. OAT Sisipan (HRZE)

Bila pada akhir tahap intensif pengobatan penderita baru BTA positif dengan kategori-1 atau penderita BTA positif pengobatan ulang dengan kategori-2, hasil pemeriksaan dahaknya masih BTA positif, diberikan OAT sisipan (HRZE) setiap hari selama satu bulan (Depkes, 2014).

**B. Tinjauan Umum tentang Rumah Sehat**

Rumah sehat adalah suatu tempat untuk tinggal permanen, berfungsi sebagai tempat bermukim, beristirahat, berekreasi (bersantai) dan sebagai tempat perlindungan dari pengaruh lingkungan yang memenuhi syarat fisiologis, psikologis, dan bebas dari penularan penyakit (Chandra, 2005). Kriteria Rumah sehat harus menjamin kesehatan penghuninya dalam arti luas. Oleh sebab itu harus diperlukan syarat perumahan (Mukono, 2006) sebagai berikut :

1. Memenuhi Kebutuhan Fisiologis

Secara fisik kebutuhan fisiologis meliputi kebutuhan suhu dalam rumah yang optimal, pencahayaan yang optimal, perlindungan terhadap kebisingan, ventilasi memenuhi persyaratan, dan tersedianya ruang yang optimal untuk bermain anak. Suhu ruangan dalam rumah yang ideal adalah berkisar antara 18-20°C, dan suhu

tersebut dipengaruhi oleh suhu udara luar, pergerakan udara, dan kelembaban udara ruangan.

Pencahayaan harus cukup baik waktu siang maupun malam hari. Pada malam hari pencahayaan yang ideal adalah penerangan listrik. Pada waktu pagi hari diharapkan semua ruangan mendapatkan sinar matahari. Intensitas penerangan minimal tidak boleh kurang dari 60 lux.

Pertukaran hawa (ventilasi) yaitu proses penyediaan udara segar dan pengeluaran udara kotor secara alamiah atau mekanis harus cukup. Pengaruh buruk kurangnya luas ventilasi adalah berkurangnya kadar oksigen, bertambahnya kadar gas CO<sub>2</sub>, suhu udara naik, dan kelembaban udara bertambah.

#### 2. Memenuhi Kebutuhan Psikologis

Kebutuhan psikologis berfungsi untuk menjamin "*privacy*" bagi penghuni rumah. Perlu adanya kebebasan untuk kehidupan keluarga yang tinggal di rumah tersebut secara normal. Keadaan rumah dan sekitarnya diatur agar memenuhi rasa keindahan. Adanya ruangan tersendiri bagi remaja dan ruangan untuk berkumpulnya keluarga serta ruang tamu.

#### 3. Perlindungan terhadap Penularan Penyakit

Untuk mencegah penularan penyakit diperlukan sarana air bersih, fasilitas pembuangan air kotor, fasilitas penyimpanan makanan, menghindari intervensi dari serangga dan hama atau hewan lain yang dapat menularkan penyakit.

#### 4. Perlindungan atau pencegahan terhadap bahaya kecelakaan dalam rumah

Agar terhindar dari kecelakaan maka konstruksi rumah harus kuat dan memenuhi syarat bangunan, desain pencegahan terjadinya kebakaran dan tersedianya

alat pemadam kebakaran, pencegahan kecelakaan jatuh, dan kecelakaan mekanis lainnya.

Beberapa pengaruh lingkungan fisik rumah yang tidak memenuhi syarat kesehatan dengan kejadian penyakit tuberkulosis paru adalah sebagai berikut:

#### 1. Pencahayaan

Pencahayaan yang dimaksud adalah pencahayaan sinar matahari, sebab cahaya matahari mempunyai daya untuk membunuh bakteri, telah diteliti dan dibuktikan oleh Robert Kock, ia telah membuktikan bahwa sinar apapun dapat membunuh kuman dalam waktu yang cepat atau lambat. Pencahayaan alam langsung maupun tidak langsung dapat menerangi seluruh ruangan minimal intensitasnya adalah 60 lux dan tidak menyilaukan (Sanropie, dkk dalam Ruswanto, 2010). Jadi bila dalam suatu rumah tidak terdapat pencahayaan yang cukup akan dapat merangsang pertumbuhan kuman-kuman yang bersifat patogen, misalnya basil tuberkulosis paru (Suyono dalam Ruswanto, 2010).

#### 2. Ventilasi (Penghawaan)

Menurut Notoatmodjo (2007), ventilasi rumah mempunyai banyak fungsi. Fungsi pertama adalah untuk menjaga agar aliran udara dalam rumah tersebut tetap segar. Hal ini berarti keseimbangan oksigen yang diperlukan oleh penghuni rumah tersebut tetap terjaga. Kurangnya ventilasi akan menyebabkan kurangnya oksigen dalam rumah yang berarti kadar karbon dioksida yang bersifat racun bagi penghuninya menjadi meningkat. Disamping itu, tidak cukupnya ventilasi akan menyebabkan kelembaban udara dalam ruangan naik karena terjadinya proses penguapan cairan dari kulit dan penyerapan. Kelembaban ini akan menjadi media yang baik untuk bakteri-bakteri patogen (bakteri-bakteri penyebab penyakit).



Fungsi kedua dari ventilasi adalah untuk membebaskan udara ruangan dari bakteri-bakteri, terutama bakteri pathogen, karena disitu selalu terjadi aliran udara yang terus menerus. Bakteri yang terbawa oleh udara akan selalu mengalir. Fungsi lainnya adalah untuk menjaga agar ruangan rumah selalu tetap dalam kelembaban (*humidity*) yang optimum. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 829/Menkes/SK/VII/1999 tentang persyaratan kesehatan perumahan, luas ventilasi yang memenuhi syarat yaitu  $\geq 10\%$  dari luas lantai rumah.

Menurut Suyono dalam Ruswanto (2010), ventilasi yang baik dalam ruangan harus memenuhi syarat lainnya diantaranya:

- a. Luas lubang ventilasi tetap minimum 5% dari luas lantai ruangan, sedangkan luas lubang ventilasi insidensil (dapat dibuka dan ditutup) minimum 5% dari luas lantai, jumlah keduanya menjadi 10% kali luas lantai ruangan. Ukuran luas ini diatur sedemikian rupa sehingga udara yang masuk tidak terlalu deras dan tidak terlalu sedikit.
- b. Udara yang masuk harus bersih, tidak dicemari oleh asap dari sampah atau dari pabrik, dari knalpot kendaraan, debu dan lain-lain.
- c. Aliran udara diusahakan *cross ventilation* dengan menempatkan lubang hawa berhadapan antara 2 dinding ruangan, jangan terhalang oleh barang-barang besar misal lemari.
- d. Kelembaban udara dijaga jangan sampai terlalu tinggi (menyebabkan orang berkeringat) dan jangan terlalu rendah (menyebabkan kulit kering, bibir pecah-pecah dan hidung berdarah).

### 3. Jendela

Jendela sangat penting untuk suatu rumah tinggal, karena jendela merupakan ventilasi *incidental* yang mempunyai fungsi ganda. Fungsi pertama sebagai lubang keluar masuknya udara sehingga di dalam ruangan tidak pengap, fungsi yang kedua sebagai lubang masuknya cahaya dari luar (matahari). Cahaya ini akan masuk kedalam ruangan rumah melalui jendela yang terbuka atau jendela kaca, sehingga di dalam rumah tidak gelap dan dapat memberikan kontribusi terciptanya temperatur udara dan kelembaban pada ruangan. Oleh karena itu untuk suatu rumah yang memenuhi syarat kesehatan, jendela mutlak harus ada dan harus terbuka pada siang hari, terutama untuk rumah-rumah yang ventilasinya kurang baik atau tidak ada sama sekali (Sanropie dalam Ruswanto, 2010).

### 4. Kelembaban

Salah satu persyaratan keadaan udara dalam ruangan adalah kondisi kelembaban. Kelembaban udara adalah konsentrasi uap air di udara. Untuk menjaga kelembaban maka diperlukan udara segar untuk menggantikan udara ruangan yang telah terpakai. Indikator kelembaban udara dalam rumah sangat erat dengan kondisi ventilasi dan pencahayaan rumah. Hal ini perlu diperhatikan karena kelembaban dalam rumah dapat mempermudah berkembangbiaknya mikroorganisme. Mikroorganisme tersebut dapat masuk ke dalam tubuh melalui udara, selain itu kelembaban yang tinggi dapat menyebabkan membran mukosa hidung menjadi kering sehingga kurang efektif dalam menghadang mikroorganisme (Notoatmodjo 2007). Tingkat kelembaban udara diukur dengan menggunakan alat *thermo-hygrometer* dengan satuan pengukuran persen (%). Semakin tinggi presentase atau kadar uap air rata-rata di udara semakin lembab pula udara tersebut. Hal ini perlu

diperhatikan karena kelembaban di dalam rumah akan mempengaruhi berkembangbiaknya mikroorganisme termasuk *Mycobacterium tuberculosis*. Kelembaban di rumah dapat disebabkan oleh air yang naik dari tanah (*rising damp*) kemudian merembes ke dinding (*percolating damp*), dan bocor melalui atap (*roof leaks*), kelembaban yang terlalu tinggi dapat menyebabkan lantai dan dinding selalu basah. Untuk mengatasi kelembaban, maka perhatikan kondisi drainase atau saluran air di sekeliling rumah, lantai harus kedap air, sambungan pondasi dengan dinding harus kedap air, atap tidak bocor dan tersedia ventilasi yang cukup (Kementerian Kesehatan RI, 1999).

Kelembaban merupakan sarana yang baik untuk pertumbuhan mikroorganisme, termasuk kuman tuberkulosis paru. Wilayah lebih tinggi cenderung memiliki kelembaban lebih rendah. Kelembaban udara harus dijaga sesuai standar yaitu 40-60 % (Kementerian Kesehatan RI, 2011). Karena jika terlalu tinggi menyebabkan badan lesu, hidung tersumbat, kerongkongan kering, dan sesak napas sedangkan jika terlalu rendah dapat menyebabkan kulit kering, bibir pecah-pecah dan hidung berdarah.

##### 5. Lantai

Lantai merupakan dinding penutup ruangan bagian bawah, konstruksi lantai rumah harus rapat air dan selalu kering agar mudah dibersihkan dari kotoran dan debu, selain itu dapat menghindari naiknya tanah yang dapat menyebabkan meningkatnya kelembaban dalam ruangan. Oleh karena itu perlu dilapisi dengan yang kedap air (disemen, dipasang tegel, teraso dan lain-lain). Untuk mencegah masuknya air ke dalam rumah, maka lantai rumah sebaiknya dinaikkan 20 cm dari permukaan tanah. lantai yang tidak memenuhi syarat dapat dijadikan tempat hidup dan

berkembangbiaknya kuman dan vektor penyakit, menjadikan udara dalam ruangan lembab, pada musim panas lantai menjadi kering sehingga dapat menimbulkan debu yang berbahaya bagi penghuninya (Departemen Pekerjaan Umum dalam Ruswanto, 2010).

#### 6. Pembagian Ruangan

Banyaknya penghuni dalam suatu rumah akan menuntut jumlah ruangan yang banyak terutama ruang tidur. Rumah yang sehat harus mempunyai ruangan khusus untuk tidur agar terhindar dari penyakit pernapasan yang mudah menular, maka ukuran ruang tidur minimal 9 m<sup>2</sup> dan tidak dianjurkan digunakan lebih dari 2 orang kecuali anak dibawah umur 5 tahun. Sumber penularan adalah penderita tuberkulosis paru, oleh karena itu dengan tidak terdapatnya pembagian ruang tidur atau tidak tersedianya ruang tidur tersendiri bagi penderita tuberkulosis paru akan mempercepat terjadinya penularan kepada anggota keluarga yang lain (Achmadi, 2013).

#### 7. Dinding

Dinding berfungsi sebagai pelindung, baik dari gangguan hujan maupun angin serta melindungi dari pengaruh panas. Beberapa bahan pembuat dinding adalah dari kayu, bambu, pasangan batu bata atau batu dan lain sebagainya, tetapi dari beberapa bahan tersebut yang paling baik adalah pasangan batu bata atau tembok (permanen) yang tidak mudah terbakar dan kedap air sehingga mudah dibersihkan.

Dinding ruang tidur, ruang keluarga harus dilengkapi dengan sarana ventilasi yang berfungsi untuk pengaturan udara, karena dinding dapat memberikan kontribusi terciptanya kelembaban dan temperatur yang memungkinkan suatu bibit penyakit akan mati atau berkembangbiak, seperti Kuman *Mycobacterium tuberculosis* tumbuh pada kelembaban dan temperatur tertentu (Kementerian Kesehatan RI, 1999).

## 8. Kepadatan Penghuni

Kepadatan hunian adalah perbandingan antara luas lantai rumah dengan jumlah anggota keluarga dalam satu rumah tinggal. Persyaratan kepadatan hunian untuk seluruh perumahan biasa dinyatakan dalam  $m^2$  per orang. Apabila ada anggota keluarga yang menjadi penderita penyakit tuberkulosis sebaiknya tidak tidur dengan anggota keluarga lainnya.

Kepadatan penghuni dalam suatu rumah tinggal akan memberikan pengaruh bagi penghuninya. Luas lantai bangunan rumah sehat harus disesuaikan dengan jumlah penghuninya agar tidak menyebabkan *overload*. Hal ini tidak sehat, sebab disamping menyebabkan kurangnya konsentrasi oksigen dan bila salah satu anggota keluarga terkena penyakit infeksi akan mudah menular kepada anggota keluarga yang lain (Notoatmodjo, 2007).

Semakin padat penghuni rumah akan cepat pula udara di dalam rumah tersebut mengalami pencemaran. Hal ini disebabkan oleh jumlah penghuni yang semakin banyak akan berpengaruh terhadap kadar oksigen di dalam ruangan tersebut, begitu pula kadar air dan suhu udaranya. Dengan meningkatnya kadar karbon dioksida di udara dalam rumah maka akan memberikan kesempatan tumbuh dan berkembang biak lebih tinggi bagi *Mycobacterium tuberculosis*. Dengan demikian akan semakin banyak kuman yang terhisap oleh penghuni rumah melalui saluran pernapasan (Ruswanto, 2010).

Semakin padat penduduk, maka perpindahan penyakit terutama penyakit menular yang penularanya melalui udara akan semakin mudah dan cepat misalnya penyakit tuberkulosis paru (Ruswanto, 2010). Persyaratan kepadatan hunian untuk seluruh rumah biasanya dinyatakan dalam  $m^2$ /orang. Dimana kepadatan hunian

merupakan perbandingan jumlah penghuni dengan luas bangunan, dengan persyaratan  $\geq 9 \text{ m}^2/\text{orang}$  (Kementerian Kesehatan RI, 1999).

Kepadatan penghuni selain dapat menimbulkan masalah privasi bagi penghuninya dari segi kesehatan, kepadatan penghuni akan dapat mempercepat terjadinya penularan penyakit terutama penyakit menular secara *droplet infection* misalnya penyakit tuberkulosis paru. Semakin padat, maka perpindahan penyakit, khususnya penyakit menular melalui udara akan semakin mudah dan cepat (Achmadi, 2013).

#### 9. Suhu

Suhu adalah panas atau dinginnya udara yang dinyatakan dengan satuan derajat tertentu. Suhu udara dibedakan menjadi:

- a. Suhu kering, yaitu suhu yang ditunjukkan oleh termometer suhu ruangan setelah diadaptasikan selama kurang lebih sepuluh menit, umumnya suhu kering antara  $24 - 34 \text{ }^\circ\text{C}$ .
- b. Suhu basah, yaitu suhu yang menunjukkan bahwa udara telah jenuh oleh uap air, umumnya lebih rendah dari pada suhu kering, yaitu antara  $20-25 \text{ }^\circ\text{C}$ . Secara umum, penilaian suhu rumah dengan menggunakan termometer ruangan.

Kenyamanan suatu ruangan disamping ditentukan oleh konsentrasi pencemar udara juga tergantung pada suhu udara. Suhu udara yang tercemar dapat menyebabkan peningkatan kelembaban sehingga akan meningkatkan efek korosif bahan pencemar. Tubuh manusia mengadakan penyesuaian terhadap temperatur udara di dalam ruangan. Pada suhu ruangan tinggi pembuluh darah kapiler akan melebar melepaskan panas proses ini dibantu oleh proses penguapan keringat dari kulit.

Sedangkan pada suhu yang rendah akan terjadi sebaliknya dimana pembuluh darah kulit akan mengerut dan menyempit (Kementerian Kesehatan RI, 1999).

Suhu dalam ruangan harus dapat diciptakan sedemikian rupa sehingga tubuh tidak terlalu banyak kehilangan panas atau sebaliknya tubuh tidak sampai kepanasan. Suhu ruangan dalam rumah yang ideal adalah berkisar antara 18-30 °C dan suhu tersebut dipengaruhi oleh suhu udara luar pergerakan udara dan kelembaban udara dalam ruangan (Kepmenkes, 2011). Menurut Azwar (1999) dalam Amirah (2014), untuk membuat suhu udara sesuai dengan yang dikehendaki dapat dilakukan dengan mendinginkan atau memanaskan ruangan, melakukan penukaran udara dan memasang penyekat suhu pada ruangan.

Menurut Goul dan Brooker (2003), bakteri *Mycobacterium tuberculosis* memiliki rentang suhu yang disukai, tetapi dalam rentang ini terdapat suatu suhu optimum saat mereka tumbuh pesat. *Mycobacterium tuberculosis* merupakan bakteri mesofilik yang tumbuh dalam rentang suhu 25-40 °C, akan tetapi akan tumbuh secara optimal pada suhu 31-37°C.

Suhu udara yang paling nyaman dalam rumah berkisar antara 18°C-30°C. Suhu optimal pertumbuhan bakteri sangat bervariasi, ada yang tumbuh pada suhu yang rendah (15°C - 20°C), bahkan ada pula yang tumbuh pada suhu yang tinggi. Kuman *Mycobacterium tuberculosis* tumbuh optimal pada suhu sekitar 37°C yang memang kebetulan sesuai dengan suhu tubuh manusia. Hubungan karakteristik lingkungan dengan perkembangan *Mycobacterium tuberculosis* diantaranya adalah ketinggian, karena secara umum mempengaruhi kelembaban dan suhu lingkungan. Disamping berpengaruh dengan kerapatan oksigen, setiap kenaikan 100 meter selisih suhu udara dengan permukaan laut sebesar 0,5°C. *Mycobacterium tuberculosis* sangat

*aerob*, sehingga diperkirakan kerapatan oksigen di pegunungan akan mempengaruhi *viabilitas* (daya tahan hidup) kuman tuberkulosis paru.

### ***C. Tinjauan Umum Tentang Analisis Spasial***

#### **1. Pengertian Spasial**

Spasial berasal dari kata *space* artinya adalah ruang, perbedaannya selain memperhatikan temporal atau waktu juga ketinggian atau variabel utama lainnya seperti kelembaban masuk didalam variabel yang harus diperhatikan. Dengan demikian selain memperhatikan tempat, ketinggian, waktu juga karakteristik ekosistem lainnya. Kalau batasan ruang lebih bersifat *man made* seperti halnya tata ruang, maka istilah spasial lebih *concern* kepada ekosistem. Spasial mempunyai arti sesuatu yang dibatasi oleh ruang, komunikasi dan atau transformasi, data spasial menunjukkan posisi, ukuran dan kemungkinan hubungan topologis (bentuk dan tata letak) dari obyek di muka bumi (Nuarsa dalam Ruswanto, 2010).

Analisis spasial adalah sebagian dari bagian manajemen penyakit berbasis wilayah, merupakan suatu analisis dan uraian tentang data penyakit secara geografi berkenaan dengan kependudukan, persebaran, lingkungan, perilaku, sosial ekonomi, kasus kejadian penyakit dan hubungan antar variabel tersebut. Analisis spasial penyakit tuberkulosis paru misalnya, memperhatikan jumlah penderita dalam suatu wilayah pada waktu tertentu dengan memperhatikan variabel suhu, kelembaban, kepadatan pemukiman, kepadatan hunian, kondisi lingkungan rumah dan ketinggian wilayah.

Ada 4 tingkatan dalam menggambarkan data spasial yaitu:

- a. Kenyataan (*reality*) adalah gejala sebagaimana yang kita lihat.



- b. Model data adalah bentuk penggambaran kejadian sehari-hari yang dialami oleh manusia.
- c. Struktur data (*logical model*) menunjukkan model data, merupakan penggambaran kejadian tertentu, biasanya berbentuk diagram.
- d. File struktur (*physical model*) adalah bentuk data dalam penyimpanan *hardware*.

Dengan cara berpikir logis secara bertahap dalam menyusun data spasial, maka pengolahan data spasial akan menjadi sebuah informasi yang teratur dan terarah (Nuarsa dalam Ruswanto, 2010).

## 2. Pengertian Sistem Informasi Geografis (GIS)

Sistem Informasi Geografis (*Geographic Information System/GIS*) yang selanjutnya akan disebut SIG merupakan sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mengolah dan menyimpan data atau informasi geografis (Aronoff, 1989). Secara umum pengertian SIG yaitu Suatu komponen yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, sumber daya manusia dan data yang bekerja bersama secara efektif untuk memasukan, menyimpan, memperbaiki, memperbaharui, mengelola, memanipulasi, mengintegrasikan, menganalisa dan menampilkan data dalam suatu informasi berbasis geografis. SIG mempunyai kemampuan untuk menghubungkan berbagai data pada suatu titik tertentu di bumi, menggabungkannya, menganalisa dan akhirnya memetakan hasilnya. Data yang akan diolah pada SIG merupakan data spasial yaitu sebuah data yang berorientasi geografis dan merupakan lokasi yang memiliki sistem koordinat tertentu, sebagai dasar referensinya. Sehingga aplikasi SIG dapat menjawab beberapa pertanyaan seperti; lokasi, kondisi, trend, pola dan pemodelan. Kemampuan inilah yang membedakan

SIG dari sistem informasi lainnya (Astrini dan Oswald, 2012). Menurut WHO (2006) unsur-unsur Sistem Informasi Geografis (SIG) mampu mengidentifikasi:

- a. Timbulnya angka-angka permasalahan kesehatan.
- b. Faktor-faktor risiko lingkungan, ekonomi-sosial, pengaruh layanan kesehatan yang lemah, kemiskinan, jalan masuk, bidang-bidang geografis dan factor-faktor demografis lainnya.
- c. Sub-sub kelompok populasi dengan permasalahan kesehatan yang spesifik, memerlukan status kesehatan.
- d. Jasa kesehatan mengarahkan pada permasalahan kesehatan atas faktor-faktor untuk seluruh atau sebagian populasi.
- e. *Input* pelayanan kesehatan staf, dana, sumber daya modal, obat-obatan dan peralatan yang digunakan dan lain-lain.
- f. *Output* pelayanan kesehatan, jumlah klien yang mengakses atau menghubungi kesehatan masyarakat yang telah dibuat, proporsi dari populasi yang dicapai yang dicapai untuk program-program dan proporsi yang tertentu populasi yang mencapai target.

### 3. Data spasial

Menurut Astrini dan Oswald (2012), sebagian besar data yang akan ditangani dalam SIG merupakan data spasial yaitu sebuah data yang berorientasi geografis, memiliki sistem koordinat tertentu sebagai dasar referensinya dan mempunyai dua bagian penting yang membuatnya berbeda dari data lain, yaitu informasi lokasi (spasial) dan informasi deskriptif (*attribute*) yang dijelaskan berikut ini :

- a. Informasi lokasi atau informasi spasial. Contoh yang umum adalah informasi lintang dan bujur, termasuk diantaranya informasi datum dan proyeksi.

- b. Informasi deskriptif (atribut) atau informasi non spasial. Suatu lokalitas bisa mempunyai beberapa atribut atau properti yang berkaitan dengannya: contohnya jenis bencana, kependudukan, pendapatan per tahun, dan lain-lain.

#### 4. Sumber Data Spasial

Menurut Retno Astrini dan Patrick Oswald (2012), salah satu syarat SIG adalah data spasial, yang dapat diperoleh dari beberapa sumber antara lain :

##### a. Peta analog

Peta analog (antara lain peta topografi, peta tanah dan sebagainya) yaitu peta dalam bentuk cetak. Pada umumnya peta analog dibuat dengan teknik kartografi, kemungkinan besar memiliki referensi spasial seperti koordinat, skala, arah mata angin dan sebagainya. Dalam tahapan SIG sebagai keperluan sumber data, peta analog dikonversi menjadi peta digital dengan cara format raster diubah menjadi format vektor melalui proses digitasi sehingga dapat menunjukkan koordinat sebenarnya di permukaan bumi.

##### b. Data sistem penginderaan jauh

Data dari sistem penginderaan jauh (antara lain citra satelit, foto udara). Data penginderaan jauh dapat dikatakan sebagai sumber data yang terpenting bagi SIG karena ketersediaannya secara berkala. Dengan adanya bermacam-macam satelit di ruang angkasa dengan spesifikasinya masing-masing, kita bisa menerima berbagai jenis citra satelit untuk beragam tujuan pemakaian. Data ini biasanya direpresentasikan dalam format raster.

##### c. Data Hasil Pengukuran Lapangan (termasuk GPS)

Data pengukuran lapangan yang dihasilkan berdasarkan teknik perhitungan tersendiri, pada umumnya data ini merupakan sumber data atribut contohnya: batas

administrasi, batas kepemilikan lahan, batas persil, batas hak pengusahaan hutan dan lain-lain. Teknologi GPS (*Global Positioning System*) memberikan terobosan penting dalam menyediakan data bagi SIG. Keakuratan pengukuran GPS semakin tinggi dengan berkembangnya teknologi. Data ini biasanya direpresentasikan dalam format vektor.

#### 5. Kesalahan (*error*) dalam data spasial

Tujuan suatu aplikasi SIG adalah untuk menyediakan informasi yang dapat digunakan mendukung perencanaan dan manajemen. Untuk mengurangi ketidakakuratan dalam suatu proses pengambilan kebijakan, kesalahan-kesalahan yang ada dalam suatu database spasial serta keluaran hasil produk suatu SIG perlu diminimalis. Hal ini dikarenakan kualitas suatu produk SIG sangat ditentukan oleh kualitas data yang digunakan sebagai masukan dalam proses analisis menggunakan SIG, yang pada akhirnya akan menentukan tingkat keakuratan suatu kebijakan yang diambil. Kesalahan-kesalahan ataupun keterbatasan suatu data spasial yang dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan tergantung pada tujuan untuk apa data itu sendiri akan digunakan. Sehingga kualitas seringkali didefinisikan atau dipertimbangan sebagai ketepatan terhadap suatu penggunaan (Astrini dan Oswald, 2012).

Menurut Astrini dan Oswald (2012), secara tradisional kesalahan-kesalahan maupun keakuratan suatu peta diasosiasikan dengan beberapa hal antara lain sebagai berikut:

- a. Kesalahan atribut (*attribute errors*) pada suatu klasifikasi atau pemberian label pada suatu kenampakan geografis.

- b. Kesalahan posisi (*positioning errors*) yang merupakan kesalahan pada suatu lokasi atau posisi, ataupun tinggi dari suatu kenampakan geografis.
- c. Keakuratan data yang terkait dengan waktu (*temporal accuracy*), sebagai misal batas suatu unit administrasi atau parsel lahan mungkin tetap sama dalam kurun waktu tertentu namun informasi kepemilikannya telah berubah.
- d. Kelengkapan informasi yang terkandung pada suatu peta (*completeness*).

#### 6. Tahapan SIG

Menurut Retno Astrini dan Patrick Oswald (2012), secara garis besar, SIG terdiri atas 4 tahapan utama, yakni :

##### a. Tahap input data

Tahapan input data merupakan salah satu tahapan kritis. Tahap input data meliputi proses perencanaan, penentuan tujuan, pengumpulan data, serta memasukkannya ke dalam komputer.

##### b. Tahap pengolahan data

Tahap ini meliputi kegiatan klasifikasi dan stratifikasi data, komplisi, serta *geoprosesing* (*clip, merge, dissolve*).

##### c. Tahap analisis data

Pada tahapan ini dilakukan berbagai macam analisa keruangan, seperti *buffer, overlay*, dan lain-lain.

##### d. Tahap *output*

Tahap ini merupakan fase akhir, dimana ini akan berkaitan dengan penyajian hasil analisa yang telah dilakukan, apakah disajikan dalam bentuk peta *hardcopy*, tabulasi data, CD sistem informasi, maupun dalam bentuk situs *website*.

#### ***D. Pandangan Islam terhadap Penyakit Tuberkulosis***

Islam adalah agama yang sempurna. Tidak ada satu hal dalam kehidupan kita melainkan Islam telah memberikan arahan dan petunjuknya. Semua kandungan ajaran dalam Islam bertujuan untuk menjadikan umatnya hidup bahagia dan sejahtera di dunia dan akhirat. Salah satu aspek kehidupan yang menjadi perhatian Islam adalah thaharah, kesucian dan kebersihan.

##### **1. Pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)**

Kebersihan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kejadian penyakit tuberkulosis. Kebersihan perseorangan (*personal hygiene*) kerap kali diabaikan oleh sebagian masyarakat sehingga memudahkan agen penyakit khususnya *Mycobacterium tuberculosis* menyebabkan terjadinya penyakit tuberkulosis. Perilaku hidup bersih dan sehat sangat penting diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari karena dengan hidup sehat dan bersih kita akan terhindar dari berbagai penyakit. Dengan demikian kita akan dapat beribadah dengan baik dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah yang bertaqwa kepada-Nya.

Di dalam Al-quran Allah SWT menganjurkan kepada hamba-Nya agar senantiasa menjaga kebersihan karena Allah SWT menyukai orang-orang yang bersih. Sebagaimana dalam Q.S al-Baqarah/2:222

.... إِنَّ اللَّهَ تُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَتُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

*Terjemahnya:*

*“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri” (Departemen Agama RI, 2009).*

Allah SWT menyukai orang-orang yang mensucikan diri dalam hal ini dapat diartikan sebagai orang-orang yang menjaga kebersihan, baik kebersihan jasmani maupun rohani. Oleh sebab itu, hendaklah kita menjaga kebersihan karena dengan menjaga kebersihan maka kita akan terhindar dari berbagai jenis penyakit seperti tuberkulosis.

## 2. Kebersihan Lingkungan

Di samping masalah kebersihan diri, Islam juga sangat memperhatikan kebersihan lingkungan yang ada di sekitar kita khususnya kebersihan tempat tinggal kita. Karena sebagai agama yang menjadi rahmat bagi sekalian alam, Islam tidak akan membiarkan manusia merusak atau mengotori lingkungan sekitarnya.

Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ فَنَظِّفُوا أَفْنِيَتَكُمْ • (رواه الترمذی)

Artinya :

*“Sesungguhnya Allah SWT itu suci yang menyukai hal-hal yang suci, Dia Maha bersih yang menyukai kebersihan, Dia Maha mulia yang menyukai kemuliaan, Dia Maha indah yang menyukai keindahan, karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu” (HR. Tirmidzi).*

Dalam hadits di atas telah dijelaskan mengenai kebersihan. Kebersihan dalam hal ini bukan hanya kebersihan perseorangan tetapi juga kebersihan lingkungan. Lingkungan yang bersih akan memberikan manfaat bagi kesehatan manusia terutama keadaan lingkungan tempat tinggalnya. Kebersihan memiliki banyak manfaat bagi manusia dan merupakan hal yang disukai oleh Allah SWT sehingga kita diperintahkan untuk memelihara kebersihan.

### 3. Pencegahan Penyakit

Pencegahan dilakukan untuk mencegah terjadinya penyakit. Di dalam ajaran Islam, upaya pencegahan penyakit telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan hadits. Salah satu hadits Rasulullah SAW berisi larangan meludah di sembarangan tempat, karena disamping ludah itu sendiri sangat menjijikan, juga menjadi salah satu sarana menularnya beberapa penyakit salah satunya adalah penyakit tuberkulosis.

Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ دَخَلَ هَذَا الْمَسْجِدَ فَبَرَقَ فِيهِ أَوْ تَنَحَّمَ فَلْيَحْوِزْ فَلْيَدْفِنْهُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيَبْرِقْ فِي ثَوْبِهِ ثُمَّ لِيُخْرِجْ بِهِ

Artinya:

*“Siapa yang masuk masjid ini, kemudian meludah atau buang dahak di dalamnya, hendaknya ia membuat lubang untuk menimbunnya. Kalau tidak demikian, maka meludahlah di kainnya kemudian dibawa keluar.”* (H.R. Abu Dawud).

Masjid di zaman Rasulullah SAW hanyalah berlantai tanah dan pasir, sehingga kadang-kadang ada orang yang dengan diam-diam meludah sembarangan di dalamnya, lalu Rasulullah SAW memerintahkan siapa yang meludah di dalam masjid untuk menanam ludah itu supaya tidak jorok dan diinjak atau diduduki orang lain. Dalam hadits ini dapat kita ambil hikmah bahwa Islam melarang kita untuk meludah di tempat-tempat umum seperti mesjid dan juga tempat lainnya, karena sama-sama menjijikkan dan menjadi salah satu faktor tertularnya penyakit. Apabila seorang penderita tuberkulosis meludah sembarang tempat, maka orang tersebut dapat menularkan kuman *Mycobacterim tuberculosis* kepada orang lain. Di dalam Islam, kita dilarang untuk berbuat sesuatu yang bisa membahayakan orang lain.



Menjaga kebersihan diri juga merupakan salah satu upaya dalam mencegah terjadinya penyakit. Di dalam Islam, kebersihan sangatlah penting. Sebagai contoh, sebelum kita melaksanakan shalat lima waktu maka kita diwajibkan untuk berwudhu. Dengan berwudhu, kotoran dan bakteri yang melekat pada bagian-bagian tubuh kita akan hilang sehingga dapat mencegah bibit penyakit masuk ke dalam tubuh.

#### 4. Pengobatan

Ketika seseorang telah menderita suatu penyakit maka hendaklah orang tersebut mencari pengobatan. Pengobatan bertujuan untuk menyembuhkan, mencegah kematian dan kekambuhan. Penyakit ini kadang baru disadari oleh penderita setelah lama menderita penyakit tuberkulosis. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan gejala-gejala penyakit yang timbul pada diri kita agar kita tetap menjaga kesehatan yang diberikan Allah SWT kepada kita.

Ketika kita telah sakit, kita harus berusaha untuk memperoleh nikmat kesehatan itu kembali dengan cara mencari pengobatan karena semua penyakit ada obatnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَنْ جَابِرٍ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.


*Artinya:*

*Dari Jabir RA, dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau bersabda, "Setiap penyakit pasti ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, maka sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah Azza wa Jalla" (H.R. Muslim).*

Hadits ini memberikan semangat kepada manusia yang sedang sakit untuk terus berusaha mencari kesembuhan, mencegah atau meringankan penyakit yang dideritanya karena Allah SWT telah menjamin bahwa semua penyakit pasti ada obatnya. Obat untuk suatu penyakit tidak hanya satu jenis. Oleh karena itu kita dilarang berobat dengan yang haram. Salah satu contoh obat yang haram adalah khamar. Dalam sebuah hadits lain Rasulullah SAW menjelaskan bahwa khamar bukanlah sebuah obat melainkan sebuah penyakit.

Pengobatan hukumnya mubah (dibolehkan) karena hal ini telah dilakukan oleh pemimpin kita Rasulullah SAW sehingga sama sekali tidak perlu dipersoalkan untuk melakukan pengobatan. Demikian pula orang-orang yang memilih untuk bersabar atas penyakitnya karena dalam ajaran Islam juga ditekankan bahwa obat dan upaya hanyalah “sebab” sedangkan penyebab sesungguhnya dibalik sebab atau upaya itu adalah Allah SWT (Shihab, 2009).

### E. Kerangka Teori




Sumber : Notoatmodjo (2003; 2007), Depkes RI (1999; 2011)

Gambar 2.1 Kerangka Teori

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
 MAKASSAR


*F. Kerangka Konsep*



Keterangan :

 : Variabel bebas

 : Variabel terikat

 : Alat pengolah data

Gambar 2.2. Kerangka Konsep

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### ***A. Jenis Penelitian***

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif yang bertujuan memetakan kejadian tuberkulosis di daerah dataran tinggi. Rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan observasional deskriptif dengan menggunakan pendekatan Sistem Informasi Geografis (SIG).

#### ***B. Lokasi dan Waktu Penelitian***

##### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada tiga wilayah kerja puskesmas kecamatan di daerah dataran tinggi Kabupaten Gowa yaitu Puskesmas Parangloe yang terletak di Kecamatan Parangloe, Puskesmas Tamaona yang terletak di Kecamatan Tombolopao, dan Puskesmas Tinggimoncong yang terletak di Kecamatan Tinggimoncong. Ketiga Puskesmas tersebut merupakan puskesmas yang memiliki kasus tuberkulosis tertinggi di daerah dataran tinggi Kabupaten Gowa.

##### **2. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dimulai pada bulan April-Agustus 2017.

#### ***C. Populasi dan Sampel***

##### **1. Populasi**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien tuberkulosis yang berkunjung dan tercatat pada rekam medik di ruangan Pemberantasan Penyakit (P2) TB di Puskesmas Parangloe, Puskesmas Tinggimoncong dan Puskesmas Tamaona mulai bulan Januari-Desember 2016 yang berjumlah 57 orang.

## 2. Sampel

Sampel penelitian adalah sebagian dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pasien tuberkulosis yang berkunjung dan tercatat pada rekam medik di ruangan Pemberantasan Penyakit (P2) TB di Puskesmas Parangloe sebanyak 20 orang, Puskesmas Tinggimoncong sebanyak 8 orang, dan Puskesmas Tamaona sebanyak 29 orang. Jumlah sampel keseluruhan sebanyak 57 orang. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu *total sampling*.

### **D. Metode Pengumpulan Data**

Adapun jenis data yang digunakan menurut sumbernya ada 2, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Data primer

Data primer diperoleh penderita tuberkulosis di wilayah kerja Puskesmas Parangloe, Puskesmas Tinggimoncong dan Puskesmas Tamaona Kabupaten Gowa dengan cara:

##### a. Wawancara

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung terhadap responden dan bertempat di rumah responden dengan menggunakan lembar observasi yang akan dilakukan untuk memperoleh data umum responden atau penderita.

##### b. Observasi

Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung pada rumah responden dengan menggunakan lembar observasi untuk memperoleh data tentang suhu,

kelembaban, luas ventilasi, kondisi lantai dan kepadatan hunian. Hasil observasi kemudian dicatat pada lembar observasi.

c. Pengukuran

Pengukuran dilakukan dengan menggunakan *roll meter* untuk memperoleh data luas ventilasi dan kepadatan hunian sedangkan *thermo-hygrometer* digunakan untuk mengukur suhu dan kelembaban di dalam rumah responden.

d. Pemetaan

Data spasial dilakukan dengan mengumpulkan titik koordinat rumah penderita tuberkulosis yang tinggal di wilayah kerja Puskesmas Parangloe, Puskesmas Tinggimoncong dan Puskesmas Tamaona Kabupaten Gowa dengan menggunakan GPS tipe Garmin Etrex 10 dan selanjutnya ditransfer ke *map sources* sehingga diperoleh informasi dan pemetaan keruangan/wilayah berdasarkan data yang dikumpulkan.

2. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa dan rekam medik Puskesmas Parangloe, Puskesmas Tinggimoncong dan Puskesmas Tamaona, Kabupaten Gowa.

**E. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian merupakan alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data. Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu lembar observasi, *roll meter*, *thermo-hygrometer*, *Global Positioning System* (GPS), *map source*, *Quantum GIS*, dan *Google Earth*. GPS merupakan alat yang digunakan untuk memetakan kondisi wilayah di sekitar rumah sampel sedangkan *map source*,

*Quantum GIS*, dan *Google Earth* merupakan program yang digunakan untuk memetakan hasilnya.

#### ***F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data***

Proses analisis data spasial dilakukan dengan menggunakan *Quantum GIS*. Data titik koordinat penderita tuberkulosis dikumpulkan dengan menggunakan GPS, selanjutnya ditransfer ke *map source*. Analisis selanjutnya dengan *Quantum GIS* dalam memetakan dan menampilkan informasi keruangan/wilyah berdasarkan data yang dikumpulkan. Adapun data distribusi penderita tuberkulosis yang telah diisi melalui lembar observasi selanjutnya dilakukan pemeriksaan atau validasi data kemudian diinput dan dianalisis dengan menggunakan SPSS 17.0. Analisis univariat dengan pendekatan deskriptif yang dibuat dalam bentuk tabel yang disertai narasi sebagai penjelasan.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Kabupaten Gowa

Kabupaten Gowa berada pada 12<sup>o</sup>38.16' Bujur Timur dari Jakarta dan 5<sup>o</sup>33.6' Bujur Timur dari Kutub Utara. Sedangkan letak wilayah administrasinya antara 12<sup>o</sup>33.19' hingga 13<sup>o</sup>15.17' Bujur Timur dan 5<sup>o</sup>5' hingga 5<sup>o</sup>34.7' Lintang Selatan dari Jakarta, dengan batas-batas wilayah:

- a. Sebelah Utara : Kota Makassar dan Kabupaten Maros.
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bulukumba dan Bantaeng.
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto.
- d. Sebelah Barat : Kota Makassar dan Kabupaten Takalar.

Wilayah administrasi Kabupaten Gowa terdiri dari 18 kecamatan dan 167 kelurahan/desa dengan luas wilayah 1.883,33 km<sup>2</sup> atau sama dengan 3,01 % dari luas Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar terletak di dataran tinggi yaitu sekitar 72,26%. Terdapat 9 wilayah kecamatan yang merupakan dataran tinggi yaitu Kecamatan Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolopao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu.

Dari total luas Kabupaten Gowa 35,30% mempunyai kemiringan tanah di atas 40 derajat yaitu Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya dan Tompobulu. Tahun 2014 jumlah penduduk Kabupaten Gowa secara keseluruhan. sebanyak 656.247 jiwa, laki-laki sebanyak 321.422 jiwa dan perempuan sebanyak 334.825 jiwa

## 2. Kecamatan Parangloe

Kecamatan Parangloe merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Secara administratif terbagi atas tujuh desa/kelurahan yaitu Kelurahan Bontoparang, Kelurahan Lanna, Desa Borisallo, Desa Belapunranga, Desa Lonjoboko, Desa Bontokassi, dan Desa Belabori. Kecamatan Parangloe terletak di dataran tinggi dengan batas-batas:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pattallassang dan Kabupaten Maros.
- b. Sebelah Timur dibatasi oleh Dam Bili-Bili.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Bontolerung, Kelurahan Bulutana dan Kabupaten Sinjai.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bontorannu.

Jarak Puskesmas Parangloe dari Sungguminasa sebagai ibukota Kabupaten Gowa  $\pm$  44 km dan secara geografis dan topografi dengan kondisi daerah dataran tinggi dengan dataran landai dan berbukit serta merupakan daerah aliran sungai Jeneberang dan Dam Bili-Bili. Saat ini wilayah Kecamatan Parangloe merupakan sentra pengembangan pertanian, perikanan, pertambangan galian golongan C khususnya pasir (Profil Kecamatan Parangloe, 2016).

## 3. Kecamatan Tinggimoncong

Puskesmas Tinggimoncong terletak di Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa. Kecamatan Tinggimoncong khususnya kelurahan Malino merupakan salah satu daerah tujuan wisata yang cukup terkenal dan banyak dikunjungi oleh wisatawan terutama untuk menikmati wisata alam dan udara dingin

yang merupakan ciri khas Kota Malino mengingat wilayah Kecamatan Tinggimoncong berada pada ketinggian 1050 meter diatas permukaan laut.

Sebelum mengalami pemekaran, wilayah kerja Puskesmas Tinggimoncong meliputi 3 kelurahan dan 6 desa. Namun pada tahun 2006, Kecamatan Tinggimoncong mengalami pemekaran menjadi 2 kecamatan yaitu Kecamatan Tinggimoncong dengan 6 kelurahan dan 1 desa, dan Kecamatan Parigi dengan 5 desa. Sehingga setelah pemekaran, wilayah kerja Puskesmas Tinggimoncong meliputi kedua kecamatan tersebut dengan jumlah desa/kelurahan seluruhnya menjadi 6 desa dan 6 kelurahan dengan jumlah penduduk sekitar 34.440 jiwa. Luas wilayah kerja Puskesmas Tinggimoncong adalah 275,63 km<sup>2</sup>, dengan batas-batas :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Maros.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tombolopao.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Bontolerung, Kelurahan Bulutana dan Kabupaten Sinjai.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Parangloe.

Sebagian besar wilayah kerja Puskesmas Tinggimoncong berada di daerah pegunungan atau kawasan lereng dengan kondisi tanah pada umumnya berbatu-batu. Kondisi jalan khususnya jalan poros kecamatan dan sebagian jalan poros desa sebagian sudah beraspal. Namun di beberapa desa dan kelurahan, jalan poros belum mengalami pengaspalan sama sekali sehingga sangat menyulitkan alur transportasi masyarakat terutama pada musim penghujan.

#### 4. Kecamatan Tombolopao

Kecamatan Tombolopao merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Gowa, yang dibentuk pada tanggal 30 Desember 1998. Wilayah kerja Puskesmas Tamaona terdiri dari 1 kelurahan dan 9 desa, dengan luas wilayah kerja 260.91 km<sup>2</sup> dengan batas-batas:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bone.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tombolopao.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Maros.

Sebagian besar wilayah Kecamatan Tombolopao berada di daerah pegunungan atau kawasan lereng dengan kondisi tanah pada umumnya berbatu-batu. Kondisi jalan khususnya jalan poros kecamatan dan sebagian jalan poros desa sebagian sudah beraspal. Namun di beberapa desa dan kelurahan, jalan poros belum mengalami pengaspalan sama sekali sehingga sangat menyulitkan alur transportasi masyarakat terutama pada musim penghujan, bahkan ada wilayah yang harus ditempuh dengan berjalan kaki karena sulitnya medan dan tidak bisa dilalui kendaraan.

#### **B. Hasil Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di daerah dataran tinggi Kabupaten Gowa dengan memilih tiga kecamatan yang memiliki kasus Tuberkulosis tertinggi yaitu Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong dan Tombolopao dimulai pada tanggal 22 Juni-22 Juli 2017. Pengumpulan data dilakukan dengan mengambil data sekunder penderita tuberkulosis yang berobat pada tahun 2016 di Puskesmas Parangloe, Puskesmas

Tinggimoncong dan Puskesmas Tamaona. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara, pengukuran dan observasi langsung di rumah responden. Adapun hasil penelitian adalah sebagai berikut:

## 1. Karakteristik Responden

### a. Karakteristik Responden Berdasarkan Lokasi Penelitian

**Tabel 4.1**  
**Distribusi Responden Berdasarkan Lokasi Penelitian**  
**di Daerah Dataran Tinggi Kabupaten Gowa Tahun 2017**

Lokasi Penelitian	Jumlah (n)	Persen (%)
Parangloe	20	35.1
Tinggimoncong	8	14.0
Tombolopao	29	50.9
<b>Total</b>	<b>57</b>	<b>100.0</b>

*Sumber: Data Primer 2017*

Berdasarkan tabel di atas, dari 57 responden terdapat 20 orang (35.1%) yang tinggal di Kecamatan Parangloe, 8 orang (14.0%) yang tinggal di Kecamatan Tinggimoncong, dan 29 orang (50.9%) yang tinggal di Kecamatan Tombolopao.

### b. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

**Tabel 4.2**  
**Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**  
**di Daerah Dataran Tinggi Kabupaten Gowa Tahun 2017**

Jenis kelamin	Jumlah (n)	Persen (%)
Laki-laki	33	57.9
Perempuan	24	42.1
<b>Total</b>	<b>57</b>	<b>100.0</b>

*Sumber: Data Primer 2017*

Berdasarkan tabel di atas, dari 57 responden terdapat 33 orang (57.9%) yang berjenis kelamin laki-laki dan 24 orang (42.1%) yang berjenis kelamin perempuan.

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Kelompok Umur

**Tabel 4.3**  
**Distribusi Responden Berdasarkan Kelompok Umur**  
**di Daerah Dataran Tinggi Kabupaten Gowa Tahun 2017**

Umur	Jumlah (n)	Persen (%)
11-20 tahun	9	15.8
21-30 tahun	8	14.0
31-40 tahun	9	15.8
41-50 tahun	13	22.8
> 50 tahun	18	31.6
<b>Total</b>	<b>57</b>	<b>100.0</b>

*Sumber: Data Primer 2017*

Berdasarkan tabel di atas, tingkat kelompok umur tertinggi adalah kelompok umur > 50 tahun sebanyak 18 orang (31.6%) dan kelompok umur terendah adalah 21-30 tahun sebanyak 8 orang (14.0%).

## d. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

**Tabel 4.4**  
**Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan**  
**di Daerah Dataran Tinggi Kabupaten Gowa Tahun 2017**

<b>Tingkat pendidikan</b>	<b>Jumlah (n)</b>	<b>Persen (%)</b>
Tidak Sekolah	13	22.8
Tidak tamat SD/ sederajat	11	19.3
Tamat SD/ sederajat	17	29.8
Tamat SMP/ sederajat	6	10.5
Tamat SMA/ sederajat	9	15.8
Strata 1	1	1.8
<b>Total</b>	<b>57</b>	<b>100.0</b>

*Sumber: Data Primer 2017*

Berdasarkan tabel di atas, tingkat pendidikan responden tertinggi adalah tamat SD/ sederajat sebanyak 17 orang (29.8%) dan terendah adalah tamatan Strata 1 sebanyak 1 orang (1.8%).

## e. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

**Tabel 4.5**  
**Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan**  
**di Daerah Dataran Tinggi Kabupaten Gowa Tahun 2017**

<b>Jenis Pekerjaan</b>	<b>Jumlah (n)</b>	<b>Persen (%)</b>
IRT	14	24.6
Petani	18	31.6
PNS	3	5.3
Pelajar	6	10.5
Penjaga tambang	1	1.8
Supir	3	5.3
Buruh bangunan	1	1.8
Tidak Ada	11	19.3
<b>Total</b>	<b>57</b>	<b>100.0</b>

*Sumber: Data Primer 2017*

Berdasarkan tabel di atas, jenis pekerjaan responden tertinggi adalah petani sebanyak 18 orang (31.6%) dan terendah adalah penjaga tambang dan buruh bangunan sebanyak masing-masing 1 orang (1.8%).



## 2. Kondisi Lingkungan Fisik Rumah Responden

### a. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Rumah

**Tabel 4.6**  
**Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Rumah**  
**di Daerah Dataran Tinggi Kabupaten Gowa Tahun 2017**

Jenis rumah	Jumlah (n)	Persen (%)
Non permanen	24	42.1
Semi permanen	7	12.3
Permanen	26	45.6
<b>Total</b>	<b>57</b>	<b>100.0</b>

Sumber: Data Primer 2017

Berdasarkan tabel di atas, jenis rumah responden tertinggi adalah rumah permanen sebanyak 26 rumah (45.6%) dan terendah adalah jenis rumah semi permanen sebanyak 7 rumah (12.3%).

### b. Suhu


**Tabel 4.7**  
**Distribusi Responden Berdasarkan Suhu Rumah**  
**di Daerah Dataran Tinggi Kabupaten Gowa Tahun 2017**

Suhu	Jumlah (n)	Persen (%)
Memenuhi syarat	43	75.4
Tidak memenuhi syarat	14	24.6
<b>Total</b>	<b>57</b>	<b>100.0</b>

Sumber: Data Primer 2017

Berdasarkan tabel di atas, suhu rumah responden yang memenuhi syarat sebanyak 43 rumah (75.4%) dan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 14 rumah (24.6%).

Berdasarkan data di atas, distribusi spasial kejadian tuberkulosis berdasarkan suhu rumah penderita tuberkulosis di daerah dataran tinggi Kabupaten Gowa tahun 2017 dapat dilihat pada gambar 4.4 di bawah ini:



Sumber: Data Primer 2017

Gambar 4.1 Peta penyebaran tuberkulosis berdasarkan suhu rumah penderita tuberkulosis

Distribusi spasial kejadian tuberkulosis berdasarkan suhu rumah penderita tuberkulosis di daerah dataran tinggi Kabupaten Gowa tahun 2017 tersebar di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong dan Tombolopao. Dari gambar di atas diketahui bahwa suhu rumah yang memenuhi syarat terbanyak terdapat di Kecamatan Tombolopao.

c. Kelembaban


**Tabel 4.8**  
**Distribusi Responden Berdasarkan Kelembaban**  
**di Daerah Dataran Tinggi Kabupaten Gowa Tahun 2017**

<b>Kelembaban</b>	<b>Jumlah (n)</b>	<b>Persen (%)</b>
Memenuhi syarat	17	29.8
Tidak memenuhi syarat	40	70.2
<b>Total</b>	<b>57</b>	<b>100.0</b>

*Sumber: Data Primer 2017*

Berdasarkan tabel di atas, kelembaban rumah responden yang memenuhi syarat sebanyak 17 rumah (29.8%) dan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 40 rumah (70.2%).

Berdasarkan data di atas, distribusi spasial kejadian tuberkulosis berdasarkan kelembaban rumah penderita tuberkulosis di daerah dataran tinggi Kabupaten Gowa tahun 2017 dapat dilihat pada gambar 4.5 di bawah ini:



Sumber: Data Primer 2017

Gambar 4.2 Peta penyebaran tuberkulosis berdasarkan kelembapan rumah penderita tuberkulosis

Distribusi spasial kejadian tuberkulosis berdasarkan kelembaban rumah penderita tuberkulosis di daerah dataran tinggi Kabupaten Gowa tahun 2017 tersebar di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong dan Tombolopao. Dari gambar di atas diketahui bahwa kelembaban rumah yang tidak memenuhi syarat terbanyak terdapat di Kecamatan Tombolopao.

d. Luas Ventilasi


**Tabel 4.9**  
**Distribusi Responden Berdasarkan Kelembaban**  
**di Daerah Dataran Tinggi Kabupaten Gowa Tahun 2017**

<b>Luas ventilasi</b>	<b>Jumlah (n)</b>	<b>Persen (%)</b>
Memenuhi syarat	11	19.3
Tidak memenuhi syarat	46	80.7
<b>Total</b>	<b>57</b>	<b>100.0</b>

*Sumber: Data Primer 2017*

Berdasarkan tabel di atas, luas ventilasi rumah responden yang memenuhi syarat sebanyak 11 rumah (19.3%) dan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 46 rumah (80.7%).

Berdasarkan data di atas, distribusi spasial kejadian tuberkulosis berdasarkan luas ventilasi rumah penderita tuberkulosis di daerah dataran tinggi Kabupaten Gowa tahun 2017 dapat dilihat pada gambar 4.6 di bawah ini:



*Sumber: Data Primer 2017*

Gambar 4.3 Peta penyebaran tuberkulosis berdasarkan luas ventilasi rumah penderita tuberkulosis

Distribusi spasial kejadian tuberkulosis berdasarkan luas ventilasi rumah penderita tuberkulosis di daerah dataran tinggi Kabupaten Gowa tahun 2017 tersebar di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong dan Tombolopao.

Dari gambar di atas diketahui bahwa luas ventilasi rumah yang tidak memenuhi syarat terbanyak terdapat di Kecamatan Tombolopao.

e. Kepadatan Hunian

**Tabel 4.10**  
**Distribusi Responden Berdasarkan Kepadatan Hunian**  
**di Daerah Dataran Tinggi Kabupaten Gowa Tahun 2017**


<b>Kepadatan hunian</b>	<b>Jumlah (n)</b>	<b>Persen (%)</b>
Memenuhi syarat	50	87.7
Tidak memenuhi syarat	7	12.3
<b>Total</b>	<b>57</b>	<b>100.0</b>

*Sumber: Data Primer 2017*

Berdasarkan tabel di atas, kepadatan hunian rumah responden yang memenuhi syarat sebanyak 50 rumah (87.7%) dan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 7 rumah (12.3%).

Berdasarkan data di atas, distribusi spasial kejadian tuberkulosis berdasarkan suhu rumah penderita tuberkulosis di daerah dataran tinggi Kabupaten Gowa tahun 2017 dapat dilihat pada gambar 4.7 di bawah ini:

UNIVERSITAS NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R



Sumber: Data Primer 2017

Gambar 4.4 Peta penyebaran tuberkulosis berdasarkan kepadatan hunian rumah penderita tuberkulosis

Distribusi spasial kejadian tuberkulosis berdasarkan kepadatan hunian rumah penderita tuberkulosis di daerah dataran tinggi Kabupaten Gowa tahun 2017 tersebar di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong dan Tombolopao.



Dari gambar di atas diketahui bahwa kepadatan hunian rumah yang memenuhi syarat terbanyak terdapat di Kecamatan Tombolopao.

f. Kondisi Lantai

**Tabel 4.11**  
**Distribusi Responden Berdasarkan Kondisi Lantai**  
**di Daerah Dataran Tinggi Kabupaten Gowa Tahun 2017**


<b>Kondisi Lantai</b>	<b>Jumlah (n)</b>	<b>Persen (%)</b>
Memenuhi syarat	22	38.6
Tidak memenuhi syarat	35	61.4
<b>Total</b>	<b>57</b>	<b>100.0</b>

*Sumber: Data Primer 2017*

Berdasarkan tabel di atas, kondisi lantai rumah responden yang memenuhi syarat sebanyak 22 rumah (38.6%) dan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 35 rumah (61.4%).

Berdasarkan data di atas, distribusi spasial kejadian tuberkulosis berdasarkan kondisi lantai rumah penderita tuberkulosis di daerah dataran tinggi Kabupaten Gowa tahun 2017 dapat dilihat pada gambar 4.8 di bawah ini:

UNIVERSITAS ALAUDDIN  
KABUPATEN GOWA  
REGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R



Sumber: Data Primer 2017

Gambar 4.5 Peta penyebaran tuberkulosis berdasarkan kondisi lantai rumah penderita tuberkulosis

Distribusi spasial kejadian tuberkulosis berdasarkan kondisi lantai rumah penderita tuberkulosis di daerah dataran tinggi Kabupaten Gowa tahun 2017 tersebar di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong dan Tombolopao.

Dari gambar di atas diketahui bahwa kondisi lantai rumah yang tidak memenuhi syarat terbanyak di Kecamatan Tombolopao.

g. Kondisi Dinding

**Tabel 4.12**  
**Distribusi Responden Berdasarkan Kondisi Dinding**  
**di Daerah Dataran Tinggi Kabupaten Gowa Tahun 2017**


<b>Kondisi Dinding</b>	<b>Jumlah (n)</b>	<b>Persen (%)</b>
Memenuhi syarat	21	36.8
Tidak memenuhi syarat	36	63.2
<b>Total</b>	<b>57</b>	<b>100.0</b>

*Sumber: Data Primer 2017*

Berdasarkan tabel di atas, kondisi dinding rumah responden yang memenuhi syarat sebanyak 21 rumah (36.8%) dan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 36 rumah (63.2%).

Berdasarkan data di atas, distribusi spasial kejadian tuberkulosis berdasarkan kondisi dinding rumah penderita tuberkulosis di daerah dataran tinggi Kabupaten Gowa tahun 2017 dapat dilihat pada gambar 4.6 di bawah ini:

**ALA UDDIN**  
M A K A S S A R




Sumber: Data Primer 2017

Gambar 4.6 Peta penyebaran tuberkulosis berdasarkan kondisi dinding rumah penderita tuberkulosis

Distribusi spasial kejadian tuberkulosis berdasarkan kondisi dinding rumah penderita tuberkulosis di daerah dataran tinggi Kabupaten Gowa tahun 2017 tersebar di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong dan Tombolopao.

Dari gambar di atas diketahui bahwa kondisi dinding rumah yang tidak memenuhi syarat terbanyak di Kecamatan Tombolopao.

Berdasarkan enam gambar di atas dapat disimpulkan bahwa dari 57 rumah responden, persentase rumah responden yang memenuhi syarat dapat dilihat pada gambar berikut ini:



*Sumber: Data Primer 2017*

Gambar 4.7 Peta penyebaran tuberkulosis berdasarkan syarat rumah sehat

Berdasarkan gambar di atas, terdapat tujuh tingkatan kondisi fisik rumah yaitu 0% yang berarti tidak ada variabel yang memenuhi syarat, 25% yang berarti terdapat satu variabel yang memenuhi syarat, 40% berarti terdapat dua variabel yang memenuhi syarat, 55% yang berarti terdapat empat variabel yang memenuhi syarat, 70% yang berarti terdapat tiga variabel yang memenuhi syarat, 85% yang berarti terdapat lima variabel yang memenuhi syarat, dan 100% yang berarti semua variabel memenuhi syarat. Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa rumah yang memenuhi syarat rumah sehat tertinggi sebanyak 40% yaitu 18 rumah.

### 3. Jenis Kasus, Akses Ke Pelayanan Kesehatan, Jarak Rumah Responden dengan PMO, dan Ketinggian Wilayah

#### a. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kasus

**Tabel 4.13**  
**Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kasus**  
**di Daerah Dataran Tinggi Kabupaten Gowa Tahun 2017**

Jenis kasus	Jumlah (n)	Persen (%)
Baru	54	94.7
Putus berobat	1	1.8
Kambuh	2	3.5
<b>Total</b>	<b>57</b>	<b>100.0</b>

*Sumber: Data Primer 2017*

Berdasarkan tabel di atas, jenis kasus tertinggi adalah kasus baru sebanyak 54 kasus (94.7%) dan terendah adalah jenis kasus putus berobat sebanyak 1 orang (1.8%).

- b. Karakteristik Responden Berdasarkan Jarak Rumah Responden dari Puskesmas

**Tabel 4.14**  
**Distribusi Responden Berdasarkan**  
**Jarak Rumah Responden dari Puskesmas**  
**di Daerah Dataran Tinggi Kabupaten Gowa Tahun 2017**


Jarak rumah responden dari puskesmas	Jumlah (n)	Persen (%)
Jauh	33	57.9
Dekat	24	42.1
<b>Total</b>	<b>57</b>	<b>100.0</b>

*Sumber: Data Primer 2017*

Berdasarkan tabel di atas, jarak rumah responden yang jauh dari puskesmas sebanyak 33 orang (57.9%) dan jarak rumah responden yang dekat sebanyak 24 orang (42.1%).

Berdasarkan data di atas, analisis buffer akses dari rumah penderita tuberkulosis ke pelayanan kesehatan di daerah dataran tinggi Kabupaten Gowa dapat dilihat pada gambar 4.8 di bawah ini:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
 M A K A S S A R



*Sumber: Data Primer 2017*

Gambar 4.8 Peta penyebaran tuberkulosis berdasarkan akses ke pelayanan kesehatan

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa kejadian tuberkulosis analisis *buffer*, penderita tuberkulosis yang tinggal dalam radius 3 km dari pelayanan kesehatan atau puskesmas sebanyak 24 rumah.



- c. Karakteristik Responden Berdasarkan Jarak Rumah Responden dengan Rumah PMO

**Tabel 4.15**  
**Distribusi Responden Berdasarkan**  
**Jarak Rumah Responden dengan Rumah PMO**  
**di Daerah Dataran Tinggi Kabupaten Gowa Tahun 2017**

Jarak rumah responden dengan rumah PMO	Jumlah (n)	Persen (%)
Jauh	3	5.3
Dekat	54	94.7
<b>Total</b>	<b>57</b>	<b>100.0</b>

*Sumber: Data Primer 2017*

Berdasarkan tabel di atas, jarak rumah responden yang jauh dengan rumah PMO sebanyak 3 orang (5.3%) dan jarak rumah responden yang dekat dengan rumah PMO sebanyak 54 orang (94.7%).

- d. Karakteristik Responden Berdasarkan Ketinggian Wilayah Tempat Tinggal


**Tabel 4.16**  
**Distribusi Responden**  
**Berdasarkan Ketinggian Wilayah Tempat Tinggal**  
**di Daerah Dataran Tinggi Kabupaten Gowa Tahun 2017**

Ketinggian Wilayah Tempat Tinggal	Jumlah (n)	Persen (%)
<200	14	24.6
≥200	43	75.4
<b>Total</b>	<b>57</b>	<b>100.0</b>

*Sumber: Data Primer 2017*

Berdasarkan tabel di atas, ketinggian wilayah tempat tinggal responden yang >200 mdpl sebanyak 43 orang (75.4%) dan responden yang tinggal dengan ketinggian <200 mdpl sebanyak 14 orang (24.6%).

Berdasarkan data di atas, analisis spasial berdasarkan ketinggian wilayah tempat tinggal penderita tuberkulosis di daerah dataran tinggi Kabupaten Gowa dapat dilihat pada gambar 4.9 di bawah ini:



*Sumber: Data Primer 2017*

Gambar 4.9 Peta penyebaran tuberkulosis berdasarkan ketinggian wilayah

Bedasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa penderita tuberkulosis ditemukan lebih banyak pada ketinggian 1.000-2000 m dpl.

### C. Pembahasan

Tuberkulosis masih menjadi salah satu penyakit menular paling mematikan di dunia. Tuberkulosis merupakan penyakit infeksi yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat. Tuberkulosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri berbentuk batang (basil) yang dikenal dengan nama *Mycobacterium tuberculosis*. Penularan penyakit tuberkulosis terjadi melalui udara yang mengandung basil *tuberculosis* dalam percikan ludah yang dikeluarkan oleh penderita tuberkulosis pada waktu penderita batuk atau bersin (Kunoli, 2012).

Menurut H.L Blum, ada 4 faktor yang dapat mempengaruhi derajat kesehatan baik individu, kelompok, maupun masyarakat yaitu lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan dan keturunan. Keempat faktor tersebut saling berkaitan dalam mempengaruhi kesehatan (Notoatmodjo, 2010).

Di dalam ajaran agama Islam, kita dianjurkan agar menutup mulut dengan kain atau tangan pada saat bersin.

Hal ini sesuai dengan hadist Rasulullah SAW yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَطَسَ وَضَعَ يَدَهُ أَوْ ثَوْبَهُ  
عَلَى فِيهِ وَخَفَضَ أَوْ غَضَّ بِهَا صَوْتَهُ شَكَّ يَجِي

Artinya:

*Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: "Jika Rasulullah SAW bersin, maka beliau meletakkan tangannya (atau pakaiannya) di atas mulutnya, kemudian beliau merendahkan (menutup) suaranya." (H.R. Tirmidzi).*

Dengan menutup mulut, bakteri seperti *Mycobacterium tuberculosis* yang ikut keluar pada saat kita bersin tidak akan dapat berpindah atau menular kepada orang lain sehingga orang yang berada di sekitar kita terhindar penyakit. Pada saat bersin, tubuh berusaha untuk mengeluarkan benda-benda yang dapat menyebabkan iritasi seperti bakteri, virus dan mikroba lain yang berasal dari saluran pernapasan yang keluar melalui mulut dan hidung bersama butiran-butiran air yang berukuran sangat kecil (diameternya antara 0,5 hingga 5  $\mu\text{m}$ ), sekitar 40.000 butir air seperti itu dapat dihasilkan dalam sekali bersin (Ubaidah, 2014). Pada saat penderita tuberkulosis bersin, maka butiran-butiran air yang mengandung bakteri *Mycobacterium tuberculosis* keluar dan akan bercampur dengan udara sehingga dapat dihirup oleh orang yang sehat. Dengan demikian orang dapat terinfeksi penyakit tuberkulosis.

Berikut gambaran mengenai karakteristik responden dan kondisi fisik lingkungan rumah responden.

## 1. Karakteristik Responden

### a. Lokasi dan Jumlah Responden

Jumlah penderita tuberkulosis di wilayah kerja Puskesmas Parangloe sebanyak 20 orang, Puskesmas Tinggimoncong sebanyak 8 orang dan Puskesmas Tamaona sebanyak 29 orang. Jadi jumlah penderita tuberkulosis yang menjadi responden sebanyak 57 orang.

### b. Jenis Kelamin

Berdasarkan hasil penelitian, responden yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak yaitu 33 orang (57.9%) dibandingkan responden yang berjenis kelamin perempuan yaitu 24 orang (42.1%). Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fahreza, Waluyo, dan Novitasari (2012) di Balai Kesehatan Paru Masyarakat Semarang yang menunjukkan bahwa jumlah penderita TB Paru BTA positif pada pria lebih banyak dibandingkan pada wanita (56,2%).

Menurut jenis kelamin, kasus BTA+ pada laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan yaitu hampir 1,5 kali dibandingkan kasus BTA+ pada perempuan. Pada masing-masing provinsi di seluruh Indonesia kasus BTA+ lebih banyak terjadi pada laki-laki dibandingkan perempuan. Laki-laki berisiko lebih besar untuk terkena penyakit TB paru dibandingkan dengan perempuan. Dimana laki-laki lebih banyak yang merokok dan minum alkohol dibandingkan dengan perempuan. Merokok dan alkohol dapat menurunkan imunitas tubuh sehingga lebih mudah terkena penyakit TB paru (Ruswanto, 2010). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Lalombo, Palandeng, dan Kallo (2015) yang menyatakan bahwa ada hubungan yang

bermakna antara kebiasaan merokok dengan kejadian tuberkulosis paru. Namun penelitian lain menyatakan bahwa tidak ada hubungan yang bermakna antara jenis kelamin dengan kejadian TB paru BTA positif nilai  $OR > 1$  (Sumarmi dan Duarsa 2014).

c. Umur

Berdasarkan umur responden, tingkat kelompok umur tertinggi yang menderita tuberkulosis adalah kelompok umur  $> 50$  tahun sebanyak 18 orang (31.6%). Hal ini disebabkan oleh seseorang yang telah berusia  $> 50$  tahun akan mengalami penurunan sistem imunologis, sehingga sangat rentan terpapar dengan *Mycobacterium tuberculosis*. Penelitian ini sejalan dengan penelitian di Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara yang memperoleh hasil responden paling banyak berada pada kelompok umur  $\leq 55$  tahun dengan kelompok kasus sebesar 32,7% dan kelompok kontrol sebesar 32,7% (Bawole, Rattu, dan Posangi 2014).

Penelitian yang juga dilakukan oleh Kurniasari, Suhartono dan Cahyo (2012) di Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri menunjukkan bahwa golongan umur responden yang paling banyak adalah kelompok umur 56 tahun - 65 tahun dengan persentase sebesar 32,4%. Namun hasil penelitian tersebut tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fahreza, Waluyo dan Novitasari (2012) di Balai Kesehatan Paru Masyarakat Semarang menunjukkan bahwa pada kelompok BTA positif umur responden yang paling banyak adalah 20-30 tahun.

#### d. Tingkat Pendidikan

Berdasarkan hasil penelitian, tingkat pendidikan responden tertinggi adalah tamatan SD/ sederajat yaitu sebanyak 17 orang (29.8%). Menurut penelitian Sumarmi dan Duarsa (2014) di Puskesmas Kotabumi II, Bukit Kemuning dan Ulak Rengas Kab. Lampung Utara menunjukkan bahwa ada perbedaan proporsi kejadian TB Paru BTA positif antara penderita yang berpendidikan rendah dengan penderita yang berpendidikan tinggi. Hasil ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Notoadmojo (2007) yang berpendapat tingkat pendidikan akan mempengaruhi pengetahuan seseorang karena orang yang berpendidikan tinggi biasanya akan lebih mudah menerima informasi atau pengetahuan. Responden yang berpendidikan tinggi lebih perhatian kepada kesehatannya dibandingkan dengan yang berpendidikan rendah. Responden yang berpendidikan tinggi memiliki tingkat pengetahuan yang lebih luas sehingga lebih peduli dengan masalah kesehatannya terutama ketika merasakan ada tanda atau gejala sakit akan segera memeriksakan kesehatannya.

#### e. Pekerjaan

Jenis pekerjaan yang paling banyak adalah petani yaitu sebanyak 18 orang (31.6%). Sebagian besar penderita TB adalah bekerja dan jenis pekerjaan yang terbanyak adalah sebagai petani. Jenis pekerjaan sebagai petani mempunyai resiko lebih tinggi untuk terkena TB paru (Hadifah et al. 2017). Tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan sangat mempengaruhi terjadinya kasus tuberkulosis atau keberhasilan pengobatan. Status sosial ekonomi keluarga diukur dari jenis rumah, keadaan rumah, kepadatan penghuni per kamar, status pekerjaan dan harta kepemilikan (Ruswanto, 2010). Pekerjaan erat kaitannya dengan penghasilan atau pendapatan keluarga yang

secara langsung akan berpengaruh pada tingkat ekonomi keluarga. Semakin rendah tingkat ekonomi keluarga semakin rendah pula kemampuan untuk pemenuhan baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier termasuk didalamnya penyediaan makanan yang bergizi, lingkungan rumah yang sehat dan pemeliharaan status kesehatan sehingga bila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi akan dapat menurunkan status kesehatan dimana daya tahan tubuh akan menjadi turun sehingga mudah terserang penyakit seperti tuberkulosis (Sumarmi dan Duarsa, 2014).

## **2. Kondisi Fisik Lingkungan Rumah**

### **a. Jenis Rumah**

Jenis rumah responden tertinggi adalah rumah permanen sebanyak 26 rumah (45.6%). Namun tidak sedikit pula responden yang memiliki jenis rumah non permanen yaitu 24 rumah (42.1%). Masih banyaknya penderita tuberkulosis yang memiliki rumah non permanen menyebabkan beberapa faktor lingkungan fisik rumah tidak memenuhi syarat. Jenis rumah dan kondisi rumah juga sangat berhubungan dengan keadaan sosial ekonomi penderita tuberkulosis. Hubungan antara kemiskinan dengan penyakit tuberkulosis bersifat timbal balik. Artinya tuberkulosis merupakan penyebab kemiskinan dan karena miskin sehingga manusia menderita tuberkulosis. Kondisi sosial ekonomi itu sendiri tidak hanya berhubungan secara langsung, namun dapat merupakan penyebab tidak langsung seperti adanya kondisi gizi memburuk, perumahan yang tidak sehat, dan kemampuan mengakses pelayanan kesehatan juga menurun. Hal ini sejalan dengan Achmadi (2005) yang menyebutkan bahwa 90% penderita TB di dunia menyerang kelompok dengan kondisi sosial ekonomi rendah atau miskin. Menurut perhitungan rata-rata penderita tuberkulosis kehilangan 3



sampai 4 bulan waktu kerja dalam setahun, dan juga kehilangan penghasilan setahun secara total mencapai 30% dari pendapatan rumah tangga (Ruswanto, 2010).

b. Suhu

Kenyamanan suatu ruangan disamping ditentukan oleh konsentrasi pencemar udara juga tergantung pada suhu udara. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.829/Menkes/SK/VII/1999 tentang persyaratan kesehatan perumahan, suhu dinyatakan memenuhi syarat jika suhu di dalam rumah berkisar 18-30°C. Suhu tersebut dipengaruhi oleh suhu udara luar, pergerakan udara dan kelembaban udara dalam ruangan. Berdasarkan hasil penelitian, suhu rumah responden yang memenuhi syarat sebanyak 43 rumah (75.4%) dan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 14 rumah (24.6%). Hasil pengukuran suhu tertinggi yaitu 32.8 °C sedangkan suhu terendah yaitu 19.5 °C. Suhu dipengaruhi oleh jenis rumah yang ditempati oleh responden. Tingginya suhu rumah responden dipengaruhi oleh kondisi geografis rumah responden. Dimana semua responden tinggal di daerah dataran tinggi sehingga suhu relatif rendah meskipun dari hasil pengukuran suhu di dalam rumah responden tidak ada yang kurang dari 18°C.

Daerah dataran tinggi memiliki suhu yang lebih rendah karena dataran tinggi berada lebih dekat dengan lapisan atmosfer sehingga menyebabkan tekanan udara menjadi tinggi. Semakin dekat dengan permukaan laut udara akan semakin rapat dan semakin jauh dari permukaan laut kerapatan semakin renggang karena massa udara dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Udara yang massanya rapat akan menyerap panas matahari lebih banyak dari pada yang massanya sedikit. Sebagian besar radiasi

matahari lebih banyak diabsorpsi untuk pertumbuhan tanaman dan digunakan untuk proses transportasi (pelepasan molekul air oleh tanaman ke atmosfer). Hal ini juga dapat menyebabkan suhu udara menjadi lebih rendah karena transfer energi yang digunakan untuk meningkatkan suhu lebih banyak digunakan untuk transportasi dan penguapan air dari tanah dan badan-badan air seperti danau dan sungai (Nurdin, Warsito, dan Nursa'ban 2008).

Bakteri *Mycobacterium tuberculosis* memiliki rentang suhu yang disukai, tetapi dalam rentang ini terdapat suatu suhu optimum saat mereka tumbuh pesat. *Mycobacterium tuberculosis* merupakan bakteri mesofilik yang tumbuh dalam rentang suhu 25-40 °C, akan tetapi akan tumbuh secara optimal pada suhu 31-37°C. Suhu optimal pertumbuhan bakteri sangat bervariasi, ada yang tumbuh pada suhu yang rendah (15°C - 20°C), bahkan ada pula yang tumbuh pada suhu yang tinggi. Kuman *Mycobacterium tuberculosis* tumbuh optimal pada suhu sekitar 37°C yang memang kebetulan sesuai dengan suhu tubuh manusia (Gould dan Brooker, 2003).

Adapun suhu di dalam rumah responden yang tidak memenuhi syarat dipengaruhi oleh kondisi rumah responden yang menggunakan atap seng dan dinding rumah juga ada yang terbuat dari seng, sebagian dari kayu dan bambu. Atap dan dinding rumah yang terbuat dari seng akan menambah panas ruangan karena sinar matahari yang diterima oleh atap dan dinding seng hanya sebagian yang dipantulkan dan lebih banyak yang diserap (Nurdin, Warsito, dan Nursa'ban, 2008).

Pada penelitian ini, rumah-rumah responden suhunya bervariasi. Berdasarkan hasil observasi peneliti, suhu ruangan dipengaruhi oleh keadaan ventilasi dan jendela

yang ditutup sehingga mempengaruhi pergerakan udara yang masuk ke dalam ruangan tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bawole, Rattu, dan Posangi (2014) menunjukkan bahwa suhu ruangan memiliki hubungan yang signifikan dengan kejadian tuberkulosis paru di Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara. Hasil ini menunjukkan bahwa suhu ruangan yang tidak memenuhi syarat akan mendukung kejadian tuberkulosis. Penelitian yang dilakukan Pratama, Budiarti, dan Lestari (2013) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara suhu ruangan di dalam rumah dengan kejadian TB paru dan orang yang tinggal pada rumah dengan suhu yang tidak memenuhi syarat memiliki resiko 4,750 kali lebih besar menderita TB (Pratama, Budiarti, dan Lestari, 2013).

#### c. Kelembaban

Salah satu persyaratan keadaan udara dalam ruangan adalah kondisi kelembaban. Kelembaban udara adalah konsentrasi uap air di udara. Kelembaban dalam rumah dapat mempermudah berkembangbiaknya mikroorganisme. Mikroorganisme tersebut dapat masuk ke dalam tubuh melalui udara. Selain itu kelembaban yang tinggi dapat menyebabkan membran mukosa hidung menjadi kering sehingga kurang efektif dalam menghadang mikroorganisme (Notoatmodjo, 2007).

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.829/Menkes/SK/VII/1999 tentang persyaratan kesehatan perumahan dinyatakan bahwa kelembaban yang memenuhi syarat kesehatan yaitu 40-70%. Berdasarkan hasil penelitian, kelembaban rumah responden yang memenuhi syarat sebanyak 17

rumah (29.8%) dan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 40 rumah (70.2%). Jumlah rumah yang memiliki kelembaban tidak memenuhi syarat lebih banyak dibandingkan rumah yang memiliki kelembaban memenuhi syarat. Hal ini disebabkan oleh lokasi rumah responden yang berada di daerah dataran tinggi dengan kelembaban terendah yaitu 57% dan tertinggi 90%. Tingginya kelembaban di daerah dataran tinggi sangat mendukung perkembangbiakan bakteri *Mycobacterium tuberculosis*.

Tinggi rendahnya kelembaban udara di suatu tempat sangat bergantung pada beberapa faktor yaitu suhu, tekanan udara, pergerakan angin, kuantitas dan kualitas penyinaran, vegetasi dan ketersediaan air di tempat tersebut. Daerah yang memiliki suhu udara yang tinggi memiliki kelembaban udara yang rendah karena suhu udara yang tinggi dapat mempercepat penguapan air di suatu tempat sehingga uap air yang terkandung di tempat tersebut sangat sedikit, begitu pula pada daerah yang memiliki suhu rendah pasti memiliki kelembaban yang tinggi. Semakin banyak vegetasi suatu daerah maka semakin tinggi kelembaban tempat tersebut (Nurdin, Warsito, dan Nursa'ban, 2008).

Bakteri *Mycobacterium tuberculosis* seperti halnya bakteri lain, akan tumbuh dengan subur pada lingkungan dengan kelembaban tinggi karena air membentuk lebih dari 80 % volume sel bakteri dan merupakan hal yang esensial untuk pertumbuhan dan kelangsungan hidup sel bakteri (Gould dan Brooker, 2003). Selain itu kelembaban udara yang meningkat merupakan media yang baik untuk bakteri-bakteri patogen termasuk bakteri tuberkulosis (Notoatmodjo, 2007).

Kelembaban yang tinggi juga dipengaruhi oleh banyaknya lantai rumah responden yang tidak kedap air. Kelembaban rumah dapat disebabkan oleh air yang naik dari tanah (*rising damp*) kemudian merembes ke dinding (*percolating damp*), dan bocor melalui atap (*roof leaks*), kelembaban yang terlalu tinggi dapat menyebabkan lantai dan dinding selalu basah. Kelembaban rumah yang tidak memenuhi syarat 5,636 kali beresiko lebih tinggi dibandingkan dengan kelembaban yang memenuhi syarat. Lantai rumah yang kurang dengan kondisi rumah dalam kelembaban yang tidak memenuhi syarat, akan menyebabkan bakteri akan mudah berkembang biak dan viabilitas yang lebih lama. Kelembaban dalam rumah akan jadi mempermudah untuk berkembangbiaknya mikroorganisme antara lain bakteri, spiroket, riketsia dan virus. Mikroorganisme tersebut dapat masuk dalam tubuh melalui udara, selain itu kelembaban yang tinggi dapat menyebabkan membran mukosa hidung menjadi kering sehingga kurang efektif dalam menghadang mikroorganisme. Kelembaban ruangan yang tinggi akan menjadi media yang baik untuk tumbuh dan berkembangbiaknya bakteri-bakteri patogen termasuk kuman tuberkulosis (Budi dan Tuntun, 2016).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bawole, Rattu, dan Posangi (2014) menunjukkan bahwa kelembaban memiliki hubungan yang signifikan dengan kejadian tuberkulosis paru di kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara. Penelitian di atas tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniasari, Suhartono, dan Cahyo (2012) yang menyatakan kelembaban tidak berhubungan dengan kejadian tuberkulosis.

#### d. Luas Ventilasi

Secara umum, penilaian ventilasi rumah dengan cara membandingkan antara luas ventilasi dan luas lantai rumah, dengan menggunakan *role meter*. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.829/Menkes/SK/VII/1999 tentang persyaratan kesehatan perumahan, luas ventilasi yang memenuhi syarat yaitu  $\geq 10\%$  dari luas lantai rumah. Ventilasi rumah merupakan jalan masuk dan keluarnya udara agar udara dalam suatu ruangan selalu segar.

Dalam Q.S al-A'raf/7:57 juga dijelaskan bahwa angin sebagai pembawa berita gembira, biasanya jika al-Quran menggunakan bentuk jamak, angin yang dimaksud adalah angin yang membawa rahmat dalam pengertian umum, baik hujan maupun kesegaran (Shihab, 2009). Sebagaimana dijelaskan dalam Surah Al-A'raf/7:57 yang berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ...

Terjemahnya:

“Dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan)” (Departemen Agama RI, 2009).

Allah SWT memberikan nikmatnya melalui angin yang membawa kesegaran bagi setiap manusia. Seperti halnya rumah yang memiliki ventilasi yang memenuhi syarat, dalam hal ini lubang angin dan jendela yang dapat menjadi jalan masuknya

udara yang segar serta menjadi jalan keluar untuk udara yang tercemar sehingga penghuni rumah dapat menghirup udara yang segar dan tidak mengandung bakteri penyebab penyakit seperti *Mycobacterium tuberculosis*.

Berdasarkan kajian integrasi keislaman dan hasil penelitian dapat diketahui bahwa isi dari al-Quran dan hadist adalah benar dan sejalan dengan ilmu pengetahuan jika dikaji lebih dalam. Oleh karena itu, hendaklah kita mengkaji lebih dalam isi dan makna dari kitab al-Quran dan hadist agar kita lebih memahami kebesaran Allah swt dalam kehidupan kita.

Berdasarkan hasil penelitian, luas ventilasi rumah responden yang memenuhi syarat sebanyak 11 rumah (19.3%) dan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 46 rumah (80.7%). Terdapat beberapa rumah yang tidak memiliki jendela. Adapun rumah responden sebagian besar ventilasi rumah berukuran kecil dan dibiarkan selalu tertutup serta tidak dibiasakan untuk membuka jendela setiap pagi, sehingga sebagian besar jendela pada rumah responden bukan termasuk ventilasi. Rumah non permanen yang tidak memiliki jendela memasang dinding rumah dengan jarak yang cukup berjauhan sehingga udara tetap bisa masuk ke dalam rumah. Akan tetapi, pertukaran udara tidak dapat terjadi dengan baik karena sekat atau lubang udara yang berasal dari jarak papan dinding rumah sangat sedikit. Kurangnya ventilasi akan menyebabkan kurangnya kadar oksigen, bertambahnya kelembaban udara di dalam ruangan. Selain itu, suhu yang dingin menyebabkan ventilasi rumah di daerah dataran tinggi berukuran lebih kecil. Masyarakat membuat ventilasi yang berukuran kecil agar udara dingin tidak banyak masuk ke rumah. Bahan atap rumah menggunakan

seng agar panas matahari yang diterima dapat disimpan dan dapat menghangatkan bagian dalamnya.

Luas ventilasi rumah yang <10 % dari luas lantai (tidak memenuhi syarat kesehatan) akan mengakibatkan berkurangnya konsentrasi oksigen dan bertambahnya konsentrasi karbondioksida yang bersifat racun bagi penghuninya. Disamping itu, tidak cukupnya ventilasi akan menyebabkan peningkatan kelembaban ruangan karena terjadinya proses penguapan cairan dari kulit. Kelembaban ruangan yang tinggi akan menjadi media yang baik untuk tumbuh dan berkembangbiaknya bakteri-bakteri patogen termasuk kuman tuberkulosis (Susanti, 2016).

Salah satu fungsi ventilasi adalah untuk membebaskan udara ruangan dari bakteri-bakteri terutama bakteri patogen seperti *Mycobacterium tuberculosis*. Aliran udara yang terjadi terus menerus menyebabkan bakteri yang terbawa oleh udara akan selalu mengalir (Notoatmodjo, 2007). Selain itu, luas ventilasi yang tidak memenuhi syarat kesehatan akan mengakibatkan terhalangnya proses pertukaran aliran udara dan sinar matahari yang masuk ke dalam rumah, akibatnya kuman tuberkulosis yang ada di dalam rumah tidak dapat keluar dan ikut terhisap bersama udara pernafasan. Ventilasi juga dapat merupakan tempat untuk memasukkan cahaya ultra violet, hal ini akan semakin baik apabila konstruksi rumah menggunakan genteng kaca, maka hal ini merupakan kombinasi yang baik. Paparan sinar matahari selama 5 menit dapat membunuh *Mycobacterium tuberculosis*. Bakteri ini dapat tahan hidup pada tempat gelap, dan berkembangbiakan bakteri lebih banyak di rumah yang gelap (Ruswanto, 2010).



Menurut penelitian Sujana, Patra, dan Mahayana (2014) menunjukkan bahwa ventilasi rumah mempunyai pengaruh terhadap kejadian penyakit tuberkulosis dan orang yang memiliki ventilasi rumah yang tidak memenuhi syarat memiliki risiko kejadian tuberkulosis 9,048 kali lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang memiliki ventilasi rumah yang memenuhi syarat.

Penelitian tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hamidah, Kandau, dan Posangi (2015) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara luas ventilasi dengan kejadian tuberkulosis paru ( $p = < 0,05$ ). Orang yang tinggal di rumah dengan luas ventilasi  $< 10\%$  dari luas lantai (tidak memenuhi syarat) mempunyai resiko 3,065 kali untuk menderita tuberkulosis paru dibandingkan dengan responden yang tinggal di rumah dengan luas ventilasi  $> 10\%$  dari luas lantai (memenuhi syarat). Penelitian yang dilakukan oleh Sinaga, Heriyani, dan Khatimah (2016) juga menyatakan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara kondisi ventilasi rumah dengan kejadian TB paru di wilayah Puskesmas Kelayan Timur. Penelitian lain yang dilakukan oleh Khaliq et al (2015) di Pakistan menyatakan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara luas ventilasi dengan kejadian TB.

Namun hasil penelitian tersebut tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Syafri (2015) yang menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan yang bermakna antara kondisi ventilasi rumah penderita TB BTA positif dengan kejadian TB Paru di wilayah kerja Puskesmas Ngemplak.

#### e. Kepadatan Hunian

Kepadatan hunian adalah perbandingan antara luas lantai rumah dengan jumlah anggota keluarga dalam satu rumah tinggal. Persyaratan kepadatan hunian untuk seluruh rumah biasanya dinyatakan dalam  $m^2$ /orang. Dimana kepadatan hunian merupakan perbandingan jumlah penghuni dengan luas bangunan, dengan persyaratan  $\geq 9 m^2$ /orang (Kementerian Kesehatan RI, 1999). Berdasarkan hasil penelitian, kepadatan hunian rumah responden yang memenuhi syarat sebanyak 50 rumah (87.7%) dan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 7 rumah (12.3%). Sebagian besar responden memiliki rumah yang cukup luas sehingga tidak terjadi kepadatan hunian di dalam rumah.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hamidah, Kandau, dan Posangi (2015) menyatakan bahwa responden yang tinggal di rumah dengan kepadatan huniannya  $<9m^2$  atau tidak memenuhi syarat mempunyai resiko 3,5 kali untuk menderita tuberkulosis paru dibandingkan dengan responden yang tinggal di rumah dengan kepadatan penghuni memenuhi syarat. Menurut Wanti, Sholihah, dan Djapawiji (2015) orang yang tinggal di dalam rumah yang memiliki kepadatan hunian yang tinggi berisiko 4,2 kali terkena penyakit TB.

Namun hasil penelitian tersebut tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dotulong, Sapulete, dan Kandou (2015) yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan yang kuat antara kepadatan hunian dengan kejadian penyakit TB Paru di Desa Wori Kecamatan Wori. Penelitian lain yang dilakukan oleh Dewi,

Suhartono, dan Adi (2016) juga menyatakan tidak ada hubungan antara tingkat kepadatan hunian dengan kejadian tuberkulosis.

Apabila ada anggota keluarga yang menjadi penderita penyakit tuberkulosis sebaiknya tidak tidur dengan anggota keluarga lainnya. Kepadatan penghuni dalam suatu rumah tinggal akan memberikan pengaruh bagi penghuninya. Luas lantai bangunan rumah sehat harus disesuaikan dengan jumlah penghuninya agar tidak menyebabkan *overload*. Hal ini tidak sehat, sebab disamping menyebabkan kurangnya konsentrasi oksigen dan bila salah satu anggota keluarga terkena penyakit infeksi akan mudah menular kepada anggota keluarga yang lain (Notoatmodjo, 2007).

Kepadatan penghuni selain dapat menimbulkan masalah privasi bagi penghuninya dari segi kesehatan, kepadatan penghuni akan dapat mempercepat terjadinya penularan penyakit terutama penyakit menular secara *droplet infection* misalnya penyakit tuberkulosis paru. Semakin padat, maka perpindahan penyakit, khususnya penyakit menular melalui udara akan semakin mudah dan cepat (Achmadi, 2013).

#### f. Kondisi Lantai

Lantai merupakan dinding penutup ruangan bagian bawah, konstruksi lantai rumah harus rapat air dan selalu kering agar mudah dibersihkan dari kotoran dan debu, selain itu dapat menghindari naiknya tanah yang dapat menyebabkan meningkatnya kelembaban dalam ruangan. Oleh karena itu perlu dilapisi dengan yang kedap air (disemen, dipasang tegel, teraso dan lain-lain) (Notoatmodjo, 2007).

Berdasarkan hasil penelitian, kondisi lantai rumah responden yang memenuhi syarat sebanyak 22 rumah (38.6%) dan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 35 rumah (61.4%). Banyaknya rumah yang memiliki lantai yang tidak memenuhi syarat disebabkan banyaknya lantai rumah responden yang terbuat dari papan. Jenis lantai papan atau panggung dapat menyebabkan kenaikan kelembaban rumah karena papan bukan bahan kedap air dan pengaruh kelembaban tanah. Untuk mencegah terjadinya kelembaban pada rumah dengan jenis lantai papan, perlu dilapisi dengan tikar karet yang berfungsi sebagai alas kedap air sehingga mampu melindungi dari rembesan air dan kelembaban (Susanti, 2016). Selain itu, terdapat beberapa lantai rumah responden yang dilapisi dengan semen namun sebagian besar dari lantai rumah tersebut rusak dan berlubang sehingga tanah dapat naik ke permukaan lantai. Lantai yang tidak kedap air menyebabkan kelembaban semakin tinggi di dalam rumah sehingga mendukung lingkungan *Mycobacterium tuberculosis* untuk berkembangbiak di dalam rumah.

Menurut penelitian Kurniasih, Triyantoro, dan Widyanto (2016) menunjukkan bahwa ada hubungan antara kondisi lantai rumah dengan kejadian tuberkulosis paru di wilayah kerja Puskesmas Kalibagor Kabupaten Banyumas Tahun 2016. Nilai OR sebesar 4,840 artinya orang yang tinggal di rumah dengan kondisi lantai tidak memenuhi syarat berisiko menderita TB Paru 4,840 kali lebih besar dibandingkan yang tinggal di rumah dengan kondisi lantai rumah memenuhi syarat.

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dawile, Sondakh, dan Maramis (2013) juga menunjukkan bahwa ada hubungan

antara jenis lantai dengan tuberkulosis paru dan jenis lantai tidak memenuhi syarat mengalami risiko 21 kali lebih besar dari responden dengan jenis lantai rumah yang memenuhi syarat.

Namun penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hamidah, Kandau, dan Posangi (2015) yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara kondisi lantai rumah dengan kejadian tuberkulosis paru. Penelitian lain yang dilakukan oleh Dewi, Suhartono, dan Adi (2016) menyatakan tidak ada hubungan antara jenis lantai dengan kejadian Tuberkulosis Paru di Kota Magelang.

g. Kondisi Dinding

Dinding berfungsi sebagai pelindung, baik dari gangguan hujan maupun angin serta melindungi dari pengaruh panas. Beberapa bahan pembuat dinding adalah dari kayu, bambu, pasangan batu bata atau batu dan lain sebagainya, tetapi dari beberapa bahan tersebut yang paling baik adalah pasangan batu bata atau tembok (permanen) yang tidak mudah terbakar dan kedap air sehingga mudah dibersihkan.

Berdasarkan hasil penelitian, kondisi dinding rumah responden yang memenuhi syarat sebanyak 21 rumah (36.8%) dan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 36 rumah (63.2%). Banyaknya kondisi dinding responden yang tidak memenuhi syarat disebabkan oleh banyaknya dinding rumah responden yang terbuat dari bahan kayu, bambu, seng dan tembok yang belum dilapisi dengan semen.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dawile, Sondakh, dan Maramis (2013) menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara kondisi dinding dengan

tuberkulosis paru. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nuraini (2015) yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan bermakna antara jenis dinding yang tidak memenuhi syarat dengan kejadian TB Paru.

Dinding ruang tidur, ruang keluarga harus dilengkapi dengan sarana ventilasi yang berfungsi untuk pengaturan udara, karena dinding dapat memberikan kontribusi terciptanya kelembaban dan temperatur yang memungkinkan suatu bibit penyakit akan mati atau berkembangbiak, seperti Kuman *Mycobacterium tuberculosis* tumbuh pada kelembaban dan temperatur tertentu (Kepmenkes RI, 1999). Berdasarkan gambar 2(a), kondisi rumah yang memenuhi syarat rumah sehat tertinggi sebanyak 40% yaitu 18 rumah. Rata-rata faktor lingkungan fisik rumah penderita tuberkulosis hanya dua yang memenuhi syarat.

### **3. Jenis Kasus, Akses Ke Pelayanan Kesehatan, Jarak Rumah Responden dengan PMO, dan Ketinggian Wilayah**

#### **a. Jenis Kasus**

Jenis kasus tertinggi adalah kasus baru sebanyak 54 kasus (94.7%) dan terendah adalah jenis kasus putus berobat sebanyak 1 orang (1.8%). Kasus baru cenderung lebih banyak dibandingkan dengan kasus putus berobat karena penderita tuberkulosis yang telah ditemukan akan diberikan pengobatan hingga sembuh.

#### b. Akses Ke Pelayanan Kesehatan

Jauh atau dekatnya akses ke pelayanan kesehatan dalam penelitian ini didasarkan pada persepsi penderita tuberkulosis. Berdasarkan hasil penelitian, responden yang tinggal jauh dari puskesmas sebanyak 48 orang (84.2%) dan jarak rumah responden yang dekat sebanyak 9 orang (15.8%). Berdasarkan gambar 4.8, analisis *buffer* penderita tuberkulosis yang tinggal dalam radius 3 km dari pelayanan kesehatan atau puskesmas sebanyak 24 rumah. Hal ini berarti penderita tuberkulosis yang tinggal jauh dari puskesmas lebih banyak.

Jarak yang jauh dan kondisi jalan yang tidak mendukung menjadi salah satu pertimbangan bagi penderita untuk datang ke puskesmas. Semakin jauh jarak rumah pasien dari tempat pelayanan kesehatan dan sulitnya transportasi akan berhubungan dengan keteraturan berobat (Selviana, Hernawan, dan Khitama 2016). Menurut Chairani dan Mariana (2017) responden yang mempunyai tingkat kesulitan dalam mengakses fasilitas kesehatan memiliki risiko 3,818 kali lebih besar untuk menderita TB Paru bila dibandingkan dengan responden yang memiliki kemudahan dalam mengakses fasilitas kesehatan.

#### c. Jarak Rumah Responden dengan PMO

Berdasarkan hasil penelitian, jenis kasus tertinggi adalah kasus baru sebanyak 54 kasus (94.7%) dan terendah adalah jenis kasus putus berobat sebanyak 1 orang (1.8%). Sedangkan responden yang tinggal jauh dengan PMO sebanyak 3 orang (5.3%) dan jarak rumah responden yang dekat dengan rumah PMO sebanyak 54 orang (94.7%). Menurut penelitian Soesilowati dan Haitamy (2016) menunjukkan

bahwa pasien TB paru yang diawasi dengan baik oleh PMO memiliki kemungkinan untuk sembuh 5 kali lebih besar dari pada yang tidak diawasi dengan baik oleh PMO. Sebagian besar PMO diambil dari pihak keluarga penderita tuberkulosis. Hal ini dimaksudkan agar obat anti tuberkulosis dapat diminum secara teratur. Menurut penelitian Jufrizal, Hermansyah dan Mulyadi (2016) menunjukkan bahwa ada hubungan peran keluarga sebagai PMO dengan tingkat keberhasilan pengobatan pada penderita TB Paru. Keluarga yang memenuhi peran yang baik sebagai PMO berpeluang 20 kali memperoleh tingkat keberhasilan pengobatan penderita TB Paru.

d. Ketinggian Wilayah

Ketinggian wilayah dalam penelitian ini adalah ketinggian wilayah tempat tinggal responden yang diukur dengan menggunakan alat GPS (*Global Positioning System*) dengan satuan mdpl. Berdasarkan hasil penelitian, ketinggian wilayah tempat tinggal responden yang >200 mdpl sebanyak 43 orang (75.4%) dan responden yang tinggal dengan ketinggian <200 mdpl sebanyak 14 orang (24.6%). Responden yang tinggal pada ketinggian wilayah <200 mdpl merupakan penderita yang tinggal di daerah lembah Kecamatan Parangloe. Hal ini disebabkan oleh Kecamatan Parangloe merupakan daerah perbukitan. Adapun pola pemukiman penduduk di daerah dataran tinggi sangat dipengaruhi oleh kondisi topografi dan tingkat kesuburan tanah. Pola pemukiman penduduk di daerah dataran tinggi biasanya menyebar mengikuti lereng dan mengelompok pada daerah yang mempunyai lahan subur dan relatif datar.



Berdasarkan gambar 4.9 menunjukkan bahwa penderita tuberkulosis ditemukan lebih banyak pada ketinggian 1.000-2000 m dpl. Ketinggian wilayah menyebabkan suhu dan kelembaban udara cukup tinggi (Nurdin, Warsito, dan Nursa'ban, 2008). Kondisi suhu dan kelembaban yang tinggi sangat mendukung perkembangbiakan bakteri *Mycobacterium tuberculosis*. Dengan demikian rumah yang belum memenuhi syarat kesehatan dapat mendukung terjadinya penyakit tuberkulosis paru di wilayah tersebut.

Hubungan karakteristik lingkungan dengan perkembangan *Mycobacterium tuberculosis* diantaranya adalah ketinggian, karena secara umum mempengaruhi kelembaban dan suhu lingkungan. Disamping berpengaruh dengan kerapatan oksigen, setiap kenaikan 100 meter selisih suhu udara dengan permukaan laut sebesar 0,5°C. *Mycobacterium tuberculosis* sangat *aerob*, sehingga diperkirakan kerapatan oksigen di pegunungan akan mempengaruhi *viabilitas* (daya tahan hidup) kuman tuberkulosis paru (Ruswanto, 2010).

#### **D. Keterbatasan penelitian**

Beberapa keterbatasan penelitian yang dirasakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Peneliti tidak dapat mengakses seluruh rumah penderita tuberkulosis sehingga sampel yang diperoleh lebih sedikit. Hal ini disebabkan oleh kondisi jalan yang belum memadai serta cuaca yang seringkali hujan.
2. Cuaca yang seringkali hujan menyebabkan hasil pengukuran suhu rendah dan kelembaban sangat tinggi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagian besar suhu di dalam rumah penderita tuberkulosis memenuhi syarat sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.829/Menkes/SK/VII/1999 tentang persyaratan kesehatan perumahan yaitu 18-30°C.
2. Sebagian besar kelembaban di dalam rumah penderita tuberkulosis tidak memenuhi syarat sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.829/Menkes/SK/VII/1999 tentang persyaratan kesehatan perumahan yaitu 40-70%.
3. Sebagian besar luas ventilasi rumah penderita tuberkulosis tidak memenuhi syarat sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.829/Menkes/SK/VII/1999 tentang persyaratan kesehatan perumahan, yaitu  $\geq 10\%$  dari luas lantai rumah.
4. Sebagian besar kepadatan hunian di dalam rumah penderita tuberkulosis memenuhi syarat sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.829/Menkes/SK/VII/1999 tentang persyaratan kesehatan perumahan yaitu 9 m<sup>2</sup>.

5. Sebagian besar kondisi lantai rumah penderita tuberkulosis tidak memenuhi syarat sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.829/Menkes/SK/VII/1999 tentang persyaratan kesehatan perumahan yaitu lantai harus kedap air.
6. Sebagian besar kondisi dinding rumah penderita tuberkulosis tidak memenuhi syarat sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.829/Menkes/SK/VII/1999 tentang persyaratan kesehatan perumahan yaitu dinding harus kedap air.
7. Sebagian besar rumah penderita tuberkulosis tidak memenuhi syarat.
8. Sebagian besar rumah penderita tuberkulosis terletak jauh dari pusat pelayanan kesehatan.
9. Sebagian besar rumah penderita tuberkulosis berada di ketinggian >200 mdpl.

## **B. Saran**

1. Bagi Puskesmas

Memberikan penyuluhan, sosialisasi, dan informasi kepada masyarakat terkait faktor risiko kejadian tuberkulosis dan pola hidup bersih dan sehat. Pihak puskesmas juga perlu meningkatkan pelacakan kasus di lingkungan masyarakat.

2. Bagi Masyarakat

Diharapkan masyarakat dapat menerapkan pola hidup bersih dan sehat agar dapat mengurangi risiko terkena penyakit tuberkulosis dan membuka jendela setiap pagi agar sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah dan sirkulasi udara berjalan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, Umar Fahmi, *Manajemen Penyakit Berbasis Wilayah*. Jakarta: Buku Kompas. 2005.
- Achmadi, Umar Fahmi. *Dasar-Dasar Penyakit berbasis wilayah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Astrini, Retno, dan Patrick Oswald. “Modul Pelatihan Quantum GIS Tingkat Dasar,” 2012. [http://www.gitews.org/tsunami-kit/en/E4/tool/Modul Pelatihan Quantum GIS Tingkat Dasar.pdf](http://www.gitews.org/tsunami-kit/en/E4/tool/Modul%20Pelatihan%20Quantum%20GIS%20Tingkat%20Dasar.pdf). 2012.
- Bawole, Sindy T T, A J M Rattu, dan Jimmy Posangi. “Faktor Resiko Lingkungan Fisik Rumah Terhadap Kejadian TB Paru di Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara.” Universitas Sam Ratulangi. <https://ejournalhealth.com/index.php/CH/article/view/32>. 2014.
- Budi, Agus Setia, dan Maria Tuntun. “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Tuberkulosis Paru BTA Positif Pada Pasien Rawat Jalan Di UPT Puskesmas Wonosobo Kabupaten Tanggamus.” *Jurnal Analis Kesehatan* 5 (2). <http://ejurnal.poltekkes-tjk.ac.id/index.php/JANALISKES/article/view/464>. 2016.
- Chairani, Miftah, dan Dina Mariana. “Faktor Risiko Kejadian Tuberkulosis Paru di Wilayah Kerja Puskesmas Binanga Kabupaten Mamuju.” *Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes* VIII (3):140–45. <http://www.forikes-ejournal.com>. 2017.
- Chandra, Budiman. *Pengantar Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC. 2005.
- Chandra, Budiman. *Kontrol Penyakit Menular Pada Manusia*. Penerbit Buku Kedokteran EGC. 2011.
- Crofton J, A. Horne, dan Miller, F. “*Tuberkulosis Klinis Edisi 2*”. Jakarta. Penerbit Widya Medika. 2002.
- Dawile, Greis, Ricky C Sondakh, Franckie R R Maramis, Fakultas Kesehatan, Masyarakat Universitas, dan Sam Ratulangi. “Hubungan Antara Kondisi Fisik Rumah Dengan Kejadian Tuberkulosis Paru di Wilayah Kerja Puskesmas Tobelo Kabupaten Halmahera Utara.” Universitas Sam Ratulangi. [digilib.unmuhjember.ac.id/download.php](http://digilib.unmuhjember.ac.id/download.php). 2013.

- Dewi, Erlin Fitria, Suhartono, dan Mateus Sakundarno Adi. "Hubungan Faktor Lingkungan Rumah dengan Kejadian TB Paru di Kota Magelang." *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)* 4 (2). <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jkm>. 2016.
- Dinas Kabupaten Gowa. Data Penderita Tuberkulosis. 2016.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa. "Profil Kesehatan Kabupaten Gowa 2014". <http://www.depkesgowa.go.id>. 2014.
- Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. "Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan 2014." Makassar. <http://www.dinkes.sulselprov.go.id>. 2015.
- Dotulong, Jendra F J, Margareth R Sapulete, dan Grace D Kandou. "Hubungan Faktor Risiko Umur, Jenis Kelamin dan Kepadatan Hunian dengan Kejadian Penyakit TB Paru di Desa Wori Kecamatan Wori." *Jurnal Kedokteran Komunitas dan Tropik* III:57–65. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JKKT/article/view/7773.pdf>. 2015.
- Fahreza, Erwin Ulinnuha, Hestu Waluyo, dan Andra Novitasari. "Hubungan antara Kualitas Fisik Rumah dan Kejadian Tuberkulosis Paru dengan Basil Tahan Asam positif di Balai Kesehatan Paru Masyarakat Semarang." *Jurnal Kedokteran Muhammadiyah* 1 (2):9–13. <http://jurnal.unimus.ac.id/index.php/kedokteran/article/view/740/794>. 2012.
- Fenta, Atnafu Temesgen. "Prevalence of HIV – co infection and multiple Drug Resistance of Pulmonary tuberculosis among patients attending Debre Markos Referral Hospital, Ethiopia." Addis Ababa University. <http://etd.aau.edu.et/bitstream//AtnafuTemesgenFenta.pdf>. 2016.
- Gould, D dan Brooker. "*Mikrobiologi Terapan untuk Perawat*". Jakarta. EGC. 2003.
- Hadifah, Zain, Ulil Amri Manik, Andi Zulhaida, dan Veny Wilya. "Gambaran Penderita Tuberkulosis Paru Di Tiga Puskesmas Wilayah Kerja Kabupaten Pidie Propinsi Aceh." *SEL Jurnal Penelitian Kesehatan* 4 (1):31–44. <http://ejournal.litbang.depkes.go.id/index.php/sel/article/view/7597/5242>. 2017.
- Hamidah, Grace D. Kandau, dan Jimmy Posangi. "Hubungan Kualitas Lingkungan Fisik Rumah Dengan Puskesmas Perawatan Siko Kecamatan Ternate Utara." *e-Biomedik (eBm)* 3 (3):856–63. [ejournal.unsrat.ac.id/index.php/ebiomedik/article/view](http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/ebiomedik/article/view). 2015.
- Hamidah, Grace D. Kandau, dan Jimmy Posangi. "Hubungan Kualitas Lingkungan

- Fisik Rumah Dengan Puskesmas Perawatan Siko Kecamatan Ternate Utara.” *e-Biomedik (eBm)* 3 (3):856–63. [ejournal.unsrat.ac.id/index.php/ebiomedik/article/view](http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/ebiomedik/article/view). 2015.
- Jufrizal, Hermansyah, dan Mulyadi. “Peran Keluarga Sebagai Pengawas Minum Obat (Pmo) Dengan Tingkat Keberhasilan Pengobatan Penderita Tuberkulosis Paru.” *Jurnal Ilmu Keperawatan* 4 (1). 2016.
- Kalsum, Ummu, A Arsunan Arsin, dan Hasanuddin Ishak. “Faktor Risiko dan Gambaran Pemetaan Kejadian Tuberkulosis di Kabupaten Enrekang Tahun 2014.” Universitas Hasanuddin. <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/1840cd1f235736aebc1f55d7fc61016b.pdf>. 2014.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 829/Menkes/SK/VII/1999 tentang persyaratan kesehatan perumahan.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. “Pedoman Nasional Pengendalian Tuberkulosis,” 2014. [http://www.tbindonesia.or.id/opendir/Buku/bpn\\_ptb\\_2014.pdf](http://www.tbindonesia.or.id/opendir/Buku/bpn_ptb_2014.pdf). 2014.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1077/Menkes/PER/V/2011 tentang Pedoman Penyehatan Udara dalam Ruang Rumah.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Profil Kesehatan Indonesia 2015. <http://www.depkes.go.id>. 2016
- Khaliq, A, Khan Ih, Akhtar Mw, dan Chaudhry Mn. “Environmental Risk Factors and Social Determinants of Pulmonary Tuberculosis in Pakistan.” *Epidemiology (Sunnyvale)* 5 (3). <https://doi.org/10.4172/2161-1165.1000201>. 2015.
- Kunoli, Firdaus J. *Asuhan Keperawatan Penyakit Tropis*. Jakarta: CV. Trans Info Media. 2012.
- Kurniasari, Ryana Ayu Setia, Suhartono Suhartono, dan Kusyogo Cahyo. “Faktor Risiko Kejadian Tuberkulosis Paru di Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri.” *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia* 11 (2):198–204. <http://www.ejournal.undip.ac.id/index.php/mkmi/article/view/5396>. 2012.
- Kurniasih, Titi, Budi Triyantoro, dan Arif Widyanto. “Hubungan Kondisi Fisik Rumah dengan Kejadian TB Paru di Wilayah Kerja Puskesmas Kalibagor Kabupaten Banyumas Tahun 2016.” *Keslingmas* 35. <http://ejournal.poltekkes-smg.ac.id>. 2016.
- Lalombo, Alfah Yulied, Henry Palandeng, dan Vanry D Kallo. “Hubungan kebiasaan

merokok dengan kejadian Tuberkulosis paru di Puskesmas Siloam Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe.” *Ejournal Keperawatan (e-Kep)* 3 (2). <https://media.neliti.com/media/publications/107509-ID-hubungan-kebiasaan-merokok-dengan-kejadian.pdf>. 2015.

Mandal, B. K, E. G. L Wilkins, E. M Dunbar, dan R. T. Mayon-White. *Lecture Notes: Penyakit Infeksi*. Edisi Keen. Jakarta: Erlangga. 2004.

Mukono, H.J. *Prinsip Dasar Kesehatan Lingkungan*. Edisi Kedua. Surabaya: Airlangga University Press. 2006.

Notoatmodjo, Soekidjo. *Kesehatan Masyarakat ilmu dan seni*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2007.

Notoatmodjo, Soekidjo. *Promosi Kesehatan Teori & Aplikasi*. Edisi Revi. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2010.

Nuraini, Anggi Fathrida. “Hubungan Karakteristik Lingkungan Fisik Rumah dan Perilaku Dengan Kejadian TB Paru di Wilayah Kerja Puskesmas Bobotsari Kabupaten Purbalingga.” *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)* 3 (1). <http://ejournal3.undip.ac.id>. 2010.

Nurdin, Muh, S.W Warsito, dan Muh Nursa’ban. *Mari Belajar IPS Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SMP/MTS Kelas VII*. Diedit oleh Nugrohowati. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 2008.

Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian. Makassar: Alauddin Press. 2013.

Peta Wilayah Kecamatan Parangloe. <https://petatematikindo.wordpress.com>

Peta Wilayah Kecamatan Tinggimoncong. <https://petatematikindo.wordpress.com>

Peta Wilayah Kecamatan Tombolopao. <https://petatematikindo.wordpress.com>

Pratama, Borneo Yuda, Lia Yulia Budiarti, dan Dhian Ririn Lestari. “Karakteristik Lingkungan Fisik Rumah dengan Kejadian TB Paru.” *DK* 1 (1):16–23. <http://ppjp.unlam.ac.id>. 2013.

Puskesmas Parangloe. Data Penderita Tuberkulosis. 2016.

Puskesmas Tinggimoncong. Data Penderita Tuberkulosis. 2016.

Puskesmas Tombolopao. Data Penderita Tuberkulosis. 2016.

Puskesmas Parangloe. Profil Puskesmas Parangloe Tahun 2016.

- Puskesmas Tinggimoncong. Profil Puskesmas Tinggimoncong Tahun 2017.
- Puskesmas Tombolopao. Profil Puskesmas Tombolopao Tahun 2017.
- Ruswanto, Bambang. "Program Pascasarjana." Universitas Diponegoro Semarang. <http://ejournal.undip.ac.id/Index.Php/Jkli>. 2010.
- Sardina, Dewi. *9 Penyakit Mematikan*. Yogyakarta: Smart Pustaka. 2011.
- Selviana, Andri Dwi Hernawan, dan Irvan Khitama. "Analisis spasial sebaran kasus dan lingkungan berpotensi penularan tuberkulosis paru." *Jurnal Vokasi Kesehatan* 2 (2):364–71. [ejournal.poltekkes-pontianak.ac.id/index.php/JVK/article/download/55/61](http://ejournal.poltekkes-pontianak.ac.id/index.php/JVK/article/download/55/61). 2016.
- Sinaga, Ferdy Ricardo, Farida Heriyani, dan Husnuh Khatimah. "Hubungan Kondisi Ventilasi Rumah dengan Kejadian TB Paru di Wilayah Puskesmas Kelayan Timur." *Berkala Kedokteran* 12 (2):279–88. 2016.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera hati, 2009.
- Soedarto. *Penyakit Menular di Indonesia*. Jakarta: CV. Sagung Seto. 2009.
- Soesilowati, Retno, dan M. Nurriszki Haitamy. "Perbedaan Antara Kesembuhan Pasien TB Paru dengan Pengawas Minum Obat (PMO) dan tanpa PMO di RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo." *SAINTEKS XIII* (1):50–60. <http://jurnalnasional ump.ac.id/index.php/SAINTEKS/article/view/1497>. 2016.
- Sujana, I Ketut, I Made Patra, dan I Made Bulda Mahayana. "Penyakit Tb Paru Di Wilayah Kerja Upt Puskesmas Mengwi I Tahun 2013." *Jurnal Kesehatan Lingkungan* 4 (1):93–98. <http://www.poltekkes-denpasar.ac.id/files/Jurnalkesehatanlingkungan.pdf>. 2014.
- Sumarmi, dan Artha Budi Susila Duarsa. "Analisis Hubungan Kondisi Fisik Rumah Dengan Kejadian TB Paru BTA Positif di Puskesmas Kotabumi II , Bukit Kemuning dan Ulak Rengas Kab . Lampung Utara Tahun 2012." *Jurnal Kedokteran Yarsi* 22 (2):82–101. <https://media.neliti.com/media/publications/4906-ID-hubungan-antara-perilaku-ibu-dan-lingkungan-fisik-rumah-dengan-kejadian-tuberkul.pdf>. 2014.
- Susanti, Erni Wingki. "Hubungan Kondisi Fisik Lingkungan Rumah dengan Kejadian Penyakit TB Paru BTA Positif di Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda." *Kesmas Wigama* 1 (3):121–31. <http://ojs.fkm-uwgm.ac.id/index.php/JFKM/article/view/14>. 2016.
- Syafri, Amalia Kartika. "Hubungan Kondisi Fisik Rumah dengan Kejadian Tuberkulosis Paru di Wilayah Ngemplak Boyolali." Universitas Muhammadiyah Surakarta. <http://eprints.ums.ac.id/33053/17/NASKAH.PUBLIKASI.pdf>. 2015.



- Ubaidah, Hani Hilyati. "Kajian hadis tematik seputar bersin: perspektif ilmu medis." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. <http://repository.uinjkt.ac.id>. 2014.
- Wanti, Qomariyatus Sholihah, dan Martha Djapawiwi. "Relationship between House Condition and Tuberculosis Incidence in Timor Tengah Utara District." *International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR)* 21 (1):344–49. [http://gssrr.org/index.php?journal=JournalOfBasicAndApplied&page=article&op=view&path\[\]=3619&path\[\]=2213](http://gssrr.org/index.php?journal=JournalOfBasicAndApplied&page=article&op=view&path[]=3619&path[]=2213). 2015.
- WHO. "Global Tuberculosis Report 2016." *Cdc 2016*, no. Global TB Report 2016:214. [https://doi.org/ISBN 978 92 4 156539 4](https://doi.org/ISBN%20978%2092%204%20156539%204). 2016.
- Widoyono. *Penyakit Tropis Epidemiologi, Penularan, Pencegahan & Pemberantasannya*. Diedit oleh Rina Astikawati. Edisi Kedu. Jakarta: Erlangga. 2011.
- William, Lippincott, dan Wilkins. *Kapita Selekta Penyakit dengan Implikasi Keperawatan (Nurse's Quick Check: Diseases)*. Diedit oleh Kimberly Bilotta. Edisi Kedu. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC. 2011.

**L**

**A**

**M**


**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**ALAUDDIN**

MAKASSAR

## LAMPIRAN 1

### LEMBAR OBSERVASI

#### ANALISIS SPASIAL KEJADIAN TUBERKULOSIS DI DAERAH DATARAN TINGGI KABUPATEN GOWA

No. lembar observasi :

Hari/Tanggal observasi :

#### **A. Data umum tentang penderita penyakit tuberkulosis**

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Umur :
4. Pekerjaan :
5. Pendidikan terakhir :
6. Alamat :
7. Desa/Kecamatan :
8. Jenis rumah :
9. Jenis kasus : 1. Baru 2. Putus obat 3. Kambuh 4. Gagal 5. Lainnya
10. Jarak rumah dengan puskesmas : 1. Jauh 2. Dekat
11. Jarak rumah dengan puskesmas : Km
12. Jarak rumah penderita dengan PMO : 1. Jauh 2. Dekat

#### **Data karakteristik wilayah**

Titik koordinat rumah responden :

Titik koordinat puskesmas :

**Tabel hasil pengukuran dan observasi lingkungan fisik rumah**

No	Variabel	Hasil pengukuran	Keterangan
1	Suhu		
2	Kelembaban		
3	Luas ventilasi		
	Luas lubang angin dan jendela permanen		
	Luas rumah		
4	Kepadatan hunian		
	Jumlah penghuni rumah		
	Luas rumah		
5	Kondisi lantai		
6	Kondisi dinding		

## LAMPIRAN 2

**Master Tabel SPSS Kejadian Tuberkulosis Di Daerah Dataran Tinggi Kabupaten Gowa**

No	Waktu	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Pekerjaan	Pendidikan Terakhir	Jenis Rumah	Alamat	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Jenis Kasus	Jarak Rumah Ke PKM	Nilai Jarak	Jarak Rumah ke PMO	Nilai Jarak
1	6-Jul-17	J.K	Laki-laki	41-50 tahun	Petani	Tamat SD/ sederajat	Permanen	Buki	Tonasa	Tombolopao	Baru	Dekat	4	Dekat	0
2	6-Jul-17	Ju	Perempuan	41-50 tahun	IRT	Tamat SMA/ sederajat	Permanen	Buki	Tonasa	Tombolopao	Baru	Dekat	4	Dekat	0
3	6-Jul-17	Jb	Laki-laki	41-50 tahun	Petani	Tamat SMA/ sederajat	Permanen	Buki	Tonasa	Tombolopao	Baru	Dekat	4	Dekat	0
4	6-Jul-17	Su	Perempuan	31-40 tahun	IRT	Tamat SD/ sederajat	Non permanen	Buki	Tonasa	Tombolopao	Baru	Dekat	4.5	Dekat	0
5	6-Jul-17	Ta	Laki-laki	21-30 tahun	Petani	Tamat SMP/ sederajat	Non permanen	Mangottong	Tonasa	Tombolopao	Baru	Jauh	5	Dekat	0
6	6-Jul-17	Ai	Perempuan	31-40 tahun	IRT	Tamat SD/ sederajat	Non permanen	Mangottong	Tonasa	Tombolopao	Baru	Jauh	5.5	Dekat	0
7	6-Jul-17	Fi	Perempuan	11-20 tahun	Pelajar	Tamat SD/ sederajat	Non permanen	Mangottong	Tonasa	Tombolopao	Baru	Jauh	6	Dekat	0
8	6-Jul-17	Nin	Perempuan	11-20 tahun	Pelajar	Tamat SD/ sederajat	Permanen	Mangottong	Tonasa	Tombolopao	Baru	Jauh	6	Dekat	0
9	6-Jul-17	M. J	Laki-laki	41-50 tahun	Petani	Tamat SMP/ sederajat	Permanen	Mangottong	Tonasa	Tombolopao	Baru	Jauh	6	Dekat	0
10	6-Jul-17	Kam	Laki-laki	> 50 tahun	Tidak Ada	Tidak Sekolah	Permanen	Maroanging	Tonasa	Tombolopao	Baru	Dekat	3.5	Dekat	0
11	6-Jul-17	Su	Perempuan	31-40 tahun	IRT	Tidak Sekolah	Non permanen	Mappadang	Tamaona	Tombolopao	Putus berobat	Jauh	10	Dekat	0
12	7-Jul-17	Sy	Laki-laki	11-20 tahun	Pelajar	Tamat SD/ sederajat	Non permanen	Mappadang	Tamaona	Tombolopao	Baru	Jauh	9	Dekat	0
13	7-Jul-17	Fa	Laki-laki	21-30 tahun	Supir	Tamat SD/ sederajat	Non permanen	Mappadang	Tamaona	Tombolopao	Baru	Jauh	9	Dekat	0
14	7-Jul-17	PB	Laki-laki	> 50 tahun	Petani	Tamat SD/ sederajat	Non permanen	Pao	Pao	Tombolopao	Baru	Jauh	6	Dekat	0
15	8-Jul-17	PS	Perempuan	> 50 tahun	Petani	Tamat SD/ sederajat	Non permanen	Suka	Ta'binjai	Tombolopao	Baru	Jauh	13	Dekat	0
16	8-Jul-17	Sup	Perempuan	11-20 tahun	Pelajar	Tamat SD/ sederajat	Permanen	Cilallang	Balassuka	Tombolopao	Baru	Jauh	17	Dekat	0
17	8-Jul-17	Sw	Perempuan	31-40 tahun	IRT	Tamat SD/ sederajat	Permanen	Sapohiring	Ta'binjai	Tombolopao	Baru	Jauh	14	Dekat	0

18	8-Jul-17	PR	Laki-laki	> 50 tahun	Petani	Tidak Sekolah	Non permanen	Suka	Ta'binjai	Tombolopao	Baru	Jauh	15	Dekat	0
19	8-Jul-17	De	Perempuan	> 50 tahun	IRT	Tamat SD/ sederajat	Permanen	Mamampang	Mamampang	Tombolopao	Baru	Jauh	12	Dekat	0
20	9-Jul-17	Nh	Perempuan	11-20 tahun	Pelajar	Tamat SD/ sederajat	Non permanen	Pattallassang	Pao	Tombolopao	Kambuh	Jauh	6	Dekat	0
21	9-Jul-17	Jb	Laki-laki	31-40 tahun	Petani	Tamat SMA/ sederajat	Non permanen	Pattallassang	Pao	Tombolopao	Baru	Jauh	6.5	Dekat	0
22	9-Jul-17	Bu	Laki-laki	21-30 tahun	Petani	Tidak tamat SD/ sederajat	Non permanen	Bangkeng Batu	Pao	Tombolopao	Baru	Jauh	7	Jauh	3
23	9-Jul-17	HW	Perempuan	31-40 tahun	PNS	S1	Permanen	Simbang	Ere'lembang	Tombolopao	Baru	Jauh	5	Dekat	0
24	9-Jul-17	NL	Perempuan	41-50 tahun	Petani	Tidak tamat SD/ sederajat	Non permanen	Simbang	Ere'lembang	Tombolopao	Baru	Jauh	5	Dekat	0
25	9-Jul-17	Kar	Perempuan	41-50 tahun	IRT	Tamat SD/ sederajat	Non permanen	Bontorannu	Ere'lembang	Tombolopao	Baru	Jauh	8	Dekat	0
26	31-Jul-17	Nin	Perempuan	41-50 tahun	IRT	Tidak Sekolah	Non permanen	Parangboddong	Kanreapia	Tombolopao	Baru	Jauh	15	Dekat	0
27	31-Jul-17	Ram	Laki-laki	21-30 tahun	Petani	Tidak Sekolah	Non permanen	Bolaromang	Bolaromang	Tombolopao	Baru	Jauh	20	Dekat	0
28	31-Jul-17	Mu	Laki-laki	> 50 tahun	PNS	Tamat SMA/ sederajat	Permanen	Silanggayya	Kanreapia	Tombolopao	Baru	Jauh	16	Dekat	0
29	20-Jul-17	RT	Laki-laki	> 50 tahun	PNS	Tamat SMA/ sederajat	Semi permanen	Tamaroka	Bontoparang	Parangloe	Baru	Jauh	7	Dekat	0
30	21-Jul-17	DN	Perempuan	> 50 tahun	Tidak Ada	Tidak Sekolah	Permanen	Padang taring	Belabori	Parangloe	Baru	Jauh	17	Dekat	0
31	21-Jul-17	Rw	Perempuan	11-20 tahun	IRT	Tamat SMA/ sederajat	Semi permanen	Baeka	Belapungranga	Parangloe	Baru	Jauh	14	Dekat	0
32	21-Jul-17	HS	Laki-laki	> 50 tahun	Tidak Ada	Tidak tamat SD/ sederajat	Non permanen	Pappareang	Belapungranga	Parangloe	Baru	Jauh	10	Dekat	0
33	21-Jul-17	DB	Perempuan	> 50 tahun	IRT	Tamat SD/ sederajat	Semi permanen	Padang taring	Belabori	Parangloe	Kambuh	Jauh	17	Dekat	0
34	21-Jul-17	SM	Laki-laki	> 50 tahun	Tidak Ada	Tidak tamat SD/ sederajat	Permanen	Pappareang	Belapungranga	Parangloe	Baru	Jauh	10	Dekat	0
35	21-Jul-17	DT	Laki-laki	> 50 tahun	Tidak Ada	Tidak Sekolah	Permanen	Pappareang	Belapungranga	Parangloe	Baru	Jauh	10	Dekat	0
36	21-Jul-17	RL	Perempuan	31-40 tahun	IRT	Tidak tamat SD/ sederajat	Permanen	Kampung Beru	Lonjoboko	Parangloe	Baru	Jauh	15	Jauh	1
37	21-Jul-17	Ag	Laki-laki	41-50 tahun	Supir	Tidak tamat SD/ sederajat	Permanen	Kampung Beru	Lonjoboko	Parangloe	Baru	Jauh	15	Jauh	1
38	22-Jul-17	DS	Laki-laki	31-40 tahun	Buruh bangunan	Tidak Sekolah	Non permanen	Parang labbua	Parang	Parangloe	Baru	Jauh	10	Dekat	0
39	22-Jul-17	MN	Laki-laki	31-40 tahun	Tidak	Tidak tamat	Permanen	Parang labbua	Parang	Parangloe	Baru	Jauh	10	Dekat	0

				tahun	Ada	SD/ sederajat									
40	22-Jul-17	BT	Laki-laki	> 50 tahun	Tidak Ada	Tidak tamat SD/ sederajat	Permanen	Cekdam	Bontoparang	Parangloe	Baru	Jauh	7	Dekat	0
41	22-Jul-17	TN	Laki-laki	41-50 tahun	Tidak Ada	Tidak Sekolah	Semi permanen	Kabbasa'	Lanna	Parangloe	Baru	Dekat	3	Dekat	0
42	22-Jul-17	Yu	Laki-laki	41-50 tahun	Penjaga tambang	Tamat SMP/ sederajat	Permanen	Alur C	Lanna	Parangloe	Baru	Dekat	1	Dekat	0
43	22-Jul-17	NW	Laki-laki	21-30 tahun	Supir	Tamat SMA/ sederajat	Permanen	Alur C	Lanna	Parangloe	Baru	Dekat	1	Dekat	0
44	22-Jul-17	Sa	Perempuan	41-50 tahun	Petani	Tidak Sekolah	Non permanen	Pakkolompo	Borisallo	Parangloe	Baru	Jauh	13	Dekat	0
45	22-Jul-17	DT	Perempuan	> 50 tahun	IRT	Tidak Sekolah	Permanen	Pakkolompo	Borisallo	Parangloe	Baru	Jauh	15	Dekat	0
46	22-Jul-17	RW	Perempuan	11-20 tahun	Tidak Ada	Tamat SMP/ sederajat	Semi permanen	Pakkolompo	Borisallo	Parangloe	Baru	Jauh	15	Dekat	0
47	22-Jul-17	MA	Laki-laki	21-30 tahun	Tidak Ada	Tamat SMA/ sederajat	Non permanen	Pakkolompo	Borisallo	Parangloe	Baru	Jauh	16	Dekat	0
48	22-Jul-17	DS	Laki-laki	> 50 tahun	Tidak Ada	Tidak tamat SD/ sederajat	Non permanen	Pakkolompo	Borisallo	Parangloe	Baru	Jauh	16	Dekat	0
49	30-Jul-17	Ar	Laki-laki	21-30 tahun	Petani	Tamat SMA/ sederajat	Permanen	Pa'rasangang toa	Garassi	Tinggimoncong	Baru	Jauh	21	Dekat	0
50	30-Jul-17	DJ	Laki-laki	41-50 tahun	Petani	Tamat SMP/ sederajat	Semi permanen	Jaleko	Garassi	Tinggimoncong	Baru	Jauh	19	Dekat	0
51	30-Jul-17	DB	Perempuan	> 50 tahun	IRT	Tidak Sekolah	Non permanen	Malino	Malino	Tinggimoncong	Baru	Dekat	3	Dekat	0
52	30-Jul-17	DR	Laki-laki	> 50 tahun	Petani	Tidak Sekolah	Semi permanen	Biringpanting	Ere'lembang	Tombolopao	Baru	Jauh	7	Dekat	0
53	30-Jul-17	Ta	Laki-laki	41-50 tahun	Petani	Tamat SD/ sederajat	Permanen	Lembanna	Pattapang	Tinggimoncong	Baru	Jauh	6	Dekat	0
54	31-Jul-17	Se	Perempuan	> 50 tahun	IRT	Tidak tamat SD/ sederajat	Permanen	Bangkeng ta'bing	Bontolerung	Tinggimoncong	Baru	Jauh	10	Dekat	0
55	31-Jul-17	Zu	Laki-laki	11-20 tahun	Pelajar	Tidak tamat SD/ sederajat	Permanen	Bonto te'ne	Bontolerung	Tinggimoncong	Baru	Jauh	11	Dekat	0
56	31-Jul-17	Sy	Laki-laki	21-30 tahun	Petani	Tamat SD/ sederajat	Permanen	Panaikang	Bontolerung	Tinggimoncong	Baru	Jauh	13	Dekat	0
57	31-Jul-17	Sya	Laki-laki	11-20 tahun	Petani	Tamat SMP/ sederajat	Non permanen	Salutowa	Parigi	Tinggimoncong	Baru	Jauh	10	Dekat	0

Nilai Suhu	Ket. Suhu	Nilai Kelembaban	Ket. Kelembaban	Nilai Luas Ventilasi	Ket. Luas Ventilasi	Nilai Kepadatan Hunian	Ket. Kepadatan Hunian	Kondisi Lantai	Ket. Kondisi Lantai	Kondisi Dinding	Ket. Kondisi Dinding	Nilai Ketinggian	Ket. Ketinggian
25.8	Memenuhi syarat	77	Tidak memenuhi syarat	7	Tidak Memenuhi Syarat	24	Memenuhi Syarat	Kedap air	Memenuhi syarat	Kedap air	Memenuhi syarat	1068	>200
24.5	Memenuhi syarat	82	Tidak memenuhi syarat	6	Tidak Memenuhi Syarat	11	Memenuhi Syarat	Tidak kedap air	Tidak memenuhi syarat	Tidak kedap air	Tidak memenuhi syarat	1068	>200
24.9	Memenuhi syarat	87	Tidak memenuhi syarat	14	Memenuhi syarat	21	Memenuhi Syarat	Kedap air	Memenuhi syarat	Kedap air	Memenuhi syarat	1054	>200
26.2	Memenuhi syarat	75	Tidak memenuhi syarat	2	Tidak Memenuhi Syarat	17	Memenuhi Syarat	Tidak kedap air	Tidak memenuhi syarat	Tidak kedap air	Tidak memenuhi syarat	1116	>200
25.8	Memenuhi syarat	75	Tidak memenuhi syarat	5	Tidak Memenuhi Syarat	14	Memenuhi Syarat	Tidak kedap air	Tidak memenuhi syarat	Tidak kedap air	Tidak memenuhi syarat	1116	>200
26.4	Memenuhi syarat	73	Tidak memenuhi syarat	4	Tidak Memenuhi Syarat	10	Memenuhi Syarat	Kedap air	Memenuhi syarat	Tidak kedap air	Tidak memenuhi syarat	1160	>200
26.5	Memenuhi syarat	74	Tidak memenuhi syarat	9	Tidak Memenuhi Syarat	20	Memenuhi Syarat	Tidak kedap air	Tidak memenuhi syarat	Tidak kedap air	Tidak memenuhi syarat	1246	>200
26.3	Memenuhi syarat	74	Tidak memenuhi syarat	24	Memenuhi syarat	10	Memenuhi Syarat	Kedap air	Memenuhi syarat	Kedap air	Memenuhi syarat	1255	>200
26.3	Memenuhi syarat	74	Tidak memenuhi syarat	24	Memenuhi syarat	10	Memenuhi Syarat	Kedap air	Memenuhi syarat	Kedap air	Memenuhi syarat	1255	>200
27.3	Memenuhi syarat	74	Tidak memenuhi syarat	7	Tidak Memenuhi Syarat	35	Memenuhi Syarat	Kedap air	Memenuhi syarat	Kedap air	Memenuhi syarat	831	>200
26.1	Memenuhi syarat	81	Tidak memenuhi syarat	9	Tidak Memenuhi Syarat	32	Memenuhi Syarat	Tidak kedap air	Tidak memenuhi syarat	Tidak kedap air	Tidak memenuhi syarat	1002	>200
26.6	Memenuhi syarat	80	Tidak memenuhi syarat	10	Memenuhi syarat	17	Memenuhi Syarat	Tidak kedap air	Tidak memenuhi syarat	Tidak kedap air	Tidak memenuhi syarat	1002	>200
27.4	Memenuhi syarat	79	Tidak memenuhi syarat	3	Tidak Memenuhi Syarat	6	Tidak memenuhi syarat	Tidak kedap air	Tidak memenuhi syarat	Tidak kedap air	Tidak memenuhi syarat	850	>200
26.2	Memenuhi syarat	77	Tidak memenuhi	5	Tidak Memenuhi	48	Memenuhi Syarat	Tidak kedap air	Tidak memenuhi	Tidak kedap	Tidak memenuhi	854	>200



			syarat		Syarat				syarat	air	syarat		
23.9	Memenuhi syarat	90	Tidak memenuhi syarat	0.5	Tidak Memenuhi Syarat	14	Memenuhi Syarat	Kedap air	Memenuhi syarat	Tidak kedap air	Tidak memenuhi syarat	760	>200
25.2	Memenuhi syarat	84	Tidak memenuhi syarat	7	Tidak Memenuhi Syarat	16	Memenuhi Syarat	Kedap air	Memenuhi syarat	Tidak kedap air	Tidak memenuhi syarat	813	>200
27	Memenuhi syarat	78	Tidak memenuhi syarat	1	Tidak Memenuhi Syarat	6	Tidak memenuhi syarat	Tidak kedap air	Tidak memenuhi syarat	Tidak kedap air	Tidak memenuhi syarat	779	>200
27.5	Memenuhi syarat	74	Tidak memenuhi syarat	0	Tidak Memenuhi Syarat	8	Tidak memenuhi syarat	Tidak kedap air	Tidak memenuhi syarat	Tidak kedap air	Tidak memenuhi syarat	773	>200
26.3	Memenuhi syarat	74	Tidak memenuhi syarat	13	Memenuhi syarat	27	Memenuhi Syarat	Tidak kedap air	Tidak memenuhi syarat	Tidak kedap air	Tidak memenuhi syarat	851	>200
25.1	Memenuhi syarat	78	Tidak memenuhi syarat	7	Tidak Memenuhi Syarat	6	Tidak memenuhi syarat	Tidak kedap air	Tidak memenuhi syarat	Tidak kedap air	Tidak memenuhi syarat	877	>200
26.1	Memenuhi syarat	77	Tidak memenuhi syarat	7	Tidak Memenuhi Syarat	23	Memenuhi Syarat	Tidak kedap air	Tidak memenuhi syarat	Tidak kedap air	Tidak memenuhi syarat	878	>200
26.5	Memenuhi syarat	70	Memenuhi syarat	0	Tidak Memenuhi Syarat	3	Tidak memenuhi syarat	Tidak kedap air	Tidak memenuhi syarat	Tidak kedap air	Tidak memenuhi syarat	965	>200
26.4	Memenuhi syarat	72	Tidak memenuhi syarat	7	Tidak Memenuhi Syarat	22	Memenuhi Syarat	Kedap air	Memenuhi syarat	Kedap air	Memenuhi syarat	887	>200
27	Memenuhi syarat	74	Tidak memenuhi syarat	3	Tidak Memenuhi Syarat	24	Memenuhi Syarat	Tidak kedap air	Tidak memenuhi syarat	Tidak kedap air	Tidak memenuhi syarat	888	>200
27.1	Memenuhi syarat	69	Memenuhi syarat	2	Tidak Memenuhi Syarat	12	Memenuhi Syarat	Tidak kedap air	Tidak memenuhi syarat	Tidak kedap air	Tidak memenuhi syarat	1024	>200
21.5	Memenuhi syarat	83	Tidak memenuhi syarat	4.6	Tidak Memenuhi Syarat	27	Memenuhi Syarat	Tidak kedap air	Tidak memenuhi syarat	Tidak kedap air	Tidak memenuhi syarat	1458	>200
20.9	Memenuhi syarat	84	Tidak memenuhi syarat	0.66	Tidak Memenuhi Syarat	11	Memenuhi Syarat	Tidak kedap air	Tidak memenuhi syarat	Tidak kedap air	Tidak memenuhi syarat	1078	>200
19.5	Memenuhi syarat	83	Tidak memenuhi syarat	8.75	Tidak Memenuhi Syarat	24	Memenuhi Syarat	Kedap air	Memenuhi syarat	Kedap air	Memenuhi syarat	946	>200

31.7	Tidak memenuhi syarat	70	Memenuhi syarat	4	Tidak Memenuhi Syarat	55	Memenuhi Syarat	Tidak kedap air	Tidak memenuhi syarat	Kedap air	Memenuhi syarat	96	<200
30.2	Tidak memenuhi syarat	80	Tidak memenuhi syarat	5.8	Tidak Memenuhi Syarat	19	Memenuhi Syarat	Tidak kedap air	Tidak memenuhi syarat	Tidak kedap air	Tidak memenuhi syarat	35	<200
27.1	Memenuhi syarat	84	Tidak memenuhi syarat	2.4	Tidak Memenuhi Syarat	48	Memenuhi Syarat	Tidak kedap air	Tidak memenuhi syarat	Tidak kedap air	Tidak memenuhi syarat	51	<200
31.5	Tidak memenuhi syarat	64	Memenuhi syarat	3.3	Tidak Memenuhi Syarat	28	Memenuhi Syarat	Tidak kedap air	Tidak memenuhi syarat	Tidak kedap air	Tidak memenuhi syarat	22	<200
30.5	Tidak memenuhi syarat	72	Tidak memenuhi syarat	3.7	Tidak Memenuhi Syarat	14	Memenuhi Syarat	Tidak kedap air	Tidak memenuhi syarat	Tidak kedap air	Tidak memenuhi syarat	30	<200
31.2	Tidak memenuhi syarat	60	Memenuhi syarat	9.8	Tidak Memenuhi Syarat	13	Memenuhi Syarat	Kedap air	Memenuhi syarat	Kedap air	Memenuhi syarat	28	<200
31.5	Tidak memenuhi syarat	59	Memenuhi syarat	2.8	Tidak Memenuhi Syarat	20	Memenuhi Syarat	Kedap air	Memenuhi syarat	Kedap air	Memenuhi syarat	31	<200
32.2	Tidak memenuhi syarat	63	Memenuhi syarat	17.2	Memenuhi syarat	11	Memenuhi Syarat	Tidak kedap air	Tidak memenuhi syarat	Tidak kedap air	Tidak memenuhi syarat	251	>200
31.2	Tidak memenuhi syarat	64	Memenuhi syarat	2.9	Tidak Memenuhi Syarat	18	Memenuhi Syarat	Kedap air	Memenuhi syarat	Kedap air	Memenuhi syarat	258	>200
32.8	Tidak memenuhi syarat	57	Memenuhi syarat	0.8	Tidak Memenuhi Syarat	24	Memenuhi Syarat	Tidak kedap air	Tidak memenuhi syarat	Tidak kedap air	Tidak memenuhi syarat	135	<200
31.5	Tidak memenuhi syarat	83	Tidak memenuhi syarat	1.2	Tidak Memenuhi Syarat	48	Memenuhi Syarat	Kedap air	Memenuhi syarat	Kedap air	Memenuhi syarat	136	<200
32.7	Tidak memenuhi syarat	57	Memenuhi syarat	9	Tidak Memenuhi Syarat	20	Memenuhi Syarat	Kedap air	Memenuhi syarat	Kedap air	Memenuhi syarat	108	<200
31	Tidak memenuhi syarat	62	Memenuhi syarat	10.8	Memenuhi syarat	12	Memenuhi Syarat	Tidak kedap air	Tidak memenuhi syarat	Tidak kedap air	Tidak memenuhi syarat	139	<200
29.8	Memenuhi syarat	63	Memenuhi syarat	16.6	Memenuhi syarat	20	Memenuhi Syarat	Kedap air	Memenuhi syarat	Kedap air	Memenuhi syarat	124	<200
29.4	Memenuhi syarat	62	Memenuhi syarat	8	Tidak Memenuhi Syarat	10	Memenuhi Syarat	Kedap air	Memenuhi syarat	Kedap air	Memenuhi syarat	156	<200

28.5	Memenuhi syarat	69	Memenuhi syarat	0	Tidak Memenuhi Syarat	8	Tidak memenuhi syarat	Tidak kedap air	Tidak memenuhi syarat	Tidak kedap air	Tidak memenuhi syarat	163	<200
26.9	Memenuhi syarat	73	Tidak memenuhi syarat	1.3	Tidak Memenuhi Syarat	12	Memenuhi Syarat	Kedap air	Memenuhi syarat	Kedap air	Memenuhi syarat	253	>200
26.4	Memenuhi syarat	76	Tidak memenuhi syarat	1.2	Tidak Memenuhi Syarat	39	Memenuhi Syarat	Tidak kedap air	Tidak memenuhi syarat	Tidak kedap air	Tidak memenuhi syarat	261	>200
27.6	Memenuhi syarat	67	Memenuhi syarat	6.3	Tidak Memenuhi Syarat	12	Memenuhi Syarat	Tidak kedap air	Tidak memenuhi syarat	Tidak kedap air	Tidak memenuhi syarat	237	>200
27.9	Memenuhi syarat	70	Memenuhi syarat	2.3	Tidak Memenuhi Syarat	28	Memenuhi Syarat	Tidak kedap air	Tidak memenuhi syarat	Tidak kedap air	Tidak memenuhi syarat	240	>200
27.2	Memenuhi syarat	78	Tidak memenuhi syarat	9.8	Tidak Memenuhi Syarat	40	Memenuhi Syarat	Kedap air	Memenuhi syarat	Kedap air	Memenuhi syarat	684	>200
27.5	Memenuhi syarat	85	Tidak memenuhi syarat	3	Tidak Memenuhi Syarat	36	Memenuhi Syarat	Tidak kedap air	Tidak memenuhi syarat	Tidak kedap air	Tidak memenuhi syarat	684	>200
27.5	Memenuhi syarat	74	Tidak memenuhi syarat	5.7	Tidak Memenuhi Syarat	7	Tidak memenuhi syarat	Tidak kedap air	Tidak memenuhi syarat	Tidak kedap air	Tidak memenuhi syarat	1135	>200
25.9	Memenuhi syarat	75	Tidak memenuhi syarat	1.35	Tidak Memenuhi Syarat	22	Memenuhi Syarat	Tidak kedap air	Tidak memenuhi syarat	Tidak kedap air	Tidak memenuhi syarat	1461	>200
24.9	Memenuhi syarat	71	Tidak memenuhi syarat	13	Memenuhi syarat	23	Memenuhi Syarat	Kedap air	Memenuhi syarat	Kedap air	Memenuhi syarat	1498	>200
31.3	Tidak memenuhi syarat	66	Memenuhi syarat	14.7	Memenuhi syarat	9	Memenuhi Syarat	Tidak kedap air	Tidak memenuhi syarat	Kedap air	Memenuhi syarat	880	>200
23	Memenuhi syarat	81	Tidak memenuhi syarat	4.1	Tidak Memenuhi Syarat	18	Memenuhi Syarat	Kedap air	Memenuhi syarat	Kedap air	Memenuhi syarat	822	>200
25	Memenuhi syarat	82	Tidak memenuhi syarat	12.5	Memenuhi syarat	30	Memenuhi Syarat	Kedap air	Memenuhi syarat	Kedap air	Memenuhi syarat	1109	>200
31.2	Tidak memenuhi syarat	79	Tidak memenuhi syarat	3.1	Tidak Memenuhi Syarat	24	Memenuhi Syarat	Tidak kedap air	Tidak memenuhi syarat	Tidak kedap air	Tidak memenuhi syarat	582	>200

### LAMPIRAN 3

#### Nama Responden

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ag	1	1.8	1.8	1.8
	Ai	1	1.8	1.8	3.5
	Ar	1	1.8	1.8	5.3
	BT	1	1.8	1.8	7.0
	Bu	1	1.8	1.8	8.8
	DB	2	3.5	3.5	12.3
	De	1	1.8	1.8	14.0
	DJ	1	1.8	1.8	15.8
	DN	1	1.8	1.8	17.5
	DR	1	1.8	1.8	19.3
	DS	2	3.5	3.5	22.8
	DT	2	3.5	3.5	26.3
	Fa	1	1.8	1.8	28.1
	Fi	1	1.8	1.8	29.8
	HS	1	1.8	1.8	31.6
	HW	1	1.8	1.8	33.3
	J.K	1	1.8	1.8	35.1
	Jb	2	3.5	3.5	38.6
	Ju	1	1.8	1.8	40.4
	Kam	1	1.8	1.8	42.1
	Kar	1	1.8	1.8	43.9
	M. J	1	1.8	1.8	45.6
	MA	1	1.8	1.8	47.4
	MN	1	1.8	1.8	49.1

Mu	1	1.8	1.8	50.9
Nh	1	1.8	1.8	52.6
Nin	2	3.5	3.5	56.1
NL	1	1.8	1.8	57.9
NW	1	1.8	1.8	59.6
PB	1	1.8	1.8	61.4
PR	1	1.8	1.8	63.2
PS	1	1.8	1.8	64.9
Ram	1	1.8	1.8	66.7
RL	1	1.8	1.8	68.4
RT	1	1.8	1.8	70.2
Rw	1	1.8	1.8	71.9
RW	1	1.8	1.8	73.7
Sa	1	1.8	1.8	75.4
Se	1	1.8	1.8	77.2
SM	1	1.8	1.8	78.9
Su	2	3.5	3.5	82.5
Sup	1	1.8	1.8	84.2
Sw	1	1.8	1.8	86.0
Sy	2	3.5	3.5	89.5
Sya	1	1.8	1.8	91.2
Ta	2	3.5	3.5	94.7
TN	1	1.8	1.8	96.5
Yu	1	1.8	1.8	98.2
Zu	1	1.8	1.8	100.0
Total	57	100.0	100.0	

**Jenis Kelamin**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Perempuan	24	42.1	42.1	42.1
	Laki-laki	33	57.9	57.9	100.0
	Total	57	100.0	100.0	

**Umur**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	11-20 tahun	9	15.8	15.8	15.8
	21-30 tahun	8	14.0	14.0	29.8
	31-40 tahun	9	15.8	15.8	45.6
	41-50 tahun	13	22.8	22.8	68.4
	> 50 tahun	18	31.6	31.6	100.0
	Total	57	100.0	100.0	

**Pekerjaan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	IRT	14	24.6	24.6	24.6
	Petani	18	31.6	31.6	56.1
	PNS	3	5.3	5.3	61.4
	Pelajar	6	10.5	10.5	71.9
	Tidak Ada	11	19.3	19.3	91.2
	Penjaga tambang	1	1.8	1.8	93.0

Supir	3	5.3	5.3	98.2
Buruh bangunan	1	1.8	1.8	100.0
Total	57	100.0	100.0	

#### Pendidikan Terakhir

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Sekolah	13	22.8	22.8	22.8
Tidak tamat SD/ sederajat	11	19.3	19.3	42.1
Tamat SD/ sederajat	17	29.8	29.8	71.9
Tamat SMP/ sederajat	6	10.5	10.5	82.5
Tamat SMA/ sederajat	9	15.8	15.8	98.2
S1	1	1.8	1.8	100.0
Total	57	100.0	100.0	

#### Jenis rumah

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Non permanen	24	42.1	42.1	42.1
Semi permanen	7	12.3	12.3	54.4
Permanen	26	45.6	45.6	100.0
Total	57	100.0	100.0	

#### Alamat

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Alur C	2	3.5	3.5	3.5
Baeka	1	1.8	1.8	5.3
Bangkeng Batu	1	1.8	1.8	7.0

Bangkeng ta'bing	1	1.8	1.8	8.8
Biringpanting	1	1.8	1.8	10.5
Bolaromang	1	1.8	1.8	12.3
Bonto te'ne	1	1.8	1.8	14.0
Bontorannu	1	1.8	1.8	15.8
Buki	4	7.0	7.0	22.8
Cekdam	1	1.8	1.8	24.6
Cilallang	1	1.8	1.8	26.3
Jaleko	1	1.8	1.8	28.1
Kabbasa'	1	1.8	1.8	29.8
Kampung Beru	2	3.5	3.5	33.3
Lembanna	1	1.8	1.8	35.1
Malino	1	1.8	1.8	36.8
Mamampang	1	1.8	1.8	38.6
Mangottong	5	8.8	8.8	47.4
Mappadang	3	5.3	5.3	52.6
Maroanging	1	1.8	1.8	54.4
Pa'rasangang toa	1	1.8	1.8	56.1
Padang taring	2	3.5	3.5	59.6
Pakkolompo	5	8.8	8.8	68.4
Panaikang	1	1.8	1.8	70.2
Pao	1	1.8	1.8	71.9
Pappareang	3	5.3	5.3	77.2
Parang labbua	2	3.5	3.5	80.7
Parangboddong	1	1.8	1.8	82.5
Pattallassang	2	3.5	3.5	86.0



Salutowa	1	1.8	1.8	87.7
Sapohiring	1	1.8	1.8	89.5
Silanggayya	1	1.8	1.8	91.2
Simbang	2	3.5	3.5	94.7
Suka	2	3.5	3.5	98.2
Tamaroka	1	1.8	1.8	100.0
Total	57	100.0	100.0	

		Desa/Kelurahan			Cumulative
		Frequency	Percent	Valid Percent	Percent
Valid	Balassuka	1	1.8	1.8	1.8
	Belabori	2	3.5	3.5	5.3
	Belapungranga	4	7.0	7.0	12.3
	Bolaromang	1	1.8	1.8	14.0
	Bontolerung	3	5.3	5.3	19.3
	Bontoparang	2	3.5	3.5	22.8
	Borisallo	5	8.8	8.8	31.6
	Ere'lembang	4	7.0	7.0	38.6
	Garassi	2	3.5	3.5	42.1
	Kanreapia	2	3.5	3.5	45.6
	Lanna	3	5.3	5.3	50.9
	Lonjoboko	2	3.5	3.5	54.4
	Malino	1	1.8	1.8	56.1
	Mamampang	1	1.8	1.8	57.9
	Pao	4	7.0	7.0	64.9
	Parang	2	3.5	3.5	68.4

Parigi	1	1.8	1.8	70.2
Pattapang	1	1.8	1.8	71.9
Ta'binjai	3	5.3	5.3	77.2
Tamaona	3	5.3	5.3	82.5
Tonasa	10	17.5	17.5	100.0
Total	57	100.0	100.0	

#### Kecamatan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Parangloe	20	35.1	35.1	35.1
Tinggimoncong	8	14.0	14.0	49.1
Tombolopao	29	50.9	50.9	100.0
Total	57	100.0	100.0	

#### Jenis Kasus

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Baru	54	94.7	94.7	94.7
Putus berobat	1	1.8	1.8	96.5
Kambuh	2	3.5	3.5	100.0
Total	57	100.0	100.0	

**Jarak rumah dengan puskesmas**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Jauh	48	84.2	84.2	84.2
	Dekat	9	15.8	15.8	100.0
	Total	57	100.0	100.0	

**Jarak rumah dengan puskesmas**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	2	3.5	3.5	3.5
	10	8	14.0	14.0	17.5
	11	1	1.8	1.8	19.3
	12	1	1.8	1.8	21.1
	13	3	5.3	5.3	26.3
	14	2	3.5	3.5	29.8
	15	6	10.5	10.5	40.4
	16	3	5.3	5.3	45.6
	17	3	5.3	5.3	50.9
	19	1	1.8	1.8	52.6
	20	1	1.8	1.8	54.4
	21	1	1.8	1.8	56.1
	3	2	3.5	3.5	59.6
	3.5	1	1.8	1.8	61.4
	4	3	5.3	5.3	66.7
	4.5	1	1.8	1.8	68.4
	5	3	5.3	5.3	73.7

5.5	1	1.8	1.8	75.4
6	6	10.5	10.5	86.0
6.5	1	1.8	1.8	87.7
7	4	7.0	7.0	94.7
8	1	1.8	1.8	96.5
9	2	3.5	3.5	100.0
Total	57	100.0	100.0	

**Jarak rumah penderita dengan PMO**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Jauh	3	5.3	5.3	5.3
	Dekat	54	94.7	94.7	100.0
	Total	57	100.0	100.0	

**Jarak rumah penderita dengan PMO**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0	54	94.7	94.7	94.7
	1	2	3.5	3.5	98.2
	3	1	1.8	1.8	100.0
	Total	57	100.0	100.0	

Nilai suhu

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	19.5	1	1.8	1.8	1.8
	20.9	1	1.8	1.8	3.5
	21.5	1	1.8	1.8	5.3
	23.0	1	1.8	1.8	7.0
	23.9	1	1.8	1.8	8.8
	24.5	1	1.8	1.8	10.5
	24.9	2	3.5	3.5	14.0
	25.0	1	1.8	1.8	15.8
	25.1	1	1.8	1.8	17.5
	25.2	1	1.8	1.8	19.3
	25.8	2	3.5	3.5	22.8
	25.9	1	1.8	1.8	24.6
	26.1	2	3.5	3.5	28.1
	26.2	2	3.5	3.5	31.6
	26.3	3	5.3	5.3	36.8
	26.4	3	5.3	5.3	42.1
	26.5	2	3.5	3.5	45.6
	26.6	1	1.8	1.8	47.4
	26.9	1	1.8	1.8	49.1
	27.0	2	3.5	3.5	52.6
	27.1	2	3.5	3.5	56.1
	27.2	1	1.8	1.8	57.9
	27.3	1	1.8	1.8	59.6
	27.4	1	1.8	1.8	61.4

27.5	3	5.3	5.3	66.7
27.6	1	1.8	1.8	68.4
27.9	1	1.8	1.8	70.2
28.5	1	1.8	1.8	71.9
29.4	1	1.8	1.8	73.7
29.8	1	1.8	1.8	75.4
30.2	1	1.8	1.8	77.2
30.5	1	1.8	1.8	78.9
31.0	1	1.8	1.8	80.7
31.2	3	5.3	5.3	86.0
31.3	1	1.8	1.8	87.7
31.5	3	5.3	5.3	93.0
31.7	1	1.8	1.8	94.7
32.2	1	1.8	1.8	96.5
32.7	1	1.8	1.8	98.2
32.8	1	1.8	1.8	100.0
Total	57	100.0	100.0	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Suhu

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Memenuhi syarat	43	75.4	75.4	75.4
	Tidak memenuhi syarat	14	24.6	24.6	100.0
	Total	57	100.0	100.0	

Nilai kelembaban

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	57	2	3.5	3.5	3.5
	59	1	1.8	1.8	5.3
	60	1	1.8	1.8	7.0
	62	2	3.5	3.5	10.5
	63	2	3.5	3.5	14.0
	64	2	3.5	3.5	17.5
	66	1	1.8	1.8	19.3
	67	1	1.8	1.8	21.1
	69	2	3.5	3.5	24.6
	70	3	5.3	5.3	29.8
	71	1	1.8	1.8	31.6
	72	2	3.5	3.5	35.1
	73	2	3.5	3.5	38.6
	74	8	14.0	14.0	52.6
	75	3	5.3	5.3	57.9
	76	1	1.8	1.8	59.6
	77	3	5.3	5.3	64.9
	78	3	5.3	5.3	70.2
	79	2	3.5	3.5	73.7
	80	2	3.5	3.5	77.2
	81	2	3.5	3.5	80.7
	82	2	3.5	3.5	84.2
	83	3	5.3	5.3	89.5
	84	3	5.3	5.3	94.7

85	1	1.8	1.8	96.5
87	1	1.8	1.8	98.2
90	1	1.8	1.8	100.0
Total	57	100.0	100.0	

**Kelembaban**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Memenuhi syarat	17	29.8	29.8	29.8
	Tidak memenuhi syarat	40	70.2	70.2	100.0
	Total	57	100.0	100.0	

**Nilai Luas ventilasi**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	1	1.8	1.8	1.8
	3	1	1.8	1.8	3.5
	4	1	1.8	1.8	5.3
	5	2	3.5	3.5	8.8
	6	1	1.8	1.8	10.5
	7	2	3.5	3.5	14.0
	9	2	3.5	3.5	17.5
	10	1	1.8	1.8	19.3
	14	1	1.8	1.8	21.1
	24	2	3.5	3.5	24.6
	0	3	5.3	5.3	29.8
	0.5	1	1.8	1.8	31.6



0.66	1	1.8	1.8	33.3
0.8	1	1.8	1.8	35.1
1	1	1.8	1.8	36.8
1.2	2	3.5	3.5	40.4
1.3	1	1.8	1.8	42.1
1.35	1	1.8	1.8	43.9
10.8	1	1.8	1.8	45.6
12.5	1	1.8	1.8	47.4
13	2	3.5	3.5	50.9
14.7	1	1.8	1.8	52.6
16.6	1	1.8	1.8	54.4
17.2	1	1.8	1.8	56.1
2	1	1.8	1.8	57.9
2.3	1	1.8	1.8	59.6
2.4	1	1.8	1.8	61.4
2.8	1	1.8	1.8	63.2
2.9	1	1.8	1.8	64.9
3	2	3.5	3.5	68.4
3.1	1	1.8	1.8	70.2
3.3	1	1.8	1.8	71.9
3.7	1	1.8	1.8	73.7
4	1	1.8	1.8	75.4
4.1	1	1.8	1.8	77.2
4.6	1	1.8	1.8	78.9
5.7	1	1.8	1.8	80.7
5.8	1	1.8	1.8	82.5

6.3	1	1.8	1.8	84.2
7	4	7.0	7.0	91.2
8	1	1.8	1.8	93.0
8.75	1	1.8	1.8	94.7
9	1	1.8	1.8	96.5
9.8	2	3.5	3.5	100.0
Total	57	100.0	100.0	

#### Luas Ventilasi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Memenuhi syarat	11	19.3	19.3	19.3
	Tidak Memenuhi Syarat	46	80.7	80.7	100.0
	Total	57	100.0	100.0	

#### Nilai Kepadatan Hunian

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	1	1.8	1.8	1.8
	6	3	5.3	5.3	7.0
	7	1	1.8	1.8	8.8
	8	2	3.5	3.5	12.3
	9	1	1.8	1.8	14.0
	10	4	7.0	7.0	21.1
	11	2	3.5	3.5	24.6
	11	1	1.8	1.8	26.3
	12	4	7.0	7.0	33.3

13	1	1.8	1.8	35.1
14	3	5.3	5.3	40.4
16	1	1.8	1.8	42.1
17	2	3.5	3.5	45.6
18	2	3.5	3.5	49.1
19	1	1.8	1.8	50.9
20	4	7.0	7.0	57.9
21	1	1.8	1.8	59.6
22	2	3.5	3.5	63.2
23	2	3.5	3.5	66.7
24	5	8.8	8.8	75.4
27	2	3.5	3.5	78.9
28	2	3.5	3.5	82.5
30	1	1.8	1.8	84.2
32	1	1.8	1.8	86.0
35	1	1.8	1.8	87.7
36	1	1.8	1.8	89.5
39	1	1.8	1.8	91.2
40	1	1.8	1.8	93.0
48	2	3.5	3.5	96.5
48	1	1.8	1.8	98.2
55	1	1.8	1.8	100.0
Total	57	100.0	100.0	

**Kepadatan Hunian**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Memenuhi Syarat	50	87.7	87.7	87.7
	Tidak memenuhi syarat	7	12.3	12.3	100.0
	Total	57	100.0	100.0	

**Keadaan Lantai**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kedap air	22	38.6	38.6	38.6
	Tidak kedap air	35	61.4	61.4	100.0
	Total	57	100.0	100.0	

**Kondisi Lantai**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Memenuhi syarat	22	38.6	38.6	38.6
	Tidak memenuhi syarat	35	61.4	61.4	100.0
	Total	57	100.0	100.0	

**Keadaan dinding**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kedap air	21	36.8	36.8	36.8
	Tidak kedap air	36	63.2	63.2	100.0
	Total	57	100.0	100.0	

**Kondisi Dinding**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Memenuhi syarat	21	36.8	36.8	36.8
	Tidak memenuhi syarat	36	63.2	63.2	100.0
	Total	57	100.0	100.0	

**Ketinggian**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	22	1	1.8	1.8	1.8
	28	1	1.8	1.8	3.5
	30	1	1.8	1.8	5.3
	31	1	1.8	1.8	7.0
	35	1	1.8	1.8	8.8
	51	1	1.8	1.8	10.5
	96	1	1.8	1.8	12.3
	108	1	1.8	1.8	14.0
	124	1	1.8	1.8	15.8
	135	1	1.8	1.8	17.5
	136	1	1.8	1.8	19.3
	139	1	1.8	1.8	21.1
	156	1	1.8	1.8	22.8
	163	1	1.8	1.8	24.6
	237	1	1.8	1.8	26.3
	240	1	1.8	1.8	28.1

251	1	1.8	1.8	29.8
253	1	1.8	1.8	31.6
258	1	1.8	1.8	33.3
261	1	1.8	1.8	35.1
582	1	1.8	1.8	36.8
684	2	3.5	3.5	40.4
760	1	1.8	1.8	42.1
773	1	1.8	1.8	43.9
779	1	1.8	1.8	45.6
813	1	1.8	1.8	47.4
822	1	1.8	1.8	49.1
831	1	1.8	1.8	50.9
850	1	1.8	1.8	52.6
851	1	1.8	1.8	54.4
854	1	1.8	1.8	56.1
877	1	1.8	1.8	57.9
878	1	1.8	1.8	59.6
880	1	1.8	1.8	61.4
887	1	1.8	1.8	63.2
888	1	1.8	1.8	64.9
946	1	1.8	1.8	66.7
965	1	1.8	1.8	68.4
1002	2	3.5	3.5	71.9
1024	1	1.8	1.8	73.7
1054	1	1.8	1.8	75.4
1068	2	3.5	3.5	78.9

1078	1	1.8	1.8	80.7
1109	1	1.8	1.8	82.5
1116	2	3.5	3.5	86.0
1135	1	1.8	1.8	87.7
1160	1	1.8	1.8	89.5
1246	1	1.8	1.8	91.2
1255	2	3.5	3.5	94.7
1458	1	1.8	1.8	96.5
1461	1	1.8	1.8	98.2
1498	1	1.8	1.8	100.0
Total	57	100.0	100.0	

**keterangan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	<200	14	24.6	24.6	24.6
	>200	43	75.4	75.4	100.0
	Total	57	100.0	100.0	

## LAMPIRAN 4

### DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1: Alat penelitian



Gambar 2: Kondisi jalan menuju rumah penderita TB





Gambar 3 : Wawancara dengan penderita TB



Gambar 4 : Jenis dan kondisi fisik rumah penderita TB