

**SKRINING PARTISI-PARTISI DAN FRAKSI-FRAKSI TIDAK LARUT  
HEKSAN DARI EKSTRAK METANOL KULIT BATANG KAYU JAWA  
[*Lannea coromandelica* (Houtt.) Merr] YANG PALING SELEKTIF  
MENGHAMBAT PERTUMBUHAN SEL KANKER HeLa DAN  
SEL KANKER MCF-7**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Farmasi  
Pada Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh:

**ZAKIAH ANUGERAH HAMZAH**

**NIM. 70100113079**

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**2017**

**SKRINING PARTISI-PARTISI DAN FRAKSI-FRAKSI TIDAK LARUT  
HEKSAN DARI EKSTRAK METANOL KULIT BATANG KAYU JAWA  
[*Lannea coromandelica* (Houtt.) Merr] YANG PALING SELEKTIF  
MENGHAMBAT PERTUMBUHAN SEL KANKER HeLa DAN  
SEL KANKER MCF-7**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Farmasi  
Pada Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

Oleh:

**ZAKIAH ANUGERAH HAMZAH**

**NIM. 70100113079**

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**2017**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Zakiah Anugerah Hamzah  
NIM : 70100113079  
Tempat, Tanggal Lahir : Pomalaa, 28 Oktober 1995  
Jur/Prodi/Konsentrasi : Farmasi  
Alamat : Jl. Perumnas Antang Raya NO. 104/Blok. A  
Judul : Skrining Partisi-Partisi dan Fraksi-Fraksi Tidak Larut  
Heksan dari Ekstrak Metanol Kulit Batang Kayu Jawa  
[*Lannea Coromandelica* (Houtt.) Merr] yang Paling  
Selektif Menghambat Pertumbuhan Sel Kanker Hela  
dan Sel Kanker MCF-7

Menyatakan bahwa Skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka Skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
MAKASSAR

Makassar, Agustus 2017  
Penyusun,

**Zakiah Anugerah Hamzah**  
70100113079

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Skrining Partisi-Partisi dan Fraksi- Fraksi Tidak Larut Heksan dari Ekstrak Metanol Kulit Batang Kayu Jawa [*Lannea Coromandelica* (Houtt.) Merr] yang Paling Selektif Menghambat Pertumbuhan Sel Kanker Hela dan Sel Kanker MCF-7**” yang disusun oleh **Zakiah Anugerah Hamzah**, NIM : **70100113079**, Mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, diuji dan dipertahankan dalam Ujian Sidang Skripsi yang diselenggarakan pada hari **senin**, tanggal **14 Agustus 2017 M** yang bertepatan dengan **21 Dzulqa’idah 1438 H**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

**Gowa, 14 Agustus 2017 M**  
**21 Dzulqa’idah 1438 H**

### DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc (.....)  
Sekretaris : Mukhriani S.Si., M.Si., Apt (.....)  
Pembimbing I : Nursalam Hamzah S.Si., M.Si., Apt (.....)  
Pembimbing II : Syamsuri Syakri S.Farm., M.Si., Apt (.....)  
Penguji I : Isriany Ismail S.Si., M.Si., Apt (.....)  
Penguji II : Dr. Dudung Abdullah. M.Ag (.....)

Dekan,

**Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc**  
**NIP. 19550203 198312 1 00**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah *Subhanahu wa ta'ala*, Tuhan semesta alam sang penegak takdir nan penolong paling Maha Pemurah, kasih sayangNya melampaui sifat Maha PenyayangNya itu, cintaNya menembus segala penjuru hingga Ia mutlak atas pemegang kendali hati bagi hamba-hamba ciptaanNya itu. Berkat cinta sang Maha Pencinta, penulis dapat menyelesaikan penelitian sekaligus penulisan skripsi ini. Shalawat dan Taslim penulis curahkan kepada Nabi Besar Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, yang telah menyingkap tabir kegelapan dan kejahiliyahan perbuatan umat manusia menuju generasi hanifiyyah yang beradab dan berprikemanusiaan. Skripsi dengan judul "*Skrining Partisi-Partisi dan Fraksi-Fraksi Tidak Larut Heksan dari Ekstrak Metanol Kulit Batang Kayu Jawa [Lannea Coromandelica (Houtt.) Merr] yang Paling Selektif Terhadap Penghambatan Pertumbuhan Sel Kanker Hela dan Sel Kanker MCF-7*", ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Farmasi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan dukungan dari banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, berupa untaian do'a-do'a, secarik nasehat dan motivasi, segudang pemikiran, serta berbagai petunjuk-petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sebagaimana mestinya.

Terkhusus ucapan terima kasih penulis haturkan sebesar-besarnya kepada suami tercinta **Baso Yudistira, AMK** yang senantiasa memberi dukungan serta do'a dan kasih sayang dalam naungan Rumah Tangga. Demikian kepada ke dua

malaikat dunia yang tercinta, Ayahanda **Drs. Hamzah M, Si** dan ibunda **Dra. Hj. Rapia Jamal** dengan seluruh hasrat kasih, cinta dan sayang, pengorbanan serta serta do'a yang senantiasa terlantunkan tak pernah putus, juga adik-adikku **Zahira Ainun Hamzah** dan **Muh. Rayhan Hamzah**, serta keluarga yang senantiasa memberikan restu dan do'anya.

Tak lupa pula penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Musafir Pababbari, M. Si.**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,
2. Bapak **Dr. dr. H. Andi Armyun Nurdin, M. Sc.**, selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan,
3. Ibu **Dr. Nur Hidayah, S. Kep., Ns., M. Kes.**, selaku Wakil Dekan I, Ibu **Dr. Andi Susilawaty, S. Si., M. Kes.**, selaku Wakil Dekan II, dan Bapak **Dr. Mukhtar Luthfi, M. Pd.**, selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan,
4. Ibu **Haeria, S. Si., M. Si.**, selaku Ketua Jurusan, dan **Ibu Mukhriani, S. Si., M. Si., Apt.**, selaku Sekretaris Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, serta seluruh Staf Jurusan Farmasi atas curahan ilmu pengetahuan dan segala bantuan yang diberikan pada penulis sejak menempuh pendidikan farmasi hingga saat ini,
5. Bapak **Nursalam Hamzah, S. Si., M. Si., Apt.**, selaku pembimbing pertama yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan, serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis, dan Ibu **Syamsuri Syakri, S.Farm., M.Si, Apt.**, selaku pembimbing kedua yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan, serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis,

6. Ibu **Isriany Ismail S.Si., M.Si., Apt** selaku penguji kompetensi yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan serta meluangkan waktunya untuk memberikan koreksi dan saran dalam penyusunan skripsi ini,
7. Bapak **Dr. Dudung Abdullah, M.Ag.** selaku penguji agama yang telah banyak memberikan arahan dan saran dalam penyusunan skripsi ini,
8. Bapak **Prof. dr. Supargiyono DTM & H.,SU.,PhD.,SpPark** selaku supervisor laboratorium bagian parasitologi Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, ibu **Suprihatin SE., MBA**, selaku teknisi Laboratorium yang ikut mendampingi dan mengarahkan saat berlangsungnya penelitian dan seluruh staf tata usaha bagian parasitologi Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
9. Kepada sahabat Ukhuwah Islamiyah **Wahyu Lyana Ningsi, Rezki Auliya, Nur Azizah Junaid, Nikmawati Siddik, dan Andi Try Resti Fauziah Sahib**, sosok yang berkontribusi dalam masa hijrah penulis.
10. Kepada ‘**Pak Salam Squad**’, **Muh. Ihsan H dan Nurhidayah Wahid** sebagai tim Kayu Jawa dan **Faradhiba Amriani** sebagai partner peneliti kanker, juga kepada **Muh. Faris Hidayat, Amiruddin, Anwar, Arditya Noor, Muh. Nurhidayah, Iffah Kholifah, Nurfadillah Absa, St. Rahma Akbar**, yang begitu semangat untuk segera menggapai titel kesarjanaaan.
11. Kepada teman-teman angkatan 2013 (**FAR13ION**) yang telah memberikan dukungan, semangat, dan do’a, terima kasih atas kebersamaan dan kekeluargaan kalian selama ini, kalian melampaui luar biasa.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan pada penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan skripsi ini ke depannya. Semoga skripsi ini dapat memberi

kemaslahatan bersama dan bernilai ibadah di sisi Allah *Subhanahu wa ta'ala*.  
Allahumma Aamiin.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Gowa,.....2017.

Penulis





## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK .....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
A. <i>Latar Belakang</i> .....	1
B. <i>Rumusan Masalah</i> .....	6
C. <i>Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian</i> .....	7
1. <i>Definisi Operasional</i> .....	7
2. <i>Ruang Lingkup Penelitian</i> .....	8
D. <i>Kajian Pustaka</i> .....	8
E. <i>Tujuan dan Manfaat Penelitian</i> .....	13
1. <i>Tujuan Penelitian</i> .....	13
2. <i>Manfaat Penelitian</i> .....	13
BAB II TINJAUAN TEORETIS .....	15
A. <i>Klasifikasi Tumbuhan</i> .....	15
B. <i>Anatomi dan Morfologi Tumbuhan</i> .....	15
C. <i>Kandungan kimia</i> .....	16
D. <i>Regulasi Siklus Sel</i> .....	23
E. <i>Kanker</i> .....	26
F. <i>Mekanisme Obat Antikanker</i> .....	31
G. <i>Sel HeLa</i> .....	34
H. <i>Sel MCF-7</i> .....	36
I. <i>Tinjauan tentang Uji Sitotoksisitas</i> .....	37

J. <i>Tinjauan tentang Uji Selektivitas</i> .....	38
K. <i>Paradigma Agama Islam</i> .....	39
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	46
A. <i>Jenis Penelitian</i> .....	46
B. <i>Waktu dan Lokasi Penelitian</i> .....	46
1. <i>Lokasi Penelitian</i> .....	46
2. <i>Waktu Penelitian</i> .....	46
C. <i>Pendekatan Penelitian</i> .....	46
D. <i>Sampel</i> .....	46
E. <i>Alat dan Bahan</i> .....	47
F. <i>Prosedur kerja</i> .....	48
1. <i>Penyiapan sampel</i> .....	48
2. <i>Ekstraksi Sampel</i> .....	48
3. <i>Partisi Sampel</i> .....	48
4. <i>Fraksinasi Sampel</i> .....	48
5. <i>Uji Golongan Senyawa</i> .....	49
6. <i>Uji sitotoksitas sel HeLa, MCF-7 dan Normal Vero</i> .....	50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	54
A. <i>Hasil</i> .....	54
B. <i>Pembahasan</i> .....	57
BAB V PENUTUP.....	69
A. <i>Kesimpulan</i> .....	69
B. <i>Saran</i> .....	69
DAFTAR PUSTAKA .....	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	101

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Senyawa dan Aktivitas Farmakologi .....	16
Tabel 2. Aktivitas Farmakologi dari Ekstrak Kayu Jawa [ <i>Lannea Coromandelica</i> (Houtt.) Merr] .....	22
Tabel 3. Hasil partisi .....	54
Tabel 4. Nilai Rf profil KLT partisi tidak larut heksan.....	54
Tabel 5. Hasil fraksinasi dari fraksi tidak larut heksan.....	54
Tabel 6. Hasil uji sitotoksitas sel kanker HeLa .....	55
Tabel 7. Hasil uji sitotoksitas sel kanker MCF-7 .....	55
Tabel 8. Hasil uji sitotoksitas sel normal Vero .....	56
Tabel 9. Nilai selektivitas indeks (SI) sel HeLa dan sel MF-7 .....	56
Tabel 10. Hasil Identifikasi Golongan Senyawa.....	57

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Siklus Sel.....	25
Gambar 2. Senyawa Quercetin.....	64
Gambar 3. Senyawa Isoquercetin.....	65
Gambar 4. Senyawa Morin .....	65
Gambar 5. Senyawa Physicion.....	65
Gambar 6. Senyawa Leucodelphin.....	65
Gambar 7. Senyawa Leucocyanidin.....	66
Gambar 8. Senyawa Kaempferol .....	66
Gambar 9. Senyawa Salvicine.....	67



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Alur Penelitian .....	77
Lampiran 2. Preparasi Partisi dan Fraksinasi Sampel Kulit Batang Kayu Jawa [ <i>Lannea coromandelica</i> (Houtt.) Merr]. .....	78
Lampiran 3. Preparasi Sampel Uji Sitotoksitas terhadap Sel Kanker HeLa, sel Kanker MCF-7 dan Sel Normal Vero .....	79
Lampiran 4. Proses Uji MTT (3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolium bromid).....	80
Lampiran 5. Alat dan Bahan yang digunakan .....	81
Lampiran 6. Prosedur Kerja .....	84
Lampiran 7. Hasil Pengamatan Sel .....	89
Lampiran 8. Kode Etik Penelitian.....	93
Lampiran 9. Sertifikat Kursus Kultur Jaringan .....	94
Lampiran 10. Data Primer Nilai Absorbansi Sel kanker HeLa.....	95
Lampiran 11. Data Nilai Standar Deviasi Sel Kanker HeLa .....	96
Lampiran 12. Data Nilai Absorbansi Sel Kanker MCF-7.....	97
Lampiran 13. Data Nilai Standar Deviasi Sel Kanker MCF-7.....	98
Lampiran 14. Data Nilai Absorbansi Sel Normal Vero .....	99
Lampiran 15. Data Nilai Standar Deviasi Sel Normal Vero .....	100

## ABSTRAK

Nama : Zakiah Anugerah Hamzah

NIM : 70100113079

Judul : Skrining Partisi-Partisi dan Fraksi-Fraksi Tidak Larut Heksan dari Ekstrak Metanol Kulit Batang Kayu Jawa [*Lannea Coromandelica* (Houtt.) Merr] yang Paling Selektif Menghambat Pertumbuhan Sel Kanker HeLa dan Sel Kanker MCF-7

---

Kanker serviks dan kanker payudara merupakan pembunuh terbesar yang menyerang kaum wanita, sehingga perlunya upaya penanganan yang membantu menekan tingkat kejadian kanker dan kematian akibat kanker. Kulit batang kayu jawa [*Lannea Coromandelica* (Houtt.) Merr] adalah salah satu komoditi tumbuhan lokal yang diprediksi mampu menghambat pertumbuhan dan perkembangan sel kanker. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui partisi dan fraksi manakah dari ekstrak metanol kulit batang kayu jawa [*Lannea Coromandelica* (Houtt.) Merr] yang paling selektif menghambat pertumbuhan sel kanker HeLa dan sel kanker MCF-7 dibandingkan sel normal vero.

Proses penelitian dimulai dengan metode ekstraksi menggunakan pelarut metanol, lalu pada tahap partisi cair padat menggunakan pelarut heksan sehingga diperoleh pemisahan partisi larut heksan dan partisi tidak larut heksan. Hasil partisi tidak larut heksan inilah yang dilanjutkan pada tahap fraksinasi menggunakan pelarut etil asetat dan metanol. Pengukuran aktivitas inhibisi pertumbuhan sel dilakukan menggunakan metode MTT Assay terhadap sel HeLa, sel MCF-7 dan sel normal vero. Adapun golongan senyawa yang ditemukan setelah diidentifikasi, didominasi oleh golongan senyawa terpenoid dan flavonoid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fraksi 1 dari partisi tidak larut heksan adalah fraksi yang paling selektif terhadap pertumbuhan sel kanker HeLa dengan nilai indeks selektivitas 4.032 dan sel kanker MCF-7 dengan nilai indeks selektivitas 2.740 dengan golongan senyawa yang aktif adalah alkaloid, flavonoid dan terpenoid, sedangkan partisi yang selektif adalah partisi larut heksan pada sel kanker HeLa dengan nilai indeks selektivitas 4.188 dan pada sel kanker MCF-7 dengan nilai selektivitas adalah 2.128 dengan golongan senyawa yang aktif adalah terpenoid dan flavonoid.

**Kata kunci:** *Lannea Coromandelica*; HeLa; MCF-7; Vero; MTT; Selektivitas

## ABSTRACT

Name : Zakiah Anugerah Hamzah  
Student Identity Number : 70100113079  
Title : Screening of Partition and Insoluble Fraction of Heksan from The Methanol Extract of [*Lannea Coromandelica* (Houtt.) Merr] which is The Most Selective Inhibition of The Growth of HeLa Cells and MCF-7 Cells

---

Cervical cancer and breast cancer are the biggest problem that kills women, therefore it is essential that great effort should take place to eradicate the number of deaths caused by cancer. The skin of Kayu Jawa [*Lannea Coromandelica* (Houtt.) Merr] is one of the local commodities that is believed to be able to prevent the growth of cancer cells. The objective of this research is to find out which fraction from the methanol extract of [*Lannea Coromandelica* (Houtt.) Merr] which is the most selective in the inhibition of the growth HeLa cells and MCF-7 cells compared to normal vero cells.

The research process started with extraction method using methanol solvent, then in the stage of solid liquid partition using solvent heksan, so obtained the separation of compounds soluble and not soluble partition of heksan. The results of partition insoluble heksan this is followed in the fractionation phase using etil acetat and methanol solvent. The measure of inhibition activity of growth cells is done using MTT Assay method HeLa cells, MCF-7 cells, and normal vero cells. the compound found after identified is dominated by the these Terpenoids and flavonoid compounds. The results has shown that fraction 1 from insoluble heksan partition is the most selective fraction in the growth of HeLa cells compared to normal vero cells with index selectivity score of 4.032 and MCF-7 cells with selectivity index score of 2.740 with the active compounds are flavonoids and alkaloids, and terpenoid, whereas selective partition is the partition of soluble heksan in cancer cells HeLa with selectivity index score of 4.188 and the partition of soluble heksan on MCF-7 cells with selectivity score of 2.128 with the active compounds are terpenoid flavonoids

**Keyword** : *Lannea coromandelica*; HeLa; MCF-7; Vero; MTT;  
**Selectivity**

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### ***A. Latar Belakang***

Kanker adalah penyebab kematian tertinggi di dunia dengan posisi ke dua setelah penyakit jantung. Angka kejadian penyakit kanker di seluruh dunia terus meningkat dan diperkirakan terdapat lebih dari satu juta pasien kanker baru setiap tahunnya. Berdasarkan data American Cancer Society, bahwa pada tahun 2017, 1.688.780 kasus kanker baru dan 600.920 kematian akibat kanker diproyeksikan terjadi di Amerika Serikat. Dari gabungan informasi beberapa situs menunjukkan bahwa tingkat kejadian kanker 20% lebih tinggi pada pria dibandingkan pada wanita, sementara tingkat kematian akibat kanker adalah 40% lebih tinggi. Kanker merupakan masalah kesehatan masyarakat yang utama di seluruh dunia dan merupakan penyebab utama kematian kedua di Amerika Serikat (Siegel, Miller, & Jemal, Cancer Statistics, 2017)

Pada tahun 2016, American Cancer Society memperkirakan jumlah kasus kanker baru dan kematian yang akan terjadi di negara Amerika tersebut dan selama beberapa tahun pun telah dikumpulkan data terbaru terhadap kejadian kanker, kematian akibat kanker, dan penderita kanker yang masih dapat bertahan hidup. Selanjutnya berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh National Cancer Institute, the Centers for Disease Control and Prevention of Cancer, and the North American Association, menunjukkan bahwa terdapat 1.685.210 kasus kanker baru dan 595.690 kematian akibat kanker yang diproyeksikan terjadi di Amerika Serikat (Siegel, Miller, & Jemal, Cancer Statistics, 2016)



Berdasarkan perkiraan GLOBOCAN, terdapat sekitar 14,1 juta kasus kanker baru dan 8,2 juta kematian yang terjadi pada tahun 2012 di seluruh dunia. Selama bertahun-tahun, telah mencapai persentase sekitar 57% kasus kanker baru dan 65% dari kematian akibat kanker di seluruh dunia (Torre, Bray, Siegel, Ferlay, Lortet-Tieulent, & Jemal, 2015)

Informasi di tingkat global dunia menunjukkan bahwa satu dari tujuh kematian terbesar disebabkan oleh kanker, dengan insiden penyebab kematian kanker lebih banyak daripada AIDS, tuberkulosis, dan malaria. Berdasarkan tingkat pembangunan kemajuan ekonomi suatu negara, pada tahun 2012 perkiraan tingkat kejadian kasus baru kanker dan kematian di seluruh dunia menunjukkan bahwa terdapat 1.676.600 kasus baru kanker payudara, dan 521.900 kasus kematian akibat kanker payudara, yang keduanya menyerang kaum wanita. Pada tahun 2030, diperkirakan beban global akan tumbuh menjadi 21.700.000 kasus kanker baru dan 13 juta kematian akibat kanker. Kejadian kanker yang akan membludak di masa depan pun diprediksi oleh sebab adopsi gaya hidup yang diketahui meningkatkan risiko kanker, seperti merokok, pola makan yang buruk, kurangnya aktivitas fisik dan sebagainya (American Cancer Society, 2015)

Di seluruh dunia, lebih dari 527.000 wanita didiagnosis dengan kanker serviks pada tahun 2012, dengan tingkat insiden yang bervariasi di seluruh dunia (Cancer Research UK, 2012). Invasi kanker serviks diperkirakan terdapat 12.800 kasus yang telah didiagnosis, dan dengan jumlah kematian 4.210 yang disebabkan oleh infeksi HPV yang terjadi pada tahun 2017 (American Cancer Society, 2015)

Terdapat sekitar 890 kematian akibat kanker serviks di Inggris pada tahun 2014, dengan jumlah kematian per hari lebih dari 2, dan berada pada posisi ke-17 kematian kanker. Di Eropa, sekitar 24.400 perempuan diperkirakan telah meninggal karena kanker serviks pada tahun 2012. Sedangkan tingkat kematian bervariasi di seluruh dunia, lebih dari 265.000 wanita diperkirakan telah meninggal karena kanker serviks pada tahun 2012 (Cancer Research UK, 2012)

Beberapa informasi data tersebut dapat disimpulkan bahwa insiden kejadian kanker beserta tingkat kematian yang terus terjadi sangat memprihatinkan, sehingga perlunya upaya penanganan untuk menekan jumlah penderita kanker dan kematian akibat kanker, khususnya kanker payudara dan kanker serviks yang menimpa kaum wanita di seluruh dunia.

Secara nasional prevalensi penyakit kanker pada penduduk semua umur di Indonesia tahun 2013 sebesar 1,4‰ atau diperkirakan sekitar 347.792 orang. Provinsi D.I. Yogyakarta memiliki prevalensi tertinggi untuk penyakit kanker, yaitu sebesar 4,1‰. Berdasarkan estimasi jumlah penderita kanker Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi dengan estimasi penderita kanker terbanyak, yaitu sekitar 68.638 dan 61.230 orang. Diketahui pula bahwa Penyakit kanker serviks dan payudara merupakan penyakit kanker dengan prevalensi tertinggi di Indonesia pada tahun 2013 (Kementrian Kesehatan, 2015)

Data informasi RS Kanker Dharmais menunjukkan bahwa penyakit kanker terbanyak di RS Kanker Dharmais selama 4 tahun berturut-turut adalah kanker payudara, serviks, paru, ovarium, rektum, tiroid, usus besar, hepatoma, dan nasofaring. Selama tahun 2010-2013, kanker payudara, kanker serviks dan kanker

paru merupakan tiga penyakit terbanyak di RS Kanker Dharmais, dan jumlah kasus baru serta jumlah kematian akibat kanker tersebut terus meningkat. Pada kasus kanker payudara menunjukkan jumlah kasus baru pada tahun 2010 adalah 711 dan kematian akibat kanker berjumlah 93 kasus, selanjutnya kanker baru pada tahun 2011 berjumlah 769 kasus dengan kematian akibat kanker berjumlah 120, kemudian pada tahun 2012 kasus baru kanker berjumlah 809 dengan kematian akibat kanker adalah 130, dan pada tahun 2013 jumlah kasus kanker baru berjumlah 819 dengan kematian akibat kanker berjumlah 217. Pada kanker serviks, kasus baru pada tahun 2010 berjumlah 296 dengan kematian akibat kanker berjumlah 93, sedangkan pada kasus baru kanker tahun 2011 berjumlah 300 dengan kematian akibat kanker berjumlah 35, kemudian kasus baru kanker pada tahun 2012 berjumlah 348 dengan kematian akibat kanker berjumlah 42, dan kasus kanker baru pada tahun 2013 berjumlah 356 dengan kematian akibat kanker berjumlah 55 kasus (Kementrian Kesehatan, 2015)

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa prevalensi kejadian penyakit kanker sangat tinggi, menempatkan posisi kanker serviks dan kanker payudara adalah penyakit kanker tertinggi di negara Indonesia.

Kemoterapi adalah langkah pengobatan yang efektif untuk melawan kanker. Obat sitotoksik pada terapi kemoterapi menyebabkan kematian sel kanker (Dan Granders Group, 2015). Namun dalam pengaplikasiannya menuai banyak efek samping dan resistensi antikanker itu sendiri. Terapi antikanker ditujukan untuk membunuh sel kanker tanpa merusak sel inangnya. Hal ini menjadi sulit karena sel kanker juga merupakan sel manusia juga. Di lain pihak, folikel rambut,

epitelium saluran pencernaan dan sumsum tulang juga mengalami pembelahan secara terus menerus. Oleh Karena itu, penggunaan terapi antikanker akan menyebabkan efek samping pada sel-sel tersebut (Nugroho, 2014). Berdasarkan jurnal internasional mengemukakan bahwa terapi kemoterapi dapat menginduksi terjadinya myelosuppresi, neutropenia, anemia dan trombositopenia berdasar penelitian yang telah dilakukan terhadap 751 pasien (Tia, Lui, Chua, & Strebel, 2015). Timbulnya efek samping oleh pengobatan kemoterapi disebabkan oleh selektifitas yang rendah dari agen kemoterapi tersebut.

Kemoterapi sitotoksik selalu menjadi andalan terhadap pengobatan kanker (Kumler, Stenvang, Moreira, Brunner, & Nielsen, 2015). Namun, oleh beberapa agen kemoterapi dapat menyebabkan resisten. Berdasarkan penelitian terhadap agen kemoterapi kanker payudara, seperti anthracyclines, taxanes dan fluoropyrimidines, secara signifikan meningkatkan hasil yang baik bagi pasien kanker payudara. Akan tetapi, mekanisme resistensi yang terjadi justru menghalangi efektivitas obat ini (Luca, et al., 2015). Kemoterapi antrasiklin sering digunakan dalam pengobatan berbagai penyakit berbahaya. Tetapi dalam pengaplikasiannya menemui beberapa keterbatasan oleh perkembangan efek samping yang serius, terutama kardiotoxicitas dan menjadi tidak efektif oleh adanya resistensi multidrug (MDR) (Czepas & Gwozdziński, 2014). Salah satu solusi untuk penyelesaian problematika tersebut adalah melalui pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara Indonesia. Indonesia merupakan *mega-center* ketersediaan hayati di dunia sehingga dapat dikelola dalam rangka pembangunan manusia-manusia yang sehat secara jasmaniah dan

rohaniah. Salah satu jenis tumbuhan yang digunakan secara empiris oleh sebagian masyarakat yang berpotensi sebagai antikanker adalah kayu jawa [*Lannea coromandelica* (Houtt.) Merr] Perlu diketahui bahwa pertimbangan akan permintaan penggunaan obat herbal justru meningkat. Termasuk salah satunya adalah pemanfaatan Kayu Jawa [*Lannea coromandelica* (Houtt.) Merr] Tanaman ini mengandung jumlah senyawa kimia dengan aktivitas farmakologi yang bervariasi dengan perlunya pengembangan pengobatan yang efektif dan salah satunya adalah diindikasikan bagi kanker. Diperoleh dosis LC50 ekstrak metanol kulit batang kayu jawa adalah  $53,59 \pm 1,33$  ug / ml (Reddy, Joy, & Kumar, 2011).

Oleh karena itu, atas dasar pandangan dan pertimbangan yang telah dipaparkan, di mana kanker menjadi penyakit penyebab kematian utama di seluruh dunia termasuk di negara Indonesia, serta salah satu terapi yang paling sering digunakan adalah kemoterapi nyatanya membuahakan banyak efek samping dan penyebab terjadinya resistensi, maka menjadi inisiatif peneliti untuk melakukan penelitian terhadap salah satu sumber daya alam yang dimiliki bangsa yakni simplisia kulit batang kayu jawa [*Lannea coromandelica* (Houtt.) Merr]. sebagai antikanker yang paling selektif terhadap penghambatan pertumbuhan sel kanker HeLa dan sel kanker MCF-7, dengan tidak menyerang sel normal vero.

### **B. Rumusan Masalah**

Partisi-partisi dan fraksi-fraksi tidak larut heksan manakah dari ekstrak metanol yang paling selektif terhadap penghambatan pertumbuhan sel kanker?

## C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

### 1. Definisi Operasional

- a. Skrining partisi dan fraksi merupakan suatu penapisan berbagai kandungan senyawa yang terdapat di dalam tumbuhan, berdasarkan yang paling selektif terhadap sel kanker HeLa dan sel kanker MCF-7 tanpa merusak sel normal vero.
- b. Partisi tidak larut heksan adalah hasil pemisahan senyawa yang tidak larut dengan pelarut n-heksan dari proses partisi cair-padat.
- c. Fraksi tidak larut leksan adalah hasil pemisahan senyawa yang memiliki polaritas yang sama dari proses fraksinasi menggunakan pelarut etil astetat dan metanol.
- d. Ekstrak metanol adalah sediaan pekat yang diperoleh melalui proses ekstraksi menggunakan pelarut yang sesuai, dengan mengekstraksi suatu zat aktif baik dari simplisia nabati atau pun simplisia hewani. Ekstrak yang digunakan dalam penelitian ini adalah ekstrak tumbuhan kayu jawa menggunakan pelarut metanol.
- e. Selektivitas berarti bersifat spesifik atau khusus. Dalam penelitian ini, ekstrak kayu jawa harus bersifat selektif untuk menghambat pertumbuhan dan perkembangan sel kanker dan sel normal, dengan menggunakan rumus selektivitas

$$SI = \frac{\%inhibisi\ sel\ kanker}{\%inhibisi\ sel\ normal}$$

- f. Sel kanker HeLa adalah yang berasal dari karsinoma serviks manusia, sel yang cepat membelah dan dapat ditumbuhkan dalam labu biakan.

Dalam penelitian ini, sel HeLa yang digunakan adalah sel yang dibudidayakan oleh Laboratorium Parasitologi Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dengan kode ATCC CCL-2.

- g. Sel kanker MCF-7 adalah salah satu model sel kanker payudara yang diambil dari jaringan payudara seorang wanita Kaukasian. Dalam penelitian ini, sel MCF-7 yang digunakan adalah sel yang dibudidayakan oleh Laboratorium Parasitologi Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dengan kode ATCC HTB-22.
- h. Sel normal vero adalah sel epitel ginjal normal kera, yang dibudidayakan di Laboratorium Parasitologi Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dengan kode ATCC CCL-81.

## 2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah skrining partisi-partisi dan fraksi-fraksi tidak larut heksan yang paling selektif terhadap penghambatan pertumbuhan sel kanker HeLa dan sel kanker MCF-7 dari ekstrak metanol tumbuhan Kayu jawa [*Lannea coromandelica* (Houtt.) Merr]

### D. Kajian Pustaka

1. (Weerapreeyakul, Junhom, Barusrux, & Thitimetharoch, 2016), “*Induction of apoptosis in human hepatocellular carcinoma cells by extracts of [Lannea coromandelica (Houtt.) Merr] and Diospyros castanea (Craib) Fletcher*”. Tanaman herbal adalah sumber antikanker pilihan. Penelitian ini bertujuan untuk menyaring senyawa yang memiliki aktivitas antikanker melalui beberapa tumbuhan, diantaranya ekstrak kasar ranting (a) *Bombax anceps* Pierre var.

Anceps (BA); (B) *Catunaregam tomentosa* (Blume ex DC.) Tirveng. (CT); (C) *Erythrophleum succirubrum* Gagnep. (ES); (D) [*Lannea coromandelica* (Houtt.) Merr] (LC); Dan (e) Daun dan (f) ranting *Diospyros castanea* (Craib) Fletcher (DC). Metode yang digunakan adalah Ekstrak air etanol 50% disiapkan dari masing-masing sampel tanaman. Efek antikanker in vitro dari enam ekstrak pada sel karsinoma hepatoseluler manusia (HepG2) dalam hal sitotoksitas diselidiki melalui uji merah netral, induksi apoptosis dengan pewarnaan 4', 6-diamidino-2-fenilindol (DAPI), dan fragmentasi DNA oleh elektroforesis gel agarose. Sel Vero normal diuji untuk perbandingan dan untuk menentukan selektivitas kanker. Kromatografi Gas- analisis spektrometri massa dilakukan untuk mengidentifikasi senyawa yang terdapat di dalam ekstrak. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dari enam ekstrak kasar memiliki sitotoksitas yang berbeda dan dikelompokkan menjadi tiga kelompok berdasarkan nilai IC dan indeks selektivitas (SI). Ekstrak kasar DC (ranting) memiliki sitotoksitas tinggi dan SI terhadap sel HepG2 yang sebanding untuk Melphalan ( $P=0,023$ ). Ekstrak kasar Dari DC (daun), LC (ranting), dan BA (ranting) memiliki efek sitotoksitas yang sedang dan nilai selektivitas indeks yang rendah. Meski semua ekstrak tanaman dapat menginduksi apoptosis lebih dari 50% Dari DAPI-positif Apoptosis sel HepG2, hanya DC (ranting) dan LC (ranting) yang menunjukkan mekanisme terbaik pada fragmentasi DNA oleh pengujian kadar logam. 2-Palmitoylglycerol merupakan senyawa utama umum kedua, sedangkan Pyrogallol dan lupeol adalah senyawa utama di ekstrak kasar DC (ranting). Selanjutnya Asam Hexadecanoic dan Asam octadecenoic merupakan senyawa utama dalam ekstrak kasar LC



(ranting), dengan tingkat toksisitas yang tinggi tapi selektivitas rendah. Adapun kesimpulannya bahwa ekstrak etanol dari ranting DC dan LC menginduksi apoptosis pada sel HepG2, di mana Pyrogallol dan lupeol yang terdapat di DC (ranting) yang bertanggung jawab atas sitotoksitas terhadap sel kanker HepG2.

Jurnal penelitian ini menguji induksi apoptosis (kematian sel terprogram) terhadap sel karsinoma hepatoselular dan sel normal vero sebagai pembanding dari ekstrak kulit batang kayu jawa [*Lannea coromandelica* (Houtt.) Merr] dengan senyawa yang diperoleh adalah Asam Hexadecanoic dan Asam octadecenoic. Sedangkan pada penulis, melakukan uji penghambatan pertumbuhan sel kanker yang paling selektif terhadap sel kanker HeLa dan sel kanker MCF-7, dan penulis pun juga menguji pada sel normal vero untuk mengetahui apakah *Lannea coromandelica* juga toksik dan menyerang sel normal vero atau tidak.

2. (Alam, Kwon, Lee, & Lee, 2017), “[*Lannea coromandelica* (Houtt.) Merr] *Induces Heme Oxygenase 1 (HO-1) Expression and Reduces Oxidative Stress via the p38/c-Jun N-Terminal Kinase–Nuclear Factor Erythroid 2-Related Factor 2 (p38/JNK–NRF2)-Mediated Antioxidant Pathway*”. Daun [*Lannea coromandelica* (Houtt.) Merr] digunakan di berbagai negara Bangladesh, seperti Garo, Pahan, dan suku Teli sebagai tanaman obat tradisional untuk mengobati hepatitis, diabetes, bisul, penyakit jantung, dan disentri. Efektivitas dari khasiat tersebut telah terbukti oleh studi fitokimia dan biologi terhadap Kulit dari *Lannea coromandelica* tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas antioksidan ekstrak *Lannea Coromandelica* (LCBE) beserta mekanismenya dari

senyawa yang terkandung dengan menggunakan sel RAW 264.7. LCBE dianalisis menggunakan kromatografi cair kinerja tinggi (KCKT) untuk mendeteksi senyawa utama polifenolik. Berbagai uji antioksidan in vitro telah dilakukan dengan menggunakan sel RAW 264.7. Identifikasi oleh HPLC menunjukkan adanya Asam galat, epigallocatechin-3-gallate, katekin, asam klorogenat, dan asam kafeat di dalam LCBE. Ekstrak tersebut menunjukkan kemampuan yang sangat ampuh untuk menangkal banyak radikal bebas, tanpa menunjukkan toksisitas apapun. Adanya regulasi NRF2 dari jalur sel RAW 264.7 melalui fosforilasi *p38 kinase* dan *c-Jun N-terminal kinase* (JNK) menunjukkan aktivitas antioksidan yang kuat. Hasil ini memberikan bukti ilmiah tentang potensinya yang ideal untuk mencegah penyakit yang berhubungan dengan oksidatif bebas dan memperlambat perkembangan penyakit.

Jurnal penelitian ini menguji aktivitas dan mekanisme molekuler melalui jalur protein *p38/c-Jun N-Terminal Kinase–Nuclear Factor Erythroid 2-Related Factor 2 (p38/JNK–NRF2)* terhadap antioksidan, menggunakan sel RAW 264.7, di mana identifikasi senyawa aktif yang berpotensi pada LCBE dilakukan menggunakan KCKT. Sedangkan pada penulis melakukan uji penghambatan pertumbuhan sel kanker yang paling selektif terhadap sel kanker HeLa, sel kanker MCF-7 dan sel normal vero. Lalu ditentukan nilai selektivitas indeks untuk mengetahui apakah *Lannea coromandelica* juga bersifat toksik dan menyerang sel normal vero atau tidak.

3. (Akter, Uddin, Grice, & Tiralongo, 2013), “*Cytotoxic activity screening of Bangladeshi medicinal plant extracts*”. Dilakukan penelitian aktivitas sitotoksik

dari 23 ekstrak metanol dari 19 tanaman obat di Negara Bangladesh terhadap fibroblas tikus sehat (NIH3T3), ginjal monyet sehat (VERO) dan empat sel kanker manusia (lambung, AGS; kolon, HT-29; dan payudara, MCF -7 dan MDA-MB-231) menggunakan uji MTT. Sitotoksisitas tinggi di semua lini sel yang diuji ditunjukkan oleh ekstrak *Aegiceras corniculatum* (buah) dan *Hymenodictyon excelsum* (kulit kayu) (nilai  $IC_{50}$  berkisar antara 0,0005 sampai 0,9980 dan 0,08 sampai 0,44 mg/mL). Empat belas ekstrak dari 11 jenis tumbuhan, yaitu *Clitoria ternatea* (bunga dan daun), *Dillenia indica* (daun), *Diospyros peregrina* (daun), *Dipterocarpus turbinatus* (kulit kayu dan daun), *Ecbolium viride* (daun), *Glinus oppositifolius* (keseluruhan tanaman), *Gnaphalium Luteoalbum* (daun), *Jasminum sambac* (daun), *Lannea coromandelica* (kulit kayu dan daun), *Mussaenda glabrata* (daun) dan *Saraca asoca* (daun), juga memiliki sitotoksik signifikan ( $IC_{50} < 1,0$  mg/mL) terhadap setidaknya satu dari beberapa jenis sel kanker yang telah diuji. Adapun yang lebih selektif adalah *Avicennia alba* (daun), *C. ternatea* (bunga dan daun), *Caesalpinia pulcherrima* (daun), *E. viride* (daun) dan *G. oppositifolius* (keseluruhan tanaman) menunjukkan sitotoksisitas hanya terhadap kedua sel kanker payudara (MCF-7 dan MDA-MB-23). Sebaliknya, *C. ternatea* (bunga dan daun) menunjukkan aktivitas sitotoksik tinggi terhadap MDA-MB-231 (nilai  $IC_{50}$  masing-masing 0,11 dan 0,49 mg/mL), sedangkan ekstrak tanaman *E. viride* dan *G. oppositifolius* menunjukkan aktivitas yang tinggi terhadap Sel MCF-7 (nilai  $IC_{50}$  masing-masing 0,06 dan 0,15 mg/mL). Hasil uji aktivitas sitotoksik untuk 9 spesies tanaman berkorelasi dengan penggunaan tradisional sebagai agen antikanker, sehingga sangat menarik untuk pengembangan obat lebih lanjut.

Jurnal penelitian ini menguji aktivitas sitotoksitas dari beberapa tumbuhan yang salah satunya adalah kulit dan daun kayu jawa (*Lannea coromandelica*), di mana menunjukkan indikasi antikanker dengan nilai  $IC_{50} < 1,0$  mg/mL. Sedangkan pada penulis melakukan uji penghambatan pertumbuhan sel kanker yang paling selektif antar sel kanker HeLa dan sel kanker MCF-7, dan penulis pun juga menguji pada sel normal vero untuk mengetahui apakah *Lannea coromandelica* juga toksik dan menyerang sel normal vero atau tidak.

#### **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Mengetahui partisi dan fraksi tidak larut heksan mana dari ekstrak metanol yang paling selektif terhadap penghambatan pertumbuhan sel kanker.

##### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Menambah khazanah ilmu pengetahuan sekaligus memberikan informasi ilmiah terkait potensi kearifan lokal tanaman obat yang tersebar di Indonesia, khususnya turut andil dalam penelitian dan pengembangan terbaru sebagai evaluasi bahan-bahan alam terhadap industri farmasi yang kiranya berpotensi sebagai obat antikanker dari khasiat kayu jawa [*Lannea Coromandelica* (Houtt.) Merr]
- b. Memberi sumbangsih pandangan terhadap integrasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap penemuan obat antikanker yang selektif berdasar potensi pemanfaatan dan pembudidayaan tanaman herbal kayu jawa [*Lannea coromandelica* (Houtt.) Merr.]

- c. Memberi bahan masukan terhadap penetapan kebijakan di bidang pengelolaan obat-obat tradisional oleh khasiat tumbuhan kayu jawa [*Lannea coromandelica* (Houtt.) Merr] agar menambah keanekaragaman tanaman obat ini dalam Materia Medika.



## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### **A. Klasifikasi Tumbuhan**

Secara taksonomi, klasifikasi tanaman Kayu Jawa (Tjitrosoepomo, 2010) (Reddy, Joy, & Kumar, 2011);

Kingdom : Plantae

Class : Dicotyledonae

Sub Class: Dialypetalae

Bangsa : Sapindales

Suku : Anacardiaceae

Marga : *Lannea*

Spesies : *Lannea coromandelica* Houtt. Merr

#### **B. Anatomi dan Morfologi Tumbuhan**

Kayu Jawa merupakan pohon yang dapat tumbuh hingga mencapai 25 m (umumnya 10-15 m). Permukaan batang berwarna abu-abu sampai coklat tua, kasar, ada pengelupasan serpihan kecil yang tidak teratur, batang dalam berserat berwarna merah atau merah muda gelap, dan memiliki eksudat yang bergetah. Daun meruncing, dan berjumlah 7-11. Bunga berkelamin tunggal berwarna hijau kekuningan. Buah berbiji, panjang 12 mm, bulat telur, kemerahan, dan agak keras. Tanaman ini berbunga dan berbuah dari bulan Januari hingga Mei (Sasidharan, 2004)


Kayu jawa memiliki sinonim *Odina wodier* yang tersebar di Himalaya (Swat-Bhutan), Assam, Burma, Indo-China, Ceylon, Pulau Andaman, China, dan Malaysia (Sasidharan, 2004)




Tanaman kayu jawa merupakan tanaman pekarangan yang dapat dimanfaatkan daun dan kulit batangnya dengan cara ditumbuk ataupun direbus untuk mengobati luka luar, luka dalam, dan perawatan paska persalinan (Rahayu, Sunarti, Sulistiarini, & Prawiroatmodjo, 2006).

Kulit batang dapat digunakan sebagai astringen, mengobati sakit perut, lepra, ulcer, penyakit jantung, disentri, dan sariawan. Kulit batang digunakan bersama dengan kulit batang *Aegle mermelos*, *Artocarpus heterophyllus* dan *Sygygium cumini* berguna dalam penyembuhan impotensi. Kulit batang dapat dikunyah selama 2-3 hari untuk menyembuhkan glossitis. Perebusan daun juga dianjurkan untuk pembengkakan dan nyeri lokal (Wahid M. A., 2009)





### C. Kandungan kimia




Tabel 1. Senyawa dan Aktivitas Farmakologi





Senyawa dan Rumus struktur senyawa	Aktivitas Farmakologi	Referensi
 <p style="text-align: center;">Gallic acid</p>	Antioksidan	(Alam, Kwon, Lee, & Lee, 2017)





 <p>(-)-Epigallocatechin gallate</p>	Antioksidan	(Alam, Kwon, Lee, & Lee, 2017)
 <p>Chlorogenic acid</p>	Antioksidan	(Alam, Kwon, Lee, & Lee, 2017)
 <p>Ellagic acid</p>	Cancer, ulcers.	(Reddy, Joy, & Kumar, 2011)






 <p>Sitosteril palmitate</p>		(Yun, Shu, Chen, Ji, & Ding, 2014)
 <p>Myricadiol</p>		(Yun, Shu, Chen, Ji, & Ding, 2014)
 <p>3-Amino-2-oxopropyl phosphate</p>		(Islam & Tahara, 2000)
 <p>Quercetin</p>	Anti inflamasi, stimulan and astringen	(Islam & Tahara, 2000); (Reddy, Joy, & Kumar, 2011); (Vikrant & M.L, 2011); (Yun, Shu,

 <p style="text-align: center;">Isoquercetin</p>	Antiinflamasi	Chen, Ji, & Ding, 2014) (Reddy, Joy, & Kumar, 2011)
 <p style="text-align: center;">Physicion</p>	Antimikroba, trombolitik, dan antioksidan, Ulcers,	(Reddy, Joy, & Kumar, 2011) (Wahid M. A., 2009)
 <p style="text-align: center;">Leucocyanidin</p>	Anti inflamasi, stimulan and astringen	(Reddy, Joy, & Kumar, 2011); (Vikrant & M.L, 2011)

 <p>Leucodelphinidin</p>	-	(Reddy, Joy, & Kumar, 2011)
 <p>Morin</p>	-	(Reddy, Joy, & Kumar, 2011)
 <p>Kaempferol</p>	Antimikroba, Disentri, Diare	(Reddy, Joy, & Kumar, 2011) (Islam & Tahara, 2000)
	Antimikroba, Trombolitik, Antioksidan, Kanker, Ulcer	(Yun, Shu, Chen, Ji, & Ding, 2014), (Vikrant & M.L, 2011) (Reddy, Joy, & Kumar, 2011)

<p style="text-align: center;"><math>\beta</math> – Sitosterol</p>		
 <p style="text-align: center;">Aralia Cerebroside</p>	-	(Yun, Shu, Chen, Ji, & Ding, 2014)
 <p style="text-align: center;">5,5'-dibutoxy-2,2'-bifuran</p>	-	(Yun, Shu, Chen, Ji, & Ding, 2014)
 <p style="text-align: center;"><math>\beta</math>-sitosteryl-3<math>\beta</math>-glucopyranoside-6'-O-palmitat</p>	-	(Yun, Shu, Chen, Ji, & Ding, 2014)
 <p style="text-align: center;"><math>\beta</math>-sitosterol palmitat</p>	-	(Yun, Shu, Chen, Ji, & Ding, 2014)

 <p>Asam Protocatechuic</p>	-	(Yun, Shu, Chen, Ji, & Ding, 2014)
 <p>(2R,3S)-(+)-3',5-dihydroxy-4',7-dimethoxydihydroflavonol</p>	-	(Islam & Tahara, 2000)
 <p>(2R,3R)-Dihydroflavonol</p>	-	(Islam & Tahara, 2000)

Tabel 2. Aktivitas Farmakologi dari Ekstrak Kayu Jawa [*Lannea Coromandelica* (Houtt.) Merr]

Aktivitas	Ekstrak	Referensi
Antioksidan dan Analgesik	Ekstrak Metanol	(Alam, Kwon, Lee, & Lee, 2017)
Antagonisme Glukagon terhadap terapi DM Tipe 2 (T2DM)	Ekstrak Air	(Walunj, Gupta, Joshi, Sabharwal, & Joshi, 2015)
Induksi Apoptosis terhadap sel kanker	Ekstrak Kombinasi Etanol 50% dan air.	(Weerapreeyakul, Junhom, Barusrux, &

HepG <sub>2</sub>		Thitimetharoch, 2016)
Antibakteri	Ekstrak Air	(Venkatesan, et al., 2015)
	Ekstrak kloroform	
	Ekstrak metanol	
Antioksidan menggunakan sel RAW 264.7	Ekstrak metanol	(Alam, Kwon, Lee, & Lee, 2017)
Hepatoprotektif dan Antioksidan	Ekstrak Kombinasi alkohol dan air	(Rao, Einstein, & Das, 2014)
Penyembuhan Luka	Ekstrak Etanol, Ekstrak Aseton	(Reddy, Joy, & Kumar, 2011)
Antiinflamasi	Ekstrak Etanol 96%	(Saputra, 2015)
Penurunan Tekanan darah	Ekstrak Etanol	(Reddy, Joy, & Kumar, 2011)
Antihiperqlikemik, Penurunan kadar glukosa	Ekstrak Metanol	(Mannan, et al., 2010)
Antifungi	Ekstrak Etanol 96%	(Mozer, 2015)
Antimikroba	Ekstrak Etanol dan Ekstrak Air	(Kaur, Jaiswal, & Jain, 2013)
Antibakteri	Ekstrak Etanol 96%	(Rahmadani, 2015)

#### D. *Regulasi Siklus Sel*


Siklus sel merupakan proses vital dalam kehidupan setiap organisme. Secara normal, siklus sel menghasilkan pembelahan sel. Pembelahan sel terdiri dari 2 proses utama, yaitu replikasi DNA dan pembelahan kromosom yang telah digandakan ke 2 sel anak. Secara umum, pembelahan sel terbagi menjadi 2 tahap, yaitu mitosis (pembelahan 1 sel menjadi 2 sel) dan interfase (proses di antara 2 mitosis). Interfase terdiri dari fase gap 1 (G1), sintesis DNA (S), gap 2 (G2). Setiap tahap dalam siklus sel dikontrol secara ketat oleh regulator siklus sel, yaitu:

a. Cyclin. Jenis cyclin utama dalam siklus sel adalah cyclin D, E, A, dan B. Cyclin diekspresikan secara periodik sehingga konsentrasi cyclin berubah-ubah pada setiap fase siklus sel. Berbeda dengan cyclin yang lain, cyclin D tidak diekspresikan secara periodik akan tetapi selalu disintesis selama ada stimulasi growth factor.

b. Cyclin-dependent kinases (Cdk). Cdk utama dalam siklus sel adalah Cdk 4, 6, 2, dan 1. Cdks merupakan treonin atau serin protein kinase yang harus berikatan dengan cyclin untuk aktivasinya. Konsentrasi Cdks relatif konstan selama siklus sel berlangsung. Cdks dalam keadaan bebas (tak berikatan) adalah inaktif karena catalytic site, tempat ATP dan substrat berikatan diblok oleh ujung C-terminal dari CKIs. Cyclin akan menghilangkan pengebloka tersebut. Ketika diaktifkan, Cdk akan memacu proses downstream dengan cara memfosforilasi protein spesifik.

c. Cyclin-dependent kinase inhibitor (CKI), merupakan protein yang dapat menghambat aktivitas Cdk dengan cara mengikat Cdk atau kompleks cyclinCdk. Cyclin-dependent kinase inhibitor terdiri dari dua kelompok protein yaitu INK4 (p15, p16, p18, dan p19) dan CIP/KIP (p21, p27, p57). Keluarga INK4 membentuk kompleks yang stabil dengan Cdk sehingga mencegah Cdk mengikat cyclin D. INK4 bertugas mencegah progresi fase G1. Keluarga CIP/KIP meregulasi fase G1 dan S dengan menghambat kompleks G1 cyclinCdk dan cyclin B-Cdk1. Protein p21 juga menghambat sintesis DNA dengan menonaktifkan proliferasi cell nuclear antigen (PCNA). Ekspresi p21 diregulasi oleh p53 karena p53 merupakan faktor transkripsi untuk ekspresi p21.

Siklus sel dimulai dari masuknya sel dari fase G<sub>0</sub> (quiescent) ke fase G<sub>1</sub> karena adanya stimulus oleh growth factor (Gambar 1). Pada awal fase G<sub>1</sub>, Cdk 4 dan atau 6 diaktifkan oleh cyclin D (cycD). Kompleks Cdk4/6 dengan cycD akan menginisiasi fosforilasi dari keluarga protein retinoblastoma (pRb) selama awal G<sub>1</sub>. Efek dari fosforilasi ini, fungsi histon deasetilasi (HDAC) yang seharusnya menjaga kekompakan struktur kromatin menjadi terganggu. Akibatnya struktur DNA menjadi longgar dan faktor transkripsi yang semula diikat pRb menjadi lepas dan transkripsi dari E2F responsive genes yang dibutuhkan dalam progresi siklus sel ke fase S menjadi aktif. Gen tersebut antara lain cycE, cycA, Cdc25, DNA polimerase, timidilat kinase, timidilat sintetase, DHFR, dll (Satyanarayana & Kaldis, 2009)



Gambar 1. Siklus sel (Sherr, 1996)



## **E. Kanker**

Kanker adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel-sel jaringan tubuh yang tidak normal. Sel-sel kanker akan berkembang dengan cepat, tidak terkendali, dan akan terus menerus membelah diri, selanjutnya menyusup ke jaringan disekitarnya (invasif) dan terus menyebar melalui jaringan ikat, darah dan menyerang organ-organ penting serta saraf tulang belakang (Yelia, 2009)

### **a. Kanker payudara**

Reseptor hormon yang paling dominan dalam keterlibatan kanker payudara adalah reseptor estrogen (ER), yang diaktifkan oleh sisi ikatan estrogen yakni estradiol (Lim, Metzger-Filho, & Winer, 2012). Reseptor hormone yang juga diekspresikan pada kanker payudara adalah reseptor progesterone, akan tetapi mengalami penghambatan dalam perkembangannya sebagai terapi antikanker karena antagonis golongan obat generasi pertama memiliki profile efek samping yang sangat parah (Brisken, 2013). Aktivasi ER menyebabkan respon transkripsi, baik dalam gen dengan dan tanpa respon elemen ER, dan juga respon seluler non-transkripsional, yang semuanya mendukung proliferasi dan kelangsungan hidup sel (Bjornstrom & Sjoberg, 2005). Terdapat 2 bentuk ER, yakni ER $\alpha$  dan ER $\beta$ . Kanker payudara ER $\alpha$ -positif menyumbang sekitar 70% dari semua kasus kanker payudara. Jalur PI3K / Akt adalah lah titik fokus mekanisme yang terlibat dalam resistensi obat kanker payudara. Sehingga dalam terapinya, terdapat tiga mekanisme molekuler kanker payudara, yakni fosfatidylinositide jalur 3-kinase / Akt, peran microRNA dalam

menekan gen, dan perubahan epigenetik yang mempengaruhi ekspresi gen (Toth, Boros, & Balint, 2012)

Reseptor Estrogen adalah salah satu anggota reseptor inti yang memperantarai aksi hormone estrogen (17 $\beta$ -estradiol) di dalam tubuh. Estrogen sendiri, melalui ikatannya dengan reseptornya, bekerja meregulasi pertumbuhan dan diferensiasi sel-sel sistem reproduksi baik pada wanita maupun pria. Di sisi lain, estrogen juga dapat memicu pertumbuhan, proliferasi dan metastase kanker payudara. Pada sel-sel jaringan reproduksi, aktivasi reseptor estrogen akan meregulasi ekspresi gen dan protein yang terkait dengan proliferasi dan diferensiasi sel seperti *growth factor* (TGF $\alpha$  dan TGF $\beta$ ), protein BRCA2, p53, protooncogene seperti c-mys, c-fos, Her-2/neu, cyclins dan lain-lain. Aktivitas ini akan mengatur proliferasi sel-sel payudara dan di sisi lain, dapat menyebabkan kanker payudara (Ikawati, 2014)

Payudara adalah alat tubuh yang letaknya dipermukaan, sehingga apabila terjadi kelainan (tumor) mudah diketahui oleh si penderita sendiri atau dokter yang memeriksa. Di Indonesia, kanker payudara merupakan kanker kedua yang paling banyak diderita kaum wanita, setelah kanker mulut/leher rahim.

Kanker payudara adalah kanker yang berasal dari kelenjar, saluran dan jaringan penunjang payudara tetapi tidak termasuk kulit payudara. Semakin bertambahnya usia seorang wanita, semakin besar kemungkinan terserang kanker payudara (Yelia, 2009)

Kanker payudara adalah tumor ganas yang menyerang jaringan payudara, merupakan penyakit yang paling ditakuti oleh kaum wanita, meskipun berdasarkan penemuan terakhir kaum pria pun bisa terkena kanker payudara ini, walaupun masih sangat jarang terjadi. Prognosis kanker payudara tergantung pada tingkat pertumbuhannya. Dari hasil pengamatan, umumnya penderita kanker payudara sudah tidak dapat ditolong karena terlambat diketahui dan diobati. Hasil penelitian di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, yang dilakukan dalam tahun 1988-1991 menunjukkan bahwa 80% penderita kanker payudara datang memeriksakan diri atau berobat ketika penyakitnya sudah pada stadium lanjut (Purwoastuti, 2008)

Setelah melewati stadium dini atau memasuki stadium lanjut, gejala serangan kanker payudara semakin banyak seperti berikut ini (Yelia, 2009);

1. Timbul rasa sakit atau nyeri pada payudara
2. Semakin lama benjolan yang tumbuh semakin membesar
3. Payudara mengalami perubahan bentuk dan ukuran karena mulai timbul pembengkakan
4. Mulai timbul luka pada payudara dan puting susu seperti koreng atau eksim
5. Kulit payudara menjadi berkerut mirip kulit jeruk
6. Terkadang keluar cairan atau darah berwarna merah kehitam-hitaman dari puting susu.

Meskipun terjadi progress kemajuan selama dekade terakhir, termasuk pengembangan suatu agen obat yang ditargetkan secara molekuler, kemoterapi sitotoksik tetap menjadi andalan pengobatan kanker. Pada kanker payudara,

anthracyclines dan taxanes dua pilihan kemoterapi utama yang digunakan secara rutin (Kumler, Stenvang, Moreira, Brunner, & Nielsen, 2015). Doxorubicin dianggap agen yang paling efektif dalam pengobatan pasien kanker payudara. Akan tetapi, resistensi terhadap agen ini adalah hal yang paling sering terjadi, sehingga justru menghambat proses kesembuhan terapi (Smith, Watson, O'Kane, Drew, Lind, & Cawkwell, 2006)

#### **b. Kanker serviks**

Kanker serviks merupakan keganasan nomor 3 paling sering dari alat kandungan dan menempati urutan ke-8 dari keganasan pada perempuan, di Amerika. Pada keadaan kanker, sel selaput lendir serviks mengadakan proliferasi (membelah dan tumbuh). Mulanya sel-sel membentuk susunan seperti bentuk kelenjar. Dengan permukaan seperti karet busa (spongiform) dan kaya dengan pembuluh darah (Yatim, 2008)

Serviks merupakan bagian dari rahim. Sel kanker tumbuh di serviks dan vagina. Karena itu dibicarakan terpisah dari kanker rahim. Rahim kaya dengan pembuluh darah. Pembuluh darah sekaligus mengurus indung telur, serviks dan vagina. Dalam situasi normal, sel akan bertambah tua dan memproduksi sel baru. Tetapi pada kanker, sel membelah secara tidak terkendali dan tidak menjadi tua, kemudian mati seperti biasa. Apabila terjadi sel membelah secara tidak terkendali, terbentuklah tumor atau satu masa. Masa ini akan menginvasi jaringan daerah sekitarnya hingga sel jaringan sekitar ikut berubah fungsi, tidak normal lagi (Yatim, 2008)

Ada 2 jenis tumor, yaitu:

1. Tumor jinak; Tumor jenis ini tidak mengancam kehidupan penderita. Tumor ini tidak menyerang jaringan sekitar, dan bila tumor diangkat, biasanya tidak tumbuh kembali.
2. Tumor ganas; Tumor jenis ini disebut juga kanker. Sel-sel kanker berkembang dan membelah tanpa perintah dan keperluan. Sel-sel ini akan menyerang jaringan sekitarnya dan menyebar ke organ lain melalui aliran darah atau cairan limphe yang merupakan bagian dari rangkaian dari sistem kekebalan tubuh (Yatim, 2008)

Kanker serviks adalah salah satu jenis keganasan atau neoplasma yang lokasinya terletak di daerah serviks, daerah leher rahim atau mulut rahim (Rasjidi, 2010)

Kanker leher rahim yang disebabkan oleh beberapa tipe human papillomavirus (HPV) beresiko tinggi seperti HPV16 dan HPV18 memiliki onkogen E6 dan E7 dimana kedua ekspresi gen ini menjadi prasyarat bagi perkembangan kanker dan pertahanan fenotip malignan. Pemusnahan kedua onkogen ini dipertimbangkan untuk diaplikasikan pada terapi molekuler kanker serviks (Yamato, et al., 2006)

Proses terjadinya karsinoma serviks sangat erat hubungannya dengan proses metaplasia. Masuknya bahan-bahan yang dapat mengubah perantai secara genetik atau mutagen pada saat fase aktif metaplasia dapat menimbulkan sel-sel yang berpotensi ganas. Perubahan biasanya terjadi pada daerah sambungan skuamosa

kolumnar (SSK) atau daerah transformasi. Mutagen pada umumnya berasal dari agen-agen yang ditularkan melalui hubungan seksual seperti *Human Papilloma Virus* (HPV) dan Herpes Simpleks Virus tipe 2 (HSV 2). Karsinogenesis pada kanker serviks dimulai sejak masuknya HPV sebagai faktor inisiator terjadinya gangguan sel serviks, di mana onkoprotein E6 dan E7 yang berasal dari HPV menyebabkan terjadinya degenerasi keganasan. Onkoprotein E6 akan mengikat p53 sehingga TSG p53 akan kehilangan fungsinya. Sementara itu, onkoprotein E7 akan mengikat TSG Rb. Ikatan ini menyebabkan terlepasnya E2F yang merupakan faktor transkripsi sehingga siklus sel berjalan tanpa kontrol (Bambang Sutrisna, 2010)

HPV adalah DNA virus yang menimbulkan proliferasi pada permukaan epidermal dan mukosa. Infeksi virus papilloma sering terdapat pada wanita yang masih melakukan aktivitas seksual.

Perjalanan transmisi virusnya sendiri dapat melalui rute non-seksual yang meliputi ekstragenital dan vertikal melalui transmisi dari ibu ke anak saat proses persalinan yang menyebabkan kondisi respirasi papilomatosis pada bayi (Rasjidi, 2010)

#### **F. Mekanisme Obat Antikanker**

Obat yang digunakan untuk mengobati kanker menghambat mekanisme proliferasi sel. Obat ini bersifat toksik bagi sel tumor maupun sel normal yang berproliferasi, khususnya pada sumsum tulang, epitel gastrointestinal, dan folikel rambut. Selektivitas sitotoksik terjadi karena tumor ganas mempunyai proporsi komponen sel yang membelah lebih tinggi daripada jaringan yang berproliferasi

normal. Pemberian obat sitotoksik bias berkaitan dengan efek samping yang tidak menyenangkan dan bahkan mengancam jiwa. Efek samping yang sering terjadi akibat banyak obat adalah mual dan muntah, ulkus mulut, diare, serta supresi sumsum tulang yang dapat menurunkan produksi salah satu atau semua elemen darah. Leukopenia berhubungan dengan risiko infeksi oportunistik yang meningkat; trombositopenia menyebabkan pendarahan, dan pembentukan sel darah merah yang menurun menyebabkan anemia. Selektivitas antitumor bersifat marginal.

a. Obat pengalkil

Digunakan secara luas pada kemoterapi kanker. Obat ini bereaksi dengan basa-basa pada DNA dan mencegah pembelahan sel dengan membuat ikatan silang dari dua heliks ganda. Obat-obat pengalkil dengan mudah membentuk ikatan kovalen. Golongan obat pengalkil adalah klormetin, siklofosfamid, klorambusil, busulfan dan sisplatin.

b. Antibiotik sitotoksik

Beberapa antibiotik yang diisolasi dari berbagai *Streptomyces* juga berinteraksi dengan DNA dan digunakan secara luas sebagai obat antikanker. Golongan antibiotik meliputi doksorubisin, daktinomisin, bleomisin, mitomisin, plikamisin.

c. Antimetabolit

Beberapa obat sitotoksik bekerja dengan turut terlibat dalam sintesis DNA. Obat-obat sitotoksik ini adalah antimetabolite dan menghambat sintesis purin dan pirimidin. Salah satunya adalah antagonis asam folat (metotreksat), secara kompetitif menghambat dihidrofolat reduktase dan mencegah regenerasi asam tetrahidrofolat,

koenzimnya, dan metilen tetrahidrofolat, yang penting untuk perubahan asam deoksiridilat menjadi asam timidilat. Karena sel-sel yang membelah dengan cepat membutuhkan banyak sekali asupan deoksitimidilat untuk sintesis DNA, metotreksat mencegah pembelahan sel. Sedangkan antipirimidin (fluorourasil) diubah menjadi asam fluorodeoksiuridilat yang menghambat timidilat sintetase, yaitu enzim yang bertanggungjawab untuk mengubah deoksiuridilat menjadi asam timidilat. Fluorourasil mengganggu sintesis DNA dengan menurunkan availabilitas asam timidilat.

d. Antibodi monoklonal

Merupakan obat baru yang bereaksi dengan antigen yang diekspresikan secara khusus pada sel kanker. Bagian Fc dari antibodi akan mengaktifasi mekanisme imun pejamu yang membunuh sel kanker. Trastuzumab mempunyai sasaran faktor pertumbuhan epidermal manusia (HER2/neu) dan digunakan untuk terapi kanker payudara metastatik. Rituximab melisis limfosit sel  $\beta$  dengan melekat pada protein permukaan (CD20). Rituximab digunakan untuk terapi limfoma sel  $\beta$

e. Hormon

Hormon steroid dan antagonis hormone sering digunakan pada terapi kanker. Glukokortikoid (misalnya prednisolone) menghambat pembelahan sel dengan menghambat sintesis DNA. Glukokortikoid digunakan luas pada terapi leukemia, limfoma, dan kanker payudara.

Pertumbuhan beberapa tumor, khususnya karsinoma payudara dan prostat, sebagian tergantung pada hormone. Tamoksifen, suatu antagonis estrogen,



digunakan secara luas untuk terapi adjuvant setelah pembedahan kanker payudara dan untuk terapi kanker payudara pascamenopause yang bermetastasis. Imunosupresan digunakan untuk mencegah penolakan jaringan setelah transplantasi organ dan untuk mengobati penyakit autoimun serta kolagen. Imunosupresan mempunyai efek samping serius dan seperti obat sitotoksik, meningkatkan kerentanan terhadap infeksi yang menyebar dengan cepat (Neal, 2005).

### **G. Sel HeLa**

Kasus HeLa dimulai pada tahun 1951, ketika sel manusia pertama dikembangkan dalam pembudidayaan jaringan jangka panjang. Sel HeLa adalah sel kanker serviks (leher rahim) yang diambil dari seorang perempuan bernama Henrietta Lacks. Walaupun Henrietta Lacks meninggal karena penyakitnya, sel dari tumor yang diidderita ini diberi nama singkat HeLa yang tidak saja selnya tetap hidup, tetapi dikembangkan (Eisen, 2013)

Sel HeLa, yang berasal dari karsinoma serviks manusia, adalah sel yang cepat membelah dan dapat ditumbuhkan dalam labu biakan. Lama siklus sel HeLa adalah sekitar 20 jam. Hanya satu jam yang digunakan untuk mitosis (Marks, 2000)

Kultur sel ini memiliki sifat semi melekat dan digunakan sebagai model sel kanker dan untuk mempelajari sinyal transduksi seluler (Anonim, Hela Cell, 2006b). Sel HeLa ini cukup aman dan merupakan sel manusia yang umum digunakan untuk kepentingan kultur sel (Guideand, Labwork Study, 2000). Sel ini oleh George Gey. Sel ini diperlakukan sebagai sel kanker yang dipercaya berasal dari sel kanker leher rahim Ms.Lacks, namun klasifikasi dari sel ini masih diperdebatkan. HeLa bersifat

imortal yang tidak dapat mati karena tua dan dapat membelah secara tidak terbatas selama memenuhi kondisi dasar bagi sel untuk tetap hidup masih ada. Strain-strain baru dari sel HeLa telah dikembangkan dalam berbagai macam kultur sel, tapi semua sel HeLa berasal dari keturunan yang sama. Sel HeLa telah mengalami transformasi akibat infeksi human papillomavirus 18 (HPV 18) dan berbeda dengan sel leher rahim yang normal (Anonim, Hela is also The German Name for Hel, Poland and The Cruiser SMS Hela., 2006c.)

Protein E6 dan E7 dari HPV memodulasi protein seluler yang mengatur daur sel. Protein E6 berikatan dengan tumor suppressor protein p53 dan mempercepat degradasi p53 yang diperantarai ubiquitin. Protein E6 juga menstimulasi aktivitas enzim telomerase. Sedangkan protein E7 dapat mengikat bentuk aktif terhipofosforilasi dari p105Rb dan anggota lain dari famili Rb. Ikatan ini menyebabkan destabilisasi Rb dan pecahnya kompleks Rb/E2F yang berperan menekan transkripsi gen yang diperlukan untuk cell cycle progression (DeFilippis, Goodwin, Wu, & DiMaio, 2003)

Sebagian besar sel kanker leher rahim, termasuk sel HeLa, mempunyai gen p53 dan p105Rb dalam bentuk wild type. Jadi, gen pengatur pertumbuhan yang aktif dalam sel normal ini juga terdapat dalam sel kanker leher rahim. Namun, aktivitasnya dihambat oleh ekspresi protein E6 dan E7 dari HPV (Goodwin & DiMaio, 2000)

Sel HeLa dapat tumbuh dengan agresif dalam media kultur. Media yang digunakan adalah media RPMI 1640-serum. Di dalamnya terkandung nutrisi yang

cukup untuk pertumbuhan, yaitu asam amino, vitamin, garam-garam anorganik, dan glukosa. Serum yang ditambahkan mengandung hormon-hormon yang mampu memacu pertumbuhan sel. Albumin berfungsi sebagai protein transport, lipid diperlukan untuk pertumbuhan sel, dan mineral berfungsi sebagai kofaktor enzim (Freshney, 1986)

Sel HeLa adalah sel kanker leher rahim akibat infeksi Human Papillomavirus (HPV 18) sehingga mempunyai sifat yang berbeda dengan sel leher rahim normal. Sel kanker leher rahim yang diinfeksi HPV diketahui mengekspresikan 2 onkogen, yaitu E6 dan E7. Protein E6 dan E7 terbukti dapat menyebabkan sifat imortal pada kultur primer keratinosit manusia, namun sel yang imortal ini tidak bersifat tumorigenik hingga suatu proses genetik terjadi. Jadi, viral onkogen tersebut tidak secara langsung menginduksi pembentukan tumor, tetapi menginduksi serangkaian proses yang pada akhirnya dapat menyebabkan sifat kanker (Goodwin & DiMaio, 2000)

#### **H. Sel MCF-7**

Sel MCF-7 merupakan salah satu model sel kanker payudara yang banyak digunakan dalam penelitian. Sel tersebut diambil dari jaringan payudara seorang wanita Kaukasian berumur 69 tahun golongan darah O, dengan Rh positif, berupa sel adherent (melekat) yang dapat ditumbuhkan dalam media penumbuh DMEM atau RPMI yang mengandung foetal bovine serum (FBS) 10% dan antibiotik Penicilin-Streptomycin 1% (Anonim, ATCC Cell Biology, 2007). Sel MCF-7 memiliki karakteristik antara lain resisten agen kemoterapi (Menchetner, et al., 1998)

(Aouali, Morjani, Trussardi, Soma, Giroux, & Manfait, 2003), mengekspresikan reseptor estrogen (ER +), overekspresi Bcl-2 (Butt, Firth, King, & Baxter, 2000) (Amundson, Myers, Scudiero, Kitada, Reed, & Fornace, 2000) dan tidak mengekspresikan caspase-3 (Onuki, Kawasaki, Baba, & Taira, 2003) (Prunet, Lemaire-Ewing, Ménétrier, Néel, & Lizard, 2005). Sel MCF-7 tergolong cell line adherent (ATCC, 2008) yang mengekspresikan reseptor estrogen alfa (ER- $\alpha$ ), resisten terhadap doxorubicin (Zampieri, Bianchi, Ruff, & Arbuthnot, 2002) dan tidak mengekspresikan caspase-3 (Onuki, Kawasaki, Baba, & Taira, 2003)

### ***I. Tinjauan tentang Uji Sitotoksitas***

Dalam pengembangan obat antikanker baru sebagai agen-agen kemoterapi kanker, evaluasi preklinik merupakan salah satu hal yang penting untuk mengetahui potensi aktivitas neoplastiknya. Evaluasi ini tidak hanya digunakan untuk obat-obat antikanker, tetapi juga untuk obat-obat lainnya, kosmetik, zat tambahan makanan, pestisida dan lainnya. Evaluasi yang telah terstandarisasi untuk menentukan apakah suatu material mengandung bahan yang berbahaya (toksik) secara biologis disebut uji sitotoksitas.

Tujuan uji ini adalah untuk mengetahui efek toksik suatu bahan secara langsung terhadap kultur jaringan (Siregar & Hadijono, 2000)

Syarat yang harus dipenuhi untuk sistem uji sitotoksitas diantaranya adalah sistem pengujian harus dapat menghasilkan kurva dosis-respon yang reproduibel dengan variabilitas yang rendah, kriteria respon harus menunjukkan hubungan linier dengan jumlah sel serta informasi yang didapat dari kurva dosis-respon harus sejalan

dengan efek yang muncul pada *in vivo*. Salah satu metode yang umum digunakan untuk menetapkan jumlah sel adalah metode MTT.

Prinsip dari metode MTT adalah terjadinya reduksi garam kuning tetrazolium MTT (3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolium bromid) oleh sistem reduktase. Suksinat tetrazolium yang termasuk dalam rantai respirasi dalam mitokondria sel-sel yang hidup membentuk kristal formazan berwarna ungu dan tidak larut air. Penambahan *reagen stopper* (bersifat detergenik) akan melarutkan kristal berwarna ini yang kemudian diukur absorbansinya menggunakan ELISA *reader*. Intensitas warna ungu yang terbentuk proporsional dengan jumlah sel hidup. Sehingga jika intensitas warna ungu semakin besar, maka berarti jumlah sel hidup semakin banyak.

#### **J. Tinjauan tentang Uji Selektivitas**

Selektivitas sampel terhadap sel kanker dibandingkan dengan sel vero normal dinyatakan oleh indeks selektivitas (SI). Sampel apapun dengan nilai SI lebih besar dari tiga dianggap memiliki selektivitas tinggi (Weerapreeyakul, Junhom, Barusrux, & Thitimetharoch, 2016). Uji ini dilakukan ketika hasil uji sitotoksik sel kanker memenuhi syarat, dengan nilai  $IC_{50} < 1.000 \mu\text{g/ml}$ .

Nilai SI menunjukkan selektivitas sampel terhadap sel uji. Selektivitas efek sitotoksik ekstrak etanol terpurifikasi sel normal vero dibandingkan sel kanker payudara MCF-7 dan sel HeLa dihitung dengan persamaan;

$$SI = \frac{\%inhibisi \text{ sel kanker}}{\%inhibisi \text{ sel normal}}$$

Penentuan selektivitas dilakukan dengan uji sitotoksik terhadap sel kanker payudara MCF-7 dan sel normal vero. Uji selektivitas dapat dilakukan ketika hasil

dari uji sitotoksik sel kanker memenuhi syarat yaitu nilai  $IC_{50}$  yang didapatkan kurang dari 1.000  $\mu\text{g/ml}$ . Suatu zat dikatakan tidak toksik bila nilai  $IC_{50} > 1.000 \mu\text{g/ml}$ .  $IC_{50}$  terpilih yang dipandang selektif berdasarkan uji sitotoksitas dikarakterisasi menggunakan pembacaan absorbansi dengan menggunakan ELISA (Mudyantini & Anggarwulan, 2010).

### **K. Paradigma Agama Islam**

Pemanfaatan tumbuh-tumbuhan demi kemaslahatan bersama adalah suatu bentuk aktualisasi pemberdayaan potensi alam sebagai suatu bentuk tanda-tanda kebesaran penciptaan Allah SWT dengan segala keaneka-ragamannya. Semestinya dalam rangka penciptaan ini, hendaknya direnungkan dengan pemaknaan yang lebih mendalam oleh kita selaku manusia yang telah diberi kesempurnaan akal untuk berpikir. Sebab tiada ciptaan yang diciptakan secara sia-sia, apa saja bentuknya itu selalu menuai hikmah dan manfaat. Demikian pula dengan tumbuh-tumbuhan ini.

Allah berfirman dalam Al-Qur'an;

أَوْ لَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ٧ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً  
وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ٨ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ٩

Terjemahan:

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyak Kami tumbuhkan di bumi berbagai macam (tumbuh-tumbuhan) yang baik? Sungguh, pada yang demikian terdapat tanda (kebesaran Allah), tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sungguh, Tuhanmu Dia-lah yang Mahaperkasa, Mahapenyayang.” (Qs. Asy-Syu'ara', 26: 7-9) (Departemen Agama, 2012)

Apakah mereka enggan memerhatikan gugusan bintang di langit dan apakah mereka tidak melihat ke bumi, berapa banyak Kami telah tumbuhkan di sana dari setiap pasang tumbuhan dengan berbagai macam jenis yang kesemuanya tumbuh subur lagi bermanfaat? (Shihab, 2009)

Argumentasi tafsir di atas adalah indikasi akan penciptaan Tuhan yang melimpah ruah, sehingga kita diperintahkan untuk memerhatikan yang berapa banyak itu, lalu disuruh untuk dimanfaatkan, digunakan, dipakai yang mengarah pada pencapaian kebahagiaan bersama dan kedamaian bersama.

Alangkah kasar jiwa manusia hanya tahu memakan hasil bumi saja, tetapi tidak mau tahu betapa asal tumbuh makanan itu? Semuanya terjadi *min kulli zaujin karimin*, dari perkawinan atau perkelaminan jantan dan betina. Orang Arab menanam kurma. Kurma yang subur adalah okulasi kurma tampang yang jantan dengan kurma tampang betina. Kadang-kadang buah-buahan sebagai manga dan rambutan, atau buah-buahan yang lain yang lain yang mulanya berbunga, beribu-ribu bunga mekar muncul dari celah dahan; separuh rontok ke bumi dan separuh menjadi buah. Diciptakan Allah berbagai makhluk untuk mempertemukan si jantan dengan si betina kembang itu, karena dia tidak dapat ziarah-menziarahi. Kumbang, lebah dan bahkan angin, mempertemukan zat kejantanan dengan zat kebetinaan. Setelah bertemu gugurlah satu kembang ke bumi, atau separuh kembang ke bumi, dan yang tinggal demi melanjutkan hidup. Itulah pengawinan atau perkawinan yang indah (Hamka, 2015).

Dengan pengetahuan yang dangkal kita telah tahu bahwa lahirnya manusia ke dunia ialah karena pertemuan kelamin laki-laki dengan perempuan. Dengan pengetahuan yang dangkal pula kita telah tahu bahwa berkembangnya binatang ternak kita karena pertemuan si jantan dengan si betina. Tetapi kalau kita telah berilmu lebih maju, akan tahulah kita bahwa buah, kurma, buah manga, dan beratus jenis buah-buahan yang lain adalah tercipta dalam rangka pertemuan *zaujin karimin*, pertemuan jantan dan betina yang indah dan mulia.

Dan pengetahuan ini kelak akan dapat lebih tinggi lagi, bahwasanya seluruh alam raya ini, terkandunglah sesuatu kekuatan besar, gabungan tenaga dan benda. Kekuatan besar itulah elektrisita. Barulah kekuatan ini menjadi kenyataan bila bertemu negatif dengan positif, betina dengan jantan, yang menerima dengan yang memberi. Kekuatan itulah yang menimbulkan atom. Dan atom itulah soal dari segala kejadian. Dan itu semua diatur dengan satu peraturan oleh Pengatur Tunggal (Hamka, 2015)

Manusia sekali-kali harus melepaskan perhatiannya dan perhatiannya dari semata-mata diri, dan terus renung keadaan yang berada disekelilingnya. Apakah artinya tubuh insan yang kecil ini dihadapan tenaga-tenaga dan peraturan yang ada di kelilingnya? Benarlah apa yang dikatakan orang, bahwasanya hidup di dunia bukanlah semata-mata untuk sandang untuk pangan, tetapi yang terutama sekali ialah berpikir merenung dan meninjau. Maka pada ayat berikutnya, ditegaskan oleh Allah,

“Semuanya itu adalah ayat. Tetapi kebanyakan mereka tidaklah percaya.”



Alangkah halusny anjuran pada ayat 7 di atas tadi. Manusia dianjurkan merenung alam kelilingnya. Di ayat-ayat yang lalu dianjurkan pula melihat kejadian langit, melihat berkelap-kelipnya bintang-bintang, meninjau hujan turun, memandangi kejadian hidup yang beratapkan langit, bukit, gunung yang menjadi pasak bumi dan bumi yang menjadi hamparan. Kadang-kadang melihat lalat atau yang lebih atas daripada lalat (*Ba'udhatan fama fauqaha*), bahkan dianjurkan juga melihat betapa hewan mampu membuat sarang, atau si lebah bersarang di gunung dan di bubungan rumah. Sekarang dalam ayat ini dianjurkan pula melihat tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, sayur-syuran, betapa terjadi perkawinan yang indah. Itu adalah ayat. Itu pun adalah pula tanda dari Maha Kekuasaan Ilahi. Tetapi di ujung ayat 8 dikatakan,

“Dan tidaklah kebanyakan mereka percaya.”

Mengapa agaknya mereka tidak percaya?

Ialah karena mereka tidak pernah meluruskan pikirannya ke sana. Mereka hanya siang malam menjuruskan pikiran kepada sandang dan pangan, dan kepentingan diri sendiri, keuntungan laba rugi benda. Jiwa yang kosong dari penilaian. Maka datanglah ayat 9 sebagai simpulan akan makna tersebut.

“Sesungguhnya Tuhan engkau itu adalah Mahakuasa dan Mahapenyayang. (Maha Pemurah).”

Dengan Allah memperingatkan sifat-Nya yang Mahakuasa al-Aziz tersimpanlah makna bahwasanya betapapun kelengahan dan tidak peduli daripada insan yang ingkar dan kufur, namun aturan Allah tidaklah akan berubah. Namun

alam akan tetap berjalan menurut peraturannya yang tentu. Namun orang yang menyisih ke tepi tidak peduli itu, tidaklah dapat mengelakkan din dari ketentuan Ilahi. Tidak ada satu kekuatan pun yang dapat menghambat kekuasaan Allah itu (Hamka, 2015)

Terdapat istilah “kembali ke alam” yang bukan lagi menjadi kata asing seiring dengan melesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengglobal. Pesatnya kehidupan modern, diduga berbanding lurus pula dengan tingginya insiden perkembangan suatu penyakit, sebab keberlangsungan kehidupan modern membuat manusia lebih menyukai pola yang instan, salah satunya makan makanan cepat saji padahal belum tentu makanan tersebut memenuhi kelayakan gizi bagi kesehatan tubuh manusia. Berdasarkan tafsir yang dikemukakan oleh Buya Hamka tersebut di atas, mengajak kita untuk benar-benar peduli, merenungi dan berpikir atas segala bentuk alam sekitar. Manusia-manusia selaku makhluk hidup yang telah diberi kesempurnaan penciptaan akal harus ikut berpartisipasi dalam hal pengembangan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam atau kearifan lokal bangsa yang ditujukan bagi keuntungan, kemanfaatan dan kemaslahatan umat yang salah satunya adalah dengan metode pengkajian ilmiah dan penemuan inovasi dan kreativitas terbaru melalui riset penelitian. Potensi tumbuh-tumbuhan herbal dapat digunakan salah satunya sebagai sarana pengembangan sediaan obat, dalam rangka meminimalisir kejadian efek samping suatu penyakit, menemukan obatbaru, mencegah suatu penyakit atau untuk memelihara kesehatan. Pada kasus obat-obat antikanker yang telah beredar, dapat menyebabkan timbulnya resisten dan berbagai

efek samping yang diakibatkan oleh penggunaan obat-obat sintetik tersebut. Hal ini pula lah yang menjadi basis pengembangan obat-obat antikanker melalui pemanfaatan sumber daya alam secara universal dan tumbuhan Kayu Jawa secara khusus. Sebab, sekali lagi, jenis apa-apa saja yang telah diciptakan olehNya tak ada yang lalai dan beroleh sia-sia semata, lebih dari itu ia perlu dimaknai secara esensial penciptaan alam ini sebagai salah satu bukti ke-Esa-an Allah SWT dengan penciptaannya yang transenden.

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

Rasulullah SAW bersabda: “Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit melainkan juga menurunkan obatnya (kesembuhan).” (HR. Al-Bukhari: 5678).

Sebagai orang yang beriman, maka menjadi kewajiban dan bentuk penyerahan tertinggi kepada Sang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang untuk yakin dengan kesembuhan yang datangnya hanya dari Allah SWT, sebab Dari Abu Sa’id Al-Khudri dan Abu Hurairah *radhiallahu ‘anhu* Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam* yang bersabda,

مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصْبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حَزَنٍ وَلَا أَدَى وَلَا غَمٍّ حَتَّى الشُّوْكَةُ يُشَاكِهَا  
إِلَّا كَفَرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ

“Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu keletihan, kesakitan, kekhawatiran dan kesedihan, dan tidak juga gangguan dan kesusahan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dengan cobaan-cobaan itu.” (HR. Al-Bukhari: 5641-5642) Secara tersirat makna hadis tersebut memerikan secara gamblang akan rahmat meluruhnya setiap dosa oleh

hamba-hambaNya ketika tertimpa berbagai kesusahan yang menyesakkan dada, dan hal ini pun merupakan manifestasi Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Allah SWT.



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### ***A. Jenis Penelitian***

Jenis penelitian ini yaitu berdasar pada analisis kuantitatif eksperimen terhadap uji penghambatan pertumbuhan sel kanker oleh senyawa tumbuhan kayu jawa dalam rangka pencarian selektivitas senyawa tanpa menyerang dan merusak sel normal tubuh.

#### ***B. Waktu dan Lokasi Penelitian***

##### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Farmasi Biologi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar dan Laboratorium Parasitologi Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

##### **2. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan setelah *Ethical Approval* diterbitkan oleh Komisi Etik Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada bulan april hingga bulan juni tahun 2017.

#### ***C. Pendekatan Penelitian***

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan *control group post test only*.

#### ***D. Sampel***

Penelitian ini menggunakan sampel kulit batang kayu jawa yang diambil di Kota Takalar, Sulawesi Selatan.

## **E. Alat dan Bahan**

### **1. Alat**

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian adalah corong kaca, toples, autoklaf, tabung reaksi, erlenmeyer, gelas ukur (*Pyrex Iwaki Glass*), botol kaca tertutup, timbangan analitik, timbangan manual, *waterbath*, box lampu UV, kertas label, kertas saring, kulkas suhu  $-20^{\circ}\text{C}$  dan  $-84^{\circ}\text{C}$ , Inkubator  $\text{CO}_2$  5% (*Hera Cell*), sentrifuge, *Laminar air flow (LAF) Clean Banch*, mikropipet 20  $\mu\text{l}$ , 200 $\mu\text{l}$  dan 1000  $\mu\text{l}$  (Gilson), *haemocytometer* (Neubauer), oven, seperangkat alat kromatografi kolom, mikroskop inverted, *ELISA plate reader*, mikroplate 96-well, *conical tube*, tabung eppendorf, vortex, dan alat-alat gelas serta alat praktikum penunjang yang lain.

### **2. Bahan**

Bahan yang digunakan adalah sampel kulit batang kayu jawa, metanol, n-heksan, etil asetat, Sel HeLa, sel MCF-7, sel normal vero, medium DMEM komplet [*foetal bovine serum (FBS)* 10%, fungizon 0,5%, Hepes (*N-2-hydroxyethylpiperazine-2-ethanesulfonic acid*), Natrium bikarbonat ( $\text{NaHCO}_3$ ), Aquadest, MTT [(3-(4,5-dimetil tiazol 2-yl)-2,5-difenil tetrazolium bromida)], PBS (*Phosphate Buffer Saline*), penisilin-streptomisin 2%, Sodium Dodecyl Sulphate (SDS), dimetil sulfoksida (DMSO), trypsin EDTA 0,5%, silika gel.

## **F. *Prosedur kerja***

### **1. *Penyiapan sampel***

#### **a. *Pengambilan sampel***

Sampel kulit batang kayu jawa, diambil di Kota Takalar, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, dengan menggunakan benda tajam seperti pisau untuk mengikisnya pada korteks kulit luar kayu jawa.

#### **b. *Pengolahan Sampel***

Sampel kulit kayu jawa yang telah diambil dikumpulkan lalu dilakukan sortasi basah, kemudian dicuci menggunakan air mengalir lalu dirajang dan dikeringkan di lemari pengering, hingga sampel siap untuk diekstraksi.

### **2. *Ekstraksi Sampel***

Serbuk kering kulit batang kayu jawa ditimbang sebanyak 2000 g lalu diekstraksi dengan metode maserasi menggunakan cairan penyari metanol 12000 ml.

### **3. *Partisi Sampel***

Partisi dilakukan dengan metode partisi cair-padat sebanyak 20.514 gram menggunakan pelarut n-heksan sebanyak 1700 ml, sehingga diperoleh partisi larut heksan dan partisi tidak larut heksan.

### **4. *Fraksinasi Sampel***

Fraksinasi dilakukan dengan metode kromatografi cair vakum, ekstrak metanol kulit batang kayu jawa ditimbang sebanyak 5 gram dan silika gel sebanyak 60 gram. Dimasukkan silika gel sedikit demi sedikit sambil dimampatkan, tuangkan secukupnya eluen pertama yang digunakan agar tidak ada

celah dalam silika itu. Setelah mampat, tambahkan ekstrak yang akan difraksinasi lalu mampatkan kembali. Gunting dan beri kertas saring di atas ekstrak tersebut. Dielusi ekstrak dengan eluen etil asetat sebanyak 902 ml dan eluen metanol sebanyak 1038 ml. Fraksi-fraksi yang diperoleh diuapkan. Dilakukan penggabungan fraksi setelah ditotol di atas lempeng kromatografi lapis tipis. Fraksi yang memiliki kromatogram dan warna bercak yang sama digabung menjadi satu, kemudian diangin-anginkan hingga menjadi fraksi kering untuk diujikan ke sel HeLa, sel MCF-7 dan sel normal vero.

## **5. Uji Golongan Senyawa**

### **a. Uji alkaloid**

Ekstrak sebanyak 5 mg digerus dengan penambahan kloroform hingga larut. Ditambahkan 0,5 mL asam sulfat 1 M, kemudian dikocok perlahan. Didiamkan beberapa saat sampai terbentuk dua lapisan. Lapisan atas yang jernih dibagi dua, 1 bagian ditambahkan 2-3 tetes pereaksi Dragendorff dan bagian berikutnya ditambahkan 2-3 tetes pereaksi Mayer. Endapan merah bata yang terbentuk oleh pereaksi Dragendorf dan endapan putih oleh pereaksi Meyer menunjukkan adanya senyawa alkaloid (Fransworth, 1996)

### **b. Uji Flavonoid**

Sebanyak 5 mg ekstrak dilarutkan dalam 5 ml air panas, didihkan selama 5 menit, lalu disaring. Filtrat yang didapat lalu ditambah 1 ml asam sulfat pekat dan 2 mL etanol. Dikocok kuat dan biarkan terpisah. Terbentuknya warna merah, kuning atau jingga pada lapisan etanol menunjukkan adanya senyawa flavonoid (Tiwari, Kumar, Kaur, Kaur, & Kaur, 2011)



c. Uji Terpenoid

Sebanyak 0,5 gram ekstrak dilarutkan dalam pelarut Lieberman burchard. Terbentuknya warna coklat atau biru mengindikasikan adanya senyawa terpenoid.

d. Uji Fenol

Sebanyak 0,5 gram ekstrak dilarutkan dengan 2 mL etanol 96% dan ditambahkan 3 tetes larutan  $\text{FeCl}_3$ . Terbentuknya warna hitam kebiruan mengindikasikan adanya senyawa fenol (Tiwari, Kumar, Kaur, Kaur, & Kaur, 2011)

**6. Uji sitotoksitas sel HeLa, MCF-7 dan Normal Vero**

a. Pembuatan Media Cair

Disiapkan media padat (media bubuk) yang akan digunakan, lalu disiapkan 950 ml aquabides steril dalam gelas beker 1000 ml dalam LAF. Dituang media bubuk ke dalam aquabides steril ke dalam gelas beker, aduk hingga rata. Dibilas bagian dalam pembungkus media bubuk dengan aquabides, tuang cairannya ke dalam gelas beker di atas. Tambahkan 2,2 g  $\text{NaHCO}_3$  untuk setiap liter media yang dibuat, aduk rata. Tambahkan aquabides steril hingga volume 1000 ml, diaduk dengan magnetik stirer hingga semua media padat dan  $\text{NaHCO}_3$  dapat larut. Lakukan *adjust* pH dengan menambahkan  $\text{NaOH}$  1 N atau  $\text{HCl}$  1 N. Lakukan filtrasi media dengan filter 0,2 mikron, tampung ke dalam botol Duran 1000 ml. Beri penandaan dan simpan media di kulkas dengan suhu  $4^\circ\text{C}$ .

b. Pembuatan Media Kultur Lengkap

Dicairkan FBS (Fetal bovine serum) dan Penisilin-streptomisin pada suhu kamar terlebih dahulu sebelum digunakan. Lalu disiapkan botol duran volume 100 ml. Ambil 10 ml FBS dan 1 ml Penisilin-streptomisin, tuang ke dalam botol Duran. Tambahkan fungizon (antijamur) lalu tambah media cair sampai 100 ml (sekitar leher botol).

c. Pemanenan sel

Diambil sel dari inkubator CO<sub>2</sub>, diamati kondisi sel. Panen sel dilakukan setelah sel 80% konfluen. Buang media kulturnya. Cuci sel diulang 2 kali dengan PBS (volume PBS adalah  $\pm \frac{1}{2}$  volume media awal). Tambahkan tripsin-EDTA (tripsin 0,25%) secara merata dan inkubasi di dalam inkubator selama 3 menit. Tambahkan media  $\pm 5$  mL untuk menginaktifkan tripsin. Resuspensi sel dengan pipet agar sel terlepas satu-satu atau tidak menggerombol.

d. Perhitungan sel

Dilakukan resuspensi sel di conical tube dari hasil panen sel. Ambil 10  $\mu$ l panen sel dan pipetkan ke hemasitometer. Hitung sel di bawah mikroskop (*inverted* atau mikroskop cahaya) dengan *counter*. Sel yang diperlukan untuk setiap sumuran adalah 10.000  $\mu$ l sel.

e. Penanaman Sel

Ambil sel dari inkubator CO<sub>2</sub>, diamati kondisi sel. Transfer sel ke dalam sumuran, masing-masing 100  $\mu$ l dan sisakan 3 sumuran kosong (jangan diisi sel). Amati keadaan sel di mikroskop *inverted* untuk melihat distribusi sel. Inkubasi sel

di dalam inkubator selama minimal 4 jam, namun ditambah menjadi 24 jam jika sel belum *attach*.

f. Preparasi Sampel

Timbang sampel kurang lebih 5 mg dengan saksama di dalam eppendorf. Uji kelarutan sampel dalam DMSO, dengan menambahkan 100  $\mu$ l DMSO dan homogenkan dengan bantuan vortex. Jika belum larut maka tambahkan 100  $\mu$ l DMSO lagi, gunakan grider untuk membantu proses pelarutannya. Dibuat konsentrasi sampel yakni konsentrasi 500 ppm. Larutkan dengan media kultur, masing-masing setiap sel menggunakan media DMEM.

g. Uji MTT (3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolium bromid)

Ambil plate yang berisi sel uji, masukkan 100  $\mu$ l PBS ke dalam semua sumuran yang terisi sel lalu buang. Tambahkan konsentrasi sampel ke dalam sumuran. Inkubasi di dalam inkubator CO<sub>2</sub> selama 24 jam. Jika belum terdapat perubahan, inkubasi kembali selama 24 jam (waktu inkubasi total: 24-48 jam). Siapkan reagen MTT untuk perlakuan (0,5 mg/ml), dengan cara ambil 1 mL stok MTT dalam PBS (5mg/mL), encerkan dengan MK ad 10 mL (untuk 1 buah 96 *well plate*). Buang media sel dan cuci PBS, lalu tambahkan reagen MTT 100  $\mu$ L ke setiap sumuran. Inkubasi sel selama 2-4 jam di dalam inkubator CO<sub>2</sub>. Periksa kondisi sel dengan mikroskop *inverted*. Jika formazan telah jelas terbentuk, tambahkan *stopper* 100  $\mu$ L SDS 10% dalam 0,01 N HCl. Bungkus *plate* dengan kertas dan inkubasikan di tempat gelap pada temperatur kamar selama semalam.

Absorbansi dibaca dengan *microplate ELISA reader* pada panjang gelombang 595 nm. Lalu dihitung persentase sel yang hidup dan sel mati, serta indeks selektivitasnya.

$$\% \text{ Sel Hidup} = \frac{(\text{Kontrol sel sehat} - \text{Kontrol blank}) - (\text{Sel treatment} - \text{Kontrol Blank})}{\text{Kontrol sel sehat} - \text{Kontrol blank}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Sel Mati} = \frac{\text{Sel treatment} - \text{Kontrol blank}}{\text{Kontrol sel sehat} - \text{Kontrol blank}} \times 100\%$$

Nilai SI menunjukkan selektivitas sampel terhadap sel uji. Dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$SI = \frac{\% \text{inhibisi sel kanker}}{\% \text{inhibisi sel normal}}$$

**BAB IV**  
**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**A. Hasil**

**1. Ekstraksi**

Ekstrak metanol kulit batang kayu jawa = 96.247 gram

$$\% \text{ Rendamen} = \frac{96.247 \text{ gram}}{2000 \text{ gram}} \times 100\% = 4.812\%$$

**2. Partisi Cair Padat**

Tabel 3. Hasil partisi

SAMPEL	Pelarut	Berat ekstrak larut	Berat ekstrak tidak larut
Kulit batang Kayu Jawa	n-heksan	4. 382 gr	16. 132 gr

**3. Fraksinasi**

Tabel 4. Nilai Rf profil KLT partisi tidak larut heksan

Jenis noda	Jarak noda	Jarak tempuh eluen	$R_f = \frac{\text{jarak tempuh eluen}}{\text{jarak noda}}$
Noda 1	5.32	5.50	0.97
Noda 2	4.47	5.50	0.81
Noda 3	3.78	5.50	0.69
Noda 4	2.75	5.50	0.50
Noda 5	1.72	5.50	0.31
Noda 6	0.69	5.50	0.12

Tabel 5. Hasil fraksinasi dari fraksi tidak larut heksan

SAMPEL	Berat fraksi (g)
Fraksi 1	0.0575
Fraksi 2	0.1732
Fraksi 3	2.2571
Fraksi 4	1.4474
Fraksi 5	0.5054

Fraksi 6	0.0051
Fraksi 7	0.0051
Fraksi 8	0.0054

#### 4. Uji sitotoksik

Tabel 6. Hasil uji sitotoksitas sel kanker HeLa

Sampel	Rata-rata Nilai Absorbansi	%Sel Inhibisi
Ekstrak Metanol	0.965±0.211	174.5763
Partisi Tidak Larut Heksan	0.932±0.123	167.5847
Partisi Larut Heksan	0.382±0.006	51.05932
Fraksi 1	0.271±0.018	27.54237
Fraksi 2	0.572±0.016	91.31356
Fraksi 3	1.013±0.084	184.7458
Fraksi 4	0.689±0.028	116.1017
Fraksi 5	0.860±0.111	152.3305
Fraksi 6	0.788±0.081	137.0763
Fraksi 7	0.637±0.053	105.0847
Fraksi 8	0.585±0.019	94.0678
Kontrol Positif (Cisplatin)	0.345±0.013	43.22034
Kontrol Sel	0.613±0.049	
Kontrol Blank	0.141±0.002	

Tabel 7. Hasil uji sitotoksitas sel kanker MCF-7

Sampel	Rata-rata Nilai Absorbansi	%Sel Inhibisi
Ekstrak Metanol	1.118±0.021	162.3974
Partisi Tidak Larut Heksan	0.919±0.020	129.7209
Partisi Larut Heksan	0.287±0.049	25.94417
Fraksi 1	0.243±0.003	18.71921
Fraksi 2	0.642±0.008	84.23645
Fraksi 3	1.093±0.166	158.2923
Fraksi 4	0.943±0.056	133.6617
Fraksi 5	0.976±0.024	139.0805
Fraksi 6	0.876±0.067	122.6601
Fraksi 7	0.708±0.022	95.07389
Fraksi 8	0.712±0.059	18.71921
Kontrol Positif (Doxorubicin)	0.525±0.088	95.73071
Kontrol Sel	0.738±0.079	
Kontrol Blank	0.129±0.005	

Tabel 8. Hasil uji sitotoksitas sel normal Vero

Sampel	Rata-rata Nilai Absorbansi	%Sel Inhibisi
Ekstrak metanol	0.841±0.007	85.2205
Partisi Tidak Larut Heksan	0.884±0.041	90.34565
Partisi Larut Heksan	0.228±0.004	12.15733
Fraksi 1	0.183±0.003	6.793802
Fraksi 2	0.822±0.084	82.9559
Fraksi 3	1.117±0.036	118.1168
Fraksi 4	0.753±0.014	74.73182
Fraksi 5	0.893±0.087	91.41836
Fraksi 6	1.134±0.197	120.143
Fraksi 7	1.164±0.226	123.7187
Fraksi 8	0.857±0.019	87.12753
Kontrol Positif (Doxorubicin)	0.607±0.027	57.33015
Kontrol Sel	0.965±0.017	
Kontrol Blank	0.126±0.002	

Tabel 9. Nilai selektivitas indeks (SI) sel HeLa dan sel MF-7

Sampel	SI sel HeLa	SI sel MCF-7
Ekstrak Metanol	2.049	1.906
Partisi Tidak Larut Heksan	1.855	1.436
Partisi Larut Heksan	4.188	2.128
Fraksi 1	4.032	2.740
Fraksi 2	1.102	1.016
Fraksi 3	1.565	1.341
Fraksi 4	1.553	1.787
Fraksi 5	1.668	1.523
Fraksi 6	1.141	1.021
Fraksi 7	0.850	0.769
Fraksi 8	1.080	1.099
Kontrol Positif (Sel Hela: Cisplatin, Sel MCF-7: Doxorubicin)	0.754	1.134

## 5. Identifikasi golongan senyawa

Tabel 10. Hasil Identifikasi Golongan Senyawa

SAMPEL	Alkaloid			Terpenoid	Flavonoid	Fenolik
	Dg	My	Wg	LB	AlCl <sub>3</sub>	FeCl <sub>3</sub>
Ekstrak Metanol	-	+	+	+	+	+
Partisi Tidak larut heksan	+	-	-	+	-	+
Partisi larut heksan	-	-	+	+	-	-
Fraksi 1	-	+	+	+	+	-
Fraksi 2	-	+	-	+	+	-
Fraksi 3	+	-	-	+	-	+
Fraksi 4	+	-	-	+	-	+
Fraksi 5	-	-	-	+	-	+
Fraksi 6	-	-	-	+	-	+
Fraksi 7	-	+	+	+	-	+
Fraksi 8	-	+	-	+	-	+

Keterangan:

Dg : Dragendorf

My : Mayer

Wg : Wagner

LB : Lieberman Burchard

### B. Pembahasan

Setiap tahunnya, angka kejadian kanker terus meningkat di seluruh dunia dengan perkiraan sekitar satu juta pasien kanker baru. Jumlah kematian yang disebabkan oleh kanker di seluruh dunia merupakan yang paling tinggi kedua setelah penyakit jantung. Hanya sebagian kecil pasien kanker berkisar 10% yang menjalani kemoterapi dapat sembuh atau meningkat harapan hidupnya, dan sebagian besar pasien mengalami komplikasi atau kambuh lagi penyakitnya itu.

Pengobatan penatalaksanaan kanker sangat bervariasi bergantung pada beberapa faktor yang diantaranya adalah jenis kanker yang diderita, lokasi kanker



yang menyerang tubuh, stadium kankernya, dan status kesehatan dari pasien penderita kanker itu sendiri. Pada umumnya, pengobatan kanker ditujukan untuk membunuh sel kanker, mengangkat sel kanker melalui tindakan operasi, atau mencegah agar sel kanker tidak mendapatkan sinyal yang dibutuhkan untuk proses pembelahan sel. Disamping itu, terapi antikanker sebenarnya ditujukan untuk membunuh sel kanker yang cepat membelah. Sel normal umumnya lebih resisten terhadap kemoterapi karena biasanya sel normal akan berhenti membelah jika kondisi lingkungannya tidak memungkinkan untuk proses pertumbuhan dan perkembangannya. Namun, ada pula beberapa sel normal yang membelah dengan cepat sehingga kemoterapi akan memengaruhi sel normal tersebut.

Dalam strategi pengobatan kanker bahwa tujuan utama pengobatan adalah penyembuhan, sedangkan penyembuhan kanker yang sebenarnya adalah pembersihan setiap sel neoplasma. Pengobatan kanker umumnya merupakan kombinasi beberapa tindakan medis. Tahap kemoterapi dilakukan ketika sel kanker telah menyebar dan tidak dapat ditangani dengan tindakan operasi. Kemoterapi juga dilakukan sebagai terapi tambahan untuk mengatasi kemungkinan sisa sel kanker pada lokasi pascaoperasi dan pada pengobatan radiasi. Kemoterapi ini dapat dipengaruhi oleh fraksi sel tumor atau sel kanker yang sedang tumbuh atau yang dalam siklus replikasi aktif. Sel kanker yang sedang tumbuh biasanya lebih sensitif terhadap obat antikanker, sedangkan sel yang sedang tidak bereplikasi atau yang sedang fase istirahat, biasanya lebih tahan terhadap senyawa antikanker atau antimitotik itu. Senyawa antikanker demikian yang menghambat sel-sel yang sedang aktif bereplikasi disebut sebagai obat yang

spesifik terhadap siklus sel (*cell cycle specific drugs*), sedangkan senyawa lain digolongkan dalam senyawa nonspesifik terhadap siklus sel (*cell cycle nonspecific drugs*). Beberapa sel neoplastik telah resisten terhadap beberapa obat antikanker.

Beberapa masalah yang ditimbulkan akibat kejadian penyakit kanker ini menjadi fokus penelitian untuk mencari dan menemukan agen kemopreventif yang layak dan berpotensi sebagai antikanker melalui pembudidayaan dan pemanfaatan kekayaan alam yang berpotensi untuk dijadikan obat antikanker, salah satunya ialah pelestarian tumbuhan seperti kayu jawa.

Dalam proses penelitian ini menggunakan tiga jenis sel, yakni dua jenis sel kanker dan satu lainnya adalah sel normal. Sel normal menjadi pilihan sebab kebanyakan dari obat-obat antineoplastik selain menghambat perkembangan atau proliferasi dari sel kanker, ternyata juga menyerang dan menghambat pertumbuhan sel normal. Tentu saja ini menjadi salah satu alasan obat-obat antikanker yang *nonselective* itu memicu terjadinya efek samping, baik efek samping yang bersifat sementara seperti alopesia, atau bersifat tetap seperti toksisitas pada jantung, paru-paru, dan kandung kemih. Sehingga dari perlakuan terhadap dua jenis sel kanker itu, dapat pula diketahui tingkat selektifitas sampel uji terhadap sel normal. Sel normal yang banyak mati tentu saja tidak baik. Sedangkan dua jenis sel kanker yakni sel kanker HeLa dan sel kanker MCF-7 yang digunakan sebab dalam perkembangannya kanker serviks dan kanker payudara menempati posisi pertama tingkat mortalitas tertinggi di seluruh dunia.

Dalam proses pengerjaannya, pelarut yang digunakan dalam proses ekstraksi adalah pelarut metanol untuk penarikan senyawa baik senyawa yang bersifat polar atau pun senyawa yang bersifat non polar dari sampel uji kulit batang kayu jawa. Kemudian dalam tahap partisi, dilakukan proses partisi cair padat dengan menggunakan pelarut n-heksan, sehingga diperoleh dua jenis hasil pemisahan partisi yakni partisi larut n-heksan dan partisi tidak larut n-heksan. Hasil partisi tersebut kemudian dipilihlah partisi tidak larut heksan untuk dilanjutkan ke tahap fraksinasi. Sebelum melakukan tahap fraksinasi, terlebih dahulu dilakukan proses elusi senyawa menggunakan metode kromatografi lapis tipis sehingga diperoleh perbandingan eluen etil : metanol, 10 : 1. Pada tahap fraksinasi, diperoleh 16 jenis fraksi dan berdasarkan hasil penggabungan fraksi hanya diperoleh 8 jenis fraksi.

Kepolaran suatu pelarut dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satunya adalah nilai konstanta dielektrik. Bahwa semakin tinggi nilai konstanta dielektrik yang dimiliki oleh suatu pelarut maka semakin tinggi polaritas yang dimiliki oleh pelarut tersebut, dalam artian polaritas suatu pelarut berbanding lurus dengan konstanta dielektrik yang dimiliki pelarut. Berikut nilai konstanta dielektrik pelarut yang digunakan dalam penelitian ini berturut-turut dari polaritas yang lebih tinggi hingga polaritas rendah yakni pelarut metanol dengan nilai 33, pelarut etil asetat 6.0 dan pelarut heksan 2.0.

Parameter sitotoksik yang digunakan adalah kemampuan konversi substrat MTT menjadi formazan ungu oleh enzim suksinat dehydrogenase pada sel hidup. Pengujian uji sitotoksik dilakukan dengan triplikate, yakni setiap konsentrasi

dimasukkan dalam tiga jenis sumuran untuk menghindari bias dalam penelitian ini. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa terhadap sel HeLa, fraksi yang selektif menghambat pertumbuhan sel kanker HeLa adalah fraksi 1 dari partisi tidak larut heksan dengan nilai indeks selektifitas sel adalah 4.032 pada sel kanker HeLa dan 2.740 pada sel kanker MCF-7. Nilai selektifitas indeks yang lebih dari 3 bersifat toksik. Singkatnya, semakin tinggi angka selektivitasnya maka senyawa tersebut semakin baik. Daya selektifitas fraksi 1 pada sel HeLa jika dibandingkan dengan sel normal vero ternyata menunjukkan bahwa pada persentase hidup sel normal lebih besar dibandingkan persentase mati sel normal yakni pada sel mati hanya berkisar 6,79%, artinya bahwa kandungan senyawa uji fraksi 1 hanya selektif menghambat pertumbuhan sel kanker HeLa tanpa menyerang dan merusak kondisi sel normal vero. Tentu saja ini sangat baik untuk dikembangkan agar diperoleh agen kemopreventif yang efektif dan selektif terhadap perkembangan sel kanker. Karena seperti yang diketahui bahwa salah satu permasalahan yang ditimbulkan oleh sebagian besar obat-obat antineoplasma adalah selektifitas obat kemoterapi yang rendah. Padahal tujuan utama kemoterapi kanker adalah merusak secara selektif sel tumor yang berbahaya tanpa mengganggu sel normal. Tujuan ini masih mengalami kegagalan dan hingga sekarang ini masih sedikit sekali obat antikanker yang bekerja secara selektif untuk pengobatan jenis kanker tertentu. Sel kanker itu lebih rentan terhadap senyawa yang bersifat sitotoksik karena sel kanker umumnya terus membelah dengan cepat dibandingkan sel normal. Namun, antikanker umumnya bekerja dengan cara membunuh sel yang sedang berkembang, sehingga masih


memungkinkan antikanker dapat menyerang sel normal yang sedang dalam proses pembelahan sel. Itulah timbulnya efek samping sebab ketidakselektifan atau selektifitas yang rendah dari obat-obat kemoterapi itu sendiri. Demikian pula dengan partisi larut heksan yang merupakan partisi paling selektif, persentase sel yang mati hanya berkisar 12.15%, sehingga partisi tersebut juga bersifat selektif terhadap progress perkembangan sel kanker tanpa menyerang sel normal vero tubuh. Nilai indeks selektivitas dari masing-masing sel oleh partisi larut heksan ialah 4.188 terhadap sel kanker HeLa dan 2.128 terhadap sel kanker MCF-7. Parameter penilaian tersebut menjadi acuan akan tingkat selektivitas suatu senyawa, dan hal ini pun dibuktikan dengan nilai selektivitas indeks dari masing-masing sampel uji memang lebih besar pada partisi larut heksan dan fraksi 1 tidak larut heksan.

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa partisi larut heksan memiliki nilai indeks selektivitas yang lebih tinggi dibandingkan partisi tidak larut heksan sebab seperti yang diketahui bahwa dalam struktur membran sel atau membran plasma, ia tersusun atas dua lapis lipid atau lipid bilayer. Molekul hidrofobik, seperti senyawa hidrokarbon dapat larut dalam membran dan melaluinya dengan mudah. Struktur lipid bilayer merupakan penyebab adanya sifat selektif permeable pada membran. Faktor-faktor yang mempengaruhi dapat tidaknya atau cepat lambatnya suatu molekul atau ion melewati membrane sel ialah kelarutan, besarnya molekul, polaritas, dan sifat kimia molekul atau ion tersebut. Senyawa-senyawa yang larut dalam lemak lebih mudah menerobos masuk ke dalam membrane sel dibandingkan dengan senyawa-senyawa yang tidak larut dalam lemak. Sehingga,

karena sebagian besar membran sel tersusun atas lipida, maka sangat memungkinkan senyawa-senyawa yang terlarut dalam pelarut heksan dapat menembus masuk ke dalam membran sel kanker tersebut oleh sebab sifat senyawanya yang non-polar pula, sehingga lebih memungkinkan untuk senyawa-senyawa tersebut menyerang dan menghambat secara selektif proliferasi dari sel-sel kanker.


Adapun golongan senyawa yang terkandung secara umum setelah diidentifikasi, didominasi oleh kandungan senyawa terpenoid dan flavonoid. Demikian pula pada partisi larut heksan yang merupakan partisi paling selektif menghambat pertumbuhan sel kanker HeLa dan sel kanker MCF-7 mengandung golongan senyawa terpenoid dan flavonoid sedangkan dalam fraksi 1 yang merupakan fraksi paling selektif mengandung alkaloid, flavonoid dan terpenoid. Alkaloid bekerja dengan menghambat jalur metabolik yang penting untuk kehidupan dan reproduksi sel kanker, meliputi penghambatan asam folat, purin, pirimidin, dan asam amino, serta jalur nukleosida pirimidin yang diperlukan bagi sintesis DNA. Ketika terjadi penghambatan terhadap replikasi DNA pada fase S (fase sintetik) siklus kehidupan sel maka akan menyebabkan sel menjadi tidak berkembang biak, tidak tumbuh dan tidak berproliferasi sehingga berujung pada kematian sel. Adanya sifat sitotoksik merupakan langkah utama dalam usaha penemuan obat antikanker baru dari bahan alam.

Pada golongan senyawa flavonoid, salah satu dugaan senyawa yang terdapat dalam kayu jawa adalah quercetin.




Gambar 2. Senyawa Quercetin


Salah satu mekanisme resistensi sel kanker terhadap banyak obat adalah kemampuan sel kanker untuk memompakan obat antikanker ke luar sel kanker yang diperantarai oleh permeabilitas glikoprotein (P-glikoprotein). Resistensi ini tergantung pada energi ATP untuk memompa obat keluar sel melalui P-glikoprotein (Radji, 2016). P-glikoprotein merupakan jalur untuk memompa obat-obat antikanker ke luar sel kanker, dan quercetin terbukti secara efisien dapat menghambat progres efluks obat yang dimediasi oleh jalur P-glikoprotein tersebut dengan menghambat ekspresi berlebihan gen MDR1 manusia (Kioka, Hosokawa, Komano, Hirayoshi, Nagata, & Ueda, 1992), kemudian quercetin juga menghambat aktivitas ATPase yang dibutuhkan untuk transportasi obat antikanker ke luar sel kanker. Sehingga, quercetin pun dapat dikembangkan sebagai senyawa yang efektif untuk melawan resistensi multi-obat pada sel kanker serviks. Adapun kandungan senyawa lain yang diidentifikasi terdapat dalam kayu jawa adalah isoquercetin, morin, physicion, leucodelphidin, leucocyanidin, dan kaempferol.




Gambar 3. Senyawa Isoquercetin



Gambar 4. Senyawa Morin




Gambar 5. Senyawa Physicion




Gambar 6. Senyawa Leucodelphinidin






Gambar 7. Senyawa Leucocyanidin



Gambar 8. Senyawa Kaempferol

Hal yang melandasi keterlibatan flavonoid dalam mekanisme antikanker sebab flavonoid memiliki potensi untuk melakukan banyak kejadian biologis pada sel kanker seperti proses apoptosis bahwa flavonoid telah menunjukkan untuk menginduksi apoptosis pada beberapa sel kanker, tanpa mempengaruhi sel normal, kemudian proses vaskularisasi, diferensiasi sel, dan proliferasi sel. Senyawa polifenol menunjukkan spektrum aktivitas biologis yang luar biasa, oleh karena itu, memiliki efek yang menguntungkan bagi perkembangan bidang kesehatan dan dapat dianggap sebagai obat kemopreventif atau terapeutik melawan kanker (Birt, Hendrich, & Wang, 2001)

Adapun golongan senyawa selanjutnya yang terdapat di dalam kayu jawa adalah terpenoid dengan salah satu jenis senyawanya adalah salvicine.



Gambar 9. Senyawa Salvicine

Terpenoid adalah kelas metabolit sekunder dengan berbagai macam struktur dan aktivitas biologis. Beberapa senyawa ini seperti salvicine, telah mampu mengatasi resistensi multi obat dengan menghambat over ekspresi p-glikoprotein pada sel kanker (Cai, et al., 2008)

Dalam perkembangannya, salah satu penemuan yang paling fundamental pada sel kanker adalah mutasi pada gen yang berperan dalam proses pertumbuhan sel, yaitu onkogen. Menurut Prof. Dr. Radji Maksum, M. Biomed., Apt bahwa protein detektif yang diproduksi oleh onkogen yang mengalami mutasi merupakan target utama terapi tepat sasaran, namun senyawa *targeted therapy* ini hanya dapat menghambat pertumbuhan sel kanker dan tidak membunuh sel kanker, sehingga dalam penggunaannya perlunya dilakukan terapi kombinasi obat. Pada terapi kombinasi, senyawa yang bekerja tepat sasaran akan dapat langsung bekerja pada titik kelemahan sel kanker, sedangkan antikanker konvensional (antikanker golongan lainnya yang digunakan pada umumnya) dapat bekerja maksimal untuk membunuh sel kanker. Dalam mekanisme terjadinya resistensi yang dapat menyerang jenis antikanker dengan rumus struktural yang berbeda, maka perlunya

obat yang menghambat over ekspresi p-glikoprotein demi menekan kejadian *multi drug resistance*, sehingga dengan itu dapat secara perlahan meningkatkan selektivitas obat-obat antikanker.

Sesiapa saja hamba Allah SWT yang mengaku beriman kepadaNya, maka Allah akan mengujinya dengan beberapa ujian sebagai bentuk cinta kasih Rabb Tuhan terhadap hambaNya itu. Sebab rasa sakit adalah kolaborasi yang baik untuk perenungan antar sisi mistik dan sisi somatik, sebagaimana “Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda, “Barangsiapa dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan memberikan cobaan kepadanya.” (HR. Al-Bukhari: 5645).



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa fraksi 1 dari partisi tidak larut heksan adalah fraksi yang paling selektif terhadap penghambatan pertumbuhan sel kanker HeLa dan sel kanker MCF-7, sedangkan partisi larut heksan adalah partisi yang paling selektif terhadap penghambatan pertumbuhan sel kanker HeLa dan sel kanker MCF-7.

#### B. Saran

Untuk mengetahui potensi sitotoksitas selektif tingkat molekuler terhadap fraksi senyawa kulit batang kayu jawa [*Lannea coromandelica* (Houtt.) Merr] maka dapat dilanjutkan pada tahap skrining klasifikasi kandungan senyawa-senyawa dengan aktivitas molekuler.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akter, Uddin, Grice, & Tiralongo. (2013). *Cytotoxic activity screening of Bangladeshi medicinal plant extracts*. Retrieved July 23, 2017, from NCBI PubMed: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23846168>
- Alam, M. B., Kwon, K.-R., Lee, S.-H., & Lee, S.-H. (2017). *Lansea coromandelica (Houtt.) Merr. Induces Heme Oxygenase 1 (HO-1) Expression and Reduces Oxidative Stress via the p38/c-Jun N-Terminal Kinase–Nuclear Factor Erythroid 2-Related Factor 2 (p38/JNK–NRF2)-Mediated Antioxidant Pathway*. *International Journal of Molecular Sciences*, 1-18.
- American Cancer Society. (2015). *Global Cancer Facts and Figure 3rd Section*. Atlanta: American Cancer Society.
- Amundson, Myers, Scudiero, Kitada, Reed, & Fornace. (2000). *An Informatics Approach Identifying Markers of Chemosensitivity in Human Cancer Cell Lines*. *Cancer Res*, 6101-6110.
- Anonim. (2006b). *Hela Cell*. Retrieved July 23, 2017, from [www.answers.com/topic/hela](http://www.answers.com/topic/hela)
- Anonim. (2006c.). *Hela is also The German Name for Hel, Poland and The Cruiser SMS Hela*. Retrieved July 23, 2017, from Wikipedia the Free Encyclopedia, Wikimedia Foundation, : <http://en.wikipedia.org/wiki/HeLa>.
- Anonim. (2007, June 25). *ATCC Cell Biology*. Retrieved July 23, 2017, from <http://www.atcc.org/common/catalog/numSearch/numResults.cfm?atccNum=HTB-22>
- Aouali, Morjani, Trussardi, Soma, Giroux, & Manfait. (2003). *Enhanced Cytotoxicity and Nuclear Accumulation of Doxorubicin-loaded Nanospheres in Human Breast Cancer MCF-7 Cells Expressing MRP1*. *International Journal of Oncology*, 1195-1201.
- ATCC. (2008, July 19). *Cell Biology, ATCC® Number: HTB-22TM, Designations: MCF-7*. Retrieved July 23, 2017, from <http://www.atcc.org/ATCCAdvancedCatalogSearch/ProductDetails/tabid/452/Default.aspx?ATCCNum=HTB-22&Template=cellBiology>,
- Bambang Sutrisna, e. a. (2010). *Epidemiologi Kanker pada Wanita*. Jakarta: Sagung Seto.

- Birt, Hendrich, & Wang. (2001). Dietary agents in cancer prevention Flavonoids and isoflavonoids. *Pharmacol Ther*, 157–177.
- Bjornstrom, & Sjoberg. (2005). Mechanisms of estrogen receptor signaling: convergence of genomic and nongenomic actions on target genes. *Mol Endocrinol*, 833–842.
- Brisken. (2013). Progesterone signalling in breast cancer: a neglected hormone coming into the limelight. *Nat Rev Cancer*, :385–396.
- Butt, Firth, King, & Baxter. (2000). Insulin-Like Growth Factor-Binding Protein-3 Modulates Expression of Bax and Bcl-2 and Potentiates P53-Independent Radiation-Induced Apoptosis In Human Breast Cancer Cells, *J. Biol Chem*, 39174-39181.
- Cai, Lu, Zhu, Xie, Huang, Lin, et al. (2008). Salvicine triggers DNA double-strand breaks and apoptosis by GSH-depletion-driven H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> generation and topoisomerase II inhibition. *Free Radic Biol Med*, 627–635.
- Cancer Research UK. (2012). *Cancer Research UK: Let's Beat Cancer Sooner*. Retrieved July 23, 2017, from Cervical Cancer Statistics: [http://www.cancerresearchuk.org/health-professional/cancer-statistics/statistics-by-cancer-type/cervical-cancer?\\_ga=2.231445279.1299240656.1511232776-1550745283.1491547098&\\_gac=1.49088274.1511233163.EAIaIQobChMI3aefl9bO1wIVxhwrCh1WZQ2eEAAYASAAEgKn9\\_D\\_BwE](http://www.cancerresearchuk.org/health-professional/cancer-statistics/statistics-by-cancer-type/cervical-cancer?_ga=2.231445279.1299240656.1511232776-1550745283.1491547098&_gac=1.49088274.1511233163.EAIaIQobChMI3aefl9bO1wIVxhwrCh1WZQ2eEAAYASAAEgKn9_D_BwE)
- Czepas, J., & Gwozdzinski, K. (2014). The flavonoid quercetin: Possible solution for anthracyclines-induced cardiotoxicity and multidrug resistance. *Biomedicine & Pharmacotherapy*, 1149-1159; Volume 68, Issue 8.
- Dan Grander's Group. (2015). *Mechanisms of action of anti-cancer drugs*. Retrieved April 16, 2017, from Oncology-Pathology Karolinska Institutet: [file:///C:/Users/Microsoft/Downloads/SKRIPSI%20ZAKIAH/mechanism s-of-action-of-anti-cancer-drugs.htm](file:///C:/Users/Microsoft/Downloads/SKRIPSI%20ZAKIAH/mechanism%20of%20action%20of%20anti-cancer%20drugs.htm)
- DeFilippis, Goodwin, Wu, & DiMaio. (2003). Endogenous Human Papillomavirus E6 and E7 Proteins Differentially Regulate Proliferation, Senescence, and Apoptosis in Hela Cervical Carcinoma Cells. *Journal of Virology*, 1551-1563; Vol.77, No.2.
- Departemen Agama. (2012). *Al-Qur'anul Karim*. Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia.
- Eisen, J. (2013). *Fakta-fakta Paling Mencengangkan dalam Dunia Kesehatan & Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: PT. Ufuk Publishing House.

- Fransworth, N. (1996). Biological and Phytochemical Screening of Plants. *J.Pharm. Sci*, 225-276.
- Freshney, R. (1986). *Animal Cell Culture, A Practical Approach, 1st Ed.* Washington D.C: IRL Press.
- Goodwin, & DiMaio. (2000). Repression of human papillomavirus oncogenes in Hela cervical carcinoma cells causes the orderly reactivation of dormant tumor suppressor pathways. *Proc Natl Acad Sci USA*, 12513-12518; Volume 97, Nomor 23.
- Guideand, Labwork Study. (2000). *Lecture Notes, Henrietta Lacks*.. Retrieved July 23, 2017, from [www.micro.msb.le.ac.uk/Labwork/Lack1.htm](http://www.micro.msb.le.ac.uk/Labwork/Lack1.htm).
- Hamka, B. (2015). *Tafsir Al-Azhar, Diperkaya dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra dan Psikologi*. Jakarta: Gema Insani.
- Ikawati, Z. (2014). *Farmakologi Molekuler; Target Aksi Obat dan Mekanisme Molekulernya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Islam, M. T., & Tahara, S. (2000). Dihydroflavonols from *Lannea coromandelica*. *Phytochemistry*54, 901-907.
- Kaur, Jaiswal, & Jain. (2013). Protective effect of *Lannea coromandelica* Houtt. Merrill. against three common pathogens. *Journal of Ayurveda*, 4(4), doi:10.4103/0975-9476.123706. *J Ayurveda Integr Med*, 224-227.
- Kementrian Kesehatan. (2015). *Pusat Data dan Informasi Kanker*. Jakarta.
- Kioka, Hosokawa, Komano, Hirayoshi, Nagata, & Ueda. (1992). Quercetin, a bioflavonoid, inhibits the increase of human multidrug resistance gene (MDR1) expression caused by arsenite. *FEBS Lett*, 307-309.
- Kumler, I., Stenvang, J., Moreira, J., Brunner, N., & Nielsen, D. L. (2015). Drug transporters in breast cancer: responses to anthracyclines and taxanes. *Expert Review of Anticancer Theraphy*, 1075-1092; Volume 15, Issue 9.
- Lim, Metzger-Filho, & Winer. (2012). The natural history of hormone receptor-positive breast cancer. *Oncology (Williston Park)*, 688-694.
- Luca, A. D., D'Alessio, A., Maiello, M. R., Gallo, M., Chicchinelli, N., Pergameno, M., et al. (2015). Evaluation of the pharmacokinetics of Ixabepilone for the treatment of breast cancer. *Expert Opinion on Drug Metabolism & Toxicology*, 1177-1185; Volume 11, Issue 7.
- Mannan, A., Das, H., Rahman, M., Jesmin, J., Siddika, A., Rahman, M., et al. (2010). Antihyperglycemic Activity Evaluation of *Leucas Aspera* (Willd.)

- Link Leaf and Stem and *Lannea Coromandelica* (Houtt.) Merr. Bark Extract in Mice. *Advances in Applied Sciences*, 385-388.
- Marks, D. B. (2000). *Biokimia Kedokteran Dasar: Sebuah Pendekatan Klinis*. Jakarta: Penerbit EGC.
- Menchetner, Kyshtoobayeva, Zonis, Kim, Stroup, Garcia, et al. (1998). Levels of Multidrug Resistance (MDR1) P-Glycoprotein Expression by Human Breast Cancer Correlate with in Vitro Resistance to Taxol and Doxorubicin, *Clinical Cancer Research. CCRC UGM Farmasi*, 389-398.
- Mozer, H. (2015). *Antifungal Activity Test of ethanol extract 96% stem bark of kayu jawa (Lannea coromandelica) Against Aspergillus niger, Candida albicans, and Trichophyton rubrum (Vol. Skripsi)*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Mudyantini, & Anggarwulan. (2010). *Pertumbuhan dan Struktur Anatomi*.
- Neal, M. (2005). *Farmakologi Medis At a Glance*. Jakarta: Erlangga.
- Nugroho, A. E. (2014). *Farmakologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Onuki, Kawasaki, Baba, & Taira, d. (2003). Analysis of A Mitochondrial Apoptotic Pathway Using Bid-Targeted Ribozymes in Human MCF7 Cells in the Absence of A Caspase-3-Dependent Pathway. *Antisense and Nucleic Acid Drug Development*, 75-82.
- Prunet, Lemaire-Ewing, Ménétrier, Néel, & Lizard, d. (2005). Activation of Caspase-3-Dependent and -Independent Pathways During 7-Ketocholesterol- and 7 $\beta$ -Hydroxycholesterol-Induced Cell Death: A Morphological and Biochemical Study. *Journal of Biochemical and Molecular Toxicology*, 311-326.
- Purwoastuti, E. (2008). *Kanker Payudara*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. .
- Radji, M. (2016). *Mekanisme Molekuler Antibiotik dan Kemoterapi*. Jakarta: Penerbit buku kedokteran EGC.
- Rahayu, M., Sunarti, S., Sulistiarini, D., & Prawiroatmodjo, S. (2006). Pemanfaatan Tumbuhan Obat secara Tradisional oleh Masyarakat Lokal di Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara. *Jurnal Biodiversitas*, 245-250; Volume 7 Nomor 3.
- Rahmadani, F. (2015). *Skripsi Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol 96% Kulit Batang Kayu Jawa (Lannea coromandelica) Terhadap Bakteri Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Helicobacter pylori, Pseudomonas*. Jakarta, Indonesia: UIN Syarif Hidayatullah.



- Rao, V. S., Einstein, J. W., & Das, K. (2014). Hepatoprotective and antioxidant activity of *Lannea coromandelica* Linn. on thioacetamide induced hepatotoxicity in rats. *International Letters of Natural Sciences*, 3. *International Letters of Natural Sciences* , 30-43.
- Rasjidi, I. (2010). *Epidemiologi Kanker pada Wanita*. Jakarta: CV Agung Seto.
- Reddy, A. K., Joy, J. M., & Kumar, C. A. (2011). *Lannea coromandelica*: The Researcher's Tree. *Avinash Kumar Reddy et al./Journal of Pharmacy Research*, 577-579.
- Saputra, A. (2015). *Anti-inflammatory Activity Assay Toward Ethanol 96% Extract of Java Wood Bark (Lannea coromandelica) with Human Red Blood Cell Stabilization In vitro (Vol. Skripsi)*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Sasidharan. (2004). *(Dr. B P Pal Fellow), Kerala Forest Research Institute. Peechi*.
- Satyanarayana, & Kaldis. (2009). Mammalian Cell-cycle Regulation: Several Cdk, Numerous Cyclins, and Diverse Compensatory Mechanisms. *Oncogene*, 2925-2939.
- Sherr, C. J. (1996). Cancer cell cycles. *Sciences*, 1672-1677; Volume 274.
- Shihab, M. Q. (2009). *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Penerbit Lentera Hati.
- Siegel, R. L., Miller, K. D., & Jemal, A. (2016). Cancer Statistics. *Cancer Statistics*, 1; Volume 00, Issue 00.
- Siegel, R. L., Miller, K. D., & Jemal, A. (2017). Cancer Statistics. *CA: A Cancer Journal for Clinicians*, 7-30; Volume 67, Issue 1.
- Siregar, F., & Hadijono, B. S. (2000). Uji Sitotoksitas dengan Esei MTT". *Jurnal Kedokteran Gigi Universitas Indonesia.*, 28-32.
- Smith, Watson, O'Kane, Drew, Lind, & Cawkwell. (2006). The analysis of doxorubicin resistance in human breast cancer cell using antibody microarrays. *Mol Cancer Ther*, 2115-2120.
- Tia, L. J., Lui, A. G., Chua, N. S., & Strebel, H. M. (2015). Chemotherapy-induced neutropenia, anemia and thrombocytopenia, among Filipino breast cancer patients on adjuvant chemotherapy. *Original Article*, 26; Volume 49 No.2.
- Tiwari, P., Kumar, B., Kaur, M., Kaur, G., & Kaur, H. (2011). Phytochemical Screening and Extraction. *A Review. International Pharmaceutica Scientia.* , 98-106; Volume 1, Issue 1.


- Tjitrosoepomo. (2010). *Taksonomi Tumbuhan (Spermatophyta)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Torre, L. A., Bray, F., Siegel, R. L., Ferlay, J., Lortet-Tieulent, J., & Jemal, A. (2015). Global Cancer Statistics, 2012. *A Cancer Journal for Clinicians*, 87-108; Volume 65, Issue 2.
- Toth, Boros, & Balint. (2012). Elevated level of lysine 9-acetylated histone H3 at the MDR1 promoter in multidrug-resistant cells. *Cancer Sci*, 659–669.
- Venkatesan, S., Susindren, P., Balamurugan, V., Sundaresan, A., Rajkumar, K., Vasanthi, et al. (2015). Phytochemical Analysis And Antibacterial Activity On Medicinal Plant *Lannea coromandelica* (Linn) Bark Extract. *International Journal of Modern Research and Reviews*, 1070-1074; Volume 3, Issue 12.
- Vikrant, A., & M.L, A. (2011). A Review on Anti-Inflammatory Plant Barks. *International Journal of PharmTech Research*, 899-908; Volume 3 Nomor 2.
- Wahid, A. (2012). In Vitro Phytochemical and Biological Investigation of Plant *Lannea coromandelica* (Famili: Anacardiaceae). Bangladesh: Thesis to Departemen Pharmacy East West University.
- Wahid, M. A. (2009). In-vitro Phytochemical and biological Investigation of plant *Lannea coromandelica* (Family: Anacardiaceae). Thesis to Department of Pharmacy, East West University. *Thesis Paper Department of Pharmacy, East West University*, 12.
- Walunj, S., Gupta, R., Joshi, S., Sabharwal, S., & Joshi, K. (2015). *Lannea coromandelica* attenuate glucagon and oxyntomodulin mediated cAMP formation in HEK cells stably-expressing human glucagon receptor. *Journal Herbal of Medicine*, 153-157.
- Weerapreeyakul, N., Junhom, C., Barusrux, S., & Thitimetharoch, T. (2016). Induction of apoptosis in human hepatocellular carcinoma cells by extracts of *Lannea coromandelica* (Houtt.) Merr. and *Diospyros castanea* (Craib) Fletcher. *Chinese Medicine*, 1-10.
- Yamato, Fen, Kobuchi, Nasu, Yamada, Nishihara, et al. (2006). Induction of Cell Death in Human Papillomavirus 18-Positive Cervical Cancer Cells by E6 siRNA, Cancer Gene Therapy. *Cancer Gene Ther*, 234-241.
- Yatim, F. (2008). *Penyakit Kandungan. Myoma, kanker rahim/leher rahim dan indung telur, kista, serta gangguan lainnya* . Jakarta: Pustaka Populer Obor.

- Yelia, M. (2009). *“Solusi Sehat Mencegah dan Mengatasi Kanker”*. Jakarta selatan: AgroMedia.
- Yun, X.-j., Shu, H.-m., Chen, G.-y., Ji, M.-h., & Ding, J.-y. (2014). Chemical Constituents from Barks of *Lannea Coromandelica*. *Chinese Herbal Medicines*, 65-69; Volume 6, Issue 1.
- Zampieri, Bianchi, Ruff, & Arbuthnot. (2002). Differential Modulation by Estradiol of P-glycoprotein Drug Resistance Protein Expression in Cultured MCF7 and T47D Breast Cancer Cells. *Anticancer Res*, 2253-2259.




## LAMPIRAN-LAMPIRAN


Lampiran 1. Alur Penelitian




Lampiran 2. Preparasi Partisi dan Fraksinasi Sampel Kulit Batang Kayu Jawa  
[*Lannea coromandelica* (Houtt.) Merr]



Lampiran 3. Preparasi Sampel Uji Sitotoksitas terhadap Sel Kanker HeLa, sel Kanker MCF-7 dan Sel Normal Vero



Lampiran 4. Proses Uji MTT (3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolium bromid)



## Lampiran 5. Alat dan Bahan yang digunakan



Media Kultur



Antisitotoksik (Kontrol Positif)



Elisa Reader





Microplate 96 well



Inkubator CO<sub>2</sub> 5%




Mikroskop Inverted




Vortex



*Laminar Air Flow Clean Bench*



Mikropipet



Tabung CO<sub>2</sub> 5% dari inkubator  
*Hera Cell*



Conical Tube

## Lampiran 6. Prosedur Kerja



Ekstraksi



Partisi Cair-Padat



Fraksinasi



Hasil penggabungan fraksi  
(10:1 Etil : Metanol)

Keterangan:

- 1 : Noda partisi
- 2 : Noda fraksi 1 - 16





*Plating Cell (Panen sel)*



Sel diinkubasi dalam *Hera Cell*




Pembuatan media penumbuh atau media komplet





Sampel yang dilarutkan dalam 200  $\mu$ l DMSO



Sampel uji dihomogenkan menggunakan vortex



Treatment dan pemberian sampel senyawa pada masing-masing sel



Masing-masing sel di atas setelah pemberian sampel beserta kontrol positif, kontrol sel dan kontrol blank, siap diinkubasi selama 24 jam.

Keterangan:

- 1; Sel Normal Vero
- 2; Sel Kanker HeLa
- 3; Sel Kanker MCF-7





Setelah pemberian reagen MTT dan stopper SDS.  
 Pemberian senyawa uji kayu jawa beserta kontrol positif, kontrol blank dan kontrol sel yang dimulai dari sumuran D10, D11, D12 sampai sumuran H10, H11, H12 (replikasi dilakukan sebanyak 3

M A K A S S A R




*Microplate* well dibungkus dengan menggunakan kertas dan tidak diinkubasi lagi



Saat akan dilakukan proses pembacaan absorbansi dari masing-masing *microplate*



Pembacaan absorbansi oleh *Elisa* reader




Data primer berupa nilai absorbansi untuk masing-masing sel


## Lampiran 7. Hasil Pengamatan Sel



Pengamatan sel di bawah mikroskop inverted




Penampakan morfologi bulat sel vero yang sedang tumbuh setelah diinkubasi tanpa pemberian senyawa uji




Penampakan sel vero yang banyak hidup pada fraksi 4 *Lansea coromandelica*





Kontrol Doxorubicin terhadap sel MCF-7




Partisi larut heksan pada sel MCF-7


Keterangan :

→ : Sel hidup

→ : Sel mati




Ekstrak metanol terhadap sel MCF-7



Fraksi 7 pada sel MCF-7



Partisi tidak larut n-heksan terhadap sel MCF-7



Fraksi 4 terhadap sel HeLa


Keterangan :

—→ : Sel hidup

—→ : Sel mati




Ekstrak Metanol *Lannea coromandelica* pada sel HeLa



Kontrol positif Cisplatin pada sel HeLa



Partisi larut heksan pada sel HeLa



Partisi tidak larut heksan pada sel HeLa

Keterangan :

→ : Sel hidup

→ : Sel mati



Kontrol blank Nampak tidak ada sel yang hidup

## Lampiran 8. Kode Etik Penelitian



**MEDICAL AND HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE (MHREC)  
FACULTY OF MEDICINE GADJAH MADA UNIVERSITY  
- DR. SARDJITO GENERAL HOSPITAL**



---

**ETHICS COMMITTEE**  
Ref: KE/FK/ 0624/EC/2017

Title of the Research Protocol : Skrining Fitokimia Fraksi-Fraksi dari Ekstrak Metanol Kulit Batang Kayu Jawa (*Zamia Coromandelica*) (Houtt.) Merr. Yang Paling Selektif Terhadap Penghambatan Pertumbuhan Sel Kanker HeLa dan Sel Kanker MCF-7 Dibandingkan Sel Normal Vero

Documents Approved : Study Protocol versi 01 2017

Principle Investigator : Zakiah Anugerah Hamzah

Name of supervisor : 1. Nursalam Hamzah, S.Si., M.Si., Apt  
2. Syamsuri Syakri, S.Farm., M.Si., Apt

Institution(s)/place(s) of research : Laboratorium Fitokimia Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar dan Laboratorium Parasitologi FK UGM Yogyakarta

The Medical and Health Research Ethics Committee (MHREC) states that the document (s) above do not need approval letter of The Medical and Health Research Ethics Committee (MHREC).

Yogyakarta, **31 MAY 2017**



Prof. Dr. dr. Sri Sutarni, Sp.S(K)  
Chairperson



dr. Ahmad Hamim Sadewa, Ph.D  
Secretary

ALAUDDIN  
MAKASSAR

Lampiran 9. Sertifikat Kursus Kultur Jaringan





Lampiran 10. Data Primer Nilai Absorbansi Sel kanker HeLa

NILAI ABSORBANSI SEL KANKER HELA			
Ekstrak Metanol	0.802	0.890	1.204
Partisi Tidak Larut Heksan	0.812	0.928	1.057
Partisi Larut Heksan	0.388	0.382	0.377
Fraksi 2	0.553	0.622	0.615
Fraksi 3	0.269	0.254	0.289
Fraksi 4	0.588	0.556	0.572
Fraksi 5	0.918	1.076	1.045
Fraksi 6	0.663	0.685	0.719
Fraksi 7	0.733	0.939	0.907
Fraksi 8	0.697	0.853	0.813
Fraksi 9	0.68	0.654	0.578
Fraksi 10	0.574	0.592	0.622
Fraksi 11	0.602	0.589	0.564
Kontrol Positif	0.332	0.346	0.358
Kontrol Sel	0.649	0.557	0.634
Kontrol Blank	0.139	0.140	0.143

Lampiran 11. Data Nilai Standar Deviasi Sel Kanker HeLa

NILAI ABSORBANSI SEL KANKER HELA				STANDAR DEVIASI
Ekstrak Metanol	0.802	0.890	1.204	±0.211
Partisi Tidak Larut Heksan	0.812	0.928	1.057	±0.123
Partisi Larut Heksan	0.388	0.382	0.377	±0.006
Fraksi 2	0.553	0.622	0.615	±0.038
Fraksi 3	0.269	0.254	0.289	±0.018
Fraksi 4	0.588	0.556	0.572	±0.016
Fraksi 5	0.918	1.076	1.045	±0.084
Fraksi 6	0.663	0.685	0.719	±0.028
Fraksi 7	0.733	0.939	0.907	±0.111
Fraksi 8	0.697	0.853	0.813	±0.081
Fraksi 9	0.68	0.654	0.578	±0.053
Fraksi 10	0.574	0.592	0.622	±0.024
Fraksi 11	0.602	0.589	0.564	±0.019
Kontrol Positif	0.332	0.346	0.358	±0.013
Kontrol Sel	0.649	0.557	0.634	±0.049
Kontrol Blank	0.139	0.140	0.143	±0.002

Lampiran 12. Data Nilai Absorbansi Sel Kanker MCF-7

NILAI ABSORBANSI SEL KANKER MCF-7			
Ekstrak Metanol	1.130	1.094	1.129
Partisi Tidak Larut Heksan	0.924	0.935	0.897
Partisi Larut Heksan	0.257	0.260	0.345
Fraksi 2	0.644	0.616	0.621
Fraksi 3	0.245	0.240	0.243
Fraksi 4	0.636	0.638	0.651
Fraksi 5	0.966	1.280	1.032
Fraksi 6	1.005	0.900	0.923
Fraksi 7	0.977	1.000	0.952
Fraksi 8	0.951	0.821	0.856
Fraksi 9	0.688	0.732	0.705
Fraksi 10	0.594	0.612	0.661
Fraksi 11	0.644	0.753	0.740
Kontrol Positif	0.479	0.627	0.469
Kontrol Sel	0.799	0.649	0.766
Kontrol Blank	0.125	0.128	0.134



Lampiran 13. Data Nilai Standar Deviasi Sel Kanker MCF-7

NILAI ABSORBANSI SEL KANKER MCF-7				STANDAR DEVIASI
Ekstrak Metanol	1.130	1.094	1.129	±0.020
Partisi Tidak Larut Heksan	0.924	0.935	0.897	±0.020
Partisi Larut Heksan	0.257	0.26	0.345	±0.050
Fraksi 2	0.644	0.616	0.621	±0.015
Fraksi 3	0.245	0.24	0.243	±0.003
Fraksi 4	0.636	0.638	0.651	±0.008
Fraksi 5	0.966	1.280	1.032	±0.166
Fraksi 6	1.005	0.900	0.923	±0.055
Fraksi 7	0.977	1.000	0.952	±0.024
Fraksi 8	0.951	0.821	0.856	±0.067
Fraksi 9	0.688	0.732	0.705	±0.022
Fraksi 10	0.594	0.612	0.661	±0.035
Fraksi 11	0.644	0.753	0.740	±0.060
Kontrol Positif	0.479	0.627	0.469	±0.088
Kontrol Sel	0.799	0.649	0.766	±0.079
Kontrol Blank	0.125	0.128	0.134	±0.005

Lampiran 14. Data Nilai Absorbansi Sel Normal Vero

NILAI ABSORBANSI SEL NORMAL VERO			
Ekstrak metanol	0.837	0.849	0.837
Partisi Tidak Larut Heksan	0.860	0.931	0.862
Partisi Larut Heksan	0.225	0.232	0.228
Fraksi 2	0.918	0.849	0.916
Fraksi 3	0.181	0.183	0.186
Fraksi 4	0.778	0.769	0.918
Fraksi 5	1.110	1.156	1.085
Fraksi 6	0.769	0.749	0.743
Fraksi 7	0.992	0.855	0.831
Fraksi 8	0.934	1.140	1.328
Fraksi 9	1.284	1.305	0.903
Fraksi 10	0.988	1.104	1.123
Fraksi 11	0.874	0.862	0.835
Kontrol Positif	0.586	0.638	0.597
Kontrol Sel	0.979	0.970	0.947
Kontrol Blank	0.124	0.128	0.126

Lampiran 15. Data Nilai Standar Deviasi Sel Normal Vero

NILAI ABSORBANSI SEL NORMAL VERO				STANDAR DEVIASI
Ekstrak metanol	0.837	0.849	0.837	±0.007
Partisi Tidak Larut Heksan	0.86	0.931	0.862	±0.040
Partisi Larut Heksan	0.225	0.232	0.228	±0.004
Fraksi 2	0.918	0.849	0.916	±0.039
Fraksi 3	0.181	0.183	0.186	±0.003
Fraksi 4	0.778	0.769	0.918	±0.084
Fraksi 5	1.110	1.156	1.085	±0.036
Fraksi 6	0.769	0.749	0.743	±0.014
Fraksi 7	0.992	0.855	0.831	±0.087
Fraksi 8	0.934	1.14	1.328	±0.197
Fraksi 9	1.284	1.305	0.903	±0.226
Fraksi 10	0.988	1.104	1.123	±0.073
Fraksi 11	0.874	0.862	0.835	±0.020
Kontrol Positif	0.586	0.638	0.597	±0.027
Kontrol Sel	0.979	0.970	0.947	±0.017
Kontrol Blank	0.124	0.128	0.126	±0.002

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Zakiah Anugerah Hamzah adalah seorang farmasis yang menyukai kehidupan membaca dan menulis. Merupakan istri dari Baso Yudistira, AMK dan anak pertama dari 3 bersaudara oleh pasangan suami istri bapak Drs. Hamzah M,Si dan Ibu Dra.Rapia yang lahir pada 28 oktober 1995. Dalam tingkatan pendidikan formal yang telah ia lalui adalah SD Negeri 2 Lalombaa, MTS Negeri Kolaka, dan SMA Negeri 1 Kolaka. Pada tahun 2013 ditakdirkan berganti status dari siswa menjadi Mahasiswa di jurusan Farmasi UIN Alauddin Makassar.

Dalam perjalanannya, penulis pernah bergelut dalam organisasi dan komunitas, diantaranya Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Farmasi UIN Alauddin Makassar, Dewan Mahasiswa (DEMA) FKIK UIN Alauddin Makassar, Senat Mahasiswa (SEMA) FKIK UIN Alauddin Makassar, Study Club (SC) Al-'afiyah FKIK UIN Alauddin Makassar, Studi Pergerakan Mahasiswa (SUPREMASI) FKIK UIN Alauddin Makassar, Ikatan Mahasiswa Pemuda Pelajar Kolaka (IMPPAK) dan komunitas Pecandu Aksara. Menurutnya, kampus menjadi tempat pembentukan karakter, pencarian jati diri sekaligus bangku belajar yang panas akan kritikan. Buku adalah pasangan yang mengasyikkan dan memabukkan, ia selalu terlena dengan kehidupan membaca, adapun gagasan-gagasan yang terbesit dalam pemikirannya ia tuangkan dalam sebuah tulisan. Menuntut ilmu adalah untuk merenovasi diri yang tersungkur lalai, membangun rohani yang tertidur, menginjak amarah yang membara, meruncing akal yang lumpuh, mempekakan rasa yang samar, menajamkan telaah demi peroleh nikmatnya hikmah. Motto hidup sang penulis adalah “Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain.”- Al Hadis.