

**UJI KADAR TOTAL FLAVONOID, FENOLIK, DAN KAROTENOID
EKSTRAK LARUT HEKSAN DAN TIDAK LARUT
HEKSAN JINTAN HITAM (*Nigella sativa* L.)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih

Gelar Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi

Fakultas Ilmu Kesehatan

UIN Alauddin Makassar

ALAUDDIN
M A K A S S A R

OLEH :

RISNAWATY BAKRI

NIM. 70100110102

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2015



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum.Wr.Wb. Puji dan syukur penulis haturkan atas segala limpahan rahmat dan hidayah yang telah diberikan Allah swt kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana di Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar. Tak lupa pula salawat dan salam yang selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. yang telah membawa ummatnya dari alam yang gelap ke alam yang terang benderang.

Rasa terima kasih penulis kepada semua pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, karena penulis menyadari bahwa banyak sekali hambatan dalam menyelesaikan skripsi ini, dan tanpa bantuan dari semua pihak-pihak pendukung, penulis tidak akan mampu untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, izinkan penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua penulis Bakri K., S.H., M.H dan Zubaedah Bs, S.E yang tak pernah berhenti memberikan semangat dan dukungan, serta kasih sayang sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Saudara-saudari penulis, Maghfirah Suryani Bakri, S.H., capt. Rahmat aryanto Bakri, S.St.pel, Muh. Nirwansyah bakri, dan Muh. Iqram Bakri
3. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

4. Bapak Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc., selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Ibu Fatmawaty Mallapiang, S.Km.,M.Kes., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
6. Ibu Dra.Hj. Faridha Yenny Nonci, M.Si.,Apt. selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Kesehatan Uninersitas Islam Negeri Alauddin Makassar..
7. Bapak Drs. Wahyuddin G.,M.Ag., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
8. Bapak Nursalam Hamzah, S.Si.,M.Si., Apt. selaku Ketua Jurusan Farmasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sekaligus sebagai pembimbing kedua yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan serta meluangkan waktu dan fikirannya dalam mengoreksi apa-apa yang perlu diperbaiki pada skripsi penulis.
9. Ibu Mukhriani, S.Si., M.Si., Apt., selaku pembimbing pertama yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan serta meluangkan waktu dan fikirannya dalam mengoreksi apa-apa yang perlu diperbaiki pada skripsi penulis.
10. Ibu Nurshalati Tahar, S.Farm., M.Si., Apt., selaku penguji kompetensi yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam mengoreksi dan memberikan saran pada skripsi penulis.
11. Bapak Drs. Muh. Saleh Ridwan, M.Ag., selaku penguji Agama yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam mengoreksi dan memberikan saran pada skripsi penulis.

12. Bapak, Ibu Dosen, serta Seluruh Staf Jurusan Farmasi atas curahan ilmu pengetahuan dan segala bantuan yang diberikan pada penulis sejak menempuh pendidikan farmasi, melaksanakan pendidikan hingga selesainya skripsi ini.
13. Para Laboran Laboratorium Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar serta teman seperjuangan angkatan 2010 dan rekan mahasiswa farmasi Universitas Islam Negeri Alauddin
14. Teman-teman komunitas Ligamers yang selalu menjadi sosok sahabat dan saudara bagi penulis
15. Teman-teman Organisasi Seni Kampus “eSA” yang senantiasa memberikan motivasi dan wejangan bagi penulis

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan memohon saran dan kritik yang membangun dari segala pihak guna untuk kesempurnaan skripsi dan penelitian selanjutnya.

Akhirnya, penulis sangat berharap karya tulis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu di bidang farmasi pada umumnya dan semoga Allah swt selalu melimpahkan rahmat dan hidayah di dalamnya. Amin Ya Robbal A'lamin

Makassar, Juni 2015

Penulis,

RISNAWATY BAKRI
NIM. 70100110102

DAFTAR ISI

JUDUL	I
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Ii
PENGESAHAN	Iii
KATA PENGANTAR	Iv
DAFTAR ISI	Viii
DAFTAR LAMPIRAN	Xi
DAFTAR TABEL	Xii
DAFTAR GAMBAR	Xiii
ABSTRAK	Xiv
ABSTRACT	Xv
BAB I PENDAHULUAN	1-6
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian	4
D. Kajian Pustaka	5
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN TEORITIS	8-34
A. Uraian Tanaman	8
1. Klasifikasi Tanaman	8
2. Penamaan Tanaman	8
3. Morfologi	8
4. Kandungan kimia	10
5. Kegunaan	11

B. Ekstraksi	13
1. Pengertian	14
2. Mekanisme kerja ekstraksi	14
3. Jenis-jenis ekstraksi	14
C. Spektrofotometer	16
D. Flavonoid, Fenolik, dan Karotenoid	21
1. Flavonoid	21
2. Fenolik	24
3. Karotenoid	25
E. Standarisasi Ekstrak	29
1. Standarisasi aspek spesifik	30
2. Standarisasi aspek non spesifik	31
F. Tinjauan Islam	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	35-40
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	36
1. Jenis Penelitian	36
2. Lokasi Penelitian	36
B. Pendekatan Penelitian	36
C. Sampel	36
D. Instrumen penelitian	36
1. Alat yang digunakan	36
2. Bahan yang digunakan	36

E. Metode Pengumpulan Data	37
1. Penyiapan sampel	37
2. Ekstraksi sampel	37
3. Analisis Kuantitatif.....	38
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	41-46
A. Hasil Penelitian	42
1. Hasil Pengukuran absorbansi larutan baku	42
2. Hasil pengukuran kadar total ekstrak Jintan hitam	43
B. Pembahasan	43
BAB V PENUTUP	47
A. Kesimpulan	47
B. Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	48-50
LAMPIRAN	51-72
RIWAYAT HIDUP	73



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Skema kerja ekstraksi sampel	52
2. Skema kerja pengukuran absorbansi panjang maksimum fenolik	53
3. Skema kerja pengukuran absorbansi panjang maksimum flavonoid	54
4. Skema kerja pengukuran absorbansi panjang maksimum karotenoid	55
5. Skema kerja pengukuran absorbansi kadar fenol ekstrak Jintan hitam	56
6. Skema kerja pengukuran absorbansi kadar flavonoid ekstrak Jintan hitam	57
7. Skema kerja pengukuran absorbansi kadar karotenoid ekstrak Jintan hitam	58
8. Foto ekstraksi tanaman jintan hitam	59
9. pengukuran absorbansi panjang gelombang maksimum	60
10. pengukuran absorbansi panjang gelombang maksimum	61
11. Grafik persamaan regresi linear	61
12. kurva baku asam galat	62
13. . kurva baku kuarsetin.....	63
14. . kurva baku Beta karoten	64
15. Perhitungan penetapan kadar total	64
16. Pembuatan larutan	71

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. spektrum cahaya tampak dan warna-warna komplementer	18
2. golongan senyawa flavonoid.....	23
3. hasil ekstraksi biji Jintan Hitam	42
3. pengukuran absorbansi maksimum larutan pembanding asam galat	42
4. pengukuran absorbansi maksimum larutan pembanding kuarsetin.....	42
5. pengukuran absorbansi maksimum larutan pembanding beta karoten.....	43
6. pengukuran absorbansi kadar total sampel biji Jintan Hitam	43

DAFTAR GAMBAR

Tabel	Halaman
1. Gambar komponen spektrofotometer	20
2. Gambar rumus bangun senyawa flavonoid	21
3. Gambar rumus bangun senyawa beta karoten	27
3. Skema kerja ekstraksi sampel biji Jintan Hitam.....	52
4. Skema kerja pengukuran absorbansi maksimum fenolik.....	53
5. Skema kerja pengukuran absorbansi maksimum flavonoid.....	54
6. Skema kerja pengukuran absorbansimaksimum karotenoid	43
7. Skema kerja pengukuran absorbansi kadar fenol ekstrak	56
8. Skema kerja pengukuran absorbansi kadar flavonoid ekstrak	57
9. Skema kerja pengukuran absorbansi kadar karotenoid ekstrak	58
10. Foto ekstraksi Jintan Hitam	59
11. Gambar absorbansi panjang gelombang maksimum asam galat	60
12. Gambar kurva absorbansi panjang gelombang maksimum asam galat	60
13. Gambar absorbansi panjang gelombang maksimum kuarsetin	60
14. Gambar kurva absorbansi panjang gelombang maksimum kuarsetin..	60
15. Gambar absorbansi panjang gelombang maksimum beta karoten	61
16. Gambar kurva absorbansi panjang gelombang maksimum beta karoten ...	61

ABSTRAK

NamaPenyusun : Risnawaty Bakri
NIM : 70100110102
Judul : Uji Kadar Total Flavonoid, Fenolik, dan Karotenoid Ekstrak Larut Heksan dan Tidak Larut Heksan Jintan Hitam (*Nigella sativa* L.)

Telah dilakukan penelitian tentang uji kadar total flavonoid, fenolik, dan karotenoid ekstrak larut heksan dan tidak larut heksan Jintan Hitam (*Nigella sativa* L.) dengan metode spektrofotometer ultraviolet *visibel*. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kadar flavonoid, fenolik, dan karotenoid dalam sampel Jintan Hitam (*Nigella sativa* L.). Sampel yang digunakan berupa ekstrak etanol 70% dan ekstrak heksan Jintan Hitam (*Nigella sativa* L.). Ekstrak didapat dengan metode maserasi bertingkat dimana pelarut pertama digunakan heksan dan yang kedua etanol dan dilakukan uji kandungan flavonoid, fenolik, dan karotenoid total. Kandungan flavonoid ekstrak etanol adalah 7,82%, kandungan fenolik 7,97%, dan karotenoid 0,6% Dan kandungan total karotenoid adalah 2,71% dan untuk ekstrak heksan, kandungan fenol nya adalah 23,81%, flavonoid 9,36%, dan karotenoid 0,7%.

Kata kunci :Jintan Hitam (*Nigella sativa* L.), ekstrak, flavonoid, fenolik, dan karotenoid

ABSTRACT

NamaPenyusun : Risnawaty Bakri
NIM : 70100110102
Judul : Uji Kadar Total Flavonoid, Fenolik, dan Karotenoid Jintan Hitam (*Nigella sativa* L.)

A study concerning the assay of total flavonoid, phenolic, carotenoid Jintan hitam (*Nigella sativa* L.) by the method of ultra violet visible spectrophotometer. This study aimed to measure the levels of phenolics, flavonoids and carotenoids in samples Jintan hitam (*Nigella sativa* L.). The sample used in the form of 70% ethanol extract Jintan hitam (*Nigella sativa* L.). The extract obtained by maceration method and test flavonoid content, phenolic and total carotenoids. Flavonoids extract of ethanol was 7,82%, phenolic was 7,97%, and carotenoids was 0,6%. Dan content of extract heksan Phenolic content was 23,81%, flavonoids content was 9,36% and the total carotenoid content was 0,7%.

Keywords: Jintan hitam (*Nigella sativa* L.) extract flavonoids, phenolics, carotenoids,

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾

Terjemahnya

“(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan Ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, Maka peliharalah kami dari siksa neraka” (QS al-Imran/ 3:191)

Keanekaragaman hayati yang ada di bumi ini tak hanya digunakan sebagai bahan pangan ataupun untuk dinikmati keindahannya saja, tetapi dapat juga bermanfaat sebagai bahan untuk mengobati berbagai jenis penyakit. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah dan beraneka ragam, namun masih sebagian kecil yang diteliti serta dimanfaatkan.

Dunia Barat mulai memalingkan kembali perhatiannya ke alam, yang terkenal dengan semboyannya *back to nature*, mengikuti jejak dunia Timur, khususnya Asia yang sampai detik inipun masih tetap memanfaatkan obat-obat dalam upaya-upaya pelayanan kesehatan di samping obat-obat farmasetik. Kembalinya perhatian dunia barat ke obat-obat alam ini tidak lain adalah karena kembali tumbuhnya kepercayaan masyarakat barat terhadap obat-obat alamiah, termasuk obat-obat nabati dapat memberikan peranannya dalam upaya pemeliharaan, peningkatan dan pemulihan kesehatan serta pengobatan penyakit. Di samping itu diyakini pula bahwa

obat-obat alamiah kurang memberikan efek samping jika dibandingkan dengan obat-obat farmasetik.

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَوَّلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ
السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى

Terjemahnya:

(Tuhan) yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu, dan yang menurunkan air (hujan) dari langit. "Kemudian kami tumbuhkan dengannya (air hujan itu) berjenis-jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan.

Obat-obat alam diakui masyarakat mempunyai peranan dalam upaya-upaya pemeliharaan, peningkatan, dan pemulihan kesehatan maupun pengobatan penyakit didasarkan atas pertimbangan bahwa menurut pandangan sistem pengobatan tradisional, obat-obat alam dapat mempengaruhi mekanisme pertahanan alamiah tubuh.

Salah satu tumbuhan yang biasa digunakan masyarakat sebagai bahan obat adalah jintan hitam (*Nigella sativa* L.) yang secara empirik bermanfaat sebagai antioksidan, antidiabetes, antikolesterol, antikanker, antiinflamasi, antihistamin, antiinfeksi bakteri, virus dan parasit dan dapat digunakan sebagai immunomodulator (Setyawati, 2001: 2).

Salah satu tanaman yang sering dimanfaatkan sebagai tanaman obat adalah Habbatussauda, habbatussauda' merupakan tanaman obat yang dikenal di Indonesia dengan nama Jintan hitam. Biji dan minyak esensial jintan hitam (*Nigella sativa* L.) telah banyak digunakan dalam pengobatan tradisional. Banyak penelitian yang telah membuktikan efek ekstrak *Nigella sativa*. Dalam berbagai penelitian, minyak biji jintan hitam menunjukkan khasiat sebagai anti kanker, anti radikal bebas dan

immunomodulator, analgesik, antimikroba, anti inflamasi, spasmolitik, bronkhodilator, hepatoprotektif, dan anti hipertensi Analisis kimia lanjutan menemukan bahwa habbatussaudaa mengandung karoten yang diubah menjadi vitamin A oleh hati (Khasanah, 2009).

سَلَمَةُ يَحْيَى بْنِ خَلْفٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَمِعْتُ سَالِمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
وَدَاءٍ فَإِنَّ فِيهَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ لَكُمْ بِهِدِهِ الْحَبَّةُ السَّ

Artinya:

“Bercerita kepada kami Abu Salmah Yahya bin Half, bercerita kepada kami Abu ‘Ashim dari Utsman bin ‘Abdil Malik ia berkata: Aku mendengar Salim bin ‘Abdillah bercerita tentang bapaknya bahwa Rasulullah saw bersabda: “Hendaklah kalian mengkonsumsi Habbatus sauda’ (Jintan Hitam) ini, karena di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan dari segala penyakit, kecuali As-sam (Maut)”. (H.R. Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah No:3439)

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas tentang manfaat habbatussauda sebagai peningkat sistem imun terhadap beberapa penyakit seperti diare, perut mulas, serta menurunkan kadar kolestrol dalam tubuh, belum pernah dilakukan penelitian tentang kadar total flavonoid, fenolik, dan karotenoidnya.

Berdasarkan fakta di atas dilakukan penelitian yang bertujuan untuk menentukan kadar flavonoid, fenolik, dan karotenoid dari tanaman Jintan Hitam (*Nigella sativa L.*) dengan alat spektrofotometer. Peneliti berharap hasil penelitian ini nantinya dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan standarisasi obat bahan alam. Selain itu, hasil penelitian juga dapat bermanfaat dalam membantu menyusun standar mutu obat bahan alam.

B. Rumusan Masalah

1. Berapa kadar total Flavonoid, Fenolik, dan Karotenoid pada ekstrak larut heksan dan tidak larut heksan Jintan Hitam (*Nigella sativa L.*)?
2. Bagaimana tinjauan islam mengenai pemanfaatan tanaman sebagai obat?

C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Defenisi Operasional

- a. Ekstrak adalah sediaan kering, kental atau cair dibuat dengan mengekstraksi simplisia nabati atau hewani menurut cara yang cocok, diluar pengaruh cahaya matahari langsung (Direktorat jendral POM, 1979: 9).
- b. Jintan Hitam atau Habbatussauda adalah tanaman yang berbentuk biji-bijian yang banyak dimanfaatkan sebagai tanaman herbal, banyak dibuktikan melalui penelitian dan dalam hadist Rasulullah SAW juga menganjurkan penggunaan tanaman jintan hitam
- c. Kadar total adalah jumlah total senyawa yang terkandung dalam sebuah tanaman berdasarkan nilai absorbansinya.
- d. Flavonoid adalah istilah yang diberikan pada suatu golongan besar senyawa yang berasal dari kelompok senyawa yang paling umum, yaitu senyawa flavon, suatu jembatan oksigen terdapat diantara cincin A dalam kedudukan orto, dan atom karbon benzil yang terletak disebelah cincin B. Senyawa heterosiklik ini, pada tingkat oksidasi yang berbeda terdapat dalam kebanyakan tumbuhan. Flavon adalah bentuk yang mempunyai cincin C dengan tingkat oksidasi paling rendah dan dianggap sebagai struktur induk dalam nomenklatur kelompok senyawa-senyawa ini. Kadar total flavonoid dihitung setara dengan kuarsetin.

- e. Fenolik adalah senyawa yang sekurang-kurangnya memiliki polifenol hanya merupakan satu senyawa yang memiliki lebih dari satu gugus fenol. Kadar total fenolik dihitung setara dengan asam galat
- f. Karotenoid adalah pigmen alamiah yang terdapat di alam. Dalam bahan pangan, karotenoid merupakan sumber vitamin A. Dalam tanaman, karotenoid terdapat didalam jaringan fotosintetik, seperti batang, bunga, buah, dan biji. Karotenoid terdapat dalam kloroplas bersama dengan klorofil, sehingga meskipun senyawa ini memiliki warna merah-kuning, sering-sering pigmen ini tidak tampak karena ditutupi oleh klorofil yang berwarna hijau. Kadar total karotenoid setara dengan beta karoten.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah Penetapan Kadar total flavonoid, fenolik, dan karotenoid, sampel diekstraksi dengan metode maserasi bertingkat, dimana digunakan pelarut heksan kemudian dilanjutkan dengan pelarut etanol 70%. Penetapan kadar menggunakan Spektrofotometer UV-Vis dengan menggunakan baku standar asam galat, kuarsetin, dan beta karoten.

D. Kajian Pustaka

1. Berdasarkan penelitian Keyhanmanesh R, Bagban H, Nazemiyeh H, Mirzaei Babil F, Alipour MR, Ahmady M (2013) menunjukkan bahwa habbatussauda dapat digunakan sebagai obat asma. menunjukkan efek pencegahan dari Nigella sativa ekstrak pada ovalbumin -induced asma..
2. Berdasarkan penelitian Onifade AA, Jewell AP, Adedeji WA menunjukkan bahwa Nigella sativa telah didokumentasikan untuk memiliki banyak fungsi terapi dalam infeksi .

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya lebih membahas kepada manfaat dari jintan hitam itu sendiri, sedangkan penelitian ini mengarah kepada kadar flavonoid, fenolik, dan karotenoid total dari jintan hitam (*Nigella sativa* L.)

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui kadar total flavonoid, fenolik, dan karotenoid total ekstrak larut heksan dan tidak larut heksan jintan hitam (*Nigella sativa* L.)
- b. Untuk mengetahui pandangan Islam mengenai pemanfaatan tanaman sebagai obat

2. Kegunaan

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bukti ilmiah tentang manfaat dari uji kadar total flavonoid, fenolik, dan karotenoid pada Jintan Hitam (*Nigella sativa* L.)

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Uraian Tanaman Jintan Hitam (*Nigella sativa* L.)

1. Klasifikasi Tanaman

Dunia	: Plantae
Divisi	: Spermatophyta
Anak divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida dicotyledon
Anak kelas	: Magnoliidae
Bangsa	: Ranunculales
Suku	: Ranunculaceae
Marga	: <i>Nigella</i> L.
Jenis	: <i>Nigella sativa</i> L. (Khare, 2007: 439)

2. Penamaan Tanaman Jintan Hitam

Jinten ireng (Jawa), Jinten le'leng (Makassar), Jinta maeta (Bau-bau), Jintan malotong (Toraja), Jintan lotong (Bugis) (Sastrohamidjojo, 1997: 570).

3. Morfologi Tanaman Jintan Hitam

Tanaman berupa herba kecil dengan tinggi sekitar 6 sampai 12 inci, memiliki bunga yang tumbuh pada ujung cabang dengan warna putih seperti susu, daun tumbuh berpasangan di kedua sisi cabang atau batang, daun yang paling bawah kecil dan daun yang paling atas dapat mencapai panjang sampai 10 cm (Resnita, 2008)

Pokoknya mengeluarkan bunga berwarna ungu muda atau putih dengan 5 helai mahkota selebar 2,5 cm. Buahnya berbentuk kapsul yang mengandung banyak biji kecil berwarna putih dan berbentuk trigonal dan panjang sekitar 3 mm.

Butir-butir Jintan Hitam dapat memproduksi diri dengan sendirinya dan akan mengalami metamorfosis (perubahan dan pematangan bentuk fisik) dari biji yang (pada awalnya) berwarna putih menjadi biji yang berwarna hitam (setelah mengalami metamorfosis). Setelah matang kapsulnya terbuka dan biji-biji akan berubah menjadi hitam. Tanaman jintan hitam secara keseluruhan tampak seperti segitiga

Tumbuhan ini tumbuh hingga mencapai tinggi 20-30 cm, dengan daun hijau lonjong, ujung dan pangkal runcing, tepi beringgit, dan pertulangan menyirip. Bunganya majemuk, bentuk karang, kepala sari berwarna kuning, mahkota berbentuk corong berwarna antara biru sampai putih, dengan 5-10 kelopak bunga dalam satu batang pohon (Hutapea, 1994).

Jintan hitam merupakan tanaman berbatang tegak, batangnya biasanya berusuk dan berbulu kasar, rapat atau jarang-jarang, dan disertai adanya bulu-bulu berkelenjar. Bentuk daun lanset berbentuk persegi, panjang 1,5 cm–2 cm, ujung meruncing dan terdapat tiga tulang daun yang berbulu. Daun bagian bawah bertangkai dan bagian atas duduk. Kelopak bunga umumnya delapan, agak memanjang, lebih kecil dari kelopak bunga, berbulu jarang, dan pendek. Benang sari banyak dan kepala sari jorong dan sedikit tajam, berwarna kuning. Biji hitam, jorong bersudut tiga tidak beraturan dan sedikit berbentuk kerucut, panjang 3 mm dan berkelenjar (Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 1979: 112-117).

Buahnya keras seperti buah buni, berbentuk besar, mengembung, berisi 3-7 unit folikel, masing-masing berisi banyak biji atau benih yang sering digunakan manusia sebagai rempah-rempah. Memiliki rasa pahit yang tajam dan bau seperti buah strawberi, bijinya berwarna hitam pekat (Tjitrosoepomo, 1996).

4. Kandungan Kimia Jintan Hitam

Biji jintan hitam (*Nigella sativa Semen*) mengandung minyak atsiri tidak kurang dari 0,2% v/b (Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 1979). Kandungan minyak atsiri dalam biji bahkan dapat mencapai 1,5%. Kandungan lain dalam bijinya adalah glukosida saponin, glukosida beracun melantin, zat pahit, dan minyak lemak (Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 1989).

Jintan Hitam kaya akan kandungan nutrisi monosakarida (molekul gula tunggal) dalam bentuk glukosa rhamnosa, xylose dan arabinosa yang dengan mudah dapat diserap oleh tubuh sebagai sumber energi, juga mengandung non-starch polisakarida. *Nigella sativa* juga sebagai sumber kalsium, zat besi, dan potasium. Ia juga mengandung asam lemak, terutama asam lemak esensial tak jenuh (asam Linoleic dan Linolenic). Asam lemak esensial terdiri dari asam Alfa Linolenic (Omega-3) dan Asam Linoleic (omega-6) sebagai pembentuk sel yang tidak dapat dibentuk sendiri dalam tubuh sehingga harus mendapat asupan atau makanan dari luar yang memiliki kandungan asam lemak esensial yang tinggi (Sulaiman 2008: 9-10).

Biji jintan hitam antara lain mengandung :

- a. Minyak atsiri: *thymoquinone* 25-50, *p-cymene* dan *α -pinene*, *carvacrol*, *anetol* dan *α -terpineol*.
- b. Minyak lemak: asam eososianat 0,5%, asam linoleat sekitar 60%, asam linolenat 0,3%, asam myristat 0,3%, asam oleat sekitar 25%, asam palmiat 0,3% dan asam stearat 3%.
- c. Kandungan lainnya: Tanin, alkaloid, nigelon, nigelimin, nigelimin noksida dan nigelisin, campesterol, stigmasterol, β -sitosterol, α - spinasterol. Juga mengandung 1,5% glukosida melantin yang bila dihidrolisis menghasilkan racun melantogenin.

Dalam 100 g biji jinten hitam mengandung: air 4 g, protein 22 g, lemak 41 g, karbohidrat 17 g, serat 8 g, mineral 4,5 g (Na 0,5 g, K 0,5 g, Ca 0,2 g, P 0,5 g, Fe 10 mg), thiamin 1,5 mg, piridoksin 0,7 mg, tokoperol 34 mg dan niasin 6 mg (Resnita 2008: 5)

5. Kegunaan Jintan Hitam

Jintan hitam mempunyai banyak manfaat seperti mengatasi radang pada selaput lendir mata, batuk rejan, keputihan, lepra, radang hidung, demam, sembelit, encok, digigit serangga atau ular, influenza (buah/bijinya). Penelitian dari The Cancer Research Institute at South Carolina USA membuktikan secara ilmiah bahwa biji jintan hitam bukan saja mempunyai kemampuan memberikan efek pengaturan terhadap sistem kekebalan dan meningkatkan jumlah sel-sel kekebalan dan antibody tetapi juga meningkatkan pembentukan sel-sel tulang sumsum secara mengejutkan (250 persen), melindungi tubuh dari virus, menghancurkan sel-sel tumor dan meningkatkan produksi interferon. Amala Research Centre in Amala Nagar, Kerala (India) juga meneliti kemampuan biji jintan hitam sebagai anti tumor. University of Alexandria di Mesir tahun 1997, hasil penelitiannya juga menekankan pula bahwa minyak dari jintan hitam ini mempunyai kemampuan menghambat pertumbuhan tumor.

Ibnu Sina yang dikenal dunia Barat dengan nama Avicenna, seorang peneliti jenius dari Timur Tengah, telah meneliti berbagai manfaat jintan hitam untuk kesehatan dan pengobatan. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya bab yang khusus membahas jintan hitam di dalam bukunya "The Canon of Medicine", buku yang dianggap sebagai tonggak paling bersejarah dalam ilmu pengobatan. Ibnu Sina memuji habbatussauda sebagai "obat yang bisa membangkitkan energi dalam tubuh

serta mampu menghilangkan rasa letih dan lesu." Di dalam bukunya tersebut, Ibnu Sina juga menganjurkan habbatussauda untuk mengatasi berbagai penyakit, antara lain demam, sakit kepala, sakit gigi, flu, penyakit kulit, luka, iritasi, sebagai obat anti-jamur, obat cacing, dan parasit

a. Meningkatkan Sistem Kekebalan Tubuh

Berbagai penelitian membuktikan bahwa Jintan hitam meningkatkan sistem kekebalan dalam tubuh manusia. Dari sini bisa diketahui manfaat jintan hitam untuk mengatasi berbagai macam penyakit secara umum, khususnya penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus

Tahun 1960, El-Dakhkhny mengungkapkan bahwa kandungan minyak nigellone dan thymoquinone dalam jintan hitam membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Riset dibidang AIDS dilakukan Dr.Haqpada di Departemen Biologi dan Pusat Penelitian Medis di Riyadh, Arab Saudi, tahun 1997. Hasilnya, jintan hitam mampu meningkatkan rasio sel T positif dan negatif menjadi 55 persen dengan 30 persen aktivitas pembunuh sel alamiah (Sulaiman 2008, 12)

b. Meningkatkan Daya Ingat dan Kecerdasan

Dengan kandungan Asam linoleat (Omega 6) dan Asam linoleat (Omega 3). Habbatussauda merupakan nutrisi bagi sel otak untuk meningkatkan daya ingat dan kecerdasan. Habbatussauda juga memperbaiki mikro (peredaran darah) ke otak dan sangat cocok diberikan kepada anak usia pertumbuhan dan lansia.

Salah satu kandungan Habbatussauda adalah setrol yang berfungsi sebagai sintesa dan bioaktivitas hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin yang masuk dalam peredaran darah.

c. Anti histamin

Histamin adalah sebuah zat yang dilepaskan oleh jaringan tubuh yang memberikan reaksi alergi seperti pada asma bronkial. Hasilnya cukup meyakinkan, 70 % yang menderita alergi debu, serbuk, jerawat, dan asma sembuh setelah diberikan minyak nigella sativa (Habbatussauda).

Pada tahun 1992, Jurnal farmasi Pakistan membuat hasil penelitian yang membuktikan minyak volatile lebih ampuh membunuh strain bakteri V Cholera dan E. Coli dibandingkan dengan antibiotik seperti ampicilin dan tetrasiklin.

d. Menambah Energi

Kaya akan kandungan nutrisi sebagai tambahan energi, sangat ideal untuk orang yang berusia lanjut, terutama untuk menjaga daya tahan tubuh dan vitalitas sel otak agar tidak cepa pikun. Habbatussauda dapat merangsang sum-sum tulang dan sel-sel kekebalan. Interferonnya menghasilkan sel-sel normal terhadap virus yang merusak sekaligus menghancurkan sel-sel tumor dan meningkatkan antibodi (Admin, 2008)

B. Ekstraksi

1. Pengertian Ekstraksi

Ekstraksi adalah penyarian zat-zat berkhasiat atau zat-zat aktif dari bagian tanaman obat, hewan dan beberapa jenis biota laut. Zat-zat aktif tersebut berada didalam sel, namun sel tanaman dan hewan berbeda, sehingga diperlukan metode ekstraksi dan pelarut tertentu dalam mengekstraksinya (Direktorat jendral POM, 1979)

2. Mekanisme Kerja

Umumnya, zat aktif yang terkandung dalam tanaman maupun hewan yang lebih larut dalam pelarut organik. Proses terekstraksinya zat aktif dalam tanaman pelarut organik akan menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat aktif, zat aktif tersebut akan terlarut sehingga terjadi perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif di dalam sel dan pelarut organik di luar sel. Maka larutan terpekat akan berdifusi keluar sel, dan proses ini berulang terus sampai terjadi keseimbangan antara konsentrasi zat aktif di dalam sel dan di luar sel (Tjiptosoepomo, 1996: 65).

3. Jenis-jenis ekstraksi

a. Maserasi

Maserasi adalah cara penyarian yang sederhana. Maserasi dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari. Cairan penyari akan menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat aktif, zat aktif akan larut karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif di dalam sel dengan yang di luar sel, maka larutan yang terpekat akan terdesak ke luar. Peristiwa tersebut berulang sehingga terjadi keseimbangan.

Maserasi digunakan untuk penyarian simplisia yang mengandung zat aktif yang mudah larut dalam cairan penyari, tidak mengandung zat yang mudah mengembang dalam cairan penyari, tidak mengandung benzoin, stirok dan lain-lain (Dirjen POM, 1979).

Metode Maserasi umumnya menggunakan pelarut non air atau pelarut non-polar. Teorinya, ketika simplisia yang akan di maserasi direndam dalam pelarut yang dipilih, maka ketika direndam, cairan penyari akan menembus dinding sel dan masuk ke dalam sel yang penuh dengan zat aktif dan karena ada pertemuan antara zat aktif

dan penyari itu terjadi proses pelarutan (zat aktifnya larut dalam penyari) sehingga penyari yang masuk ke dalam sel tersebut akhirnya akan mengandung zat aktif, katakan 100%, sementara penyari yang berada di luar sel belum terisi zat aktif (0%) akibat adanya perbedaan konsentrasi zat aktif di dalam dan di luar sel ini akan muncul gaya difusi, larutan yang terpekat akan didesak menuju keluar berusaha mencapai keseimbangan konsentrasi antara zat aktif di dalam dan di luar sel. Proses keseimbangan ini akan berhenti, setelah terjadi keseimbangan konsentrasi (istilahnya “jenuh”). Dalam kondisi ini, proses ekstraksi dinyatakan selesai, maka zat aktif di dalam dan di luar sel akan memiliki konsentrasi yang sama, yaitu masing-masing 50%. (Anonim, 1979: 10-11)

Keuntungan cara penyarian dengan maserasi adalah cara pengerjaan dan peralatan yang digunakan sederhana dan mudah diusahakan. Cairan penyari yang digunakan dapat berupa air, etanol, air-etanol, atau pelarut lain. Bila cairan penyari digunakan air, maka untuk mencegah timbulnya kapang dapat ditambahkan bahan pengawet yang diberikan pada awal penyarian (Dirjen POM, 1979)

b. Perkolasi

Perkolasi adalah ekstrak dengan pelarut yang selalu baru sampai terjadi penyarian sempurna yang umumnya dilakukan pada temperatur kamar. Proses perkolasi terdiri dari tahapan perkolasi pengembangan bahan, tahap maserasi antara, tahap perkolasi sebenarnya (penetesan/penampungan ekstrak), terus-menerus sampai diperoleh ekstrak (perkolat).

c. Refluks

Refluks adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik didihnya selama waktu tertentu dan dalam jumlah pelarut terbatas yang relatif konstan dengan adanya pendingin balik.

d. Digesti

Digesti adalah maserasi dengan pengadukan kontinyu pada temperatur yang lebih tinggi dari temperatur kamar yaitu 40-50⁰C.

e. Infus

Infus adalah ekstraksi menggunakan pelarut air pada temperatur penangas air (bejana infus tercelup dalam penangas air mendidih, temperatur terukur 90⁰C) selama 15 menit.

f. Dekok

Dekok adalah ekstraksi menggunakan pelarut air pada temperatur 90⁰C selama 30 menit.

g. Sokletasi

Sokletasi adalah metode ekstraksi untuk bahan yang tahan pemanasan dengan cara meletakkan bahan yang akan diekstraksi dalam sebuah kantung ekstraksi (kertas kering) didalam sebuah alat ekstraksi dari gelas yang bekerja kontinyu (Voight, 1995; 570).

C. Spektrofotometri

Spektrofotometer adalah suatu instrumen untuk mengukur transmitans atau absorbans suatu sampel sebagai fungsi panjang gelombang (Underwood, 2002: 396). Spektrofotometer sesuai dengan namanya adalah alat yang terdiri dari spektrometer dan fotometer. Spektrometer menghasilkan sinar dari spektrum dengan panjang

gelombang tertentu dan fotometer adalah alat pengukur intensitas cahaya yang ditransmisikan atau yang diabsorpsi. Jadi spektrofotometer digunakan untuk mengukur energi secara relatif jika energi tersebut ditransmisikan, direfleksikan, atau diemisikan sebagai fungsi dari panjang gelombang (Khopkar, 1990: 225).

Spektrum UV-Vis merupakan hasil interaksi radiasi UV-Vis terhadap molekul yang mengakibatkan molekul mengalami transisi elektronik, sehingga disebut spektrum elektronik. Hal ini didapat karena adanya gugus berikatan rangkap atau terkonjugasi yang mengabsorpsi radiasi elektromagnetik di daerah UV-Vis (Mulja, 1990)

Spektrofotometri UV-Vis merupakan metode yang digunakan untuk menguji sejumlah cahaya yang diabsorpsi pada setiap panjang gelombang di daerah ultraviolet dan tampak. Dalam instrumen ini suatu sinar cahaya terpecah sebagian cahaya diarahkan melalui sel transparan yang mengandung pelarut. Ketika radiasi elektromagnetik dalam daerah UV-Vis melewati suatu senyawa yang mengandung ikatan-ikatan rangkap, sebagian dari radiasi biasanya diabsorpsi oleh senyawa. Hanya beberapa radiasi yang diabsorpsi, tergantung pada panjang gelombang dari radiasi dalam struktur senyawa. Absorpsi radiasi disebabkan oleh pengurangan energi cahaya radiasi ketika elektron dalam orbital dari rendah tereksitasi ke orbital energi tinggi (Mulja 1990: 30).

Prinsip dasarnya yaitu apabila radiasi elektromagnetik pada daerah ultraviolet dan sinar tampak melalui senyawa yang memiliki ikatan-ikatan rangkap, sebagian dari radiasi biasanya diserap oleh senyawa. Jumlah radiasi yang diserap tergantung pada panjang gelombang radiasi dan struktur senyawa. Penyerapan sinar radiasi disebabkan oleh pengurangan energi dari sinar radiasi pada saat elektron-elektron

dalam orbital berenergi rendah tereksitasi ke orbital berenergi lebih tinggi (Solomon, 1980: 413).

Semua molekul dapat mengabsorpsi radiasi dalam daerah UV-tampak karena mereka mengandung elektron yang dapat dieksitasikan ke tingkat energi yang lebih tinggi. Panjang gelombang dimana absorpsi itu terjadi, bergantung pada berapa kuat elektron itu terikat dalam molekul (Underwood, 2002: 388).

Spektrofotometer UV-Vis dapat melakukan penentuan terhadap sampel yang berupa larutan, gas, atau uap. Untuk sampel yang berupa larutan perlu diperhatikan pelarut yang dipakai antara lain:

1. Pelarut yang dipakai tidak mengandung sistem ikatan rangkap terkonjugasi pada struktur molekulnya dan tidak berwarna
2. Tidak terjadi interaksi dengan molekul senyawa yang dianalisis
3. Kemurniannya harus tinggi atau derajat untuk analisis (Mulja, 1990:28).

Panjang gelombang cahaya UV atau Nampak jauh lebih pendek daripada panjang gelombang radiasi infra merah. Satuan yang akan digunakan untuk panjang gelombang ini adalah *nanometer* ($1 \text{ nm} = 10^{-7} \text{ cm}$). spektrum Nampak terentang dari sekitar 400 nm (ungu) ke 750 nm (merah), sedangkan ultra violet berjangka dari 100 nm ke 400 nm (Fesenden, 1986:436).

Tabel 1. Spektrum cahaya tampak dan warna-warna komplementer (Underwood, 2001; 396).

Panjang gelombang (nm)	Warna	Warna komplementer
400-435	Violet	Kuning-hijau
435-480	Biru	Kuning
480-490	Hijau-biru	Orange
490-500	Biru-hijau	Merah
500-560	Hijau	Ungu
560-580	Kuning-hijau	Violet
580-595	Kuning	Biru

595-610	Orange	Hijau-biru
610-750	Merah	Biru-hijau

Suatu spektrofotometer tersusun dari sumber spektrum tampak yang kontinu, monokromator, sel pengabsorpsi untuk larutan sampel atau blanko dan suatu alat untuk mengukur perbedaan absorpsi antara sampel dan blanko ataupun pembandingan (khopkar,1990: 226-227).

1. Sumber

Sumber yang biasa digunakan pada spektroskopi absorpsi adalah lampu wolfram. Arus cahaya tergantung pada tegangan lampu, $I = K V^n$, i (arus cahaya), V (tegangan), n (eksponen) (3-4 pada lampu wolfram), variasi tegangan masih dapat diterima 0,2% pada suatu sumber DC, misalnya batrei. Kebaikan lampu wolfram adalah energi radiasi yang dibebaskan tidak bervariasi pada panjang gelombang. Untuk memperoleh tegangan yang stabil dapat digunakan transformator. Jika potensial tidak stabil, kita kita mendapatkan energy yang bervariasi.

2. Monokromator

Digunakan untuk memperoleh sumber, sinar yang monokromatis. Alatnya dapat berupa prisma ataupun grating. Untuk mengarahkan sinar monokromatis yang diinginkan dari hasil penguraian ini dapat digunakan celah. Jika celah yang posisinya tetap, maka prisma tau gratingnya yang dirotasikan untuk mendapatkan panjang gelombang yang diinginkan.


3. Sel absorpsi

Pada pengukuran didaerah tampak kuvet kaca atau kuvet kaca corex dapat digunakan, tetapi untuk pengukuran pada daerah UV kita harus menggunakan sel kuarsa karena gelas tidak tembus cahaya pada daerah ini. Umumnya tebal kuvetnya

adalah 10 mm, tetapi yang lebih kecil maupun yang lebih besar dapat digunakan. Sel yang baik adalah kuarsa atau gelas hasil leburan serta seragam keseluruhannya.

4. Detector

Peranan detektor penerima adalah memberikan respons terhadap cahaya pada berbagai panjang gelombang.




Kerja alat ini adalah sebagai berikut: suatu radiasi dikenakan secara bergantian atau simultan melalui sampel dan blanko yang dapat berupapelarut atau udara. Sinar yang ditransmisikan oleh sampel dan blanko kemudian diteruskan ke detektor, sehingga perbedaan intensitas ini diantara kedua berkas ini dapat memberikan gambaran tentang fraksi radiasi yang diserap oleh sampel. Detektor alat ini mampu untuk mengubah informasi radiasi ini menjadi sinar listrik yang jika diamplikasikan akan

dapat menggerakkan pena pencatat diatas kertas grafik khusus alat ini (Mulja,1990: 30).

D. Flavonoid, dan Fenolik, Karotenoid

1. Flavonoid



Gambar 1. Kerangka Flavonoid

Senyawa flavonoid mempunyai struktur $C_6-C_3-C_6$. Tiap bagian C_6 merupakan cincin benzen yang terdistribusi dan dihubungkan oleh atom C_3 yang merupakan rantai alifatik, seperti ditunjukkan pada gambar (silalahi, 2006;41).

Flavonoid merupakan senyawa yang banyak dijumpai pada tanaman, terutama jenis flavonol (kuarsetin dan rutin). aktivitas flavonoid sebagai antioksidan tergantung pada bentuk, dosis, sistem enzim atau deoksidasinya. Flavonoid juga dapat menghambat oksidasi lipid baik secara enzimatis maupun non enzimatis. Senyawa-senyawa flavonoid adalah senyawa-senyawa polifenol yang mempunyai 15 atom karbon, terdiri dari dua cincin benzen yang dihubungkan menjadi satu oleh rantai linear yang terdiri dari tiga atom karbon. Senyawa-senyawa flavonoid adalah senyawa 1,3 diaril propana (Safitri, 2004)

Istilah flavonoid diberikan pada suatu golongan besar senyawa yang berasal dari kelompok senyawa yang paling umum, yaitu senyawa flavon, suatu jembatan oksigen terdapat diantara cincin A dalam kedudukan orto, dan atom karbon benzil yang terletak disebelah cincin B. Senyawa heterosiklik ini, pada tingkat oksidasi yang

berbeda terdapat dalam kebanyakan tumbuhan. Flavon adalah bentuk yang mempunyai cincin C dengan tingkat oksidasi paling rendah dan dianggap sebagai struktur induk dalam nomenklatur kelompok senyawa-senyawa ini). Flavonoid sebenarnya terdapat pada semua bagian tumbuhan termasuk daun, akar, kayu, kulit, tepung sari, bunga, buah, dan biji (Markham, 1981: 47-50).

Senyawa flavonoid adalah suatu kelompok senyawa fenol yang terbesar yang ditemukan di alam. Senyawa-senyawa ini merupakan zat warna merah, ungu dan biru sehingga berfungsi sebagai zat warna kuning yang ditemukan dalam tumbuh-tumbuhan. Fungsi flavonoid dalam tubuh manusia adalah sebagai antioksidan, sehingga sangat baik untuk pencegahan kanker. Manfaat flavonoid antara lain adalah untuk melindungi struktur sel, memiliki hubungan sinergi dengan vitamin C (meningkatkan efektivitas vitamin C), antiinflamasi, mencegah keropos tulang, dan sebagai antiseptik.

Dewasa ini, suatu konsensus yang kuat menyatakan bahwa flavonoid dan turunan polifenol merupakan komponen yang bertanggung jawab terhadap aktivitas antioksidan dalam buah dan sayuran, senyawa flavonoid mempunyai khasiat sebagai antioksidan dengan menghambat berbagai reaksi oksidasi serta mampu bertindak sebagai pereduksi radikal hidroksil, superoksida dan radikal peroksil. Senyawa antioksidan juga dapat bertindak sebagai pereduksi, penangkap radikal bebas, pengkhelatan logam, dan peredam terbentuknya singlet oksigen. Mengonsumsi flavonoid dapat mereduksi inflamasi dan menangkap radikal bebas maupun senyawa oksigen reaktif, karena flavonoid dapat menghambat enzim-enzim oksidatif seperti *aldose reductase*, *α -glucosidase*, *4 xanthine oxidase*, *monooxygenase*, *lipoxigenase*, dan *cyclooxygenase*. Kandungan flavonoid total dapat ditentukan secara kolorimetri

dengan reagen AlCl_3 dan dinyatakan dalam RE (*rutin equivalent*). Prinsip penetapan berdasarkan gugus orto dihidroksi dan gugus hidroksi keton yang membentuk kompleks reagen AlCl_3 sehingga memberikan efek batokromik (Harborne, 1987).

Aglikon flavonoid adalah polifenol dan karena itu mempunyai sifat kimia senyawa fenol, yaitu bersifat agak asam sehingga dapat larut dalam basa, dan disamping itu, terdapat oksigen, banyak yang akan terurai. Karena mempunyai sejumlah gugus hidroksil, atau suatu gula, flavonoid merupakan senyawa polar, maka umumnya flavonoid cukup larut dalam pelarut polar seperti etanol, metanol, butanol, aseton, dimetilformamida, air, dan lain-lain. Adanya gula yang terikat pada flavonoid (bentuk yang umum ditemukan) cenderung menyebabkan flavonoid lebih mudah larut dalam air dan dengan demikian campuran pelarut yang disebut diatas dengan air merupakan pelarut yang lebih baik untuk glikosida. Sebaliknya, aglikon yang kurang polar seperti isoflavon, flavonon dan flavon serta flavonol yang termetoksilasi cenderung lebih mudah larut dalam pelarut seperti eter dan kloroform.

Tabel 2. Golongan Senyawa flavonoid (Hernani. 2006:18)

Golongan	Sumber Penghasil	Tanaman
Flavon	Herbal	Parsley, daun sop, zaitun,
Flavonol	Sayuran	Bawang merah, bawang putih, brokoli, seledri, dan paprika
	Buah	Apel, cheri dan strawberi
	Minuman	The dan anggur merah
Flavono	Buah	Jeruk
Katekin	Buah	Apel, pir, dan anggur
	Mnuman	The dan cokelat
Antosianidin	Buah	Cheri dan anggur

Isoflavon	Sayuran	Kedelai dan legumes
-----------	---------	---------------------

2. Fenolik

Fenol adalah senyawa dengan satu gugus hidroksil (-OH) yang terikat pada cincin aromatik. Banyaknya variasi gugus yang mungkin tersubstitusi pada kerangka utama fenol menyebabkan kelompok fenolik memiliki banyak sekali anggota. Terdapat lebih dari 8.000 jenis senyawa yang termaksud dalam golongan senyawa fenolik. Anggota senyawa fenolik mulai dari yang paling sederhana dengan berat molekul yang kecil hingga senyawa yang kompleks dengan berat molekul lebih (Fesenden dan fesenden, 1986:485)

Kandungan fenolik yang terkandung dalam tumbuhan disebut GAE (*galic acid equivalent*) yaitu jumlah kesetaraan milligram asam galat dalam satu gram sampel. Salah satu antioksidan alami yaitu asam galat (*3,4,5-trihydroxybenzoic acid*). Ekuivalen asam galat (GAE) merupakan acuan umum untuk mengukur jumlah senyawa fenolik yang terdapat dalam suatu bahan.

Asam galat banyak digunakan sebagai standar karena stabil dan dapat diperoleh dalam bentuk yang murni, serta harganya relatif murah dibandingkan dengan jenis senyawa standar yang lain. Kurva baku sebagai standar untuk menentukan Total Phenolic Content (TPC) ekstrak dinyatakan dalam ekuivalen asam galat (GAE). Penentuan kandungan fenolik total dapat dilakukan dengan pereaksi Folin Ciocalteu. Metode ini berdasarkan kekuatan mereduksi dari gugus hidroksil fenolik. Semua senyawa fenolik termasuk fenol sederhana dapat bereaksi dengan pereaksi Folin Ciocalteu, adanya inti aromatis pada senyawa fenolik dapat mereduksi fosfomolibdat fosfotungstaf menjadi molybdenum yang berwarna biru (Elsha ukieyanna, 2012: 12).

3. Karotenoid

Karotenoid merupakan salah satu pigmen alami tumbuhan yang menghasilkan warna merah, kuning, orange, dan hijau tua pada buah dan sayuran. Warna-warna yang terlihat pada buah dan sayuran disebabkan oleh adanya ikatan rangkap terkonjugasi, maka makin pekat warna pada karotenoid yang menyerap cahaya. Semakin banyak ikatan ganda terkonjugasi, maka makin pekat warna pada karotenoid yang mengarah pada warna merah (Heriyanto, 2009). Karakteristik dari karotenoid adalah sensitif terhadap udara dan sinar terutama pada suhu tinggi, tidak larut air, gliserol dan propile glikol. Karotenoid larut dalam minyak (Kumalaningsih, 2007)

Karakteristik dari karotenoid adalah sensitif terhadap alkali dan sangat sensitif terhadap udara dan sinar terutama pada suhu tinggi, tidak larut dalam air, gliserol dan propilen glikol. Karotenoid larut dalam minyak makan pada suhu kamar (Kumalaningsih, 2007).

Cara ekstraksi karotenoid sangat efisien karena sifat komponen yang akan dipisahkan sensitive terhadap panas, mempunyai titik didih yang berdekatan, dan mempunyai sifat penguapan yang relatif rendah (Jos, dkk, 2003).

Karotenoid terdapat dalam kloroplas (0,5 %) bersama-sama dengan klorofil (9,3 %), terutama pada bagian permukaan atas daun. Pada dedaunan hijau selain klorofil terdapat juga karotenoid. Karotenoid juga terdapat dalam buah pepaya, kulit pisang, tomat, mangga, wortel, ubi jalar, dan pada beberapa bunga yang berwarna kuning dan merah. Diperkirakan lebih dari 100 juta ton karotenoid diproduksi setiap tahun di alam. Beberapa jenis karotenoid yang terdapat di alam dan bahan makanan adalah *-karoten* (berbagai buah-buahan yang kuning dan merah), *likopen* (tomat), dan *biksin* (annatis) (Winarno, 2002).


Karotenoid merupakan senyawa yang mempunyai rumus kimia sesuai atau mirip dengan karoten. Terdapat 2 jenis karotenoid yaitu (Salisbury dan Ross,1995):

1. *Karoten* merupakan hidrokarbon atau turunannya yang terdiri dari beberapa unit isoprena (suatu diena). Beberapa senyawa karotenoid yaitu γ , β , α - *karoten*, *likopen*.

2. *Xantofil* merupakan karotenoid yang mengandung gugus hidroksil. *Xantofil* umum biasanya berupa monohidroksikarotena (misalnya *lutein*, *rubixantin*), dihidroksikarotena (*zeaxantin*), atau dihidroksiepoksikarotena (*violaxantin*). *Karoten* dan *xantofil*, kedua jenis karotenoid ini umumnya mengandung 40 karbon aktif yang terdiri dari 8 unit isopren. Keduanya tidak larut dalam air, tapi larut dalam alkohol, eter minyak bumi, aseton dan banyak pelarut organik lainnya. Lebih dari 400 *karoten* yang berbeda telah ditemukan di alam. β -*karoten* merupakan karotenoid yang paling banyak dijumpai pada tumbuhan tingkat tinggi dan menyebabkan akar wortel berwarna jingga (Salisbury dan Ross, 1995).

Penetapan karotenoid total dilakukan dengan mengukur sampel atau pebanding yang dilarutkan dalam pelarut non polar pada panjang gelombang 470 nm dan pada pebanding beta karoten (thaipong,2006).

Beta karoten adalah salah satu dari kelompok senyawa yang disebut karotenoid. Dalam tubuh, senyawa ini akan dikonversi menjadi vitamin A. Serat, vitamin A, dan beta-karoten banyak ditemukan pada sayuran berwarna kuning, orange, dan hijau seperti tomat, wortel, bayam, dan brokoli. Golongan senyawa karotenoid Antara lain alfa-karoten, *zeaxanthin*, lutein, dan likopen. (Hernani. 2006:19).



Gambar 3. Beta Karoten

Karotenoid merupakan tetraterpenoid C_{40} yaitu golongan pigmen yang larut dalam lipid sehingga disebut pigmen-pigmen lipokrom yang tersebar luas dalam tumbuhan dan hewan. Karotenoid merupakan pigmen yang berwarna kuning, jingga, atau merah yang warnanya disebabkan oleh sejumlah besar ikatan rangkap terkonjugasi. Karotenoid terdiri dari dua kelompok hidrokarbon dan dua kelompok xantofil yang merupakan derivat oksigenasi dari karoten yang tersusun dari alkohol, aldehid, keton, epoksida, dan asam. (Harborne, 1987; 23-24)

Karotenoid yang terkenal adalah hidrokarbon tak jenuh turunan likopen yang berupa rantai panjang yang terdiri dari delapan satuan isoprene, merangkai dari kepala sampai ekor sehingga terbentuk ikatan terkonjugasi lengkap. Rangkaian ini merupakan cincin likopen pada salah satu ujung menghasilkan γ -karoten. Sedangkan bila cincin terjadi pada kedua ujungnya terbentuklah hidrokarbon trisiklik, yaitu β -karoten. Isomer (misalnya α dan γ -karoten) hanya berbeda pada letak ikatan rangkapnya dalam satuan ujung siklik

Alfa karoten merupakan Kristal prisma berwarna ungu, titik lebur $187,50^{\circ}$, lebih mudah larut dibandingkan β -karoten. Mudah larut dalam karbon disulfida dan kloroform, larut dalam benzene, sedikit larut dalam alkohol, praktis tidak larut dalam air, asam dan alkali. α -karoten mempunyai panjang gelombang maksimum 444,0 nm dalam petroleum eter (Allianger, 1976: 725)

Beta karoten adalah salah satu dari kelompok senyawa yang disebut karotenoid. Dalam tubuh, senyawa ini akan dikonversi menjadi vitamin A. Serat, vitamin A, dan beta-karoten banyak ditemukan pada sayuran berwarna kuning, orange, dan hijau seperti tomat, wortel, bayam, dan brokoli. Golongan senyawa karotenoid antara lain alfa-karoten, *zeaxanthin*, lutein, dan likopen (Hernani, 2006: 19)

Diantara 500 jenis karotenoid telah diidentifikasi dengan baik, hanya 60 jenis yang memiliki aktivitas sebagai provitamin A (Combs, 1992). Karotenoid merupakan prekursor vitamin A, yang terdapat dalam tanaman disebut provitamin A. Beta karoten adalah pigmen yang paling banyak terdapat dalam tanaman dan mempunyai aktivitas vitamin A yang terbesar dan paling banyak terdapat dalam makanan manusia (Harper, 1997).

Betakaroten merupakan provitamin A paling potensial yang ekuivalen dengan dua molekul vitamin A (Meyer, 1987 dan Andarwulan & Koswara, 1992). Walaupun betakaroten dapat dipecah menjadi dua molekul vitamin A, namun tidaklah memberikan vitamin A yang lebih banyak karena tidak semuanya dapat diserap oleh tubuh (Suhardjo & Kusharto, 1987).

Senyawa dengan aktivitas vitamin A yang terdapat dalam tanaman, termasuk dalam kelompok karotenoid akan diubah menjadi vitamin A pada proses metabolisme tubuh setelah dikonsumsi karena tubuh manusia mempunyai kemampuan mengubah sejumlah besar karoten menjadi vitamin A (Andarwulan & Koswara, 1992 dan Winarno, 1997: 110).

Karotenoid merupakan pigmen alamiah yang terdapat di alam. Dalam bahan pangan, karotenoid merupakan sumber vitamin A. Dalam tanaman, karotenoid

terdapat didalam jaringan fotosintetik, seperti batang, bunga, buah, dan biji. Karotenoid terdapat dalam kloroplas bersama dengan klorofil, sehingga meskipun senyawa ini memiliki warna merah-kuning, sering-sering pigmen ini tidak tampak karena ditutupi oleh klorofil yang berwarna hijau (meyer, 1987)

Karoten mempunyai sifat dapat larut dalam lemak, suhu pemasakan biasa tidak berpengaruh terhadap warna dan nilai karoten. Selain itu, karoten juga tidak tahan terhadap pengaruh sinar matahari, dapat mudah teroksidasi apabila dalam keadaan kering karena dijemur (Nasoetion et al. 1983). Karoten mempunyai sifat larut dalam lemak, dan tidak larut dalam air, karena itu tidak hilang karena terekstrak atau terbawa dalam air. Suhu pengolahan tidak berpengaruh terhadap warna dan nilai karotenoid.

E. Standarisasi Ekstrak

Mengingat obat herbal dan berbagai tanaman memiliki peran penting dalam bidang kesehatan bahkan bisa menjadi produk andalan Indonesia maka perlu dilakukan upaya penetapan standar mutu dan keamanan ekstrak tanaman obat. Rangkaian proses melibatkan berbagai metode analisis kimiawi berdasarkan data farmakologis, melibatkan analisis fisik dan mikrobiologi berdasarkan kriteria umum keamanan (toksikologi) terhadap suatu ekstrak alam (tumbuhan obat) disebut standarisasi bahan obat alam (SBOA) atau standarisasi herbal. Standarisasi secara normatif ditujukan untuk memberikan efikasi yang terukur secara farmakologis dan menjamin keamanan konsumen.

Standarisasi obat herbal meliputi dua aspek:

1. Aspek Parameter spesifik: yakni berfokus pada senyawa atau golongan senyawa yang bertanggung jawab terhadap aktivitas farmakologis. Analisis kimia yang dilibatkan ditunjukkan untuk analisa kualitatif dan kuantitatif terhadap senyawa aktif.
2. Aspek parameter non spesifik: yakni berfokus pada aspek kimia, mikrobiologi, dan fisis yang akan mempengaruhi keamanan konsumen dan stabilitas misal kadar logam berat, aflatoksin, kadar air, dan lain-lain.

1. Standarisasi Aspek Spesifik

a. Aspek Profil KLT

Tujuan : menunjukkan bahwa setidaknya senyawa aktif (marker) betul ada dalam ekstrak atau secara kimiawi ekstrak adalah otentik yakni berasal dari tanaman yang benar.

Parameter : Setidaknya senyawa marker muncul sebagai bercak terpisah.

Problem : - Marker tidak muncul sebagai bercak tunggal meskipun senyawa pembanding yang otentik tersedia.
- Tidak tersedianya marker yang otentik.

b. Aspek Penetapan Kadar Marker

Tujuan : Untuk menunjukkan secara kuantitatif kadar dari senyawa marker yang ada di dalam ekstrak sehingga bisa ditentukan berapa jumlah senyawa yang bertanggung jawab terhadap aktivitas farmakologi di dalam ekstrak.

Parameter : Terbacanya senyawa target pada kadar tertentu.

Problem : - Senyawa target tidak berwarna.

- Senyawa marker tersedia dalam jumlah terbatas.
- Bentuk peak pada pembacaan densitometer atau HPLC tidak simetris
- Linearitas dan reproduisibilitas rendah.

c. Aspek Penetapan Kadar Total Golongan Metabolit

Tujuan : Untuk menetapkan kadar total golongan metabolit sekunder tertentu seperti fenolat, flavonoid, alkaloid, antrakinon, kumarin, saponin yang diperkirakan berkontribusi terhadap aktivitas farmakologi.

Parameter : Kadar golongan metabolit sekunder di atas pada range tertentu.

- Problem** :
- Golongan senyawa tidak ada/ terdeteksi.
 - Beberapa metode standar tidak aplikatif.
 - Tidak semua instrumen bisa diterapkan untuk analisis kadar total.
 - Kadar yang diperoleh tidak spesifik (>50 %).

2. Standarisasi Aspek Non Spesifik

a. Aspek Penetapan Sisa Air

Tujuan : Menetapkan residu air setelah proses pengentalan atau pengeringan.

Parameter : Range kadar air tergantung jenis ekstrak yang diinginkan, ekstrak kering kadar air < 10 %, ekstrak kental 5-30 %, ekstrak cair > 30 %. Atau menyesuaikan dengan formulasi tetapi jika tidak dinyatakan lain maka ekstrak adalah ekstrak kental.

Problem : Untuk menetapkan parameter nonspesifik titik krusial terpenting adalah homogenitas sampel. Seringkali keterulangan (simpangan deviasi) beberapa pengukuran rendah karena cara sampling yang tidak representatif.

b. Aspek Penetapan Sisa Pelarut Organik (Etanol)

Tujuan : Menetapkan sisa pelarut etanol setelah pengeringan.

Parameter : Biasanya dengan metode destilasi kadar etanol sudah tidak terdeteksi. Ketentuan-ketentuan pada dokumen resmi, metode yang digunakan adalah metode destilasi.

c. Aspek Penetapan Kadar Abu

Tujuan : Untuk menetapkan karakteristik sisa kadar abu non organik setelah pengabuan. Merupakan pencirian terhadap spesies tanaman obat tertentu karena setiap tanaman memiliki sisa abu secara spesifik.

Parameter : Kadar abu pada range tertentu dengan pengukuran triplikat.

Problem : Deviasi kadar. Homogenisasi ekstrak dilakukan terlebih dahulu sebelum pengabuan.

d. Aspek Cemaran Mikroba

Tujuan : Menetapkan keberadaan dan jumlah bakteri atau jamur penyebab penyakit atau merusak ekstrak pada ekstrak sehingga bisa dicegah keberadaannya misal: *Salmonella thypi*, *E. Coli*, *Bacillus subtilis*, *Aspergillus flavus*, *S. Aureus*.

Parameter : Angka minimal atau tidak adanya bakteri dan jamur.

Problem : Bakteri dan jamur jumlahnya terlalu tinggi dan tidak memenuhi syarat aspek mikrobiologis.

e. Cemaran Logam Berat

Tujuan : Menentukan kadar logam berat As, Pb, Cd, atau Hg atau jenis logam lain dengan metode standar spektroskopi serapan atom (SSA).

Parameter : Residu Pb tidak melebihi 10 mg/kg ekstrak, residu Cd tidak melebihi 0,3 mg/kg dan As tidak melebihi $\mu\text{g/kg}$.

F. Tinjauan Islam Mengenai Penelitian Tanaman Obat

Al-Qur'an banyak menyebutkan tentang potensi tumbuh-tumbuhan untuk dimanfaatkan oleh manusia. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ayat 99 surah Al-An'am.

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا مَخْرُجًا مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ أَنْظِرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٩٩﴾

Terjemahnya:

“ Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan Maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan (perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman.”

Al-Qur'an banyak menyebutkan tentang tumbuh-tumbuhan untuk dimanfaatkan oleh manusia. Sebagaimana firman Allah dalam QS.Thaha ayat 53:

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّىٰ ﴿٥٣﴾

Terjemahnya:

“Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam.”

Menurut Shihab dalam tafsir Al-Mishbah bahwa aneka tumbuhan dengan bermacam-macam jenis bentuk dan rasanya itu merupakan hal-hal yang sungguh menakjubkan lagi membuktikan betapa agung penciptanya setiap macam tumbuhan diciptakan Allah untuk kemaslahatan umat manusia, diantaranya sebagai salah satu sumber pangan bagi manusia dan dapat dipetik hasilnya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manfaat tumbuhan ini salah satunya digunakan sebagai tanaman obat (Shihab, 2002: 318).

Dalam pandangan Islam dijelaskan bahwa segala ciptaan Allah SWT tidak ada sia-sia termasuk tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam yang memerlukan penelitian.

Jadi setiap penyakit yang diturunkan oleh Allah SWT ada obatnya, dan setiap pengobatan itu harus sesuai dengan penyakitnya. Kesembuhan seseorang dari penyakit yang diderita memang Allah SWT yang menyembuhkan, akan tetapi Allah SWT menghendaki agar pengobatan itu dipelajari oleh ahlinya agar sesuai dengan penyakit yang akan diobati sehingga akan mendorong kesembuhannya.

Islam sangat menghargai bentuk-bentuk pengobatan yang didasari oleh ilmu pengetahuan, penelitian, dan eksperimen ilmiah. Oleh karena itu setiap pengobatan hendaklah ditangani oleh ahlinya

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Luqman/31:10

خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَواسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿١٠﴾

Terjemahnya:

“Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya dan Dia meletakkan gunung-gunung (di permukaan) bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu; dan me memperkembang biakkan padanya segala

macam jenis binatang. dan Kami turunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.”

Allah SWT menciptakan tumbuhan dan menumbuhkannya di bumi tak lain adalah untuk kebaikan bagi manusia, karena banyak tumbuhan yang bermanfaat bagi manusia, yang salah satunya bermanfaat untuk pengobatan. Agar bisa dikembangkan menjadi suatu bahan obat, maka sebelumnya perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui secara pasti kegunaan dari tumbuhan tersebut.

Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadits Bukhari mengenai khasiat dari jintan hitam

“Dari Abu Hurairah RA bahwa dia mendengar Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya biji hitam itu mengandung obat untuk segala penyakit, kecuali sam, “Sam adalah kematian dan biji hitam adalah syuniz”.

Dari hadis di atas menjelaskan bahwa jintan hitam merupakan obat herbal yang dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Banyak penelitian yang telah membuktikan kemampuan khasiat dari jintan hitam. Pada masa Islam Rasulullah SAW, memberikan rekomendasi bahwa jintan hitam adalah obat bagi segala penyakit. Setelah 14 abad lamanya barulah penelitian-penelitian modern menemukan dan membuktikan adanya khasiat kesembuhan dalam biji jintan hitam (Resnita R. 2008)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif, dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah kadar yang terdapat dalam senyawa tersebut

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Farmakognosi-Fitokimia dan Kimia Analisis Farmasi, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni-Juli 2014.

B. Pendekatan Penelitian

Eksperimentatif, dimana penelitian ini berdasarkan permasalahan dan penjabaran pada latar belakang

C. Sampel

Sampel yang digunakan adalah Jintan Hitam (*Nigella sativa* L.) yang diperoleh dari Mesir

D. Instrumen Penelitian

1. Alat

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian adalah Batang Pengaduk, Erlenmeyer (Iwaki Pyrex[®]), Gelas kimia (Iwaki Pyrex[®]), Gelas ukur (Iwaki Pyrex[®]), Inkubator (Memmert[®]), Kertas saring, Kuvet, Labu alas bulat (Iwaki Pyrex[®]), Magnetic stirrer (Helth[®]), Neraca Analitik (AND[®]), Pipet volum (Iwaki Pyrex[®]),

Rotafapor (Heidolph[®]), Sendok tan*duk, Spatula, Tabung reaksi (Iwaki Pyrex[®]), Spektrofotometer UV-Vis (Thermo genesis[®]), Vial.

2. Bahan

Serbuk simplisia Jintan Hitam (*Nigella sativa* L.), Air suling, Asam galat, Beta karoten, Etanol 70%, Etanol p.a, Hexan, Metanol p.a, Pereaksi folin coicalteu, Aluminium (III) klorida, Besi (III) klorida, Natrium asetat, Natrium karbonat, Kuarsetin

E. Metode Pengumpulan Data

1. Penyiapan Sampel

Sampel biji jintan hitam (*Nigella sativa*) dikirim dari Negara Mesir. Pengambilan sampel dilakukan saat bagian bawah jintan hitam mulai kering dan kulit bijinya sudah kekuningan. Pemanenan dilakukan dengan cara memotong bagian bawah tanaman dan mengikatnya. Hasil panen dikeringkan dan dibolak-balik sehingga bijinya rontok. Diperlukan kain katun untuk menampung biji jintan hitam. Biji yang telah keluar dari cangkang (kulit) tersebut diayak agar terpisah dari bahan lain. Biji jintan hitam (*Nigella sativa*) yang telah dikumpulkan kemudian dibersihkan dari kotoran dan dicuci dengan air mengalir beberapa kali sampai semua kotoran yang melekat hilang, kemudian diangin-anginkan ditempat yang tidak terkena langsung sinar matahari. Setelah kering, sampel diserbuk menggunakan ayakan. Sampel siap untuk diekstraksi.

2. Ekstraksi Sampel

Sampel ditimbang sebanyak 800 g, kemudian dimasukkan kedalam wadah maserasi dan direndam 3 hari dengan pelarut heksan sambil sesekali diaduk. Wadah maserasi ditutup rapat, disimpan ditempat yang tidak terkena sinar matahari langsung.

Setelah disaring, ditambahkan cairan penyari heksan yang baru dan dilakukan maserasi kembali. Maserasi dilakukan sampai pelarut tidak berwarna pekat lagi. Ekstrak heksan yang diperoleh kemudian ditampung, dan diuapkan di deksikator, kemudian diganti dengan pelarut etanol, dilakukan perlakuan yang sama seperti heksan.

3. Analisis Kuantitatif

a. Penetapan Flavonoid total dalam ekstrak

1. Pembuatan larutan perbandingan kuarsetin

Sebanyak 10 mg kuarsetin (perbandingan) ditimbang dan dilarutkan dalam 100 mL metanol p.a (larutan stock 1000 ppm). Kemudian dibuat pengenceran kuarsetin dengan konsentrasi 20, 30, 50, 70, 80 ppm, masing-masing 10 ml. Sebanyak 0,5 mL larutan perbandingan diencerkan dengan 1,5 mL metanol, kemudian ditambahkan 0,1 mL aluminium (III) klorida 10%, 0,1 mL natrium asetat 1 M dan 2,8 mL aquadest. Setelah diinkubasi selama 30 menit, absorbansi dari larutan perbandingan diukur dengan spektroskopi UV-sinar tampak pada panjang gelombang 436 nm. Masing-masing larutan perbandingan diukur tiga kali, setelah diperoleh absorbansi dibuat kurva kalibrasi dan diperoleh persamaan regresi linear.

2. Pengukuran Panjang Gelombang maksimum

Diambil salah satu konsentrasi dari larutan perbandingan, kemudian diukur serapannya menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Panjang gelombang yang menunjukkan serapan tertinggi yang digunakan sebagai panjang gelombang maksimum 436 nm.

3. Pembuatan Kurva Pembandingan

Kurva pembandingan dibuat dengan menghubungkan konsentrasi larutan pembandingan dengan hasil serapannya yang diperoleh dari pengukuran dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 436 nm.

4. Pengukuran Kadar Sampel

Sebanyak 1 g sampel ekstrak etanol dilarutkan dalam metanol p.a dan sampel ekstrak heksan dilarutkan dalam etanol p.a, kemudian masing-masing dicukupkan volumenya hingga 100 mL pada labu takar (Larutan 10.000 ppm), masing-masing ekstrak diambil 0,5 mL sampel, ditambahkan 0,1 mL Aluminium (III) klorida 10%, 0,1 mL natrium asetat 1 M, dan 2,8 mL aquadest. Setelah diinkubasi 30 menit, absorbansi dari larutan pembandingan diukur dengan spektrofotometer UV sinar tampak pada panjang gelombang 436 nm. Masing-masing larutan pembandingan diukur tiga kali.

b. Penetapan fenolik total dalam ekstrak

1. Pembuatan larutan pembandingan asam galat

Dibuat larutan asam galat sebanyak 5 mg. Dilarutkan dengan metanol p.a hingga 100 ml dalam labu ukur (larutan stok 500 ppm). Kemudian dari larutan stok dibuat pengenceran dengan konsentrasi 80, 100, 140, 160, 200 ppm. Sebanyak 0,5 mL larutan asam galat pembandingan ditambah dengan 5 mL pereaksi Folin ciocalteu dan 4 mL natrium karbonat 1M. Diinkubasi selama 15 menit, kemudian absorbansi diukur pada panjang gelombang 798 nm pada spektrofotometer UV-sinar tampak. Masing-masing larutan diukur tiga kali. Setelah diperoleh absorbansi dari masing-masing larutan pembandingan, dibuat kurva kalibrasi dan diperoleh persamaan regresi linear

2. Pengukuran panjang gelombang maksimum

Diambil salah satu konsentrasi dari larutan pembanding, kemudian diukur serapannya menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Panjang gelombang yang menunjukkan serapan tertinggi yang digunakan sebagai panjang gelombang maksimum 798 nm.

3. Pembuatan kurva pembanding

Kurva pembanding dibuat dengan menghubungkan konsentrasi larutan pembanding dengan hasil serapannya yang diperoleh dari pengukuran dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 798 nm.

4. Pengukuran kadar sampel

Pengujian kandungan fenolik total dilakukan dengan melarutkan 1 g ekstrak etanol dengan metanol p.a, dan ekstrak heksan dengan etanol p.a dalam labu takar 100 ml (10.000 ppm) dan dihomogenkan di magnetic stirrer. Kemudian masing-masing ekstrak diambil 0,5 ml dari larutan tersebut dan ditambahkan dengan pereaksi folin ciocalteu 5 ml. Setelah itu ditambahkan 4 ml natrium karbonat dan didiamkan 15 menit. Lalu nilai absorbansinya diukur pada panjang gelombang 798 nm menggunakan spektrofotometer UV-Vis.

c. Penetapan Karotenoid Total dalam Ekstrak

1. Pembuatan larutan pembanding β -karoten

Ditimbang 10 mg β -karoten dan dilarutkan dalam 100 ml etanol p.a (larutan stok 1000 ppm). Kemudian dibuat pengenceran dengan konsentrasi 3, 5, 6, 9, dan 12 ppm masing-masing dalam 10 ml.

2. Pengukuran Panjang Gelombang Maksimum

Diambil salah satu konsentrasi dari larutan pembanding kemudian diukur serapannya menggunakan spektrofotometer UV-Vis, panjang gelombang yang menunjukkan serapan tertinggi yang digunakan sebagai panjang gelombang maksimum 452 nm.

3. Pembuatan kurva pembanding

Kurva pembanding dibuat dengan menghubungkan konsentrasi larutan pembanding dengan hasil serapannya yang diperoleh dari pengukuran dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 452 nm.

4. Pengukuran Kadar sampel

Sebanyak 1 g sampel ekstrak etanol dilarutkan dengan metanol p.a dan 1 g sampel ekstrak heksan dilarutkan dengan etanol p.a, kemudian masing-masing dicukupkan volumenya hingga 100 ml (larutan stok 10.000 ppm). Diambil sebanyak 2 ml untuk diukur serapannya pada panjang gelombang 452 nm. Pengukuran dilakukan triplo. Kadar total karotenoid dihitung kedalam persamaan regresi linear.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang dikumpulkan adalah data primer yang didapatkan dari absorbansi masing-masing larutan pembanding asam galat, kuarsetin, dan beta karoten. Dibuat kurva kalibrasi dan diperoleh persamaan regresi linear dari masing-masing kurva kalibrasi yang telah diukur sebelumnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Pengamatan

Penelitian dilakukan dengan menggunakan 500 g biji Jintan Hitam yang dimaserasi dengan metode maserasi bertingkat dimana pada maserasi pertama menggunakan pelarut hexan dan maserasi kedua dengan pelarut etanol 70% hingga diperoleh ekstrak kering sebanyak 90 gram.

Tabel 1. Hasil ekstraksi Biji Jintan Hitam (*Nigella sativa* L.)

Sampel	Berat Sampel	Volume Pelarut	Berat Wadah		Berat Ekstrak
			Wadah kosong	Wadah + ekstrak	
Biji Jintan hitam	500 g	3,8 L	240 g	330 g	90 G

1. Hasil Pengukuran Absorbansi Maksimum Larutan Baku

a. Asam galat (fenolik)

Konsentrasi	Absorbansi
80	0,285
100	0,362
140	0,493
160	0,583
200	0,737

b. Kuarsetin (Flavonoid)

Konsentrasi	Absorbansi
20	0,223
30	0,306
50	0,482
60	0,606
70	0,681
80	0,783

c. Beta karoten (Karotenoid)

Konsentrasi (ppm)	Absorbansi
3	0,212
5	0,315
6	0,364
9	0,609
12	0,793

2. Pengukuran absorbansi kadar total sampel biji Jintan Hitam

Sampel	Absorbansi ekstrak heksan	Kadar $\mu\text{g/ml}$	Absorbansi ekstrak etanol	Kadar $\mu\text{g/ml}$
Flavonoid (436 nm)	0,850	0,852 $\mu\text{g/ml}$	0,784	0,707 $\mu\text{g/ml}$
	0,854		0,680	
	0,852		0,659	
Fenolik (798 nm)	0,876	0,864 $\mu\text{g/ml}$	0,288	0,278 $\mu\text{g/ml}$
	0,864		0,272	
	0,852		0,275	
Karotenoid (452 nm)	0,470	0,472 $\mu\text{g/ml}$	0,410	0,417 $\mu\text{g/ml}$
	0,468		0,426	
	0,480		0,415	

B. Pembahasan

Dalam berbagai penelitian, biji jintan hitam menunjukkan khasiat sebagai anti kanker, anti radikal bebas, immunomodulator, analgesik, anti mikroba, anti inflamasi, spasmolitik, hepatoprotektif, dan anti hipertensi. (Khasanah, 2009)

Pada penelitian ini dilakukan ekstraksi sampel Biji Jintan Hitam dengan metode maserasi bertingkat, dimana pelarut pertama menggunakan pelarut etanol 70%. Pemilihan pelarut etanol sebagai pelarut didasarkan pada asumsi bahwa etanol dapat menggabungkan gugus polar dan nonpolar sehingga komponen pada sampel Jintan Hitam yang bersifat polar dan nonpolar dapat terekstrak. Pelarut yang bersifat polar dapat mengikat komponen senyawa fenolik termasuk flavonoid dan karotenoid. Sementara penggunaan etanol 70% didasarkan hasil penelitian, yaitu pengujian antioksidan tanaman obat dalam 70% menunjukkan

aktivitas yang tinggi dibandingkan dengan dalam konsentrasi atau beberapa pelarut lainnya, sedangkan pelarut kedua menggunakan heksan, dimana pelarut heksan ini diketahui bersifat non polar, sehingga mampu menarik senyawa non polar lebih banyak.

Metode maserasi merupakan metode dingin (proses ekstraksi tanpa pemanasan), bertujuan agar senyawa yang terkandung dalam sampel tidak rusak. dimana metode ini cocok untuk bahan yang tidak perlu pemanasan dalam proses ekstraksinya yang diperkirakan dapat merusak senyawa kimia yang terdapat dalam sampel. Metode ini memiliki keuntungan yaitu cara pengerjaannya mudah, alat yang digunakan sederhana, cocok untuk bahan yang tidak tahan pemanasan (Depkes RI, 1986). Metode ini dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari. Cairan penyari akan menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat aktif, zat aktif akan larut dan karena adanya perubahan konsentrasi antara larutan zat aktif yang didalam dan yang ada diluar sel, maka larutan yang terpekat didesak keluar. Peristiwa tersebut berulang sehingga terjadi keseimbangan konsentrasi larutan antara diluar sel dan di dalam sel.

Pada penelitian ini, dilakukan tiga pengujian kadar, yaitu pengujian kadar total flavonoid, fenolik, serta karotenoid

Pada uji kadar total fenolik umumnya dilakukan sebagai dasar pengujian aktivitas antioksidan. Karena diketahui bahwa senyawa fenolik mampu mencegah terjadinya proses oksidasi, sehingga bila kandungan senyawa fenoliknya tinggi, maka aktivitas antioksidannya juga akan tinggi. Senyawa fenolik bertindak sebagai agen pereduksi, pemberi hidrogen, peredam hidrogen singlet dan sebagai penghelat yang potensial (Kahkonen, 1999;62).

Pada penetapan kadar Fenolik Jintan hitam ini diukur dengan menggunakan prinsip folin ciocalteu yang didasarkan pada reaksi oksidasi-reduksi. Reagen folin yang terdiri dari asam fosfomolibdat dan asam fosfotunstat akan tereduksi oleh senyawa polifenol menjadi molybdenum-tungsen. Reaksi ini membentuk kompleks warna biru. Fenolik hanya terdapat pada larutan basa tetapi pereaksi folin ciocalteu dan produknya tidak stabil pada larutan basa.

Pengukuran kadar fenolik total pada Jintan hitam (*Nigella sativa* L.) sebanyak 0,5 ml larutan pembanding asam galat ditambah dengan 5 ml pereaksi folin ciocalteu dan 4 ml natrium karbonat 1 M. Diinkubasi selama 15 menit absorbansi dari larutan pembanding diukur dengan spektrofotometer UV-sinar tampak pada panjang gelombang 798 nm. Masing-masing larutan pembanding diukur tiga kali. Setelah diperoleh absorbansi dari masing-masing larutan pembanding, dibuat kurva kalibrasi dan diperoleh persamaan regresi linear.

Penambahan natrium karbonat pada uji fenolik bertujuan untuk membentuk suasana basa agar terjadi reaksi reduksi folin ciocalteu oleh gugus hidroksil dari fenolik dalam sampel. Pada penentuan kadar total fenolik digunakan asam galat sebagai larutan standar karena asam galat merupakan turunan dari hidroksi benzoat yang tergolong sebagai asam fenol sederhana. Pemilihan asam galat sebagai larutan standar didasarkan atas ketersediaan substansi yang stabil dan murni, selain itu asam galat lebih murah dibandingkan dengan senyawa standar lainnya.

Dari kurva kalibrasi diperoleh persamaan garis linear $Y = 0,003x - 0,017$. Dan koefisien korelasi (R^2) = 0,998 hasil tersebut menunjukkan terdapat hubungan linear antara konsentrasi dan absorbansi. Nilai (r) yang mendekati satu menunjukkan bahwa persamaan regresi tersebut adalah linear. Setelah dilakukan penentuan kurva kalibrasi asam galat, absorbansi sampel yang diperoleh

kemudian dimasukkan kedalam persamaan garis lurus sehingga diperoleh kadar fenolik total ekstrak etanol 7,97%, dan untuk ekstrak heksan 23,81%. Hal ini menunjukkan bahwa kadar total fenolik pada sampel jintan hitam tinggi sehingga diduga aktivitas antioksidanya juga tinggi.

Pada penetapan kadar flavonoid, digunakan pembanding Kuarsetin, dimana quarcetin berperan melindungi sel dari serangan oksidasi (Hasanah, 2008). Penetapan kadar flavonoid adalah adanya reaksi antara flavonoid dengan $AlCl_3$ kompleks yang berwarna kuning. Penambahan $AlCl_3$ akan menyebabkan terjadinya pergeseran batokromik spektrum ultraviolet pada senyawa flavonoid. Pemilihan kuarsetin sebagai larutan standar dikarenakan kuarsetin merupakan senyawa yang paling luas penyebarannya terdapat pada tumbuhan.

Pengukuran kadar flavonoid total pada ekstrak Jintan Hitam (*Nigella sativa* L.) sebanyak 0,5 ml larutan pembanding kuarsetin diencerkan dengan 1,5 ml metanol kemudian ditambahkan 0,1 ml Aluminium (III) klorida 10%, 0,1 ml natrium natrium asetat 1 M dan 2,8 ml aquadest. Setelah diinkubasi 30 menit, absorbansi dari larutan pembanding diukur dengan spektrofotometer UV-sinar tampak pada panjang gelombang 436 nm. Masing-masing larutan pembanding, dibuat kurva kalibrasi dan diperoleh persamaan regresi linear.

Dari kurva kalibrasi diperoleh persamaan garis linear $Y = 0,0094x - 0,0278$ dan koefisien korelasi (R^2) = 0,9977 hasil tersebut menunjukkan terdapat hubungan linear antara konsentrasi dan absorbansi. Setelah dilakukan penentuan kurva kalibrasi kuarsetin. Absorbansi sampel yang diperoleh kemudian dimasukkan kedalam persamaan garis lurus sehingga diperoleh kadar flavonoid total ekstrak etanol 7,82%, dan ekstrak heksan 9,36%. Hal ini menunjukkan bahwa kadar total fenolik pada sampel jintan hitam tinggi sehingga diduga aktivitas antioksidanya juga tinggi.

Penetapan kadar karotenoid menggunakan pembandingan β -karoten, dimana beta karoten ini mampu meredam radikal bebas akibat adanya keberadaan ikatan rangkap terkonjugasi. Beta karoten adalah pigmen berwarna merah-oranye yang sangat berlimpah pada tanaman dan buah-buahan. Senyawa karotenoid yang dikonsumsi baik dari makan maupun dari suplemen dapat bersifat sebagai antioksidan melalui peredaman radikal bebas (Charles,2013; 3).

Dari kurva kalibrasi diperoleh persamaan garis linear $Y = 0,0668 x - 0,0091$ dan koefisien korelasi (R^2) = 0,993 hasil tersebut menunjukkan terdapat hubungan linear antara konsentrasi dan absorbansi. Setelah dilakukan penentuan kurva kalibrasi kuarsetin. Absorbansi sampel yang diperoleh kemudian dimasukkan kedalam persamaan garis lurus sehingga diperoleh kadar flavonoid total ekstrak etanol 0,6%, dan ekstrak heksan 0,7%. Hal ini menunjukkan bahwa kadar total fenolik pada sampel jintan hitam sangat rendah sehingga diduga aktivitas antioksidanya nyaris tidak ada.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Ekstrak etanol Jintan Hitam (*Nigella sativa* L.) memiliki kadar total fenolik 7,97%, ekstrak heksan 23,81%, kadar total flavonoid ekstrak etanol 7,82 dan 9,36% dan kadar total karotenoid ekstrak etanol 0,6% dan ekstrak heksan 0,7.
2. Allah telah menyerukan kepada umatnya dalam Al-Qur'an bahwa tidak ada penciptaan yang sia-sia, semua ada fungsinya jika manusia sadar, mempelajari, dan berusaha mencari tahu.

B. Saran

Penelitian lebih lanjut tentang penentuan struktur dari ketiga senyawa ini dan pemanfaatannya sebagai sediaan modern berdasarkan jumlah kadar yang telah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

Admin, al manar. *Khasiat Habbatussauda (jinten hitam)*.

<http://indoroyal.com/2008/03/01/khasiat-habbatussauda/> (diakses 29 Juli)

Allianger, N Cava, M. 1976. *Organic Chemistry second edition*, Worth Publishier, Inc. New York.

Andarwulan, N & S.Koswara. 1992. *Kimia Vitamin*. Rajawali press, Jakarta

Anonim, 2009. *Spektroskopis IR dan UV-VIS*

<http://alio-burazz.blogspot.com/2009/12/spektroskopis-ir-dan-uv-vis.html4>

Anonim, *Farmakope Indonesia Edisi III*, Jakarta, Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 1979

Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 1979. *Materia Medika Indonesia Jilid III*. Jakarta: Depkes RI.

Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 1989. *Materia Medika Indonesia, Jilid V*. Jakarta: Depkes RI.

Direktorat Jendral Pengawasan Obat dan Makanan. 1979. *Farmakope Indonesia Edisi III*. Jakarta: Depkes RI


Direktorat Jendral Pengawasan Obat dan Makanan, *Sediaan Galenika Edisi II*. 1979. Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Bhakti Husada : Jakarta.

Fessenden & Fessenden, 1986, *Kimia Organik Jilid 1*, Erlangga, Jakarta.

Harbone. 1987. *Metode fitokimia, Penentuan Modern Menganalisa Tumbuhan*, Terbitan ke-2, terjemahan Kosasih Padmawinata dan Iwang Soediro. Bandung : ITB


- Harper, H. A., V. W. Rodwell & P. A. Mayes. 1997. *Biokimia : Review of Physiological Chemistry*. M. Muliawan (ed). LANGE Medical Publications, Los altos, California
- Hernani, Mono Rahardjo. 2006. *Tanaman Sumber Antioksidan Edisi I*. Penebar Swadaya. Jakarta
- Hutapea, J.R. *Inventaris tanaman obat Indonesia. jilid III*. Departemen Kesehatan Republik Indonesia : Jakarta. 1994.
- Khare, C.P. *Indian Medicinal Plants*. New York : Springer. 2007.
- Khasanah, Nur. 2009. “*Pengaruh Pemberian Ekstrak Jintan Hitam (Nigella sativa L.) terhadap respon Proliferasi Limfosit Limpa Mencit balb/c yang diinfeksi Salmonella typhimurium*”. Semarang
- Khopkar. S. M., 1990. *Konsep Dasar kimia Analitik*. Terjemahan A. Saptorahardjo, penerbit Universitas Indonesia.
- Kumalaningsih, S., 2007. *Antioksidan, sumber, dan manfaatnya (Online)*. <http://antioxidant-centre.com/index.php/antioksidan/3.-Antioksidan-Sumber-Manfaatnya.html>, 29 Desember 2007.
- Markham, K.R. 1981. *Cara mengidentifikasi Flavonoid*, terjemahan Kosasih Padmawinata, penerbit ITB, Bandung.
- Meyer, BN, Ferrigni, NR, Putnam, JE, Jacobson, LB, Nicholas, DE, McLaughlin, JL. *Brine Shrimp: A Convenient General Bioassay For Active Plant Constituents*, Plant, Med. 1987
- Mulja., M dan Syahrani, A.1990. *Aplikasi Analisis Spektrofotometer UV-Vis*. Chriso Grafika, Surabaya.

- Resnita R., Stella.2008. *Efek infus Jintan Hitam (Nigella sativa Linn.) Terhadap Aktivitas Immunoglobulin M (IgM) Kelinci (Oryctolagus cuniculus)Jantan*. Skripsi, Jurusan farmasi. Fakultas Farmasi. UNHAS : Makassar
- Safitri, Ratu. 2004. *Lalab, Sayuran dan Buah-buahan adalah Sumber Antioksidan*. <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0604/17/Cakrawala/penelitian.htm>M. 2002
- Shihab, Quraish M. 2002. *Tafsir Al-Misbah. Pesan, Kesan, dan keserasian Al-Qur'an volume 12*. Lentera Hati. Jakarta
- Suhardjo & C. M. Kusharto. 1987. *Prinsip-prinsip Ilmu Gizi*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Sulaiman, S. *Hidup Sehat dengan Habbatussauda*. 2008. Al-Qowam Publishing. Solo
- Sastrohamidjojo H. *Spektroskopi*. Liberty. Yogyakarta. 1997. Hal. 11
- Solomons TWG. *Organic Chemistry, 2nd edition*. University of South Florida John Wiley and Sons. New York. 1980. Hal 413
- Tjiptrosoepomo, G. 1996. *Taksonomi tumbuhan (Spermathopyta)*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
- Underwood & Day, JR, 2002. *Analisis Kimia Kuantitatif edisi keenam*. Penerbit Erlangga: Jakarta.
- Winarno, F.G., 2002, *Kimia Pangan dan Gizi*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Lampiran 1. Skema kerja ekstraksi sampel Jintan Hitam (*Nigella sativa* L.)


Gambar 4. Skema kerja

Lampiran2. Skema kerja pengukuran absorbansi panjang maksimum fenolik




Gambar 5. Skema kerja pengukuran nilai absorbansi maksimum

Lampiran3. Skema kerja pengukuran absorbansi panjang maksimum flavonoid




Gambar 6. Skema kerja pengukuran nilai absorbansi maksimum kuarsetin

Lampiran4. Skema kerja pengukuran absorbansi panjang maksimum karotenoid




Gambar 7. Skema kerja pengukuran nilai absorbansi maksimum β-karoten

Lampiran5. Skema kerja pengukuran absorbansi kadar fenol ekstrak Jintan Hitam




Gambar 8. Skema kerja pengukuran nilai absorbansi ekstrak Jintan Hitam

Lampiran 6. Skema kerja pengukuran absorbansi kadar flavonoid ekstrak Jintan Hitam



Gambar 9. Skema kerja pengukuran nilai absorbansi ekstrak Jintan Hitam

Lampiran 7. Skema kerja pengukuran absorbansi kadar karotenoid ekstrak Jintan Hitam



Gambar 10. Skema kerja pengukuran nilai absorbansi ekstrak Jintan Hitam

Lampiran 8. Foto tumbuhan Jintan Hitam




Lampiran 8. Pengukuran absorbansi panjang gelombang maksimum

Cell # 2

Wavelength	Abs
780.0	0.510
782.0	0.510
784.0	0.512
786.0	0.512
788.0	0.514
790.0	0.515
792.0	0.517
794.0	0.516
796.0	0.519
798.0	0.520

ID#: 2
Baseline collected 1Jul14

Collect Baseline	Graph	Edit Data	Measure Sample
------------------	-------	-----------	----------------



Gambar 12. Absorbansi panjang gelombang Maksimum larutan asam galat


Gambar 13. Kurva absorbansi panjang gelombang maksimum Larutan asam galat

Cell # 1

Wavelength	Abs
420.0	1.044
422.0	1.080
424.0	1.114
426.0	1.142
428.0	1.167
430.0	1.187
432.0	1.202
434.0	1.211
436.0	1.215
438.0	1.215

ID#: 1
Baseline collected 1Jul14


Collect Baseline	Graph	Edit Data	Measure Sample
------------------	-------	-----------	----------------



Gambar 13. Absorbansi panjang gelombang Maksimum larutan kuarsetin

Gambar 14 kurva absorbansi panjang gelombang maksimum larutan kursetin

Lampiran 10. Pengukuran absorbansi panjang gelombang maksimum



Gambar 15. Absorbansi panjang gelombang Gambar 16. Kurva absorbansi

Larutan pembanding beta karoten

panjang gelombang larutan Pembanding
beta karoten

Lampiran 11. Grafik persamaan regresi linier

1. Fenol


Konsentrasi [ppm]	Abs
80	0.285
100	0.362
140	0.493
160	0.583
200	0.737

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

LAUDDIN

MAKASSAR

Konsentrasi [ppm]	80	100	140	160	200
absorbansi	0.283	0.367	0.496	0.579	0.737
	0.288	0.36	0.492	0.583	0.73
	0.285	0.36	0.493	0.587	0.745
Σ	0.285333	0.362333	0.493667	0.583	0.737333




Konsentrasi [ppm]	20	30	50	60	70	80
-------------------	----	----	----	----	----	----

Konsentrasi [ppm]	Abs
20	0.223
30	0.306
50	0.482
60	0.606
70	0.681
80	0.783

Flavonoid


absorbansi	0.251	0.307	0.498	0.614	0.687	0.792
	0.206	0.302	0.464	0.607	0.695	0.771
	0.214	0.31	0.486	0.599	0.663	0.787
Σ	0.223667	0.306333	0.482667	0.606667	0.681667	0.783333



2. Karotenoid

Konsentrasi [ppm]	Abs
3	0.212
5	0.315
6	0.364
9	0.609
12	0.793

Konsentrasi [ppm]	3	5	6	9	12
Absorbansi	0.209	0.315	0.368	0.598	0.792
	0.21	0.315	0.352	0.614	0.793
	0.219	0.315	0.372	0.615	0.794
Σ	0.212667	0.315	0.364	0.609	0.793



Lampiran 12. Perhitungan penetapan kadar total

A. Ekstrak Heksan

1. Kadar total Fenol

Berat sampel = 1000 mg = 1 g

$Y_1 : 0,876, Y_2 : 0,864, Y_3 : 0,852$

Volume sampel = 100 ml

Faktor pengenceran = 1x

$$\text{Absorbansi rata-rata} = 0,876 + 0,864 + 0,852 / 3 = 0,864$$

Maka:

$$Y = 0,0037x - 0,0171$$

$$0,864 = 0,0037x - 0,0171$$

$$0,0037x = 0,864 + 0,0171$$

$$X = 0,8811 / 0,0037$$

$$X = 238,1 \times 10^{-3} \text{ mg/ml} \approx 2381 \text{ } \mu\text{g/ml}$$

$$\text{kadar total} = \frac{\text{konsentrasi} \left(\frac{\mu\text{g}}{\text{ml}} \right) \times \text{volume sampel} \times \text{fp}}{\text{berat sampel (g)}}$$

$$\text{kadar total} = \frac{2381 \frac{\mu\text{g}}{\text{ml}} \times 100 \text{ ml} \times 1/1}{1 \text{ g}}$$

$$= 238100 \text{ } \mu\text{g/g}$$

$$= 238,10 \text{ mg/g}$$

$$= 23,81 \%$$

2. Kadar total Flavonoid

Berat sampel = 1000 mg = 1 g

$Y_1 : 0,850, Y_2 : 0,854, Y_3 : 0,852$

Volume sampel = 100 ml

Faktor pengenceran = 1x

Absorbansi rata-rata = $0,850 + 0,854 + 0,852 / 3 = 0,852$

Maka:

$$Y = 0,0094x - 0,0278$$

$$0,852 = 0,0094x - 0,0278$$

$$0,0094x = 0,852 + 0,0278$$

$$X = 0,8798 / 0,0094$$

$$X = 93,6 \times 10^{-3} \text{ mg/ml} \approx 936 \text{ } \mu\text{g/ml}$$

$$\text{kadar total} = \frac{\text{konsentrasi} \left(\frac{\mu\text{g}}{\text{ml}} \right) \times \text{volume sampel} \times \text{fp}}{\text{berat sampel (g)}}$$

$$\text{kadar total} = \frac{936 \frac{\mu\text{g}}{\text{ml}} \times 100 \text{ ml} \times 1/1}{1 \text{ g}}$$

$$= 93600 \text{ } \mu\text{g/g}$$

$$= 93,60 \text{ mg/g}$$

$$= 9,36 \%$$

3. Kadar total karotenoid

Berat sampel = 1000 mg = 1g

$Y_1 : 0,470, Y_2 : 0,468, Y_3 : 0,480$

Volume sampel= 100 ml

Faktor pengenceran= 1x

Absorbansi rata-rata = $0,470+0,468+0,480/3 = 0,472$

Maka:

$Y = 0,0668 x - 0,0091$

$0,472 = 0,0668x - 0,0091$

$0,0668x = 0,472 + 0,0091$

$X = 0,4811/0,0668$

$X = 7,2 \times 10^{-3} \text{ mg/ml} \approx 72 \text{ } \mu\text{g/ml}$

$$\text{kadar total} = \frac{\text{konsentrasi } \left(\frac{\mu\text{g}}{\text{ml}}\right) \times \text{volume sampel} \times \text{fp}}{\text{berat sampel (g)}}$$

$$\text{kadar total} = \frac{72 \frac{\mu\text{g}}{\text{ml}} \times 100\text{ml} \times 1/1}{1 \text{ g}}$$

$$= 7200 \text{ } \mu\text{g/g}$$

$$= 7,20 \text{ mg/g}$$

$$= 0,7\%$$

B. Ekstrak etanol

1. Kadar total fenolik

Berat sampel = 1000 mg = 1g

$Y_1 : 0,288, Y_2 : 0,272, Y_3 : 0,275$

Volume sampel = 100 ml

Faktor pengenceran = 1x

Absorbansi rata-rata = $0,288 + 0,272 + 0,275 / 3 = 0,278$

Maka:

$Y = 0,0037x - 0,0171$

$0,278 = 0,0037x - 0,0171$

$0,0037x = 0,278 + 0,0171$

$X = 0,2951 / 0,0037$

$X = 79,7 \times 10^{-3} \text{ mg/ml} \approx 797 \mu\text{g/ml}$

$$\text{kadar total} = \frac{\text{konsentrasi} \left(\frac{\mu\text{g}}{\text{ml}} \right) \times \text{volume sampel} \times \text{fp}}{\text{berat sampel (g)}}$$

$$\text{kadar total} = \frac{797 \frac{\mu\text{g}}{\text{ml}} \times 100 \text{ ml} \times 1/1}{1 \text{ g}}$$

$$= 79700 \mu\text{g/g}$$

$$= 79,70 \text{ mg/g}$$

$$= 7,97 \%$$

2. kadar total flavonoid

Berat sampel = 1000 mg = 1 g

$Y_1 : 0,784, Y_2 : 0,680, Y_3 : 0,659$

Volume sampel = 100 ml

Faktor pengenceran = 1x

Absorbansi rata-rata = $0,784 + 0,680 + 0,659 / 3 = 0,707$

Maka:

$Y = 0,0094x - 0,0278$

$0,707 = 0,0094x - 0,0278$

$0,0094x = 0,707 + 0,0278$

$X = 0,735 / 0,0094$

$X = 78,2 \times 10^{-3} \text{ mg/ml} \approx 782 \text{ } \mu\text{g/ml}$

$$\text{kadar total} = \frac{\text{konsentrasi} \left(\frac{\mu\text{g}}{\text{ml}} \right) \times \text{volume sampel} \times \text{fp}}{\text{berat sampel (g)}}$$

$$\text{kadar total} = \frac{782 \frac{\mu\text{g}}{\text{ml}} \times 100 \text{ ml} \times 1/1}{1 \text{ g}}$$

$$= 78200 \text{ } \mu\text{g/g}$$

$$= 78,2 \text{ mg/g}$$

$$= 7,82 \%$$

3. Kadar total karotenoid

Berat sampel = 1000 mg = 1g

$Y_1 : 0,410, Y_2 : 0,426, Y_3 : 0,415$

Volume sampel= 100 ml

Faktor pengenceran= 1x

Absorbansi rata-rata = $0,410+0,426+0,415/3 = 0,417$

Maka:

$$Y = 0,0668x - 0,0091$$

$$0,417 = 0,0668x - 0,0091$$

$$0,0668x = 0,417 + 0,0091$$

$$X = 0,4261/0,0668$$

$$X = 6,37 \times 10^{-3} \text{ mg/ml} \approx 63,7 \text{ } \mu\text{g/ml}$$

$$\text{kadar total} = \frac{\text{konsentrasi} \left(\frac{\mu\text{g}}{\text{ml}} \right) \times \text{volume sampel} \times \text{fp}}{\text{berat sampel (g)}}$$

$$\text{kadar total} = \frac{63,7 \frac{\mu\text{g}}{\text{ml}} \times 100\text{ml} \times 1/1}{1 \text{ g}}$$

$$= 6370 \text{ } \mu\text{g/g}$$

$$= 6,370 \text{ mg/g}$$

$$= 0,6\%$$

Lampiran 13. Pembuatan Larutan

a. Pembuatan larutan

1) Pembuatan larutan induk

Larutan induk dibuat dengan cara melarutkan 10 mg pembanding dalam 50 ml metanol hingga larut, dicukupkan volumenya dalam labu takar 100 ml hingga tanda batas sehingga diperoleh larutan induk 100 ppm sebanyak 100 ml.

2) Pembuatan larutan standar (5 ppm)

Larutan induk 100 ppm yang diencerkan menjadi 5 ppm sebanyak 10 ml.

$$M_1 \times V_1 = M_2 \times V_2$$

$$100 \times V_1 = 10 \times 5$$

$$V_1 = \frac{10 \times 5}{100}$$

$$V_1 = 5$$

Larutan induk 100 ppm diambil sebanyak 0,5 ml dan diencerkan pada labu takar 10 ml sampai tanda batas.

Untuk konsentrasi 10, 20, 40, dan 80 ppm dibuat dengan rumus perhitungan yang sama, V_2 diubah sesuai konsentrasi yang akan dibuat.

b. Pembuatan larutan natrium asetat 1 M

$$M = \frac{\text{mol zat terlarut}}{\text{volume larutan}}$$

$$\text{mol} = \frac{\text{massa zat terlarut}}{\text{Mr zat dalam g/mol}}$$

$$1 M = \frac{x}{1 \text{ liter}}$$

$$x = 1 \text{ mol}$$

$$1 \text{ mol} = \frac{\text{gram}}{82,03}$$

$$\text{gram} = 82,03 \text{ g}$$

Natrium asetat diambil sebanyak 82,03 g dan dilarutkan pada labu takar 1 liter menggunakan air suling sampai tanda batas.

c. Pembuatan larutan natrium karbonat 1 M

$$M = \frac{\text{mol zat terlarut}}{\text{volume larutan}}$$

$$\text{mol} = \frac{\text{massa zat terlarut}}{\text{Mr zat dalam g/mol}}$$

$$1 M = \frac{x}{1 \text{ liter}}$$

$$x = 1 \text{ mol}$$

$$1 \text{ mol} = \frac{\text{gram}}{106}$$

$$\text{gram} = 106 \text{ g}$$

Natrium karbonat diambil sebanyak 106 g dan dilarutkan pada labu takar 1 liter menggunakan air suling sampai tanda batas.

RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir di Majene, Sulawesi Barat. Tepatnya pada tanggal 8 April 1992, kemudian dirawat dan dibesarkan oleh seorang bidadari yang tuhan kirimkan untuknya, penulis sering memanggilnya “IBU”, dia bernama Zubaedah BS, SE dan seorang kesatria terhebat yang juga Tuhan kirimkan untuk menjaga dan membimbingnya, dan penulis dengan bangga memanggilnya “AYAH”, dia bernama Bakri K, S.Sos, MH. Ketika penulis berumur 4 tahun, penulis memulai jejak pendidikannya di Taman Kanak-kanak (TK) bernama TK Aisiyah.

Sedangkan penulis sendiri memulai Pendidikan Dasarnya di Sekolah Dasar Impres 20 somba, dan saat naik kelas 3, pindah ke Sekolah Dasar Negeri 2 Majene, kemudian melanjutkan pendidikan menengahnya di Pondok Pesantren Modern Al-Ikhlash, Lampoko, Campalagian, Polewali Mandar, setelah itu melanjutkan pendidikan masa Putih Abu-abu di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Majene. Setelah menyelesaikan pendidikan di bangku sekolah, penulis kemudian melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar Jurusan Farmasi.

M A K A S S A R