

Volume 3, Nomor 2

September 2015

ISSN 2338-0616



FARBAL

JURNAL FARMASI DAN BAHAN ALAM



Diterbitkan Oleh :
Program Studi Farmasi F.MIPA
Universitas Islam Makassar

| | | | | | |
|---------------|----------|---------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| FARBAL | Volume 3 | Nomor 2 | Halama 40 - 67 | Makassar September 2015 | ISSN 2338-0616 |
|---------------|----------|---------|-------------------|-------------------------------|-------------------|



9 772338 061008

FARBAL

JURNAL FARMASI DAN BAHAN ALAM

Volume 3, Nomor 2, September 2015
ISSN 2338-0616

Jurnal Farmasi dan Bahan Alam terbit dua kali setahun, yaitu pada bulan Maret dan September. Berisi artikel atau tulisan tentang hasil penelitian dalam bidang farmasi dan bahan alam.

SUSUNAN REDAKSI

Pelindung

Rektor Universitas Islam Makassar
Dekan Fakultas MIPA

Penanggung Jawab
Ketua Program Studi

Pemimpin Redaksi
Sitti Fauziah Noer

Redaktur Pelaksana
Nur Ida
Washliaty Sirajuddin
Tahirah Hasan
Yasnidar Yasir
Ayu Wandira A. Baso A.

Alamat Redaksi :

Kantor Program Studi Farmasi F.MIPA Lt. 1 Universitas Islam Makassar, Jl. Perintis
Kemerdekaan Km.9 No 29 Makassar 90245, Telp: (0411) 588167; Fax: 588167, HP
08158123295 E-mail: farbal_farmasi_uim@yahoo.co.id

Redaksi menerima artikel atau tulisan yang belum pernah dimuat di media lain.

DAFTAR ISI

1. Uji Aktivitas Ekstrak Beras Hitam (*Oryza sativa* L) Terhadap Penurunan Berat Badan Tikus (*Rattus novergicus*)
Maulita Indrisari, Nurkhairi, dan Resky Herdayanti 40 - 42
2. Profil Farmakokinetik Interaksi Obat Antidiabetik Oral (Ado) Dan Minuman Kopi Pada Kelinci (*Oryctolagus cuniculus*) Dm (Diabetes Mellitus)
Abd. Halim Umar, Fajriansyah43 - 46
3. Karakterisasi komposit Alginat–Kitosan Berkurkumin–Zno Nano Sebagai Absorbent Dressing Anti Bakteri
Astuti Amin, Nur Khairi 47 - 50
4. Uji Efek Hipoglikemik Ekstrak Etanol Inti Biji Gori (*Caesalpinia. crista* L.) Asal Kabupaten Wakatobi Pada Mencit Jantan (*Mus musculus*)
St. Fauziah Noer, Nurjayanti, Yasnidar Yasir, Hasyim Bariun 51 - 54
5. Penentuan Kadar Fenolik Total Dan Flavonoid Total Ekstrak Buah Mengkudu (*Morinda citrifolia* L.) dengan Metode Spektrofotometri Uv-Vis
Nur Ida, Marhawaida, Tahirah Hasan, M. Rusdi 55 - 58
6. Uji Toksisitas Fraksi N-Hexan, Etil Asetat Dan Etanol 70% dari Ekstrak Etanol Bunga Parang Romang (*Boehmeria virgata* (Forst) Guill) terhadap Larva Udang (*Artemia Salina* Leach)
Muhammad Rusdi, Yasnidar Yasir, Nabigha 59 - 62
7. Uji Daya Hambat Dan Analisis Klt Bioautografi Akar Parang Romang (*Boehmeria virgata* (Forst) Guill)
Evi Mustiqawati, Ridhoheni Justan, Nursam jafar, M. Rusdi 63 – 67

UJI TOKSISITAS FRAKSI n-HEXAN, ETIL ASETAT DAN ETANOL 70% DARI EKSTRAK ETANOL BUNGA PARANG ROMANG (*Boehmeria virgata* (Forst) Guill) TERHADAP LARVA UDANG (*Artemia salina* Leach)

Muhammad Rusdi*, Yasnidar Yasir**, Nabigha**

*Jurusan Farmasi FKIK UIN Alauddin Makassar

**Program Studi Farmasi FMIPA, Universitas Islam Makassar

email: rusdim01@yahoo.com

ABSTRAK

Telah dilakukan penelitian tentang uji toksisitas fraksi n-hexan, etil asetat dan etanol 70% dari ekstrak etanol bunga parang romang (*Boehmeria virgata* (forst) Guill) terhadap larva udang *Artemia salina* Leach. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui potensi fraksi n-hexan, etil asetat dan etanol 70% dari ekstrak etanol bunga *Boehmeria virgata* (Forst) Guill sebagai obat antikanker menurut metode Brine Shrimp Lethality Test (BST). Serbuk bunga *Boehmeria virgata* (Forst) Guill diekstraksi dengan metode maserasi menggunakan pelarut etanol 96 %. Ekstrak cair yang diperoleh kemudian pelarut n-heksan, etil asetat, dan ekstrak kental. Selanjutnya ekstrak kental dipartisi dengan menggunakan pelarut n-heksan, etil asetat, dan etanol 70%. Masing-masing ekstrak diuji aktivitasnya terhadap larva *Artemia salina* Leach. Hasil analisis data menunjukkan nilai LC₅₀ ekstrak n-heksan, etil asetat dan etanol 70% bunga *Boehmeria virgata* (Forst) Guill berturut-turut sebesar 10,1624; 0,9145 dan 1,345 µg/mL.

Kata Kunci: Uji Toksisitas, Fraksi bunga *Boehmeria virgata* (Forst) Guill, larva udang *Artemia salina* L, BST

PENDAHULUAN

Kanker atau karsinoma adalah pembentukan jaringan baru yang abnormal dan bersifat ganas (maligne). Suatu kelompok sel dengan mendadak menjadi liar dan memperbanyak diri secara pesat dan terus menerus. Akibatnya adalah pembengkakan atau benjolan yang disebut tumor atau neoplasma. Sel-sel kanker ini menginfiltrasi jaringan sekitarnya dan memusnahkannya (Tjay & Rahardja, 2006).

Kanker merupakan salah satu penyakit dengan angka kematian yang tinggi. Data Global action against cancer (2005) dari WHO (World Health Organization) menyatakan bahwa kematian akibat kanker dapat mencapai angka 45% dari tahun 2007 hingga 2030, yaitu sekitar 7,9 juta jiwa menjadi 11,5 juta jiwa kematian.

Pengobatan kanker dapat dilakukan dengan pembedahan, kemoterapi, maupun dengan radiasi. Pengobatan dengan kemoterapi dan radiasi seringkali kurang selektif dan tidak dapat menghilangkan sel kanker tersebut. Cara lain yang dipilih sebagian penderita penyakit ini adalah dengan memanfaatkan bahan alam yaitu dengan menggunakan tanaman obat. Hal ini disebabkan adanya keinginan masyarakat sendiri untuk kembali menggunakan bahan dari alam (back to nature). Salah satu tanaman yang akhir-akhir ini mendapat perhatian bagi peneliti adalah Parang Romang (*Boehmeria virgata* (Forst) Guill).

Marianti, dkk (2007), melakukan uji antiproliferasi terhadap ekstrak daun *Boehmeria virgata* dan didapatkan bahwa ekstrak n-heksan, etil asetat dan n-butanol daun *Boehmeria virgata*

memiliki aktivitas antiproliferasi terhadap sel kanker HeLa dengan nilai LC₅₀ berturut-turut 3,453; 12,096 dan 168,66 µg/

Penelitian M. Rusdi (2012), ditemukan 4 senyawa aktif yang diisolasi dari ekstrak n-heksan daun *Boehmeria virgata* (Forst) Guill, memiliki aktivitas antiproliferasi terhadap sel kanker HeLa yaitu senyawa D3a, D3b, D3c dan D3d dengan nilai LC₅₀ masing-masing sebesar 0,59; 0,132; 4,97; dan 5,04 µg/ml, dimana senyawa D3a dan D3b adalah senyawa golongan alkaloid. Selanjutnya M. Rusdi (2014), melakukan penelitian terhadap akar tanaman ini yang menunjukkan hasil bahwa ekstrak etanol 96% akar *Boehmeria virgata* (Forst) Guill, memiliki efek toksisitas terhadap larva udang (*Artemia salina* Leach) dengan nilai LC₅₀ sebesar 13,095 µg/ml.

Abdul Latif (2014), menerangkan bahwa ekstrak etanol batang parang romang *Boehmeria virgata* (Forst) Guill bersifat toksik terhadap larva udang (*Artemia salina* Leach) dengan nilai LC₅₀ sebesar 21,777 µg/ml.

Informasi penggunaan bagian lain dari tanaman Parang Romang seperti bunga sebagai antikanker belum ada, sehingga perlu dilakukan penelitian pendahuluan mengenai ekstrak partisi bunga parang romang (*Boehmeria virgata* (Forst) Guill).

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang timbul pada penelitian ini yaitu apakah ekstrak partisi (ekstrak n-heksan, etil asetat, dan etanol 70%) bunga parang romang (*Boehmeria virgata* (Forst) Guill) dapat memberikan efek toksik terhadap larva udang

(*Artemia salina* Leach). Penelitian untuk memecahkan masalah mengenai uji toksisitas akut ekstrak partisi bunga parang romang (*Boehmeria virgata* (Forst) Guill) terhadap larva udang (*Artemia salina* Leach) menggunakan metode BST telah dilakukan. Metode pengujian BST dengan menggunakan *Artemia salina* dianggap memiliki korelasi dengan daya sitotoksik senyawa-senyawa antikanker, sehingga sering digunakan untuk skrining awal pencarian senyawa antikanker. Metode ini dikenal sebagai metode yang cepat, mudah, murah dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan (Mayer, et al., 1982).

METODE PENELITIAN

A. Alat dan Bahan

Alat-alat yang digunakan adalah seperangkat alat maserasi, timbangan kasar, timbangan analitik, alat-alat untuk uji BST terdiri atas wadah penetasan telur, lampu pijar, vorteks, aerator, pipet, dan vial 10 ml.

Bahan-bahan yang digunakan adalah bunga (*Boehmeria virgata* (Forst) Guill), etanol 96%, air suling, DMSO, telur *Artemia salina*, air laut, dan ragi instan (Fermipan).

B. Ekstraksi

Simplisia bunga *Boehmeria virgata* (Forst) Guill diperoleh dari Camba Kab. Maros, Sulawesi Selatan. Serbuk bunga *Boehmeria virgata* (Forst) Guill yang telah kering sebanyak 100 gram diekstraksi dengan metode maserasi dengan pelarut etanol 96%. Penyarian dilakukan sebanyak 2 kali. Hasil maserasi diuapkan sampai kental. Ekstrak yang diperoleh ditimbang untuk dihitung rendemennya.

C. Partisi Ekstrak

Ekstrak kering yang telah dihitung rendemennya, ditimbang sebanyak 3 g. Ekstrak ini dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 250 mL dan ditambahkan pelarut n-hexan sebanyak 75 mL, dilarutkan dengan cara pengadukan menggunakan bantuan stirer. Pengadukan dilakukan selama 10 menit. Setelah itu dipisahkan antara residu (ekstrak yang tidak larut n-hexan) dan filtrat yang didapatkan. Filtrat dituang ke dalam gelas kimia 100 mL dan dienapungkan selama 10 menit, kemudian disaring menggunakan kertas wathman. Ekstrak yang tidak larut ditambahkan lagi 75 mL pelarut n-hexan dan proses ekstrak partisi tersebut diulang sebanyak 5 kali. Setelah proses ekstrak partisi untuk pelarut etil asetat. Pelarut etil asetat ditambahkan pada sisa ekstrak yang tidak larut dengan n-hexan dengan volume yang sama juga dilakukan untuk pelarut etanol 70%. Seluruh ekstrak cair untuk masing-masing pelarut disatukan dan pelarutnya dibiarkan menguap

hingga diperoleh ekstrak kental yang selanjutnya disimpan dalam desikator hingga didapat ekstrak kering. Ekstrak kering yang diperoleh ditimbang beratnya.

D. Penyiapan larva uji

Kista atau telur *Artemia salina* direndam dalam aquades (± 1 jam), ditiriskan, kemudian ditetaskan dalam kotak kecil berisi 500 ml air laut yang telah terbagi menjadi 2 bilik dengan sekat berlubang-lubang. Bilik penetasan diberi kondisi gelap sedangkan bilik satunya diberi sumber cahaya (lampu pijar), lalu aerator dihidupkan. Telur akan menetas dalam 24 jam dan larva berenang menuju bilik terang karena larva bersifat fototropik. Setelah berumur 48 jam larva *Artemia* siap digunakan.

E. Penyiapan sampel uji

Penyiapan sampel larutan induk setiap uji dengan melarutkan masing-masing 30 mg sampel uji dalam 3 ml metanol. Larutan uji 1000 ppm dibuat dengan memipet larutan induk sebanyak 500 μ L, sedangkan larutan uji 100 ppm dan 10 ppm dibuat dengan memipet 50 μ L dan 5 μ L dari larutan induk, vial larutan uji dimasukkan kedalam desikator sampai kering.

F. Uji toksisitas

Ekstrak n-hexan, etil asetat, dan etanol 70% masing-masing ditimbang sebanyak 36,3 mg, 33,4 mg, dan 33 mg untuk membuat larutan stok dengan konsentrasi 10.000 ppm masing-masing ekstrak dilarutkan dengan DMSO 200 μ L dan ditambahkan 3.430 μ L n-hexan untuk ekstrak n-hexan, 3.140 μ L etil asetat untuk ekstrak etil asetat dan 3.100 μ L etanol 70% untuk ekstrak etanol 70%. Kemudian dari setiap larutan ekstrak tersebut dipipet sebanyak 500 μ L, 50 μ L, 5 μ L untuk mendapatkan konsentrasi berturut-turut 1000, 100, 10 ppm dalam 5 mL larutan. Konsentrasi untuk 1 ppm diperoleh dari larutan yang dipipet sebanyak 50 μ L dari larutan stok 100 ppm yang dibuat dengan mengambil larutan stok awal sebanyak 10 μ L dan ditambahkan dengan tiap pelarut ekstrak hingga 1 mL air laut dan masing-masing dimasukkan ke dalam vial, diuapkan pelarutnya selama 24 jam. Setelah pelarut dibiarkan habis menguap, selanjutnya ke dalam masing-masing vial ditambahkan DMSO 50 μ L dan 1 mL air laut. Selanjutnya dimasukkan 10 ekor larva udang yang diambil secara acak dan 3 tetes suspensi ragi fermipan ke dalam masing-masing vial dan ditambahkan lagi air laut sampai volumenya 5 mL. Air laut ditambah dengan DMSO 50 μ L yang digunakan sebagai kontrol. Kemudian vial-vial ini disimpan di tempat yang cukup mendapat cahaya lampu selama 24 jam. Dilakukan pengamatan setelah 24 jam terhadap kematian larva udang. Dihitung jumlah larva yang

mati untuk tiap ekstrak. Dilakukan replikasi atau pengulangan sebanyak 3 kali. Sebagai kontrol negatif digunakan pelarut saja. Data-data dianalisis dengan analisis probit untuk menentukan LC₅₀.

Hasil rendamen ekstrak etanol bunga parang romang (*Boehmeria virgata* (Fors) Guill) dilihat pada tabel 1 di bawah ini:

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Hasil Perhitungan Rendamen Ekstrak Etanol Bunga Parang Romang (*Boehmeria virgata* (Fors) Guill)

| Sampel | Berat Sampel (g) | Berat Ekstrak (g) | % Rendamen |
|-------------------------------|------------------|-------------------|------------|
| Simplisia bunga Parang romang | 100 | 3,7475 | 3,7475 |

Hasil analisis data uji toksisitas masing-masing ekstrak partisi bunga parang romang (*Boehmeria virgata* (Fors) Guill) terhadap larva

udang (*Artemia salina* Leach) setelah 24 jam perlakuan dapat dilihat pada tabel 2, 3 dan 4 di bawah ini:

Tabel 2. Hasil Analisis Data Uji Toksisitas Ekstrak n-heksan Bunga Parang Romang (*Boehmeria virgata* (Fors) Guill) terhadap Larva Udang (*Artemia salina* Leach) Setelah 24 Jam Perlakuan.

| Konsentrasi (µg/mL) | Log Konsentrasi | Total Larva | | % Kematian | Nilai Probit |
|---------------------|-----------------|-------------|------|------------|--------------|
| | | Uji | Mati | | |
| 1000 | 3 | 30 | 27 | 90 | 6,28 |
| 100 | 2 | 30 | 23 | 77 | 5,77 |
| 10 | 1 | 30 | 19 | 63 | 5,33 |
| 1 | 0 | 30 | 5 | 17 | 4,05 |

Pers. Regresi $y = 0.71x + 4,285; R^2 = 0,931$

Nilai LC₅₀ = 10,1624 µg/MI

Tabel 3. Hasil Analisis Data Efek Toksisitas Akut Ekstrak Etil Asetat Bunga Parang Romang (*Boehmeria virgata* (Fors) Guill) terhadap Larva Udang (*Artemia salina* Leach) Setelah 24 Jam Perlakuan.

| Konsentrasi (µg/mL) | Log Konsentrasi | Total Larva | | % Kematian | Nilai probit |
|---------------------|-----------------|-------------|------|------------|--------------|
| | | Uji | Mati | | |
| 1000 | 3 | 30 | 30 | 100 | 8,09 |
| 100 | 2 | 30 | 28 | 93 | 6,48 |
| 10 | 1 | 30 | 25 | 83 | 5,95 |
| 1 | 0 | 30 | 17 | 57 | 5,18 |

Pers. Regresi $y = 0,926x + 5,036; R^2 = 0,942$

Nilai LC₅₀ = 0.9145 µg/mL

Tabel 4. Hasil Analisis Data Efek Toksisitas Akut Ekstrak Etanol 70% Bunga Parang Romang (*Boehmeria virgata* (Fors) Guill) terhadap Larva Udang (*Artemia salina* Leach) Setelah 24 Jam Perlakuan

| Konsentrasi ($\mu\text{g/mL}$) | Log Konsetrasi | Total Larva | | % Kematian | Nilai probit |
|-------------------------------------|-------------------|-------------|------|---------------|--------------|
| | | Uji | Mati | | |
| 1000 | 3 | 30 | 30 | 100 | 8,59 |
| 100 | 2 | 30 | 29 | 97 | 6,88 |
| 10 | 1 | 30 | 23 | 77 | 5,74 |
| 1 | 0 | 30 | 15 | 55 | 5,09 |

Pers. Regresi $y = 1,041x + 4,866; R^2 = 0,988$

Nilai $LC_{50} = 1.3449 \mu\text{g/mL}$

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Ekstrak n-heksan, etil asetat dan etanol 70% bunga parang romang (*Boehmeria virgata* (Forst) Guill) memiliki potensi toksisitas akut terhadap larva udang (*Artemia salina* Leach) pada kategori toksik untuk ekstrak n-heksan dengan nilai LC_{50} 10,1624 $\mu\text{g/mL}$, sangat toksik untuk ekstrak etil asetat dan ekstrak etanol 70% dengan nilai LC_{50} masing-masing 0,9145 $\mu\text{g/mL}$ dan 1,3449 $\mu\text{g/mL}$.

DAFTAR PUSTAKA

- Latif, A., 2014, Uji Toksisitas Akut Batang Parang Romang (*Artemia salina* Leach dengan metode Brine Shrimp Lethality Test (BST), Skripsi Universitas Islam makassar, Makassar.
- Mayer, dkk. 1982. Brine Shrimp, a convenient general bioassay for active plant constituents. *J of Plant Medical Research*;45:31-34.
- Manggau M., Yusriadi, Mufidah, Alam, G., (2007), Efek Antiproliferasi Ekstrak Daun Parang Romang (*Boehmeria virgata* (Forst) Guill) terhadap Sel Kanker HeLa, *Majalah Farmasi dan Farmakologi*, Vol. 11, No. 3, 76-79

Rusdi, M., 2012, Isolasi dan Karakterisasi Senyawa Aktif Ekstrak Partisi n Hexan Daun Parang Romang (*Artemia salina* Leach) terhadap Sel Kanker HeLa, Tesis Program Pascasarjana Farmasi Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar.

Rusdi, M., 2014, Skrining Fitokimia dan Uji Toksisitas Ekstrak Akar Parang Romang (*Artemia salina* Leach) terhadap larva udang *Artemia salina* Leach, *Jurnal Farbal*, Vol 2, No. 2, Universitas Islam makassar, Makassar.

Tjay, T.H., Rahardja, K., (2006), *Obat-obat Penting. Khasiat, Penggunaan, dan Efek Samping*, Edisi VI, Gramedia, Jakarta