

Volume 2, Nomor 2

September 2014

ISSN 2338-0616



FARBAL

JURNAL FARMASI DAN BAHAN ALAM



Diterbitkan Oleh :
Program Studi Farmasi F.MIPA
Universitas Islam Makassar

FARBAL	Volume 2	Nomor 2	Halaman 42-86	Makassar September 2014	ISSN 2338-0616
---------------	----------	---------	------------------	----------------------------	-------------------



9 772338 061008

DAFTAR ISI

1. Optimalisasi Produksi Senyawa Antibakteri Isolat *Penicillium* Sp
Dari Fungi Endofit *Ulva reticulata* Forsskal
Nielma Auliah, Sartini, Safaruddin, Suparlan 42 - 45
2. Uji Aktivitas Antibakteri Sediaan Obat Kumur
Ekstrak bonggol nenas (*Ananas comosus* L. Merr)
Terhadap bakteri *Streptococcus mutans*
Nur Ida, Sitti Hajar, Guntur Yusuf, Ermina Pakki 46 - 50
3. Uji Efek Hipoglikemik Ekstrak Etanol
Akar Trembesi (*Samanea saman* (Jacq) Merr.) pada
Mencit Jantan (*Mus musculus*)
Sitti Fauziah Noer, Sutriana, Hasyim Bariun, M.Rusdi 51 - 56
4. Uji Efek Hipoglikemik Ekstrak Etanol
Kulit Buah Markisa Ungu (*Passiflora edulis* Sims.)
Pada Mencit Jantan (*Mus musculus*)
Sitti Aminah, Hasyim Bariun, M. Rusdi, Sitti Fauziah Noer..... 57 - 62
5. Sensitivitas *Mycobacterium tuberculosis* Terhadap
Ekstrak Etanol Daun Miana (*Coleus scutellarioides* (L.) Benth)
Sesilia Rante Pakadang, Habiba Naim, Sisilia TR Dewi, Santi Sinala 63 - 67
6. Skrining Fitokimia Dan Uji Toksisitas
Ekstrak Akar Parang Romang (*Boehmeria virgata* (Forst) Guill)
Terhadap Larva Udang *Artemia salina* Leach
Muhammad Rusdi 68 - 71
7. Biosorpsi Ion Ni^{2+} , Zn^{2+} , DAN Cd^{2+} oleh
Nannochloropsis salina dalam Sistem Tiga Logam
Tahirah Hasan, Risman Anwar, Abd. Wahid Wahab, Yusafir Hala 72 - 83
8. Analisis Kandungan Logam Berat Pb dan Cd pada
Teripang Pasir (*Holothuria scabra*) Asal Perairan Lawele,
Sulawesi Tenggara dengan Metode Spektrofotometri
Yasnidar Yasir, Kurnia, Tahirah Hasan, Yusnita Rifai 84 - 88

SKRINING FITOKIMIA DAN UJI TOKSISITAS EKSTRAK AKAR PARANG ROMANG (*Boehmeria virgata* (Forst) Guill) TERHADAP LARVA UDANG *Artemia salina* Leach

Muhammad Rusdi

Program Studi Farmasi FMIPA, Universitas Islam Makassar
email: rusdim01@yahoo.com

ABSTRAK

Telah dilakukan penelitian tentang skrining fitokimia dan uji toksisitas akar Parang Romang (*Boehmeria virgata* (Forst) Guill) terhadap larva udang *Artemia salina* L. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui golongan senyawa yang terkandung dalam ekstrak etanol akar *Boehmeria virgata* (Forst) Guill dan mengetahui potensi toksisitas akut pada ekstrak akar *Boehmeria virgata* (Forst) Guill menurut metode Brine Shrimp Lethality Test (BST). Serbuk akar *Boehmeria virgata* (Forst) Guill diekstraksi dengan metode maserasi menggunakan pelarut etanol 96 %. Ekstrak cair yang diperoleh kemudian diuapkan untuk mendapatkan ekstrak kental. Skrining fitokimia dilakukan terhadap ekstrak untuk mendeteksi golongan kandungan kimianya. Selanjutnya ekstrak etanol akar *Boehmeria virgata* (Forst) Guill diuji aktivitasnya terhadap larva udang *Artemia salina* L. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak akar *Boehmeria virgata* (Forst) Guill mengandung golongan alkaloid, terpenoid, fenolik, flavanoid dan memberikan LC₅₀ sebesar 13,095 µg/ml. Dari hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa ekstrak etanol akar *Boehmeria virgata* (Forst) Guill memiliki toksisitas terhadap larva udang *Artemia salina* L.

Kata Kunci : Skrining fitokimia, Uji Toksisitas, ekstrak akar *Boehmeria virgata* (Forst) Guill, larva udang *Artemia salina* L.

PENDAHULUAN

Kanker atau karsinoma adalah pembentukan jaringan baru yang abnormal dan bersifat ganas (maligne). Suatu kelompok sel dengan mendadak menjadi liar dan memperbanyak diri secara pesat dan terus menerus. Akibatnya adalah pembengkakan atau benjolan yang disebut tumor atau neoplasma. Sel-sel kanker ini menginfiltrasi jaringan sekitarnya dan memusnahkannya (Tjay dan Rahardja, 2006).

Tumbuhan Parang Romang (*Boehmeria virgata* (Forst) Guill) yang termasuk dalam suku Urticaceae sering digunakan sebagai obat kanker oleh masyarakat daerah Tana Toraja, Sulawesi Selatan. Tumbuhan ini juga tumbuh di daerah-daerah pegunungan seperti Sinjai, Gowa, Malino, Maros, Engrekang.

Beberapa hasil penelitian tumbuhan Parang Romang yang telah dilakukan sebelumnya adalah ekstrak n-heksan, etil asetat dan n-butanol daun *Boehmeria virgata* (Forst) Guill memiliki aktifitas antiproliferasi terhadap sel kanker HeLa dengan nilai IC₅₀ berturut-turut 3,453; 12,096 dan 168,66 µg/ml (Manggau, 2007). Ekstrak n-heksan, etil asetat dan metanol tumbuhan ini juga memiliki aktifitas antiproliferasi terhadap sel kanker kandung kemih 5637 dengan nilai IC₅₀ berturut-turut 1,4; 3,96; dan 2,18 µg/ml (Manggau, 2009). Selain itu, Ekstrak n-heksan daun Parang Romang telah diisolasi 4 senyawa

aktif sebagai antiproliferatif terhadap sel kanker HeLa, diantara isolatnya merupakan alkaloid (Rusdi, 2012).

Brine Shrimp Lethality Test (BST) merupakan salah satu metode yang digunakan untuk penapisan awal senyawa-senyawa yang diduga berkhasiat sebagai antikanker. Metode pengujian BST dengan menggunakan *Artemia salina* dianggap memiliki korelasi dengan daya sitotoksik senyawa-senyawa antikanker, sehingga sering dilakukan untuk skrining awal pencarian senyawa antikanker. Besarnya toksisitas diketahui berdasarkan jumlah kematian larva akibat pemberian ekstrak yang mengandung senyawa antikanker. Ekstrak bersifat toksik bila harga LC₅₀-nya < 1000 mg/ml, sedangkan untuk senyawa murni aktif bila LC₅₀-nya < 200 mg/ml. Metode ini mempunyai beberapa keuntungan antara lain, waktu pelaksanaan cepat, biaya relatif murah, pengerjaan sederhana, tidak memerlukan teknik aseptik, tidak memerlukan peralatan khusus, menggunakan sampel dalam jumlah relatif sedikit dan tidak memerlukan serum hewan seperti pada uji sitotoksik (Meyer, dkk., 1982).

Dari keterangan di atas dapat dilihat bahwa daun (*Boehmeria virgata* (Forst) Guill) sudah terbukti sebagai memberikan efek antiproliferatif terhadap sel kanker, tapi untuk bagian lain dari tanaman ini belum pernah dilaporkan. Dalam upaya pemanfaatan secara

optimal organ tanaman sebagai bahan obat antikanker, maka perlu dilakukan uji antikanker menggunakan menggunakan organ lain. Oleh karena itu, pada penelitian ini dilakukan identifikasi kandungan kimia yang ada dalam ekstrak etanol akar (*Boehmeria virgata* (Forst) Guill) dengan cara melakukan skrining fitokimia dan menguji potensi toksisitas akut pada ekstrak akar *Boehmeria virgata* (Forst) Guill menurut metode Brine Shrimp Lethality Test (BST)

METODE PENELITIAN

A. Alat dan Bahan

Alat-alat yang digunakan adalah seperangkat alat maserasi, timbangan kasar, timbangan analitik, alat-alat untuk uji BST terdiri atas wadah penetasan telur, lampu pijar, vorteks, aerator, pipet, dan vial 10 ml.

Bahan-bahan yang digunakan adalah akar (*Boehmeria virgata* (Forst) Guill), etanol 96%, air suling, DMSO, telur *Artemia salina*, air laut, dan ragi instan (Fermipan).

B. Ekstraksi

Simplisia akar *Boehmeria virgata* (Forst) Guill diperoleh dari Camba Kab. Maros, Sulawesi Selatan. Serbuk akar *Boehmeria virgata* (Forst) Guill yang telah kering (150 g) diekstraksi dengan metode maserasi dengan pelarut etanol 96%. Penyarian dilakukan sebanyak 2 kali. Hasil maserasi diuapkan sampai kental. Ekstrak yang diperoleh ditimbang untuk dihitung rendemennya.

C. Skrining Fitokimia

Skrining fitokimia dilakukan dengan metode uji tabung menggunakan pereaksi-pereaksi yang sesuai untuk golongan senyawa yang akan di uji yaitu saponin, flavonoid, terpenoid, alkaloid, fenolik

Dilarutkan sebanyak 500 mg ekstrak etanol 96% akar *Boehmeria virgata* (Forst) Guill dengan 50 mL etanol 96%, kemudian didapat larutan uji yang digunakan untuk uji fitokimia.

Pemeriksaan Saponin

Skrining fitokimia saponin dilakukan dengan cara sebanyak 10 mL larutan uji dalam tabung reaksi dikocok vertikal selama 10 detik kemudian dibiarkan selama 10 detik. Pembentukan busa setinggi 1-10 cm yang stabil selama tidak kurang dari 10 menit, menunjukkan adanya saponin dan pada penambahan 1 tetes HCl 2N, busa tidak hilang (Depkes RI, 1989).

Pemeriksaan Flavonoid

Skrining fitokimia flavonoid dilakukan dengan cara sebanyak 1 mL larutan uji diuapkan hingga kering, sisanya dibasahkan dengan aseton P, ditambahkan sedikit serbuk halus asam borat P dan serbuk halus asam oksalat P, dipanaskan

hati-hati di atas penangas air dan dihindari pemanasan berlebihan. Sisa yang diperoleh dicampur dengan 10 mL eter P. Diamati dengan sinar UV 366 nm; larutan berfluoresensi kuning intensif, menunjukkan adanya senyawa flavonoid (Depkes RI, 1989).

Pemeriksaan terpenoid

Pada pemeriksaan terpenoid dilakukan dengan menggunakan reaksi Liebermann Burchard. Larutan uji sebanyak 2 mL diuapkan dalam cawan porselen. Residu dilarutkan dengan 0,5 mL kloroform, setelah itu ditambahkan dengan asam asetat anhidrat sebanyak 0,5 mL. Selanjutnya ditambahkan 2 mL asam sulfat pekat melalui dinding tabung. Adanya triterpenoid ditandai dengan terbentuknya cincin kecoklatan atau violet pada perbatasan larutan, sedangkan adanya steroid ditandai dengan terbentuknya cincin biru kehijauan (Ciulei, 1984).

Pemeriksaan Alkaloid

Ekstrak sebanyak 0,5 gram ditambahkan dengan 5 mL amonia 25% dan digerus dalam mortar, lalu ditambahkan 20 mL kloroform dan digerus kuat. Campuran disaring sehingga diperoleh lapisan air dan lapisan pelarut organik. Lapisan air ditambahkan 2 tetes pereaksi Dragendorff atau pereaksi Mayer. Jika terbentuk warna orange dengan pereaksi Dragendorff atau terbentuk endapan putih dengan penambahan pereaksi Mayer berarti ekstrak mengandung alkaloid (Farnsworth, 1966).

Pemeriksaan polifenol

Adanya polifenol ditunjukkan oleh perubahan warna menjadi biru, biru-hitam, atau biru-hijau setelah ditambahkan pereaksi FeCl₃ 10% pada larutan uji (Jones dan Kinghorn, 2006).

D. Penyiapan larva uji

Kista atau telur *Artemia salina* direndam dalam aquades (\pm 1 jam), ditiriskan, kemudian diletakkan dalam kotak kecil berisi 500 ml air laut yang telah terbagi menjadi 2 bilik dengan sekat berlubang-lubang. Bilik penetasan diberi kondisi gelap sedangkan bilik satunya diberi sumber cahaya (lampu pijar), lalu aerator dihidupkan. Telur akan menetas dalam 24 jam dan larva berenang menuju bilik terang karena larva bersifat fototropik. Setelah berumur 48 jam larva *Artemia* siap digunakan.

E. Penyiapan sampel uji

Penyiapan sampel larutan induk setiap uji dengan melarutkan masing-masing 30 mg sampel uji dalam 3 ml metanol. Larutan uji 1000 ppm dibuat dengan memipet larutan induk sebanyak 500 μ l, sedangkan larutan uji 100 ppm dan 10 ppm dibuat dengan memipet 50 μ l dan 5 μ l dari

larutan induk, vial larutan uji dimasukkan kedalam desikator sampai kering.

F. Uji toksisitas

Konsentrasi larutan uji adalah 1000 ppm, 100 ppm dan 10 ppm. masing-masing konsentrasi dibuat 3 vial untuk kontrol, kemudian ke dalam setiap vial ditambahkan dimetilsulfoksida sebanyak 50 µl dan ditambahkan air laut kurang lebih 2 ml. Masukkan 10 ekor larva udang ke dalam vial. Ditambahkan setetes suspensi fermipan 3 mg pada tiap vial sebagai makanan larva. Vial diisi air laut hingga volume akhir 5 ml. Setelah 24 jam jumlah larva yang masih hidup dalam masing-masing vial dihitung dan dicatat kemudian ditentukan % kematian larva. Sebagai kontrol negatif digunakan pelarut saja. Data-data dianalisis dengan analisis probit untuk menentukan LC₅₀.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akar *Boehmeria virgata* yang telah kering (150 g) diserbukkan, maserasi dilakukan dengan pelarut etanol 96 % sebanyak 2 kali untuk tiap pelarut. Pelarut diuapkan dengan rotary evaporator, sehingga didapat ekstrak etanol 96 % (4,6094 g)

Dari hasil uji toksisitas ekstrak etanol *Boehmeria virgata* yang diperoleh dengan menggunakan metode Brine Shrimp Lethality Assay terhadap larva udang memperhatikan hasil seperti diperlihatkan pada tabel 1.

Tabel 1. Hasil uji toksisitas ekstrak etanol *Boehmeria virgata*

No. Vial	Jumlah larva yang mati tiap konsentrasi (µg/ml)			
	10	100	1000	kontrol
1	7	8	8	0
2	7	8	8	0
3	4	8	8	0
Jumlah Kematian	18	24	24	0
Jumlah larva	30	30	30	30
% Kematian	60	80	80	0
Pers regresi	y = 1.17x + 3.693 R ² = 0.924			
Nilai LC ₅₀	13.095 µg/ml			

Hasil uji toksisitas ekstrak etanol memberikan LC₅₀ sebesar 13,095 µg/ml. Menurut Meyer (1982) ekstrak yang mempunyai nilai LC₅₀ ≤ 1000 µg/ml termasuk dalam katagori aktif.

Skrining fitokimia menunjukkan bahwa ekstrak etanol akar *Boehmeria virgata* mengandung senyawa saponin, flavonoid, Fenolik, terpenoid dan alkaloid

Saponin pada umumnya berada dalam bentuk glikosida sehingga cenderung bersifat polar (Harbone, 1987). Saponin adalah senyawa aktif permukaan yang dapat menimbulkan busa jika dikocok dalam air. Hal tersebut terjadi karena saponin memiliki gugus polar dan non polar yang akan membentuk misel. Pada saat misel terbentuk maka gugus polar akan menghadap ke luar dan gugus nonpolar menghadap ke dalam dan keadaan inilah yang tampak seperti busa (Robinson, 1991; Santi dkk., 2008)

Flavonoid mempunyai tipe yang beragam dan terdapat dalam bentuk bebas (aglikon) maupun terikat sebagai glikosida (Harbone, 1987). Flavonoid umumnya memiliki ikatan dengan gugus gula yang menyebabkan flavonoid lebih mudah larut dalam air atau pelarut polar (Markham, 1988).

Golongan fenolik yang cenderung larut dalam air dan pelarut polar. Pengujian ini dilakukan dengan penambahan FeCl₃. Terbentuknya warna hijau kehitaman setelah ditambahkan dengan FeCl₃ dikarenakan senyawa fenol yang terkandung akan membentuk senyawa kompleks dengan ion Fe³⁺ (Harbone, 1987).

Pada pengamatan skrining fitokimia alkaloid, terbentuk endapan putih saat larutan uji ditambahkan pereaksi Mayer dan terbentuk endapan jingga saat ditambahkan pereaksi Dragendorff. Hal tersebut menunjukkan pada ekstrak terdapat kandungan alkaloid. Pada pengujian sterol dan triterpenoid didapatkan hasil positif triterpenoid yang ditandai dengan terbentuknya cincin kecoklatan pada kedua batas larutan. Pada pengujian saponin, terbentuk busa. Hal tersebut menunjukkan pada ekstrak terdapat kandungan saponin. Pada pengujian kandungan kimia polifenol, terbentuk warna hijau kehitaman yang menunjukkan ekstrak positif mengandung polifenol. Pengujian flavonoid menunjukkan hasil positif yang ditandai dengan terbentuknya fluoresensi kuning intensif pada pengamatan UV366.

KESIMPULAN

1. Uji toksisitas ekstrak etanol akar *Boehmeria virgata* (Forst) Guill, terhadap larva udang *Artemia salina* L dinyatakan aktif dengan nilai LC₅₀ = 13,095 µg/ml
2. Ekstrak akar *Boehmeria virgata* (Forst) Guill mengandung saponin, terpenoid, alkaloid, flavanoid dan fenolik

DAFTAR PUSTAKA

Ciulei, J. 1984. Methodology for Analysis of Vegetables and Drugs. Bucharest: Faculty of Pharmacy.

Depkes RI. 1989. Materia Medika Indonesia. Jilid V. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

Farnsworth, N.R. 1966. Biological and Phytochemical Screening of Plants. J. Pharm. Sci

Harborne, J.B. 1987. Metode Fitokimia: Penuntun Cara Modern Menganalisis Tumbuhan, Edisi Kedua. Bandung : Penerbit ITB.

Jones, W. P. dan Kinghorn, A. D. (2006). Extraction of Plant Secondary Metabolites. In: Sarker, S. D., Latif, Z., dan Gray, A. I., editors. Natural Products Isolation, Second Edition. New Jersey: Humana Press.

Mayer, dkk. 1982. Brine Shrimp, a convenient general bioassay for active plant constituents. J of Plant Medical Research. 45:31-34.

Robinson, T. 1991. Kandungan Organik Tumbuhan Tingkat Tinggi. Bandung: Penerbit ITB.

Sangi, M., M.R.J. Runtuwene., H.E.I. Simbala., V.M.A. Makang. 2008. Analisis Fitokimia Tumbuhan Obat di kabupaten Minahasa Utara. Chem. Prog. 1(1):47-53.

Tjay, T.H., Rahardja, K., (2006), Obat-obat Penting. Khasiat, Penggunaan, dan Efek Samping, Edisi VI, Gramedia, Jakarta

Manggau M., Mufidah, Lindequist, U., (2009), Antiproliferation Against Human Bladder Cancer 5637 Cell Line and Antioxidant Activity of Various Plant Extracts, The Indonesian Journal of Natural Product, Vol. 6, No. 6, 247-250

Manggau M., Yusriadi, Mufidah, Alam, G., (2007), Efek Antiproliferasi Ekstrak Daun Parang Romang (*Boehmeria virgata* (Forst) Guill terhadap Sel Kanker HeLa, Majalah Farmasi dan Farmakologi, Vol. 11, No. 3, 76-79