

**BIOAKUMULASI LOGAM BERAT TEMBAGA (Cu)
BERDASARKAN WAKTU PAPERANNYA OLEH
BAKTERI ENDAPAN SEDIMEN PERAIRAN
SEKITAR RUMAH SUSUN
KOTA MAKASSAR**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains
Jurusan Biologi pada Fakultas Sains Dan Teknologi
Uin Alauddin Makassar

Oleh:

ALTRIANA EKA PUTRI
NIM.60300113048

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDINMAKASSAR
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Altriana Eka Putri
NIM : 60300113048
Tempat/Tgl. Lahir : Makassar, 21 Maret 1995
Jur/Prodi : Biologi
Fakultas : Sains dan Teknologi
Alamat : Jl. Dirgantara, Gowa. BTN Griya Asinda Pratama, G.8.
Judul : Bioakumulasi Logam Berat Tembaga (Cu) Berdasarkan Waktu Paparannya Oleh Bakteri Endapan Sedimen Perairan Sekitar Rumah Susun Kota Makassar.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 28 Agustus 2017
Penyusun

Altriana Eka Putri
NIM: 60300113048



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Bioakumulasi Logam Berat Tembaga (Cu) Berdasarkan Waktu Paparannya Oleh Bakteri Endapan Sedimen Perairan Sekitar Rumah Susun Kota Makassar”, yang disusun oleh Altriana Eka Putri, NIM: 60300113048, mahasiswa Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2017 M, bertepatan dengan 06 Dzul-Hijjah 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Sains dan Teknologi, Jurusan Biologi (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 28 Agustus 2017 M
06 Dzul-Hijjah 1438 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Hasyimuddin, S.Si., M.Si	(.....)
Munaqisy I	: Hafsan, S.Si., M.Pd	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Cut Muthiadin, S.Si., M.Si	(.....)
Munaqisy III	: Dr. Muh. Sabri AR, M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Mashuri Masri, S.Si., M.Kes	(.....)
Pembimbing II	: Ulfa Triyani A Latif, S.Si., M.Pd	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag
NIP. 196912051993031001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi Saudari Altriana Eka Putri, NIM: 60300113048, mahasiswa Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi dengan seksama skripsi yang berjudul, “Bioakumulasi Logam Berat Tembaga (Cu) Berdasarkan Waktu Paparannya Oleh Bakteri Endapan Sedimen Perairan Sekitar Rumah Susun Kota Makassar”, memandang bahwa hasil penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan kesidang *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Makassar, 28 Agustus 2017



Dr. Mashuri Masri, S.Si., M.Kes
Pembimbing I



Ulfa Triyani A Latif, S.Si., M.Pd
Pembimbing II

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt. atas rahmat dan hidayah-Nya. Dengan menyebut nama Allah swt. yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami penjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karuninayah-Nya kepada kami, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Bioakumulasi Logam Berat Tembaga (Cu) Berdasarkan Waktu Paparannya Oleh Bakteri Endapan Sedimen Perairan Sekitar Rumah Susun Kota Makassar”**.

Skripsi ini telah kami susun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan skripsi ini. Untuk itu kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan skripsi ini.

Sebuah persembahan dan terima kasih yang khusus penulis persembahkan kepada Ayahanda **Asrian Jemmy D** dan Ibunda **St. Maryam S.H** yang telah mencurahkan seluruh kasih sayangnya, berkorban dan telah bekerja keras membesarkan dan membiayai penulis hingga dapat menyelesaikan pendidikan pada bangku kuliah hingga mendapatkan gelar Sarjana.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

Olehnya secara mendalam penulis sampaikan banyak terima kasih kepada semua yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini diantaranya:

1. Prof. Dr. Musafir Pabbari, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan seluruh jajarannya yang telah memberikan kebijakan-kebijakan membangun UIN Alauddin Makassar agar lebih berkualitas sehingga dapat bersaing dengan Universitas lainnya.
2. Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, beserta Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III dan seluruh staf administrasi yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada kami selama masa pendidikan.
3. Dr. Mashuri Masri, S.Si., M.Kes., selaku Ketua Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi dan Sekertaris Jurusan Baiq Farhatul Wahidah, S.Si., M.Si yang telah banyak memberikan saran kepada kami selama masa pendidikan.
4. Dr. Mashuri Masri, S.Si., M.Kes selaku pembimbing I dan Ulfa Triyani A.Latif S.Si., M.Pd selaku pembimbing II dalam penyusunan skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Hafsan S.Si., M.Pd., selaku pembahas I, Dr. Cut Muthiadin, M.Si., selaku pembahas II dan Dr. M.Sabri AR, M.Ag selaku pembahas III yang telah memberikan saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
6. St. Aisyah Sijid, S.Pd., M.Kes., selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing penulis dalam bidang akademik selama masa pendidikan.

7. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yang selama ini telah mendidik penulis dengan baik, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada tingkat perguruan tinggi.
8. Eka Sukmawati S.Si., M.Si selaku Kepala Laboratorium Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dan seluruh stafnya yang telah membimbing dalam proses praktikum selama masa pendidikan.
9. Kepada saudaraku Adrian Akbar, Ardiansyah, dan Astrid Dwi Putri tersayang yang telah memberikan do'a, dukungan moril dan material.
10. Sahabat, teman, sekaligus saudara Aulia Faraz Umayu, Nurafdalia, Chaerunnisa, Rezky Anugrah dan Dewi Sakti Angraeni yang senantiasa memberikan dukungan, saran dan bantuannya, serta setia menemani penulis dalam suka maupun duka.
11. Teman-teman "**BRACHIALIS**" (Biologi Angkatan 2013) yang senantiasa memberikan do'a dan motivasinya kurang lebih 4 tahun.
12. Adik-adik mahasiswa Jurusan Biologi 2014, 2015 dan 2016.
13. Teman-teman KKN Reguler Angkatan 53 di Kabupaten Gowa, Kecamatan Bontolempangan.
14. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penulisan tugas akhir ini yang tidak dapat dituliskan satu per satu.

Akhir kata penulis memohon maaf atas segala kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Penulis menyadari bahwa karya sederhana ini jauh dari

kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari pembaca, sebagai bahan perbaikan kedepannya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah swt. yang dilimpahkan rahmat dan ridho-Nya. Aamiin

Makassar, 25 Agustus 2017

Penulis



DAFTAR ISI

JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR	iv-vii
DAFTAR ISI.....	viii-ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup Penelitian	6
D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu	6-9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN TEORITIS	11
A. Ayat yang relevan	10
B. Tinjauan Umum Lingkungan	13
C. Tinjauan Umum Logam Berat	17
D. Tinjauan Umum Logam Berat Tembaga (Cu)	21
E. Tinjauan Umum Bakteri	24
F. Bakteri Pengakumulasi Logam Berat	30
G. Kerangka Berfikir.....	38
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	39
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	39
B. Pendekatan Penelitian	39
C. Variabel Penelitian	39
D. Definisi Operasional Penelitian	40
E. Metode Penelitian	41

F. Instrumen Penelitian (Alat dan Bahan).....	41
G. Prosedur Kerja	42
H. Analisis Data	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	45
A. Hasil Penelitian	45
B. Pembahasan	47
BAB V PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran.....	55
KEPUSTAKAAN	56-60
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	




DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Tabel Perbedaan Susunan Gram Positif dan Gram Negatif.....	25
Tabel 4.1. Tabel Akumulasi Bakteri <i>Bacillus thuringiensis</i> Terhadap Logam Berat Tembaga (Cu)	45
Tabel 4.2. Tabel Akumulasi Bakteri <i>Pseudomonas aeruginosa</i> Terhadap Logam Berat Tembaga (Cu)	46
Tabel 4.3. Tabel Akumulasi Bakteri <i>Alcaligenes faecalis</i> Terhadap Logam Berat Tembaga (Cu).....	46
Tabel 4.4. Tabel Jumlah Rata-Rata Akumulasi Logam Berat Tembaga (Cu) ...	47



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Gambar Logam Berat Tembaga (CuNO_3).....	24
Gambar 2.2. Gambar Kurva Pertumbuhan Bakteri.....	29
Gambar 2.3. Gambar Bakteri <i>Bacillus thuringiensis</i> dan Klasifikasinya	34
Gambar 2.4. Gambar Bakteri <i>Pseudomonas aeruginosa</i> dan Klasifikasinya ...	35
Gambar 2.5. Gambar Bakteri <i>Alcaligenes faecalis</i> dan Klasifikasinya	37



ABSTRAK

Nama : Altriana Eka Putri
NIM : 60300113048
Judul Skripsi : “Bioakumulasi Logam Berat Tembaga (Cu) Berdasarkan Waktu Paparannya Oleh Bakteri Endapan Sedimen Perairan Sekitar Rumah Susun Kota Makassar”

Logam berat adalah unsur-unsur kimia dengan bobot jenis lebih besar dari 5 gr/cm³ terletak disudut kanan bawah sistem periodik, mempunyai afinitas yang tinggi terhadap unsur S dan biasanya bernomor atom 22 sampai 92 dari periode 4 sampai 7. Logam berat merupakan bahan polusi berbahaya karena sifatnya yang tidak dapat didegradasi oleh mikroorganisme sehingga terakumulasi di lingkungan. Kadar Cu yang tinggi dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan biotik maupun abiotik, Peningkatan kadar Cu yang terlalu tinggi dapat memberikan dampak negative bagi hewan dan manusia karena sifatnya yang karsinogenik. Penelitian mengenai bioakumulasi logam berat tembaga (cu) berdasarkan waktu paparannya oleh bakteri endapan sedimen perairan sekitar rumah susun kota makassar telah dilakukan pada bulan Maret hingga Juni 2017. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat kemampuan bioakumulasi dari tiga jenis bakteri terhadap logam berat tembaga (Cu) dengan melihat jumlah penurunan logam berat oleh masing-masing bakteri. Media NA dicampur dengan logam berat CuNO₃ sebanyak 10 ppm, diinokulasikan bakteri *Bacillus thuringiensis*, *Pseudomonas aeruginosa* dan *Alcaligenes faecalis* dan diinkubasi selama 24 jam. Kultur bakteri diinokulasikan masing-masing pada media NB 250 ml kemudian di inkubator shaker selama 12 jam dan dilakukan 6 kali pengamatan, diukur suhu dan pHnya. Dilakukan uji UV VVS untuk melihat absorbansinya. Hasil pengamatan disentrifugasi dan supernatan di uji SSA untuk melihat penurunan logam beratnya. Dari hasil penelitian, ketiga bakteri mampu menurunkan kadar logam berat masing-masing dari 10 ppm menjadi 3,47 ppm (isolat A) total persen 90%, 3,49 ppm (isolat B) total 90%, dan 2,60 ppm (isolat C) total persen 100%. Kemampuan bioakumulasi bakteri yang menonjol dibuktikan oleh bakteri isolat C dengan jumlah persentase penurunan sebanyak 100%. Hasil penelitian ini menunjukkan Isolat C (*Alcaligenes faecalis*) memiliki daya bioakumulasi yang sangat baik sehingga untuk menurunkan kadar logam berat Cu dalam jumlah 10 ppm sangat dimungkinkan.

Kata Kunci: *Bioakumulasi*, *Tembaga (Cu)*, *Endapan Sedimen*, *Bacillus thuringiensis*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Alcaligenes faecalis*, *Tembaga (Cu)*.

ABSTRACT

Name : Altriana Eka Putri
NIM : 60300113048
Title : “Bioakumulasi heavy metals of copper (Cu) based on time of Sedimentary Deposition by Bacteria the Waters Around the Flats City of Makassar”

Heavy metals are the chemical elements with weights greater than 5 type gr/cm³ is located bottom right corner of the periodic table, has a high affinity towards the elements of S and usually atomic number 22 to 92 of the period 4 to 7. Heavy metal pollution is dangerous because of its nature which cannot be acumulation by the microorganisms so as to accumulate in the environment. High levels of Cu can give a negative impact on the environment of biotic or abiotic component, increased levels of Cu that is too high can give negative impact for animals and humans because of its carcinogenic. Research on the Bioakumulasi heavy metals of copper (Cu) based on time of Sedimentary Deposition by Bacteria the Waters Around the Flats City of Makassar has done in the month of March to June 2017. The purpose of this research is to look at the capabilities of the bioakumulasi of three kinds of bacteria against heavy metals of copper (Cu) by looking at the amount of the decrease of heavy metals by bacteria respectively. Media NA laced with heavy metals CuNO₃ as many as 10 ppm, in the inoculation bacterium *Bacillus thuringiensis*, *Pseudomonas aeruginosa* and *Alcaligenes faecalis* and incubated for 24 hours. Culturing the bacteria in the inoculation each 250 ml NB media later in the incubator shaker for 12 hours and is done 6 times of observations, measured temperature and pH do test Spectrophotometer UV-VIS to see its absorbance. Result observation of centrifuged and supernatan in SSA test to see the decline of metal weighing. From the results of the study, the third of bacteria capable down the levels of heavy metals each of 10 ppm be 3.47 ppm (isolates A) total 90% percent, 3.49 ppm (isolate B) total 2.60% and 90 ppm (isolates C) 100% percent of the total. Bioaccumulation ability of bacteria that sticks out is evidenced by bacteria isolates percentage decrease in the amount of C with as much as 100%. The results of this research show the Isolates (*Alcaligenes faecalis*) C has a very good bioaccumulation power so as to down the levels of of heavy metals Cu in the amount of 10 ppm is very possible.

Keyword: *Bioacumulation, Cooper (Cu), Deposition of sediment, Bacillus thuringiensis, Pseudomonas aeruginosa and Alcaligenes faecalis.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah swt. menurunkan al-Qur'an sebagai pedoman untuk manusia dalam melakukan setiap aktivitasnya di dunia termasuk aktivitas berpikir, menelaah, menganalisis dan meneliti. Sebagai seorang ilmuwan muslim, hendaklah kita menjadikan al-Qur'an sebagai sumber inspirasi kita untuk meneliti. Dalam penelitian ini adapun surah yang relevan sebagai inspirasi adalah surah Ar-Rum ayat 41 sebagai berikut:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ ٤١

Terjemahannya :

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar (Kementrian Agama, 2012).

Berdasarkan ayat diatas dapat disimpulkan yaitu telah nampak kerusakan di darat dan dilautan akibat dari perbuatan manusia sendiri. Karena merekalah yang ditugaskan tuhan untuk mengurus bumi ini. Mereka mempunyai inisiatif dan daya kreatif. Sedangkan segala makhluk selain manusia yang ada dipermukaan bumi ini bergerak hanya menurut tabiat dan instingnya yang telah ditetapkan Allah kepadanya, mereka tidak memiliki inisiatif atau naluri.

“Dari Abi Amir Ibn Jubair Ibn Abdillah, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Barang siapa yang berbuat baik dalam islam, maka ia akan memperoleh pahala dari perbuatan itu dan pahala dari orang yang melaksanakan atau meniru perbuatan itu setelahnya tanpa mengurangi pahala orang-orang yang menirunya. Dan barang siapa yang melakukan keburukan, maka ia akan mendapatkan dosa dari yang melakukannya itu tanpa mengurangi dosa orang yang menirunya” (H.R Muslim).

Ayat dari surah Ar-Rum mengingatkan akan adanya perbuatan tidak baik yang merusak dipermukaan bumi. Seharusnya manusia yang berakal hendaknya menjauhi perbuatan tidak baik itu, dan berbuat sesuatu yang berguna bagi masyarakat. Kalimat yang menyatakan bahwa dalam ayat ini agar mereka merasakan sebagian akibat perbuatan yang tidak baik mereka tersebut, itu merupakan rahmat dari Allah swt. Manusia yang berbuat tercela itu hanya sebagian saja dengan harapan hal itu akan menjadi penghambat bagi mereka agar tidak berbuat buruk lagi, dan agar mereka kembali kepada Allah swt.

Pencemaran lingkungan merupakan suatu keadaan yang terjadi karena perubahan kondisi tata lingkungan (tanah, udara dan air) yang tidak menguntungkan dan bersifat merusak dan merugikan kehidupan manusia, (binatang dan tumbuhan) yang disebabkan oleh kehadiran benda-benda asing seperti sampah, limbah industri, minyak dan logam berbahaya sebagai akibat perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan lingkungan tersebut tidak berfungsi seperti semula. Pencemaran dapat terjadi di udara, darat dan perairan (Aminah, 2009).

Pencemaran yang dapat ditimbulkan oleh limbah ada bermacam macam bentuk. Ada pencemaran berupa bau, warna, suara, bahkan pemutusan rantai dari suatu tatanan lingkungan hidup atau penghancuran suatu jenis organisme yang pada tingkat akhirnya akan menghancurkan tatanan ekosistemnya. Pencemaran yang dapat menghancurkan tatanan lingkungan hidup, biasanya berasal dari limbah-limbah yang sangat berbahaya dalam arti memiliki daya racun (*toksisitas*) yang tinggi. Limbah yang sangat beracun pada umumnya merupakan limbah kimia, apakah itu berupa senyawa kimia atau hanya dalam bentuk unsur. Biasanya senyawa kimia yang sangat beracun bagi organisme hidup dan manusia adalah senyawa kimia yang mempunyai bahan aktif dari logam berat. Daya racun yang dimiliki oleh bahan aktif dari logam berat akan bekerja sebagai penghalang kerja enzim dalam proses fisiologis atau metabolisme tubuh sehingga proses metabolisme terputus. Disamping itu bahan beracun dari senyawa kimia juga dapat terakumulasi atau menumpuk dalam tubuh, akibatnya timbul problema kronis (Palar, 2008).

Logam berat adalah unsur-unsur kimia dengan bobot jenis lebih besar dari 5 gr/cm³ terletak disudut kanan bawah sistem periodik, mempunyai afinitas yang tinggi terhadap unsur S dan biasanya bernomor atom 22 sampai 92 dari periode 4 sampai 7. Sebagai logam berat timbal (Pb), cadmium (Cd), dan merkuri (Hg) merupakan zat pencemar yang berbahaya, afinitas yang tinggi terhadap unsur S menyebabkan logam ini menyerang ikatan belerang dalam enzim, sehingga enzim bersangkutan menjadi tidak aktif (Dony, 2009).

Bioakumulasi adalah proses dimana mikroorganisme mampu mendegradasi atau memecah polimer alam (seperti lignin dan selulosa) dan polimer sintetik (seperti polietilen dan polistiren). Mikroorganisme mendegradasi polietilen dan poliuretan dengan memanfaatkannya sebagai sumber karbon untuk pertumbuhan mikroorganisme. Degradasi polimer tersebut akan membentuk formasi biofilm pada permukaan polimer. Proses degradasi diawali dengan polimer yang dirubah menjadi monomer kemudian monomer ini dimineralisasi. Sebagian besar polimer terlalu besar untuk melalui membran sel, jadi polimer harus dipolimerisasi menjadi monomer yang lebih kecil sebelum dapat diserap dan didegradasi dalam sel mikroba. Beberapa jenis mikroorganisme yang paling sering dimanfaatkan dalam Bioakumulasi adalah bakteri (Rohaeti, 2009).

Mikroba yang toleran terhadap logam berat disebut sebagai mikroba pengakumulasi logam berat. *Pseudomonas* dan *Bacillus* merupakan salah satu mikroba dinyatakan mampu mengakumulasi logam berat. Didalam tanah, sel-sel mikroba baik mati maupun hidup dan produknya dapat merupakan bioakumulator logam berat yang sangat efisien (Suhendrayatna, 2011).

Kota Makassar mempunyai luas wilayah 175,77 Km persegi, atau 0,28 persen dari luas Sulawesi Selatan. Setiap saat penduduk suatu daerah selalu mengalami perubahan, demikian pula yang dialami oleh Kelurahan Mariso Kecamatan Mariso Kota Makassar. Daerah ini merupakan salah satu dari beberapa daerah yang ada di kota Makassar yang masih kurang perhatian dan pengetahuan terhadap kesehatan lingkungan, sehingga pada daerah ini masyarakat membuang sampahnya sembarangan

di perairan seperti pada kanal, sungai dan nantinya akan menuju ke laut tanpa memperhatikan keadaan lingkungan sekitarnya dan dampak yang akan diakibatkan oleh perbuatan tersebut kedepannya (BPS, 2013).

Pembangunan rusunawa diharapkan mampu mengembangkan atau meningkatkan kualitas hidup penghuninya. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kondisi Rusunawa mengalami penurunan kualitas lingkungan hunian secara fisik maupun non fisik. Tujuan dibangunnya rumah susun itu sendiri untuk mengurangi kekumuhan, tetapi kenyataan yang terjadi bahwa rumah susun terlihat semakin kumuh, hal ini bisa saja disebabkan oleh prasarana yang kurang memadai, perilaku penghuni itu sendiri, ataupun manajemen yang kurang bagus dalam mengelola Rusunawa. Limbah domestik dari penghuni rusunawa itu sendiri di buang langsung ke kanal selanjutnya akan masuk ke badan perairan laut, hal tersebut dapat menyebabkan pencemaran lingkungan seperti pencemaran logam berat yang berdampak pada biota perairan yang bersifat toksik bagi kelangsungan makhluk hidup (Alamsyah, 2013).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dilakukan penelitian untuk melihat Bioakumulasi Logam Berat Tembaga (Cu) Berdasarkan Waktu Paparannya Oleh Bakteri Endapan Sedimen Perairan Sekitar Rumah Susun Kota Makassar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana bioakumulasi logam berat tembaga (cu) berdasarkan waktu paparannya oleh bakteri endapan sedimen perairan sekitar rumah susun kota makassar.

C. Ruang Lingkup Penelitian

1. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bioakumulasi logam berat tembaga (cu) berdasarkan waktu paparannya oleh bakteri endapan sedimen perairan sekitar rumah susun kota makassar.
2. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April-Juni 2017, yang bertempat di Laboratorium Mikrobiologi dan Laboratorium Kimia UIN Alauddin Makassar.

D. Kajian Pustaka

1. Penelitian sebelumnya oleh Mastang (2015) "*Isolasi Dan Identifikasi Bakteri Pengakumulasi Logam Berat Timbal (Pb) Pada Endapan Sedimen Kanal Sekitar Rumah Susun Kota Makassar*" Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah konsentrasi pencemaran logam berat timbal (Pb), mengetahui karakteristik morfologi dari koloni bakteri yang dapat mengakumulasikan logam berat timbal (Pb) dan mengetahui bakteri yang dapat mengakumulasikan logam berat timbal (Pb) pada endapan sedimen di perairan kanal sekitar rumah susun. Hasil tiga isolat bakteri yang memiliki tingkat pertumbuhan yang paling baik di media logam timbal (Pb) yang memiliki kemampuan untuk mengakumulasikan logam berat timbal yaitu isolat A8, B3 dan C2. Setelah diidentifikasi secara molekular menunjukkan bahwa

isolat A8 merupakan bakteri *Pseudomonas aeruginosa*, B3 merupakan bakteri *Alcaligenes faecalis* dan isolat C2 merupakan bakteri *Bacillus thuringiensis*. Ketiga isolat tersebut mampu mengakumulasi logam berat timbal (Pb) dengan konsentrasi 250 ppm pada media NB (*Nutrient Broth*) dan jumlah persentase absorbansi dengan masing-masing isolat A8 96 %, B3 98,4 % dan C2 99,8 %.

2. Penelitian sebelumnya oleh Wulandari (2005), *Identifikasi Bakteri Pengikat Timbal (Pb) Pada Sedimen di Perairan Sungai Siak*, yang bertujuan untuk mendapatkan isolat-isolat bakteri yang mampu mengikat logam berat khususnya timbal (Pb) untuk mengurangi pencemaran timbal dari limbah industri secara biologis dan diharapkan dapat memberikan informasi tentang peran mikroorganisme (bakteri) sebagai pengikat (biosorbent) logam berat khususnya timbal untuk mengurangi pencemaran di suatu perairan sungai. Jumlah total bakteri pengikat Timbal (Pb) pada sedimen di perairan sungai Siak Pekanbaru berkisar antara $3,0 \times 10^7$ sampai $1,5 \times 10^8$ sel/ml. Isolasi bakteri pengikat Timbal (Pb) pada sedimen di perairan sungai Siak Pekanbaru yang ditemukan 6 jenis yaitu *Micrococcus*, *Corynebacterium*, *Phenylobacterium*, *Enhydrobacter*, *Morrococcus*, *Flavobacterium*.
3. Primaharinastiti, dkk (2004) yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan mikroorganisme dalam mengakumulasi logam berat, berdasarkan banyaknya industri yang berkembang selama ini, ternyata tidak ramah lingkungan dan menghasilkan limbah yang dapat menyebabkan pencemaran, terutama di lingkungan perairan termasuk pencemaran logam berat karena adanya penambangan, peningkatan penggunaan logam berat dalam berbagai industri, serta

adanya limbah industri yang mengandung logam berat yang menjadi penyebab utama terjadinya keracunan logam berat dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan pengamatan kerapatan optik suspensi sel dan kurva pertumbuhan bakteri *Bacillus sp* yang diperoleh dalam penelitian ini waktu optimal melakukan pemanenan sel adalah 42 jam setelah inkubasi. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, disimpulkan bahwa *Bacillus sp* dalam media cair *Nutrient Broth*, pada suhu kamar dengan lama inkubasi 42 jam mampu menurunkan kadar Cu dalam filtrat media sebesar 8,912–12,623% dari kadar Cu awal, dengan nilai rata-rata sebesar 10,8558%. Kemampuan mengakumulasi logam berat Cu dalam media sebesar berat per berat sel kering 0,1149–0,1400 %/mg sel, dengan nilai rata-rata sebesar 0,1270%/mg sel.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Anuradha R Mulik dan Rama K Bhadekar (2017) yaitu ada empat isolat dalam penelitian yang ditanam pada empat logam (10 ppm) secara individual di LB dengan rentan waktu selama 48 jam. Setiap kultur pada media LB, disentrifugasi pada 10.000 rpm selama 10 menit untuk mendapatkan pellet sel dan dianalisa untuk distribusi ion logam dalam sel-sel. Pada hasil penelitian ini, akumulasi dan dinding sel adsorpsi logam diperkirakan menggunakan metode yang dijelaskan oleh Al – Momani, absorpsi logam pada dinding sel yang ditentukan oleh pellet sel isolat masing-masing dengan 10 ml 0.1 M natrium sitrat untuk 10 menit, dilakukan sebanyak 3 kali untuk melepaskan kation dari dinding sel. Akumulasi logam yang mengalami penurunan dikumpulkan sel pelletnya pada 10 ml asam nitrat (35% HNO₃). Sampel yang dianalisis oleh ICP-OES distribusi

logam di setiap bagian seluler dihitung dalam mg/g biomassa. Kami mengamati maksimum penurunan Pb^{2+} dan Cd^{2+} dari sel eksterior BRI 36 dan 38 masing-masing yang dapat dipertanggungjawabkan akumulasi logam. Cukup bakteri halophilic yang diisolasi dari salinitas lingkungan Iran dalam pengambilan lebih dari 90% dan 50% timbal dan kadmium. Massadeh telah melaporkan isolat bakteri dari pantai laut mati menunjukkan penyerapan Cd dan Pb dari 86,8 menjadi 96,0% dan 82,60 % menjadi 93,2%, masing-masing dalam 3 minggu.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bioakumulasi logam berat tembaga (Cu) berdasarkan waktu paparannya oleh bakteri endapan sedimen perairan sekitar rumah susun kota makassar.

F. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada:

1. Bagi Instansi

- a. Sebagai masukan bagi pengambil keputusan suatu instansi atau institusi dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pencemaran logam berat.
- b. Sebagai tambahan informasi bahwa bakteri endapan sedimen sekitar rumah susun kota Makassar mampu mengakumulasi logam berat khususnya logam berat tembaga (Cu) pada konsentrasi yang telah ditentukan.

2. Bagi Masyarakat

Menambah pengetahuan masyarakat untuk peka terhadap situasi lingkungan di sekitar yang berhubungan dengan kesehatan.

3. Bagi Peneliti maupun Perguruan Tinggi

- a. Menambah pengetahuan peneliti dan sebagai masukan pengetahuan kepada peneliti mengenai bioakumulasi logam berat tembaga (cu) berdasarkan waktu paparannya oleh bakteri endapan sedimen perairan sekitar rumah susun kota makassar.
- b. Dapat dijadikan bahan kajian untuk penelitian selanjutnya yang relevan.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Ayat Yang Relevan

Ayat yang relevan pada penelitian ini yaitu, Allah swt berfirman dalam surah Ar-Ra'd (13): 17 berbunyi:

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَهُ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ أَبْيَغَاءَ حَلِيَّةٍ أَوْ مُتَعًا زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ١٧

Terjemahnya:

Allah telah menurunkan air (hujan) dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, maka arus itu membawa buih yang mengambang. Dan dari apa (logam) yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada (pula) buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan (bagi) yang benar yang bathil. Adapun buih itu, akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya; adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan (Kemenetrian Agama RI, 2012).

Yang dimaksud dengan firman-Nya *amma ma yanfa'u an-nasa* atau adapun yang bermanfaat bagi manusia adalah air bukan buihnya dan logam setelah dibakar dan hilang kotorannya. Ayat ini tidak menyebut air dan logam itu secara langsung tetapi menegaskan manfaatnya. Hal tersebut untuk mengisyaratkan bahwa yang penting bukan air atau logamnya, tetapi manfaat yang harus dihasilkan oleh air dan logam itu. Demikian juga yang haq, yang penting bukanlah ide-ide yang benar, yang berada di menara gading atau mengawang-awang di angkasa, tetapi yang lebih penting adalah manfaat dan penerapan ide-ide yang benar itu dalam kehidupan duniawi sehingga dapat

memberi manfaat. Karena apakah arti *al-haq* atau kebenaran jika ia tidak ditempatkan di menara gading? Atau jika ia tidak membuni. Selanjutnya yang dimaksud bermanfaat di sini mencakup aneka manfaat, baik jasmani maupun rohani, baik perorangan maupun kolektif, baik dunia maupun akhirat.

Banyak ulama memahami bahwa ayat di atas menampilkan dua macam perumpamaan, masing-masing untuk kebenaran dan untuk kebatilan. Contoh pertama bagi kebenaran adalah air yang mengalir dengan sangat deras dan contoh kedua adalah logam dengan kualitasnya yang jernih. Sedang contoh pertama dari kebatilan adalah buih yang dihasilkan oleh derasnya arus air dan contoh kedua adalah karat yang keluar akibat pembakaran logam.

Dari berbagai barang tambang yang dihasilkan manusia melalui proses pembakaran seperti emas, perak, tembaga dan timah ada yang dapat dijadikan perhiasan atau peralatan seperti bejana, ada juga yang berupa sampah seperti sampah air yang mengapung di atas permukaan air. Bagian barang tambang yang mengalir itu disebut *khabits* (limbah). Dengan tamsil air dan limbahnya serta tambang dan limbahnya itu, Allah menerangkan kebenaran dan kebatilan. Kebenaran diibaratkan sebagai air dan tambang yang jernih, sedangkan kebatilan diibaratkan sebagai limbah air dan limbah tambang yang tidak mungkin dapat dimanfaatkan dan akan lenyap dan terbuang. Sedangkan air jernih dan tambang jernih yang dapat berguna untuk kepentingan manusia akan bertahan di dalam tanah agar dapat dimanfaatkan. Dengan

tamsil yang sangat jelas seperti itulah Allah swt. memperlihatkan kebaikan dan kejahatan kepada manusia (Shihab, 2002).

B. Tinjauan Umum Lingkungan

Pencemaran atau polusi adalah suatu kondisi yang telah berubah dari bentuk asal pada keadaan yang lebih buruk. Pergeseran bentuk tatanan dari kondisi asal pada kondisi yang buruk ini dapat terjadi sebagai akibat masukan dari bahan pencemar atau polutan. Bahan polutan tersebut pada umumnya mempunyai sifat racun (toksik) yang berbahaya bagi organisme hidup (Palar, 2008).

Semakin pesatnya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, terutama di bidang industri, telah membawa dampak yang beragam bagi kehidupan masyarakat baik dampak positif maupun negatif. Dampak positif dari semakin modernnya industri adalah berkembangnya penemuan obat-obat baru, mesin-mesin baru yang canggih, pemanfaatan sumber-sumber alam yang optimal, dan sebagainya. Sedangkan dampak negatif yang menyertainya dan paling dirasakan adalah semakin besarnya pencemaran lingkungan. Banyak industri yang berkembang selama ini, ternyata tidak ramah lingkungan dan menghasilkan limbah yang dapat menyebabkan pencemaran, terutama di lingkungan perairan termasuk pencemaran logam berat karena adanya penambangan, peningkatan penggunaan logam berat dalam berbagai industri, serta adanya limbah industri yang mengandung logam berat yang menjadi penyebab utama terjadinya keracunan logam berat dalam kehidupan masyarakat. Logam berat merupakan senyawa toksik bila berada dalam tubuh manusia di atas ambang

konsentrasi tertentu dan hanya dapat ditoleransi pada tingkat mikrogram (Primaharinastiti, 2004).

Suatu tatanan lingkungan hidup dapat tercemar atau menjadi rusak disebabkan oleh banyak hal. Namun yang paling utama dari sekian banyak penyebab tercemarnya suatu tatanan lingkungan adalah limbah. Limbah dalam konotasi sederhana dapat diartikan sebagai sampah. Limbah atau polutan, dapat digolongkan atas beberapa kelompok berdasarkan pada jenis, sifat dan sumbernya berdasarkan pada jenis, limbah digolongkan atas limbah padat dan limbah cair. Berdasarkan pada sifat yang dibawanya, limbah digolongkan atas limbah organik dan limbah anorganik. Sedangkan bila berdasarkan pada sumbernya, limbah dikelompokkan atas limbah rumah tangga atau limbah domestik dan limbah industri (Palar, 2008).

Agama islam dibangun di atas kaidah yaitu, meraih kemaslahatan dan mencegah keburukan. Inilah pokok yang agung dan kaidah yang menyeluruh, mencakup keseluruhan permasalahan agama. Semua ajaran Islam berporos pada meraih kemaslahatan agama, dunia dan akhirat serta mencegah kerusakan agama, dunia dan akhirat. Tidaklah Allah swt. memerintahkan sesuatu melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan yang tak terhitung banyaknya. Demikian pula sebaliknya, tidaklah Allah swt. melarang dari sesuatu melainkan di dalamnya terdapat kerusakan yang tak terhitung banyaknya, tidak terkecuali dalam hal menjaga kelestarian lingkungan disekitar kita.

Ketahuiilah, bahwa Allah swt. Telah berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 106 yang berbunyi:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ
صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠

Terjemahnya:

Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya adzab yang besar (Kemenetrian Agama RI, 2012).

Dari Abu Sa'id Al Khudry radiyallahu'anhu berkata: saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barang siapa diantara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu dengan tangannya, dengan lisannya. Jika tidak mampu dengan lisannya, dengan hatinya; dan itulah selema lemah iman" (HR. Muslim).

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, bahwa, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: " Apabila aku melarangmu dari sesuatu maka jauhi dia. Bila aku perintahkan kamu suatu perkara maka tunaikanlah semampumu." (HR. Al-Bukhari)

Dari hadist tersebut dapat kita pahami bahwa dalam masalah larangan, Rasulullah saw. telah menyuruh kita menjauhi dan meninggalkan larangan itu secara menyeluruh (semuanya) sedang dalam masalah perintah melaksanakannya tergantung kemampuan kita. Hal ini (sekali lagi) juga mengisyaratkan bahwa menolak mudharat lebih diutamakan daripada mengambil manfaat (sementara).

Dari surah An-Nahl ayat 106 tersebut diperoleh penjelasan bahwa jika seseorang dalam keadaan dipaksa kafir sedang hatinya tetap dalam keadaan beriman

(hatinya tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas), maka tidak ada dosa baginya. Sedangkan batasan terpaksa sebagaimana penjelasannya surah An-Nahl ayat 106 tersebut adalah mengancam jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa menolak mudharat/bahaya (yaitu menghindari terancamnya jiwa) adalah lebih didahulukan daripada mengambil manfaat, yaitu mempertahankan keimanan (dengan catatan, hatinya tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas).

Ayat alqur'an dan hadist diatas dapat diambil kesimpulan, bahwa Allah swt. telah menjanjikan sesuatu yang baik bagi orang-orang yang tetap pada keimanannya dan berbuat kebajikan, sedangkan bagi yang mengingkari kebajikan akan mendapatkan balasan yang setimpal. Hadist diatas juga menerangkan bahwa, Rasulullah mengajarkan jika melihat kemungkaran hendaklah kita sebagai orang-orang yang memiliki iman dapat berperilaku selayaknya makhluk beriman karena memberi peringatan sesungguhnya adalah hal yang berfaedah bagi orang yang berilmu.



C. Tinjauan Umum Logam Berat

Badjoeri (2010) menyatakan bahwa logam berat merupakan bahan polusi berbahaya karena sifatnya yang tidak dapat didegradasi oleh mikroorganisme sehingga terakumulasi di lingkungan.

Logam berat masih termasuk golongan logam dengan kriteria yang sama dengan logam lain. Perbedaannya terletak dari pengaruh yang dihasilkan bila logam berat ini berikatan dan masuk ke dalam tubuh organisme hidup. Sebagai contoh bila unsur logam besi (Fe) masuk ke dalam tubuh, meski dalam jumlah agak berlebihan, biasanya tidaklah menimbulkan pengaruh yang buruk terhadap tubuh. Karena unsur besi (Fe) dibutuhkan dalam darah untuk mengikat oksigen. Sedangkan unsur logam berat baik itu logam berat beracun yang dipentingkan seperti tembaga (Cu), bila masuk ke dalam tubuh dalam jumlah berlebihan akan menimbulkan pengaruh yang buruk terhadap fungsi fisiologis tubuh. Jika yang masuk ke dalam tubuh organisme hidup adalah unsur logam berat beracun seperti Hydragyrum (Hg), Plumbum (Pb), Cadmium (Cd) dalam jumlah yang banyak dan terakumulasi dalam tubuh maka dapat dipastikan bahwa organisme tersebut akan langsung keracunan (Palar, 2008).

Logam berat digolongkan menjadi dua jenis yaitu logam berat esensial dan non esensial. Logam berat esensial adalah logam yang keberadaannya dalam jumlah tertentu sangat dibutuhkan oleh organisme hidup, namun dalam jumlah yang berlebihan dapat menimbulkan efek racun. Contoh logam berat ini adalah Zn, Cu, Fe, Co, dan Mn sedangkan logam berat non esensial yaitu logam yang keberadaannya dalam tubuh belum diketahui manfaatnya atau bahkan dapat bersifat racun, seperti Hg, Cd, Pb, dan Cr. Logam ini dapat menimbulkan efek kesehatan bagi manusia tergantung pada bagaimana logam berat tersebut terikat dalam tubuh. Daya racun yang dimiliki akan bekerja sebagai penghalang kerja enzim, selain itu logam berat ini akan bertindak sebagai penyebab alergi, mutagen atau karsinogen bagi manusia (Putra, 2005).

Logam berat merupakan senyawa toksik bila berada di atas tubuh manusia di atas ambang konsentrasi tertentu (Wardhana, 2004). Istilah logam biasanya diberikan kepada semua unsur kimia dengan ketentuan atau kaidah-kaidah tertentu. Unsur ini dalam kondisi suhu kamar, tidak selalu berbentuk padat melainkan ada yang berbentuk cair. Menurut (Palar, 2008) melihat kepada bentuk dan kemampuan atau daya yang ada pada setiap logam, maka dapatlah diketahui bahwa setiap logam haruslah:

- a. Memiliki kemampuan yang baik sebagai penghantar daya listrik (konduktor).
- b. Memiliki kemampuan sebagai penghantar panas yang baik .
- c. Memiliki kerapatan yang tinggi.
- d. Dapat membentuk alloy dengan logam lainnya.
- e. Untuk logam yang padat, dapat ditempa dan dibentuk.

Kontaminasi logam berat pada air menyajikan dampak bahaya kesehatan masyarakat dan lingkungan karena akumulasi mereka di rantai makanan bebas-terurai polutan dan di alam. Utamanya digunakan sebagai bahan baku industri manufaktur baterai, plating, pertambangan, dan tanneries. Karena parahnya dan efek toksik kronis di kesehatan hewan dan manusia, lingkungan perlindungan Agency (EPA) menyatakan standar dalam air minum dan air limbah adalah 0,05 dan 0,5 mg/l. Namun, konsentrasi ion timbal dari 20-400 mg/l telah dinyatakan terdapat pada air limbah dari beberapa sumber industri, hal ini merupakan kandungan yang lebih tinggi dari ambang batas yang ditentukan oleh EPA4. Oleh karena itu, konsentrasi logam berat harus

dikendalikan dan dimonitor agar tetap pada ketetapan peraturan lingkungan perlindungan agency (EPA) (Weiwei,dkk, 2016).

Klasifikasi pencemaran logam berat berdasarkan lokasinya (Sarjono,2009):

1. Pada perairan estuaria, pencemaran memiliki hubungan erat dengan penggunaan logam oleh manusia.
2. Pada perairan laut lepas kontaminasi logam berat biasanya terjadi secara langsung dari atmosfer atau karena tumpahan minyak dari kapal-kapal tanker yang melaluinya.
3. Sedangkan diperairan sekitar pantai kontaminasi logam berat kebanyakan berasal dari mulut sungai yang terkontaminasi oleh limbah buangan industri atau pertambangan.

Menurut USEPA (U.S Enviromental Agency) dalam Suhendrayatna (2001) mendata 13 logam berat yang merupakan elemen utama polusi yaitu antimon, arsen, berilium, kadmium, kromium, tembaga, timbal, merkuri, nikel, selenium, silver, talium, dan zink. Beberapa ion logam berat seperti arsen, timbal, kadmium, dan merkuri diketahui cukup berbahaya bagi kesehatan manusia dan kelangsungan hidup di alam.

Logam berat tidak seperti material organik yang dapat terdegradasi tetapi terakumulasi pada organisme hidup. Banyak logam berat merupakan logam yang beracun dan bersifat karsinogenik. Beberapa faktor yang mempengaruhi aktivitas

keracunan setiap jenis logam antara lain: bentuk senyawa dari logam tersebut, daya kelarutan dalam cairan, ukuran partikel, dan beberapa sifat kimia dan sifat fisiknya (Wang, 2011).

Adapun sifat-sifat logam berat (Sutamihardja, 1982) yaitu:

1. sulit didegradasi, sehingga mudah terakumulasi dalam lingkungan perairan dan keberadaanya secara alami sulit terurai (dihilangkan),
2. dapat terakumulasi oleh organisme termasuk kerang dan ikan, serta dapat membahayakan kesehatan manusia yang mengkonsumsi organisme tersebut,
3. mudah terakumulasi di sedimen, sehingga konsentrasinya akan lebih tinggi dari konsentrasi logam dalam air. Selain itu, sedimen mudah tersuspensi karena pergerakan massa air yang akan melarutkan kembali logam yang dikandungnya di dalam air, sehingga sedimen menjadi sumber pencemar potensial dalam skala waktu tertentu.

Logam berat di alam dapat berasal dari erosi batuan tambang dan vulkanisme. Proses alam seperti perubahan siklus alami mengakibatkan batuan-batuan dan gunung berapi memberikan kontribusi yang sangat besar ke lingkungan. Selain itu masuknya logam berat juga dapat berasal dari aktivitas manusia, seperti pertambangan minyak, emas dan batu bara, pembangkit tenaga listrik, pestisida, keramik, peleburan logam dan pabrik-pabrik pupuk serta kegiatan industri lainnya (Suhendrayatna, 2001 dalam Sarjono, 2009).

D. Tinjauan Umum Logam Berat Tembaga (Cu)

Tembaga (Cu) adalah logam dengan nomor atom 29, massa atom 63,546, titik lebur 1083 °C, titik didih 2310 °C, jari-jari atom 1,173 Å dan jari-jari ion Cu²⁺ 0,96

A°. Tembaga adalah logam transisi (golongan I B) yang berwarna kemerahan, mudah regang dan mudah ditempa. Tembaga bersifat racun bagi makhluk hidup. Isoterm adsorpsi merupakan suatu keadaan kesetimbangan yaitu tidak ada lagi perubahan konsentrasi adsorbat baik di fase terserap maupun pada fase gas atau cair. Isoterm adsorpsi biasanya digambarkan dalam bentuk kurva berupa plot distribusi kesetimbangan adsorbat antara fase padat dengan fase gas atau cair pada suhu konstan. Isoterm adsorpsi merupakan hal yang mendasar dalam penentuan kapasitas dan afinitas adsorpsi suatu adsorbat pada permukaan adsorben (Wiyuniati,2008).

Tembaga (Cu) merupakan logam transisi golongan IB yang memiliki nomor atom 29 dan berat atom 63,55 g/mol. Tembaga dalam bentuk logam memiliki warna kemerah-merahan, namun lebih sering ditemukan dalam bentuk berikatan dengan ion-ion lain seperti sulfat sehingga memiliki warna yang berbeda dari logam tembaga murni. Tembaga sulfat pentahidrat ($\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$) merupakan salah satu bentuk persenyawaan Cu yang sering ditemukan. Senyawa tersebut biasa digunakan dalam bidang industri, misalnya untuk pewarnaan tekstil, untuk penyepuhan, pelapisan, dan pembilasan pada industri perak. Selain itu, tembaga sulfat pentahidrat juga marak digunakan dalam bidang pertanian dan peternakan, yaitu sebagai fungisida, algasida, pupuk Cu, dan sebagai zat pengatur pertumbuhan untuk babi (Alloway, 1995).

Logam Cu dapat masuk ke dalam semua strata lingkungan, baik itu pada strata perairan, tanah ataupun udara (lapisan atmosfer). Tembaga yang masuk ke dalam strata lingkungan dapat datang dari bermacam-macam sumber. Tetapi sumber-sumber masukan logam Cu ke dalam strata lingkungan yang umum dan diduga paling banyak

adalah dari kegiatan-kegiatan perindustrian, kegiatan rumah tangga dan dari pembakaran serta mobilitas bahan-bahan bakar (Palar, 1994).

Secara biologis Cu tersedia dalam bentuk Cu^+ atau Cu^{2+} dalam garam inorganik dan kompleks inorganik. Perpindahan Cu dengan konsentrasi relatif tinggi dari lapisan tanah bumi ditentukan oleh cuaca, proses pembentukan tanah, pengairan, potensial oksidasi reduksi, jumlah bahan organik di tanah dan pH. Kondisi tanah yang asam akan meningkatkan kelarutan Cu, sedangkan pada kondisi basa Cu cenderung dipresipitasi oleh tanah sehingga akan terlarut dan terbawa air yang mengakibatkan defisiensi Cu pada tanaman. Variasi kualitas tanah mempengaruhi pengambilan Cu oleh akar tanaman. Pada tanaman, Cu diakumulasi di akar dan dinding sel serta didistribusikan melalui berbagai cara (Merian, 1994).

Tembaga (Cu) dapat diperoleh dari hasil pelapukan/pelarutan mineral-mineral yang terkandung dalam bebatuan. Polusi yang disebabkan oleh logam tembaga berasal dari industri-industri tembaga, pembakaran batu bara, pembakaran kayu, minyak bumi, dan buangan di area pemukiman/perkotaan (Lahuddin, 2007).

Penggunaan Cu yang semakin meluas akan meningkatkan kadar Cu di lingkungan. Proses produksi seperti pewarnaan, penyepuhan, dan pembilasan yang menggunakan logam Cu akan menghasilkan limbah yang mengandung Cu kadar tinggi, misalnya saja limbah padat proses *deinking* industri kertas. Limbah padat tersebut mengandung Cu sebesar 110 ppm sedangkan ambang batas Cu dalam limbah sesuai

peraturan Bapedal (Kep.04/Bapedal/09/1995) hanya sebesar 100 mg/kg (Hardiani, 2009).

Tembaga adalah logam yang secara jelas mengalami proses akumulasi dalam tubuh hewan seiring dengan pertambahan umurnya, dan ginjal merupakan bagian tubuh ikan yang paling banyak terdapat akumulasi Tembaga. Paparan Tembaga dalam waktu yang lama pada manusia akan menyebabkan terjadinya akumulasi bahan-bahan kimia dalam tubuh manusia yang dalam periode waktu tertentu akan menyebabkan munculnya efek yang merugikan kesehatan penduduk (Widowati, 2008).

Gejala yang timbul pada manusia yang keracunan Cu akut adalah mual, muntah, sakit perut, hemolisis, nefrosis, kejang, dan akhirnya mati. Pada keracunan kronis, Cu tertimbun dalam hati dan menyebabkan hemolisis. Hemolisis terjadi karena tertimbunnya H_2O_2 dalam sel darah merah sehingga terjadi oksidasi dari lapisan sel yang mengakibatkan sel menjadi pecah. Defisiensi suhu dapat menyebabkan anemia dan pertumbuhan terhambat (Darmono, 1995).

Logam berat berbahaya bagi manusia karena dapat mengakibatkan efek biotoksik pada manusia yang kemudian menimbulkan penyakit akut maupun kronis. Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) menemukan bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan dari keberadaan logam berat di rantai makanan (Srivastava, 2010).



Gambar logam berat tembaga (CuNO_3) (www.Google.Id http://: 29 Juli 2017)

E. Tinjauan Umum Bakteri

Bakteri merupakan mikroba uniseluler. Pada umumnya bakteri tidak mempunyai klorofil. Ada beberapa yang fotosintetik dan reproduksi seksualnya secara pembelahan. Bakteri disebut juga sebagai *Ubiquitous*, artinya ada dimana-mana. Jumlah bakteri tergantung keadaan sekitar. Misalnya jumlah bakteri di dalam tanah tergantung jenis dan tingkat kesuburan tanah (Hidayat dkk, 2006).

ALAUDDIN
M A K A S S A R

1. Perbedaan Susunan Gram Positif dan Gram Negatif

No	Gram Positif	Gram Negatif
1	Komponen terbesar dari mukopeptida	Terdiri dari tiga lapisan yaitu lapisan dalam adalah mukopeptida. Lapisan bagian luar terdiri dari dua lapisan yaitu lipopolisakarida dan lipoprotein
2	Pada beberapa bakteri terdapat asam teikhoit	Tida ada asam teikhoit
3	Mikopeptida mengalami lisis oleh lisoenzim	Lisoenzim melunakkan dinding sel
4	Dinding sel tebal, 25-30 μm	Dinding sel tipis, 10-15 μm

2. Karakteristik Bakteri

Bakteri umumnya berukuran kecil dengan karakteristik dimensi sekitar 1 μm . bentuknya dapat bulat atau *cocci*, batang atau *bacilli*. Sel dapat berbentuk tunggal ataupun rangkaian. Beberapa kelompok memiliki flagel dan dapat bergerak aktif. Bakteri memiliki berat jenis 1,05 – 1,1 g cm^{-3} dan berat sekitar 10-12 g sebagai partikel kering. Ukuran aktual tergantung dari laju pertumbuhan, media tumbuh dan sebagainya. Ada tiga bentuk dasar bakteri, yaitu bentuk bulat atau *Coccus*, bentuk batang atau *Silindris*, bentuk lengkung atau *Vibrio* (Hidayat dkk, 2006).

Bentuk bulat pada jenis bakteri ini sebenarnya tidak ada bakteri yang betul-betul bulat, tetapi sferoid. Bentuk bulat atau coccus dapat dibedakan yaitu, *Micrococcus* yaitu bulat satu, *Diplococcus* bulat bergandengan dua, *Streptococcus* bulat bergandengan seperti rantai sebagai hasil pembelahan sel ke satu atau dua arah dalam satu garis, *Tetracoccus* bulat terdiri dari empat sel yang tersusun dalam bentuk bujur sangkar sebagai hasil pembelahan sel ke dua arah, *Sarcina* bulat terdiri dari delapan sel yang tersusun dalam bentuk kubus sebagai hasil pembelahan sel ke tiga arah, *Staphilococcus* bulat tersusun sebagai kelompok buah anggur sebagai hasil pembelahan sel ke segala arah (Hidayat dkk, 2006).

Bentuk batang, pada jenis bakteri berbentuk batang dapat dibedakan ke dalam bentuk batang panjang dan batang pendek dengan ujung datar atau lengkung. Bentuk batang dapat dibedakan lagi atas bentuk batang yang mempunyai garis tengah sama dan tidak sama di seluruh bagian panjangnya. Bakteri bentuk batang dapat terdiri atas sel tunggal bergandengan dua-dua (*Diplocillus*) dan sebagai rantai (*Streptobacillus*) (Hidayat dkk, 2006).

Bentuk lengkung pada jenis bakteri berbentuk lengkung pada pokoknya dapat dibagi menjadi bentuk koma (*Vibrio*), jika lengkungnya kurang dari setengah lingkaran. Jika spiralnya halus dan lentur disebut *Spirochaeta* jika spiralnya tebal dan kaku disebut *Spirillum* (Hidayat dkk, 2006).

3. *Morfologi Bakteri*

Secara harfiah morfologi berarti pengetahuan tentang bentuk (*morphos*). Morfologi dalam cabang ilmu biologi ilmu tentang bentuk organisme, terutama hewan dan tumbuhan dan mencakup bagian-bagiannya. Populasi bakteri tumbuh dengan cepat ketika mereka disertakan dengan gizi dan kondisi lingkungan yang memungkinkan mereka untuk berkembang. Melalui pertumbuhan ini, berbagai jenis bakteri kadang-kadang menghasilkan koloni yang khas dalam penampilan. Beberapa koloni mungkin akan berwarna, ada yang berbentuk lingkaran, sementara yang lain tidak teratur. Morfologi koloni merupakan salah satu cara untuk dapat mengidentifikasi bakteri. Morfologi koloni dapat ditinjau dari berbagai aspek, yaitu bentuk (*shape*), tepi atau pinggir (*edge*), ketinggian (*elevation*), ukuran (*size*), permukaan (*surface*), kekentalan atau kepadatan (*consistency*), bau (*odor*), transparansi (*opacity*) dan pigmentasi (*chromogenesis*) (Nadyah, 2011).

4. *Habitat Bakteri*

Bakteri tersebar luas di alam, di dalam tanah, di atmosfer, di dalam endapan-endapan lumpur, di dalam lumpur laut, dalam air, pada sumber air panas, di daerah antartika, dalam tubuh manusia, hewan, dan tanaman (Hidayat dkk, 2006).

5. *Struktur Bakteri*

Menurut (Nadyah, 2011). Bakteri memiliki 2 pembagian struktur yaitu:

- a. Struktur dasar (dimiliki oleh hampir semua jenis bakteri). Meliputi dinding sel, membran plasma, sitoplasma, ribosom dan DNA.

- b. Struktur tambahan (dimiliki oleh jenis bakteri tertentu) meliputi kapsul, flagellum, pilus dan fimbria, klorosom, vakuola gas dan endospora.


6. *Sifat Bakteri*

Pada bakteri ada yang bersifat hidup bebas, hidup sebagai saproba, hidup sebagai parasit dan ada pula yang hidup sebagai patogen (Aminah, 2009).

7. *Fase Pertumbuhan Bakteri*

Menurut (Nadyah, 2011) pada pertumbuhan bakteri terdiri atas beberapa fase yaitu :

- a. Fase lag (lambat), merupakan fase dimana bakteri beradaptasi dengan lingkungannya dan mulai bertambah sedikit demi sedikit.
- b. Fase logaritmik (eksponensial), merupakan fase dimana pembiakan bakteri berlangsung paling cepat. Jika ingin mengadakan piaraan yang cepat tumbuh, maka bakteri pada fase ini baik sekali untuk dijadikan inokulum.
- c. Fase stasioner, merupakan fase dimana jumlah bakteri yang berkembang biak sama dengan jumlah bakteri yang mengalami kematian.
- d. Fase autolisis (kematian), adalah fase dimana jumlah bakteri yang mati semakin banyak, melebihi jumlah bakteri yang berkembang biak. Fase kematian ditandai dengan cepat meratanya koloni dan jumlah bakteri yang mati semakin bertambah. Keadaan ini dapat berlangsung beberapa minggu bergantung pada spesies dan keadaan medium serta faktor lingkungan.



Gambar kurva pertumbuhan bakteri (www.Google.Id http//: 29 Juli 2017).

8. *Metabolisme Bakteri*

Bakteri memiliki energi dan material mentah membutuhkannya untuk proses metabolisme dan reproduksi melalui media reaksi kimia. Alam menyediakan sejumlah besar reaksi tersebut, dan zat-zat bakteri telah menggunakannya. Konsekuensinya, bakteri terlibat dalam proses biogeokimia dalam air dan tanah. Partisipasi bakteri sangat esensial, dalam banyak siklus elemen penting di alam, termasuk elemen nitrogen, karbon dan sulfur. Zat-zat ini mengakibatkan formasi dari banyak deposit mineral termasuk besi dan mangan. Pada skala yang lebih kecil, beberapa deposit terbentuk melalui aksi bakteri pada sistem air alam dan pipa. Metabolisme bakteri berhubungan dengan proses-proses biokimia melalui modifikasi zat-zat dalam sel-sel bakteri. Hal tersebut merupakan suatu cara untuk memperoleh energi dan material sel dari substansi nutrient (Nadyah, 2011).

F. Bakteri Pengakumulasi Logam Berat

Bioremediasi didefinisikan sebagai penggunaan organisme hidup, terutama mikroorganisme, untuk mendegradasi pencemaran lingkungan yang merugikan ke tingkat atau bentuk yang lebih aman. Proses bioremediasi ini dapat dilakukan dengan cara bioaugmentasi yaitu penambahan atau introduksi satu jenis atau lebih mikroorganisme baik yang alami maupun yang sudah mengalami perbaikan sifat, dan biostimulasi yaitu suatu proses yang dilakukan melalui penambahan zat gizi tertentu yang dibutuhkan oleh mikroorganisme atau menstimulasi kondisi lingkungan sedemikian rupa (misalnya pemberian aerasi) agar mikroorganisme tumbuh dan beraktivitas dengan baik. Dalam proses degradasinya, mikroba menggunakan senyawa kimia tersebut untuk pertumbuhan dan reproduksinya melalui berbagai proses oksidasi (Aminah, 2009).

Mikroorganisme sangat berperan dalam proses degradasi bahan buangan dari kegiatan industri yang dibuang ke air lingkungan, baik sungai, danau maupun laut. Jika bahan buangan yang harus didegradasi cukup banyak berarti mikroorganisme akan ikut berkembang biak. Pada perkembangbiakan mikroorganisme ini tidak menutup kemungkinan bahwa mikroba patogen ikut berkembang pula (Aminah, 2009).

Mikroba pada habitat terkontaminasi logam berat mengembangkan beberapa mekanisme toleransi terhadap logam berat, yaitu dengan cara *efflux*, kompleksasi atau reduksi logam berat atau menggunakan logam berat sebagai penerima terakhir elektron pada respirasi anaerob. Mekanisme toleransi terhadap logam seperti tembaga, seng, arsenik, kromium, kadmium, and nikel telah diidentifikasi dan digambarkan dengan

detail. Sebagian besar mekanisme toleransi mikroba terhadap logam adalah dengan cara *efflux* metal ke luar sel (Spain, 2003).

Mikroba yang toleran logam berat dengan mekanisme selain *efflux* disebut sebagai mikroba pengakumulasi logam berat. Bakteri ini dapat dimanfaatkan untuk mengatasi pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh logam berat. Bakteri, kapang, ganggang, dan ragi mampu mengakumulasi logam berat Ag, Au, Cd, Co, Cu, Fe, Ni, U, Zn. *Pseudomonas*, *Thiobacillus*, *Bacillus*, dan bakteri penambat N₂ dilaporkan mampu mengakumulasi logam berat. Di dalam tanah, sel-sel mikroba baik mati maupun hidup dan produknya dapat merupakan bioakumulator logam berat yang sangat efisien (Mullen, 1989).

Badjoeri dan Zarkasyi (2010), menyatakan bahwa *Bacillus megaterium* mampu menyerap logam merkuri dengan efisien penyerapan mencapai 98%. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, bakteri yang toleran terhadap logam timbal antara lain *Pseudomonas*, *Listeria*, *Bacillus*, *Micrococcus*, *Corynebacterium*, *Phynilobacterium*, *Morococcus*, dan *Xanthobacter autotropichus*.

Mekanisme toleransi mikroba terhadap logam berat dengan cara kompleksasi meliputi produksi polisakarida ekstraselular yang memiliki sifat-sifat anion yang berfungsi sebagai bioakumulator yang efisien, produksi metabolit organik yang memiliki sifat pengkelat dan membentuk kompleks dengan logam (*Aspergillus niger*, *Penicilium spinulosum* dan *Verticillium psalliotae*), presipitasi, serta kristalisasi ekstraselular oleh bakteri pereduksi sulfat sehingga membentuk deposit sulfida yang kaya akan logam, dan pembentukan metalothionin (protein kaya sistein dalam sel

dapat mengikat logam) yang berfungsi untuk detoksifikasi, penyimpanan, dan regulasi ion logam dalam sel (Gadd, 1990).

Pengikatan logam berat oleh bakteri dapat dipisahkan menjadi fase pengikatan dan transpor aktif. Fase pengikatan tergantung pada metabolisme sel yaitu absorpsi melalui dinding sel atau permukaan eksternal, kemudian diikuti dengan transpor aktif yang tergantung pada metabolisme sel. Pada proses metabolisme, logam berat dapat terakumulasi pada membran sel (*ekstraseluler*) dan pada sitoplasma (*intrasel*) (Aminah, 2009).

Akumulasi ekstraseluler dapat terjadi karena pengikatan ion-ion logam oleh polimer ekstraseluler atau polisakarida ekstraseluler yang dihasilkan sel sel mikroba dan kompleks antara ion-ion logam yang bermuatan positif dengan sisi reaktif pada permukaan sel yang bermuatan negatif. Sedangkan akumulasi intraseluler dapat terjadi karena proses difusi yang tidak membutuhkan aktifitas mikroba secara langsung dimana gen-gen yang mengendalikan plasmid dalam proses metabolisme tersebut.

Cara lain adalah reverse osmosis, elektrodialisis, ultrafiltrasi dan resin penukar ion. Reverse osmosis merupakan proses pemisahan logam berat oleh membran semipermeabel dengan menggunakan perbedaan tekanan luar dengan tekanan osmotik dari limbah, kekurangan sistem ini adalah biaya yang mahal sehingga sulit terjangkau oleh industri di Indonesia. Teknik elektrodialisis menggunakan membran ion selektif permeabel berdasarkan perbedaan potensial antara 2 elektroda yang menyebabkan perpindahan kation dan anion, juga menimbulkan kerugian yakni terbentuknya senyawa logam-hidroksi yang menutupi membran, sedangkan melalui ultrafiltrasi

yaitu penyaringan dengan tekanan tinggi melalui membran berpori, juga merugikan karena menimbulkan banyak lumpur (*Sludge*). Resin penukaran ion berprinsip pada gaya elektrostatis di mana ion yang terdapat (Aminah, 2009).


Adapun bakteri hasil endapan sedimen perairan sekitar rumah susun kota Makassar (Mastang, 2015) yang telah diidentifikasi secara molekular menunjukkan bahwa isolat A8 merupakan bakteri *Pseudomonas aeruginosa*, B3 merupakan bakteri *Alcaligenes faecalis* dan isolat C2 merupakan bakteri *Bacillus thuringiensis*. Ketiga isolat tersebut mampu mengakumulasi logam berat timbal (Pb) dengan konsentrasi 250 ppm pada media NB (*Nutrient Broth*) dan jumlah persentase absorpsi dengan masing-masing isolat A8 96 %, B3 98,4 % dan C2 99,8 %.

1. Bakteri *Bacillus thuringiensis*

Bacillus thuringiensis mempunyai ciri khas bergerak dan berbentuk batang, berukuran sekitar 0.6 x 2 µm. Umumnya mempunyai flagel polar, tetapi kadang-kadang 2-3 flagel. Bakteri Gram-negatif dan terlihat sebagai bakteri tunggal, berpasangan, dan kadang-kadang membentuk rantai yang pendek (Bravo, et al., 1998).

Bakteri *Bacillus thuringiensis* (Bt) memiliki ciri koloni bakteri seperti berwarna putih berbentuk bulat, tepian berkerut atau bergelombang, elevasi timbul, dan permukaannya kasar. Bakteri *Bacillus thuringiensis* (Bt) merupakan salah satu jenis bakteri yang dapat diisolasi langsung dari tanah, kotoran, dan bagian tumbuhan. *Bacillus thuringiensis* (Bt) dapat tumbuh pada interval suhu 0 - 50°C dan memiliki pertumbuhan optimum pada suhu 40°C. Selain itu, *Bacillus thuringiensis* (Bt) dapat tumbuh pada kisaran pH 6.4 sampai 7.5 dan mampu tumbuh optimum pada pH 7.0.

Bacillus thuringiensis (Bt) dapat tumbuh optimum pada kisaran salinitas 20 - 50 ppt karena bakteri *Bacillus thuringiensis* (Bt) merupakan bakteri halotoleran yang dapat mentolerir berbagai tingkat salinitas (Bravo, et al., 1998).



Gambar 3.1 Bakteri *Bacillus thuringiensis* (www.Google.Id http://: 29 Juli 2017).

Klasifikasi bakteri *Bacillus thuringiensis* sebagai berikut:

Kingdom : Eubacteria
 Phylum : Firmicitus
 Class : Bacilli
 Ordo : Bacillales
 Family : Bacillaceae
 Genus : Bacillus
 Spesies : *Bacillus thuringiensis* (Holt, et al., 1994)

2. Bakteri *Pseudomonas aeruginosa*

Bakteri *Pseudomonas aeruginosa* merupakan bakteri gram negatif aerob obligat. Berbentuk batang dengan ukuran sekitar 10 μm , berkapsul, mempunyai flagel monotrik. *Pseudomonas aeruginosa* merupakan bakteri hidrokarbonoklastik yang mampu mendegradasi berbagai jenis hidrokarbon. Keberhasilan penggunaan bakteri *Pseudomonas aeruginosa* dalam upaya bioremediasi lingkungan akibat pencemaran hidrokarbon. *Pseudomonas aeruginosa* tidak menghasilkan spora dan tidak dapat memfermentasikan karbohidrat pada uji biokimia. Bakteri ini menghasilkan hasil negatif pada uji methyl red dan Voges proskauer. Bakteri ini secara luas dapat ditemukan di alam contohnya tanah, air, tanaman dan hewan (Boyd, 1995).



Gambar 3.2 Bakteri *Pseudomonas aeruginosa* (www.Google.Id http://: 29 Juli 2017)

Klasifikasi bakteri *Pseudomonas aeruginosa* sebagai berikut:

Kingdom : Bacteria
Phylum : Proteobacteria
Class : Gamma Proteobacteria
Ordo : Pseudomonales
Family : Pseudomonadaceae
Genus : Pseudomonas
Spesies : *Pseudomonas aeruginosa* (Jawetz et al., 2001).

3. Bakteri *Alcaligenes faecalis*

Alcaligenes faecalis merupakan bakteri bentuk batang Gram negatif, bergerak menggunakan flagel peritrik, uji oksidase dan katalase positif, memproduksi reaksi alkali dengan kuat di semua media karbohidrat, mereduksi nitrit tapi tidak mereduksi nitrat, biasanya tidak menghidrolisis triptofan, mengasamkan perbenihan sitrat, bersifat urease negatif, suhu optimum untuk pertumbuhan pada suhu 20-37°C *Alcaligenes faecalis* pada umumnya ditemukan di tanah dan air, serta kadang diisolasikan dari urin, darah, cairan spiral, luka, dan abses (Jawetz et al, 2010).

Patogenesis *Alcaligenes faecalis* merupakan bakteri patogen oportunistik yang dapat memicu infeksi lokal, radang usus buntu, dan infeksi aliran darah (Koneman, 1992).




Gambar 3.2 Bakteri *Alcaligenes faecalis* (www. Google. Id <http://>: 29 Juli 2017).

Klasifikasi bakteri *Alcaligenes faecalis* sebagai berikut:

Kingdom	: Bacteria
Phylum	: Proteobacteria
Class	: Beta Proteobacteria
Ordo	: Burkholderiales
Family	: Alcaligenaceae
Genus	: <i>Alcaligenes</i>
Spesies	: <i>Alcaligenes faecalis</i> (Jawetz et al., 2001).

G. Kerangka Berfikir

1. Logam berat Tembaga (Cu) merupakan bahan yang berbahaya bagi makhluk hidup
2. Bioakumulasi adalah mikroorganisme yang mampu mengakumulasi logam berat.
3. Pengambilan sampel dilakukan dengan secara sengaja
4. Bakteri *Pseudomonas aeruginosa*, *Bacillus thuringiensis*
dan *Alcaligenes faecalis* digunakan untuk mendeteksi logam berat



METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif yang menggambarkan tentang kemampuan bakteri *Pseudomonas aeruginosa*, *Bacillus thuringiensis* dan *Alcaligenes faecalis* dalam mengakumulasi logam berat tembaga (Cu). Lokasi penelitian yaitu di Laboratorium Mikrobiologi dan Laboratorium Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan eksperimental adalah untuk menguji pengaruh satu atau lebih variabel terhadap variabel lain.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi pada penelitian ini adalah bakteri endapan sedimen perairan rumah susun kota Makassar pengakumulasi logam berat.
2. Sampel pada penelitian ini adalah logam berat tembaga (Cu).

D. Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel tunggal yaitu bakteri endapan sedimen perairan rumah susun kota Makassar pengakumulasi logam berat.

E. Defenisi Operasional Variabel

Mikroorganisme sangat berperan dalam proses degradasi bahan buangan dari kegiatan industri yang dibuang ke air lingkungan, baik sungai, danau maupun laut. Jika bahan buangan yang harus didegradasi cukup banyak berarti mikroorganisme akan ikut berkembang biak. Pada perkembangbiakan mikroorganisme ini tidak menutup kemungkinan bahwa mikroba patogen ikut berkembang pula.

Pseudomonas aeruginosa adalah bakteri gram negatif aerob obligat, berkapsul, mempunyai flagella polar sehingga bakteri ini bersifat motil. Bakteri ini tidak dapat menghasilkan spora dan tidak dapat memfermentasikan karbohidrat.

Bacillus thuringiensis adalah bakteri gram positif, berbentuk batang. Bakteri ini termasuk patogen fakultatif dan dapat hidup di daun tanaman konifer maupun pada tanah. Apabila kondisi lingkungan tidak menguntungkan maka bakteri ini akan membentuk fase sporulasi.

Alcaligenes faecalis adalah merupakan bakteri Gram negatif, bersifat aerobik, dan motil. Jenis bakteri ini dapat ditemukan pada air, tanah dan asosiasi lingkungan dengan manusia serta dapat tumbuh pada suhu 37° C.

F. Metode Penelitian

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode secara sengaja (*Purposive sampling*). Metode ini dipilih berdasarkan tujuan tertentu (Sugiyono, 2010).

G. Instrumen Penelitian

1. Alat

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : *Autoclaf*, inkubator, incubator shaker, cawan petri, jarum ose, spiritus, tabung reaksi, aluminium foil, Spektrofotometer Serapan Atom (SSA), Laminar Air Flow (LAF), Spektrofotometer UV-VIS, lemari asam, spatula, gelas ukur, batang pengaduk, rak tabung, erlenmeyer, neraca analitik, *mikrocentrifuge*, mikropipet, tub dan botol semprot.

2. Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Tembaga (CuNO_3) sebanyak 0,0289 gr atau 10 ppm, NB (*Nutrient Broth*) 8 gr, NA (*Nutrient Agar*) 10 gr, aquadest, alkohol 70%, karet gelang, kertas label, kapas dan bakteri *Pseudomonas aeruginosa*, *Bacillus thuringiensis* dan *Alcaligenes faecalis* hasil peremajaan.

H. Prosedur Kerja

Adapun prosedur kerja dalam penelitian ini yaitu:

1. Sterilisasi alat dan bahan

Alat berbahan plastik dan bahan yang digunakan disterilisasi dengan menggunakan *autoclave* pada suhu 121°C dan alat berbahan kaca dan besi menggunakan oven pada suhu 37°C selama 2 jam.

2. Peremajaan bakteri

Bakteri *Pseudomonas aeruginosa*, *Bacillus thuringiensis* dan *Alcaligenes faecalis* diremajakan pada media NA (*Nutrient Agar*) + logam berat tembaga (Cu) sebanyak 0,0298 selama 2 jam.

3. Pembuatan media

Melarutkan medium NB (*Nutrient Broth*) 8 gr dalam 1000 ml aquadest ditambahkan logam berat tembaga (Cu) dengan konsentrasi yaitu 10 ppm.

Cara menentukan larutan tembaga (Cu) 10 ppm:



Keterangan:

Ar (Cu) = jumlah Massa Relatif

Mr (Cu) = jumlah Massa Molekul Relatif.

4. Uji kemampuan isolat bakteri terhadap logam berat tembaga (Cu)

a. Mengambil kultur bakteri dengan menggunakan ose.

- b. Menginokulasikan pada erlenmayer 250 ml yang berisi *Nutrient Broth* + logam berat tembaga (Cu) 10 ppm.
 - c. Membuat kontrol negatif digunakan media yang mengandung logam berat tetapi tidak ditambahkan bakteri.
 - d. Menginkubasi selama 3x24 jam pada inkubator shaker dengan kecepatan 150 rpm.
 - e. Menuangkan sebanyak 10 ml kedalam tabung reaksi dan diukur pHnya.
 - f. Melakukan uji absorbansi pada Spektrofotometer UV-VIS.
 - g. Memisahkan natan dan supernatan hasil inkubasi menggunakan *microsentrifuge* dengan kecepatan 5000 rpm.
 - h. Menyimpan supernatan pada tabung reaksi kemudian ditutup rapat dengan kapas, aluminium foil, dan silk dan disimpan dalam kulkas.
 - i. Melakukan uji Spektrofotometer Serapan Atom (SSA) untuk melihat jumlah penurunan logam berat tembaga (Cu).
5. Preparasi Larutan Induk Standard

Pembuatan larutan induk tembaga (Cu) sebanyak 10 ppm (Laboratorium Kimia UIN Alauddin Makassar).

- a. Menuangkan larutan standar Cu konsentrasi 1000 ppm pada erlenmayer 1000ml
- b. Membagi larutan induk 1000 ppm kedalam erlenmayer 100 ml sebanyak 2 ppm, 4 ppm, 6 ppm, 8 ppm, dan 10 ppm.
- c. Konsentrasi larutan standar tembaga (Cu) dalam labu ukur 100 ml masing-masing diukur dengan menggunakan Spektrofotometer Serapan Atom (SSA) dengan panjang gelombang 324,7 μm .

6. Uji reduksi logam

Untuk menghitung reduksi logam menggunakan rumus:

$$\frac{\text{total reduksi (ppm)}}{\text{konsetrasi awal}} \times 100\%$$

I. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan *microsoft excel* dan secara manual.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian, berdasarkan grafik 4.1 kurva standar $y = 0.0840 + 0.0098$ digunakan untuk mengetahui jumlah akumulasi bakteri terhadap logam berat. Perhitungan pada jumlah akumulasi bakteri terhadap logam berat tembaga (Cu) dihitung melalui kurva standar, diketahui bahwa ketiga bakteri tersebut mampu menurunkan konsentrasi logam berat tembaga (Cu) dengan jumlah yang bervariasi. Hasil penurunannya berdasarkan kurva standar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1. akumulasi bakteri *Bacillus thuringiensis* terhadap logam berat tembaga (Cu).

No.	Waktu (jam)	Absorbansi Kepadatan Bakteri	Konsentrasi Awal (ppm)	Σ Rata-rata Konsentrasi Akhir (ppm)	Total Akumulasi (ppm)	Penurunan (%)
1.	12	0,996	10	0,0023	9	90%
2.	24	0,987	10	0,3507	9	90%
3.	36	0,994	10	1,982	7	70%
4.	48	0,998	10	2,8593	6	60%
5.	60	0,997	10	3,3398	6	60%
6.	72	0,998	10	3,4703	6	60%

Tabel 4.2. akumulasi bakteri *Pseudomonas aeruginosa* terhadap logam berat tembaga (Cu).

No.	Waktu (jam)	Absorbansi Kepadatan Bakteri	Konsentrasi Awal (ppm)	Σ Rata-rata Konsentrasi Akhir (ppm)	Total Akumulasi (ppm)	Penurunan (%)
1.	12	0,996	10	2,0327	7	90%
2.	24	0,987	10	0,1101	9	90%
3.	36	1,005	10	0,4843	9	70%
4.	48	0,997	10	2,5742	7	60%
5.	60	0,997	10	3,1460	6	60%
6.	72	0,998	10	3,4945	6	60%

Tabel 4.3. akumulasi bakteri *Alcaligenes faecalis* terhadap logam berat tembaga (Cu).

No.	Waktu (jam)	Absorbansi Kepadatan Bakteri	Konsentrasi Awal (ppm)	Σ Rata-rata Konsentrasi Akhir (ppm)	Total Akumulasi (ppm)	Penurunan (%)
1.	12	0,996	10	0,2171	9	90%
2.	24	0,996	10	-0,0851	10	100%
3.	36	0,996	10	0,3960	9	90%
4.	48	0,996	10	1,7421	7	70%
5.	60	0,997	10	2,0124	7	70%
6.	72	0,998	10	2,6007	7	70%

Tabel 4.4. Jumlah rata-rata akumulasi bakteri terhadap logam berat tembaga (Cu).

No.	Waktu (jam)	Isolat Bakteri	Konsentrasi Awal (ppm)	Konsentrasi Akhir (ppm)	Total Akumulasi (ppm)	Penurunan (%)
1.	3x24	<i>Bacillus thuringiensis</i>	10	3,4703	9	90%
2.		<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	10	3,4945	9	90%
3.		<i>Alcaligenes faecalis</i>	10	2,6007	10	100%

B. Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada bioakumulasi bakteri yang ditumbuhkan pada media NA (*Nutrient Agar*) yang telah dipaparkan dengan logam berat tembaga (CuNO_3) dengan konsentrasi 10 ppm dan dilakukan uji akumulasi dengan menggunakan media NB (*Nutrient Broth*) dalam waktu 3x24 jam dengan menggunakan inkubator shaker. Kemudian menguji kepadatan bakteri menggunakan UV-VS. Selanjutnya dicentrifugasi dengan kecepatan 5.000 rpm selama 5 menit untuk mendapatkan supernatant. Supernatant yang dihasilkan selanjutnya diukur dengan menggunakan Spektrofotometer Serapan Atom (SSA) untuk mengetahui jumlah akumulasi dari masing-masing bakteri tersebut. Pada uji Spektrofotometer Serapan Atom (SSA) digunakan larutan induk standar dengan konsentrasi 2 ppm, 4 ppm, 6 ppm, 8 ppm, dan 10 ppm.

Berdasarkan tabel 4.4 diatas, menunjukkan bahwa isolat bakteri *Bacillus thuringiensis* sangat efektif dalam menurunkan kadar logam berat tembaga (Cu) berdasarkan nilai rata-rata dari konsentrasi 10 ppm menjadi 3,47 ppm dengan total akumulasi 9 ppm dengan persentase 90 % dalam waktu 3x24 jam dengan 6x pengamatan pada media pH 7 dan suhu 37⁰ C. Adapun hasil yang ditunjukkan oleh tabel 4.1 yaitu pada 36 jam absorbansi kepadatan bakteri yang didapatkan yaitu 0,994 CFU/ml sementara total akumulasinya 7 ppm dan pada 72 jam absorbansi kepadatan bakterinya 0,998 CFU/ml sementara total akumulasinya 6 ppm. Hal ini menunjukkan bahwa bakteri pada 36 jam lebih banyak yang hidup dibandingkan yang mati sehingga total akumulasinya tinggi sedangkan pada 72 jam mengalami yang sebaliknya yaitu jumlah bakteri lebih banyak yang mati dibandingkan yang hidup sehingga total akumulasinya menurun, hasil penelitian sebelumnya (Primaharinastiti, 2004) juga menyebutkan dimana setelah melakukan uji bioakumulasi pada bakteri *Bacillus thuringiensis* terjadi penurunan yang cukup signifikan yaitu *Bacillus thuringiensis* dalam media cair *Nutrient Broth*, pada suhu kamar dengan lama inkubasi 42 jam mampu menurunkan kadar Cu dalam filtrat media sebesar 8,912–12,623% dari kadar Cu awal, dengan nilai rata-rata sebesar 10,8558%.

Hasil penelitian ini juga berkaitan dengan hasil yang dikemukakan (Hanjun, 2010) potensi bioremediasi oleh bakteri *Bacillus thuringiensis* sangat baik adaptasinya pada logam berat tembaga (Cu) 10 ppm. Kemampuan bioremediasi pada logam berat terjadi dengan mudah, yaitu dengan penyerapan 75.78% (Cd), 80.48% (Pb) dan 21,25% (Cu) dalam 24 jam inkubasi. Hal ini sangat efisien dalam menghambat

kegiatan ATPase. Penurunan ion Cd, Pb, dan Cu menunjukkan bahwa tidak akan timbul polusi serius dalam bioremediasi.

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa isolat bakteri *Pseudomonas aeruginosa* sangat efektif dalam menurunkan kadar logam berat tembaga (Cu) dari konsentrasi 10 ppm menjadi 3,49 ppm dengan total akumulasi 9 ppm dengan persentase 90% dalam waktu 3x24 jam dengan 6x pengamatan pada media pH 7 dan suhu 37⁰ C. Adapun hasil yang ditunjukkan oleh tabel 4.2 yaitu pada 60 jam absorbansi kepadatan bakteri 0,996 CFU/ml sementara total akumulasinya 9 ppm dan pada 72 jam absorbansi kepadatan bakteri 0,998 namun total akumulasinya tetap 6 ppm. Hal ini menunjukkan pada 72 jam, jumlah bakteri yang mati lebih banyak dibandingkan bakteri yang mati pada 60 jam sehingga jumlah akumulasinya tetap. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya (Mastang, 2016) bahwa Isolat A8 yang didapatkan dari kanal yang berhubungan langsung dengan air laut yang merupakan bakteri *Pseudomonas aeruginosa* juga menunjukkan kemampuan yang sangat efektif dalam mereduksi logam timbal dari konsentrasi 250 ppm menjadi 8,805 ppm dengan jumlah total akumulasi 241 ppm dengan presentasi 96 %.

Pseudomonas aeruginosa memproduksi katalase, oksidase dan amonia dari arginin. Bakteri ini dapat menggunakan sitrat sebagai sumber karbonnya. Bakteri *Pseudomonas aeruginosa* mampu mendegradasi polutan hidrokarbon yang ada di lingkungan perairan maupun di tanah, dapat menurunkan aromatik hidrokarbon seperti *methylbenzene* yang merupakan produk-produk industri minyak bumi dan biasanya digunakan sebagai pelarut untuk enamel dan cat serta dalam produksi obat dan bahan

kimia serta dapat memecah toluene bentuk paling sederhana *methylbenzene* (pengendalian pencemaran) (Mastang, 2016).

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa isolat bakteri *Alcaligenes faecalis* paling efektif dalam menurunkan kadar logam berat tembaga (Cu) dibandingkan dengan dua bakteri lainnya. Akumulasi pada bakteri ini rata-ratanya sangat baik bahkan pada 24 jam mampu mengakumulasi logam berat dari konsentrasi 10 ppm menjadi 2,60 ppm dengan total akumulasi 10 ppm dengan persentase 100 %. Adapun hasil yang ditunjukkan oleh tabel 4.3 yaitu pada 36 jam absorbansi kepadatan bakteri yang didapatkan yaitu 0,996 CFU/ml sementara total akumulasinya 9 ppm dan pada 72 jam absorbansi kepadatan bakterinya 0,998 CFU/ml sementara total akumulasinya 7 ppm. Hal ini menunjukkan bahwa bakteri pada 36 jam lebih banyak yang hidup dibandingkan bakteri yang hidup pada 72 jam sehingga total akumulasi bakteri di 72 jam menurun. Dari hasil yang ditunjukkan oleh tabel 4.3, biokumulasi bakteri *Alcaligenes faecalis* yaitu mampu mengakumulasi logam berat Cu hingga habis kadar logam beratnya, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa bakteri ini yang paling efektif. Penelitian ini juga didukung pada penelitian yang dilakukan oleh Shakoori (2010) yang menunjukkan kemampuan bakteri *Alcaligenes faecalis* dalam mereduksi logam tetapi bukan logam tembaga melainkan logam kromium (VI) sebesar 97% dari konsentrasi awal 100 mg/l selama 24 jam pada media lurea bertani. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan bakteri *Alcaligenes faecalis* pada 24 jam sangat baik.

Alcaligenes faecalis merupakan spesies bakteri yang penting pada bioteknologi karena bakteri ini mampu memproduksi suatu materi *plastic-like*

polihidroksibutirat biopolimer (PHB) yang dapat didegradasi oleh proses biologis sehingga tidak mencemari lingkungan. Selain itu, bakteri yang umumnya terdapat di tanah ini dapat memetabolisme dan menetralisasi materi organik maupun an-organik yang terdapat di lingkungan dan mempunyai efek yang berbahaya pada makhluk hidup (Fhadilah,2016).

Berdasarkan teori dan hasil penelitian diatas, maka dapat diketahui bahwa bakteri *Alcaligenes faecalis* sebagai mikroorganisme kemoorganotrof yaitu mampu menggunakan karbon dari berbagai sumber untuk pertumbuhannya sehingga mampu mengakumulasi lebih baik dibandingkan dua bakteri lainnya.

Kemampuan mengakumulasi logam oleh mikroorganisme ini dipengaruhi oleh faktor-faktor pertumbuhan seperti jumlah oksigen, pH, dan nutrisi khusus. Mekanismenya juga dipengaruhi oleh sifat mikroorganisme dan logamnya, sedangkan prosesnya dapat terjadi pada ekstraseluler, pada permukaan sel, dan intraseluler. Pada ekstraseluler, akumulasi logam dapat disebabkan oleh adanya pembentukan polimer ekstraseluler membentuk kompleks dengan logam. Mekanisme ini terjadi bila logam mengendap dan secara fisik terjebak oleh matriks polimer yang diinduksi oleh kondisi lingkungan atau terjadinya kompleks yang larut.

Akumulasi pada permukaan sel merupakan hasil reaksi kompleks antara ion logam dan konstituen dinding sel. Komposisi dinding sel bakteri gram positif, bakteri gram negatif, ragi, jamur, dan alga berbeda. Proses akumulasinya sangat bergantung pada jenis spesies dan kondisi lingkungan. Sedangkan proses akumulasi intrasel

memerlukan sistem transport aktif yang sangat spesifik untuk masuknya logam ion pada suatu sel (Shumate, 1985).

Proses akumulasi logam berat dapat berlangsung baik pada kadar logam berat yang kecil, namun jika kadar logamnya terlalu banyak atau besar maka akan mengganggu pertumbuhan sel itu sendiri bahkan dapat menyebabkan kematian sel. Bioakumulasi logam pada kadar/konsentrasi yang rendah lebih bisa diterima sebagai alternatif penyelesaian masalah pencemaran logam berat di lingkungan, oleh karena bila pencemaran tersebut terjadi dengan kadar yang tinggi maka lebih dimungkinkan cara-cara penyelesaian secara kimiawi ataupun fisika (Primaharinastiti, 2004).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan pada penelitian ini yaitu pada perbandingan kemampuan Ketiga isolat bakteri yang telah di ujikan diantaranya isolat bakteri (A) *Bacillus thuringienses*, (B) *Pseudomonas aeruginosa* dan (C) *Alcaligenes faecalis* masing-masing dipaparkan dengan logam berat tembaga (Cu) dengan konsentrasi 10 ppm dimana ketiga isolat tersebut memiliki kemampuan dalam mengakumulasi logam berat tembaga (Cu). Dari hasil rata-rata yang didapatkan, isolat (A) sangat efektif dalam menurunkan kadar logam berat tembaga (Cu) dari konsentrasi 10 ppm menjadi 3,47 ppm dengan total akumulasi 9 ppm dengan persentase 90 % , isolat (B) yang memiliki kemampuan yang hamper sebanding dengan isolate (A) dimana, dari konsentrasi 10 ppm menjadi 3,49 ppm dengan total akumulasi 9 ppm dengan persentase 90%. Pada isolat (C) paling efektif dalam menurunkan kadar logam berat tembaga (Cu) dibandingkan dengan kedua isolat bakteri yang ada, dimana dari konsentrasi 10 ppm menjadi 2,60 ppm dengan total akumulasi 10 ppm dengan persentase 100%, dalam waktu 3x24 jam dengan 6x pengamatan pada media pH 7 dan suhu 37⁰ C untuk ketiga bakteri.

Absorbansi kepadatan bakteri yang merupakan hasil dari pembacaan Spektrofotometer UV-VIS menunjukkan hasil yang mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak stabil. Hal ini karena jumlah bakteri yang mati pada saat uji spektrofotometer UV-VIS tetap terbaca karena hanya melihat kekeruhan pada sampel, sehingga diperoleh pula jumlah penurunan akumulasi yang tidak stabil pada uji Spektrofotometer Serapan Atom (SSA).

Bakteri *Alcaligenes faecalis* yang umumnya terdapat di tanah ini dapat memetabolisme dan menetralisasi materi organik maupun an-organik yang terdapat di lingkungan dan mempunyai efek yang berbahaya pada makhluk hidup. bakteri *Alcaligenes faecalis* sebagai mikroorganisme kemoorganotrof yaitu mampu menggunakan karbon dari berbagai sumber untuk pertumbuhannya sehingga mampu mengakumulasi lebih baik dibandingkan dua bakteri lainnya.

Pengaruh jumlah logam berat dalam proses akumulasi logam berat mungkin masih membutuhkan penelitian lebih lanjut. Di samping itu kondisi lingkungan pertumbuhan bakteri juga perlu untuk dioptimasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses biodegradasi telah diketahui antara lain jenis logam, suhu, adanya air, pH, adanya senyawa-senyawa dan toksik yang lain.

B. Saran

Adapun saran dari penelitian ini adalah:

1. Sebaiknya ada tindak lanjut dari penelitian ini menjadi lebih berkembang lagi mungkin dengan menggunakan metode atau konsentrasi yang berbeda.
2. Sebaiknya ada pengaplikasian ke beberapa logam berat lainnya seperti cadmium (Cd), Merkuri (Hg), dan logam berat lainnya.
3. Sebaiknya remajakan kembali bakteri yang telah digunakan, agar mempermudah penggunaan selanjutnya pada penelitian yang sama.

KEPUSTAKAAN

- Alamsyah, Hadir. *Kinerja Prasarana Dasar Rumah Susun Sewa (RUSUNAWA) Mariso Kota Makassar*. 2013.
- Alloway, B.J. 1995. *Heavy Metals in Soil*. Champan and Hall. London.
- Aminah Ummi. “Isolasi Bakteri Pengakumulasi Logam Berat Timbal (Pb) di Perairan Pelabuhan Paotere Makassar”. *Skripsi*. Makassar: Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin, 2011.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar. 2013. *Makassar Dalam Angka 2013*. Kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pusat Statistik Kota Makassar.
- Badjoeri, M & Zarkasyi,H (2010). *Isolasi Dan Seleksi Bakteri Bioremoval Logam Berat Merkuri*. *Prosiding Seminar Nasional Limnology*. Pusat Penelitian Limnology LIPI.
- Breton, Jerome. dkk. 2016. Science Report: *Does oral exposure to cadmium and lead mediate susceptibility to colitis? The dark-and-bright sides of heavy metals in gut ecology*. France.
- Bravo, *et al.* 1998. MEGA 5: Molecular Evolutionary Genetics Analysis Using Maximum Likelihood, Evolutionary Distance and Maximum Parsimony Methods. *Journal Mol. Biol.* vol.10.1093.
- Darmono. *Lingkungan Hidup dan Pencemar Hubungan dengan Toksikologi Senyawa Logam*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2001.
- Darmono. *Logam dalam Sistem Biologi Makhluk Hidup*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1995.
- Gadd, G.M. 1990. Metal tolerance. p 178-210. *In C. Edward (Ed.)*. Microbiology of extreme environments. Mcgraw-Hill. New York.
- Hardiani, Henggar, dkk. *Bioakumulasi Logam Timbal (Pb) Dalam Tanah Terkontaminasi Limbah Sludge Industri Kertas Proses Deinking*. Bandung : Balai Besar Pulp dan Kertas, 2011.

- Hanjun, Guo *et al* (2010). *Bioremediation of heavy metals by growing hyperaccumulating orendophytic bacterium Bacillus sp. L14*. *Bioresource Technology* 101 8599–8605.
- Hidayat Nur, Padaga Masdiana C, Suhartini Sri. *Mikrobiologi Industri*. Yogyakarta: Andi Offset, 2006.
- Kundari, N. A., dan Wiyuniati, S. “*Tinjauan Kesetimbangan Adsorpsi Tembaga Dalam Limbah Pencuci PCB Dengan Zeolit*”. Yogyakarta: Prosiding Seminar Nasional IV SDM Teknologi Nuklir, 2008.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Wali, 2012.
- Khoiroh, Zaimatul. *Bioremediasi Logam Berat Timbal (Pb) dalam Lumpur Lapindo Menggunakan Campuran Bakteri (Pseudomonas pseudomallei dan Pseudomonas aeruginosa)*. Malang, 2014.
- Kouadjo *et al.* 2010. “*Chromium Tolerance and Reduction Potential Of Staphylococci Species Isolated From a Fly Ash Dumping Site In South Africa*. *Journal of Biotechnology* Vol. 10 (19) pp. 15587 – 15594.
- Lewaru, Syafruddin. Riyantini, Indah. Mulyani, Yuniar. *Identifikasi Bakteri Indigeneus Logam Berat Cr (VI) dengan Metode Molekuler di Sungai Cikijing Rancaekek Jawa Barat*”. *Jurnal Perikanan dan Kelautan* 3 no.4 (Desember 2012): 82.
- Maula, Alfiatul. *Bioremediasi Logam Kromium pada Limbah Cair Industri Penyamakan Kulit Menggunakan Isolat Bakteri Indigeneus*. Malang: 2005.
- Mastang. “*Isolasi dan Karakterisasi Bakteri Pengakumulasi Logam Berat Timbal (Pb) pada Endapan Sedimen Perairan Sekitar Rumah Susun di Kota Makassar*”. Skripsi. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2016.
- Muhajir, Abdul. “*Studi Kandungan Logam Berat Kadmium (Cd) Pada Kerang Darah (Anadara granosa) Dari Beberapa Daerah Pasar Kota Malang*”. Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2009.
- Mulik Anuradha R, Rama K Bhadekar1 (2017). *Heavy Metal Removal By Bacterial Isolates From The Antarctic Oceanic Region*. *Int J Pharm Bio Sci* July ; 8(3): (B) 535 -543

- Mullen, M.D., D.C. Wolf, F.G. Ferris, T.J. Beveridge, C.A. Fleming, & G.W. Bailey. 1989. Bacterial sorption of heavy metal. *Appl. Environ. Microbiol.* 55: 3143-3149.
- Nadyah. *Dasar-Dasar Mikrobiologi Untuk Mahasiswa Ilmu Kesehatan*. Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Palar Heryando. *Pencemaran dan Toksikologi Logam Berat*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Primaharinastiti, Riesta dkk (2004). *Bioakumulasi Logam Berat Cu Oleh Bacillus sp.* Fakultas Farmasi Universitas Airlangga. *Berck. Penel. Hayati: 10(19-23)*, 2004.
- Prasetyawati E. Triwahyu. *Bakteri Rhizozfer Sebagai Pereduksi Merkuri dan Agensia Hayati*. : UPN Press, 2009.
- Pratiwi, Tanjung, Sylvia. *Mikrobiologi Farmasi*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Purnomo, Dony. 2009. *Logam Berat Sebagai Penyumbang Pencemaran Air Laut*. Bandung: Refika Aditama
- Putra, J.A. *Bioremoval Metode Alternatif Untuk Menanggulangi Pencemaran Logam Berat*, 2005.
- Sahin, Yasemin. 2005 “*Biosorption Of Chromium (VI) Ions From Aqueous Solution By The Bacterium Bacillus thuringiensis*”. *Process Biochemistry*. 40: 1895 – 1901.
- Sarjono, A. 2009. “*Analisis Kandungan Logam Berat Cd, Pb, dan Hg Pada Air dan Sedimen di Perairan Kamal Muara Jakarta Utara*”, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Shakoori et al. 2010. “*Isolation and characterization of Cr⁶⁺ reducing bacteria and their potential use in bioremediation of chromium containing wastewater*”. *Pakistan J. Zool.* 42 (6): 651-658.
- Suhendrayatna. “*Bioremoval Logam Berat Dengan Menggunakan Mikroorganisme*” Seminar Bioteknologi Untuk Indonesia. Bandung : 2011.
- Suhendrayatna. 2001. *Bioremoval Logam Berat dengan Menggunakan Mikroorganisme: Suatu Kajian Kepustakaan*. Institute for Science and Technology Studies. Japan .

- Sukmeri. 2008. Dampak Pencemaran Logam Timah Hitam (Pb) Terhadap Kesehatan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*. 2 (2), 200-202.
- Shihab M. Quraish. Tafsir Al-Misbah: *Pesan, Kesan dan Kesorasian Al-qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shumate SE and Stranberg GW, 1985. Accumulation of Metal by Microbial Cells, *Comprehensive Biotechnology*, Vol. V, Pergamon Press, Oxford. 235-47.
- Spain, A. 2003. Implications of microbial heavy metal tolerance in the environment. *Reviews in Undergraduate Research* 2: 1-6.
- Sutamihardja, R.T.M, dkk. 1982. *Perairan Teluk Jakarta Ditinjau Dari Tingkat Pencemarannya*. Skripsi. Bogor: Program Pascasarjana Jurusan PSL. IPB.
- Utami. *Konservasi Sumber Daya Alam Perspektif Islam dan Sains*. Malang: UIN Malang, 2008.
- Wang W. 2011. *Chelating Adsorption Properties of Cd(II) on The PMAA/SiO₂*. *Journal Process Safety and Environmental Protection*. 1(89): 127-132.
- Wei, Wei. dkk. 2016. Science Report: *Biosorption of Pb (II) from aqueous solution by extracellular polymeric substances extracted from Klebsiella sp. J1: Adsorption behavior and mechanism assessment*. France.
- Wardhana W, Arya. *Dampak Pencemaran Lingkungan*. Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Widowati, W. *Efek Toksik Logam Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2008.
- Wulandari Sri, Dewi Nila Fitri, Suwando. "Identifikasi Bakteri Pengikat Timbal (Pb) pada Sedimen di Perairan Sungai Siak". *Jurnal Biogenesis*. 1 no 2 (2005):62.
- www. Google. id. [http:// gambar tembaga \(CuNO₃\)](http://gambar tembaga (CuNO₃)) (29 Juli 2017).
- www. Google. id. [http:// grafik pertumbuhan bakteri](http://grafik pertumbuhan bakteri) (29 Juli 2017).
- www. Google. id. [http:// Gambar Bakteri *Bacillus thuringiensis*](http://Gambar Bakteri Bacillus thuringiensis) (29 Juli 2017).

www. Google. id. <http://> Gambar Bakteri *Pseudomonas aeruginosa* (29 Juli 2017).

www. Google. id. <http://> Gambar Bakteri *Alcaligenes faecalis* (29 Juli 2017).




LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Skema Penelitian



Lampiran 2. Alur Kerja Penelitian



**Inokulasi
Bakteri**

1. Menyiapkan ketiga isolat bakteri yang telah diremajakan.
2. Menginokulasi bakteri didalam LAF (*Laminator Air Flow*).
3. Masing-masing bakteri diinokulasikan kedalam Erlenmeyer yang berisi media NB dan logam berat tembaga (Cu) menggunakan jarum ose sebanyak 3 ose.
4. Setelah diinokulasikan menutup rapat masing-masing Erlenmeyer menggunakan kapas dan Alumunium foil.



**Uji Akumulasi
Logam Berat
Tembaga (Cu)**

1. Menyalakan incubator shaker dengan suhu 37⁰ C.
2. Setelah itu memasukkan masing-masing Erlenmeyer kedalam incubator shaker dengan kecepatan 150 rpm.
3. Pengamatan selama 3x24 jam dan diamati selama 12 jam.
4. Setiap pengamatan 12 jam masing-masing diamati PH, suhu, uji kepadatan bakteri menggunakan UV VVS.
5. Kemudian setelah masa inkubasi selanjutnya menggunakan mikrocentrifuge dengan kecepatan 1500rpm untuk mendapatkan hasil supernatan cair.

**Uji
Spektrofotometer
Serapan Atom**

1. Membuat preparasi larutan induk standar
2. Kemudian dilakukan uji Spektrofotometer Serapan Atom untuk di ketahui jumlah penurunan logam berat tembaga (Cu) tersebut.

Lampiran 3. Grafik Kurva Standar



Lampiran 4.

Diagram Jumlah rata-rata akumulasi bakteri terhadap logam berat tembaga (Cu).

Lampiran 5. Gambar pertumbuhan isolat bakteri

1. Isolat Bakteri *Bacillus thuringiensis*



2. Isolat Bakteri *Pseudomonas aeruginosa*




3. Isolat bakteri *Alcaligenes faecalis*



Lampiran

4. Gambar pengamatan 12 jam pertama



1. Bakteri *Bacillus thuringiensis* + Media NB + logam berat tembaga (Cu)

2. Bakteri *Pseudomonas aeruginosa* + Media NB + logam berat tembaga (Cu)





3. Bakteri *Alcaligenes faecalis* + Media NB + logam berat tembaga (Cu)



Lampiran 5. Gambar pengamatan 12 jam kedua



1. Bakteri *Bacillus thuringiensis* + Media NB + logam berat tembaga (Cu)



2. Bakteri *Pseudomonas aeruginosa* + Media NB + logam berat tembaga (Cu)



3. Bakteri *Alcaligenes faecalis* + Media NB + logam berat tembaga (Cu)



Gambar pengamatan 12 jam ketiga

Lampiran 6.



1. Bakteri *Bacillus thuringiensis* + Media NB + logam berat tembaga (Cu)



2. Bakteri *Pseudomonas aeruginosa* + Media NB + logam berat tembaga (Cu)



3. Bakteri *Alcaligenes faecalis* + Media NB + logam berat tembaga (Cu)




Lampiran

7. Gambar pengamatan 12 jam keempat



1. Bakteri *Bacillus thuringiensis*
+ Media NB + logam berat tembaga (Cu)



2. Bakteri *Pseudomonas aeruginosa* + Media NB + logam berat tembaga (Cu)




3. Bakteri *Alcaligenes faecalis*
+ Media NB + logam berat tembaga (Cu)



Lampiran 8. Gambar pengamatan 12 jam kelima



1. Bakteri *Bacillus thuringiensis* +
Media NB + logam berat tembaga (Cu)



Gambar pengamatan 12 jam keenam

Lampiran 9.



1. Bakteri *Bacillus thuringiensis* +
Media NB + logam berat tembaga (Cu)



2. Bakteri *Pseudomonas aeruginosa*
+ Media NB + logam berat tembaga (Cu)



3. Bakteri *Alcaligenes faecalis* +
Media NB + logam berat tembaga (Cu)



Lampiran 10. Uji

Spektrofotometer Serapan Atom (SSA)

ALAUDDIN
MAKASSAR



Lampiran 11.

Dokumentasi penelitian





Lampiran 11. Alat dan Bahan



Cara menentukan larutan tembaga (Cu) 10 ppm

10
Bobot

Bobot

dalam 1 liter Aquadest 100 ppm \Rightarrow

Menentukan rumus Mr $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$

Mr