

**KEMAMPUAN BIOAKUMULASI LOGAM BERAT TIMBAL (Pb)  
BERDASARKAN WAKTU PAPARANNYA oleh BAKTERI  
ENDAPAN SEDIMEN PERAIRAN SEKITAR  
RUMAH SUSUN KOTA MAKASSAR**



**Skripsi**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar sarjana sains  
Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

**DEWI SAKTI ANGRAENI**

NIM.60300113071

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2017

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi sakti Angraeni  
NIM : 60300113071  
Tempat/Tgl. Lahir : Pare-Pare 01 Oktober 1994  
Jur/Prodi : Biologi  
Fakultas : Sains Dan Teknologi  
Alamat : Jl. Manggarupi No.120  
Judul :Kemampuan Bioakumulasi Logam Berat Timbal (Pb)  
Berdasarkan Waktu Paparannya Oleh Bakteri Endapan  
Sedimen Perairan Sekitar Rumah Susun Kota Makassar.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau se seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar,  
Penyusun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R  
Dewi Sakti Angraeni  
NIM: 60300113071

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Kemampuan Bioakumulasi logam berat timbal (Pb) Berdasarkan Waktu Paparannya Oleh Bakteri Endapan Sedimen Perairan Sekitar Rumah Susun Kota Makassar”, yang disusun oleh Dewi Sakti Angraeni, NIM: 60300113071, Mahasiswa Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertaruhkan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari senin tanggal 28 Agustus 2017 bertepatan dengan 06 Dzul-Hijjah 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam ilmu Sains dan Teknologi, Jurusan Biologi (Dengan berbagai Perbaikan).

Makassar, 28 Agustus 2017 M.  
06 Dzul-Hijjah 1438 H.

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Hasyimuddin, S.Si., M.Si	(.....)
Munaqisy I	: Eka sukrawati, S.Si., M.Si	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Cut Muthiadin, S.Si., M.Si	(.....)
Munaqisy III	: Dr. Muh. Sabri AR, M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Mashuri Masri, S.Si., M.kes	(.....)
Pembimbing II	: Ulfa Triyani A latif, S.Si., M.Pd	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar



Dr. H. Arifuddin, M.Ag  
NIP. 19691205 199303 1 001

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil alamin. Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt karena berkat Rahmat dan RidhoNya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Kemampuan Bioakumulasi Logam Berat Timbal (Pb) Berdasarkan Waktu Paparannya Oleh Bakteri Endapan Sedimen Perairan Sekitar Rumah Susun Kota Makassar”**. Penulisan ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sains (S.Si). Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Baginda Rasulullah SAW yang telah mengajarkan banyak ilmu pengetahuan yang di jadikan pedoman dalam kehidupan ini.

Penulis menyadari banyak pihak yang telah berpartisipasi dan membantu dalam menyelesaikan penulisan ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu, secara khusus iringan doa dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis Alm. Ayahanda Drs. Burhanuddin dan Ibunda Jumriyani yang telah mendidik dan mencurahkan seluruh kasih sayang yang tiada hentinya dengan penuh ketulusan dan keikhlasan melantunkan doa setiap sujudnya serta rela mengorbankan banyak hal demi tercapainya harapan dari sang anak yang tidak akan pernah mampu untuk dibalas. Semoga berkah, Rahmat dan Hidayah Allah Selalu menaungi mereka.

Penulis menyadari sepenuhnya, dalam penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari hambatan dan tantangan. Namun berkat keyakinan dan Usaha serta motivasi dari pihak langsung maupun tidak langsung yang meperlancar jalannya penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, secara mendalam saya menyampaikan banyak terimakasih kepada semua pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini diantaranya adalah:

1. Prof. Dr. H. Musafir Pababari, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM) beserta sejarannya.
2. Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
3. Dr. Mashuri Masri, S.Si., M.Kes., selaku Ketua Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
4. Hasyimuddin, S.Si., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
5. Bapak Dr. Mashuri Masri, S.Si., M.Kes., sebagai Dosen Pembimbing I dan Ibu Ulfa Triyani A Latif, S.Si., M.Pd selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan yang sangat bermanfaat bagi penelitian dan penulisan Skripsi penulis.
6. Ibu Dr. Cut Muthiadin, S.Si., M.Si., Ibu Eka Sukmawati S.Si., M.Si., dan Bapak Dr. Muh. Sabri, M.Ag, selaku Dosen Penguji yang telah banyak memberikan saran dalam penyempurnaan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu Dosen Pengajar yang selama ini telah mengajarkan banyak hal serta pengetahuan yang berlimpah selama kuliah di kampus ini.
8. Seluruh Staf Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknolgi UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan kelancaran bagi penulis dalam pengurusan penyelesaian Skripsi ini.
9. Kepada seluruh Laboran Laboratorium jurusan Biologi FST UIN Alauddin Makassar.
10. Kepada Laboran Laboratorium jurusan Kimia FST UIN Alauddin Makassar
11. Kapala perpustakaan beserta jajarannya.
12. Teman-teman team dan seperjuangan penelitian Nana, Tile', Fitri, Maslan, husnul, hikmah, yuyun, ety, ravida, Kiki, wulan, inna, mae, datin, aya, wika, ika, afni, dina, hajjah, ida, yul, anty, sukriadi, lia, Fia, yang terkhususnya maslan wahyu, sudi, ikram, ulmi, ayya dan tiwi yang selalu setia peneliti baik dalam suka maupun duka dalam melaksanakan penelitian di Laboratorium Jurusan Biologi

FST UIN Alauddin Makassar hingga tercapai harapan bersama menuju Sarjana Sains (S.Si).

13. Teman-teman seperjuangan KKN Angkatan 53 kecamatan Tompobulu terkhususnya di Dusun Mampua Kabupaten Gowa dan Hasrullah, S.Pd yang selalu mensupport penulis dalam menyelesaikan Skripsi in.
14. Kepada seluruh keluarga besar Desa Datara terkhususnya Bapak/I dan adik-adikku tercinta dari Dusun Mampua yang selalu mendoakan dan mensupport penulis agar dapat menyelesaikan Skripsi ini.
15. Teman-teman “Brachialis” (Angkatan 2013) yang sangat banyak memberikan saran dan masukan bagi penulis hingga semua cerita di masa-masa kita bersama tak ada kisah yang tak berkesan selama 4 tahun ini penulis bersama kalian.
16. Adik-adik mahasiswa jurusan Biologi Angkatan 2014, 2015 dan 2016.
17. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah ikut berpartisipasi dalam penyelesaian penulis, semoga Allah swt selalu memberikan Rahmatnya bagi kita semua.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa hanya kepada Allah swt kita menyerahkan segalanya. Sesungguhnya Allah swt Maha Penolong bagi setiap hambanya yang meminta kepadaNya. Semoga kita semua tercurahkan kasih dan sayang serta Ridho dariNya. Amin

Makassar,  
Penulis

Dewi Sakti Angraeni  
Nim: 60300113071

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
PENGESAHAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv-v
DAFTAR ISI.....	vi-vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
ABSTRAK .....	xi
ABSTRACT .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1-10
A. Latar Belakang .....	1-4
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Ruang Lingkup Penelitian .....	5
D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu .....	5-8
E. Tujuan Penelitian .....	9
F. Kegunaan Penelitian .....	9-10
BAB II TINJAUAN TEORITIS .....	11-37
A. Tinjauan Umum Logam Berat .....	11-16
B. Tinjauan Umum Timbal (Pb).....	16-19
C. Tingkat Pencemaran Timbal (Pb) .....	19
D. Toksisitas Timbal (Pb).....	19-22
E. Tinjauan Umum Bakteri.....	22-23
F. Bakteri <i>Alcaligenes faecalis</i> .....	23-24
G. Bakteri <i>Bacillus thuringiensis</i> .....	24-25
H. Bakteri <i>Pseudomonas aeruginosa</i> .....	25-27
I. Perbedaan Bakteri Gram Positif dan Gram Negatif .....	27-28
J. Fase Pertumbuhan Bakteri .....	28-30
K. Tinjauan Kemampuan Bakteri Mengakumulasi Logam Berat .....	31-33
L. Tinjauan Bioakumulasi .....	33
M. Spektrofotometer Serapan Atom (SSA).....	33-36

N. Kerangka Pikir .....	37
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	38-42
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	37
B. Pendekatan Penelitian .....	37
C. Variabel Penelitian.....	37-38
D. Defenisi Operasional Variabel .....	38-39
E. Metode Pengumpulan Data.....	39
F. Instrumen Penelitian (Alat dan Bahan Penelitian).....	39
G. Prosedur Kerja .....	40-42
H. Analisi Data .....	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	43-53
A. Hasil Penelitian .....	42-46
B. Pembahasan .....	46-53
BAB V PENUTUP.....	54-55
A. Kesimpulan .....	54
B. Saran.....	55
KEPUSTAKAAN .....	56-60
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.4 Perbedaan susunan bakteri gram positif dan gram negatif .....	29
Tabel 4.1 Akumulasi logam berat timbal (Pb) oleh bakteri <i>Alcaligenes faecalis</i> .....	43
Tabel 4.2 Akumulasi logam berat timbal (Pb) oleh bakteri <i>Bacillus thuringiensis</i> .....	44
Tabel 4.3 Akumulasi logam berat timbal (Pb) oleh bakteri <i>Pseudomonas aeruginosa</i> .....	45
Tabel 4.4 Akumulasi bakteri terhadap logam berat timbal (Pb) .....	48



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Bakteri <i>Alcaligenes faecalis</i> .....	23
Gambar 3.2 Bakteri <i>Bacillus thuringiensis</i> .....	25
Gambar 3.3 Bakteri <i>Pseudomonas aeruginosa</i> .....	26
Gambar 3.5 Kurva Fase pertumbuhan bakteri .....	29
Gambar 3.6 Alat Spektrofotometer Serapan Atom (SSA) .....	34
Gambar 4.5 Akumulasi Logam Berat Timbal (Pb) oleh Bakteri Endapan Sedimen Perairan Kota Makassar .....	34



## ABSTRAK

**Nama** : Dewi Sakti Angraeni  
**NIM** : 60300113071  
**Judul Skripsi** : “Kemampuan Bioakumulasi Logam Berat Timbal (Pb) Berdasarkan Waktu Paparannya Oleh Bakteri Endapan Sedimen Perairan Sekitar Rumah Susun Kota Makassar”.

---

Logam berat dapat didefinisikan sebagai unsur-unsur yang mempunyai nomor atom 22-92 dan terletak pada periode 4 – 7. Logam berat mempunyai efek racun terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya karena dapat menggumpal didalam tubuh organisme dan tetap tinggal dalam tubuh dalam jangka waktu yang lama sebagai racun yang terakumulasi. Logam berat yang berbahaya dan sering mencemari lingkungan salah satunya adalah timbal (Pb). Telah diketahui bahwa mikroorganisme mempunyai afinitas yang tinggi terhadap logam, dapat mengakumulasi logam berat dan logam beracun dengan berbagai mekanisme. Salah satu sel mikroba yang digunakan untuk pengolahan limbah adalah bakteri. Tujuan penelitian untuk mengetahui kemampuan bioakumulasi logam berat timbal (Pb) berdasarkan waktu paparannya oleh bakteri endapan sedimen perairan sekitar rumah susun kota makassar. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode secara sengaja (*Purposive sampling*). Tahapan penelitian meliputi peremajaan bakteri menggunakan Media NA (*Nutrien Agar*) yang telah dipaparkan timbal (Pb) 350 ppm, inokulasi bakteri, uji akumulasi logam berat timbal (Pb) pada media NB (*Nutrien Broth*) dengan menggunakan inkubator shaker kecepatan 150 rpm suhu 37<sup>0</sup>C selama 3x24 jam masa inkubasi, uji kepadatan bakteri UV-VIS dan uji Spektrofotometer Serapan Atom (SSA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan waktu paparannya isolat bakteri *Alcaligenes faecalis*, *Bacillus thuringiensis* dan *Pseudomonas aeruginosa* dalam menurunkan kadar logam berat timbal (Pb) dari konsentrasi 350 ppm menjadi 28,49, 24,06 dan 30,85 ppm dengan persentase 91,71%, 92,85% dan 91,14% dalam waktu 3x24 jam.

**Kata Kunci:** Logam Berat Timbal (Pb), Bioakumulasi, Bakteri, Spektrofotometer Serapan Atom (SSA)

## ABSTRACT

**Nama** : Dewi Sakti Angraeni  
**NIM** : 60300113071  
**Judul Skripsi** : “Bioaccumulation Capability of Heavy Metal Lead (Pb)  
Based on Time Exposure By Sedimentary Sediment Bacteria  
Aquatic Around Flats of Makassar City”

---

Heavy metals can be defined as elements having atomic numbers 22-92 and lie in periods 4-7. Heavy metals have toxic effects on humans and other living things because they can agglomerate within the body of the organism and remain in the body for long periods as toxins accumulate. Heavy metals that are dangerous and often pollute the environment one of them is lead (Pb). It is known that microorganisms have a high affinity to metals, can accumulate heavy metals and toxic metals by various mechanisms. One of the microbial cells used for waste treatment is bacteria. The purpose of this research is to know bioaccumulation capability of heavy metal lead (Pb) based on time exposure by sedimentary sediment bacteria aquatic around flats of makassar city. The method used in this study is the method intentionally (*Purposive sampling*). Research stages include rejuvenation of bacteria using NA Media (*Nutrient Agar*) which has presented lead (Pb) 350 ppm, bacterial inoculation, the lead accumulation test of lead metal (Pb) on NB (*Nutrient Broth*) media using incubator shaker at 150 rpm temperature 37<sup>0</sup>C for 3x24 hours incubation period, test of UV-VIS bacteria density and Atomic Absorption Spectrophotometer (SSA) test. The results showed that based on the time of exposure of bacterial isolates *Alcaligenes faecalis*, *Bacillus thuringiensis* and *Pseudomonas aeruginosa* in lowering lead weight metal (Pb) from concentration of 350 ppm to 28,49, 24,06 and 30,85 ppm with percentage of 91,71%, 92,85% and 91,14% within 3x24 hours.

**Key Words:** Lead Weight Metal (Pb), Bioaccumulation, Bacteria, Atomic Absorption Spectrophotometer (SSA)

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Allah menciptakan bumi terdiri dari beberapa lapisan dimana terdiri dari kerak bumi, selimut bumi dan inti bumi. Pada kerak bumi terdapat logam timbal (Pb) dalam bentuk padatan (bebatuan).

Dijelaskan dalam Al-qur'an bahwa sesungguhnya Allah menciptakan sesuatu dengan tidak sia-sia. Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. Ali-'Imran: 190-191.

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ  
﴿١٩٥﴾ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ  
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطُلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya, dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), “Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia; Mahasuci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka (Kementerian Agama RI, 2012).

Tafsir QS. Ali-'Imran Ayat 191

Tafsir Al-qurtubi dalam tafsirnya merangkum ayat ini menjadi satu bagian Q.S Ali-Imran : 190, Allah swt menegaskan bahwa dalam penciptaan langit dan bumi terdapat tanda-tanda kekuasaan-Nya. Tanda-tanda itu bisa diserapi, dimaknai oleh Ulul Albab (orang-orang yang berfikir). Dalam ayat ini, kita disadarkan bahwa salah

satu wasilah mengenai Allah adalah dengan mentafakuri, memikirkan ayat-ayat Kauni-Nya pada alam. Salah satunya kekuasaan Allah dalam pergantian siang dan malam yang disebutkan dalam ayat ini. Kedua, dalam ayat 191 Firman Allah swt. “(Yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): ‘Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka’”. Firman Allah swt, artinya dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): ‘Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka’”.

Pada ayat ini Allah swt. Menyeru kepada hambanya tafakkur (merenungkan) kekuasaan Allah swt. Bertafakkur pada segala ciptaan Allah dan mengambil pelajaran dari apa yang terbayangkan, agar semua itu dapat menambah wawasan mereka terhadap Tuhan Yang Maha Pencipta (Shihab, 2010).

Pesatnya perkembangan industri dan pertanian telah mengakibatkan peningkatan pencemaran sungai dan danau dengan logam berat yang telah diidentifikasi sebagai bahaya lingkungan yang signifikan untuk ikan dan manusia (Uluturham dan Kucuksezgin, 2007). Akibat pencemaran logam berat adalah menyebabkan penurunan tingkat kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan.

Logam berat merupakan salah satu unsur pencemar perairan yang bersifat toksik dan harus terus diwaspadai keberadaannya. Penyebab utama logam berat menjadi bahan pencemar berbahaya yaitu logam berat tidak dapat dihancurkan (*non*

*degradable*) oleh organisme hidup di lingkungan dan terakumulasi ke lingkungan, terutama mengendap di dasar perairan membentuk senyawa kompleks bersama bahan organik dan anorganik secara adsorpsi dan kombinasi (Nontji, 1993).

Logam timbal (Pb) banyak digunakan sebagai bahan pengemas, saluran air, alat-alat rumah tangga dan hiasan. Dalam bentuk oksida timbal digunakan sebagai pigmen atau zat warna dalam industri kosmetik dan gelas serta industri keramik yang sebagian diantaranya digunakan dalam peralatan rumah tangga, sedangkan bentuk aerosol anorganik dapat masuk kedalam tubuh melalui udara yang dihirup atau makanan seperti sayuran dan buah-buahan yang tumbuh dari tanah yang tercemar oleh paparan logam timbal (Pb). Logam timbal (Pb) tersebut dalam jangka waktu panjang dapat terakumulasi dalam tubuh karena proses eliminasinya yang lambat dan logam yang mendapat perhatian utama dalam segi kesehatan karena dampaknya pada sejumlah besar orang akibat keracunan makanan atau udara yang memiliki sifat toksik berbahaya (Hardiani, 2012).

Berbagai macam perlakuan secara fisik dan kimia atau gabungan keduanya telah lama digunakan untuk menghilangkan logam berat dari limbah industri. Akan tetapi pada tahun terakhir ini, penggunaan sel-sel mikroba sebagai bioserben logam berat menawarkan suatu alternatif terhadap pengolahan limbah industri yang relatif lebih potensial (Avery dan Tobing, 1992). Salah satu sel mikroba yang digunakan untuk pengelolaan limbah adalah bakteri (Nakamura *et al*, 1990).

Telah diketahui bahwa mikroorganisme mempunyai afinitas yang tinggi terhadap logam, dapat mengakumulasi logam berat dan logam beracun dengan

berbagai mekanisme. Mikroorganisme termasuk didalamnya bakteri, jamur dan alga sangat efektif dalam menangkap logam berat (Octavia, 1997).

Mikroba yang toleran logam berat dengan mekanisme selain *efflux* (reduksi logam berat) disebut sebagai mikroba pengakumulasi logam berat. Bakteri ini dapat dimanfaatkan untuk mengatasi pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh logam berat. Bakteri, kapang, ganggang, dan ragi mampu mengakumulasi logam berat Ag, Au, Cd, Co, Cu, Fe, Ni, U, Zn (Gadd & White, 1993). *Pseudomonas*, *Thiobacillus*, *Bacillus*, dan bakteri penambat N<sub>2</sub> dilaporkan mampu mengakumulasi logam berat (Mullen, 1989).

Menurut Darmawibawa (2004), metode bioakumulasi oleh mikroorganisme merupakan salah satu cara yang tepat, efektif dan hampir tidak ada efek sampingnya pada lingkungan karena tidak menghasilkan racun atau blooming. Agar pengolahan limbah berlangsung secara efektif khususnya logam berat maka dilakukan langkah lanjutan dari penelitian Mastang (2016) untuk mencari tahu kemampuan ketiga bakteri tersebut dalam mengakumulasi logam berat terkhususnya timbal (Pb) dengan konsentrasi yang lebih tinggi.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dilakukan penelitian ini dengan judul “Kemampuan Bioakumulasi Logam Berat Timbal (Pb) Berdasarkan Waktu Paparannya Oleh Bakteri Endapan Sedimen Perairan Sekitar Rumah Susun Kota Makassar.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana kemampuan bioakumulasi logam berat timbal (Pb) berdasarkan waktu paparannya oleh bakteri endapan sedimen perairan sekitar rumah susun kota Makassar.

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

1. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November-Desember 2016 selama 2 bulan, yang bertempat di Laboratorium Mikrobiologi dan Laboratorium Kimia UIN Alauddin Makassar.
2. Logam berat timbal (Pb) adalah logam yang bersifat toksik terhadap manusia, yang bisa berasal dari tindakan mengonsumsi makanan, minuman, atau melalui udara, debu yang tercemar Pb, kontak lewat kulit, dan kontak mata.
3. Konsentrasi logam berat timbal (Pb) di analisis di laboratorium dengan menggunakan metode SSA (*Spektrofotometer Serapan Atom*).

## **D. Kajian Pustaka**

Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Mastang (2015) "*Isolasi Dan Identifikasi molekuler Bakteri Pengakumulasi Logam Berat Timbal (Pb) Pada Endapan Sedimen Kanal Sekitar Rumah Susun Kota Makassar*" Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah konsentrasi pencemaran logam berat timbal (Pb), mengetahui karakteristik morfologi dari koloni bakteri yang dapat mengakumulasikan logam berat timbal (Pb) dan mengetahui bakteri yang dapat mengakumulasikan

logam berat timbal (Pb) pada endapan sedimen di perairan kanal sekitar rumah susun. Hasil tiga isolat bakteri yang memiliki tingkat pertumbuhan yang paling baik di media logam timbal (Pb) yang memiliki kemampuan untuk mengakumulasi logam berat timbal yaitu isolat A8, B3 dan C2. Setelah diidentifikasi secara molekular menunjukkan bahwa isolat A8 merupakan bakteri *Pseudomonas aeruginosa*, B3 merupakan bakteri *Alcaligenes faecalis* dan isolat C2 merupakan bakteri *Bacillus thuringiensis*. Ketiga isolat tersebut mampu mengakumulasi logam berat timbal (Pb) dengan konsentrasi 250 ppm pada media NB (*Nutrient Broth*) dan jumlah persentase absorbansi dengan masing-masing isolat A8 96 %, B3 98,4 % dan C2 99,8 %.

Hasil penelitian ini juga telah didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2005), *Identifikasi Bakteri Pengikat Timbal (Pb) Pada Sedimen di Perairan Sungai Siak*, yang bertujuan untuk mendapatkan isolat-isolat bakteri yang mampu mengikat logam berat khususnya timbal (Pb) untuk mengurangi pencemaran timbal (Pb) dari limbah industri secara biologis dan diharapkan dapat memberikan informasi tentang peran mikroorganisme (bakteri) sebagai pengikat (biosorbent) logam berat khususnya timbal untuk mengurangi pencemaran di suatu perairan sungai. Jumlah total bakteri pengikat timbal (Pb) pada sedimen di perairan sungai Siak Pekanbaru berkisar antara  $3,0 \times 10^7$  samapai  $1,5 \times 10^8$  sel/ml. isolasi bakteri pengikat timbal (Pb) pada sedimen di perairan sungai Siak Pekanbaru yang ditemukan 6 jenis yaitu *Micrococcus*, *Corynebacterium*, *Phenylobacterium*, *Enhydrobacter*, *Morrococcus*, *Flavobacterium*.

Khoiroh (2014) melakukan penelitian *Bioremediasi Logam Berat Timbal (Pb) Dalam Lumpur Lapindo Menggunakan Campuran Bakteri Pseudomonas pseudomallei dan Pseudomonas aeruginosa*. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh campuran bakteri (*Pseudomonas pseudomallei* dan *Pseudomonas aeruginosa*) terhadap jumlah total sel bakteri pada proses bioremediasi logam Pb lumpur Lapindo dan kadar logam Pb dalam lumpur Lapindo. Pengukuran kadar logam timbal (Pb) menggunakan AAS, dan perhitungan jumlah total sel dilakukan menggunakan metode TPC. Campuran bakteri yang digunakan adalah *Pseudomonas pseudomallei* dan *Pseudomonas aeruginosa* dengan berbagai konsentrasi (0%, 9%, 12%, dan 15%). Proses bioremediasi dilakukan dengan lama inkubasi (0, 20, 30, dan 40 hari). Hasil penelitian menunjukkan, jumlah total sel tertinggi terdapat pada perlakuan dengan penambahan campuran bakteri sebesar 15%, dengan jumlah sel  $6,57 \times 10^{10}$ . Persen penurunan kadar logam berat timbal (Pb) tertinggi terdapat pada perlakuan dengan penambahan mikroba eksogen sebesar 12%, dengan persen penurunan sebesar 65% dari kadar awal logam sebesar 3,5 ppm menjadi 1,21 ppm.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Lewaru dkk (2012) dengan judul identifikasi bakteri indigenous pereduksi logam berat Cr (VI) dengan metode molekuler di sungai cikijing rancaekek, jawa barat. Sampel beasal dari air dan sedimen sungai cekijing. Tahapan penelitian meliputi kultivasi bakteri, ujiantang dengan konsentrasi yang digunakan yaitu 50, 150, 500, 1000, uji reduksi dengan konsentrasi 300, 700 dan 1000 ppm dan identifikasi molekuler gen 16S rRNA. Hasil

penelitian didapat 10 isolat murni bakteri dan semua bakteri mempunyai resisten terhadap konsentrasi Cr (VI). Dua bakteri mempunyai tingkat resisten, tingkat reduksi tertinggi dengan melihat OD (*optical densite*), yaitu A.3.3 yang dapat menurunkan 1085,25 ppm menjadi 468,30 ppm dan S.3.1 dapat menurunkan 1083,25 ppm menjadi 856,20 ppm dalam waktu  $\pm 24$  jam. Hasil identifikasi molekuler menunjukkan spesies bakteri A.3.3 adalah *Bacillus thuringiensis* dan isolat S.3.1 adalah *Staphylococcus arlettae*.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Guo *et all* (2010) Bioremediasi Logam Berat Dengan Menumbuhkan *Hyperaccumulaor* Bakteri Endofit Bacillus Sp. L14 Logam berat bioremediasi oleh bakteri endofit resisten multi logam L14 (EB L14) terisolasi dari *hyperaccumulator* kadmium *Solanum nigrum* L. ditandai untuk aplikasi potensial dalam pengolahan logam. 16S rDNA analisis mengungkapkan bahwa endofit ini milik Bacillus sp. Hormesis EB L14 diamati di hadapan divalent logam berat (Cu (II), Cd (II) dan Pb (II)) pada konsentrasi yang relatif lebih rendah (10 mg/L). Hormesis tersebut adalah efek samping dari kegiatan normal kenaikan ATPase yang direncanakan untuk menyediakan energi untuk membantu mengurangi toksisitas logam berat dengan mengekspor kation L14 EB. Dalam inkubasi 24 jam, EB L14 bisa khusus penyerapan 75.78%, 80.48%, 21,25% dari Cd (II), Pb (II) dan Cu (II) di bawah konsentrasi awal 10 mg/L.

### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui kemampuan bioakumulasi logam berat timbal (Pb) berdasarkan waktu paparannya oleh bakteri endapan sedimen perairan sekitar rumah susun kota makassar.

### **F. Kegunaan Penelitian**

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada:

#### 1. Bagi Instansi

- a. Sebagai masukan bagi pengambil keputusan suatu instansi atau institusi dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pencemaran logam berat.
- b. Memberikan informasi bahanya logam berat Timbal (Pb).
- c. Sebagai tambahan informasi bahwa dengan adanya bakteri *Pseudomonas aeruginosa*, *Alcaligenes faecalis* dan *Bacillus thuringiensis* dalam mengakumulasi logam berat timbal (Pb) agar dapat mengurangi dampak pencemaran logam berat.

#### 2. Bagi Masyarakat

Menambah pengetahuan masyarakat untuk peka terhadap situasi lingkungan di sekitar yang berhubungan dengan kesehatan.

#### 3. Bagi Peneliti maupun Perguruan Tinggi

- a. Meningkatkan pengetahuan peneliti dan menambah masukan pengetahuan kepada peneliti mengenai kemampuan bioakumulasi logam berat timbal (Pb) berdasarkan waktu paparannya oleh bakteri endapan sedimen perairan sekitar rumah susun kota Makassar.

- b. Dapat dijadikan bahan kajian untuk penelitian selanjutnya.



## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORITIS**

#### ***A. Tinjauan Umum Logam Berat***

Logam berat dapat didefinisikan sebagai unsur-unsur yang mempunyai nomor atom 22-92 dan terletak pada periode 4 – 7. Logam berat mempunyai efek racun terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya. Logam berat yang berbahaya dan sering mencemari lingkungan adalah merkuri (Hg), timbal (Pb), arsenik (As), kadmium (Cd), kromium (Cr), dan nikel (Ni). Logam-logam tersebut dapat menggumpal didalam tubuh organisme dan tetap tinggal dalam tubuh dalam jangka waktu yang lama sebagai racun yang terakumulasi (Fardiaz, 1992).

Menurut (Connel dan Miller, 1995), kegiatan manusia merupakan suatu sumber utama pemasukan logam berat ke dalam lingkungan perairan. Masuknya logam berat berasal dari buangan langsung berbagai jenis limbah yang beracun. Logam berat berasal dari kerak bumi yang berupa bahan-bahan murni, organik, dan anorganik. Logam berat mula-mula diambil dari pertambangan di bawah tanah (kerak bumi), yang kemudian dicairkan dan dimurnikan dalam pabrik menjadi logam-logam murni. Dalam proses pemurnian logam tersebut yaitu dari pencairan sampai menjadi logam, sebagian darinya terbuang ke dalam lingkungan (Darmono, 1995).

Umumnya logam-logam yang terdapat dalam tanah dan perairan dalam bentuk persenyawaan, seperti senyawa hidroksida, senyawa oksida, senyawa karbonat, dan

senyawa sulfida. Senyawa-senyawa itu sangat mudah larut dalam air. Namun demikian pada badan perairan yang mempunyai derajat keasaman mendekati normal atau pada daerah kisaran pH 7 sampai 8, kelarutan dari senyawa-senyawa ini cenderung stabil (Darmono, 2001).

Sumber tersebarnya logam dalam lingkungan dan di udara karena proses digunakannya logam tersebut pada suhu yang tinggi. Misalnya, penggunaan batu bara dan minyak bumi untuk pembangkit tenaga listrik, proses industri, peleburan logam, pemurnian logam, pembakaran sampah, dan industri semen. Dalam proses tersebut logam dikeluarkan ke udara di daerah sekitarnya. Logam seperti arsen (As), merkuri (Hg), kadmium (Cd) dan timbal (Pb) banyak dipelajari oleh para ilmuwan karena keempat logam tersebut sangat berbahaya terhadap kehidupan makhluk hidup. Emisi logam tersebut dalam proses penggunaan suhu tinggi akan merusak siklus biogeokimia sistem tata kehidupan manusia dan alam sekitarnya. Untuk mengetahui dan mengukur seberapa jauh kerusakan yang ditimbulkannya perlu diinventarisasikan seberapa besar jumlah konsentrasi emisi dari logam tersebut (Darmono, 2001). Dalam kelompok inti polutan air logam berat memiliki sifat yang bioakumulatif dan *non biodegradable* (Kazim Uysal dkk, 2015).

Logam berat dalam air mudah terserap dan tertimbun dalam fitoplankton yang merupakan titik awal dari rantai makanan, selanjutnya melalui rantai makanan sampai ke organisme lainnya (Fardiaz, 1992). Kadar logam berat dalam air selalu berubah-ubah tergantung pada saat pembuangan limbah, tingkat kesempurnaan, pengelolaan limbah, dan musim. Logam berat yang terikat dalam sedimen relatif sukar untuk lepas

kembali melarut dalam air, sehingga semakin banyak jumlah sedimen maka semakin besar kandungan logam berat di dalamnya (Muchyiddin, 2007). Keberadaan logam di badan perairan dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan diantaranya adalah suhu, pH dan salinitas (Palar, 1994).

Akumulasi logam berat dalam tubuh organisme tergantung pada konsentrasi logam berat dalam air atau lingkungan, suhu, keadaan spesies dan aktivitas fisiologis. Organisme laut lebih memiliki daya tahan dibandingkan dengan biota air tawar. Kelarutan timbal di air cukup rendah mengakibatkan kadarnya relatif sedikit. Kadar dan toksisitas timbal dipengaruhi oleh kesadaran, pH, alkalinitas dan kadar oksigen (Darmono, 1995).

Jumlah debit yang besar logam akan terkontaminasi pada air limbah, industri bantalan logam berat, seperti kadmium (Cd), kromium (Cr), tembaga (Cu), nikel (Ni), arsen (As), timbal (Pb), dan Seng (Zn), yang paling berbahaya di antara industri kimia intensif. Karena kelarutan tinggi di lingkungan perairan, logam berat dapat diserap oleh organisme hidup setelah memasuki rantai makanan, konsentrasi besar logam berat dapat terakumulasi dalam tubuh manusia. Jika logam yang terserap di luar konsentrasi, maka dapat menyebabkan gangguan kesehatan yang serius (Babel dan Kurniawan, 2004).

Kebanyakan logam berat secara biologis terkumpul dalam tubuh organisme, menetap untuk waktu yang lama dan berfungsi sebagai racun kumulatif (Darmono, 1995). Keberadaan logam berat dalam perairan akan berpengaruh negatif terhadap

kehidupan biota. Logam berat yang terikat dalam tubuh organisme yaitu pada ikan akan mempengaruhi aktivitas organisme tersebut (Kadir, 2013).

Menurut (Laws, 1981), tingginya kandungan logam berat di suatu perairan dapat menyebabkan kontaminasi, akumulasi bahkan pencemaran terhadap lingkungan seperti biota, sedimen, air, dan tanah. Berdasarkan kegunaannya, logam berat dapat dibedakan atas dua golongan, yaitu :

1. Golongan yang dalam konsentrasi tertentu berfungsi sebagai mikronutrien yang bermanfaat bagi kehidupan organisme perairan, seperti Seng (Zn), besi (Fe), tembaga (Cu).
2. Golongan yang sama sekali belum diketahui manfaatnya bagi organisme perairan, seperti merkuri (Hg) dan timbal (Pb).

Adanya logam berat di perairan, berbahaya baik secara langsung terhadap kehidupan organisme, maupun efeknya secara tidak langsung terhadap kesehatan manusia. Hal ini berkaitan dengan sifat-sifat logam berat yaitu sulit didegradasi, sehingga mudah terakumulasi dalam lingkungan perairan dan keberadaannya secara alami sulit terurai (dihilangkan), dapat terakumulasi dalam organisme termasuk kerang dan ikan, dan akan membahayakan kesehatan manusia yang mengkonsumsi organisme tersebut (Nontji, 1993).

Logam berat biasanya ditemukan sangat sedikit dalam air. Secara alamiah, yaitu kurang dari 1  $\mu\text{g/l}$ . Bila terjadi erosi alamiah, konsentrasi logam tersebut dapat meningkat. Beberapa macam logam biasanya lebih dominan daripada logam lainnya dan dalam air biasanya tergantung pada asal sumber air (air tanah dan air sungai).

Disamping itu jenis air (air tawar, air payau dan air laut) juga mempengaruhi kandungan logam di dalamnya (Darmono, 2001).

Kadar ini dapat meningkat jika terjadi peningkatan limbah yang mengandung logam berat masuk ke dalam laut. Limbah ini dapat berasal dari aktivitas manusia di laut yang berasal dari pembuangan sampah kapal-kapal, penambangan logam di laut, dan yang berasal dari darat seperti limbah perkotaan, pertambangan, pertanian, dan perindustrian (Kadir, 2013).

Kontaminasi logam berat di lingkungan merupakan masalah, karena akumulasinya sampai pada rantai makanan dan keberadaannya di alam tidak mengalami transformasi (perubahan), sehingga menyimpan potensi keracunan yang berbahaya (Notodarmojo, 2005).

Allah Berfirman dalam QS Ar-Ra'd/13: 17.

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حُلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلَهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ١٧

Terjemahnya:

Allah telah menurunkan air (hujan) dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, maka arus itu membawa buih yang mengambang. Dan dari apa (logam) yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada (pula) buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan (bagi) yang benar yang bathil. Adapun buih itu, akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya; adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan (Kementrian Agama RI, 2012).

Yang dimaksud dengan firman-Nya *amma ma yanfa'u an-nasa* atau adapun yang bermanfaat bagi manusia adalah *air* bukan buihnya dan logam setelah dibakar. Ayat ini tidak menyebut air dan logam itu secara langsung tetapi menegaskan manfaatnya. Hal tersebut untuk mengisyaratkan bahwa yang penting bukan air atau logamnya, tetapi manfaat yang harus dihasilkan oleh air dan logam itu, yang lebih penting adalah manfaat dan penerapan ide-ide yang benar itu dalam kehidupan duniawi sehingga dapat memberi manfaat.

Banyak ulama memahami bahwa ayat di atas menampilkan dua macam perumpamaan, masing-masing untuk kebenaran dan untuk kebatilan. Contoh pertama bagi kebenaran adalah air yang mengalir dengan sangat deras dan contoh kedua adalah logam dengan kualitasnya yang jernih. Sedang contoh pertama dari kebatilan adalah buih yang dihasilkan oleh derasnya arus air dan contoh kedua adalah karat yang keluar akibat pembakaran logam.

Berbagai jenis barang tambang yang dihasilkan manusia melalui proses pembakaran seperti emas, perak, tembaga dan timah ada yang dapat dijadikan perhiasan atau peralatan seperti bejana, ada juga yang berupa sampah seperti sampah air yang mengapung di atas permukaan air. Bagian barang tambang yang mengalir itu disebut *khabits* (limbah). Dengan tamsil air dan limbahnya serta tambang dan limbahnya itu, Allah menerangkan kebenaran dan kebatilan. Kebenaran diibaratkan sebagai air dan tambang yang jernih, sedangkan kebatilan diibaratkan sebagai limbah air dan limbah tambang yang tidak mungkin dapat dimanfaatkan dan akan lenyap dan terbuang. Sedangkan air jernih dan tambang jernih yang dapat berguna unuk

kepentingan manusia akan bertahan didalam tanah agar dapat dimanfaatkan. Dengan tamsil yang sangat jelas seperti itulah Allah swt. memperlihatkan kebaikan dan kejahatan kepada manusia (Shihab, 2002).

### **B. Tinjauan Umum Timbal (Pb)**

Timbal (Pb) pada awalnya adalah logam berat yang secara alami terdapat di dalam kerak bumi. Namun, timbal (Pb) juga biasa berasal dari kegiatan manusia bahkan mampu mencapai jumlah 300 kali lebih banyak dibandingkan timbal (Pb) alami. Timbal (Pb) adalah logam lunak berwarna abu-abu kebiruan mengkilap serta mudah dimurnikan dari pertambangan. Timbal (Pb) meleleh pada suhu  $328^{\circ}\text{C}$  ( $662^{\circ}\text{F}$ ), titik didih  $1740^{\circ}\text{C}$  ( $3164^{\circ}\text{F}$ ) dan memiliki gravitasi 11,34 dengan berat atom 207,2. Timbal (Pb) memiliki titik lebur rendah, mudah dibentuk, memiliki sifat kimia yang aktif, sehingga bisa digunakan untuk melapisi logam agar tidak timbul perkaratan. Apabila dicampur dengan logam lain akan terbentuk logam campuran yang lebih bagus daripada logam murninya (Wahyu, 2008).

Logam timbal di bumi jumlahnya sangat sedikit, yaitu 0,0002% dari jumlah kerak bumi bila dibandingkan dengan jumlah kandungan logam lainnya yang ada di bumi. Timbal adalah logam yang mendapat perhatian karena bersifat toksik melalui konsumsi makanan, minuman, udara, air serta debu yang tercemar timbal . Intoksikasi (keracunan) timbal (Pb) biasa terjadi melalui jalur oral, lewat makanan, minuman, pernapasan, kontak lewat kulit, dan kontak lewat parenteral (jaringan tubuh) (Wahyu, 2008).

Logam timbal (Pb) banyak digunakan pada industri baterai, kabel, cat (sebagai zat pewarna), penyepuhan, pestisida, dan yang paling banyak digunakan sebagai zat antiletup pada bensin. Timbal (Pb) juga digunakan sebagai zat penyusun patri atau solder dan sebagai formulasi penyambung pipa yang mengakibatkan air untuk rumah tangga mempunyai banyak kemungkinan kontak dengan timbal (Pb) (Aminah, 2010).

Organisme yang terekespos logam berat timbal (Pb) dengan konsentrasi rendah biasanya tidak mengalami kematian, tetapi akan mengalami pengaruh subletal, yaitu pengaruh yang terjadi pada organisme tanpa mengakibatkan kematian pada organisme tersebut. Pengaruh subletal ini dapat dibedakan atas tiga macam, yaitu menghambat (misalnya pertumbuhan dan perkembangan, serta reproduksi), menyebabkan terjadinya perubahan morfologi dan merubah tingkah laku organisme. Logam berat yang dilimpahkan ke perairan, baik sungai ataupun laut, akan mengalami paling tidak tiga proses, yaitu pengendapan, adsorpsi, dan absorpsi oleh organisme-organisme perairan (Bryan, 1976).

Menurut (Rompas, 2010), timbal (Pb) termasuk polutan di laut yang sangat berbahaya, tidak hanya bagi biota perairan, tetapi akan berdampak bagi manusia yang memakannya. Faktor yang menyebabkan logam tersebut dikelompokkan ke dalam zat pencemar adalah :

1. Logam tidak dapat terurai melalui biodegradasi seperti pencemar organik.
2. Logam dapat terakumulasi dalam lingkungan terutama dalam sedimen sungai dan laut, karena dapat terikat dengan senyawa organik dan anorganik, melalui proses adsorpsi dan pembentukan senyawa kompleks. Karena logam dapat terakumulasi

dalam sedimen, maka kadar logam dalam sedimen lebih besar dari logam dalam air.

### ***C. Tingkat Pencemaran Timbal (Pb)***

Emisi timbal (Pb) dari pembakaran mesin menyebabkan jumlah timbal (Pb) udara dari asap buangan kendaraan meningkat sesuai meningkatnya jumlah kendaraan. Hasil emisi gas pembuangan kendaraan bermotor akan meningkatkan pula kadar timbal (Pb) di udara. Asap kendaraan bermotor bisa mengeluarkan partikel timbal (Pb) yang kemudian bisa mencemari udara, tanaman di sekitar jalan raya, perairan, dan asap juga bisa terserap oleh manusia secara langsung melalui pernapasan kulit (Wahyu, 2008). Pencemaran timbal (Pb) dari kegiatan transportasi darat dikarenakan oleh penggunaan dalam bahan bakar berkualitas rendah untuk menurunkan nilai mesin kendaraan. Jumlah senyawa timbal (Pb) yang jauh lebih besar menyebabkan jumlah timbal (Pb) yang dibuang ke udara sangat tinggi (Palar, 1994).

### ***D. Toksisitas Timbal (Pb)***

Toksisitas timbal (Pb) bersifat kronis dan akut. Toksisitas kronis sering dijumpai pada pekerja tambang dan pabrik pemurnian logam, pembuatan baterai, percetakan, pelapisan logam, dan pengecatan. Paparan timbal (Pb) secara kronis bisa menyebabkan kelelahan, kelesuhan, gangguan iritabilitas, kehilangan libido, gangguan menstruasi serta aborsi spontan pada wanita, depresi, sakit kepala, sulit

berkonsentrasi, daya ingat terganggu, dan sulit tidur. Toksisitas akut bisa terjadi bila timbal (Pb) masuk ke dalam tubuh seseorang melalui makanan atau menghirup gas timbal (Pb) dalam waktu yang relatif pendek dengan dosis atau kadar yang relatif tinggi (Wahyu, 2008).

Di dalam tubuh manusia, timbal (Pb) bisa menghambat aktivitas enzim yang terlibat dalam pembentukan Hemoglobin (Hb) dan sebagian kecil timbal (Pb) diekskresikan lewat urin atau feses karena sebagian terikat oleh protein, sedangkan sebagian lagi terakumulasi dalam ginjal, hati, kuku, jaringan lemak, dan rambut. Waktu paruh timbal (Pb) dalam eritrosit adalah selama 35 hari dalam jaringan ginjal dan hati selama 40 hari, sedangkan dalam tulang selama 30 hari. Tingkat ekskresi timbal (Pb) melalui sistem urin adalah sebesar 76%, gastrointestinal 16%, dan untuk rambut, kuku, serta keringat sebesar 8% (Wahyu, 2008).

Menurut (Wahyu, 2008) timbal bersifat kumulatif. Mekanisme toksisitas timbal (Pb) berdasarkan organ yang dipengaruhinya adalah:

1. Sistem hematopoietik; dimana timbal (Pb) menghambat sistem pembentukan hemoglobin (Hb) sehingga menyebabkan anemia.
2. Sistem saraf; dimana timbal (Pb) bisa menimbulkan kerusakan otak dengan gejala epilepsi, halusinasi, kerusakan otak besar, dan delirium.
3. Sistem urinaria; dimana timbal (Pb) bisa menyebabkan lesi tubulus proksimalis, *loop of Henle*, serta menyebabkan aminosiduria.
4. Sistem kardiovaskuler; dimana timbal (Pb) bisa menyebabkan peningkatan permeabilitas pembuluh darah.

5. Sistem reproduksi; berpengaruh terutama terhadap gametotoksisitas atau janin belum lahir menjadi peka terhadap timbal (Pb). Ibu hamil yang terkontaminasi timbal (Pb) bisa mengalami keguguran, tidak berkembangnya sel otak embrio, kematian janin waktu lahir, serta hipospermia, dan teratospermia pada pria.
6. Sistem endokrin; dimana timbal (Pb) mengakibatkan gangguan fungsi tiroid dan fungsi adrenal.
7. Gangguan gastrointestinal, seperti kram perut, dan biasanya diawali dengan sembelit, mual, muntah-muntah, dan sakit perut yang hebat.
8. Gangguan neurologi, berupa ensefalopati seperti sakit kepala, bingung atau pikiran kacau, sering pingsan, dan koma
9. Bersifat karsinogenik dalam dosis tinggi.

Menurut (Wahyu, 2008), toksisitas akut bisa terjadi jika timbal (Pb) masuk ke dalam tubuh seseorang melalui makanan atau menghirup gas timbal (Pb) dalam waktu yang relatif pendek dengan dosis atau kadar yang lebih tinggi.

Timbal (Pb) pada anak bisa merusak jaringan saraf, fungsi ginjal, menurunnya kemampuan belajar, dan membuat anak-anak bersifat hiperaktif. Selain itu, timbal (Pb) juga mempengaruhi organ-organ tubuh, antara lain: sistem saraf, ginjal, sistem reproduksi, endokrin, dan jantung serta gangguan pada otak sehingga anak mengalami gangguan kecerdasan mental (Wahyu, 2008).

Keracunan timbal (Pb) pada orang dewasa kebanyakan terjadi di tempat mereka bekerja. Prevalensi kejadiannya bervariasi untuk setiap jenis pekerjaannya. Gejala yang terlihat ialah penderita terlihat pucat, sakit perut, konstipasi, muntah,

anemia, dan sering terlihat adanya garis biru tepat di daerah gusi di atas gigi. Pada pemeriksaan psikologi dan neuropsikologi ditemukan adanya gejala sulit mengingat (sistem memori sangat berkurang), konsentrasi menurun, kurang lancar berbicara, dan gejala saraf lainnya. Resiko terjadinya toksisitas timbal (Pb) pada orang dewasa tergantung pada pekerjaannya yang biasanya bersifat kronis. Pada pemeriksaan darah para pekerja terhadap konsentrasi timbal (Pb) akan diketahui seberapa jauh derajat toksisitas kronis timbal (Pb) tersebut (Darmono, 2001).

Kadar normal timbal (Pb) pada orang dewasa adalah antara 0,4-0,5 mg/l dalam darah dan untuk anak-anak 0,25mg/l kadar timbal (Pb) yang normal (Baird, 1995). Pemerintah Republik Indonesia no. 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dengan batas kandungan logam berat untuk timbal (Pb) dan cadmium (Cd) tidak boleh melebihi 0,03 mg/L dan 0,01 mg/L pada suatu perairan (Arif, 2012).

#### **E. Tinjauan Umum Bakteri**

Bakteri adalah makhluk hidup yang sangat kecil dan hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop (Irianto, 2006). Bakteri tergolong mikroba uniseluler. Pada umumnya bakteri tidak memiliki klorofil. Ada beberapa yang fotosintetik dan reproduksi secara pembelahan. Bakteri disebut juga sebagai *Ubiquitos*, artinya ada di mana-mana. Jumlah bakteri tergantung keadaan sekitar. Misalnya jumlah bakteri dalam tanah tergantung jenis dan tingkat kesuburan tanah (Hidayat dkk, 2006).

## 1. Bakteri *Alcaligenes faecalis*

*Alcaligenes faecalis* merupakan bakteri Gram-negatif bersifat aerob merupakan bakteri berbentuk batang tak berpigmen. Karakteristik ini membedakannya dengan *Pseudomonas*. Spesies ini bersifat motil dengan satu atau lebih flagela. Bakteri dari famili *Achromobacter* ini tidak berkapsul, tidak membentuk spora dan tumbuh dengan lambat (Kavuncuoglu *et al.* 2010). Bakteri *Alcaligenes faecalis* dapat umum ditemukan di lingkungan yaitu pada tanah dan air juga dapat tumbuh pada suhu 37<sup>0</sup>C (Latt *et al.* 2013).




Gambar 3.1 Bakteri *Alcaligenes faecalis* (www. Google. <http://>) gambar bakteri *Alcaligenes faecalis*, 28 Juli 2017).

Klasifikasi dari bakteri *Alcaligenes faecalis* sebagai berikut:

Kingdom : Bacteria  
Phylum : Proteobacteria  
Class : Beta proteobacteria  
Ordo : Burkholderiales  
Family : Alcaligeneceae  
Genus : Alcaligenes  
Spesies : *Alcaligenes faecalis* (Chastellani & Chalmers, 1919).

## 2. Bakteri *Bacillus thuringiensis*

*Bacillus* merupakan bakteri berbentuk batang, memiliki ukuran lebar 1,0-1,2  $\mu\text{m}$ , panjang 3-5  $\mu\text{m}$  dan diameter 5-10  $\mu\text{m}$  termasuk gram positif bersifat aerob dan dapat membentuk endospora berbentuk oval. Anggota spesies dari genera *Bacillus* menunjukkan kemampuan fisiologis yang luas sehingga dapat hidup di berbagai lingkungan termasuk lingkungan yang ekstrim seperti habitat yang tercemar logam timbal (Pb). Kemampuan fisiologis bakteri tersebut dalam mengatasi tekanan adsorpsi pada dinding sel atau permukaan eksternal, kemudian diikuti dengan transport aktif yang tergantung pada metabolisme sel (Gadd, 1992). Selain itu, *Bacillus thuringiensis* dapat tumbuh pada kisaran pH 6.4 - 7.5 (Kwalimwa, 2012) dan mampu tumbuh optimum pada pH 7.0 (Kesharvazi *et.all*, 2005).



Gambar 3.2 Bakteri *Bacillus thuringiensis* (www. Google. <http://>) gambar bakteri *Bacillus thuringiensis*, 28 Juli 2017).

Klasifikasi dari bakteri *Bacillus thuringiensis* sebagai berikut:

Kingdom	: Eubacteria
Phylum	: Firmicitus
Class	: Bacilli
Order	: Bacillales
Family	: Bacillaceae
Genus	: Bacillus
Spesies	: <i>Bacillus thuringiensis</i> (Berliner, 1915).

### 3. Bakteri *Pseudomonas aeruginosa*

Bakteri *Pseudomonas aeruginosa* merupakan bakteri gram-negatif aerob obligat. Berbentuk batang dengan ukuran sekitar 1,0  $\mu\text{m}$ . Bakteri tersebut terlihat sebagai bakteri tunggal, berpasangan dan terkadang membentuk rantai yang pendek.

Berkapsul, mempunyai flagella monotrik (flagel tunggal pada salah satu kutub) polar sehingga bakteri ini bersifat motil dan memiliki suhu pertumbuhan  $42^{\circ}\text{C}$ . Bakteri *Pseudomonas aeruginosa* juga mampu mengakumulasi berbagai logam berat diantaranya, merkuri (Hg), tembaga (Cu), kromium (Cr), dan timbal (Pb) yang mencemari tanah maupun air dan menjadi masalah besar dalam kesehatan publik (Nagashetti, 2013). *Pseudomonas aeruginosa* ditandai dengan tingkat resistensi yang tinggi terhadap xenobiotik. Termasuk agen antimikroba, pelarut dan logam berat (Wang, C. L dkk, 1997).



Gambar 3.3 Bakteri *Pseudomonas aeruginosa* (www. Google. <http://>) gambar bakteri *Pseudomonas aeruginosa*, 28 Juli 2017).

Klasifikasi dari bakteri *Pseudomonas aeruginosa* sebagai berikut:

Kingdom : Bacteria  
Phylum : Proteobacteria  
Class : Gamma Proteobacteria  
Order : Pseudomonadales  
Family : Pseudomonadaceae  
Genus : Pseudomonas  
Spesies : *Pseudomonas aeruginosa* (Schroter, 1872).

#### **F. Perbedaan Bakteri Gram Positif dan Gram Negatif**

Permukaan bakteri gram positif dan gram negatif merupakan permukaan yang baik untuk penyepapan kation logam lingkungan air. Hal ini karena sifat anionik dari peptidoglikan dan polimer kedua yang menyusun permukaan bakteri gram positif dan karena grup fosforil dari lipoposakarida yang terdapat pada membran luar bakteri gram negatif. Secara umum permukaan dinding sel bakteri gram positif mempunyai kapasitas yang lebih besar untuk mengikat ion logam daripada gram negatif (Allen, 1995).

Pengikatan logam berat timbal oleh bakteri *Bacillus thuringiensis* yang merupakan gram positif terjadi karena adanya sifat anionik dari peptidoglikan dan polimer kedua yang menyusun permukaan selnya. Peptidoglikan merupakan komponen utama dari dinding selnya. Polimer kedua yang berperan dalam penyerapan logam adalah asam teikhoit yang bersama dengan peptidoglikan merupakan bahan

yang paling penting dalam hal kemampuan dinding untuk menyerap ion logam. Asam teikhoit sendiri merupakan senyawa yang bermuatan negatif kuat dan struktural terikat pada peptidoglikan (William *et all*, 1995).

Berbeda dengan bakteri gram negatif, pengikatan logam berat timbal oleh bakteri melibatkan lapisan peptidoglikan dan membran luar yang terdiri dari struktur bilayer yang terdiri dari fosfolipid pada bagian dalam dan liposakarida pada bagian luarnya. Membran ini merupakan membran pertama yang berhadapan langsung dengan lingkungan luar dan konsekuensinya merupakan pertimbangan terpenting dalam pengikatan logam oleh bakteri gram negatif (Allen, 1995). Ditambahkan oleh hughes poole (1989) bahwa, pengikatan logam berat oleh bakteri gram negatif dapat ditemukan pada selubung sel atau komponen membran sel di bagian gugus fosfat dari liposakarida.

Tabel 3.4 Perbedaan susunan bakteri gram positif dan gram negatif (Irianto, 2006).

No.	Gram Positif	Gram Negatif
1	komponen terbesar dari mukopeptida	Terdiri dari tiga lapisan yaitu lapisan dalam adalah mukopeptida. Lapisan bagian luar terdiri dari dua lapisan yaitu lipopolisakarida dan lipoprotein
2	Pada beberapa bakteri terdapat asam teikhoit	Tidak ada asam teikhoit
3	Mikopeptida mengalami lisis oleh lisozim	Lisozim melunakkan dinding sel
4	Dinding sel tebal, 25-30 nm	Dinding sel tipis, 10-15 nm

### **G. Tinjauan Fase Pertumbuhan Pada Bakteri**

Pada pertumbuhan mikroorganisme misalnya bakteri selang untuk terbentuknya dua sel anakan dari satu sel induk dinamakan generasi dan waktu yang dibutuhkan untuk terjadinya pembelahan sel tersebut dinamakan waktu generasi. Waktu generasi tersebut berbeda-beda pada tiap-tiap jenis bakteri (Brock *et all*, 1991). Hubungan antara jumlah sel dengan waktu pertumbuhan dapat dinyatakan dalam kurva pertumbuhan (Cappucino dan Natalie, 1982).

Menurut (Nadyah, 2011) pada pertumbuhan bakteri terdiri atas beberapa fase yaitu :

1. Fase lag (lambat), merupakan fase dimana bakteri beradaptasi dengan lingkungannya dan mulai bertambah sedikit demi sedikit.
2. Fase logaritmik (eksponensial), merupakan fase dimana pembiakan bakteri berlangsung paling cepat.
3. Fase stasioner, merupakan fase dimana jumlah bakteri yang berkembang biak sama dengan jumlah bakteri yang mengalami kematian.
4. Fase autolisis (kematian), adalah fase dimana jumlah bakteri yang mati semakin banyak, melebihi jumlah bakteri yang berkembang biak. Fase kematian ditandai dengan cepat meratanya koloni dan jumlah bakteri yang mati semakin bertambah.



hidup bebas dan tubuh inang adalah suhu optimum untuk bakteri yang bersimbiosis.

4. Oksigen, memiliki hubungan antara dengan Oksigen maka dapat dibedakan sekurang-kurangnya 3 kelompok bakteri:
  - a. Bakteri aerob obligat: bakteri yang mampu menghasilkan energi hanya melalui respirasi.
  - b. Bakteri anaerob obligat: bakteri yang hanya dapat hidup dalam lingkungan bebas Oksigen (Oksigen untuk bakteri ini bersifat toksik).
  - c. Bakteri anaerob fakultatif: bakteri yang tumbuh dengan adanya Oksigen udara.
5. Tekanan osmotik. Bakteri yang membutuhkan konsentrasi garam yang tinggi dan yang membutuhkan tekanan osmotik tinggi dinamakan osmofilik (Stainer dkk, 1984).

#### **H. Tinjauan Kemampuan Bakteri Mengakumulasi Logam Berat**

Mikroba dalam proses degradasinya menggunakan senyawa kimia tersebut untuk pertumbuhan dan reproduksinya melalui berbagai proses oksidasi. Pada pengikatan logam berat oleh bakteri dapat dipisahkan menjadi fase pengikatan transpor aktif. Fase pengikatan tergantung pada metabolisme sel yaitu absorpsi melalui dinding sel atau permukaan eksternal, kemudian diikuti dengan transport aktif yang tergantung pada metabolisme sel. Pada proses metabolisme, logam berat dapat terakumulasi pada membran sel (ekstraseluler) dan pada sitoplasma (intraseleuler) (Aminah, 2009).

Akumulasi ekstraseluler dapat terjadi karena pengikatan ion-ion logam oleh polimer ekstraseluler atau polisakarida ekstraseluler yang dihasilkan oleh sel-sel mikroba dan komplikasi antara ion-ion logam yang bermuatan positif dengan sisi reaktif pada permukaan sel yang bermuatan negatif. Sedangkan akumulasi intraseluler dapat terjadi karena proses difusi yang tidak membutuhkan aktifitas mikroba secara langsung dimana gen-gen yang mengendalikan plasmid dalam proses metabolisme tersebut (Aminah, 2009).

Menurut (Lewaru, 2012) proses bakteri dalam mereduksi logam berat timbal (Pb) dalam melalui kondisi aerobik dan anaerobik. Dalam kondisi aerobik logam direduksi dengan bantuan NADH sebagai donor elektron dan pada kondisi anaerobik logam direduksi menggunakan *Cytoplasmic membrane protein* yang dimiliki oleh bakteri.

Kemampuan mengakumulasi logam berat oleh bakteri disebabkan adanya kemampuan bakteri dalam menurunkan toksisitas logam berat tersebut atau bahkan menghilangkannya. cara yang dilakukan adalah dengan:

1. Mengeluarkan cairan ekstra seluler yang selanjutnya bereaksi dengan logam berat tersebut dan kemudian logam berat yang ada diendapkan disekeliling sel dalam bentuk molekul organik (Suriawira, 1993)
2. Logam berat tersebut ikut dalam metabolisme sel bakteri. Logam berat tersebut mengalami proses biotransformasi desktruksi (perubahan senyawa kimia oleh enzim) berupa reaksi reduksi dan kemudian membentuk molekul organik (Brock

*et all*, 1991). Adanya kemampuan mengadakan biotransformasi didukung oleh kemampuan bakteri dalam mensintesis enzim adaptif yang mengkatalisis reaksi biotransformasi tersebut (Suriawira, 1993)

3. Penyerapan logam berat oleh bakteri. Secara umum, terdapat dua jenis penyerapan logam berat oleh bakteri yaitu penyerapan logam yang tidak tergantung pada metabolisme (*metabolism -independent*) yang terjadi pada permukaan sel dan penyerapan logam yang tergantung pada metabolisme (*metabolism - dependent*) yang menyebabkan terakumulasinya logam didalam sel (Hughes dan Poole, 1990).
4. Pengikatan logam berat pada struktur sel bakteri (Khususnya dinding sel) (Atlas dan Bartha, 1993). Dinding sel bakteri gram positif dan gram negatif merupakan tempat kontak awal antara sel dengan lingkungan eksternal. Permukaan sel bakteri menyediakan area permukaan yang besar untuk interaksi dengan ion logam.

#### **I. Tinjauan Bioakumulasi**

Logam berat menjadi tidak berbahaya disebabkan oleh sistem bioakumulasi. Bioakumulasi adalah proses pemanfaatan mikroba untuk mengakumulasi zat-zat kimia maupun logam berat yang mencemari lingkungan (Diliyana, 2008).

Untuk mencegah dan mengurangi terjadinya toksisitas daya racun yang disebabkan oleh logam berat yang bersifat toksik terhadap lingkungan dan makhluk hidup (manusia, hewan dan tumbuhan) maka dapat dilakukan proses bioakumulasi

dengan memanfaatkan mikroorganisme sebagai agen bioakumulasi diantaranya bakteri yang dapat mengakumulasi logam berat (Hardiani, 2011).

#### **J. Tinjauan Spektrofotometer Serapan Atom (SSA)**

Konsentrasi ion Pb (II) yang tidak terserap dalam supernatan ditentukan dengan menggunakan *Atomic Spektrofotometer Serapan*. Metode spektrofotometer serapan atom (SSA) berprinsip pada absorpsi cahaya oleh atom. Atom-atom menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu, tergantung pada sifat unsurnya. Misalkan natrium menyerap pada 589 nm, uranium pada 358,5 nm, sedang kalium pada 766,5 nm. Cahaya pada panjang gelombang ini mempunyai cukup energi untuk mengubah tingkat elektronik suatu atom. Transisi elektronik suatu unsur bersifat spesifik dengan absorpsi energi, berarti memperoleh lebih banyak energi, suatu atom pada keadaan dasar dinaikkan tingkat energinya ke tingkat eksitasi. Tingkat-tingkat eksitasinya pun bermacam-macam. Spektrum atomik untuk masing-masing unsur terdiri atas garis-garis resonansi. Garis-garis lain yang bukan garis resonansi dapat berupa spektrum yang berasosiasi dengan tingkat energi molekul, biasanya berupa pita-pita lebar ataupun garis tidak berasal dari eksitasi tingkat dasar yang disebabkan proses atomisasinya (Khopkar, 2010).



Gambar 3.6 Alat Spektrofotometer serapan Atom (SSA) ([www.google.http://](http://www.google.com) gambar Spektrofotometer Serapan Atom (SSA), 29 juli 2017).

Spektrofotometer serapan atom (SSA) memiliki beberapa komponen, yaitu sumber sinar, tempat sampel, monokromator, detektor dan readout. Sumber sinar yang lazim dipakai dalam spektrofotometer serapan atom adalah lampu katoda berongga (*hollow cathode lamp*). Lampu ini terdiri atas tabung kaca tertutup yang mengandung suatu katoda dan anoda. Katoda sendiri berbentuk silinder berongga yang terbuat dari logam atau dilapisi dengan logam tertentu. Tabung logam ini diisi dengan gas mulia (neon atau argon) dengan tekanan rendah (10-15 torr). Neon biasanya lebih disukai karena memberikan intensitas pancaran lampu yang lebih rendah. Salah satu kelemahan penggunaan lampu katoda berongga adalah satu lampu digunakan untuk satu unsur saja (Gandjar, 2010).

Analisis dengan spektrofotometer serapan atom (SSA), sampel yang akan dianalisis harus diuraikan menjadi atom-atom netral yang masih dalam keadaan asas. Ada berbagai macam alat yang dapat digunakan untuk mengubah suatu sampel menjadi uap atom yaitu: dengan nyala (*flame*) dan dengan tanpa nyala (*flameless*) (Gandjar, 2010).

Monokromator dimaksudkan untuk memisahkan dan memilih panjang gelombang yang digunakan dalam analisis. Disamping sistem optik, dalam monokromator juga terdapat suatu alat yang digunakan untuk memisahkan radiasi resonansi dan kontinyu yang disebut *chopper*. Sedangkan detektor digunakan untuk mengukur intensitas cahaya yang melalui tempat pengatoman. Biasanya digunakan tabung penggandaan foton (*Photomultiplier tube*). Komponen SSA yang lain adalah *readout*. *Readout* merupakan suatu alat petunjuk atau dapat juga diartikan sebagai sistem pencatatan hasil. Pencatatan hasil dilakukan dengan suatu alat yang telah dikalibrasi untuk pembacaan suatu transmisi atau absorbansi. Hasil pembacaan dapat berupa angka atau berupa kurva dari suatu *recorder* yang menggambarkan absorbansi atau intensitas emisi (Gandjar, 2010).

### A. Kerangka Berfikir

#### Input

1. Logam berat Timbal (Pb) merupakan bahan yang berbahaya bagi setiap makhluk hidup.
2. Bioakumulasi adalah proses pemanfaatan mikroba untuk mengakumulasi zat-zat kimia maupun logam berat yang mencemari lingkungan
3. Pengambilan sampel dilakukan dengan secara sengaja
4. Bakteri *Pseudomonas aeruginosa*, *Alcaligenes faecalis* dan *Bacillus thuringiensis* sebagai pengakumulasi logam berat timbal (Pb).

#### Proses

1. Sterilisasi alat
2. Peremajaan bakteri (*Pseudomonas aeruginosa*, *Alcaligenes faecalis* dan *Bacillus thuringiensis*)
3. Pembuatan media
4. Uji kemampuan isolat bakteri terhadap logam timbal
5. Uji *Spektrofotometer Serapan Atom (SSA)* untuk di ketahui jumlah penurunan logam berat tersebut.
6. Analisis data
7. Hasil

#### Output

Kemampuan Bioakumulasi logam berat timbal (Pb) Berdasarkan Waktu Paparannya Oleh Bakteri Endapan Sedimen Perairan Sekitar Rumah Susun Kota Makassar

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

1. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang menggambarkan tentang kemampuan bakteri *Pseudomonas aeruginosa*, *Alcaligenes faecalis* dan *Bacillus thuringiensis* dalam mengakumulasi logam berat timbal (Pb).
2. Lokasi penelitian yaitu di Laboratorium Mikrobiologi dan Laboratorium Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

#### ***B. Populasi dan Sampel***

Populasi isolat bakteri pengakumulasi logam berat timbal (Pb) pada endapan sedimen perairan sekitar rumah susun Kota Makassar. Sampel isolat bakteri *Alcaligenes faecalis*, *Bacillus thuringiensis* dan *Pseudomonas aeruginosa*.

#### ***C. Pendekatan Penelitian***

Pendekatan penelitian ini dilakukan secara eksperimental karena adanya rekayasa perlakuan bakteri terhadap logam berat timbal (Pb).

#### **D. Variabel Penelitian**

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel tunggal yaitu bakteri pengakumulasi logam berat timbal (Pb).

#### **E. Defenisi Operasional Variabel**

Logam berat mempunyai efek racun terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya. Logam berat yang berbahaya dan sering mencemari lingkungan adalah merkuri (Hg), timbal (Pb), arsenik (Ar), kadmium (Cd), kloronium (Cr), dan nikel (Ni). Logam-logam tersebut dapat menggumpal di dalam tubuh organisme dan tetap tinggal dalam tubuh dalam jangka waktu yang lama sebagai racun yang terakumulasi (Fardiaz, 1992).

*Pseudomonas aeruginosa* merupakan bakteri gram-negatif mampu mengakumulasi berbagai logam berat diantaranya, merkuri (Hg), tembaga (Cu), kromium (Cr), dan timbal (Pb) yang mencemari tanah maupun air dan menjadi masalah besar dalam kesehatan publik (Nagashetti, 2013).

*Alcaligenes faecalis* merupakan bakteri Gram-negatif bersifat aerob merupakan bakteri berbentuk batang tak berpigmen. Karakteristik ini membedakannya dengan pseudomonas. Spesies ini bersifat motil dengan satu atau lebih flagela. Bakteri dari famili *Achromobacter* ini tidak berkapsul, tidak membentuk spora dan tumbuh dengan lambat (Kavuncuoglu *et al.* 2010). Bakteri *Alcaligenes faecalis* dapat umum ditemukan di lingkungan yaitu pada tanah dan air (Latt *et all.* 2013).

*Bacillus* merupakan bakteri berbentuk batang termasuk gram positif bersifat aerob dan dapat membentuk endospora. Anggota spesies dari genera *Bacillus* menunjukkan kemampuan fisiologis yang luas sehingga dapat hidup di berbagai lingkungan termasuk lingkungan yang ekstrim seperti habitat yang tercemar logam timbal (Pb). Kemampuan fisiologis bakteri tersebut dalam mengatasi tekanan adsorpsi pada dinding sel atau permukaan eksternal, kemudian diikuti dengan transport aktif yang tergantung pada metabolisme sel (Gadd, 1992).

Bioakumulasi adalah proses pemanfaatan mikroba untuk mengakumulasi zat-zat kimia maupun logam berat yang mencemari lingkungan (Diliyana, 2008).

#### **F. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode secara sengaja (*Purposive sampling*). Metode ini dipilih berdasarkan tujuan tertentu (Sugiyono, 2010).

#### **G. Instrumen Penelitian**

##### **1. Alat**

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah yaitu *Autoclaf*, Inkubator, Cawan petri, Jarum ose, Lampu bunsen, Tabung reaksi, Aluminium foil, *Spektrofotometer Serapan Atom* (SSA), UV ViS, lemari asam, spatula, gelas ukur, batang pengaduk, rak tabung, erlenmeyer, Neraca analitik, *mikrocentrifuge*, mikropipet, tub dan botol semprot.

## 2. *Bahan*

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  $PbNO_3$  steril sebanyak 350 ppm, NB (*Nutrient Broth*) gram, NA (*Nutrient Agar*), Aquadest, Alkohol 70%, karet gelang, kertas label dan kapas.

## H. *Prosedur Kerja*

Adapun prosedur kerja dalam penelitian ini yaitu:

### 1. Sterilisasi alat

Alat yang digunakan disterilisasi dengan menggunakan *autoclav* pada suhu  $121^{\circ}C$  (bahan plastik) dan (bahan kaca) menggunakan oven pada suhu  $180^{\circ}C$  selama 2 jam.

### 2. Peremajaan bakteri

Bakteri *Pseudomonas aeruginosa*, *Bacillus thuringiensis* dan *Alcaligenes faecalis* diremajakan pada media NA (*Nutrient Agar*) dipaparkan 350 ppm logam berat timbal (Pb).

### 3. Pembuatan media

#### a. Timbal (Pb)

Melarutkan medium NB (*Nutrient Broth*) 8 gram dalam 1 liter aquadest ditambahkan logam berat  $PbNO_3$  dengan konsentrasi yaitu 350 ppm.

Cara menentukan larutan timbal (Pb) 350 ppm

$Pb = 350 \text{ mg/l (ppm)}$

$$\frac{mg}{l} \times \frac{ArPb}{Mr (Pb (NO_3))}$$

Keterangan:

ArPb = Jumlah Massa Relatif Atom

Mr (Pb (NO<sub>3</sub>)) = Jumlah Massa Molekul Relatif

4. Uji kemampuan isolat bakteri terhadap logam timbal (Pb)
  - a. Mengambil bakteri dengan menggunakan ose, kemudian diinokulasikan pada labu erlenmeyer yang berisi *Nutrient Broth* logam berat masing-masing 350 ppm. Selanjutnya biakan diinkubasi dengan menggunakan inkubator shaker selama 12, 24, 36, 48, 60 dan 72 jam dengan kecepatan 150 rpm. Sebagai kontrol negatif digunakan media yang mengandung logam berat tetapi tidak ditambahkan bakteri.
  - b. Kemudian setelah masa inkubasi, selanjutnya menggunakan *mikrocentrifuge* dengan kecepatan 5000 rpm untuk mendapatkan hasil supernatan cair.
  - c. Kemudian di lakukan uji *Spektrofotometer Serapan Atom* (SSA) untuk di ketahui jumlah penurunan logam berat tersebut.
5. Uji persentase reduksi logam

Untuk menghitung persentase reduksi logam menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Total Reduksi (ppm)}}{\text{Konsetrasi Awal (ppm)}} \times 100\% \text{ (Lewaru, 2012).}$$

#### I. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan *microsoft excel* dan secara manual.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### ***A. Hasil Penelitian***

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa pada logam berat timbal yang ditumbuhkan pada media NA (*Nutrient Agar*) yang telah dipaparkan dengan logam berat timbal ( $PbNO_3$ ) konsentrasi 350 ppm dan dilakukan uji akumulasi dengan menggunakan media NB (*Nutrient Broth*) dalam waktu 3x24 jam dengan pengamatan 12, 24, 36, 38, 60 dan 72 jam menggunakan inkubator shaker kecepatan 150 rpm suhu  $37^{\circ}C$ . Kemudian menguji kepadatan bakteri menggunakan UV ViS. Selanjutnya disentrifugasi dengan kecepatan 5.000 rpm selama 5 menit untuk mendapatkan supernatan cair. Supernatan yang dihasilkan selanjutnya diukur dengan menggunakan Spektrofotometer Serapan Atom (SSA) untuk mengetahui jumlah akumulasi dari masing-masing bakteri tersebut. Akumulasi logam berat timbal (Pb) oleh bakteri *Alcaligenes faecalis*, *Bacillus thuringiensis* dan *Pseudomonas aeruginosa* dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**1. Tabel 4.1 Akumulasi logam berat timbal (Pb) oleh bakteri *Alcaligenes faecalis***

No.	Waktu/Jam	$\Sigma$ Absorbansi Kepadatan Bakteri	$\Sigma K^1$ (ppm)	$\Sigma K^0$ (ppm)	Total Reduksi (ppm)	Penurunan (%)
1	12	1,456	350	28,49	321	91,71 %
2	24	1,433		28,99	320	91,42 %
3	36	1,406		35,42	314	89,71 %
4	48	1,916		49,99	299	85,42 %
5	60	1,598		50,21	299	85,42 %
6	72	2,293		69,14	280	80 %

Keterangan:

$\Sigma$  = Jumlah Rata-rata

$K^1$  = Konsentrasi Awal

$K^0$  = Konsentrasi Akhir

**2. Tabel 4.2 Akumulasi logam berat timbal (Pb) oleh bakteri *Bacillus thuringiensis***

No	Waktu/Jam	$\Sigma$ Absorbansi Kepadatan Bakteri	$\Sigma K^1$ (ppm)	$\Sigma K^0$ (ppm)	Total Reduksi (ppm)	Penurunan (%)
1	12	1,354	350	24,06	325	92,85 %
2	24	1,305		30,64	319	91,14 %
3	36	1,372		44,07	305	87,14 %
4	48	1,359		54,07	295	84,28 %
5	60	1,228		57,42	292	83,42 %
6	72	1,811		62,59	285	81,42 %

Keterangan:

$\Sigma$  = Jumlah Rata-rata

$K^1$  = Konsentrasi Awal

$K^0$  = Konsentrasi Akhir

**3. Tabel 4.3 Akumulasi logam berat timbal (Pb) oleh bakteri *Pseudomonas aeruginosa***

No	Waktu/Jam	$\Sigma$ Absorbansi Kepadatan Bakteri	$\Sigma K^1$ (ppm)	$\Sigma K^0$ (ppm)	Total Reduksi (ppm)	Penurunan (%)
1	12	1,331	350	37,06	312	89,14 %
2	24	1,369		28,99	320	91,42 %
3	36	1,289		36,85	313	89,42 %
4	48	1,555		39,28	310	88,57 %
5	60	1,516		32,35	313	89,42 %
6	72	1,787		30,85	319	91,14 %

Keterangan:

$\Sigma$  = Jumlah Rata-rata

$K^1$  = Konsentrasi Awal

$K^0$  = Konsentrasi Akhir

**4. Tabel 4.4 Akumulasi Logam Berat Timbal (Pb) oleh Bakteri Endapan Sedimen Perairan Kota Makassar**

No	Waktu	Isolat Bakteri	$\sum K^1$ (ppm)	$\sum K^0$ (ppm)	Total Akumulasi (ppm)	Penurunan %
1	3 x 24	<i>Alcaligenes faecalis</i>	350	28,49	321	91,71 %
2		<i>Bacillus thuringiensis</i>	350	24,06	325	92,85 %
3		<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	350	28,99	320	91,42 %


Keterangan :

$\sum$  = Jumlah Rata-rata

$K^1$  = Konsentrasi Awal

$K^0$  = Konsentrasi Akhir

**Gambar 4.5 Akumulasi Logam Berat Timbal (Pb) oleh Bakteri Endapan Sedimen Perairan Kota Makassar**



## B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa pada tabel 4.1 isolat bakteri *Alcaligenes faecalis* efektif dalam menurunkan kadar logam berat timbal (Pb) dari konsentrasi 350 ppm menjadi 28,49 ppm dengan total akumulasi 321 ppm dengan persentase 91,71 % dalam waktu 3x24 jam dengan 6x pengamatan dari 12, 24, 36, 48, 60 dan 72 jam pada media NB (*Nutrient Broth*). Penelitian sebelumnya (Mastang, 2016) bahwa Isolat C2 yang didapatkan dari kanal yang berhubungan langsung dengan air laut yang merupakan bakteri *Alcaligenes faecalis* juga menunjukkan kemampuan yang efektif dalam mereduksi logam timbal dari konsentrasi 250 ppm menjadi 4.057 ppm dengan jumlah total akumulasi 246 ppm dengan presentasi 98,4 %. Penelitian ini juga didukung oleh Shakoori *et all* (2010) yang menunjukkan kemampuan bakteri *Alcaligenes faecalis* dalam mereduksi logam berat tetapi bukan timbal (Pb) melainkan logam berat kromium (Cr) (VI) sebesar 97% dari konsentrasi 100 mg/ml selama 24 jam dan pada media lura bertani.

Pada tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa isolat bakteri *Bacillus thuringiensis* juga sangat efektif dalam menurunkan kadar logam berat timbal (Pb) dari konsentrasi 350 ppm menjadi 24,06 ppm dengan total akumulasi 325 ppm dengan persentase 92,85% dalam waktu 3x24 jam dengan 6x pengamatan dari 12, 24, 36, 48, 60 dan 72 jam pada media NB (*Nutrient Broth*).

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya (Mastang, 2016) bahwa Isolat C2 yang didapatkan dari kanal yang berhubungan langsung dengan air laut yang merupakan bakteri *Bacillus thuringiensis* juga menunjukkan kemampuan yang sangat

efektif dalam mereduksi logam timbal dari konsentrasi 250 ppm menjadi 0.471 ppm dengan jumlah total akumulasi 249 ppm dengan presentasi 99,8 %. Penelitian pendukung lainnya yaitu oleh Lewaru (2012) tetapi menggunakan Kromium (Cr) dengan konsentrasi 1083,25 ppm menjadi 468,30 ppm dalam waktu  $\pm 24$  jam. Penelitian pendukung ini juga dilakukan oleh Guo *et all* (2010) untuk membantu mengurangi toksisitas logam berat dengan menggunakan bakteri *Bacillus* L14 EB dalam inkubasi 24 jam, EB L14 bisa penyerapan 75.78%, 80.48%, 21,25% dari Cd (II), Pb (II) dan Cu (II) di bawah konsentrasi awal 10 mg/L.

Pada tabel 4.3 Hasil penelitian menunjukkan bahwa isolat bakteri *Pseudomonas aeruginosa* juga sangat efektif dalam menurunkan kadar logam berat timbal (Pb) dari konsentrasi 350 ppm menjadi 30,85 ppm dengan total akumulasi 319 ppm dengan persentase 91,14% dalam waktu 3x24 jam dengan 6x pengamatan dari 12, 24, 36, 48, 60 dan 72 jam, pada media NB (*Nutrient Broth*). Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya (Mastang, 2016) bahwa Isolat C2 yang didapatkan dari kanal yang berhubungan langsung dengan air laut yang merupakan bakteri *Pseudomonas aeruginosa* juga menunjukkan kemampuan yang efektif dalam mereduksi logam timbal dari konsentrasi 250 ppm menjadi 9.128 ppm dengan jumlah total akumulasi 240 ppm dengan presentasi 96 %.

Penelitian ini juga didukung oleh Chank *et all* (1997) mengandung logam berat konsentrasi 500 mg/liter dengan 24 jam masa inkubasi menggunakan bakteri *Pseudomonas aeruginosa* PU21 (Rip64) dengan persen penyerapan mencapai hampir 98% pemulihan Pb dan Cu.

Pada tabel 4.4 Ketiga isolat bakteri yang telah di ujikan diantaranya isolat bakteri *Alcaligenes faecalis*, *Bacillus thuringiensis* dan *Pseudomonas aeruginosa* masing-masing di kontakkan dengan logam berat timbal (Pb) dengan konsentrasi 350 ppm dimana ketiga isolat tersebut memiliki kemampuan dalam mengakumulasi logam berat timbal (Pb) namun bakteri *Bacillus thuringiensis* yang memiliki kemampuan yang paling efektif karena termasuk golongan bakteri gram positif dibandingkan dengan kedua isolat bakteri diatas yang tergolong bakteri gram negatif dari konsentrasi 350 ppm menjadi 24,06 ppm dengan total akumulasi 320 ppm dan persentase 92,85% selama 3x24 jam masa inkubasi. Terlihat pada tabel diatas, bahwa semakin lama terpapar oleh bakteri semakin baik pula pengaruh penurunan konsentrasinya.

Jumlah akumulasi yang dihasilkan oleh ketiga isolat bakteri tersebut menunjukkan kemampuan bakteri dalam menurunkan konsentrasi timbal (Pb). Menurut (Hoyle dan Beveridge, 1983) bahwa kemampuan akumulasi ketiga bakteri terhadap logam berat timbal dikarenakan permukaan dinding sel bakteri baik gram positif maupun gram negatif mempunyai ikatan anion sehingga logam akan mudah diserap. Menurut (Nadyah, 2011) pada pertumbuhan bakteri terdiri atas beberapa fase yaitu Fase lag (lambat), merupakan fase dimana bakteri beradaptasi dengan lingkungannya dan mulai bertambah sedikit demi sedikit. Fase logaritmik (eksponensial), merupakan fase dimana pembiakan bakteri berlangsung paling cepat dan terjadi peningkatan bakteri di karenakan pada fase ini bakteri pembelahan sel, sehingga pada fase inilah tingkat penurunan pada logam berat timbal (Pb) lebih

banyak terakumulasi oleh bakteri dapat dilihat pada tabel 4.1, tabel 4.2 dan tabel 4.3 bahwa penurunan logam berat lebih banyak terakumulasi pada jam ke 12-24. Inilah yang menyebabkan tingginya tingkat daya akumulasi pada logam berat timbal (Pb). Fase stasioner, merupakan fase dimana jumlah bakteri yang berkembang biak sama dengan jumlah bakteri yang mengalami kematian. Fase autolisis (kematian) adalah fase dimana jumlah bakteri yang mati semakin banyak, melebihi jumlah bakteri yang berkembang biak dapat dilihat pada tabel 4.1, tabel 4.2 dan tabel 4.3 pada jam ke 72 bahwa tingkat kepadatan bakteri meningkat namun berbeda dengan tingkat penurunannya. Inilah mengapa pada perhitungan kepadatan bakteri pada UV VIS absorbansi ini berukuran OD600 (Guo *et al.*, 2010) meskipun memiliki tingkat kepadatan yang sangat tinggi namun berbeda dengan tingkat penurunan logam berat timbal (Pb) ini disebabkan oleh pada tingkat kematian pada bakteri lebih banyak dibanding pertumbuhannya.

Menurut (Lewaru, 2012) proses bakteri dalam mereduksi logam berat timbal (Pb) melalui kondisi aerobik dan anaerobik. Dalam kondisi aerobik logam direduksi dengan bantuan NADH sebagai donor elektron dan pada kondisi anaerobik logam direduksi menggunakan *Cytoplasmic membrane protein* yang dimiliki oleh bakteri.

Pada struktur bakteri terbagi atas 2 pembagian yaitu struktur dasar (dimiliki hampir oleh seluruh bakteri) yang meliputi dinding sel, membran plasma, sitoplasma, ribosom dan DNA. Struktur tambahan (dimiliki oleh jenis bakteri tertentu) yang meliputi flagellum, pilus, fimbria, klorosom, vakuola gas dan endospora (Nadiyah, 2011). Pada struktur bakteri diatas bahwa yang melakukan proses metabolisme,

logam berat dapat terakumulasi yaitu pada membran sel (ekstraseluler) dan pada sitoplasma (Intrasel) (Aminah, 2009) dan Guo *et all* (2010) membenarkan dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa hampir 80.8% dan 76,5% dari Cd (II) dan Pb (II) diambil oleh sel-sel yang terdapat pada bagian membran, sedangkan kehadiran Cd (II) dan Pb (II) dalam sitoplasma hanya 5,5% dan 7,4%, dan di dinding sel adalah 13,7% dan 16.1%. Laju akumulasi mikroba terhadap logam berat tergantung pada beberapa faktor, yaitu aktivitas mikroba, nutrisi, derajat keasaman dan faktor lingkungan (Donlon, 2006)

Allah swt berfirman dalam Surah Yunus 10: ayat 61

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا  
 كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالٍ  
 ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي  
 كِتَابٍ مُبِينٍ

Terjemahnya:

Kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al quran dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu biarpun sebesar zarah (atom) di bumi ataupun di langit. Tidak ada yang lebih kecil dan tidak (pula) yang lebih besar dari itu, melainkan (semua tercatat) dalam Kitab yang nyata (Lauhul mahfuzh) (Kementrian Agama RI, 2015).

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, akhirnya manusia dapat mengenal makhluk baru yang belum diketahui seperti yang ditunjukkan oleh

Al-qur'an pasca penemuan mikroskop sehingga berkembanglah ilmu mengenai bentuk-bentuk yang baru yang terlalu kecil untuk dilihat dengan mata telanjang manusia yang dapat diidentifikasi. Pada ayat ini memberikan manusia penjelasan tentang adanya kehidupan hasil ciptaan Allah yang memiliki ukuran amat kecil. Melalui ayat ini pula Allah swt mengajari manusia bahwa hanya Dia-lah yang mengatur kehidupan dalam dunia jasad renik yang sangat luas (Ilmi, 2015). Hal tersebut juga dikemukakan dalam firman Allah QS. Al-anbiya ayat 16

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ (١٦)

Terjemahnya:

Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dengan bermain-main (Kementerian Agama RI, 2015).

Maksudnya, Kami tidak menciptakan langit dan bumi serta apa saja yang berada di antara keduanya, dengan tata aturan yang begitu tepat dan indah, dengan main-main. Kami menciptakan semua itu dengan penuh hikmah, yang dapat diketahui oleh orang-orang yang merenung dan berpikir (Shihab, 2013). Maksud dari penuh hikmah diantaranya adalah Allah swt menciptakan mikroorganisme meskipun memiliki ukuran yang sangat kecil namun dapat bermanfaat bagi makhluk hidup terkhususnya dalam mengurangi tingkat pencemaran yang disebabkan oleh logam berat bagi orang-orang yang berpikir. Seperti halnya diatas bahwa dengan dilakukannya sebuah penelitian maka kita dapat mengetahui manfaat dari ketiga isolat bakteri tersebut dimana memiliki kemampuan dalam mengakumulasi atau

menurunkan tingkat konsentrasi timbal (Pb) dari 350 ppm dan rata-rata penurunnya yaitu 90% ke atas.

Berdasarkan hasil penelitian diatas bahwa ketiga bakteri tersebut dapat menurunkan kadar logam berat timbal (Pb) dan dapat disimpulkan bahwa bakteri ini juga dapat bermanfaat untuk alam karena dengan adanya bakteri diatas maka dapat mengurangi tingkat pencemaran logam berat timbal (Pb) di lingkungan terkhususnya perairan. Adapun yang membedakan penelitian saya dengan mastang (2016) yaitu dari konsentrasi logam berat timbal (Pb) dimana mastang menggunakan konsentrasi 250 ppm selama 2x24 jam masa inkubasi, sedangkan saya menggunakan konsentrasi 350 ppm selama 3x24 jam masa inkubasi menggunakan inkubator shaker dan penelitian mastang tidak menggunakan uji UV ViS sedangkan saya menggunakan uji UV ViS.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan pada penelitian ini yaitu pada kemampuan bioakumulasi logam berat timbal (Pb) berdasarkan waktu paparannya oleh bakteri endapan sedimen perairan sekitar rumah susun kota Makassar. Bahwa Ketiga isolat bakteri yang telah di ujikan diantaranya isolat bakteri *Alcaligenes faecalis*, *Bacillus thuringienses* dan *Pseudomonas aeruginosa* masing-masing di paparkan dengan logam berat timbal (Pb) dengan konsentrasi 350 ppm dimana ketiga isolat tersebut memiliki kemampuan dalam mengakumulasi logam berat timbal (Pb). Isolat *Alcaligenes faecalis* efektif dalam menurunkan kadar logam berat timbal (Pb) dari konsentrasi 350 ppm menjadi 28,49 ppm dengan total akumulasi 321 ppm dan persentase 91,71 %. Isolat *Bacillus thuringienses* yang memiliki kemampuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kedua isolat bakteri diatas dari konsentrasi 350 ppm menjadi 24,06 ppm dengan total akumulasi 325 ppm dengan persentase 92,85%. Pada isolat *Pseudomonas aeruginosa* juga efektif dalam menurunkan kadar logam berat timbal (Pb) dari konsentrasi 350 ppm menjadi 28,99 ppm dengan total akumulasi 320 ppm dengan persentase 91,42% dalam waktu 3x24 jam dengan 6x pengamatan pada media NB (*Nutrient Broth*) dapat dilihat bahwa semakin lama terpapar oleh bakteri semakin baik pula pengaruh penurunan konsentrasi logam berat timbal.

## **B. Saran**

Adapun saran dari penelitian ini yaitu:

1. Sebaiknya isolat bakteri yang telah diujikan diremajakan setiap 1 bulan sekali agar isolat bakteri tersebut dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya.
2. Sebaiknya menaikkan konsentrasi logam berat timbal (Pb) agar dapat diketahui batas maksimum kemampuan dari ketiga isolat bakteri tersebut dalam mengakumulasi logam berat timbal (Pb).
3. Penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat membandingkan kemampuan bakteri dalam menggunakan inkubator dan inkubator shaker.
4. Penulis menyarankan agar ketiga isolat tersebut dapat diaplikasikan dengan logam berat lain selain timbal (Pb) dan tembaga (Cu).
5. Penulis menyarankan penelitian selanjutnya dapat menggunakan alat yang bisa mengetahui bakteri yang tumbuh maupun yang telah mati. Agar data yang diperoleh lebih relevan.

## KEPUSTAKAAN

- Allen, E.H.. *Metal Contaminated Aquatic Sediment*. Ann Arbor Oress, Inc 121 South Main Street, Chelsea, Michigan. 1995
- Aminah Umami. "Isolasi Bakteri Pengakumulasi Logam Berat Timbal (Pb) di Perairan Pelabuhan Paotere Makassar". *Skripsi*. Makassar: Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin, 2011.
- Avery, SU. dan J.S. Tobing. *Mechanism of Strontium up Take Laboratory and Brewing Sturms o f Sacvhar/itfiyccs cerevisial*. *Appt Envirant Microbial* 56 (4), 1992.
- Babel, S., Kurniawan, T.A. "Cr (VI) Removal from Synthetic Wastewater Using Coconut Shell Charcoal and Commercial Activated Carbon Modified with Oxidizing Agents and/or Chitosan". *Journal of Chemosphere* No.54 (Juli 2004): 951-967.
- Brock, T.D., M.T, Madigan, J.M. Martinko dan J. Parker. *Biology Of Mikroorganisms, Seventh Edition*, Prentice-Hall Internasional, Inc, Wisconsin, 1991.
- Bryan, G. W. 1976.*Some Aspects Heavy Metal Tolerance in Aquatic Organism*. In : A. P. M. LOCKWOOD (ed.) *Effects of Polltitants on Aquatic Organisms*. Combridge.
- Cappuccino, J.G dan N. Sherman, *Microbiology: A Laboratory manual* Rockland Community Collage, StAte University of new York. The Benjamin/Comings Publishing Company Inc, 1987.
- Chang Jo-Shu, Robin Law And Chung-Cheng Chang (1997). *Biosorption Of Lead, Copper And Cadmium By Biomass Of Pseudomonas Aeruginosa Pu21*. Department of Chemical Engineering, Feng Chia University, War. Res. Vol. 31, No. 7.
- Chojnacka, K. "*Biosorption of Cr (III) Ionsby Eggshells*". *J. Hazard Mater B*. (2005); 167-173.
- Connel. D. W. and Miller. *Kimia dan Ekotoksikologi Pencemaran*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1995.
- Darmono. *Lingkungan Hidup dan Pencemar Hubungan dengan Toksikologi Senyawa Logam*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2001.

- Darmono. *Logam dalam Sistem Biologi Makhluk Hidup*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1995.
- Dave, S.R. 1994. *Biosorption of heavy metal*. Proch.Acad. Environ. Biol. 3(1): 21-24.
- Dharmawibawa. *Isolasi, Identifikasi dan Uji Kemampuan Bkteri Pengurai Minyak Solar dari Perairan Pelabuhan Benoa Bali*. Inoversitas Udayana Bali, 2004.
- Diliyana, Y. F. *Studi Kandungan Merkuri (Hg) pada Ikan Bandeng (Chanos chanos) di Tambak Sekitar Perairan Rejoso Kabupaten Pasuruan*. Malang: [Skripsi] Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi. Universitas Islam Negeri. 2008.
- Donlon, D.L. dan Bauder, J.W. *A General Essay on Bioremediation of Contaminated Soil*, <http://waterquality.montana.edu/docs/methane/Donlan.shtml> [26/06/2017]
- Fardiaz, S. *Polusi Air dan Udara*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Gadd, G.M, *Metal Tolerance Initiating Munibinlgy n f Extreme Environment*. f.dwaid (cd), 1992.
- Gadd, G.M. & C. White. 1993. *Microbial treatment of metal pollution working biotechnology*. *Trends in Biotechnology* 3 (2): 353-359.
- Gandjar, Ibnu Gholib dan Abdul Rohman. *Kimia Farmasi Analisis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Guo Hanjun *et all* (2010). *Bioremediation of heavy metals by growing h yperaccumula orendophytic bacterium Bacillus sp. L14*. *Bioresource Technology* 101 8599–8605.
- Hardiani Henggar a, Teddy Kardiansyah dan Susi Sugesty. *Bioremediasi Logam Timbal (Pb) Dalam Tanah Terkontaminasi Limbah Sludge Industri Kertas Proses Deinking*. Bandung: Balai Besar Pulp dan Kertas, 2011.
- Hoyle, M.N dan R.K. Poole. *Metal and Microorganism*. Chapman and Hall. London, 1989.
- [Http://www.islamxplored.co<wbr></wbr>m/2008/09/microbiologi<wbr></wbr>holy-quran.html](http://www.islamxplored.co<wbr></wbr>m/2008/09/microbiologi<wbr></wbr>holy-quran.html). Akses (29 Juli 2017).
- [Https://alquranmulia.wordpress.com/tag/tafsir-ibnu-katsir-surah-yunus-ayat-61](https://alquranmulia.wordpress.com/tag/tafsir-ibnu-katsir-surah-yunus-ayat-61) Akses (29 Juli 2017).


- Hwang Jangsun, Youngmin Seo, Yeonho Jo, Jaewoo Son, Jinkee Hong & Jonghoon Choi. *Sensitive detection of copper ions via ion-responsive fluorescence quenching of engineered porous silicon nanoparticles*. DOI: 10.1038 (2016).
- Jawets, E., J. Melnick dan E. Edelberg. *Mikrobiologi kedokteran*. Penerjam Edi Nugroho dan R.F Maulani. Edisi. 20. Penerbit Buku Kedokteran EGC. Jakarta, 1996.
- Kadir, Haryanto. “Biokonsentrasi Logam Berat Pb pada Karang Lunak *Sinularia polydactyla* di Perairan Pulau Laelae, Pulau Bonebatang dan Pulau Badi”. *Skripsi*. Makassar: Ilmu Kelautan UNHAS, 2013.
- Kavuncuoglu F, Unal A, Oguzhan N, Tokgoz B, Oymak O, Utas C. 2010. *First Reported Case of Alcaligenes faecalis Peritonitis. Peritoneal Dialysis International*, Vol. 30, pp. 112–121.
- Kazim Uysal Esengul Kose, Mustafa Koyun, Cigdem Omeraglu, Ferda Ozmal. “The Comparison of Heavy Metal Accumulation Ratios of Some Fish Species in Enne Dame Lake (Kutahya/Turkey)”. *Procedia Environmental Sciences Jilid 30* (2015): 320-325.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Jakarta, 2012.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Jakarta, 2015.
- Khopkar, S.M. *Konsep Dasar Kimia Analitik*. Jakarta: UI Press, 2010.
- Latt ZK, Yu SS, Lynn TM. 2013. Enhancement of Cellulolytic Nitrogen Fixing Activity of *Alcaligenes* sp. by MNNG Mutagenesis. *International Journal of Innovation and Applied Studies* Vol. 3 No. 4 Aug. pp. 979-986.
- Laws EA, John Willey and Sons. *Aquatic Pollution*. New York, 1981.
- Mulik Anuradha R 1 And Rama K Bhadekar1 (2017). *Heavy Metal Removal By Bacterial Isolates From The Antarctic Oceanic Region*. *Int J Pharm Bio Sci* July ; 8(3): (B) 535 -543
- Mullen, M.D., D.C. Wolf, F.G. Ferris, T.J. Beveridge, C.A. Fleming, & G.W. Bailey. 1989. Bacterial sorption of heavy metal. *Appl. Environ. Microbiol.* 55: 3143-3149.
- Nadyah. *Dasar-Dasar Mikrobiologi Untuk Mahasiswa Ilmu Kesehatan*. Makassar: Alauddin University Press, 2011.

- Nagashetti Vinod, Mahadevaraju.G.K, T.S.Muralidhar, Aamir Javed, Dwijendra Trivedi, Khum Prasad Bhusa. *Biosorption of Heavy Metals from Soil by Pseudomonas Aeruginosa* International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE) ISSN: 2278-3075, Volume-2 Issue-6, May 2013.
- Nakamura, K. Sakamoto, M. Uehiyaama. (*Jrganicirial Volnhzing Bude rial in The Mercury P (tented Sedimen o f The Minamata Bey Japan. Appl Environ Microbial.* 1990.
- Nontji. *Laut Nusantara*. Jakarta: Djambatan, 1993.
- Notodarmojo, S. *Pencemaran Tanah dan Air Tanah*. Penerbit ITB. 2005. ISBN 979-3507-43-8.
- Octavia, B. 1997. *Pemanfaatan bakteri untuk menurunkan konsentrasi cemaran merkuri. Jurnal penelitian Iptek Dan Humaniora.* 2 : 9-18.
- Palar Heryando. *Pencemaran dan Toksikologi Logam Berat*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Palar, H. *Pencemaran dan Toksikologi Logam Berat*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Petrucci, H. *Kimia Dasar Prinsip dan Terapan Modern*. Jakarta: Erlangga, 1989.
- Poole, R.K, dan Gadd, G.M. *Metal-Microbe Interaction*. IRL, Press, Oxford, 1989.
- Pratama, S.D., I. Raya, dan M. Zakir. "Pengaruh Penambahan Glutation Pada Bioakumulasi Ion  $Pb^{2+}$  Dan  $Cr^{6+}$  Oleh Fitoplankton Laut *Porphyridium Cruentum*". *Jurnal Ilmu Perairan dan Perikanan Indonesia* No.1 (Desember 2011):1-10.
- Retnowati Yuliana (2011). *Isolasi Dan Identifikasi Bakteri Pengguna Merkuri Dari Sedimen Sungai Yang Terkontaminasi Limbah Tambang Emas*. Jurusan Biologi Fakultas Matematika Dan Ipa Universitas Negeri Gorontalo Saintek Vol 6, No 1.
- Rompas, M.R. *Toksikologi Kelautan*. Jakarta Pusat: Sekretariat Dewan Kelautan Indonesia, 2010.
- Shakoori Farah R., Shagufta Tabassum, A. Rehman and A. R. Shakoori (2010). *Isolation and Characterization of Cr6+ Reducing Bacteria and Their Potential Use in Bioremediation of Chromium Containing Wastewater*. University of the Punjab Pakistan J. Zool., vol. 42(6), pp. 651-658.


- Shihab M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shihab, Quraish M. *Tafsir Al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2010.
- SNI 06-6989. 8-2004. Air dan Air Limbah-Bagian 8 : Cara Uji Timbal (Pb) dengan Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)-Nyala. Banteng: BSN, 2004.
- Sugiyono. *Meode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: alfabeta, 2010.
- Suriawira, U. *Mikrobiologi Air Dan Dasar-Dasar Pengolahan Buangan Secara Biologis*. Penerbit Alumni. Bandung, 1993.
- Uluturhan E, Kucuksezgin F. “*Heavy Metal Contaminants in Red Pandora (Pagellus erythrinus) Tissues from the Eastern Aegean Sea*”. *Journal Heavy Metals of Turkey* No. 41 (*Water Res* 2007) No. 41: 1185-92.
- Wahyu, Widowati, A. Sastiono, dan R. Jusuf. *Efek Toksik Logam*. Bandung: Andi Yogyakarta, 2008.
- Wang, C. L., Michels, P. C., Dawson, S. C., Kitisakkul, S., Baross, J. A., Keasling, J. D., and Clark, D. S. (1997) *Appl. Environ. Microbiol.* 63,4075–4078
- William, W.Y., H.J. Blumenthal, T. Hashimoto. *Kumpulan soal-soal Mikrobiologi dan Imunologi*. Alih bahasa Yulius Effendi. Penerbit Buku Kedokteran, ECG, 1995.
- Wulandari Sri, Dewi Nila Fitri dan Suwando. “*Identifikasi Bakteri Pengikat Timbal (Pb) pada Sedimen di Perairan Sungai Siak*”. *Jurnal Biogenesis*. 1 no 2 (2005):6

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Skema Penelitian



## Lampiran 2. Alur Kerja Penelitian



3. Masing-masing bakteri diinokulasikan kedalam Erlenmeyer yang berisi media NB dan logam berat timbal (Pb) menggunakan jarum ose sebanyak 3 ose.
4. Setelah diinokulasikan menutup rapat masing-masing Erlenmeyer menggunakan kapas dan Aluminium foil.

**Uji Akumulasi  
Logam Berat  
Timbal (Pb)**

1. Menyalakan inkubator shaker dengan suhu 37<sup>0</sup> C.
2. Setelah itu memasukkan masing-masing Erlenmeyer kedalam incubator shaker dengan kecepatan 150 rpm.
3. Pengamatan selama 3x24 jam dan diamati selama 12 jam.
4. Setiap pengamatan 12 jam masing-masing diamati PH, suhu, uji kepadatan bakteri menggunakan UV VVS.
5. Kemudian setelah masa inkubasi selanjutnya menggunakan mikrocentrifuge dengan kecepatan 5.000rpm untuk mendapatkan hasil supernatan cair.

**Uji  
Spektrofotometer  
Serapan Atom  
(SSA)**


1. Membuat preparasi larutan induk standar
2. Kemudian dilakukan uji Spektrofotometer Serapan Atom untuk di ketahui jumlah penurunan logam berat timbale (Pb) tersebut.

Lampiran 3. Gambar pertumbuhan isolat bakteri

1. Isolat Bakteri *Alcaligenes faecalis*



2. Isolat Bakteri *Bacillus thuringiensis*



3. Isolat bakteri *Pseudomonas aeruginosa*



Lampiran 4. Gambar pengamatan ke 12 jam + control



NO	Waktu	Waktu	Result
1	1.463	1.469	0.006
2	1.459	1.452	0.007
3	1.385	1.387	0.002
4	-0.041	-0.041	0.000
5	-0.040	-0.041	0.001

1. Bakteri *Alcaligenes faecalis* + Media NB + logam berat timbal (Pb)



2. Bakteri *Bacillus thuringiensis* + Media NB + logam berat timbal (Pb)



3. Bakteri *Pseudomonas aeruginosa* + Media NB + logam berat timbal (Pb)



Lampiran 5. Gambar pengamatan ke 24 jam



104	500.0	500.0	Result
1	1.422	1.427	0.997
2	1.425	1.429	0.997
3	1.372	1.373	0.999
4	-0.836	-0.836	1.000
5	-0.836	-0.836	1.000

104	500.0	500.0	Result
1	1.229	1.241	0.998
2	1.278	1.282	0.997
3	1.360	1.362	0.999
4	-0.836	-0.836	1.000
5	-0.836	-0.836	1.000

1. Bakteri *Alcaligenes faecalis* + Media NB + logam berat timbal (Pb)



2. Bakteri *Bacillus thuringiensis* + Media NB + logam berat timbal (Pb)



3. Bakteri *Pseudomonas aeruginosa* + Media NB + logam berat timbal (Pb)



Lampiran 6. Gambar pengamatan ke 36 jam



Titik	Abu	Abu	Result
	600.0	600.0	
1	1.432	1.432	0.997
2	1.395	1.395	0.997
3	1.397	1.397	0.999
4	-0.037	-0.037	1.000
5	-0.037	-0.037	1.000

Titik	Abu	Abu	Result
	600.0	600.0	
1	1.438	1.441	0.997
2	1.378	1.381	0.997
3	1.393	1.401	0.999
4	-0.037	-0.037	1.000
5	-0.037	-0.037	1.000

1. Bakteri *Alcaligenes faecalis* + Media NB + logam berat timbal (Pb)



2. Bakteri *Bacillus thuringiensis* + Media NB + logam berat timbal (Pb)



3. Bakteri *Pseudomonas aeruginosa* + Media NB + logam berat timbal (Pb)



Lampiran 7. Gambar pengamatan ke 48 jam



Absorbance Ratio				Absorbance Ratio			
Test Name: 00_M1M1				Test Name: 00_M1M1			
	Abx	Abx	Result		Abx	Abx	Result
08	600.0	600.0	Result	08	600.0	600.0	Result
1	1.924	1.930	0.997	1	1.946	1.951	0.996
2	1.900	1.910	0.999	2	1.999	1.992	0.998
3	1.972	1.972	0.996	3	1.912	1.916	0.997
4	-0.045	-0.045	1.000	4	-0.042	-0.042	1.000
5	-0.046	-0.046	1.000	5	-0.042	-0.042	1.000


1. Bakteri *Alcaligenes faecalis* + Media NB + logam berat timbal (Pb)



2. Bakteri *Bacillus thuringiensis* + Media NB + logam berat timbal (Pb)



3. Bakteri *Pseudomonas aeruginosa* + Media NB + logam berat timbal (Pb)



Lampiran 8. Gambar pengamatan ke 60 jam



ID#	Wb 600.0	Wb 600.0	Result
1	1.697	1.572	0.996
2	1.569	1.515	0.996
3	1.259	1.272	0.998
4	-0.043	-0.043	1.000
5	-0.043	-0.043	1.000


  

ID#	Wb 600.0	Wb 600.0	Result
1	1.180	1.151	0.996
2	1.602	1.604	0.999
3	1.431	1.431	0.998
4	-0.043	-0.043	1.000
5	-0.043	-0.043	1.000


1. Bakteri *Alcaligenes faecalis* + Media NB + logam berat timbal (Pb)



2. Bakteri *Bacillus thuringiensis* + Media NB + logam berat timbal (Pb)



3. Bakteri *Pseudomonas aeruginosa* + Media NB + logam berat timbal (Pb)



Lampiran 9. Gambar pengamatan ke 72 jam



ID	Obs	Obs	Result
1	2.293	2.294	1.000
2	2.296	2.299	0.999
3	1.936	1.940	0.997
4	-0.041	-0.041	1.000
5	-0.041	-0.041	1.000

ID	Obs	Obs	Result
1	1.687	1.693	0.996
2	1.706	1.710	0.997
3	1.869	1.873	0.998
4	-0.040	-0.040	1.000
5	-0.040	-0.040	1.000

1. Bakteri *Alcaligenes faecalis* + Media NB + logam berat timbal (Pb)




2. Bakteri *Bacillus thuringiensis* + Media NB + logam berat timbal (Pb)



3. Bakteri *Pseudomonas aeruginosa* + Media NB + logam berat timbal (Pb)



Lampiran 10. Gambar Kurva Standar



Keterangan:

Y = Absorbansi

X = Konsentrasi

$R^2$  = Tingkat kepercayaan (Cat. Jika angka  $R^2$  mendekati angka 1 maka data yang diperoleh lebih bagus).

Lampiran 11. Tabel jumlah akumulasi bakteri terhadap logam berat timbal (Pb)

1. Jumlah akumulasi bakteri *Alcaligenes faecalis* terhadap logam berat timbal (Pb)

a. Simple I

No	waktu	Jumlah Kepadatan (OD 600nm)	Konsentrasi Awal (ppm)	Konsentrasi Akhir (ppm)	Total Akumulasi	Penurunan %
1	12	1,463	350	29,42	320	91,42 %
2	24	1,432	350	30.71	319	91,22 %
3	36	1,427	350	33.28	316	90,28 %
4	48	1,924	350	49.42	300	85,71 %
5	60	1,687	350	46	304	86,85 %
6	72	2,293	350	64.57	285	81,42 %

b. Diplo II

No	waktu	Jumlah Kepadatan (OD 600nm)	Konsentrasi Awal (ppm)	Konsentrasi Akhir (ppm)	Total Akumulasi (ppm)	Penurunan %
1	12	1,450	350	27.57143	322	92,12 %
2	24	1,435	350	27.28571	322	92 %
3	36	1,385	350	37.57143	312	89,26 %
4	48	1,908	350	50.57143	299	85,55 %
5	60	1,509	350	54.42857	295	84,45 %
6	72	2,294	350	73.71429	276	78,94 %

2. Jumlah akumulasi bakteri *Bacillus thuringiensis* terhadap logam berat timbal (Pb)

a. Simple I

No	waktu	Jumlah Kepadatan (OD 600nm)	Konsentrasi Awal (ppm)	Konsentrasi Akhir (ppm)	Total Akumulasi (ppm)	Penurunan %
1	12	1,385	350	24.28	325	92,85 %
2	24	1,372	350	35.28	314	89,71 %
3	36	1,307	350	48.57	301	86 %
4	48	1,372	350	55	295	84,28 %
5	60	1,269	350	58.42	291	83,14 %
6	72	1,935	350	68.42	281	80,28 %

b. Diplo II

No	waktu	Jumlah Kepadatan (OD 600nm)	Konsentrasi Awal (ppm)	Konsentrasi Akhir (ppm)	Total Akumulasi (ppm)	Penurunan %
1	12	1,232	350	23.85	326	93,14%
2	24	1,239	350	26	324	92,57 %
3	36	1,438	350	39,57	310	88,57%
4	48	1,346	350	53.14	296	84,57 %
5	60	1,188	350	56.42	293	83,71 %
6	72	1,687	350	59.71	290	82,85 %

3. Jumlah akumulasi bakteri *Pseudomonas aeruginosa* terhadap logam berat timbal (Pb)

a. Simple I



No	waktu	Jumlah Kepadatan (OD 600nm)	Konsentrasi Awal (ppm)	Konsentrasi Akhir (ppm)	Total Akumulasi (ppm)	Penurunan %
1	12	1,285	350	37,71	312	89,14 %
2	24	1,378	350	26,85	323	92,28 %
3	36	1,179	350	39,71	310	88,57 %
4	48	1,599	350	34,28	315	90 %
5	60	1,602	350	35,85	314	89,71 %
6	72	1,705	350	31,71	318	90,85 %

b. Diplo II


No	waktu	Jumlah Kepadatan (OD 600nm)	Konsentrasi Awal (ppm)	Konsentrasi Akhir (ppm)	Total Akumulasi (ppm)	Penurunan %
1	12	1,378	350	36,42	313	89,42 %
2	24	1,360	350	31,14	318	90,85 %
3	36	1,399	350	34	316	90,28 %
4	48	1,512	350	44,28	305	87,42 %
5	60	1,431	350	28,85	312	89,14 %
6	72	1,869	350	30	320	91,42 %

Lampiran 12. Diagram akumulasi logam berat timbal (Pb)


1. *Alcaligenes faecalis*




2. *Bacillus thuringiensis*



### Kurva Pertumbuhan Bakteri *Bacillus thuringiensis*




### 3. *Pseudomonas aeruginosa*




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
 MAKASSAR

## Kurva Pertumbuhan Bakteri *Pseudomonas areuginosa*



### 4. Diagram kemampuan bakteri dalam mengakumulasi logam berat timbal (Pb)



Lampiran 12. Dokumentasi penelitian



Lampiran 13. Alat dan Bahan



Lampiran 14. Rumus penentuan larutan timbal (Pb) 350 ppm

$$\frac{mg}{l} \times \frac{ArPb}{Mr(Pb(NO_3)_2)}$$

$$350 \frac{mg}{l} = \frac{mg}{l} \times \frac{ArPb}{Mr(Pb(NO_3)_2)}$$

$$350 \frac{mg}{l} = \frac{bobot \times 207,2 \frac{g}{m}}{331,2 \frac{g}{m}}$$

$$Bobot \times 207,2 = 350 \text{ mg} \times 331,2$$

$$\begin{aligned} \text{Bobot} &= \frac{115,959 \text{ mg}}{207,2} \\ &= 559,959 \text{ mg} \end{aligned}$$

$$= 0,559 \text{ gram dalam 1 liter Aquadest} \Rightarrow 350 \text{ ppm}$$

Menentukan rumus  $MrPb(NO_3)_2 \Rightarrow$  Nomor Atom Pb = 207,2, N = 14 dan O = 16

$$\begin{aligned} Mr &= Pb + 2(N + 3(O)) \\ &= 207,2 + 2(14 + 3(16)) \\ &= 207,2 + 2(14 + 48) \\ &= 207,2 + 2(62) \\ &= 207,2 + 124 \\ &= 331,2 \end{aligned}$$

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
M A K A S S A R

## Lampiran 15. Preparasi larutan induk standar

1. Pembuatan larutan induk timbal (Pb) sebanyak 350 ppm (Laboratorium Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar)
  - a. Mengencerkan larutan induk Pb dengan aquadest pada Erlenmeyer 1000ml sehingga konsentrasi menjadi 1000 ppm.
  - b. Membagi larutan induk 1000 ppm kedalam Erlenmeyer 100 ml sebanyak 50, 125, 200, 275 dan 350 ppm.
  - c. Konsentrasi larutan standar timbal (Pb) dalam labu ukur 100 ml masing-masing diukur dengan menggunakan Spekrtofotometer Serapan Atom (SSA) dengan panjang gelombang 324,7  $\mu\text{m}$ .



## RIWAYAT HIDUP

Bismillahirrahmanirahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh


Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. penulis bernama Dewi Sakti Angraeni untuk panggilan kampus (wiwi) dan panggilan rumah (dewi). Penulis lahir di Pare-pare pada tanggal 01 Oktober 1994 pas saat peringatan kelahiran kesaktian pancasila, maka dari itu nama penulis ada Saktinya. Nama penulis diberikan oleh Alm. Ayahanda Drs.Burhanuddin dan ibunda Jumriyani. Penulis merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara. Penulis mulai memasuki masa sekolah tahun 2001-2007 di SDI. Paccinongang kab. Gowa, kemudian pada tahun yang sama 2007-2009 penulis melanjutkan kejenjang SMP, penulis bertolak ke kampung halaman yaitu Pare-pare untuk bersekolah namun hanya sampai memasuki SMP kelas 2 semester awal penulis berpindah kemakassar dan bersekolah kembali di SMP. Aisyiyah Paccinongang Kab. Gowa. Selanjutnya penulis melanjutkan sekolah pada tahun 2009-2012 di SMA Neg. 3 Sungguminasa. Selanjutnya pada tahun 2012 penulis tidak langsung melanjutkan kuliah melainkan penulis bekerja membantu ibu yang sejak kecil sudah berpisah dengan ayahanda. Selajutnya pada tahun 2013-2017 penulis melanjutkan kuliah dan diterima masuk di jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.

Selama penulis menjabat sebagai mahasiswa, penulis sangat aktif dalam bidang organisasi terkhususnya menjadi bagian dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Biologi (HMJ) periode 2014-2015 dan penulis juga pernah menjabat menjadi Asisten praktikum Laboratorium jurusan Biologi FST UINAM.

Demikian penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini dengan berjudul “*Perbandingan Kemampuan Bakteri Alcaligenes faecalis, Bacillus thuringiensis dan Pseudomonas aeruginosa*”.

Semoga ilmu yang penulis dapatkan selama ini dapat bermanfaat terkhususnya bagi penulis pribadi dan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan bagi kita semua ummat baginda Rasulullah SAW. Aamiin Yaa Rabbalalamin.

SYUKRAN KATSIRAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
M A K A S S A R