

**IDENTIFIKASI MOLEKULAR IKAN GOBI (FAMILI: GOBIIDAE) DI
SUNGAI KARAMA KABUPATEN MAMUJU SULAWESI BARAT
BERDASARKAN GEN COI MITOKONDRIA**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains
Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Zakiyah Darojar
NIM : 60300114029
Tempat/Tgl. Lahir : Mangkutana/31 Agustus 1996
Jur/Prodi : Biologi
Fakultas : Sains dan Teknologi
Alamat : Jl. HM. Yasin Limpo, Samata-Gowa
Judul : Identifikasi Molekular Ikan Gobi (Famili: Gobiidae) Di Sungai Karama Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat Berdasarkan Gen COI Mitokondria

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 16 Agustus 2018

Penyusun

Annisa Zakiyah Darojar

NIM: 60300114029



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Identifikasi Molekular Ikan Gobi (Famili: Gobiidae) di Sungai Karama Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat Berdasarkan Gen COI Mitokondria", yang disusun oleh Annisa Zakiyah Darojat, NIM: 60300114029, mahasiswa Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 09 Agustus 2018 M, bertepatan dengan 27 Dzulqa'dah 1439 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Sains dan Teknologi, Jurusan Biologi (dengan beberapa perbaikan).

Gowa, 16 Agustus 2018 M.

5 Dzulhijjah 1439 H.

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.

(.....)

Sekretaris : Hasyimuddin, S.Si., M.Si.

(.....)

Munaqisy I : Eka Sukmawaty, S.Si., M.Si.


(.....)

Munaqisy II : Dr. M. Sadik Sabry, M.Ag.

(.....)

Pembimbing I : Dr. Cut Muthiadin, S.Si., M.Si. (.....)

Pembimbing II: Isna Rasdianah Azis, S.Si., M.Sc. (.....)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir penyelesaian masa studi S1. Dialah Allah yang telah memberikan kekuatan dan motivasi tertinggi bagi penulis selama masa belajar hingga penyusunan tugas akhir.

Shalawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada suri tauladan Nabiyyullah Muhammad saw. yang telah membawa risalah Islam melalui akhlaq yang mulia dan tuntunan langsung dari Allah berupa perintah membaca. Darinya terbuka pemikiran ummat pada setiap sisi kehidupan yang membentuk peradaban baru bermartabat.

Proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena keterbatasan ruang, tidak mungkin bagi penulis untuk menyebutkan satu per satu. Oleh karena itu, hanya beberapa pihak yang penulis cantumkan pada skripsi ini.

Ucapan terima kasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada kedua orang tua, ayahanda Sutawi dan ibunda Asiyah, S.Pd.I. yang telah membesarkan, merawat dan mendidik penulis hingga detik ini. Ibunda yang telah menularkan semangat menuntut ilmu dan pantang menyerah kepada penulis dan ayahanda yang telah menjadi motivasi terbesar dalam tiap usaha untuk mengejar cita-cita. Terima kasih karena telah mendekatkan ridho Allah melalui do'a dan keridhoan ayahanda dan ibunda.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si. selaku rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
2. Bapak Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag. selaku dekan Fakultas Sains dan Teknologi beserta Wakil Dekan I, II dan III, dan seluruh staf administrasi yang telah banyak memberikan fasilitas dan bantuan selama masa belajar hingga penyelesaian tugas akhir.
3. Bapak Dr. Mashuri Masri, S.Si., M.Kes. selaku ketua jurusan Biologi dan Bapak Hasyimuddin, S.Si., M.Si. selaku sekretaris jurusan Biologi yang telah memberikan banyak fasilitas dan bantuan selama masa belajar hingga penyelesaian tugas akhir.
4. Ibu Dr. Cut Muthiadin, S.Si., M.Si. selaku dosen Penasehat Akademik dan Pembimbing I yang telah memberikan nasehat, motivasi, ide, do'a, dan inspirasi selama masa belajar hingga penyelesaian tugas akhir, semoga tetap menjadi inspirasi bagi banyak orang.
5. Ibu Isna Rasdianah Azis, S.Si., M.Sc. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, kritik, dan saran yang membangun selama penulisan skripsi.
6. Ibu Eka Sukmawaty, S.Si., M.Si., selaku pembahas I dan Bapak Dr. Sadiq Sabri, M.Ag., selaku pembahas II.

7. Bapak dan Ibu dosen dalam jajaran Fakultas Sains dan Teknologi yang telah mengajarkan ilmu dan mendidik penulis. Semoga menjadi amal jariyah di sisi Allah swt.
8. Kepala Laboratorium dan para Laboran Biologi Fakultas Sains dan Teknologi yang telah membimbing praktikum hingga menyediakan fasilitas selama penelitian, dan memberikan ruang kepada penulis untuk menambah pengalaman dalam laboratorium.
9. Ibu Dra. Tuty Arisuryanti, M.Sc., Ph.D., beserta staf Laboratorium Genetika dan Pemuliaan Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang senantiasa membimbing selama penelitian berlangsung.
10. Kakak Sumiaty, S.Pd., selaku staf Jurusan Biologi yang telah banyak membantu persiapan hingga pelaksanaan kegiatan akademik berupa peminjaman buku, persuratan, dan lain sebagainya.
11. Kakak Miftahul Khairiyah dan adik Adzkia Qurroti A'yun beserta seluruh keluarga besar yang telah memberikan semangat dan do'a kepada penulis.
12. Saudara seperjuangan Tim Penja; Adin Ayu Andriyani dan Saifullah Azman yang senantiasa berjuang bersama-sama dan saling menyemangati satu sama lain.
13. Saudara seangkatan “14CTEAL” yang telah membersamai perjuangan penulis sejak awal perjalanan perkuliahan, praktikum hingga penyelesaian tugas akhir.
14. Adik-adik mahasiswa jurusan Biologi angkatan 2015, 2016, dan 2017 serta para senior jurusan Biologi.

15. Teman-teman KKN angkatan 57 Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, khususnya Posko 9 Desa Bonto Jai yang selalu memberikan dukungan, motivasi, semangat dan do'anya.
16. Serta semua pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan, semangat, motivasi dan do'a dalam penulisan tugas akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Ucapan terima kasih sebesar-besarnya pula kepada Kepala Perpustakaan UIN Alauddin Makassar dan staf pustakawan yang telah memfasilitasi penulis dalam hal pengumpulan referensi selama penyusunan tugas akhir.

Terima kasih pula kepada semua pihak yang telah membaca dan berkenan memberikan masukan, saran dan koreksi pada tulisan ini. Pada akhirnya, penulis tetap bertanggung jawab sepenuhnya terhadap tulisan ini meskipun dalam penyusunannya menerima banyak masukan dan bantuan dari berbagai pihak. Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

UNIVERSITAS ISLAM NGRADJAL
Gowa, 16 Agustus 2018


ALAUDDIN
MAKASSAR

Annisa Zakiyah Daroijat
NIM: 60300114029

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR ILUSTRASI	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1-8
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup Penelitian	6
D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu	6
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN TEORITIS	9-31
A. Ayat yang Relevan	9
B. Tinjauan Umum Kabupaten Mamuju.....	11
C. Tinjauan Umum Ikan Gobi (Famili Gobiidae)	15
D. Tinjauan Umum DNA	18
E. Tinjauan Umum DNA Mitokondria	21
F. Tinjauan Umum Gen COI Mitokondria	26
G. Tinjauan Umum Identifikasi Molekular Menggunakan Gen COI Mitokondria	28
H. Kerangka Pikir.....	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	32-38
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	32
B. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	32
C. Populasi dan Sampel	32
D. Variabel Penelitian	32
E. Definisi Operasional Variabel	33
F. Metode Pengumpulan Data	33
G. Alat dan Bahan	33

	H. Prosedur Kerja.....	34
	I. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	37
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	39-49
	A. Hasil Penelitian.....	39
	B. Pembahasan	42
BAB V	PENUTUP.....	50
	A. Kesimpulan.....	50
	B. Saran.....	50
	KEPUSTAKAAN	51-57
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	58-73
	RIWAYAT HIDUP.....	74



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Perbedaan antara DNA nukleus dan DNA mitokondria pada manusia	25
Tabel 2.2. Variasi kode genetik DNA mitokondria	26
Tabel 3.1. Komposisi PCR mix (<i>My Taq Red Mix Bioline</i>)	35
Tabel 3.2. Deskripsi prosedur pelaksanaan amplifikasi.....	36
Tabel 3.3. Primer yang digunakan pada amplifikasi ikan Gobi.....	36
Tabel 4.1. Hasil analisis BLAST sampel ikan Gobi g dan h.....	41
Tabel 4.2. Data variasi genetik sampel ikan Gobi g dan h.....	41
Tabel 4.3. Indikator kategori keragaman Haplotype (Hd)	41



DAFTAR ILUSTRASI

Gambar 2.1. Peta Kabupaten Mamuju	12
Gambar 2.2. Lokasi stasiun pengambilan sampel	13
Gambar 2.3. Area yang tergabung dalam Indo-Malay- Philippines Archipelago.....	14
Gambar 2.4. Letak DNA mitokondria.....	21
Gambar 2.5. Pemetaan genom DNA mitokondria Gobiidae spesies <i>S. japonicus</i>	22
Gambar 2.6. Skema transkripsi pada DNA mitokondria manusia	24
Gambar 2.7. Replikasi DNA mitokondria.....	25
Gambar 4.1. Hasil amplifikasi sampel ikan Gobi g, h, dan i menggunakan primer F2 dan R2	39



ABSTRAK

Nama : Annisa Zakiyah Darojat
NIM : 60300114029
Judul Skripsi : Identifikasi Molekular Ikan Gobi (Famili Gobiidae) di Sungai Karama Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat Berdasarkan Gen COI Mitokondria

Ikan penja adalah ikan famili Gobiidae yang menjadi salah satu produk perikanan Mamuju. Ikan penja dikenal luas oleh masyarakat lokal namun tidak diketahui nama spesiesnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui spesies ikan penja berdasarkan gen COI mitokondria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sampel g dan h memiliki kemiripan dengan spesies *Sicyopterus pugnans* dengan *E-value* 0.0 dan *percentage of identity* 99%. Kedua sampel tersebut juga menunjukkan jumlah *haplotype 2, polymorphic site 7 bp, haplotype diversity 1,000, dan nucleotide diversity 0,00992*. Kedua sampel ikan tersebut dikonfirmasi sebagai ikan Gobi dengan spesies *Sicyopterus pugnans* dan memiliki keragaman genetik antar individu interspesies.

Kata kunci : *Sicyopterus pugnans*, COI mitokondria, Gobiidae dan Penja

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

ABSTRACT

Name : Annisa Zakiyah Darojat
Student ID Number : 60300114029
Title : Molecular Identification of Gobies (Family Gobiidae) in Karama River Mamuju Regency West Sulawesi Based on COI Mitochondria

Penja is Gobiidae family which become fishery commodity in Mamuju, West Sulawesi. Penja is well-known by local people while the scientific name is unidentified. This study aims to identify Penja using qualitative method based on COI mitochondria. The result shows that sample g and h presented E-value 0.0 and percentage of identity 99% which similar with *Sicyopterus pugnans*. Both of them also indicate number of haplotype 2, polymorphic site 7 bp, haplotype diversity 1,000, and nucleotide diversity 0,00992. Sample g and h are confirmed as *Sicyopterus pugnans* with intraspecies genetic diversity.

Keywords : *Sicyopterus pugnans*, COI mitochondria, Gobiidae and Penja



BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang*

Kekayaan alam yang terdiri atas berbagai macam makhluk hidup merupakan suatu hal yang patut untuk disyukuri. Hamparan lautan yang luas memberikan banyak manfaat bagi kehidupan, khususnya bagi kehidupan manusia. Maka sudah sepantasnya manusia mensyukuri nikmat yang luar biasa tersebut dengan tidak hanya mengucap syukur melalui lisan, tetapi juga melalui tindakan yaitu dengan menjaga kelestarian alam dan memanfaatkan sumber daya alam dengan bijaksana. Sehubungan dengan hal tersebut Allah berfirman dalam QS al-Nahl/16: 14.

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبِسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَالِيْرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

Terjemahnya:

Dan Dialah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daging yang segar (ikan) darinya, dan (dari lautan itu) kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu (juga) melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur (Kementerian Agama RI, 2015).

Ayat di atas dijelaskan dalam tafsir Al-Azhar, “Dan Dialah yang menyediakan lautan supaya kamu makan daripadanya daging yang empuk”. Ayat ini memberikan perhatian kepada soal laut, dan terlebih dahulu soal ikan. Disebut keistimewaan dari daging ikan laut, yaitu empuknya, tidak pernah keras atau kejang atau liat. Kata yang sedikit ini saja sudah dapat berlarut-larut kepada usaha

mempertinggi hasil ikan laut dan memperbaiki alat-alat penangkapannya. “Dan supaya kamu keluarkan daripadanya perhiasan yang akan kamu pakai dia”. Yaitu mutiara, marjan, giwang dari lokan dan karab. Itulah barang-barang mahal yang dihasilkan dari lautan untuk manusia. “Dan engkau lihat kapal mengarungi padanya”. Alat pengangkutan penting yang telah ada di dunia sejak beribu-ribu tahun yang telah lalu, mengarungi lautan menghubungkan benua dengan benua, pulau dengan pulau, membawa pindah boyongan manusia dari benua ke benua, sehingga ahli-ahli ilmu pertumbuhan bangsa-bangsa (Antropologi), ahli sejarah bangsa, ahli ilmu bumi dan lain-lain telah mencari hubungan di antara bangsa-bangsanya (Hamka, 1965).

“Dan supaya kamu cari karunia-Nya dan supaya kamu bersyukur”. Dalam membicarakan lautan dan ikannya, mutiara dan marjan, dan kepentingan kapal, Tuhan di akhir ayat telah menganjurkan memakai kesempatan mencari karunia Tuhan dengan menggunakan kapal tersebut. Dalam ayat ini dinyatakan bahwa menjadi Muslim haruslah mempunyai keaktifan hidup. Mengembara, berlayar, bermiaga, dan menjadi nelayan. Ujungnya ialah bersyukur kepada Tuhan (Hamka, 1965).

Ayat di atas juga dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, bahwasanya Allah swt. memberi kabar tentang pengendalian-Nya terhadap lautan yang menggebu-gebu dengan ombak, Allah memberi anugerah kepada hamba-Nya dengan menundukkan lautan, membuatnya mudah untuk mengarunginya, menciptakan ikan besar dan ikan kecil dalam lautan, menjadikan dagingnya halal; baik yang hidup maupun yang mati, ketika halal (diluar kegiatan haji dan umrah) atau ketika ihram, dan Allah memberi anugerah kepada hamba-Nya mutiara dan permata yang sangat berharga dalam lautan. Allah juga memudahkan hamba-Nya untuk mengeluarkan mutiara dan

permata tersebut dari tempatnya, sehingga menjadi perhiasan yang dapat dipakai hamba-Nya. Allah memberi anugerah kepada hamba-Nya dengan menundukkan lautan sehingga hamba-Nya dapat membawa perahu-perahu untuk mengarunginya. Selanjutnya Allah berfirman “Dan supaya kamu kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya dan supaya kamu bersyukur”. Maksudnya, nikmat-nikmat-Nya dan kebaikan-kebaikan-Nya (Abdullah, 2003).

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan perkiraan luas wilayah perairan mencapai 5,8 juta km² (Sulistiono, 2001). Perairan tersebut terdiri atas luas perairan kepulauan atau laut Nusantara (*Total Archipelagic Waters*) 2,3 juta km², luas perairan territorial (*Total Territorial Waters*) 0,8 juta km², luas perairan ZEE Indonesia (*Total EEZ of Indonesian Waters*) 2,7 juta km², dan panjang garis pantai (*Coast Line of Indonesian*) 95.181 km (Retnowati, 2011).

Lautan Indonesia yang luas merupakan aset Sumber Daya Alam yang penting bagi kehidupan dalam bentuk Modal Alam (*Natural Resources Stock*), sedangkan bentuk faktor produksi (komoditas) utama lautan berupa ikan (Retnowati, 2011). Hal ini dikarenakan lautan merupakan habitat dari beragam flora dan fauna akuatik yang selanjutnya menjadi sumber penghidupan masyarakat (Yusron, 2013).

Selain lautan, Indonesia juga memiliki ekosistem perairan tawar berupa sungai, danau, waduk, dan rawa seluas 54 juta Ha. Jenis ikan yang menghuni perairan tawar ini lebih dari 1000 spesies, baik ikan konsumsi maupun ikan hias (Suwelo, 2005).

Sumber daya alam yang dimiliki Indonesia dikategorikan menjadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*renewable*) dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (*non renewable*) (Retnowati, 2011). Sumber daya perikanan yang bersumber dari perairan Indonesia termasuk dalam Sumber Daya Alam yang dapat

diperbaharui (*renewable*) (Sulistiono, dkk., 2001). Dalam *Australian Museum*, ikan yang hidup di perairan Indonesia tercatat kira-kira sebanyak 8500 jenis. Jumlah tersebut merupakan 45% dari keseluruhan jumlah jenis di dunia dan 1300 dari 8500 jenis menempati habitat perairan tawar (Kottelat, 1996 dalam Budiman, dkk., 2002). Berdasarkan jumlah jenis tersebut, Indonesia menempati urutan ke dua dunia setelah Brazil dan menempati urutan pertama di Asia (Budiman, dkk., 2002).

Salah satu ikan air tawar yang terdapat di Mamuju, Sulawesi Barat adalah ikan penja. Ikan ini merupakan salah satu ikan yang tergabung dalam famili Gobiidae dan menghuni Sungai Karama yang terletak di sebelah utara kota Mamuju (Hermiyanto, dkk., 2010). Ikan ini telah diidentifikasi pada tahap juvenil dan tidak menunjukkan kemiripan signifikan pada spesies di database *Gene Bank* (Usman, 2016).

Secara morfologi, ikan penja dewasa memiliki ciri-ciri yang dimiliki oleh ikan famili Gobiidae yaitu sirip perut berbentuk cakram (Thacker dan Roje, 2011). Sehingga perlu dilakukan identifikasi molekular pada spesies ikan penja dewasa untuk mengonfirmasi nama spesies ikan yang disebut sebagai ikan penja oleh masyarakat lokal sebagai salah satu usaha konservasi spesies.

Menurut UU perikanan No. 31 Tahun 2004 tentang konservasi sumberdaya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya ikan, termasuk ekosistem, jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap terpelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumberdaya ikan.

Kabupaten Mamuju adalah salah satu daerah yang tergabung dalam area Indo-Malay-Philippines Archipelago yang merupakan area dengan tingkat biodiversitas tertinggi (Hubert, dkk., 2012). Keberadaan ikan penja di Sungai Karama menjadi potensi kekayaan alam tersendiri, terlebih statusnya sebagai anggota

famili ikan terbesar sehingga perlu dilakukan identifikasi untuk mengetahui spesies spesifik ikan tersebut.

Identifikasi molekular dilakukan sebagai upaya untuk mengungkap identitas organisme terkait yang selanjutnya dapat menjadi dasar eksplorasi kekayaan alam dan ilmu pengetahuan. Selain itu, identifikasi molekular yang merupakan bagian dari studi keragaman genetik juga penting dalam rangka konservasi, pemuliaan, dan mempertahankan plasma nutfah (Wibowo, dkk., 2013).

Identifikasi molekular dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap DNA makhluk hidup. Selain DNA nukleus, DNA mitokondria juga dapat menjadi sumber informasi karakter genetik melalui gen COI. Gen COI merupakan gen yang terdapat pada DNA mitokondria yang dapat digunakan untuk mempelajari karakter genetik makhluk hidup hingga filogeninya (Wibowo, dkk., 2013).

Penggunaan gen COI DNA mitokondria pada identifikasi molekuler ikan penja didasarkan pada beberapa pertimbangan diantaranya ukuran DNA mitokondria lebih kecil, jumlah salinannya lebih banyak, informasi urutan DNA untuk makhluk hidup akuatik tersedia lengkap (Mackie, 1999 dalam Maulid, dkk., 2016), diwariskan secara maternal (Kamaruddin, dkk., 2011), dan lebih peka terhadap mutasi (Maulid dan Nurilmala, 2015).

Selain identitas ikan penja, variasi genetiknya juga perlu diketahui agar dapat dideteksi status kelestarian ikan penja di Sungai Karama Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian, dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah jenis ikan yang disebut sebagai ikan penja di Sungai Karama Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat?
2. Bagaimana variasi genetik ikan yang disebut sebagai ikan penja di Sungai Karama Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Sampel penelitian berupa ikan Gobi (famili: Gobiidae) yang diambil dari Sungai Karama di Dusun Arassi Desa Kalonding Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat. Selanjutnya dilakukan identifikasi molekuler pada gen COI mitokondria untuk mengetahui spesies spesifik ikan tersebut. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Genetika dan Pemuliaan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan Laboratorium Genetika Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Oktober 2017 – Mei 2018.

D. Kajian Pustaka

Adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam melakukan penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Devi (2012) dengan judul Identifikasi Postlarva Famili Gobiidae dari Muara Sungai Kedurang, Bengkulu Melalui DNA Barcode/ruas gen COI. Hasil penelitian ini menunjukkan rekonstruksi pohon filogeni menggunakan metode *Neighbor Joining* (NJ) *bootstrap* 1000x dari 22 ekor postlarva diperoleh 2 klad

besar, yaitu klad pertama yang terdiri dari *Stiphodon atratus* dan *Novem Genus*, serta klad kedua yang terdiri dari *Amblyeleotris sungami*.

2. Ju, et al. (2013) dengan judul Struktur Populasi dan Riwayat Demografi *Sicyopterus japonicus* (Perciformes; Gobiidae) di Taiwan yang Disimpulkan dari Sekuen Area Kontrol Mitokondria. Hasil penelitian ini menunjukkan 102 haplotype dari 107 *S. japonicus* dari 22 populasi yang dikumpulkan dari Taiwan dan Islet Lanyu. Keanekaragaman haplotype tinggi dan keanekaragaman nukleotida rendah terdeteksi di seluruh populasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa *S. japonicus* cenderung mengalami ekspansi demografis.
3. Larson, et al. (2014) dengan judul *Mugilogobius hitam*, spesies baru ikan gobi air tawar (Teleostei: Gobioidei: Gobiidae) dari danau Towuti, Sulawesi Tengah, Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan temuan spesies baru *Mugilogobius hitam* dengan karakteristik morfologi khas berupa papila sensorik yang melintang di pipi, berwarna kehitaman pada kepala, tubuh, dan sirip serta memiliki ukuran tubuh dewasa yang relatif besar.
4. Usman (2016) dengan judul Analisis Variasi Genetik Ikan Penja Indigenous Perairan Polewali Mandar dan Ikan Nike (*Awaous* sp.) Indigenous Perairan Gorontalo. Hasil penelitian ini menunjukkan jarak genetik antara ikan Penja dan ikan Nike (*Awaous* sp.) 0,0364 dengan indeks similaritas berkisar 0,9642. Jarak genetik tersebut termasuk ke dalam kategori rendah.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui spesies ikan yang disebut sebagai ikan penja di Sungai Karama Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat.
2. Untuk mengetahui variasi genetik ikan yang disebut sebagai ikan penja di Sungai Karama Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengeksplorasi keragaman ikan air tawar pada Sungai Karama, Mamuju, Sulawesi Barat.
2. Sebagai upaya konservasi, pemuliaan, dan mempertahankan plasma nutfah Indonesia.
3. Sebagai sumber informasi dan bahan relevansi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Ayat yang Relevan

Aneka ragam makhluk di muka bumi merupakan sebuah mahakarya dari Sang Pencipta. Tiap makhluk memiliki keunikannya masing-masing yang tidak didapati pada makhluk lainnya. Bahkan ketika dua anak terlahir kembar sekalipun tetap memiliki perbedaan satu sama lain. Allah swt. berfirman dalam QS Fathir/35: 28.

وَمِنَ النَّاسِ وَالْدَّوَابِ وَالْأَنْعَمْ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ وَكَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى
الْلَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَؤُلْقٌ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ^{٢٨}

Terjemahnya:

Dan demikian (pula) di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada-Nya, hanyalah para ulama. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun (Kementerian Agama RI, 2015).

Menurut Tafsir Ibnu Katsir, firman Allah Ta’ala, “Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya)”. Yaitu, demikian pula halnya makhluk-makhluk hidup, berupa manusia dan *ad-Dawaab*, yaitu binatang melata, yakni halnya setiap binatang melata yang berjalan dengan empat kaki. *Al-An'aam* (binatang ternak) merupakan jenis tersendiri yang disertakan kepada sesuatu yang umum, dan demikian pula, ia pun berbeda-beda. Sedangkan di antara manusia, ada bangsa Barbar, Habsy, dan Thumathin yang sangat hitam, serta bangsa Shaqalibah dan Romawi yang sangat putih dan bangsa Arab ada di antara mereka, sedangkan bangsa

Hindi di bawah mereka. Untuk itu Allah Ta’ala berfirman di dalam ayat yang lain, “Dan berlain-lainannya bahasamu, dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui” (QS Ar-Ruum: 22). Demikian pula, binatang-binatang ternak juga memiliki perbedaan warna, sekalipun satu jenis. Bahkan, dalam satu macam pun terdapat yang berbeda warna serta satu hewan ada yang berwarna ini dan ada yang berwarna itu. Mahasuci Allah, Rabb sebaik-baik Pencipta, *wallahu a’lam* (Abdullah, 2003).

Ayat tersebut juga dijelaskan pada Tafsir Al-Maragi, dan demikian pula manusia, binatang melata, dan binatang ternak bermacam-macam warnanya, sekalipun satu jenis. Bahkan satu jenis binatang kadang-kadang mempunyai bermacam-macam warna. Maha Suci Allah Pencipta yang terbaik (Al-Maragi, 1992).

Dan setelah Allah menyebutkan tanda-tanda kebesaran-Nya, Dia terangkan pula bahwa semua itu takkan diketahui sebaik-baiknya kecuali oleh orang-orang yang berilmu tentang rahasia alam semesta, yaitu orang-orang yang mengetahui rincian ciptaan Allah Ta’ala. Merekalah yang paham sebaik-baiknya, mengetahui betapa keras hantaman Allah, dan betapa besar tekanan-Nya (Al-Maragi, 1992).

Ayat di atas menyatakan dengan jelas Kuasa Allah dalam penciptaan makhluk, khususnya perbedaan fenotip yang digambarkan melalui hewan-hewan ternak. Selain sebagai dasar dalil aqli, ayat ini menjadi sinyal bagi umat Islam untuk mencari tahu apa yang terjadi sehingga tiap individu makhluk yang Allah ciptakan tidak ada satupun yang sama persis. Secara tidak langsung, Allah telah merangsang umat Islam untuk berfikir dan mempelajari fenomena ciptaan-Nya.

Ayat di atas sudah lebih dari cukup untuk menjadi dasar bahwa keanekaragaman di muka bumi ini memang benar adanya. Dalam kajian Biologi dikenal 3 macam keanekaragaman yaitu keanekaragaman tingkat ekosistem, jenis,


dan gen. Perbedaan warna kulit manusia ataupun perbedaan corak warna pada ikan merupakan wujud keanekaragaman gen pada tiap individu. Perbedaan yang tampak pada masing-masing individu inilah yang kemudian lazim disebut sebagai fenotip.

Suryo (2012) mendefinisikan fenotip sebagai sifat keturunan yang dapat dilihat atau diamati warna, bentuk, maupun ukurannya. Sedangkan genotip adalah sifat dasar yang tak nampak dan tetap. Dari definisi tersebut dapat difahami bahwa fenotip ditentukan oleh genotip. Sebagai faktor penentu, gen yang terdiri atas urutan basa nukleotida (DNA) ini kemudian dikaji lebih lanjut karena dianggap sebagai identitas suatu individu.

Keanekaragaman hewan, khususnya ikan, menjadi daya tarik tersendiri bagi para peneliti untuk mengidentifikasi jenisnya melalui metode molekular. Metode ini berkaitan erat dengan gen yang menjadi penentu fenotipnya. Penelitian ini dilakukan sebagai salah satu upaya eksplorasi kekayaan alam juga konservasi.

B. *Tinjauan Umum Kabupaten Mamuju*

Kabupaten Mamuju merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Barat dengan posisi $1^{\circ} 38' 110''$ – $2^{\circ} 54' 552''$ lintang selatan dan $11^{\circ} 54' 47''$ – $13^{\circ} 5' 35''$ bujur timur. Kabupaten yang beribukota di Mamuju ini memiliki total luas wilayah $5056,19 \text{ km}^2$ dan membawahi 11 kecamatan yaitu Tommo, Sampaga, Papalang, Kalumpang, Bonehau, Kalukku, Simboro, Mamuju, Tapalang, Tapalang Barat, dan Balabalakang. Kecamatan terluas yaitu kecamatan Kalumpang dengan luas wilayah $1.731,99 \text{ km}^2$ dan kecamatan Kepulauan Balabalakang merupakan kecamatan terkecil dengan luas wilayah $21,86 \text{ km}^2$. 11 kecamatan tersebut membawahi 88 desa dan 13 kelurahan (BPS Kabupaten Mamuju, 2017).




Gambar 2.1. Peta Kabupaten Mamuju (BPS Kabupaten Mamuju, 2017)

Secara geografis, total wilayah kabupaten Mamuju berbatasan dengan kabupaten Mamuju Tengah pada sebelah utara, berbatasan dengan provinsi Sulawesi Selatan pada sebelah timur, berbatasan dengan kabupaten Majene, kabupaten Mamasa dan provinsi Sulawesi Selatan pada sebelah selatan, dan berbatasan dengan Selat Makassar pada sebelah barat (BPS Kabupaten Mamuju, 2017).

Kecamatan Sampaga merupakan salah satu kecamatan yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Mamuju. Kecamatan yang beribukota di Desa Bunde ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Mamuju Tengah pada sebelah utara, Kecamatan Papalang pada sebelah selatan, Selat Makassar pada sebelah barat, dan Kecamatan Bonehau pada sebelah Timur. Kecamatan Sampaga memiliki total luas wilayah $119,4 \text{ km}^2$ dan membawahi 7 desa diantaranya Desa Salubarana, Desa Kalonding, Desa Tanambua, Desa Bunde, Desa Tarailu, Desa Sampaga, dan Desa Losso. Desa terluas yaitu Desa Kalonding dengan luas wilayah $42,84 \text{ km}^2$ dan Desa

Tanambua merupakan desa terkecil dengan luas wilayah 8,10 km² (BPS Kabupaten Mamuju, 2017).

Kecamatan Sampaga dilintasi oleh 4 sungai, diantaranya Sungai Salubarana yang melintasi Desa Salubarana, Sungai Tanambua yang melintasi Desa Tanambua, Sungai Bunde yang melintasi Desa Bunde, dan Sungai Karama yang melintasi Desa Kalonding, Desa Tarailu, dan Desa Losso. Salah satu dusun dari 14 dusun di Desa Kalonding yang dilintasi oleh Sungai Karama adalah dusun Arassi (BPS Kabupaten Mamuju, 2017).




Gambar 2.2. Lokasi stasiun pengambilan sampel (RBI skala 100.000 modifikasi Azman, 2018)

Kabupaten Mamuju memiliki sejumlah potensi sumber daya alam yang dikelola dengan baik. Salah satunya yaitu sektor perikanan yang terdiri atas perikanan laut dan perikanan darat (berasal dari perairan tawar). Menurut data yang

bersumber dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2014, Kabupaten Mamuju tercatat menempati urutan pertama pada produksi ikan laut dengan jumlah 32.400 ton, menempati urutan keempat pada produksi ikan tambak dengan jumlah 49.055,11 ton, dan menempati urutan keenam pada produksi ikan kolam dengan jumlah 574,50 ton (BPS Sulawesi Barat, 2018).

Kabupaten Mamuju tergabung dalam area Indo-Malay-Philippines Archipelago (IMPA) yang memiliki puncak biodiversitas. Terdapat 2 hipotesis terkait IMPA, yaitu *Centre-of-Origin* dan *Centre-of-Overlap*. *Centre-of-Origin* menyebutkan IMPA sebagai tempat asal biodiversitas ikan karang tropis yang selanjutnya bermigrasi dan menetap di daerah perifer. Sebaliknya *Centre-of-Overlap* menyebutkan bahwa diversitas yang dimiliki oleh IMPA merupakan hasil dari berkumpulnya ikan yang berasal dari beberapa daerah biogeografi di sekitar IMPA (Hubert, dkk., 2012).



Gambar 2.3. Area yang tergabung dalam Indo-Malay-Philippines Archipelago (IMPA) (Hubert, dkk., 2012)

C. Tinjauan Umum Ikan Gobi (Family Gobiidae)

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah sumber daya alam pada sektor perikanan melimpah. Menurut data statistik Ditjen Perikanan Tangkap, produksi perikanan tangkap mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, produksi perikanan tangkap yang berasal dari perairan laut tercatat sebesar 6.351.480 ton, sedangkan dari perairan umum tercatat sebesar 479.850 ton. Hal ini berbanding lurus dengan meningkatnya tingkat konsumsi ikan per kapita sebesar 43,88 di tahun yang sama (SIDATIK, 2018).

Sehubungan dengan hal di atas, Allah swt. berfirman dalam QS Fathir/35: 12:

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِعٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ
أَجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً
تَلْبِسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاحِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

Terjemahnya:

Dan tidak sama (antara) dua lautan; yang ini tawar, segar, sedap diminum dan yang lain asin lagi pahit. Dan dari (masing-masing lautan) itu kamu dapat memakan daging yang segar dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai, dan disana kamu melihat kapal-kapal berlayar membelah laut agar kamu dapat mencari karunia-Nya dan agar kamu bersyukur (Kementerian Agama RI, 2015).

Dalam tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur dijelaskan bahwa tidaklah sama dua laut. Yang sebuah, rasa airnya tawar dan sedap, memenuhi sungai-sungai yang airnya mengalir sepanjang dataran rendah. Yang sebuah lagi, airnya asin yang memenuhi laut, yang tidak mengalir, untuk tempat kapal berlayar. Dari masing-masing laut, kamu memperoleh ikan-ikan yang enak rasanya dan bergizi sebagai keutamaan (rezeki) dari Allah. Kamu keluarkan mutiara dan marjan dari laut serta pada masing-

masing laut tersebut berlayarlah kapal pulang pergi mengangkut semua kebutuhanmu. Mudah-mudahan kamu mensyukuri Allah atas kemurahan-Nya menundukkan laut kepadamu hingga kamu dapat berlayar di atasnya, jika kamukehendaki (Ash-Shiddieqy, 2000).

Ayat tersebut dijelaskan pula pada Tafsir Al-Azhar, “dan tidaklah sama di antara dua lautan”, yaitu perbedaan di antara daratan dan samudera luas yang membentang seperlima dari seluruh dunia ini dan danau-danau dan sungai-sungai besar yang mengalir dari gunung melalui tanah landai, menurun menuju laut. “Yang ini tawar lagi segar, sedap diminumnya”, menjadi persediaan air minum bagi manusia. “Dan yang ini asin lagi pahit”, itulah air asin di lautan lepas. “Dan dari masing-masing kamu makan daging yang empuk”, yaitu ikan-ikan. Pun suatu hal yang mengagumkan bahwa kedua macam ikan itu, ikan lautan asin dan ikan danau juga sungai yang tawar, rasanya sama-sama enak dan sama-sama empuk. Padahal ikan air tawar tidak dapat hidup di lautan asin dan ikan lautan asin tidak dapat hidup di air tawar (Hamka, 1988).

Salah satu produk perikanan Indonesia yang tersimpan di kabupaten Mamuju adalah ikan gobi yang tergabung dalam famili Gobiidae. Gobiidae merupakan salah satu famili ikan *acanthomorph* terbesar dan tersebar luas di lautan, estuari (muara) dan habitat perairan tawar. Karena hidupnya di dasar dan perairan, ikan gobi secara umum dikategorikan sebagai bentos yang mendiami zona bentik (Thacker dan Roje, 2011).

Ikan gobi merupakan spesies yang cukup besar di wilayah Indo-Pasifik dan kepulauan Indo-Malay (Larson, dkk., 2014). Gobiidae terdiri atas lebih dari 260 genus dengan jumlah spesies lebih dari 1700 spesies. Famili Gobiidae ini terbagi menjadi dua subfamili besar yaitu Gobiinae dan Gobionellinae. Gobiinae meliputi

ikan Gobi yang berhabitat di perairan laut, sedangkan Gobionellinae meliputi ikan Gobi yang habitatnya merupakan asosiasi dari perairan tawar dan estuari (Tornabene, 2014).

Ikan gobi memiliki ukuran tubuh yang kecil yaitu kurang dari 50 mm dengan ciri khas berupa sirip perut berbentuk cakram yang berfungsi untuk melekat pada substrat perairan (Thacker dan Roje, 2011). Ukuran sirip perut berbeda berdasarkan substrat habitatnya, sirip perut ikan Gobi yang mendiami substrat pasir halus atau lumpur cenderung lebih besar dibandingkan sirip perut ikan Gobi yang mendiami substrat batu (Devi, 2012).

Ikan gobi memiliki tipe siklus hidup *freshwater amphidromous* yaitu bereproduksi di air tawar, larva telur melakukan migrasi ke laut melalui aliran air sungai hingga menjadi juvenil selama 2-9 bulan. Selanjutnya juvenil kembali ke air tawar, tumbuh dewasa, dan kembali bereproduksi. Siklus hidup ini memiliki keuntungan tersendiri bagi ikan gobi, larva telur berpindah ke laut untuk menghindari adanya kompetisi sumber makanan dengan juvenil dan ikan dewasa. Selain itu, habitat laut lebih produktif dibandingkan sungai dan kemungkinan lebih baik untuk pertumbuhan larva (Watanabe, et al., 2013).

Pada penelitian yang dilakukan di perairan Pelawangan Timur yang merupakan jalur air laut dari Samudera Indonesia menuju Segara Anakan, diperoleh data frekuensi kemunculan larva Gobiidae sebesar 20, 31% pada Agustus akhir. Secara umum larva dapat ditemukan pada pertengahan Agustus hingga Oktober dengan puncak kemunculan larva tertinggi pada pertengahan September. Migrasi larva ini bertujuan untuk mencari kondisi lingkungan yang sesuai dan sumber makanan untuk pertumbuhannya (Subiyanto, dkk., 2008).

Kondisi lingkungan habitat tidak dapat dipungkiri menjadi hal penting bagi kelangsungan hidup ikan. Beberapa parameter lingkungan meliputi suhu, pH dan DO yang optimum untuk pertumbuhan ikan di daerah tropis berkisar antara 25°C-30°C, pH 6,5-9, dan DO 6-8 mg/l atau >5mg/l (Mamangkey, 2010).

Selain faktor lingkungan, ketersediaan makanan bagi larva menjadi salah satu alasan utama migrasi sementara larva ke laut. Pada genus Sicydiinae, diketahui bahwa larva membutuhkan makanan berupa plankton berukuran kecil. Plankton tersebut terdapat dalam jumlah yang melimpah di laut, olehnya larva melakukan migrasi ke laut. Di samping itu, perpindahan larva ke laut diperkirakan juga untuk menghindari kompetisi sumber makanan dengan juvenil dan ikan dewasa (Watanabe, dkk., 2013).

D. Tinjauan Umum DNA

Deoxyribonucleic acid yang disingkat DNA merupakan persenyaawan kimia terpenting bagi makhluk hidup. DNA memuat informasi genetik makhluk hidup secara keseluruhan dari satu generasi ke generasi berikutnya (Suryo, 2012).

Untuk pertama kalinya, struktur molekul DNA diungkapkan oleh James Watson dan Francis Crick pada tahun 1953 sebagai untai ganda polinukleotida yang berpilin satu sama lain. Untai ganda ini memiliki orientasi yang berlawanan yaitu orientasi 5' → 3' dan orientasi 3' → 5' (Yuwono, 2005).

DNA di dalam sel terdapat sebagai rantai panjang nukleotida dengan bentuk untaian ganda berpilin (*double helix*). Kedua untai DNA ini dihubungkan oleh ikatan hidrogen, sedangkan penghubung pada untai tunggalnya berupa ikatan fosfodiester. Untai DNA ini memiliki pola spesifik, dimana basa adenin selalu berikatan dengan timin, begitu pula guanin selalu berikatan dengan sitosin. Dari pola spesifik tersebut

maka terbentuklah dua untai yang saling komplementer satu dengan yang lainnya (Pratiwi, 2008).

Struktur kimia DNA terdiri atas asam fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Basa nitrogen ini terbagi atas dua jenis yaitu purin dan pirimidin. Purin terdiri atas guanine (G) dan adenine (A), sedangkan pirimidin terdiri atas cytosine (C) dan timin (T). Basa purin pada N'9 akan berikatan pada atom C'1 deoksiribosa, sedangkan basa pirimidin pada N'1. Selanjutnya, gugus fosfat akan berikatan dengan C'5 deoksiribosa (Irawan, 2008).

Bila suatu molekul hanya tersusun atas basa nukleotida dan gula ribosa atau deoksiribosa maka disebut nukleosida. Akan tetapi, jika ikatannya ditambah dengan gugus fosfat disebut nukleotida. Berdasarkan jumlah gugus fosfatnya, nukleotida dapat dibagi menjadi nukleotida monofosfat (NMP), nukleotida difosfat (NDP), dan nukleotida trifosfat (NTP). Gugus fosfat dapat dibedakan menjadi α , β , dan γ . Gugus fosfat α berikatan dengan atom C'5 deoksiribosa, gugus fosfat β berikatan dengan gugus fosfat α , dan gugus fosfat γ berikatan dengan gugus fosfat β (Irawan, 2008).

Aliran informasi genetik dari DNA, RNA, hingga menjadi urutan asam amino yang menyusun protein berlangsung melalui tiga tahap utama yaitu replikasi (penggandaan bahan informasi genetik), transkripsi (sintesis RNA menggunakan DNA sebagai cetakan), dan translasi (penerjemahan kode genetik pada mRNA oleh tRNA menjadi asam amino) (Pratiwi, 2008). Konsep ini diungkapkan oleh Francis Crick pada 1956 dengan nama dogma sentral (*central dogma*) (Campbell, dkk., 2010).

Replikasi merupakan proses penggandaan bahan informasi genetik (Yatim, 2003). Proses replikasi ini berlangsung dengan melibatkan banyak komponen, diantaranya DNA *template*, molekul deoksiribonukleotida (dATP, dGTP, dCTP, dan


dTTP), DNA polimerase, primase, helikase, girase, *single strand binding protein* (SSB), dan ligase (Yuwono, 2005).

Transkripsi merupakan proses sintesis RNA menggunakan DNA sebagai cetakan (Yatim, 2003). Beberapa komponen yang berperan penting dalam proses transkripsi yaitu DNA *template*, RNA polimerase, faktor-faktor transkripsi, dan molekul ribonukleotida (5'-trifosfat ATP, GTP, CTP, dan UTP). RNA yang disintesis pada transkripsi berupa mRNA (*messenger RNA*) yang selanjutnya akan ditranslasi, tRNA (*transfer RNA*) sebagai pembawa asam amino spesifik dalam translasi, dan rRNA (*ribosomal RNA*) sebagai penyusun ribosom. Sebelum berlanjut ke tahap selanjutnya, sintesis transkrip RNA primer akan menjalani proses pemotongan intron dan penyambungan ekson (*RNA splicing*) (Yuwono, 2005).

Translasi merupakan proses diterjemahkannya nukleotida pada mRNA menjadi asam amino yang selanjutnya akan menyusun polipeptida atau protein. Proses ini berlangsung di ribosom melalui 3 tahapan yaitu inisiasi, pemanjangan, dan terminasi. Pada tahap inisiasi, translasi dimulai ketika ribosom menemukan kodon AUG pada mRNA. Selanjutnya dilakukan translasi dengan arah 5' → 3' melalui pengikatan antikodon tRNA pada sisi A ribosom, pembentukan ikatan peptida pada sisi P ribosom, dan perpindahan posisi ribosom ke kodon mRNA selanjutnya. Tahap terakhir translasi yaitu terminasi pada salah satu dari tiga kodon terminasi (UAA, UAG, UGA pada mRNA) (Yuwono, 2005).

E. Tinjauan Umum DNA Mitokondria

Selain dalam inti sel, DNA juga terdapat di organel sel pada sitoplasma yaitu mitokondria dan plastida pada tumbuhan. DNA ini disebut sebagai DNA ekstrakromosomal (Yatim, 2003). Berikut ilustrasi letak DNA mitokondria:




Gambar 2.4. Letak DNA mitokondria (Susmiarsih, 2010)

Selain DNA nukleus, informasi genetik makhluk hidup juga dapat diperoleh melalui DNA mitokondria. DNA mitokondria merupakan DNA rantai ganda yang ditransmisikan secara maternal dan berbentuk sirkuler. DNA mitokondria mengkode kompleks protein rantai respirasi yang penting pada proses produksi ATP (Susmiarsih, 2010). Untai ganda DNA mitokondria terdiri atas *heavy strand* (H) dan *light strand* (L) yang mengkode 13 polipeptida penyusun kompleks I, III, IV, dan V pada rantai transpor elektron. Kompleks I terdiri atas ND1, ND2, ND3, ND4L, ND4, ND5, dan ND6. Kompleks III yaitu *Cytochrome b*. Kompleks IV terdiri atas COI, COII, dan COIII. Serta kompleks V yang terdiri atas ATPase 6 dan ATPase 8 (Mposhi, et al., 2017). Penamaan untai H dan L didasarkan pada perbedaan berat molekul masing-masing untai, untai H tersusun atas lebih banyak basa purin yang memiliki 2 cincin (Ngili, dkk., 2012). Meskipun secara keseluruhan DNA mitokondria membentuk untai ganda, namun bagian *displacement loop* (D-loop)

yang merupakan area *non-coding* membentuk untai tiga, untai ketiga ini dikenal dengan 7S DNA (Satiyarti, dkk., 2017).

DNA mitokondria Gobiidae pada spesies *Sicyopterus japonicus* diketahui berbentuk sirkular, untai ganda, dan berukuran sekitar 16 kb. DNA mitokondria ini terdiri atas 16.514 bp, dengan 13 gen pengkode protein, 2 rRNA, 22 tRNA, dan 1 *non-coding region* yang terletak di antara tRNA (Pro) dan tRNA (Phe) dengan panjang 843 bp (Chiang, et al., 2013). Berikut ilustrasi DNA mitokondria *Sicyopterus japonicus*:




Gambar 2.5. Pemetaan genom DNA mitokondria Gobiidae spesies *S. japonicus* (MitoFish, 2018)

Seperti halnya DNA nukleus, DNA mitokondria juga melakukan replikasi, transkripsi, dan translasi yang berlangsung di matriks mitokondria. Jika DNA nukleus memiliki setidaknya 1 promoter tiap gen, maka DNA mitokondria hanya memiliki 3 promoter yang mentranskripsi banyak gen sekaligus dan menghasilkan transkrip polisistronik. Untai L ditranskripsi oleh *L-strand promoter* (LSP) dan untai H ditranskripsi oleh *H-strand promoter 1 and 2* (HSP1 and HSP2), dimana HSP1 mentranskripsi 12S dan 16 S rRNA dan HSP2 mentranskripsi seluruh untai H sebagai transkrip polisistronik. Ketiga promoter tersebut terletak pada lokus 1 kb yang dikenal sebagai D-loop atau DNA mitokondria *non-coding region* (Mposhi, et al., 2017).

Transkripsi berlangsung pada ketiga promoter yang terletak di *H-strand* dan *L-strand*. *Enhancer* yang tersusun atas sekuen DNA pendek diketahui menstimulasi terjadinya transkripsi dengan mengikat *mitochondrial transcription factor A* (mtTFA), selanjutnya mtTFA mengikat *mitochondrial RNA polymerase* untuk memulai transkripsi. *Initiation transcription H₁* (IT_{H1}) memulai transkripsi *H-strand* dan berakhir pada ujung 3' 16S rRNA, sedangkan IT_{H2} mentranskripsi seluruh *H-strand* dan menghasilkan mRNA polisistronik. Pada *L-strand*, IT_L memulai transkripsi dengan arah yang berlawanan dengan *H-strand* dan menghasilkan mRNA sekaligus *primer* replikasi *H-strand*. Untai RNA yang terbentuk dari titik IT_L mengalami transisi dari RNA menjadi DNA pada area *conserved sequence block* (CSB) I, II, dan III. Untai DNA pendek ini mengalami terminasi pada *termination-associated sequence* (TAS) dan menjadi untai ketiga D-loop yang dikenal dengan 7S DNA (Taanman, 1999).

Berikut ilustrasi pengawalan transkripsi pada DNA mitokondria manusia:



Gambar 2.6. Skema transkripsi pada DNA mitokondria manusia (Taanman, 1999)


Setelah melewati proses transkripsi, transkrip primer mengalami proses pasca transkripsi. tRNA dipisahkan dari untaian transkrip dengan bantuan enzim mtRNase yang memotong ujung 5' dan endonuklease yang memotong ujung 3'. Selanjutnya ujung 3' ditambahkan sekuen CCA oleh ATP/CTP yang dikatalisis oleh tRNA *nucleotidyltransferase*. Adapun mRNA mengalami poliadenilasi oleh *mitochondrial poly (A) polymerase* tanpa signal poliadenilasi seperti mRNA nukleus. Sedangkan rRNA ditambahkan sekuen pendek adenin pada ujung 3' (Taanman, 1999).

mRNA yang telah melalui proses pasca transkripsi selanjutnya ditranslasi. Untai mRNA akan berikatan dengan ribosom melalui perantara *mitochondrial initiation factor* (mtIF) dan GTP. Translasi dimulai dengan pengikatan fMet-tRNA, seperti halnya translasi pada prokaryot. Proses translasi melibatkan *mitochondrial elongation factor* (mtEF), peptidil transferase, dan GTP (Taanman, 1999).

Adapun replikasi pada *H-strand* dimulai dari O_H dengan primer RNA yang terbentuk dari IT_L dengan arah menuju *Cyt b* hingga O_L yang terletak di antara 5 gen pengkode tRNA. Selanjutnya *H-strand* terpisah dan O_L aktif. O_L membentuk struktur *stem-loop* yang menjadi struktur pengenalan *mitochondrial RNA polymerase*

(POLRMT) untuk menginisiasi *primer* bagi replikasi *L-strand*. Arah replikasi *L-strand* berlawanan dengan arah replikasi *H-strand* (Wanrooij and Falkenberg, 2010).

Ilustrasi replikasi DNA mitokondria ditunjukkan pada bagan alir sebelah kiri berikut:



Gambar 2.7. Replikasi DNA mitokondria (Brown, et.al., 2005)

Menurut Mposhi, et al. (2017), beberapa perbedaan antara DNA nukleus dan DNA mitokondria pada manusia diantaranya:

Tabel 2.1. Perbedaan antara DNA nukleus dan DNA mitokondria pada manusia

Sifat	DNA nukleus	DNA mitokondria
Ukuran (bp)	$\sim 3 \times 10^9$	16.569
Bentuk	Linear untai ganda	Sirkular untai ganda
Pewarisan	Kedua orang tua	Maternal
Salinan DNA/sel	2	$\sim 10-50.000$
Jumlah gen	~ 20.000 protein coding	13 protein-coding + 24 non-protein coding
Intron	Ditemukan hampir tiap gen	Tidak ada
Histon	Berasosiasi dengan DNA	Tidak berasosiasi dengan DNA

Menurut (Hartwell, et.al., 2011), DNA mitokondria manusia juga memiliki variasi kode genetik diantaranya:

Tabel 2.2. Variasi kode genetik DNA mitokondria

Karakteristik	Kode universal	Kode DNA mitokondria
UGG	Trp	Trp
UGA	Stop	Trp
AGG	Arg	Stop
AGA	Arg	Stop
AUG	Met	Met
AUA	Ile	Met

DNA mitokondria digunakan secara luas pada studi genetika populasi, identifikasi spesies, identifikasi penyakit, filogeni kedokteran hewan, dan sebagainya (Wibowo, dkk., 2013). Beberapa keunggulan DNA mitokondria sehingga cocok dijadikan sebagai penanda molekuler berskala besar diantaranya genom DNA mitokondria dapat menghasilkan salinan dalam jumlah yang besar dari berbagai metode ekstraksi, DNA mitokondria memiliki tingkat mutasi yang tinggi sehingga memungkinkannya menjadi genom yang informatif terhadap pola dan proses evolusi (Hubert, et al., 2008), paparan rekombinasi terbatas, pewarisannya dalam bentuk haploid (Hebert, et al., 2003), pewarisan maternal efektif, replikasi kontinyu, dan laju substitusi dalam DNA mitokondria 5 sampai 10 kali lebih besar daripada salinan tunggal DNA nukleus (Kamarudin, et al., 2011).

F. Tinjauan Umum Gen COI Mitokondria

Pendekatan DNA mitokondria mulai mendominasi sistematik molekular pada akhir 1970-an dan 1980-an. Selanjutnya Hebert et al. (2003), memperkenalkan *Cytochrome c oxidase sub unit I* (COI) sebagai sistem bioidentifikasi global untuk hewan. Identifikasi ikan dan produk perikanan yang akurat dan tidak ambigu, mulai dari telur hingga ikan dewasa, dipandang sangat penting. Hal ini memungkinkan

substitusi spesies dapat terdeteksi, membantu manajemen perikanan jangka panjang yang berkelanjutan, dan meningkatkan riset ekosistem dan konservasi. Sampai sekarang, metode berbasis DNA dan protein digunakan untuk mengidentifikasi spesies ikan (Ward, et al., 2005).

Salah satu gen pada DNA mitokondria yang digunakan sebagai alat identifikasi yaitu gen *Cytochrome c oxidase I* (COI). *Cytochrome* sendiri merupakan suatu protein yang mengandung struktur hem berbeda dari hemoprotein pengikat oksigen seperti hemoglobin dan lain-lain. Ion besi pada *cytochrome* berada pada keadaan yang bergantian antara teroksidasi (Fe^{3+}) dan tereduksi (Fe^{2+}) dalam rantai transpor elektron pada proses fosforilasi oksidatif di mitokondria. Berdasarkan struktur hem yang diikat, *cytochrome* dibagi atas *cytochrome a*, *b*, dan *c* (Kadri, 2012). Gen COI yang terkandung pada DNA mitokondria memiliki 2 keunggulan yang penting yaitu primer universal untuk gen ini mampu memperbarui ujung 5' pada kebanyakan filum hewan. Selanjutnya, gen COI tampaknya mengontrol sinyal filogenetik lebih besar dibandingkan gen mitokondria lainnya (Hebert, et al., 2003).

Selain *Cytochrome c*, *Cytochrome b* juga seringkali digunakan sebagai penanda molekuler. Hanya saja *Cytochrome c* dianggap lebih efektif, khususnya pada studi filogenetik, karena perubahan urutan asam aminonya berlangsung lebih lambat (Hebert, et al., 2003). Meskipun fragmen COI jarang mengalami substitusi asam amino, akan tetapi perubahan berupa *silent mutation* (perubahan asam amino yang tidak merubah fungsinya) seringkali terjadi. Hal ini membuat COI dianggap efektif untuk merekonstruksi filogenetik dalam bidang evolusi bahkan di bawah tingkat spesies (Rahayuwati, 2009).

Spesies dari berbagai kelompok hewan dapat dibedakan dan diidentifikasi dengan baik menggunakan fragmen *Cytochrome c oxidase I* sepanjang 650 bp (Ball, et al., 2005). Sumber DNA berupa sampel beku atau awetan dengan alkohol berupa otot, hati, darah, atau sirip (Hubert, et al., 2008).

Kemampuan gen COI pada DNA mitokondria dalam mengidentifikasi telah terbukti pada identifikasi 22 postlarva ikan famili Gobiidae (Devi, 2012), ikan air tawar Kanada (Hubert, dkk., 2008), struktur populasi dan riwayat demografi *Sicyopterus japonicus* (Ju, et al., 2013), dan identifikasi *Mugilogobius hitam* di Danau Towuti (Larson, et al., 2014).

G. Tinjauan Umum Identifikasi Molekular Menggunakan Gen COI Mitokondria

Ekstraksi atau isolasi DNA merupakan upaya memperoleh DNA murni dengan memisahkannya dari komponen sel lainnya. Isolasi DNA dapat dilakukan dengan cara mekanik dan kimiawi. Secara mekanik, ekstraksi dilakukan dengan cara menggerus atau memblender sampel. Sedangkan secara kimiawi, ekstraksi menggunakan bahan-bahan kimia yang dapat merusak sel dan mengendapkan DNA (Langga, dkk., 2012).

PCR (*Polymerase Chain Reaction*) merupakan teknik amplifikasi sekuen DNA menjadi ribuan sampai jutaan salinan sekuen DNA (Hewajuli dan Dharmayanti, 2014). Teknik ini untuk pertama kalinya ditemukan oleh Kary Mullis pada tahun 1987 (Utami, dkk., 2013). Teknik ini menggunakan primer sebagai pembatas fragmen DNA target yang akan diamplifikasi dan enzim polimerase untuk menggabungkan DNA cetakan tunggal membentuk untain molekul DNA panjang. Prinsip dasar PCR adalah sekuen DNA spesifik diamplifikasi secara eksponensial menjadi dua, empat, dan seterusnya (Hewajuli dan Dharmayanti, 2014).

Siklus PCR terdiri atas tiga tahapan yang berulang yaitu denaturasi, *annealing* (penempelan) primer, dan ekstensi. Siklus tersebut dapat berlangsung 30-40 siklus yang menghasilkan berjuta-juta salinan DNA. Komponen utama dalam proses PCR yaitu *template* DNA, *primer*, dNTPs, *Taq* DNA polimerase, MgCl₂, dan larutan *buffer* (Fitriatin dan Manan, 2015).

Denaturasi merupakan tahap awal PCR dimana untai ganda DNA *template* dipisahkan satu sama lain menjadi untai tunggal (Utami, dkk., 2013). Suhu denaturasi DNA *template* berkisar antara 93-95°C, tergantung pada panjang DNA *template* dan DNA target. Suhu denaturasi yang terlalu tinggi dapat menyebabkan penurunan aktifitas DNA polimerase, sedangkan suhu denaturasi yang terlalu rendah akan menyebabkan proses denaturasi DNA *template* tidak sempurna (Handoyo dan Rudiretna, 2001).

Annealing merupakan tahap lanjutan setelah denaturasi dimana untai tunggal DNA *template* masing-masing akan ditempel oleh primer, yaitu primer *forward* dan *reverse* (Utami, dkk., 2013). Suhu *annealing* adalah suhu yang dibutuhkan agar primer menempel pada *template* DNA, suhu ini ditentukan berdasarkan *melting temperature* (T_m) masing-masing primer. Suhu *annealing* yang optimal pada proses PCR menentukan spesifitas dan sensitivitas produk PCR. Suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan produk PCR tidak terbentuk karena penempelan primer pada template DNA lepas kembali. Sebaliknya, jika suhu terlalu rendah maka penempelan primer pada template DNA tidak spesifik sehingga dapat menghasilkan produk PCR non spesifik (Asy'ari dan Noer, 2005).

Ekstensi merupakan proses pemanjangan atau polimerisasi primer mulai dari tempat penempelannya hingga ujung 5' DNA *template* (Utami, dkk., 2013). Suhu ekstensi yang selalu digunakan dalam proses PCR adalah 72°C. Suhu ini merupakan

suhu optimum DNA polimerase yang digunakan untuk proses PCR (Handoyo dan Rudiretna, 2001). DNA polimerase merupakan enzim yang mengkatalisis penggabungan cetakan DNA tunggal menjadi untaian panjang. Untuk menjamin proses ekstensi berlangsung dengan optimal, DNA polimerase harus tahan panas, memiliki laju polimerisasi dan prosesivitas yang tinggi. Prosesivitas DNA polimerase adalah kemampuan DNA polimerase mengkatalisis penggabungan nukleotida dengan *primer* secara terus menerus tanpa terlepas dari kompleks *primer-DNA template* (Hewajuli dan Dharmayanti, 2014).


DNA hasil amplifikasi belum dapat dilihat hasilnya secara langsung. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis elektroforesis. Elektroforesis merupakan teknik pemisahan dan pemurnian fragmen DNA, RNA, atau protein. Biasanya elektroforesis DNA digunakan dalam pemisahan DNA berdasarkan ukurannya. Prinsip kerjanya yaitu pemisahan molekul berdasarkan muatan listrik intrinsik (Langga, dkk., 2012). Pada prosesnya, akan tampak DNA yang bermuatan negatif perlahan berpindah menuju ke kutub positif dalam medan listrik. Perpindahan tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi *buffer*, suhu, durasi waktu, konsentrasi gel, dan ukuran molekul (Fitriatin dan Manan, 2015). Migrasi molekul yang berukuran kecil akan berlangsung lebih cepat, sebab molekul tersebut dapat dengan mudah melintasi poripori yang ada pada matriks gel (Nugraha, dkk., 2014).

Setelah proses elektroforesis selesai, tahap selanjutnya adalah visualisasi fragmen DNA dengan paparan sinar UV (Nugraha, dkk., 2014). Fragmen DNA akan tampak berupa garis ketika terpapar sinar UV, hal ini terjadi karena sinar UV dipendarkan oleh etidium bromida yang menyisip ke dalam DNA (Yuwono, 2005). Untuk mengetahui ukuran fragmen DNA, laju migrasi fragmen DNA sampel

dibandingkan dengan laju migrasi DNA *marker* yang telah diketahui ukurannya (Nugraha, dkk., 2014).

Tahap terakhir adalah sekuensing, sekuensing merupakan teknik untuk menentukan urutan nukleotida yang ada pada molekul DNA. Hasil sekuensing berupa urutan basa nukleotida yang selanjutnya diolah menggunakan beberapa *software* pengolah data sekuen (Roslim, dkk., 2016).

H. Kerangka Pikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan model eksploratif untuk mengetahui spesies spesifik ikan Gobi (Famili Gobiidae) di Sungai Karama berdasarkan gen COI mitokondria.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada 27 Oktober – 07 November 2017 di Laboratorium Genetika dan Pemuliaan, Fakultas Biologi, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahap identifikasi molekuler dan pada April – Mei 2018 di Laboratorium Genetika, Jurusan Biologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahap analisis data.

C. Populasi dan Sampel

Pada penelitian ini, ikan Gobi (Famili Gobiidae) merupakan populasi. Sedangkan sampelnya adalah fillet daging bagian bawah sirip pektoralis sebelah kanan ikan Gobi dewasa (Famili Gobiidae).

D. Variabel Penelitian

Penelitian ini memiliki variabel tunggal. Identifikasi ikan air tawar (Famili Gobiidae) di Sungai Karama Mamuju berdasarkan metode COI Mitokondria merupakan variabel dalam penelitian ini.

E. Defenisi Operasional Variabel

Adapun defenisi operasional variabelnya yaitu identifikasi molekular melalui gen COI DNA mitokondria merupakan upaya penetapan identitas ikan Gobi yang terdapat di Sungai Karama dan lazim disebut dengan nama ikan Penja berbasis gen COI DNA mitokondria.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan percobaan laboratorium dan analisis data.

G. Alat dan Bahan

1. Alat

Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah inkubator, spatula, *freezer -20°C*, *cutter*, neraca analitik, *vortex*, spin down e-centrifuge Wealtec, mikropipet, tabung eppendorf/tabung sentrifuge (*tube*), sentrifuge, *spin column*, *collection tube*, rak tip, spidol marker, mesin PCR (*Polymerase Chain Reaction*) BioRad T100 *Thermal Cycler*, tube PCR, *Profuge Gk-Centrifuge*, labu erlenmeyer, microwave LG, gunting, pinset, *scalpel*, bunsen, *beaker glass*, gelas ukur, satu set alat elektroforesis, *power supply*, UV iluminator, kamera, dan komputer.

2. Bahan

Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah ikan Gobi (Famili: Gobiidae) asal Sungai Karama, air, tip, aquades, sarung tangan, alkohol 96 %, *tissue*, satu set *The Dneasy Blood and Tissue Kit* (Qiagen), proteinase K, ATL *buffer*, *absolute ethanol*, AL *buffer*, AW-1 *buffer*, AW-2 *wash buffer*, AE *elution buffer*, My

Taq Red Mix PCR (Bioline), primer COI-mitokondria, marker Easy Ladder I *range* 2000-100 bp, agarosa, TBE *buffer*, Florosafe DNA stain, ddH₂O.

H. Prosedur Kerja

1. Pengambilan sampel

Sampel ikan Gobi diambil pada titik koordinat 02° 23' 686" S dan 199° 18' 238" E di Sungai Karama, Dusun Arassi, Desa Kalonding, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Sampel yang diperoleh selanjutnya ditambahkan bahan preservasi berupa ethanol absolut 95%.

2. Ekstraksi DNA

DNA ikan diekstraksi dilakukan dengan mengacu pada pedoman intruksi manual menggunakan *The Dneasy Blood and Tissue Kit* (Qiagen) yang terdiri atas 4 tahap yaitu *lyse*, *bind*, *wash*, dan *elute*. Bagian tubuh sebelah kanan difillet sebesar biji beras dan dikeringkan dari bahan preservasi dengan tissu. Fillet sampel dimasukkan ke dalam tube 1,5 ml dan ditambahkan 150 μ l buffer ATL. Sampel dalam tube digunting menggunakan gunting steril hingga halus dan cairan berwarna keruh. Ditambahkan 20 μ l Proteinase-K dan divortex, kemudian diinkubasi pada suhu 50°C selama semalam, tube dibolak-balik tiap 30 menit sekitar 3-4 kali. Selanjutnya sampel divortex dan disentrifuge (*pulse*), ditambahkan 200 μ l AL buffer dan 200 μ l ethanol absolut dari *freezer*, sampel divortex dan disentrifuge (*pulse*). Setelah itu sampel dipipet untuk dipindahkan ke Dneasy *mini spin column* dalam tube koleksi. Selanjutnya disentrifuge 8000 rpm 1 menit, supernatan pada tube koleksi dibuang dan tube koleksi diganti yang baru. Ditambahkan 500 μ l AW-1 dan disentrifuge 8000 rpm 1 menit. Supernatan pada tube koleksi dibuang dan *column* ditempatkan di tube koleksi lagi. Ditambahkan 500 μ l AW-2 dan disentrifuge 13.000

rpm 3 menit. Supernatan pada tube koleksi dibuang dan *column* ditempatkan di tube 1,5 ml. Diinkubasi dalam inkubator pada suhu 50°C selama 2 menit dengan tutup tube terbuka. Selanjutnya ditambahkan 250 μ l AE dan diinkubasi pada suhu ruang selama 2 menit dengan tutup tube terbuka. Disentrifuge 8000 rpm 1 menit dan menyimpan hasil ekstraksi DNA di *freezer* pada suhu -4°C untuk digunakan sebagai *template* PCR (Dneasy Blood and Tissue, 2006).

3. Amplifikasi

Proses amplifikasi DNA dilakukan melalui metode PCR. Secara umum proses PCR terdiri atas 3 tahap yaitu *denaturation* (penguraian untai ganda), *annealing* (penempelan primer pada template DNA), dan *extension* (pemanjangan untai DNA). Selain 3 tahapan tersebut, proses PCR dilengkapi dengan *predenaturation* selama 1 menit, *final extension* selama 5 menit, dan *hold*.

Adapun volume total campuran untuk PCR 25 μ l rinciannya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1. Komposisi PCR mix (*My Taq Red Mix* Bioline)

No	Reaksi	Konsentrasi Per-Reaksi	Volume yang Ditambahkan (μ l)
1.	PCR kit <i>My Taq Red Mix</i> (Bioline)	-	12,5
2.	MgCl ₂	1 μ M	1
3.	Primer Forward	0,6 μ M	1,5
4.	Primer Reverse	0,6 μ M	1,5
5.	ddH ₂ O	-	5,5
6.	DNA <i>template</i>	-	3

Tahapan, proses, waktu, suhu, dan jumlah siklus PCR disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2. Deskripsi prosedur pelaksanaan amplifikasi (Arisuryanty, 2016 dengan modifikasi)

Tahapan	Proses	Suhu	Waktu
I (1 siklus)	Pre-denaturasi	95°C	1 menit
II (35 siklus)	Denaturasi	95°C	15 detik
	Penempelan (<i>annealing</i>)	50°C	30 detik
	Pemanjangan (<i>extension</i>)	72°C	30 detik
III (1 siklus)	<i>Final extension</i>	72°C	5 menit
	<i>Hold</i>	4°C	4 menit

Adapun primer yang digunakan adalah F2 dan R2 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3. Primer yang digunakan pada amplifikasi ikan Gobi (Ward, et al., 2005)

Primer	Sekuen Nukleotida
F2	(5'-TCGACTAACATAAGATATCGGCAC-3')
R2	(5'-ACTTCAGGGTGACCGAAGAACATCAGAA-3')

4. Elektroforesis

Agar yang digunakan adalah gel agarosa 1%. Gel agarose dibuat dengan cara menimbang sebanyak 1 gr agarose bubuk dan dilarutkan dengan 100 ml 1×TBE (10 ml 10×TBE dan 90 ml ddH₂O). Kemudian dipanaskan di *microwave* sampai larutan tersebut berwarna bening, kemudian ditambahkan Florosafe DNA stain 5 µl dan dihomogenkan. Kemudian dituang ke dalam cetakan agar dan dibentuk sumur gel dengan menggunakan sisir gel. Gel didiamkan selama 15 menit hingga membeku dan sisir diambil dengan hati-hati. Gel kemudian ditempatkan pada alat/tangki *elektroforesis* yang berisi larutan TBE dengan posisi sumur berada pada kutub negatif.

Marker dipipet sebanyak 2 µl ke dalam sumuran sebagai standar ukuran hasil amplifikasi. Selanjutnya produk PCR sebanyak 2 µl dipipet ke dalam sumuran pula.

Tangki elektroforesis ditutup dan elektroda dihubungkan ke *power supply*. Proses elektroforesis berlangsung selama 25 menit dengan tegangan 100 volt. Elektroforesis dimatikan dan gel dipindahkan ke UV iluminator dan diamati hasilnya di komputer.

5. Sekuensing

Produk PCR dimasukkan ke dalam 5 tube PCR baru dengan volume masing-masing tube 40 μl . Primer forward dan reverse dimasukkan ke dalam tube PCR terpisah dengan volume disesuaikan dengan volume sampel (5 μl /sampel). Tube yang berisi produk PCR dan primer dikemas kemudian dikirim ke PT. Genetika Science Indonesia yang kemudian akan dikirim ke *1st BASE sequencing INT* di Malaysia untuk proses sekuensing.

I. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Hasil sekuensing berupa file AB1 dianalisis menggunakan serangkaian software pengolah data sekuen. Dua macam file AB1 yang terdiri atas *forward* dan *reverse* masing-masing sampel dilakukan edit sekuen pada DNASTar. Sebelum dilakukan analisis lebih lanjut, masing-masing fasta sampel di analisis BLAST di NCBI (online) (Madden, 2013). Fasta sekuen selanjutnya diubah ekstensinya di Mesquite 3.31 (offline) dari .txt menjadi .fasta (Maddison dan Maddison, 2017). Kemudian, dilakukan Alignment menggunakan ClustalW pada software MEGA6 (offline) dan data diekspor ke dalam format MEGA (Tamura, et al., 2013). Data tersebut selanjutnya dianalisis di software DnaSP (offline) untuk mengetahui variasi genetiknya meliputi jumlah *haplotype*, *variable/polymorphic site*, *haplotype diversity*, dan *nucleotide diversity* (Librado dan Rozas, 2009). Khusus untuk *polymorphic/variable sites data file* dan *haplotype* dilakukan interpretasi data pada software NoteTab Light (offline) (NoteTab, 2017). Untuk mengonfirmasi data

variable/polymorphic site, dilakukan alignment menggunakan Clustal Omega pada *European Bioinformatics Institute (EBI)* (online) (EBI, 2018).




BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil hasil elektroforesis gen COI DNA mitokondria pada ikan Gobi

Identifikasi ini dilakukan terhadap 3 ekor sampel ikan Gobi dengan target gen COI DNA mitokondria menggunakan primer F2 dan R2 (Ward, et al., 2005). Berikut hasil amplifikasi yang divisualisasikan melalui gel elektroforesis:



Gambar 4.1. Hasil amplifikasi sampel ikan Gobi G, H, dan I menggunakan primer F2 dan R2. Keterangan gambar; M: marker, g: gobi 1, h: gobi 2, i: gobi 3.

Berdasarkan hasil elektroforesis, diketahui panjang fragmen DNA dari sampel g, h, dan i berkisar antara 500 bp sampai 1000 bp. Merujuk pada primer yang digunakan yaitu F2 dan R2, ukuran fragmen DNA ketiga sampel tersebut diperkirakan sepanjang 655 bp (Ward, et al., 2005).

2. Sekuen gen COI DNA mitokondria sampel ikan Gobi

a. Gobi g

TGTTCGACTAAATCAAAAGATACTGGCACCCCTACCTTGTTCGGTGCCTGA
GCAGGAATAGTAGGGACTGCCCTCAGCCTACTCATCCGAGCTGAATTAAAGTCAA
CCTGGAGCTCTCTAGGGGACGACCAAATTACAATGTAATTGTTACTGCACAT
GCCTTGTAAATAATTCTTATAGTAATACCAATCATGATTGGAGGCTTGGG
AACTGACTTATTCCCCTAATGATCGGTGCCCTGATATGGCCTTCCTCGAATA
AATAACATAAGCTTTGACTTCTCCCCCTCATCCTCTCCTCAGCATCT
TCTGGTGTGAAGCAGGGCCGGAAGTGGCTGAACAGTATATCCTCCTCTGGCA
GGAAACCTTGACATGCAGGAGCTGTGACTTAATCTCCCTCCAC
CTGGCAGGTATTCATCGATTCTGGGCAATTAAATTCTACCAACCACCTA
AACATGAAACCCCTGCAATTTCACAATATCAAACACCTTATTTGTATGAGCT
GTTCTATTACAGCAGTCCTCCTACTTCTCTCCCTGTCCTTGAGCTGGC
ATTACAATGCTACTAACAGACGAAACCTAACACAACCTTGTGACCCATCA
GGAGGAGGTGACCCAATTCTACCAACATCTATTCTGATTCTCGTCCCCCT
GAAGTAA

b. Gobi h

TCGACTAATTCAAAAGATACTGGCACCCCTACCTTGTTCGGTGCCTGAGCA
GGAATAGTAGGGACTGCCCTCAGCCTACTCATCCGAGCTGAATTAAAGTCACCT
GGAGCTCTCTAGGGGACGACCAAATTACAATGTAATTGTTACCGCACATGCC
TTTGTAAATAATTCTTATAGTAATACCAATCATGATTGGAGGCTTGGGAAAC
TGACTTATTCCCCTAATGATCGGTGCCCTGATATGGCCTTCCTCGAATAAAAT
AACATAAGCTTTGACTTCTCCCCCTCATCCTCTCCTCAGCATCTTCT
GGTGTGAAGCAGGGCCGGAAGTGGCTGAACAGTATATCCTCCTCTGGCAGGA
AACCTGCACATGCAGGAGCTCTGTTGACTTAATCTCCCTCCACCTG
GCAGGTATTCATCAATTCTGGGCAATTAAATTCTACCAACCACCTAAAC
ATGAAACCCCTGCAATTCAAAATCAAACACCTTATTTGTATGAGCTGTT
CTTATTACAGCAGTCCTCCTACTTCTCTCTCCCTGTCCTTGAGCTGGCATT
ACAATGCTACTAACAGACGAAACCTAACACAACCTTGTGACCCATCAGGA
GGAGGTGACCCAATTCTACCAACATCTATTCTGATTCTCGTACCCCTGAA
ATTAA

Sekuen gen COI DNA mitokondria tersebut selanjutnya dianalisis pada program *Basic Local Alignment Search Tool* (BLAST) di NCBI. Berikut hasil analisis BLAST kedua sekuen sampel:

Tabel 4.1 Hasil analisis BLAST sampel ikan Gobi g dan h

Kode sampel	Spesies	Max score	Total score	Query cover	E value	Ident	Accession
Gobi g	<i>Sicyopterus pugnans</i>	1240	1240	97%	0.0	99%	KJ202204
Gobi h	<i>Sicyopterus pugnans</i>	1229	1229	95%	0.0	99%	KJ202204

3. Variasi genetik

Berikut data variasi genetik sampel ikan Gobi g dan h yang dikonfirmasi sebagai spesies *Sicyopterus pugnans*:

Tabel 4.2. Data variasi genetik sampel ikan Gobi g dan h

Species	Number of sites	N	Hn	Variable sites	Hd	π
<i>Sicyopterus pugnans</i>	706 bp	2	2	7	1,000±0,500	0,00992±0,00496

Keterangan:

N = jumlah sekuen sampel (*number of sequence*)

Hn = jumlah haplotipe (*number of haplotype*)

Hd = keragaman haplotipe (*haplotype diversity*)

π = keragaman nukleotida (*nucleotide diversity*)

Menurut Akbar (2014), keragaman haplotipe (Hd) dapat diukur dengan mengacu pada indikator berikut:

Tabel 4.3. Indikator kategori keragaman haplotipe (Hd)

Nilai Hd	Kategori	Sumber
0,1 – 0,4	Rendah	Nei, 1987
0,5 – 0,7	Sedang	
0,8 – 1,00	Tinggi	

B. Pembahasan

Penelitian ini dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi ekstraksi, amplifikasi, elektroforesis, sekuensing, dan analisis data.

Ekstraksi merupakan proses perusakan sel untuk mengeluarkan DNA murni sampel (Utami, dkk., 2013). Ekstraksi dilakukan pada fillet daging ikan Gobi yang terletak di bawah sirip pektoralis sebelah kanan. Pemilihan lokasi fillet ini didasarkan pada kebutuhan dokumentasi spesimen dalam bentuk foto pada sebelah kiri tubuh ikan dengan posisi lateral (Weigt, et al., 2012).

Ekstraksi ikan Gobi menggunakan *Dneasy Blood and Tissue Kit* (Qiagen) yang merupakan rekomendasi kit ekstraksi untuk prosedur DNA *Barcode* dan identifikasi molekular hewan (Knebelsberger dan Stoger, 2012). Ekstraksi terdiri atas tahap *lyse*, *bind*, *wash*, dan *elute*. Pada tahap *lyse*, sampel ditambahkan *buffer ATL*, digunting hingga cairan keruh, ditambahkan Proteinase-K dan diinkubasi 12 jam pada suhu 50°C. *Buffer ATL* berperan sebagai *buffer lysis* yang berfungsi melisiskan sel secara kimiawi. Adapun penggantian sampel dilakukan untuk membantu proses pelisisan atau pemecahan sel. Sedangkan Proteinase-K berfungsi untuk merusak protein sel sehingga memudahkan proses ekstraksi DNA.

Tahap *bind*, sampel ditambahkan *buffer AL* dan ethanol absolut. *Buffer AL* berfungsi untuk memisahkan DNA dari komponen sel lainnya, sedangkan ethanol absolut berfungsi pada presipitasi DNA sampel. Mulyani dkk. (2011) menyebutkan bahwa ethanol efektif mengendapkan DNA, karena asam nukleat DNA sukar larut dalam ethanol sedangkan pengotor berupa komponen sel lainnya mudah larut. Pada tahap *wash*, DNA sampel dibersihkan dari kotoran sisa pelisisan sel menggunakan *buffer AW-1* dan *buffer AW-2*. Selanjutnya tahap *elution* merupakan tahap purifikasi

DNA sebelum akhirnya berlanjut ke tahap berikutnya. Pada tahap ini, sampel ditambahkan *buffer AE* dan disimpan di *freezer* pada suhu -4°C.

Pada proses ekstraksi, sentrifugasi dilakukan sebanyak 6 kali yang terdiri atas 2 kali *pulse*, 3 kali dengan kecepatan 8000 rpm selama 1 menit dan 1 kali dengan kecepatan 13.000 rpm selama 3 menit. Prinsip kerja sentrifugasi yaitu menyortir substansi berdasarkan berat jenis. Sentrifugasi yang dilakukan berulang ini bertujuan untuk memperoleh DNA murni yang bebas dari protein, RNA, dan kotoran sel lainnya akibat pelisisan sel (Utami, dkk, 2013).

DNA yang diperoleh melalui proses ekstraksi selanjutnya diamplifikasi menggunakan *Polymerase Chain Reaction* (PCR) sebanyak 35 siklus. Komponen penting yang digunakan pada proses PCR yaitu PCR kit *MyTaq Red Mix* (Bioline), MgCl₂ yang berperan sebagai kofaktor bagi DNA polimerase dalam meningkatkan spesifitas penempelan primer terhadap DNA *template* (Handoyo dan Rudiretna, 2001), primer *forward* dan *reverse* yang berfungsi mengawali proses polimerisasi, DNA *template* yang berfungsi sebagai DNA cetakan bagi untai komplementer yang akan dibentuk, dan ddH₂O.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini tidak jauh berbeda dari metode identifikasi molekuler lainnya. Akan tetapi target DNA-nya lebih spesifik yaitu DNA mitokondria. Penggunaan DNA mitokondria sebagai penanda molekuler dalam identifikasi didasarkan pada beberapa keunggulan yang dimiliki yaitu pewarisan dalam bentuk haploid (Hebert, et al., 2003) dan maternal (Kamarudin, et al., 2011), tingkat mutasi tinggi (Hubert, et al., 2008) tetapi dalam bentuk *silent mutation* (Rahayuwati, 2009), memiliki sedikit intron (Hebert, et al., 2003), serta telah digunakan secara luas pada studi genetika populasi dan identifikasi spesies (Wibowo,

dkk., 2013). Identifikasi ini dilakukan dengan menggunakan primer F2 dan R2 (Ward, et al., 2005).

Identifikasi molekuler menggunakan DNA mitokondria telah digunakan secara luas. Ardura et al. (2010) menggunakan gen 12S rRNA dan gen COI DNA mitokondria untuk mengidentifikasi 29 spesies ikan komersial Amazon. Lakra et al. (2011) melakukan identifikasi terhadap 115 spesies dari 37 famili yang berasal dari Pantai timur dan barat India melalui gen COI mitokondria menggunakan primer F1 dan R1 (Ward, et al., 2005) dan merepresentasikan 79 genus, 37 famili dan 7 ordo dari 115 spesies tersebut. Selanjutnya, Knebelsberger et al. (2014) menggunakan primer F1 dan R1 (Ward, et al., 2005) untuk membuat pustaka DNA *barcode* berdasarkan gen COI mitokondria terhadap 93 spesies ikan Atlantik Utara yang berasal dari Laut Utara.

Untuk menguji keberhasilan amplifikasi, dilakukan elektroforesis menggunakan 1% gel agarose dengan 100 volt. Setelah 25 menit, *running* elektroforesis dihentikan. Gel selanjutnya divisualisasi dan didokumentasikan pada *UV iluminator* yang dilengkapi kamera dan sinar UV.

Komponen penting yang digunakan dalam proses elektroforesis yaitu gel agarose yang berfungsi sebagai media *running* elektroforesis fragmen DNA sampel, akuades berfungsi sebagai pelarut gel agarose, Florosafe DNA *Stain* berperan membantu visualisasi fragmen DNA dengan cara menyisip ke dalam DNA (Yuwono, 2005). *Buffer* TBE terdiri atas tris borat dan EDTA, tris borat berfungsi menjaga kesetimbangan ion H⁺ dan OH⁻ yang dihasilkan oleh elektroda dan kesetimbangan pH, sedangkan EDTA berfungsi untuk menonaktifkan aktivitas enzim DNase yang dapat mendegradasi fragmen DNA (Atmaja, 2014).

Berdasarkan visualisasi gel pada *UV iluminator*, fragmen DNA ketiga sampel ikan Gobi terletak di antara 500 bp dan 1000 bp. Menurut (Ward, et al., 2005), primer F2 dan R2 dapat mengamplifikasi gen COI mitokondria 655 bp. Olehnya, hasil elektroforesis ikan Gobi sampel g, h dan i diperkirakan sepanjang 655 bp.

Setelah diketahui visualisasi sampel melalui elektroforesis, sampel hasil ekstraksi yang masih tersisa diamplifikasi kembali. Selanjutnya produk PCR dan primer (*forward* dan *reverse*) dikemas terpisah, kemudian dikirim ke PT. Genetika Science Indonesia dan diteruskan ke *1st BASE Sequencing INT* di Malaysia untuk proses *sequencing*.

Hasil *sequencing* ketiga sampel ikan Gobi g, h dan i yaitu sekuen sampel g 709, sekuen sampel h 707, dan sekuen sampel i hanya muncul sekuen *forward* pada analisis *contig* tanpa adanya sekuen *reverse* sehingga dinyatakan tidak berhasil di *sequencing*.

Selanjutnya, susunan basa nukleotida yang merupakan hasil dari proses *sequencing* dianalisis penyejajaran pada *Basic Local Alignment Search Tools* (BLAST) di NCBI dengan tujuan membandingkan sekuen DNA yang diperoleh dengan sekuen DNA yang telah terdaftar pada *Gene Bank*.

Hasil analisis BLAST menunjukkan *Sicyopterus pugnans* BTN18 *cytochrome oxidase subunit 1* (COI) gene, partial cds;mitochondrial dengan accession number KJ202204 memiliki skor 1240 terhadap sampel g dan skor 1229 terhadap sampel h. Kedua skor tersebut merupakan skor tertinggi hasil analisis BLAST masing-masing sampel. *Max score* dan *total score* menunjukkan ukuran tingkat kesamaan sekuen sampel dengan database (Nugraha, dkk., 2014). *Max score* merupakan skor *alignment* tertinggi tiap segmen yang sejajar antara sekuen sampel dan sekuen *database*. Sedangkan *total score* merupakan jumlah skor *alignment* dari semua

segmen yang sejajar antara sekuen sampel dan sekuen *database* (NCBI, 2018). Semakin tinggi skor yang diperoleh, maka tingkat kemiripan antara sekuen sampel dan sekuen database semakin tinggi. Skor <50 dinyatakan tidak memiliki kemiripan sama sekali (Claverie dan Notredame, 2003). Selain itu, kemiripan antara sekuen sampel dan sekuen database juga dicirikan dengan kesamaan nilai *max score* dan *total score* (Narita, dkk., 2012). Sekuen hasil BLAST menunjukkan keterangan *partial cds (coding sequence)* karena gen target pada penelitian ini hanya gen COI DNA mitokondria yang sesuai pula dengan gen COI DNA mitokondria pada sekuen *Gene Bank*, bukan genom komplit DNA mitokondria.

Nilai *query cover* sampel g sebesar 97% dan sampel h 95%. Persentase tersebut menunjukkan kesesuaian panjang sekuen sampel dengan database spesies pada *Gene Bank*. Semakin tinggi nilai persentase *query cover* maka semakin tinggi pula tingkat homologinya (Nugraha, dkk., 2014). Adapun nilai E-value (*expectation value*) masing-masing sampel g dan h yaitu 0.0. Nilai tersebut menunjukkan spesies yang ada pada database homolog dengan sekuen sampel, karena semakin rendah nilai E-value maka semakin tinggi tingkat homologinya (Claverie dan Notredame, 2003). Terakhir, nilai *percentage of identity* masing-masing sampel g dan h adalah 99%. Tingginya nilai persentase tersebut mengindikasikan identiknya sekuen sampel dengan sekuen spesies pada database (Claverie dan Notredame, 2003).

Adapun klasifikasi dari *Sicyopterus pugnans* yaitu sebagai berikut:

Kingdom	: Animalia
Phylum	: Chordata
Class	: Osteichthyes
Order	: Perciformes
Sub ordo	: Gobioidei
Family	: Gobiidae
Sub family	: Sicydiinae
Genus	: Sicyopterus
Species	: <i>Sicyopterus pugnans</i> (Ogilvie-Grant, 1884)

Hasil analisis polimorfisme kedua sekuen DNA mitokondria sampel menunjukkan jumlah haplotype 2, nilai keragaman nukleotida (π) 0,00992, dan nilai keragaman haplotype (Hd) 1,000. Nilai Hd berada pada kisaran 0,8-1,00 dengan kategori tinggi. Haplotype sendiri merupakan kombinasi alel-alel yang diwariskan bersamaan sebagai suatu kelompok (Junitha dan Sudirga, 2007). Menurut Akbar (2014), tingginya nilai keragaman haplotype menunjukkan tingginya keragaman genetik. Hal ini dipengaruhi oleh populasi yang besar yang memungkinkan perkawinan antar individu (*interbreeding*) dan migrasi yang memungkinkan terjadinya aliran gen (*gene flow*). Terlebih lagi jika spesies terkait memiliki kemampuan migrasi yang tinggi dengan ukuran populasi yang besar.

Kedua sekuen sampel memiliki jumlah *variable/polymorphic site* sejumlah 7 bp yang terletak pada urutan basa nukleotida ke 9, 153, 447, 570, 694, 703, dan 705 (lampiran 7). Jumlah *polymorphic site* ini selanjutnya dikonfirmasi ulang dengan melakukan *alignment* pada Clustal Omega di EBI dengan jumlah yang sama, yaitu 7 bp. Tingginya jumlah *polymorphic site* yang muncul pada kedua sekuen

mengindikasikan tingkat keragaman genetik yang tinggi pula dan stabilnya suatu populasi. Seperti yang disebutkan oleh Leary et al. (1985) dalam Akbar (2014) bahwa keragaman genetik suatu populasi menentukan tingkat bertahan hidup, pertumbuhan, dan adaptasi.

Polimorfisme disebabkan oleh adanya mutasi dan rekombinasi seksual (Campbell, dkk., 2003). Mutasi yang seringkali terjadi adalah mutasi titik atau *single nucleotide polymorphism* (SNP). Mutasi titik ini mempengaruhi perubahan satu basa N pada urutan genom sehingga menyebabkan variasi dalam urutan DNA. Perubahan basa N tersebut mempengaruhi perubahan urutan asam amino pada protein dan dapat berdampak pada fenotip yang diekspresikan (Lusiastuti, dkk., 2015). Akan tetapi, mutasi yang terjadi pada fragmen gen COI seringkali berupa *silent mutation* (perubahan basa N pada gen yang tidak merubah fungsinya) (Rahayuwati, 2009). *Silent mutation* biasanya terjadi karena adanya substitusi basa N, baik transisi ataupun transversi.

Adapun rekombinasi seksual erat kaitannya dengan hukum pemilihan bebas Mendel, yang menyatakan bahwa setiap pasangan alel bersegregasi secara bebas terhadap pasangan alel-alel lain selama pembentukan gamet (Campbell, dkk., 2010). Pada reproduksi seksual, alel akan terbagi secara acak melalui pindah silang (*crossing over*) selama meiosis dan menentukan genotip individu baru. Sehingga zigot memiliki komposisi alel unik yang dihasilkan melalui fertilisasi acak sperma terhadap ovum (Campbell, dkk., 2003).

Sicyopterus merupakan genus paling beragam dalam subfamily Sicydiinae dengan tipe hidup *amphidromous* yang terdiri dari sekitar 25 -30 spesies (Watson, et al., 2000 dalam Keith, et al., 2005). Genus ini tersebar di area Indo-Pasifik dari Madagaskar dan Comoros hingga French Polynesia (Keith, et al., 2005). *S. pugnans*

diketahui memiliki area persebaran yang terbatas dan endemik di beberapa kelompok kepulauan yang terletak di kawasan garis Khatulistiwa (Keith, et al., 2002 dalam Keith, et al., 2005).

S. pugnans memiliki tipe hidup *amphidromous* dimana reproduksi berlangsung di sungai, perkembangan embrio berlangsung di air tawar, larva yang baru menetas menuju ke laut dan berkembang menjadi *post-larvae*. Selanjutnya, juvenil *post-larvae* berkelompok dan migrasi ke hulu sungai. *S. pugnans* dewasa menyukai habitat perairan dengan arus yang sedang hingga tinggi, kedalaman rendah, dan substrat batu serta kerikil. *S. pugnans* melekat pada substrat batuan dan kerikil menggunakan sirip penghisap pada bagian ventral tubuh. *S. pugnans* bertahan hidup dengan memakan diatom yang melekat pada permukaan batuan (Keith, dkk., 2015).

Selain ditemukan di Sungai Karama Kabupaten Mamuju, *S. pugnans* juga ditemukan di French Polynesia (Taillebois, et al., 2014) dan perairan Pulau Verde Filipina (Thomas Jr., et al., 2013). Berdasarkan lokasi temuannya, diperkirakan daerah persebaran *S. pugnans* berada pada perairan Pasifik hingga area Indo-Malay Philippines Archipelago (IMPA).

Berdasarkan hasil penelitian ini, temuan *S. pugnans* di Sungai Karama Kabupaten Mamuju perlu menjadi perhatian khusus mengingat persebaran *S. pugnans* yang terbatas. Hal ini berpotensi membuat *S. pugnans* menjadi spesies endemik Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat, terlebih lagi spesies ini belum pernah ditemukan di daerah lain di Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu dari 3 sampel ikan Gobi g, h dan i, 2 sampel diantaranya (Gobi g dan Gobi h) teridentifikasi sebagai spesies *Sicyopterus pugnans* dengan jumlah *haplotype* 2, *polymorphic site* 7 bp, *haplotype diversity* 1,000, dan *nucleotide diversity* 0,00992. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa *Sicyopterus pugnans* yang ditemukan di Sungai Karama Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat memiliki keragaman genetik yang tinggi.

B. *Implikasi Penelitian (Saran)*

Adapun saran terkait penemuan spesies *S. pugnans*, Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju diharapkan dapat membuat regulasi terhadap penangkapan ikan, sebab *S. pugnans* merupakan salah satu spesies endemik Indo-Malay-Philippines Archipelago dalam subfamily Sicydiinae. Selanjutnya saran untuk penelitian selanjutnya adalah penggunaan sampel yang lebih beragam untuk proses identifikasi dan analisis yang dilakukan menyeluruh sehingga data yang dihasilkan akurat, representatif dan informatif.

KEPUSTAKAAN

- Al-Qur'anul karim.* Bandung: Cordoba, 2015.
- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5.* Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2003.
- Akbar, N. "Keragaman Genetik, Struktur Populasi dan Filogenetik Ikan Tuna Sirip Kuning (*Thunnus albacares*) di Perairan Maluku Utara dan Ambon, Indonesia". *Tesis.* Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, 2014.
- Al-Maragi, A.M. *Terjemah Tafsir Al-Maragi Juz: 22, 23 dan 24.* Semarang: CV. Toha Putra, 1992.
- Ardura, A., Linde, A.R. Moreira, J.C., Garcia-Vazquez, E. "DNA Barcoding for Conservation and Management of Amazonian Commercial Fish". *Biological Conservation* 143 (2010): 1438-1443.
- Arisuryanty, T. "Molecular Genetic and Taxonomic Studies of the Swamp Eel (*Monopterus albus* Zuiew 1793)". *Disertasi.* Northern Territory Australia: Charles Darwin University, 2016.
- Ash-Shiddieqy, T.M.H. *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur 4 (Surat 24-41).* Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Asy'ari, M. dan Noer, A.S. "Optimasi Konsentrasi MgCl₂ dan Suhu Annealing Pada Proses Amplifikasi *Multifragments* DNA mitokondria dengan Metoda PCR". *JKSA* 8 No. 1 (April 2005): 24-28.
- Atmaja, F.D. "Amplifikasi Internal Transcribed Spacer dan β-Tubulin pada Tanaman *Jacobaea* sp. (Asteraceae) Setelah perlakuan Fungisida Sistemik". Skripsi. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mamuju. *Kecamatan Sampaga dalam Angka.* Mamuju: BPS Kabupaten Mamuju, 2017.
- . *Statistik Daerah Kabupaten Mamuju.* Mamuju: BPS Kabupaten Mamuju, 2017.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Barat. *Situs Resmi BPS Sulawesi Barat.* <https://sulbar.bps.go.id> (24 April 2018).
- Ball, S.L., Hebert, P.D.N. Burian, S.K., Webb, J.M. "Biological Identifications of Mayflies (Ephemeroptera) Using DNA Barcodes". *Journal of The North American Benthological Society* 24 No. 3 (2005): 508-524.
- Brown, T.A., Cecconi, C., Tkachuk, A.N., Bustamante, C., Clayton, D.A. "Replication of Mitochondrial DNA Occurs by Strand Displacement with Alternative Light-Strand Origins, not Via a Strand-Coupled Mechanism". *Genes Dev.* 19 (2005): 2466-2476.
- Budiman, A., Arief, A.J., Tjakrawidjaya, A.H. "Peran Museum Zoologi Dalam Penelitian dan Konservasi Keanekaragaman Hayati". *Jurnal Iktiologi Indonesia* 2 No. 2 (2002): 51-55.

- Campbell, N.A., Reece, J.B., Mitchell, L.G. *Biologi Edisi Kelima Jilid 2*. Jakarta: Erlangga, 2003.
- Campbell, N.A., Reece, J.B., Urry, L.A., Cain, M.L., Wasserman, S.A., Minorsky, P.V., Jackson, R.B. *Biologi Edisi Kedelapan Jilid 1*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- Chiang, T.Y., Chen, I.S., Chang, W.B., Ju, Y.M. "Complete Mitochondrial Genome of *Sicyopterus japonicus* (Perciformes, Gobiidae)". *Mitochondrial DNA* 24 No. 3 (2013): 191-193.
- Claverie, J.M. and Notredame, C. *Bioinformatics for Dummies*. Indianapolis (USA): Wiley Publishing, 2003.
- Devi, L.I. "Identifikasi Postlarva Famili Gobiidae dari Muara Sungai Kedurang, Bengkulu Melalui DNA Barcode". Skripsi. Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2012.
- European Bioinformatics Institute (EBI). *Website Resmi EBI*. <http://www.ebi.ac.uk> (14 April 2018).
- Fitriatin, E. dan Manan, A. "Pemeriksaan *Viral Nervous Necrosis* (VNN) Pada Ikan Dengan Metode *Polymerase Chain Reaction* (PCR)". *Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan* 7 No. 2 (November 2015): 149-152.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar Juzu' 13 dan Juzu' 14*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1965.
- Handoyo, D. dan Rudiretna, A. "Prinsip Umum dan Pelaksanaan PCR". *Unitas* 9 No. 1 (Februari 2001): 17-29.
- Hartwell, Hood, Goldberg, Reynolds, Silver. *GeneticsFrom Genes to Genomes Fourth Edition*. New York: Mc Graw Hill, 2011.
- Hebert, P.D.N., Cywinska, A., Ball, S.L., deWaard, J.R. "Biological Identifications Through DNA Barcodes". *Proceedings of The Royal Society of London* 270 (2003): 313-321.
- Hermiyanto, M.H., Mangga, A., Koesnama. "Lingkungan Pengendapan Batubara, Formasi Kalumpang di Daerah Mamuju". *JSDG* 20 No. 4 (Agustus 2010): 179-187.
- Hewajuli, D.A. dan Dharmayanti, N.L.P.I. "Perkembangan Teknologi *Reverse Transcriptase-Polymerase Chain Reaction* dalam Mengidentifikasi Genom *Avian Influenza* dan *Newcastle Diseases*". *WARTAZOA* 24 No. 1 (2014): 16-29.
- Hubert, N., Hanner, R., Holm, E., Mandrak, N.E., Taylor, E., Burridge, M., Watkinson, D., Dumont, P., Curry, A., Bentzen, P., Zhang, J., April, J., Bernatchez, L. "Identifying Canadian Freshwater Fish Through DNA Barcodes". *Plos One* 3 No. 6 (Juni 2008): 1-8.
- Hubert, N., Meyer, C.P., Bruggemann, H.J., Guerin, F., Komeno, R.J.L., Espiau, B., Causse, R., Williams, J.T., Planes, S., "Cryptic Diversity in Indo-Pacific Coral Reef Fishes Revealed by DNA Barcoding Provides New Support to the Centre-of-Overlap Hypothesis". *Plos One* 7 No. 3 (2012): 1-8.
- Irawan, B. *Genetika Molekuler*. Surabaya: Airlangga University Press, 2008.

- Ju, Y.M., Hsu, C.H., Fang, L.S., Lin, H.D., Wu, J.H., Han, C.C., Chen, I.S., Chiang, T.Y. "Population Structure and Demographic History of *Sicyopterus japonicus* (Perciformes; Gobiidae) in Taiwan Inferred from Mitochondrial Control Region Sequences". *Genetics and Molecular Research* 12 No. 3 (2013): 4046-4059.
- Junitha, I.K. dan Sudirga, S.K. "Variasi DNA Mikrosatelit Kromosom Y pada Masyarakat Bali Mula Terunyan". *HAYATI Journal of Biosciences* 14 No. 2 (2007): 59-64.
- Kadri, H. "Hemoprotein dalam Tubuh Manusia". *Jurnal Kesehatan Andalas* 1 No. 1 (2012): 22-30.
- Kamarudin, K.H., Rehan, A.M., Hashim, R., Usup, G., Ahmad, H.F., Anua, M.H. Idris, M.Y. "Molecular Phylogeny of *Holothuria* (*Mertensiothuria*) *leucospilota* (Brandt 1835) as Inferred from Cytochrome C Oxidase I Mitochondrial DNA Gene Sequences". *Sains Malaysiana* 40 No. 2 (2011): 125-133.
- Keith, P. "Les Gobiidae Amphidromes des Systemes Insulaires Indo-Pacifiques: Endemisme et Dispersion". Toulouse: Memoire d'Habilitation a Diriger des Recherches (HDR) ENSAT, 2002.
- Keith, P., Galewski, T., Cattaneo-Berrebi, G., Hoareau, T., Berrebi, P. "Ubiquity of *Sicyopterus lagocephalus* (Teleostei: Gobioidei) and Phylogeography of the Genus *Sicyopterus* in the Indo-Pacific Area Inferred from Mitochondrial Cytochrome b Gene". *Molecular Phylogenetics and Evolution* 37 (2005): 721-732.
- Keith, P., Lord, C., Maeda, K. *Indo-Pacific Sicydiinae Gobies: Biodiversity, Life Traits and Conservation*. Paris: Societe Francaise d'ichtyologie, 2015.
- Knebelsberger, T., Landi, M., Neumann, H., Kloppmann, M., Sell, A.F., Campbell, P.D. Laakmann S. Raupach MJ. Carvalho GR. Costa FO. "A Reliable DNA Barcode Reference Library for The Identification of The North European Shelf Fish Fauna". *Molecular Ecology Resources* (2014): 1-12.
- Knebelsberger, T. and Stoger, I. *DNA Barcodes Methods and Protocols: DNA Extraction, Preservation, and Amplification*. New York: Humana Press, 2012.
- Kottelat, M. and Whitten, T. *Freshwater Biodiversity in Asia With Special Reference to Fish*. Washington D.C.: The World Bank, 1996.
- Lakra, W.S., Verma, M.S., Goswami, M., Lal, K.K., Mohindra, V., Punia, P., Gopalakrishnan, A., Singh, K.V., Ward, R.D., Hebert, P. "DNA Barcoding Indian Marine Fish". *Molecular Ecology Resources* 11 (2011): 60-71.
- Langga, I.F., Restu, M., Kuswinanti, T. "Optimalisasi Suhu dan Lama Inkubasi Dalam Ekstraksi DNA Tanaman Bitti (*Vitex cofassus* Reinw) Serta Analisis Keragaman Genetik Dengan Teknik RAPD-PCR". *J. Sains dan Teknologi* 12 No. 3 (Desember 2012): 265-276.
- Larson, H.K., Geiger, M.F., Hadiaty, R.K., Herder, F. "*Mugilogobius hitam*, a New Species of Freshwater Goby (Teleostei: Gobioidei: Gobiidae) From Lake Towuti, Central Sulawesi, Indonesia". *Raffles Bulletin of Zoology* 62 (2014): 718-725.

- Leary, R.F., Allendorf, F.W., Knudsen, K.L. "Development Instability and High Meristic Counts in Interspecific Hybrid of Salmonid Fishes. *Evolution* 39 (1985): 1.318-1.326.
- Librado, P. dan Rozas, J. "DnaSP v5: A Software for Comprehensive Analysis of DNA Polymorphism Data". *Bioinformatics* 25 No. 11 (2009): 1451-1452.
- Lusiastuti, A.M., Seeger H., Sugiani, D., Mufidah, T., Novita, H. "Deteksi Polymorfisme dengan Substitusi Nukleotida Tunggal Pada *Srtptococcus galactiae* Isolat Lokal Indonesia". *Media Akuakultur* 10 No. 2 (2015): 91-95.
- Mackie, I.M., Pryde, S.E., Gonzales-Sotelo, C., Medina, I., Perez-Martin, R., Quinteiro, J., Rey-Mendez, M., Rehbein, H. "Challenges in the Identification of Species of Vanned Fish". *Trend and Food Science and Technology* 10 (1999): 9-14.
- Madden, T. *The NCBI Handbook (Internet)*. 2nd Edition: The BLAST Sequence Analysis Tool. Bethesda (MD): National Center for Biotechnology Information (US), 2013.
- Maddison, D.R. dan Maddison W.P. Mesquite: A Modular System for Evolutionary Analysis. Website Resmi Mesquite. <http://www.mesquiteproject.org/> (30 Oktober 2017).
- Mamangkey, J.J. "Biopopulasi Ikan Endemik Butini (*Glossogobius matanensis*) di Danau Towuti, Sulawesi Selatan". *Disertasi*. Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2010.
- Maulid, D.Y. dan Nurilmala, M. "DNA Barcoding Untuk Autentifikasi Produk Ikan Tenggiri (*Scomberomorus* sp.)". *Jurnal Akuatika* 6 No. 2 (September 2015): 154-160.
- Maulid, D.Y., Nurilmala, M., Nurjanah, Madduppa, H. "Karakteristik Molekuler Cytochrome B Untuk DNA Barcoding Ikan Tenggiri". *JPHPI* 19 No. 1 (2016): 9-16.
- Mitochondrial Genome Database of Fish (Mito Fish). Website Resmi Mito Fish. <http://mitofish.aori.u-tokyo.ac.jp> (01 Juni 2018).
- Mposhi, A., van der Wijst, M.G.P., Faber, K.N., Rots, M.G. "Regulation of Mitochondrial Gene Expression, the Epigenetic Enigma". *Frontiers in Bioscience* 22 (2017): 1099-1113.
- Mulyani, Y., Purwanto, A., Nurruhwati, I. "Perbandingan Beberapa Metode Isolasi DNA Untuk Deteksi Dini Koi Herpes Virus (KHV) Pada Ikan Mas (*Cyprinus carpio* L.)". *Jurnal Akuatika* (2011): 1-16.
- Narita, V., Arum, A.L., Isnaeni, S., Fawzya, N.Y. "Analisis Bioinformatika Berbasis WEB untuk Eksplorasi Enzim Kitosanase Berdasarkan Kemiripan Sekuens" *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Sains dan Teknologi* 1 No. 4 (2012): 197-203.
- National Center for Biotechnology Information (NCBI). Basic Local Alignment Search Tool (BLAST). Website Resmi NCBI. <https://blast.ncbi.nlm.nih.gov> (14 April 2018).
- NCBI News: New Database and View Options for Nucleotide BLAST Services. Website Resmi NCBI. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast/ne...>

<blast.ncbi.nlm.nih.gov/Web/Newsltr/V15N2/BLView.html> (13 Agustus 2018).

Nei, M. *Molecular Evolutionary Genetics*. New York: Columbia University Press, 1987.

Ngili, Y., Bolly, H.M.B., Ubayaan, R. "Analisis DNA Mitokondria Manusia Melalui Karakterisasi Heteroplasmi Pada Daerah Pengontrol Gen". Prosiding yang disajikan pada InSINas, 29-30 November 2012.

NoteTab. NoteTab – Gets More Done in Less Time. *Website Resmi NoteTab*. <https://www.notetab.com/> (30 April 2017).

Nugraha, F., Roslim, D.I., Ardilla, Y.P., Herman. "Analisis Sebagian Sekuen Gen *Ferritin2* pada Padi (*Oryza sativa L.*) Indragiri Hilir, Riau". *Biosaintifika Journal of Biology and Biology Education* 6 No. 2 (2014): 94-103.

Pfaffl, M.W., Horgan, G.W., Dempfle, L. "Relative Expression Software Tool (REST) for Group-Wise Comparison and Statistical Analysis of Relative Expression Results in Real-Time PCR". *Nucleic Acid Research* 30 No. 9 (2002): 1-10.

Pratiwi, S.T. *Mikrobiologi Farmasi*. Jakarta: Erlangga, 2008.

Rahayuwati, S. "Variasi Morfologi Puparium dan DNA Penyandi Gen Mitokondria Sitokrom Osidase I *Bemisia tabaci* (Gennadius) (Hemiptera: Alleyrodidae)". Tesis. Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, 2009.

Retnowati, E. "Nelayan Indonesia Dalam Pusaran Kemiskinan Struktural (Perspektif Sosial, Ekonomi dan Hukum)". *Perspektif* 16 No. 3 (Mei 2011): 149-159.

Roslim, D.I., Kumairoh, S., Herman. "Confirmation of Tuntun Angin (*Elaeocarpus floribundus*) Taxonomic Status Using *matK* and ITS Sequences". *Biosaintifika* 8 No. 3 (2016): 392-399.

Satiyarti, R.B., Nurmilah, Rosahdi, T.D. "Identifikasi Fragmen DNA Mitokondria Pada Satu Garis Keturunan Ibu dari Sel Epitel Rongga Mulut dan Sel Folikel Akar Rambut". *BIOSFER Jurnal Tadris Pendidikan Biologi* 8 No. 1 (2017): 13-27.

Sistem Informasi Diseminasi Data dan Statistik Kelautan dan Perikanan (SIDATIK). <http://statistik.kkp.go.id/sidatik-dev/index.php?m=5> (24 April 2018).

Subiyanto, Ruswahyuni, Cahyono, D.G. "Komposisi dan Distribusi Larva Ikan Pelagis di Estuaria Pelawangan Timur, Segara Anakan, Cilacap". *Jurnal Saintek Perikanan* 4 No. 1 (2008): 62-68.


Sulistiono, Kurniati, T.H., Riani, E. "Kematangan Gonad Beberapa Jenis Ikan Buntal (*Tetraodon lunaris*, *T. fluviatilis*, *T. reticularis*) di Perairan Ujung Pangkah, Jawa Timur". *Jurnal Iktiologi Indonesia* 1 No. 2 (2001): 25-30.

Suryo. *Genetika Untuk Strata 1*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.

Susmiarsih, T. "Peran Genetik DNA Mitokondria (DNA mitokondria) Pada Motilitas Spermatozoa". *Majalah Kesehatan Pharma Medika* 2 No. 2 (2010): 178-184.


- Suwelo, I.S. "Spesies Ikan Langka dan Terancam Punah Perlu Dilindungi Undang-Undang". *Jurnal Ilmu-Ilmu Perairan dan Perikanan Indonesia* 12 No 2 (Desember 2005): 161-168.
- Taanman, J. "Review: The Mitochondrial Genome; Structure, Transcription, Translation and Replication". *Biochimica et Biophysica Acta* (1999): 103-123.
- Taillebois, L., Castelin, M., Lord, C., Chabarria, R., Dettai, A., Keith, P. "New Sicydiinae Phylogeny (Teleostei: Gobioidei) Inferred from Mitochondrial and Nuclear Genes: Insights on Systematics and Ancestral Areas". *ELSEVIER Molecular Phylogenetics and Evolution* 70 (2014): 260-271.
- Tamura, K., Stecher, G., Peterson, D., Filipski, A., Kumar, S. "MEGA6: Molecular Evolutionary Genetics Analysis Version 6.0". *Molecular Biology and Evolution* 30 No. 12 (2013): 2725-2729.
- Thacker, C.E. dan Roje, D.M. "Phylogeny of Gobiidae and Identification of Gobiid Lineages". *Systematycs and Biodiversity* 9 No. 4 (2011): 329-347.
- Thomas Jr., R.C., Beldia III, P.D., Campos, W.L., Santos, M.D. "Resolving the Identity of Larval Fishes, *Dulong*, in the Verde Island Passages, Philippines". *Phil. J. of Nat. Scie.* 18 (2013): 29-36.
- Tornabene, L. "Patterns of Evolution in Gobies (Teleostei: Gobiidae): A Multi-Scale Phylogenetic Investigation". *Disertasi*. Texas: Texas A&M University-Corpus Christi, 2014.
- Usman, M.Y. "Analisis Variasi Genetik Ikan Penja Indigenous Perairan Majene Sulawesi Barat dan Ikan Nike". *Skripsi*. Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2016.
- Utami, S.T., Kusharyati, D.F., Pramono, H. "Pemeriksaan Bakteri *Leptospira* Pada Sampel Darah Manusia Suspect Leptospirosis Menggunakan Metode PCR (Polymerase Chain Reaction)". *BALABA* 9 No. 2 (Desember 2013): 74-81.
- Wanrooij, S. and Falkenberg, M. "The Human Mitochondrial Replication Fork in Health and Disease". *Biochimica et Biophysica Acta* (2010): 1378-1388.
- Ward, R.D., Zemlak, T.S., Innes, B.H., Last, P.R., Hebert, PDN. "DNA Barcoding Australia's Fish Species". *Philosophical Transactions of the Royal Society, Series B* 360 (2005): 1847-1857.
- Watanabe, S., Iida, M., Lord, C., Keith, P., Tsukamoto, K. "Tropical and Temperate Freshwater Aphidromy: a Comparison Between Life History Characteristics of Sicydiinae, Ayu, Sculpins and Galaxiids". *Rev. Fish. Biol. Fisheries* (2013): 1-14.
- Watson, R.E., Marquet, G., Pollabauer, C. "New Caledonia Fish Species of the Genus *Sicyopterus* (Teleostei: Gobioidei: Sicydiinae)". *Aqua J. Icht. Aquatic Biol* 4 No. 1 (2000): 5-34.
- Weigt, L.A., Driskell, A.C., Baldwin, C.C., Ormos, A. *DNA Barcodes Methods and Protocols: DNA Barcoding Fishes*. New York: Humana Press, 2012.

- Wibowo, S.E., Djaelani, M.A., Pancasakti, H. "Pelacakan Gen Sitokrom Oksidase Sub Unit I (COI) DNA Mitokondri Itik Tegal (*Anas domesticus*) Menggunakan Primer Universal". *BIOMA* 15 No. 1 (Juni 2013): 20-26.
- Wijana, I.M.S., Mahardika, I.G.N. "Struktur Genetik dan Filogeni *Yellowfin Tuna* (*Thunnus albacares*) Berdasarkan Sekuen DNA Mitokondria *Control Region* Sitokrom Oksidase I Pada Diversitas Zone Biogeografi". *Jurnal Bumi Lestari* 10 No. 2 (Agusus 2010): 270-274.
- Yatim, W. *Biologi Sel Lanjut*. Bandung: Tarsito, 2003.
- Yusron, E. "Biodiversitas Fauna Ekhinodermata (Holothuroidea, Echinoidea, Asteroidea dan Ophiuroidea) di Perairan Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat". *Zoo Indonesia* 22 No. 1 (2013): 1-10.
- Yuwono, T. *Biologi Molekular*. Jakarta: Erlangga, 2005.



Lampiran 1. Alat

Nama	Gambar
Pinset	
Pisau bedah (<i>scalpel</i>)	
Gunting	
Bunsen	
Tube 1,5 ml	
Collection tube	

Tube PCR	
Rak tube	
Mikropipet	
Tip	
Spidol marker	


Spin down e-centrifuge Wealtec	
Profuge Gk-Centrifuge	
Thermal Cycler BioRad T100	
Microwave LG	-
Vortex	

Labu erlenmeyer	
Gelas beaker	
Gelas ukur	
Alat elektroforesis	
UV iluminator	

	
Komputer	




Lampiran 2. Bagan alir prosedur kerja



Lampiran 3. Dokumentasi kerja

1. Preparasi sampel



2. Isolasi DNA






3. Amplifikasi




4. Elektroforesis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

5. Visualisasi fragmen DNA dengan UV iluminator



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI


ALAUDDIN
MAKASSAR

Lampiran 4. Hasil BLAST sampel ikan Gobi g



	Description	Max score	Total score	Query cover	E value	Ident	Accession
■	Sicyopterus pugnans voucher BTN18 cytochrome oxidase subunit 1 (COI) gene, partial cds; mitochondrial	1240	1240	97%	0.0	99%	KJ202204.1
■	Sicyopterus pugnans isolate 4B cytochrome oxidase subunit I (COI) gene, partial cds; mitochondrial	1072	1072	95%	0.0	95%	HQ639045.1
■	Sicyopterus pugnans isolate Pug1B cytochrome oxidase subunit I (COI) gene, partial cds; mitochondrial	1068	1068	94%	0.0	96%	KF668861.1
■	Sicyopterus pugnans isolate 4A cytochrome oxidase subunit I (COI) gene, partial cds; mitochondrial	1066	1066	95%	0.0	95%	HQ639044.1
■	Sicyopterus pugnans isolate Pug1C cytochrome oxidase subunit I (COI) gene, partial cds; mitochondrial	1057	1057	94%	0.0	95%	KF668862.1
■	Sicyopterus pugnans isolate Pug1A cytochrome oxidase subunit I (COI) gene, partial cds; mitochondrial	1051	1051	94%	0.0	95%	KF668860.1
■	Sicyopterus pugnans voucher MBIO1806.4 cytochrome oxidase subunit 1 (COI) gene, partial cds; mitoch	1042	1042	91%	0.0	96%	JQ432155.1
■	Sicyopterus pugnans voucher MBIO1807.4 cytochrome oxidase subunit 1 (COI) gene, partial cds; mitoch	1035	1035	91%	0.0	95%	JQ432154.1
■	Sicyopterus microcephalus voucher BIF2521 cytochrome oxidase subunit 1 (COI) gene, partial cds; mitoc	1022	1022	91%	0.0	95%	KU693043.1
■	Sicyopterus microcephalus voucher BIF2430 cytochrome oxidase subunit 1 (COI) gene, partial cds; mitoc	1022	1022	91%	0.0	95%	KU693038.1
■	Sicyopterus microcephalus voucher BIF2270 cytochrome oxidase subunit 1 (COI) gene, partial cds; mitoc	1016	1016	91%	0.0	95%	KU693055.1
■	Sicyopterus microcephalus voucher BIF1988 cytochrome oxidase subunit 1 (COI) gene, partial cds; mitoc	1016	1016	91%	0.0	95%	KU693053.1
■	Sicyopterus microcephalus voucher BIF1680 cytochrome oxidase subunit 1 (COI) gene, partial cds; mitoc	1016	1016	91%	0.0	95%	KU693052.1

Lampiran 5. Hasil BLAST sampel ikan Gobi h



	Description	Max score	Total score	Query cover	E value	Ident	Accession
□	<i>Sicyopterus pugnans</i> voucher BTN18 cytochrome oxidase subunit 1 (COI) gene, partial cds; mitochondria	1229	1229	95%	0.0	99%	KJ202204.1
□	<i>Sicyopterus pugnans</i> isolate 4B cytochrome oxidase subunit I (COI) gene, partial cds; mitochondrial	1066	1066	95%	0.0	95%	HQ639045.1
□	<i>Sicyopterus pugnans</i> isolate Puq1B cytochrome oxidase subunit I (COI) gene, partial cds; mitochondrial	1062	1062	94%	0.0	95%	KF668861.1
□	<i>Sicyopterus pugnans</i> isolate 4A cytochrome oxidase subunit I (COI) gene, partial cds; mitochondrial	1061	1061	95%	0.0	95%	HQ639044.1
□	<i>Sicyopterus pugnans</i> isolate Puq1C cytochrome oxidase subunit I (COI) gene, partial cds; mitochondrial	1051	1051	94%	0.0	95%	KF668862.1
□	<i>Sicyopterus pugnans</i> isolate Puq1A cytochrome oxidase subunit I (COI) gene, partial cds; mitochondrial	1046	1046	94%	0.0	95%	KF668860.1
□	<i>Sicyopterus pugnans</i> voucher MBIO1806.4 cytochrome oxidase subunit 1 (COI) gene, partial cds; mitoch	1037	1037	92%	0.0	95%	JQ432155.1
□	<i>Sicyopterus pugnans</i> voucher MBIO1807.4 cytochrome oxidase subunit 1 (COI) gene, partial cds; mitoch	1029	1029	92%	0.0	95%	JQ432154.1
□	<i>Sicyopterus microcephalus</i> voucher BIF2521 cytochrome oxidase subunit 1 (COI) gene, partial cds; mitoc	1022	1022	92%	0.0	95%	KU693043.1
□	<i>Sicyopterus microcephalus</i> voucher BIF2430 cytochrome oxidase subunit 1 (COI) gene, partial cds; mitoc	1022	1022	92%	0.0	95%	KU693038.1
□	<i>Sicyopterus microcephalus</i> voucher BIF2270 cytochrome oxidase subunit 1 (COI) gene, partial cds; mitoc	1016	1016	92%	0.0	95%	KU693055.1
□	<i>Sicyopterus microcephalus</i> voucher BIF1988 cytochrome oxidase subunit 1 (COI) gene, partial cds; mitoc	1016	1016	92%	0.0	95%	KU693053.1
□	<i>Sicyopterus microcephalus</i> voucher BIF1680 cytochrome oxidase subunit 1 (COI) gene, partial cds; mitoc	1016	1016	92%	0.0	95%	KU693052.1
□	<i>Sicyopterus microcephalus</i> voucher BIF1679 cytochrome oxidase subunit 1 (COI) gene, partial cds; mitoc	1016	1016	92%	0.0	95%	KU693050.1

Lampiran 6. Hasil analisis keragaman genetik ikan Gobi *Sicyopterus pugnans*

ANALYSIS>POLYMORPHIC SITE

Input Data File: D:\...\COI-Goby-ghMEGA.meg

Number of sequences: 2 Number of sequences used: 2

Selected region: 1-706 Number of sites: 706

Total number of sites (excluding sites with gaps / missing data): 706

Sites with alignment gaps or missing data: 0

Invariable (monomorphic) sites: 699

Variable (polymorphic) sites: 7 (Total number of mutations: 7)

Singleton variable sites: 7

Parsimony informative sites: 0

Singleton variable sites (two variants): 7

Site positions: 9 153 447 570 694 703 705

Parsimony informative sites (two variants): 0

Variable sites (three variants): 0

Variable sites (four variants): 0

Protein Coding Region assigment: No

OVERVIEW>POLYMORPHISM DATA

Input Data File: D:\...\COI-Goby-ghMEGA.meg

Number of sequences: 2 Number of sequences used: 2

Selected region: 1-706 Number of sites: 706

Total number of sites (excluding sites with gaps / missing data): 706

Number of variable sites, S: 7

Total number of mutations, Eta: 7

===== G+C content =====

G+C content, G+C: 0,441 (706,00 sites)

===== Haplotype/Nucleotide Diversity =====

Number of Haplotypes, h: 2

Haplotype (gene) diversity, Hd: 1,000

Variance of Haplotype diversity: 0,25000

Standard Deviation of Haplotype diversity: 0,500

Nucleotide diversity (per site), Pi: 0,00992

Sampling variance of Pi: 0,0000246

Standard deviation of Pi: 0,00496

Average number of nucleotide differences, k: 7,00000

Theta (per sequence) from S, Theta-W: 7,00000

Theta (per site) from S, Theta-W: 0,00992

===== Neutrality Tests =====

Four or more sequences are need to compute Tajima's and Fu and Li's statistics

Fu's Fs statistic: 1,946

Strobeck's S statistic: 1,000

(Probability that NHap <= 2)

Probability that [NHap = 2]: 0,875

GENERATE>POLYMORPHIC/VARIABLE SITES DATA FILE

Input Data File: D:\...\COI-Goby-ghMEGA.meg

Number of sequences: 2 Number of sequences used: 2

Selected region: 1-706 Number of sites: 706

Total number of sites (excluding sites with gaps / missing data): 706

Number of polymorphic (segregating) sites in table: 7

Substitutions considered: All Substitutions

Sites with alignment gaps were included

GENERATE>HAPLOTYPE/DNA SEQUENCES DATA FILE

Input Data File: D:\...\COI-Goby-ghMEGA.meg

Number of sequences: 2 Number of sequences used: 2

Selected region: 1-706 Number of sites: 706

Total number of sites (excluding sites with gaps / missing data): 706

Sites with alignment gaps: considered

Number of variable sites: 7

===== Haplotype Distribution =====

Number of haplotypes, h: 2

Haplotype diversity, Hd: 1,0000

Hap_1: 1 [1]

Hap_2: 1 [2]

Hap_1: 1 [COI-Goby3-sampel_G]

Hap_2: 1 [COI-Goby4-sampel_H]

Lampiran 7. Hasil *Multiple Sequence Alignment* (MSA) pada Clustal Omega by EBI

COI-Goby3-sampel_G	TGTTCGACTAA	A	TCAAAAGATATCGGCACCC	TATACCTGTTTCGGTGCCTGAGCAGGA
COI-Goby4-sampel_H	---TCGACTAA	A	TCAAAAGATATCGGCACCC	TATACCTGTTTCGGTGCCTGAGCAGGA
	*****	*****	*****	*****
COI-Goby3-sampel_G	ATAGTAGGGACTGCC	C	TAGCCTACTCATCCGAGCTGAATTAA	AGTCAACCTGGAGCTTT
COI-Goby4-sampel_H	ATAGTAGGGACTGCC	C	TAGCCTACTCATCCGAGCTGAATTAA	AGTCAACCTGGAGCTTT
	*****	*****	*****	*****
COI-Goby3-sampel_G	CTAGGGGACGACCA	A	TTTACAATGTAATTGTTAC	TGCACATGCCTTGTAATAATTTC
COI-Goby4-sampel_H	CTAGGGGACGACCA	A	TTTACAATGTAATTGTTAC	TGCACATGCCTTGTAATAATTTC
	*****	*****	*****	*****
COI-Goby3-sampel_G	TTTATAGTAATACCA	A	TCATGATTGGAGGCTTGGGAA	CTGACTTATTCCC
COI-Goby4-sampel_H	TTTATAGTAATACCA	A	TCATGATTGGAGGCTTGGGAA	CTGACTTATTCCC
	*****	*****	*****	*****
COI-Goby3-sampel_G	GGTGCCC	G	GTGATATGGCCTTCC	GAATAAAACATAAGCTTTGACTT
COI-Goby4-sampel_H	GGTGCCC	G	GTGATATGGCCTTCC	GAATAAAACATAAGCTTTGACTT
	*****	*****	*****	*****
COI-Goby3-sampel_G	TCATTCC	T	TCCTCTCCTAGC	ATTTCTGGTGAAGCAGGGGCCGGA
COI-Goby4-sampel_H	TCATTCC	T	TCCTCTCCTAGC	ATTTCTGGTGAAGCAGGGGCCGGA
	*****	*****	*****	*****
COI-Goby3-sampel_G	GTATATC	C	CTCCTCTGGCAGGAACCTTG	CACATGCAGGAGCTCTGTTGACTTAA
COI-Goby4-sampel_H	GTATATC	C	CTCCTCTGGCAGGAACCTTG	CACATGCAGGAGCTCTGTTGACTTAA
	*****	*****	*****	*****
COI-Goby3-sampel_G	TTCTCC	C	CTCCACCTGGCAGGTATT	CATCCATTCTGGGCAATTAAATT
COI-Goby4-sampel_H	TTCTCC	C	CTCCACCTGGCAGGTATT	CATCCATTCTGGGCAATTAAATT
	*****	*****	*****	*****
COI-Goby3-sampel_G	ATCCTAA	A	CATGAAACCCCC	CTGCAATTTCACAATATCAAACAC
COI-Goby4-sampel_H	ATCCTAA	A	CATGAAACCCCC	CTGCAATTTCACAATATCAAACAC
	*****	*****	*****	*****
COI-Goby3-sampel_G	GTTCTT	T	TATTACAGCAGTCCT	CTACTTCTCTCCCTGTCCTTGCA
COI-Goby4-sampel_H	GTTCTT	T	TATTACAGCAGTCCT	CTACTTCTCTCCCTGTCCTTGCA
	*****	*****	*****	*****
COI-Goby3-sampel_G	ATGCTACTAACAGAC	G	CGAAACCTTAACACAAC	CTTGCAGCTGGCATTACA
COI-Goby4-sampel_H	ATGCTACTAACAGAC	G	CGAAACCTTAACACAAC	CTTGCAGCTGGCATTACA
	*****	*****	*****	*****
COI-Goby3-sampel_G	CCAATTCT	C	TCTACCAACATCTATTCTG	ATTCTCGGTCCCCCTGAAC
COI-Goby4-sampel_H	CCAATTCT	C	TCTACCAACATCTATTCTG	ATTCTCGGTCCCCCTGAAC
	*****	*****	*****	*****

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Annisa Zakiyah Darojat, dengan nama panggilan Nisa. Lahir di Mangkutana Kabupaten Luwu Timur pada 31 Agustus 1996. Penulis merupakan anak kedua dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Sutawi dan Ibu Asiyah, S.Pd.I.

Penulis menempuh jenjang pendidikan dimulai pada SDN 155 Karya Mukti, SDN 162 Limbo Mampongo, dan SDN 148 Tawi Baru Kab. Luwu Timur tahun 2002-2008, MTs Miftahul Ulum Kab. Luwu Timur tahun 2008-2011, MA Nurul Junaidiyah Lauwo Kab. Luwu Timur tahun 2011-2014, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2014-2018.

Selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan, penulis aktif di organisasi HMJ Biologi FST UIN Alauddin Makassar, Lembaga Dakwah Ulil Albaab FST UIN Alauddin Makassar, dan UKM LDK Al Jami' UIN Alauddin Makassar. Selain itu, penulis juga pernah menjadi asisten praktikum pada praktikum Botani Dasar, Taksonomi Tumbuhan, Taksonomi Hewan, Zoologi, Genetika dan Biologi Molekuler, dan Ekologi.