

**ANALISIS RISIKO PAPARAN KARBON MONOKSIDA (CO)
TERHADAP ANAK SEKOLAH DI SD NEGERI KAKA TUA
KOTA MAKASSAR TAHUN 2017**



Skripsi
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Kesehatan Masyarakat Jurusan Kesehatan Masyarakat
Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

OLEH :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SHERLI WAHYUNI
70200113030
ALAUDDIN
M A K A S S A R

**JURUSAN KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2018

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Analisis Risiko Paparan Karbon Monoksida (CO) terhadap Anak Sekolah di SD Negeri Kaka Tua Kota Makassar Tahun 2017", yang disusun oleh Sherli Wahyuni, NIM: 70200113030, mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Selasa, 13 Februari 2018 bertepatan 27 Jumadil Awal 1439 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat.

Makassar, 13 Februari 2018 M
27 Jumadil Awal 1439 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr.H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc	(.....)
Sekretaris	: Hasbi Ibrahim, SKM, M.Kes	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Andi Susilawaty, S.Si., M.Kes	(.....)
Pembimbing II	: Emmi Bujawati, SKM., M.Kes	(.....)
Penguji I	: Syahrul Basri, SKM., M.Kes	(.....)
Penguji II	: Dr. H. A. Darussalam, M.Ag	(.....)

ay Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu
Kesehatan UIN Alauddin Makassar B



Dr. dr.H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc.
NIP: 19550203 198312 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sherli Wahyuni
NIM : 70200113030
Tempat/Tgl.Lahir : Pasang/ 20 Oktober 1995
Jurusan/ Konsentrasi : Kesehatan Masyarakat/Kesehatan Lingkungan
Fakultas/Program : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan / Strata 1 (S1)
Alamat : Villa Samata Sejahtera Blok A 36
Judul Penelitian : Analisis Risiko Paparan Karbon Monoksida (CO) terhadap Anak Sekolah di SD Negeri Kakatua Kota Makassar Tahun 2017

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, 26 November 2017

Penyusun

Sherli Wahyuni
70200113030

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah swt. atas segala limpahan berkah, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Salam dan shalawat atas junjungan Nabi Muhammad saw. yang menghantarkan manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman peradaban saat ini, sehingga melahirkan insan-insan muda yang berwawasan serta berakhlak mulia.

Telah banyak kisah yang terukir dalam rangkaian perjalanan mengarungi waktu dalam rangka penyusunan tugas akhir ini. Episode suka dan duka terangkum dalam kisah ini sebagai bentuk harapan, kenangan, dan tantangan.

Dalam penulisan skripsi ini, tidak sedikit hambatan dan kendala yang dialami oleh penyusun. Namun berkat usaha, tekad yang kuat serta bantuan dan dorongan yang diberikan oleh berbagai pihak, maka semua yang menjadi penghalang dan rintangan dapat teratasi.

Terkhusus dan teristimewa penyusun menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada kedua orang tua bapak (Alm) Irwan S.Pd dan Ibu Pina S.Pd.,AUD, atas segala pengorbanan dan doa restu yang telah mereka berikan demi keberhasilan penyusun dalam menuntut ilmu sejak kecil sampai sekarang. Semoga Allah swt. mengampuni dosa-dosa mereka, mengalirkan pahala kebaikan dan memberikan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat atas bantuan semua pihak terutama kepada :

1. Prof. Dr. H. Musafir Pababari, M.SI, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar dan para Wakil Rektor I, II, III dan IV.
2. Dr.dr.Armyn Nurdin, M.Sc, selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Hasbi Ibrahim, SKM.,M.Kes. selaku ketua jurusan dan Azriful, SKM., M.Kes. selaku sekretaris jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
4. Dr. Andi Susilawaty, S.Si. ,M.Kes dan Emmi Bujawati, SKM. ,M.Kes, sebagai pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, koreksi dan petunjuk dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Syahrul Basri, SKM. ,M.Kes dan Dr. H. A. Darussalam M.Ag, selaku penguji kompetensi dan integrasi keislaman yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Para dosen di lingkungan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar atas keikhlasannya memberikan ilmu yang bermanfaat selama proses studi, serta segenap staf Tata Usaha di lingkungan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang banyak membantu penyusun dalam berbagai urusan administrasi selama perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.

7. Bapak dan ibu guru di SD Negeri Kakatua serta para siswa yang telah bersedia menerimaku dan telah banyak membantu proses penelitian ini di SD Negeri Kakatua
8. Kakak-kakak laboran di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar, yang telah banyak membantu selama proses penelitian.
9. Teman-teman seperjuangan di Jurusan Kesehatan Masyarakat angkatan 2013 (*Dimension*) khususnya peminatan Kesehatan Lingkungan 2013 yang telah memberikan dukungan moril, moral maupun materil serta saran demi penyelesaian skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat yang telah seperti saudara, St.Hardiyanti M, Fitriani, Syahraini, Sulhinayatillah, AsnidarAstari, Miftahul Khaeriyah, Andi Ayu Hapsari, dan Hikmah Nurul Arifah yang telah dengan sabar mendengar keluh kesah penyusun, memberi saran, dukungan, dan dorongan semangat serta menemani penyusun sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi.
11. Teman penelitian ARKL Andi Ratnasari dan A. Kurniawan NP) serta kak Diman yang telah banyak membantu selama masa-masa penelitian dan penyusunan skripsi ini.
12. Serta semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.


Penyusun menyadari dalam penyusunan skripsi ini mempunyai banyak kekurangan. Olehnya itu segala kritik dan saran penyusun nantikan demi kesempurnaan dalam penulisan selanjutnya.

Akhirnya, penyusun berharap semoga hasil penelitian ini bernilai ibadah disisi Allah SWT dan dapat memberi manfaat bagi kita semua.

Makassar, 22 Januari 2018

Penyusun

Sherli Wahyuni
NIM :70200113030



DAFTAR ISI

SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
RINGKASAN	xv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Defenisi Operasional dan Kriteria Objektif	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Pencemaran Udara	14
B. Tinjauan Umum tentang Gas Karbon Monoksida (CO)	24
C. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian	38
D. Tinjauan Umum tentang Pencemaran Udara dalam Perspektif Islam ...	41
E. Tinjauan Umum tentang Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan (ARKL)	47
F. Kerangka Teori	64
G. Kerangka Konsep	65

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	66
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	67
C. Populasi dan Sampel.....	68
D. Metode Pengumpulan Data.....	70
E. Instrumen Penelitian	71
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.....	72
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	75
B. Pembahasan Hasil Penelitian	87
C. Keterbatasan Peneliti	103
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tinjauan Pustaka Terkait Penelitian mengenai CO	6
Tabel 2.1 Pengaruh konsentrasi CO di udara dan pengaruhnya pada tubuh bila kontak terjadi pada waktu yang lama	35
Tabel 2.2 Data Penerimaan Siswa BaruSD Negeri Kakatua Kota Makassar Tahun ajaran 2016/2017	39
Tabel 2.3Data Jumlah SiswaSD Negeri Kakatua Kota Makassar Tahun ajaran 2016/2017	40
Tabel 2.4 Data Keadaan GuruSD Negeri Kakatua Kota Makassar Tahun ajaran 2016/2017	40
Tabel 2.5 Data Penjaga Sekolah/Tenaga AdministrasiSD Negeri Kakatua Kota Makassar Tahun ajaran 2016/2017	41
Tabel 4.1Distribusi Responden berdasarkan Jenis Kelamin di SD Negeri Kakatua Kota Makassar Tahun 2017	73
Tabel 4.2 Distribusi Responden berdasarkan Kelompok Umur di SD Negeri Kakatua Kota Makassar Tahun 2017.....	74
Tabel 4.3 Distribusi Responden berdasarkan Kelompok Berat Badan di SD Negeri Kakatua Kota Makassar Tahun 2017.....	74
Tabel 4.4 Distribusi Responden berdasarkan Kelompok Kelas di SD Negeri Kakatua Kota Makassar Tahun 2017.....	75
Tabel 4.5Distribusi Laju Asupan Harian Responden di SD Negeri Kakatua Kota Makassar Tahun 2017.....	77


Tabel 4.6 Distribusi Durasi Paparan Responden di SD Negeri Kakatua Kota
Makassar Tahun 2017..... 78

Tabel 4.7Distribusi Berat Badan Responden di SD Negeri Kakatua Kota
Makassar Tahun 2017..... 78



DAFTAR GAMBAR

Gamabr 2.1 Sumber Pencemaran Udara	30
Gambar 2.2 Sistem Pernapasan pada Manusia	32
Gambar 2.3 Analisis Risiko	48
Gambar 2.4 Bagan Alur Penerapan ARKL	54
Gambar 2.5 Kerangka Teori	62
Gambar 2.6 Kerangka Konsep	63



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Lembar Observasi
- Lampiran 2 : Laporan Hasil Pengukuran Karbon Monoksida di Udara Ambien
- Lampiran 3 : Master Tabel
- Lampiran 4 : Hasil Perhitungan Intake dan RQ
- Lampiran 5 : Tabel Frekuensi Karakteristik Responden
- Lampiran 6 : Surat Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 7 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 8 : Gambar Titik Pengambilan Sampel
- Lampiran 9 : Dokumentasi penelitian
- Lampiran 10 : Riwayat Hidup



ABSTRAK

Nama : Sherli Wahyuni

NIM : 70200113030

Judul : Analisis Risiko Paparan Karbon Monoksida (CO) Terhadap Anak Sekolah di SD Negeri Kakatua Kota Makassar Tahun 2017

Karbon Monoksida (CO) adalah gas yang tidak berbau, tidak berasa dan juga tidak berwarna. Gas CO dapat berbentuk cairan pada suhu -129°C . Gas CO sebagian besar berasal dari pembakaran fosil dengan udara berupa gas buangan. Di kota besar yang padat lalu lintasnya akan banyak menghasilkan gas CO sehingga kadar CO dalam udara relatif tinggi dibandingkan dengan daerah pedesaan. Selain itu, Gas CO dapat pula terbentuk dari proses industri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besaran risiko paparan CO pada anak sekolah di SD negeri kakatua kota makassar.

Jenis rancangan pada penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan metode Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan (ARKL). Dengan jumlah populasi 222 responden dan sampelnya sebanyak 143 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Multi Stage Sampling* yang dilakukan dengan 2 tahap pengambilan sampel.

Hasil penelitian menunjukkan rata-rata konsentrasi CO dalam udara ambien di Sekitar SD Negeri Kakatua tahun 2017 yaitu pada pagi hari sebesar $964,48 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$, siang hari sebesar $879,44 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$, dan sore hari sebesar $1054,78 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$. Rata-rata laju asupan udara anak sekolah di SD Negeri Kakatua yaitu $2,65 \text{ m}^3/\text{hari}$. Rata-rata durasi paparan anak sekolah di SD Negeri Kakatua yaitu 5,05 tahun. Rata-rata berat badan anak sekolah di SD Negeri Kakatua yaitu 33,12 kg. Rata-rata besaran risiko (RQ) CO pada anak sekolah di SD Negeri Kakatua yaitu $\text{RQ} < 1$. Nilai $\text{RQ} < 1$ yang artinya anak sekolah di SD Negeri Kakatua belum terjadi risiko paparan Karbon Monoksida yang terkandung di udara ambien

Diharapkan kepada semua pihak baik pemerintah, pihak sekolah dan anak sekolah untuk selalu menjaga lingkungan sekitar utamanya yang dekat jalan raya misalnya dengan menanam pohon yang dapat meminimalisir pencemaran udara sekitar.

Kata Kunci : Karbon Monoksida, ARKL, Risk Quotient (RQ)

Daftar Pustaka : 46 (1998-2017)

RINGKASAN

SHERLI WAHYUNI

“ANALISIS RISIKO PAPARAN KARBON MONOKSIDA (CO) TERHADAP ANAK SEKOLAH DI SD NEGERI KAKATUA KOTA MAKASSAR TAHUN 2017”

Pembimbing: Andi Susilawaty, Emmi Bujawati

(xii+102 halaman+12 lampiran)

Karbon Monoksida (CO) adalah gas yang tidak berbau, tidak berasa dan tidak berwarna (Wardana,2004). Gas CO dapat berbentuk cairan pada suhu -129C. Karbon monoksida ini biasanya dihasilkan dari pembakaran tidak sempurna gas bermotor. Secara global, polusi udara membunuh hingga 2,4 juta orang setahun di seluruh dunia. sebagian besar kematian akibat polusi udara terjadi di Asia Timur dan India dimana polusi udara di sana sudah sangat berat. Para peneliti memperkirakan bahwa sebanyak 1,24 juta orang Asia Timur dan India sebanyak 549.000 orang meninggal karena menghirup udara beracun setiap tahun. Eropa dan Asia Tenggara khususnya Indonesia memiliki angka kematian yang tinggi juga (WHO, 2013).

Keberadaan CO akan sangat berbahaya jika terhirup oleh manusia karena gas itu akan menggantikan posisi oksigen yang berkaitan dengan hemoglobin dalam darah. Karbon monoksida adalah gas yang bersifat membunuh makhluk hidup termasuk manusia. Pada kasus darah yang tercemar karbon monoksida dalam kadar 70% hingga 80% dapat menyebabkan kematian. Adapun yang paling berisiko keracunan CO adalah bayi dan anak dan mereka yang mengalami masalah kardiovaskular, perokok dan petugas pemadam kebakaran serta pengecat yang menggunakan cat yang mengandung metil klorida karena asapnya mudah diserap melalui paru-paru dan masuk ke peredaran darah (Kamal, 2015).

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui besaran risiko paparan CO pada anak sekolah di SD Negeri Kakatua Kota Makassar dengan jenis penelitian Kuantitatif dengan metode Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan (ARKL) digunakan untuk menilai dan menaksirkan risiko kesehatan manusia yang disebabkan oleh pajanan bahaya lingkungan.

Hasil penelitian menunjukkan untuk konsentrasi Karbon Monoksida di lokasi penelitian masih dibawah batas aman yang telah ditentukan, tetapi dalam penelitian ini tidak memperlihatkan konsentrasi yang diperoleh melebihi atau tidak karena tinggi rendahnya konsentrasi CO tetap akan mempengaruhi besarnya risiko pada anak-anak sekolah di lokasi penelitian. Selain itu dampak yang ditimbulkan apabila gas CO melebihi nilai batas aman yang telah ditentukan seperti timbulnya gejala keracunan yang ditandai dari keadaan ringan berupa pusing, sakit kepala dan mual. Keadaan lebih berat dapat berupa penurunan kemampuan gerak tubuh, gangguan pada sistem kardiovaskuler, serangan jantung sampai pada kematian. dan untuk Laju asupan harian adalah banyaknya udara yang mengandung CO yang terhirup di lokasi penelitian. Adapun Laju asupan harian anak sekolah di lokasi penelitian adalah $0,5 \text{ m}^3/\text{jam}$ artinya nilai ini adalah jumlah CO yang akan terhirup oleh responden di lokasi penelitian. Aktivitas yang dilakukan responden di sekolah yang kebanyakan dilakukan di lapangan, kantin dan diluar kelas ini biasanya terhitung sampai 6 jam/hari di sekolah. Oleh sebab itu, nilai laju asupan responden rata-rata tinggi untuk kategori anak-anak. Hal ini akan mempengaruhi jumlah gas CO yang dihirup semakin lama responden berada di lokasi penelitian maka semakin banyak pula jumlah CO yang diterima.

Durasi paparan adalah lamanya waktu responden menghirup udara yang mengandung CO di lokasi penelitian dalam satuan tahun. Nilai rata-rata durasi responden adalah 5,05 tahun. Durasi paparan anak sekolah itu 6 jam/ hari. Waktu pajanan selama 24 jam/hari merupakan waktu pajanan maksimal dalam kehidupan sehari-hari dalam satuan jam/hari, sehingga jika terpapar dalam waktu maksimal maka akan semakin besar pula peluang responden memiliki besar risiko yang tidak aman,

Berat badan yang dimaksud adalah berat badan responden pada saat dilakukan penelitian dalam satuan kilogram (kg). Nilai rata-rata dari data berat badan responden adalah 33,12 kg. Berat badan mempengaruhi besar risiko paparan zat berbahaya seseorang. Pada orang gemuk kerja sistem pernapasannya cenderung lebih berat dan kapasitas parunya relatif lebih kecil dibandingkan dengan orang yang kurus. Hal ini terjadi karena penimbunan lemak pada dinding dada dan perut yang akan mengganggu gerak pernapasan.

Besar Risiko (RQ) yang dimaksud adalah kemungkinan risiko terpapar CO pada anak-anak yang bersekolah dilokasi penelitian atau besarnya risiko anak-anak terpapar udara yang mengandung CO dilokasi penelitian melalui perhitungan dengan membandingkan antara asupan dengan konsentrasi acuan. Nilai rata-rata dari data besar risiko (RQ) responden adalah 0,173554, sehingga nilai RQ seluruh responden < 1 artinya nilai risiko belum ada dan perlu di pertahankan. Anak sekolah yang bersekolah dilokasi penelitian belum terjadi risiko paparan karbon monoksida yang terkandung di udara ambien dalam waktu 6 tahun bersekolah di lokasi tersebut.

Responden memiliki besar risiko yang masih aman yaitu mulai dari konsentrasi karbon yang dibawah batas aman, nilai laju asupan rata-rata tinggi untuk kategori anak-anak, durasi paparan yang tidak terlalu tinggi, dan untuk besar risiko sendiri masih di bawah nilai 1, artinya risiko belum ada dan perlu dipertahankan. Sedangkan untuk berat badan sendiri bisa dikatakan melebihi berat badan normal anak sekolah.

Diperlukan peran dari pihak sekolah mengajarkan kepada para anak sekolah tentang menanam pohon agar tanaman yang dapat menyerap polutan-polutan dari emisi gas buang khususnya karbon monoksida

Kata Kunci : *Anak Sekolah, Karbon Monoksida, Risk Quotien (RQ), ARKL*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Udara merupakan zat yang sangat penting mengingat kontribusi yang diberikannya bagi kehidupan di permukaan bumi ini. Apabila dalam proses inspirasi (menghirup udara) udara itu haruslah udara yang bersih dan sehat, hal itu akan menyebabkan kesehatan yang baik, namun bila kita menghirup udara yang tercemar akan menyebabkan kesehatan yang buruk. Pencemaran udara menyebabkan perubahan susunan udara dalam keadaan normalnya. Sumber pencemar terdiri atas dua yaitu sumber bergerak dan tidak bergerak. Sumber pencemaran udara yang utama berasal dari transportasi yaitu kendaraan bermotor, dimana hampir 60% dari polutan yang dihasilkan terdiri dari karbon monoksida (CO) dan sekitar 15% terdiri dari hidrokarbon (HC) (Kamal,2015).

Secara global, polusi udara membunuh hingga 2,4 juta orang setahun di seluruh dunia. Sebagian besar kematian akibat polusi udara terjadi di Asia Timur dan India di mana polusi udara di sana sudah berat. Para peneliti memperkirakan bahwa sebanyak 1,24 juta orang Asia Timur dan India sebanyak 549.000 orang meninggal karena menghirup udara beracun setiap tahun. Eropa dan Asia Tenggara khususnya Indonesia memiliki angka kematian yang tinggi juga. Berdasarkan data dari WHO menunjukkan bahwa angka kematian karena *outdoor air pollution* pada tahun 2008 di wilayah Asia Tenggara, negara Indonesia merupakan peringkat ketiga setelah India dan Bangladesh. Kasus kematian akibat

outdoor air pollution ini dikarenakan adanya gangguan pada sistem pernapasan yaitu 88,3% diakibatkan *cardiopulmonary disease*, 11% *lung cancer* dan 0,7% *respiratory infection* (WHO, 2013).

Beberapa tahun yang lalu United Nations Environmental Programme (UNEP) telah menempatkan Jakarta sebagai kota terpolusi nomor tiga di dunia setelah Meksiko dan Bangkok. Bisa dibayangkan betapa parahnya ancaman polutan emisi gas buang di metropolitan ini. Padahal tanpa harus berhadapan dengan fakta tersebut, anak Indonesia sudah tergolong lemah dan memiliki angka kematian tinggi. Berdasarkan catatan UNICEF, laju kematian anak Indonesia sudah tergolong lemah dan memiliki angka kematian tinggi. Berdasarkan catatan UNICEF, laju tingkat kematian anak Indonesia termasuk tinggi dibanding negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia. Sebagai perbandingan, tahun 1997 tingkat kematian anak di Jakarta mencapai 81 kasus, Kalimantan sebesar 67 kasus dan NTB mencapai 28 kasus perseribu kelahiran, sedangkan di Thailand hanya 30 dan Malaysia hanya 9 kasus (Seprianto M, Sri; Sainab 2015).

Berdasarkan laporan WHO, bahwa dari 126 kota di seluruh dunia terdapat 130 ribu kematian *premature* dan 50-70% insiden penyakit pernafasan tiap tahun akibat polusi udara, khususnya yang diakibatkan oleh karbon monoksida (CO). Sedangkan di Amerika Serikat pada tahun 1969 diperkirakan sebagian besar kendaraan bermotor yang menghasilkan sekitar 97 ribu ton gas CO yang merupakan 65% dari seluruh karbon monoksida buatan manusia.

Di Indonesia, kondisi pencemaran CO di udara juga kian mempeihatinkan. Berdasarkan data dari WHO, jumlah polutan CO di Indonesia yang diestimasikan dari seluruh aktivitas manusia adalah sekitar 686,864 ton pertahun atau 48,6% dari jumlah total emisi lima polutan. Penyebab dari pencemaran udara itu sekitar 80% berasal dari sektor transportasi dan 20% dari industri dan limbah domestik (Arifin, 2012)

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perhubungan Kota Makassar mengenai jumlah kendaraan yang ada di kota makassar memperlihatkan bahwa pada tahun 2013 jumlah total untuk semua jenis kendaraan adalah 1.160.385, tahun 2014 adalah 1.254.876, sedangkan pada tahun 2015 adalah 1.763.438, dimana jumlah ini sebagian besar di dominasi oleh sepeda motor dan mobil pribadi.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Lutfie, dkk (2014) menyatakan bahwa jalanan terpadat yang ada dikota makassar itu yang pertama jl.Cakalang (107,166%), jl.Tentara Pelajar (105,641%), jl.Gagak (105,639%), jl.cendrawasih (105,18%), jl. AP.Pettarani (104,277%). Penelitian ini dilakukan selama 13 jam mulai dari pukul 07:00 hingga pukul 22:00 pada 36 ruas jalan utama di Kota Makassar

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota pada tahun 2016 yang melakukan pengukuran kualitas udara memperlihatkan bahwa nilai untuk kadar CO yang paling tinggi itu berada di Jl. Letnan Hertasning Raya sebesar 1148,54 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ pada pagi hari dan paling rendah berada di Jl. Penghibur lama sebesar 579,64 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ pada siang hari.

Keberadaan CO akan sangat berbahaya jika terhirup oleh manusia karena gas itu akan menggantikan posisi oksigen yang berkaitan dengan hemoglobin dalam darah. Karbon monoksida adalah gas yang bersifat membunuh makhluk hidup termasuk manusia. Zat gas CO ini akan mengganggu pengikatan oksigen pada darah karena CO lebih mudah terikat oleh darah dibandingkan dengan oksigen dan gas-gas lainnya. Pada kasus darah yang tercemar karbon monoksida dalam kadar 70% hingga 80% dapat menyebabkan kematian. Adapun yang paling berisiko keracunan CO adalah bayi dan anak dan mereka yang mengalami masalah kardiovaskular, perokok dan petugas pemadam kebakaran serta pengecat yang menggunakan cat yang mengandung metil klorida karena asapnya mudah diserap melalui paru-paru dan masuk ke peredaran darah (Kamal, 2015).

SD Negeri Kakatua merupakan satu-satunya sekolah dasar yang terletak di Jl. Gagak Kec. Mariso Kota Makassar yang menempati posisi kedua jalanan terpadat di kota makassar setelah jl. tentara pelajar, dimana sekolah ini mempunyai jumlah siswa yang banyak yaitu 402 orang anak yang memiliki umur sekitar 7- 12 tahun. Berdasarkan data-data di atas maka peneliti tertarik mengambil penelitian yang berkaitan dengan pencemaran udara karbon monoksida dengan judul **“Analisis Risiko Paparan Karbon Monoksida (CO) terhadap Anak Sekolah di SD Negeri Kakatua Kota Makassar Tahun 2017”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan data yang diperoleh mengenai dampak yang akan ditimbulkan akibat Karbon Monoksida (CO) maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: Berapa Besar Risiko Paparan Karbon Monoksida (CO) terhadap anak sekolah di SD Negeri Kakatua Kota Makassar Tahun 2017?

C. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif

1. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan kesamaan dan menghindari terjadinya kesalahan penafsiran dalam penelitian ini maka dibuatkan definisi operasional terhadap beberapa variabel, sebagai berikut:

- a. Konsentrasi CO adalah besarnya kandungan senyawa CO di udara di sekitar SD Negeri Kakatua yang diukur dengan *NDIR Analyzer* dan dinyatakan dalam satuan mg/Nm^3 . Skala pengukurannya merupakan skala pengukuran rasio
- b. Laju Asupan adalah banyaknya udara yang dihirup atau tingkat maksimal udara yang dihirup tiap jam berdasarkan umur. Untuk anak usia 6-12 tahun adalah $0,5 \text{ m}^3/\text{jam}$.
- c. Durasi Paparan adalah lamanya waktu responden menghirup udara yang mengandung CO di lokasi penelitian dalam satuan tahun. Diperoleh melalui pertanyaan dalam kuisioner kepada responden. Skala pengukurannya adalah rasio.

- d. Berat Badan adalah hasil pengukuran terhadap berat badan responden pada saat dilakukan penelitian dalam satuan kilogram (kg). Skala pengukurannya adalah interval.
- e. Besar Risiko (Risk Quotient) adalah kemungkinan besar risiko keterpaparan CO pada anak SD dilokasi penelitian atau besarnya risiko masyarakat terpapar udara yang mengandung CO dilokasi penelitian.
- f. Waktu paparan adalah lama paparan yaitu jumlah jam dalam sehari responden berada di lokasi penelitian yang udaranya tercemar karbon monoksida (CO) (jam/hari).

2. Kriteria Objektif

$RQ \leq 1$: Risiko belum ada dan perlu dipertahankan

$RQ > 1$: Risiko ada dan perlu dikendalikan

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka menguraikan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan penelitian bisa dinarasikan atau dalam bentuk tabel.

Tabel 1. Tinjauan pustaka terkait penelitian mengenai Karbon Monoksida

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Model/Desain Penelitian	Sampel	Hasil Penelitian
1.	Erwin Ningsih, 2012	Pengaruh paparan gas karbon monoksida (CO) terhadap tekanan darah pekerja jasa	Metode penelitian ini yaitu observasional analitik dengan menggunakan pendekatan <i>cross secsional</i>	Sampel penelitian sebanyak 60 orang di ambil menggunakan teknik <i>purposive sampling</i>	1. Hasil uji Chi Square menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan antara paparan gas karbon monoksida (CO) dengan tekanan darah pekerja jasa becak

		becak diterminal tirtonadi surakarta			<p>di Terminal Tirtonadi Surakarta dengan nilai $p+0,000$.</p> <p>2. Dari nilai <i>contingency coefficients</i> dan uji <i>Chi Square</i> dapat diketahui bahwa faktor paparan gas CO mampu mempengaruhi tekanan darah sebesar 55,8%. Artinya terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi tekanan darah pekerja jasa becak di terminal tirtonadi, surakarta sebesar 44,2%. Faktor-faktor tersebut merupakan faktor yang tidak dapat dikendalikan atau tidak diteliti dalam penelitian ini.</p>
2.	Nahlah Mustafa Kamal, 2015	Studi tingkat kualitas udara pada kawasan mall Panakukang di makassar	Metode yang digunakan adalah metode survey lapangan dan wawancara	Jumlah sampel yang diambil adalah 5 titik sampel disemua titik yang menimbulkan kemacetan	<p>1. Berdasarkan tabel baku mutu udara ambien jenis polutan dengan hasil SO^2 66,245 $\mu g/m^3$ dengan baku mutu 900 $\mu g/Nm^3$ NO^2 66,105 $\mu g/m^3$ dengan baku mutu standar 400 $\mu g/Nm^3$, CO 13,55 $\mu g/m^3$ dengan baku mutu 30.000 $\mu g/Nm^3$, Cl_2 31,03 $\mu g/m^3$ dengan baku mutu 150 $N\mu g/m^3$ keempat polutan tersebut</p>

					<p>tidak melewati ambang batas baku mutu udara ambien. Sedangkan hasil polutan yang tidak terdapat pada baku mutu udara ambien adalah H₂ 0,051 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, H₂S 52,92 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, dan CO 7,62 $\mu\text{g}/\text{m}^3$</p> <p>2. Hasil ISPU di Kawasan Mall Panakukang pada polutan SO₂ 31,87 dalam kategori baik yaitu pada range 0-50, pada polutan NO₂ 11,69 dalam kategori baik yaitu range 0-50 dan sedangkan pada polutan CO 100,4 dengan range 51-100 dalam kategori sedang</p>
3.	Alqadri, 2013 (skripsi tidak terpublikasi)	Analisi risiko paparan nitrogen dioksida pada pedagang kaki lima dikawasan terminal mallengkeri makassar	Dengan menggunakan model analisis risiko kesehatan lingkungan (ARKL) untuk menghitung besaran risiko kesehatan masyarakat	Total sampel sebanyak 5 titik dan sampel manusianya sebanyak 53 responden	Hasil penelitian menunjukkan rata-rata konsentrasi NO ₂ dalam udara ambien di kawasan terminal mallengkeri tahun 2013 yaitu 0,02328 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$. Rata-rata durasi paparan pedagang kaki lima terhadap NO ₂ yaitu 10,9836 tahun. Rata-rata berat badan pedagang kaki lima yaitu 58,97 kg. rata-rata besaran risiko (RQ) < 1. Nilai RQ belum terjadi risiko

					paparan NO ₂ yang terkandung di udara ambien di lokasi itu dalam waktu 30 tahun ke depan.
4.	Destiani Rerung Isa Sarira, 2015 (skripsi tidak terpublikasi)	Studi kadar SO ₂ dan CO di udara serta keluhan gangguan pernapasan pada masyarakat sekitar PT semen tonasa maros kecamatan bantimurung tahun 2015	Metode yang digunakan adalah metode observasional dengan pendekatan deskriptif	Untuk pengambilan sampel udara dilakukan di tiga titik sampel yang berada pada tiga dusun di desa Tukamasea, dari ketiga dusun tersebut ditarik sampel manusia sebanyak 83 orang .	Hasil pengukuran kadar SO ₂ dan CO ditemukan kadar SO ₂ tertinggi dititik 1 pada pengambilan sampel siang hari yaitu 22,166 µg/Nm ³ dan yang terendah di titik 3 pada pengambilan sampel pagi hari dengan kadar sebesar 12,528 µg/Nm ³ . Untuk pengukuran kadar CO yang tertinggi juga ditemukan pada titik satu pengambilan sampel siang hari yaitu sebesar 33.344 µg/Nm ³ dan yang terendah yaitu pada pengambilan sampel pagi hari di titik 3 dengan kadar sebesar 22,546 µg/Nm ³ . Dari 85 responden 75,3% mengaku mengalami gangguan pernapasan selama 6 bulan terakhir. Seluruh sampel udara berada dibawah nilai ambang batas yang ditentukan namun jarak yang dekat dari lokasi pabrik semen memiliki risiko paparan yang tinggi terbukti dengan hasil pengukuran tertinggi pada titik 1 dan

					adanya keluhan sebesar 100% dari masyarakat dusun amesanggung yang merupakan dusun terdekat dari pabrik semen.
5.	Khairah kadir, 2013 (Skripsi tidak terpublikasi)	Studi kadar karbon monoksida dan karbon dioksida dengan status kesehatan pegawai stasiun pengisian bahan bakar umum di kecamatan rappocini kota makassar	Jenis penelitian yang digunakan adalah observasional menggunakan analisa laboratorium dan metode pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan kadar karbon monoksida dan karbon dioksida di udara dan status kesehatan pegawai SPBU kecamatan rappocini kota makassar	Jumlah responden di SPBU 1 adalah sebanyak 18 responden dan di SPBU 2 sebanyak 12 responden	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar CO paling tinggi adalah 14,9 ppm dan yang paling rendah yaitu 3,3 ppm. Untuk pengukuran kadar CO ₂ yang paling tinggi adalah 819,4 ppm dan yang paling rendah 508,6 ppm. Pada SPBU 1, dari 18 responden yang diteliti sebanyak 14 responden (77,8%) yang tidak sehat sedangkan pada SPBU 2, dari 12 responden yang diteliti sebanyak 11 (80%) responden yang tidak sehat.
6	Deddy alif Utama, 2015	Analisis risiko pajanan Co dan NO ₂ pada pedagang di kawasan terminal mallengkeri kota makassar	Penelitian ini menggunakan rancangan observasional dengan pendekatan Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan (ARKL)	Sampel ditarik dengan menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> untuk mendapatkan 48 sampel dan sampel manusia yaitu pedagang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi rata-rata gas CO dikawasan terminal mallengkeri pada awal pekan yaitu 312,59 µg/Nm ³ , sedangkan pada akhir pekan yaitu 449,06 µg/Nm ³ . Konsentrasi rata-rata NO ₂ pada awal pekan yaitu 16,49 µg/Nm ³ dan pada saat akhir pekan

				<p>sebanyak 58 responden.</p>	<p>yaitu $7,22 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$. RQ rata-rata CO pada awal pekan, yakni 0,11883, sedangkan pada akhir pekan adalah 0,15363. Sementara RQ rata-rata NO_2 pada saat pekan adalah 0,03424 dan pada akhir pekan sebesar 0,01683. RQ kumulatif rata-rata pada awal pekan yaitu 0,15307, sedangkan pada akhir pekan yaitu 0,17046. tiap-tiap konsentrasi polutan, baik CO maupun NO_2, belum melebihi nilai ambang batas. RQ dan RQ kumulatif belum menunjukkan risiko kesehatan non karsinogenik (< 1). Meskipun demikian, dari hasil analisis didapatkan data bahwa nilai RQ dan RQ kumulatif tertinggi pajanan CO pada akhir pekan telah melebihi nilai risiko maksimum.</p>
--	--	--	--	-------------------------------	--

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a) Tujuan Umum

Untuk mengetahui besaran risiko paparan CO pada anak sekolah di SD Negeri

Kakatua Kota Makassar

b) Tujuan Khusus

- 1) Untuk menghitung rata-rata konsentrasi CO di sekitar SD Negeri Kakatua
- 2) Untuk mengukur rata-rata laju asupan CO di udara yang terhirup oleh anak-sekolah di SD Negeri Kakatua
- 3) Untuk mengukur rata-rata durasi paparan CO pada anak sekolah SD Negeri Kakatua
- 4) Untuk mengukur rata-rata berat badan anak sekolah di SD Negeri Kakatua
- 5) Untuk mengukur besar risiko paparan CO pada anak sekolah di SD Negeri Kakatua

2. Kegunaan Penelitian

a) Kegunaan Praktis

- 1) Memberikan informasi kepada masyarakat dan warga sekolah terkait mengenai jumlah proporsi anak-anak SD Negeri Kakatua yang mempunyai risiko terpapar karbon monoksida (CO).
- 2) Sebagai informasi awal kepada pengambil kebijakan khususnya untuk kepala sekolah serta guru dan para staf sekolah dan pemerintahan Kota Makassar untuk melakukan manajemen risiko terhadap anak sekolah SD Negeri Kakatua.

b) Kegunaan pada Ilmu Pengetahuan

Sebagai informasi awal dalam menganalisis besarnya risiko kesehatan anak sekolah dan masyarakat yang akan terjadi pada masa yang akan datang akibat *risk agent* yang ada dilingkungan agar dapat di cegah.

c) Kegunaan bagi Peneliti

Menambah pengetahuan serta pengalaman masyarakat dalam melakukan analisis risiko dampak paparan karbon monoksida (CO) terhadap kesehatan anak sekolah dan masyarakat yang menghirupnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pencemaran Udara

1. Pengertian Pencemaran Udara

Udara adalah campuran dari berbagai gas secara mekanis dan bukan merupakan senyawa kimia. Udara merupakan komponen yang membentuk atmosfer bumi, yang membentuk zona kehidupan pada permukaan bumi. Udara terdiri dari berbagai gas dalam kadar yang tetap pada permukaan bumi, kecuali gas metana, ammonia, hidrogen sulfida, karbon monoksida dan nitrogen oksida mempunyai kadar yang berbeda-beda tergantung daerah/lokasi. Umumnya konsentrasi metana, ammonia, hydrogen sulfida, karbon monoksida dan nitrooksida sangat tinggi di areal rawa-rawa atau industri kimia (Gunawan, 1997).

Pengertian pencemaran udara sudah banyak dibahas oleh beberapa ahli lingkungan hidup. Pengertian pencemaran udara seperti yang dikemukakan oleh Henry C. Perkins dalam bukunya yang berjudul “*Air Pollution*” menjelaskan “*air pollution means presence in the outdoor atmosphere of one or more contaminants, such as dust, fumes, gas, mist, odor, smoke or vapor in quantities of characteristic an of duration, such as to be injurious to human, plant or animal life for to property, or which unreasonable interferes with the comfortable enjoyment of life and property*”. Bila didefenisikan ke dalam bahasa indonesia adalah “Pencemaran udara merupakan hadirnya suatu zat atau beberapa kontaminan di dalam udara atmosfer seperti debu, gas, kabut, bau, asap dan uap

dalam kuantitas yang banyak dengan berbagai sifat manapun lama berlangsungnya di udara sehingga dapat menimbulkan gangguan terhadap kehidupan manusia, tumbuhan atau binatang maupun benda, atau tanpa alasan jelas sudah dapat mempengaruhi kelestarian kehidupan organisme maupun benda” (Gunawan, 1997).

Menurut Slamet Riyadi (1982), Pencemaran udara adalah keadaan dimana masuknya suatu sumber ke dalam udara atmosfer, baik melalui aktivitas manusia maupun secara alami yang dibebaskan satu atau beberapa bahan atau zat-zat dalam kuantitas dalam batas waktu tertentu yang secara karakteristik dapat atau memiliki kecenderungan yang dapat menimbulkan ketimpangan susunan udara atmosfer secara ekologis sehingga mampu menimbulkan gangguan-gangguan bagi kehidupan satu atau kelompok organisme maupun benda-benda.

Menurut Peraturan Pemerintah RI No.41 tahun 1999, pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya. Sedangkan Menurut UU No. 32 tahun 2009 tentang pengolahan Lingkungan Hidup, pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Mukono (2008), Pencemaran udara adalah bertambahnya bahan atau substrat fisik atau kimia ke dalam lingkungan udara normal yang mencapai jumlah

tertentu sehingga dapat dideteksi oleh manusia (atau dapat dihitung ataupun diukur) serta dapat memberikan efek pada manusia, binatang, vegetasi dan material. Sedangkan menurut Mukono (2008), Pencemaran udara merupakan perubahan atmosfer oleh karena masuknya bahan kontaminan alami ataupun buatan kedalam atmosfer tersebut. Selain itu pencemaran udara dapat pula dikatakan sebagai adanya bahan polutan di atmosfer yang dalam konsentrasi tertentu akan mengganggu keseimbangan dinamik di atmosfer dan mempunyai efek pada manusia dan lingkungannya.

Pencemaran udara dapat saja terjadi dari pencemaran udara seperti: pembakaran batu bara, bahan bakar minyak dan pembakaran lainnya yang mempunyai limbah berupa partikulat (aerosol, debu, abu terbang, kabut, asap dan jelaga) selain kegiatan pabrik yang berhubungan dengan perempelasan, pemulasan dan pengolesan (*grinding*), penumpukan dan penghancuran benda keras (*crushing*), pengolahan biji logam dan proses pengeringan. Kegiatan pembongkaran dan penumpukan sampah atau pembuangan limbah yang tidak memenuhi syarat (Alqadri,2013)

Penting dicatat bahwa keberadaan pencemaran memerlukan suatu penilaian yang subjektif, apakah pengaruh buruk terjadi atau tidak. Kenyataannya, terdapat pertentangan pendapat dalam hal ini, sebagai contoh, pada saat zat hara makanan tumbuhan dilepaskan diperairan, akan menyebabkan penambahan jumlah tumbuhan yang ada dan sering kali penggabungannya memperbanyak jumlah ikan. Jadi, nelayan akan menganggap tindakan ini menguntungkan dan dengan demikian bukanlah pencemaran. Sebaliknya, pihak pengelola pasokan air

minum mungkin menemukan bahwa kandungan ganggang dalam air akan bertambah dan pengukuran penanggulangannya diperlukan untuk mendapatkan kualitas air minum yang memadai. Jadi pihak pengelola akan menganggap bahwa pencemaran telah terjadi. Karena penilaian subjektif yang dilakukan manusia, “Faktor Manusia” merupakan hal yang kritis dalam pengelolaan pencemaran (Pohan,2004).

2. Klasifikasi Bahan Pencemar Udara

a. Polutan Primer

Polutan primer adalah polutan yang dikeluarkan langsung ke udara sebagai hasil dari suatu proses. Jenis polutan ini berada di udara dalam bentuk yang tetap sama dengan bentuk pada saat dikeluarkan. Polutan Primer berupa polutan gas yang terdiri dari senyawa karbon, sulfur, nitrogen dan senyawa halogen seperti flour, klorin, hidrogen, klorida dan bromin.

b. Polutan Sekunder

Polutan sekunder adalah polutan yang terbentuk dari hasil interaksi kimia antara polutan dan unsur udara normal di atmosfer. Polutan sekunder biasanya terjadi karena reaksi dari dua atau lebih bahan kimi di udara, misalnya reaksi forokimia. Sebagaimana contoh adalah adanya sinara matahari yang dapat menyebabkan disosiasi NO_2 sehingga menghasilkan forokimia oksidan NO dan radikal oksidan. Proses kecepatan dan arah reaksinya dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- 1) Konsentarsi relatif dari bahan reaktan
- 2) Derajat fotoaktif

3) Kondisi Iklim

4) Topografi lokal dan adanya embun

Polutan sekunder ini mempunyai sifat fisik dan sifat kimia yang tidak stabil. termaksud dalam polutan sekunder ini adalah ozon, *Peroxy Acyl Nitrat* (PAN) dan *formaldehid* (Mukono, 2008).

Menurut Purba (2008) sumber bahan pencemar primer dapat dibagi lagi menjadi dua golongan besar:

a) Sumber Alamiah

Beberapa kegiatan alam yang bisa menyebabkan pencemaran udara adalah kegiatan gunung berapi, kebakaran hutan, kegiatan mikroorganismes dan lain-lain. Bahan pencemar yang dihasilkan umumnya adalah gas, asap dan debu.

1) Gas

Gas terdiri atas:

- Senyawa karbon yakni hidrokarbon, hidrokarbon teroksigenasi dan karbondioksida (CO).
- Senyawa sulfur, yaitu sulfur oksida
- Senyawa nitrogen yaitu nitrogen oksida dan amoniak
- Senyawa halogen yaitu flour, klorin, hidrogen klorida, hidrogen terklorinasi, timbal dan bromin.

Penyebab terjadinya pencemaran lingkungan di atmosfer biasanya berasal dari sumber pencemaran kendaraan bermotor dan atau industri. Bahan pencemar yang dihasilkan antara lain gas NO₂, SO₂, SO₃, ozon, CO, HC, Pb, dan partikel debu. Gas NO₂, SO₂, HC dan CO dapat dihasilkan oleh

proses pembakaran dari mesin yang menggunakan bahan bakar yang berasal dari bahan bakar fosil (Mukono,2008)

2) Partikel

Partikel yang di atmosfer mempunyai karakteristik yang spesifik, dapat berupa zat padat maupun suspensi aerosol cair di atmosfer. Bahan partikel tersebut dapat berasal dari proses kondensasi, proses dispersi (misalnya proses penyemprotan/*spraying*) melalui proses erosi bahan tertentu.

3) Asap

Asap (*Smoke*) seringkali dipakai untuk menunjukkan campuran bahan partikulat (*partikulat matter*), uap (*fumes*), gas dan kabut (*mist*) (Mukono,2008).

Adapun yang dimaksud dengan:

- Asap, adalah partikel karbon yang sangat halus (sering disebut sebagai jelaga) dan merupakan hasil pembakaran yang tidak sempurna.
- Debu, adalah partikel padat yang dapat dihasilkan oleh manusia atau alam dan merupakan hasil dari proses pemecahan suatu bahan.
- Uap, adalah partikel padat yang merupakan hasil dari proses sublimasi, distilasi atau reaksi kimia.
- Kabut, adalah partikel cair yang merupakan hasil kondensasi dari uap air.

b) Sumber buatan manusia

Kegiatan manusia yang menghasilkan bahan-bahan pencemar bermacam-macam, seperti Industri dianggap sebagai sumber pencemar karena aktivitas industri merupakan bagian yang sangat tampak dalam pembahasan berbagai

senyawa kimia ke lingkungan. Sebagian jenis gas dapat di pandang sebagai pencemar udara apabila kadar gas tersebut melebihi tingkat kadar normal dan dapat berasal dari sumber alami seperti gunung merapi, kebakaran hutan dan nitrifikasi biologi serta berasal dari kegiatan manusia seperti pengangkutan, transportasi, kegiatan rumah tangga, industri, pembangkitan daya yang menggunakan bahan bakar fosil, pembakaran sampah dan pembakaran sisa pertanian.

Pencemaran udara ini berupa emisi gas buang atau yang biasa kita sebut dengan asap knalpot, muncul karena adanya proses pembakaran. Adapun pengertian dari pembakaran adalah proses oksidasi yang cepat suatu bahan bakar dan pembakaran yang komplit hanya mungkin jika ada suatu oksigen cukup. Tujuan dari pembakaran yang baik adalah melepaskan seluruh panas yang terdapat dalam bahan bakar. Hal ini dilakukan dengan pengontrolan “tiga T” pembakaran yaitu *Temperature* atau suhu yang cukup tinggi untuk menyalakan dan menjaga penyalaan bahan bakar, *Turbulence* atau turbulensi atau pencampuran oksigen dan bahan bakar yang baik, dan *Time* atau waktu yang cukup untuk pembakaran yang sempurna. Terlalu banyak, atau terlalu sedikitnya bahan bakar pada jumlah udara pembakaran tertentu, dapat mengakibatkan tidak terbakarnya bahan bakar dan terbentuknya karbon monoksida (Anggraeni, 2009).

Komponen utama bahan bakar fosil yang beberapa diantaranya digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor adalah hidrogen (H) dan karbon (C). Pada pembakaran bahan bakar yang sempurna maka yang dihasilkan adalah

gas CO_2 dan H_2O . Pembakaran yang sempurna ini terjadi hanya jika ada pasokan oksigen yang cukup. Jika tidak sempurna, maka akan dihasilkan senyawa hidrokarbon (HC), karbon monoksida (CO), karbon dioksida (CO_2), timbal, serta nitrogen Oksida (NO_x) pada kendaraan berbahan bakar bensin. Sedangkan pada kendaraan berbahan bakar solar, gas buangnya mengandung sedikit HC dan CO tetapi lebih banyak sulfur oksida (SO_x) (Anggraeni, 2009).

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencemaran udara

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi pencemaran udara di atmosfer, misalnya:

a) Kelembaban

Kelembaban udara relatif yang rendah (<60%) di daerah tercemar SO_2 akan menyebabkan efek korosif dari bahan kimia tersebut. Pada kelembaban relatif lebih atau sama dengan 80% di daerah tercemar SO_2 akan terjadi peningkatan efek korosif SO_2 tersebut.

b) Suhu

Suhu yang menurun pada permukaan bumi dapat menyebabkan peningkatan kelembaban udara relatif, sehingga akan meningkatkan efek korosif bahan pencemar di daerah yang udaranya tercemar. Pada suhu yang meningkat, akan meningkatkan pula kecepatan reaksi suatu kimia.

c) Sinar Matahari

Sinar matahari dapat mempengaruhi bahan oksidan ozon di atmosfer. Keadaan tersebut dapat menyebabkan kerusakan bahan/alat bangunan atau bahan yang

terbuat dari karet. Jadi dapat dikatakan bahwa sinar matahari dapat meningkatkan rangsangan untuk merusak baeang

d) Pergerakan Udara

pergerakan udara yang cepat dapat meningkatkan abrasi bahan bangunan (Mukono 2008)

4. Proses terjadinya pencemaran udara

Menurut Sastrawijaya (2009), proses terjadinya pencemaran udara dapat dibagi dalam tiga proses yaitu:

a) *Atrition* (gesekan)

Terjadi pada setiap aspek kehidupan mulai dari yang sederhana seperti gesekan sepatu dan rantai, gesekan ban mobil dan jalan raya, sampai proses yang lebih kompleks seperti penyebaran partikel-partikel ke udara melalui proses sanding (pemecahan) batuan, grinding (pemotongan), drilling (pengeboran) dan spraying (penyemprotan).

b) *Vaporazation* (penguapan)

Adalah suatu bentuk perubahan fase cairan menjadi gas. Perubahan bentuk tersebut dapat disebabkan oleh pengaruh tekanan dan pemanasan.

c) *Combustion* (pembakaran)

Pencemaran udara dapat bersumber dari pembakaran. Pembakaran bensin dalam kendaraan bermotor merupakan separuh penyebab polusi udara. Pembakaran tersebut dapat berlangsung sempurna maupun tidak sempurna yang dapat menimbulkan pencemaran.

5. Dampak bahan pencemar udara dan dampaknya terhadap kesehatan dan lingkungan

a. Dampak terhadap Kondisi Atmosfer

Dampak negatif bahan pencemar udara terhadap kondisi fisik atmosfer antara lain adalah:

- 1) Gangguan jarak pandang
- 2) Memberikan warna tertentu pada atmosfer
- 3) mempengaruhi struktur dari awan
- 4) mempengaruhi keasaman air hujan

b. Dampak terhadap Ekonomi

Dampak negatif bahan pencemar udara terhadap faktor yang berhubungan dengan ekonomi antara lain:

- 1) Meningkatkan biaya rehabilitasi karena rusaknya bahan
- 2) Meningkatnya biaya pemeliharaan

c. Dampak terhadap Vegetasi

Dampak negatif bahan pencemar udara terhadap kehidupan vegetasi antara lain ialah:

- 1) Perubahan morfologi, pigmen dan kerusakan fisiologi sel tumbuhan terutama pada daun
- 2) Mempengaruhi pertumbuhan vegetasi
- 3) Mempengaruhi proses produksi tanaman
- 4) Mempengaruhi komposisi komunitas tanaman

5) Terjadinya akumulasi bahan pencemar pada vegetasi tertentu (misalnya lumut kerak) dan mempengaruhi kehidupan serta morfologi vegetasi tersebut.

d. Dampak terhadap Kehidupan Hewan

Dampak terhadap kehidupan hewan, dapat terjadi karena adanya proses biokumulasi dan keracunan bahan berbahaya, sebagai contoh adalah terjadinya migrasi burung karena udara ambien terpapar oleh gas SO_2 .

e. Dampak terhadap Kesehatan Manusia secara Umum

Efek yang ditimbulkan oleh polutan tergantung dari besar pajanan (terkait dosis/kadarnya di udara dan lama/waktu pajanan) dan juga faktor kerentanan *host* (individu) yang bersangkutan (efek buruk lebih mudah terjadi pada anak, individu pengidap jantung- pembuluh darah dan pernapasan serta penderita diabetes militus). Selain faktor zat aktif yang dibawa oleh polutan tersebut, ukuran polutan juga menentukan lokasi anatomis terjadinya deposit polutan dan juga efeknya terhadap jaringan sekitar

B. Tinjauan Umum Gas Karbon Monoksida (CO)

1. Pengertian Karbon Monoksida (CO)

Karbon Monoksida (CO) adalah gas yang tidak berbau, tidak berasa dan juga tidak berwarna (Wardhana, 2004). Gas CO dapat berbentuk cairan pada suhu $-129^{\circ}C$. Gas CO sebagian besar berasal dari pembakaran fosil dengan udara berupa gas buangan. Di kota besar yang padat lalu lintasnya akan banyak menghasilkan gas CO sehingga kadar CO dalam udara relatif tinggi dibandingkan

dengan daerah pedesaan. Selain itu, Gas CO dapat pula terbentuk dari proses industri (Saputra,2011).

Karbon Monoksida (CO) adalah suatu gas yang tidak berwarna dan tidak berbau yang dihasilkan oleh pembakaran tidak sempurna material yang mengandung zat arang atau bahan organik, baik dalam alur pengolahan hasil jadi industri, ataupun proses di alam lingkungan. Ia terdiri dari satu bahan atom karbon senyawa kovalen berikatan dengan satu atom oksigen. Dalam ikatan ini, terdapat pula dua ikatan kovalen dan satu ikatan kovalen koordinasi antara atom oksigen dan karbon (Anggareni, 2009).

Satuan konsentrasi CO di udara adalah ppm atau parts per million. Untuk mengukur kadar CO tersebut, digunakan gas analyzer dengan satuan persen volume. Dimana 1 setara dengan 10-4%. Selain dihasilkan oleh pembakaran tidak sempurna di luar tubuh, gas CO juga dihasilkan dalam jumlah kecil (kurang dari 0,5%) dari katabolisme normal cincin protoporfirin hemoglobin di dalam tubuh dan tidak toksik dalam tubuh (Anggareni, 2009).

a. Sifat Fisika dan Kimia CO

Karbon dan oksigen dapat bergabung membentuk senyawa karbon monoksida (CO) hasil pembakaran yang tidak sempurna dan karbon dioksida (CO₂) sebagai hasil pembakaran sempurna. Karbon monoksida merupakan senyawa yang tidak berbau, tidak berasa dan pada suhu udara normal berbentuk gas yang tidak berwarna. Tidak seperti senyawa CO mempunyai potensi bersifat racun yang berbahaya karena mampu membentuk ikatan yang kuat dengan pigmen darah yaitu hemoglobin.

b. Sumber dan Distribusi CO

Karbon monoksida di lingkungan dapat terbentuk secara alamiah, tetapi sumber utamanya dari kegiatan manusia. Karbon monoksida yang berasal dari alam termaksud dari lautan, oksidasi metal di atmosfer, pegunungan, kebakaran hutan dan badai listrik alam.

Sumber CO buatan antara lain kendaraan bermotor, terutama yang menggunakan bahan bakar bensin. Berdasarkan estimasi, Jumlah CO dari sumber buatan diperkirakan mendekati 60 juta ton per tahun. Separuh dari jumlah ini berasal dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin dan sepertiganya berasal dari sumber tidak bergerak seperti pembakaran batubara dan minyak dari industri dan pembakaran sampah domestik. Di dalam laporan WHO (1992) dinyatakan paling tidak 90% dari CO di udara perkotaan berasal dari emisi kendaraan bermotor. Selain itu asap rokok juga mengandung CO, sehingga para perokok dapat memajan dirinya dari asap rokok yang sedang dihisapnya. Sumber CO dari dalam ruang (Indoor) termaksud dari tungku dapur rumah tangga dan tungku pemanas ruang. Dalam beberapa penelitian ditemukan kadar CO yang cukup tinggi di dalam kendaraan sedan maupun bus.

Kadar CO di perkotaan cukup bervariasi tergantung dari kepadatan kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin dan umumnya ditemukan kadar maksimum CO yang bersamaan dengan jam-jam sibuk pada pagi hari dan malam hari.

Selain cuaca, Variasi dari kadar CO juga dipengaruhi oleh topografi jalan dan bangunan sekitarnya. Pemajanan CO dari udara ambien dapat direfleksikan

dalam bentuk kadar karboksi-hemoglobin (HbCO) dalam darah yang terbentuk dengan sangat perlahan karena butuh waktu 4-12 jam untuk tercapainya keseimbangan antara kadar CO di udara dan HbCO dalam darah, Oleh karena itu kadar CO didalam lingkungan, cenderung dinyatakan sebagai kadar rata-rata dalam 8 jam pemajanan. Data CO yang dinyatakan dalam rata-rata setiap 8 jam pengukuran sepanjang hari adalah lebih baik dibandingkan dari kadar CO yang dinyatakan dalam rata-rata dari 3 kali pengukuran pada periode waktu 8 jam yang berbeda dalam sehari. Perhitungan tersebut akan lebih mendekati gambaran dari respon tubuh manusia terhadap keracunan CO dari udara.

Beberapa individu juga dapat terpajan oleh CO karena lingkungan kerjanya, kelompok masyarakat yang paling terpajan CO termasuk polisi lalu lintas atau tukang parkir, pekerja bengkel mobil, petugas industri logam, industri bahan bakar bensin, industri gas kimia dan pemadam kebakaran.

Pemajanan CO dari lingkungan kerja seperti yang telah disebutkan di atas perlu mendapatkan perhatian. Misalnya kadar CO di bengkel kendaraan bermotor ditemukan mencapai setinggi $600 \mu\text{g}/\text{m}^3$ dan didalam darah para pekerja bengkel tersebut bisa mengandung HbCO sampai lima kali lebih tinggi dari kadar normal. Para petugas yang bekerja di jalan raya diketahui mengandung HbCO dengan kadar 4-7,6% (perokok) dan 1,4-3,8% (bukan perokok) selama sehari bekerja. Sebaliknya kadar HbCO pada masyarakat umum jarang yang melampaui 1% walaupun studi yang dilakukan di 18 kota besar di Amerika Utara menunjukkan bahwa 45% dari masyarakat bukan perokok yang terpajan oleh CO di udara, di dalam darahnya terkandung HbCO melampaui 1,5 %. Perlu juga

diketahui bahwa manusia sendiri dapat memproduksi CO didalam tubuhnya sendiri akibat proses metabolismenya yang normal.

Berdasarkan SNI 19-0232-2005 nilai ambang batas karbon monoksida di udara adalah 25 ppm.

c. Proses pembentukan Karbon monoksida (CO) dalam gas buang

Gas Karbon Monoksida (CO) dihasilkan dari pembakaran yang tidak sempurna akibat dari pencampuran bahan bakar dan udara yang terlalu kaya. Boleh dikatakan bahwa terbentuknya karbon monoksida (CO) sangat tergantung dari perbandingan campuran bahan bakar dan udara yang masuk dalam ruang bakar. Menurut teori bila terdapat oksigen yang melebihi perbandingan campuran teori/ideal (campuran menjadi terlalu kurus) maka tidak akan termaksud CO. Tetapi kenyataannya CO juga dihasilkan pada saat kondisi campuran kurus. Tiga alasan untuk kondisi di atas adalah (Irawan,2003) :

1) Pada proses selanjutnya CO akan berubah menjadi CO₂



Akan tetapi reaksi ini lambat dan tidak dapat merubah seluru sisa CO menjadi CO₂. Oleh sebab itu campuran yang kurus sekalipun masih juga menghasilkan emisi CO.

2) Pembakaran yang tidak merata yang ditimbulkan dari tidak meratanya suplai/distribusi bahan bakar di dalam ruang bakar.

3) Temperatur di sekeliling silinder yang rendah, yang pada akhirnya menyebabkan peristiwa *Quenching*, artinya temperatur terlalu rendah untuk terjadinya pembakaran, sehingga api tidak mencapai daerah ini di dalam silinder.


d. Mekanisme Keterpaparan Gas CO dan Gejala Keracunan CO

Karbonmonoksida (CO) merupakan racun yang cukup lama dalam sejarah manusia. Sumber utama dari CO adalah asap knalpot kendaraan terutama mesin berbahan bakar bensin. Sumber pencemaran udara juga dapat disebabkan oleh berbagai kegiatan alam, seperti kebakaran hutan, gunung meletus, gas alam beracun, dll. Dampak dari pencemaran udara tersebut menyebabkan penurunan kualitas udara, yang berdampak negatif terhadap kesehatan manusia (Akmal, 2009).

Pencemaran udara ini berupa emisi gas buang atau yang biasa kita sebut dengan asap knalpot, muncul karena adanya proses pembakaran. Adapun pengertian dari pembakaran adalah proses oksidasi yang cepat suatu oksigen cukup. Tujuan dari pembakaran yang baik adalah melepaskan seluruh panas yang terdapat dalam suatu bahan bakar. Komponen utama bahan bakar fosil, yang beberapa diantaranya digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor adalah Hidrogen (H) dan Karbon (C). Pada pembakaran bahan bakar yang sempurna maka yang dihasilkan adalah gas CO₂ dan H₂O. Pembakaran yang sempurna ini terjadi hanya jika ada pasokan oksigen yang cukup. Jika tidak sempurna, maka akan dihasilkan senyawa Hidrokarbon (HC), Karbon monoksida (CO), Karbondioksida, timbal (Pb) serta Nitrogen oksida pada

kendaraan berbahan bakar bensin. Sedangkan pada kendaraan berbahan bakar solar, gas buangnya mengandung sedikit HC dan CO tetapi lebih banyak sulfur oksida (Anggaraeni, 2009).

Diantara gas-gas yang beracun tersebut, yang perlulebih banyak mendapat perhatian adalah gas karbon monoksida (CO) karena pengaruhnya yang besar terhadap kesehatan manusia




Gambar 2.1 Sumber Pencemar Udara

Karbon monoksida (CO) adalah gas yang tidak berbau, tidak berasa dan juga tidak berwarna. Oleh karena itu lingkungan yang telah tercemar oleh gas CO tidak dapat dilihat oleh mata. Gas CO dapat berbentuk cairan pada suhu -192°C. Di udara gas CO terdapat dalam jumlah yang sangat sedikit, hanya sekitar 0,1 ppm. Di daerah perkotaan dengan lalu lintas yang sangat padat konsentrasi gas CO berkisar antara 10-15 ppm. Sudah sejak lama diketahui bahwa gas CO dalam jumlah banyak (konsentrasi tinggi) dapat menyebabkan gangguan kesehatan, bahkan juga dapat menimbulkan kematian.


Karbon monoksida (CO) apabila terhisap ke dalam paru-paru akan ikut peredaran darah dan akan menghalangi masuknya oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh. Hal ini dapat terjadi karena CO bersifat racun metabolis, ikut bereaksi secara metabolis dengan darah. Seperti halnya oksigen, gas CO mudah bereaksi dengan darah (hemoglobin):



Ternyata ikatan karbon monoksida dengan darah (karboksihemoglobin) jauh lebih stabil dari pada ikatan oksigen dengan darah (oksihemoglobin). Kestabilan karboksihemoglobin kira-kira 140 kali kestabilan oksihemoglobin. Keadaan ini menyebabkan darah menjadi lebih mudah menangkap gas CO dan menyebabkan fungsi vital darah sebagai pengangkut oksigen terganggu.



Gambar 2.2. Sistem Pernapasan pada Manusia



Dalam keadaan normal hemoglobin berfungsi sebagai pembawa atau pengangkut oksigen (O_2) dalam bentuk oksihemoglobin dari paru-paru dibagikan kepada sel-sel tubuh yang memerlukannya. Selain dari itu, hemoglobin juga berfungsi mengambil gas CO_2 (karbondioksida) hasil pembakaran di dalam tubuh (dari sel-sel) dalam bentuk karbondioksihemoglobin untuk dibuang keluar melalui paru-paru.

Konsentrasi gas CO sampai dengan 100 ppm masih dianggap aman kalau waktu kontak hanya sebentar. Gas CO sebanyak 30 ppm apabila dihisap oleh manusia selama 8 jam akan menimbulkan rasa pusing dan mual. Konsentrasi CO sebanyak 1000 ppm dan waktu paparan (kontak) selama 1 jam menyebabkan pusing dan kulit berubah menjadi kemerah-merahan. Untuk paparan yang sama dengan konsentrasi CO 1300 ppm, kulit akan langsung berubah menjadi merah tua dan disertai rasa pusing yang hebat. Untuk keadaan yang lebih tinggi lagi, akibatnya akan lebih fatal lagi, yaitu kematian. Bagaimana diagram aliran darah dalam fungsinya sebagai pengangkut oksigen untuk dibagikan ke bagian tubuh yang memerlukan oksigen, maupun fungsi sebagai pengambil karbondioksida yang dihasilkan oleh bagian tubuh untuk dibuang keluar paru-paru.

Ikatan karbon monoksida dengan darah (hemoglobin) yang begitu kuat, kurang lebih 140 kali lebih kuat dari ikatan oksigen dengan darah, menyebabkan darah tidak berfungsi normal sebagai pengangkut oksigen manakala karbon dioksida masuk dalam darah. Pengaruh karbon monoksida (CO) terhadap tubuh manusia ternyata tidak sama untuk manusia yang stau

dengan yang lain. Daya tahan tubuh manusia ikut menentukan toleransi tubuh terhadap pengaruh adanya karbon monoksida. Para olahragawan pada umumnya mempunyai toleransi yang tinggi terhadap racun gas karbon monoksida. Orang menderita kekurangan darah (anemia) dan anak-anak akan mudah keracunan gas karbonmonoksida.

Keracunan gas karbon monoksida (CO) dapat ditandai dari keadaan yang ringan, berupa pusing, sakit kepala dan mual. Keadaan yang lebih berat dapat berupa menurunnya kemampuan gerak tubuh, gangguan pada sistem kardiovaskular, serangan jantung sampai pada kematian. Pertolongan bagi orang yang keracunan gas karbon monoksida pada tingkat yang relatif masih ringan dapat dilakukan dengan membawa korban ke tempat yang berudara terbuka (segar) dan memberikan kesempatan kepada korban untuk bernafas dalam-dalam. Masuknya udara segar (oksigen) kedalam tubuh korban akan mengubah karboksihemoglobin menjadi menjadi oksihemoglobin berdasarkan reaksi keimbangan berikut ini:



Walaupun dikatakan bahwa reaksi tersebut diatas adalah reaksi keseimbangan, namun apabila udara masuk ke dalam tubuh cukup banyak maka pada akhirnya reaksi akan bergeser terus di kanan sampai semua karboksihemoglobin habis menjadi oksihemoglobin yang memang diperlukan oleh tubuh manusia. Pada umumnya keracunan gas karbon monoksida tidak bersifat kumulatif. Kerusakan permanen hanya terjadi apabila ada sel vital

(contohnya sel-sel otak) yang mengalami kekurangan oksigen dalam waktu yang relatif cukup lama.

Konsentrasi gas karbon monoksida (CO) di udara secara langsung akan mempengaruhi konsentrasi karboksihemoglobin (COHb). Bila konsentrasi gas CO di udara tetap maka konsentrasi COHb di dalam darah akan mencapai keseimbangan tertentu dan akan tetap bertahan selama tidak ada perubahan pada konsentrasi CO di udara. Dalam keadaan normal sebenarnya darah sudah mengandung COHb sebanyak 0,5%, berasal dari proses metabolisme di dalam tubuh, terutama merupakan hasil pemecahan heme komponen hemoglobin dalam darah itu sendiri, ditambah lagi dari konsentrasi CO yang terdapat di udara dalam konsentrasi rendah. Hubungan antara konsentrasi COHb dalam darah dengan konsentrasi CO di udara (<100 ppm) adalah sebagai berikut:

$$\% \text{ COHb dalam darah} = 0,16 (\text{konsentrasi CO di udara}) + 0,5$$

Berdasarkan persamaan hubungan konsentrasi COHb dalam darah dengan konsentrasi CO di udara tersebut dapat di buat tabel sebagai berikut

Tabel 2.1 Pengaruh konsentrasi CO di udara dan pengaruhnya pada tubuh bila kontak terjadi pada waktu yang lama

Konsentrasi CO di udara (ppm)	Konsentrasi COHb dalam darah (%)	Gangguan pada tubuh
3	0,98	Tidak ada
5	1,3	Belum begitu terasa
10	2,1	Sistem saraf sentral
20	3,7	Panca indra
40	6,9	Fungsi jantung

60	10,1	Sakit Kepala
80	13,3	Sulit bernafas
100	16,5	Pingsan – kematian

Sumber: Wardhana, 2004

Gejala toksisitas atau keracunan ringan meliputi sakit kepala dan mual-mual pada konsentrasi kurang dari 100 ppm. Konsentrasi serendah 667 ppm dapat menyebabkan 50% hemoglobin tubuh berubah menjadi karboksihemoglobin (HbCO). Karboksihemoglobin cukup stabil, namun perubahan ini bias reversibel atau dapat kembali ke keadaan awal. Karboksihemoglobin tidaklah efektif dalam menghantarkan oksigen di dalam sistem sirkulasi atau transportasi darah. Karena itu beberapa bagian tubuh tidak mendapatkan oksigen yang cukup. Sebagai akibatnya, paparan pada tingkat ini dapat membahayakan jiwa. Di Amerika Serikat, organisasi Administrasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja membatasi paparan gas karbon monoksida di tempat kerja sebesar 50 ppm maksimal.

Mekanisme bagaimana karbon monoksida mengakibatkan efek keracunan belum sepenuhnya dimengerti. Kebanyakan pengobatan akibat keracunan gas karbon monoksida adalah memberikan 100% oksigen atau terapi oksigen heperbarik, Walaupun pengobatan ini masih kontroversial. Keracunan karbon monoksida domestik dapat dicegah dengan menggunakan gas detektor yang ada sensor untuk mendeteksi gas ini, Bisa juga alat khusus detektor karbon monoksida baik yang dipasang secara tetap maupun yang portabel.

Umumnya rute keterpaparan gas karbon monoksida adalah melalui jalan pernapasan atau rute terhirup atau inhalasi (*inhalation route*). Gas ini

dikelompokkan sebagai bahan kimia asfiksia (asphyxiate). Ia mengakibatkan racun dengan cara meracuni hemoglobin (Hb) darah. Hb berfungsi mengikat darah dalam bentuk HbO. Setelah CO mengikat hemoglobin darah terbentuk ikatan: HbCO maka otomatis oksigen akan terusir. Dengan mekanisme ini, tubuh mengalami kekurangan oksigen dan gejala asfiksia atau kekurangan oksigen akan terjadi. Sebab afinitas atau sifat pengikatan atau daya lengket karbon monoksida ke hemoglobin darah dibandingkan dengan oksigen jauh lebih besar sebanyak 200 – 3-000 kali lipat. Dalam jumlah sedikit pun gas karbon monoksida jika terhirup dalam waktu tertentu dapat menyebabkan gejala racun terhadap tubuh.

e. Dampak CO terhadap Kesehatan

CO bereaksi dengan Fe dari porfirin dan karena itu CO bersaing dengan oksigen dalam mengikat protein heme yaitu hemoglobin, mioglobin, sitokrom oksidase (sitokroma, a₃) dan sitokrom P-450, peroksidase dan katalase. Yang terpenting adalah reaksi CO dengan Hb dan sitokrom a₃. Dengan diikatnya Hb menjadi COHb mengakibatkan Hb menjadi inaktif sehingga darah berkurang kemampuan untuk mengangkut oksigen. Selain itu adanya COHb dalam darah akan menghambat disosiasi Oxi-Hb. Dengan demikian jaringan akan mengalami hipoksia. Reaksi CO dengan sitokrom a₃ yang merupakan link yang penting dalam sistem enzim pernafasan sel dan mengakibatkan hipoksia jaringan.

Konsentrasi CO dalam udara lingkungan dan lamanya inhalasi/paparan menentukan kecepatan timbulnya gejala-gejala atau kematian. 50 ppm

(0,005%) adalah TLV (*Threshold Limit Value*) gas CO, yaitu konsentrasi CO dalam udara lingkungan yang dianggap aman pada inhalasi selama 8 jam setiap hari dan 5 hari setiap minggu untuk jumlah tahun yang tidak terbatas. Pada 200 ppm (0,02 %) inhalasi 1-3 jam akan mengakibatkan kadar COHb mencapai 15 – 20 % saturasi dan gejala keracunan CO mulai timbul. Pada 1000 ppm (0,1 %), inhalasi 3 jam dapat menyebabkan kematian. Sedangkan pada 3000 ppm (0,3%), inhalasi 2 jam sudah dapat menyebabkan kematian. Pada 10.000 ppm (1%), inhalasi 15 menit dapat menyebabkan kehilangan kesadaran dengan COHb 50% saturasi, sedangkan inhalasi 20 menit menyebabkan kematian dengan 80% saturasi.

Faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi toksisitas CO yaitu aktivitas fisik dan penyakit yang menyebabkan gangguan oksigenasi jaringan seperti arteriosklerosis pembuluh darah otak dan jantung, emfisema paru, asma bronchial, TBC paru dan penyakit metabolik serta obat-obatan yang menyebabkan depresi susunan saraf pusat, contohnya alkohol, barbiturat dan morfin.

C. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian

SD Negeri Kakatua adalah salah satu sekolah dasar yang ada di Kota Makassar yang berlokasi di Jl. Gagak No.24 Kelurahan Mariso Kecamatan Mariso Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Sekolah ini berdiri sejak tahun 1910 dan terakreditasi A pada tahun pelajaran 2003 – 2004. Sekolah ini memiliki luas 1040 m² dengan ruangan kelas berjumlah 12 ruangan dalam 2 lantai.

1. Visi dan Misi

Visi

“Mewujudkan warga sekolah yang unggul imtaq, iptek, dan pengembangan kreativitas diri serta berperilaku peduli dan sadar lingkungan”

Misi

- a. Melaksanakan kegiatan yang dapat meningkatkan prestasi di bidang IPTEK dan IMTAQ.
- b. Melaksanakan kegiatan kerohanian, ekstrakurikuler dan pembiasaan.
- c. Berperan aktif dalam mewujudkan pelestarian lingkungan, mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- d. Mewujudkan lingkungan sekolah yang bebas dari sampah plastik sebagai upaya perlindungan terhadap pencemaran lingkungan.
- e. Mewujudkan lingkungan yang sehat, rindang dan asri sebagai upaya melestarikan dan pengelolaan lingkungan hidup.

1. Data Penerimaan Siswa Baru

Tabel 2.2

Data Penerimaan Siswa Baru
SD Negeri Kakatua Kota Makassar Tahun ajaran 2016/2017

Rencana diterima		Siswa Baru yang diterima			Rata-rata umur		
Tahun	Jumlah	L	P	Jumlah	Tertinggi	Terendah	Rata-rata
2012/2013	73	37	36	73	7	6,8	6,5

2013/2014	64	38	29	67	7	6,8	6,5
2014/2015	66	27	39	39	7	6,8	6,5
2015/2016	66	31	35	35	7	6,8	6,5
2016/2017	63	32	31	31	7	6,8	6,5

Sumber: Data Sekunder, 2017

2. Data Jumlah Siswa Tahun Pelajaran 2016/2017

Tabel 2.3

Data Jumlah Siswa

SD Negeri Kakatua Kota Makassar Tahun ajaran 2016/2017

Kelas		Jumlah Siswa	Total
Kelas 1	A	32	63
	B	31	
Kelas 2	A	32	63
	B	31	
Kelas 3	A	31	63
	B	32	
Kelas 4	A	32	71
	B	39	
Kelas 5	A	33	68
	B	35	
Kelas 6	A	41	83
	B	42	
TOTAL			411

Sumber: Data Sekunder, 2017

3. Data Keadaan Guru

Tabel 2.4

Data Keadaan Guru

SD Negeri Kakatua Kota Makassar Tahun ajaran 2016/2017

	Guru		Jumlah
	PNS	Non PNS	

Guru Kelas	8	2	10
Guru Penjas	1	1	2
Guru PAI	-	2	2
Guru PAK	-	-	-
Guru Mulok		1	1
Jumlah	9	6	15

Sumber: Data Sekunder, 2017

4. Data Penjaga Sekolah/Tenaga Administrasi

Tabel 2.5
Data Penjaga Sekolah/Tenaga Administrasi
SD Negeri Kakatua Kota Makassar Tahun ajaran 2016/2017

Penjaga Sekolah/Tenaga Administrasi		Jumlah
Staff Tata Usaha	PNS	
	Non PNS	1
Pustakawan	PNS	
	Non PNS	1
Bujang Sekolah/Cleaning Service	PNS	
	Non PNS	2

Sumber: Data Sekunder, 2017

D. Tinjauan Umum tentang Pencemaran udara dalam perspektif Islam

Masalah kesehatan lingkungan utama yang terjadi di dunia adalah pencemaran udara, terutama terjadi di negara – negara yang sedang berkembang (Arista,2015). Pencemaran udara adalah masuk atau

dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya (PP RI No.41 Tahun 1999).

Pencemaran udara dapat disebabkan oleh sumber alamiah dan akibat perbuatan manusia (Chandra, 2015).Perbuatan manusia baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja secara sadar dan tidak sadar dapat menyebabkan terjadinya peningkatan pencemaran udara. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Ruum/30:41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ

يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Terjemahnya:

Telah tampak kerusakan di darat dan laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar) (Departemen Agama RI, 2013).

Ditinjau dari *asbab al-nuzul* surat Ar-Rum ayat 41, maka Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa surat Ar-Rum ayat 41 itu menjadi petunjuk bahwa berkurangnya hasil tanam-tanaman dan buah-buahan adalah karena banyak perbuatan maksiat yang dikerjakan oleh para penghuninya. Abul Aliyah mengatakan bahwa barang siapa yang berbuat durhaka kepada Allah di bumi, berarti dia telah berbuat kerusakan di bumi, karena terpeliharanya kelestarian bumi dan langit adalah dengan ketaatan.

Sesudah Allah menjelaskan bahwa timbulnya kerusakan sebagai akibat dari perbuatan tangan manusia sendiri, lalu Dia memberikan petunjuk kepada mereka, bahwa orang-orang sebelum mereka pernah melakukan hal yang sama seperti apa yang telah dilakukan oleh mereka. Akhirnya mereka tertimpa azab dari sisi-Nya, sehingga mereka dijadikan pelajaran buat orang-orang yang sesudah mereka dan sebagai perumpamaan-perumpamaan bagi generasi selanjutnya.

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa terjadinya kerusakan – kerusakan di muka bumi ini disebabkan oleh perbuatan manusia. Allah SWT memberi peringatan dengan kerusakan itu agar manusia sadar akibat dari perbuatannya dan kembali ke jalan Allah SWT.

Dari ayat di atas juga dapat dipahami bahwa sebelum adanya teori dari para ahli yang menyimpulkan bahwa pencemaran udara dapat disebabkan oleh perbuatan manusia, Allah SWT telah berfirman dalam Al-Qur'an bahwa kerusakan – kerusakan di muka bumi dalam hal ini pencemaran udara disebabkan oleh perbuatan manusia.

Salah satu hal yang dapat menyebabkan turunnya konsentrasi CO di udara adalah dengan turunnya hujan. Adapun hadist para ulama tentang turunnya hujan sebagai rahmat Allah yaitu:

“Telah menceritakan kepada kami Isma'il telah menceritakan kepadaku Malik dari Shalih bin Kaisan dari 'Ubaidullah bin 'Abdullah bin 'Utbah bin Mas'ud dari Zaid bin Khalid Al Juhaini bahwa dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memimpin kami shalat Shubuh di Hudaibiyyah pada suatu malam sehabis turun hujan. Selesai shalat beliau menghadapkan wajahnya kepada orang banyak lalu bersabda: "Tahukah kalian apa yang sudah difirmankan oleh Rabb kalian?" Orang-orang menjawab, "Allah dan rasul-Nya lebih mengetahui." Beliau lalu bersabda: "Allah berfirman: 'Di pagi ini ada hamba-hamba Ku yang menjadi Mukmin kepada-Ku dan ada pula yang kafir.

Orang yang berkata, 'Hujan turun kepada kita karena karunia Allah dan rahmat-Nya', maka dia adalah yang beriman kepada-Ku dan kafir kepada bintang-bintang. Adapun yang berkata, 'Hujan turun disebabkan bintang ini dan itu', maka dia telah kafir kepada-Ku dan beriman kepada bintang-bintang'."

Hadist di atas merupakan salah satu hadis yang menjadi dasar tentang adanya hujan sebagai rahmat Tuhan. Di dalam hadis tersebut secara tekstual berisi pernyataan bahwa orang yang menganggap hujan itu berasal dari bintang (planet) maka dia telah kafir, sedangkan orang yang beriman adalah orang yang mengatakan bahwa hujan merupakan karunia dan rahmat yang datang dari Allah. Jika berangkat dari normatifitas teks, tidak dapat diragukan bahwa hadis tersebut shahih. Hal ini karena di masa Nabi belum ditemukan berbagai teori dan bukti-bukti ilmiah mengenai terbentuknya hujan. Pengetahuan tentang hujan hanya diketahui langsung dari firman Allah. Sehingga pemahaman Nabi tentang hujan merupakan ilmu yang langsung dari Allah sebagai bukti kerasulannya.

Menurut Ibnu Katsir, sesudah Allah menyebutkan apa yang telah Dia berikan kepada mereka nikmat-Nya (yang lain) yang diberikan kepada mereka yaitu berupa turunya hujan dari langit, yang di dalam hujan terdapat air yang dapat diminum dan kenikmatan dunia untuk mereka dan Allah menjadikannya air hujan yang diminum tawar lagi cair, yang mudah bagimu meminumnya, dan Allah tidak menjadikannya asin lagi pahit. Kemudian, Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dari hujan itu untukmu, yang kamu semua mengembalakan ternak-ternakmu di tempat itu, seperti apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, Ikrimah, Adh- Dhahhak, Qatadah, Ibnu Zaid, dalam firman Allah: *Fiihi tusiimuun (Di untuk binatang-binatang mereka tempat itu kamu*

mengembalikan ternakmu) artinya mengembalikan, dari lafadz itu pula disebut *Al-Ibilus Saaimah* artinya, unta yang digembalakan.

Hujan merupakan salah satu perkara terpenting bagi kehidupan makhluk hidup di muka bumi. Ia merupakan sebuah prasyarat bagi aktivitas di suatu tempat, tidak hanya manusia, tapi hampir semua makhluk. Allah membagikan hujan dengan sangat teliti dan bijaksana. Air yang dibawa oleh hujan mengalir dari daratan ke lautan dan samudra setelah menjalankan perannya dalam mengairi tumbuh-tumbuhan, member minum hewan-hewan dan manusia yang banyak, meremukkan bebatuan bumi, membentuk tanah, mengentalkan keledak (*sedimen*) yang masih mentah, membuat dan membelah saluran dan aliran air, termasuk meringankan dan melembabkan udara.

Selain itu, Allah SWT juga menerangkan larangan kepada manusia untuk tidak merusak lingkungan. Sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surah Al-A'raf/7: 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.(Kementerian Agama RI 2010).

Dari ayat di atas, dapat dipahami bahwa Allah SWT telah menciptakan dunia dengan sangat sempurna sehingga makhluk – makhluk dapat hidup memenuhi kebutuhannya di dunia. Agar dunia dapat tetap dalam keadaan seimbang sehingga makhluk – makhluk dapat hidup secara harmonis, Allah SWT melarang manusia untuk membuat kerusakan di muka bumi ini. Dalam hal ini larangan untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merusak lingkungan khususnya perbuatan yang dapat menyebabkan terjadi pencemaran udara. Manusia dianjurkan untuk menjaga lingkungan dengan melakukan kecil atau besarnya hal – hal yang dapat mengurangi terjadinya pencemaran udara. Salah satu langkah pemerintah untuk mengurangi pencemaran udara di perkotaan yaitu pembuatan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Ruang Terbuka Hijau merupakan daerah permukaan tanah yang banyak ditanami tumbuhan yang fungsinya untuk perlindungan habitat, sarana lingkungan atau kota (Rosha, dkk, 2013).

Penanaman tumbuhan berupa pohon maupun bunga – bunga dapat memperbaiki kualitas atmosfer karena mereduksi bahan pencemaran di udara sehingga dapat mengurangi pencemaran udara. Sebagaimana hadist Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بِهِمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ وَقَالَ لَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا أَبُو أَنَسٍ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Terjemahnya:

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah. Dan diriwayatkan pula telah menceritakan kepada saya

'Abdurrahman bin Al Mubarak telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Qatadah dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Tidaklah seorang muslimpun yang bercocok tanam atau menanam satu tanaman lalu tanaman itu dimakan oleh burung atau manusia atau hewan melainkan itu menjadi shadaqah baginya"*. Dan berkata, kepada kami Muslim telah menceritakan kepada saya Aban telah menceritakan kepada kami Qatadah telah menceritakan kepada kami Anas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam (HR. Bukhari, 2152).

Dari hadist di atas dapat dipahami bahwa manusia telah bersedekah apabila bercocok tanam ataupun menanam satu tanaman dan tanaman ini dimakan oleh hewan atau manusia. Oleh karena itu, menanam pohon sangat dianjurkan selain dapat mengurangi pencemaran udara juga dapat menjadi amal sedekah karena bermanfaat untuk hewan dan manusia lain. Penanaman pohon atau tumbuhan lain juga sangat dianjurkan sebagai langkah dalam mengurangi pencemaran udara baik dilaksanakan secara luas maupun di lingkungan rumah masing – masing. Kecil atau besarnya hal yang dilakukan dengan tujuan yang baik tentu akan mendapat pahala di sisi Allah SWT. Sehingga alangkah baiknya jika memulai dari langkah kecil terlebih dahulu yaitu dengan menjadikan lingkungan rumah sendiri hijau terlebih dahulu, kemudian mendukung langkah nyata penanaman pohon dalam pencemaran udara di wilayah yang lebih luas.

C. Tinjauan Umum tentang Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan (ARKL)

Di Indonesia Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan (ARKL) masih belum banyak dikenal dan digunakan sebagai metode kajian dampak lingkungan terhadap kesehatan. Padahal beberapa Negeri Uni Eropa, Amerika dan Australia ARKL telah menjadi proses central idea legislasi dan regulasi pengendalian

dampak lingkungan. Dampak kontes AMDAL, efek lingkungan terhadap kesehatan umumnya masih dikaji secara epidemiologis (Syalbi,2010).

Analisis risiko adalah padanan istilah untuk *risk assessment*, yaitu karakterisasi efek – efek yang potensial merugikan kesehatan manusia oleh pajanan bahaya lingkungan (Aldrich dan Griffith,1993). Analisis risiko merupakan suatu alat pengelolaan risiko, proses penilaian bersama para ilmuwan dan birokrat untuk memprakirakan peningkatan risiko kesehatan pada manusia yang terpajan (NRC, 1983).

Analisis risiko adalah padanan istilah untuk *risk assesment*, yaitu karakteristik efek-efek yang potensila merugikan kesehatan manusia oleh pajanan bahaya lingkungan (Aldrich dan Griffith, 1993). Analisis risiko merupakan suatu alat pengelolaan risiko, proses penilaian bersama para ilmuwan dan birokrat memperkirakan peningkatan risiko kesehatan pada manusia yang terpajan (NRC,1983).

Analisis risiko adalah sebuah proses untuk mengendalikan situasi atau keadaan dimana organisme, sistim, atau sub/populasi mungkin terpajan bahaya (Pedoman ARKL Dirjen PP dan PL Kemenkes, 2012).

Analisis risiko kesehatan lingkungan adalah sebuah proses yang dimaksudkan untuk menghitung atau memprakirakan risiko pada kesehatan manusia, termasuk juga identifikasi terhadap keberadaan faktor ketidakpastian, penelusuran pada pajanan tertentu, memperhitungkan karakteristik yang melekat pada agen yang menjadi perhatian dan karakteristik dari sasaran yang spesifik (Pedoman ARKL Dirjen PP dan PL Kemenkes, 2012).

Seiring perkembangannya, analisis risiko kini digunakan untuk menilai dan memprakirakan risiko kesehatan yang akan terjadi pada manusia yang disebabkan oleh pajanan bahaya lingkungan. Bahaya adalah sifat yang melekat pada suatu *risk agent* atau situasi yang memiliki potensi menimbulkan efek merugikan jika suatu organisme, sistem, atau sub populasi terpajan oleh risk agent tersebut (Basri et.al, 2014)


Bahaya lingkungan terdiri atas tiga *risk agent* yaitu *chemical agents* (bahan – bahan kimia), *physical agents* (energi radiasi dan gelombang elektromagnetik berbahaya), dan *biological agents* (makhluk hidup atau organisme). Bahaya tidak sama dengan risiko. Bahaya adalah suatu potensi risiko, dan risiko tidak akan terjadi kecuali syarat – syarat tertentu terpenuhi. Syarat – syarat yang dimaksud adalah toksisitas *risk agent* yang bersangkutan dan pola – pola pajanannya. Suatu *risk agent* sekalipun toksik, tidak akan berisiko bagi kesehatan jika tidak memajani dengan dosis dan waktu tertentu (Basri et.al, 2014)

1. Paradigma Analisis Risiko

Paradigma *risk analysis* untuk kesehatan masyarakat pertama kali dikemukakan tahun 1983 oleh *US National Academic of Science* untuk menilai risiko kanker oleh bahan kimia di dalam makanan (NRC, 1983). Menurut Syahrul Basri,et.al (2014) paradigma yang dikemukakan NRC menerangkan bahwa *risk analysis* terbagi dalam tiga langkah utama yaitu penelitian (*research*), analisis risiko (*risk assessment*) dan manajemen risiko.

Pengelolaan risiko terdiri dari tiga unsur yaitu evaluasi risiko, pengendalian emisi dan pemajanan dan pemantauan risiko. Analisis risiko

merupakan bagian *risk analysis* sedangkan manajemen risiko bukan bagian analisis risiko tetapi kelanjutan dari analisis risiko. Supaya tujuan pengelolaan risiko tercapai dengan baik maka pilihan – pilihan manajemen risiko itu harus dikomunikasikan kepada pihak – pihak yang berkepentingan. Langkah ini dikenal sebagai komunikasi risiko. Manajemen dan komunikasi risiko bersifat spesifik yang bergantung pada karakteristik *risk agent*, pola pemajanan, individu atau populasi yang terpajan, sosio demografi dan kelembagaan masyarakat dan pemerintah setempat. (Basri et.al, 2014)



Gambar 2.2. Analisis Risiko (Louvar dan Louvar, 1998)

Pada gambar di atas terlihat jelas bahwa manajemen risiko tidak termasuk dalam langkah – langkah analisis risiko melainkan manajemen risiko merupakan langkah tindak lanjut dari hasil analisis risiko yang telah didapatkan.

Selanjutnya WHO merumuskan aturan umum bahwa analisis risiko perlu diawali dengan analisis risiko pendahuluan yang bersifat subyektif dan informal. Langkah ini dilakukan untuk memastikan apakah suatu kasus memerlukan analisis risiko secara formal atau tidak. Analisis risiko pendahuluan merupakan transisi menuju analisis risiko formal, suatu proses literatif yang memudahkan persinggungan kritis analisis risiko dengan manajemen risiko. Proses ini disebut sebagai perumusan masalah (Basri et.al, 2014).

Analisis risiko kesehatan lingkungan masih jarang digunakan dalam kajian dampak lingkungan terhadap kesehatan masyarakat. Kebanyakan analisis dilakukan secara konservatif dengan studi epidemiologi. Memang, selama berabad – abad studi epidemiologi telah menjadi metoda investigasi penyakit infeksi di masyarakat (NRC, 1983). Ciri – ciri yang membedakan EKL (epidemiologi kesehatan lingkungan) dan ARKL (analisis risiko kesehatan lingkungan) yaitu (Rahman, 2007):

- a. Dalam ARKL, pajanan *risk agent* yang diterima setiap individu dinyatakan sebagai *intake* atau asupan. Studi epidemiologi umumnya tidak perlu memperhitungkan asupan individual ini.
- b. Dalam ARKL, perhitungan asupan membutuhkan konsentrasi *risk agent* di dalam media lingkungan tertentu, karakteristik antropometri (seperti berat badan dan laju inhalasi atau pola konsumsi dan pola aktivitas waktu kontak dengan *risk agent*. Dalam EKL, konsentrasi dibutuhkan tetapi karakteristik antropometri dan pola aktivitas individu bukan determinan utama dalam menetapkan besaran risiko.

- c. Dalam ARKL, risiko kesehatan oleh pajanan setiap *risk agent* dibedakan atas efek karsinogenik dan nonkarsinogenik dengan perhitungan yang berbeda. Dalam EKL, teknik analisis efek kanker dan nonkanker pada dasarnya sama.
- d. Dalam EKL, efek kesehatan (kanker dan nonkanker) yang ditentukan dengan berbagai pernyataan risiko (seperti *odd ratio*, *relative risk* atau *standardized mortality ratio*) didapat dari populasi yang dipelajari. ARKL tidak dimaksudkan untuk mencari indikasi atau menguji hubungan atau pengaruh dampak lingkungan terhadap kesehatan (kejadian penyakit berbasis lingkungan) melainkan untuk menghitung atau menaksir risiko yang telah, sedang dan akan terjadi. Efek tersebut, yang dinyatakan sebagai nilai kuantitatif dosis respon, harus sudah ditegakkan lebih dahulu, yang didapat dari luar sumber – sumber populasi yang dipelajari bahkan dari studi – studi toksisitas uji hayati (*bioassay*) atau studi keaktifan biologis *risk agent*.
- e. Dalam ARKL, besaran risiko (dinyatakan sebagai RQ untuk nonkarsinogenik dan ECR untuk karsinogenik) tidak dibaca sebagai perbandingan lurus (*directly proportional*) melainkan sebagai probabilitas. Dalam EKL, pernyataan risiko seperti OR, RR atau SMR dibaca sebagai perbandingan lurus. Jadi misalnya, $RQ = 2$ tidak dibaca sama dengan $OR = 2$.
- f. Kuantitas risiko nonkarsinogenik dan karsinogenik digunakan untuk merumuskan pengelolaan dan komunikasi risiko secara lebih spesifik. ARKL menawarkan pengelolaan risiko secara kuantitatif seperti penetapan baku mutu dan reduksi konsentrasi. Pengelolaan dan komunikasi risiko bukan bagian integral studi EKL dan jika ada hanya relevan untuk populasi yang dipelajari.

- g. EKL umumnya dilakukan atas dasar kejadian penyakit (*disease oriented*) atau kondisi lingkungan yang spesifik (*agent oriented*), sedangkan analisis risiko kesehatan lingkungan bersifat agent spesifik dan *site specific*. ARKL adalah proses perhitungan atau perkiraan risiko pada suatu organisme sasaran, sistem, atau sub populasi termasuk identifikasi ketidakpastian – ketidakpastian yang menyertainya setelah terpajan oleh agent tertentu dengan memerhatikan karakteristik yang melekat pada agent itu dan karakteristik sistem sasaran yang spesifik.
- h. Dalam *public health assessment* kedua studi tersebut dapat digabungkan dengan tidak menghilangkan cirinya masing – masing. Analisis risiko kesehatan lingkungan mampu meramalkan besaran tingkat risiko secara kuantitatif sedangkan epidemiologi kesehatan lingkungan dapat membuktikan apakah prediksi itu sudah terbukti atau belum. *Public health assessment* tidak saja memberikan estimasi numerik risiko kesehatan melainkan juga perspektif kesehatan masyarakat dengan memadukan analisis mengenai kondisi – kondisi pemajanan setempat, data efek – efek kesehatan dan kepedulian masyarakat (NRC, 1983).

2. Metode, Teknik dan Prosedur ARKL

Kajian ARKL dimulai dengan memeriksa secara cermat apakah data dan informasi berikut sudah tersedia (ATSDR, 2005):

- a. Jenis spesi kimia *risk agent*
- b. Dosis referensi untuk setiap jenis spesi kimia *risk agent*
- c. Media lingkungan tempat *risk agent* berada (udara, air, tanah, pangan)


- d. Konsentrasi *risk agent* dalam media lingkungan yang bersangkutan
- e. Jalur – jalur pemajanan *risk agent* (sesuai dengan media lingkungannya)
- f. Populasi dan sub – sub populasi yang berisiko
- g. Gangguan kesehatan (gejala – gejala penyakit atau penyakit – penyakit yang berindikasikan sebagai efek pajanan *risk agent* yang merugikan kesehatan pada semua segmen populasi berisiko.

Menurut NRC (1983) ada dua kemungkinan kajian ARKL yang dapat dilakukan, yaitu:

- a. Evaluasi di atas meja (*desktop evaluation*), selanjutnya disebut ARKL meja. Analisis risiko kesehatan lingkungan (ARKL) meja dilakukan untuk menghitung estimasi risiko dengan segera tanpa harus mengumpulkan data dan informasi baru dari lapangan. Evaluasi di atas meja hanya membutuhkan konsentrasi *risk agent* dalam media lingkungan bermasalah, dosis referensi *risk agent* dan nilai default faktor – faktor antropometri pemajanan untuk menghitung asupan.
- b. Kajian Lapangan (*field study*), selanjutnya disebut ARKL lengkap. ARKL lengkap pada dasarnya sama dengan evaluasi di atas meja namun didasarkan pada data lingkungan dan faktor – faktor pemajanan antropometri sebenarnya yang didapat dari lapangan, bukan dengan asumsi atau simulasi. Kajian ini membutuhkan data dan informasi tentang jalur pemajanan dan populasi berisiko.

3. Langkah – langkah ARKL

Menurut Mukono (2008) analisis risiko terbagi menjadi empat langkah yaitu: identifikasi bahaya (*hazard identification*), analisis dosis-respon (*dose-response assessment*), analisis pemajanan (*exposure assessment*) dan karakterisasi risiko (*risk characterization*).



Gambar 2.4. Bagan Alir Penerapan ARKL (Pedoman ARKL Dirjen PP dan PL
Kemenkes, 2012)

a. Identifikasi Bahaya

Identifikasi bahaya atau hazard identification adalah tahap awal analisis risiko kesehatan lingkungan untuk mengenali risiko. Tahap ini adalah suatu

proses untuk menentukan bahan kimia yang berpengaruh terhadap kesehatan manusia, misalnya kanker dan cacat lahir (Mukono, 2008).

Data identifikasi bahaya risk agent dari berbagai sumber pencemaran dapat dirangkum dalam suatu tabel. Bila data awal tidak tersedia, harus dilakukan pengukuran pendahuluan dengan sedikitnya 2 sampel yang mewakili konsentrasi risk agent paling tinggi dan paling rendah. Selanjutnya dihitung Risk Quotient (RQ) untuk asupan konsentrasi risk agent. Bila ternyata $RQ > 1$ berarti ada risiko potensial dan perlu dikendalikan. Sedangkan bila $RQ < 1$ untuk sementara pencemaran dinyatakan masih aman dan belum perlu dikendalikan (Rahman, 2008).

b. Analisis Pemajanan

Analisis pemajanan atau exposure assessment yang disebut juga penilaian kontak bertujuan untuk mengenali jalur-jalur pajanan risk agent agar jumlah asupan yang diterima individu dalam populasi berisiko bias dihitung. Data dan informasi yang dibutuhkan untuk menghitung asupan adalah semua variable yang terdapat dalam persamaan berikut

$$Ink = \frac{C \times R \times t_E \times f_E \times D_t}{W_b \times t_{avg}}$$

Keterangan

I	:	Asupan (intake), mg/kg/hari
C	:	Konsentrasi risk agent, mg/M ³ untuk medium udara, mg/L untuk air minum, mg/kg untuk makanan atau pangan
R	:	Laju asupan atau konsumsi, M ³ /jam untuk inhalasi, L/hari untuk air minum, g/hari untuk makanan

t_E	:	Waktu pajanan
f_E	:	Frekuensi pajanan
D_t	:	Durasi pajanan, tahun (real time atau proyeksi, 30 tahun untuk nilai default residensial)
W_b	:	Berat badan, kg
t_{avg}	:	Periode waktu rata – rata ($D_t \times 365$ hari/tahun untuk zat nonkarsinogen, 70 tahun \times 365 hari/tahun untuk zat karsinogen)

Konsentrasi *risk agent* dalam media lingkungan diperlukan menurut karakteristik statistiknya. Jika distribusi konsentrasi *risk agent* normal, bisa digunakan nilai aritmatik meannya. Jika distribusinya tidak normal, harus digunakan log normal atau mediannya. Normal tidaknya distribusi konsentrasi *risk agent* bisa ditentukan dengan menghitung *coefficiene of variance* (CoV), yaitu SD dibagi mean. Jika CoV <20% distribusi dianggap normal dan karena itu dapat digunakan nilai mean. Sebelum nilai default nasional tersedia berdasarkan hasil survey maka t_E , f_E dan W_b dapat dipakai sebagai nilai numeric faktor antropometri pemajanan (Rahman, 2008).

c. Analisis Dosis Respon

Analisis dosis-respon disebut juga *dose-response assessment* atau *toxicity assessment* menetapkan nilai – nilai kuantitatif toksisitas *risk agent* untuk setiap bentuk spesi kimianya. Toksisitas dinyatakan sebagai dosis referensi (*reference dose*, RfD) untuk efek – efek nonkarsinogenik dan *Canser Slope Factor* (CSF) atau *Cancer Unit Risk* (CCR) untuk efek – efek karsinogenik.

Analisis dosis respon merupakan tahap yang paling menentukan karena ARKL hanya bisa dilakukan untuk *risk agent* yang sudah ada dosis-responnya.

Dosis referensi dibedakan untuk pajanan oral atau tertelan (ingesi, untuk makanan dan minuman) yang disebut RfD dan untuk pajanan inhalasi (udara) yang disebut reference concentration (RfC). Dalam analisis dosis-respon, dosis dinyatakan sebagai risk agent yang terhirup (inhaled), tertelan (ingested) atau terserap melalui kulit (absorbed) per kg berat badan per hari (mg/kg/hari) (US EPA, 1997)

Dosis yang digunakan untuk menetapkan RfD adalah yang menyebabkan efek paling rendah yang disebut NOAEL (No Observed Adverse Effect Level) atau LOAEL (Lowest Observed Adverse Effect Level). NOAEL dosis tertinggi suatu zat pada studi toksisitas kronik atau subkronik yang secara statistik atau biologis tidak menunjukkan efek merugikan pada hewan uji atau pada manusia sedangkan LOAEL berarti dosis terendah yang (masih) menimbulkan efek. Secara numeric NOAEL selalu lebih rendah daripada LOAEL. RfD atau RfC diturunkan dari NOAEL atau LOAEL menurut persamaan berikut ini.

Perhitungan nilai RfC dari karbon monoksida dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

- a) NOAEL CO, didapatkan = 1,35 ppm. Dikonversi menjadi mg/m^3 , maka:

$$\begin{aligned} \text{mg}/\text{m}^3 &= \frac{n(\text{ppm}) \times \text{BM}}{24,45} \\ &= \frac{1,35 \times 28}{24,45} \\ &= 1,5460 \text{ mg}/\text{m}^3 \end{aligned}$$

Keterangan:

n : jumlah kadar CO dalam ppm

BM : Berat Molekul CO (C= 12, O= 16)

Adapun cara untuk memperoleh laju inhalasi, maka dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$y = 5,3 \ln(x) - 6,9$$

dimana diketahui $y = R$ dan $x = W_b$, maka di dapatkan hasil laju inhalasi sebagai berikut:

$$\begin{aligned} R &= 5,3 \ln(W_b) - 6,9 \\ &= 5,3 \ln(33) - 6,9 \\ &= 5,3 (3,49) - 6,9 \\ &= 18,497 - 6,9 \\ &= 11,59 \text{ m}^3/\text{hari} \end{aligned}$$

Selanjutnya hasil akan dikonversi ke dalam satuan m^3/jam

$$11,59 \frac{\text{m}^3}{\text{hari}} \times \frac{1 \text{ hari}}{24 \text{ jam}} = 0,5 \text{ m}^3/\text{jam}$$

maka laju inhalasi yang digunakan adalah $0,5 \text{ m}^3/\text{jam}$.

- b) Dengan konsentrasi aman pada $I = RfC$ atau $I = \text{NOAEL}$, berlaku persamaan sebagai berikut untuk menghitung *Intake* pajanan:

Maka didapatkan:

$$RfC = \frac{C \times R \times t_E \times f_E}{W_b \times t_{avg}}$$

$$\text{NOAEL} = \frac{C \times R \times t_E \times f_E}{W_b \times t_{avg}}$$

Selanjutnya NOAEL CO di konversi dari mg/m^3 ke $\text{mg}/\text{kg}/\text{hari}$

$$\begin{aligned} \text{NOAEL CO} &= \frac{1,5460 \frac{\text{mg}}{\text{m}^3} \times 0,5 \frac{\text{m}^3}{\text{jam}} \times 6 \frac{\text{jam}}{\text{hari}} \times 350 \frac{\text{hari}}{\text{tahun}}}{33 \text{ kg} \times 365 \frac{\text{hari}}{\text{tahun}}} \\ &= \frac{1.623,3}{12.045} \\ &= 0,1347 \text{ mg/kg/hari} \end{aligned}$$

- c) Kemudian di koreksi lagi dengan laju inhalasi (0,5 m³/jam anak usia sekolah, 0,6 m³/jam dewasa) dan berat badan (33 kg anak, 55 kg dewasa Asia, 70 kg dewasa Eropa/Amerika) sehingga didapatkan faktor koreksi (F_k):

$$F_k = \frac{0,5}{0,6} \times \frac{55}{33} \times \frac{70}{55} = 1,74$$

- d) Dengan mengalihkan F_k ini dengan NOAEL CO, maka NOAEL CO berubah menjadi NOAEL CO (Koreksi), yaitu 0.2343 mg/kg/hari
- e) Untuk semua RfC, dari 4 UF hanya UF 1 dan UF 4 yang berlaku karena NOAEL tidak berasal dari *bioassay*, UF 4 dibutuhkan karena NOAEL diindikasikan dari studi epidemiologi *cross-sectional* yang diakui lemah untuk membuktikan hubungan kausalitas. Namun, UF 1 tidak dibutuhkan karena variabilitas kerentanan populasi dapat dianggap telah terwakili berhubung studi tersebut melibatkan dua etnis. Maka UF untuk menentukan RfC diberi nilai 10 sedangkan MF diberi nilai *Default* 1, sehingga:

$$\begin{aligned} RfC \text{ CO}_{\text{koreksi}} &= \frac{\text{NOAEL CO}_{\text{koreksi}}}{UF4 \times MF} \\ &= \frac{0,2343}{10 \times 1} \\ &= 0,02343 \text{ mg/kg/hari} \end{aligned}$$

Jadi, RfC yang digunakan untuk gas CO yaitu 0,02343 mg/kg/hari.

UF adalah uncertainty factor (faktor ketidakpastian) dengan nilai UF1 = 10 untuk variasi sensitivitas dalam populasi manusia (10H, human), UF2 = 10 untuk ekstrapolasi dari hewan ke manusia (10A, animal), UF3 = 10 jika NOAEL diturunkan dari uji subkronik, bukan kronik, UF4 = 10 bila menggunakan LOAEL bukan NOAEL. MF adalah modifying factor bernilai 1 s/d 10 untuk mengakomodasi kekurangan atau kelemahan studi yang tidak tertampung UF. Penentuan nilai UF dan MF tidak lepas dari subyektivitas. Untuk menghindari subyektivitas, tahun 2004 telah diajukan model dosis-respon baru dengan memecah UF menjadi ADUF (=100, 4 atau 2,5), AKUF (=100,6 atau 4,0), HDUF (=100,5 atau 3,2) dan HKUF (=100,5 atau 3,2)8

d. Karakteristik Risiko

Karakteristik risiko kesehatan dinyatakan sebagai Risk Quotient (RQ, tingkat risiko) untuk efek – efek nonkarsinogenik dan Excess Cancer Risk (ECR) untuk efek – efek karsinogenik. RQ dihitung dengan membagi asupan nonkarsinogenik (Ink) risk agent dengan RfD atau RfC-nya menurut persamaan (3) (ATSDR, 1998).

$$RQ = \frac{Ink}{RfD \text{ atau } RfC}$$

Baik Ink maupun RfD atau RfC harus spesifik untuk bentuk spesi kimia risk agent dan jalur pajanannya. Risiko kesehatan dinyatakan ada dan perlu

dikendalikan jika $RQ > 1$, jika $RQ < 1$, risiko tidak perlu dikendalikan tetapi perlu dipertahankan agar nilai numeric RQ tidak melebihi 1 (Rahman, 2008)

ECR dihitung dengan mengalikan CSF dengan asupan karsinogenik risk agent (Ink) menurut persamaan. Harap diperhatikan, asupan karsinogenik dan nonkarsinogenik tidak sama karena perbedaan bobot waktu rata – ratanya (avg) seperti dijelaskan dalam keterangan rumus asupan (ATSDR,1998)

$$ECR = CSF \times Ink$$

Baik CSF maupun Ink harus spesifik untuk bentuk spesi kimia risk agent dan jalur pajanannya. Karena secara teoritis karsinogenisitas tidak mempunyai ambang non threshold, maka risiko dinyatakan tidak bisa diterima (unacceptable) bila $E-6 < ECR < E-4$. Kisaran angka $E-6$ s/d $E-4$ dipungut dari nilai default karsinogenitas US EPA.

e. Manajemen risiko

Berdasarkan karakterisasi risiko, dapat dirumuskan pilihan – pilihan manajemen risiko untuk meminimalkan RQ dan ECR dengan memanipulasi (mengubah) nilai faktor – faktor pemajanan yang tercakup dalam persamaan (1) sedemikian rupa sehingga asupan lebih kecil atau sama dengan dosis referensi toksisitasnya. Pada dasarnya hanya ada dua cara untuk menyamakan Ink dengan RfD atau RfC atau menguba Ink sedemikian rupa sehingga ECR tidak melebihi $E-4$, yaitu menurunkan konsentrasi risk agent atau mengurangi waktu kontak. Ini berarti hanya variable – variable persamaan (1) tertentu saja yang bisa diubah – ubah nilainya (Rahman dalam Syahrul Basri, dkk,2014).

Berikut penjelasan cara – cara manajemen risiko secara lengkap (Basri et.al, 2014):

- a) Menurunkan konsentrasi risk agent bila pola dan waktu konsumsi tidak dapat diubah. Cara ini menggunakan prinsip $RfC = Ink$, maka persamaan yang digunakan adalah:

$$RfC = \frac{C \times R \times f_E \times D_t}{W_b \times t_{avg}} \text{ mg/m}^3$$


- b) Mengurangi pola (laju) asupan bila konsentrasi risk agent dan waktu konsumsi tidak dapat diubah. Persamaan yang digunakan yaitu:

$$R = \frac{RfC \times W_b \times t_{avg}}{C \times f_E \times D_t} \text{ m}^3/\text{hari}$$


- c) Mengurangi waktu kontak bila konsentrasi risk agent dan pola asupan tidak dapat diubah. Persamaan sebagai berikut:

$$D_t = \frac{RfD \times W_b \times t_{avg}}{C \times R \times f_E} \text{ tahun}$$

E. Kerangka Teori



Sumber: Modifikasi dari (Wardhana, 2014) (Sastrawijaya, 2009) (Rahman, 2007)

F. Kerangka Konsep

Keterangan:

□ : Variabel Independen

○ : Variabel Dependen

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian jenis kuantitatif yaitu pengamatan pada sampel-sampel untuk mengetahui gambaran variabel yang diteliti yaitu paparan karbon monoksida (CO) pada anak-anak di SD Negeri Kakatua Kota Makassar.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian jenis survai bersifat deskriptif dengan metode Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan (ARKL). Analisis Risiko digunakan untuk menilai dan menaksirkan risiko kesehatan manusia yang disebabkan oleh pajanan bahaya lingkungan. Bahaya adalah sifat yang melekat pada suatu risk agent atau situasi yang memiliki potensi menimbulkan efek merugikan jika suatu organisme, sistem atau subpopulasi terpajan oleh risk agent tersebut (WHO,2004).

Pengembangan model pendidikan berbasis kompetensi dengan menggunakan model analisis risiko kesehatan lingkungan (ARKL) untuk menghitung besaran risiko kesehatan anak-anak yang bersekolah di SD Negeri Kakatua Kota Makassar akibat menghirup udara yang mengandung CO, kelebihan analisis kesehatan lingkungan adalah mampu meramalkan risiko menurut proyeksi pemaparan ke depan. Dengan demikian, maka risiko gangguan kesehatan yang akan terjadi pada masa yang akan datang akibat risk agent yang ada pada lingkungan dapat dicegah.

Seiring perkembangannya, analisis risiko kini digunakan untuk menilai dan memprakirakan risiko kesehatan yang akan terjadi pada manusia yang disebabkan oleh pajanan bahaya lingkungan. Bahaya adalah sifat yang melekat pada suatu *risk agent* atau situasi yang memiliki potensi menimbulkan efek merugikan jika suatu organisme, sistem, atau sub populasi terpajan oleh risk agent tersebut (WHO dalam Syahrul Basri, dkk, 2014).

Analisis paparan yang dilakukan dengan pengukuran besarnya paparan, yaitu dengan mengestimasi jumlah asupan CO yang dihirup setiap harinya dengan memperhitungkan konsentrasi CO dalam udara, frekuensi paparan, durasi paparan dan berat badan. Untuk mendukung kualitas udara ambien, perlu dilakukan pemantauan kondisi meteorologi yang meliputi temperatur, kecepatan angin dan kelembaban.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Kakatua yang berada di Jl. Gagak No.24 Kelurahan Mariso Kecamatan Mariso Kota Makassar.

2. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian dilakukan selama satu bulan atau lebih yang dimulai pada bulan Agustus-Oktober 2017

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini yaitu semua siswa kelas IV, V dan VI dengan total 222 siswa di SD Negeri Kakatua yang berlokasi di Jl. Gagak No.24 Kelurahan Mariso Kecamatan Mariso Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Sampel

a) Besar Sampel

sampel subjek dalam penelitian ini yaitu sebagian dari populasi yang akan dijadikan objek penelitian. Untuk menentukan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin apabila jumlah populasi (N) diketahui, maka pengambilan sampel dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(d^2)}$$

Keterangan:

n : Jumlah sampel

N : Besar Populasi

d² : Batas presisi yang diharapkan (0,05)

$$n = \frac{N}{1 + N(d^2)}$$

$$n = \frac{222}{1 + 222(0,05)}$$

$$n = \frac{222}{1 + 222(0,0025)}$$

$$n = \frac{222}{1 + 0,555}$$

$$n = \frac{222}{1,555} = 142,76 \rightarrow 143 \text{ responden}$$

b) Teknik Pengambilan Sampel.

Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Multi Stage Random* sampling yaitu proses pengambilan sampel yang dilakukan melalui dua tahap pengambilan sampel atau lebih. Proses pertama menggunakan Proporsional Random sampling dengan cara pengambilan sampel secara acak sederhana yang di ambil per kelas, dengan menggunakan rumus di bawah ini maka dari 143 resonden tersebut, diperoleh sampel sebagai berikut:

$$n = \frac{\text{Populasi kelas}}{\text{Populasi keseluruhan}} \times \text{Besar sampel}$$

$$\text{Kelas IV} \rightarrow n = \frac{71}{222} \times 143 = 45,7 \rightarrow 46 \text{ responden}$$

$$\text{Kelas V} \rightarrow n = \frac{68}{222} \times 143 = 43,8 \rightarrow 44 \text{ responden}$$

$$\text{Kelas VI} \rightarrow n = \frac{83}{222} \times 143 = 53,4 \rightarrow 53 \text{ responden}$$

Jadi, sampel pada penelitian ini yaitu kelas IV berjumlah 46 responden, kelas V berjumlah 44 responden dan kelas VI berjumlah 53 responden.

Setelah pengambilan sampel dengan Proporsional Stratified Random sampling maka digunakan lagi teknik pengambilan sampel *Porposive* sampling untuk menentukan kriteria responden yang sesuai dengan kriteria inklusi.

c) Kriteria Inklusi

Adapun Kriteria Inklusi dalam penelitian ini adalah:

1. Bukan siswa pindahan dari sekolah lain.
2. Siswa Tidak pernah Tinggal Kelas

d) Sampel Objek

Menurut SNI 19-7119.7-2005 dalam penentuan titik sampel untuk pemantauan kualitas udara ambien ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor meteorologi (arah dan kecepatan angin), faktor geografi seperti topografi dan tata guna lahan. Dalam penelitian ini, sampel untuk pengukuran konsentrasi Karbon monoksida (CO) diperoleh di delapan titik di lokasi penelitian.

E. Metode Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti. Dalam penelitian ini data pengukuran yang dilakukan di lokasi penelitian yaitu besar kandungan senyawa karbon monoksida (CO), waktu paparan, frekuensi paparan, durasi paparan dan data individu responden dengan pengisian kuisioner yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan responden dilokasi penelitian. Setelah melakukan wawancara, responden ditimbang berat badannya. Data-data yang telah diperoleh selanjutnya digunakan untuk menghitung asupan karbon monoksida dalam udara yang masuk ketubuh manusia melalui jalur inhalasi.

Konsentrasi Karbon monoksida (CO) diperoleh dengan melakukan pengukuran udara ambien di delapan titik menggunakan alat *Non Dispersive Infra Red* (NDIR) yang dilakukan oleh petugas Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) Makassar. Pengambilan sampel dilakukan dengan tiga pengulangan yaitu pagi, siang dan sore hari. Selanjutnya untuk mengetahui konsentrasi CO menggunakan metode NDIR didasarkan pada kemampuan gas CO menyerap sinar infra merah pada panjang 4,5 μm . Banyaknya intensitas sinar yang diserap sebanding dengan konsentrasi CO di udara. Cara pengambilan sampel udara CO ini sesuai SNI 19-7119.10-2011 dan di uji di laboratorium Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) Makassar.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung sebelum melakukan penelitian. Data sekunder berupa jumlah siswa diperoleh dari sekolah lokasi penelitian. Data – data pendukung lainnya diperoleh dari buku referensi, jurnal, dan skripsi.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan berupa pengukuran udara ambien konsentrasi senyawa karbon monoksida dengan menggunakan alat *Non Dispersive Infra Red* (NDIR) *Analyzer* dan wawancara dengan menggunakan kuisioner untuk mengidentifikasi bahaya, analisis dosis respon, analisis pajanan dan karakteristik risiko pada anak-anak yang bersekolah di SD Negeri Kakatua.

G. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

a. Data-data primer yang telah diperoleh kemudian dilanjutkan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1) *Editing* (pemeriksaan data)

Pada tahap ini dilakukan pengecekan dan perbaikan terhadap semua isian kuisioner yang telah terkumpul. Tahap ini untuk memastikan bahwa data yang diperoleh tersebut semua telah terisi, konsisten, relevan dan dapat dibaca dengan baik.

2) *Coding* (pemberian kode)

Pada tahap ini peneliti mengubah data berbentuk kalimat atau huruf menjadi angka atau bilangan secara manual. Perbaikan kode ini sangat berguna dalam memasukkan data (*data entry*).

3) *Entry* (pemasukan data ke komputer) atau processing

Data yang dalam bentuk kode (huruf atau angka) dimasukkan ke program komputer untuk diolah dengan menggunakan program *Ms. Excel*.

4) *Cleaning* (Pembersihan data)

Pemeriksaan semua data yang telah dimasukkan ke dalam program komputer guna menghindari terjadinya kesalahan pemasukan data.

5) Penyajian data

Data yang telah diolah akan disajikan dalam bentuk tabel dan narasi.

b. Teknik pengolahan data menggunakan perhitungan analisis risiko yaitu dengan menghitung laju asupan (*intake*) untuk mengetahui tingkat risiko *risk agent*

(RQ) terhadap responden. perhitungan laju asupan (intake) diperoleh berdasarkan data konsentrasi karbon monoksida (CO) sebagai *risk agent* dalam udara (mg/m^3), laju asupan paparan (m^3/hari), frekuensi paparan tahunan (hari/tahun), durasi paparan (*real time*) dalam tahun, berat badan (kg), periode waktu rata-rata ($30 \text{ tahun} \times 365 \text{ hari/tahun}$ untuk non karsinogenik). Data asupan konsentrasi CO dalam udara diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$I = \frac{C \times R \times t_g \times f_E \times D_t}{W_b \times t_{avg}}$$

Keterangan:

- I : Asupan (*Intake*), $\text{mg}/\text{kg}/\text{hari}$,
- C : Konsentrasi risk agent, mg/m^3 untuk medium udara, mg/L untuk air minum, mg/kg untuk makanan atau pangan
- R : Laju asupan atau konsumsi, m^3/jam untuk inhalasi, L/hari untuk air minum, g/hari untuk makanan.
- t_E : Waktu pajanan
- f_E : Frekuensi paparan
- D_t : Durasi pajanan, tahun (*real time* atau proyeksi, 30 tahun untuk nilai *default residensial*)
- W_b : Berat badan, kg
- t_{avg} : Periode waktu rata-rata ($D_t \times 365 \text{ hari/tahun}$ untuk zat nonkarsinogenik, $70 \text{ tahun} \times 365 \text{ hari/tahun}$ untuk zat karsinogenik).

$$RQ = \frac{\text{Ink (mg/kg/hari)}}{RfC}$$

Keterangan:

RQ : besar risiko

Ink : asupan (Intake). Jumlah risk agent (konsentrasi CO) yang masuk
kedalam tubuh responden (mg/kg/hari)

RfC : pajanan inhalasi (udara) diperoleh dari US-EPA

Hasil perhitungan RQ dapat menunjukkan tingkat risiko kesehatan anak SD akibat menghirup udara yang mengandung karbon monoksida. Apabila $RQ \leq 1$ menunjukkan paparan masih berada dibawah batas normal dan responden yang menghirup udara tersebut masih dalam batas aman dari risiko kesehatan oleh CO sepanjang hidupnya. Sedangkan, bila nilai $RQ > 1$ menunjukkan paparan berada diatas normal dan responden yang menghirup udara tersebut memiliki risiko kesehatan oleh CO sepanjang hidupnya

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 6 November-16 November 2017 yang terdiri dari wawancara dan pengukuran data di SD Negeri Kakatua Kota Makassar. Wawancara responden dilakukan di kelas masing-masing dengan menggunakan Lembar Observasi. Sedangkan untuk pengukuran kualitas udara menggunakan alat dari Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) Makassar.

1. Karakteristik Responden

a) Jenis Kelamin Responden

Tabel 4.1

Distribusi Responden berdasarkan Jenis Kelamin
Di SD Negeri Kakatua Kota Makassar Tahun 2017

No	Jenis Kelamin	n	Presentase %
1	Laki-Laki	81	65,6
2	Perempuan	62	43,4
	Total	143	100,0

Sumber: Data Primer, 2017

Berdasarkan tabel 4.1 di atas menunjukkan jenis kelamin responden sebagian besar adalah laki-laki yaitu sebanyak 81 responden (65,6 %), sedangkan perempuan sebanyak 62 responden (43,4%) .

b) Kelompok Umur

Tabel 4.2
Distribusi Responden berdasarkan Kelompok Umur
Di SD Negeri Kakatua Kota Makassar Tahun 2017

No	Kelompok Umur (Tahun)	n	Persentase (%)
1	9	46	32,2
2	10	44	30,8
3	11	53	37,0
	Total	143	100,0

Sumber: Data Primer, 2017

Berdasarkan tabel 4.2 di atas menunjukkan kelompok umur responden. Responden untuk umur 9 tahun sebanyak 46 responden (32,2%), untuk umur 10 tahun sebanyak 44 responden (30,8%), sedangkan untuk umur 11 tahun sebanyak 53 responden (37,0%).

c) Kelompok Kelas

Tabel 4.3
Distribusi Responden berdasarkan Kelompok Kelas
Di SD Negeri Kakatua Kota Makassar Tahun 2017

No	Kelas	n	Persentase (%)
1.	4	46	32,2
2.	5	44	30,8
3.	6	53	37,0
	Total	143	100,0

Sumber: Data Primer, 2017


Berdasarkan tabel 4.3 di atas menunjukkan kelompok kelas responden. Responden untuk kelas 4 sebanyak 46 responden (32,2%), untuk kelas 5 sebanyak 44 responden (30,8%), dan untuk kelas 6 sebanyak 53 responden (37,0%).

2. Analisis Deskriptif Variabel

Menghitung rata-rata (*Mean*) laju asupan, durasi paparan, berat badan dan besar risiko responden di lokasi penelitian sedangkan konsentrasi karbon monoksida (CO) data sekunder yang diperoleh dari hasil pengukuran Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) Makassar. Untuk mengetahui nilai rata-rata dari setiap variabel dilakukan analisis Deskriptif Variabel

a) Konsentrasi Karbon Monoksida (CO)

Konsentrasi Karbon Monoksida (CO) berdasarkan data hasil pengukuran kualitas udara yang dilakukan di 8 titik dengan 3 kali waktu pengambilan (pagi, siang, sore) yang dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Grafik 1: Data Konsentrasi Karbon Monoksida di SD Negeri Kakatua

Keterangan:

Lokasi 1	: Green Haouse	Lokasi 5	: Parkiran
Lokasi 2	: Kantin	Lokasi 6	: Lapangan Upacara
Lokasi 3	: Gerbang 1	Lokasi 7	: Ruang Kelas (Lantai 1)
Lokasi 4	: Gerbang 2	Lokasi 8	: Ruang Kelas (Lantai 2)

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa Konsentrasi Karbon Monoksida di SD Negeri Kakatua. Untuk pengukuran pada pagi hari titik yang paling tinggi adalah lokasi 3 ($1146,28 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$) dan yang terendah adalah lokasi 1 ($849,58 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$), untuk pengukuran pada siang hari titik yang paling tinggi adalah lokasi 2 ($959,24 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$) dan yang terendah adalah lokasi 7 ($801,22 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$), sedangkan untuk pengukuran pada sore hari titik yang paling tinggi adalah lokasi 4 ($1088,26 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$) dan yang terendah adalah lokasi 1 ($1017,30 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$).

b) Laju Asupan Harian

Tabel 4.4
Distribusi Laju Asupan Harian Responden
Di SD Negeri Kakatua Kota Makassar Tahun 2017

No	Laju Asupan Harian (m^3/jam)	n	Persentase (%)
1.	2,4	46	32,2
2.	2,5	44	30,7
3.	3,0	53	37,1
	Total	143	100,0

Sumber: Data Primer, 2017

Berdasarkan tabel 4.4 di atas menunjukkan laju asupan harian responden. Responden dengan laju asupan tertinggi yaitu 3,0 sebanyak 53 responden (37,1%) dan yang paling rendah yaitu 2,4 sebanyak 46 responden (32,2%).

c) Durasi Paparan

Tabel 4.5
Distribusi Durasi Paparan Responden
Di SD Negeri Kakatua Kota Makassar Tahun 2017

No	Durasi Paparan Responden (Tahun)	n	Persentase (%)
1.	4	46	32,2
2.	5	44	30,7
3.	6	53	37,1
	Total	143	100,0

Sumber: Data Primer, 2017

Berdasarkan tabel 4.5 di atas menunjukkan Durasi paparan responden. Responden dengan durasi paparan tertinggi yaitu 6 tahun sebanyak 53 responden (37,1%) dan yang paling rendah yaitu 4 tahun sebanyak 46 responden (32,2%).

d) Berat Badan

Tabel 4.6
Distribusi Berat Badan
Di SD Negeri Kakatua Kota Makassar Tahun 2017

No	Kelompok Berat Badan (Kg)	n	Persentase (%)
1.	18,2-24,8	26	18,2
2.	24,9-31,5	53	37,1
3.	31,6-38,2	29	20,3
4.	38,3-44,9	15	10,4
5.	44,10-51,7	10	7,0
6.	51,8-58,2	4	2,8
7.	58,3-64,9	3	2,1
8.	>65,0	3	2,1
	Total	143	100,0

Sumber: Data Primer, 2017

Berdasarkan tabel 4.6 di atas menunjukkan kelompok berat badan responden. Responden di kelompok berat badan antara 18,2-24,8 kg sebanyak 26 responden (18,2%), responden di kelompok berat badan antara 24,9-31,5 kg sebanyak 53 responden (37,1%), responden di kelompok berat badan antara 31,6-38,2 kg sebanyak 29 responden (20,3%), responden di kelompok berat badan antara 38,3-44,9 kg sebanyak 15 responden (10,4%), responden di kelompok berat badan antara 44,10-51,7 kg sebanyak 10 responden (7,0%), responden di kelompok berat badan antara 51,8-58,2 kg sebanyak 4 responden (2,8%), responden di kelompok berat badan antara 58,3-64,9 kg sebanyak 3 responden (2,1%), dan responden di kelompok berat badan >65,0 kg sebanyak 3 responden (2,1%).

e) Besar Risiko

Besar risiko (RQ) yang dimaksudkan adalah kemungkinan risiko terpapar CO pada anak sekolah yang berada di lokasi penelitian atau besarnya risiko anak sekolah terpapar udara yang mengandung CO di lokasi penelitian melalui perhitungan dengan membandingkan antara asupan dengan konsentrasi acuan. Untuk itu dilakukan tahap-tahap berikut

1) Analisis Pemaparan (Exposure Assessment)

Analisis pemajanan bertujuan untuk mengetahui dosis risk agent co yang didapatkan tiap responden sebagai asupan atau intake (I), Intake diketahui melalui persamaan:

$$Ink = \frac{C \times R \times t_E \times f_E \times D_t}{W_b \times t_{avg}}$$

Keterangan:

- I : Asupan (*intake*), jumlah risk agent (konsentrasi CO) yang masuk ke dalam tubuh responden (mg/kg/hari)
 C : Konsentrasi CO (mg/m³)
 R : Laju Asupan (untuk anak usia 6-12 tahun adalah 0,5 m³/hari)
 t_E : Waktu Paparan (jam/hari)
 f_E : Frekuensi Paparan (hari/tahun)
 D_t : Durasi Paparan (Tahun)
 W_b : Berat Badan Responden (Kg)
 t_{avg} : Periode waktu rata-rata (30 tahun × 365 hari/tahun untuk zat nonkarsinogenik, 70 tahun × 365 hari/tahun untuk zat karsinogenik)

Nilai konsentrasi CO (C) didapat dari nilai rata-rata konsentrasi CO yang diukur langsung di SD Negeri Kakatua. Nilai berat badan responden (W_b) diukur langsung pada saat penelitian dan wawancara. Waktu paparan (t_E), Frekuensi paparan (f_E) dan Durasi paparan (D_t) diperoleh dari wawancara menggunakan lembar observasi. Untuk Frekuensi paparan (f_E) semua anak-anak bersekolah di lokasi penelitian selama 360 hari/tahun.

Nilai laju asupan (R) yang bernilai 0,5 m³/hari didapat dari rumus Laju Asupan Koreksi. Nilai periode waktu rata-rata (t_{avg}) untuk zat CO adalah 30 tahun × 365 hari/tahun = 10950 hari (CO adalah zat Non-Karsinogenik).

Contoh perhitungan besarnya intake untuk masing-masing individu adalah sebagai berikut. Hasil penelitian diketahui bahwa salah seorang responden berinisial YF yang bersekolah di SD Negeri Kakatua dengan waktu (t_E) 6 jam/hari. berat badan (W_b) = 21,1 kg. Responden tersebut telah bersekolah di lokasi penelitian selama (D_t) = 4 tahun dengan frekuensi paparan setahun (f) = 360 hari/tahun, nilai (t_{avg}) untuk zat non-karsinogenik

adalah 10950 hari dan bila berada di lokasi maka responden setiap hari menghirup udara yang mengandung Karbon Monoksida dengan konsentrasi (C) rata-rata = 0,96811 mg/m³ dengan laju asupan (R) = 0,5 m³/jam, sehingga besarnya *Intake* (I) Karbon monoksida adalah:

$$I = \frac{0,96811 \frac{\text{mg}}{\text{m}^3} \times 0,5 \frac{\text{m}^3}{\text{jam}} \times 6 \frac{\text{jam}}{\text{hari}} \times 200 \frac{\text{hari}}{\text{tahun}} \times 4 \text{ tahun}}{21,1 \text{ kg} \times 10950 \text{ hari}}$$

$$I = \frac{2323,464}{231045}$$

$$I = 0,01005 \text{ mg/kg/hari}$$

Jadi asupan (*Intake*) karbon monoksida untuk responden dengan waktu pengukuran sore hari adalah 0,01005 mg/kg/hari

2) Karakteristik Risiko (Risk Characterization)

Karakteristik risiko dilakukan untuk membandingkan hasil analisa paparan (*Intake*) dengan nilai dosis acuan (RfC) yang dikenal dengan bilangan risiko atau (RQ). RQ dihitung dengan persamaan:

$$\text{Besar Risiko (RQ)} = \frac{\text{Intake} \left(\frac{\frac{\text{mg}}{\text{kg}}}{\text{hari}} \right)}{\text{RfC} \frac{\frac{\text{mg}}{\text{kg}}}{\text{hari}}}$$

RfC merupakan dosis acuan yang diperbolehkan dari kepustakaan (US-EPA). Perhitungan nilai RfC dari karbon monoksida dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

Perhitungan nilai RfC dari karbon monoksida dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

a) NOAEL CO, didapatkan = 1,35 ppm. Dikonversi menjadi mg/m^3 , maka:

$$\begin{aligned}\text{mg}/\text{m}^3 &= \frac{n(\text{ppm}) \times \text{BM}}{24,45} \\ &= \frac{1,35 \times 28}{24,45} \\ &= 1,5460 \text{ mg}/\text{m}^3\end{aligned}$$

Keterangan:

n : jumlah kadar CO dalam ppm

BM : Berat Molekul CO (C= 12, O= 16)

Adapun cara untuk memperoleh laju inhalasi, maka dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$y = 5,3 \ln(x) - 6,9$$

dimana diketahui $y = R$ dan $x = W_b$, maka di dapatkan hasil laju inhalasi sebagai berikut:

$$\begin{aligned}R &= 5,3 \ln(W_b) - 6,9 \\ &= 5,3 \ln(33) - 6,9 \\ &= 5,3 (3,49) - 6,9 \\ &= 18,497 - 6,9 \\ &= 11,59 \text{ m}^3/\text{hari}\end{aligned}$$

Selanjutnya hasil akan dikonversi ke dalam satuan m^3/jam

$$11,59 \frac{\text{m}^3}{\text{hari}} \times \frac{1 \text{ hari}}{24 \text{ jam}} = 0,5 \text{ m}^3/\text{jam}.$$

maka laju inhalasi yang digunakan adalah $0,5 \text{ m}^3/\text{jam}$.

b) Dengan konsentrasi aman pada $I = RfC$ atau $I = \text{NOAEL}$, berlaku persamaan sebagai berikut untuk menghitung *Intake* pajanan:

Maka didapatkan:

$$RfC = \frac{C \times R \times t_E \times f_E}{w_b \times t_{avg}}$$

$$NOAEL = \frac{C \times R \times t_E \times f_E}{w_b \times t_{avg}}$$

Selanjutnya NOAEL CO di konversi dari mg/m³ ke mg/kg/hari

$$\begin{aligned} NOAEL\ CO &= \frac{1,5460 \frac{mg}{m^3} \times 0,5 \frac{m^3}{jam} \times 6 \frac{jam}{hari} \times 350 \frac{hari}{tahun}}{33\ kg \times 365 \frac{hari}{tahun}} \\ &= \frac{1.623,3}{12.045} \\ &= 0,1347\ mg/kg/hari \end{aligned}$$

- c) Kemudian di koreksi lagi dengan laju inhalasi (0,5 m³/jam anak usia sekolah, 0,6 m³/jam dewasa) dan berat badan (33 kg anak, 55 kg dewasa Asia, 70 kg dewasa Eropa/Amerika) sehingga didapatkan faktor koreksi (F_k):

$$F_k = \frac{0,5}{0,6} \times \frac{55}{33} \times \frac{70}{55} = 1,74$$

- d) Dengan mengalihkan F_k ini dengan NOAEL CO, maka NOAEL CO berubah menjadi NOAEL CO (Koreksi), yaitu 0.2343 mg/kg/hari
- e) Untuk semua RfC, dari 4 UF hanya UF 1 dan UF 4 yang berlaku karena NOAEL tidak berasal dari *bioassay*, UF 4 dibutuhkan karena NOAEL diindikasikan dari studi epidemiologi *cross-sectional* yang diakui lemah untuk membuktikan hubungan kausalitas. Namun, UF 1 tidak dibutuhkan karena variabilitas kerentanan populasi dapat dianggap telah terwakili berhubung studi tersebut melibatkan dua etnis. Maka UF untuk menentukan RfC diberi nilai 10 sedangkan MF diberi nilai *Default* 1, sehingga:

$$\begin{aligned}
 RfC \text{ CO}_{\text{koreksi}} &= \frac{NOAEL \text{ CO}_{\text{koreksi}}}{UF4 \times MF} \\
 &= \frac{0,2343}{10 \times 1} \\
 &= 0,02343 \text{ mg/kg/hari}
 \end{aligned}$$

Jadi, RfC yang digunakan untuk gas CO yaitu 0,02343 mg/kg/hari.

Dari contoh perhitungan asupan diatas, makan nilai RQ karbon monoksida untuk responden tersebut adalah:

$$\begin{aligned}
 \text{Besar Risiko (RQ)} &= \frac{0,01005 \left(\frac{\text{mg}}{\text{kg}} \right)}{0,02 \frac{\text{mg}}{\text{kg}} \text{ hari}} \\
 &= 0,5025
 \end{aligned}$$

Jadi Besar Risiko (RQ) untuk karbon monoksida responden tersebut adalah 0,5025 sehingga nilai $RQ < 1$, artinya responden tersebut mempunyai risiko rendah untuk terpapar CO (Data nilai besar risiko responden terlampir).

Penjelasan di atas menghasilkan nilai besar risiko untuk tiap responden.

Nilai rata-rata dari data besar risiko (RQ) reponden adalah

Tabel 4.7
Distribusi Besar Risiko Responden
Di SD Negeri Kakatua Kota Makassar Tahun 2017

No	Besar Risiko	n	Persentase (%)
1.	0,20-0,26	7	4,9
2.	0,27-0,33	25	17,5
3.	0,34-0,40	31	21,7
4.	0,41-0,47	27	18,8
5.	0,48-0,54	26	18,2
6.	0,55-0,61	21	14,7

7.	0,62-0,68	3	2,1
8.	0,69-0,80	3	2,1
	Total	143	100,0

Sumber: Data Primer, 2017

Berdasarkan tabel 4.7 di atas menunjukkan kelompok bbesaran risiko responden. Responden dengan nilai besaran risiko antara 0,20-0,26 sebanyak 7 responden (4,9%), responden dengan nilai besaran risiko antara 0,27-0,33 sebanyak 25 responden (17,5%), responden dengan nilai besaran risiko antara 0,34-0,40 sebanyak 31 responden (21,7%), responden dengan nilai besaran risiko antara 0,41-0,47 sebanyak 27 responden (18,8%), responden dengan nilai besaran risiko antara 0,48-0,54 sebanyak 26 responden (18,2%), responden dengan nilai besaran risiko antara 0,55-0,61 sebanyak 21 responden (14,7%), responden dengan nilai besaran risiko antara 0,62-0,68 sebanyak 3 responden (2,1%), dan responden di kelompok berat badan 0,67-0,80 sebanyak 3 responden (2,1%).

Adapun Besaran Risiko total yang didapatkan oleh anak-anak di SD Negeri Kakatua kota makassar adalah dari 143 responden yang diteliti hasilnya yaitu semua anak-anak mendapatkan nilai $RQ < 1$ artinya Risiko belum ada dan perlu dipertahankan, sedangkan untuk $RQ > 1$ artinya risiko ada dan perlu dikendalikan tapi tidak ada anak-anak yang mendapatkan nilai di atas 1.

Pengambilan sampel pada pagi hari nilai $RQ < 1$ sebanyak 143 responden (100,0%) dan untuk $RQ > 1$ sebanyak 0 reponden (0,0%), pengambilan sampel pada siang hari nilai $RQ < 1$ sebanyak 143 responden (100,0%) dan untuk $RQ > 1$ sebanyak 0 reponden (0,0%), sedangkan untuk pengambilan sampel sore

hari nilai $RQ < 1$ sebanyak 143 responden (100,0%) dan untuk $RQ > 1$ sebanyak 0 reponden (0,0%).

B. Pembahasan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa besaran risiko paparan CO pada anak sekolah di SD Negeri Kakatua Kota Makassar. Hal ini dilakukan dengan membandingkan antara asupan (*intake*) inhalasi CO anak sekolah di SD Negeri Kakatua Kota Makassar dengan dosis acuan CO yang dihitung dengan menggunakan rumus yang telah ditentukan. Perhitungan asupan (*Intake*) diperoleh dari data konsentrasi CO sebagai *risk agent* dalam udara (mg/m^3), laju asupan

Selain itu penelitian ini bertujuan untuk menghitung rata-rata konsentrasi CO, laju asupan, durasi paparan, berat badan, dan besar risiko responden di lokasi penelitian.

1. Konsentrasi Karbon Monoksida

Sekolah merupakan lingkungan pendidikan yang secara sengaja dirancang dan dilaksanakan dengan aturan-aturan yang ketat seperti harus berjenjang dan berkesinambungan, sehingga disebut pendidikan formal (Sabduh, 2010). Lingkungan sekolah yang berada di sekitar jalan raya turut mempengaruhi pencemaran lingkungan yang ada. Aktivitas kendaraan paling tinggi pada pagi dan sore hari. Pencemaran tersebut tidak hanya berdampak bagi lingkungan sekolah saja tetapi juga para anak sekolah yang setiap harinya bersekolah di sana. Aktivitas di sekolah berlangsung mulai dari pagi sampai sore hari. Kendaraan bermotor palig banyak menyumbang zat-zat yang berbahaya bagi tubuh seperti, CO, NO₂, Pb dan zat-zat lainnya.

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Sandri (2011) menyatakan bahwa Pada hari kerja, konsentrasi polutan paling tinggi terjadi pada waktu siang yaitu sebesar $15577,07 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Pada hari setengah kerja- setengah libur, konsentrasi polutan paling tinggi terjadi pada sore hari yaitu sebesar $13028,31 \mu\text{g}/\text{m}^3$ dan pada hari libur konsentrasi polutan paling tinggi terjadi pada waktu sore yaitu sebesar $9809,96 \mu\text{g}/\text{m}^3$

Gas Karbon Monoksida (CO) dihasilkan dari pembakaran yang tidak sempurna akibat dari pencampuran bahan bakar dan udara yang terlalu kaya. Boleh dikatakan bahwa terbentuknya karbon monoksida (CO) sangat tergantung dari perbandingan campuran bahan bakar dan udara yang masuk dalam ruang bakar. Menurut teori bila terdapat oksigen yang melebihi perbandingan campuran teori/ideal (campuran menjadi terlalu kurus) maka tidak akan termaksud CO.

Pencemaran oleh Karbon monoksida di sebabkan karena ulah tangan manusia itu sendiri. Manusia dianjurkan untuk menjadikan bumi layaknya surga, hal ini karena Nabi Adam terlebih dahulu tinggal di surga. Godaan setan terhadap Nabi Adam adalah bekal baginya untuk taat kepada Allah. Pekerjaan inilah yang harus diingat sepanjang hidup manusia di bumi. Akibat dari ketidaktaatan terhadap perintah Allah adalah mendapatkan hukuman. termaksud didalamnya adalah ketaatan mengikuti petunjuk-petunjuk dalam melestarikan dan memakmurkan bumi. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Fatir/35:39.

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ
 كُفْرَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ إِلَّا حَسَارًا ﴿٣٩﴾

Terjemahnya:

“ Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. barangsiapa yang kafir, Maka (akibat) kekafirannya menimpa dirinya sendiri. dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka”. (Departemen Agama RI, 2013)

Ayat ini mengisyaratkan bahwa setiap orang bertugas membangun dunia ini dan memakmurkannya sesuai petunjuk Allah SWT. Manusia diberi anugerah berupa potensi untuk mengelola dan memakmurkan bumi sesuai dengan kadar masing-masing. Dengan demikian, kelangsungan kehidupan di bumi adalah tanggung jawab manusia sebagai aktor utama yang memiliki peran terbesar dalam kehidupan di bumi.

Salah satu hal yang dapat menyebabkan turunnya konsentrasi CO di udara adalah dengan turunnya hujan. Adapun hadist para ulama tentang turunnya hujan sebagai rahmat Allah yaitu:

“Telah menceritakan kepada kami Isma'il telah menceritakan kepadaku Malik dari Shalih bin Kaisan dari 'Ubaidullah bin 'Abdullah bin'Utbah bin Mas'ud dari Zaid bin Khalid Al Juhaini bahwa dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memimpin kami shalat Shubuh di Hudaibiyyah pada suatu malam sehabis turun hujan. Selesai shalat beliau menghadapkan wajahnya kepada orang banyak lalu bersabda: "Tahukah kalian apa yang sudah difirmankan oleh Rabb kalian?" Orang-orang menjawab, "Allah dan rasul-Nya lebih mengetahui." Beliau lalu bersabda: "Allah berfirman: 'Di pagi ini ada hamba-hamba Ku yang menjadi Mukmin kepada-Ku dan ada pula yang kafir. Orang yang berkata, 'Hujan turun kepada kita karena karunia Allah dan rahmat-Nya', maka dia adalah yang beriman kepada-Ku dan kafir kepada bintang-bintang. Adapun yang berkata, 'Hujan turun disebabkan bintang ini dan itu', maka dia telah kafir kepada-Ku dan beriman kepada bintang-bintang'."

Hadist di atas merupakan salah satu hadis yang menjadi dasar tentang adanya hujan sebagai rahmat Tuhan. Di dalam hadis tersebut secara tekstual berisi pernyataan bahwa orang yang menganggap hujan itu berasal dari bintang (planet)

maka dia telah kafir, sedangkan orang yang beriman adalah orang yang mengatakan bahwa hujan merupakan karunia dan rahmat yang datang dari Allah. Jika berangkat dari normatifitas teks, tidak dapat diragukan bahwa hadis tersebut shahih. Hal ini karena di masa Nabi belum ditemukan berbagai teori dan bukti-bukti ilmiah mengenai terbentuknya hujan. Pengetahuan tentang hujan hanya diketahui langsung dari firman Allah. Sehingga pemahaman Nabi tentang hujan merupakan ilmu yang langsung dari Allah sebagai bukti kerasulannya.

Menurut Ibnu Katsir, sesudah Allah menyebutkan apa yang telah Dia berikan kepada mereka nikmat-Nya (yang lain) yang diberikan kepada mereka yaitu berupa turunnya hujan dari langit, yang di dalam hujan terdapat air yang dapat diminum dan kenikmatan dunia untuk mereka dan Allah menjadikannya air hujan yang diminum tawar lagi cair, yang mudah bagimu meminumnya, dan Allah tidak menjadikannya asin lagi pahit. Kemudian, Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dari hujan itu untukmu, yang kamu semua mengembalakan ternak-ternakmu di tempat itu, seperti apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, Ikrimah, Adh- Dhahhak, Qatadah, Ibnu Zaid, dalam firman Allah: *Fiihi tusiimuun* (Di untuk binatang-binatang mereka tempat itu kamu mengembalakan ternakmu) artinya mengembalakan, dari lafadz itu pula disebut *Al-Ibilus Saaimah* artinya, unta yang digembalakan.

Hujan merupakan salah satu perkara terpenting bagi kehidupan makhluk hidup di muka bumi. Ia merupakan sebuah prasyarat bagi aktivitas di suatu tempat, tidak hanya manusia, tapi hampir semua makhluk. Allah membagikan hujan dengan sangat teliti dan bijaksana. Air yang dibawa oleh hujan mengalir

dari daratan ke lautan dan samudra setelah menjalankan perannya dalam mengairi tumbuh-tumbuhan, member minum hewan-hewan dan manusia yang banyak, meremukkan bebatuan bumi, membentuk tanah, mengentalkan keledak (*sedimen*) yang masih mentah, membuat dan membelah saluran dan aliran air, termasuk meringankan dan melembabkan udara.

Pengambilan sampel udara dan penentuan titik di sekitar SD Negeri Kakatua ini mengacu pada SNI 19-7119.6-2005. Jumlah titik sebanyak 24 titik dan pengambilan dilakukan pada pagi, siang dan sore hari.

Data rata-rata konsentrasi CO di SD Negeri Kakatua dengan tiga waktu pengambilan adalah pada pagi hari sebesar 964,48 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$, siang hari sebesar 879,44 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ dan pada sore hari sebesar 1054,78 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$. Meskipun konsentrasi gas CO di SD Negeri Kakatua masih dibawah nilai baku mutu nasional yaitu 30.000 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$, namun dalam penelitian ini tidak memperhatikan konsentrasi yang diperoleh melebihi nilai baku mutu atau tidak karena tinggi atau rendahnya konsentrasi CO tetap mempengaruhi besarnya risiko pada anak-anak sekolah di lokasi penelitian untuk terpapar CO.

Adapun beberapa hal yang mempengaruhi rendahnya konsentrasi CO pada saat pengukuran yaitu:

a. Suhu dan Kelembaban

Keberadaan karbon monoksida (CO) sangat mempengaruhi tinggi rendahnya suhu di udara. Semakin banyaknya karbon gas karbon dioksida (CO₂) terdispersi ke udara maka suhu udara meningkat. (Putri (2011) menyebutkan bahwa pada siang hari sebagian dari radiasi matahari akan diserap oleh gas-gas

atmosfer dan partikel padat yang melayang di atmosfer. serapan radiasi matahari akan menyebabkan suhu udara meningkat. Suhu udara harian maksimum tercapai beberapa saat setelah intensitas cahaya maksimum tercapai pada saat berkas cahaya jauh tegak lurus yakni pada saat tengah hari,. Hal ini berbanding terbalik dengan keadaan dilapangan dimana pada saat penelitian intensitas cahaya matahari agak kurang yang menyebabkan suhu udara rendah dan kelembaban tinggi disebabkan oleh curah hujan.

b. Kecepatan Angin

Kecepatan angin berpengaruh terhadap pendistribusian gas karbon dioksida (CO_2). Besar atau kecilnya laju kecepatan angin oleh besar dan banyaknya bangunan di suatu wilayah, karena jika di wilayah seperti perkotaan bangunan gedung bertingkat tinggi dan banyak akan membuat laju angin menghambat sehingga dimungkinkan tidak terjadi pembersihan udara kota. Hal ini tidak sejalan dengan apa yang terjadi dilapangan dimana kecepatan angin agak kecil karena kurangnya bangun-bangunan dekat sekolah.

c. Jumlah kendaraan

Sering kali konsentrasi tinggi CO didapatkan dari gas buang kendaraan bermotor. Semakin banyak kendaraan yang ada maka semakin banyak pula polusi udara yang dihasilkan. Jumlah kendaraan pada saat penelitian berlangsung tidak terlalu banyak sehingga emisi yang dihasilkan juga sedikit.

d. Penanaman Pohon

Salah satu langkah untuk menanggulangi polusi CO di udara adalah dengan menanam pohon disekitar, semakin banyak pohon yang ditanam maka

semakin sedikit pula konsentrasi karbon diudara. Dilokasi penelitian ada Green House dan banyak pohon yang dapat meminimalisir konsentrasi Karbon Monoksida di udara ambien.

Di udara ambien yang normal CO dapat menyebabkan keracunan yang mengakibatkan berbagai gejala kesehatan. Keracunan gas karbon monoksida (CO) dapat ditandai dari keadaan yang ringan, berupa pusing, sakit kepala dan mual. Keadaan yang lebih berat dapat berupa menurunnya kemampuan gerak tubuh, gangguan pada sistem kardiovaskular, serangan jantung sampai pada kematian

Konsentrasi gas karbon monoksida (CO) di udara secara langsung akan mempengaruhi konsentrasi karboksihemoglobin (COHb). Bila konsentrasi gas CO di udara tetap maka konsentrasi COHb di dalam darah akan mencapai keseimbangan tertentu dan akan tetap bertahan selama tidak ada perubahan pada konsentrasi CO di udara. Dalam keadaan normal sebenarnya darah sudah mengandung COHb sebanyak 0,5%, berasal dari proses metabolisme di dalam tubuh, terutama merupakan hasil pemecahan heme komponen hemoglobin dalam darah itu sendiri, ditambah lagi dari konsentrasi CO yang terdapat di udara dalam konsentrasi rendah.

2. Laju Asupan Harian

Laju asupan harian adalah banyaknya udara yang mengandung CO yang terhirup di lokasi penelitian. Data laju asupan ini diperoleh dari hasil perkalian antara nilai rekomendasi dari US-EPA ($0,5 \text{ m}^3/\text{jam}$) dengan lamanya (t) responden berada dilokasi penelitian.

Nilai laju asupan harian anak sekolah di lokasi penelitian adalah 2,4 m³/hari, 2,5 m³/hari dan 3,0 m³/hari. Dengan nilai laju asupan untuk 2,4 m³/hari sebanyak 46 orang (32,2 %), untuk nilai 2,5 m³/hari sebanyak 44 orang (30,7%) sedangkan untuk nilai laju asupan 3,0 m³/hari sebanyak 53 orang (37,1%).

Nilai laju asupan rata-rata ini lebih rendah dibandingkan dengan nilai laju asupan rata-rata pada penelitian yang dilakukan oleh Alkadri (2013) yang bernilai 9,0348 m³/hari. dengan jumlah responden yang memiliki laju asupan harian > 9,0348 m³/hari sebanyak 37 responden dan yang memiliki laju asupan harian < 9,0348 m³/hari sebanyak 24 responden.

Besarnya laju asupan berkaitan dengan lamanya responden berada di lokasi penelitian dalam sehari yang diketahui melalui pertanyaan dalam lembar observasi mengenai rata-rata responden berada di lokasi penelitian. Rata-rata responden melakukan aktifitasnya masih dalam sekitar lokasi penelitian misalnya anak-anak yang kesehariannya lebih dominan melakukan aktivitas di lapangan, sekitar kantin dan di luar kelas yang masih mencakup wilayah penelitian sehingga rata-rata lama responden berada di lokasi penelitian dalam sehari terhitung 6 jam/hari. Oleh sebab itu, nilai laju asupan responden rata-rata tinggi untuk kategori anak-anak.

Hal ini dijelaskan pula dalam penelitian Seprianto (2012) Mekanik yang terpapar sekitar 6-7 jam per hari lebih banyak yang memiliki konsentrasi karbon monoksida dalam darah yang tidak memenuhi syarat dibandingkan yang terpapar selama 3-5 jam per hari. Semakin lama responden berada di lokasi penelitian maka semakin besar pula risiko yang akan diterimanya

Dari penjelasan tersebut, nilai laju asupan dipengaruhi oleh lamanya anak sekolah beraktivitas di lingkungan sekolah seperti penelitian yang dilakukan oleh Ramadhona (2014) yang menunjukkan semakin lama orang terpapar amonia semakin besar risiko kesehatan yang diterima. Hal ini pun berlaku untuk semua jenis zat pencemar udara lainnya yang termaksud di dalamnya CO.

3. Durasi Paparan

Durasi paparan adalah lamanya waktu responden menghirup udara yang mengandung CO di lokasi penelitian dalam satuan tahun. Nilai rata-rata durasi responden adalah 5,05 tahun. Durasi paparan terendah adalah 4 tahun dan tertinggi adalah 6 tahun.

Pada tabel 4.6 Nilai Durasi Paparan anak sekolah di lokasi penelitian adalah 4 tahun, 5 tahun dan 6 tahun. Dengan nilai laju asupan untuk 4 tahun sebanyak 46 orang (32,2 %), untuk nilai 5 tahun sebanyak 44 orang (30,7%) sedangkan untuk nilai laju asupan 6 tahun sebanyak 53 orang (37,1%).

Semakin tinggi nilai durasi paparan maka semakin tinggi juga risiko responden untuk terpapar gas CO. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Aprilia, 2017) menyatakan bahwa Durasi paparan akan mempengaruhi jumlah asupan gas CO yang diterima oleh petugas pengumpul tol. Semakin lama seseorang bekerja maka semakin banyak terpapar zat berbahaya ke dalam tubuh oleh lingkungan kerja yang tidak sehat.

Penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan Novirsa dan Achmadi (2012) serta Ma'rufi (2014) yang memiliki nilai durasi paparan 24 jam/hari. Hal ini dikarenakan penelitian ini memiliki objek anak

sekolah yang hanya memiliki durasi pajanan 6 jam/hari sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Norvisa dan Achmadi memiliki responden masyarakat usia dewasa. Waktu pajanan selama 24 jam/hari merupakan waktu pajanan maksimal dalam kehidupan sehari-hari dalam satuan jam/hari, sehingga jika terpapar dalam waktu maksimal maka akan semakin besar pula peluang responden memiliki besar risiko yang tidak aman, seperti penelitian yang dilakukan oleh Ramadhona (2014) yang menunjukkan semakin lama orang terpapar amonia semakin besar risiko kesehatan yang diterima. Hal ini pun berlaku untuk semua jenis zat pencemar udara lainnya yang termaksud di dalamnya CO.

4. Berat Badan

Berat badan yang dimaksud adalah berat badan responden pada saat dilakukan penelitian dalam satuan kilogram (kg). Nilai rata-rata dari data berat badan responden adalah 33,12 kg. Dengan berat badan terendah 18,2 kg dan berat badan tertinggi 79,4 kg. Dari tabel 4.7 menunjukkan bahwa lebih banyak responden yang memiliki berat badan <33,12 dibandingkan responden yang memiliki berat badan >33,12 kg.

Berat badan mempengaruhi besar risiko paparan zat berbahaya seseorang. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Sianipar (2009) pada masyarakat yang tinggal di sekitar TPA Sampah Terjun Medan, menunjukkan hasil Chi-square antara berat badan rata-rata responden (58 kg) dan besar risiko, responden yang memiliki berat badan 58 kg mempunyai peluang 1.342 kali memiliki risiko yang akan mengganggu kesehatan akibat paparan H₂S dibandingkan responden yang memiliki berat badan di bawah 58 kg.

Pada orang gemuk kerja sistem pernapasannya cenderung lebih berat dan kapasitas parunya relatif lebih kecil dibandingkan dengan orang yang kurus. Hal ini terjadi karena penimbunan lemak pada dinding dada dan perut yang akan mengganggu gerak pernapasan. dalam keadaan normal, kedua paru-paru dapat menampung udara sebanyak 5 liter. Waktu ekspirasi, di dalam paru-paru masih tertinggal ± 3 liter udara.

Sesuai dengan teori Syaifuddin (1997) yang menyatakan semakin besar juga kapasitas volume paru seseorang yang memungkinkan udara lebih banyak masuk ke dalam tubuh, sehingga, semakin besar volume paru-paru seseorang yang dimasuki udara yang mengandung CO, memungkinkan semakin besar risiko seseorang tersebut memiliki dampak yang tidak aman terhadap kesehatan.

5. Besar Risiko

Besar Risiko (RQ) yang dimaksud adalah kemungkinan risiko terpapar CO pada anak-anak yang bersekolah dilokasi penelitian atau besarnya risiko anak-anak terpapar udara yang mengandung CO dilokasi penelitian melalui perhitungan dengan membandingkan antara asupan dengan konsentrasi acuan. Nilai rata-rata dari data besar risiko (RQ) responden adalah 0,173554, sehingga nilai RQ seluruh responden < 1 artinya nilai risiko belum ada dan perlu di pertahankan. Anak sekolah yang bersekolah dilokasi penelitian belum terjadi risiko paparan karbon monoksida yang terkandung di udara ambien dalam waktu 6 tahun bersekolah di lokasi tersebut.

Banyaknya responden yang mempunyai nilai RQ < 1 di pengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya yaitu berat badan anak-anak yang bersekolah

dilokasi penelitian rata-rata melebihi batas berat badan normal anak-anak, selain itu hal yang menyebabkan nilai $RQ < 1$ karena kadar konsentrasi CO tidak melebihi baku mutu nasional yang telah ditetapkan yaitu $30.000 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$.

Adapun nilai rata-rata konsentrasi karbon monoksida di SD Negeri Kakatua berdasarkan waktu pengambilan sampel. Untuk pengambilan sampel pada pagi hari nilai rata-rata konsentrasi CO sebesar $964,48 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$, nilai rata-rata konsentrasi CO pada siang hari sebesar $879,49 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$, sedangkan nilai rata-rata konsentrasi CO pada sore hari sebesar $1054,78 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$. Hasil ini menunjukkan nilai konsentrasi paling tinggi terjadi pada sore hari hal ini dikarenakan pada sore hari banyaknya aktivitas kendaraan bermotor dan lokasi penelitian ini juga berada di dekat jalan raya yang akan menyumbang lebih banyak CO yang berasal dari kendaraan bermotor tersebut.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alkadri (2013) yang menyatakan bahwa nilai RQ rata-rata responden < 1 artinya pedagang kaki lima di kawasan Terminal Mallengkeri belum terjadi resiko paparan Nitrogen Dioksida yang terkandung di udara ambien di lokasi itu dalam waktu 30 tahun ke depan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Putri (2014) yang berjudul “Analisis Risiko Sulfur Dioksida (SO_2) pada Masyarakat yang Bermukim di Sekitar PT. PLN (Persero) Sektor Tello Tahun 2014” menyimpulkan bahwa masyarakat di sana rata-rata memiliki besar risiko akibat paparan SO_2 adalah 4,12 yang berarti masyarakat di sana mempunyai risiko gangguan kesehatan akibat paparan SO_2 . Begitu pula penelitian yang dilakukan oleh Fitriana (2012) yang berjudul

“Analisis Risiko Paparan SO₂ pada Masyarakat di Sekitaran Pabrik Semen Tonasa” menyimpulkan bahwa masyarakat di sana rata-rata memiliki besaran risiko akibat paparan SO₂ sebesar 1,089 yang berarti masyarakat di sana mempunyai risiko gangguan kesehatan akibat paparan SO₂.

Kedua penelitian di atas memiliki nilai besaran risiko > 1 sedangkan pada penelitian ini memiliki nilai besaran risiko < 1. Besaran risiko CO pada anak sekolah di SD Negeri Kakatua Kota Makassar sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

- a. Konsentrasi CO di SD Negeri Kakatua Kota Makassar rata-rata 0,96811 µg/Nm³ sedangkan nilai ambang batas bernilai 30.000 µg/Nm³.
- b. Laju asupan harian anak sekolah di SD Negeri Kakatua Kota Makassar rata-rata 2,65 m³/hari. Nilai ini lebih rendah dibandingkan nilai rata-rata laju asupan harian pada penelitian Putri (2014) yaitu 10,98 m³/hari dan penelitian Fitriani (2012) yaitu 11,28 m³/hari.
- c. Berat badan anak sekolah di lokasi penelitian rata-rata melebihi batas berat badan yang seharusnya.

Risiko akibat paparan karbon monoksida di SD Negeri Kakatua Kota Makassar belum terjadi risiko dan perlu dipertahankan, tapi risiko paparan karbon monoksida mungkin bisa didapatkan dari berkembangannya pengguna jalan yang memungkinkan tingginya konsentrasi di sekitar sekolah.

Terjadinya risiko kesehatan disebabkan oleh beberapa faktor salah satu diantara faktor manusia. Mereka membuat perbaikan di bumi padahal itu bisa saja malah merusak bumi. Namun banyak manusia yang merasa sombong dan merasa

telah melakukan perbaikan di bumi. Padahal sebaliknya, mereka justru melakukan kerusakan namun tidak menyadarinya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah/2: 11-12

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ ﴿١٢﴾

Terjemahnya:

(11) Dan bila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi". mereka menjawab: "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan." (12) Ingatlah, Sesungguhnya mereka Itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar". (Departemen Agama RI, 2013).

Perusakan di bumi adalah segala aktivitas yang mengakibatkan sesuatu yang bermanfaat menjadi berkurang atau hilang manfaatnya. Sedangkan seseorang dikatakan *muṣliḥ* adalah apabila ia menemukan sesuatu yang berkurang manfaatnya atau hilang manfaatnya lalu melakukan aktivitas (memperbaiki) sehingga mengembalikan manfaat dari sesuatu tersebut. Yang lebih dari itu seorang *muṣliḥ* adalah orang yang menemukan sesuatu yang telah memiliki manfaat lalu ia melakukan aktivitas sehingga meningkatkan kualitas manfaat dari benda tersebut

Ayat 11 dan 12 surat al-Baqarah menggambarkan bahwa orang-orang yang benar-benar melakukan kerusakan di muka bumi tidak menyadari perbuatannya. Perusakan yang mereka lakukan meliputi beberapa aspek. Aspek pertama adalah perusakan pada diri mereka sendiri yang enggan berobat sehingga makin parah penyakit yang mereka derita. Aspek kedua adalah perusakan kepada keluarga dan anak-anak mereka melalui sifat buruk yang mereka tularkan kepada keluarga dan

anak-anaknya. Aspek ketiga adalah perusakan kepada masyarakat dengan menghalang-halangi orang lain melakukan kebajikan, menyebarkan isu-isu negatif, menanamkan kebencian dan perpecahan dalam masyarakat. Dan aspek keempat adalah perusakan di bumi. Ini adalah dampak dari keburukan-keburukan yang dilakukannya itu. Jika perusakan-perusakan yang terjadi dibiarkan begitu saja maka akan menyebar ke semua lingkungan hidup.

Berbagai tindakan dan perbuatan manusia seringkali secara tidak langsung telah menyebabkan kerusakan di bumi. Kegiatan yang mereka lakukan hanyalah bertujuan untuk kesenangan sesaat tanpa memedulikan kondisi alam sekitar. Pembangunan industri tanpa adanya perencanaan yang matang mengakibatkan pencemaran lingkungan. Hal ini tentunya akan berdampak buruk bagi kehidupan makhluk yang berada di lingkungan tercemar tersebut.

Adapun hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko lingkungan adalah Reboisasi. Maraknya pembalakan hutan secara liar menimbulkan kerusakan di permukaan bumi. Hutan-hutan akan kehilangan fungsi utamanya sebagai paru-paru dunia. Perubahan lahan hutan menjadi areal pertanian maupun perkebunan, pengambilan hasil hutan dan pembukaan lahan yang kurang mengindahkan kelestarian hutan akan memberikan dampak yang buruk bagi masyarakat. Udara semakin kotor dan berdebu akibat perubahan hutan menjadi kota, penebangan pohon-pohon, pembangunan gedung-gedung pencakar langit, penutupan sawah menjadi beton, dan aktivitas-aktivitas lain yang tidak terkontrol.

Kabut asap tebal menyelimuti hampir seluruh wilayah Riau pada pertengahan Juni 2013, dan menyebabkan terganggunya aktivitas maupun

kesehatan masyarakat. Kabut asap ini dipicu oleh pembakaran hutan sebagai upaya pembukaan lahan baru. Jauh sebelum terjadinya bencana-bencana tersebut, Allah swt telah mengisyaratkan dalam QS. al-Baqarah (2): 11-12 bahwa manusia merasa sombong dan tidak menyadari kerusakan yang dibuatnya di muka bumi. Padahal Allah swt telah mengingatkan dalam Q.S. Hūd/11: 85

وَيَقَوْمٍ أَوْتُوا الْمَكِّيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾

Terjemahnya:

“Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan” (Departemen Agama RI. 2013).

Agar manusia tidak melakukan kerusakan hanya karena mengikuti hawa nafsunya. Keuntungan yang diperoleh dari tindak perusakan hutan tidak sebanding dengan kerugian yang didapatkan.

Fakta-fakta tersebut menuntut adanya sebuah kebijakan dari seluruh lapisan masyarakat untuk memperbaiki seluruh kerusakan. Reboisasi atau penanaman kembali hutan yang telah ditebang (tandus, gundul) adalah salah satu langkah yang harus dilakukan untuk mengurangi dampak global warming. Manfaat lain yang dapat diperoleh dari reboisasi adalah mengurangi erosi tanah oleh angin dan air, pelestarian kesuburan lahan pertanian sekitarnya, kenaikan kadar air tanah perlindungan cekungan air tanah, restorasi keanekaragaman hayati, menghentikan ancaman penggurunan, pencegahan banjir oleh penyimpanan air kapasitas tinggi di hutan, di daerah pegunungan perlindungan terhadap longsor, penangkapan

dan penyimpanan CO₂ untuk mengurangi efek rumah kaca (penyerapan CO₂), dan lain-lain

D. Keterbatasan Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti mempunyai beberapa keterbatasan yang dapat mengurangi kesempurnaan penelitian. Keterbatasan dalam penelitian ini antara lain adalah:

1. Data untuk penilain paparan dalam penelitian ini hanya berdasarkan hasil satu kali pengukuran *risk agent* (karbon monoksida), dengan tidak memperhitungkan adanya perbedaan konsentrasi sebelum dan sesudah penelitian ini dilakukan, sehingga konsentrasi yang di ukur untuk menghitung asupan CO yang diterima kurang mewakili.
2. Dalam perhitungan asupan tidak memperhitungkan dari mana sumber-sumber asupan berasal.
3. Tidak dilakukan pemeriksaan organ saluran pernapasan dari masing-masing responden untuk mengetahui efek toksisitas CO, untuk mengukur biomarker paparan CO tidak dilakukan dalam penelitian ini karena keterbatasan biaya dan waktu.
4. Waktu penelitian dilakukan pada saat musim hujan sehingga memungkinkan konsentrasi gas pencemar CO akan naik turun.

Berdasarkan keterbatasan penelitian ini maka diharapkan dari hasil penelitian ini akan dapat digunakan sehingga acuan untuk penelitian yang telah lanjut, sehingga faktor-faktor keterbatasan peneliti ini dapat teratasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang terdiri dari wawancara, pengukuran udara ambien dan analisis risiko di SD Negeri Kakatua Kota Makassar, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Rata-rata konsentrasi CO dalam udara ambien di SD Negeri Kakatua Kota Makassar tahun 2017 yaitu $968,11 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$
2. Rata-rata laju asupan udara yang mengandung CO di SD Negeri Kakatua Kota Makassar tahun 2017 yaitu $0,5 \text{ m}^3/\text{jam}$
3. Rata-rata durasi paparan anak sekolah terhadap CO di SD Negeri Kakatua Kota Makassar tahun 2017 yaitu 5,05 tahun
4. Rata-rata berat badan anak sekolah di SD Negeri Kakatua Kota Makassar tahun 2017 yaitu 33,128 kg
5. Rata-rata besaran risiko (RQ) CO anak sekolah di SD Negeri Kakatua Kota Makassar tahun 2017 yaitu $\text{RQ} < 1$
6. Nilai $\text{RQ} < 1$ yang artinya anak sekolah yang berada di SD Negeri Kakatua belum terjadi resiko paparan karbon monoksida yang terkadnugn di udara ambien di lokasi penelitian dalam waktu 30 tahun ke depan.

7. Sebagai ummat muslim kita harus senantiasa bersyukur atas rahmat dari Allah SWT, dengan cara mensyukuri, menjaga dan merawat rahmat tersebut dengan baik salah satunya hujan yang dapat membersihkan udara dari bahan-bahan pencemar.

B. Saran

1. Disarankan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar agar memperhatikan dan melakukan sistem pemantauan emisi pada kendaraan umum yang banyak beroperasi di jalan raya.
2. Melakukan program penyuluhan kesehatan masyarakat dengan menginformasikan kepada anak-anak mengenai risiko kesehatan akibat CO di kemudian hari
3. Disarankan untuk pihak sekolah mengajarkan kepada para anak sekolah tentang menanam pohon agar tanaman yang dapat menyerap polutan-polutan dari emisi gas buang khususnya karbon monoksida.
4. Perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai manajemen risiko yang tepat bagi anak sekolah yang ada di SD Negeri Kakatua Kota Makassar.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan terjemahannya. Departemen Agama Republik Indonesia. PT. Bumi Aksara:Jakarta. 2013
- Alqadri,. Analisis risiko paparan nitrogen dioksida pada pedagang kaki lima dikawasan terminal mallengkeri makassar. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN alauddin. 2013
- Anggraeni,N.I.S. Pengaruh Lama Paparan Asap Knalpot dengan Kadar CO 1800 Ppm Terhadap Gambaran Histopatologi Jantung pada Tikus Wistar. Fakultas Kedokteran UNDIP. Semarang. 2009
- Aprilia, Devita Nur. Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan Paparan Gas Karbon Monoksida (CO) PADA Petugas Pengumpul Tol di Semarang. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro Semarang. 2017
- Arifin. *Sumber-sumber Pencemaran Udara.*
<https://airpollution8.wordpress.com/2013/02/23/sumber-sumberpencemaran-udara/>, diakses pada hari selasa tanggal 4 November 2012 pukul 10.00.2012
- Aldrich, Tim E., and Jack Griffith. Environmental Epidemiologi and Risk Assesment. New York: Van Nos-trand Reinhold. 1993
- ATSDR. "Public Health Assessment Guid-ance Manual." <http://www.atsdr.cdc.gov/hac/PHSManual/toc.html>. 2005. (accessed Desember 16, 2011).
- Basri. Syahrul,et.al. Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan (Model Pengukuran Risiko Pencemaran Udara Terhadap Kesehatan. UIN Alauddin Makassar. 2014
- Chandra. Gambaran Asupan Amonia (NH₃) pada Masyarakat Dewasa di Kawasan Sekitar Pemukiman PT. Pusri Palembang Tahun 2015. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2015
- Deddy alif Utama. Analisis risiko paparan CO dan NO₂ pada pedagang di kawasan terminal mallengkeri kota makassar. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. 2015.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung. CV. Penerbit PT. Sygma Examedia.2013
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Laporan Hasil Uji Kualitas Udara Ambien di Jalan Raya Kota Makassar Tahun 2016

- Dinas Perhubungan Kota Makassar. Data Jumlah Kendaraan Setiap Tahun di Kota Makassar Tahun 2016
- Direktorat Jendera PP dan PL Kementerian Kesehatan. Pedoman Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan tahun 2012
- Fitriana. Analisis Risiko Paparan Sulfur Dioksida pada Masyarakat di Sekitar Pabrik Semen Tonasa. Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. 2012
- Gunawan,. *Analisis Kerugian Akibat Polusi Udara Dan Kebisingan Lalu Lintas*. Bandung : Puslitbang. 1997
- Kementerian Lingkungan Hidup No. Kep-45/MENLH/10/1997. *Indeks Standar Pencemaran Udara*
- Kamal, Nahlah Mustafa. Studi tingkat kualitas udara pada kawasan mall Panakukang di makassar. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. 2015
- Kadir, Khairah. Studi kadar karbon monoksida dan karbon dioksida dengan status kesehatan pegawai stasiun pengisian bahan bakar umum di kecamatan rappocini kota makassar. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN alauddin. 2013
- Louvar, J.F.,Louvar,B.D. *Health and Environmental Risk Analysis: Fundamentals with Application*, New jersey: Prentice Hall.1998
- Ma'rufi, Isa. Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan Akibat Transportasi Kendaraan Bermotor di Kota Surabaya. The 17th FSTPT Internasional Symposium Jember University. 2014
- Mukono. *Pencemaran Udara dan Pengaruhnya terhadap Gangguan Saluran Pernapasan*. Surabaya: Airlangga University Press. 2008
- _____. *Epidemiologi Lingkungan*. Surabaya: Airlangga University Press. 2003
- Ningsih, Erwin. Pengaruh paparan gas karbon monoksida (CO) terhadap tekanan darah pekerja jasa becak di terminal tirtonadi surakarta. Fakultas Kedokteran Universitas Sebalas Maret. Surakarta: 2012
- NRC. "Risk Assessment in The Federal Government : Managing The Pro-cess." <http://www.nap.edu/catalog/366.html>. 1983.(accessed Desember 16, 2011).

- Novirsa , Randy, Achmadi, Umar Fahmi. Analisis Risiko Paparan PM_{2,5} di Udara Ambien Siang Hari Terhadap Masyarakat di Kawasan Industri Semen. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional* 7(4)
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah.
- Purba, D. Analisis Prioritas Faktor-Faktor yang Mempengaruhi efektivitas Fungsi Terminal Sarantama (Studi Kasus Terminal Sarantama Kota Pematang siantar). Tesis. Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Medan. 2008.
- Putri, Ardhini. Analisis Konsentrasi Nox di dalam Ruangan pada Rumah Tinggal di Tepi Jalan Raya (Studi Kasus: Wilayah Karees, Bandung). Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB. 2011
- Pohan,N. *Pencemaran Udara*. Program Studi Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara. Medan. 2004
- Rahman, Abdur. Bahan Ajar Pelatihan Analisis Risiko Kesehatan (Program Intensif Tingkat Dasar). Depok: FKm UI. 2007
- Ramadhona, M. Analisis Risiko Kesehatan Paparan Amonia (NH₃) pada Karyawan di Area Produksi Amonia PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang Tahun 2014. Skripsi. Fakultas Kesehatan Masyarakat Unuversitas Sriwijaya. 2014
- Sabdulloh, Uyoh. *Pedagogik Ilmu Mendidik*. Bandung:Alfabeta. 2010
- Sastrawijaya, A.T. *Pencemaran Lingkungan*. Rineka Cipta: Jakarta. 2009
- Saputra, Y.E. Karbonmonoksida dan Dampaknya Terhadap Kesehatan. <http://Karbonmonoksida> dan dampaknya terhadap kesehatan Chem-Is-Try.org situs kimia Indonesia.htm (24 November 2011).2009.
- Sarira, Destiani Rerung Isa. Studi kadar SO₂ dan CO di udara serta keluhan gangguan pernapasan pada masyarakat sekitar PT semen tonasa maros kecamatan bantimurung tahun 2015. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. 2015
- S. Seprianto. M. Sri Sainab. Studi Kadar CO Udara dan Kadar COHB darah Karyawan Mekanik Otomotif Bengkel Perawatan dan Perbaikan. 2015

- Sianipar, Reinhard. Analisis Risiko Paparan Hidrogen Sulfida Pada Masyarakat Sekitar Tempat Pembuangan Akhir Sampah Terjun Kecamatan Medan Marelan. Tesis Magister. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara. 2009
- Standar Nasional Indonesia (SNI) .2005. No.19-7119.6-2005.Faktor Titik Sampel Udara Ambien dan Syarat Pemilihan Lokasi (titik) Pengambilan Contoh Uji
- Sugiyono.Metode penelitian. Alfabeta : Bandung.2007
- Syalbi,I. Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan Akibat Pencemaran Udara Lumpur Lapindo”kajiaan Imajinatif” (Online),(<http://idanputri.blogspot.com/2017/07/analisis-risiko-kesehatan-lingkungan.html>), diakses 21 Mei 2014. 2010
- Syaifudin. Anatomi Fisiologi Untuk Siswa Perawat. Penerbit Buku Kedokteran EGC: Jakarta. 1997
- US EPA. *Exposure factors Handbook*. En-vironmental Protection Agency, 1997.
- Wahyuddin, Putri Puspitasari, Andi Susilawaty, Azriful, Syahrul Basri. Analisis Risiko *Sulfur Dioksida* (SO₂) pada Masyarakat yang Bermukim di Sekitar PT. PLN (Persero) Sektor Tello Tahun 2014. Skripsi UIN Alauddin Makassar. 2014
- Wardhana, Wisnu A. 2004. *Dampak Pencemaran Lingkungan*. Yogyakarta :Penerbit Andi Offset.
- World Health Organization Environmental Health. Disitais dari <http://who.int>.Last Update May 2013
- WHO. *Environmental Health Criteria XXX : Principles for Modelling, Dose Response for The Risk Assess-ment of Chemicals*. Jenewa: IPCS, 2004

L

A

M


P

I

R

A

N



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

LEMBAR OBSERVASI

Lokasi SD Negeri Kakatua Kota Makassar

Tanggal Wawancara :

No. Responden:

I. Responden

Nama	
Jenis Kelamin	
Umur	
Kelas	

II. Variabel

Berat Badan (Kg)	
Waktu Belajar Maksimal (Jam/Hari)	
Waktu Belajar Maksimal (Hari/Minggu)	
Waktu Belajar Maksimal (Tahun)	



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MAKASSAR

Jl. Perintis Kemerdekaan KM 11 Tamalanrea Makassar 90245



LAPORAN HASIL UJI

Report of Analysis

Nama : SHERLI WAHYUNI
NIM : 70200113030
Pekerjaan : Mahasiswa
Jenis Sampel : Udara
Tanggal Penelitian : 6 Nopember 2017
Judul Penelitian : Analisis Risiko Paparan Karbon Monoksida (CO) Terhadap Anak Sekolah di SD Negeri Kakatua Kota Makassar Tahun 2017.

HASIL PEMERIKSAAN

NO. LAB	KODE SAMPEL	SATUAN	CO
17122325	01	$\mu\text{g} / \text{Nm}^3$	849.5817
17122326	02	$\mu\text{g} / \text{Nm}^3$	907.6426
17122327	03	$\mu\text{g} / \text{Nm}^3$	1146.285
17122328	04	$\mu\text{g} / \text{Nm}^3$	978.6021
17122329	05	$\mu\text{g} / \text{Nm}^3$	1052.761
17122330	06	$\mu\text{g} / \text{Nm}^3$	907.6426
17122331	07	$\mu\text{g} / \text{Nm}^3$	881.8451
17122332	08	$\mu\text{g} / \text{Nm}^3$	991.5008
17122333	09	$\mu\text{g} / \text{Nm}^3$	894.7439
17122334	10	$\mu\text{g} / \text{Nm}^3$	959.2374
17122335	11	$\mu\text{g} / \text{Nm}^3$	872.1794
17122336	12	$\mu\text{g} / \text{Nm}^3$	881.8451
17122337	13	$\mu\text{g} / \text{Nm}^3$	807.6526
17122338	14	$\mu\text{g} / \text{Nm}^3$	907.6426
17122339	15	$\mu\text{g} / \text{Nm}^3$	801.2199
17122340	16	$\mu\text{g} / \text{Nm}^3$	956.0044
17122341	17	$\mu\text{g} / \text{Nm}^3$	1017.298
17122342	18	$\mu\text{g} / \text{Nm}^3$	1043.096
17122343	19	$\mu\text{g} / \text{Nm}^3$	1072.126
17122344	20	$\mu\text{g} / \text{Nm}^3$	1088.258
17122345	21	$\mu\text{g} / \text{Nm}^3$	1043.096
17122346	22	$\mu\text{g} / \text{Nm}^3$	1039.863
17122347	23	$\mu\text{g} / \text{Nm}^3$	1052.761
17122348	24	$\mu\text{g} / \text{Nm}^3$	1081.792

Makassar, 18 Januari 2018
Penyelia Kimia Kesehatan,

JOHARSAN, S.Farm

NIP : 196602061988031002

Master Tabel

No	Inisial Nama	Jenis Kelamin	Kelas	Berat Badan
1	AD	Perempuan	IV A	21,3
2	AR	Perempuan	IV A	27,3
3	BC	Perempuan	IV A	29
4	CKP	Perempuan	IV A	19,3
5	FFA	Laki-laki	IV A	25,4
6	GE	Laki-laki	IV A	26,3
7	KZT	Perempuan	IV A	24
8	MAJ	Laki-laki	IV A	28
9	MS	Perempuan	IV A	34
10	MAR	Laki-laki	IV A	27
11	MAA	Laki-laki	IV A	19,8
12	MFA	Laki-laki	IV A	21,6
13	MTI	Laki-laki	IV A	20,6
14	MYG	Laki-laki	IV A	32,1
15	MAL	Laki-laki	IV A	29,5
16	N	Perempuan	IV A	32,2
17	NIT	Perempuan	IV A	25,3
18	NS	Laki-laki	IV A	25,8
19	RP	Laki-laki	IV A	39,3
20	RR	Perempuan	IV A	29,3
21	Rri	Laki-laki	IV A	23,3
22	SS	Laki-laki	IV A	22,5
23	AA	Laki-laki	IV A	28,9
26	MAI	Laki-laki	IV A	39,7
25	YF	Laki-laki	IV B	21.1
26	AF	Laki-laki	IV B	24,8
27	AJA	Laki-laki	IV B	26,3

28	MTU	Laki-laki	IV B	32,7
29	K	Laki-laki	IV B	43,1
30	MN	Laki-laki	IV B	39,3
31	MF	Laki-laki	IV B	25,5
32	MR	Laki-laki	IV B	27,6
33	AN	Perempuan	IV B	40,7
34	StS	Perempuan	IV B	33,4
35	ATR	Perempuan	IV B	22,9
36	KP	Perempuan	IV B	18,2
37	JR	Perempuan	IV B	30,2
38	AP	Laki-laki	IV B	32,8
39	NF	Perempuan	IV B	28,4
40	CN	Perempuan	IV B	29,6
41	F	Laki-laki	IV B	19,6
42	RH	Laki-laki	IV B	22,7
43	MF	Laki-laki	IV B	20,7
44	NH	Perempuan	IV B	20,6
45	NAA	Perempuan	IV B	25,4
46	MS	Laki-laki	IV B	27,2
47	ARJ	Laki-laki	V A	25
48	Aaj	Perempuan	V A	36,3
49	Mfi	Laki-laki	V A	54,8
50	MFR	Laki-laki	V A	47,3
51	MR	Laki-laki	V A	27,8
52	MA	Laki-laki	V A	27,8
53	MFI	Laki-laki	V A	32,5
54	MR	Laki-laki	V A	34,8
55	MRM	Laki-laki	V A	34,8
56	MTA	Laki-laki	V A	27,7
57	MZ	Laki-laki	V A	22,5

58	TR	Laki-laki	V A	24,1
59	RDS	Laki-laki	V A	44,1
60	AR	Perempuan	V A	26,2
61	F	Perempuan	V A	37,1
62	MS	Perempuan	V A	28,7
63	N	Perempuan	V A	43,8
64	NA	Perempuan	V A	28,2
65	NAR	Perempuan	V A	50,1
66	SAZ	Perempuan	V A	30,7
67	SK	Perempuan	V A	22,1
68	AF	Perempuan	V A	32,4
69	RR	Perempuan	V A	27,3
70	AMY	Laki-laki	V B	25,4
71	AAG	Laki-laki	V B	35,5
72	HM	Laki-laki	V B	25,7
73	DRA	Laki-laki	V B	23
74	HY	Laki-laki	V B	29
75	MADA	Laki-laki	V B	31,8
76	MR	Laki-laki	V B	47,7
77	MFN	Laki-laki	V B	23,4
78	MS	Laki-laki	V B	34,9
79	MFA	Laki-laki	V B	37,6
80	MAA	Laki-laki	V B	37
81	MR	Laki-laki	V B	45,7
82	PF	Laki-laki	V B	24,8
83	RS	Laki-laki	V B	20,1
84	ANF	Perempuan	V B	42,7
85	FS	Perempuan	V B	30,1
86	NA	Perempuan	V B	26,5
87	NZ	Perempuan	V B	39,1

88	WA	Perempuan	V B	26,3
89	PMM	Perempuan	V B	29,2
90	SNR	Perempuan	V B	29,5
91	AR	Laki-laki	VI A	26,5
92	ADW	Perempuan	VI A	28,6
93	AS	Laki-laki	VI A	29,7
94	AAR	Perempuan	VI A	54,2
95	AP	Laki-laki	VI A	26,4
96	ADA	Laki-laki	VI A	31,2
97	ADS	Laki-laki	VI A	31,7
98	AAY	Perempuan	VI A	23,9
99	DA	Perempuan	VI A	44
100	FB	Laki-laki	VI A	26,5
101	JS	Perempuan	VI A	43,4
102	KH	Perempuan	VI A	43,9
103	LK	Perempuan	VI A	26,8
104	MS	Laki-laki	VI A	44,5
105	MBA	laki-laki	VI A	49,5
106	MHH	laki-laki	VI A	43,5
107	MR	laki-laki	VI A	33,3
108	MS	laki-laki	VI A	28,7
109	NA	Perempuan	VI A	36,2
110	NM	Perempuan	VI A	21
111	NAS	Perempuan	VI A	28,5
112	NI	Perempuan	VI A	30,2
113	RF	Laki-laki	VI A	68,3
114	RR	Laki-laki	VI A	79,4
115	SDL	Perempuan	VI A	49
116	SNA	Perempuan	VI A	49
117	MFW	Laki-laki	VI A	59,5

118	ADP	Laki-laki	VI B	55,3
119	FR	Perempuan	VI B	47,9
120	FAS	Perempuan	VI B	34,4
121	GE	Laki-laki	VI B	26,5
122	HS	Laki-laki	VI B	33,2
123	H	Perempuan	VI B	38,2
124	Hah	Laki-laki	VI B	28,8
125	HA	Perempuan	VI B	36,1
126	LS	Perempuan	VI B	47,5
127	MA	Laki-laki	VI B	27,4
128	MES	Laki-laki	VI B	35,8
129	Mad	Laki-laki	VI B	20,1
130	MASS	Laki-laki	VI B	27,6
131	MFK	Laki-laki	VI B	41,1
132	MNI	Laki-laki	VI B	26,5
133	MRMM	Laki-laki	VI B	54,6
134	MRAK	Laki-laki	VI B	70,6
135	MS	Laki-laki	VI B	31,6
136	MSr	Perempuan	VI B	31,3
137	NAR	Perempuan	VI B	60
138	RPR	Perempuan	VI B	29,1
139	WD	Perempuan	VI B	24,9
140	SRN	Perempuan	VI B	56,7
141	NNA	Perempuan	VI B	20
142	NAP	Perempuan	VI B	45
143	KNH	Perempuan	VI B	34,3

Hasil Perhitungan Intake dan RQ

No	Inisial Nama	C	R	Te	fg	Dt	Wb	tavg	Intake	RfC	RQ
1	AD	0.96811	0.5	6	200	4	21.3	10950	0.00996	0.02	0.498095
2	AR	0.96811	0.5	6	200	4	27.3	10950	0.00777	0.02	0.388624
3	BC	0.96811	0.5	6	200	4	29	10950	0.00732	0.02	0.365842
4	CKP	0.96811	0.5	6	200	4	19.3	10950	0.01099	0.02	0.549711
5	FFA	0.96811	0.5	6	200	4	25.4	10950	0.00835	0.02	0.417694
6	GE	0.96811	0.5	6	200	4	26.3	10950	0.00807	0.02	0.4034
7	KZT	0.96811	0.5	6	200	4	24	10950	0.00884	0.02	0.442059
8	MAJ	0.96811	0.5	6	200	4	28	10950	0.00758	0.02	0.378908
9	MS	0.96811	0.5	6	200	4	34	10950	0.00624	0.02	0.312042
10	MAR	0.96811	0.5	6	200	4	27	10950	0.00786	0.02	0.392942
11	MAA	0.96811	0.5	6	200	4	19.8	10950	0.01072	0.02	0.53583
12	MFA	0.96811	0.5	6	200	4	21.6	10950	0.00982	0.02	0.491177
13	MTI	0.96811	0.5	6	200	4	20.6	10950	0.0103	0.02	0.515021
14	MYG	0.96811	0.5	6	200	4	32.1	10950	0.00661	0.02	0.330512
15	MAL	0.96811	0.5	6	200	4	29.5	10950	0.00719	0.02	0.359642
16	N	0.96811	0.5	6	200	4	32.2	10950	0.00659	0.02	0.329485
17	NIT	0.96811	0.5	6	200	4	25.3	10950	0.00839	0.02	0.419345
18	NS	0.96811	0.5	6	200	4	25.8	10950	0.00822	0.02	0.411218
19	RP	0.96811	0.5	6	200	4	39.3	10950	0.0054	0.02	0.26996
20	RR	0.96811	0.5	6	200	4	29.3	10950	0.00724	0.02	0.362096
21	Rri	0.96811	0.5	6	200	4	23.3	10950	0.00911	0.02	0.45534

22	SS	0.96811	0.5	6	200	4	22.5	10950	0.00943	0.02	0.47153
23	AA	0.96811	0.5	6	200	4	28.9	10950	0.00734	0.02	0.367108
26	MAI	0.96811	0.5	6	200	4	39.7	10950	0.00535	0.02	0.26724
25	YF	0.96811	0.5	6	200	4	21.1	10950	0.01006	0.02	0.502816
26	AF	0.96811	0.5	6	200	4	24.8	10950	0.00856	0.02	0.427799
27	AJA	0.96811	0.5	6	200	4	26.3	10950	0.00807	0.02	0.4034
28	MTU	0.96811	0.5	6	200	4	32.7	10950	0.00649	0.02	0.324447
29	K	0.96811	0.5	6	200	4	43.1	10950	0.00492	0.02	0.246158
30	MN	0.96811	0.5	6	200	4	39.3	10950	0.0054	0.02	0.26996
31	MF	0.96811	0.5	6	200	4	25.5	10950	0.00832	0.02	0.416056
32	MR	0.96811	0.5	6	200	4	27.6	10950	0.00769	0.02	0.384399
33	AN	0.96811	0.5	6	200	4	40.7	10950	0.00521	0.02	0.260674
34	StS	0.96811	0.5	6	200	4	33.4	10950	0.00635	0.02	0.317647
35	ATR	0.96811	0.5	6	200	4	22.9	10950	0.00927	0.02	0.463294
36	KP	0.96811	0.5	6	200	4	18.2	10950	0.01166	0.02	0.582935
37	JR	0.96811	0.5	6	200	4	30.2	10950	0.00703	0.02	0.351305
38	AP	0.96811	0.5	6	200	4	32.8	10950	0.00647	0.02	0.323458
39	NF	0.96811	0.5	6	200	4	28.4	10950	0.00747	0.02	0.373571
40	CN	0.96811	0.5	6	200	4	29.6	10950	0.00717	0.02	0.358427
41	F	0.96811	0.5	6	200	4	19.6	10950	0.01083	0.02	0.541297
42	RH	0.96811	0.5	6	200	4	22.7	10950	0.00935	0.02	0.467376
43	MF	0.96811	0.5	6	200	4	20.7	10950	0.01025	0.02	0.512533
44	NH	0.96811	0.5	6	200	4	20.6	10950	0.0103	0.02	0.515021
45	NAA	0.96811	0.5	6	200	4	25.4	10950	0.00835	0.02	0.417694

46	MS	0.96811	0.5	6	200	4	27.2	10950	0.0078	0.02	0.390052
47	ARJ	0.96811	0.5	6	200	5	25	10950	0.01061	0.02	0.530471
48	Aaj	0.96811	0.5	6	200	5	36.3	10950	0.00731	0.02	0.365338
49	Mfi	0.96811	0.5	6	200	5	54.8	10950	0.00484	0.02	0.242003
50	MFR	0.96811	0.5	6	200	5	47.3	10950	0.00561	0.02	0.280376
51	MR	0.96811	0.5	6	200	5	27.8	10950	0.00954	0.02	0.477042
52	MA	0.96811	0.5	6	200	5	27.8	10950	0.00954	0.02	0.477042
53	MFI	0.96811	0.5	6	200	5	32.5	10950	0.00816	0.02	0.408055
54	MR	0.96811	0.5	6	200	5	34.8	10950	0.00762	0.02	0.381086
55	MRM	0.96811	0.5	6	200	5	34.8	10950	0.00762	0.02	0.381086
56	MTA	0.96811	0.5	6	200	5	27.7	10950	0.00958	0.02	0.478765
57	MZ	0.96811	0.5	6	200	5	22.5	10950	0.01179	0.02	0.589412
58	TR	0.96811	0.5	6	200	5	24.1	10950	0.01101	0.02	0.550281
59	RDS	0.96811	0.5	6	200	5	44.1	10950	0.00601	0.02	0.300721
60	AR	0.96811	0.5	6	200	5	26.2	10950	0.01012	0.02	0.506175
61	F	0.96811	0.5	6	200	5	37.1	10950	0.00715	0.02	0.35746
62	MS	0.96811	0.5	6	200	5	28.7	10950	0.00924	0.02	0.462083
63	N	0.96811	0.5	6	200	5	43.8	10950	0.00606	0.02	0.30278
64	NA	0.96811	0.5	6	200	5	28.2	10950	0.00941	0.02	0.470276
65	NAR	0.96811	0.5	6	200	5	50.1	10950	0.00529	0.02	0.264706
66	SAZ	0.96811	0.5	6	200	5	30.7	10950	0.00864	0.02	0.43198
67	SK	0.96811	0.5	6	200	5	22.1	10950	0.012	0.02	0.600081
68	AF	0.96811	0.5	6	200	5	32.4	10950	0.00819	0.02	0.409314
69	RR	0.96811	0.5	6	200	5	27.3	10950	0.00972	0.02	0.48578

70	AMY	0.96811	0.5	6	200	5	25.4	10950	0.01044	0.02	0.522117
71	AAG	0.96811	0.5	6	200	5	35.5	10950	0.00747	0.02	0.373571
72	HM	0.96811	0.5	6	200	5	25.7	10950	0.01032	0.02	0.516023
73	DRA	0.96811	0.5	6	200	5	23	10950	0.01153	0.02	0.576599
74	HY	0.96811	0.5	6	200	5	29	10950	0.00915	0.02	0.457303
75	MADA	0.96811	0.5	6	200	5	31.8	10950	0.00834	0.02	0.417037
76	MR	0.96811	0.5	6	200	5	47.7	10950	0.00556	0.02	0.278025
77	MFN	0.96811	0.5	6	200	5	23.4	10950	0.01134	0.02	0.566743
78	MS	0.96811	0.5	6	200	5	34.9	10950	0.0076	0.02	0.379994
79	MFA	0.96811	0.5	6	200	5	37.6	10950	0.00705	0.02	0.352707
80	MAA	0.96811	0.5	6	200	5	37	10950	0.00717	0.02	0.358427
81	MR	0.96811	0.5	6	200	5	45.7	10950	0.0058	0.02	0.290192
82	PF	0.96811	0.5	6	200	5	24.8	10950	0.0107	0.02	0.534749
83	RS	0.96811	0.5	6	200	5	20.1	10950	0.0132	0.02	0.65979
84	ANF	0.96811	0.5	6	200	5	42.7	10950	0.00621	0.02	0.31058
85	FS	0.96811	0.5	6	200	5	30.1	10950	0.00881	0.02	0.440591
86	NA	0.96811	0.5	6	200	5	26.5	10950	0.01001	0.02	0.500445
87	NZ	0.96811	0.5	6	200	5	39.1	10950	0.00678	0.02	0.339176
88	WA	0.96811	0.5	6	200	5	26.3	10950	0.01009	0.02	0.50425
89	PMM	0.96811	0.5	6	200	5	29.2	10950	0.00908	0.02	0.454171
90	SNR	0.96811	0.5	6	200	5	29.5	10950	0.00899	0.02	0.449552
91	AR	0.96811	0.5	6	200	6	26.5	10950	0.01201	0.02	0.600533
92	ADW	0.96811	0.5	6	200	6	28.6	10950	0.01113	0.02	0.556438
93	AS	0.96811	0.5	6	200	6	29.7	10950	0.01072	0.02	0.53583

94	AAR	0.96811	0.5	6	200	6	54.2	10950	0.00587	0.02	0.293619
95	AP	0.96811	0.5	6	200	6	26.4	10950	0.01206	0.02	0.602808
96	ADA	0.96811	0.5	6	200	6	31.2	10950	0.0102	0.02	0.510068
97	ADS	0.96811	0.5	6	200	6	31.7	10950	0.01004	0.02	0.502023
98	AAY	0.96811	0.5	6	200	6	23.9	10950	0.01332	0.02	0.665863
99	DA	0.96811	0.5	6	200	6	44	10950	0.00723	0.02	0.361685
100	FB	0.96811	0.5	6	200	6	26.5	10950	0.01201	0.02	0.600533
101	JS	0.96811	0.5	6	200	6	43.4	10950	0.00733	0.02	0.366685
102	KH	0.96811	0.5	6	200	6	43.9	10950	0.00725	0.02	0.362509
103	LK	0.96811	0.5	6	200	6	26.8	10950	0.01188	0.02	0.593811
104	MS	0.96811	0.5	6	200	6	44.5	10950	0.00715	0.02	0.357621
105	MBA	0.96811	0.5	6	200	6	49.5	10950	0.00643	0.02	0.321498
106	MHH	0.96811	0.5	6	200	6	43.5	10950	0.00732	0.02	0.365842
107	MR	0.96811	0.5	6	200	6	33.3	10950	0.00956	0.02	0.477902
108	MS	0.96811	0.5	6	200	6	28.7	10950	0.01109	0.02	0.5545
109	NA	0.96811	0.5	6	200	6	36.2	10950	0.00879	0.02	0.439617
110	NM	0.96811	0.5	6	200	6	21	10950	0.01516	0.02	0.757816
111	NAS	0.96811	0.5	6	200	6	28.5	10950	0.01117	0.02	0.558391
112	NI	0.96811	0.5	6	200	6	30.2	10950	0.01054	0.02	0.526958
113	RF	0.96811	0.5	6	200	6	68.3	10950	0.00466	0.02	0.233003
114	RR	0.96811	0.5	6	200	6	79.4	10950	0.00401	0.02	0.20043
115	SDL	0.96811	0.5	6	200	6	49	10950	0.0065	0.02	0.324778
116	SNA	0.96811	0.5	6	200	6	49	10950	0.0065	0.02	0.324778
117	MFW	0.96811	0.5	6	200	6	59.5	10950	0.00535	0.02	0.267464

118	ADP	0.96811	0.5	6	200	6	55.3	10950	0.00576	0.02	0.287778
119	FR	0.96811	0.5	6	200	6	47.9	10950	0.00665	0.02	0.332237
120	FAS	0.96811	0.5	6	200	6	34.4	10950	0.00925	0.02	0.46262
121	GE	0.96811	0.5	6	200	6	26.5	10950	0.01201	0.02	0.600533
122	HS	0.96811	0.5	6	200	6	33.2	10950	0.00959	0.02	0.479341
123	H	0.96811	0.5	6	200	6	38.2	10950	0.00833	0.02	0.4166
124	Hah	0.96811	0.5	6	200	6	28.8	10950	0.01105	0.02	0.552574
125	HA	0.96811	0.5	6	200	6	36.1	10950	0.00882	0.02	0.440835
126	LS	0.96811	0.5	6	200	6	47.5	10950	0.0067	0.02	0.335034
127	MA	0.96811	0.5	6	200	6	27.4	10950	0.01162	0.02	0.580808
128	MES	0.96811	0.5	6	200	6	35.8	10950	0.00889	0.02	0.444529
129	Mad	0.96811	0.5	6	200	6	20.1	10950	0.01584	0.02	0.791748
130	MASS	0.96811	0.5	6	200	6	27.6	10950	0.01153	0.02	0.576599
131	MFK	0.96811	0.5	6	200	6	41.1	10950	0.00774	0.02	0.387205
132	MNI	0.96811	0.5	6	200	6	26.5	10950	0.01201	0.02	0.600533
133	MRMM	0.96811	0.5	6	200	6	54.6	10950	0.00583	0.02	0.291468
134	MRAK	0.96811	0.5	6	200	6	70.6	10950	0.00451	0.02	0.225413
135	MS	0.96811	0.5	6	200	6	31.6	10950	0.01007	0.02	0.503612
136	MSr	0.96811	0.5	6	200	6	31.3	10950	0.01017	0.02	0.508439
137	NAR	0.96811	0.5	6	200	6	60	10950	0.00531	0.02	0.265236
138	RPR	0.96811	0.5	6	200	6	29.1	10950	0.01094	0.02	0.546878
139	WD	0.96811	0.5	6	200	6	24.9	10950	0.01278	0.02	0.639122
140	SRN	0.96811	0.5	6	200	6	56.7	10950	0.00561	0.02	0.280673
141	NNA	0.96811	0.5	6	200	6	20	10950	0.01591	0.02	0.795707

142	NAP	0.96811	0.5	6	200	6	45	10950	0.00707	0.02	0.353647
143	KNH	0.96811	0.5	6	200	6	34.3	10950	0.00928	0.02	0.463969

Keterangan :

I : Asupan (intake), jumlah risk agent (konsentrasi CO) yang masuk ke dalam tubuh responden (mg/kg/hari)

$$I = \frac{C \times R \times t_e \times f_f \times D_t}{W_b \times t_{avg}}$$

Wb x tavg

$$RQ = \frac{\text{Intake (mg/kg/hari)}}{RfC \text{ (mg/kg/hari)}}$$

RfC (mg/kg/hari)

C : Konsentrasi CO (mg/m³)

R : Laju Asupan (untuk anak usia 6-12 tahun adalah 0,5 m³/hari)

t_e : Waktu Paparan (jam/hari)

f_f : Frekuensi Paparan (hari/tahun)

D_t : Durasi Paparan (Tahun)

W_b : Berat Badan Responden (Kg)

t_{avg} : Periode waktu rata-rata (30 tahun × 365 hari/tahun untuk zat nonkarsinogenik, 70 tahun × 365 hari/tahun untuk zat karsinogenik)

Tabel Frekuensi Karakteristik Responden

Kelas

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	IV	46	32.2	32.2	32.2
	V	44	30.8	30.8	62.9
	VI	53	37.1	37.1	100.0
	Total	143	100.0	100.0	

Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	laki-laki	81	56.6	56.6	56.6
	perempuan	62	43.4	43.4	100.0
	Total	143	100.0	100.0	

Berat Badan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	18,2-24,8	26	18.2	18.2	18.2
	24,9-31,5	53	37.1	37.1	55.2
	31,6-38,2	29	20.3	20.3	75.5
	38,3-44,9	15	10.5	10.5	86.0
	44,10-51,7	10	7.0	7.0	93.0
	51,8-58,2	4	2.8	2.8	95.8
	58,3-64,9	3	2.1	2.1	97.9
	>65,0	3	2.1	2.1	100.0
	Total	143	100.0	100.0	

Analisis Deskriptif Variabel

- Konsentrasi Karbon Monoksida

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
VAR00001	24	801.22	1146.28	968.1100	96.01641
Valid N (listwise)	24				

- Laju Asupan Harian CO

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Laju Asupan Harian CO	143	2.4	3.0	2.653	.2701
Valid N (listwise)	143				

Tabel Distribusi Frekuensi

Laju Asupan Harian CO (m3/hari)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	>2,65	53	37.1	37.1	37.1
	<2,65	90	62.9	62.9	100.0
Total		143	100.0	100.0	

- Durasi Paparan

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Durasi Paparan	143	4	6	5.05	.834
Valid N (listwise)	143				

Tabel Distribusi Frekuensi

Durasi Paparan responden

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	>5,05	53	37.1	37.1	37.1
	<5,05	90	62.9	62.9	100.0
	Total	143	100.0	100.0	

- Berat Badan

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Berat Badan	143	18.2	79.4	33.128	11.1030
Valid N (listwise)	143				

Tabel Distribusi Frekuensi

Berat Badan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	>33,12	53	37.1	37.1	37.1
	<33,12	90	62.9	62.9	100.0
	Total	143	100.0	100.0	

- Besar Risiko (RQ)

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Besar Risiko	143	.100215	.397853	.21694280	.058794894
Valid N (listwise)	143				

Tabel Distribusi Frekuensi

Besar Risiko

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	RQ < 1	143	100.0	100.0	100.0

4

LOKASI UNTUK TAMAN



2

Kantin Sehat



GREEN HOUSE


1



8

7

3



PINTU GERBANG


5

PARKIRAN



LAPANGAN UPACARA

6



LAHAN KOSONG

Dokumentasi Penelitian



Penimbangan Berat Badan Responden



Alat Pengukuran udara ambien CO, NO₂ dan Pb



1965



M A K A S S A R

RIWAYAT HIDUP



Sherli Wahyuni, dilahirkan di Pasang Kabupaten Enrekang pada tanggal 20 Oktober 1995. Penulis adalah anak Sulung dari tiga bersaudara dari pasangan bapak (Alm) Irwan S.Pd dan Ibu Pina S.Pd. AUD. Penulis mengawali masa pendidikan di TK Idhata

Loka pada tahun 2000 selama 2 tahun kemudian melanjutkan pendidikan di SD Negeri 88 Loka pada tahun 2002 dan selesai pada tahun 2007. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan ke tingkat sekolah menengah pertama di SMP Negeri 4 Baraka dan selesai pada tahun 2010. Pada tahun tersebut pula penulis melanjutkan pendidikan di tingkat sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Baraka Kabupaten Enrekang. Pada tahun 2013, penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan jurusan Kesehatan Masyarakat dengan peminatan Kesehatan Lingkungan hingga sekarang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R