

**UJI MIKROBIOLOGI AIR ZAM – ZAM DALAM KEMASAN**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Farmasi Pada Jurusan Farmasi  
Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
MAKASSAR

Oleh :  
NUR FADILLAH  
NIM. 70100113095

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
2018**

**UJI MIKROBIOLOGI AIR ZAM-ZAM DALAM KEMASAN**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Farmasi Pada Jurusan Farmasi  
Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
NUR FADILLAH  
NIM. 70100113095  
ALAUDDIN  
MAKASSAR

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawahini:

Nama : Nur fadillah

NIM : 70100113095

Tempat/TanggalLahir : Sinjai/ 27 Oktober 1996

Jur/Prodi/Konsentrasi : Farmasi

Alamat : Sinjai

Judul : Uji Mikrobiologi Air Zam-Zam Dalam Kemasan

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benarlah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dengan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



Samata-gowa, Februari 2018

Penyusun,

**NUR FADILLAH**  
NIM. 70100113095

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Uji Mikrobiologi Air Zam-Zam Dalam Kemasan” yang disusun oleh Nurfadillah, NIM : 70100113095, Mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam Ujian Sidang Skripsi yang diselenggarakan pada hari **Rabu, 14 Februari 2018 M** yang bertepatan dengan **28 Jumadil Awwal 1439 H**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

**Gowa, 14 Februari 2018 M**  
**28 Jumadil Awwal 1439 H**

### DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc. (.....)

Sekretaris : Haeria, S.Si.,M.Si (.....)

Pembimbing I : Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, M.Si., Apt. (.....)

Pembimbing II : M. Rusdi, S.Si., M.Si., Apt. (.....)

Penguji I : Hurria, S.Farm., M.Sc., Apt (.....)

Penguji II : Dr. Hj Nurlaelah Abbas, Lc., M.A. (.....)

Dekan,

**Dr. dr. H. And Armyn Nurdin, M.Sc.**  
**NIP. 19550203 198312 1 001**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Shalawat serta salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad SAW, yang termulia dari para Nabi dan Rasul. Dan semoga pula tercurah atas keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penghargaan yang setinggi-tingginya dan rasa terima kasih penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda A. Jumardi dan Ibunda Nur aeni yang tak henti-hentinya memberi doa dan motivasi serta dukungannya baik dalam bentuk moril terlebih lagi dalam bentuk materil, sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik karena kasih sayang dan bimbingan beliau.

Untuk saudara (i)ku tercinta. Nur faidah serta seluruh keluarga besar penulis yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, terima kasih atas do'a, kasih sayang dan bimbingan, dan dukungannya kepada penulis, tiada kata yang pantas untuk mengungkapkan betapa besar cinta dan kasih sayang yang telah kalian berikan. Mereka adalah semangat terbesar bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan perlindungan-Nya kepada kalian.

Penulis tak lupa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya sebagai ungkapan kebahagiaan kepada :

1. Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan menyelesaikan studi di UIN Alauddin Makassar.
2. Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc. Selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Dr. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
4. Dr. Andi Susilawaty, S.Km., M.Kes. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
5. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
6. Haeria, S.Si., M.Si. Selaku ketua jurusan Farmasi UIN Alauddin Makassar Fakultas Ilmu Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
7. Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, M.Si., Apt. Selaku pembimbing akademik dan juga sekaligus sebagai pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. M. Rusdi, S.Si, M.Si., Apt selaku pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Hurria., S.Farm., M.Sc., Apt Selaku penguji kompetensi yang telah memberi banyak masukan dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.
10. Dr. Hj. Nurlaelah Abbas, Lc., M.A. Selaku penguji agama yang telah banyak memberikan tuntunan dan pengarahan dalam mengoreksi seluruh kekurangan pada skripsi ini.

11. Bapak dan Ibu dosen yang dengan ikhlas membagi ilmunya, semoga jasa-jasanya mendapatkan balasan dari Allah SWT. Serta seluruh staf jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
12. Rekan, saudara, teman seperjuangan yang telah banyak membantu dan telah berjuang bersama dari awal hingga akhir.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Namun besar harapan kiranya dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya, khususnya di bidang farmasi dan semoga bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Amin Ya Rabbal Alamin.

Samata-Gowa, Februari 2018

Penyusun

**NUR FADILLAH**

NIM : 70100113095

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R


## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Uraian Tentang Air Zam-Zam.....	8
B. Sejarah Air Zam-zam .....	11
1. Defenisi.....	8
2. Struktur Air Zam-Zam .....	13
C. Mikrobiologi.....	14

	D. Tinjauan Umum Air Minum Kemasan .....	27
	E. Persyaratan Mikrobiologi Air .....	29
	F. Bakteri Uji.....	31
	G. Kriteria Klasifikasi Bakteri .....	33
<b>BAB III</b>	<b>METODOLOGI PENELITIAN</b>	
	A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	38
	B. Alat dan Bahan.....	38
	C. Populasi dan Sampel .....	39
	D. Prosedur Kerja.....	39
	E. Pengujian Sampel .....	40
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
	A. Hasil Penelitian .....	44
	B. Pembahasan.....	46
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	50
	B. Saran .....	50
	KEPUSTAKAAN .....	51
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	54
	BIOGRAFI .....	70

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Skema Kerja.....	67
2. Gambar Pengamatan.....	54
3. Pembuatan Medium.....	62



## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Hasil pengamatan metode ALT dari sampel AB.....	44
2. Hasil pengamatan metode MPN dari sampel AB.....	45
3. Hasil uji identifikasi bakteri patogen.....	46



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4. Proses hasil pengujian ALT sampel kemasan A.....	54
5. Proses hasil pengujian ALT sampel kemasan B.....	55
6. Hasil pengujian MPN air zam-zam dalam kemasan A .....	56
7. Hasil pengujian MPN air zam-zam dalam kemasan B .....	57
8. Hasil hasil pengujian bakteri <i>Salmonella</i> pada sampel AB .....	58
9. Hasil hasil pengujian bakteri <i>Pseudomonas aeruginosa</i> sampel AB...	59
10. Hasil pengujian bakteri <i>Escherichia coli</i> sampel AB .....	60
11. Foto tempat pembelian sampel .....	61



## ABSTRAK

Nama Penyusun : Nur fadillah

NIM : 70100113095

Judul Skripsi : Uji Mikrobiologi Air Zam-Zam Dalam Kemasan

---

Telah dilakukan penelitian tentang uji mikrobiologi air zam-zam dalam kemasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya mikroba terhadap air zam-zam dalam kemasan. Tahap pertama isolasi mikroba yakni dengan melakukan pengenceran 10 : 1 hingga 10 : 3 dengan menggunakan metode tuang pada medium Nutrien Agar terhadap mikroba uji. Kemudian menggunakan metode MPN melalui beberapa tahap tes pendahuluan, pemeriksaan pada tes pendahuluan dengan menginokulasi pada media Lactose Broth dilihat ada tidaknya pembentukan gas dalam tabung durham, kemudian Tes Penegasan Pemeriksaan pada tes penegasan dengan penanaman pada media Brilliant Green Lactosa Bile Broth, dilihat ada tidaknya pembentukan gas dalam tabung durham setelah diinkubasi selama 24 jam. Selanjutnya metode identifikasi bakteri adalah untuk mengetahui sifat-sifat morfologi bakteri dalam mikroba uji.

Hasil penelitian diperoleh untuk angka lempeng total dengan metode tuang pada sampel air zam-zam dalam kemasan A adalah  $7 \times 10^2$  koloni/ml, sampel air zam-zam dalam kemasan B adalah  $5 \times 10^2$  koloni/ml. Selanjutnya dilakukan pengujian MPN pada pengujian didapatkan hasil yang diperoleh dari jumlah total bakteri secara MPN pada sampel air zam-zam dalam kemasan A adalah 3 APM/ml. Sampel kemasan B hasil yang didapatkan adalah 64 AMP/ml. Dalam pengujian identifikasi bakteri patogen didapatkan hasil negatif untuk bakteri *Escherichia coli*. Bakteri *Salmonella sp* hasil yang didapatkan positif, dan untuk bakteri *Pseudomonas aeruginosa* hasil yang didapatkan adalah positif.

**Kata kunci** : Air zam-zam. Uji mikrobiologi.

## ABSTRACT

Nama Penyusun : Nur fadillah

NIM : 70100113095

Judul Skripsi : Test Water Microbiology Zam-Zam In Packaging

---

A research on microbiology of zam-zam water in packaging has been conducted. This study aims to determine the presence of microbials against zam-zam water in packaging. The first stage of microbial isolation is by diluting 10: 1 to 10: 3 by using pour method on Nutrient Agar medium against test microbes. Then using the MPN method through several pretest test stages of examination on preliminary test by inoculating on Lactose Broth media seen the presence or absence of gas formation in tube durham, then Test Confirmation Examination on assertion test by planting on Brilliant Green Lactosa Bile Broth media, seen the existence or absence of gas formation in Durham tube after incubation for 24 hours. Furthermore, bacterial identification method is to know the properties of bacterial morphology in microbial test.

The results obtained for total plate number by the method of pouring on zam-zam water sample in packaging A is  $7 \times 10^2$  colony / ml, zam-zam water sample in pack B is  $5 \times 10^2$  colony / ml. Furthermore, the MPN test on the test obtained the results obtained from the total number of bacteria by MPN on zam-zam water samples in packaging A is 3 APM / ml for packaging sample B which is 64 AMP / ml. In testing the identification of pathogenic bacteria and the results obtained for the bacteria *Escherichia coli* negative. *Salmonella sp* bacteria obtained positive results, bacteria *Pseudomonas aeruginosa* results obtained positif.

**Keywords:** *Water zam-zam, Microbiology test*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. *Latar belakang masalah*

Air minum merupakan kebutuhan manusia paling penting, seperti diketahui kadar air dalam tubuh manusia mencapai 68 persen dan untuk tetap hidup air dalam tubuh tersebut harus dipertahankan, kebutuhan air minum setiap orang bervariasi dari 2,1 liter hingga 2,8 liter per hari, tergantung pada berat badan dan aktivitasnya akan tetapi agar tetap sehat, air minum harus memenuhi persyaratan fisik, kimia, maupun bakteriologis (Suriawiria, 1986).

Air merupakan zat yang paling penting dalam kehidupan setelah udara. Tiga per empat bagian tubuh manusia terdiri dari air. Manusia tidak dapat bertahan hidup lebih dari 4-5 hari tanpa minum air. Air juga merupakan zat yang paling parah akibat pencemaran penyakit-penyakit yang menyerang manusia dapat ditularkan dan disebarkan melalui air. Penyakit-penyakit tersebut merupakan akibat tingginya kadar pencemaran yang memasuki air.

Pengadaan air bersih untuk keperluan air minum, harus memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Air minum aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan secara fisika, mikrobiologi, kimia, dan radiaktif. Parameter wajib penentuan kualitas air minum secara mikrobiologi adalah total bakteri *Coliform* dan *Escherichia coli*. Penentuan kualitas air secara mikrobiologi dilakukan dengan Most Probable Number Test. Jika di dalam 100 ml sampel air didapatkan sel bakteri *Coliform* memungkinkan terjadinya diare dan gangguan pencernaan lain (Rido wandrivel, 2012).

Air merupakan medium pembawa mikroorganisme patogenik yang berbahaya bagi kesehatan, patogen yang sering ditemukan dalam air terutama adalah bakteri-bakteri penyebab infeksi saluran pencernaan seperti *Vibrio cholera* penyebab penyakit kolera, *Salmonella typosa* penyebab tifus, serta *Escherichia coli*. (Fardiaz, 1992).

Air merupakan komponen yang mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia. Tanpa air, mustahil ada kehidupan, karena kehidupan bermula dari air. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya (21) ayat 30 :

أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا  
فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٠﴾

Terjemahnya :

“Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman” (Kementrian Agama RI, 2009).

Allah SWT berfirman mengingatkan tentang kekuasaan-Nya sempurna dan kerajaan-Nya yang agung. Awalam yaral ladziina kafaruu “Dan apakah orang-orang yang kafir itu tidak mengetahui” yaitu orang-orang yang mengingkari Ilahiyyah-Nya lagi menyembah selain Dia bersama-Nya. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa Allah SWT adalah Rabb Yang Maha esa dalam penciptaan, maka bagaimana mungkin layak diibadahi bersama selain-Nya atau disekutukan bersama yang lain-Nya. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa langit dan bumi dahulunya adalah bersatu, yaitu seluruhnya sambung menyambung, bersatu dan sebagiannya bertumpuk

di atas bagian yang lainnya pertama kali. Lalu, satu bagian yang ini berpecah-belah, maka langit menjadi tujuh dan bumi menjadi tujuh serta antara langit dunia dan bumi dipisahkan oleh udara, hingga hujan turun langit dan tanah pun menumbuhkan tanaman. Untuk itu dia berfirman. *Wa ja'alnaa minal maa-i kulla syai-in hayyin afalaa yu'minuun* "Dan dari air, kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman" Yaitu, mereka menyaksikan berbagai makhluk, satu kejadian demi kejadian secara nyata. Semua itu adalah bukti tentang adanya Maha pencipta Yang berbuat secara bebas lagi Maha kuasa atas apa yang dikehendaki-Nya.

Ayat tersebut di atas telah membuktikan bahwa air adalah bahan baku penciptaan segala sesuatu di dunia, betapa besar manfaat dari air sehingga memberikan kita pengetahuan untuk terus mengkaji tentang bagaimana pemanfaatan air bagi kesehatan.

Dalam kehidupan, air merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kelangsungan hidup komponen-komponen biotis dan fungsinya tidak dapat digantikan oleh senyawa lain. Tubuh manusia mengandung air kira-kira 65% atau sekitar 47 liter. Setiap hari sekitar 2,5 liter harus digantikan dengan yang baru. Dari jumlah air yang harus diganti tersebut, 1,5 liter berasal dari mikroorganisme penyebab penyakit dan mikroba patogen lainnya serta bebas dari zat kimia yang merusak kesehatan. Dwidjoseputro (1990) mengemukakan bahwa air merupakan wahana bagi penyakit untuk berkembang, seperti disentri, thypus dan kolera, ketiga penyakit ini masih banyak di Indonesia. Patogen yang sering disebarluaskan melalui air adalah penyebab infeksi saluran pernafasan, pencernaan (demam tifoid dan para

tifoid), disentri (basilan dan amoebik), kolera dan virus. Pengujian air tidak bisa didasarkan hanya pada pengujian terhadap adanya berbagai kuman yang ada didalamnya seperti yang diungkapkan oleh Riyadi (1984) bahwa Pengujian air dan kuman-kuman tidak dapat diujikan terhadap adanya berbagai kuman yang ada didalamnya. Dalam praktek cukup diketahui melalui pembuktian adanya *Escherichia coli* dan *Aerobacter aerogen* yang kedua-duanya merupakan penghuni tetap dari colon hewan maupun manusia, baik dalam keadaan sehat maupun sakit. Dengan adanya kuman-kuman tersebut di dalam sampel yang diambil cukup untuk membuktikan dan mengatakan bahwa air itu telah mengalami kontaminasi oleh kotoran manusia atau hewan dan hal ini analog dengan adanya kuman-kuman patogen pada sampel tersebut. Namun tidak banyak penduduk yang mengetahui bahaya bakteri tersebut terutama mereka yang berpendidikan rendah (Riyadi (1984).

Di indonesia temperatur yang optimal sepanjang tahun menyebabkan air di alam terbuka selalu mengandung mikroorganisme, pengujian kemurnian air hanya mungkin dilakukan di kota-kota besar dimana ada satu sistem saluran air minum yang melayani bagian terbesar dari penduduk kota-kota tersebut, sedangkan pengujian sumber air sungai, waduk, kubangan atau pun sumur-sumur yang ada dikampung-kampung dan di desa tersebar diseluruh tanah air dan jarang dilakukan pengujian dan kelayakan mikroorganisme (Dwidjoseputro, 1994).

Sumber daya alam yaitu air, dapat diperoleh dari air permukaan meliputi air sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya, pada air tanah dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu air tanah tidak tertekan bebas adalah air terletak pada suatu dasar yang kedap air dan mempunyai permukaan bebas, pada air tanah tertekan

adalah air yang sepenuhnya jenuh dengan bagian atas dan bawah dibatasi oleh lapisan yang kedap air, salah satunya sumur (Effendi, 2003).

Manusia hidup di dunia tidak bisa lepas dari mengkonsumsi air. Air sebagai salah satu sumber kehidupan mempunyai berbagai peran. Air bisa digunakan untuk memasak, minum, mencuci, dan sebagai perantara untuk beribadah. Berdasarkan kualitas dan keistimewaannya, air juga mempunyai tingkatan yang berbeda-beda sebagaimana tingkatan yang ada pada air-air mineral yang sering kita minum. Tingkatan air istimewa dalam islam salah satunya disematkan pada air zam-zam. Air zam-zam berasal dari mata air zam-zam yang terletak di bawah tanah, sekitar 20 meter di sebelah Tenggara Ka'bah. Mata air atau Sumur ini mengeluarkan air zam-zam tanpa henti hentinya. Ukurannya hanya 18 x 14 *feet* (kira-kira 5 x 4 meter), tidak terbayangkan bagaimana caranya sumur sekecil ini bisa mengeluarkan jutaan galon air setiap musim hajinya. Dan itu berlangsung sejak ribuan tahun yang lalu, sejak zaman Nabi Ibrahim AS (Ega Muhammad, 2016).

Air zam-zam adalah air yang dianggap suci oleh umat islam, zam-zam secara bahasa berarti banyak atau melimpah. Air zam-zam yang terletak dikota mekkah sebuah kota yang dianggap suci, air zam-zam memiliki banyak keutamaan dibandingkan air mineral biasa, yaitu sesuai dengan hadist Rasulullah SAW Sebaik-baik air dimuka bumi adalah air zam-zam, air tersebut bisa menjadi makanan yang menyenangkan dan bisa sebagai obat penyakit keutamaan air zam-zam tersebut sangat dipercaya oleh ummat islam sehingga air ini banyak dikonsumsi oleh jutaan umat muslim di dunia, hal ini menyebabkan permintaan air zam-zam di dunia, Sangat tinggi. Akan tetapi pada tahun 2010 pemerintah Arab Saudi memberlakukan undang-undang larangan ekspor air zam-zam keluar negeri untuk kepentingan komersial,

namun demikian saat ini masih banyak perdagangan air zam-zam secara bebas didunia termasuk di indonesia, pada tahun 2014 di indonesia ditemukan industri air zam-zam palsu yakni dikota semarang yang memasak air zam-zam untuk daerah jawa timur, Jawa tengah dan DKI jakarta (Hidayah, et al. 2014).

Salah satu air yang baik dimuka bumi ini adalah air zam-zam sumber mata air yang berada dikawasan Masjidil Haram ini tidak hanya bersih, tetapi juga mempunyai manfaat yang cukup banyak bagi kesehatan. Keunikan sumber mata ini juga tidak pernah habis atau kering. Meski tiap tahun ribuan jamaah haji mengambil air dari sumur zam-zam. Artinya terus mengalir deras dan tanda-tanda akan kering. Berdasarkan berbagai penelitian, menunjukkan bahwa beberapa besarnya manfaat air zam-zam bagi kesehatan tubuh kita. Selain mengandung beberapa mineral penting bagi tubuh, air zam-zam juga bersifat steril dengan adanya kandungan fluorida yang memiliki sifat antimikroba dalam jumlah yang proporsional serta memberikan dampak meracuni bagi tubuh (Muhammad, 2012).

Beberapa ilmuan telah membuktikan bahwa manfaat air zam-zam secara ilmiah. Hasil dari penelitian, ditemukan bahwa air zam-zam tidak berbau sebagaimana mestinya. Hal tersebut menjadi indikator air zam-zam dikatakan sebagai air sehat. Disamping itu, air dari tanah suci ini juga terbukti memiliki kandungan mineral kalsium, magnesium dan flourida yang tinggi. Air zam-zam juga memiliki muatan ion-ion yang seimbang. Dan kualitas air zam-zam tidak berubah selama penyimpanan dalam jangka waktu lama dan ditempatkan dimanapun, dilihat dari segi tekstur, warna dan baunya. Suatu penelitian dari Direktur Kepala Pusat Penelitian Haji, Ir. Sami Anqali, yaitu untuk mengetahui apakah didalam air zam-zam terdapat

bakteri atau tidak dan menunjukkan hasil bahwa air tersebut adalah air yang bersih (Muhammad, 2012).

**B. Rumusan masalah**

1. Apakah air zam-zam dalam kemasan memenuhi syarat secara mikrobiologis.
2. Apakah terdapat mikroba pada air zam-zam dalam kemasan
3. Apakah memenuhi standar nilai MPN bakteri koliform pada air zam-zam dalam kemasan

**C. Tujuan penelitian**

1. Untuk mengetahui kualitas mikrobiologi air zam-zam yang berfungsi sebagai sumber air minum yang dapat dikonsumsi secara langsung
2. Untuk membedakan kualitas air zam-zam
3. Untuk mengetahui adanya mikroba terhadap air zam-zam yang didalam kemasan

**D. Manfaat penelitian**

1. Sebagai sumber data bagi mahasiswa atau peneliti lainnya tentang bagaimana kualitas air zam-zam dalam kemasan.
2. Sebagai pengembangan sumber air zam-zam kemasan yang berkualitas untuk masyarakat.

## BAB II

### TINJAUAN TEORITAS

#### A. *Air zam-zam*

Air merupakan bahan essensial bagi hidupnya organisme, oleh karena itu air selalu penuh dengan benda-benda hidup. Manusia dan mahluk-mahluk lainnya yang tidak hidup di dalam air senantiasa mencari tempat-tempat tinggal dekat air supaya mudah untuk menagambil air untuk kehidupannya, makanya desa atau kota zaman dahulu tumbuh disekitar sumber air, ditepi sungai, atau ditepi danau. Sesudah manusia lebih maju, tempat tinggalnya tidak perlu dekat air dengan sumber jauh yang disalurkan dengan pipa dan didistribusikan (Prawiro, 1898).

Air minum merupakan kebutuhan manusia paling penting. Diketahui kadar air dalam tubuh manusia mencapai 65% oleh karena itu penting mengetahui bagaimana air yang sehat bagi kehidupan manusia. Air yang sehat adalah air yang tidak terkontaminasi dan tidak menimbulkan penyakit, bebas dari unsur-unsur beracun dan bebas dari sejumlah mineral dan zat organik berlebihan (Lusiani, 1996).

Zam-zam dalam bahasa arab artinya air yang melimpah dan dapat juga berarti minum dengan ragukan sedikit-sedikit, sumur dibawah tanah yang terletak  $\pm$  20 meter sebelah tenggara Ka'bah ini mengeluarkan air bersih zam-zam tanpa henti. Diamanatkan agar sewaktu memiunmnya air zam-zam kita menghadap ke Ka'bah dengan mengangkat kedua tangan sambil berdo'a memohon pada Allah SWT (Gawo Iwan, 2005).

Air zam-zam merupakan air suci yang terletak di Mekah, tepatnya di dalam Masjidil Haram. Air zam-zam dipercaya oleh umat muslim di seluruh dunia sebagai

air suci yang memiliki banyak manfaat serta keistimewaan dibandingkan dengan air minum biasa. Seperti yang dilakukan oleh peneliti di Al-Hajj *Research Centre* Universitas Om Al-Quro bahwa air zam-zam memiliki bentuk kristal yang indah, tidak ada satu pun jenis air yang menyerupai butiran-butiran kristal air zam-zam. Komposisi multiunsur dan hidrokimia air zam-zam terdapat sebanyak 34 elemen, diantaranya yaitu, kalsium (Ca), magnesium (Mg), natrium (Na) dan klorida (Cl) dalam konsentrasi tertinggi. Unsur-unsur Antimon (Sb), berilium (Be), bismuth (Bi), bromin (Br), kobalt (Co), iodine (I), dan molibdenum (Mo) kurang dari 0,01 ppm. Kromium (Cr), mangan (Mn), dan titanium (Ti) juga terdeteksi dalam air zam-zam. Selain itu, air zam-zam memiliki profil mineral esensial yang kaya, yaitu TDS (*Total Dissolved Solids*), dimana berada pada rentang yang dapat diterima (berkisar hingga 1000 mg / L). Air zam-zam juga memiliki konduktivitas listrik yang lebih tinggi (1390 mikrodetik / cm) dibandingkan dengan air kemasan (740 mikrodetik / cm) (Rasyida, et al, 2014).

Air zam-zam terletak di dalam Kudus Masjid di sekitar 20 Meter di sebelah timur Ka'bah di Makkah Al-Mukarramah, Arab Saudi. Sumur dari zam-zam digali dengan tangan dan berukuran sekitar 30,5 m, dengan diameter internal berkisar antara 1,08 sampai 2,66 meter. Air zam-zam berbeda dengan air lainnya dalam banyak hal : pertama bakteri tidak dapat terbentuk pada sumbernya. Kedua tidak berjalan berjamur dan juga tidak berubah warna, rasa atau bau. Biologis pertumbuhan dan vegetasi biasanya terjadi paling banyak sumur. Hal ini membuat air menjadi tidak enak karena Pertumbuhan alga menyebabkan perubahan rasa dan bau. Namun, di sumur zam-zam, tidak ada tanda pertumbuhan biologis (Rasyida, et al, 2014).

Air zam-zam memiliki banyak manfaat dan keistimewaan sehingga banyak dikonsumsi oleh umat muslim di seluruh dunia. Pada tahun 2010, Pemerintah Arab Saudi menerapkan aturan ketat tentang pengiriman air zam-zam keluar negeri. Aturan tersebut menyebabkan maraknya penjualan air zam-zam palsu secara global. Maraknya penjualan air zam-zam palsu menyebabkan kekhawatiran di tengah-tengah konsumen terutama umat muslim (Rasyida, et al, 2014).

Air zam-zam memiliki keistimewaan yaitu dapat menyembuhkan penyakit. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  
 “خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم فيه طعام الطعم و شفاء السقم”  
 (رواه الطبراني)

Artinya :

“Dari Ibnu Abbas r.a berkata, Rasulullah saw bersabda, Sebaik-baik air dimuka bumi adalah air zam-zam, Padanya terdapat makanan yang mengenyangkan dan penawar dari penyakit” (HR. Thabrani).

Boleh mengambil keberkahan dari air tersebut karena hal ini diisyaratkan oleh Nabi Muhammad SAW dianjurkan bagi orang yang meminum air zam-zam untuk memerciki air tersebut pada wajah, kepala dan dadanya, diniatkan sebagai obat.

Kemampuan menyembuhkan yang ada pada air zam-zam tidaklah karena mukjizat atau bahkan sugesti semata, tetapi dapat dibuktikan secara ilmiah. Banyak penelitian ilmiah yang dilakukan untuk mengetahui sifat unik dalam air zam-zam, dimana hasilnya menyebutkan bahwa kandungan mineral dalam air zam-zam jauh lebih tinggi daripada air sumur dan air mineral kemasan.

## **B. Sejarah air zam-zam**

Tentang air zam-zam ini sejarahnya tidak dapat dipisahkan dan isteri Nabi Ibrahim AS yaitu Siti Hajar dan putranya Ismail AS. Waktu Ismail dan ibunya ditinggalkan oleh nabi Ibrahim di Makkah, mereka kehabisan air untuk minum. Maka Siti Hajar pergi ke bukit Shafa dan Marwah kalau di sana ada air, Siti Hajar berlari-lari antara Bukit Shafa dan bukit marwah sebanyak 7 kali namun, tidak berhasil menemukan setetes air pun. Tiba-tiba ia mendengarkan suara. Maka Hajar pun berkata “Saya mendengar suaramu, tolonglah aku jika engkau punya kebaikan”

Malaikat Jibril menampakkan diri dan melalui hentakan kaki Ismail, sertamerta memancarkan air dari bumi. Siti Hajar membendung air dengan limpah-limpah serta berkata zam-zam yang maksudnya berkumpul, dengan air inilah Siti Hajar dan putranya Ismail menyambung hidup mereka, mata air inilah yang kemudian terkenal dengan nama sumur zam-zam yang diriwayatkan oleh At- Thabrani dalam kitab Al-Mu’jamul Kabir dan oleh Ibnu Abbas RA bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, tentang air zam-zam yang artinya :  
“Sebaik-baik air di permukaan bumi ialah air zam-zam padanya terdapat makanan yang menyegarkan dan padanya terdapat penawar bagi penyakit”

Setelah beberapa hari Siti Hajar dan anaknya tinggal di dekat mata air itu, datanglah kepadanya dua orang dari suku jurham yang mewakili bangsanya untuk berkenalan sekaligus minta izin untuk ikut memanfaatkan air itu dan kalau boleh akan tinggal di sekitarnya. Maka Siti Hajar dengan senang hati menerima mereka dan akhirnya menjadi sekumpulan masyarakat baru disekitar mata air zam-zam dan seterusnya menjadi sebuah kota yang amat ramai, dalam sejarahnya zam-zam ini sudah berkali-kali di gali, baik karena tertimbun maupun karena perbaikan, antara lain yang dilakukan oleh Abdul Muthalib, kakek Rasulullah pada zaman jahiliah

sebelum islam dan yang terakhir adalah yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi pada awal tahun 1980 M (Gayo Iwan, 2005).

#### Keistimewaan air zam-zam

1. Meminum air zam-zam menjadi salah satu amalan ibadah, yaitu paling tidak dengan niat mengikuti anjuran Rasulullah
2. Diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Abbas “aku pernah menyiapkan air zam-zam untuk Rasulullah SAW kemudian beliau meminumnya sambil berdiri”
3. Makruh hukumnya apabila digunakan mencuci najis atau dipakai untuk membersihkan hadas besar
4. Disunnahkan jama'ah haji dan jama'ah umrah membawanya pulang ke negerinya, Rasulullah SAW adalah orang yang pertama yang membawa keluar atau membawa pulang air zam-zam yaitu ketika beliau ke Madinah selesai menunaikan ibadah haji
5. Mata airnya tidak pernah kering walaupun berjuta-juta manusia meminumnya setiap hari terutama pada musim haji
6. Pada waktu Rasulullah SAW akan melakukan sa'i beliau minum air zam-zam sampai kenyang kemudian menyiram kepalanya dengan air itu
7. Banyak orang mengguyur atau membasahi kain ihram, kemudian direntang tanpa diperas agar kering sendiri dan katanya akan dipakai kafan kalau meninggal nanti (Gayo Iwan, 2005).

#### Struktur dan Hidrogeologi dari Sumur air zam-zam

Zam-zam digali dengan menggunakan tangan dan sekitar 30,5 m dalam, dengan diameter mulai 1,08-2,66 m. Dalam hal hidrogeologi, juga terletak dalam wadi Ibrahim, yang berjalan melalui Kota Suci Mekkah dan keran air tanah dari wadi

Lembah alluvium, pada tingkat yang jauh lebih rendah, dan dari batuan dasar segar yang mendasari baik yang sekarang disimpan di ruang bawah tanah, dilindungi oleh panel kaca yang memungkinkan jelas pandangan baik. Pompa listrik digunakan untuk menimba air dari sumur, menggantikan sebelumnya tali dan ember. Tidak ada pengunjung kecuali pejabat diperbolehkan untuk memasuki ruang dengan baik dan sekitarnya. Di luar ruangan, terdapat area layanan, di mana dingin air zam-zam air mancur dan kontainer pengeluaran disediakan untuk keperluan minum. Baru-baru ini Al-Haram daerah Tawaf telah diperluas untuk mencakup pintu masuk ke daerah ini, dan tidak lagi diakses oleh penziarah. Sebaliknya, air dingin mancur zam-zam dan kontainer pengeluaran yang sekarang ditempatkan di pinggiran daerah Tawaf. Bagian atas 13,5 m dari sumur digali di alluvium berpasir wadi Ibrahim dan lebih rendah 17 m di batuan dasar diorit yang mendasari. Di antara aluvium berpasir dan diorit batuan, ada lapisan tipis (0,5 m) dari permeabel batuan lapuk. Sebagian aluvial yang bagian dari sumur dipagari dengan batu batu, kecuali untuk paling atas 1 m, yang memiliki bertulang kerah beton. Bagian batu lapuk dipagari dengan batu dan menyediakan masuknya air utama ke dalam sumur (Khalid Nauman, 2013).



**Gambar 2.** Bentuk dan dimensi sumur zam-zam

### **C. Mikroba di dalam air**

Mikrobiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup yang kecil yaitu Semua makhluk yang tidak dapat dilihat langsung dengan mata telanjang, makhluk hidup yang kecil tersebut dapat berupa hewan atau tumbuhan. Karena di dalam alam sesuai dengan konsep biologi yang pada awalnya hanya dikenal dua kelompok besar makhluk hidup yaitu golongan tumbuhan-tumbuhan dan golongan hewan-hewan dan dikenal bidang botani yang mempelajari tentang tumbuhan-tumbuhan plantae dan bidang zoologi yang mempelajari tentang hewan animalia. Perbedaan dari kedua golongan tersebut dapat dilihat dengan jelas terutama pada hewan tingkat tinggi dan tumbuhan tingkat tinggi, tetapi untuk makhluk hidup yang kecil seperti mikroorganisme perbedaan tersebut sangat sulit. Hal tersebut disebabkan karena adanya beberapa sifat dari mikroorganisme yang sama atau berbeda sana sekali dengan sifat tumbuhan dan hewan tersebut diatas tadi (Natsir djide, 2006).

Mikrobiologi merupakan cabang ilmu dari biologi yang khusus mempelajari jasad-jasad renik. Mikrobiologi berasal dari bahasa Yunani *Micros*. Kecil, *bios*. Hidup, dan *logos*. Pengetahuan sehingga secara singkat dapat diartikan bahwa mikrobiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup yang kecil-kecil. Makhluk hidup yang kecil-kecil tersebut disebut juga dengan mikroorganisme, mikrobial, mikroba, atau jasad renik (Nadyah, 2012).

Bakteri adalah mikroorganisme bersel tunggal yang panjangnya beberapa mikrometer dan memiliki morfologi dari berupa tongkat (basil), kokus sampai bentuk spiral. Bakteri hidup di tanah permukaan bumi, diperairan air panas, air laut, dibawah permukaan tanah dan ada yang berkembang pada sampah zat radioaktif populasi bakteri dalam 1 gram tanah mencapai 40 juta sel bakteri dan pada 1 ml air jernih

dapat mengandung satu juta sel bakteri keberadaan bakteri sangat penting dalam kehidupan mulai dari pembentukan zat atau substansi seperti peran dalam fiksasi dan siklus nutrisi sampai penguraian serta dikomposisi atau pembusukan dan penghancurannya hidupnya berinteraksi dengan lingkungan dan makhluk hidup lainnya dapat bersifat simbiosis mutualisasi dapat juga bersifat parasitik sebagai patogen (Subandi, 2014).

Bakteri terdapat secara luas di lingkungan alam yang berhubungan dengan hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, air dan tanah. Bakteri adalah mikroorganisme bersel tunggal tidak terlihat oleh mata, berukuran antara 0,5 – 1,0  $\mu\text{m}$  dan lebar 0,5 – 2,5  $\mu\text{m}$  tergantung pada jenisnya (Lisdayanti, 2013). Bakteri pertama ditemukan oleh Anthony van Leeuwenhoek pada 1674 dengan menggunakan mikroskop buatannya sendiri. Nama bakteri berasal dari bahasa Yunani, yaitu *bacterion* yang berarti tongkat atau batang. Sekarang nama itu dipakai untuk menyebut sekelompok mikroorganisme yang bersel satu, tidak berklorofil (meskipun ada kecualinya), berbiak dengan pembelahan diri serta demikian kecilnya sehingga hanya tampak dengan mikroskop. Berbagai jenis bakteri dapat dibedakan menurut bentuknya yang kadang tercermin pada namanya (Lisdayanti, 2013).

#### a. Morfologi dan Struktur Bakteri

Terdapat beribu jenis bakteri, tapi hanya beberapa jenis bakteri yang ditemukan, diantaranya berbentuk bulat, batang, spiral, koma atau vibrios. Sel bakteri terdiri dari membran dan sitoplasma. Sel dibungkus oleh dinding sel, pada beberapa jenis bakteri dinding sel dikelilingi oleh kapsula atau lapisan lendir. Kapsul berisi campuran polisakarida dan polipeptida. Bakteri memiliki flagella yang tumbuh dalam membran sel, berupa struktur yang menyerupai benang panjang, berbentuk seperti

cambuk. Flagella ini merupakan alat gerak bakteri yang bergerak dengan cara mendorong bakteri dalam cairan, misalnya air. Pada umumnya ukuran tubuh bakteri sangat kecil, umumnya bentuk tubuh bakteri baru dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Bakteri adalah sel prokariot yang khas, bersifat uniseluler dan tidak mengandung struktur yang terbatas membran di dalam sitoplasmanya. Sel bakteri ada yang berbentuk bulat, batang atau spiral. Umumnya bakteri memiliki diameter antara 0,5-2,5  $\mu\text{m}$ . Bakteri adalah yang paling berkelebihan dari semua organisme. Bakteri tersebar (berada dimana mana) di tanah, air dan sebagai simbiosis dari organisme lain (Lisdayanti, 2013: 19).

Struktur bakteri terdiri dari beberapa bagian yaitu :

a. Dinding Sel

Lapisan selubung sel yang terletak antara membran sitoplasma dan kapsul disebut dinding sel. Dinding sel bakteri bisa begitu kuat karena lapisannya yang tersusun atas suatu bahan yang disebut murein, mukopeptida, atau peptidoglikan (semuanya merupakan suatu bahan yang sama). Berdasarkan perbedaan respon terhadap prosedur pewarnaan gram (klasifikasi ini dilakukan oleh ahli histology Hans Christian Gram) dan struktur dinding bakteri, bakteri diklasifikasikan menjadi bakteri gram negatif dan bakteri gram positif.

Bakteri Gram Positif :

- 1) Dinding sel mengandung peptidoglikan yang tebal serta diikuti pula dengan adanya ikatan benang-benang teichoic acid dan teichoronic acid, yang merupakan 50 % dari berat kering dinding sel dan 10% dari berat kering keseluruhan sel.
- 2) Pada umumnya berbentuk bulat (coccus).

- 3) Pada pewarnaan gram, bakteri jenis ini berikatan dengan zat warna utama (primary Strain) yaitu Gentian Violet dan tidak luntur (decolorized) bila dicelupkan ke dalam larutan alkohol.
- 4) Di bawah mikroskop tampak berwarna ungu.

Bakteri Gram Negatif :

- 1) Mengandung sedikit sekali ikatan peptidoglikan dan tidak terdapat ikatan benang-benang teichoic acid dan teichoronic acid.
- 2) Pada umumnya berbentuk batang (basil), kecuali Bacillus anthraxis dan Bacillus sereus.
- 3) Pada pewarnaan Gram, bakteri jenis ini tidak mampu berikatan dengan zat warna utama yaitu Gentian Violet dan luntur bila dicelupkan ke dalam larutan alkohol.
- 4) Di bawah mikroskop tampak berwarna merah, apabila diberi zat warna safranin/fusin.

Komponen-komponen dinding sel bakteri gram negatif (yang terletak di luar lapisan peptidoglikan) :

- 1) Lipoprotein yang berfungsi untuk menstabilkan membran luar dan merekatkannya ke lapisan peptidoglikan.
- 2) Membran luar yaitu struktur berlapis ganda lapisan sebelah dalamnya memiliki komposisi yang serupa dengan membran sitoplasma, sedangkan fosfolipid pada lapisan sebelah luar digantikan oleh molekul lipopolisakarida. Lipopolisakarida.
- 3) Membran sitoplasma
- 4) Flagel
- 5) Kapsul dan Glikokaliks
- 6) Fili (Fimbria)

Bakteri yang sedang tumbuh, jumlah selnya akan meningkat dalam jumlah yang besar dalam waktu yang singkat dan akibat pertumbuhan tersebut akan terbentuk koloni, serta pertumbuhan bakteri tersebut dapat diukur atau dihitung. Berbagai faktor sangat menentukan apakah suatu kelompok mikroba yang terdapat di dalam suatu lingkungan dapat tumbuh subur, tetap dorman atau mati. Untuk pertumbuhannya, bakteri memerlukan unsur kimiawi serta kondisi fisik tertentu.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri (Hasyimi, 2010) yaitu:

1. Suhu

Suhu mempengaruhi laju pertumbuhan, mempengaruhi jumlah total pertumbuhan, merubah proses-proses metabolik tertentu serta morfologi (bentuk luar) sel. Kisaran suhu bagi mikroba terbagi 3 tahap yaitu suhu minimum, suhu maksimum dan suhu optimum. Suhu pertumbuhan optimum adalah suhu inkubasi yang memungkinkan pertumbuhan tercepat selama periode waktu yang singkat, yaitu antara 12 s/d 24 jam. Berdasarkan suhu inkubasi bakteri ini, bakteri terkelompok ke dalam Psikrofil (suhu  $0^{\circ}$ - $30^{\circ}$  C), Mesofil (suhu  $25^{\circ}$ - $40^{\circ}$  C), Termofil fakultatif ( $25^{\circ}$ - $55^{\circ}$  C) dan Termofil obligat ( $45^{\circ}$ - $75^{\circ}$  C).

2. pH

pH optimum bagi pertumbuhan bakteri berkisar antara 6,5-7,5. Beberapa spesies bakteri ada yang mempunyai pH minimum 0,5 dan pH maksimumnya 9,5. Pergeseran pH dalam suatu medium dapat terjadi sedemikian besar, karena akibat adanya senyawa-senyawa asam atau basa selama pertumbuhan. Pergeseran ini dapat dicegah dengan menggunakan larutan penyangga yang disebut Buffer (kombinasi garam-garam  $\text{KH}_2\text{PO}_4$  dan  $\text{K}_2\text{HPO}_4$ ). Garam-garam anorganik diperlukan oleh

mikroba untuk keperluan mempertahankan keadaan koloidal, mempertahankan tekanan osmose di dalam sel, memelihara keseimbangan pH serta sebagai aktivator enzim.

### 3. Pencahayaan

Bakteri biasanya tumbuh dalam gelap, walaupun ini bukan suatu keharusan. Tetapi sinar ultraviolet mematikan mereka dan ini dapat digunakan untuk prosedur sterilisasi. Beberapa bakteri memerlukan persyaratan yang khusus. Diantaranya, bakteri Fotoautotrofik (fotosintetik), yaitu bakteri dalam pertumbuhannya harus ada pencahayaan.

### 4. Waktu

Jika bakteri menemukan kondisi yang cocok, pertumbuhan dan reproduksi terlaksana. Bakteri berkembang biak dengan membelah diri. Dari satu sel tunggal menjadi dua, dua menjadi empat, empat menjadi delapan dan seterusnya. Dalam lingkungan dan suhu yang cocok, bakteri membelah diri setiap 20-30 menit. Dalam kondisi yang mereka sukai itu, maka dalam 8 jam satu sel bakteri telah berkembang menjadi 17 juta sel dan menjadi satu milyar dalam 10 jam.

### 5. Oksigen

Berdasarkan akan kebutuhan terhadap oksigen, bakteri dapat digolongkan menjadi bakteri aerob mutlak (bakteri yang untuk pertumbuhannya memerlukan adanya oksigen, misalnya *M. tuberculosis*), bakteri anaerob fakultatif (bakteri yang dapat tumbuh, baik ada oksigen maupun tanpa adanya oksigen), bakteri anaerob aerotoleran (bakteri yang tidak mati dengan adanya oksigen), bakteri anaerob mutlak (bakteri yang hidup bila tidak ada oksigen, misalnya *Clostridium tetani*) dan bakteri

mikroaerofilik (bakteri yang dapat hidup bila tekanan oksigennya rendah, misalnya *Neisseria gonorrhoeae*).

#### 6. Air

Air atau H<sub>2</sub>O merupakan bahan yang amat penting bagi pertumbuhan bakteri karena 80%-90% bakteri tersusun atas air. Tetapi bakteri tidak dapat menggunakan air yang mengandung zat-zat terlarut dalam konsentrasi tinggi, seperti gula dan garam. Larutan pekat, misalnya larutan garam 200 mg/liter tidak menunjang pertumbuhan bakteri. Tekanan osmose juga sangat diperlukan untuk mempertahankan bakteri agar tetap hidup, suatu misal apabila bakteri berada dalam larutan yang konsentrasinya lebih tinggi daripada konsentrasi yang ada dalam sel bakteri, maka akan terjadi keluarnya cairan dari sel bakteri melalui membran sitoplasma yang disebut plasmolisis. Namun ada beberapa bakteri yang mempunyai toleransi terhadap lingkungan dengan kadar garam yang sangat tinggi. Keadaan demikian disebut sebagai extreme halophiles, misalnya dijumpai pada mikroba yang berada di laut mati di mana mikroba tersebut dapat hidup dan tumbuh pada lingkungan yang berkadar garam sekitar 30%. Beberapa spesies bakteri ada yang dapat tumbuh pada lingkungan yang berkadar garam 10-15% dan disebut facultative halophiles, misalnya dijumpai pada *Vibrio parahaemolyticus*. Pada umumnya, bakteri untuk pertumbuhannya memerlukan kadar garam hanya 1%-2%.

#### 7. Karbon

Unsur karbon sangat penting bagi pertumbuhan bakteri. Sumber karbon atau carbon source antara bakteri yang satu dengan bakteri yang lain tidaklah sama, dan unsur karbon tersebut diperlukan oleh semua makhluk hidup mulai bakteri ampai dengan manusia. Telah diketahui bahwa berat unsur karbon merupakan setengah dari

berat kering bakteri. Menurut keperluan kuman akan sumber karbon, maka kuman dibagi menjadi 2 golongan yakni kuman autotrof yang memenuhi unsur karbonnya dari sumber anorganik. Sebaliknya kuman heterotrof memenuhi keperluan karbonnya dari sumber organik seperti karbohidrat (glukosa).

#### 8. Nitrogen, sulfur dan fosfor

Nitrogen, sulfur dan fosfor diperlukan untuk menyusun bagian-bagian sel misalnya untuk menyintesis protein diperlukan nitrogen dan sulfur. Untuk mensintesis DNA dan RNA, diperlukan nitrogen dan fosfor. Demikian pula, untuk menyintesis ATP. Seperti diketahui bahwa ATP adalah suatu bahan yang penting dalam sel, yang berguna untuk persediaan dan transfer energi dalam sel. Nitrogen, sulfur dan fosfor merupakan 18% berat kering dari sel di mana nitrogen adalah 15% dari berat kering sel tersebut. Sumber sulfur di alam bisa dalam bentuk ion sulfat atau berasal dari  $H_2S$  maupun sulfur yang terdapat dalam asam amino, sedangkan fosfor diperoleh dari senyawa fosfat. Nitrogen oleh bakteri terutama diperlukan untuk menyintesis asam amino yang selanjutnya digunakan untuk menyintesis protein, DNA, serta RNA. Nitrogen tersebut diperoleh bakteri, misalnya dari proses dekomposisi bahan organik atau berasal dari ion ammonium serta dari senyawa nitrat dan nitrogen yang berada di udara melalui proses fiksasi nitrogen tergantung dari jenis bakterinya. Bakteri yang dapat menggunakan nitrogen yang berasal dari udara melalui proses fiksasi nitrogen adalah cyanobacteria (blue green algae).

#### 9. Senyawa logam

Senyawa logam untuk pertumbuhan makhluk hidup diperlukan dalam jumlah sedikit. Oleh karena itu, disebut trace element. Termasuk di antaranya yang

diperlukan untuk kehidupan bakteri adalah Fe, Cu dan Zn. Di alam, trace element terdapat pada air (tap water) atau bahan-bahan lain

#### 1. Bakteri indikator sanitasi

Bakteri yang paling banyak digunakan sebagai indikator sanitasi adalah *Escherichia coli* karena bakteri ini adalah bakteri komensal pada usus manusia dan pada umumnya bukan patogen penyebab penyakit.

*Escherichia coli* yang terdapat didalam air apabila dikonsumsi terus-menerus dalam jangka panjang akan berdampak pada timbulnya penyakit seperti radang usus, diare, infeksi pada saluran kemih dan saluran empedu. Oleh karena itu, standar air minum mensyaratkan *Escherichia coli* harus kosong dalam 100 ml.

#### 2. Bakteri patogen

##### a. *Pseudomonas aeruginosa*

*Pseudomonas aeruginosa* adalah bakteri gram negatif anaerob obligat, berkapsul, mempunyai flagella polar sehingga bakteri ini bersifat motil, berukuran sekitar 0,5 – 1,0  $\mu\text{m}$ . Bakteri ini tidak menghasilkan spora dan tidak dapat memfermentasikan karbohidrat, bakteri ini secara luas dapat ditemukan di alam, contohnya di tanah, air, tanaman, hewan.

*Pseudomonas aeruginosa* adalah patogen oportunistik, bakteri ini merupakan penyebab utama infeksi pneumonia nosokomial, meskipun begitu bakteri ini dapat berkolonisasi pada manusia normal tanpa menyebabkan penyakit (Dwidjoseputro, 1998).

##### b. *Salmonella*

*Salmonella* adalah suatu genus bakteri enterobakteri gram negatif berbentuk batang yang menyebabkan penyakit tifus dan

paratifus, ukuran 2-4  $\mu\text{m}$  x 0,5. Dapat bergerak karena memiliki flagel (Entjang, 2001).

Pengaruh lingkungan pada pertumbuhan dan perkembangan bakteri

### 1. Pengaruh suhu

Tiap jenis bakteri mempunyai suhu optimum dimana pertumbuhannya paling baik, berdasarkan hal ini bakteri dibagi 3 (tiga) golongan yaitu :

Golongan	Suhu pertumbuhan		
	Minimum	Optimum	Maximum
Psychrophill	0°C	10° - 15°C	30°C
Mesophil	15° - 25°C	25° - 37°C	40° - 55°C
Thermophil	25° - 45°C	50° - 60°C	60° - 90°C

Bakteri-bakteri pathogen pada manusia termasuk bakteri mesophil, suhu optimumnya sama dengan suhu tubuh manusia 37°C.

#### a. Pengaruh suhu rendah

Suhu rendah sampai dibawah suhu minimumnya, menyebabkan bakteri tidak dapat berkembang biak, pada umumnya tidak segera mematikan bakteri-bakteri bahkan ada yang tahan bertahun-tahun pada suhu minus 70°C bakteri yang pathogen pada manusia umumnya cepat mati pada suhu 0°C.

#### b. Pengaruh suhu tinggi

Suhu tinggi lebih membahayakan kehidupan dibandingkan dengan suhu rendah. Bila bakteri dipanaskan pada suhu diatas suhu maksimumnya, akan segera mati semua bakteri, baik yang pathogen maupun tidak dalam bentuk vegetatifnya mati dalam waktu 30 menit pada suhu 60° - 65°C. Kenyataan ini merupakan dasar tindakan pasteurisasi.

## 2. Cahaya

Sebagian bakteri adalah chemotrophe, karena itu tumbuhnya tidak bergantung pada adanya cahaya matahari pada beberapa species, cahaya matahari dapat membunuhnya karena pengaruh sinar ultraviolet.

## 3. Pengeringan (Kelembapan)

Air sangat penting untuk kehidupan bakteri terutama karena bakteri hanya dapat mengambil makanan dari luar dalam bentuk larutan (holophytis) semua bakteri tumbuh baik pada media yang basanya dan udara yang lembab dan tidak dapat tumbuh pada media yang udara yang kering.

## 4. Keasaman (pH)

Umumnya asam mempunyai pengaruh buruk terhadap pertumbuhan bakteri, kebanyakan bakteri. Kebanyakan bakteri lebih baik hidup dalam suasana netral pH 7,0 atau sedikit basa pH 7,2 – 7,4 tetapi pada umumnya dapat hidup pada pH 6,5 – 7,5. Bakteri-bakteri yang pathogen pada manusia tumbuh baik pada pH 6,8-7,4 yang sama dengan pH darah, beberapa bakteri dapat hidup pada suasana asam misalnya bakteri yang hidup pada gusi manusia yaitu *Streptococcus mutans*. Ada pula bakteri yang tumbuh baik pada suasana basa misalnya *Vibrio cholera*.

## 5. Pengaruh O<sub>2</sub> dari udara

Untuk melangsungkan hidupnya, manusia dan binatang membutuhkan O<sub>2</sub> oxygen yang diambil dari udara melalui pernapasan fungsi O<sub>2</sub> ini sudah jelas yaitu untuk pembakaran zat-zat makanan didalam sel-sel jaringan, sehingga dihasilkan panas dan tenaga, pada tumbuhan mulai dari tumbuhan tingkat tinggi sampai

tumbuhan yang bersel satu termasuk bakteri juga membutuhkan  $O_2$  untuk melangsungkan hidupnya. Kehidupan semacam itu, yaitu hidup dalam lingkungan yang mengandung  $O_2$  dalam jumlah yang normal disebut hidup secara aerob, organisasi yang tidak bisa hidup dalam lingkungan yang mengandung  $O_2$  bebas disebut organisme anaerob.

Louis Pasteur berpendapat bahwa  $O_2$  merupakan racun bagi bakteri anaerob sehingga dapat membunuhnya teori ini kurang banyak disetujui orang, karena walau bagaimana juga, untuk pembakaran didalamnya selnya, bakteri anaerob pun tentu membutuhkan  $O_2$  walaupun karena sifatnya istimewa ini senyawa-senyawa yang mengandung  $O_2$  misalnya dari karbohidrat.

Berdasarkan responnya terhadap  $O_2$  bebas ini, bakteri dibagi dalam 3 golongan yaitu :

1. Bakteri aerob

Yaitu bakteri yang hanya hidup didalam lingkungan yang mengandung  $O_2$  bebas. Misalnya : *Vibrio cholera*, *Corynebacterium diphtheriae* dan *Bacillus anthracis*.

2. Bakteri anaerob

Yaitu bakteri yang hanya dapat hidup didalam lingkungan yang tidak mengandung  $O_2$  bebas. Misalnya : *Clostridium tetani*.

3. Fakultatif aerob

Yaitu bakteri yang hidup didalam lingkungan baik yang mengandung  $O_2$  bebas ataupun tidak. Misalnya : *Salmonella typhi*, *Streptococcus pyogenes*. Bakteri-bakteri fakultatif aerob pada umumnya akan lebih tumbuh pada lingkungan yang mengandung sedikit  $O_2$  bebas karena itu lebih tepat bila dinamakan bakteri microaerophil (Ismail Saldanis, 2008).

Pada pemeriksaan bakteriologis yang rutin terhadap air untuk menentukan aman tidaknya air tersebut untuk diminum seringkali digunakan organisme indikator, yang seringkali digunakan sebagai organisme indikator di Indonesia adalah *E.coli* sedangkan di Inggris yang digunakan sebagai indikatornya adalah *Clostridium perfringens* dan di USA adalah *Streptococcus faecalis*. Organisme ini pada keadaan normal terdapat pada usus manusia, adanya organisme ini pada air sumur sebagai petunjuk bahwa air tersebut terpopulasi oleh feses manusia atau hewan berdarah panas, dan tidak mustahil terdapat berbagai macam organisme patogen yang secara berkala terdapat dalam saluran pencernaan manusia untuk masuk ke dalam air.

Dalam uji bakteriologis air minum isi ulang digunakan tabung fermentasi Most Probable Number yang meliputi beberapa tes, diantaranya tes pendugaan presumptive test, tes penegasan confirmed test, dan tes kesempurnaan complete test, metode tabung fermentasi ini bersifat kualitatif, karena tidak dilakukan penghitungan secara langsung terhadap jumlah bakteri beberapa ciri penting dari suatu mikroorganisme indikator adalah terdapat dalam air tercemar, mempunyai kemampuan bertahan hidup yang lebih lama dan pada mikroorganisme patogen, mempunyai sifat seragam, jumlah mikroorganisme indikator berkorelasi dengan kadar polusi, tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, terdapat dalam jumlah yang lebih banyak dari pada mikroorganisme patogen dan mudah diteliti dengan menggunakan teknik-teknik laboratorium yang sederhana (Pelezar dan Chan, 2006).

Sekitar tiga per empat bagian tubuh manusia terdiri dari air, menjadikan air sebagai zat terpenting untuk kebutuhan dasar agar berlangsungnya kehidupan. Air selain bermanfaat bagi manusia, juga merupakan media yang baik untuk kehidupan

bakteri. Bakteri ini dibedakan menjadi dua, yaitu bakteri patogen dan bakteri non-patogen. Bakteri patogen dapat menyebabkan penyakit dengan keluhan diare seperti disentri, tipus, dan kolera, melalui air yang diminum. Beberapa contoh bakteri patogen adalah *Shigella dysenteriae*, *Salmonella typhi*, *Salmonella paratyphi*. Untuk bakteri non-patogen contohnya dari golongan bakteri *Fecal streptococci*, *Iron bacteri*, dan *Actinomyces*.

Air yang aman untuk diminum adalah air bersih yang harus memenuhi persyaratan secara fisika, kimia, radioaktif dan mikrobiologi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Secara mikrobiologi, salah satu syarat air bersih yang dapat dikonsumsi adalah tidak ditemukannya *Escherichia Coli* dalam 100 ml. 3 *Escherichia Coli* juga termasuk bakteri yang dapat menyebabkan keluhan diare.

#### **D. Tinjauan umum air minum kemasan**

Menurut Standar Nasional Indonesia Nomor SNI-01-3553-1996 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan air minum dalam kemasan adalah air minum yang telah diproses, dikemas dan diminum langsung (SNI, 1996).

Kehadiran air minum kemasan ternyata cenderung mendapatkan sambutan, tidak saja dilingkungan golongan masyarakat menengah ke atas tetapi juga meluas ke pedesaan, sehingga tidak mengherankan kalau perdagangan beberapa merek air kemasan sudah umum dijumpai sampai ke pelosok daerah terpencil (Suriawiria. U, 1993).

Air kemasan didefinisikan sebagai air yang diperuntukkan bagi manusia yang dikonsumsi dan yang disegel dalam botol atau lainnya wadah tanpa bahan tambahan kecuali yang mungkin secara opsional mengandung agen antimikroba yang aman dan sesuai. Fluor dapat ditambahkan dalam standar kualitas yang ditetapkan. Namun, air

kemasan tidak harus lebih aman dari pada air keran, dan selama bertahun - tahun, keprihatinan telah meningkat tentang kualitas air kemasan dipasarkan ke seluruh dunia. Sastra terungkap bahwa tingkat beberapa penyusun air dalam kemasan air dapat melebihi standar yang ditentukan. Botolnya Kualitas air juga bisa terpengaruh oleh sumbernya, pengobatannya jenis, jenis wadah dan lama penyimpanan (Sulaiman M. Alfadul And Mujahid A. Khan, 2015).

**Tabel 1.** Analisis merek air kemasan dalam dan luar negeri

Nama merek air kemasan	tipe	Kota/Negara tempat produksi
Arwa	Air minum kemasan	Riyadh, Saudi Arabia
Al-Hada	Air minum kemasan	Makkah Al-Mukarrama. Saudi Arabia
Al Qassim	Air minum kemasan	Al-Qassim, Saudi Arabia
Hana	Air minum kemasan	Al-Qassim, Saudi Arabia
Safa	Air minum kemasan	Makkah Al-Mukarrama. Saudi Arabia
Aquafina	Air minum kemasan	Riyadh. Saudi Arabia
Nova	Air minum kemasan	Riyadh. Saudi Arabia
Pure life (Nestle)	Air minum kemasan	Riyadh. Saudi Arabia
Masafi	Air minum kemasan	UAE
Evian	Air minum kemasan	Prancis
Volvic	Air minum kemasan	Prancis

(Sulaiman M. Alfadul And Mujahid A. Khan, 2015).

Keistimewaan air kemasan adalah karena warna, rasa, dan baunya yang tidak berubah dan rasa, warna dan bau air alami, misalnya yang baru keluar dan mata air

dipegunungan yang sehat dan bersih. Walau begitu tentu saja bahwa baik air kemasan atau pun air-air lainnya tidak selamanya memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada.

Untuk menjamin kesehatan lingkungan dengan tersedianya air berkualitas baik, ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Permenkes RI Nomor 416/MENKES/PER/IX/1990 yang meliputi berbagai persyaratan termasuk persyaratan mikrobiologis, yaitu tidak ada bakteri koliform sebagai indikator pencemaran pada setiap 100 ml sampel air yang dinyatakan dengan 0 colony forming units (cfu)/100 ml sampel (Menkes RI, 1990).

Untuk mengetahui keberadaan bakteri koliform dilakukan penghitungan bakteri hidup dengan menggunakan metode Most Probable Number MPN yang didasarkan pada metode statistik. Sejumlah bakteri koliform merupakan bakteri dengan family Enterobacteriaceae (Kusuma, 2012).

#### **E. Persyaratan mikrobiologi air**

Persyaratan mikrobiologi yang harus dipenuhi oleh air dapat diketahui melalui uji bakteriologis, pada umumnya uji bakteriologis yang harus dipenuhi oleh air sebagai berikut :

1. Tidak mengandung bakteri patogen, misalnya bakteri golongan *coli*, *Shigella dysenteriae*, *Salmonella typhi*, *Salmonella parathypi*, *Vibrio colerae*. Bakteri-bakteri ini mudah tersebar melalui air (transmitted by water).
2. Tidak mengandung bakteri non-patogen seperti Actinomycetes, Phytoplanktom coliform, Ciadocera, Coliform, Fecal streptococci, Iron bakteri.

Persyaratan mikrobiologis yang harus dipenuhi oleh air menurut peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : HK.00.06.1.52.4011, adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.** Batasan Maksimum Cemaran Mikroba Dalam Air Minum Dalam Kemasan

Parameter	Batas maksimum
ALT awal	1 x 10 : 2 koloni/ml
ALT Akhir	1 x 10 : 5 koloni/ml
Bakteri coliform	< 2/ 100 ml
Salmonella	Negatif / 100 ml
Pseudomonas aeruginosa	Negatif /ml

Ketentuan kemurnian air dari berbagai standar adalah sebagai berikut :

- Tahun 2002, departemen Kesehatan RI menetapkan kriteria kualitas air secara mikrobiologis melalui Keputusan Menteri Kesehatan No. 907 tahun 2002 dan diperbaiki melalui Peraturan Menteri Kesehatan 492/Menkes/Per/IV/2010. Dalam peraturan tersebut dituliskan bahwa air minum tidak diperkenankan mengandung bakteri coliform dan *Escherischia coli*.
- Standar Nasional Indonesia (SNI) No. 01-3553-2006 menyatakan bahwa air minum kemasan tidak boleh mengandung bakteri pathogen yaitu *Pesudomonas aeruginosa*, dan *Salmonella*. Selain itu cemaran mikroianya tidak boleh lebih besar dari 100 koloni/ml.
- USP 28 untuk *Purified Water* (PW) memiliki persyaratan mikrobiologi air adalah 100 CFU/ml dan untuk *Water for Injection* (WFI) sebesar 10 CFU/ml serta batas cemaran *endotoxin* 0,25 EU/ml.

## F. Bakteri uji

Yang termasuk bakteri anaerob adalah bakteri yang tidak membutuhkan oksigen untuk memperoleh makanannya. Bakteri menghasilkan enzim yang berfungsi merombak senyawa sederhana. Adapun yang termasuk bakteri anaerob yaitu sebagai berikut.

### 1. *Escherichia coli*

#### a. Klasifikasi (Garrity, 2004).

Domain	: Bacteria
Phylum	: Proteobacteria
Class	: Gammaproteobacteria
Ordo	: Enterobacteriales
Familia	: Enterobacteriaceae
Genus	: Escherichia
Spesies	: <i>Escherichia coli</i>

#### b. Sifat dan morfologi

*Escherichia coli* merupakan bakteri gram negatif berbentuk batang lurus, 1,1-1,5  $\mu\text{m}$  x 2,0-6,0  $\mu\text{m}$ , motil dengan flagellum peritrikum atau non motil, tumbuh dengan mudah pada medium nutrisi sederhana. Laktosa difermentasi oleh sebagian besar galur dengan produksi asam dan gas (Pelczar, 2008).

### 2. *Pseudomonas aeruginosa*

#### a. Klasifikasi (Garrity, 2004).

Domain	: Bacteria
Phylum	: Proteobacteria
Class	: Gammaproteobacteria

Ordo : Pseudomonadales  
 Familia : Pseudomonadaceae  
 Genus : Pseudomonas  
 Spesies : *Pseudomonas aeruginosa*

b. Sifat dan morfologi

*Pseudomonas aeruginosa* merupakan bakteri gram negatif dengan berbentuk sel tunggal, batang lurus atau melengkung, namun tidak berbentuk heliks, pada umumnya berukuran 0,5-1,0  $\mu\text{m}$ . Motil dengan flagelum polar monotrikus atau multitrikus, tidak menghasilkan selongsong prosteka, tidak dikenal adanya stadium istirahat. Kemoorganotrof, metabolisme dengan respirasi, tidak pernah fermentatif. Beberapa merupakan kemolitotrof fakultatif, dapat menggunakan  $\text{H}_2$  atau  $\text{CO}_2$  sebagai sumber energi. Oksigen molekuler merupakan penerima elektron universal, beberapa dapat melakukan denitrifikasi dengan menggunakan nitrat sebagai penerima pilihan (Plaza and chan, 2008).

### 3. *Salmonella typhi*

a. Klasifikasi (Garrity, 2004).

Domain : Bacteria  
 Class : Gammaproteobacteria  
 Ordo : Enterobacteriales  
 Familia : Enterobacteriaceae  
 Genus : Salmonella  
 Spesies : *Salmonella typhi*

b. Sifat dan morfologi

*Salmonella typhi* adalah bakteri gram negatif berbentuk batang lurus dengan ukuran 0,7-1,5  $\mu\text{m}$ , biasanya tunggal dan kadang-kadang membentuk rantai pendek, jenis yang bergerak berflagel peritrik, hidup secara aerobik atau anaerobik fakultatif, meragikan glukosa dengan menghasilkan asam kadang-kadang gas, tumbuh optimal pada suhu 37°C dan berkembang baik pada suhu kamar, bakteri ini dapat ditemukan disaluran pencernaan manusia dan hewan. Bakteri ini merupakan penyebab demam tifoid karena adanya infeksi akut pada usus halus manusia dan hewan (Pelezar and chan, 2008).

**G. Kriteria klasifikasi bakteri (pertumbuhan pada medium).**

Medium pembiakan dasar adalah medium pembiakan sederhana yang mengandung zat-zat yang umum diperlukan oleh sebagian besar mikroorganisme, dan dipakai juga sebagai komponen dasar untuk membuat medium pembiakan lain. Medium ini dibuat dari 3 g ekstrak daging, 5 g pepton dan 1000 ml air, dinamakan juga bulyon nutrisi. Dengan penambahan 15 g agar-agar diperoleh apa yang dinamakan agar nutrisi atau bulyon agar.

Sehingga pengganti ekstrak daging dapat dipakai air kaldu yang dibuat dari 1 kg daging segar bebas lemak yang direbus dengan air sampai diperoleh 2000 ml air kaldu setelah disaring, kemudian ditambah ½ persen natrium klorida. (Koes Irianto, jilid 1).

Ketahanan dan kesinambungan pertumbuhan mikroorganisme bergantung pada persediaan nutrisi yang mencukupi dan lingkungan pertumbuhan yang baik, untuk ketahanan pertumbuhan sebagian besar mikroba harus menggunakan bahan berbobot molekul rendah dan dapat larut yang sering diperoleh dari degradasi nutrisi

kompleks, secara enzimatik suatu larutan yang mengandung nutrien-nutrien tersebut dengan media biakan. Pada dasarnya, semua media biakan biakan terbentuk cair, semipadat, atau padat. Semua media cair tidak mengandung senyawa pematat (senyawa yang berfungsi untuk mengubah bentuk media menjadi lebih padat) dan disebut dengan media kaldu, suatu kaldu. Suatu media kaldu yang diberi senyawa pematat (yang disebut agar) menghasilkan media semipadat atau padat. Agar merupakan suatu ekstrak rumput laut, suatu karbohidrat kompleks yang terutama terdiri dari galaktosa dan tidak mengandung nilai nutrisi. Agar merupakan senyawa pematat yang sangat baik karena mencair pada suhu  $100^{\circ}\text{C}$  dan menjadi padat pada suhu  $40^{\circ}\text{C}$ . Karena sifat tersebut organisme terutama patogen dapat dikultivasi pada suhu  $37,5^{\circ}\text{C}$  atau sedikit lebih tinggi tanpa khawatir terjadi pencairan media. Suatu media yang betul-betul padat membutuhkan konsentrasi agar kira-kira 1,5 sampai 1,8% jika konsentrasi agar kurang dari 1% media yang terbentuk adalah media semipadat. Keuntungan dari suatu media padat yaitu memberikan permukaan yang cukup keras sehingga mikroorganisme padat ditumbuhkan dengan menggunakan teknik yang khusus untuk isolat koloni-koloni yang terpisah, tiap koloni merupakan suatu kelompok sel yang berasal dari pembelahan satu sel tunggal dan menunjukkan pertumbuhan satu spesies mikroorganisme. Koloni yang terisolasi dan terlihat dengan baik disebut dengan biakan murni. Pada kondisi cair media padat juga dapat ditetapkan dalam tabung uji. Yang kemudian dibiarkan mendingin dan memadat pada posisi miring sehingga akan menghasilkan agar miring. Agar miring berguna untuk memelihara biakan murni setelah pembuatan tabung yang serupa yang dibiarkan memadat pada posisi tegak disebut tabung agar tegak, tabung agar tegak digunakan terutama untuk mempelajari kebutuhan (Cappuccino, James G. 2002).

### 1. Medium non selektif

Agar darah dan agar cokelat adalah contoh medium non selektif kompleks yang mendukung pertumbuhan berbagai bakteri yang berbeda, medium nonselektif penting untuk isolasi bakteri yang tidak diketahui dari satu spesimen, banyak tipe koloni bakteri yang sering ditemui ketika spesimen klinis diinokulasi kedalam medium non selektif.

### 2. Medium selektif

Medium pembiakan selektif digunakan untuk menyeleksi bakteri yang diperlukan dari campuran dengan bakteri-bakteri lain yang terdapat dalam bahan pemeriksaan, dengan penambahan zat-zat tertentu bakteri yang dicari dapat dipisahkan dengan mudah. Medium pembiakan ini berdasarkan pada sifat kerjanya, dapat dibedakan dalam

- a. Selektivitas karena perbedaan tumbuh
- b. Selektivitas karena penghambatan tumbuh

Medium pembiakan selektif dalam pemakaiannya diberikan bermacam-macam bentuk yang sesuai dengan tujuannya yaitu sebagai berikut.

- a. Bentuk medium cair
- b. Bentuk medium padat dengan penambahan agar-agar atau gelatin
- c. Bentuk lempeng, dibekukan dalam piringan petri
- d. Bentuk miring, dibekukan dalam keadaan miring dalam tabung

1. Bentuk tegak, dibekukan dalam keadaan tegak dalam tabung. bila konsentrasi agarnya dikurangi menjadi  $\frac{1}{2}$  -  $\frac{1}{4}$  persen menjadi medium setengah padat yang digunakan untuk pemeriksaan gerak bakteri. (Koes Irianto, jilid 1).

Oleh karena keanekaragaman mikroorganisme yang menetap secara khas di beberapa tempat pengambilan sampel (misal, saluran cerna), medium selektif digunakan untuk mengeliminasi atau mengurangi besarnya jumlah bakteri yang tidak relevan dalam spesimen ini, basis medium selektif adalah kombinasi agen penghambat yang secara spesifik mencegah pertumbuhan bakteri yang tidak relevan, contoh agen-agen yang demikian adalah

- Natrium azida Pilihan untuk bakteri gram positif daripada bakteri gram negatif
- Garam empedu misalnya, natrium deoksilat mendukung bakteri enterik gram negatif dan menghambat bakteri mukosa gram negatif serta sebagian besar bakteri gram positif.
- Kolistin dan asam nalidiksat menghambat pertumbuhan berbagai bakteri gram negatif, contoh medium selektif adalah agar macconkey (mengandung empedu) yang menyokong Enterobacteriaceae dan agar darah CNA (mengandung kolistin dan asam nalidiksat) menyokong *Staphylococcus* dan *Streptococcus*.

### 3. Medium diferensial

Di dalam kultur, beberapa bakteri yang menghasilkan pigmen khas dan bakteri lainnya dapat dibedakan berdasarkan komplemen enzim ekstraseluler aktivitas enzim ini sering dapat dideteksi sebagai daerah jernih disekitar koloni yang dibiakkan dengan adanya substrat yang tidak larut contoh daerah hemolisis didalam, edium agar yang mengandung sel darah merah banyak anggota Enterobacteriaceae dapat dibedakan berdasarkan kemampuan mereka untuk melakukan metabolisme laktosa, sebagai contoh salmonella dan shigella patogen tidak memfermentasi laktosa dan pada cawan Macconkey membentuk koloni jernih, sedangkan anggota Enterobacteriaceae yang memfermentasi laktosa misalnya *E.coli* membentuk koloni

berwarna merah atau merah muda, jumlah medium diferensial yang digunakan dalam laboratorium klinis saat ini jauh melebihi lingkup bab ini, walaupun demikian identifikasi biokimia merupakan alat yang penting untuk melakukan klasifikasi patogen mikroba (Jawetz, Melnick & Adelberg, 2002).



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

##### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah eksperimen laboratorium (Siswanto, 2015).

##### **2. Lokasi penelitian**

Penelitian dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar..

#### ***B. Alat dan Bahan***

##### **1. Alat yang digunakan**

Autoklaf (*Hirayama*), cawan petri, erlenmeyer (*Pyrex® Iwaki*) 250 ml dan 100 ml, gelas ukur, gelas ukur (*Pyrex® Iwaki*) 100 ml, inkubator, jarum ose bulat, lampu spiritus, laminar air flow (LAF) (*Esco*), oven (*Memmert*), pipet tetes, phyrex, sendok stainless stell, spoitl ml dan 10 ml, tabung reaksi (*Pyrex® Iwaki*), tabung durham, timbangan analitik.

##### **2. Bahan yang digunakan**

Air zam-zam dalam kemasan, aquadest, brilliant Green Lactose Bile Broth (BGLB), cetremid Agar (CETA), eosin Methylen Blue (EMBA), media Lactose Borth (LB), media Bismuth Sulfit Agar (BSA), media Pseudomonas Selective Agar (PSA), natrium agar (NA), Triptic Soy Broth (TSB), Selenite Cystine Broth (SCB), Salmonella Shigella Agar (SSA).

### ***C. Populasi dan Sampel***

Populasi dari penelitian ini adalah air berlabel zam-zam yang diperjual belikan di jln. Kerung-kerung Makassar, sedangkan sampel yang merupakan bagian dari populasi yang diteliti dalam penelitian ini adalah air berlabel zam-zam dalam kemasan yang diperjual belikan di dua toko yang berbeda-beda dengan merek yang berbeda-beda pula. Rincian merek air berlabel zam-zam dan toko tempat penjualannya dapat dilihat dalam tabel 1.

**Tabel 1.** Sampel air zam-zam yang digunakan

No	Toko	Merek
1.	Salsabilla	SW
2.	Al-Hidayah	Kingdom Of Saudi Arabia

### ***D. Prosedur kerja***

#### **1. Sterilisasi alat**

Alat yang digunakan dicuci dengan deterjen, wadah mulut lebar dibersihkan dengan direndam dengan larutan deterjen panas selama 15-30 menit diikuti dengan pembilasan pertama dengan HCl 0,1 % dan terakhir dengan air suling, alat-alat dikeringkan dengan posisi terbalik di udara terbuka setelah kering dibungkus dengan kertas perkamen. Tabung reaksi dan gelas erlenmeyer terlebih dahulu disumbat dengan kapas bersih. Alat-alat dari kaca disterilkan di oven pada suhu 180° C selama 2 jam. Alat-alat suntik dan alat-alat plastik lainnya tidak tahan pemanasan tinggi disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121° C selama 15 menit dengan tekanan 2 atm. Jarum ose disterilkan dengan pemanasan langsung hingga memijar.

## **2. Pembuatan medium**

Bahan disiapkan untuk pembuatan medium, medium nutrisi agar NA, lactosa Broth LB, ditimbang sesuai dengan komposisi medium yang akan dibuat, lalu dilarutkan dengan air suling steril, dan dipanaskan serta disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121 °C selama 15 menit.

### ***E. Pengujian sampel***

#### **1. Pengujian kuantitatif**

##### **a. ALT Bakteri**

Diambil 1 ml sampel air dari tiap tingkatan pengenceran yaitu 10 : 1 dan 10 : 2 dan 10 : 3 kemudian masing-masing dimasukkan ke dalam cawan petri steril, selanjutnya dituang medium NA hingga menutupi semua dasar cawan petri, dihomogenkan kemudian dibiarkan memadat. Diinkubasi pada suhu 37 °C selama 1 x 24 jam. Diamati jumlah koloni bakteri.

##### **b. Penentuan total jumlah bakteri secara Most Problem Number (MPN)**

Pada metode ini digunakan medium cair dengan tabung-tabung reaksi dan tabung durham, perhitungannya dilakukan berdasarkan atas jumlah tabung reaksi yang positif yaitu yang ditumbuhi oleh mikroorganisme setelah dilakukan inkubasi pada suhu dan waktu tertentu. Pengamatan terhadap tabung positif dapat dilihat dan diamati dengan adanya perubahan warna dari medium dan terbentuk gas dalam tabung durham yang diletakkan dengan cara terbalik. Untuk setiap pengenceran dapat digunakan tabung reaksi yang berisi medium dengan beberapa seri yaitu seri tiga, lima dan tujuh. Lebih banyak tabung yang digunakan akan menunjukkan hasil yang lebih teliti, tetapi harus menggunakan tabung yang lebih banyak. Sehingga dalam pengerjaan secara rutin pada umumnya hanya menggunakan seri tiga sudah cukup.

Pada metode MPN ini yang sekarang, dilakukan pengenceran terhadap bahan atau sediaan yang akan diperiksa sesuai dengan derajat kontaminasinya. Pengenceran tersebut biasanya dilakukan pengenceran lebih tinggi dari pada pengenceran dalam hitungan cawan, sehingga beberapa tabung yang berisi medium cair yang diinokulasikan dengan larutan hasil pengenceran tersebut mengandung satu sel mikroorganisme, beberapa tabung mungkin mengandung lebih banyak dari satu sel, sedangkan tabung lainnya tidak mengandung sel mikroorganisme. Dengan demikian setelah dilakukan inkubasi diharapkan terjadi pertumbuhan pada beberapa tabung yang dinyatakan sebagai tabung positif, sedangkan lainnya adalah negatif.

Metode MPN ini biasanya digunakan untuk menghitung jumlah mikroorganisme dalam contoh yang berbentuk cair, meskipun juga dapat digunakan untuk menghitung jumlah mikroorganisme dalam sediaan padat yang sebelumnya dibuat dalam bentuk suspensi atau larutan. Kelompok mikroorganisme yang dapat dihitung dengan menggunakan metode MPN ini juga bervariasi tergantung dari media yang digunakan untuk pertumbuhan.

Pada metode MPN ini setiap hasil pengenceran dipipet 1 ml ke dalam masing-masing tabung reaksi yang berisi medium, dimana untuk setiap pengenceran dapat digunakan tiga seri tabung reaksi waktu tertentu, maka diamati dan dihitung jumlah tabung reaksi yang positif pada setiap seri pengenceran yang ditandai dengan adanya perubahan warna pada medium dan terbentuknya gas dalam tabung Durham. Apabila menggunakan medium lactosa broth, maka warna medium akan berubah dari hijau ke kuning apabila terjadi reaksi positif, sebagai contoh pada pengenceran pertama pertama terdapat 3 tabung yang positif, pada pengenceran kedua ada 2 tabung yang positif dan pada pengenceran ketiga 1 tabung yang positif dan tabung berikutnya

kalau masih ada adalah 0, maka kombinasinya menjadi urutan 3, 2, 1, 0 dapat digunakan 3, 2, 1 atau 2, 1, 0 angka kombinasi ini dicocokkan dengan tabel MPN (Djide Natsir, 2006).

## **2. Pengujian kualitatif**

### **a. Pengujian *Pseudomonas aeruginosa***

Diambil 1 ml sampel dari tiap tingkat pengenceran yaitu 10 : 1 10 : 2 dan 10 : 3 kemudian masing-masing dimasukkan ke dalam 3 seri tabung reaksi yang berisi 8 ml medium TSB, selanjutnya diinkubasi pada suhu 37° C selama 24 jam. Diamati jika timbul kekeruhan dan endapan maka positif untuk *Pseudomonas aeruginosa*.

### **b. Pengujian *Salmonella***

Diambil 1 ml sampel dari tiap tingkat pengenceran yaitu 10 : 1 10 : 2 dan 10 : 3 kemudian masing-masing dimasukkan ke dalam 3 seri tabung reaksi yang berisi 9 ml medium SCB. Selanjutnya diinkubasi pada suhu 37° C selama 1 x 24 jam. Diamati jika timbul kekeruhan dan endapan maka positif untuk *Salmonella*.

## **3. Pengujian Lanjutan**

### **a. Pengujian *Pseudomonas aeruginosa***

Dituang medium CETA kedalam cawan petri steril, kemudian diambil 1 ml sampel uji positif dari medium TSB, selanjutnya di inkubasi pada suhu 37° C selama 1 x 24 jam. Diamati jika timbul koloni fluoresensi hijau biru maka *Pseudomonas aeruginosa*.

### **b. Pengujian *Salmonella***

Dituang medium SSA kedalam cawan petri steril, kemudian diambil 1 ml sampel uji positif dari medium SCB, selanjutnya di inkubasi pada 37° C selama 1 x

24 jam. Diamati jika timbul koloni coklat hitam dengan zona bening maka positif *Salmonella*.

**c. Pengujian *Escherichia coli***

Dituang medium EMBA kedalam cawan petri steril sehingga tertutupi dasarnya dan dibiarkan memadat, kemudian diambil 1 ml sampel uji positif dari medium LB, selanjutnya di inkubasi pada suhu 37°C selama 1 x 24 jam. Diamati jika timbul koloni merah dalam hijau metalik maka positif untuk *Escherichia coli*.



**BAB IV**  
**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**A. Hasil penelitian**

**1. Uji ALT**

Uji Angka Lempeng Total merupakan metode kuantitatif yang digunakan untuk mengetahui jumlah mikroba pada suatu sampel, dan pengujian ALT dilakukan untuk mengetahui jumlah koloni yang tumbuh pada media Nutrien agar yang diinkubasi selama 24 jam dengan 37° C yang diambil pada air zam-zam kemasan yang meliputi sampel A dan sampel B dan untuk membedakan masing-masing pengujian pada sampel dengan hasil sebagai berikut :

**Tabel 1.** Hasil Pengamatan Angka Lempeng Total Bakteri dari sampel air zam-zam dalam kemasan A B.

Sampel	Jumlah pengenceran			Jumlah koloni	Hasil perhitungan (Koloni/ml)	Persyaratan (Koloni/ml)	Keterangan
	10 : 1	10 : 2	10 : 3				
A	219	332	222	773	$7 \times 10 : 2$	$1 \times 10 : 5$	Tidak memenuhi syarat
B	144	138	277	559	$5 \times 10 : 2$	$1 \times 10 : 5$	Tidak memenuhi syarat

## 2. Uji MPN

Metode MPN menggunakan medium cair, maupun medium padat dengan tabung-tabung reaksi dan tabung durham, perhitungan dilakukan berdasarkan jumlah tabung reaksi yang positif dan yang ditumbuhi oleh mikroorganisme setelah dilakukan inkubasi pada suhu dan waktu tertentu, pengamatan untuk tabung yang positif dapat dilihat dan diamati dengan adanya perubahan warna dari medium dan terbentuknya gas pada Tabung durham, sampel air dimasukkan pada media Laktosa Broth yang didalamnya diberi tabung durham dengan tujuan untuk menangkap gas CO<sub>2</sub> bila terjadi penguraian Laktosa, dari uji tabung penduga yang positif dilanjutkan ke uji penegas dengan ditanam pada media Brilliant Green Laktosa Broth dan diinkubasi pada suhu 37° C selama 24 jam dan hasil pengujian adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.** Hasil Pengamatan Metode MPN dari sampel air zam-zam dalam kemasan A B.

Sampel	Jumlah hasil (+) tiap pengenceran			Hasil perhitungan	Persyaratan	Keterangan
	10 : 1	10 : 2	10 : 3			
A	-	-	+	3 APM/ ml	< 2/100 ml	Tidak memenuhi syarat
B	+	-	+	64 APM/ ml	< 2/100 ml	Tidak memenuhi syarat

Keterangan : (-) Tidak berubah

(+) Gelembung gas, keruh

### 3. Uji identifikasi Bakteri patogen

**Tabel 5.** Hasil identifikasi Bakteri patogen dari sampel air zam-zam dalam kemasan

A B.

No	Kode sampel		<i>E.coli</i>	<i>P. Aeruginosa</i>		<i>S. Typhi</i>	
			EMBA	TSB	CETA	SCB	SSA
1	A	10 : 1	-	+	+	-	+
2	B	10 : 1	-	+	+	-	+

Keterangan : (+) Tampak keruh

#### B. Pembahasan

Penelitian ini menggunakan air zam-zam dalam kemasan dimana sampel ini berasal dari Jl. Raya Kerung-kerung Makassar, penelitian ini menggunakan air zam-zam dalam kemasan karena untuk mengetahui apakah air zam-zam dalam kemasan mengandung mikroorganisme, penelitian air zam-zam dalam kemasan ini terdiri dari sampel A dan sampel B.

Standar penghitungan jumlah koloni kuman di Laboratorium Mikrobiologi adalah maksimal jumlah koloni pada plate adalah 300 koloni. Jika jumlah koloni lebih dari 300, maka perlu dilakukan pengenceran. Dari pengenceran perlu dipastikan bahwa hasil pengenceran menunjukkan jumlah kuman harus dalam rentang antara 30-300 koloni.

Pengujian angka lempeng total (ALT) merupakan salah satu cara untuk menentukan jumlah mikroba dalam sampel air zam-zam dalam kemasan secara tidak langsung dengan metode hitung mikroba yang hidup dalam media agar. Cara ini lebih akurat dibandingkan dengan cara hitung langsung melalui pengamatan dibawah mikroskop, karena cara ini dapat menentukan jumlah mikroba hidup melalui

kemampuannya membentuk koloni pada media agar yang dapat langsung dilihat dengan mata tanpa bantuan mikroskop.

Pengenceran pada sampel air zam-zam dalam kemasan dengan menggunakan metode tuang dimana untuk mengetahui adanya suatu mikroba pada suatu sampel oleh karena itu dilakukan pengenceran bertingkat yaitu dari pengenceran 10 : 1 10 : 2 10 : 3 untuk menurunkan jumlah mikroorganisme sehingga pertumbuhan koloni tidak terlalu rapat atau tidak terjadi penumpukan agar lebih mudah dalam lebih mudah dalam pengamatan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tuang dimana metode ini dibuat pengenceran 10 : 1 10 : 2 10 : 3 teknik untuk menumbuhkan mikroorganisme di dalam media agar dengan cara mencampurkan media agar yang masih cair dengan stok kultur bakteri agar sehingga sel-sel tersebut tersebar merata dan diam baik di permukaan agar atau di dalam agar (Harley and Presscot, 2002).

Media yang digunakan untuk mengisolasi atau menumbuhkan mikroba yaitu medium Nutrien Agar untuk bakteri yang mengandung sumber nitrogen yang cukup, yaitu sumber daging sebagai sumber protein dan pepton sebagai sumber asam amino yang dibutuhkan untuk pertumbuhan bakteri.

Pengujian Angka Lempeng Total berdasarkan metode Standar Plate Count (SPC) diambil dari tingkat pengenceran 10 : 1 10 : 2 10 : 3 dan hasil yang diperoleh untuk Angka Lempeng Total dengan metode Standar Plate Count (SPC) sampel air zam-zam dalam kemasan A adalah  $7 \times 10^2$  koloni/ml, sampel air zam-zam dalam kemasan B adalah  $5 \times 10^2$  koloni/ml.

Hasil yang diperoleh dari jumlah total bakteri secara Most Probable Number (MPN) atau Angka Paling Memungkinkan (APM) pada sampel air zam- zam dalam kemasan A adalah 3 APM/ml untuk sampel kemasan B adalah 64 APM/ml.

Pemeriksaan bakteri *Escherichia coli* dilakukan dengan cara menginokulasi sampel yang telah ditanam dalam media uji, pada media selektif yaitu Eosin Methylen Blue Agar (EMBA). Media ini bersifat selektif dalam menumbuhkan *Escherichia coli* karena dalam media ini mengandung eosin yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri gram positif dan hanya dapat menumbuhkan bakteri gram negatif. Bila dalam biakan terdapat bakteri *Escherichia coli* maka asam yang dihasilkan dari fermentasi akan menghasilkan warna koloni yang spesifik untuk bakteri *Escherichia coli* yaitu koloni yang berwarna hijau dengan kilap logam (Acumedia Manufacture inc, 2001). Dalam penelitian ini tidak ditemukan adanya bakteri *Escherichia coli* dari tiga sampel yang diteliti.

Dalam identifikasi bakteri patogen *Salmonella sp* menggunakan medium pembedahan Selenite Cystine Broth (SCB), yang mengandung kasein yang menyediakan nitrogen dan sumber vitamin untuk pertumbuhan mikroorganisme, dan diinkubasi pada suhu 37° C selama 24 jam kemudian diamati, dari hasil penelitian yang diperoleh tidak menimbulkan kekeruhan, jika timbul kekeruhan dan endapan maka positif untuk *Salmonella*, dan dilakukan lagi inokulasi pada medium Salmonella-Shigella Agar (SSA) yang merupakan salah medium yang untuk menumbuhkan bakteri *Salmonella sp*, media ini tergolong selektif dikarenakan terdiri dari bile salt yang berguna untuk menghambat pertumbuhan bakteri gram positif dan beberapa gram negatif. Dari hasil yang diperoleh dari pertumbuhannya ditandai dengan warna coklat muda dan hasilnya merupakan hasil yang positif untuk bakteri

*Salmonella sp.*, jika timbul koloni coklat hitam dengan zona bening maka positif *Salmonella*.

Identifikasi bakteri *Pseudomonas aeruginosa* dengan menggunakan medium Tryptine Soy Broth (TSB) mengandung kasein dan pepton kedelai yang menyediakan asam amino yang bernutrisi untuk berbagai macam mikroorganisme, diinkubasi pada suhu 37° C selama 24 jam dan diamati, dan hasil yang diperoleh pada medium Tryptine Soy Broth (TSB) adalah pada permukaan timbul warna hitam, jika timbul kekeruhan dan endapan maka positif untuk *Pseudomonas aeruginosa*, dan dilanjutkan lagi pada medium selanjutnya medium Cetrimida agar (CETA) adalah media selektif untuk bakteri *Pseudomonas aeruginos*, intisari enzimatik dari gelatin menyediakan nitrogen, vitamin, dan karbon dalam Agar Cetrimide. Magnesium Klorida dan Kalium Klorida meningkatkan produksi pyocyanin dan fluoresensi. Cetrimide (Cetyltrimethylammonium Bromide) adalah agen selektifnya Cetrimide yang menyebabkan penghambatan pertumbuhan bakteri selain *Pseudomonas aeruginos*, dari hasil yang diperoleh yaitu timbul kekeruhan pada medium hasilnya negatif untuk bakteri *Pseudomonas aeruginos*.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengujian mikrobiologi air zam-zam dalam kemasan untuk pengujian Angka Lempeng Total (ALT) dan MPN koliform tidak memenuhi persyaratan standar Nasional Indonesia (SNI).
2. Mikroba sampel air zam-zam dalam kemasan ini terdapat 2 isolat bakteri yakni *Salmonella sp* dengan menggunakan medium Selenite Cystine Broth (SCB), Salmonella-Shigella Agar (SSA) dan bakteri *Pseudomonas Aeruginosa* dengan menggunakan medium Tryptine Soy Broth (TSB), dan medium Cetrimida Agar (CETA).

#### **B. Saran**

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui kualitas air zam-zam dalam kemasan.
2. Masyarakat dapat memilih air zam-zam dalam kemasan yang berkualitas selain untuk obat maupun kepentingan lainnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an.

Djide, M. Natsir, dkk. *Analisis Mikrobiologi Farmasi*. Makassar Lembaga Penerbit Unhas. 2006.

Dwidjoseputro, D. *Dasar-Dasar Mikrobiologi*. Jakarta. Djambatan. 1994.

Dwidjoseputro, D. *Dasar-Dasar Mikrobiologi*. Jakarta. Djambatan. 1990.

Entjang. *Mikrobiologi dan parasitologi untuk akademi keperawatan dan sekolah tenaga kesehatan yang sederajat*. Bandung : Penerbit PT. Citra aditya bakti. 2003.

Effendi, E. *Telaah Kualitas Air Bagi Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan Perairan*. Yogyakarta : Kanisius. 2003.

Ega, M. *Manfaat Air Zam-Zam Terhadap Pencegahan Osteoporosis*. Lampung : Fakultas Kedokteran. 2016.

Fardiaz, S. *Mikrobiologi Pangan I*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. 1992.

Gayo, I. *Buku Pintar Haji dan Umrah*. Jakarta : Pustaka warga negara. 2005.

Garrity, dkk. *Taxonomic Outline Of The Prokaryotes Bergey's Manual Of Systematic Bacteriologi*. 2004.

Hidayah, Et al. *Deteksi Kemurnian Air Zam-Zam Dengan Menggunakan Metode Spektrofotometri*. 2014.

Hasyimi, H. M. *Mikrobiologi Dan Parasitologi Untuk Mahasiswa Keperawatan*. Jakarta : CV Trans Info Media. 2010.

Harley and Presscot. *Laboratory Exercise in Microbiology*. USA : Mc Graw Hill Publisher. 2002.

Irianto, K. *Mikrobiologi Menguak Dunia Mikroorganisme*. Bandung : Yrama widya. Jilid 1.

Ismail, S. *Mikrobiologi parasitologi*. Jakarta. 2008.

Jawetz Melnick And Adelberg. *Mikrobiologi kedokteran* : EGC. 2002.

- Jordan, H. *Manfaat Air Zamzam*. Jurnal Pustaka Kesehatan. 2014.
- James G, dkk. *Manual Laboratorium Mikrobiologi Jilid 8*. Penerbit Buku Kedokteran : EGC. 2002.
- Kusuma, A. *Kontaminasi Escherichia coli Pada Penyajian Makanan Pendamping Air Susu Ibu Lokal Bagi Bayi Usia 6-12 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Selayo Tahun 2012*. Disertasi. Jakarta : Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. 2012.
- Khalid, N. *Mineral Composition and Healt Functionality Of Zam-Zam Water Review*. 2013.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 416/MENKES/PER/IX/1990 *Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air*. Jakarta Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 1990.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur`an dan Terjemahannya*. Bandung : PT Msyaamil Cipta Media. 2009.
- Lusiani. *Studi Banding Kualitas Bakteriologi Air Pada Minuman Dalam Plastik Sebelum Dan Sesudah Proses Perbandingan Di Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Surakarta* : FK UNS. Skripsi. 1996.
- Lisdayanti, E. *Potensi Antibakteri Dari Bakteri Asosiasi Lamun (Seagrass) Dari Pulau Bonebatang Perairan Kota Makassar*. Makassar : Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin Makassar. 2013.
- Muhammad, N. *Mukjizat Makanan dan Minuman Kesukaan Rasulullah*. Jogjakarta : Diva press anggota IKAPI. 2012.
- Nadyah. *Dasar-Dasar Mikrobiologi*. Makassar : Alauddin University Press. 2012.
- Pelczar Michael J, And Chan. *Dasar-dasar mikrobiologi*. Jakarta : UI Press. 2010.
- Prawiro, H. *Biologi edisi kedua*. Jakarta. Penerbit : Erlangga. 1898.
- Riyadi, S. *Pencemaran Air Seri Lingkungan Dasar-Dasar dan Pokok-Pokok Penanggulangan*. Surabaya : Karya anda. 1984.
- Rasyida, et al. *Deteksi Kemurnian Air Zamzam Menggunakan Metode Spektrofotometri*. 2014.

Rido wandrivel, dkk. *Kualitas Air Minum Yang Diproduksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Bungus Padang Berdasarkan Persyaratan Mikrobiologi* : Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. 2012.

Standar Nasional Indonesia SNI-3553. *Tentang Air Zam-Zam Kemasan*. Jakarta. Dewan Standarisasi Nasional Indonesia. 1996.

Siswanto, et. al. *Reduksi Silika Dari Pasir Putih*. Medan : Universitas Sumatra Utara. 2013.

Srikandi, F. *Mikrobiologi Pangan*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka utama. 1992.

Subandi. *Mikrobiologi Pengembangan Kajian dan Pengamatan dalam Persfiktif Islam*. 2014.

Suriawiria. *Mikrobiologi Air dan Dasar-Dasar Pengolahan Buangan Secara Biologis*. Penerbit : PT. Alumni. 2008.

Suriawiria. *Pengantar Mikrobiologi umum*. Bandung : Angkasa. 1986.


Sulaiman M, dkk. *Jurnal Ilmu Dan Tekhnologi Kelautan Tropis*. Bogor : Department Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan. 2015.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

**Lampiran 1 : Gambar pengamatan**

**Gambar 1.** Foto hasil pengujian ALT air zam-zam kemasan sampel A




**Keterangan :**

A : Pengenceran sampel 10 : 1 (sampel merek SW)

A : Pengenceran sampel 10 : 2 (sampel merek SW)

A : Pengenceran sampel 10 : 3 (sampel merek SW)

**Gambar 2.** Foto hasil pengujian ALT air zam-zam kemasan sampel B




**Keterangan :**

**B** : Pengenceran sampel 10 : 1 (sampel merek Kingom of saudi arabia)

**B** : Pengenceran sampel 10 : 2 (sampel merek Kingom of saudi arabia)

**B** : Pengenceran sampel 10 : 3 (sampel merek Kingom of saudi arabia)

**Gambar 4** : Foto hasil pengujian MPN air zam-zam sampel A




**Keterangan :**

A : Pengenceran sampel 10 : 1 (sampel merek SW)

A : Pengenceran sampel 10 : 2 (sampel merek SW)

A : Pengenceran sampel 10 : 3 (sampel merek SW)

**Gambar 5** : Foto hasil pengujian MPN air zam-zam dalam kemasan sampel B




**Keterangan :**

**B** : Pengenceran sampel 10 : 1 (sampel merek Kingom of saudi arabia)

**B** : Pengenceran sampel 10 : 2 (sampel merek Kingom of saudi arabia)

**B** : Pengenceran sampel 10 : 3 (sampel merek Kingom of saudi arabia)

**Gambar 7** : Foto hasil pengujian bakteri *Salmonella* air zam- zam dalam kemasan sampel A, sampel B.



**Keterangan :**


**A** : Selenite Cystine Broth (SCB) (sampel merek SW)

**A** : Salmonella-Shigella Agar (SSA) (sampel merek SW)

**B** : Selenite Cystine Broth (SCB) (sampel merek Kingom of saudi arabia)

**B** : Salmonella-Shigella Agar (SSA) (sampel merek Kingom of saudi arabia)

**Gambar 8** : Foto hasil pengujian bakteri *Pseudomonas aeruginosa* air zam- zam dalam kemasan sampel A, sampel B.



**Keterangan :**


**A** : Tryptine Soy Broth (TSB) (sampel merek SW)

**A** : Cetrimida Agar (CETA) (sampel merek SW)

**B** : Tryptine Soy Broth (TSB) (sampel merek Kingom of saudi arabia)

**B** : Cetrimida Agar (CETA) (sampel merek Kingom of saudi arabia)

**Gambar 9** : Foto hasil pengujian bakteri *Escherichia coli* air zam-zam dalam Kemasan sampel A, sampel B.



**Keterangan :**

**A** : EMBA (sampel merek SW)

**B** : EMBA (sampel merek SW)

**Gambar 10** : Foto daerah tempat pembelian sampel air zam-zam dalam kemasan Jl.  
Raya Kerung-kerung Makassar, sampel A, sampel B.



A



A



B



B

## Lampiran 2. Pembuatan medium

### a. Nutrien Agar (NA)

Komposisi :

Ekstrak Beef	3,0 gram
Pepton	5,0 gram
Agar	15,0 gram
Air suling hingga	1000 ml

Pembuatan :

Ditimbang bahan sebanyak 23,0 g dilarutkan dalam 1000 ml sampai larut, kemudian disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121 °C selama 15 menit.

### b. Medium laktosa broth (LB)

Komposisi :

Ekstrak daging	3 gram
Pepton	5 gram
Laktosa	15 gram

Air suling hingga 1000 ml

Pembuatan :

Semua bahan yang ditimbang dimasukkan ke dalam gelas erlenmeyer dilarutkan dalam air suling hingga 800 ml, dipanaskan sampai larut, dicukupkan sampai 1000 ml air suling, kemudian disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121 °C selama 15 menit.

c. Eosin Methylen Blue Agar (EMBA)

Komposisi :

Pepton	10 gram
Potasium Hidrogen Phosfat	2 gram
Laktosa	5 gram
Sukrosa	5 gram
Eosin Y.yellowish	0,4 gram
Methylen blue	0,07 gram
Agar	13,5 gram
Air suling hingga	1000 ml

Pembuatan :

Medium sintetik ini ditimbang sebanyak 36 gram semua bahan dimasukkan kedalam gelas erlenmeyer dilarutkan dalam air suling hingga 800 ml, dipanaskan sampai larut, dicukupkan sampai 1000 ml air suling, kemudian disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121 °C selama 15 menit.

d. Medium Selenite Cystein Brioth (SCB)

Komposisi :

Pepton dari casein	5 gram
L-cystine	0,01 gram
Laktosa	4 gram
Sodium phosphat	10 gram

Sodium Hydrogen Selenitye	4 gram
Air suling hingga	1000 ml

Pembuatan :

Semua bahan yang ditimbang dimasukkan kedalam gelas erlenmeyer dilarutkan dalam air suling hingga 800 ml, dipanaskan sampai larut, dicukupkan sampai 1000 ml air suling, kemudian disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121 °C selama 15 menit.

e. Salmonella Shigella Agar (SSA).

Komposisi :

Meat ekstrak	5 gram
Laktosa	10 gram
Natrium Citrat	10 gram
Natrium Tiosulfat	8,5 gram
Amonium Iron (III) Citrat	1,0 gram
Briliant Green	0,0003 gram
Neutral real	0,025 gram
Agar	12 gram
Air suling hingga	1000 ml

Pembuatan :

Semua bahan dimasukkan ke dalam gelas erlenmeyer dilarutkan dalam air suling hingga 800 ml, dipanaskan sampai larut, dicukupkan sampai 1000 ml air suling, kemudian disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121 °C selama 15 menit.

f. Brillient Green Lactose Bile Broth (BGLB)

Koposisi :

Pepton	10 gram
Laktosa	10 gram
Air suling hingga	500 ml

Pembuatan :

Ditimbang exgall 20 lalu dilarutkan dalam 200 ml air suling dan diukur Ph antara 7,0 dan 7,5 lalu dicampur dengan semua larutan, di tambahkan air suling sampai volumenya mencapai 975 ml lalu di atur lagi Ph 7,4 lalu ditambahkan larutan brilliant green 0,1 % dalam air sebanyak 13,3 ml, ditambahkan air suling sampai volume menjadi 1 liter lalu disaring.

g. Tryptic Soy Broth (TSB)

Komposisi :

Enzymatic Digest of casein	17, 0 gram
Enzymatic Digest of Soybean Meal	3,0 gram
Sodium Chloride	5,0 gram
Dipotassium Phosphate	2,5 gram
Dextrose	2,5 gram

Pembuatan :

Ditimbang bahan sebanyak 6,6 gram dan dilarutkan dalam 200 ml aquadest, kemudian dipanaskan hingga semua larut (homogen). Selanjutnya disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121 °C selama 15 menit.

h. Cetremid Agar (CETA)

Komposisi :

Enzymatic Digest of Gelatin	20 gram
-----------------------------	---------

Magnesium Chloride	1,4 gram
Pottassium Chloride	10 gram
Cetrimide (Cetyltrimethylammonium Bromide)	0,3 gram
Agar	13,6 gram
Glycerol	10 ml


Pembuatan :

Ditimbang bahan sebanyak 9,96 gram dan larutkan dalam 200 ml aquadest. Kemudian dipanaskan hingga semua larut (homogen), selanjutnya disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121 °C selama 15 menit.

**Lampiran skema kerja**


**1. Pengujian kuantitatif**

**a. ALT**




**b. MPN**


**1. Uji pendahuluan**



## 2. Uji penegasan



c. Identifikasi Bakteri patogen





## BIOGRAFI

**Nurfadillah**, begitulah nama lengkap mahasiswi ini dan akrab disapa dengan sebutan dila, lahir di sinjai, 27 Oktober 1996. Anak dari pasangan suami isteri A. Jumardi dan Nur aini. Merupakan anak pertama dari dua bersaudara.

Memulai jenjang pendidikannya di SD Negeri 5 lepak lombok masuk pada tahun 2002 dan lulus pada tahun 2007, kemudian melanjutkan pendidikannya di jenjang Sekolah Menengah Pertama di MTS islam ulil al-baab lombok lulus pada tahun 2010. Setelah lulus dari jenjang MTS, ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Atas di SMA islam ulil al-baab lombok dan lulus pada tahun 2013.

Setelah lulus pada jenjang Sekolah Menengah Atas penulis melanjutkan jenjang pendidikannya. Dan alhamdulillah penulis dapat lulus di salah satu Universitas yang ada di Makassar yaitu Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Fakultas kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Jurusan Farmasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R