

**PENGARUH TIGA JENIS PUPUK KANDANG TERHADAP
PERTUMBUHAN KANGKUNG CABUT
(*Ipomoea Reptans* POIR)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Peternakan (S.Pt) Pada Jurusan Ilmu Peternakan
Fakultas Sains dan Teknologi Universitas
Islam Negeri Alauddin
Makassar

Oleh:

Hasan Basri

NIM: 60700112025

**JURUSAN ILMU PETERNAKAN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
ALAUDDIN MAKASSAR
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasan Basri
NIM : 60700112025
Tempat/Tgl. Lahir : Sinjai, 21 September 1994
Jurusan/Prodi : Ilmu Peternakan
Alamat : Jl. Veteran Bakung, Samata-Gowa
Judul : “Pengaruh Tiga Jenis Pupuk Kandang Terhadap Pertumbuhan Kangkung Cabut (*Ipomoea Reptans* POIR)”.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

ALA UDDIN
M A K A S S A R

Gowa, Mei 2018

Penyusun,



Hasan Basri
Nim: 60700112025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi saudara **Hasan Basri**, NIM: **60700112025** mahasiswa Ilmu Peternakan pada Fakultas Sains dan Teknologi, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, “Pengaruh Tiga Jenis Pupuk Kandang Terhadap Pertumbuhan Kangkung Cabut (*Ipomoea Reptans* POIR)”, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih Lanjut


Makassar, Mei 2018

Pembimbing I



Prof. Dr. Ir. H. Abd. Lathief Toleng, M.Sc
NIP. 19540602 197802 1 001

Pembimbing II




Muh. Hidayat, S.Pt., M.Si
NIP: 19750909 200912 1 001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Peternakan



Dr. Ir. Muh. Basir Paly, M.Si
NIP. 19590712 198603 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Pengaruh Tiga Jenis Pupuk Kandang Terhadap Pertumbuhan Kangkung Cabut (*Ipomaea Reptans* POIR” yang disusun oleh **HASAN BASRI, NIM: 60700112025**, mahasiswa Jurusan Ilmu Peternakan pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 25, April, 2018 dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Peternakan, pada jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Samata-Gowa Agustus, 2018
Dzul-Hijjah, 1439 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. Muh. Thahir Maloko, M.HI.	(.....)
Sekretaris	: Irmawati, S.Pt., M.P.	(.....)
Munaqisy I	: Dr.Ir.Muh. Basir Paly, M.Si	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Muh. Sabri AR, M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Prof.Dr.Ir.H.Abd.Latif Toleng.M.Sc	(.....)
Pembimbing II	: Muh. Nur Hidayat, S.Pt.,M.P.	(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN MAKASSAR



Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.
NIP. 1969205 199303 1 001

KATA PENGANTAR



Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Tiga Jenis Pupuk Kandang Terhadap Pertumbuhan Kangkung Cabut (*Ipomoea Reptans* POIR)” guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Peternakan (S.Pt) pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad saw, beserta sahabat-sahabatnya dan kepada pengikut setianya Insya Allah. Penulis menyadari bahwa karya ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberi dukungan, do’a, semangat, peajaran dan pengalaman berharga pada penulis sejak penulis menginjak bangku perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini.

Selama prosespenulisan skripsi, tentunya tidak lepas dari berbagai hambatan dan tantangan, namun berkat petunjuk, bimbingan, arahan, do’a serta dukungan moril dari berbagai pihak maka hambatan dan tantangan tersebut dapat teratasi. Untuk itu, perkenankanlah penulis menghaturkan ucapan terimakasih dan penghargaan yang istimewa kepada Ayahanda **Bahar**, Ibunda tercinta **Hawisah** dan Kakandaku **Bahriadi** yang tanpa pamrih, penuh kasih sayang membesarkan dan mendidik penulis sejak kecil hingga menyelesaikan pendidikan seperti saat ini.

Penulis menyadari kelemahan serta keterbatasan yang ada sehingga dalam menyelesaikan skripsi ini memperoleh bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :


1. Bapak **Prof. Dr. Musafir Pabbari, M.Si** selaku rector Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
2. Bapak **Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag** selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Bapak **Dr. Ir. M. Basir Paly, M.Si** Sebagai ketua Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Bapak **Prof. Dr. Ir. H. Abd. Latief Toleng, M.Sc** selaku dosen Pembimbing pertama, dan Ayahanda **Muh. Nur Hidayat, S.Pt., M.Si** selaku dosen Pembimbing Kedua, atas bimbingannya selama ini yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis mulai dari penyusunan proposal sam[ai meyelesaikan skripsi ini.
5. **Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Peternakan** atas bimbingan dalam kegiatan perkuliahan, baik dalam tatapmuka mupun arahan-arahan diluar perkuliahan.
6. Bapak **Dr. Ir. M. Basir Paly, M.Si, Bapak Dr. Muh. Sabri AR, M.Ag** selaku penguji yang telah memberikan saran dan kritikan yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan dan penyusunan skripsi ini.
7. Rekan seperjuangan di Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar Angkatan 2012: **Asrul S.pt, Hasrin Spt, Suhaebar,**

Surwanto Udin, Amar Musdar S.pt, Irfan Islami S.Pt, Andi Nurhamzah Putra, Safaruddin Teristimewa kepada senior **Muh Arsan Jamili S.Pt, M,Si** dan **Muh Imran Yambas**

8. Adik-adikku tercinta: **Rustam, Mansur, Muh. Salman Alfarizi**, yang tidak pernah berhenti mengiringi Do'a motivasi, serta canda dan tawa sehingga dalam kondisi apapun penulis tetap mampu percaya diri dalam menyelesaikan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan baik isi maupun susunannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi penulis juga bagi para pembaca. Semoga segala bantuan dan bimbingan semua pihak dalam penyusunan skripsi ini mendapat imbalan dari Allah SWT. Aamiin

Makassar, April 2018



Penulis

HASAN BASRI
60700112025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	5
C. Tujuan penelitian	5
D. Manfaat penelitian.....	5
E. Definisi Operasional	6
F. Kajian terdahulu	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Kerusakan Lahan.....	10
B. Pemupukan.....	15
C. Sumber pupuk Organik	25
D. Pupuk organik dari ternak	32
E. Kangkung cabut	37
F. Kajian Islam tentang pupuk	39
BAB III MATERI DAN METODE	44
A. Waktu dan tempat	44

B. Populasi dan sampel.....	44
C. Materi penelitian	44
D. Variabel Penelitian	45
E. Prosedur Penelitian.....	45
F. Analisis data	48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Hasil	49
B. Pembahasan.....	51
BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

No.	Halaman
1. Kandungan zat hara dari tiga jenis feses ternak	34
2. Pengukuran tinggi tanaman kangkung	62
3. Uji Anova Pengukuran tinggi tanaman kangkung	62
4. Uji Tukey HSD 0,05 Pada Pengukuran Tinggi Tanaman kangkung	62
5. Pengukuran Panjang daun kangkung	63
6. Uji Anova Pengukuran Panjang daun kangkung	63
7. Uji Tukey HSD 0,05 Pengukuran Panjang daun kangkung	63
8. Penghitungan jumlah daun kangkung	64
9. Uji Anova penghitungan jumlah daun kangkung	64
10. Uji Tukey HSD 0,05 penghitungan jumlah daun kangkung	64
11. Pengukuran timbangan kangkung	65
12. Uji Anova Pengukuran timbangan kangkung	65
13. Uji Tukey HSD Pengukuran timbangan kangkung.....	65

DAFTAR GAMBAR

No.	Halaman
1. Diagram tinggi tanaman kangkung	47
2. Diagram jumlah daun kangkung	48
3. Diagram panjang daun kangkung.....	48
4. Diagram berat basah daun kangkung	49
5. Penyiapan lahan penelitian.....	66
6. Proses Penanaman kangkung cabut	66
7. Proses pengukuran kangkung cabut.....	67
8. Proses penimbangan kangkung.....	68



ABSTRAK

Nama : Hasan Basri
Nim : 60700112025
Jurusan : Ilmu Peternakan
Judul : Pengaruh pemberian tiga jenis pupuk kandang terhadap pertumbuhan kangkung cabut (*Ipomoea reptans* POIR)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tiga macam jenis pupuk kandang yaitu feses sapi, ayam, dan puyuh pada lahan kering dataran rendah terhadap produktifitas kangkung cabut (*Ipomoea Reptans*) dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan pola empat perlakuan dan lima ulangan. Perlakuan terdiri atas (P_0); Penanaman bibit kangkung tanpa menggunakan pupuk kandang (100 % Lahan), (P_1); Pupuk kandang feses sapi, (P_2); Pupuk kandang feses ayam, dan (P_3) Pupuk kandang feses puyuh. Parameter yang diukur meliputi tinggi tanaman, panjang daun, jumlah daun dan berat basah tanaman. Berdasarkan hasil sidik ragam menunjukkan bahwa pemberian pupuk kandang berpengaruh nyata dengan ($P < 0,05$) terhadap tinggi tanaman kangkung, jumlah daun kangkung, panjang daun kangkung dan berat basah tanaman kangkung. Akan tetapi berdasarkan hasil uji lanjut dari uji tukey HSD yang terdapat keragaman perdaan nyata hanya pada pengukuran tinggi tanaman dan berat basah tanaman. Dari hasil tersebut terlihat jelas bahwa penggunaan pupuk dari feses ayam lebih bagus jika dibandingkan dengan feses sapi dan feses puyuh.

Kata Kunci: *Pupuk Kandang, Unsur Hara Tanah, Kangkung Cabut*

ABSTRACT

Name : Hasan Basri
Nim : 60700112025
Department : Animal Science
Title : The effect of giving three types of manure to the growth of kale unplug (*Ipomoea reptans* POIR)

Research to compare between three types of manure, namely cow feces, chicken and quail. This study aims to determine the effect of three kinds of manure ie cow, chicken, and quail feces on lowland dry land using Completely Randomized Design (RAL) with 4 treatment patterns and 5 replications. (P_1); Planting of kale seedlings without using manure A (100% Soil), (P_2), Planting Seedlings using Manure (Cow Feces), (P_3); Planting of kale seedlings using Manure (chicken feces), (P_4) and Planting of seedlings using Manure (quail feces). Observed parameters include plant height, leaf length, leaf number and wet weight of the plant. Based on the result of the research, it was found that control plants (P0) in lowland kale landlings had significant effect ($P < 0,05$) on chicken stool (P1), quail feces (P2) and beef feces (P3). From the results of the height measurement of kale plants, the number of leaves, the length of leaves and the weight of wet kale plants also seen that the use of fertilizer from chicken feces better when compared with cow feces and quail feces.

Keywords: Manure, Soil Nut Element, *Ipomoea reptans*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris dengan 13,34% penduduknya adalah petani. Sebagian besar sistem pertanian di Indonesia berbasis tanah sehingga tanah merupakan faktor yang sangat penting. Tanah adalah salah satu komponen lahan berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan organik serta mempunyai sifat fisik, kimia, dan biologi yang mampu menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Sebagai bagian dari tubuh alam, tanah memiliki kapasitas yang terbatas secara kualitas maupun kuantitas. Kerusakan tanah adalah hilangnya atau menurunnya fungsi tanah, baik sebagai sumber unsur hara tumbuhan maupun sebagai tempat akar tumbuhan berjangkar dan tempat air tersimpan. Pemanfaatan tanah dengan intensitas tinggi berpotensi mengalami kerusakan tanah (Sukisno dkk, 2011).

Dalam upaya mencegah dan mengendalikan kerusakan tanah, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 150 tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa. Peraturan tersebut digunakan sebagai pedoman dalam menyusun peta status kerusakan tanah, yang merupakan acuan dalam kegiatan pencegahan serta pengendalian pada tanah yang belum maupun yang sudah mengalami kerusakan. Peraturan ini ditujukan untuk tanah yang digunakan sebagai lahan pertanian, misal sawah, perkebunan, tegalan, ladang dan hutan tanaman (Bintang dkk, 2016).

Penggunaan pupuk anorganik yang terus menerus dapat mengganggu keseimbangan kimia tanah sehingga produktifitas tanah menurun. Pemakaian pupuk kimia secara terus menerus menyebabkan terjadinya residu yang berlebihan dalam tanah. Tumpukan residu pupuk ini dalam tanah akan menjadi racun tanah yang mengakibatkan tanah menjadi sakit. Pada tanah yang sakit ini akan mendorong hilangnya unsur hara tertentu, polusi lingkungan dan rusaknya kondisi alam (Hairah dkk, 2000).

Dalam mengatasi permasalahan penggunaan pupuk anorganik secara terus menerus, perlu dilakukan perbaikan struktur tanah yaitu dengan pemberian pupuk kandang. Pupuk kandang dianggap dapat memperbaiki sifat fisik dan biologi tanah seperti dapat meningkatkan kegiatan jasad renik dalam membantu proses dekomposisi bahan organik. Setiap jenis pupuk kandang yang berbeda tentunya mengandung unsur hara yang berbeda (Stevenson, 1994)

Bahan organik memiliki peran penting dalam menentukan kemampuan tanah untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Jika kadar bahan organik tanah menurun, maka kemampuan tanah dalam mendukung produktivitas tanaman juga menurun. Menurunnya kadar bahan organik merupakan salah satu bentuk kerusakan tanah yang umum terjadi. Kerusakan tanah secara garis besar dapat digolongkan menjadi tiga kelompok utama, yaitu kerusakan sifat kimia, fisika dan biologi tanah. Kerusakan kimia tanah dapat terjadi karena proses pemasaman tanah, akumulasi garam-garam (*Salinisasi*), tercemar logam berat, dan tercemar senyawa-senyawa organik dan *xenobiotik* seperti pestisida atau tumpahan minyak bumi (Djajakirana, 2001).

Terjadinya pemasaman tanah dapat diakibatkan penggunaan pupuk nitrogen buatan secara terus menerus dalam jumlah besar. Kerusakan tanah secara fisik dapat diakibatkan karena kerusakan struktur tanah yang dapat menimbulkan pemadatan tanah. Kerusakan struktur tanah ini dapat terjadi akibat pengolahan tanah yang salah atau penggunaan pupuk kimia secara terus menerus (Brady, 1990)

Pupuk kandang adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri atas bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik yang berperan dalam memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Pupuk kandang mengandung unsur hara yang lengkap, baik unsur hara makro maupun unsur hara mikro. Kondisi ini tidak dimiliki oleh pupuk anorganik. Pupuk kandang mengandung asam-asam organik, antara lain asam *humic*, asam *fulvic*, hormon dan *enzym* yang tidak terdapat dalam pupuk anorganik yang sangat berguna baik bagi tanaman maupun lingkungan dan mikroorganisme (Buckman *at al*, 1982).

Penggunaan pupuk kandang adalah kunci keberhasilan program pemupukan pada sistem pertanian berkelanjutan. Secara bertahap pupuk kandang memang dapat menambah tersedianya unsur hara bagi tanaman dan memberi pengaruh yang positif terhadap sifat fisis dan kimiawi tanah juga mampu mendorong perkembangan jasad renik (Sutedjo, 2002)

Disarankan pemberian pupuk kandang untuk tanaman berkisar antara 10-20 ton per hektar. Salah satu alternatif pupuk kandang yang dapat digunakan adalah pupuk kandang kotoran sapi, kambing dan ayam (Kusuma, 2012).

Kotoran sapi merupakan bahan organik secara spesifik berperan meningkatkan ketersediaan fosfor dan unsur-unsur mikro, mengurangi pengaruh buruk dari aluminium, menyediakan karbondioksida pada kanopi tanaman, terutama pada tanaman dengan kanopi lebat, dimana sirkulasi udara terbatas, kotoran sapi banyak mengandung hara yang dibutuhkan oleh tanaman seperti N, P, K, Ca, Mg, S dan B (Buckman *at al*, 1982).

Kotoran ayam bermanfaat dalam proses mineralisasi akan melepaskan hara dengan lengkap (N, P, K, Ca, Mg, S serta hara mikro), serta dapat meningkatkan kandungan nutrisi tanah. Selain itu kotoran ayam juga dapat memperbaiki sifat fisik dan kimia tanah, memperbaiki struktur tanah, tanah menjadi ringan untuk diolah, meningkatkan daya tahan air, permeabilitas tanah menjadi lebih baik, serta meningkatkan kapasitas pertukaran kation, sehingga mampu mengikat kation menjadi tinggi. Tetapi bila dipupuk dengan dosis tinggi, hara tanaman tidak mudah tercuci (Anonim, 2010).

Burung puyuh berada dalam satu kelompok ternak unggas (*poultry*) dengan ayam petelur dan ayam pedaging. Dari aspek biologisnya pada kelompok hewan ini terdapat beberapa kesamaan baik pola hidup maupun cara budidayanya sebagai komoditas usaha di bidang peternakan, demikian juga halnya dalam permasalahan dampak limbahnya terhadap lingkungan (Yuwanto, 2004)

Berdasarkan permasalahan diatas maka perlu dilakukan penelitian untuk membandingkan antara tiga jenis pupuk kandang, yaitu feses sapi, ayam dan puyuh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tiga macam jenis pupuk kandang yaitu feses sapi, ayam, dan puyuh pada lahan kering dataran rendah. Olehnya itu, penelitian ini mengenai pengaruh ketiga jenis pupuk tersebut di atas terhadap pertumbuhan kangkung dilahan kering dataran rendah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas maka dilakukanlah penelitian agar penggunaan pupuk anorganik yang dapat merusak tanah dapat digantikan oleh pupuk organik yang berasal dari pupuk kandang yang ramah lingkungan maka di buatlah pertanyaan penelitian yaitu pupuk manakah yang terbaik diantara ketiga pupuk Kandang tersebut terhadap pertumbuhan kangkung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pupuk kandang yang terbaik digunakan untuk penanaman kangkung cabut.

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan bacaan untuk sektor pertanian dan peternakan serta referensi bagi mahasiswa lainnya terutama yang akan meneliti judul ini selanjutnya. Mengetahui pupuk kandang yang terbaik digunakan untuk penanaman kangkung cabut.

E. Devinisi Operasional

1. Pupuk merupakan suatu bahan yang dimasukkan ke dalam tanah dengan maksud menambah kesuburan (persediaan hara) dalam tanah.
2. Pupuk anorganik adalah pupuk yang dibuat oleh pabrik-pabrik pupuk dengan meramu bahan-bahan kimia anorganik berkadar hara tinggi.
3. Pupuk organik adalah pupuk yang tersusun dari materi makhluk hidup, seperti pelapukan sisa-sisa tanaman, hewan, dan manusia.
4. Residu adalah ampas, sisa pengendapan dari sebuah zat tertentu yang mengalami pemisahan kepekatkan, dimana zat tersebut tertinggal dan tidak larut sebagaimana bagian lainnya yang bias hilang (larut) secara keseluruhan.
5. Unsur hara adalah beberapa nutrisi yang sangat penting bagi tanaman.
6. Dataran rendah adalah hamparan luas tanah dengan tingkat ketinggian yang diukur dari permukaan laut adalah relatif rendah (sampai dengan 200 m dpl).
7. Jasad renik atau mikro organisme adalah makhluk hidup yang terdiri dari satu atau beberapa kumpulan sel dengan ukuran beberapa mikron (1 mikron = 0,001 mm).
8. Kanopi tanaman adalah bagian luar dari tanaman tersebut yang menjadi pelindung atau penutup (kulit tanaman).
9. Permeabilitas tanah adalah kecepatan air merembes ke dalam tanah ke arah horizontal dan vertikal melalui pori-pori tanah atau pula dapat diartikan dengan kecepatan tanah meresapkan atau meloloskan air dalam keadaan jenuh.
10. Kation adalah ion bermuatan positif yang terbentuk ketika sebuah atom kehilangan satu atau lebih elektron selama reaksi kimia.

11. Konversi adalah conversion yaitu proses perubahan dari sistem atau jenis instrumen tertentu menjadi sistem atau instrumen lain.
12. *Xenobiotik* adalah zat asing yang masuk dalam tubuh manusia. Contohnya: obat-obatan, insektisida, zat kimia tambahan pada makanan (pemanis, pewarna, pengawet) dan zat karsinogen lainnya.

F. Kajian terdahulu (Penelitian Terdahulu)

Sulistiyowati dan Susanti (2013) dalam penelitiannya dengan judul “Pengaruh macam Dan Dosis Pupuk Kandang Terhadap Pertumbuhan Dan Hasil Tanaman Petsai (*Brassica chinensis* L.) ” Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) factorial dengan 3 kali ulangan. Adapun perlakuan terdiri dari 2 (dua) factor yaitu Faktor 1 adalah jenis pupuk kandang (organik) yang terdiri dari 3 (tiga) taraf yaitu : K1 = kotoran sapi, K2 = kotoran kambing, K3 = kotoran ayam. Sedangkan faktor 2 adalah penggunaan dosis pupuk kandang (organik) yang terdiri dari 4 (empat) taraf yaitu: D0 = tanpa dosis pupuk kandang, D1= 2,5 kg/polybag, D2= 5 kg/polybag, D3= 7,5 kg/polybag. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlakuan macam pupuk kandang kotoran ayam (K3) memberikan rerata tertinggi terhadap panjang tanaman.

Budiono (2009) dalam penelitiannya dengan judul “Pengaruh pemberian pupuk organik dan terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kangkung darat ” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian pupuk organik dan N (Urea) terhadap pertumbuhan dan hasil kangkung darat. Penelitian dilaksanakan mulai bulan Mei sampai Juni 2009 di Kebun Penelitian Banguntapan

Fakultas Pertanian, Universitas Gadjah Mada, menggunakan Rancangan Split plot diulang tiga kali. Petak utama, (N0) tanpa pemberian pupuk Urea (N1) diberi pupuk Urea 100 kg/ha. Anak petak, (P0) tanpa pupuk organik, (P1) bokhasi 20 t/ha dan (P2) pukan kambing 20 t/ha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pupuk N (Urea) berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman kangkung darat, (2) dosis pupuk organik 20 ton per hektar tidak dapat mensubstitusi kebutuhan N untuk pertumbuhan tanaman kangkung (3) Pemupukan 100 kg Urea per ha dapat meningkatkan produksi sebesar 110,9% dibandingkan tanpa pemupukan N.

Utami dan Ulfah Rachmawati (2016) dalam penelitiannya dengan judul “Pengaruh pemberian pupuk organik pada media tanah yang mengandung timbal (pb) terhadap pertumbuhan kangkung darat (*ipomoea reptans* POIR)”. Penelitian dilakukan secara Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan perlakuan pemberian pupuk organik dengan dosis 0 gram, 50 gram, 100 gram, 150 gram, 200 gram, dan 250 gram dalam 2 kg tanah dari TPA Piyungan, Bantul. Setiap perlakuan diulang 4 kali dan dilakukan selama 4 minggu. Pengamatan meliputi tinggi tanaman, jumlah daun, panjang daun, panjang akar, dan berat basah tanaman. Pada minggu ke-4, dilakukan pengukuran kadar timbal (Pb) dalam daun. Dilakukan uji ANOVA dan BNT 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian pupuk organik dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman kangkung darat. Dosis yang paling efektif untuk pertumbuhan tanaman kangkung darat adalah 200 gram dalam 2 kg tanah. Pemberian pupuk organik tidak dapat menurunkan kandungan Pb dalam tanaman kangkung darat.

Edi (2014) dalam penelitiannya dengan judul “Pengaruh pemberian pupuk organik terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kangkung darat (*ipomea reptans* POIR)” Penelitian menggunakan Rancangan Acak Kelompok, menguji kombinasi perlakuan pupuk organik dan tanah, yaitu: (A) tanah 100% (kontrol), (B) tanah 75% tambah pupuk organik 25%, (C) tanah 50% tambah pupuk organik 50% dan (D) tanah 25% tambah pupuk organik 75%. Masing- masing perlakuan diulang 8 (delapan) kali dengan jumlah polybag 32 buah. Tanah yang digunakan berasal dari lahan petani, yang telah seringkali digunakan untuk penanaman beberapa jenis sayuran di Paal Merah Kota Jambi, sedangkan pupuk organik diperoleh dari hasil olahan kelompok tani Paal Merah Kota Jambi dengan bahan dasar kotoran sapi yang diinkubasi dengan EM-4 dan ditambahkan sisa tanaman sayuran dengan hasil pupuk organik berperan dalam pertumbuhan dan produksi tanaman kangkung, perlakuan B (tanah 75% tambah pupuk organik 25%) dan C (tanah 50% tambah pupuk organik 50%) dapat memberikan pertumbuhan dan hasil tanaman kangkung yang maksimal berbeda sangat nyata dengan perlakuan A yang ditanam sebagai kontrol.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerusakan lahan

Kerusakan tanah secara garis besar dapat digolongkan menjadi tiga kelompok utama, yaitu kerusakan sifat kimia, fisika dan biologi tanah. Kerusakan kimia tanah dapat terjadi karena proses pemasaman tanah, akumulasi garam-garam (*salinisasi*), tercemar logam berat, dan tercemar senyawa-senyawa organik dan *xenobiotik* seperti pestisida atau tumpahan minyak bumi (Djajakirana, 2001).

Aktivitas pertanian semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk. Sementara lahan pertanian produktif semakin sempit. Menurut data kepemilikan lahan garapan per KK (kepala keluarga) adalah 0,3 ha. Disamping itu lahan pertanian, keberadaannya sudah di kelilingi berbagai infrastruktur termasuk pemukiman, industri, dan fasilitas umum lainnya. Dalam keadaan demikian lahan pertanian sangat terancam produktivitasnya. Kualitas tanah menurun menyebabkan produksi tanaman menurun. Hal ini karena lahan pertanian sudah terkontaminasi oleh bahan tercemar (Deddy dkk, 2013)

Sumber pencemaran pada lahan pertanian dapat digolongkan ke dalam kegiatan non pertanian dan pertanian. Untuk kegiatan non pertanian termasuk industri, kegiatan penambangan serta rumah tangga. Pencemaran umumnya berasal dari limbah industri, penambangan, rumah tangga. Sedangkan dari kegiatan pertanian berupa penggunaan pupuk, baik pupuk kandang atau kimia dan pestisida. Sumber bahan yang mencemari dan terkontaminasi dalam tanah berasal

dari: pestisida, pupuk anorganik, pupuk organik, air limbah pabrik, sisa/limbah pertambangan, dan udara buangan industri termasuk debu dan emisi (Wuana and Okieimen, 2011).

Berbagai sumber dan penyebab pencemaran yang dapat mengakibatkan mundurnya kualitas tanah di antaranya penggunaan bahan-bahan agrokimia, limbah industri, kegiatan pertambangan dan limbah rumah tangga. Dengan mengetahui sumber dan penyebab pencemaran terutama yang terjadi pada lahan pertanian, maka upaya pencegahan dan penanggulangannya dapat diterapkan secara lebih tepat dan terarah (Charisma, 2014)

Umumnya tanaman tidak bisa menyerap 100% pupuk kimia. Selalu akan ada residu atau sisanya. Sisa-sisa pupuk kimia yang tertinggal di dalam tanah ini, bila telah terkena air akan mengikat tanah seperti lem/semen. Setelah kering, tanah akan lengket satu dengan lain (alias tidak gembur lagi), dan keras. Selain keras, tanah juga menjadi masam. Kondisi ini membuat organisme-organisme pembentuk unsur hara (organisme penyubur tanah) menjadi mati atau berkurang populasinya. Beberapa binatang yang menggemburkan tanah seperti cacing tidak mampu hidup di kawasan tersebut dan kehilangan unsur alamiahnya. Bila ini terjadi, maka tanah tidak bisa menyediakan makanan secara mandiri lagi, dan akhirnya menjadi sangat tergantung pada pupuk tambahan, khususnya pupuk kimia (Charisma, 2014)

Terjadinya pemasaman tanah dapat diakibatkan penggunaan pupuk nitrogen buatan secara terus menerus dalam jumlah besar. Kerusakan tanah secara fisik dapat diakibatkan karena kerusakan struktur tanah yang dapat menimbulkan

pemadatan tanah. Kerusakan struktur tanah ini dapat terjadi akibat pengolahan tanah yang salah atau penggunaan pupuk kimia secara terus menerus. Kerusakan biologi ditandai oleh penyusutan populasi maupun berkurangnya biodiversitas organisme tanah, dan terjadi biasanya bukan kerusakan sendiri, melainkan akibat dari kerusakan lain (fisik dan atau kimia). Contohnya pada penggunaan pupuk nitrogen (dalam bentuk ammonium sulfat dan *sulfur coated urea*) yang terus menerus selama 20 tahun dapat menyebabkan pemasaman tanah sehingga populasi cacing tanah akan turun dengan drastis (Lal, 1995).

Kehilangan unsur hara umumnya terjadi pada praktek pertanian di lahan yang miskin atau kurang subur tanpa dibarengi dengan pemberian pupuk yang memadai, sehingga terjadi ketidak seimbangan antara input bahan organik dengan kehilangan yang terjadi atau terbawa saat panen. Untuk mencukupi kebutuhan unsur hara bagi tanaman dapat dilakukan dengan penambahan pupuk, baik organik maupun anorganik. Pupuk anorganik dapat menyediakan hara dengan cepat, namun apabila hal ini dilakukan terus menerus akan menimbulkan kerusakan tanah. Hal ini tentu saja tidak menguntungkan bagi pertanian yang berkelanjutan (Lal, 1995).

Menurut Lal (1995), pengelolaan tanah yang berkelanjutan berarti suatu upaya pemanfaatan tanah melalui pengendalian input dalam suatu proses budidaya untuk memperoleh produktivitas tinggi secara berkelanjutan, meningkatkan kualitas tanah, serta memperbaiki karakteristik lingkungan. Dengan demikian diharapkan kerusakan tanah dapat ditekan seminimal mungkin sampai batas yang dapat ditoleransi, sehingga sumberdaya tersebut dapat dipergunakan

secara lestari dan dapat diwariskan kepada generasi yang akan datang. Bahan organik tanah berpengaruh terhadap sifat-sifat fisik, kimia, maupun biologi tanah, antara lain sebagai berikut:

- 1) Berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap ketersediaan hara. Bahan organik secara langsung merupakan sumber hara N, P, S, unsur mikro maupun unsur hara esensial lainnya. Secara tidak langsung bahan organik membantu menyediakan unsur hara N melalui fiksasi N_2 dengan cara menyediakan energi bagi bakteri penambat N_2 , membebaskan fosfat yang difiksasi secara kimiawi maupun biologi dan menyebabkan pengkhelatan unsur mikro sehingga tidak mudah hilang dari zona perakaran.
- 2) Membentuk agregat tanah yang lebih baik dan memantapkan agregat yang telah terbentuk sehingga aerasi, permeabilitas dan infiltrasi menjadi lebih baik. Akibatnya adalah daya tahan tanah terhadap erosi akan meningkat.
- 3) Meningkatkan retensi air yang dibutuhkan bagi pertumbuhan tanaman.
- 4) Meningkatkan retensi unsur hara melalui peningkatan muatan di dalam tanah.
- 5) Mengimmobilisasi senyawa antropogenik maupun logam berat yang masuk ke dalam tanah
- 6) Meningkatkan kapasitas sangga tanah
- 7) Meningkatkan suhu tanah
- 8) Mensuplai energi bagi organisme tanah
- 9) Meningkatkan organisme *saprotrof* dan menekan organisme parasit bagi tanaman.

Berbagai aspek tersebut, jika kandungan bahan organik tanah cukup, maka kerusakan tanah dapat diminimalkan, bahkan dapat dihindari. Jumlah bahan organik di dalam tanah dapat berkurang hingga 35% untuk tanah yang ditanami secara terus menerus dibandingkan dengan tanah yang belum ditanami atau belum dijamah (Brady, 1990). Untuk mempertahankan kandungan bahan organik tanah agar tidak menurun, diperlukan minimal 8-9 ton per ha bahan organik tiap tahunnya (Young, 1989).

Menurut Hairah dkk (2000), beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memperoleh bahan organik antara lain

- 1) Pengembalian sisa panen
- 2) Pemberian pupuk kandang
- 3) Pemberian pupuk hijau (serasah/sisa tanaman).

Bahan organik yang berasal dari sisa tanaman mengandung bermacam-macam unsur hara yang dapat dimanfaatkan kembali oleh tanaman jika telah mengalami dekomposisi dan mineralisasi. Sisa tanaman ini memiliki kandungan unsur hara yang berbeda kualitasnya tergantung pada tingkat kemudahan dekomposisi serta mineralisasinya. Kompos merupakan hasil dekomposisi alami dari bahan organik oleh mikroorganisme aerob. Kompos merupakan campuran pupuk dari bahan organik yang berasal dari tanaman atau hewan atau campuran keduanya yang telah melapuk sebagian dan dapat berisi senyawa-senyawa lain seperti abu, kapur dan senyawa kimia lainnya. Kompos merupakan inti dan dasar terpenting dari berkebun dan bertani secara alami, serta merupakan jantung dari konsep pertanian organik (Djajakirana, 2001).

B. Pemupukan

Pertanian merupakan kegiatan besar pertama manusia yang mempengaruhi tanah. Melalui siklus hidup tanaman dapat tumbuh dengan hara makro (N, P, K, S, Ca, dan Mg) dan mikro. Pada beberapa tanah terjadi kekurangan logam berat yang penting seperti Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, dan Zn untuk pertumbuhan tanaman yang normal. Untuk itu pemberiannya dapat diberikan melalui tanah atau daun. Sebagai contoh tanaman sereal ditanam pada tanah miskin Cu, sehingga perlu ditambahkan Cu, begitu juga bila kekurangan Mn. Sejumlah besar pupuk N, P, dan K diberikan secara teratur ke dalam tanah pada sistem pertanian intensif dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman. Senyawa-senyawa yang digunakan pada pupuk tersebut mengandung logam berat (misalnya Cd dan Pb). Logam berat tersebut dapat meningkat di dalam tanah sejalan dengan peningkatan penggunaan pupuk. Logam, seperti Cd dan Pb, diketahui tidak memiliki aktivitas/fungsi fisiologis. Aplikasi pupuk fosfat tertentu secara tidak sengaja menambahkan Cd dan elemen lainnya yang berpotensi beracun ke dalam tanah, seperti F, Hg, dan Pb (Raven *et al*, 1998).

Adapun menurut Nur (2011) menyatakan bahwa peranan unsur-unsur hara dalam pertumbuhan tanaman dapat diuraikan secara ringkas seperti dibawah ini.

1) Nitrogen, peranannya adalah:

- a) Merangsang pertumbuhan vegetatif yaitu menambah tinggi tanaman dan merangsang tumbuhnya anak-anak,

- b) Membuat tanaman menjadi lebih hijau karena banyak mengandung butir-butir hijau daun yang penting dalam fotosintesa.
 - c) Merupakan bahan penyusun klorofil daun, proteina, dan lemak. Tetapi bila diberikan N terlalu banyak ke dalam tanah dapat menghambat pembungaan dan pemuahan.
- 2) Fosfor, peranannya adalah:
- a) Memacu pertumbuhan akar dan pembentukan system perakaran yang baik dari benih dan tanaman muda,
 - b) Mempercepat pembungaan dan pemasakan buah, biji atau gabah,
 - c) Memperbesar persentase pembentukan bunga menjadi buah atau biji.
 - d) Sebagai bahan penyusun inti sel, lemak dan proteina.
- 3) Kalium, peranannya adalah:
- a) Memperlancar fotosintesa,
 - b) Membantu pembentukan proteina dan karbohidrat,
 - c) Sebagai katalisator dalam transformasi tepung, gula dan lemak tanaman,
 - d) Mengeraskan jerami dan bagian kayu dari tanaman,
 - e) Meningkatkan kualitas hasil yang berupa bunga dan buah (rasa dan warnanya),
 - f) Meningkatkan resistensi tanaman terhadap gangguan hama, penyakit dan kekeringan,
 - g) Pada tanaman, unsur K terkumpul pada titik tumbuh dan berperan mempercepat pertumbuhan jaringan meristematik.

- 4) Magnesium, peranannya adalah:
- Merupakan bahan penyusun khlorofil,
 - Mengaktifkan enzim yang berhubungan dengan metabolisme karbohidrat,
 - Dapat menaikkan kadar minyak pada berbagai tanaman penghasil minyak.
- 5) Kalsium, peranannya adalah:
- Merangsang pembentukan bulu-bulu akar,
 - Mengeraskan jerami dan bagian kayu tanaman,
 - Merangsang pembentukan biji-bijian.
- 6) Belerang, peranannya adalah:
- Sebagai penyusun utama ion sulfat,
 - Menambah kandungan protein dan vitamin,
 - Membantu pembentukan bintil-bintil akar pada tanaman kacang (leguminosae),
 - Membantu pembentukan butir-butir hijau daun sehingga warna daun menjadi lebih hijau.
- 7) Chlor, peranannya adalah:
- Meninggikan kuantitas dan kualitas tanaman, seperti kapas, gandum, kentang, kubis, wortel dan tomat. Tetapi pada tembakau berakibat menurunkan kualitas, yaitu menjadi rendahnya daya baker.
- 8) Besi, peranannya adalah:
- Terutama sangat penting pada pembentukan klorofil.

9) Mangan, peranannya adalah:

- a) Penting dalam menyusun klorofil,
- b) Membantu proses fotosintesa,
- c) Merangsang perkecambahan biji,
- d) Merangsang pemasakan buah.

10) Tembaga dan Seng, peranannya adalah:

- a) Penting dalam pengaturan system enzim tanaman dan dalam pembentukan klorofil. Kedua unsur hara ini sangat diperlukan pada tanah alkalis dan tanah organik.

11) Borium, peranannya adalah:

- a) Meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil sayur-sayuran dan buah-buahan,
- b) Penting dalam usaha peningkatan produksi biji-bijian tanaman leguminosa,
- c) Sangat diperlukan pada tanah-tanah organik.

12) Molibdenium, peranannya adalah:

- a) Penting dalam proses fiksasi N,
- b) Sangat penting untuk tanaman leguminosa, jeruk, dan sayur-sayuran.

1. Pupuk Organik

Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri atas bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik yang berperan dalam memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Saat ini banyak masyarakat yang mengkonsumsi sayuran dan buah terutama komoditi segar yang bebas bahan kimia. Masyarakat lebih suka membeli sayuran

dan buah yang berlubang karena hama penyakit dari pada sayuran dan buah segar yang mulus tetapi banyak disemprot bahan kimia. Komoditas tanaman kangkung termasuk salah satu jenis sayuran dengan permintaan besar baik di kota maupun di pedesaan. Pada saat ini konsumen mulai menginginkan jenis kangkung yang bebas residu kimia dan diproduksi dengan sistem yang ramah lingkungan terutama konsumen tingkat ekonomi menengah keatas. Melihat kecenderungan ini, salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam bidang pertanian adalah mengembangkan pertanian dengan system pertanian yang tidak tergantung pada input luar yang besar. Pengkajian kembali teknologi yang tidak hanya berorientasi pada penggunaan energi secara maksimal dan intensif akan tetapi juga berusaha Menerapkan *Low Input Sustainable Agriculture (LISA)*. Untuk Indonesia dan negara berkembang lainnya, dua tujuan harus tetap seimbang yaitu peningkatan produktivitas dan produksi disatu pihak serta pencapaian keberlanjutan sistem produksi, peningkatan kesejahteraan petani dan pelestarian lingkungan (Safuan dkk, 2002)

Bahan dasar pupuk organik baik dalam bentuk kompos maupun pupuk kandang dapat berasal dari limbah pertanian, seperti jerami dan sekam padi, kulit kacang tanah, ampas tebu, batang jagung dan bahan hijauan lainnya. Kotoran ternak yang banyak dimanfaatkan adalah kotoran sapi, kerbau, kambing dan ayam. Beragamnya sumber pupuk organik tentunya beragam pula komposisi kandungan hara dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan tanaman. Oleh karena itu perlu dikaji pengaruh dari sumber bahan organik terhadap pertumbuhan dan hasil salah satunya terhadap tanaman kangkung darat. Kajian ini bertujuan untuk

mengetahui pengaruh pemberian pupuk organik dan N (Urea) terhadap pertumbuhan dan hasil kangkung darat (Tala'ohu dan Irawan, 2008)

Penggunaan kompos sangat baik karena dapat memberikan manfaat baik bagi tanah maupun tanaman. Kompos dapat menggemburkan tanah, memperbaiki struktur dan porositas tanah, serta komposisi mikroorganisme tanah, daya ikat tanah terhadap air meningkatkan, menyimpan air tanah lebih lama, dan mencegah lapisan kering pada tanah. Kompos juga menyediakan unsur hara mikro bagi tanaman, memudahkan pertumbuhan akar tanaman, mencegah beberapa penyakit akar, dapat meningkatkan efisiensi pemakaian pupuk kimia. Karena keunggulan tersebut, kompos menjadi salah satu alternatif pengganti pupuk kimia karena harganya murah, berkualitas dan ramah lingkungan. Penggunaan kompos pada budidaya tanaman pangan termasuk padi dapat meningkatkan produksi dan produktivitas (Tala'ohu dan Irawan, 2008)

Menurut Asep (2013), kelebihan dan kekurangan pupuk organik adalah:

1. Kelebihan

Pupuk organik mengandung unsur hara yang lengkap, baik unsur hara makro maupun unsur hara mikro. Kondisi ini tidak dimiliki oleh pupuk anorganik. Pupuk organik mengandung asam-asam organik, antara lain asam *humic*, asam *fulvic*, hormon dan *enzym* yang tidak terdapat dalam pupuk anorganik yang sangat berguna baik bagi tanaman maupun lingkungan dan mikroorganisme.

Pupuk organik mengandung unsur makro dan mikroorganisme tanah yang mempunyai pengaruh yang sangat baik terhadap perbaikan sifat fisik tanah dan terutama sifat biologis tanah.

- a) Memperbaiki dan menjaga struktur tanah.
- b) Menjadi penyangga pH tanah.
- c) Membantu menjaga kelembaban tanah
- d) Aman dipakai dalam jumlah besar dan berlebih sekalipun
- e) Tidak merusak lingkungan.

2. Kekurangan

- a) Kandungan unsur hara jumlahnya kecil, sehingga jumlah pupuk yang diberikan harus relatif banyak bila dibandingkan dengan pupuk anorganik.
- b) Karena jumlahnya banyak, menyebabkan memerlukan tambahan biaya operasional untuk pengangkutan dan implementasinya.
- c) Dalam jangka pendek, apalagi untuk tanah-tanah yang sudah miskin unsur hara, pemberian pupuk organik yang membutuhkan jumlah besar sehingga menjadi beban biaya bagi petani. Sementara itu reaksi atau respon tanaman terhadap pemberian pupuk organik tidak sespektakuler pemberian pupuk buatan.

Senyawa organik dapat mencegah pergerakan ion logam berat bergerak masuk ke dalam sistem jaringan tanaman. Logam berat dalam bentuk terlarut yang membahayakan dapat membentuk kompleks dengan bahan organik dalam tanah menjadi logam yang tidak larut. Logam yang diikat menjadi kompleks organik ini relatif tidak tersedia bagi tanaman. Hal tersebut tidak berlaku untuk tanaman

hiperakumulator. Tumbuhan *hiperakumulator* memiliki kemampuan untuk melarutkan unsur logam pada *rizosfer* dan menyerap logam bahkan dari fraksi tanah yang tidak bergerak. Tumbuhan *hiperakumulator* memiliki kemampuan lebih tinggi dalam mengubah logam pada zona perakaran menjadi bentuk yang tersedia (Darmono, 2008).

2. Pupuk Anorganik

Pupuk anorganik (Kimia) adalah pupuk yang dibuat oleh pabrik-pabrik pupuk dengan meramu bahan-bahan kimia anorganik berkadar hara tinggi. Pupuk anorganik telah memberikan keuntungan yang nyata pada produksi pangan dan ketahanan pangan dunia dalam jangka pendek, namun ada keprihatinan yang meluas terhadap keberlanjutan penggunaan teknologi ini untuk jangka panjang agar dapat terus memberi makan seluruh populasi dunia yang terus meningkat. Penggunaan pupuk anorganik secara terus menerus akan menyebabkan perusakan tanah pertanian, antara lain sebagai akibat dari hilangnya bahan organik, pemadatan tanah, peningkatan salinitas, dan pencucian nitrat anorganik (Hatta, 2013).

Dampak dari penggunaan pupuk anorganik menghasilkan peningkatan produktivitas tanaman yang cukup tinggi. Namun penggunaan pupuk anorganik dalam jangka yang relatif lama umumnya berakibat buruk pada kondisi tanah. Tanah menjadi cepat mengeras, kurang mampu menyimpan air dan cepat menjadi asam yang pada akhirnya akan menurunkan produktivitas tanaman (Parman, 2007).

Menurut Musnamar (2013), Pengembalian bahan organik ke dalam tanah merupakan hal yang mutlak dilakukan untuk mempertahankan lahan pertanian agar tetap produktif, dua alasan yang selama ini dikemukakan para ahli adalah:

- 1) Pengolahan tanah yang dangkal selama bertahun-tahun mengakibatkan menurunnya kandungan C dan N organik.
- 2) Penggunaan pupuk seperti urea, KCL, dan TSP telah melampaui batas efisiensi teknis dan ekonomis sehingga efisiensi dan pendapatan bersih yang diterima petani dari setiap unit pupuk yang digunakan semakin menurun. Kedua alasan tersebut memberikan dampak yang buruk bagi pertanian di masa mendatang jika tidak dimulai tindakan antisipasinya.

Penggunaan pupuk anorganik menyebabkan kandungan unsur-unsur hara dalam tanah meningkat dan hal tersebut dapat membantu pertumbuhan tanaman padi dengan cepat serta meningkatkan hasil produksi pertanian. Produktivitas lahan pertanian yang meningkat tersebut hanya akan berlangsung dalam waktu yang tidak lama, karena penggunaan pupuk anorganik terus-menerus akan menyebabkan perubahan struktur tanah, pemadatan, kandungan unsur hara dalam tanah menurun, dan pencemaran lingkungan. Salah satu pengaruh penggunaan pupuk anorganik pada usaha pertanian adalah akumulasi residu unsur-unsur kimia seperti N, P, dan K dalam tanah akibat dari pemakaian pupuk anorganik yang berlebihan dan terus-menerus. Sekitar 50% nitrogen, 40%-75% potasium, dan 5%-25% fosfat mengendap di lahan pertanian, pada tubuh perairan, dan air tanah (Solihin, 2008).

Senyawa-senyawa yang digunakan pada pupuk tersebut mengandung logam berat (misalnya Cd dan Pb). Logam berat tersebut dapat meningkat didalam tanah sejalan dengan peningkatan penggunaan pupuk. Logam, seperti Cd dan Pb, diketahui tidak memiliki aktivitas/fungsi fisiologis. Aplikasi pupuk fosfat tertentu secara tidak sengaja menambahkan Cd dan elemen lainnya yang berpotensi beracun ke dalam tanah, seperti F, Hg, dan Pb (Raven *et al*, 1998).

Menurut Asep (2013), kelebihan dan kekurangan pupuk anorganik adalah:

1. Kelebihan penggunaan pupuk anorganik/kimia
 - a) Unsur yang terkandung akan cepat terurai
 - b) Lebih cepat terserap oleh tumbuhan
 - c) Pemupukan lebih mudah dilakukan
 - d) Pemupukan intensif untuk tumbuhan lebih mudah, karena pupuk kimia telah dikonsentrasikan pada jenis unsur tertentu.
2. Penggunaan pupuk anorganik/kimia
 - a) Karena cepat terurai di alam, sehingga untuk memperoleh hasil pemupukan yang efisien dan optimal harus digunakan dengan dosis yang tepat
 - b) Waktu pemupukan harus sering dilakukan karena pupuk anorganik/kimia tidak dapat tersimpan dalam median tanah.
 - c) Ketersediaan pupuk sangat tergantung pada pihak ketiga yaitu pabrikan dan distributor

- d) Harga relatif tinggi karena setiap tahunnya pemerintah kadang mengurangi jumlah subsidi
- e) Dapat mengakibatkan tidak seimbangnya unsur hara dalam tanah karena pemupukan tidak seimbang
- f) Dalam pemakaian dalam jangka waktu lama akan menurunkan PH tanah
- g) Dalam pemakaian dalam jangka waktu tertentu akan berakibat tanah menjadi kurus.

C. Sumber pupuk Organik

Pupuk organik adalah nama kolektif untuk semua jenis bahan organik asal tanaman dan hewan yang dapat dirombak menjadi hara tersedia bagi tanaman. Dalam Peraturan menteri pertanian No.2/Pert/Hk.060/2/2006, tentang pupuk organik dan pembenah tanah, dikemukakan bahwa pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri atas bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan mensuplai bahan organik untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Definisi tersebut menunjukkan bahwa pupuk organik lebih ditujukan kepada kandungan C-organik atau bahan organik dari pada kadar haranya; nilai C-organik itulah yang menjadi pembeda dengan pupuk anorganik. Bila C-organik rendah dan tidak masuk dalam ketentuan pupuk organik maka diklasifikasikan sebagai pembenah tanah organik. Pembenah tanah atau soil ameliorant menurut SK Menri pertanian adalah bahan-bahan sintesis atau alami, organik atau mineral (Nafiun, 2013).

1. Pupuk organik dari hewan

Pupuk organik yang berasal dari hewan dapat di bagi menjadi yaitu: pupuk kompos dan pupuk kandang

1. Pupuk Kompos

Kompos adalah hasil pembusukan sisa-sisa tanaman yang disebabkan oleh aktivitas mikroorganisme pengurai. Kualitas kompos sangat ditentukan oleh besarnya perbandingan antara jumlah karbon dan nitrogen (C/N rasio). Jika C/N rasio tinggi, berarti bahan penyusun kompos belum terurai sempurna. Bahan kompos dengan C/N rasio tinggi akan terurai atau membusuk lebih lama dibandingkan dengan bahan ber-C/N rendah. Kualitas kompos dianggap baik jika memiliki C/N rasio antara 12-15% (Rinsema, 1993).

Bahan kompos seperti sekam, jerami padi, batang jagung, dan serbuk gergaji, memiliki C/N rasio antara 50-100. Daun segar memiliki C/N rasio 10-12. Proses pembuatan kompos akan menurunkan C/N rasio hingga menjadi 12-15. Tahapan proses pembuatan kompos sebagai berikut (Rinsema, 1993).

- a) Karbohidrat, protein, dan lilin (bahan dengan C/N rasio tinggi) diurai menjadi senyawa sederhana seperti NH_3 , CO_2 , H_2 , dan H_2O . Pada tahap ini, mikroorganisme pengurai menyerap unsur hara dari lingkungan sekitarnya untuk pertumbuhannya.
- b) Setelah perombakan selesai, mikroorganisme pengurai akan mati. Konsekuensinya, unsur hara penyusun tubuh mikroorganisme akan dilepaskan. Pada tahap ini C/N rasio menjadi lebih rendah karena banyak

karbon yang berubah menjadi CO₂ dan menguap ke udara. Namun, bertolak belakang dengan karbon, kandungan nitrogennya justru berlimpah.

- c) Jika C/N rasio telah mencapai angka 12-20 berarti unsur hara yang terikat pada humus telah dilepaskan melalui proses mineralisasi sehingga dapat digunakan oleh tanaman.

Pernyataan proses di atas dapat menjawab pertanyaan mengapa tanaman justru tampak seperti kekurangan unsur hara setelah diberikan kompos yang belum terurai sempurna. Sampai dengan proses penguraian sempurna, tanaman akan bersaing dengan mikroorganisme tanah untuk memperebutkan unsur hara. Oleh karena itu, disarankan untuk menambah pupuk buatan apabila bahan kompos yang belum terurai sempurna terpaksa digunakan (Rinsema, 1993).

Kandungan unsur hara kompos yaitu Nitrogen sebesar 0,1-0,6%, Fosfor 0,1-0,4%, Kalium 0,8-1,5%, dan Kalsium 0,8-1,5%. Ciri fisik kompos yang baik adalah berwarna coklat kehitaman, agak lembab, gembur, dan bahan pembentuknya sudah tidak tampak lagi. Kompos ibarat multivitamin untuk tanah pertanian. Kompos akan meningkatkan kesuburan tanah dan merangsang perakaran yang sehat. Kompos memperbaiki struktur tanah dengan meningkatkan kandungan bahan organik tanah dan akan meningkatkan kemampuan tanah untuk mempertahankan kandungan air tanah. Aktivitas mikroba tanah yang bermanfaat bagi tanaman akan meningkat dengan penambahan kompos. Aktivitas mikroba ini membantu tanaman untuk menyerap unsur hara dari tanah dan menghasilkan senyawa yang dapat merangsang pertumbuhan tanaman. Aktivitas

mikroba tanah juga diketahui dapat membantu tanaman menghadapi serangan penyakit (Djuarni dkk, 2006).

Tanaman yang dipupuk dengan kompos juga cenderung lebih baik kualitasnya daripada tanaman yang dipupuk dengan pupuk kimia, misal hasil panen lebih tahan disimpan, lebih berat, lebih segar, dan lebih enak. Kompos memiliki banyak manfaat bagi tanaman yaitu meningkatkan kesuburan tanah, memperbaiki struktur dan karakteristik tanah, meningkatkan kapasitas serap air tanah, meningkatkan aktivitas mikroba tanah, meningkatkan kualitas hasil panen (rasa, nilai gizi dan jumlah panen), menyediakan hormon dan vitamin bagi tanaman, menekan pertumbuhan/serangan penyakit pada tanaman, meningkatkan retensi/ketersediaan hara didalam tanah (Isroi, 2008).

2. Pupuk Kandang

Pupuk kandang adalah pupuk organik yang berasal dari kotoran ternak. Kualitas pupuk kandang sangat tergantung pada jenis ternak, kualitas pakan ternak, dan cara penampungan pupuk kandang. Penambahan pupuk kandang dapat meningkatkan kesuburan dan produksi pertanian. Hal ini disebabkan tanah lebih banyak menahan air sehingga unsur hara akan terlarut dan lebih mudah diserap oleh buluh akar. Sumber hara makro dan mikro dalam keadaan seimbang yang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Unsur mikro yang tidak terdapat pada pupuk lainnya bisa disediakan oleh pupuk kandang, misalnya S, Mn, Co, Br, dan lain-lain (Sarief, 1989).

Pupuk kandang yang berasal dari ayam atau unggas memiliki kandungan unsur hara yang lebih besar dari pada jenis ternak yang lain. Penyebabnya adalah kotoran padat pada unggas tercampur dengan kotoran cairnya. Umumnya, kandungan unsur hara pada urine selalu lebih tinggi dari pada kotoran padat (Harjowigeno, 1995).

Ciri-ciri pupuk kandang yang baik dapat dilihat secara fisik atau kimiawi. Ciri fisiknya yakni berwarna kehitaman, cukup kering, tidak mengandung dan tidak berbau menyengat. Ciri kimiawinya adalah C/N rasio kecil (bahan pembentuknya sudah tidak terlihat) dan temperaturnya relatif stabil (Novizan, 2002).

Menurut Novizan (2002), Efek dari kelebihan pupuk kandang akan menimbulkan pencemaran nitrat (NO_3) dan ammonia (NH_3) sehingga menyebabkan eutrofikasi (*eutropication*). Di samping itu sering pula tidak tersedia bagi tanaman, karena diserap oleh mikroorganisme untuk kebutuhan hidupnya. Keuntungan pemakaian pupuk kandang antara lain:

- a) Dapat memperbaiki kesuburan fisika tanah melalui perubahan struktur.
- b) Dapat memperbaiki kesuburan kimia tanah karena mengandung unsur N, P, K, Ca, Mg, dan Cl.
- c) Dapat meningkatkan kegiatan mikroorganisme tanah yang berarti meningkatkan kesuburan biologis.
- d) Dalam pelapukan sering mengeluarkan hormon yang merangsang pertumbuhan tanaman, seperti *auxin*, *gibberellin* dan *cytokinin*.

3. Pupuk organik dari Tanaman

Pupuk organik dari tanaman dapat dibedakan menjadi tiga bagian yaitu: pupuk hijau, pupuk humus dan pupuk daun.

1. Pupuk Hijau

Pupuk hijau adalah bagian dari tanaman yang masih hidup dan diberikan pada tanaman. Pupuk hijau terbuat dari tanaman atau komponen tanaman yang ditanamkan ke dalam tanah. Jenis tanaman yang banyak digunakan adalah dari *familia Leguminosae* atau kacang-kacangan dan jenis rumput-rumputan (rumput gajah). Jenis tersebut dapat menghasilkan bahan organik lebih banyak, daya serap haranya lebih besar dan mempunyai bintil akar yang membantu mengikat nitrogen dari udara (Isroi, 2008).

Menurut Isroi (2008), pupuk hijau memiliki tujuan dan keunggulan dalam penggunaannya. Tujuan pemupukan hijau adalah:

- a) Mempertinggi kandungan bahan organik dalam tanah, sebagai pengganti yang telah habis diserap oleh tanaman, selama periode pengolahan tanah.
- b) Menambah nitrogen apabila yang dijadikan pupuk hijau.
- c) Mengurangi erosi vertikal.
- d) Mengurangi penyakit akar pada kapas terhadap *phymatotrichum*.

Selain memiliki tujuan penggunaan pupuk hijau memiliki keuntungan antara lain:

- a) Mampu memperbaiki struktur dan tekstur tanah serta infiltrasi air.
- b) Mencegah adanya erosi.
- c) Dapat membantu mengendalikan hama dan penyakit.

d) Sangat bermanfaat pada daerah-daerah yang sulit dijangkau untuk suplai pupuk anorganik.

2. Pupuk humus

Humus adalah material organik yang berasal dari degradasi ataupun pelapukan daun-daunan dan ranting-ranting tanaman yang membusuk (mengalami dekomposisi) yang akhirnya mengubah humus menjadi (bunga tanah), dan kemudian menjadi tanah. Bahan baku untuk humus adalah dari daun ataupun ranting pohon yang berjatuhan, limbah pertanian dan peternakan, industri makanan, agroindustri, kulit kayu, serbuk gergaji (abu kayu), kepingan kayu, endapan kotoran, sampah rumah tangga, dan limbah-limbah padat perkotaan (Hadisuwinto, 2012).

Humus merupakan sumber makanan bagi tanaman, serta berperan baik bagi pembentukan dan menjaga struktur tanah. Senyawa humus juga berperan dalam pengikatan bahan kimia toksik dalam tanah dan air. Selain itu, humus dapat meningkatkan kapasitas kandungan air tanah, membantu dalam menahan pupuk anorganik larut air, dan mencegah penggerusan tanah. Kandungan utama dari kompos adalah humus. Humus merupakan penentu akhir dari kualitas kesuburan tanah, jadi penggunaan humus sama halnya dengan penggunaan kompos (Hadisuwinto, 2012).

3. Pupuk daun

Pupuk daun akan menjadikan tanaman lebih baik dan sehat. Pemberian pupuk daun diberikan melalui pencampuran pupuk dengan tanah agar diserap melalui akar. Menggunakan pupuk daun sebagai penambah unsur hara bagi

tanaman agar tumbuh lebih sehat dan kuat dan tumbuh lebih cepat sehingga mampu melawan hama dan penyakit. Pupuk daun biasanya dibuat dari bahan yang mengandung hara yang diperlukan tanaman seperti besi, belerang, nitrogen dan kalium. Tanaman tersebut misalnya sejenis solanum nigrum/terung leuca. Pemberian hara tambahan ini pada tanaman akan membantunya tumbuh lebih kuat dan lebih sehat (Lingga dan Marsono, 2004).

D. Pupuk Organik dari ternak

Pupuk kandang ialah olahan kotoran hewan, biasanya ternak, yang diberikan pada lahan pertanian untuk memperbaiki kesuburan dan struktur tanah. Zat hara yang dikandung pupuk kandang tergantung dari sumber kotoran bahan bakunya. Pupuk kandang ternak besar kaya akan nitrogen, dan mineral logam, seperti magnesium, kalium, dan kalsium. Namun demikian, manfaat utama pupuk kandang adalah mempertahankan struktur fisik tanah sehingga akar dapat tumbuh secara baik. Oleh sebab itu pupuk kandang sangat baik digunakan dalam budidaya tanaman Kangkung darat karena pupuk kandang selain dapat memenuhi kebutuhan unsur hara juga dapat memperbaiki sifat fisik tanah yang akan mempermudah perkembangan Kangkung darat sehingga hasil dari Kangkung darat akan lebih besar. Kompos kotoran ternak merupakan kunci keberhasilan bagi petani lahan kering. Selain mudah didapat kotoran sapi juga relatif lebih murah apabila dibandingkan dengan harga pupuk an-organik yang beredar di pasaran. Hal ini mendorong para petani yang biasa menggunakan pupuk buatan beralih menggunakan pupuk organik (Wiskandar, 2002).

Pupuk kandang adalah pupuk yang berasal dari campuran kotoran-kotoran ternak, urine, serta sisa-sisa makanan ternak tersebut. Pupuk kandang ada yang berupa cair dan ada pula yang berupa padat, tiap jenis pupuk kandang memiliki kelebihan masing-masingnya. Setiap hewan akan menghasilkan kotoran dalam jumlah dan komposisi yang beragam. Kandungan hara pada pupuk kandang dapat dipengaruhi oleh jenis ternak, umur ternak, bentuk fisik ternak, pakan dan air (Pranata, 2010).

Feses ternak sebagai limbah ternak banyak mengandung unsur hara makro seperti Nitrogen (N), Fosfat (P_2O_5), Kalium (K_2O) dan Air (H_2O). Meskipun jumlahnya tidak banyak, dalam limbah ini juga terkandung unsur hara mikro diantaranya kalsium (Ca), magnesium (Mg), tembaga (Cu), mangan (Mn), dan Boron (Bo). Banyaknya kandungan unsur makro pada feses ternak membuat penggunaannya hanya dilakukan pada saat pemupukan dasar saja. Hal ini erat kaitannya dengan jumlah unsur makro yang dibutuhkan tanaman yang tidak boleh melebihi rasio (Anonim, 2010)

Kotoran hewan lebih sering dipilih sebagai bahan pembuat gas bio karena ketersediaannya sangat besar. Bahan ini memiliki keseimbangan nutrisi, mudah diencerkan dan relatif dapat diproses secara biologi. Selain itu, kotoran segar lebih mudah diproses dibandingkan dengan kotoran yang lama atau telah dikeringkan, disebabkan karena hilangnya substrat volatil solid selama waktu pengeringan (Fischer dan Krieg, 2000).

Tabel 1: Kandungan zat hara dari beberapa jenis kotoran hewan

Jenis ternak	Unsur Hara		
	N(nitrogen) %	P ₂ O ₅ (Difosforus pentaoksida) %	K ₂ O(Kalium Oksida) %
Sapi	0,10-0,96	0,64-1,15	0,45-1,00
Ayam	1,00-3,13	2,80-6,00	0,40-2,00
Puyuh	0,6-1,32	0,8-3,10	0,50-1,24

Sumber: Kartadisastra, 2001

1. Kotoran Sapi

Umumnya tujuan para peternak dalam beternak sapi adalah untuk mendapatkan daging sapi atau susu sapi. Selain menghasilkan daging atau susu, beternak sapi juga menghasilkan produk lain berupa kotoran. Menurut, ada tiga pilihan untuk memanfaatkan kotoran ternak yaitu: menggunakan kotoran ternak untuk pupuk, penghasil biogas, dan bahan pembuat bio arang. Zat-zat yang terkandung dalam kotoran ternak dapat dimanfaatkan kembali dengan menggunakan kotoran ternak sebagai pupuk kandang. Kandungan unsur hara dalam kotoran yang penting untuk tanaman adalah unsur nitrogen (N), fosfor (P), dan kalium (K). Kotoran ternak merupakan bahan organik dengan nilai C/N rendah. Oleh karena itu kotoran ternak dapat dicampur dengan limbah tanaman yang memiliki C/N yang tinggi untuk dijadikan kompos yang baik. Seekor sapi dapat menghasilkan kotoran antara 8-10 kg/harinya. Kotoran sapi akan menimbulkan masalah bila tidak dimanfaatkan dan ditangani dengan baik. Hal tersebut tentu tidak dapat dibiarkan begitu saja, karena selain mengganggu dan

mengotori lingkungan, juga sangat berpotensi untuk menimbulkan penyakit bagi masyarakat sekitarnya (Brady, 1990)

Kotoran sapi merupakan bahan organik yang secara spesifik berperan meningkatkan ketersediaan fosfor dan unsur-unsur mikro, mengurangi pengaruh buruk dari aluminium, menyediakan karbondioksida pada kanopi tanaman, terutama pada tanaman dengan kanopi lebat dimana sirkulasi udara terbatas. Kotoran sapi banyak mengandung hara yang dibutuhkan tanaman seperti nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, belerang dan boron (Brady, 1990).

2 Kotoran Ayam

Kotoran ayam merupakan salah satu limbah yang dihasilkan baik ayam petelur maupun ayam pedaging yang memiliki potensi yang besar sebagai pupuk organik. Komposisi feses sangat bervariasi tergantung pada sifat fisiologis ayam, ransum yang dimakan, lingkungan kandang termasuk suhu dan kelembaban. Feses ayam merupakan salah satu bahan organik yang berpengaruh terhadap sifat fisik, kimia dan pertumbuhan tanaman. feses ayam mempunyai kadar unsur hara dan bahan organik yang tinggi serta kadar air yang rendah. Setiap ekor ayam kurang lebih menghasilkan ekskreta per hari sebesar 6,6% dari bobot hidup (Taiganides, 1977).

Menurut Hardjowigeno (2003) pupuk kandang mengandung Nitrogen (N) tiga kali lebih besar dari pada pupuk kandang lain. Kotoran ayam memiliki kandungan unsur hara N 1%, P 0,80%, K 0,40% dan kadar air 55% (Lingga, 1986). Bakteri yang ditemukan pada kotoran ternak ayam antara lain *Lactobacillus achidophilus*, *Lactobacillus reuteri*, *Leuconostoc mensenteroides*

dan *Streptococcus thermophilus*, sebagian kecil terdapat *Actinomycetes* dan kapang. Penggunaan bahan organik kotoran ayam mempunyai beberapa keuntungan antara lain sebagai pemasok hara tanah dan meningkatkan retensi air (Raihan dkk, 2000).

Apabila kandungan air tanah meningkat, proses perombakan bahan organik akan banyak menghasilkan asam-asam organik. Anion dari asam organik dapat mendesak fosfat yang terikat oleh Fe dan Al sehingga fosfat dapat terlepas dan tersedia bagi tanaman. Penambahan kotoran ayam berpengaruh positif pada tanah masam berkadarnya bahan organik rendah karena pupuk organik mampu meningkatkan kadar P, K, Ca dan Mg tersedia. Beberapa hasil penelitian aplikasi pupuk kandang ayam selalu memberikan respon tanaman terbaik pada musim pertama. Hal ini terjadi karena pupuk kandang ayam yang lebih cepat terdekomposisi serta mempunyai kadar hara yang cukup pula jika dibandingkan dengan jumlah unit yang sama dengan pupuk kandang lainnya (Widiowati dkk, 2005).

4. Kotoran Puyuh

Salah satu alternatif pupuk kandang yang dapat digunakan adalah pupuk kandang kotoran burung puyuh. Kotoran yang di buang begitu saja pada tempat-tempat terbuka akan menyebabkan pencemaran lingkungan karena baunya lebih menyengat dari pada kotoran ayam atau unggas lainnya, namun demikian kotoran burung puyuh masih bisadimanfaatkan untuk dibuat pupuk yang sangat baik untuk tanaman sayuran dan tanaman hias (Listiyawati dan Roosptasari, 1992).

Kotoran burung puyuh baunya lebih menyengat dibandingkan kotoran ayam atau unggas lainnya, apalagi bila puyuh diberi pakan bekadar protein tinggi. Kotoran burung puyuh cukup baik untuk pupuk, karena ransum makanannya mengandung unsur hara makro (Ca, P, N, K dan CI) dan unsur hara mikro (Fe, Cu, Zn, Mn, Se, dan Mo) dalam jumlah cukup. Ransum buatan pabrik komposisinya terbukti baik, sehingga kotorannya pun bila dijadikan pupuk akan bermanfaat bagi tanaman karena mengandung unsur-unsur yang dibutuhkan tanaman (Listyawati dan Roospitasari, 1992).

E. Kangkung Cabut

Tanaman Kangkung Darat Di Klasifikasikan Sebagai Berikut:

Kingdom	: Plantea (tumbuhan)
Subkingdom	: Tracheobionta (berpembuluh)
Superdivisio	: Spermatophyta (menghasilkan biji)
Divisio	: Magnoliophyta (berbunga)
Kelas	: Magnoliapsida (berkeping dua / dikotil)
Sub kelas	: Asteridae
Ordo	: Solanales
Familia	: Convolvulaceae (suku kangkung – kangkungan)
Genus	: <i>Ipomea</i>
Spesies	: <i>Ipomea reptans</i> POIR

Kangkung merupakan tanaman yang dapat tumbuh lebih dari satu tahun. Tanaman kangkung memiliki sistem perakaran tunggang dan cabang-cabangnya akar menyebar kesemua arah, dapat menembus tanah sampai kedalaman 60

hingga 100 cm, dan melebar secara mendatar pada radius 150 cm atau lebih, terutama pada jenis kangkung air. Batang kangkung bulaT, berlubang dan berbuku-buku, banyak mengandung air (*herbacious*) dari buku-bukunya mudah sekali keluar akar. Memiliki percabangan yang banyak dan setelah tumbuh lama batangnya akan menjalar (Djuariah, 2007).

Kangkung memiliki tangkai daun melekat pada buku-buku batang dan di ketiak daunnya terdapat mata tunas yang dapat tumbuh menjadi percabangan baru. Bentuk daun umumnya runcing ataupun tumpul, permukaan daun sebelah atas berwarna hijau tua, dan permukaan daun bagian bawah berwarna hijau muda. Selama fase pertumbuhannya tanaman kangkung dapat berbunga, berbuah, dan berbiji terutama jenis kangkung darat. Bentuk bunga kangkung umumnya berbentuk “terompet” dan daun mahkota bunga berwarna putih atau merah lembayung (Maria, 2009).

Buah kangkung berbentuk bulat telur yang didalamnya berisi tiga butir biji. Bentuk buah kangkung seperti melekat dengan bijinya. Warna buah hitam jika sudah tua dan hijau ketika muda. Buah kangkung berukuran kecil sekitar 10 mm, dan umur buah kangkung tidak lama. Bentuk biji kangkung bersegi-segi atau tegak bulat. Berwarna cokelat atau kehitam-hitaman, dan termasuk biji berkeping dua. Pada jenis kangkung darat biji kangkung berfungsi sebagai alat perbanyakan tanaman secara generatif (Maria, 2009).

F. Kajian Islam Tentang Pupuk

Pada saat sekarang ini lahan pertanian semakin berkurang kesuburannya, hal tersebut hal tersebut dikarenakan penggunaan lahan dan pemakaian pupuk kimia yang terus menerus tanpa diikuti upaya pemuliahan kesuburannya. Selain itu penggunaan pupuk kimia akan menyebabkan tanah menjadi keras dan adanya indikasi proses pemiskinan atau pengurangan jenis unsur hara tanah (Lahuddin, 1998).

Dalam Ayat Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 41-42

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ﴿٤٢﴾

Terjemahnya.

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah: 'Lakukanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)". (Gofar dan Mu'thi, 2007)

Pada ayat diatas terdapat penegasan Allah bahwa berbagai kerusakan yang terjadi di daratan dan di lautan adalah akibat perbuatan manusia. Hal tersebut hendaknya disadari oleh manusia dan karenanya manusia harus segera menghentikan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan timbulnya kerusakan di daratan dan di lautan (Gofar dan Mu'thi, 2007).

Salah satu cara yang dapat mengembalikan kesuburan tanah ialah dengan menggunakan bahan-bahan organik ke dalam tanah. Seperti tahi dari ternak atau di sebut juga dengan feces, Pupuk organik merupakan bahan pembenah tanah yang paling baik dibanding bahan pembenah lainnya. Nilai pupuk yang dikandung pupuk organikpada umumnya rendah dan sangat bervariasi, misalkan unsur nitrogen (N), fosfor(P), dan kalium (K) tetapi juga mengandung unsur mikro esensial lainnya. Pupuk organik membantu dalam mencegah terjadinya erosi dan mengurangi terjadinya retakan tanah(Taiganides, 1977).

Manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi, sehingga Allah memerintahkan untuk Mencegah Kerusakan di bumi ini. Sebagaimana firman Allah Dalam Alquran pada QS. Al-A'raf ayat 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ
رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya!

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (56) (Damanhuri dan Padi, 2007).

Allah SWT sebagai Tuhan seluruh Alam semesta melarang umat manusia untuk membuat kerusakan di muka bumi. Allah mengirimkan manusia sebagai khalifah yang seharusnya mampu memanfaatkan, mengelola dan memelihara bumi dengan baik bukan malah sebaliknya yang merusak bumi. Penggunaan pupuk kimia yang secara terus menerus dapat merusak bagian dari bumi yaitu tanah dan unsur hara yang terkandung di dalam tanah tersebut. Karakteristik umum yang dimiliki pupuk organik, ialah kandungan unsur hara sangat rendah dan sangat bervariasi, penyediaan hara terjadi secara lambat, menyediakan hara dalam jumlah terbatas. (Damanhuri dan Padmi, 2007).

Menurut Damanhuri dan Padmi (2007), Manfaat pupuk organik adalah:

1. Meningkatnya produktivitas lahan pertanian. Karena dengan meningkatnya kadar kandungan bahan organik dan unsur hara yang ada dalam tanah, maka dengan sendirinya akan memperbaiki sifat, kimia dan biologi tanah atau lahan pertanian.
2. Semakin mudahnya melakukan pengolahan lahan karena tanah semakin baik.
3. Harga pupuk organik lebih murah dan sangat mudah didapat dari alam.

Selain itu kotoran ternak yang sebelumnya menjadi limbah yang akan mengotori lingkungan menjadi bermanfaat untuk lahan pertanian, sehingga dapat menjadikan dampak negatif menjadi dampak positif terhadap lingkungan sebagaimana isi kandungan ayat di atas (Gofar dan Mu'thi, 2007).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September-Oktober Tahun 2017. Tempat penelitian di Samata Integrated Farming System (SIFS) Veteran Bakung, Kabupaten Gowa.

B. Populasi dan sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian yang digunakan adalah tanaman kangkung darat (*Ipomoea reptans* Poir).

2. Sampel

Dalam penelitian ini sampelnya adalah pengamatan terhadap komponen pertumbuhan dan hasil dilakukan pada 50 tanaman contoh yang diambil secara acak pada setiap bedengan.

C. Materi Penelitian

1. Alat

Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu cangkul, ember, sabit, selang, shower dan traktor.

2. Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa air, bibit kangkung, lahan berupa tanah bedengan, pestisida, dan pupuk kandang dari kotoran sapi, ayam dan puyuh.

D. Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

1. Variabel bebas: Pupuk Organik (Pupuk kandang sapi, pupuk kandang puyuh, dan pupuk kandang ayam)
2. Variabel Terikat: Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pertumbuhan dan hasil kangkung Darat (*Ipomoea Reptans*) meliputi tinggi tanaman, jumlah helai daun dan panjang permukaan daun

E. Prosedur Penelitian

1. Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan pola 4 perlakuan dan 5 ulangan. Perlakuan (P_0); Penanaman bibit kangkung tanpa menggunakan pupuk kandang A (100 % Tanah), Perlakuan (P_1); Penanaman Bibit dengan menggunakan Pupuk kandang (Feses Sapi), Perlakuan (P_2); Penanaman bibit Kangkung dengan menggunakan Pupuk kandang (Feses Ayam), Perlakuan (P_3) dan Penanaman bibit dengan menggunakan Pupuk kandang (Feses Puyuh).

Perlakuan 1: Tanpa pemberian Pupuk Organik (Kontrol) dengan penyiraman 2 kali yaitu pagi dan sore

Perlakuan 2: Pemberian Pupuk Kandang feses sapi ($15\text{kg}/\text{m}^2$) dengan penyiraman 2 kali yaitu pagi dan sore

Perlakuan 3: Pemberian pupuk kandang feses Ayam ($15\text{kg}/\text{m}^2$) dengan penyiraman 2 kali yaitu pagi dan sore

Perlakuan 4: Pemberian pupuk kandang feses puyuh ($15\text{kg}/\text{m}^2$) dengan penyiraman 2 kali yaitu pagi dan sore

2. Persiapan

Adapun persiapan dari penelitian ini yaitu:

- 2.1 Tanah yang digunakan untuk media penanaman yaitu tanah di lahan di Samata integrated farmimng system Kelurahan Samata kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa yang berupa tanah Merah yang telah dibersihkan dari gulma, akar, dan dedaunan kering, kemudian
- 2.2 Membentuk menjadi bedengan menggunakan traktor dan Cangkul dengan ukuran 80cm kali 240cm sebanyak 20 bedengan.
- 2.3 Tahap pencampuran pupuk dilakukan dengan mengaduk rata pupuk dengan bedengan hingga tercampur merata hingga homogen lalu merapikan kembali bedengan seperti bentuk semula.

3. Pelaksanaan

Adapun persiapan dari penelitian ini yaitu:

- 3.1 Tahap pelaksanaan dimulai dengan Pembelian bibit di toko tani terdekat.
- 3.2 Penanaman bibit Kangkung darat (*Ipomoea Reptans*) dengan jarak 5 cm
- 3.3 Menimbung bibit dengan tanah bedengan dengan tebal 1 cm.
- 3.4 Merapikan semua alat lalu menyiram bibit.

4. Pemeliharaan

Adapun pemeliharaan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- 4.1 Penyiraman dilakukan 2 kali sehari yaitu pada pagi dan sore hari, penyiraman tidak dilakukan apabila hujan turun, dandilakukan menggunakan sprayer atau shower.

4.2 Penyiangan dilakukan pada umur 9 hari setelah tanam dan pelaksanaannya secara manual yaitu dengan mencabut rumput/gulma menggunakan tangan sedangkan penyiangan dibagian luar bedeng menggunakan cangkul.

5. Panen

Pemanenan dilakukan pada umur kisaran 25-27 hari setelah tanam., lalu dipanen dengan cara tanah di basahi dulu sehingga tanaman mudah dicabut secara hati-hati agar akarnya ikut tercabut.

6. Variabel yang diukur

Parameter yang akan diamati dalam penelitian ini, Yaitu:

6.1 Tinggi tanaman (cm)

Tinggi tanaman diukur 1 kali yaitu pada umur 27 hari setelah tanam selama penelitian yang diukur menggunakan penggaris mulai dari pangkal batang sampai ujung tanaman tertinggi.

6.2 Jumlah daun (helai)

Untuk pengamatan jumlah daun dilakukan dengan cara menghitung banyaknya daun yang telah terbuka sempurna setelah tanaman berumur, 27 hari.

6.3 Panjang Daun (cm)

Untuk pengamatan luas permukaan daun dilakukan dengan cara menghitung panjang daun (dari pangkal tangkai daun hingga ujung daun sepanjang tulang daun) setelah tanaman berumur 27 hari.

6.4 Berat basah tanaman kangkung dengan 50 pohon sebagai sampel dari setiap bedengan

Untuk pengamatan berat basah tanaman maka diambil 50 pohon tanaman dari setiap bedengan sebagai sampel dalam penelitian ini, cara pengambilab sampel yaitu dengan membuat garis yang membentuk huruf X pada bedengan lalu setiap ujung X diambil 10 pohon ditambah dengan titik temu tengah sebanyak 10 pohon, kemudian ditimbang menggunakan timbangan digital.

F. Analisis data

Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis sidik ragam (ANOVA) pola searah untuk mengetahui pengaruh perlakuan dan perbedaan yang nyata diuji lanjut dengan uji tukey. Model matematik Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang digunakan menurut Steel dan Torrie (1995) adalah sebagai berikut :

Model linear untuk menjelaskan tiap nilai pengamatan yaitu:

$$Y_{ij} = \mu + \tau_i + \varepsilon_{ij}$$

Keterangan

Y_i = data hasil pengamatan pada perlakuan ke-i ulangan ke-j

μ = Rata-rata pengamatan

τ_i = Pengaruh aditif dari perlakuan ke-i

ε_{ij} = Pengaruh galat hasil percobaan pada perlakuan ke-i dan ke-j

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN


A. Hasil

Hasil penelitian selama 27 hari yang mencakup perbandingan 3 jenis pupuk yaitu pupuk feses sapi, pupuk feses puyuh dan pupuk feses ayam terhadap pertumbuhan kangkung cabut di dataran rendah dengan parameter tinggi tanaman, jumlah helai daun, panjang daun dan berat basah tanaman.

1. Tinggi tanaman (cm)

Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa pemberian pupuk kandang berpengaruh nyata dengan ($P < 0,05$) terhadap tinggi tanaman kangkung. Berdasarkan uji tukey HSD menunjukkan P0 (18,36 cm) berbeda nyata ($P < 0,05$) dengan P1 (31,00 cm), P2 (38,52 cm) dan P3 (43,6 cm). P1 (31,00 cm) berbeda nyata ($P < 0,05$) dengan P2 (38,52 cm) dan P3 (43,6 cm). Demikian juga P2 (38,52 cm) berbeda nyata dengan P3 (43,6 cm). Hasil sidik ragam di sajikan pada


Gambar berikut:



Gambar 1: Diagram tinggi tanaman kangkung

2. Jumlah daun (Helai)


Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa pemberian pupuk kandang berpengaruh nyata ($P < 0,05$) terhadap jumlah daun kangkung. Berdasarkan uji Tukey HSD menunjukkan P0 (11,48 cm) berbeda nyata ($P < 0,05$) dengan P1 (12,60 cm), P2 (13,52 cm) dan P3 (13,66 cm). akan tetapi antara P1 (12,60 cm), P2 (13,52 cm) dan P3 (13,66 cm) tidak menunjukkan perbedaan nyata ($P > 0,05$). Hasil sidik ragam di sajikan pada Gambar berikut:



Gambar 2: Diagram Jumlah daun kangkung

3. Panjang daun (cm)


Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa pemberian pupuk kandang berpengaruh nyata yaitu ($P < 0,05$) terhadap panjang daun kangkung. Berdasarkan uji Tukey HSD menunjukkan P0 (11,40 cm) berbeda nyata dengan P1 (14,16 cm), P2 (14,64 cm) dan P3 (15,32cm). akan tetapi antara P1 (14,16 cm), P2 (14,64 cm) dan P3 (15,32 cm) tidak menunjukkan perbedaan nyata ($P > 0,05$). Hasil sidik ragam di sajikan pada Gambar berikut:



Gambar 3: Diagram panjang daun kangkung

4. Berat basah tanaman

Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa pemberian pupuk kandang berpengaruh nyata ($P < 0,05$) terhadap berat basah tanaman. Berdasarkan uji Tukey HSD P0 (0,42kg) berbedanya nyata ($P < 0,05$) dengan P1 (0,72kg), P2 (0,84kg) dan P3 (1,32kg). Sedangkan P1(0,72kg), P2 (0,84kg) juga berbedanya nyata terhadap P3 (1,32kg) akan tetapi antara P1(0,72kg) dan P2 (0,84kg) tidak berbeda nyata ($P > 0,05$)



Gambar 4: Diagram beratbasah tanaman kangkung

).

B. Pembahasan

1. Tinggi Tanaman

Berdasarkan Gambar 1, tinggi tanaman terendah yaitu P0 (18,36 cm) yang merupakan kontrol/tanpa pemberian pupuk kandang, sedangkan tinggi tanaman yang memiliki ukuran tertinggi yaitu P3 (43,6 cm) dengan pemberian pupuk kandang dari feses ayam, hal ini disebabkan oleh kandungan unsur hara yang terkandung pada feses ayam lebih tinggi dibandingkan dengan feses sapi dan feses puyuh hal ini sesuai dengan pendapat Raihan dkk (2000) yang menyatakan bahwa pupuk kandang ayam mengandung nitrogen (N) tiga kali lebih besar dari pupuk kandang lain. Dalam semua pupuk fosfor (P) selalu terdapat dalam kotoran padat, sedang bagian Kalium (K) dan Nitrogen (N) terdapat dalam kotoran cair atau urine. Kandungan K dalam urine 5 kali lebih banyak, kandungan unsur hara dalam kotoran ayam lebih banyak karena kotoran padat dan kotoran cair tercampur meskipun pada kotoran puyuh juga tercampur namun pada hasil analisis yang dilakukan oleh Kartadisastra (2001) menunjukkan bahwa feses ayam memiliki kandungan unsur hara N 1,00-3,13%, P_2O_5 1,80-6,00%, K_2O 0,40-2,00% kandungan unsur hara pada puyuh N 0,6-1,32%, P_2O_5 0,8-3,0%, K_2O 0,50-1,24% sedangkan kandungan unsur hara pada feses sapi N 0,10-0,96%, P_2O_5 0,64-1,15%, K_2O 0,45-1,00%.

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa kandungan nitrogen pada feses ayam lebih tinggi dari pada feses puyuh dan feses sapi sehingga mempengaruhi tanaman kangkung yang di beri pupuk kandang fess ayam lebih unggul dari pemberian feses puyuh dan feses sapi hal ini sesuai dngan pendapat

yang di kemukakan oleh Nur (2011) yang menyatakan bahwa nitrogen berperan merangsang pertumbuhan vegetatif yaitu menambah tinggi tanaman dan merangsang tumbuhnya anakan.

Senyawa nitrogen akan merangsang pertumbuhan vegetatif tanaman yaitu menambah tinggi tanaman. Selain itu fungsi nitrogen antara lain yaitu meningkatkan pertumbuhan vegetative dan merangsang pertunasan dimana tunas ini akan menghasikan daun. Fungsi lain dari kandungan nitrogen yaitu tanaman dengan kandungan N yang lebih tinggi memiliki daun yang lebih lebar dengan warna daun lebih hijau sehingga fotosintesis berjalan lebih baik (Buckman and Brady, 1982).

Apabila kandungan air tanah meningkat, proses perombakan bahan organik akan banyak menghasilkan asam-asam organik. Anion dari asam organik dapat mendesak fosfat yang terikat oleh Fe dan Al sehingga fosfat dapat terlepas dan tersedia bagi tanaman. Penambahan kotoran ayam berpengaruh positif pada tanah masam berkadar bahan organik rendah karena pupuk organik mampu meningkatkan kadar P, K, Ca dan Mg tersedia. Beberapa hasil penelitian aplikasi pupuk kandang ayam selalu memberikan respon tanaman terbaik pada musim pertama. Hal ini terjadi karena pupuk kandang ayam yang lebih cepat terdekomposisi serta mempunyai kadar hara yang cukup pula jika dibandingkan dengan jumlah unit yang sama dengan pupuk kandang lainnya (Widiowati dkk, 2005).

2. Jumlah daun kangkung (Helai)

Berdasarkan Gambar 2. Menunjukkan bahwa ketiga jenis pupuk kandang baik pupuk feses sapi, pupuk feses puyuh maupun pupuk feses ayam tidak menunjukkan perbedaan nyata terhadap jumlah helai daun hal ini berarti bahwa penggunaan ketiga feses tersebut sama saja jika yang di inginkan adalah jumlah helai daun. Tanaman kangkung pada perlakuan kontrol memiliki jumlah daun yang di hasilkan paling sedikit dengan warna kekuningan dan tampak kurus serta kerdil. Hal ini disebabkan karena tidak tersedianya nitrogen yang cukup dalam, ini sesuai dengan pendapat Djuarni dkk (2006) yang menyatakan bahwa kompos akan meningkatkan kesuburan tanah dan merangsang perakaran yang sehat. Kompos memperbaiki struktur tanah dengan meningkatkan kandungan bahan organik tanah dan akan meningkatkan kemampuan tanah untuk mempertahankan kandungan air tanah. Aktivitas mikroba tanah membantu tanaman untuk menyerap unsur hara dari tanah dan menghasilkan senyawa yang dapat merangsang pertumbuhan tanaman. Aktivitas mikroba tanah juga diketahui dapat membantu tanaman menghadapi serangan penyakit.

Tanaman yang dipupuk dengan kompos juga cenderung lebih baik kualitasnya dari pada tanaman yang dipupuk dengan pupuk kimia, baik dilihat dari hasil panen yang lebih tahan disimpan, lebih berat, lebih segar, dan lebih enak. Kompos memiliki banyak manfaat bagi tanaman yaitu meningkatkan kesuburan tanah, memperbaiki struktur dan karakteristik tanah, meningkatkan kapasitas serap airtanah, meningkatkan aktivitas mikroba tanah, meningkatkan kualitas hasil panen (rasa, nilai gizi dan jumlah panen), menyediakan hormon dan

vitamin bagi tanaman, menekan pertumbuhan/serangan penyakit pada tanaman, meningkatkan retensi/ketersediaan hara didalam tanah (Isroi, 2008).

3. Panjang daun kangkung

Berdasarkan Gambar 3, jika ditinjau dari nilai pengukuran panjang daun, pemberian pupuk kompos memberikan pengaruh nyata yang signifikan terhadap kontrol. Namun berdasarkan uji tukey HSD antara ketiga jenis pupuk pupuk kompos feses ternak yang pakai dalam penelitian ini tidak menunjukkan berbeda nyata. Kemungkinan di sebabkan karena kandungan unsur hara dari pupuk kompos belum terurai sempurna sehingga belum mampu memberikan pengaruh signifikan terhadap panjang daun tanaman, hal ini sesuai dengan pendapat Rinsema (1993) yang menyatakan bahwa tanaman justru tampak seperti kekurangan unsur hara setelah diberikan kompos yang belum terurai sempurna. Sampai dengan proses penguraian sempurna, tanaman akan bersaing dengan mikroorganisme tanah untuk memperebutkan unsur hara.

Jika di tinjau dari angka pengukuran, penggunaan pupuk kompos dari feses ayam terlihat lebih panjang dari penggunaan pupuk kompos feses puyuh dan sapi. Adapun kotoran ayam memiliki kandungan unsur hara N 1%, P 0,80%, K 0,40% dan kadar air 55%. Bakteri yang ditemukan pada kotoran ternak ayam antara lain *Lactobacillus achidophilus*, *Lactobacillus reuteri*, *Leuconostoc mensenteroides* dan *Streptococcus thermophilus*, sebagian kecil terdapat *Actinomycetes* dan kapang. penggunaan bahan organik kotoran ayam mempunyai beberapa keuntungan antara lain sebagai pemasok hara tanah dan meningkatkan retensi air (Raihan dkk, 2000).

4. Berat basah kangkung

Berdasarkan Gambar 4, pengukuran berat basah tanaman kangkung berpengaruh nyata dengan P0 (0,42kg) sebagai tanaman kontrol dengan P1 (0,72kg), P2 (0,84kg) juga berbeda nyata dengan P3 (1,32kg) hal ini memperlihatkan secara jelas bahwa penggunaan pupuk feses ayam (P3) lebih unggul dari penggunaan pupuk feses sapi (P1) dan penggunaan feses puyuh (P2). Hal ini sesuai dengan pendapat yang di nyatakan oleh Taiganides (1977) yang menyatakan bahwa Kotoran ayam merupakan salah satu limbah yang dihasilkan baik ayam petelur maupun ayam pedaging yang memiliki potensi yang besar sebagai pupuk organik. Komposisi kotoran sangat bervariasi tergantung pada sifat fisiologis ayam, ransum yang dimakan, lingkungan kandang termasuk suhu dan kelembaban. Kotoran ayam merupakan salah satu bahan organik yang berpengaruh terhadap sifat fisik, kimia dan pertumbuhan tanaman. Kotoran ayam mempunyai kadar unsur hara dan bahan organik yang tinggi serta kadar air yang rendah. Setiap ekor ayam kurang lebih menghasilkan ekskreta per hari sebesar 6,6% dari bobot hidup.

Penggunaan pupuk kandang adalah kunci keberhasilan program pemupukan pada sistem pertanian berkelanjutan. Secara bertahap pupuk kandang memang dapat menambah tersedianya unsur hara bagi tanaman dan memberi pengaruh yang positif terhadap sifat fisis dan kimiawi tanah juga mampu mendorong perkembangan jasad renik (Sutedjo, 2002)

Berdasarkan uraian di atas terlihat jelas bahwa pupuk kandang ayam jauh lebih berpotensi untuk digunakan dalam budidaya kangkung cabut di karenakan kangkung cabut membutuhkan unsur Nitrogen yang tinggi yang di butuhkan untuk perkembangan batang dan daun, hal ini sesuai dengan pendapat yang di kemukakan oleh Harjowigeno (2003), menyatakan bahwa pupuk kandang ayam mengandung Nirogen (N) tiga kali lebih besar dari pada pupuk kandang lain.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa tanaman kontrol (P0) dalam penanaman kangkung darat didataran rendah berpengaruh nyata ($P < 0,05$) terhadap pemberian feses ayam (P1), pemberian feses puyuh (P2) dan pemberian feses sapi (P3). Dari hasil pengukuran tinggi tanaman kangkung, jumlah daun, panjang daun dan berat basah tanaman kangkung terlihat pula bahwa penggunaan pupuk dari feses ayam lebih bagus jika dibandingkan dengan feses sapi dan feses puyuh.

B. Saran

1. Limbah ternak berupa feses setidaknya dimanfaatkan sebagai pupuk bagi tanaman yang bermanfaat bagi masyarakat
2. Perlu dilakukan penelitian tentang penggunaan pupuk kandang terhadap tanaman-tanaman lain selain kangkung.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jazairi, 2007. *Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar* Jilid 2, Jakarta: Darussunnah
- Anonim. 2009. *Pupuk Cair Organik*. (Online) www.scribd.com/doc/43991654/PUPUK-CAIR-ORGANIK. (diakses pada 17 Agustus 2017)
- Anonim. 2010. *Budidaya Hortikultura di Musim Hujan Kendala dan Kiat Mengatasinya*. (Online) Budidaya.blogspot.com. (diakses pada 17 Agustus 2017)
- Asep. 2013. *Kekurangan dan keunggulan pupuk organik dan anorganik*. (Online) <http://asepjb.blogspot.co.id/>. (diakses pada 21 Agustus 2017)
- Atmojo, S.W. 2003. *Peranan Bahan Organik terhadap Kesuburan Tanah dan Upaya Pengelolaannya*. Sebelas Maret University Press. Surakarta.
- Buckman dan Nyle.C. Brady., 1982. *Ilmu Tanah*. Bhatara Karya Aksara. Jakarta
- Brady, N. C. 1990. *The Nature and Properties of Soil*. 10th ed. Mac Millan Publishing Co. New York.
- Bintang R. A. S., R. Suyartodan Kesumadewi A. A. I. 2016. *Kajian Status Kerusakan Tanah pada Lahan Pertanian di Kecamatan Denpasar*. Program Studi Agro ekoteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Udayana. Denpasar-Bali.
- Charisma. A. J., 2014. *Aplikasi Beberapa Jenis Pupuk Organik dan Dosis Mikoriza Untuk Meningkatkan Produksi dan Kualitas Salak Gula Pasir Diluar Musim*. Tesis untuk Memperoleh Gelar Magister pada Program Magister, Program Studi Pertanian Lahan Kering, Program Pascasarjana. Universitas Udayana
- Damanhuri, E., dan Padmi, T., 2007. *Pengomposan (Composting) (Bagian 1)*. Diklat Kuliah TL-3150/ITB. (Online) <http://tsabitah.wordpress.com/2007/05/03/pengomposan-composting/>. (diakses pada 19 Agustus 2017).
- Darmono, D. W. 2008. *Bertanam Kangkung*. Penerbit Penebar Swadaya.
- Deddy, F. Labaydan A. Suswanto. 2013. *Master plan Pengelolaan Ekosistem Gambut Provinsi Riau*. Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Jakarta.
- Djajakirana, 2001. *Pengelolaan Kesuburan Tanah*. Bumi Aksara: Semarang.

- Djuarni. 2006. *Cara Cepat Membuat Kompos*. Agro Media Pustaka. Jakarta.
- Djuariah, D. 2007. *Evaluasi Plasma NutfahKangkung Di Dataran Medium Rancaekek*. Jurnal Hortikultura 7(3):756-762.
- Fachrudin, Khaira Amalia. 2008. “*Faktor – Faktor yang Meningkatkan Peluang Survive Perusahaan Kesulitan Keuangan*”. Jurnal Manajemen Bisnis. 1(1): 1-9. (Online) <http://usupress.usu.ac.id>. (diakses pada tanggal 11 Februari 2013)
- Fischer, R.F. dan Kries, D. 2000. *Ecology and Management of Forest Soils (3rd ed)*. John Wiley & Sons, Inc. New York.
- Gofar, A dan Mu’thi, A. 2007. *Tafsir Ibnu Katsir*. Bogor. Pustaka Imam Asy-syafi’i
- Hairah, K., Widiyanto, S.R. Utami, D. Suprayogo, Sunaryo, S. M. Sitompul, B. Lusiana, R. Mulia, M. van Noordwijk, dan G. Cadisch. 2000. *Pengelolaan Tanah Masam secara Biologi*. Refleksi Pengalaman dari Lampung Utara. ICSAF.
- Hadisuwinto. 2012. *Diskusi. Laboratorium Hama dan Penyakit Tumbuhan*. UNILA.
- Harjowigeno, 1995. *Ilmu Tanah*. Akademika Pressindo. Jakarta. 233 hal.
- Hardjowigeno, S. 2003. *Klasifikasi Tanah dan Pedogenesis*. Jakarta : Akademika Pressindo.
- Hatta, M. 2013. *Produksi tanaman pada lahan basah*. (Online) <http://emhatta.wordpress.com/category/stress/>. (diakses pada 16 Agustus 2017).
- Isroi, 2008. *Pengomposan*. (Online) <http://www.isroi.org>. (diakses tanggal 18 Agustus 2017).
- Kartadisastra, H. R. 2001. *Penyediaan dan Pengelolaan Pakan Ternak Ruminansia*. Kanisius, Yogyakarta.
- Kusuma., M. E. 2012. *Pengaruh Takaran Pupuk Kandang Kotoran Burung Puyuh Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Sawi Putih (Brassica Juncea L.)* The Effects of Doses Quail Manure on The Growth and Production of White Mustard (Brassica Juncea L.) Jurnal ilmu hewani tropika vol 1 No. 1.
- Lahuddin. 1998. *Pengaruh pemupukan N dan abu janjang kelapa sawit pada tanaman dan kimia tanah*. *Kultura*, Medan: Fak. Pert. USU, no. 120.


- Lal, R. 1995. *Sustainable Management of Soil Resources in the Humid Tropics*. United Nation University Press, Tokyo.
- Lingga, P, dan Marsono, 2004. *Petunjuk Penggunaan Pupuk*. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Listiyowati, E dan k. Roospitasari. 1992. *Puyuh. Tata Laksana Budidaya Secara Komersial*. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Maria, G.M. 2009. *Respon Produksi Tanaman Kangkung Darat (Ipomea reptans Poir) Terhadap Variasi Waktu Pemberian Pupuk Kotoran Ayam*. Jurnal Ilmu Tanah 7(1) : 18-22.
- Musnamar. 2013. *Pupuk Organik: Cair & Padat, Pembuatan, Aplikasi*. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Nafiun. 2013. *Pupuk Organik dan Hayati: Pengertian, Sumber, Bahan, Sejarah, Penggunaan, Manfaat, Peranan, Lingkungan* .<http://www.nafiun.com/2013/02/pupuk-organik-dan-hayati-pengertian-sumber-bahan-manfaat-peggunaan-peranan.html> (diakses pada 17 agustus 2017)
- Novizan. 2002. *Petunjuk Pemupukan yang Efektif*. Agromedia Pustaka. Jakarta; Hal: 23-24
- Nur s. Fajar. *Unsur Hara Tanaman*. (Online) <http://nurlight94.blogspot.co.id/2011/11/unsur-hara-tanaman.html>. (diakses pada 16 Agustus 2017).
- Parman, S. 2007. *Pengaruh Pemberian Pupuk Organik Cair terhadap Pertumbuhan dan Produksi Kentang (Solanum tuberosum L.)*. Paper ilmiah Anatomi dan Fisiologi Vol. XV, No. 2.
- Pranata, Ayub. 2010. *Meningkatkan Hasil Panen Dengan Pupuk Organik*. Agro Media Pustaka, Jakarta.
- Rahma Charisma, 2014. *Bahaya pupuk Anorganik*. (Online) http://www.kompasiana.com/charismarahma/masih-mau-pakai-pupuk-kimia-yuk-intip-bahayanya_54f84872a33311d55e8b4963. (diakses pada 16 agustus 2017)
- Raihan, S., Hairunsyah, A. Noor, dan Y. Raihana. 2000. *Peranan Beberapa Macam Bahan Organik dan Pupuk Kalium terhadap Pertumbuhan dan Hasil Jagung di Lahan Kering*. <http://www.google.com/scholar>, diakses pada tanggal 18 Maret 2015.
- Raven, P. H., L. R. Berg, and G. B. Johnson 1998. *Environment, Saunders College Publishing*, New York, NY, USA, 2nd edition.
- Rinsema, W. T., 1993. *Pupuk dan Cara Pemupukan*. Bharata Karya Aksara. Jakarta.

- Safuan, L.O., I.U. Warsono, G. Ayu K.S., L. Prihastuti, S. Wahyuni, Hestin, E. Oktavidiati, E. Hernawan, Rudi, Desyanti, Elis, dan M. Suwena. 2002. *Pertanian Terpadu Suatu Strategi Untuk Mewujudkan Pertanian Berkelanjutan*. (Online) <http://www.tomuato.net>. (diakses pada 20 agustus 2017).
- Sarief. 1989. *Kesuburan dan Pemupukan Tanah Pertanian*. PustakaBuana Bandung.
- Sitompul, S.M dan B. Guritno. 1995. *Analisis Pertumbuhan Tanaman*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Sensus Pertanian. 2013. *Jumlah Petani Menurut Sektor/Subsektor & Jenis Kelamin*. (Online) <http://st2013.bps.go.id/dev/st2013/index.php/site/tab1?tid=23&wid=0>.(Akses tanggal 15 agustus 2017).
- Solihin. 2008. *Pemanfaatan Limbah Pabrik Gula dan Ethanol Menjadi Pupuk Organik Bernilai Ekonomi Tinggi*. (Online) <http://www.beritabumi.or.id/?g=beritadtl&opiniID=OP0017&ikey=3>.(diakses tanggal 20 Agustus 2017).
- Steel, C.J. dan J.H. Torrie.1995. *Prinsip dan Prosedur Statistik*. PT. Gramedia. Jakarta.
- Stevenson, F. J. 1994. *Humus Chemistry: Genesis, Composition, Reactions*. 2th ed. John Wiley & Sons, Inc. New York.
- Sukisno, K. S. Hindarto, Hasanudin, dan A. H. Wicaksono. 2011. *Pemetaan Potensial Status Kerusakan Tanah untuk Mendukung Produktivitas Biomassa di Kabupaten Lebong*. Program Studi Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian UNIB.
- Sutedjo, M. M. 2002. *Pupuk Dan Cara Penggunaan*. Jakarta : RinekaCipta.
- Taiganides, R. E. 1977. *Animal Waste*. Applied Science Publisher Ltd: London.
- Tala'ohu, S. H. dan Irawan. 2014. *Reklamasi Lahan Pasca Penambangan Batubara. Konservasi Tanah Menghadapi Perubahan Iklim*. pp 187 – 213. (Online)<http://balittanah.litbang.pertanian.go.id/ind/dokumentasi/buku/bungarampai08.pdf>. (diakses tanggal 20 Agustus 2017).
- Warjiyo, Perry., dan Solikin. 2003. *Kebijakan Moneter di Indonesia*. PPSK BI. Jakarta.
- Wiskandar, 2002. *Pemanfaatan pupuk kandang untuk memperbaiki sifat fisik tanah di lahan kritis yang telah dteras*. Konggres Nasional VII.
- Widowati, L.R., Sri W., U. Zainuddin., dan W. Hartatik. 2005. *Pengaruh Kompos Organik yang Diperkaya Bahan Mineral dan Pupuk Hayati terhadap Sifat-Sifat Tanah*. TA 2005 (Tidak dipublikasikan).

Wuana,. J. R, and Okieman. I. J. 2011. Pengaruh Macam Pupuk Organik Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Jagung Manis (*Zea mays-saccharata*, Sturt). *Jurnal Agrosains*. Vol 1 No 1 ISSN 0216-499X.

Young, A. 1989. *Agroforestry for soil Management. Second edition*. CABI. Icrif.

Yuwanto, T. 2004. *Dasar Ternak Unggas*. Kanisius. Yogyakarta.



LAMPIRAN

A. Pengukuran tinggi tanaman kangkung

No	TINGGI TANAMAN KANGKUNG (cm)					Total	Rerata	
	Perlakuan	ULANGAN						
		1	2	3	4			5
1	P0	26	15.4	17	16.2	17.2	91.8	18.36
2	P1	38.2	27.4	28.4	31.4	29.6	155	31
3	P2	39	38.6	39	38.8	37.2	192.6	38.52
4	P3	47.6	43.2	45.8	45	46.4	228	45.6
	Total umum						667.4	
	rerata umum							38.37333

Sumber: Data primer setelah diolah, 2017

B. Uji Anova Pengukuran tinggi tanaman kangkung

Descriptives

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
Po	5	18.3600	4.32990	1.93639	12.9837	23.7363	15.40	26.00
P1	5	31.0000	4.29185	1.91937	25.6710	36.3290	27.40	38.20
P2	5	38.5200	.75631	.33823	37.5809	39.4591	37.20	39.00
P3	5	45.6000	1.64317	.73485	43.5597	47.6403	43.20	47.60
Total	20	33.3700	10.75278	2.40439	28.3375	38.4025	15.40	47.60

ANOVA

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	2035.062	3	678.354	67.097	.000
Within Groups	161.760	16	10.110		
Total	2196.822	19			

C. Uji Tukey HSD 0,05 Pada Pengukuran Tinggi Tanaman kangkung

perlakuan	n	N	Subset for alpha = 0.05			
			1	2	3	4
Tukey HSD ^a	P0	5	18.3600			
	P1	5		31.0000		
	P2	5			38.5200	
	P3	5				45.6000
	Sig.		1.000	1.000	1.000	1.000

D. Pengukuran Panjang daun kangkung

No	PANJANG DAUN KANGKUNG (cm)						Total	rerata
	Perlakuan	ULANGAN						
		1	2	3	4	5		
1	P0	10.2	11.2	11.4	12.8	11.4	57	11.4
2	P1	14.6	13.4	14.6	14.4	13.8	70.8	14.16
3	P2	15.2	13.6	14.8	15.6	14	73.2	14.64
4	P3	16.6	15.4	15	15.6	14	76.6	15.32
	Total umum						220.6	
	rerata umum							14.70

Sumber: Data primer setelah diolah, 2017

E. Uji Anova Pengukuran Panjang daun kangkung

Descriptives

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
Po	5	11.4000	.92736	.41473	10.2485	12.5515	10.20	12.80
P1	5	14.1600	.53666	.24000	13.4937	14.8263	13.40	14.60
P2	5	14.6400	.82946	.37094	13.6101	15.6699	13.60	15.60
P3	5	15.3200	.94446	.42237	14.1473	16.4927	14.00	16.60
Total	20	13.8800	1.70621	.38152	13.0815	14.6785	10.20	16.60

ANOVA

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	44.400	3	14.800	21.701	.000
Within Groups	10.912	16	.682		
Total	55.312	19			

F. Uji Tukey HSD 0,05 Pengukuran Panjang daun kangkung

perlakuan	N	Subset for alpha = 0.05	
		1	2
Tukey HSD ^a	Po	5	11.4000
	P1	5	14.1600
	P2	5	14.6400
	P3	5	15.3200
	Sig.		1.000

G. Penghitungan jumlah daun kangkung

No	JUMLAH DAUN KANGKUNG (Helai)					total	rerata	
	Perlakuan	ULANGAN						
		1	2	3	4			5
1	P0	11.4	12.4	10.8	11	11.8	57.4	11.48
2	P1	13.4	13.2	12.2	12.2	12	63	12.6
3	P2	13.2	13.6	13	14.4	13.4	67.6	13.52
4	P3	13.2	13.8	13.2	14.5	13.6	68.3	13.66
	Total umum						253.6	
	Rerata Umum							13.26

Sumber: Data primer setelah diolah, 2017

H. Uji Anova penghitungan jumlah daun kangkung

Descriptives

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
Po	5	11.4800	.64187	.28705	10.6830	12.2770	10.80	12.40
P1	5	12.6000	.64807	.28983	11.7953	13.4047	12.00	13.40
P2	5	13.5200	.54037	.24166	12.8490	14.1910	13.00	14.40
P3	5	13.6600	.53666	.24000	12.9937	14.3263	13.20	14.50
Total	20	12.8150	1.04744	.23421	12.3248	13.3052	10.80	14.50

ANOVA

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	15.197	3	5.066	14.351	.000
Within Groups	5.648	16	.353		
Total	20.845	19			

I. Uji Tukey HSD 0,05 penghitungan jumlah daun kangkung

perlakua n		N	Subset for alpha = 0.05	
			1	2
Tukey HSD ^a	Po	5	11.4800	
	P1	5		12.6000
	P2	5		13.5200
	P3	5		13.6600
	Sig.		1.000	.054

J. Pengukuran timbangan kangkung

No	BERAT TIMBANGAN 50 POHON (kg)					Total	Rerata	
	Perlakuan	ULANGAN						
		1	2	3	4			5
1	P0	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	2.1	0.42
2	P1	0.7	0.6	0.8	0.8	0.7	3.6	0.72
3	P2	0.9	0.9	0.5	0.9	1	4.2	0.84
4	P3	1.4	1.5	1.4	1.2	1.1	6.6	1.32
	Total umum						16.5	
	Rerata umum							0.96

Sumber: Data primer setelah diolah, 2017

K. Uji Anova Pengukuran timbangan kangkung

Descriptives

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
Po	5	.4200	.13038	.05831	.2581	.5819	.30	.60
P1	5	.7200	.08367	.03742	.6161	.8239	.60	.80
P2	5	.8400	.19494	.08718	.5980	1.0820	.50	1.00
P3	5	1.3200	.16432	.07348	1.1160	1.5240	1.10	1.50
Total	20	.8250	.35964	.08042	.6567	.9933	.30	1.50

ANOVA

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	2.101	3	.700	31.483	.000
Within Groups	.356	16	.022		
Total	2.457	19			

L. Uji Tukey HSD Pengukuran timbangan kangkung

perlakuan	N	Subset for alpha = 0.05		
		1	2	3
Tukey HSD ^a	Po	5	.4200	
	P1	5	.7200	
	P2	5	.8400	
	P3	5		1.3200
	Sig.		1.000	.593
				1.000

M. Foto Kegiatan Penelitian



Gambar 5. Penyiapan lahan penelitian



Gambar 6. Proses Penanaman Kangkung



Gambar 7. Proses pengukuran kangkung cabut

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



Gambar 8. Proses penimbangan kangkung

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

RIWAYAT HIDUP



HASAN BASRI dilahirkan di Tanah Tekko Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 21 September 1994. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara pasangan dari Bahar.S dan Hawisah. Penulis menyelesaikan pendidikan di SDN 219 Pukkiseng di Desa Bulutellue, Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai pada tahun 2006. Pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 4 SINJAI dan tamat pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan ke Sekolah SMAN 1 Bulupoddo dan mengambil Program Ips dan selesai pada tahun 2012. Setelah selesai dan lulus, penulis melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi tepatnya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM), mengambil program studi Ilmu Peternakan, Fakultas Sains Dan Teknologi. Alhamdulillah berkat Do'a dan kerja keras serta kegigihannya penulis menyelesaikan kuliah Strata satu (S1) pada tahun 2018.