

**UJI DAYA CERNA PROTEIN PADA BROILER YANG
DIBERIKAN ANTIBIOTIK DAN PROBIOTIK**



Skripsi

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Peternakan pada Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar**

UNIVERSITAS Oleh: M NEGERI
ALAUDDIN
RUSTAN
NIM: 60700114066
M A K A S S A R

**JURUSAN ILMU PETERNAKAN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rustan
NIM : 60700114066
Tempat/Tgl. Lahir : Salulayo, 24 September 1996
Jurusan/Prodi : Ilmu Peternakan
Alamat : Jl. Veteran Bakung, Samata-Gowa
Judul : Uji daya cerna protein pada broiler yang diberikan antibiotik dan probiotik

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
M A K A S S A R

Gowa, Agustus 2018

Penyusun,



Rustan

Nim: 60700114066

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Pembimbing penulisan skripsi saudara **Rustan**, NIM: **60700114066**, mahasiswa jurusan Ilmu Peternakan pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar. Setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul **“Uji Daya Cerna Protein Pada Broiler yang Diberikan Antibiotik dan Probiotik”** memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Ujian Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih Lanjut


Samata_Gowa, Agustus 2018


Pembimbing I

Pembimbing II


Muh. Nur Hidayat, S.Pt., M.P.
NIP: 19750909 200912 1 001


Rasyidah Mappanganro, S.Pt., M.Si.
NIP:


Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Peternakan


Dr. Ir. Muh. Basir Paly, M.Si
NIP. 19590712 198603 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Uji Daya Cerna Protein pada Broiler yang Diberikan Antibiotik dan Probiotik” yang disusun oleh **RUSTAN, NIM: 60700114066**, mahasiswa Jurusan Ilmu Peternakan pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 06 Agustus 2018, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Peternakan pada Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Samata-Gowa, Agustus 2018 M
Dzul-Hijjah 1439 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Astaty, S.Pt, M.Si.	(.....)
Munaqisy I	: Hj. Jumriah Syam, S.Pt., M.Si.	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Muh. Sabri AR, M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Muh. Nur Hidayat, S.Pt., M.P.	(.....)
Pembimbing II	: Rasyidah Mappanganro, S.Pt., M.Si.	(.....)

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.
NIP. 1969205 199303 1 001

KATA PENGANTAR



Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Uji Daya Cerna Protein Pada Broiler yang Diberikan Antibiotik dan Probiotik” guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Peternakan (S.Pt) pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad saw, yang senantiasa menuntun kita dari jalan yang gelap gulita ke jalanyang terang benderang.

Selama proses penulisan skripsi, tentunya tidak lepas dari berbagai hambatan dan tantangan, namun berkat petunjuk, bimbingan, arahan, do'a serta dukungan moral dari berbagai pihak maka hambatan dan tantangan tersebut dapat teratasi. Untuk itu, perkenangkanlah penulis menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang istimewa kepada Ayahanda **Arsyad**, Ibunda tercinta **Hasna** dan saudariku tercinta **Rusmianty** yang tanpa pamrih, penuh kasih sayang membesarkan dan mendidik penulis sejak kecil hingga menyelesaikan pendidikan seperti saat ini.

Penulis menyadari kelemahan serta keterbatasan yang ada sehingga dalam menyelesaikan skripsi ini memperoleh bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Musafir Pabbari, M.Si** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
2. Bapak **Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag** selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Bapak **Dr. Ir. M. Basir Paly, M.Si** Sebagai Ketua Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Tekhnologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Bapak **Muh. Nur Hidayat, S.Pt., M.P** selaku Dosen Pembimbing Pertama, dan Ibu **Rasyidah Mappanganro, S.Pt., M.Si** selaku Dosen Pembimbing Kedua, atas bimbingannya selama ini yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis mulai dari penyusunan proposal sampai meyelesaikan skripsi ini.
5. **Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Peternakan** atas bimbingan dalam kegiatan perkuliahan, baik dalam tatap muka mupun arahan-arahan diluar perkuliahan.
6. Kepada Tim Penguji, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu **Hj. Jumriani Syam, S.Pt., M.Si**, selaku Penguji I dan Bapak **Dr. Muh. Sabri AR, M.Ag** selaku Penguji II, yang telah memberikan saran dan kritikan yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan dan penyusunan skripsi ini.
7. Terima kasih kepada Tim penelitian antibiotik dan probiotik (**Syarif Hidayatullah, Sultan Akbar Wahidin, Rahmawati, Ismawati, Andi Febri Astuti, Eka Fitriani dan Wahyuni**), dan terima kasih juga kepada adinda **Syahrul** yang senantiasa ikut membantu kami selama proses penelitian.

8. Terima kasih pula kepada kakak **Andi Arfiana, SE**, selaku pegawai jurusan yang membantu dalam pengurusan berkas. Terima kasih pula kepada Ibu **Drh. Aminah Hajah Thaha**, kakak **Muh. Arsan Jamili S.Pt., M.Si** dan **Hikmawati S.Pt**, selaku laboran jurusan ilmu peternakan yang ikut membimbing, memberi kritik, dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
9. Terima kasih pula kepada Rekan seperjuangan **ELANG (Angkatan 2014)** di Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, atas kebersamaan dan pengalaman yang telah diberikan selama ini dan tetap semangat dan tersenyumlah smile.
10. Terima kasih juga kepada kakanda-kakanda di SIFS: **Asrul S.pt, Hasrin Spt, Suhaebar, Surwanto Udin, Andi Nurhamzah Putra, Safaruddin dan Muh Imran Yambas**, serta teman seperjuangan di SIFS: **Mansyur, Arfah dan Zulfikar**.
11. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan baik isi maupun susunannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi penulis juga bagi para pembaca.

Samata_Gowa, Agustus 2018

Penulis



Rustan

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATAPENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
ABSTRACT	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Rumusan masalah.....	4
C. Tujuan penelitian	4
D. Manfaat penelitian.....	5
E. Definisi Operasional	5
F. Ruang Lingkup Penelitian	6
G. Hipotesis.....	6
H. Kajian Terdahulu.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Integrasi	8
B. Kajian Teoritis	11
1. Broiler.....	11
2. Konsumsi Ransum Broiler	20
3. Protein	22
4. Daya Cerna	30
5. Antibiotik.....	36
6. Probiotik	41
7. Bakteri Asam Laktat.....	49

BAB III MATERI DAN METODE

A. Waktu dan tempat.....	58
B. Alat dan Bahan Penelitian	58
C. Jenis Penelitian	59
D. Metode Penelitian.....	59
E. Parameter yang Diukur	61
F. Analisis Data.....	63

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil	64
B. Pembahasan	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	77
RIWAYAT HIDUP.....	xiv

DAFTAR TABEL

No.	Halaman
1. Kebutuhan Nutrien pada Broiler	14
2. Konsumsi Ransum Ayam Broiler <i>Strain Ross</i>	21
3. Jenis-jenis Pakan Berdasarkan Kandungan Nutrisi.....	25
4. Uji Anova SPSS Pengukuran Daya Cerna Protein Pada Broiler	78



DAFTAR GAMBAR

No.	Halaman
1. Diagram Pengukuran Daya Cerna Protein	64
2. Diagram Garis Daya Cerna Protein.....	79
3. Pembersihan Lokasi Penelitian	80
4. Pembuatan Sekat-sekat Kandang	80
5. Pemberian Antibiotik dan Probiotik	80
6. Vaksin yang Digunakan	81
7. Pemberian Vaksinasi	81
8. Penimbangan Pakan	82
9. Pengambilan Feses	82
10. Uji Analisis Laboratorium	82



ABSTRACT

Name :Rustan
Nim :60700114066
Department :Animal Science
Title : Test Protein Digest At Broiler Given Antibiotics and Probiotics

This study aims to determine the effect of antibiotics *Bacitracin zinc* and probiotics *Microbial strains (Lactobacillusceseii, Saccharomyces cerevisiae and Rhodopseudomonas palustris)* on protein digestibility in broilers. This research was conducted in the stable poultry Alauddin State Islamic University in Makassar and continue Chemistry Laboratory Animal Feed University of Hasanuddin (UNHAS Makassar), South Sulawesi. This study was conducted over 35 days. The experiments were conducted using a completely randomized design (RAL), which contained four treatments, P₀ (control), P₁ (Probiotic 1.5 ml / day, 1-35 days), P₂ (Antibiotics 0.1 g / day of 1- 35 days) and P₃ (Antibiotics 0.1 g / day, 1-21 days + Probiotics 1.5 ml / day, 22-35 days) with three replications. This study uses antibiotics *Bacitracin zinc* and multi probiotic *Microbial strains (Lactobacillusceseii, Saccharomyces cerevisiae and Rhodopseudomonas palustris)* containing 1.5×10^6 cfu / ml). The measured parameters namely protein digestibility. Based on the analysis of variance of the study, showed that the treatment had no significant effect ($P > 0.05$) on protein digestibility. Average protein digestibility obtained in this study, namely P₀ (66.03%), P₁ (79.58%), P₂ (81.41%), and P₃ (80.00%). But seen from the data of each treatment (P), P₁ (79.58%), P₂ (81.41%), and P₃ (80.00%). Tends to be better than the control treatment.

Keywords: *Antibiotics, Broiler, Digestibility, Protein, Probiotics.*

ABSTRAK

Nama : Rustan
Nim : 60700114066
Jurusan : Ilmu Peternakan
Judul : Uji Daya Cerna Protein Pada Broiler yang Diberikan Antibiotik dan Probiotik

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian antibiotik *Zink bacitracin* dan probiotik *Multi strain (Lactobacillus cesei, Saccharomyces cerevisiae dan Rhodopseudomonas palustris)* terhadap daya cerna protein pada broiler. Penelitian ini dilakukan di kandang unggas Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan dilanjutkan di Laboratorium Kimia Makanan Ternak Universitas Hasanuddin Makassar (UNHAS Makassar), Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilaksanakan selama 35 hari. Percobaan dilakukan dengan menggunakan rancangan acak lengkap (RAL), yang terdapat 4 perlakuan yaitu P₀ (Kontrol), P₁ (Probiotik 1,5 ml/hari, 1-35 hari), P₂ (Antibiotik 0,1 g/hari 1-35 hari) dan P₃ (Antibiotik 0,1 g/hari, 1-21 hari + Probiotik 1,5 ml/hari, 22-35 hari) dengan 3 kali ulangan. Penelitian ini menggunakan antibiotik *Zink bacitracin* dan mikroba probiotik *Multi strain (Lactobacillus cesei, Saccharomyces cerevisiae dan Rhodopseudomonas palustris)* yang mengandung $1,5 \times 10^6$ cfu/ml). Parameter yang diukur, yaitu daya cerna protein. Berdasarkan hasil analisis sidik ragam dari penelitian, menunjukkan bahwa pada perlakuan tidak memberikan pengaruh yang nyata ($P > 0,05$) terhadap daya cerna protein. Rata-rata daya cerna protein yang diperoleh dalam penelitian ini, yaitu P₀ (66,03%), P₁ (79,58%), P₂ (81,41%), dan P₃ (80,00%). Namun dilihat dari data setiap perlakuan (P), P₁ (79,58%), P₂ (81,41%), dan P₃ (80,00%). Cenderung lebih baik dari perlakuan kontrol.

Kata Kunci: Antibiotik, Broiler, Daya cerna, Protein, Probiotik.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penduduk Indonesia telah menyadari akan pentingnya protein hewani bagi pertumbuhan jaringan tubuh. Salah satu sumber protein adalah daging broiler (*Gallus domesticus*). Akan tetapi dalam industri broiler di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan yang harus segera diatasi agar Indonesia mampu menyediakan daging dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang baik dan menguntungkan produsen tanpa merugikan konsumen. Produksi daging broiler berkontribusi terhadap total produksi daging nasional sebesar 62,56%. Konsumsi nasional daging ayam pada tahun 2014 sebesar 8 kg per kapita per tahun. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2014 sebesar 248 juta jiwa, sehingga konsumsi daging nasional tahun yang sama sebesar 1,9 juta ton. Konsumsi yang tinggi ini harus diimbangi dengan produksi daging yang semakin meningkat untuk memenuhi kebutuhan konsumen (Poultry Indonesia, 2014).

Rendahnya efisien produksi broiler, yang disebabkan oleh tingginya harga pakan broiler, sehingga sering dilakukannya upaya untuk meningkatkan efisiensi penggunaan pakan dengan pemberian pakan lemak tinggi dan meningkatkan *Feed conversion rate* (FCR) dengan memaksimalkan penyerapan pakan oleh organ pencernaan. Akan tetapi konsumen belum mengetahui bahwa daging broiler yang rendah lemak seperti kolesterol, tetapi tinggi protein, dan bebas

mikrobia patogen serta bebas antibiotika. Wuryaningsih (2005) dan Rahmianna (2006), menyatakan bahwa isu keamanan pangan asal ternak yang meresahkan masyarakat antara lain cemaran mikroba pathogen dalam daging, maka dari itu yang dapat menekan pathogen tersebut yaitu pemberian antibiotik dan probiotik dalam pakan yang berfungsi sebagai antibiotik *Growth promoter* (AGP).

Antibiotik banyak digunakan sebagai *Growth promoter* dalam pakan ternak di seluruh dunia untuk memacu pertumbuhan ternak agar dapat tumbuh lebih besar dan dalam waktu yang lebih cepat serta untuk mencegah terjadinya infeksi (Gaggia, 2010). Beberapa antibiotika yang banyak dipakai sebagai *Growth promoter* antara lain dari golongan tetracyclin, penicillin, macrolida, lincomycin dan virginiamycin (Cervantes, 2007).

Antibiotik merupakan zat biokimia yang dapat membunuh pertumbuhan mikroorganisme, dan dapat memperbaiki efisiensi penggunaan pakan serta menekan bakteri patogen didalam saluran pencernaan. Pengaruh pemberian antibiotik *Zink bacitracin* di dalam pakan ternak dapat membantu laju pertumbuhan dan efisiensi pakan pada broiler (Brooks, 2003).

Menurut Indrawani (2001), dalam penelitiannya menyatakan bahwa pemberian Antibiotik *Oksitetrasiklin* dan *Spiramycin* selama 8 minggu akan meninggalkan residu di dalam hati dan daging ayam yang lebih besar dibanding dengan jika pemberian antibiotik hanya 4 minggu. Pemakaian antibiotik berupa *Zink bacitracin* dalam bidang peternakan perlu diperhatikan waktu hentinya pemberian antibiotik tersebut, Untuk menghindari adanya residu antibiotik *Zinc*

bacitracin, pemberian antibiotik *Zinc bacitracin* sebaiknya dihentikan 13 hari sebelum ayam dipotong. Hal tersebut dapat menghindarkan residu yang akan masuk dalam daging pada broiler.

Probiotik merupakan *Feed additive* berupa mikroorganisme hidup yang diberikan kepada ternak yang mempunyai efek positif bagi ternak yang mengkonsumsi. Konsep memanfaatkan keseimbangan mikroflora inilah yang menjadi landasan penggunaan probiotik untuk menekan perkembangan bakteri patogen, baik pada saluran pencernaan ayam maupun pada litter (lingkungan dalam kandang ternak). Penambahan probiotik kedalam pakan untuk menstabilkan mikroflora pencernaan dan berkompetisi dengan bakteri patogen, dengan demikian *Strain* probiotik harus mencapai usus dalam keadaan hidup dalam jumlah yang cukup (Gaggia, 2010).

Sampai sekarang konsep tentang probiotik didasarkan pada terbentuknya kolonisasi mikroba menguntungkan yang masuk kedalam saluran pencernaan, mencegah perkembangan bakteri patogen, menetralkan racun pada saluran pencernaan, mengatur aktifitas enzim bakteri tertentu dan menguatkan pengaruh substansi yang merangsang sintesis antibodi pada sistem kekebalan (Cruywagen, 2001).

Pemeliharaan broiler dengan menggunakan antibiotik dan probiotik dalam campuran pakan akan memberikan kualitas baik dalam daging ayam. Hal tersebut disebabkan antibiotik dan probiotik yang diberikan dapat disekresikan dengan sempurna sehingga sudah tidak terdapat lagi residu yang disimpan dalam daging broiler. Antibiotik yang sering dicampur ke dalam pakan adalah

Bacitracin, kuramicin, higromicin, kolistin, kiamisin, spiramisin, tiamulin, virginiamisin, aviamisin, flavomisin dan tetrasiklin (Direktorat Jenderal Peternakan, 2018).

Masyarakat menyadari bahwa konsumsi daging broiler dengan kualitas baik sesuai standar aman, sehat, utuh, dan halal sangat diperlukan tubuh. Broiler yang aman adalah menggunakan bahan antimikroba yang bisa ditambahkan ke dalam ransum serta tidak menimbulkan residu pada daging ayam broiler. Penambahan zat aditif pada ransum memiliki respon lebih cepat bila dibandingkan dengan menggunakan suntik pada broiler. Salah satu bahan yang ditambahkan dalam ransum adalah antibiotik dan probiotik (Brooks, 2003).

Berdasarkan uraian tersebut maka perlu diadakannya suatu penelitian terhadap penggunaan pakan adiktif yaitu penggunaan antibiotik yang dicampur dengan probiotik pada pakan untuk mengetahui daya cerna protein pada broiler.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh pemberian antibiotik dan probiotik terhadap daya cerna protein pada broiler?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemberian antibiotik dan probiotik terhadap daya cerna protein pada broiler.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengetahuan tambahan masyarakat mengenai manfaat antibiotik dan probiotik sebagai pakan aditif yang dapat menekan laju pertumbuhan pada broiler.
2. Sebagai data dasar atau referensi bagi mahasiswa peneliti dan lainnya untuk melakukan penelitian lanjutan tentang manfaat antibiotik dan probiotik.
3. Menjadi dasar untuk pengambilan kebijakan bagi perusahaan peternakan broiler di perusahaan sehingga dapat merapkan tambahan pakan antibiotik dan probiotik bagi broiler agar kualitas daging yang di jual semakin meningkat.

E. Defenisi Oprasional

1. *Broiler* adalah istilah untuk menyebutkan *strain* hasil budidaya teknologi yang memiliki karakteristik ekonomis dengan ciri khas yaitu pertumbuhan yang cepat, broiler juga termasuk unggas dari hasil persilangan dari bangsa-bangsa ayam yang memiliki daya produktivitas tinggi, terutama dalam memproduksi daging.
2. Protein merupakan bagian bahan makanan yang mengandung persenyawaan nitrogen yang disusun oleh asam-asam amino esensial dan non esensial. Protein berfungsi sebagai bahan pembangun dan pengganti

jaringan tubuh yang rusak, bahan baku pembuatan enzim, hormon dan zat kekebalan atau antibodi, serta mengatur metabolisme sel.

3. Daya cerna adalah jumlah zat makanan dari suatu bahan pakan yang diserap dalam traktus gastrointestinalis.
4. Antibiotik adalah zat kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme hidup secara sintesis kimia dengan konsentrasi rendah mempunyai kemampuan menghambat bahkan membunuh mikroorganisme lain.
5. Probiotik adalah mikrobial hidup berupa kultur tunggal atau campuran yang diberikan untuk menjaga keseimbangan mikrobial di dalam saluran pencernaan dan memperbaiki sifat dari mikrobial indigenous yang bermanfaat bagi inang.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah menganalisis pengaruh antibiotik dan probiotik terhadap daya cerna protein pada broiler.

G. Hipotesis

Diduga bahwa pemberian kombinasi antibiotik dan probiotik dalam pakan dapat meningkatkan daya cerna protein.

H. Kajian Terdahulu

Penelitian Murwani (2008), dalam penelitiannya menunjukkan berbagai spesies bakteri pembentuk spora seperti *Bacillus* telah digunakan sebagai probiotik untuk hewan dan manusia. Isolasi dari saluran pencernaan ayam menghasilkan beberapa spesies *Bacillus* yang teridentifikasi diantaranya *Bacillus subtilis*, *Bacillus pumilus*, *Bacillus licheniformis*, *Bacillus clausii*, *Bacillus*

megaterium, *Bacillus firmus* dan spesies dari kelompok *Bacillus cereus*. *Bacillus subtilis* merupakan *Strain* yang menunjukkan sifat sebagai probiotik.

Penelitian Andriani (2010), menunjukkan bahwa penambahan antibiotik dan probiotik pada pakan pencernaan protein dapat dicerna atau diserap dalam tubuh pada ternak dapat meningkatkan pertumbuhan, memperbaiki konversi pakan dan menjaga status kesehatan.

Penelitian Halimnatsir (2006), menunjukkan bahwa menggunakan probiotik cair dengan dosis yaitu sebanyak 0,1%/1 liter air perhari dan ada pengaruh.

Penelitian Dhika (2005), menunjukkan bahwa dosis penggunaan probiotik dan prebiotik dengan dosis 1 ml dapat meningkatkan daya cerna dan akhirnya dapat meningkatkan pertambahan bobot badan ayam pedaging.

Penelitian Wahyono (2002), menunjukkan bahwa penambahan kultur bakteri yang berperan sebagai probiotik, dapat menstimulasi sintesis enzim pencernaan sehingga meningkatkan utilisasi nutrisi. Penelitian ini menunjukkan berbagai spesies bakteri pembentuk spora seperti *Bacillus* telah digunakan sebagai probiotik untuk hewan dan manusia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Integrasi

1. Tinjauan Al-Qur'an Tentang Unggas

Allah menciptakan binatang ternak seperti unggas bukan tanpa maksud dan tujuan. Hal ini semata-mata untuk kepentingan umat manusia karena pada binatang ternak terdapat banyak manfaat yang dapat diambil dan digunakan untuk kebutuhan dan kelangsungan hidup manusia dan binatang ternak juga seperti unggas termasuk binatang yang dipelihara secara intensif atau dikandangkan agar mudah dikontrol (Departemen Agama, 2002).

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nahl/16:5 yang berbunyi:

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

Terjemahnya:

“Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan”.

Maksud dari ayat diatas adalah bahwa Allah SWT telah menciptakan segala sesuatu termaksud di dalamnya binatang ternak serta hasil ikutanya dengan memiliki manfaat masing-masing dan memerintah agar sahnya kita menggunakannya atau memanfaatkanya dengan sebaik mungkin sebab ternak juga termasuk makhluk hidup yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia (Shihab, 2002).

Allah swt juga berfirman dalam Q.S. Al-An'am/6:142 yang berbunyi:

وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرَشَاتٌ ۚ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتَ
الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٤٢﴾

Terjemahnya:

“Dan di antara hewan ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang untuk disembelih. makanlah dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.” (Kementrian Agama RI, 2012).

Maksud dari ayat diatas adalah bahwa Dijelaskan dalam ayat ini bahwa sedikitnya ada dua fungsi pada binatang ternak yaitu pertama binatang ternak sebagai alat angkut atau alat transportasi (Hamulatan) seperti kuda, sapi, dan keledai. Fungsi yang kedua yaitu binatang ternak sebagai bahan makanan (Farsya). Kata (Farsya) yang dimaknai sebagai ternak-ternak kecil karena tubuhnya hampir menyentuh dengan tanah, dan dapat disembelih yaitu seperti kambing, domba, sapi dan sebagainya (Shihab, 2002).

Sejalan dengan penafsiran yang dikemukakan dalam penjelasan di atas, maka ayam termasuk dalam kategori farsya karena dapat disembelih dan dagingnya dapat dimakan

2. Tinjauan Al-Qur'an Tentang Mikroorganisme

Mikroorganisme merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah yang memberikan manfaat. Diantara banyaknya manfaat salah satu manfaat mikroorganisme dalam bidang peternakan yaitu dijadikan sebagai campuran pakan guna meningkatkan kualitas hasil peternakan. Salah satu produknya adalah

probiotik. Probiotik adalah mikroorganisme yang dapat meningkatkan kapasitas daya cerna sehingga diperoleh zat pakan yang lebih banyak untuk pertumbuhan maupun produksi pada broiler sehingga akan menurunkan pH pada saluran pencernaan dan meningkatkan kapasitas daya serap usus akan zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh semakin meningkat dan pencernaan didalam usus untuk memberikan keseimbangan dalam pertumbuhan pada broiler tersebut (Siswono, 2002). Hal ini dijelaskan pada firman Allah swt dalam QS. An-Nahl/16:8 yang berbunyi:

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Dan (Dia telah menciptakan) kuda, begal dan keledai, agar kamu menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya”(Kementerian Agama RI, 2012).

Maksud dari ayat ini, dalam pandangan islam seluruh makhluk Allah adalah hidup karna dia telah disentuh oleh sang maha hidup yaitu Allah swt, karna itu maka islam menolak benda mati atau hidup dalam fisika modern. Yang dijelaskan oleh Allah dalam surah Q.S. An-nahl/16:8.

Menurut Shihab (2002), dalam kitabnya yang berjudul tafsir al-misbah menjelaskan bahwa tafsir ayat di atas yaitu; ayat di atas menegaskan bahwa: dan disamping bukti-bukti kekuasaan dan limpahan anugerah-Nya, *Allah juga telah menciptakan semua jenis hewan dari air* yang memancar sebagaimana Dia menciptakan tumbuhan dari air tercurah. Lalu Allah menjadikan hewan-hewan itu beraneka ragam jenis, potensi dan fungsinya. Allah menerangkan bahwa Dia

menciptakan apa yang dikehendaki-Nya bukan saja binatang-binatang yang berkaki banyak tetapi mencakup semua binatang berbagai macam bentuk. Ada yang terkecil yang tidak kasat mata itulah yang sering disebut mikroorganisme yang hanya dapat dilihat dengan mikroskop.

Ayat diatas juga menjelaskan semua makhluk yang ada alam semesta ini Allah ciptakan tidak semata-mata hanya untuk melengkapi isi langit dan bumi. Tapi Allah menciptakan segala sesuatu untuk memberikan manfaat bagi semua makhluk-Nya. Manusia diperintahkan untuk menuntut ilmu agar mereka mempelajari segala yang telah Allah ciptakan. Pada masa yang serba canggih seperti saat ini, sering dengan kemajuan teknologi manusia dapat mempelajari manfaat ciptaan Allah dengan mudah. Tidak terkecuali dalam bidang pengolahan bahan makanan agar manusia mendapatkan makanan yang bermanfaat bagi tubuh dalam bentuk yang beraneka ragam. Misalnya pemanfaatan berbagai bakteri menguntungkan atau bakteri asam laktat yaitu probiotik yang dapat dimanfaatkan dalam bidang peternakan.

B. Kajian Teoritis

1. Broiler

Broiler adalah istilah untuk menyebutkan *Strain* hasil budidaya teknologi yang memiliki karakteristik ekonomis dengan ciri khas yaitu pertumbuhan yang cepat, broiler juga termasuk unggas dari hasil persilangan dari bangsa-bangsa ayam yang memiliki daya produktivitas tinggi, terutama dalam memproduksi daging. Itu dikarenakan konversi ransumnya yang baik sehingga dapat dipotong

pada usia relatif muda dan sirkulasi pada pemeliharaan lebih cepat dan efisien serta menghasilkan daging yang berkualitas baik (Murtidjo, 2001).

Strain juga termasuk sekelompok ayam yang dihasilkan oleh perusahaan pembibitan melalui proses pembiakan untuk tujuan ekonomis tertentu. Berbagai *Strain* broiler banyak dipelihara di Indonesia. Contoh *Strain* broiler antara lain CP 707, *Starbro*, *Hybro*, dan *Lohmann strain*. *Lohmann* adalah *Strain* yang diciptakan di Jerman pada 1972. *Strain lohmann* dipilih karena memiliki daya tahan tubuh yang baik dan tempramen yang tenang (Suprijatna, 2005).

Menurut Jayanata dan Harianto (2011), *Day old chick* (DOC) yang berkualitas baik memiliki ciri-ciri berasal dari indukan yang berkualitas, DOC sehat, bebas dari penyakit, aktif bergerak, lincah, tidak terlihat lesu, tubuh gemuk dan berbentuk bulat, berbulu bersih dan mengkilat, mata terlihat tajam dan cerah, lubang anus bersih dan tidak terdapat kotoran, tidak terdapat bekas luka dan tidak cacat, serta bobot tubuh minimal 37 gram atau rata-rata sebesar 40 gram. Dalam pemeliharaannya, DOC sangat membutuhkan keadaan yang steril, sehingga kebersihan kandang harus terjaga saat penerimaan DOC.

Persyaratan mutu bibit ayam broiler atau DOC menurut SNI (2006), yaitu berat DOC per ekor minimal 37 gram dengan kondisi fisik sehat, kaki normal, dapat berdiri tegak, tampak segar dan aktif, tidak dehidrasi, tidak ditemukan kelainan bentuk dan cacat fisik, sekitar pusar dan dubur kering. Warna bulu seragam sesuai dengan warna galur dan kondisi bulu kering dan berkembang serta jaminan kematian DOC maksimal 2 %.

Untuk mewujudkan kemampuan genetik ayam broiler diperlukan pemeliharaan, pencegahan penyakit dan pemberian ransum yang baik maka NRC (1999), membuat patokan kebutuhan nutrisi bagi ayam broiler. Kebutuhan protein untuk umur 0-3 minggu, 3-6 minggu dan 6-8 minggu masing-masing 23%, 20% dan 18% pada tingkat EMP 3200 kkal/kg. Anwar (2014), menyatakan bahwa kandungan protein 22,51% dan energi sebesar 2.813 kkal menghasilkan pertambahan bobot badan, konsumsi, dan konversi yang paling baik.

Neto (2000), menyatakan bahwa dengan pemberian energy sebesar 3.000 kkal dan protein 24% sangat nyata memberikan pertambahan bobot badan dan konversi ransum yang paling baik pada umur 0-21 hari. Tilman (2001), berpendapat bahwa dengan peningkatan pemberian kadar protein dari 20 sampai 25% dapat memperbaiki pertumbuhan dan efisiensi ransum pada umur 4-6 minggu. Hal ini erat kaitannya dengan efisiensi ransum karena semakin dewasa ayam maka nilai efisiensi ransum akan semakin besar. Situasi ini terjadi karena ayam yang semakin berat akan makan lebih banyak ransum untuk menjaga ukuran berat badan, maka dari itu penggunaan protein sebesar 80% untuk menjaga berat badannya yang besar dan 20% untuk pertumbuhan sehingga efisiensi ransumnya menjadi kurang baik (Leeson, 2000).

Energi yang umum digunakan dalam pakan unggas adalah energi metabolisme. Tinggi rendahnya energi metabolisme dalam pakan ternak unggas akan mempengaruhi banyak sedikitnya ayam mengkonsumsi pakan. Pakan yang energinya semakin tinggi semakin sedikit dikonsumsi demikian sebaliknya bila energi pakan rendah akan dikonsumsi semakin banyak untuk memenuhi

kebutuhannya. Energi yang diperlukan sebagai sumber kekuatan untuk hidup dan berproduksi. Kebutuhan energi metabolis ayam pedaging fase *Finisher* sekitar 3200 Kkal/kg pakan (Murtidjo, 2001).

Menurut Wahju (2004), bahwa pakan *Starter* diberikan pada ayam berumur 0-3 minggu, sedangkan ransum *Finisher* dibeikan pada waktu ayam berumur 4 minggu sampai panen. Konsumsi pakan merupakan jumlah pakan yang dimakan dalam jangka tertentu. Pakan yang dikonsumsi ternak digunakan untuk menentukan energi zat nutrisi lain sehingga energi sesuai dengan jumlah protein yang dibutuhkan karena jumlah energi dalam ransum mempengaruhi konsumsi ransum, yang selanjutnya mempengaruhi jumlah protein dapat dilihat pada Tabel 1 mengenai kebutuhan nutrisi broiler (Suprijatna, 2005).

Tabel 1. Kebutuhan Nutrien pada Broiler

Komponen	Fase Pemeliharaan			
	Starter		Finisher	
	1	2*	1	2*
Energi Metabolisme (Kkal/kg)	3200	min. 2900	3200	min. 2900
Protein Kasar (%)	23	min. 19	20	min. 18
Serat Kasar (%)	-	maks. 6,0	-	maks. 6,0
Lemak Kasar (%)	-	maks. 7,4	-	maks. 8,0
Lisin (%)	1,10	min. 1,10	1,10	min. 0,90
Methionin (%)	0,50	min. 0,40	0,38	min. 0,30
Kalsium (Ca) (%)	0,95	0,90-1,20	0,90	0,90-1,20
Fosfor (P) (%)	0,45	min. 0,40	0,35	min. 0,40

Keterangan: 1. National Research Council (NRC) 1994.

2 Badan Standarisasi Nasional 2006.*

2 Badabn Standarisasi Nasional 2006.*

Pada broiler memiliki kebutuhan nutrisi yang berbeda pada fase pertumbuhan dan penggemukannya. Pada fase *Pre-Starter* yaitu umur 0-2 minggu kebutuhan protein yang dikonsumsi ayam broiler lebih besar sedangkan kebutuhan energinya rendah. Hal ini diperlukan guna menunjang pertumbuhannya, jumlah energi memang harus sesuai dengan jumlah protein yang dibutuhkan karena jumlah energi dalam ransum mempengaruhi konsumsi ransum, yang selanjutnya akan mempengaruhi jumlah protein yang dapat masuk ke dalam tubuh ayam. Bila ransum mengandung energi yang rendah, unggas akan mengkonsumsi makanan lebih banyak. Dan bila kandungan energi tinggi unggas akan mengkonsumsi pakan lebih sedikit, karena ayam akan berhenti makan jika kebutuhan energinya sudah terpenuhi (Rasyaf, 2007).

Selanjutnya pada fase *Starter-Grower* umur 2-6 minggu kebutuhan proteinya menurun dan kebutuhan energinya sedikit meningkat, hal ini terjadi karena pada fase ini adalah dimulai fase penggemukan ayam. Pada umur 6 minggu hingga masa panen (fase *Finisher*) kebutuhan proteinya semakin menurun dan kebutuhan energinya meningkat. Pada fase ini daya konsumsi pakan dikurangi dengan energi yang tinggi karena bobot badan ayam telah mencapai perlemakan yang optimum (Rasyaf, 2007).

Konsumsi protein adalah konsumsi zat-zat organik yang mengandung karbon, hidrogen, nitrogen sulfur dan phosphor. Menurut Wahyu (2002), besarnya konsumsi ransum tergantung pada kandungan protein ransum. Gultom (2014) menyatakan bahwa konsumsi protein yang tinggi akan mempengaruhi asupan protein pula ke dalam daging dan asam-asam amino tercukupi di dalam tubuhnya

sehingga metabolisme sel-sel dalam tubuh berlangsung secara normal. Hal ini sesuai dengan pendapat Suhardjo dan Kusharto (2001), yang menyebutkan bahwa asupan protein dipengaruhi oleh jumlah konsumsi ransum. Pakan yang energinya semakin tinggi semakin sedikit dikonsumsi demikian sebaliknya bila energi pakan rendah akan dikonsumsi semakin banyak untuk memenuhi kebutuhannya. Menurut Amrullah (2004), semakin mendekati waktu panen, konsumsi energi tersedia berlebih sehingga ayam dapat menyimpan padatan lemak berlebih dalam jaringan tubuh, yaitu bagian dari subkutan dan abdominal. Massa Protein Daging (MPD) merupakan indikator untuk melihat baik atau buruknya deposisi protein. Asupan protein berperan penting dalam proses deposisi protein melalui sintesis dan degradasi protein. Efisiensi Protein (REP) menentukan tingkat efisiensi seekor tenak dalam mengubah setiap gram protein menjadi sejumlah pertumbuhan bobot badan. Penggunaan protein seoptimal mungkin sangat penting dalam pemeliharaan ayam broiler, oleh karena itu pakan imbuhan sering diberikan pada ternak agar dapat memperbaiki efisiensi penggunaan ransum (Khodijah, 2012).

Menurut Winarno (2000), yang menyatakan bahwa laju pertumbuhan merupakan fungsi dari tingkat nutrisi. Semakin baik tingkat nutrisi yang diberikan maka laju pertumbuhan semakin baik. Efisiensi terhadap pemberian ransum akan berpengaruh nyata terhadap penambahan keuntungan. Untuk itu hendaknya ransum yang digunakan mengandung susunan zat makanan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan, dari ransum tersebut ditambahkan antibiotik dan probiotik sehingga pakan tersebut memiliki kandungan nutrisi yang tinggi yakni kandungan

energi yang tinggi, kualitas protein baik dan kandungan asam amino esensial serta mineral dan vitamin yang cukup.

Mendapatkan bobot badan yang sesuai dengan yang dikehendaki pada waktu yang tepat, maka perlu diperhatikan pakan yang tepat. Kandungan energi pakan yang tepat dengan kebutuhan ayam dapat mempengaruhi konsumsi pakannya, dan ayam jantan memerlukan energi yang lebih banyak dari pada betina, sehingga ayam jantan mengkonsumsi pakan lebih banyak. Menurut Amrullah (2004), ayam pedaging mampu menghasilkan bobot badan 1,5-1,9 kg/ekor. Pada usia 5-6 minggu. Dijelaskan lebih lanjut bahwa ayam broiler pada minggu ke 4 bobot badan 1,480 kg/ekor dengan konversi pakannya adalah 1,431 kg (Fadilah, 2004).

Ransum yang dibutuhkan oleh unggas adalah ransum yang nutrisinya terpenuhi, baik protein, serat, energi metabolis, lemak, kalsium, posphor, dan yang lainnya agar pertumbuhannya maksimal dan seimbang. Kandungan serat kasar dalam ransum yang tinggi mengakibatkan pencernaan protein dalam usus tidak efektif, sehingga protein makanan tidak dapat diserap usus dengan baik. Menurut Anggorodi (2003), semakin tinggi kandungan serat kasar dalam suatu bahan makanan maka semakin rendah daya cerna bahan makanan tersebut, sehingga protein yang terdapat dalam makanan tidak dapat dicerna seluruhnya oleh unggas (Widodo, 2002).

Menurut Tilman (2001) faktor yang mempengaruhi daya cerna pakan diantaranya adalah komposisi zat makanan yaitu serat kasar. Serat kasar yang terlalu tinggi akan mengurangi konsumsi dari nutrien yang tercerna. Konsumsi

serat kasar yang semakin tinggi bukan berarti akan menghasilkan pertumbuhan ternak dan produksi yang lebih baik. Hal ini disebabkan serat kasar bersifat menurunkan daya cerna. Hal ini sejalan dengan Cheeke (2003), yang menyatakan bahwa semakin tinggi kadar serat kasar dalam bahan pakan, semakin cepat pula laju pergerakan zat makanan sehingga dapat diperkirakan bahwa kecernaan zat-zat makanan akan semakin rendah karena untuk mencerna serat kasar diperlukan banyak energi sehingga pada proses mencerna suatu zat makanan didalam usus berjalan optimal, tingginya serat kasar akan mempengaruhi laju pertumbuhan broiler dan daya cerna protein akan menurun sehingga pada proses pencernaan didalam usus tidak stabil.

Bahan pakan jagung memiliki daya cerna paling tinggi, yaitu memiliki presentase KCBK 89,87% karena jagung mengandung bahan kering: 75 – 90 %, serat kasar: 2,0 %, protein kasar: 8,9 %, lemak kasar: 3,5 %. Dilihat dari data kandungan nutrisi jagung tersebut diketahui bahwa jagung memiliki kandungan serat kasar yang sangat sedikit yaitu 2,0% sehingga jagung memiliki daya cerna yang tinggi. Hal ini sama dengan literatur yang ada yaitu jika serat kasar pada suatu bahan pakan itu tinggi akan mengurangi konsumsi dari nutrisi yang tercerna, sehingga jika dibandingkan dengan keempat sampel bahan pakan. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Donald (2002), kecernaan nutrisi ransum dipengaruhi oleh kandungan serat kasar ransum dan persentase protein dalam ransum serta jumlah protein yang dikonsumsi jagung adalah bahan pakan yang memiliki daya cerna paling tinggi karena memiliki kandungan serat kasar yang relatif rendah yaitu 2,0%. Ini membuktikan bahwa bahan pakan jagung memiliki

kualitas yang baik sebagai bahan pakan ayam broiler jika dibandingkan dengan ketiga bahan pakan yang ada yaitu separator, BR 1 dan BKK jika dilihat dari daya cerna yang ada (Cheeke, 2003).

Nilai potensial suatu bahan pakan untuk menyediakan nutrisi tertentu bagi ternak dapat ditentukan dengan analisis kimia namun nilai sebenarnya dari bahan pakan tersebut untuk ternak baru dapat ditentukan setelah diperhitungkan pula kehilangan nutrisi yang tidak terelakkan selama proses pencernaan, absorpsi dan metabolisme. Sebagaimana definisi dari pencernaan bahan pakan yang diekspresikan sebagai proporsi nutrisi yang tidak diekskresikan pada feses yang diasumsikan sebagai nutrisi yang diabsorpsi oleh ternak. Pada umumnya diukur dengan dasar bahan kering dan dalam bentuk koefisien atau persentase. Pengukuran pencernaan suatu bahan pakan ataupun ransum langsung pada ternak sering disebut dengan metode *In vivo*. Berdasarkan praktikum pencernaan unggas, pakan yang diberikan yaitu terdiri dari pakan BP 11, konsentrat dan dedak. Dari ketiga pakan tersebut memiliki kandungan nutrisi yang berbeda-beda, sehingga hasil dari praktikum pencernaan berbeda pula, ini disebabkan karena pemberian pakan pada ayam broiler berbeda kandungan nutrisi antara BP 11, konsentrat dan dedak (Cheeke, 2003).

Sudaryani dan Santosa (2009), menyatakan ayam broiler mampu memproduksi daging secara optimal dengan hanya mengonsumsi pakan dalam jumlah relatif sedikit. Ciri-ciri ayam broiler antara lain; ukuran badan relatif besar, padat, kompak, berdaging penuh, produksi telur rendah, bergerak lamban dan tenang serta lambat dewasa kelamin. Menurut Amrulla (2004),

produktivitas ayam broiler dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain genetik, iklim, nutrisi dan faktor penyakit. Keunggulan ayam broiler akan terbentuk bila didukung oleh lingkungan, karena sifat genetik saja tidak menjamin keunggulan tersebut dapat timbul. Ayam broiler akan nyaman hidup dan memproduksi pada suhu lingkungan 18-21 °C. Sebab pada suhu yang terlalu panas itu akan menyebabkan broiler menjadi stres sehingga akan mempengaruhi proses laju pertumbuhannya. Broiler sangat rentang dengan suhu yang kurang stabil disebabkan, karena broiler merupakan binatang ternak yang sangat sensitif terhadap penyakit.

2. Konsumsi Ransum Broiler

Konsumsi pakan merupakan jumlah pakan yang dimakan dalam jangka waktu tertentu. Pakan yang dikonsumsi ternak digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat nutrisi lain. Konsumsi pakan tiap ekor ternak berbeda-beda. Konsumsi diperhitungkan sebagai jumlah makanan yang dimakan oleh ternak dan bila diberikan *Ad libitum* (Ardana, 2009).

Pemberian pakan pada periode *Starter* pada minggu pertama dilakukan secara *Ad libitum* yaitu pemberian pakan secara terus-menerus. Pemberian pakan ini dilakukan sesering mungkin dengan jumlah sedikit demi sedikit. Anak ayam pada periode ini masih dalam tahap belajar dan adaptasi dengan lingkungan sehingga pemberian pakan dalam jumlah sedikit demi sedikit dimaksudkan agar tidak banyak terbuang dan tidak tercampur dengan kotoran ayam sehingga pada saat anak ayam mengkonsumsi makanannya akan lebih

mudah masuk didalam pencernaanya sehingga pakan yang dikonsumsi mudah tercerna dan tidak tercemar kotoran (Fadilah, 2004).

Tabel 2. Konsumsi Ransum Ayam Broiler *Strain Ross*

Minggu	Konsumsi Pakan (g/ekor)
Minggu 1	139
Minggu 2	462
Minggu 3	1024
Minggu 4	1849
Minggu 5	2877

Sumber: Bell dan Weaver (2002).

Menurut Bell dan Weaver (2002), menyatakan bahwa tujuan ayam broiler mengkonsumsi ransum adalah untuk memenuhi berbagai kebutuhan, seperti untuk hidup pokok, pertumbuhan, dan produksi. Peningkatan konsumsi ransum ayam broiler berbanding lurus dengan penambahan bobot badan yang dihasilkan. Menurut NRC (1999), konsumsi ransum dipengaruhi oleh besar tubuh ayam, kualitas dan kuantitas ransum, aktivitas sehari-hari, dan suhu lingkungan. Wahju (2004) menambahkan bahwa besar dan bangsa ayam, temperatur lingkungan, tahap produksi, dan energi dalam ransum dapat mempengaruhi konsumsi ransum ayam broiler. Kelebihan energi dalam ransum akan berakibat pada konsumsi ransum yang rendah sehingga menurunkan konsumsi protein yang diperlukan untuk pertumbuhan optimum atau produksi. Ransum yang tinggi kandungan energinya harus diimbangi dengan protein, vitamin dan mineral yang cukup agar ayam broiler tidak mengalami defisiensi protein, vitamin dan mineral.

3. Protein (Parameter)

Protein merupakan bagian bahan makanan yang mengandung persenyawaan nitrogen yang disusun oleh asam-asam amino esensial dan non esensial. Protein juga merupakan salah satu zat gizi yang esensial bagi keperluan tubuh unggas. Protein berfungsi sebagai bahan pembangun dan pengganti jaringan tubuh yang rusak, bahan baku pembuatan enzim, hormon dan zat kekebalan atau antibodi, serta mengatur metabolisme sel. Bahan makanan sumber protein dapat dikelompokkan kedalam dua kelompok yaitu sumber protein hewani dan nabati. Nilai protein yang berasal dari hewan memiliki nilai yang lebih tinggi dari pada nilai protein yang berasal dari sumber nabati. Hal ini dikarenakan bahan makanan yang berasal dari hewan jauh lebih mengandung semua asam amino esensial dalam jumlah yang cukup (Christiyanto, 2009).

Menurut Tillman (2001), yang menyatakan bahwa fungsi protein untuk hidup pokok, pertumbuhan jaringan baru, memperbaiki jaringan rusak, metabolisme untuk energi dan produksi Molekul protein adalah sebuah polimer dari asam-asam amino yang digabung dalam ikatan peptida. Kecernaan protein kasar tergantung pada kandungan protein di dalam ransum. Ransum yang kandungan proteinnya rendah, umumnya mempunyai pencernaan yang rendah pula dan sebaliknya. Tinggi rendahnya pencernaan protein tergantung pada kandungan protein bahan pakan dan banyaknya protein yang masuk dalam saluran pencernaan.

Jumlah protein yang dikonsumsi berbanding lurus dengan jumlah pakan yang dikonsumsi. Makin tinggi jumlah pakan yang dikonsumsi makin tinggi pula jumlah protein yang dikonsumsi, dan sebaliknya. Hal ini disebabkan karena persentase protein dari empat jenis pakan perlakuan yang digunakan pada penelitian ini sama, yaitu 6%. Namun, tingginya jumlah pakan yang dikonsumsi belum menjamin protein dapat diserap dan dimanfaatkan oleh tubuh secara maksimal, karena sebagian dari protein yang dikonsumsi akan dikeluarkan lagi melalui feses (Supriyati, 2001). Menurut Wahju (2004), yang menyatakan bahwa daya cerna protein unggas berkisar antara 70-85%. Daya cerna protein menggambarkan seberapa besar protein yang digunakan oleh tubuh dalam proses pencernaan, baik untuk memenuhi kebutuhan.

Kebutuhan protein selalu diimbangi oleh kebutuhan energi dan variasi kebutuhan protein dengan energi ditentukan oleh kandungan, ketersediaan dan pencernaan asam amino serta jenis dan variasi mutu bahan baku. Hasil penelitian Supriyati (2001), menunjukkan bahwa perbedaan kebutuhan protein pada ayam, disebabkan oleh perbedaan komposisi pakan, baik dari bahan baku, imbangannya asam amino, maupun energi. Jumlah pakan yang dikonsumsi mengikuti jumlah protein yang dimakan untuk memenuhi kebutuhan energi, namun bila protein yang dikonsumsi melebihi kebutuhan akan menyebabkan nilai lebih rendah pada ayam kampung sehingga pada ayam broiler membutuhkan protein yang cukup.

Pada broiler kebutuhan protein sangatlah dibutuhkan dalam tubuhnya, sebab protein sangatlah penting untuk memperbaiki jaringan yang hilang. Kekurangan protein dalam tubuh akan mengakibatkan hewan tidak mampu membuat dan memelihara jaringan tubuhnya sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan. Maka dari itu pemberian pakan harus dapat menjamin bahwa kandungan proteinya cukup untuk keperluan pertumbuhan pada broiler mulai dari *Starter* sampai *Finisher*, sehingga broiler tersebut akan memiliki bobot badan yang diinginkan ketika kebutuhan nutrisinya terpenuhi dan nutrisi itu di dapat dari ransum dan air minum pada broiler, ransum tersebut sudah terdapat didalamnya kandungan nutrisi (Triakson, 2002).

Kelengkapan zat makanan merupakan hal yang penting dalam penyusunan ransum. Salah satu zat makanan yang penting bagi pertumbuhan ternak adalah protein, karena bila ternak kekurangan portein maka pertumbuhannya terganggu. Kebutuhan protein ayam pada setiap periode pemeliharaan berbeda-beda. Ayam kampung memiliki kebutuhan protein yang sedikit jika dibandingkan dengan ayam pedaging. Pada ayam pedaging periode *Starter* umur 0–3 minggu memerlukan energi metabolis sebesar 3080 Kkal dengan protein antara 23–24%. Sedangkan pada ayam fase *Finisher* umur 3–6 minggu memerlukan energi energi metabolis sebesar 3080–3190 kkal dan protein antara 19–21% (Wahju, 2004). Sedangkan ayam kampung fase *Starter* (0-4 minggu) membutuhkan protein sekitar 19-20% dengan energi metabolis sebesar 2850 kkal/kg, fase *Grower* I memerlukan protein sekitar 18-19%, energi 2.900 kkal/kg, dan pada fase

Grower II energi metabolis sekitar 3000 kkal/kg dengan protein sebesar 16-18% (Nawawi, 2011).

Kebutuhan protein dan energi metabolisme ayam broiler pada berbagai periode pertumbuhan dilihat pada tabel 2.

Tabel 3. Jenis-jenis Pakan Berdasarkan Kandungan Nutrisi

Jenis pakan	Lama pemberian	Protein (%)	Energi metabolisme (kkal/kg pakan)
Prastarter	1-7 hari	23-24	3.050
Starter	8-28 hari	21-22	3.100
Finisher	29- panen	18-20	3.200-3300

Sumber: Santoso dan Sudaryani (2009).

Energi metabolisme yang diperlukan ayam broiler berbeda-beda , sesuai tingkat umurnya, jenis kelamin dan cuaca. Semakin tua ayam membutuhkan energi metabolisme lebih tinggi (Fadilah, 2004). Menurut Wahyu (2002), energi yang dikonsumsi oleh ayam broiler umumnya digunakan untuk pertumbuhan jaringan tubuh, produksi, menyelenggarakan aktivitas fisik dan mempertahankan temperature tubuh yang normal. Fadilah (2004), menyatakan bahwa kebutuhan energi untuk ayam broiler periode *Starter* 3080 kkal/kg ransum pada tingkat protein 24%, sedangkan periode *Finisher* 3190 kkal/kg ransum pada tingkat protein 21%.

Angka kebutuhan energi yang absolut tidak ada, karena ayam broiler dapat menyesuaikan jumlah ransum yang dikonsumsi dengan kebutuhan energi bagi tubuhnya (Rizal, 2006). Menurut Fadilah (2004), kandungan protein dalam ransum untuk ayam broiler umur 1-14 hari adalah 24% dan untuk umur 14-39 hari adalah 21%. Kebutuhan protein untuk ayam broiler yang sedang bertumbuh relatif

lebih tinggi karena untuk memenuhi tiga macam kebutuhan yaitu untuk pertumbuhan jaringan, hidup pokok dan pertumbuhan bulu (Wahyu, 2002). Rasyaf (2007), menyatakan bahwa kebutuhan energi metabolis berhubungan erat dengan kebutuhan protein yang mempunyai peranan penting pada pertumbuhan ayam broiler selama masa pertumbuhan. (Sudaro dan Siriwa, 2007), menyatakan bahwa penggunaan serat kasar dalam ransum ayam broiler adalah sebesar 5%.

Amrullah (2004), menyatakan bahwa tingkat rasio energi-protein yang lebih tinggi dari kebutuhan dapat membentuk lemak selama akhir pemeliharaan. Frekuensi atau waktu pemberian ransum pada anak ayam biasanya lebih sering, sampai 5 kali sehari dan semakin tua ayam frekuensi pemberian ransum semakin berkurang sampai dua atau tiga kali sehari. Namun, yang perlu mendapat perhatian dari segi waktu ini adalah ketepatan waktu pemberian ransum setiap harinya perlu dipertahankan karena pemberian ransum pada waktu yang tidak tepat setiap hari dapat menurunkan produksi (Rizal, 2006). Ransum juga dapat diberikan dengan cara terbatas pada waktu-waktu tertentu dan disesuaikan dengan kebutuhan ayam, misalnya pagi dan sore. Saat diberikan biasanya ayam dalam keadaan lapar sehingga ransum tidak banyak terbuang (Sudaro dan Siriwa, 2007).

Menurut Fadilah (2004), kandungan protein dalam ransum untuk ayam broiler umur 1-14 hari adalah 24% dan untuk umur 14-39 hari adalah 21%. Kebutuhan protein untuk ayam yang sedang dalam pertumbuhan relatif lebih tinggi karena untuk memenuhi tiga macam kebutuhan yaitu untuk pertumbuhan jaringan, hidup pokok dan pertumbuhan bulu sehingga kebutuhan energi metabolis berhubungan erat dengan kebutuhan protein yang mempunyai peranan

penting pada pertumbuhan ayam broiler selama masa pertumbuhan. Maka dari itu protein perlu dihidrolisis menjadi asam-asam amino oleh enzim pencernaan (Wahyu, 2002).

Menurut Linton dan Abrams (1990), yang menyatakan bahwa kecernaan protein adalah bagian protein dalam bahan makanan ternak yang dapat dicerna atau diserap dalam tubuh. Sebab mutu nutrisi protein yang diberikan sangat tergantung dari kandungan asam- asam amino esensialnya dan daya cerna. Protein yang masuk ke dalam tubuh tidak seluruhnya dapat dicerna. Protein umumnya tidak sempurna dicerna karena protein dilindungi oleh pelindung selulosa dan polisakarida. Hal tersebut menyebabkan protein harus dikonsumsi jauh lebih besar untuk memenuhi kebutuhan harian minimum seluruh asam amino. Protein hewani dapat dihidrolisis hampir sempurna menjadi asam-asam amino dikarenakan jumlah nutrisi yang terkandung dalam protein hewani jauh lebih lengkap dan lebih mudah dicerna dibandingkan dengan protein nabati.

Pemanfaatan protein oleh tubuh dimulai dari pencernaan yang bergantung pada hidrolisis ikatan protein (ikatan peptida). Ikatan peptida pada protein dapat terputus oleh hadirnya pemanasan dan enzim proteolitik seperti tripsin dan kimotripsin. Lehninger (1994), menjelaskan bahwa enzim-enzim yang terlibat dalam pencernaan protein dalam tubuh manusia yaitu *Pepsin*, *Tripsin*, *Kimotripsin*, *Karboksi peptidase*, dan *Amino peptidase*. *Pepsin* merupakan enzim yang dihasilkan oleh lambung yang berperan dalam hidrolisis protein menjadi asam-asam amino penyusunnya. Asam-asam amino bebas diperoleh

sebanyak 30% dari protein yang dirombak dan diserap langsung melalui mukosa usus. Asam-asam amino dari suatu makanan yang dapat diserap tubuh terbatas pada asam amino dengan jumlah yang paling rendah. Asam amino lain yang terkandung berlebih akan dideaminasi dalam hati dan diubah menjadi glikogen atau lemak atau dibakar sebagai bahan bakar. Protein nabati tertentu dapat saling melengkapi dalam makanan seperti campuran jagung dan kacang dengan saling menambahkan asam amino *Triptofan*.

Protein yang dihidrolisis dengan enzim akan menghasilkan produk bertekstur yang integritas strukturnya mudah lepas bila dipanaskan. Hal ini menunjukkan efek yang merugikan bagi tekstur suatu produk dengan ukuran molekul yang diperkecil. Protein dengan bobot molekul lebih rendah menghasilkan hasil ekstrusi dengan kualitas tekstur yang jelek, hal ini dapat diakibatkan bila bahan tersebut mengalami pemotongan mekanik berlebihan selama berada di dalam ulir atau cetakan. Peningkatan konsentrasi protein akan mempermudah pembentukan tekstur dan memperbanyak ikatan silang. Molekul-molekul karbohidrat yang rusak akibat pemanasan dan kelembaban yang rendah kurang bersifat kohesif dibandingkan karbohidrat yang tergelatinisasi yang tidak rusak. Hal ini menyebabkan molekul- molekul itu kurang mengembang sehingga menghasilkan produk berpori-pori lebih kecil, tekstur lebih lunak, lebih mudah larut dan lengket bila dikonsumsi (Muchtadi, 2000).

Penentuan daya cerna protein dapat dilakukan dengan cara *In vitro*. Metode ini dilakukan dengan menggunakan enzim-enzim pencernaan. Enzim-enzim tersebut diantaranya pepsin, pankreatin, tripsin, kemotripsin, peptidase, dan

multi enzim (Muchtadi, 2000). Penggunaan enzim-enzim tersebut akan menghasilkan koefisien daya cerna protein setiap bahan berbeda. Metode *In vitro* dapat memperkirakan pencernaan pada tubuh manusia atau kondisi biologis yang sebenarnya (Suhardjo dan Kusharto, 2001).

Untuk mengetahui pencernaan protein pada unggas dibutuhkan teknik khusus karena feses dan urin dikeluarkan secara bersamaan sehingga menyebabkan bercampurnya urin dan feses. Hal tersebut menurut Muchhtadi (2000), yang menyatakan bahwa pemisahan urin dalam feses secara kimia atau dilakukan pembedahan untuk koleksi sampel dari usus besar. Metode ini yaitu dengan cara broiler yang sudah siap panen atau umur sudah sampai 35 hari di bedah untuk diambil ususnya untuk koleksi sampel dari usus besar. Metode pengambilan sampel dari usus besar dilakukan dengan asumsi bahwa pencernaan dan penyerapan telah terjadi pada usus besar.

Protein kasar bukan merupakan protein yang sesungguhnya tetapi merupakan fraksi yang terbentuk dari nitrogen yang dipisahkan dari sumber protein. Kualitas protein pakan dinyatakan tinggi atau rendah, tergantung dari keseimbangan asam amino essensial yang terkandung dalam pakan tersebut. Asam amino akan dimanfaatkan oleh mikroba untuk memperbanyak diri. Meningkatnya jumlah koloni mikroba selama proses fermentasi secara tidak langsung dapat meningkatkan kandungan protein kasar karena mikroba merupakan sumber protein tunggal, mikroba rumen yang telah mati tersebut akan memberikan pasokan protein yang cukup besar pada ternak jika dicerna dalam usus halus (Wuryantoro, 2000).

Kecernaan suatu bahan pakan merupakan cermin dari tinggi rendahnya nilai manfaat dari bahan pakan tersebut. Apabila kecernaannya rendah maka nilai manfaatnya juga rendah, sebaliknya apa bila kecernaannya tinggi maka nilai manfaatnya juga tinggi. Pengukuran nilai kecernaan suatu bahan pakan atau ransum dapat dilakukan secara langsung pada ternak unggas. Pengukuran kecernaan adalah suatu usaha untuk menentukan jumlah zat yang dapat diserap oleh saluran pencernaan, dengan cara mengukur jumlah pakan yang dikonsumsi dan jumlah makanan yang dikeluarkan melalui feses (Muchhtadi, 2000).

4. Daya Cerna

Daya cerna dapat diartikan sebagai jumlah zat makanan dari suatu bahan pakan yang diserap dalam traktus gastrointestinal. Hal tersebut menyangkut proses pencernaan yaitu hidrolisa untuk membebaskan zat-zat makanan dalam suatu bentuk tertentu sehingga dapat diserap usus. Daya cerna dapat ditentukan dengan mengukur secara teliti bahan pakan yang dikonsumsi dan feses yang dikeluarkan. Dari pengukuran yang didukung dengan analisis kimiawi zat makanan, maka dapat dihitung daya cernanya (Muchhtadi, 2000).

Pengukuran kecernaan atau nilai cerna suatu bahan pakan adalah usaha menentukan jumlah nutrien dari suatu bahan pakan yang didegradasi dan diserap dalam saluran pencernaan. Daya cerna juga merupakan presentasi nutrisi yang diserap dalam saluran pencernaan yang hasilnya akan diketahui dengan melihat selisih antara jumlah nutrisi yang dimakan dan jumlah nutrien yang dikeluarkan dalam feses. Nutrisi yang tidak terdapat dalam feses inilah yang diasumsikan sebagai nilai yang dicerna dan diserap (Suhardjo dan Kusharto, 2001).

Feses ayam merupakan salah satu sumber pencemaran antara lain udara, tanah dan pencemaran badan air serta polusi bau dan meningkatkan perkembangan lalat atau nyamuk. Walaupun demikian, feses ayam dapat dimanfaatkan sebagai sumber pakan unggas setelah mengalami pengolahan (Jamila, 2008).

Upaya peningkatan pemenuhan nutrient unggas dapat dilakukan melalui pembuatan pakan yang berasal dari kotoran ternak khususnya feses ayam sekaligus sebagai salah satu usaha untuk meminimalisasi limbah ternak. Penggunaan feses ayam sebagai pakan dapat mengurangi biaya pemeliharaan ternak unggas karena tidak perlu dibeli dan biaya pengolahannya tidak mahal. Biaya pakan mencapai 60 –80 % dari biaya pemeliharaan ternak unggas (Jamila, 2008).

Salah satu teknologi yang dapat membantu dalam meningkatkan kualitas feses ayam adalah melakukan fermentasi dengan penambahan bakteri *Lactobacillus sp.* Proses fermentasi dapat meningkatkan kandungan protein kasar feses ayam tapi tidak berpengaruh nyata pada kandungan serat kasar feses ayam tersebut (Jamila, 2008). Kandungan lemak kasar, BETN, calcium dan fosfor sangat berpengaruh terhadap kualitas nutrisi dari bahan pakan. Hasil penelitian Mercedes (2008) menyatakan bahwa penambahan *Lactobacillus sp* sebanyak 0.2% kedalam ransum broiler dapat meningkatkan secara signifikan pertambahan berat badan dan konversi pakan dari ayam broiler, oleh karena itu perlu diteliti apakah fermentasi feses ayam dengan campuran bakteri *Lactobacillus sp* akan

berpengaruh terhadap kandungan lemak kasar, BETN, kalsium dan fosfor pada bahan pakan khususnya feses ayam.

Untuk menentukan pencernaan suatu pakan maka harus diketahui jumlah nutrisi yang terdapat di dalam pakan dan jumlah nutrisi yang dicerna. Jumlah nutrisi yang terdapat di dalam pakan dapat dicari dengan analisis kimia, sedang jumlah nutrisi yang dicerna dapat dicari bila pakan telah mengalami proses pencernaan. Untuk mengetahuinya, terlebih dahulu dilakukan analisis secara biologis yang kemudian diikuti dengan analisis kimia untuk mengetahui nutrisi yang terdapat di dalam feses. Diketuainya jumlah nutrisi di dalam pakan dan jumlah nutrisi di dalam feses maka dapat diketahui jumlah nutrisi tercerna dari pakan tersebut (Suhardjo dan Kusharto, 2001).

Potensi suatu bahan pakan dalam menyediakan zat makanan bagi ternak dapat ditentukan melalui analisis kimia. Namun, sayangnya potensi bahan pakan tersebut tidak semuanya dapat dimanfaatkan, karena nilai sesungguhnya bahan pakan dicerminkan dari bagian yang hilang setelah melalui proses pencernaan, penyerapan dan metabolisme. Oleh karenanya bagian bahan pakan maupun zat makanan yang hilang setelah pencernaan urgen sifatnya untuk diketahui.

Bagian yang hilang dapat ditentukan secara langsung yaitu kehilangan secara langsung yaitu kehilangan karena pencernaan (*Digestion*). Istilah pencernaan atau daya cerna (*Digestibility*) didefinisikan sebagai bagian zat makanan dari bahan pakan yang tidak diekresikan dalam feses atau dengan asumsi bahwa zat makanan yang terdapat dalam feses adalah habis dicerna dan diserap. Pencernaan pakan adalah peubah fisik dan kimiawi yang dialami bahan pakan didalam alat

pencernaan. Kecernaan pakan merupakan jumlah pakan yang diabsorpsi oleh saluran pencernaan dan tidak diekskresikan didalam feses (Donald, 2002).

Kecernaan ada dua macam, yaitu kecernaan sesungguhnya (*True digestibility*) dan kecernaan semu (*Apparent digestibility*). Kecernaan sesungguhnya memperhitungkan material bukan bahan pakan yang ada di dalam feses seperti mukosa usus, enzim dan bakteri. Sedangkan kecernaan semu menganggap semua nutrisi yang ada di dalam feses berasal dari bahan pakan yang tidak tercerna (Abun, 2007).

Kecernaan ransum dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk menilai suatu bahan ransum (Abun, 2007). Kecernaan ransum dipengaruhi oleh jenis ternak, jenis bahan ransum, jumlah ransum dan kandungan nutrisi (Lubis, 1992). Faktor lain yang mempengaruhi kecernaan adalah suhu, laju perjalanan ransum melalui pencernaan, bentuk fisik dari bahan ransum dan komposisi ransumnya (Anggorodi, 1990).

Potensi suatu bahan pakan dalam menyediakan zat makanan bagi ternak dapat ditentukan melalui analisis kimia. Namun, sayangnya potensi bahan pakan tersebut tidak semuanya dapat dimanfaatkan, karena nilai sesungguhnya bahan pakan dicerminkan dari bagian yang hilang setelah melalui proses pencernaan, penyerapan dan metabolisme. Oleh karenanya bagian bahan pakan maupun zat makanan yang hilang setelah pencernaan urgen sifatnya untuk diketahui proses pencernaannya (Muchtadi, 2000).

Bagian yang hilang dapat ditentukan secara langsung yaitu kehilangan secara langsung yaitu kehilangan karena pencernaan (*Digestion*). Istilah kecernaan

atau daya cerna (*Digestibility*) didefinisikan sebagai bagian zat makanan dari bahan pakan yang tidak dieksresikan dalam feses atau dengan asumsi bahwa zat makanan yang terdapat dalam feses adalah habis dicerna dan diserap (Wahyu, 2002).

Menurut Williamson (1993), yang menyatakan bahwa pengukuran pencernaan dapat dilakukan secara *In vitro* dan *In vivo*. Pengukuran pencernaan secara *In vitro* dilakukan dengan membuat suasana seperti yang terjadi dalam saluran pencernaan ternak di laboratorium. Pengukuran secara *In vivo* terdiri dari 2 periode yaitu periode pendahuluan dan periode total koleksi. Periode pendahuluan digunakan untuk membiasakan ternak dengan ransum perlakuan dan kondisi lingkungan yang baru serta menghilangkan sisa ransum waktu sebelumnya. Periode total koleksi adalah periode pengumpulan ekskreta sampai akhir percobaan yang kemudian dikeringkan dan dianalisis (Tillman, 2001).

Jalur pengeluaran feses dan urin pada unggas menjadi satu sehingga koleksi feses dan urin dilakukan secara bersamaan sebagai koleksi ekskreta. Pengukuran pencernaan pada unggas dapat ditambahkan suatu indikator ke dalam ransum. Metode indikator merupakan pengukuran pencernaan dengan menggunakan senyawa yang tidak dapat dicerna oleh saluran pencernaan unggas seperti krom oksida, methylene blue, karmine dan barium sulfat yang ditambah ke dalam ransum (Wahju, 2004).

Pengukuran pencernaan pada ternak secara langsung tidak akan terlepas dari konsumsi pakan itu sendiri. Secara langsung pencernaan bahan pakan

tergantung pada kondisi fisiologis ternak yang sangat ditentukan oleh ketersediaan dan kemampuan ternak untuk mengkonsumsi pakan (Wahyu, 2002).

Menurut Donald (2002), menyatakan bahwa tinggi rendahnya pencernaan bahan pakan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain jenis ternak, macam bahan pakan dalam ransum, kandungan protein kasar, level pemberian ransum dan cara penyediaan ransum. Hal ini menunjukkan bahwa penyediaan ransum pada ternak broiler pada penelitian tersebut itu dalam bentuk mesh sehingga pakan tersebut tidak menyatu semua dan pada saat ternak mematak makanannya itu hanya sebagian bahan pakan yang dikonsumsi dan menyebabkan tingkat palatabilitas broiler yang rendah sehingga menyebabkan pertumbuhan yang kurang optimal. Palatabilitas merupakan sifat performansi bahan pakan sebagai akibat dari keadaan fisik dan kimiawi yang dimiliki oleh bahan pakan tersebut yang dicerminkan oleh sifat organoleptik, seperti kenampakan, bau, rasa dan tekstur.

Menurut Tilman dkk (2001), faktor-faktor yang mempengaruhi daya cerna makanan adalah:

- a. Komposisi makanan, daya cerna makanan berhubungan erat dengan komposisi kimiawi, salah satunya serat kasar yang mempunyai pengaruh yang terbesar. Penambahan serat kasar dalam bahan pakan dapat menurunkan daya cerna.
- b. Keseimbangan protein, jika imbalanced protein dalam pakan menurun akan menyebabkan bahan makanan cepat melewati saluran pencernaan, sehingga menyebabkan turunnya daya cerna dari bahan pakan tersebut.

- c. Perlakuan terhadap pakan, misalnya pemotongan, penggilingan dan pemanasan mempengaruhi daya cerna. Bahan yang digiling untuk pakan unggas memberikan permukaan yang lebih luas terhadap getah pencernaan, sehingga dapat mempengaruhi daya cerna pakan.
- d. Jenis hewan, bahan pakan yang rendah serat kasarnya dapat dicerna dengan baik oleh hewan non-ruminansia dan hewan ruminansia. Tetapi bahan pakan yang tinggi serat kasarnya dicerna lebih baik oleh hewan ruminansia, dibandingkan dengan hewan non-ruminansia.
- e. Jumlah makanan, penambahan jumlah makanan yang dimakan mempercepat arus makanan dalam usus, sehingga mempengaruhi daya cerna.

Jumlah air dalam tembolok juga mempengaruhi Bergeraknya makanan dan daya cerna pakan. Pada keadaan kekurangan air, akan terjadi penurunan kecepatan pencernaan disebabkan makanan yang berada di tembolok akan mengalami penurunan kecepatan untuk mencapai usus halus (Wahyu, 2002).

5. Antibiotik

Antibiotik berasal dari bahasa latin yang terdiri dari anti, lawan, bios, hidup adalah zat kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme hidup secara sintesis kimia dengan konsentrasi rendah mempunyai kemampuan menghambat bahkan membunuh mikroorganisme lain. Antibiotik juga mengalami proses penyerapan dalam saluran pencernaan (Cheeke, 2003).

Antibiotik membantu sistem pencernaan dengan cara membunuh mikroba patogen dalam saluran pencernaan ataupun di tempat sel mukosa usus, akibatnya

mikroorganisme tersebut mati dan luruh dari sel mukosa usus. Konsekuensinya, tempat sel mukosa usus menjadi semakin terbuka (Cheeke, 2003).

Tempat utama aktivitas antibiotik adalah dalam bagian *Gastrointestinal*. Beberapa macam antibiotik yang dapat dicampurkan ke dalam ransum antara lain *Bacitracin*, *Colistin*, *Oxytetracycline*, *Kitasamycin* dan *Spiramycin*. Antibiotik umumnya digunakan sebagai pengobatan terhadap infeksi bakteri, namun demikian penggunaan antibiotik dalam dosis rendah dapat menimbulkan pengaruh pemacu pertumbuhan (*Growth promotor*). Antibiotik dengan dosis rendah juga digunakan untuk meningkatkan performa dan kesehatan saluran pencernaan misalnya *Bambermycin* atau *Flavophospholipol*, sedangkan antibiotik dengan konsentrasi tinggi digunakan untuk pengobatan suatu penyakit atau beberapa penyakit (Bolder, 1999).

Antibiotik dipakai secara luas dalam industri peternakan dengan tujuan untuk pengobatan, tujuan lain pemakaian antibiotika adalah sebagai imbuhan pakan sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ternak. Mekanisme kerja atau fungsi dari imbuhan pakan sangat bermacam macam, antara lain sebagai pengawet, obat cacing, anti koksidia, antijamur, meningkatkan *Palatabilitas*, memperbaiki sistem pencernaan. Intinya pemberian imbuhan pakan mempunyai tujuan meningkatkan efisiensi dalam beternak, dengan cara mempercepat kenaikan bobot badan atau meningkatkan produksiternak sehingga biaya pemeliharaan dapat ditekandan keuntungan dapat diperoleh secara maksimal. Industri peternakan broiler saat ini senantiasa meningkatkan mutu produksinya dengan mengadopsi ilmu dan teknologi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui

bahwa 80% penggunaan antibiotik pada ternak unggas. Industri broiler umumnya menggunakan *Feed additive* berupa antibiotika dengan tujuan meningkatkan produktivitas produk mereka, sehingga produk-produk tersebut terjamin terhindar dari residu yang terdapat dalam pakan yang dimana antibiotik bekerja dalam pencernaan (Bahri, 2005).

Menurut Siswandono dan Soekardjo (2002), cara kerja antibiotik adalah sebagai berikut:

- a. Menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang memproduksi toksin diantaranya menghalangi atau membunuh mikroorganisme yang menimbulkan infeksi subklinis dan yang bersaing dengan induk semang dalam menyediakan nutrisi.
- b. Meningkatkan kapasitas daya serap usus, hal tersebut berdasarkan pada pengamatan bahwa pemberian antibiotik menyebabkan dinding usus menjadi tipis sehingga daya serap usus akan zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh semakin meningkat.

Adapun salah satu antibiotik yang baik untuk broiler yaitu *Zink bacitracin* yang dapat digunakan untuk menghambat pertumbuhan bakteri dengan cara menghambat pembentukan dinding sel bakteri (Parks, 2001). Menurut Parks (2001), juga menyatakan bahwa penggunaan *Zink bacitracin* dapat meningkatkan bobot badan kalkun umur 12 minggu. Penggunaan *Zink bacitracin* sebagai *Feed additive* dapat mengurangi terjadinya peningkatan bakteri patogen dalam saluran pencernaan pada ayam broiler, sehingga dapat membantu proses pertumbuhan pada broiler selama proses pemeliharaan

35 hari. Hal tersebut dipengaruhi juga oleh mekanisme kerja atau fungsi dari imbuhan pakan sangat bermacam macam, antara lain sebagai pengawet, obat cacing, anti koksidia, antijamur, meningkatkan palatabilitas, memperbaiki sistem pencernaan.

Menurut Leeson (2001), yang menyatakan bahwa penggunaan antibiotik memiliki efek antara lain:

- a. Antibiotik dapat mencegah penyakit terutama dalam saluran pencernaan.
- b. Antibiotik dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang menghasilkan amonia dalam jumlah besar.
- c. Antibiotik dapat meningkatkan penyerapan nutrisi (kalsium, fosfor dan magnesium) dan menghambat kerusakan nutrisi (vitamin dan asam amino) oleh mikroorganisme.
- d. Antibiotik dapat meningkatkan kemampuan absorpsi zat makanan dan meningkatkan efisiensi penggunaan ransum.

Pemakaian antibiotik berupa *Zinc bacitracin* dalam bidang peternakan perlu diperhatikan waktu hentinya pemberian antibiotik tersebut, Untuk menghindari adanya residu antibiotik *Zinc Bacitracin*, pemberian antibiotik *Zinc bacitracin* sebaiknya dihentikan 13 hari sebelum ayam dipotong. Hal tersebut dapat menghindarkan residu yang akan masuk dalam daging pada broiler. Maka dari itu pemberian antibiotik harus diberikan dengan dosis yang tepat supaya dapat bekerja secara efektif. Penggunaan antibiotik yang tidak sesuai dosis dapat mengakibatkan resistensi bakteri terhadap antibiotik itu sendiri. Selain itu residu dari antibiotik dapat terbawa dalam produk-produk unggas seperti daging dan

telur yang berbahaya bagi konsumen, ketika terlalu berlebihan pemberian antibiotik tersebut akan mengakibatkan dampak negatif juga pada broiler selain antibiotik terdapat juga probiotik yang berfungsi sebagai perangsang pertumbuhan pada broiler, samalahnya juga dengan antibiotik probiotik juga memiliki dampak negatif ketika penggunaannya berlebihan (Mulyantini, 2010).

FAO/WHO (2010), menetapkan batas maksimum residu (BMR) *Spiramycin* dan *Zink bacitracin* pada produk ternak asal ayam sebesar 0,06 ppm (600 µg/kg) (hati), 0,3 ppm (300 µg/kg) (lemak) dan 0,2 ppm (200 µg/kg) (daging). Nilai BMR tersebut diperhitungkan sebagai penjumlahan konsentrasi antibiotik *Zink bacitracin* dan *Spiramycin* untuk residu dalam daging ayam. Adapun BMR yang diizinkan di Indonesia adalah 0,2 ppm (200 µg/kg) (Dewan Standarisasi Nasional, 2000).

Pemakaian antibiotika dosis kecil dalam pakan untuk memacu pertumbuhan ternak telah dilakukan lebih dari setengah abad yang lalu. Kenyataan menunjukkan bahwa antibiotik dalam dosis yang sangat kecil dapat mempercepat pertumbuhan ternak, sehingga menyebabkan timbulnya kelonggaran dalam memperoleh antibiotik untuk dipergunakan dalam bidang peternakan. Akan tetapi timbulnya kasus resistensi *Salmonella* pada tahun 1960 telah mendorong untuk berpikir tentang kerugian dan keuntungan pemakaian antibiotik dalam bidang peternakan. Pada bulan Juli 1968 dibentuk suatu komisi di Inggris, yang diberi nama Swann Committee, yang bertugas membahas pemakaian antibiotik dalam bidang peternakan (Phillips, 2005).

6. Probiotik

Probiotik didefinisikan sebagai mikrobia hidup berupa kultur tunggal atau campuran yang diberikan untuk menjaga keseimbangan mikrobia di dalam saluran pencernaan dan memperbaiki sifat dari mikrobia indigenus yang bermanfaat bagi inang. Kompiang (2006), menyatakan pemberian probiotik pada ternak dapat meningkatkan pertumbuhan, memperbaiki konversi pakan dan menjaga status kesehatan.

Penggunaan probiotik sebagai bahan pakan tambahan untuk meningkatkan pertambahan bobot badan, konversi pakan dan kesehatan ternak merupakan alternatif yang aman karena aktivitasnya dalam mendukung perkembangan mikroba yang menguntungkan dan menekan pertumbuhan bakteri patogen dalam saluran pencernaan. Dinyatakan pula oleh Seifert dan Gessler (1997), bahwa penggunaan probiotik pada ternak bertujuan untuk memperbaiki kondisi saluran pencernaan dengan menekan reaksi pembentukan racun dan metabolit yang bersifat karsinogenik, merangsang reaksi enzim yang dapat menetralsir senyawa beracun yang tertelan atau dihasilkan oleh saluran pencernaan. Selain itu juga merangsang produksi enzim yang diperlukan untuk mencerna pakan dan memproduksi vitamin serta zat-zat yang tidak terpenuhi dalam pakan. Probiotik juga menghasilkan sejumlah nutrisi penting dalam sistem imun dan metabolisme *Host*, seperti vitamin B (Asam pantotenat), pyridoksin, niasin, asam folat, kobalamin, dan biotin serta antioksidan penting seperti vitamin K (Yu *et al.*, 2008).

Pemberian probiotik pada ternak unggas biasanya diberikan dalam bentuk campuran ransum atau diberikan melalui air minum, atau dalam bentuk probiotik yang hanya mengandung satu macam mikroba saja atau dalam bentuk campuran terdiri dari beberapa mikroba seperti *Probiolac* atau *Protexin*. Beberapa keuntungan dari penggunaan probiotik pada hewan atau ternak antara lain adalah dapat memacu pertumbuhan, memperbaiki konversi ransum, mengontrol kesehatan. Saat ini telah beredar produk probiotik yang mengandung mikroba *Lipolitik*, *Selulolitik*, *Lignolitik*, dan mikroba asam lambung. Beberapa penelitian pada broiler menunjukkan bahwa penambahan probiotik dalam ransum dapat meningkatkan pertambahan bobot badan, menurunkan konversi pakan dan mortalitas. Probiotik dapat mengubah pergerakan pada populasi mikroba di dalam usus halus ayam, sehingga keberadaannya dapat meningkatkan fungsi dan kesehatan usus, memperbaiki *Mikroflora* pada sekum, serta meningkatkan penyerapan zat makanan (Mountzouris, 2010).

Maka dari itu penambahan probiotik kedalam ransum kontrol, akan membantu pencernaan zat-zat makanan yang tidak terpenuhi di usus halus dan menurunkan populasi bakteri pathogen (Diaz, 2008). Penambahan probiotik ke dalam ransum ayam dapat meningkatkan produksi enzim *B-glukanase* di semua segmen saluran pencernaan, menurunkan viskositas digesta dan dapat meningkatkan pertambahan bobot badan (Mountzouris, 2010).

Secara umum manfaat penambahan probiotik adalah membantu sistem pencernaan unggas, agar lebih mudah mencerna dan meningkatkan kapasitas daya cerna sehingga diperoleh zat pakan yang lebih banyak untuk pertumbuhan

maupun produksi. Pada dasarnya ada dua tujuan utama dari penggunaan probiotik pada unggas, yaitu untuk manipulasi mikroorganisme saluran pencernaan bagian anterior (crop, gizzard, dan usus halus) dengan menempatkan *Mikroflora* dari *Strain lactobacillus sp.* untuk meningkatkan daya tahan ternak dari infeksi *Salmonella* (Barrow, 1992). Menurut Suastina (2002), mekanisme kerja probiotik pada saluran pencernaan ternak unggas adalah menetralkan racun, menekan populasi bakteri tertentu yang tidak dikehendaki sebagai anti bakteri atau berkompetisi di dalam saluran pencernaan, dan meningkatkan kekebalan tubuh.

Hal ini sejalan dengan penelitian Siswandono dan Soekardjo (2002), yang menyatakan bahwa dengan penambahan *Feed addiitive* dapat meningkatkan daya cerna protein lebih baik pada asam laktat bentuk ekapsulasi baru akan teregradasi pada usus halus sehingga dapat menurunkan pH pada saluran pencernaan dan meningkatkan kapasitas daya serap usus, hal tersebut berdasarkan pada pengamatan bahwa pemberian *Feed addiitive* menyebabkan dinding usus menjadi tipis sehingga daya serap usus akan zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh semakin meningkat. Suasana asam yang tercipta di daerah usus halus itu disebabkan adanya penambahan asam laktat yang dapat menguntungkan bagi perkembangan bakteri patogen sehingga dapat meningkatkan pencernaan zat-zat makan.

Penggunaan antibiotik pada ternak mempunyai kekurangan yaitu penggunaan dosis antibiotik harus benar-benar diperhatikan karena penggunaan yang berlebihan dikhawatirkan dapat meninggalkan residu dalam tubuh ayam disamping meningkatkan biaya produksi. Oleh karena itu, dibutuhkan cara yang

lebih aman untuk meningkatkan efisiensi penggunaan pakan ayam yang menghasilkan daging tanpa residu antibiotik tetapi tidak membunuh *Mikroflora* non patogen di dalam saluran pencernaan dan bahkan dapat memperbaiki daya cerna protein yaitu dengan memanfaatkan probiotik berupa asam laktat (Anonymous, 2002).

Probiotik digunakan sebagai bahan pakan tambahan unggas bertujuan pencernaan dan menciptakan kondisi pH yang sesuai untuk pencernaan zat makanan yang masuk ke dalam saluran pencernaan serta menekan mikroba patogen dan meningkatkan pertumbuhan mikroba yang menguntungkan (Hyden, 2000).

Menurut Hyden (2000), juga menyatakan bahwa asam laktat adalah salah satu probiotik yang dapat mempertahankan pH saluran pencernaan dan menciptakan kondisi pH yang sesuai untuk pencernaan zat makanan yang masuk ke dalam saluran pencernaan, menekan mikroba patogen dan meningkatkan pertumbuhan mikroba yang menguntungkan.

Dilaporkan juga oleh Wahyono (2002), bahwa penambahan kultur bakteri yang berperan sebagai probiotik, dapat menstimulasi sintesis enzim pencernaan sehingga meningkatkan utilisasi nutrisi. Penelitian menunjukkan berbagai spesies bakteri pembentuk spora seperti *Bacillus* telah digunakan sebagai probiotik untuk hewan dan manusia. Isolasi dari saluran pencernaan ayam menghasilkan beberapa spesies *Bacillus* yang teridentifikasi diantaranya *Bacillus subtilis*, *B. pumilus*, *Bacillus licheniformis*, *Bacillus clausii*, *Bacillus megaterium*, *Bacillus*

firmus dan spesies dari kelompok *Bacillus cereus*. *Bacillus subtilis* merupakan strain yang menunjukkan sifat sebagai probiotik (Murwani, 2008).

Pemberian mikroba hidup dalam jumlah yang cukup dapat mempengaruhi komposisi dan ekosistem *Mikroflora* pencernaannya. Kondisi ekosistem *Mikroflora* dalam saluran pencernaan unggas mempengaruhi untuk kinerja dan kesehatan ternak. Ketidakseimbangan *Mikroflora* dalam saluran pencernaan karena terjadinya kolonisasi bakteri patogen atau *Mikroflora* yang dapat mengganggu kinerja ternak. Sebagai bahan alternatif untuk pemacu tumbuh, probiotik dalam penggunaannya pada ternak dapat meningkatkan kinerja ternak. Hal demikian terjadi karena adanya variasi respon yang tinggi dari individual ternak terhadap jenis pakan imbuhan. Probiotik bukan bertindak sebagai nutrisi esensial dimana tidak ada dosis respon, tetapi hanya ada level batas pemakaian. Cara kerja probiotik terutama melalui modifikasi populasi bakteri usus dan efektivitasnya tergantung atas status mikroba pada satu kelompok ternak dan pada individu ternak. Dengan demikian, dapat dimengerti jika efek yang terjadi mempunyai variasi yang tinggi. Perbedaan cara kerja dari strain probiotik sejauh ini belum dipahami, tetapi metabolit bakteri yang dihasilkan seperti asam organik khususnya pada bakteri asam laktat yang dapat menurunkan pH atau juga peroksida dan bakteriosin diperkirakan bertanggung jawab atas sifat antagonis terhadap bakteri patogen gram positif seperti *Salmonella*. Beberapa probiotik diketahui dapat menghasilkan enzim pencernaan seperti amilase, protease dan lipase yang dapat meningkatkan konsentrasi enzim pencernaan pada saluran pencernaan inang sehingga dapat meningkatkan perombakan nutrisi. Terdapat

beberapa mekanisme respon probiotik yaitu meliputi produksi bahan penghambat secara langsung, penurunan pH luminal melalui produksi asam lemak terbang rantai pendek, kompetisi terhadap nutrisi dan tempat pelekatan pada dinding usus, interaksi bakterial, resistensi kolonisasi contohnya *Lactobacilli* dengan bakteri patogen, merubah respon imun (Soekardjo, 2002).

Menurut Budiansyah (2004), mekanisme kerja dari probiotik ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Melekat atau menempel dan berkolonisasi dalam saluran pencernaan

Kemampuan probiotik untuk bertahan hidup dalam saluran pencernaan dan menempel pada sel-sel usus merupakan tahap pertama untuk kolonisasi dan selanjutnya memodifikasi sistem kekebalan hewan inang. Kemampuan menempel yang kuat pada sel-sel usus ini akan menyebabkan mikroba probiotik berkembang dengan baik dan mikroba patogen tereduksi dari sel-sel usus inang sehingga pertumbuhan dari mikroba patogen dapat terhambat.

b. Kompetisi untuk memperoleh makanan dan memproduksi zat antimikroba

Mikroba probiotik menghambat organisme patogen dengan berkompetisi untuk mendapatkan sejumlah substrat bahan makanan untuk difermentasi. Substrat makanan tersebut diperlukan agar mikroba probiotik dapat berkembang dengan baik. Substrat bahan makanan yang mendukung perkembangan mikroba probiotik dalam saluran pencernaan disebut prebiotik. Prebiotik ini adalah terdiri dari bahan-bahan makanan yang pada umumnya banyak mengandung serat. Sejumlah mikroba probiotik menghasilkan senyawa atau zat-zat yang diperlukan untuk membantu proses pencernaan substrat bahan makanan tertentu dalam

saluran pencernaan yaitu enzim. Mikroba probiotik penghasil asam laktat menghasilkan enzim selulase yang membantu proses pencernaan. Enzim ini mampu memecah serat kasar yang merupakan komponen yang sulit dicerna dalam saluran pencernaan unggas. Pakan ternak unggas umumnya mengandung serat kasar tinggi. Penggunaan probiotik menghasilkan enzim selulase mampu memanfaatkan makanan berserat kasar tinggi dalam proses pencernaan sehingga serat kasar dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan jaringan dan peningkatan berat badan ternak unggas.

c. Stimulasi mukosa dan meningkatkan sistem kekebalan hewan inang

Kemampuan mikroba probiotik mengeluarkan toksin yang menghambat perkembangan mikroba patogen dalam saluran pencernaan, merupakan suatu kondisi yang dapat meningkatkan kekebalan hewan inang. Toksin-toksin yang dihasilkan tersebut merupakan antibiotik bagi mikroba-mikroba patogen, sehingga penyakit yang ditimbulkan oleh mikroba patogen tersebut berkurang atau dapat hilang atau sembuh dengan sendirinya. Hal ini dapat memberikan keuntungan terhadap kesehatan hewan inang sehingga tahan terhadap penyakit. Meski jumlah bakteri probiotik melimpah dalam saluran pencernaan, probiotik tidak membahayakan, bahkan sebaliknya. Karena probiotik tidak memakan sel-sel dinding pencernaan, baik yang masih hidup maupun sel yang sudah mati.

Probiotik hanya memakan zat makanan yang tidak bisa dicerna seperti inulin. Tidak hanya sekedar tidak mengganggu, keberadaan probiotik ternyata menghadirkan manfaat besar bagi manusia maupun hewan. Peralnya, probiotik mampu mencegah munculnya infeksi pada saluran pencernaan, terutama yang

disebabkan bakteri jahat. Tidak seperti probiotik, bakteri jahat memang potensial merugikan manusia maupun hewan. Ini disebabkan bakteri jahat hidupnya dengan cara memakan sel dinding pencernaan yang mati maupun masih hidup. Akibatnya, dinding saluran pencernaan bisa terinfeksi dan bocor (Siswono, 2002).

Prinsip kerja probiotik yaitu memanfaatkan kemampuan mikroorganisme dalam menguraikan rantai panjang karbohidrat, protein dan lemak. Kemampuan ini diperoleh karena adanya enzim-enzim khusus yang dimiliki mikroorganisme untuk memecah ikatan. Pemecahan molekul kompleks menjadi molekul sederhana mempermudah penyerapan oleh saluran pencernaan manusia maupun hewan. Di sisi lain, mikroorganisme pemecah ini mendapat keuntungan berupa energi dari hasil perombakan molekul kompleks (Medicinus, 2009).

Menurut Gunawan dan Sunandari (2003), penggunaan probiotik sampai dengan 0,25% dalam ransum dapat meningkatkan pertambahan bobot badan broiler hingga umur 6 minggu dan memperbaiki pemanfaatan serat kasar sampai dengan 6% dalam ransum.

Beberapa penelitian menunjukkan, penambahan probiotik mempunyai dampak positif. Salah satunya menyatakan, bahwa banyaknya kandungan mikroorganisme hidup dalam usus ternak dapat mempengaruhi metabolisme dalam usus, meningkatkan populasi mikroorganisme yang menguntungkan, sehingga produktivitas ternak lebih baik, kandungan lemaknya lebih rendah, dan menurunkan kadar kolesterol sebab probiotik dapat meningkatkan metabolisme energi (ME) dan *Total digestible nutrien* (TDN) sehinggaimbangan antara protein dan energi lebih bagus (Adnan, 2011).

7. Bakteri Asam Laktat

Bakteri asam laktat (BAL) adalah kelompok bakteri gram-positif yang tidak membentuk spora dan dapat memfermentasikan karbohidrat untuk menghasilkan asam laktat. Berdasarkan taksonomi, terdapat sekitar 20 genus bakteri yang termasuk bakteri asam laktat (BAL). Beberapa bakteri asam laktat (BAL) yang sering digunakan dalam pengolahan pangan adalah *Aerococcus*, *Bifidobacterium*, *Carnobacterium*, *Enterococcus*, *Lactobacillus*, *Lactococcus*, *Leuconostoc*, *Oenococcus*, *Pediococcus*, *Streptococcus*, *Tetragenococcus*, *Vagococcus*, dan *Weissella*. Contoh produk makanan yang dibuat menggunakan bantuan bakteri asam laktat (BAL) adalah yogurt, keju, mentega, *Sour cream* (susu asam), dan produk fermentasi lainnya. Dalam pengolahan makanan, *Bakteri asam laktat* (BAL) dapat melindungi dari pencemaran bakteri patogen, meningkatkan nutrisi, dan berpotensi memberikan dampak positif bagi kesehatan manusia yang terdapat pada probiotik (Carr, 2002).

Kuswanto dan sudarmadji (2003), menyatakan bahwa bakteri asam laktat merupakan kelompok spesies bakteri yang mempunyai kemampuan untuk membentuk asam laktat dari metabolisme karbohidrat dan tumbuh pada pH lingkungan yang rendah. Secara ekologis, kelompok bakteri asam laktat ini telah diisolasi dari berbagai macam jenis habitat yang anggota spesiesnya dapat mendominasi macam-macam habitat seperti tanaman, jerami, sayuran, produk air susu, produk daging, rongga mulut dan perut hewan. Bakteri asam laktat di isolasi untuk menghasilkan antimikroba yang dapat digunakan sebagai probiotik. Manfaat bagi kesehatan yang berkaitan dengan bakteri asam laktat, diantaranya

memperbaiki daya cerna laktosa, mengendalikan bakteri patogen dalam saluran pencernaan, menurunkan serum kolesterol dan memproduksi vitamin B.

Probiotik merupakan suplementasi sel mikroba utuh (tidak harus hidup) atau komponen sel mikroba pada pakan atau lingkungan hidupnya yang menguntungkan bagi inangnya. Prinsip dasar kerja probiotik adalah pemanfaatan kemampuan mikroorganisme dalam memecah atau menguraikan rantai panjang karbohidrat, protein dan lemak yang menyusun pakan yang diberikan. Probiotik yang berisi mikroba pengurai bila ditambahkan ke dalam pakan, dapat meningkatkan pencernaan pakan dengan proses penguraian yang dilakukan oleh mikroba tersebut (Irianto, 2003). Menurut pendapat Carr (2002), beberapa mikroba yang mempunyai potensi sebagai probiotik antara lain adalah *Lactobacillus acidophilus*, *Lactobacillus casei*, *Lactobacillus fermentum*, *Lactobacillus plantarum*, *Lactobacillus salivarius*, *Lactobacillus reuteri*, *Lactobacillus delbrueckii*, *Lactobacillus lactis*, *Lactobacillus cellobiosus*, *Lactobacillus brevis*, *Aspergillus oryzae*, *Bifidobacterium longum*, *Bacillus pseudologum*, *Bacillus bifidum*, *Bacillus suis*.

Fermentasi ialah proses baik secara aerob maupun anaerob yang menghasilkan berbagai produk yang melibatkan aktivitas mikroba atau ekstraknya dengan aktivitas mikroba terkontrol (Carr, 2002). Fermentasi merupakan proses yang telah lama dikenal manusia. Fermentasi adalah proses untuk mengubah suatu bahan menjadi produk yang bermanfaat bagi manusia, seperti fermentasi susu kambing, unta yang terjadi di Sumaria dan Babilonia pada jaman Mesopotamia.

Hingga saat ini, proses fermentasi telah mengalami perbaikan-perbaikan dari segi proses sehingga dihasilkan produk fermentasi yang lebih baik (Sudha, 2005).

Fermentasi memiliki berbagai manfaat, antara lain untuk mengawetkan produk pangan, memberi cita rasa atau flavor terhadap produk pangan tertentu, memberikan tekstur tertentu pada produk pangan. Dengan adanya proses fermentasi yang dilakukan oleh mikroba tertentu diharapkan akan meningkatkan nilai gizi yang ada pada produk fermentasi. Dengan adanya perbaikan mutu produk pangan fermentasi ini diharapkan nilai terima pangan oleh konsumen meningkat (Kusmiati dan Malik, 2002).

Produk fermentasi bakteri asam laktat (BAL) salah satunya adalah asam organik. Asam organik ini dihasilkan selama proses fermentasi terkait spesies organisme, gabungan kultur dan kondisi pertumbuhan (Lindgren dan Dobrogosz, 1990). Asam-asam organik dari produk fermentasi dari hasil hidrolisis asam lemak dan juga sebagai hasil aktivitas pertumbuhan bakteri. Penentuan kuantitatif asam organik pada produk fermentasi adalah penting untuk mempelajari kontribusi bagi aroma sebagian besar produk fermentasi, alasan gizi, dan sebagai indikator aktivitas bakteri. Asam-asam organik juga sering digunakan sebagai acidulants (bahan pengasam) yang dapat menurunkan pH. Sehingga pertumbuhan mikroba berbahaya pada produk fermentasi akan terhambat (Bahri, 2005).

Asam organik mampu menurunkan pH dan berfungsi untuk tidak memutus beberapa ikatan molekul sehingga memiliki kemampuan aktivitas mikroba. Selain itu probiotik juga harus mampu menempel pada sel epitel usus, mampu membentuk kolonisasi pada saluran pencernaan, mampu menghasilkan zat anti

mikroba (bakteriosin), dan memberikan pengaruh yang menguntungkan inangnya. Syarat lainnya adalah tidak bersifat patogen dan aman jika dikonsumsi. probiotik juga harus tahan dan tetap hidup selama proses pengolahan makanan dan penyimpanan, mudah diaplikasikan pada produk makanan, dan tahan terhadap proses psikokimia pada makanan seperti dalam pemanfaatan gula untuk fermentasi bakteri asam laktat tersebut (Prado, 2008).

Pemanfaatan gula yang ada dalam substrat untuk pertumbuhan bakteri asam laktat (BAL) akan terlihat dengan meningkatnya populasi sel. Gambaran mengenai peningkatan kerapatan sel dari awal fermentasi hingga akhir fermentasi. Penggunaan gula yang ada dalam substrat untuk pertumbuhan bakteri asam laktat (BAL) ini dapat terlihat dengan meningkatnya kerapatan sel pada substrat. Pemecahan glukosa dalam selnya menghasilkan energi untuk aktivitasnya tersebut akan menghasilkan senyawa lain termasuk asam laktat. Asam laktat yang dihasilkan oleh bakteri asam laktat (BAL) akan terseks-kresikan keluar sel dan akan terakumulasi dalam cairan fermentasi (Kusmiati dan Malik, 2002).

Menurut Kusmiati dan Malik (2002), fermentasi karbohidrat oleh *Streptococcus* dan *Lactobacillus* dilakukan melalui konversi karbohidrat ke glukosa dan kemudian glukosa difermentasi melalui jalur heksosa difosfat untuk memproduksi asam laktat sebagai produk utama. Asam-asam organik yang dihasilkan akan menyebabkan pH susu kedelai menjadi rendah. Semakin banyak sumber gula yang dapat dimetabolisir maka semakin banyak pula asam-asam organik yang dihasilkan sehingga secara otomatis pH juga akan semakin rendah. Hal ini sejalan dengan pendapat Chandan & Shahani (1993), yang menyatakan

bahwa asam laktat yang dihasilkan dalam proses pembuatan yogurt dapat menurunkan pH susu.

Yusmarini (1997) menyatakan bahwa selama fermentasi protein akan dihidrolisis menjadi komponen-komponen terlarut guna keperluan pembentukan protein sel mikrobia dan selanjutnya dilaporkan bahwa hanya 20% dari komponen nitrogen terlarut yang dipakai untuk pertumbuhannya.

Aktivitas metabolisme starter yang mempunyai suhu pertumbuhan optimum 41°C sampai 45 °C, sehingga akan meningkatkan berbagai aktivitas metabolisme starter antara lain mengubah laktosa menjadi asam laktat. Pengubahan laktosa menjadi Asam laktat tersebut menyebabkan menurunnya kadar laktosa dan pH media sehingga pH media mencapai 4,0 sampai 4,5 (Prado, 2008).

Dengan meningkatnya jumlah asam yang diekskresikan oleh bakteri asam laktat (BAL) karena proses akumulasi asam dalam substrat, maka akan meningkatkan keasaman substrat. Peningkatan akumulasi asam dalam substrat ini dapat diketahui dengan penurunan pH substrat. Proses fermentasi oleh bakteri di samping meningkatkan kadar asam laktat, keasaman substrat, kerapatan sel bakteri asam laktat (BAL) juga meningkatnya kadar protein dalam cairan fermentasi (Prado, 2008).

Salah satu faktor penting dalam pertumbuhan bakteri adalah nilai pH. Bakteri memerlukan suatu pH optimum untuk tumbuh optimal. Pengaruh pH terhadap pertumbuhan bakteri ini berkaitan dengan aktivitas enzim. Enzim dibutuhkan oleh bakteri untuk mengkatalis reaksi-reaksi yang berhubungan

dengan pertumbuhan bakteri. Apabila pH dalam suatu medium/lingkungan tidak optimal, maka akan mengganggu kerja dari enzim-enzim tersebut, yang pada akhirnya akan mempengaruhi pertumbuhan bakteri itu sendiri (Kusmiati dan Malik, 2002).

Jenis bakteri asam laktat (BAL) yang berbeda akan menghasilkan enzim protease yang berbeda dengan spesifisitas pemecahan yang juga berbeda sehingga akan dihasilkan bermacam-macam peptida. Susunan asam amino yang dihasilkan selama proses fermentasi juga akan mempengaruhi kemampuan peptida dalam mengikat garam empedu. Fraksi protein kedelai yang bersifat hidrofobik mempunyai kemampuan mengikat asam empedu, sebab peptida yang mengandung asam amino hidrofobik pada terminal N mempunyai kemampuan dalam mengikat garam empedu (Kusmiati dan Malik, 2002).

Bakteri asam laktat (BAL) dapat menghambat pertumbuhan bakteri lain dengan memproduksi protein yang disebut bakteriosin. Salah satu contoh bakteriosin yang dikenal luas adalah nisin, diproduksi oleh *Lactobacillus lactis* ssp. *lactis*. Nisin dapat menghambat pertumbuhan beberapa bakteri, yaitu *Bacillus*, *Clostridium*, *Staphylococcus*, dan *Listeria*. Senyawa bakteriosin yang diproduksi bakteri asam laktat dapat bermanfaat karena menghambat bakteri patogen yang dapat merusak makanan ataupun membayakan kesehatan manusia, sehingga keamanan makanan lebih terjamin (Carr, 2002).

Penambahan probiotik akan mempengaruhi pertumbuhan dari ayam pedaging, karena bakteri asam laktat mampu meningkatkan daya cerna ternak ayam sehingga pakan dapat diserap dengan baik dan dapat diolah lebih efisien

menjadi daging (Jayanata dan Harianto, 2011). Bakteri asam laktat menghasilkan enzim lipase yang bisa memecah lemak bermolekul besar menjadi substrat yang lebih kecil sehingga mudah dicerna (Sudha, 2005).

Menurut Mijin (2001), menyatakan bahwa mikroba yang digunakan sebagai probiotik yang efektif yaitu *Lactobacillus acidophilus* dimana harus memiliki sifat-sifat dapat bertahan hidup selama persiapan sampai produksi dengan skala industri, stabil dan tetap hidup dalam jangka waktu lama pada periode penyimpanan dan kondisi lapangan, dapat bertahan hidup, mampu bersaing, tidak hanya sekedar tumbuh dalam saluran pencernaan, serta mampu menimbulkan efek yang menguntungkan bagi inang.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Haddadin (1996), dilaporkan bahwa penambahan probiotik *Lactobacillus acidophilus* pada pakan ayam diketahui dapat meningkatkan produksi telur, memperbaiki konversi pakan (Feed Conversion Ratio) dan mengurangi konsentrasi kolesterol kuning telur, sedang lipida dan trigliserida dalam kuning telur dan serum darah tidak mengalami penurunan. Penambahan kultur *Lactobacillus acidophilus* pada pakan yang paling efektif adalah pada konsentrasi 10⁶ cfu/g diet (Sudha, 2005).

Bakteri asam laktat (BAL) termasuk *Lactobacillus* merupakan salah satu genus bakteri asam laktat yang paling banyak dijumpai pada saluran gastro-intestinal baik pada manusia maupun pada hewan. Salah satu jenis bakteri ini adalah gram positif yang tidak berspora dan berbentuk bulat atau batang yang mampu mengubah karbohidrat menjadi asam laktat. Asam laktat dapat memberikan efek bakterisidal untuk bakteri lain karena pH lingkungan dapat

turun menjadi 3-4,5. Bakteri asam laktat ini bermanfaat bagi kesehatan dan produksi ternak, beberapa diantaranya adalah meningkatkan nilai nutrisi pakan, mengontrol infeksi pada usus dan meningkatkan pencernaan dengan menghalangi bakteri patogen dalam saluran pencernaan. *Lactobacillus brevis* mampu menghasilkan lebih banyak asam organik. *Lactobacillus plantarum* terutama berguna untuk pembentukan asam laktat, penghasil hidrogen peroksida tertinggi dibandingkan bakteri asam laktat lainnya dan juga menghasilkan bakteriosin yang merupakan senyawa protein yang bersifat. Penambahan bakteri asam laktat dalam pakan akan mendukung peningkatan produktivitas pada pemeliharaan ternak dan bukan hanya itu bakteri asam laktat ini juga akan membantu proses pertumbuhan pada broiler mulai dari starter sampai finisher, asam laktat tersebut berasal dari probiotik yang akan dicampurkan kedalam pakan ataupun air minum selama pemeliharaan 35 hari, sebab bakteri asam laktat ini akan bekerja didalam pencernaan selama broiler tersebut memakan pakan yang telah dicampurkan antibiotik dan probiotik didalam pakan (Kusmiati dan Malik, 2002).

Sjofjan (2003), menyatakan bahwa bakteri non patogen menghasilkan enzim yang dapat mencerna serat kasar, protein dan lemak serta dapat mendetoksifikasi racun. Hal ini sangat membantu proses pencernaan pakan pada ternak, sehingga pakan yang terkonsumsi dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pertumbuhan. Adanya penambahan bakteri dalam proses fermentasi feses ayam dapat meningkatkan kandungan protein kasar. Ini disebabkan karena meningkatnya jumlah mikroba yang terdapat dalam feses, yang mana mikroba tersebut dapat mensintesis protein selama masa fermentasi. Hal ini sesuai dengan

pendapat Kusmiati dan Malik (2002), yang menyatakan bahwa bakteri yang melakukan fermentasi dapat menghasilkan asam-asam amino. Di samping itu bakteri ini mampu mengikat nitrogen dari udara bebas sehingga jumlah nitrogen yang digunakan lebih tersedia untuk mensintesa asam amino, selanjutnya asam amino disintesa menjadi protein. Ditambahkan oleh Prado (2008), bahwa mikroorganisme mempunyai kandungan protein yang tinggi dan mensintesis vitamin dalam jumlah yang memadai. Peningkatan protein kasar feses ayam hasil fermentasi mengindikasikan adanya sintesis protein oleh mikroba dalam feses ayam selama proses fermentasi.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2017 sampai dengan 27 Januari tahun 2018. Bertempat di kandang unggas, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan dilanjutkan di Laboratorium Kimia Makanan Ternak Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan.

B. Alat dan Bahan Penelitian

Penelitian ini menggunakan alat-alat yaitu gasolek, kandang litter, lampu pijar 60 watt, tempat pakan gantung, tempat air minum 800 ml, talenan dan timbangan analitik. Sedangkan alat yang digunakan untuk menghitung daya cerna protein yaitu cutter, ember, labu khjedhal, labu destilasi, labu ukur 100 ml, lemari asam, erlenmeyer dan timbangan digital.

Bahan yang digunakan pada saat pemeliharaan yaitu antibiotik *Zink bacitracin*, probiotik multi strain (*Lactobacillus cesei*, *Saccharomyces cerevisiae* dan *Rhodopseudomonas palustris*) sebanyak ($1,5 \times 10^6$ cfu/ml), broiler umur satu hari atau *Day old chick* (DOC) sebanyak 36 ekor dengan jenis kelamin campuran (*Unsexed*), gula merah, tali rapia, kantong plastik. Sedangkan bahan yang digunakan untuk menghitung daya cerna protein yaitu sampel (feses), selenium \pm 1 gram, H₂SO₄ pekat 25 ml, air suling 100 ml, H₃BO₃ 2% 10 ml, larutan indicator 4 tetes dan NaOH 30% 10 ml.

C. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian kuantitatif dengan metode eksperimen yaitu penelitian yang dilakukan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendali.

D. Metode Penelitian

1. Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 4 perlakuan dan 3 ulangan, setiap ulangan terdiri dari 3 ekor broiler sehingga terdapat 36 unit percobaan dengan perlakuan (P) yaitu:

P_0 = Ransum basal + Kontrol

P_1 = Ransum basal + Probiotik 1,5 ml/hari, (1-35 hari).

P_2 = Ransum basal + Antibiotik 0,1 g/hari, (1-35 hari).

P_3 = Ransum basal + Antibiotik 0,1 g/hari, (1-21 hari) + Probiotik 1,5 ml/hari, (22-35 hari).

2. Persiapan dan Pemeliharaan Broiler

Persiapan yang dilakukan sebelum pemeliharaan broiler yaitu:

a. Kandang

Kandang terlebih dahulu disiapkan sebelum DOC (*Day Old Chick*) di masukkan, persiapan kandang dilakukan secara matang dan dilakukan pemasangan tirai serta pembersihan dan *Sterilisasi* disekitar kandang dengan cara penyemprotan desinfektan atau deterjen dan alat-alat yang akan digunakan dan tunggu sampai kering. Setelah itu ditaburi sekam dengan ketebalan 7 cm, tempat pakan dan luas unit kandang yang digunakan 75 x 100 cm. Persiapan dipelihara

dari DOC sampai umur 35 hari dengan kandang yang beri alas sekam. Perlakuan diberikan pada ayam sejak umur 1 hari sampai panen. Jumlah ayam perlakuan sebanyak 36 ekor dipilih secara acak dan dimasukkan ke dalam kandang yang telah disekat-sekat dengan bambu masing-masing 3 ekor. Setiap sekat-sekat kandang dilengkapi dengan lampu pijar 60 watt sebanyak 15 buah.

b. Ransum dan Air minum

Pemberian pakan dilakukan beberapa jam setelah DOC minum (3-4 jam setelah DOC minum) pemberian pakan dan air minum dilakukan secara *Ad libitum* (terus-menerus) dan dalam pemberiannya itu harus dalam keadaan bersih dan segar dan ransum tersebut telah dicampurkan dengan antibiotik *Zink bacitracin* 0,1 g/hari dan probiotik multi strain 1,5 ml/hari yang diberikan setiap harinya mulai dari DOC sampai umur 35 hari dan pemberiannya itu dilakukan sesuai dengan perlakuan yang telah ditentukan dalam penelitian ini.

Adapun bahan penyusun ransum yang digunakan pada penelitian ini yaitu jagung 53%, bungkil kedelai 28%, dedak 6%, MBM 8%, minyak 3%, kapur 0,8%, mineral mix 0,3%, vitamix 0,5% dan NaCl (garam) 0,4%. Kandungan nutrisi ransum pada penelitian ini yaitu protein 22,98%, energi metabolisme 3100 kkal/kg, lemak kasar 9.07%, serat kasar 7.61%, kalsium 0.94% dan posfor 0.5% (SNI, 2006).

3. Proses Perhitungan Daya Cerna Protein

Setelah proses pemeliharaan, pada akhir penelitian dilakukan pengambilan sampel dari setiap perlakuan berupa feses yang masih segar yang telah ditimbang sebelumnya untuk mengetahui berat segarnya, untuk selanjutnya diamati di

laboratorium dengan metode perhitungan daya cerna protein yaitu dengan cara timbang dengan teliti $\pm 0,5$ gram sampel, kemudian masukkan kedalam labu khjedhal. Tambahkan ± 1 gram campuran selenium dan 25 ml H_2SO_4 pekat. Labu khjedhal bersama isinya di goyangkan sampai semua sampel terbasahi dengan H_2SO_4 kemudian lakukan. Destruksi dalam lemari asam sampai jernih. Biarkan dingin kemudian tuang kedalam labu ukur 100 ml dan bilas dengan air suling. Biarkan dingin lagi kemudian impitkan hingga tanda garis dengan air suling lalu kocok hingga homogen setelah itu. Siapkan panampungan yang terdiri dari 10 ml H_3BO_3 2% + 4 tetes larutan indicator campuran dalam erlenmeyer kemudian Pipet 5 ml larutan sampel kedalam labu destilasi, Tambahkan 10 ml NaOH 30% dan 100 ml air suling. Kemudian suling hingga volume penampung menjadi ± 50 ml. Bilas ujung penyuling dengan air suling kemudian penampung bersama isinya di titrasi dengan larutan H_2SO_4 0,0171 N (Laboratorium Kimia Makanan Ternak, 2017).

Perhitungan :

$$\% \text{ Protein Kasar} = \frac{V \times N \times 14 \times 6,25 \times P}{\text{Berat sampel (mgr)}} \times 100\%$$

Keterangan :

V = Volume Titrasi contoh

N = Normalitas Larutan H_2SO_4

P = Faktor Pengenceran

E. Parameter yang Diukur

Daya cerna protein, yang dilakukan setelah proses pemeliharaan, pada akhir penelitian dilakukan pengujian daya cerna protein pada tiap objek penelitian

(broiler). Pengamatan terhadap daya cerna protein dengan cara mengetahui data konsumsi pakan yang telah ditambahkan antibiotik dan probiotik dan menimbang feses yang terdapat didalam usus.

Metode untuk pengukuran pencernaan nutrisi tergantung dari prosedur teknik pengumpulan sampel. Metode yang paling sederhana untuk koleksi isi ileal dengan membunuh unggas atau alternatif lain dengan membuat cannula ileal (Kim, 2010). Metode yang digunakan yaitu dengan membunuh unggas dan mengambil seluruh isi ileum setelah melalui koleksi digesta. Metode koleksi digesta ileum, dengan cara pemuasakan ayam selama 14 jam, setelah dipuaskan diberikan pakan uji sebanyak 100 gram/unit selama 10 jam sebelum pemotongan. Kemudian ayam disembelih. Digesta diambil dari usus halus bagian ileum, yaitu setelah 1 cm dari Meckel's diverticulum hingga batas 1 cm sebelum ileo-cecal junction. Setelah itu feses dikeluarkan kemudian ditimbang berat awalnya dalam bentuk segar dari setiap perlakuan. Setelah itu feses dikumpulkan kemudian dianalisis dengan cara *In vitro* (Adedokun *et al.*, 2008).

Menurut Anggorodi (1990) mengenai metode perhitungan daya cerna protein yaitu dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Daya Cerna Protein} = \frac{(\sum A \times \% B) - (\sum C \times \% D)}{(\sum A \times \% B)} \times 100$$

Keterangan:

A = Konsumsi ransum

B = % Zat makanan dalam ransum (Protein)

C = Jumlah feses

D = % Zat makanan dalam feses (Protein)

Rumus ini digunakan untuk mengukur daya cerna protein pada broiler mulai dari konsumsi ransum, zat makanan dan penimbangan awal feses serta di analisis dengan metode pengukuran kecernaan secara *In vitro* dilakukan dengan membuat suasana seperti yang terjadi dalam saluran pencernaan ternak di laboratorium, sehingga dapat mengetahui nilai daya cerna protein yang ada pada broiler tersebut. Pengukuran daya cerna protein atau nilai cerna suatu bahan pakan dapat ditentukan jumlah nutrien dari suatu bahan pakan dalam saluran pencernaan.

F. Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan analisa sidik ragam. Apabila perlakuan berpengaruh nyata, maka dilanjutkan uji wilayah berganda Duncan untuk melihat perbedaan terhadap setiap sampel perlakuan. Hasil penelitian ini akan dianalisis menggunakan rancangan acak lengkap (RAL).

Menurut Steel (1991) model matematika dari Rancangan Acak Lengkap (RAL) yaitu sebagai berikut:

$$Y_{ij} = \mu + \alpha_i + \epsilon_j$$

Keterangan:

Y_{ij} = Nilai pengamatan dari perlakuan ke- i dari pemberian antibiotik dan probiotik ke- j

μ = Nilai rata-rata sesungguhnya

α_i = Pengaruh perlakuan pada taraf ke- i

ϵ_j = Galat

i = P0, P1, P2, P3 (Perlakuan)


j = 1,2,3, (Ulangan)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Hasil penelitian selama 35 hari yang mencakup beberapa perlakuan termasuk pemberian antibiotik dan probiotik multi strain terhadap daya cerna protein pada broiler yang di sajikan pada Gambar 1 dibawah ini.



Gambar 1: Daya cerna protein kasar

Keterangan: P₀ = Ransum basal + Kontrol. P₁ = Ransum basal + Probiotik 1,5 ml/hari, (1-35 hari).
P₂ = Ransum basal + Antibiotik 0,1 g/hari, (1-35 hari). P₃= Ransum basal + Antibiotik 0,1 g/hari, (1-21 hari) + Probiotik 1,5 ml/hari, (22-35 hari).

B. Pembahasan

Berdasarkan Gambar 1 diatas diperoleh hasil analisis sidik ragam dari penelitian, menunjukkan bahwa pada perlakuan tidak memberikan pengaruh yang nyata ($P > 0,05$) terhadap daya cerna protein. Rata-rata daya cerna protein yang

diperoleh dalam penelitian ini yaitu P₀ (66,03%), P₁ (79,58%), P₂ (81,41%), dan P₃ (80,00%). Daya cerna protein adalah banyaknya protein yang dapat dicerna tubuh atau banyaknya protein yang dapat dipotong ikatannya oleh enzim protease sehingga dapat diperoleh asam-asam amino yang dapat langsung diserap tubuh. Pada Gambar 1 tersebut nilai rata-rata dari P₂ (81,41%), yang diberikan ransum basal + antibiotik *Zink bacitracin* 0,1 gr/hari, (1-35 hari) menunjukkan nilai daya cerna protein yang paling tinggi diantara perlakuan yang lain. Sedangkan nilai rata-rata daya cerna protein terendah adalah P₀ (66,03%) dari semua perlakuan. Hal ini sesuai dengan pendapat Soekardjo (2002), yang menyatakan bahwa penambahan *Feed additiv* antibiotik (bahan pakan tambahan) mempunyai nilai daya cerna protein yang lebih tinggi, hal ini disebabkan bahwa mekanisme kerja antibiotik didalam usus yaitu meningkatkan kapasitas daya serap usus dan menyebabkan dinding usus menjadi tipis sehingga daya serap usus akan zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh semakin meningkat.

Secara statistik perlakuan tidak berpengaruh nyata pada daya cerna protein namun dilihat dari data setiap perlakuan (P), P₁ (79,58%), P₂ (81,41%), dan P₃ (80,00%). Cenderung lebih baik dari perlakuan kontrol. Hal ini sesuai dengan pendapat Wahyu (2004), yang menyatakan bahwa daya cerna protein unggas berkisar antara 70-85%. Daya cerna protein menggambarkan seberapa besar protein yang digunakan oleh tubuh dalam proses pencernaan, baik untuk memenuhi kebutuhan.

Pengaruh yang tidak nyata pada setiap perlakuan terhadap daya cerna protein ($P>0,05$). Hal ini mungkin disebabkan oleh penggunaan *Breed DOC (Day old chick)*, penyediaan ransum, bentuk pakan, kandungan protein dalam pakan yang diberikan pada broiler serta dosis pemberian antibiotik dan probiotik. Hal ini sesuai dengan pendapat Donald (2002), menyatakan bahwa tinggi rendahnya pencernaan bahan pakan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain jenis ternak, bentuk pakan, macam bahan pakan dalam ransum, kandungan protein kasar dan cara penyediaan ransum. Namun hal ini juga menunjukkan salah satu faktor yang membuat tidak signifikan adalah jumlah konsumsi broiler yang dipengaruhi oleh bentuk pakan dan kandungan protein pakan. Hal ini sesuai dengan pendapat Nawawi (2011), yang menyatakan bahwa konsumsi pakan adalah salah satu faktor penting yang mempengaruhi daya cerna untuk memberikan pertumbuhan yang optimal.

Dalam penelitian tersebut bentuk pakan yang digunakan adalah mesh atau bentuk ukurannya kecil dengan melalui pencampuran secara manual. Hal ini tidak sesuai dengan pendapat Nawawi (2011), yang menyatakan bahwa bentuk pakan yang baik untuk broiler yaitu bentuk pellet dan crambel sebab broiler memiliki *Palatabilitas* yang tinggi dalam memilih makanannya sehingga meningkatkan kecernaannya. Hal ini juga berdasarkan dari penelitian Cheeke (2003), yang menyatakan bahwa bentuk pakan pada broiler sangatlah menentukan tinggi rendahnya pencernaan protein sehingga banyaknya pakan dan kandungan protein yang masuk dalam saluran pencernaan.

Kandungan protein dalam pakan yang digunakan pada setiap perlakuan yaitu 22,98 dari periode *Starter-Finisher*. Hal ini tidak sesuai dengan pendapat Wahju (1992), yang menyatakan bahwa kandungan protein dalam ransum pada ayam pedaging periode *Starter* umur 0–3 minggu memerlukan protein antara 23–24%. Sedangkan pada ayam fase *Finisher* umur 3–6 minggu memerlukan protein antara 19–21%. Ditambahkan juga oleh Tillman (2001), yang menyatakan bahwa ransum yang kandungan proteinnya rendah, umumnya mempunyai pencernaan yang rendah pula dan sebaliknya. Tinggi rendahnya pencernaan protein tergantung pada kandungan protein bahan pakan, banyaknya protein yang masuk dalam saluran pencernaan dan pengaruh penggunaan dosis antibiotik dan probiotik yang diberikan.

Penggunaan dosis dari setiap perlakuan juga sangat menentukan pengaruh pada daya cerna protein. Dosis yang digunakan pada penelitian dari perlakuan P1, P2 dan P3 yaitu antibiotik 0,1 gr/hari dan probiotik multi strain 1,5 ml/1 liter air. Hal ini tidak sesuai dengan penelitian Halimnatsir (2006), yang menggunakan probiotik cair dengan dosis yaitu sebanyak 0,2%/1 liter air perhari dan ada pengaruh. Hal ini juga didukung oleh pendapat Dhika (2005), yang dalam penelitiannya menggunakan probiotik dan prebiotik dengan dosis 2 ml dapat meningkatkan daya cerna dan akhirnya dapat meningkatkan pertambahan bobot badan ayam pedaging.

Penggunaan antibiotik diatas 13 hari dan probiotik dosis 1,5cc/1 liter air minum cenderung menurunkan daya cerna dan performans, diduga bahwa lamanya penggunaan antibiotik dan dosis probiotik yang hanya 1,5cc/1 liter air

dalam saluran pencernaan mungkin malah akan menggunakan zat nutrisi inang. Hal ini sesuai pendapat Mulyantini (2010), menyatakan bahwa pemberian antibiotik sebaiknya dihentikan 13 hari sebelum ayam dipotong. Hal tersebut dapat menghindarkan residu yang akan masuk dalam daging pada broiler. Akan tetapi pada Gambar 1, menunjukkan bahwa penggunaan antibiotik dan probiotik diatas 13 hari dapat meningkatkan daya cerna protein, tetapi tidak memberikan pertumbuhan yang baik. Hal ini mungkin disebabkan oleh jenis antibiotik dan probiotik multi strain dan mekanisme kerjanya didalam usus. Hal ini sesuai dengan pendapat Budiansyah (2004), menyatakan bahwa mekanisme kerja antibiotik dan probiotik multi strain dalam kemampuan menempel yang kuat pada sel-sel usus ini akan menyebabkan mikroba probiotik berkembang dengan baik dan kompetisi untuk memperoleh makanan dan memproduksi zat anti mikroba yang bersifat patogen dan tereduksi dari sel-sel usus inang sehingga pertumbuhan dari mikroba patogen dapat terhambat.

Menurut Direktur Jendral Peternakan dan kesehatan Hewan (2018), menegaskan bahwa tidak adalagi penggunaan antibiotik pada pakan ternak sebagai pemacu pertumbuhan berlaku efektif mulai 1 januari 2018. Hal ini juga menurut pendapat Widodo (2002), yang menunjukkan bahwa antibiotik adalah senyawa kimia murni zat anti mikroba yang mengalami proses penyerapan ketika berlebihan akan menimbulkan residu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa pemberian antibiotik dan probiotik tidak memberikan pengaruh yang nyata ($P > 0,05$) terhadap daya cerna Protein broiler. Namun pemberian antibiotik dan probiotik dari perlakuan P₂ (81,41%), P₃ (80,00%) dan P₁ (79,58%), yang diberikan ransum basal + antibiotik 0,1 gr/hari + Probiotik 1,5 ml/hari, (1-35 hari) dan Antibiotik 0,1 g/hari, (1-21 hari) + Probiotik 1,5 ml/hari, (22-35 hari). Cenderung lebih baik terhadap nilai daya cerna protein pada broiler.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka perlu ada penelitian lebih lanjut mengenai level dan dosis pemberian antibiotik dan probiotik yang tepat pada broiler agar diketahui konsentrasi yang optimal dalam memperbaiki nilai daya cerna protein pada broiler.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR PUSTAKA

- Abun. 2007. *Mikroorganisme*. Cetakan Pertama. Agromedia Media Pustaka: Jakarta.
- Adedokun. 2008. *Analisis Kecernaan Unggas*. Tesis. FPS. UGM: Yogyakarta.
- Adnan, K. 2011. *Pertumbuhan Berat Badan yang Optimal pada Ayam Broiler*. Agromedia Pustaka: Jakarta.
- Amrullah, I. K. 2004. *Nutrisi Ayam Broiler*. Cetakan ketiga. Lembaga Satu Gunung budi: Bogor.
- Andriani, L. 2010. *Probiotik Basis Ilmiah Aplikasi dan Aspek Praaktis*. Widya Padjadjaran: Bandung.
- Anggorodi, R. 1990. *Metode Perhitungan Daya Cerna Protein*. Kemajuan Mutakhir. Universitas Indonesia Press: Jakarta.
- Anwar, R. 2014. *Pengaruh Penggunaan Litter Sekam Padi, Serutan Kayu, dan Jerami Padi Terhadap Performa Broiler di Closed House*. Skripsi. Fakultas Pertanian Universitas: Lampung.
- Ardana. 2009. *Konsumsi Ayam Brioler*. Cetakan pertama. Agromedia Media Pustaka: Jakarta.
- Anonimous. 2002. *Animal Nutrition*. 3 Ed. W. Green and Son, Limited: London.
- Badan Standardisasi Nasional. 2005. SNI 01-2886-2000. *Makanan Ekstrudat*. Badan Standardisasi Nasional: Jakarta.
- Bahri, S. 2005. *Analisis Kebijakan Keamanan Pangan Asal Ternak Ayam Ras Petelur dan Broiler*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan: Bogor.
- Barrow. 1992. *Biology*. 5th edition. I.G.N., Lindawati, S.A., 2011. Readng, Massachusetts: Addison-Wesley Publis.
- Bell dan Weaver. 2002. *Contemporary Issues in Animal Agriculture*. Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.
- Bolder, N., J. A. 1999. The Effect of Flavophospholipol (Flavomycin) and Salinomycin Sodium (Sacox) on The Excretion of Clostridium

- Perfringens, *Salmoella* Enteritis and *Campylobacter* Jejuni in Broiler After Experimental Infection. *Journal Poultry Sci.* 78: 1681-1689.
- Brooks, G. F. 2003. *Mikrobiologi Kedokteran*. Edisi 20. EGC: Jakarta.
- Budiansyah. 2004. *Nutrisi Aneka Ternak Unggas*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Carr, E. G. 2002. Positive Behavior Support: Evolution of An Applied Science. *Journal of Positive Behavior Interventions*. 4:4-16.
- Cervantes, H. 2007. *Antibiotic Feed Additives*. Politics and Science. Phibro Animal Health, Watkinsville, Georgia: USA.
- Cruywagen, C. W. 2001. Effect of *Lactobacillus Acidophilus* Supplementation of Milk Replacer on Preweaning of Calves. *Journal Dairy Science*. 79: 483-486.
- Chandan, R. C. dan Shahani, K.M. 1993. Yogurt. In: *Dairy Science and Technologi Handbook Product Manufacturing*. Georgia: USA.
- Cheeke, P. R. 2003. *Contemporary Issues in Animal Agriculture*. Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.
- Christiyanto. 2009. Changes in Total Protein Digestibility, Fractions Content and Structure During Cooking of Lentil Cultivars. *Journal of Nutrition*. 7 (6): 801-805.
- Dewan Standarisasi Nasional. 2000. *Penggunaan Antibiotik*. DSN (Dewan Standarisasi Nasional: Jakarta.
- Dhika. 2005. *Feed Addiktive Unggas*. Pusat Antar Universitas Pangan dan Gizi. Institut Pertanian Bogor: Bogor.
- Direktorat Jenderal Peternakan. 2018. *Ringkasan Imbuhan Pakan (Feed Additive) untuk Hewan*. Edisi II. Direktorat Binaan Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Peternakan: Jakarta.
- Diaz, D. 2008. Safety and Efficacy of Ecobiol as Feed Additive For Chickens For Fattening. *The EFSA Journal*. 773 : 2-13.
- Donald. 2002. *Sistem Pencernaan Unggas*. Universitas Airlangga Press: Surabaya.
- Fadilah. 2004. *Panduan Mengelola Peternakan Ayam Broiler Komersial*. Cetakan Pertama. Agromedia Media Pustaka: Jakarta

- FAO/WHO. 2010. *Batas Penggunaan BMR*. Penebar Swadaya: Jakarta
- Gaggia, F. 2010. Probiotic and Prebiotics in Animal Feeding For Safe Food Production. *Intl. Journal Food Microbiol.*
- Gultom. 2014. *Konsumsi Protein Unggas*. Maggy Thenawijaya. Penerbit Erlangga: Jakarta.
- Gunawan dan Sunandari, M. M. S. 2003. *Pengaruh Penggunaan Probiotik dalam Ransum Terhadap Produktivitas Ayam*. Universitas Airlangga Press: Surabaya.
- Haddadin, M. S. Y. 1996. The Effect of *Lactobacillus Acidophilus* on the Production and Chemical Composition on hen's eggs. University Books, Guelph, Ontario: Canada.
- Halimnatsir. 2006. *Antibiotik dan Probiotik*. Program Pasca Sarjana. IPB: Bogor.
- Harianto. 2011. *28 Hari Panen Ayam Broiler*. PT Agromedia Jakarta. Pustaka.
- Hyden, M. 2000. "Protected" Acide Additives. Feed internasional: Mexiko.
- Indrawani, I. M., 2001. Kajian Terhadap Beberapa Antibiotika Sebagai *Feed Additive* Dalam Ransum Ayam Broiler. Tesis. FPS. UGM: Yogyakarta
- Irianto, 2003. *Pemanfaatan Mikroorganisme sebagai Probiotik* Program Pasca Sarjana. IPB: Bogor.
- Jamila. 2008. *Fermentasi Feses Ayam dengan Campuran Bakteri Lactobacillus Sp.* Pusat Antar Universitas, Institut Pertanian Bogor: Bogor.
- Jayanata, C. E., dan Harianto, B. 2011. *28 Hari Panen Ayam Broiler*. Angro Media Pustaka: Jakarta.
- Kementrian Agama RI. 2012. *Metodologi Pendidikan Agama Islam*. Dirjen Kelembagaan Islam: Jakarta.
- Khodijah, S. 2012. Imbangan Efisiensi Protein yang diberi Ransum Mengandung Ekstrak Kulit Jengkol (*Pithecellobium jiringa* (Jack) Prain). *Jurnal*. Universitas Padjajaran.
- Kim. 2010. *Metode untuk Pengukuran Kecernaan Nutrien pada Unggas* Penebar Swadaya: Jakarta.

- Kompiang, I. P. 2006. *Pemanfaatan Mikroorganisme sebagai Probiotik untuk Meningkatkan Produksi Ternak Unggas di Indonesia*. Orasi Pengukuhan Penelitian Utama Sebagai Profesor Riset Badan Pakan dan Nutrisi Ternak. Balitnak: Bogor.
- Kusmiati dan Malik, A. 2002. *Aktivitas Bakteriosin dari Bakteri *Leuconostoc Mesenteroides Pb ac1**. Pada berbagai media. Makara Kesehatan: Bogor.
- Kuswanto, K. R., dan S. Sudarmadji. 2003. *Proses-proses Mikrobiologi Pangan*. Pangan dan Gizi Universitas Gajah Mada: Yogyakarta.
- Laboratorium Kimia Makanan Ternak. 2017. *Uji Analisis Daya Cerna Protein pada Broiler*. Universitas Hasanuddin: Makassar.
- Leeson, S. 2001. *Nutrition of the Chicken*. 4th Edition. University Books, Guelph, Ontario: Canada.
- Lehninger, A. L. 1994. *Dasar-dasar Biokimia*. Terjemahan: Maggy Thenawijaya. Penerbit Erlangga: Jakarta.
- Linton, R. G and J. T. Abrams. 1990. *Animal Nutrition and Veterinary Dietetic*. 3 Ed. W. Green and Son, Limited: London.
- Lindgren, S.E. dan W.J. Dobrogosz. 1990. Antagonistic Activities of Lactic Acid Bacteria in Food and Fermentation. *FEMS Microbial*. Limited: London.
- Lubis. 1992. *Antibiotic Feed Additives*. Politics and Science. Phibro Animal Health, Watkinsville, Georgia: USA.
- Medicinus. 2009. *Pengaruh Genetik Performa Ternak*. Erlangga: Jakarta.
- Mercedes. 2008. *Probiotik *Lactobacillus sp.** Cetakan Kelima. Gajah Mada University Press: Yogyakarta
- Mijin dan Miles. 2001. *Dasar Fisiologi Ternak*. Erlangga: Jakarta.
- Murtidjo, B. A. 2001. *Pedoman Beternak Ayam Broiler*. Kanisius: Yogyakarta.
- Mulyantini, I. M. 2010. Kajian Terhadap Beberapa Antibiotika Sebagai *Feed Additive* Dalam Ransum Ayam Broiler. Tesis. FPS. UGM: Yogyakarta.
- Muchtadi, D. 2000. *Evaluasi Nilai Gizi Pangan*. Pusat Antar Universitas Pangan dan Gizi. Institut Pertanian Bogor: Bogor.
- Mountzouris, K. 2010. Effects Of Probiotic Inclusion Levels In Broiler Nutrition On Growth Performance, Nutrient Digestibility, Plasma

- Immunoglobulins, and Caecal Microflora Composition. *Journal Poult. Sci.* 89:58-67.
- Murwani. 2008. *Pengaruh Penambahan Probiotik Leuconostoc TSD-10 pada Substrat yang Berbeda terhadap Kecernaan Serat Kasar*. Aktifitas fermentasi dan populasi bakteri rumen (invitro). Program Pasca Sarjana. IPB: Bogor.
- Nawawi. 2011. *Ilmu Nutrien Unggas*. Gajah Mada University Press: Yogyakarta.
- Neto, S. Leeson. A and Temim, W.A. 2000. *Amino acids, peptides, and protein*. Dalam: O. R. Fennema (Editor). *Food Chemistry*. Third Edition. Marcel Dekker, Inc: New York.
- NRC (National Research Council). 1999. *Ransum Unggas*. Pusat Antara Universitas, Institut Pertanian Bogor: Bogor.
- Parks, C. W. 2001. The Effect of Mannanooligosaccharides, Bambermycin, and Virginiamycin on Performance of Large White Male Market Turkeys. *Journal Poultry Sci.* 80: 718-723.
- Phillips. 2005. Does the use Antibiotics in Food Animals Pose a risk to Human Health?. *Journal of Antimicrobial Chemotherapy.* 53:28-52 (<http://www.oxfordjournals.org>) (diakses September)
- Poultry Indonesia. 2014. *Pengaruh Genetik terhadap Performa Ternak*. [Http://www.poultryindonesia.com/news/riset-artikel-referensi/pengaruh-faktor-genetik-terhadap-performa-ternak/](http://www.poultryindonesia.com/news/riset-artikel-referensi/pengaruh-faktor-genetik-terhadap-performa-ternak/).
- Prado, F. 2008. Trends In Non-Dairy Probiotic Beverages. *Journal Food Res. Int.* 41:111-123.
- Rahmianna, A.A. 2006. *Aflatoksin pada Kacang Tanah dan Usaha untuk Mengendalikannya*. Makalah disampaikan dalam Pertemuan Forum Aflatoksin Indonesia, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 24 Februari 2006.
- Rasyaf, M. 2007. *Panduan Beternak Ayam Pedaging*. Penebar Swadaya: Jakarta.
- Rizal, Yose. 2006. *Ilmu Nutrien Unggas*. Andalas University Press: Padang.
- Santoso, H dan Titik Sudaryani. 2009. *Pembesaran Ayam Pedaging Hari per Hari di Kandang Panggung Terbuka*. Penebar Swadaya: Jakarta.
- Seifert, H.S.H., and F. Gessler. 1997. Continuous oral application of probiotik *B.Cereus* an aternative to the prevention of enteroxamia. *Anim. Research and Develop.* 46: 30-38.

- Siswono. 2002. *Metabolisme Protein pada Ayam Kampung*. Erlangga: Jakarta.
- Siswandono dan Soekardjo, B. 2002. *Kimia Medisinal*. Universitas Airlangga Press: Surabaya.
- Sjofjan, O. 2003. *Probiotik (Aspergillus Niger dan Bacillus Sp)*. Sebagai Imbuhan Ransum dan Implikasinya terhadap Mikroflora Usus serta Penampilan Produksi Ayam Broiler. Universitas Padjadjaran: Bandung.
- Shihab. M. Q. 2002. *Tafsir*. Lentera Hati: Jakarta.
- Standar Nasional Indonesia. 2006. *Pakan Ayam Ras Pedaging*. SNI 01-3929-2006.
- Steel. 1991. *Model Matematika dari Rancangan Acak Lengkap*. Gajah Mada University Press: Yogyakarta.
- Supriyanto. 2001. *Pembibitan Ayam Arab*. Penebar Swadaya: Jakarta.
- Suprijatna, E. U. 2005. *Ilmu Dasar Ternak Unggas*. Penebar Swadaya: Jakarta.
- Suhardjo dan Kusharto, C. M. 2001. *Prinsip-prinsip Ilmu Gizi*. Pusat Antar Universitas Institut Pertanian Bogor: Bogor.
- Suastina. 2002. *Pengaruh Substitusi Jagung*. Penebar Swadaya: Jakarta
- Sudha. 2005. *Probiotics as Complementary Therapy for Hypercholesterolemia*. Biology and Medicine. Vol. 1 (4).
- Sudaro, Y dan Anita, S. 2007. *Ransum Ayam dan Itik*. Cetakan IX. Penebar Swadaya: Jakarta.
- Tilman, A.D. Hartadi, R. Sudomo, dan P. Soeharto. 2001. *Ilmu Makanan Ternak Dasar*. Cetakan Kelima. Gajah Mada University Press: Yogyakarta.
- Triakoso, B. 2002. *Kesehatan Ternak*. Penerbit Kanisius. Yogyakarta. Hal-52.
- Wahyono, F. 2002. The Influence of Probiotic on Feed Consumption, Body Weight and Blood Cholesterol Level in Broiler Fed on High Saturated or Unsaturated fat Ration. *Journal. Trop. Anim. Dev* 27 : 36-44.
- Wahju. 2004. *Kecernaan Protein*. Gajah Mada University Press: Yogyakarta.
- Wahyu, J. 2002. *Ilmu Nutrisi Unggas*. Gajah Mada University Press: Yogyakarta.

- Widodo. 2002. *Kecernaan Protein*. Pusat Antar Universitas Pangan dan Gizi. Institut Pertanian Bogor: Bogor.
- Winarno. 2000. *Metode Penelitian*. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Williamson, G. 1993. *Pengantar Peternakan di Daerah Tropis*. Universitas Gajah Mada: Yogyakarta.
- Wuryaningsih, E. 2005. Kebijakan pemerintah dalam pengamanan pangan asal hewan. *Prosiding Lokakarya Nasional Keamanan Pangan Produk Peternakan*. Bogor, 14 September 2005. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, Bogor. hlm. 9–13.
- Wuryantoro. 2000. *Prinsip-prinsip Kecernaan Unggas*. Pusat Antar Universitas Institut Pertanian Bogor: Bogor
- Yu, J. R. 2008. Evaluation of *Lactobacillus reuteri* Pg4 strain expressing heterologous B-glucanase as a probiotic in poultry diets based on barley. *Journal Anim Feed Sci*.
- Yusmarini. 1997. *Aktivitas Proteolitik Bakteri Asam Laktat dalam Fermentasi Protein*. Universitas Gajah Mada: Yogyakarta.

L

A

M

P

I

R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K S S A R

N


Lampiran 1. Uji SPSS Versi 16 Pengaruh Pemberian Antibiotik dan Probiotik terhadap Daya Cerna Protein Pada Broiler.

Descriptives

Daya Cerna Protein	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
P0	3	66.0333	12.51601	7.22612	34.9418	97.1248	55.15	79.71
P1	3	79.5833	5.06814	2.92609	66.9934	92.1733	74.06	84.02
P2	3	81.4067	8.69306	5.01894	59.8119	103.0014	71.37	86.56
P3	3	80.0000	1.15659	.66776	77.1269	82.8731	79.12	81.31
Total	12	76.7558	9.45733	2.73010	70.7469	82.7647	55.15	86.56
Model			8.05052	2.32398	71.3967	82.1150		
Fixed Effects				3.59539	65.3137	88.1980		
Random Effects								

ANOVA

Daya Cerna Protein	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	465.365	3	155.122	2.393	.144
Within Groups	518.487	8	64.811		
Total	983.852	11			



Gambar 2: Diagram Garis Daya Cerna Protein


Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian



Gambar 3: Proses Pembersihan Kandang




Gambar 4: Proses Pembuatan Sekat-sekat Kandang



Gambar 5: Antibiotik dan Probiotik yang digunakan



Gambar 6: Vaksin Yang Digunakan



Gambar 7: Pemberian Vaksinasi



Gambar 8: Penimbangan Pakan



Gambar 9: Pengambilan Feses



Gambar 10: Uji Analisis Laboratorium

RIWAYAT HIDUP



RUSTAN dilahirkan di Salulayo Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 24 September 1996. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara pasangan dari Arsyad dan Hasna. Penulis menyelesaikan pendidikan di SD Inpres Lembang di Kelurahan Kalukku, Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju pada tahun 2008. Pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Kalukku dan tamat pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan ke Sekolah kejuruan SMAN 1 Kalukku dan mengambil Program Ipa, sejak SMA penulis juga masuk disalah satu organisasi yaitu ROHIS (Rohani Islam) dan selesai pada tahun 2014. Setelah selesai dan lulus dari Sekolah Kejuruan tersebut, penulis melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi tepatnya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM), mengambil program studi Ilmu Peternakan, Fakultas Sains Dan Teknologi. Alhamdulillah berkat Do'a dan kerja keras serta kegigihannya penulis menyelesaikan kuliah Strata satu (S1) pada tahun 2018.

