

**IDENTIFIKASI BAKTERI ASAM LAKTAT DARI USUS DOC  
BROILER UMUR SATU HARI BERDASARKAN GEN 16S rRNA**



**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Peternakan (S.Pt) pada Fakultas Sains dan Teknologi  
Universitas Islam Negeri Alauddin  
Makassar*

Oleh :

SATRINA  
60700114042

**JURUSAN ILMU PETERNAKAN  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN  
MAKASSAR**

**2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Satrina  
NIM : 60700114042  
Tempat/Tgl. Lahir : Jenepono, 27 April 1996  
Jurusan : Ilmu Peternakan  
Fakultas : Sains dan Teknologi  
Alamat : jl. veteran bakung, perumahan Baruga samata blok B no. 9  
Judul : Identifikasi Bakteri Asam Laktat Dari Usus DOC Umur  
Satu Hari Berdasarkan Gen 16S rRNA

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R

Gowa, Agustus 2018

Penyusun,



**Satrina**

NIM: 60700114042

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi saudara **SATRINA**, NIM: 60700114042, mahasiswa Jurusan Ilmu Peternakan pada Fakultas Sains dan Teknologi, setelah dengan saksama meneliti dan mengoreksi Skripsi yang bersangkutan dengan judul, **“Identifikasi Bakteri Asam Laktat Dari Usus DOC Broiler Umur Satu Hari Berdasarkan Gen 16S rRNA”** memandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Gowa, Agustus 2018


Pembimbing I

Pembimbing II

  
Muh. Nur Hidayat S.Pt., M.P.  
Nip. 197509092009121001

  
Dr. Ir. Muh. Basir Paly, M.Si.  
Nip. 1950712 198603 1 002

Mengetahui  
Ketua Jurusan Ilmu Peternakan

  
Dr. Ir. Muh. Basir Paly, M.Si.  
Nip. 195907121986031002


## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Identifikasi Bakteri Asam Laktat Dari Usus DOC Broiler Umur Satu Hari Berdasarkan Gen 16S rRNA" yang disusun oleh **SATRINA, NIM: 60700114042**, mahasiswa Jurusan Ilmu Peternakan pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, 25 Juli 2018, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Peternakan pada Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Samata-Gowa, Agustus 2018 M  
Dzul Hijjah 1439 H

### DEWAN PENGUJI:

Ketua : Dr. Wasilah, S.T., M.T.

  
(.....)

Sekretaris : drh. Aminah Hajah Thaha, M.Si.

  
(.....)


Munaqisyi I : Rasyidah Mappangro, S.Pt., M.Si.

  
(.....)


Munaqisyi II : Dr. Muh. Sabri AR M.Ag.

  
(.....)

Pembimbing I : Muh. Nur Hidayat S.Pt., M.P.

  
(.....)

Pembimbing II : Dr. Ir. Muh. Basir Paly, M.Si.

  
(.....)

Diketahui oleh:  
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar,



  
Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.  
NIP. 19691205199303 1 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena berkat taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat merampungkan penyusunan skripsi yang berjudul “(Identifikasi Bakteri Asam Laktat Dari Usus DOC Broiler Umur Satu Hari Berdasarkan Gen 16S Rrna)” yang diajukan sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Ilmu Peternakan (S.Pt) pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang merupakan rahmat bagi semesta Alam dan menjadi sosok suri teladan bagi kita, beserta sahabat-sahabatnya dan kepada pengikut setianya Insyaa Allah. Penulis menyadari bahwa karya tulis ilmiah ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberi dukungan, doa, semangat, perjalanan dan pengalaman berharga pada penulis sejak penulis menginjak bangku perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi.

Selama penyusunan skripsi, tentunya tidak lepas dari berbagai hambatan dan tantangan, namun berkat doa yang begitu besar dari manusia yang begitu berharga dan merupakan penynemangat hidup. Untuk itu, perkenankanlah penulis menghanturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang istimewa kepada Ayah tercintah **Muh. Yusuf dan Ibu Nurbaya** serta Sekeluarga yang tampah pamrih,

penuh kasih sayang membesarkan dan mendidik penulis sejak kecil hingga menyelesaikan pendidikan seperti saat ini.

Terselesaikannya skripsi ini juga tidak lepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. **Bapak Prof. Dr. H. Musyafir Pabbabari, M.Si.** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. **Bapak Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.** selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. **Bapak Dr. Ir. Muh. Basir Paly, M.Si.** sebagai ketua Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. **Bapak Muh. Nur Hidayat, S.Pt., M.P.** selaku Dosen Pembimbing pertama, dan **Bapak Dr. Ir. Muh. Basir Paly, M.Si.** selaku Dosen Pembimbing kedua, atas bimbingan dan mengarahkan penulis mulai dari penyusunan proposal sampai penyelesaian skripsi ini.
5. **Ibu Rasyidah Mappanganro, S.Pt., M.Si. dan Dr. Muh. Sabri AR M.Ag.** selaku penguji yang telah memberikan saran dan kritikan yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. **Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Peternakan** atas bimbingan dalam kegiatan perkuliahan, baik dalam tatap muka maupun arahan-arahan diluar perkuliahan.

7. **Ibu Juniati Binti Lukman, S.Si.** Selaku pihak Laboran Science Building yang telah membantu dan membimbing peneliti dalam menyelesaikan penelitian.
8. Keluarga, rekan-rekan, dan sahabat tercinta: **Ratih purnama sari, jihan salsabila, Muhammad Arsan Jamili, S.Pt., M.Si, Hikmawati, S.Pt, Hasrin, S.Pt, syafaruddin, S.Pt, Asrul, S.Pt,** yang tidak pernah berhenti mengiringi do'a, motivasi, serta canda tawa sehingga dalam kondisi apapun tetap mampu percaya diri dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Teruntuk **Muhammad Faiz, S.H** saya mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Allah SWT telah mempertemukan kita dan terima kasih karena telah bersedia menemani dan membantu saya dalam melakukan penelitian, terima kasih untuk bantuan dan semangat yang diberikan kepada saya selama menyelesaikan skripsi.
10. Sahabat-sahabat tercinta di Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar: **Titin Aprilia Fani, Dian Setyawati Mansur, Khusnul Khatimah Akhmad, Muthmainnah Syahrul dan Sri Irmawati.** terima kasih untuk semua kebahagiaan yang telah diberikan kepada penulis semenjak memasuki jenjang perkuliahan, selalu menjadi sahabat dalam kondisi apapun, dengan hadirnya kalian penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat tercinta saya di SMKN 2 sinjai **Andi Nurlinda, Jumarni, Hastina, A. Nur Islamia Hasbi, Sutarmi, Rahmadani, Muhammad Ikhsan, Izhak Hamzah, Muhammad Saleh, Suhendra, Chycu Andi Asapa, Awaluddin, Sukirman.** Terima kasih untuk semua dukungan yang kalian

berikan, selalu ada dalam keadaan apapun, tanpa kalian saya mungkin tidak ada apa-apanya.

12. partner in crime dalam setiap hal **Riska Nurmayanti**, terima kasih sudah hadir dan menjadi teman dalam melakukan hal-hal gila, yang telah memberi satu warna dalam kehidupan saya selama akhir semester, memberi semangat untuk saya agar selalu optimis selama menunggu hasil penelitian.
13. Teman-teman KKN Angkatan 57 khususnya KKN Polewali Manjah **Fajriani Jamalulai, Dini Aryani, Hesti Julianihandayani, Sri Wahyuni, Eno Angriani, Muhammad Amin, Risman, Bayu Febrianto** yang telah memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
14. Terkhusus untuk adik yang tidak sedarah yang selalu bersama saya selama kurang lebih dua tahun **Sri Rahmani Inayah**, terima kasih sudah sabar menghadapi sikap dan kelakuan saya yang masih kekenak-kanakan, yang selalu ribut dan mungkin saja mengganggu aktivitas tidurmu.
15. Teman-teman di Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar Angkatan 014 kelas B terkhusus kepada **Ulil Albab Samsur, Cheddar Ali, Abdul Rahman, Adly Ismirandy, Rustan, Syarif Hidayatullah, Arfah, Zulikar, Sultan Akbar Wahidin, Muh Arfa, Khaerullah, Iswandi, Andi Haris Asbal, Muh. Salman Alfarizi, Riskayanti, Ama Amelia Arianto, Rosita Rajak, Andi Apriana Aziz, Rini Anggriani.**



16. Teman-teman seperjuangan ELANG 014 terkhusus **Nurbaya, A. Nurislamia Hasbi, Rahmawati, Isra Nurfadillah Hasris, Muhlisani, Nadya Putri, Reskiyanti Isnani, Eka Fitriani, Hilmiati, Mirnawati, Wahyuni, Ismawati, Febri Widya Astuti, Musrifa Aliya, Muslina, Makmur, Arman, Redho, Muhammad Basri, Muhammad Ardilawa, Rival, Muhammad Zakir, Usman, Muhammad Rusli, Muhammad Awaluddin, Muhammad Rizal, Supriadi, Ulil Albab Samsur, Chaedar Ali, Abdul Rahman, Adly Ismirandy, Rustan, Syarif Hidayatullah, Arfah, Zulikar, Sultan Akbar Wahidin, Muh Arfa, Khaerullah, Iswandi, Andi Haris Asbal , Muh. Salman Alfarizi, Riskayanti, Ama Amelia Arianto, Rosita Rajak, Andi Apriana Aziz, Rini Anggriani** terima kasih telah berjuang bersama mulai dari awal sampai saat ini.

Penulis berharap adanya masukan dan saran yang positif demi memperbaiki skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menambah ilmu pengetahuan tentang peternakan khususnya masalah Produksi Rumput Gajah Mini. Semoga segala bantuan dan bimbingan semua pihak dalam penyusunan skripsi ini mendapat imbalan dari Allah SWT. Amin.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb

Gowa, Agustus 2018



Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
KATA PENGANTARA .....	v
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
ABSTRAK .....	xv
ABSTRACT .....	xvi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	2
C. Tujuan Penelitian .....	2
D. Kegunaan Penelitian .....	3
E. Definisi Operasional .....	3
F. Ruang Lingkup Penelitian .....	5
G. Kajian Terdahulu .....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	9
A. Tinjauan Umum Tentang Ternak Unggas .....	9
B. Saluran Pencernaan Unggas .....	13
C. Mikrobiota Saluran Pencernaan Unggas .....	16
D. Bakteri Asam Laktat .....	19

E. Polymerase Chain Reaction (PCR) .....	28
F. Gen 16S rRNA .....	39
BAB III METODE PENELITIAN .....	50
A. Waktu dan Tempat Penelitian .....	50
B. Alat dan Bahan Penelitian .....	50
C. Prosedur Kerja .....	51
1. Ekstraksi DNA .....	51
2. Amplifikasi DNA dengan Metode PCR .....	52
3. Deteksi Produk PCR dengan Elektroforesis .....	53
4. Sekuensing DNA .....	54
5. Analisa Urutan DNA pengkode 16S Rrna .....	54
D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	54
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	55
A. Hasil Pengamatan .....	55
1. Amplifikasi DNA dengan Metode PCR .....	55
2. Hasil BLAST Gen 16S rRNA .....	56
B. Pembahasan .....	57
1. Amplifikasi DNA dengan metode PCR .....	57
2. Hasil BLAST Gen 16S rRNA .....	59
3. Hasil Identifikasi Bakteri Asam Laktat dengan metode berbeda .....	61
BAB V PENUTUP .....	65
A. Kesimpulan .....	65
B. saran .....	65
DAFTAR PUSTAKA .....	66
LAMPIRAN .....	72
RIWAYAT HIDUP .....	86

**DAFTAR TABEL**

	Halaman
1. RNA Ribosom Pada Prokariot .....	41
2. Sekuens DNA Beberapa Organisme .....	42
3. prosedur dan waktu yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi bakteri dalam kegiatan laboratorium rutin .....	47
4. Hasil BLAST Gen 16S rRNA .....	56



## DAFTAR GAMBAR

- |  | Halaman |
|--|---------|
| 1. Gambar 1. Hasil Amplifikasi Gen rRNA dengan primer 63F dan 1387 ..... | 55      |



**DAFTAR LAMPIRAN**

	Halaman
Lampiran 1. Susunan Pasangan Basa <i>Enterococcus faecalis</i> .....	73
Lampiran 2. Hasil BLAST Gen 16S Rrna .....	74
Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian .....	79



## ABSTRAK

Name : Satrina

Nim : 60700114042

Jurusan : Ilmu Peternakan

Judul Skripsi : Identifikasi Bakteri Asam Laktat Dari Usus DOC Broiler Umur Satu Hari Berdasarkan Gen 16s rRNA

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bakteri asam laktat yang terdapat pada usus DOC Broiler umur satu hari menggunakan teknik molekuler berbasis Gen 16S rRNA. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Polymerase Chain Reaction (PCR)-sekuensing meliputi Ekstraksi DNA, Amplifikasi DNA dengan PCR, Elektroforesis, Sekuesing DNA, dan Analisis Urutan DNA pengkode 16S rRNA. Analisis dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif yaitu dengan melihat hasil dari proses Ekstraksi DNA, Amplifikasi DNA, Elektroforesis, Sekuesing DNA, dan Pengurutan DNA, dimana seluruh data diperoleh dari hasil pengamatan yang ditunjukkan pada beberapa indikator uji yang telah dilakukan. Yakni pengumpulan data secara langsung dan dengan cara dokumentasi untuk dijadikan bukti hasil penelitian. Berdasarkan hasil analisis sekuens yang telah dilakukan menunjukkan hasil bahwa bakteri yang terdapat pada isolat adalah bakteri jenis *Enterococcus faecalis* yang memiliki tingkat kesamaan panjang nukleotida pada database mencapai 75% dan memiliki kecocokan sekuens mencapai 95%. *Enterococcus faecalis* merupakan sebagai bakteri Gram positif, berbentuk coccus atau bulat.

*Kata Kunci : Identifikasi BAL, Polymerase chain reaction (PCR), Gen 16s rRNA, Saluran Pencernaan, DOC.*

## ABSTRACT

Name : Satrina

Nim : 60700114042

Department : Animal Science

Thesis Title : Identification of Lactic Acid Bacteria from DOC Broiler Age One Day Based on Gen 16s rRNA

---

This study aims to identify lactic acid bacteria found in intestinal DOC Broilers aged one day using molecular techniques based on 16S rRNA gene. The method used is the method of Polymerase Chain Reaction (PCR) -sequencing include DNA extraction, DNA amplification by PCR, Elektroforesis, Sequencing DNA and coding DNA sequence analysis of 16S rRNA. The analysis was carried out using descriptive analysis by looking at the results of the DNA extraction, DNA amplification, electrophoresis, DNA sequencing and DNA sequencing processes, where all the data obtained from the observations shown in several test indicators were carried out. Namely data collection directly and by means of documentation to be used as evidence of research results. Based on sequence analysis results have shown results that bacteria present in isolates a bacterial species of *Enterococcus faecalis* that has a nucleotide length similarity level in the database reaching 75% and has a sequence sequence of 95%. *Enterococcus faecalis* is a Gram positive bacteria, in the form of coccus or round.

*Keywords:* Identification of BAL, Polymerase chain reaction (PCR), Gen 16s rRNA, Digestive Tract, DOC.



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang***

Indonesia merupakan negara yang sangat kaya dengan berbagai macam ragam tumbuh-tumbuhan maupun binatang ternak, salah satunya adalah jenis ayam broiler yang pertumbuhannya sangat cepat sehingga berbagai macam percobaan dilakukan untuk tetap membuat ayam tersebut dapat tumbuh dengan baik, pada era moderen ini berbagai macam penelitian dilakukan oleh para ahli seperti halnya membuktikan bahwa dalam usus DOC ayam broiler dapat dijadikan sebagai kandidat probiotik bakteri asam laktat.

Mikroba yang sering digunakan sebagai probiotik pada ayam berasal dari kelompok bakteri asam laktat (BAL). BAL adalah kelompok bakteri Gram positif berbentuk kokus atau batang, tidak membentuk spora, suhu optimum  $\pm 40^{\circ}\text{C}$ , pada umumnya tidak motil, bersifat anaerob, katalase negatif dan oksidase positif, dengan asam laktat sebagai produk utama fermentasi karbohidrat. Bakteri asam laktat dikenal sebagai bakteri yang bermanfaat bagi industri makanan dan minuman (Surono, 2004). Eksplorasi pemanfaatan bakteri asam laktat dalam industri mendorong pencarian bakteri asam laktat baik dari makanan fermentasi maupun yang berasal dari saluran pencernaan. Sifat-sifat khusus bakteri asam laktat adalah mampu tumbuh pada kadar gula, alkohol, dan garam yang tinggi, mampu memfermentasikan monosakarida dan disakarida. Dalam saluran pencernaan tumbuh normal dalam jalur intestin suatu bakteri asam laktat yang

memberikan efek positif yang penting terhadap kesehatan tubuh, yaitu melalui kemampuannya menekan pertumbuhan bakteri patogen intestin penyebab diare, serta menstimulasi sistem kekebalan tubuh (imun) (Rahayu dan Margino, 1997).

BAL telah lama secara luas digunakan sebagai kultur starter dalam fermentasi makanan, produk susu dan pakan. Selain itu, BAL telah dikenal berperan penting bagi kesehatan manusia dan hewan. BAL digunakan sebagai probiotik untuk meningkatkan mikrobiota normal usus inangnya karena kemampuannya menghasilkan berbagai zat antimikroba termasuk asam laktat, alkohol, karbondioksida, diasetil, hidrogen peroksida, bakteriosin dan metabolit lainnya (Gaggia *et al*, 2010).

Identifikasi ini dapat menjadi dasar pembuatan probiotik yang efektif pada usus DOC umur Satu hari. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka akan dilakukan penelitian tentang. “Identifikasi Keragaman Bakteri Asam Laktat dari Usus DOC Broiler Umur Satu Hari Berdasarkan Gen 16S rRNA.

### **B. Rumusan Masalah**

Apakah terdapat Bakteri Asam Laktat dari saluran DOC broiler umur satu hari dengan menggunakan teknik berbasis 16S rRNA ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang adanya bakteri asam laktat yang menyusun mikrobiota pada Usus DOC Broiler Umur Satu Hari menggunakan teknik molekuler berbasis 16S rRNA yaitu dengan metode *Polymerase Chain Reaction* (PCR)-sekuensing.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini yaitu, dapat bermanfaat sebagai bahan informasi bagi peneliti dan mahasiswa tentang adanya bakteri asam laktat dari usus DOC broiler umur satu hari menggunakan teknik molekuler berbasis 16S rRNA yaitu dengan metode Polymerase Chain Reaction (PCR)-sekuensing.

#### **E. Defenisi Operasional**

1. Unggas adalah jenis hewan ternak kelompok burung yang dimanfaatkan untuk daging dan telur atau bulunya.
2. DOC ayam adalah ayam dengan umur dibawah 10 hari dan paling lama 14 hari setelah ayam itu menetas, DOC ayam biasanya dipakai untuk istilah ayam pedaging atau ayam potong.
3. Sistem pencernaan adalah penghancuran bahan makanan (mekanis, enzimatis, kimia, dan mikrobial) dari bentuk kompleks (molekul besar) menjadi sederhana (bahan penyusun) dalam saluran cerna.
4. Usus adalah bagian dari sistem pencernaan yang bermula dari lambung hingga anus. Pada usus terdiri dari dua bagian yaitu usus kecil dan usus besar (kolon).
5. Bakteri asam laktat (BAL) merupakan spesies bakteri yang mempunyai kemampuan untuk membentuk asam laktat dari metabolisme karbohidrat dan tumbuh pada pH lingkungan yang rendah bakteri.
6. Sebagian BAL berpotensi memberikan dampak positif bagi kesehatan dan nutrisi manusia, beberapa diantaranya meningkatkan nilai nutrisi makanan, mengontrol infeksi pada usus, meningkatkan digesti

(pencernaan) laktosa, mengendalikan beberapa tipe kanker dan mengendalikan tingkat serum kolesterol dalam darah.

7. Identifikasi BAL dapat dilakukan berdasarkan fenotif dan genotif.
8. Analisa genotip dengan menggunakan metode molekular antara lain melalui sekuensing gen pengkode 16S rRNA dengan metode *Polymerase Chain Reaction* (PCR)-sekuensing. Analisa PCR dapat digunakan sebagai alat untuk mengungkap keragaman BAL pada usus DOC umur Satu hari.
9. Genotif adalah susunan gen yang menentukan sifat dasar suatu makhluk hidup dan bersifat tetap.
10. DNA adalah suatu asam nukleat yang menyimpan segala informasi biologis yang unik dari setiap makhluk hidup dan beberapa virus.
11. Gen 16S rRNA merupakan salah satu penyusun subunit 30S, yang penting untuk translasi, dan terdiri dari 1542 pasangan basa. 16S adalah suatu jenis RNA yang dilibatkan dalam produksi protein.
12. PCR adalah reaksi polimerase berantai, yaitu reaksi yang melibatkan enzim polimerase yang dilakukan secara berulang-ulang. Yang diulang-ulang adalah proses pemisahan untai ganda DNA menjadi untai tunggal hibridisasi primer untuk mengawali replikasi DNA dilanjutkan dengan proses penambahan basa pada cetakan DNA oleh enzim polimerase.
13. Sekuesing atau pengurutan DNA adalah proses atau teknik penentuan urutan basa nukleotida pada suatu molekul DNA. Urutan tersebut dikenal sebagai sekuens DNA yang merupakan informasi paling mendasar suatu

gen atau genom karena mengandung instruksi yang dibutuhkan untuk pembentukan tubuh makhluk hidup.

14. Elektroforesis DNA merupakan teknik untuk memisahkan sampel DNA berdasarkan atas ukuran (berat molekul) dan struktur fisik molekulernya.

15. Amplifikasi adalah suatu proses yang dapat mengadakan atau merplikasi suatu DNA yang semulanya sedikit (bisa 1 atau 2 dan seterusnya) bisa menjadi banyak atau berlipat ganda hingga 10 kali lipat.

16. rRNA berfungsi sebagai tempat pembentukan protein, rRNA terdiri dari dua sub unit. Sub unit kecil berperan dalam mengikat mRNA sedangkan sub unit besar berperan untuk mengikat tRNA yang sesuai.

#### **F. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian meliputi identifikasi bakteri asam laktat dari usus DOC dengan metode molekular antara lain melalui sekuensing gen pengkode 16S rRNA dengan metode *Polymerase Chain Reaction* (PCR)-sekuensing dapat digunakan sebagai alat untuk mengungkap keragaman BAL pada usus DOC broiler umur Satu hari.

#### **G. Hipotesis**

Diduga bahwa di dalam usus DOC umur Satu hari terdapat bakteri asam laktat, yang akan diidentifikasi dengan menggunakan teknik molekuler 16S rRNA yaitu dengan metode *Polymerase Chain Reaction* (PCR).

## H. Kajian Pustaka (Penelitian Terdahulu)

1. Jannah (2014), telah meneliti tentang “Analisis Keragaman Bakteri Asam Laktat Dari Saluran Pencernaan Ayam Cemani Berdasarkan Gen 16S rRNA dan Potensi Penggunaannya sebagai Probiotik”. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui keragaman Bakteri Asam Laktat dari saluran Saluran Pencernaan Ayam Cemani Berdasarkan Gen 16S rRNA dan Potensi Penggunaannya sebagai Probiotik. Analisa keragaman bakteri dengan menggunakan metode T-RFLP dilakukan dengan isolasi DNA genom langsung dari sampel lumen saluran pencernaan ayam (tembolok, ventrikulus, ileum dan sekum), primer yang digunakan adalah primer forward 27F dilabel dengan 6-carboxyfluorescein dan primer reverse spesifik untuk bakteri asam laktat SG-Lab-0677, *enzim restriksi* yang digunakan HaeIII dan MspI. Selanjutnya ditentukan jumlah *filotipe*, kelimpahannya (indeks Shannon Wiener) dan indeks kesamaan komunitas (indeks Sorensen). Analisa plate counts dilakukan untuk memperoleh nilai total bakteri asam laktat dan juga untuk memperoleh isolat kandidat probiotik, dengan cara ditumbuhkan pada cawan petri yang berisi media padat MRS dan GYP yang ditambahkan dengan 0.5% CaCO<sub>3</sub>, diinkubasi secara anaerobik selama 48 jam pada suhu 37°C.

Hasil analisa T-RFLP menunjukkan perbedaan dan dinamika populasi antara mikroba pada tembolok, ventrikulus, ileum dan sekum. Tidak semua filotipe BAL dapat diidentifikasi, beberapa filotipe BAL (41 %)

tidak dapat diidentifikasi (unidentified) dan 17% diidentifikasi sebagai bakteri yang belum dapat dikulturkan (unculturable), hal ini mengacu pada database yang tersedia di MiCA3. Jumlah filotipe (S) BAL di ileum (9.5) lebih tinggi daripada di komunitas lain dan jumlah terendahnya adalah di sekum (6.5), *indeks keragaman Shannon-Wiener* menunjukkan indeks keragaman bervariasi dengan nilai tertinggi di ileum (2.13), sedangkan yang terendah di sekum (1.08), indeks kesamaan komunitas tertinggi (0.70) adalah antara komunitas ventrikulus dan ileum. Dengan menggunakan metode tradisional pengkulturan, populasi bakteri asam laktat dari saluran pencernaan ayam diketahui antara 7.12 sampai 9.07 log CFU g<sup>-1</sup> dan jumlah tertingginya ditemukan di bagian tembolok.

2. Kadir (2016) telah meneliti tentang “Pertumbuhan (BAL) Kandidat Probiotik Asal Saluran Pencernaan Doc Broiler terhadap Berbagai Kondisi Asam Lambung”, Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pertumbuhan Bakteri Asam Laktat terhadap berbagai kondisi asam lambung saluran pencernaan DOC Broiler. Mikrobia kandidat probiotik diisolasi dari saluran pencernaan DOC Broiler yang baru menetas dan belum mendapatkan tambahan pakan maupun antibiotik. Metode penelitian yaitu mengamati pertumbuhan Bakteri Asam Laktat terhadap berbagai kondisi asam lambung dengan menggunakan medium MRSB-HCl dan MRSB-KOH dengan masing-masing 1 ose bakteri (ose bulat) yang diinkubasi 1x24 jam dengan derajat keasaman 1-6 (pH) dimana data yang diperoleh dari hasil pengamatan (positif atau negatif)

yang ditunjukkan pada indikator uji yang telah dilakukan. Hasil penelitian didapatkan bahwa Bakteri Asam Laktat dapat tumbuh pada pH 4, pH 5 dan pH 6 yang terlihat dengan adanya endapan dan medium yang keruh sedangkan untuk pH 1-3 tidak terlihat adanya pertumbuhan dengan medium yang masih tetap jernih. Berdasarkan hal tersebut isolat bakteri asam laktat dapat dimanfaatkan sebagai probiotik.





## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### ***A. Tinjauan Islam Tentang Ternak Unggas***

Ilmu peternakan merupakan ilmu terapan yang disebut secara eksplisit di dalam Al Quran. Bahkan beberapa nama hewan ternak dijadikan sebagai nama surat di dalam Al Quran. Hewan ternak merupakan sumber pelajaran yang penting di alam karena terdapat banyak hikmah dalam penciptaannya. Lihatlah bagaimana Allah swt memberikan kemampuan pada ternak ruminansia (sapi, kambing, domba, dan kerbau) yang mampu mengubah rumput (hijauan) menjadi daging dan susu serta ternak non ruminansia (kuda dan unggas) yang mampu mengubah rumput menjadi daging dan berbagai macam aneka hiasan yang terbuat dari bulu unggas atau kemampuan yang dimiliki lebah madu dalam mengubah cairan nektar tanaman menjadi madu yang bermanfaat dan berkhasiat obat bagi manusia. Sedemikian besarnya peran usaha peternakan dalam kehidupan, maka sudah pada tempatnya sub sektor ini mendapat perhatian kaum muslimin, termasuk melakukan penelitian dan pengembangan produk peternakan (Ashshiddiq, 1971).

Ternak unggas merupakan spesies burung yang dapat memberikan keuntungan ekonomis bagi manusia yang memeliharanya, beberapa jenis unggas yang memberikan keuntungan antara lain ayam, itik, angsa dan puyuh. Usaha beternak unggas perlu memperhatikan pakan, Breeding, manajemen dan lingkungan. Keempat hal tersebut diperlukan dalam peningkatan produksi dan mempercepat daya kerja setiap sistem yang ada di dalam tubuh ternak sehingga

menghasilkan produk yang optimum, antara lain sistem pencernaan, sistem Respirasi, sistem reproduksi, dan sistem Urinari (Sari, 2012).

Ayam broiler merupakan suatu ternak unggas hasil dari budidaya yang bersifat ekonomis dengan pertumbuhan yang cukup cepat dalam menghasilkan daging yang siap potong dengan lama budidaya yang relatif singkat, baik jenis jantan atau pun betina (Kanisius, 1986).

Ayam broiler merupakan unggas penghasil daging sebagai sumber protein hewani untuk pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Permintaan terhadap daging ayam semakin bertambah seiring dengan peningkatan penghasilan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya asupan protein hewani. Ayam broiler memiliki siklus produksi lebih singkat dibandingkan dengan unggas lain, karena mempunyai sifat genetik yang semakin baik khususnya untuk sifat pertumbuhan. Keberhasilan peternakan ayam broiler dipengaruhi oleh mutu genetik, lingkungan, dan interaksi antara genetik dengan lingkungan.

Hal ini sesuai dengan Firman Allah swt. dalam QS al-An'am/6:142 yang berbunyi:

وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا ۚ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٤٢﴾

Terjemahnya:

Dan di antara hewan ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang untuk disembelih. Makanlah dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. (Kementerian Agama, RI., 2012:147).

Maksud dari ayat diatas bahwa Allah swt. menciptakan berbagai ciptaan beraneka ragam ternak yang bisa dijadikan pangan untuk kelangsungan hidup manusia yang memiliki nilai gizi protein yang menunjang asupan serap pangan yang memiliki nutrisi bagi tubuh seperti dengan mengkonsumsi daging seperti daging ayam broiler.

Ternak mampu memenuhi kebutuhan hidup manusia terutama pada kebutuhan pangan berasal dari produk hewani yang pokok yaitu daging, susu, dan kulit. Jika kita perhatikan maka yang tersirat dalam Qs Al-An'am ayat 142 tersebut dapat di lihat pentingnya hewan ternak bagi manusia. Betapa tidak, produk utama ternak yaitu susu, daging, dan telur merupakan bahan pangan hewani yang bergizi tinggi yang dibutuhkan manusia. Hewan ternak yang dimaksud adalah golongan hewan ruminansia dan nonruminansia termasuk unggas.

Islam sendiri memandang pemanfaatan mikroorganismenya bagi kehidupan manusia sebagai sesuatu hal yang perlu untuk dikembangkan, sebagaimana firman Allah swt dalam Qs Ar-Ra'd/13:17 yang berbunyi:

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حَلِيَّةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهٗ ۗ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْحَقِّقَ وَالْبَاطِلَ ۗ فَاَمَّا الزَّبَدُ فَيَذٰهَبُ جُفَاءً ۗ وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْاَرْضِ ۗ

كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ ﴿١٧﴾

Terjemahnya:

Allah swt telah menurunkan air (hujan) dari langit, Maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, Maka arus itu membawa buih yang mengambang. dan dari apa (logam) yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada (pula) buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah swt membuat perumpamaan (bagi) yang benar dan yang bathil. Adapun buih itu, akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya; Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, Maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah swt membuat perumpamaan-perumpamaan. (Kementerian Agama RI, 2011).

Dalam uraian ayat tersebut kita dapat mengetahui bahwa Allah swt telah menciptakan sesuatu yang diinginkan dan apapun yang Allah swt kehendaki atas makhluk-makhlukNya ia ciptakan dan dapat menjadikannya bermakna dari masing-masing penciptaanya. Begitu juga dalam proses pengisolasian ini terjadilah makhluk mikroorganisme yang tidak kasat mata (Hifizah, 2012).

Dapat kita ketahui bahwa Allah swt telah menciptakan berbagai makhluk hidup yang beraneka ragam dari benda yang bisa dilihat oleh mata secara langsung ataupun benda-benda kecil seperti halnya mikroorganisme. Salah satu contoh mikroorganisme yaitu kelompok mikroorganisme yang dimanfaatkan untuk merubah sesuatu yang tidak bermanfaat menjadi bermanfaat. Hal ini menunjukkan kekuasaan Allah s.wt yang begitu besar untuk menciptakan segala sesuatu yang dikehendaki. Semua yang telah diciptakan-Nya tiada yang sia-sia karena semua ada manfaatnya tergantung manusia bagaimana mengolahnya. Namun, sejauh ini manusia telah menerapkan ilmu pengetahuan untuk memanfaatkan apa yang telah Allah swt berikan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini menunjukkan bahwa semua makhluk yang diciptakan-Nya tiada yang sia-sia (Hifizah, 2012).

## **B. Saluran Pencernaan Unggas**

Saluran pencernaan ayam atau dikenal sebagai saluran gastrointestinal merupakan saluran yang memanjang dari mulut sampai kloaka dengan beberapa organ penting diantara keduanya, berfungsi dalam mengubah dan mencerna makanan menjadi nutrisi yang dapat diabsorpsi dan digunakan oleh tubuh/inang. Struktur saluran pencernaan terdiri dari mulut, esofagus, tembolok, proventrikulus, *gizzard*/ventrikulus, usus halus (duodenum, jejunum & ileum), dan usus besar (sekum, usus besar dan rektum). Masing-masing bagian memiliki struktur histologi dan anatomi yang dirancang sesuai fungsi masing-masing dalam proses pencernaan. Masing-masing bagian juga mempunyai pH lingkungan yang berbeda, tembolok dengan pH 5.5, proventrikulus 2.5-3.5, *gizzard*/ventrikulus 2.5-3.5, duodenum 5-6, jejunum 6.5-7, ileum 7.0-7.5, sekum 6-7, dan kolon 7-8 (Salanitro *et al*, 1974 ).

Menurut Abun (2008) saluran-saluran pencernaan pada ayam broiler terdiri dari :

### 1. Mulut dan Esofagus

Mulut ayam umum disebut dengan paruh. Fungsi utamanya adalah untuk memegang, menyobek, memecah makanan atau memangsanya. Mulut ayam tidak memiliki bibir dan gigi. Peranan bibir dan gigi pada ayam digantikan oleh rahang yang menanduk dan membentuk dan membentuk paruh. Lidahnya runcing dan keras seperti ujung panah dengan arah ke depan. Bentuk seperti kail pada bagian belakang lidah yang berfungsi untuk mendorong pakan menuju esofagus sewaktu lidah

digerakkan ke depan dan ke belakang. Kelenjar ludah mengeluarkan cairan yang melicinkan pakan menuju esofagus dan diteruskan ke tembolok. Makanan yang masuk ke dalam mulut tidak dikunyah karena ayam tidak mempunyai gigi, dan secara utuh masuk ke dalam tembolok, yang merupakan perpanjangan dari esofagus.

## 2. Tembolok

Tembolok adalah organ yang berbentuk kantung dan merupakan daerah pelebaran dari esofagus. Proses pencernaan di dalam tembolok sangat kecil terjadi. Fungsi utama dari tembolok adalah sebagai organ penyimpanan pakan. Pakan yang berupa serat kasar dan biji-bijian tinggal di dalam tembolok selama beberapa jam untuk proses pelunakan dan pengasaman. Makanan berada di tembolok selama 6 jam sehingga makanan mengalami fermentasi oleh kelompok *Lactobacillus*. Dari tembolok masuk ke bagian yang terdiri dari 2 bagian yang terpisah, yaitu proventrikulus (disebut sebagai *true stomach*, bagian glandula) dan ventrikulus (*mechanical stomach*, bagian muscular).

## 3. Perut Kelenjar

Perut kelenjar atau proventrikulus merupakan pelebaran dan penebalan dari ujung akhir esofagus. Asam hidroklorit dan enzim pepsin yang dihasilkan dinding perut kelenjar berfungsi untuk membantu proses pencernaan protein. Sewaktu makanan melewatinya, sel kelenjar secara mekanis akan berkerut dan menyebabkan keluarnya cairan kelenjar perut. Pencernaan pakan di dalam perut kelenjar hanya kecil peranannya, karena

makanan hanya tinggal di dalam organ ini dalam waktu relatif pendek.

#### 4. Empedal

Empedal terdiri atas serabut otot yang padat dan kuat. Bentuknya bulat telur dengan dua lubang saluran di ujung-ujungnya. Di bagian depan berhubungan dengan perut kelenjar dan bagian yang lain dengan usus halus. Fungsi utama empedal adalah menggiling dan meremas pakan keras. Perototan empedal melakukan gerakan meremas kurang lebih empat kali satu menit. Di dalam empedal ini dapat dihasilkan asam hidroklorit. Proses mencerna makanan secara normal dapat dibantu oleh adanya kerikil yang biasa diambil dan ditelan melalui mulut. Ukuran empedal dipengaruhi oleh aktifitasnya.

#### 5. Usus halus

Usus terdiri atas saluran makanan yang dimulai dari duodenum, yaitu usus halus bagian depan dan berakhir di rektum atau usus besar di bagian paling belakang. Pencernaan dan penyerapan pakan utamanya terjadi di usus halus. Selaput lendir usus halus memiliki jonjot yang lembut dan menonjol seperti jari. Fungsinya selain sebagai penggerak aliran pakan dalam usus juga untuk menaikkan permukaan penyerapan sari makanan. Di usus halus juga disekresikan *mucus*, serta adanya vili dan mikrovili yang membantu penyerapan nutrisi makanan. Setelah itu sisa makanan masuk ke usus besar, yang di bagian ini terdapat sepasang sekum.

## 6. Usus Besar

Pada perkembangan usus bagian bawah dan rektum terdapat dua bentuk cabang usus yang buntu sehingga disebut usus buntu atau sekum. Usus ini biasanya berukuran panjang 10-15 cm dan terisi calon tinja. Usus besar paling belakang adalah rektum yang pendek dan berakhir di kloaka.

## 7. Kloaka

Kloaka merupakan suatu tabung yang berhubungan dengan saluran pencernaan, saluran kencing dan reproduksi yang membuka keluar menuju anus. Organ ini bertaut dengan bursa fabrius pada sisi atas berdekatan dengan tepi luarnya. Air kencing yang sebagian besar adalah endapan asam urat dikeluarkan melalui kloaka bersama tinja dengan bentuk seperti pasta putih (Daghir, 1995; Jacob *et al.* 2011).

### **C. Mikrobiota pada Saluran Pencernaan Unggas**

Saluran pencernaan ternak merupakan tempat persembunyian (tempat hidup) mikroflora yang segera terbentuk setelah dilahirkan. Mikroflora indigenous dewasa akan menjadi *barrier* (pembawa) koloni mikroorganisme patogen seperti *Salmonella* dan *Escherichia coli* mikroflora yang menyokong kesehatan hewan terdiri dari berbagai macam spesies mikroorganisme seperti *Lactobacillus*, *Bifidobacterium* dan *Bacteroides* yang sebagian besar merupakan mikroorganisme yang predominan. Semua mikroba tersebut 90%-nya tergolong flora. Kelompok lainnya adalah *Enterobacteriaceae*, *Enterococcus*, dan *Clostridium*. Dalam kesehatan hewan, rasio jumlah mikroorganisme pada kelompok bakteri tersebut adalah penting. Digesti mikroba terjadi di tembolok



dan bagian bawah ileum sampai sekum terdapat banyak mikroorganisme (*Lactobacilli*) berguna untuk memecah karbohidrat, protein dan gula yang lolos oleh enzim. Ceca mempunyai populasi bakteri yang terbesar dan bertindak sebagai kamar fermentasi. Hasil utama pada fermentasi adalah asam lemak volatile, terutama asam asetat, asam propionate, CO<sub>2</sub>, dan methane dan beberapa vitamin yang diserap oleh ceca (Hifizah, 2012).

Diketahui bahwa mikroflora saluran pencernaan hewan dapat saling berpengaruh, misalnya oleh ingesti mikroorganisme lainnya. Hasil perlakuan tersebut dapat merubah jumlah keberadaan mikroorganisme, menghasilkan lingkungan yang cocok bagi kolonisasi mikroba, yang pada akhirnya berpotensi bagi berkembangnya mikroorganisme patogen. Diantara mikroba patogen *Salmonella* dan *Campylobacter* diperkirakan merupakan masalah serius pada unggas. Populasi mikroorganisme yang ada didalam saluran pencernaan ada dua macam, yaitu bakteri yang berkoloni di dalam saluran pencernaan itu sendiri (*autochonus*) dan bakteri yang berasal dari luar tubuh ternak dan hidup di dalam saluran pencernaan (*allochonus*). Kelompok bakteri yang kedua ini biasanya ditambahkan ke dalam ransum atau air minum ternak sebagai imbuhan pakan (*Feed Additive*). Ahli makanan ternak (Nutrisionis) memberikan istilah pada mikroba yang dijadikan imbuhan pakan tersebut sebagai probiotik. Beberapa data hasil penelitian menunjukkan, bahwa bakteri probiotik yang ditambahkan ke dalam ransum atau air minum ternak dapat mencegah infeksi dan kolonisasi patogen di dalam saluran pencernaan unggas (Hifizah, 2012).

Kelompok bakteri yang dominan pada usus ayam adalah bakteri Gram positif, Proteobakteri, dan Chthophagal/Flexibacter/Bakteroides. Pada bagian ileum dan sekum banyak dihuni oleh bakteri Gram positif seperti *Lactobacillus*, *Clostridia*, *Bacillus*, dan *Streptococci*. Jumlah bakteri *Bacillus* pada sekum (1,45%) dan ileum (0,67%). Akan tetapi, seiring dengan bertambahnya umur ayam broiler, jumlah *Bacillus* juga meningkat pada sekum, yaitu pada umur 14 hari (2,70%), 21 hari (4,04%) dan 28 hari (1,75%), dan umur 49 (4,04%) (Hifizah, 2012).

Disamping itu nilai pH menyebabkan populasi mikroba di dalam setiap bagian saluran pencernaan menjadi spesifik. Nilai pH pada saluran pencernaan unggas pada setiap bagian, adalah: tembolok (4.5), proventrikulus (4.4), gizzard (2.6), duodenum (5.7-6.0), jejunum (5.8), ileum (6.3), kolon (6.3), ceca (5.7), dan empedu (5.9). Salah satu faktor yang dapat menyebabkan turunnya nilai pH pada saluran pencernaan adalah fermentasi pakan. Misalnya pada daerah tembolok, pakan yang dikonsumsi oleh unggas berada beberapa saat di organ tersebut, sebagai dari pakan ini akan mengalami fermentasi oleh *Lactobacillus* tipe *Lactobacillus salivarius* dan menghasilkan asam laktat yang menyebabkan pH tembolok menjadi turun. Adanya gerakan peristaltik pada saluran pencernaan yang membawa pakan secara tidak langsung melalui lumen sampai pada bagian pertengahan saluran pencernaan, menjadi salah satu penyebab yang dapat mencegah mikroba menempel pada epitel usus. Namun, demikian beberapa mikroba yang lain dapat melekat (*adherence*) pada epitel saluran pencernaan, sedangkan yang lainnya dikeluarkan dari usus oleh cairan musim. Diantara

bakteri Gram negatif yang dapat tumbuh dan melekat pada epitel tembolok, lamina propria, dan permukaan villi usus adalah *E.coli*. Perubahan morfologi pada usus, yaitu vili yang menjadi lebih pendek dan *crypts* lebih dalam dapat disebabkan oleh toksin yang dihasilkan mikroba patogen yang ada pada saluran pencernaan ternak unggas (Hifizah, 2012).

#### **D. Bakteri Asam Laktat**

Bakteri asam Laktat adalah bakteri yang mampu memfermentasikan gula atau karbohidrat untuk memproduksi asam laktat dalam jumlah besar. Ciri-ciri bakteri asam laktat secara umum adalah selnya bereaksi positif terhadap pewarnaan Gram, bereaksi negatif terhadap katalase dan tidak membentuk spora. Dan fermentasi glukosa akan dihasilkan asam laktat. Tipe fermentasi bakteri asam laktat meliputi homofermentatif yaitu yang hasil fermentasinya hanya asam laktat dan heterofermentatif yang hasil fermentasinya di samping asam laktat ada asam organik lainnya seperti asetat, gas CO<sub>2</sub>, dan etanol. Beberapa marga bakteri asam laktat adalah *Lactobacillus*, *Streptococcus*, *Enterococcus*, *Pediococcus*, *Tetragenococcus*, *Leuconostoc*, dan *Lactococcus* (Widyastuti, 1999).

Pada mulanya, bakteri asam laktat terdiri dari 4 genus yaitu *Lactobacillus*, *Leuconostoc*, *Pediococcus* dan *Streptococcus*. Klasifikasi tersebut lebih didasarkan pada ciri morfologi, tipe fermentasi, kemampuan untuk tumbuh pada suhu yang berbeda, sifat stereospesifik (D atau L laktik), serta toleransi terhadap asam dan basa. Klasifikasi bakteri asam laktat berkembang sehingga genus *Lactobacillus* menjadi *Lactobacillus* dan *Carnobacterium*. Sedangkan genus *Streptococcus* menjadi empat yaitu *Streptococcus*, *Lactococcus*, *Vagococcus*, dan

*Enterococcus*. Genus *Pediococcus* menjadi *Pedicoccus*, *Tetragenococcus* dan *Aerococcus*. Untuk genus *Leuconostoc* tetap. Klasifikasi yang baru tersebut dihasilkan dengan mempertimbangkan komposisi asam lemak pada membran sel, motilitas dan urutan RNA, serta persen guanin dan sitosin pada DNA (Pot, 1994).

Konsep bakteri asam laktat adalah nama grup yang diciptakan untuk bakteri yang menyebabkan fermentasi dan koagulasi susu, serta dapat menghasilkan asam laktat dari laktosa. Nama family *Lactobacteriaceae* diterapkan oleh Orla-Jensen, (1919) kepada sekelompok bakteri yang menghasilkan asam laktat sendiri atau asam asetat dan asam laktat, alkohol dan karbon dioksida. Bakteri asam laktat adalah kelompok bakteri Gram-positif yang disatukan mengikut karakteristik morfologi, metabolisme, dan fisiologis. Mereka adalah non-spore, fermentasi karbohidrat-produksi asam laktat, tahan asam dalam keadaan non-aerobik dan katalase negatif. Biasanya mereka adalah non-motile dan tidak mereduksi nitrit. Mereka dibagi menjadi empat genus *Streptococcus*, *Leuconostoc*, *Pediococcus*, dan *Lactobacillus*. Revisi taksonomi terbaru menunjukkan bahwa bakteri asam laktat kelompok bisa terdiri dari genera *Aerococcus*, *Carnobacterium*, *Enterococcus*, *Lactobacillus*, *Lactococcus*, *Leuconostoc*, *Pediococcus*, *Streptococcus*, *Tetragenococcus*, dan *Vagococcus*. Awalnya, bifido termasuk dalam genus *Lactobacillus* dan organisme ini disebut sebagai *Lactobacillus bifidus*. Klasifikasi bakteri asam laktat ke dalam genus berbeda sebagian besar didasarkan pada morfologi, cara fermentasi glukosa, pertumbuhan pada temperatur yang berbeda, dan konfigurasi dari asam laktat

yang dihasilkan, kemampuan untuk tumbuh pada konsentrasi garam tinggi, toleransi pada asam atau basa (Lee dan Salminen, 2009).

Bakteri asam laktat termasuk golongan bakteri mikroaerofilik, yang memfermentasi heksosa menghasilkan asam laktat. Bakteri asam laktat yang banyak digunakan dalam dunia industri adalah spesies *Lactococcus*, *Enterococcus*, *Oenococcus*, *Pediococcus*, *Streptococcus*, *Leuconostoc*, dan *Lactobacillus* (Makarova, 2006, O'Sullivan et al, 2009).

Bakteri asam laktat juga dapat menghasilkan peptida antimikroba seperti bakteriosin, sebagai contoh adalah *L. salivarius* UCC118, yang sangat efektif untuk menekan pertumbuhan *L. monocytogenes*. Beberapa spesies yang biasa ditemukan pada saluran pencernaan manusia dan hewan, kadang-kadang juga dapat menimbulkan penyakit. Penyakit yang disebabkan oleh kolonisasi BAL patogen seperti; infeksi saluran kencing, bakterimia, *Endokarditis*, *Divertikulitis*, dan *Meningitis* (O'Sullivan et al, 2009).

Bakteri Asam Laktat (BAL) adalah kelompok bakteri yang mampu mengubah karbohidrat (glukosa) menjadi asam laktat. Efek bakterisidal dari asam laktat berkaitan dengan penurunan pH lingkungan menjadi 3 sampai 4,5 sehingga pertumbuhan bakteri lain termasuk bakteri pembusuk akan terhambat. Efektivitas BAL dalam menghambat bakteri pembusuk dipengaruhi oleh kepadatan BAL, strain BAL, dan komposisi media. Selain itu, produksi substansi penghambat dari BAL dipengaruhi oleh media pertumbuhan, pH, dan temperature/suhu lingkungan (Amin, 2001).

Usus besar atau kolon memiliki lebih dari 99% bakteri yang tinggal di dalamnya dan lebih dari 99% berupa bakteri anaerob mutlak diantaranya adalah *Clostridium*, *Bacterioides*, *Bifidobacterium* dan lain-lain. Hanya kurang dari 1% berupa bakteri fakultatif anaerob seperti *E.coli*, *Enterobacter* dan bakteri patogen lainnya (Surono, 2004)

Usus pada ternak unggas ibarat sebuah tabung reaksi yang berisi beragam bakteri dan berbagai nutrisi yang disuplai melalui makanan yang dikonsumsi. Dalam saluran pencernaan ayam, mikroba terdapat hampir di sepanjang usus. Mikroorganisme utama yang terdapat dalam tembolok, usus halus dan ceca adalah golongan bakteri *Lactobacilli* yang khusus menghasilkan asam laktat dan asam asetat. Sehingga pH dalam tembolok ayam yang baik antara pH 4–5 akibatnya organisme yang tidak tahan asam tidak dapat berkembang secara normal (Sjofjan, 2003).

Sebagian besar BAL dapat tumbuh sama baiknya di lingkungan yang memiliki dan tidak memiliki  $O^2$  (tidak sensitif terhadap  $O^2$ ), sehingga termasuk anaerob aerotoleran. Bakteri yang tergolong dalam BAL memiliki beberapa karakteristik tertentu yang meliputi: tidak memiliki porfirin dan sitokrom, katalase negatif, tidak melakukan fosforilasi transpor elektron, dan hanya mendapatkan energi dari fosforilasi substrat. Hampir semua BAL hanya memperoleh energi dari metabolisme gula sehingga habitat pertumbuhannya hanya terbatas pada lingkungan yang menyediakan cukup gula atau bisa disebut dengan lingkungan yang kaya nutrisi. Kemampuan mereka untuk menghasilkan senyawa (biosintesis) juga terbatas dan kebutuhan nutrisi kompleks BAL meliputi

asam amino, vitamin, purin, dan pirimidin (Rahayu, 1997).

Karakterisasi BAL yang dapat digolongkan ke dalam bakteri probiotik adalah diketahui sebagai materi yang tidak berbahaya, dapat hidup selama dilakukan proses dan penyimpanan, memiliki efek antagonis terhadap bakteri patogen, toleran terhadap asam lambung, getah pankreas dan cairan empedu serta mampu melindungi epitelium inangnya (Begley et al, 2005).

Bakteri asam laktat (BAL) merupakan kelompok bakteri Gram-positif yang mampu mengubah karbohidrat menjadi asam laktat. Bakteri asam laktat (BAL) hidup di saluran pencernaan ternak. Keberadaan bakteri probiotik tersebut masih sangat kurang khususnya di usus halus, sehingga penyerapan sari makanan menjadi kurang maksimal. Jadi untuk menambahkan jumlah bakteri probiotik seperti BAL pada usus biasanya bakteri probiotik tersebut diisolasi dari usus ternak itu sendiri agar didapatkan bakteri probiotik yang benar-benar cocok dan sesuai dengan sistem pencernaan ternak tersebut, namun tidak semua jenis bakteri usus merupakan bakteri probiotik BAL (Simanjuntak, 2008).

Menurut Simanjuntak (2008), menyatakan bahwa bakteri asam laktat dapat dibedakan atas 2 kelompok berdasarkan hasil fermentasinya, yaitu:

1. Bakteri homofermentatif: glukosa difermentasi menghasilkan asam laktat sebagai satu-satunya produk. Contoh: *Streptococcus*, *Pediococcus*, dan beberapa *Lactobacillus*.
2. Bakteri heterofermentatif : glukosa difermentasikan selain menghasilkan asam laktat juga memproduksi senyawa-senyawa lainnya yaitu etanol, asam asetat, dan CO<sub>2</sub>. Contoh : *Leuconostoc* dan beberapa spesies

### *Lactobacillus.*

Bakteri asam laktat memiliki karakteristik berbentuk batang atau kokus, gram positif, katalase negatif, tidak membentuk spora, tidak bergerak, tidak mempunyai sitokrom, anaerobik, membutuhkan nutrisi yang kompleks seperti asam-asam amino, vitamin (B1, B6, B12) dan biotin (Simanjuntak, 2008).

Menurut Simanjuntak (2008), menyatakan bahwa Faktor- faktor yang mempengaruhi pertumbuhan Bakteri Asam Laktat adalah sebagai berikut:

#### 1. Lama Fermentasi

Mikroorganisme diinokulasi pada media, pertumbuhan yang terlihat mula-mula adalah suatu pembesaran ukuran, volume dan berat sel. Ketika ukurannya telah mencapai kira-kira dua kali dari besar sel normal, sel tersebut membelah dan menghasilkan dua sel. Sel-sel tersebut kemudian tumbuh dan membelah diri menghasilkan empat sel. Selama kondisi memungkinkan, pertumbuhan dan pembelahan sel berlangsung terus sampai sejumlah besar populasi sel terbentuk. Waktu antara masing-masing pembelahan sel berbeda-beda tergantung dari spesies dan kondisi lingkungannya, tetapi untuk kebanyakan bakteri waktu ini berkisar antara 10–60 menit. Tipe pertumbuhan yang cepat ini disebut pertumbuhan logaritmis atau eksponensial karena bila log jumlah sel digambarkan terhadap waktu dalam grafik akan menunjukkan garis lurus.

#### 2. pH (keasaman)

Makanan yang mengandung asam biasanya tahan lama, tetapi jika oksigen cukup jumlahnya dan bakteri dapat tumbuh serta fermentasi



berlangsung terus, maka daya awet dari asam tersebut akan hilang. Pada keadaan ini mikroba proteolitik dan lipolitik dapat berkembang biak.

### 3. Suhu

Tiap-tiap mikroorganisme memiliki suhu pertumbuhan maksimal, minimal dan optimal yaitu suhu yang memberikan pertumbuhan terbaik dan perbanyak diri tercepat. Mikroorganisme dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok berdasarkan suhu pertumbuhan yang diperlukannya yaitu golongan psikrofil, tumbuh pada suhu dingin dengan suhu optimal 10–20°C, golongan mesofil tumbuh pada suhu sedang dengan suhu optimal 20–45°C dan golongan termofil tumbuh pada suhu tinggi dengan suhu optimal 50–60°C. Bakteri bervariasi dalam hal suhu optimum untuk pertumbuhan dan pembentukan asam. Kebanyakan bakteri dalam kultur laktat mempunyai suhu optimum 30°C, tetapi beberapa kultur dapat membentuk asam dengan kecepatan yang sama pada suhu 37°C maupun 30°C. Isolasi mikrobial ada dua cara, yaitu cara goresan (*streak plate metode*) dan cara tuang (*pour plate metode*). Metode goresan cawan dilakukan dengan menyebarkan setitik biakan pada permukaan agar di cawan dan digoreskan sejajar.

### 4. Oksigen

Tersedianya oksigen dapat mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme. Bakteri diklasifikasikan menjadi empat kelompok yaitu aerob obligat (tumbuh jika persediaan oksigen banyak), aerob fakultatif (tumbuh jika oksigen cukup, juga dapat tumbuh secara anaerob), anaerob

obligat (tumbuh jika tidak ada oksigen) dan anaerob fakultatif (tumbuh jika tidak ada oksigen juga dapat tumbuh secara aerob).

Beberapa strain bakteri asam laktat yang berpotensi sebagai agensia probiotik adalah *Lactobacillus acidophilus*, *L. reuteri* dan *L. casei* demikian pula strain dari beberapa persyaratan yang diperlukan untuk menjadikan strain bakteri asam laktat sebagai agensia probiotik adalah bahwa strain tersebut merupakan mikroflora alami jalur pencernaan manusia, tumbuh dan tetap hidup pada makanan sebelum dikonsumsi, tetap hidup walaupun melewati jalur pencernaan, memiliki resistensi terhadap asam lambung, beberapa antibiotik, terhadap lisosim; dapat tumbuh pada intestin dan memiliki kemampuan menempel pada sel epitel intestin manusia, memberi efek yang menguntungkan pada usus, memproduksi asam dalam jumlah besar dan cepat, mampu menghasilkan komponen antimikrobia lain di samping asam (bakteriosin, hidrogen peroksida, diasetil dan reuterin) yang efektif menghambat bakteri lain yang tidak dikehendaki, khususnya bakteri patogen. Metode tuang dengan melakukan pengenceran berturut-turut diletakkan pada cawan petri steril dan dicampurkan dengan medium agar cair yang dingin lalu dibiarkan memadat. Koloni yang berkembang tertanam di dalam agar tersebut (Rahayu dan Margino, 1997).

Menurut (Rahayu dan Margino, 1997), menyatakan bahwa jenis-jenis bakteri asam laktat antara lain sebagai berikut:

1. *Streptococcus thermophilus*, *Streptococcus lactis* dan *Streptococcus cremoris*. Semuanya ini adalah bakteri Gram positif, berbentuk bulat (coccus) yang terdapat sebagai rantai dan semuanya mempunyai nilai

ekonomis penting dalam industri susu.

2. *Pediococcus cerevisae* bakteri ini adalah Gram positif berbentuk bulat, khususnya terdapat berpasangan atau berempat (*tetrads*). Walaupun jenis ini tercatat sebagai perusak bir dan anggur, bakteri ini berperan penting dalam fermentasi daging dan sayuran.
3. *Leuconostoc mesenteroides* dan *Leuconostoc dextranicum*. Bakteri ini adalah Gram positif berbentuk bulat yang terdapat secara berpasangan atau rantai pendek. Bakteri-bakteri ini berperan dalam perusakan larutan gula dengan produksi pertumbuhan dekstran berlendir. Walaupun demikian, bakteri-bakteri ini merupakan jenis yang penting dalam 18 permulaan fermentasi sayuran dan juga ditemukan dalam sari buah, anggur, dan bahan pangan lainnya.
4. *Lactobacillus lactis*, *Lactobacillus acidophilus*, *Lactobacillus bulgaricus*, *Lactobacillus plantarum*, *Lactobacillus delbrueckii*. Organisme-organisme ini adalah bakteri berbentuk batang, gram positif dan sering berbentuk pasangan dan rantai dari sel-selnya. Jenis ini umumnya lebih tahan terhadap keadaan asam dari pada jenis-jenis *Pediococcus* atau *Streptococcus* dan oleh karenanya menjadi lebih banyak terdapat pada sayuran. Pada hewan ternak lain seperti sapi bali dapat ditemukan bakteri asam laktat seperti *Lactobacillus lactis* dan *Lactobacillus brevis*. Penyimpanan isolat mikrobial dimaksudkan supaya mikrobial tidak mengalami mutasi dan kehilangan sifat-sifat unggul. Cara yang digunakan untuk menyimpan isolat menurut (Fardiaz, 1993).

### **E. *Polymerase Chain Reaction (PCR)***

*Polymerase Chain Reaction* adalah teknik biologi molekuler untuk mengamplifikasi sekuen DNA spesifik menjadi ribuan sampai jutaan kopi sekuen DNA. Teknik ini menggunakan metode enzimatik yang diperantarai primer. Prinsip dasar PCR adalah sekuen DNA spesifik diamplifikasi menjadi dua kopi selanjutnya menjadi empat kopi dan seterusnya. Pelipat gandaan ini membutuhkan enzim spesifik yang dikenal dengan polimerase. Polimerase adalah enzim yang mampu menggabungkan DNA cetakan tunggal, membentuk untaian molekul DNA yang panjang. Enzim ini membutuhkan primer serta DNA cetakan seperti nukleotida yang terdiri dari empat basa yaitu *Adenine* (A), *Thymine* (T), *Cytosine* (C) dan *Guanine* (G) (Gibbs, 1990).

Reaksi amplifikasi ini dimulai dengan melakukan denaturasi DNA cetakan yang berantai ganda menjadi rantai tunggal, kemudian suhu diturunkan sehingga primer akan menempel (*annealing*) pada DNA cetakan yang berantai tunggal. Setelah proses *annealing*, suhu dinaikkan kembali sehingga enzim polimerase melakukan proses polimerase rantai DNA yang baru. Rantai DNA yang baru tersebut selanjutnya sebagai cetakan bagi reaksi polimerase berikutnya (Yuwono 2006).

Metode PCR dibedakan menjadi dua yaitu PCR konvensional dan real time. Analisis hasil amplifikasi fragmen DNA pada PCR konvensional dilakukan dengan visualisasi di agar elektroforesis. Sedangkan PCR real time, jumlah DNA yang diamplifikasi dapat dideteksi dan diukur di setiap siklus proses PCR (Fraga *et al*, 2008)

### 1. *Polymerase Chain Reaction* Konvensional

Reaksi PCR konvensional biasanya menggunakan satu pasang primer oligonukleotida untuk mengamplifikasi bagian tertentu dari genom agen infeksi serta dilakukan pada suatu tabung. Primer PCR adalah oligodeoksiribonukleotida pendek, atau oligomer yang dirancang untuk melengkapi urutan akhir sekuen dari amplikon target PCR dan digunakan untuk mengawali sintesis rantai DNA. Panjang basa DNA primer umumnya 15-25 nukleotida dan mempunyai 50-60% kandungan *Guanine* ditambah *Cytocine*. Primer yang digunakan dalam PCR ada dua yaitu oligonukleotida yang mempunyai sekuen yang identik dengan salah satu rantai DNA cetakan pada ujung 5'-fosfat dan oligonukleotida yang kedua identik dengan sekuen pada ujung 3'-OH rantai DNA cetakan yang lain. Masing-masing dari dua primer PCR melengkapi untai tunggal yang berbeda dari target untai ganda. Untuk mendapatkan skrining sekuen yang potensial dan homolog, rancangan primer ditetapkan dengan menggunakan perangkat lunak seperti Oligo (*National Biosciences, Plymouth, NC*) atau situs pencarian online seperti BLAST (NCBI, [www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/](http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/)). Namun demikian, primer PCR juga dapat homopolimer misalnya oligo (dT) yang sering digunakan untuk mengawali proses PCR RNA (Dyah dan Dharmayanti, 2014).

*Reverse transcriptase* (RT) yang berlangsung pada suhu 42-55oC. Proses PCR dibagi menjadi tiga tahap. Pertama, denaturasi cetakan DNA beruntai ganda pada suhu di atas 90oC sehingga menjadi DNA cetakan berantai tunggal. Kedua, penempelan (*annealing*) primer oligonukleotida ke DNA cetakan berantai tunggal biasanya pada suhu 50-60oC sehingga primer akan membentuk jembatan

hidrogen dengan cetakan pada daerah sekuen yang komplementer dengan sekuen primer. Suhu dimana primer *annealing* biasanya diistilahkan dengan  $T_m$ . Ketiga, perpanjangan atau ekstensi fragmen DNA dengan enzim polimerase dan primer untuk menghasilkan kopi DNA yang dapat berfungsi sebagai DNA cetakan untuk siklus selanjutnya yang berlangsung pada suhu 70-78°C (Dyah dan Dharmayanti, 2014).

Kedua DNA cetakan asli dan target yang teramplifikasi selanjutnya berfungsi sebagai substrat untuk proses denaturasi, penempelan primer dan perpanjangan fragmen DNA. Berdasarkan teori, setiap siklus akan menggandakan jumlah kopi target DNA sehingga terjadi amplifikasi geometri. Amplifikasi DNA target sebanyak 25 siklus akan menghasilkan 33 juta kopi. Setiap penambahan 10 siklus menghasilkan 1024 lebih kopi. Rataan perubahan suhu atau tahapan lamanya inkubasi di setiap suhu dan jumlah waktu setiap siklus yang diulang, dikontrol dengan suatu program dari alat *thermal cycler*. Jumlah siklus amplifikasi PCR harus dioptimasi tergantung pada konsentrasi awal DNA target. Minimal diperlukan 25 siklus untuk dapat melipatgandakan satu kopi sekuen DNA target sehingga hasil PCR dapat dilihat secara langsung dengan menggunakan agar elektroforesis (Carman et al. 2000).

Keberhasilan proses PCR juga ditentukan oleh jenis enzim DNA polimerase yang digunakan. Enzim DNA polimerase yaitu enzim yang melakukan katalisis reaksi sintesis rantai DNA. Enzim DNA polimerase idealnya harus tahan panas, mempunyai laju polimerisasi dan prosesivitas yang tinggi. Prosesivitas adalah kemampuan suatu enzim polimerase untuk menggabungkan nukleotida

dengan suatu *primer* secara terus menerus tanpa terdisosiasi dari kompleks *primer-DNA* cetakan. Pada awalnya, PCR menggunakan DNA polimerase yang berasal dari *Eschericia coli*. Namun demikian, DNA polimerase ini mempunyai kelemahan harus didenaturasi pada suhu yang sesuai untuk DNA cetakan dan harus ditambahkan di setiap siklus PCR. Beberapa kelemahan lain yang dimiliki DNA polimerase ini adalah tidak tahan panas serta mempunyai laju polimerisasi dan prosesivitas rendah (Yuwono 2006).

*Taq* DNA polimerase adalah suatu enzim yang dihasilkan dari bakteri *Thermus aquaticus* yang sangat tahan panas. Enzim ini memungkinkan reaksi amplifikasi terbentuk pada suhu yang lebih tinggi sehingga reaksi PCR dapat dilakukan secara otomatis karena penambahan enzim tidak diperlukan di setiap siklus PCR. Walaupun demikian, *Taq* DNA polimerase dari *T. aquaticus* tidak dapat memanfaatkan RNA sebagai cetakan dan memiliki aktivitas transkripsi balik yang rendah. Oleh karena itu, digunakan DNA polimerase yang lain, yaitu *Taq* DNA polimerase dari *Thermus thermophilus* (*Tth* DNA polymerase) yang mempunyai aktivitas DNA polimerase yang lebih tinggi untuk proses transkripsi balik RNA. Enzim ini dapat digunakan untuk melakukan RT-PCR molekul RNA sampai ukuran 1000 pasangan basa (bp, *base pairs*) (Yuwono 2006).

Beberapa enzim DNA polimerase yang diisolasi dari mikroba *extremophilic* yaitu *Pwo* Polymerase, *Amylase*, *Pullanase*, *Glutamin Synthetase I*, *Galactosidase* dan *Ferredoxin* diperoleh dari *Pyrococcus woesei*. *Pyrococcus woesei* adalah suatu mikroba *heterotrophic* dan anaerob serta dapat tumbuh secara optimum pada suhu 98-100oC (Kim et al. 2007).

Aktivitas *P. woesei*  $\beta$ -D-galactosidase ditingkatkan dengan senyawa tiol, ion  $Mg^{2+}$  dan D-galaktosa serta dihambat ion logam berat dan D-glukosa tetapi keberadaan ion  $Ca^{2+}$  tidak berpengaruh terhadap aktivitas *P. woesei* (Wanarska *et al.*, 2005).

Aktivitas *Pwo* DNA polimerase sebanding dengan *Pfu* DNA polimerase komersial *Pfu* DNA polimerase adalah suatu *proof reading* DNA polimerase yang diisolasi dari *Pyrococcus furiosus*. *Pfu* DNA polimerase merupakan suatu pilihan yang ideal untuk berbagai teknik PCR yang membutuhkan sintesis DNA tinggi dengan tingkat ketepatan yang tinggi dibandingkan dengan enzim lain dengan kondisi yang sama sebagai acuan (Biles dan Connolly 2004).

*Pfu* DNA polimerase lebih banyak digunakan jika dibandingkan dengan *Taq* DNA polimerase, dikarenakan tingkat akurasi yang lebih tinggi selama proses amplifikasi (Kanoksilapatham, 2007).

Selain jenis enzim DNA polimerase yang digunakan, efisiensi PCR juga dikontrol dengan beberapa parameter diantaranya komposisi penyangga dan stabilitas, kemurnian, konsentrasi dNTPs, parameter siklus, serta karakteristik sampel awal. Kualitas DNA atau RNA yang akan diamplifikasi juga sangat penting. Deteksi virus dalam sampel dengan PCR tidak hanya tergantung pada kinerja dari PCR itu sendiri, tetapi juga pada efisiensi dari prosedur kerja ekstraksi asam nukleat dari material. Prosedur kerja ekstraksi DNA atau RNA yang sangat panjang, rumit dan membutuhkan waktu lama yang diterapkan pada tahun 1990an telah diganti dengan prosedur kerja yang cepat dan sederhana atau dengan kit ekstraksi DNA atau RNA yang tersedia secara komersial. Sejumlah perusahaan



telah mengembangkan kit ekstraksi DNA atau RNA manual untuk aplikasi di laboratorium klinik. Kit ekstraksi DNA atau RNA manual menggunakan reagen non-korosif sehingga penggunaannya bersifat aman bagi personel laboratorium. Kit ini umumnya murah dan aplikasinya mudah (Germer et al. 2003).

Pelatihan intensif bagi personel laboratorium yang melakukan ekstraksi DNA atau RNA manual diperlukan untuk mendapatkan konsistensi pekerjaan laboratorium diantara personel laboratorium, sehingga hasil pengujian dapat dipercaya. Beberapa sistem komersial terpadu memungkinkan untuk ekstraksi DNA atau RNA secara otomatis. Sistem ekstraksi otomatis mempunyai kelebihan khusus dibandingkan dengan sistem ekstraksi DNA atau RNA manual. Sampel yang dibutuhkan pada ekstraksi DNA atau RNA otomatis relatif lebih sedikit. Peralatan untuk ekstraksi DNA atau RNA otomatis menggunakan sistem tertutup sehingga dapat menurunkan resiko kontaminasi. Sistem ekstraksi DNA atau RNA otomatis biasanya berjalan secara otomatis, sehingga meminimalkan tenaga personel laboratorium. Namun demikian, sistem tersebut harus dievaluasi terlebih dahulu sebelum dapat diadopsi untuk deteksi rutin (Germer et al. 2003).

## 2. *Polymerase Chain Reaction Real Time*

Selama beberapa tahun terakhir, pengujian PCR *real time* yang berdasarkan fluoresensi menjadi suatu metode pengujian yang sering digunakan untuk deteksi RNA, DNA dan *cDNA*. Teknik ini sangat sensitif yang memungkinkan amplifikasi terjadi secara bersama-sama serta kuantitas sekuens asam nukleat dapat diketahui. Disamping memiliki sensitivitas lebih tinggi, kelebihan pengujian PCR *real time* jika dibandingkan dengan PCR konvensional

adalah lebih dinamis, risiko kontaminasi silang lebih sedikit, kemampuan aplikasi penggunaannya untuk pengujian lebih banyak (Black et al. 2002).

*Polymerase Chain Reaction (PCR) real time* tepat untuk berbagai aplikasi seperti analisis ekspresi gen, penentuan jumlah virus, deteksi organisme yang mengalami mutasi genetik, diskriminasi alel dan genotipe *single nucleotide polymorphisms* (SNP). Penggunaan *probe* yang spesifik membantu peningkatan spesifisitas pada pengujian PCR *real time* jika dibandingkan dengan pengujian PCR konvensional. Namun demikian, PCR *real time* juga mempunyai kelemahan yaitu memerlukan peralatan dan reagen yang mahal serta pemahaman teknik yang benar untuk hasil yang akurat (Chantratita et al. 2008).

Tahapan-tahapan umum yang dilakukan selama pengujian PCR *real time* dimulai dari isolasi RNA atau DNA sampai analisis data. Prinsip kerja PCR *real time* adalah mendeteksi dan mengkuantifikasi reporter fluoresen. Sinyal fluoresen akan meningkat seiring dengan bertambahnya amplifikasi DNA PCR dalam reaksi. Reaksi selama fase eksponensial dapat dipantau dengan mencatat jumlah emisi fluoresen pada setiap siklus. Peningkatan hasil amplifikasi PCR pada fase eksponensial berhubungan dengan jumlah inisiasi target gen. Makin tinggi tingkat ekspresi target gen maka deteksi emisi fluoresen makin cepat terjadi (Pardal 2010). Kuantitas urutan DNA target dicapai dengan menentukan jumlah siklus amplifikasi. Jumlah siklus amplifikasi diperlukan untuk menghasilkan produk PCR berdasarkan fluoresensi di awal fase eksponensial PCR serta untuk melewati garis ambang fluoresensi/siklus *threshold* (Ct). Jumlah siklus yang diperlukan untuk mencapai ambang batas disebut Ct. Siklus Ct adalah prinsip dasar dari PCR

*real time* dan sebagai bagian yang sangat penting untuk memperoleh data yang akurat. Nilai Ct PCR *real time* sangat berkorelasi dengan kuantitas urutan DNA target (Giglio *et al*, 2003).

Apabila kuantitas urutan DNA target tinggi di awal reaksi, nilai Ct akan lebih cepat diketahui. Namun demikian, nilai Ct akan lebih sering ditemukan pada fase eksponensial di setiap siklus amplifikasi PCR. Hal ini yang menjadi alasan utama bahwa nilai Ct lebih mampu mengukur jumlah amplifikasi DNA target dari awal reaksi. Reaksi PCR *real time* dapat dilakukan satu tahap (*one step real time PCR*) maupun dua tahap (*two step real time PCR*). Keseluruhan reaksi sintesis *cDNA* sampai amplifikasi PCR dalam PCR *real time* satu tahap dilakukan dalam satu tabung. *Polymerase Chain Reaction (PCR) real time* satu tahap dapat meminimalkan variasi perlakuan laboratorium karena reaksi kedua enzim terjadi dalam satu tabung. Reaksi *reverse transcriptase* pada proses PCR *real time* dua tahap dilakukan terpisah dari pengujian PCR *real time*. Prosedur PCR *real time* dua tahap akan bekerja lebih baik ketika menggunakan suatu DNA *binding dye* seperti SYBR *green I* karena akan lebih mempermudah untuk mengeliminasi primer-dimer melalui manipulasi  $T_m$ . SYBR *green I* merupakan salah satu jenis DNA *binding dye* yang mempunyai kemampuan mengikat 100 kali lebih tinggi dan relatif lebih ramah lingkungan jika dibandingkan dengan *ethidium bromide*. Bahkan, DNA *binding dye* ini lebih mudah diterapkan karena tidak memerlukan adanya *probe* yang spesifik dan biaya yang dibutuhkan relatif terjangkau. PCR *real time* dua tahap memberikan kemungkinan untuk terjadinya peningkatan kontaminasi DNA (Vandesompele *et al*. 2002).

Berbagai modifikasi PCR *real time* telah dikembangkan untuk meningkatkan kerja dari PCR *real time* seperti PCR *real time* multiplex. Saat ini, telah tersedia kit komersial untuk PCR *real time* multiplex yang memungkinkan untuk kombinasi beberapa pengujian dalam satu reaksi. *Polymerase Chain Reaction* (PCR) multiplex adalah amplifikasi secara berkelanjutan dua atau lebih DNA atau cDNA target dalam satu reaksi tabung dan hanya dapat dilakukan dengan menggunakan *probe* berlabel spesifik pada setiap urutan DNA target. Kelebihan dari PCR multiplex adalah jumlah sampel yang dibutuhkan lebih sedikit sehingga berguna apabila jumlah sampel yang tersedia dalam jumlah terbatas dan kemampuannya untuk menggabungkan pengujian dalam satu sistem internal kontrol (Hoffmann *et al*, 2007).

Meskipun demikian, pengujian ini harus dioptimasi terlebih dahulu untuk meminimalkan adanya interaksi kompetitif yang akan sangat berpengaruh terhadap sensitivitas pengujian (Chantratita *et al*, 2008).

Penggunaan teknologi *probe* novel fluoresensi dapat meningkatkan sensitivitas dan spesifisitas PCR *real time*. Terdapat tiga tipe metode PCR *real time* yang sering digunakan untuk deteksi asam nukleat dalam mikrobiologi klinik, yaitu *TaqMan probe*, *molecular beacon* dan *Fluorescence Resonance Energy Transfer* (FRET) *probe* hibridisasi. *TaqMan probe* adalah suatu *probe* fluorescent *real time* yang pertama kali dikembangkan dan merupakan oligonukleotida pendek yang mengandung 5' *fluorescent dye* dan 3' *quenching dye* yang terpisah. *Fluorescent dye* yang terpisah terakumulasi setelah setiap suhu siklus PCR dan dapat diukur di setiap waktu selama tahapan siklus PCR termasuk

tahap hibridisasi. Hal ini berbeda dengan *probe molecular beacon* dan FRET hibridisasi karena fluoresensi hanya dapat diukur selama tahap hibridisasi (Uhl dan Cockerill 2004).

*Molecular beacon* adalah suatu *probe* oligonukleotida yang dilabel oleh 5' *fluorescent dye* dan 3' *quenching dye* dan berbentuk seperti jepit rambut (Tyagi & Kramer 1996).

*Fluorescence Resonance Energy Transfer* adalah suatu proses spektroskopi dengan mengalirkan energi sebesar 10-100 *Amstrong* di antara molekul yang berbeda. Peningkatan sinyal fluoresensi sebanding dengan akumulasi produk PCR yang akan timbul sebagai akibat dari pemindahan energi resonansi fluoresensi (FRET) antara label fluorogenik yang berbeda (yang dikenal sebagai *reporter* dan *quencher*) yang terhubung dengan *probe* atau primer. Beberapa format telah digunakan dalam *real time* PCR. *Quencher* fluorogenik yang paling sering digunakan adalah *6-carboxytetramethylrhod-amine* (TAMRA), *4-dimethylaminoazo benzene-4-carboxylic acid* (DABCYL) dan *Black Hole Quencher* (BHQ) (Didenko 2001).

Meskipun RT-PCR *real time* (rRT-PCR) merupakan suatu pengujian diagnostik yang sensitif dan spesifik serta banyak digunakan untuk deteksi penyakit secara cepat, tetapi adanya kemungkinan reaksi negatif palsu dapat terjadi. Reaksi ini kemungkinan disebabkan oleh adanya penghambat RT-PCR, ekstraksi virus RNA yang sedikit atau sudah terdegradasi, kesalahan personel laboratorium dalam melakukan pengujian rRT-PCR dan kualitas dari salah satu reagen yang sudah kadaluarsa. Sampel yang diperiksa dapat mengandung

substansi penghambat PCR yang memungkinkan menghasilkan hasil negatif palsu. Penghambat amplifikasi PCR dapat dideteksi dengan kontrol internal. Kontrol internal merupakan faktor yang sangat penting sebagai kontrol dari kualitas pengujian sehingga pengujian dilakukan secara benar (Das et al, 2006).

Penerapan tipe kontrol internal positif yang berbeda pada pengujian rRT-PCR telah dikembangkan untuk menguji sampel klinik. Berdasarkan sifatnya terhadap target cetakan DNA, kontrol internal positif dibagi menjadi dua, yaitu kompetitif dan non-kompetitif. Kontrol internal positif kompetitif menggunakan suatu rancangan tiruan yang digunakan untuk mengikat bagian primer yang sama dengan sekuen internal sehingga dapat dibedakan dari sekuen target baik ukuran maupun *probe*-nya. Kontrol internal positif nonkompetitif menggunakan sekuen target yang berbeda dan memiliki primer atau *probe* yang berbeda sehingga tidak digunakan untuk mengamplifikasi target ampikon serta berkompetitif secara tidak langsung dengan target ampikon (Dingle et al. 2004).

Penggunaan kontrol yang spesifik, yaitu kontrol positif dan negatif serta pengendalian mutu reagen sebagai salah satu pelaksanaan program jaminan mutu dari suatu laboratorium sangat diperlukan selama pengujian sehingga hasil yang diperoleh akurat. Kontrol positif yang dapat digunakan adalah sampel yang mengandung organisme atau asam nukleat yang dapat dideteksi. Konsentrasi kontrol positif yang digunakan harus mampu memberikan hasil positif yang konsisten. Air atau *buffer* sering digunakan sebagai kontrol negatif. Namun demikian, kontrol negatif yang bagus adalah sampel yang mengandung asam nukleat selain target untuk mengetahui tidak adanya amplifikasi PCR non-spesifik

atau amplifikasi produk. Selain itu, kontrol negatif digunakan untuk menunjukkan bahwa reagen yang digunakan tidak terkontaminasi dengan asam nukleat target (NCCLS 1995).

Jaminan mutu reagen sangat penting untuk memastikan keberhasilan pengujian PCR *real time*. Biasanya, komponen *master mix* yang mengandung konsentrasi reagen baku telah tersedia secara komersial tetapi tidak selalu tersedia untuk primer dan *probe* FRET (Burgos et al. 2002).

Resiko kontaminasi pada PCR *real time* masih dapat terjadi meskipun resiko kontaminasi yang terjadi pada PCR *real time* sangat kecil, karena amplifikasi PCR *real time* dilakukan dalam sistem yang tertutup dan tidak memerlukan tahapan-tahapan yang panjang seperti yang dilakukan seperti di PCR konvensional. Kontaminasi paling sering terjadi antar sampel jika dibandingkan dengan kontaminasi produk amplifikasi. Kontaminasi antar sampel dapat terjadi pada saat memasukkan sampel ke tabung PCR atau tabung ekstraksi DNA atau RNA. Teknik pipetasi harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari adanya aerosol yang dapat menimbulkan kontaminasi. Tahapan-tahapan prosedur PCR membutuhkan ruangan kerja yang terpisah di laboratorium. Selain itu, penerapan alur kerja searah serta praktik kerja laboratorium yang benar harus dijalankan untuk memperoleh hasil yang akurat (Niesters 2002).

#### **F. *Gen 16S rRNA***

Identifikasi mikroorganisme penyebab infeksi secara konvensional dilakukan melalui metode pembiakan dan dilanjutkan dengan pemeriksaan karakteristik fisiologis dan biokimia. Metode ini membutuhkan waktu yang lebih

lama. Terlebih lagi pada beberapa mikroorganisme yang sulit untuk dibiakkan seperti *mycobacterium* dan virus tertentu. Saat ini dikembangkan metode identifikasi berbasis molekuler yang lebih cepat dengan tingkat sensitivitas dan spesifisitas yang tinggi, yaitu dengan analisis sekuensing gen 16S rRNA (16S *ribosomal Ribonucleic acid*/Asam ribonukleat pengkode ribosom 16S, S menyatakan *Svedberg*, yaitu satuan ukuran ribosom). Gen 16S rRNA juga sering disebut sebagai 16S rDNA (16S *ribosomal deoxyribose nucleatic acid*), namun menurut konsensus dari *American Society for Microbiology* (ASM), istilah 16S rRNA dinilai lebih tepat (Tristia, 2011).

Gen pengkode RNA ribosomal (rRNA) adalah gen yang paling lestari (*conserved*). Porsi sekuens rDNA dari tiap organisme yang secara genetik berkorelasi umumnya adalah sama. Dengan demikian setiap organisme yang memiliki jarak kekerabatan tertentu dapat disejajarkan sehingga lebih mudah untuk menentukan perbedaan dalam sekuens yang menjadi ciri khas organisme tersebut. Daerah yang lestari ini juga yang menyebabkan gen ini dapat digunakan sebagai primer universal yang digunakan dalam Polymerase Chain Reaction (PCR) serta dapat ditentukan urutan nukleotidanya melalui sekuensing. Gen pengkode rRNA digunakan untuk menentukan taksonomi, filogeni (hubungan evolusi) serta memperkirakan jarak keragaman antar spesies (*rates of species divergence*) bakteri. Perbandingan sekuens rDNA dapat menunjukkan hubungan evolusi antar organisme. Penggunaan sekuens 16S rRNA dipelopori oleh Carl Woese (1977), yang juga menemukan klasifikasi 3 domain terbesar makhluk hidup, yaitu bakteri, *archaea* dan eukaria (Tristia, 2011).



### 1. Pemilihan gen 16S rDNA sebagai Target Sekuensing

Gen pengkode rRNA adalah gen yang mampu mempertahankan kelestariannya selama jutaan tahun keanekaragaman evolusi. Sebagian besar prokariot memiliki 3 jenis rRNA, yaitu 5S, 16S dan 23S (Clariridge, 2004).

Tabel 2. RNA Ribosomal pada Prokariot

Jenis rRNA	Ukuran (Nukleotida)	lokasi
5S rRNA	120	Ribosom subunit besar
16S rRNA	1500	Ribosom subunit besar
23S rRNA	2900	Ribosom subunit besar

sumber: (Clariridge, 2004).

Penggunaan 5S rRNA juga sudah dipelajari namun gen ini terlalu kecil untuk digunakan dalam penentuan filogenetik. Gen 16S dan 23S rRNA memiliki ukuran yang cukup untuk dianalisis. Gen 16S rRNA berukuran sekitar 1500 pasang basa dan sekitar 500 basa di bagian ujung sekuens merupakan daerah yang disebut dengan *hypervariable region*. Daerah ini merupakan bagian yang membedakan antar organisme. Primer yang digunakan dalam amplifikasi sekuens akan mengenali daerah yang lestari dan mengamplifikasi *hypervariable region*, dengan demikian akan diperoleh sekuens yang khas pada organisme tersebut. Tabel 3 menunjukkan sekuens DNA dari Beberapa organisme mewakili tiga kelompok besar, yaitu bakteri, eukariot dan archea. Sekuens tersebut menunjukkan adanya kesamaan dan perbedaan sejumlah basa (Clarridge, 2004).

Tabel 3. Sekuens DNA beberapa Organisme

Human	GTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGT ATATTAAAGTTGCTGCAGTTAAAAAG
Yeast	GTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGT ATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAG
Corn	GTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCAATAGCGTA TATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAG
Escherichia coli	GTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGGAGGGTGCAAGCG TTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCG
Anacystis nidulans	GTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGGGAGAGGCAAGCG TTATCCGGAATTATTGGGCGTAAAGCG
Thermotoga maratima	GTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGGGGCAAGCG TTACCCGGATTTACTGGGCGTAAAGGG
Methanococcus vannieli	GTGCCAGCAGCCGCGGTAATACCGACGGCCCGAGTGT GTAGCCACTCTTATTGGGCCTAAAGCG
Thermococcus celer	GTGGCAGCCGCCGCGGTAATACCGGCGGCCCGAGTG GTGGCCGCTATTATTGGGCCTAAAGCG
Sulfolobus sulfatoricus	GTGTCAGCCGCCGCGGTAATACCAGCTCCGCGAGTGG TCGGGGTGATTACTGGGCCTAAAGCG

Sumber : (Clariridge, 2004).

Gen 16S rRNA adalah salah satu gen yang telah dikarakterisasi dengan baik sehingga digunakan dalam identifikasi mikroorganisme. Ribuan sekuens dari berbagai isolat klinis dan dari lingkungan telah terkumpul di satu database yaitu National Center for Biotechnology Information (NCBI) yang dapat diakses pada

[www.ncbi.nlm.nih.gov](http://www.ncbi.nlm.nih.gov), serta Ribosomal Database Project yang dapat diakses di [www.cme.msu.edu/RDP/html/index.html](http://www.cme.msu.edu/RDP/html/index.html). Database ini juga menyediakan aplikasi yang dapat digunakan untuk membandingkan sekuens yang diperoleh dengan sekuens yang telah terdaftar di database tersebut. Sejak ditemukan pertama kali oleh Woese, sekuens 16S rDNA semakin banyak digunakan (Tristia, 2011).

Pada tahun 1980-an telah dikembangkan standar terbaru dalam mengidentifikasi bakteri. Penelitian Woese (1977), menunjukkan bahwa sifat yang *conserved* dari gen 16S rRNA diduga disebabkan karena peran yang sangat esensial dari gen ini terhadap fungsi sel. Pada gen-gen yang mengkode enzim, mutasi dapat terjadi lebih sering dan umumnya dapat ditolerir oleh sel karena hanya menyebabkan perubahan struktur dan biasanya tidak memegang peranan yang krusial seperti halnya rRNA. Pada bakteri, jika terdapat gen yang mengkode enzim yang dibutuhkan untuk penggunaan laktosa, maka bakteri dapat menggunakan gula lain atau protein sebagai sumber energi (Tristia, 2011).

## 2. Aplikasi Analisis Sekuensing 16S rRNA di Bidang Mikrobiologi

Metode sekuensing telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Perkembangan teknologi saat ini telah memungkinkan dilakukannya analisis terhadap jutaan sekuens DNA per tahun. Kualitas analisis sekuensing sangat tergantung pada faktor kecepatan prosedur kerja dan teknologi yang digunakan. Identifikasi mikroorganisme penyebab infeksi dilakukan dengan menumbuhkan bakteri dari berbagai spesimen klinis pada media tertentu (Tristia, 2011).

Pada metode mikrobiologi konvensional membutuhkan waktu yang lama pada saat identifikasi berdasarkan karakteristik fisiologis dan biokimianya sedangkan pada identifikasi berbasis molekuler melalui analisis sekuensing, waktu yang dibutuhkan jauh lebih singkat. Langkah analisis sekuensing dimulai dengan mengisolasi DNA dari kultur bakteri, baik kultur padat maupun cair. DNA yang diperoleh akan dijadikan sebagai cetakan dalam tahap amplifikasi dengan PCR. Primer yang digunakan dalam PCR adalah primer 16S rRNA yang bersifat universal berukuran sekitar 1500 pb, sehingga dapat mengamplifikasi daerah 16S rRNA dari seluruh bakteri. Produk PCR dimurnikan terlebih dahulu dengan menggunakan kit komersial untuk menghilangkan sisa-sisa primer serta fragmen nukleotida (Lau, 2002).

Produk PCR yang telah dimurnikan ditentukan urutan nukleotidanya dengan metode sekuensing. Pada tahap sekuensing produk PCR dengan ukuran tertentu digunakan sebagai cetakan. Primer pada tahap PCR juga digunakan dalam sekuensing, hanya saja masing-masing primer digunakan secara terpisah dalam satu siklus sekuensing (*forward* saja atau *reverse* saja). Berbeda dengan PCR, produk yang dihasilkan dari sekuensing memiliki ukuran yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena pada sekuensing ditambahkan ddNTP (*di-deoxyribonuclease Triphosphat*) atau dNTP terminator yang dilabel dengan zat warna. Terminator ini pada satu siklus akan berikatan secara acak dan menghentikan proses pembacaan. Pada tiap basa terminator (ddATP, ddGTP, ddCTP, atau ddTTP), terdapat zat warna fluoresen yang dapat menyerap panjang

gelombang yang berbeda sehingga basa terminator akan dapat dibaca dengan fluorometri (Fox, 2008).

Sekuens DNA terbentuk dari hasil pensejajaran pembacaan primer *reverse* dan *forward* dan umumnya disebut sebagai sekuens konsensus (*consensus sequence*). Sekuens konsensus ini kemudian dibandingkan dengan data sekuens yang tersedia di database menggunakan software tertentu. Beberapa sistem dapat menentukan urutan nukleotida melalui pembacaan satu primer, namun pembacaan dengan dua primer memberikan hasil yang lebih akurat. Beberapa database yang dapat digunakan untuk membandingkan sekuens 16S rRNA antara lain GenBank (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/>), Ribosomal Database Project (RDP-II) (<http://rdp.cme.msu.edu/html/>), Ribosomal Database Project European Molecular Biology Laboratory (<http://www.ebi.ac.uk/embl/>), Smart Gene IDNS (<http://www.smartgene.ch>) dan Ribosomal Differentiation of Medical Microorganisms (RIDOM) (<http://www.ridom.com/>) (Tristia, 2011).

Dalam penggunaan klinis sangat penting untuk dipertimbangkan apakah diperlukan sekuensing dari keseluruhan gen (sekitar 1500 pb). Sekuensing keseluruhan gen dapat digunakan untuk membedakan strain dari suatu mikroorganisme. Dalam penemuan spesies baru, sekuensing keseluruhan gen 16S rRNA sangat diperlukan. Pada sebagian besar isolat klinis bakteri, fragmen pendek, yaitu 500 pb di bagian awal gen 16S rRNA dinilai sudah cukup informatif dalam mengidentifikasi (Tristia, 2011). Kattar *et al* (2000), menyatakan bahwa spesies dari *Bordetella* sp dapat ditentukan dari sekuens DNA di bagian awal gen 16S rRNA yang dimilikinya (Kattar *et al*, 2000).

### 3. Analisis Sekuensing versus Mikrobiologi Konvensional dalam Identifikasi Penyebab Infeksi

Perkembangan identifikasi mikroorganisme penyebab infeksi dengan metode berbasis molekuler memberikan kontribusi yang sangat penting di bidang mikrobiologi. Identifikasi dengan analisis sekuensing gen 16S rRNA dinilai memberikan hasil yang sangat akurat dan dapat dijadikan sebagai metode diagnosis dalam aplikasi klinis. Analisis sekuensing dinilai dapat menjawab berbagai permasalahan yang berkaitan dengan identifikasi berbasis mikrobiologi konvensional. Dalam mikrobiologi konvensional, identifikasi dilakukan dengan mengisolasi mikroorganisme tersebut dari spesimen klinis, lalu mengamati karakteristik fenotipiknya. Metode ini memiliki beberapa kelemahan, yaitu tidak dapat digunakan pada mikroorganisme yang tidak dapat dikultur serta menunjukkan hasil uji biokimia yang tidak dapat digolongkan pada genus atau spesies tertentu (secara fenotipik membingungkan atau belum pernah ditemukan sebelumnya)<sup>2,5</sup>. Pada isolat berasal dari saluran nafas, mikrobiologi konvensional membutuhkan waktu lama, tidak dapat membedakan infeksi dan kolonisasi serta dapat dipengaruhi oleh pemberian antibiotik (Tristia, 2011).

Dari segi waktu, analisis sekuensing memiliki keunggulan karena dapat dilakukan dalam waktu singkat. Analisis dan merangkum waktu yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi satu sampel klinik menggunakan metode sekuensing (Tabel 4), dimana analisis sekuensing terhadap satu sampel klinis dapat dilakukan dalam rata-rata 40 menit (Clarridge, 2004).

Tabel 4. Prosedur dan waktu yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi bakteri dalam kegiatan Laboratorium rutin adalah sebagai berikut :

No	Prosedur	Waktu	Waktu pemrosesan (dalam mesin/instrumen)
1.	Pemanenan organisme dipanen dengan menumbuhkannya pada media kultur padat atau cair	3-5 menit per sampel	
2.	Ekstraksi DNA	30 menit	10 menit dan 3 menit
3.	Amplifikasi dengan PCR	30 menit	2 jam
4.	Karakterisasi Produk PCR dengan Elektroforesis	20 menit	1 jam
5.	Purifikasi produk PCR	1 jam	
6.	Siklus Sekuensing	30 menit	30 menit
7.	Purifikasi produk PCR	1 jam	
8.	Sekuensing gen 16S RNA. setelah <i>running</i> , petugas dapat melakukan pekerjaan lainnya.	1 jam	2,5 jam
9.	Analisis Hasil sekuensing	5-15 menit per sampel	
10.	Pencarian nama/spesies dalam database. Jika sekuens DNA organisme tersebut telah ada dalam database, maka waktu yang dibutuhkan hanya sekitar 1 menit. Jika merupakan organisme baru, maka sekuens harus	Tidak diikutsertakan dalam kalkulasi waktu	

dibandingkan secara detil dengan data dari sejumlah database. Waktu yang diperlukan untuk kegiatan ini sekitar 15-30 menit

11. Melaporkan hasil Total waktu 30 menit 1 sampel/40 menit  
yang dibutuhkan dalam 60 sampel/40jam  
pemeriksaan 20 sampel per  
minggu

---

sumber: (Clarridge, 2004).

Analisis sekuensing gen 16S rRNA saat ini sudah banyak digunakan, terutama di bidang penelitian. Pemakaian di bidang klinis sebagai prosedur diagnostik memang belum banyak digunakan terkait dengan biaya pemeriksaan yang mahal. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa tuntutan akan suatu metode diagnostik dengan tingkat spesifisitas dan sensitivitas tinggi, cepat dan akurat mengharuskan adanya aplikasi berbasis molekuler ini dalam identifikasi berbagai sampel klinis (Tristia, 2011).

Mengidentifikasi bakteri yang berasal dari saluran pernafasan, metode mikrobiologi konvensional dinilai kurang akurat sehingga tidak lagi dimasukkan dalam pedoman penatalaksanaan. Metode identifikasi berbasis molekuler dengan amplifikasi asam nukleat dan sekuensing menunjukkan keunggulan dari segi waktu, sensitivitas dan akurasi yang lebih baik (Nolte, 2008).

Lau *et al* (2004) juga menggunakan analisis sekuensing gen 16S rRNA untuk mengidentifikasi *Arcobacter* dari penderita apendisitis akut gangrenosa. *Arcobacter* adalah bakteri Gram negatif yang sulit untuk diidentifikasi melalui karakteristik fenotip. Kuppeveld *et al* (1992), menggunakan sekuensing 16S rRNA untuk menentukan spesies *Mycoplasma* yang secara klinis sulit serta membutuhkan waktu lama untuk ditumbuhkan/dikultivasi. Selain dari isolat klinis, sekuensing gen 16S rRNA juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi bakteri patogen yang terdapat di lingkungan.



Magray *et al* (2011), melakukan identifikasi bakteri patogen dari sumber air minum di Srinagar, India, dan menemukan bahwa *Escherichia coli* adalah bakteri patogen terbanyak. Sekuensing gen 16S rRNA juga digunakan untuk mengidentifikasi bakteri tertentu yang tidak dapat diidentifikasi lagi secara fenotip. *Streptococcus pneumonia* adalah bakteri Gram positif yang dapat dikarakterisasi secara fenotipik berdasarkan sensitivitasnya terhadap antibiotik optochin. Namun saat ini *S. pneumonia* telah mengembangkan resistensi terhadap optochin sehingga diperlukan metode identifikasi lain yang lebih akurat. El Aila *et al* (2010), melakukan identifikasi *S. pneumoniae* dengan analisis sekuensing gen 16S rRNA dan memberikan hasil yang lebih akurat<sup>10</sup>. Sacchi *et al* (2002), menggunakan gen 16S rRNA untuk mengidentifikasi *Bacillus anthracis*, bakteri yang sering digunakan dalam bioterorisme

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Tempat.**

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai Mei 2018 di Laboratorium Science building Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA), Universitas Hasanuddin.

#### **B. Alat dan Bahan**

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah mikroskop, ose bulat, ose lurus, gelas objek, penjepit tabung, vortex shaker, waterbath, tabung *Eppendorf*, rak tabung *Eppendorf*, *GD colom*, *collection tube*, Sentrifuse MPW-260R, stopwatch, micropipette (BIOHIT *Proline Plus Single channel* 0,5-10 l; 10-100 l; 20-100 l) (Biorad *Single channel* 100-1000 l), tip filter, botol reagen, Erlenmeyer 250 ml, batang pengaduk, neraca analitik, DNA thermal cyclers (Applied Biosystem), lemari pendingin 4°C, perangkat lampu ultraviolet + kamera digital, elektroforesis+tip supply, kaca mata anti UV, freezer -20°C, mikrotube, sarung tangan.

Bahan yang digunakan adalah isolat bakteri D dari usus DOC umur satu hari, pewarnaan Gram (kristal violet, lugol, alkohol-aseton, dan safranin), aquadest, enzim, etanol absolut, etidium bromide, garam buffer, gel agarose 2%, gen 16S rRNA primer forward 63F (5'CAGGCCTAACACATGGTC-3') dan primer reverse – 1387R (GGGCGTGTGTACAAGGC-3') larutan GB buffer, kertas label, larutan wash buffer, larutan loading dye, lysozyme, proteinase, TAE

buffer, marker (Smart leader SF), medium de Mann-Ragosa-Sharpe (MRS), Presto mini gDNA Bacteria Kit (100 Preps), 2X Kapa 2G Fast ready Mix.

### **C. *Prosedur Kerja***

Prosedur kerja yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **1. Ekstraksi DNA**

Ekstraksi DNA genom dilakukan dengan mengikuti protokol ekstraksi DNA yang terdapat dalam Geneaid Presto™ Mini gDNA Bacteria Kit. Pertama dilakukan preparasi sampel, untuk bakteri gram (-) negatif, bakteri sebanyak  $1 \times 10^9$  sel dipindahkan ke 1,5 ml tube mikrosentrifuge, kemudian disentrifuge selama 1 menit dengan kecepatan 14-16,000 x g lalu supernatant dibuang. Tambahkan 180  $\mu$ l GT Buffer kemudian suspensi ulang pelet sel dengan menggunakan vortex atau pipet. Tambahkan juga 20  $\mu$ l proteinase K, inkubasi pada suhu 60°C selama 10 menit, selama inkubasi setiap 3 menit lakukan pembalikan. Untuk bakteri gram (+) positif, bakteri sebanyak  $1 \times 10^9$  sel dipindahkan ke 1,5 ml tube mikrosentrifuge, kemudian disentrifuge selama 1 menit dengan kecepatan 14-16,000 x g lalu supernatant dibuang. Masukkan 200  $\mu$ l gram (+) buffer ke tube sentrifuge dan tambahkan lysozyme (4 mg/ml) lalu vortex sampai lysozyme benar-benar larut. Kemudian masukkan larutan gram (+) buffer yang telah ditambahkan lysozyme ke dalam sampel kemudian suspensi ulang pelet sel dengan menggunakan vortex atau pipet. Inkubasi pada suhu 37°C selama 30 menit. Selama inkubasi lakukan pembalikan beberapa

kali. Setelah itu, tambahkan 20  $\mu\text{l}$  proteinase K kemudian vortex agar tercampur. Inkubasi pada suhu  $60^{\circ}\text{C}$  selama 10 menit, selama inkubasi setiap 3 menit lakukan pembalikan. Untuk proses selanjutnya baik bakteri gram (+) maupun gram (-) sama. Ke dalam sampel ditambahkan 200  $\mu\text{l}$  GB Buffer kemudian divortex setelah itu diinkubasi selama 10 menit pada suhu  $70^{\circ}\text{C}$ . Selanjutnya ditambahkan 200  $\mu\text{l}$  ethanol absolut kemudian divortex selama 10 detik kemudian di masukkan kedalam GD Column dan disentrifuge dengan kecepatan 14-16000 g selama 2 menit. Ganti collect tube dengan yang baru. Setelah itu ditambahkan 400  $\mu\text{l}$  W1 buffer kemudian di sentrifuge dengan kecepatan 14-16000 g selama 30detik. Kemudian ditambahkan 600  $\mu\text{l}$  W1 buffer kemudian di sentrifuge dengan kecepatan 14-16000 g selama 30 detik, selanjutnya GD column dipindahkan ke dalam tabung Eppendorf steril ditambahkan 100  $\mu\text{l}$  pre-heated elution setelah itu di sentifuge dengan kecepatan 14-16000 g selama 3 menit. Supernatan yang tertampung pada tabung eppendorf adalah ekstrak DNA.

## **2. Amplifikasi DNA dengan Metode PCR**

Prosedur ini dikerjakan pada sampel DNA yang telah diisolasi, Sebelumnya dibuat campuran reaksi untuk PCR yaitu 12,5 $\mu\text{l}$  2X KAPA 2G Fast Ready Mix + Dye dan masing-masing 1  $\mu\text{l}$  DNA gen 16S rRNA Primer Forward 63F (5'-CAGGCCTAACACATGCAAGTC-3') dan primer reserve 1387R (5'-GGGCGGTGTGTACAAGGC-3') dan H<sub>2</sub>O 5  $\mu\text{l}$  untuk 4 tabung. Selanjutnya siapkan tabung (sesuai dengan jumlah sampel

yang akan diamplifikasi). Tabung kemudian diisi campuran reaksi PCR sebanyak 20  $\mu$ l lalu masing-masing tabung ditambahkan 5  $\mu$ l ekstrak DNA. Amplifikasi dilakukan sebanyak 35 siklus dan setiap siklus terdiri dari predenaturasi denaturasi pada suhu 95<sup>0</sup>C selama 3 menit, pada suhu 95<sup>0</sup>C selama 10 detik, annealing pada suhu 55<sup>0</sup>C selama 10 detik, extending pada suhu 72<sup>0</sup>C selama 15 detik dan post extending pada suhu 72<sup>0</sup>C selama 1 menit.

### **3. Deteksi Produk PCR dengan Elektroforesis**

Gel agarosa 2% dibuat dengan mencampurkan 1,5 gr serbuk agarosa ke dalam 100 mL TAE Buffer di Erlenmeyer kemudian dipanaskan ke dalam microwave selama 2 menit hingga mendidih, lalu ditambahkan 8  $\mu$ L Ethidium Bromida. Cairan gel lalu didinginkan di suhu kamar. Setelah agak dingin, cairan gel dituang ke cetakan gel elektroforesis dengan menggunakan sisir gel dengan jumlah sisir 17 sumur. Masing-masing 5  $\mu$ l produk amplifikasi dimasukkan ke dalam sumur gel agarosa 2% yang terendam dalam tangki yang berisi TAE Buffer. Selanjutnya, elektroforesis dijalankan selama 50 menit dengan tegangan konstan 100 volt. Setelah 50 menit elektroforesis dihentikan dan gel diangkat untuk diamati dibawah sinar UV. Hasil positif jika terdapat pita DNA yang sejajar dengan marker dan negatif jika tidak terdapat pita pada gel.

#### **4. Sekuensing DNA**

Produk PCR dari sampel yang menunjukkan hasil elektroforesis yang positif dilakukan sekuensing DNA dilakukan oleh 1<sup>st</sup> Base melalui PT Genetika Indonesia. Proses sekuensing DNA dilakukan menggunakan metode Sanger dideoksi.

#### **5. Analisis Urutan DNA Pengkode 16S rRNA**

Analisis hasil sekuensing dilakukan dengan melakukan BLAST urutan nukleotida dari hasil sekuensing 16S rRNA dengan data base yang tersedia pada situs [www.ncbi.nlm.nih.gov](http://www.ncbi.nlm.nih.gov) yang digunakan untuk mencari similaritas suatu sekuens nukleotida atau protein (query sequence) dengan sekuens data base (subject sequence).

#### **D. Teknik Pengolahan dan Analisa Data**

Analisis dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif antara lain dengan melihat hasil dari identifikasi bakteri teknik molekuler berbasis rRNA yaitu dengan metode PCR, dimana seluruh data diperoleh dari seluruh pengamatan (positif atau negatif) yang ditunjukkan pada beberapa indikator uji selama proses kerja yang telah dilakukan. Yakni pengumpulan data dan pengamatan secara langsung dan dengan cara dokumentasi untuk dijadikan bukti hasil penelitian.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Amplifikasi DNA dengan Metode PCR

Hasil Pengamatan pada Amplifikasi DNA dengan Metode PCR Berdasarkan Gen 16S rRNA dengan Primer 63F dan 1387R sebagai berikut :



Gambar 1: Hasil Amplifikasi Gen 16S rRNA dengan Primer 63F dan 1387R

Hasil visualisasi dengan elektroforesis pada Gambar 1 terdapat satu pita DNA hasil ekstraksi DNA. Pada sampel D pita yang terbentuk garis tebal, hal ini menunjukkan bahwa DNA hasil ekstraksi memiliki konsentrasi DNA yang tinggi dengan pita tebal dan terang, dan visualisasi pada elektroforesis tampak tebal.

hasil amplifikasi divisualisasikan pada elektroforesis dan dihasilkan pita DNA yang sejajar dengan marker 1350 bp.

## 2. Hasil BLAST Gen 16S rRNA

Tabel 4. Hasil BLAST Gen 16S rRNA sebagai berikut :

Isolat Bakteri	Deskripsi Spesies	Query Cover	Identity	Nomor Akses
D	<i>Enterococcus faecalis</i> partial 16S rRNA gene, isolate BS28-28	75 %	95%	HG798520.1
	<i>Bacterium</i> NLAE-zl-G467 ribosomal RNA gene, partial sequence	73%	96%	JX048455.1
	<i>Enterococcus</i> sp. strain MS3 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	74%	95%	MG754234.1
	<i>Enterococcus faecalis</i> strain ES09 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	73%	96%	KX364715.1
	<i>Bacterium</i> NLAE-zl-G369 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	73%	96%	JX048364.1
	<i>Uncultured bacterium clone</i> HRF-f-Cel13 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	73%	96%	JN698647.1
	<i>Enterococcus faecalis</i> strain SNNU0263 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	73%	96%	KX752884.1
	<i>Enterococcus faecalis</i> strain 1 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	73%	96%	MH322794.1
	<i>Enterococcus faecium</i> strain CAU8625 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	73%	96%	MF108117.1
	<i>Enterococcus faecalis</i> strain CAU170 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	73%	96%	MF582810.1
	<i>Enterococcus faecalis</i> strain CAU2945 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	73%	96%	MF428839.1
	<i>Enterococcus faecalis</i> strain CAU6383 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	73%	96%	MF425319.1

Sumber : Data Primer, 2018



Analisis hasil BLAST tersebut memberikan informasi dan memverifikasi mengenai organisme atau bakteri apa yang mempunyai kesamaan dengan urutan DNA sampel sehingga dapat digunakan untuk identifikasi bakteri. Informasi dari hasil BLAST tersebut berupa *Query Coverage* dan *Maximum identity*. *Query coverage* adalah persentasi dari panjang nukleotida yang selaras dengan database yang terdapat pada BLAST. *Max identity* adalah nilai tertinggi dari persentasi identitas atau kecocokan antara sekuen query dengan sekuen database yang tersejajarkan.

Isolat D memiliki kesamaan sekuens mencapai 95% dengan *Enterococcus faecalis*, hal ini menunjukkan bahwa isolat D yang merupakan bakteri asam laktat asal usus DOC adalah bakteri *Enterococcus faecalis*.

## **B. Pembahasan**

### **1. Amplifikasi DNA dengan Metode PCR**

Berdasarkan dari proses amplifikasi DNA dengan metode PCR yang telah dilakukan maka diperoleh hasil visualisasi dengan elektroforesis seperti pada Gambar 1 yang menunjukkan bahwa terdapat satu pita DNA hasil ekstraksi DNA. Sebelum tahap amplifikasi dilakukan terlebih dahulu dilakukan tahap Identifikasi isolat BAL D secara molekuler dengan gen 16S rRNA yaitu dengan cara isolat bakteri asam laktat diekstraksi menggunakan Geneaid Presto TM Mini gDNA Bacteria Kit. Hasil ekstraksi DNA diamplifikasi dengan metode PCR menggunakan primer universal gen 16S rRNA yaitu primer Forward 63F (5'CAGGCCTAACACATGCAAGTC-3') dan primer Reserve 1387R (5'-GGGCGGWGTGTACAAGGC-3'), hasil amplifikasi divisualisasikan pada

elektroforesis dan dihasilkan pita DNA yang sejajar dengan marker 1350 bp seperti pada Gambar 1. Pada sampel D pita yang terbentuk garis tebal, hal ini menunjukkan bahwa DNA hasil ekstraksi memiliki konsentrasi DNA yang sedang dengan pita tidak terlalu tebal dan tidak terlalu terang. Noer dan Gustiananda (2007), melaporkan bahwa semakin besar konsentrasi templat akan semakin terang dan tebal pita DNA yang dihasilkan, namun konsentrasi templat yang terlalu tinggi juga akan mengakibatkan terbentuknya pita yang smear, sebaliknya konsentrasi templat terlalu rendah akan menyebabkan terbentuknya pita yang terlalu tipis untuk dapat dideteksi dengan cara elektroforesis gel agarosa.

Berdasarkan hasil visualisasi elektroforesis pada Gambar 1 menunjukkan bahwa primer yang digunakan dapat teramplifikasi sekitar 1350 bp pada sampel D. Dari Gambar 1 di atas terlihat bahwa pola pita DNA hasil amplifikasi PCR yang terbentuk dengan menggunakan primer berupa pita tunggal. Pita DNA sampel D bergaris sedang. Hal ini menunjukkan DNA sampel D yang teramplifikasi memiliki konsentrasi yang cukup untuk mengindikasikan bahwa pada sampel D mengalami amplifikasi DNA menggunakan primer 63F dan 1387R. Keberhasilan teknik PCR ini didasari dengan kecocokan primer dengan isolat yang akan digunakan serta optimasi selama proses PCR. Hal ini sesuai dengan pendapat Aris, *et al* (2013), yang menyatakan bahwa Keberhasilan teknik PCR ini lebih didasarkan kepada kesesuaian primer dan efisiensi dan optimasi proses PCR. Primer yang tidak spesifik dapat menyebabkan teramplifikasinya daerah lain dalam genom yang tidak dijadikan sasaran atau sebaliknya tidak ada daerah genom yang teramplifikasi. Optimasi PCR juga diperlukan untuk menghasilkan

karakter yang diinginkan. Optimasi ini menyangkut suhu annealing DNA dalam mesin PCR.

Isolat D teramplifikasi menggunakan primer 63F dan 1387R menunjukkan pita yang bergaris sedang dan tidak terlalu terang, sampel yang positif teramplifikasi yang akan dilanjutkan ketahap berikutnya. Tebal atau tipisnya pita DNA berpengaruh terhadap proses pengurutan nukleotida (sekuensing). Sekuensing DNA dilakukan untuk memastikan fragmen DNA yang teramplifikasi pada proses PCR sehingga DNA pengkode 16S rRNA dapat digunakan sebagai penanda molekuler untuk menentukan genus dan strain bakteri karena molekul ini ada pada setiap organisme dengan fungsi yang identik pada seluruh organisme. Terdapat grafik elektrophoregram yang berwarna-warni untuk membedakan jenis basa nitrogen (nukleotida). Hal ini sesuai dengan pernyataan Miller *et al* (1990), yang menyatakan Hasil sekuensing berupa grafik elektrophoregram dengan peak-peak yang berwarna-warni untuk membedakan jenis basa nitrogen (nukleotida) yang dicirikannya. Nukleotida A (Adenin) berwarna hijau, nukleotida G (Guanin) berwarna hitam, C (Citosin) nukleotida berwarna biru dan nukleotida T (Timin) berwarna merah sedangkan lambang N yang merupakan lambang untuk simbol A, G, C, dan T yang muncul tidak banyak.

## **2. Hasil BLAST Gen 16S rRNA**

Sekuens yang diperoleh di Bank Gen bertujuan untuk mengkonfirmasi spesies atau bakteri apa yang memiliki kesamaan dengan urutan DNA sehingga dapat digunakan untuk identifikasi bakteri. Hal ini dibenarkan oleh Miller *et al.*,

(1990), yang menyatakan bahwa Analisis hasil BLAST tersebut memberikan informasi dan memverifikasi mengenai organisme atau bakteri apa yang mempunyai kesamaan dengan urutan DNA sampel sehingga dapat digunakan untuk identifikasi bakteri. Informasi dari hasil BLAST tersebut berupa *Query Coverage* dan *Maximum identity*.

Sekuen yang diperoleh dari bank gen berupa Pasangan Basa dalam bentuk FASTA, Sekuen tersebut merupakan akses untuk menampilkan skala yang menunjukkan tingkat kesamaan sekuens yang dibandingkan pada BLAST. Setelah memasukkan akses berupa pasangan basa pada BLAST maka akan tampil hasil sekuen dari isoat.

Setelah sekuens sampel isolat D dicocokkan dengan sekuens database pada BLAST maka diperoleh hasil seperti pada Tabel 4 bahwa isolat D teridentifikasi sebagai *Enterococcus faecalis*. Di mana isolat D memiliki tingkat kesamaan panjang nukleotida pada database di BLAST mencapai 75% dan memiliki kecocokan sekuens mencapai 95 % dengan *Enterococcus faecalis*, hal ini menunjukkan bahwa isolat D yang merupakan bakteri asam laktat asal usus DOC adalah bakteri *Enterococcus faecalis*. Menurut Narita, (2012) persentase yang dapat diterima minimal 95%, kecuali sekuens yang bacaannya lebih rendah diberlakukan 75%.

Berdasarkan hasil penelitian maka dihasilkan bakteri *Enterococcus faecalis*. *Enterococcus faecalis* adalah bakteri Gram positif dan berbentuk *coccus* atau bulat. Bakteri ini memiliki ciri yang sangat menonjol seperti permukaan koloni berbentuk sirkular, halus dan menyeluruh sehingga mudah dibedakan

dengan bakteri-bakteri lainnya. Menurut Andi (2012), *Enterococcus faecalis* adalah bakteri Gram positif, non-motil dan juga berbentuk bulat. Bakteri ini memiliki ciri-ciri yang khas, sehingga lebih mudah dibedakan dengan bakteri-bakteri yang lainnya dan juga merupakan bakteri fakultatif anaerob dengan metabolisme fermentasi dan berbentuk secara non-sporadis. Sel *Enterococcus faecalis* berbentuk ovoid dan dalam karakteristiknya kadang tunggal, berpasangan atau membentuk rantai dengan diameter 0,5-1  $\mu$ l, dapat hidup meski tanpa oksigen.

### **3. Hasil Identifikasi Bakteri Asam Laktat dengan Metode yang Berbeda**

Berdasarkan pada hasil peneliti terdahulu Marnila (2016), yang mengidentifikasi bakteri dari isolat D dengan metode *Manual Bergey's* menunjukkan bahwa isolat D merupakan bakteri *Pediococcus* sp dengan ciri-ciri memiliki koloni kecil berbentuk bulat, elevasi cembung, tepi rata, permukaan berkilau, dan warna putih susu. Sedangkan karakteristik morfologi sel yang didapatkan yaitu bersifat Gram positif, bentuk sel bulat (*coccus*), dan penataan selnya berbentuk tetrakokus. Sedangkan pada identifikasi isolat D yang menggunakan metode PCR menunjukkan bahwa isolat D tersebut menunjukkan spesies bakteri *Enterococcus faecalis* sp yang memiliki tingkat kecocokan 95% dengan bank data. Dimana *Enterococcus faecalis* memiliki ciri-ciri sebagai bakteri Gram positif, non-motil, dan juga berbentuk *coccus* atau bulat, sehingga mudah dibedakan dengan bakteri-bakteri lainnya dan juga merupakan bakteri fakultatif anaerob dengan metabolisme fermentasi dan berbentuk secara non-sporadis.

Kedua metode yang digunakan untuk mengidentifikasi bakteri asam laktat sama-sama menggunakan isolat yang sama yaitu isolat D dari usus broiler umur satu hari. Namun, hasil yang diperoleh dari kedua metode tersebut berbeda. Hal ini dikarenakan banyaknya kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan terjadi pada saat dilakukan penelitian. Seperti pada saat dilakukan penelitian pada metode uji probiotik kemungkinan kurangnya ketelitian dalam melakukan prosedur kerja sehingga memungkinkan sampel isolat yang digunakan terkontaminasi dengan bakteri luar yang tidak diinginkan, kemungkinan suhu yang digunakan tidak sesuai, serta kemungkinan media yang digunakan sebagai media tumbuh yang digunakan dapat memicu tumbuhnya bakteri lain. Hal ini dibenarkan oleh Gunawan (1987), yang menyatakan bahwa Media tumbuh dan eksplan dapat terkontaminasi oleh mikroorganisme karena kedua-duanya dapat berfungsi sebagai substrat yang baik bagi pertumbuhan mikroorganisme termasuk bakteri dan jamur.

Selain dari kemungkinan media yang dapat menyebabkan kontaminasi, alat-alat yang kurang steril juga kemungkinan dapat menyebabkan terkontaminasinya suatu bakteri. Hal ini sesuai dengan pernyataan Guppe (1990), yang menyatakan bahwa Peranan sterilisasi pada bidang mikrobiologi diantaranya adalah untuk mencegah pencemaran mikroorganisme luar dan untuk mempertahankan keadaan aseptis. Di dalam pengamatan tentang mikrobiologi sterilisasi merupakan bagian yang sangat penting atau merupakan suatu keharusan, baik pada alat maupun media. Hal ini penting karena jika alat atau media tidak

steril, akan sulit menentukan apakah mikroba merupakan akibat dari percobaan yang dilakukan atau merupakan kontaminan.

Dari beberapa faktor kemungkinan yang terjadi pada penelitian terdahulu dengan metode *Manual Bergey's* yang menyebabkan bakteri yang dihasilkan tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan dengan metode PCR. Identifikasi dengan menggunakan metode PCR merupakan cara untuk mengidentifikasi suatu spesies bakteri dengan lebih akurat. Hal ini dikarenakan pada setiap proses yang identifikasi dilakukan dengan menggunakan beberapa alat yang dapat meningkatkan tingkat keakuratannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Black *et al* (2002), yang menyatakan bahwa selama beberapa tahun terakhir pengujian PCR *real time* yang berdasarkan fluoresensi menjadi suatu metode pengujian yang sering digunakan untuk deteksi RNA, DNA, dan cDNA. Teknik ini sangat sensitif yang memungkinkan amplifikasi terjadi secara bersama-sama serta kuantitas sekuens asam nukleat dapat diketahui. Disamping memiliki sensitivitas lebih tinggi kelebihan pengujian PCR *real time* jika dibandingkan dengan PCR konvensional adalah lebih dinamis, resiko kontaminasi silang lebih sedikit, kemampuan aplikasi penggunaannya untuk pengujian lebih banyak.

Salah salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya perbedaan hasil identifikasi bakteri asam laktat dari isolat D adalah metode yang digunakan. Pada penelitian terdahulu yang menggunakan *Manual Bergey's* mengidentifikasi secara Fenotip yaitu dengan mengamati morfologi seperti bentuk sel, dan pewarnaan gram. Sedangkan pada identifikasi menggunakan metode PCR mengidentifikasi secara genotif yaitu mengamati gen dari sampel isolat, dengan

mencocokkan urutan DNA sampel isolat dengan data DNA yang telah lebih akurat di bank gen.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian identifikasi bakteri asam laktat dari saluran DOC umur satu hari menggunakan teknik molekuler berbasis 16S rRNA dengan metode *Polymerase Chain Reaction* menunjukkan bahwa saluran DOC umur satu hari terdapat bakteri asam laktat yaitu jenis bakteri *Enterococcus faecalis* yang memiliki ciri sebagai bakteri Gram positif, non-motil, dan juga berbentuk *coccus* atau bulat, sehingga mudah dibedakan dengan bakteri-bakteri lainnya dan juga merupakan bakteri fakultatif anaerob dengan metabolisme fermentasi dan berbentuk secara non-sporadis.

#### **B. Saran**

Bakteri asam laktat yang telah didapatkan dengan menggunakan metode PCR konvensional sebaiknya pada penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode PCR *real time* sehingga data yang dihasilkan lebih akurat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abun. 2008. *Hubungan Mikroflora Dengan Metabolisme Dalam Saluran Pencernaan Unggas Dan Monogastrik*. Jatinangoro Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Asrwarwadi, A. 2012. *Efektivitas Ekstrak Daun Jambu Biji (Psidium Guajava) Terhadap Bakteri Enterococcus Faecalis Sebagai Salah Satu Bahan Alternatif Irigasi Saluran Akar*. Skripsi. Makassar. fakultas kedokteran gigi. Universitas Hasanuddin.
- Amin dan Leksono, 2001. *Efektivitas Bakteri Asam Laktat Dalam Menghambat Bakteri*. Yogyakarta : Airlangga.
- Ashshiddiq, 1971. *Al- Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta : Yayasan Pelanggaran Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an.
- Aris, M., Sukenda, Harris E, dan Sukadi M.F. 2013. *Identifikasi Molekular Bakteri Patogen Dan Desain Primer PCR*. Budidaya Perairan. Vol. 1(3) : 43-50.
- Biles B.D dan Connolly B.A. 2004. *Low-Fidelity Pyrococcus Furiosus DNA Polymerase Mutants Useful In Error-Prone PCR*. Nucleic Acids Res. 32:3-7.
- Black E.M, Lowings J.P, Smith J, Heaton P.R dan McElhinney L.M. 2002. *A Rapid RT-PCR Method To Differentiate Six Established Genotypes Of Rabies And Rabies-Related Viruses Using Tag Man Tecnology*. J Virol Methods. 105: 25-35.
- Burgos J.S, Ramirez C, Tenorio R, Sastre I dan Bullido M.J. 2002. *Influence Of Reagents Formulation On Real-Time PCR Parameters*. Mol Cell Probes. 16:257-260.
- Carman W.F., Wallace L.A., Walker J, McIntyre S, Noone A, Christie P, Millar J dan Douglas D.J. 2000. *Rapid Virological Surveillance Of Community Influenza Infection In General Practice*. BMJ. 321:736-737.
- Chantratita W, Sukasem C, Kaewpongsri S, Srichunrusami C, Pairoj W, Thitithanyanont A, Chaichoune K, Ratanakron P, Songserm T, Damrongwatanapokin S dan Landt O. 2008. *Qualitative detection of Avian*

*Influenza A (H5N1) viruses: a comparative evaluation of four real-time nucleic acid amplification methods.* Mol Cell Probes. 22:287-293.

Clarridge J.E. 2004. *Impact Of 16S Rrna Gene Sequence Analysis For Identification Of Bacteria On Clinical Microbiology And Infectious Diseases.* Clin Microbiol. Rev. 17(4): 840-62.

Daghir N.J. 1995. *Poultry Production In Hot Climates.* New York: Cab International, Madison avenue.

Das A, Spackman E, Senne D, Pedersen J dan Suarez D.L. 2006. *Development Of An Internal Positive Control For Rapid Diagnosis Of Avian Influenza Virus Infections By Real-Time Reverse Transcription-PCR With Lyophilized Reagents.* J Clin Microbiol. 44:3065-3073.

Didenko V. 2001. *DNA Probes Using Fluorescence Resonance Energy Transfer (FRET): Designs And Applications.* Biotechniques. 31:1106-1116, 1120-1121.

Dingle K.E, Crook D dan Jeffery K. 2004. *Stable And Noncompetitive RNA Internal Control For Routine Clinical Diagnostic Reverse Transcription-PCR.* J Clin Microbiol. 42:1003-1011.

Fox G.E, Wisotzkey J.D dan Jurtshuk P. 1992. *16s rRNA Sequence Identity May Not Be Sufficient To Guarantee Species Identity.* Int. J. Syst. Bacteriol. 42(1): 166-70.

Fraga D, Meulia T, dan Fenster S. 2008. *Real-Time PCR. In: Current Protocols Essential Laboratory Techniques.* New York (US): John Wiley & Sons, Inc. p. 10.3.1-10.3.33.

Gaggia F, Mattarelli P, dan Biavati B. 2010. *Review: Probiotics And Prebiotics In Animal Feeding For Safe Food Production.* Int J of Food Microbiol. 141: S15–S28.

Germer J.J, Lins M.M, Jensen M.E, Harmsen W.S, Ilstrup D.M, Mitchell P.S, Cockerill F.R dan Patel R. 2003. *Evaluation Of The Magna Pure LC Instrument For Extraction Of Hepatitis C Virus RNA For The COBAS AMPLICOR Hepatitis C Virus Test, Version 2.0.* J Clin Microbiol. 41:3503-3508.

Gibbs R.A. 1990. *DNA Amplification By The Polymerase Chain Reaction.* Anal Chem. 62:1202-1214.

- Giglio S, Monis P.T dan Saint C.P. 2003. *Demonstration Of Preferential Binding Of SYBR Green I To Specific DNA Fragments In Real-Time Multiplex PCR*. Nucleic Acids Res. 31:e136.
- Gunawan L. N. 1987. *Teknik Kultur Jaringan*. Bogor : PAN ITB.
- Guppe dan Satish. 1990. *Mikrobiologi Dasar. Terjemahan E. Suryawidjaja : The Short Textbook Of Medical Microbiologi*. Jakarta: Bina rupa Aksara.
- Hifizah. 2012. *Mikrobiologi Ternak*: Makassar: UIN Press Makassar.
- Hoffmann B, Harder T, Starick E, Depner K, Werner O dan Beer M. 2007. *Rapid And Highly Sensitive Pathotyping Of Avian Influenza A H5N1 Virus By Using Real-Time Reverse Transcription-PCR*. J Clin Microbiol. 45:600-603.
- Jacob J, Pescatore T dan Cantor A. 2011. *Avian Digestive System*. Cooperative extension service. University of Kentucky, college of agricuklture, Lexington.
- Kanisius. 1986. *Beternak Ayam Pedaging* . Yogyakarta: Kanisius.
- Kanoksilapatham W. 2007. *Directed-Mutagenesis And Deletion Generated Through An Improved Overlapping-Extension PCR Based Procedure*. Silpakorn Univ Sci Technol J. 1:7-12.
- Kattar M. 2000. *Application Of 16S rRNA Gene Sequencing To Identify Bordetella Hinzii As The Causative Agent Of Fatal Septicemia*. J. Clin. Microbiol. 38:789-94.
- Kementerian Agama, RI., 2012. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta timur: CV. Darus Sunnah.
- Kim Y.J, Lee H.S, Bae S.S, Jeon J.H, Lim J.K, Cho Y, Nam K.H, Kang S.G, Kim S.J, Kwon S.T dan Lee J.H. 2007. *Cloning, Purification, And Characterization Of A Family B Type DNA Polymerase From A Hyperthermophilic Archaeon Thermococcus Sp. NAI*. J Microbiol Biotechnol. 17:1090-1097.
- Kuppeveld F.J.M, Logt J.T.M, Angulo A.F, Zoest M.J, Quint W.G.V, Niesters H.G.M, Galama J.M.D dan Melchers W.J.G. 1992. *Genus And Species-Specific Identification Of Mycoplasmas By 16S rRN Amplification*. Appl. Environ. Microbiol. 58(8): 2606-15.

- Lau S.K.P, Woo P.C.Y, Teng J.L.L, Leung K.W dan Yuen K.Y. 2002. *Identification By 16S Ribosomal RNA Gene Sequencing Of Arcobacter Butzleri Bacteraemia In A Patient With Acute Gangrenous Appendicitis*. J Clin Pathol: Mol Pathol.55:182–185.
- Lee, D.K., Jang S, Baek E.H, Kim M.J, Lee K.S, Shin H.S, Chung M.J, Kim J.E, Lee K.O, dan Ha N.J. 2009. *Lactic Acid Bacteria Affect Serum Cholesterol Levels, Harmful Fecal Enzyme Activity, And Fecal Water Content*. Lipids in Health and Disease. 8:21.
- Magray M.S.U.D, Kumar A, Rawat A.K dan Srivastava S. 2011. *Identification Of Escherichia Coli Through Analysis Of 16S Rrna And 16S-23S Rrna Internal Transcribed Spacer Region Sequences*. Bioinformation. 6(10): 370-371.
- Makarova, K, Slesarev A, Wolf Y, Sorokin A, Mirkin B, Koonin E, Pavlov A, Pavlova N, Karamychev V, Polouchine N, Shakhova V, Grigoriev I, Lou Y, Rohksar D, Lucas S, Huang K, Goodstein D.M, Hawkins T, Plengvidhya V, Welker D, Hughes J, Goh Y, Benson A, Baldwin K, Lee J.H, Díaz-Muñiz I, Dosti B, Smeianov V, Wechter W, Barabote R, Lorca G, Altermann E, Barrangou R, Ganesan B, Xie Y, Rawsthorne H, Tamir D, Parker C, Breidt F, Broadbent J, Hutkins R, O'Sullivan D, Steele J, Unlu G, Saier M, Klaenhammer T, Richardson P, Kozyavkin S, Weimer B dan Mills D. 2006. *Comparative Genomics Of The Lactic Acid Bacteria*. Proc. Natl. Acad. Sci. U S A. 103(42): 15611–15616.
- Marnila, L. 2016. *Isolasi Dan Karakteristik Mikroba Isolat Bakteri Asam Laktat (BAL) Asal Saluran Pencernaan Doc Broiler*. Skripsi. Makassar : Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains Dan Teknologi. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Miller, G.A., Baeckwith R, Fellbaum C, Gross D dan Miller K. 1990. *Introduction To Wordnet: An On-Line Lexical Database*. International Journal of Lexicography. Vol. 3: 235-312.
- Narita, V., Arum A.L., Isnaeni S, dan Fawzya N.Y. 2012. *Analisis Bioinformatika Berbasis WEB untuk Eksplorasi Enzim Kitosanase Berdasarkan Kemiripan Sekuens*. Jurnal Al-Azhar Indonesia Sains dan Teknologi. Vol. 1(4) : 197-203.
- NCCLS. 1995. *Molecular Diagnostic Methods For Infectious Diseases; Approved Guideline*. 1st ed. Wayne (Pennsylvania): National Committee for Clinical Laboratory Standards.
- Niesters H.G. 2002. *Clinical Virology In Real Time*. J Clin Virol. 25 (Suppl.3): 3-12.

- Noer, A.S dan M. Gustiananda. 2007. *PCR Tanpa Isolasi DNA dari Sel Epitel Rongga Mulut*. *JMS*. Vol. 2(1): 35-45.
- Nolte F.S. 2008. *Molecular Diagnostics For Detection Of Bacterial And Viral Pathogens In Community-Acquired Pneumonia*. *CID*. 47:123-6.
- O'Sullivan, O., O'Callaghan J., Vegas A.S., McAuliffe O., Slattery L., Kaleta P., Callanan M., Fitzgerald G.F., Ross R.P dan Beresford T. 2009. *Comparative Genomics Of Lactic Acid Bacteria Reveals A Niche-Specific Gene Set*. *BMC Microbiol*. 9:1471-2180.
- Pot, B., Ludwig W., Kersters, Schleifer K., Vuyst D.E., dan Vandamme E. J. 1994. *Taxonomy Of Lactic Acid Bacteria*. microbiology genetic and application. London: Blackie Academic & Professiona.
- Rahayu, E.S. dan Margino. 1997. *Bakteri Asam Laktat: Isolasi dan Identifikasi. Materi Workshop. Seminar Makalah Tugas Akhir*. PAU Pangan dan Gizi. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Sacchi C.T. 2002. *Sequencing Of 16S Rrna Gene: A Rapid Tool For Identification Of Bacillus Anthracis*. *Emerging Infectious Diseases*. 8(10): 1117-23.
- Salanitro J.P., Blake I.G., Muirhead P.A. 1974. *Studies On The Cecal Microflora Of Commercial Broiler Chicken*. *Appl Microbiol*. 28: 439-447.
- Ramdana, S. 2012. *Karakterisasi Bakteri Probiotik yang Berasal dari Saluran Pencernaan Ayam Pedaging*. Makassar : Universitas Hasanuddin.
- Simanjuntak. 2008. *Bakteri Asam Laktat Mampu Mengikat Toksin*. Jakarta: Nirwana Abadi.
- Sjofjan, O. 2003. *Kajian Probiotik AB (Aspergillus dan Bacillus spp) Sebagai Imbuhan Ransum Dan Implikasi Efeknya Terhadap Mikroflora Usus Serta Penampilan Produksi Ayam Petelur*. Disertasi Program Pasca Sarjana. Bandung : Universitas Padjadjaran.
- Surono, I.S. 2004. *Probiotik Susu Fermentasi Dan Kesehatan*. Jakarta : Tri Cipta Karya.
- Trisna, R. 2011. *Analisis Sekuesing 16 S Rrna Di Bidang Mikrobiologi vol 11*. jurnal kedokteran syiah kuala. fakultas kedokteran kuala. nomor 3: h. 172-176.

- Tyagi, S dan Kramer F.R. 1996. *Molecular beacons: probes that fluoresce upon hybridization*. Nat Biotechnol. 14:303-308.
- Wanarska M., Kur J., Pladzyk R., Turkiewicz M., 2005. *Thermostable Pyrococcus Woesei B-D Galactosidase-High Level Expression, Purification And Biochemical Properties*. Acta Biochim vol. 52:781-787.
- Widyastuti, Y dan Sofarianawati E., 1999. *Karakter Bakteri Asam Laktat Enterococcus Sp. Yang Diisolasi Dari Saluran Pencernaan Ternak*. Jurnal Mikrobiologi Indonesia no.4, h.50-53.
- woese, C.R., Weisburg, paster W.G., Han J., Tanner C.M., Krieg R.S., Koops N.R., Harms H.P., dan Stackebrandt, E. 1984. *The Phylogeny Of Purple Bacteria : The Beta Subdivision Systematic And Appleid Mikrobiologi*. 5, 327-336.
- Valez, M., dan perea. 2007. *Identification And Characterization Of Starter Lactic Acid Bacteria And Probiotics From Columbian Dairy Products*. Journal of Applied Microbiolgy; ISSN; 1364-5072.
- Vandesompele J, De Paepe A dan Speleman F. 2002. *Elimination Of Primer-Dimer Artifacts And Genomic Coamplification Using A Two-Step SYBR Green I Real-Time RT-PCR*. Anal Biochem. 303:95-98.
- Yuwono T. 2006. *Teori Dan Aplikasi Polymerase Chain Reaction*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Zoetendal E.G., Cheng B., Koike S., Mackie RI. 2004. *Molecular Microbial Ecology Of The Gastrointestinal Tract: From Phylogeny To Function*. Curr Issues Intest Microbiol. 5:3.



# LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
M A K A S S A R




**Lampiran 1. Susunan Pasangan Basa *Enterococcus faecalis***

PASANGAN BASA

GGGGCCATCGCGGGCGTGCTGATCCGCGATTACTAGCGATTCCGGCTTCATGCAGGCGAGTT  
GCAGCCTGCAATCCGAAGTGAAGAGATTTGCATGACCTCGCGGTCTAGCGACT  
CGTTGTACTTCCATTGTAGCACGTGTGTAGCCCAGGTCATAAGGGGCATGATGATTTGACGTC  
ATCCCCACCTTCTCCGTTTTGTCACCGGCAGTCTCGCTAGAGTGCCCAACTAAATGATGGCAAC  
TAACAATAAGGGTTGCGCTCGTTGCGGGACTTAACCCAACATCTCACGACACGAGCTGACGACA  
ACCATGCACCACCTGTCACTTTGTCCCCGAAGGGAAAGCTCTATCTCTAGAGTGGTCAAAGGAT  
GTCAAGACCTGGTAAGGTTCTTCGCGTTGCTTGAATTAACCACATGCTCCACCGCTTGTGCGG  
GCCCCGTCATTCCTTTGAGTTTCAACCTTGCAGTCTACTCCCCAGGCGGAGTGCTTAATGCG  
TTTGTGCGACTGAAGGGCGGAAACCCTCCAACACTTAGCACTCATGTTTACGGCGTGGAC  
TACCAGGGTATCTAATCCTGTTTGTCCCCACGTTTTGAGCCTCAGCGTCAGTTACAGACCAGA  
GAGCCGCTTCGCCACTGGTGTTCCTCCATATATCTACGCATTTACCGCTACACATGGAATTCCA  
CTCTCCCTCTTCTGCACTCAAGTCTCCAGTTTCCAATGACCCTCCCCGTTGAGCCGGGGGCT  
TTCACATCAGAACTTAAGAAAACCGCCCTGCGCCTCGCTTTTACGCCCAATAAAATCCGGAACA  
ACGCCTTGCCACCCTACGTAATTTACCCGCGGCCTGGCTGGGCACCGTAGTTTAGCCGTGGG  
CTTTCTGGGTTAGAATACCGTTCAGGGGGAACGTTTACGTTTACCTAACGGTCCCTTGGTTCCT  
TCCTCTAAACAAACAGAAGTTTTTACGAATCCCGAAAAACCCTTTCTTTCCACTTCAACGCCGG  
GCGTTTTGGCTTCGGGTTGAGAACTTTTTCCGTTCCATTTGGCCGAAAAGAATTTCCCCCTA  
ACCTGGGCTGGCCCTTTCCCGGTAAGGGAAGTTCCTGGGGGGCCCGGTGGGTTCTTCAAGTTT  
CCCCAAGTTGGTGGGGGCCCGGAATTCACCCCCCTTCTTCCAGGGTTCCGGGGCCTTAAT  
TGGCAATTCCGGTGGGGGCCCTTTTTGGGGGTTGGAAGGCCCGGTTTTTAACCCCTTTCA  
AACCCAAAACCTTTAAGCCTTTAAAATTGGCCACCCCCGGGCCCGGGGGGCTTCTCCATTT  
CCCA

## Lampiran 2. Hasil BLAST Gen 16S rRNA



6/7/2018

NCBI Blast:Nucleotide Sequence (1360 letters)

**Descriptions**

Sequences producing significant alignments:

Description	Max score	Total score	Query cover	E value	Ident	Accession
Enterococcus faecalis partial 16S rRNA gene, isolate BS28-28	1589	1589	75%	0.0	95%	<a href="#">HG798520.1</a>
Bacterium NLAE-zl-G467 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1578	1578	73%	0.0	96%	<a href="#">JX048455.1</a>
Enterococcus sp. strain MS3 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1576	1576	74%	0.0	95%	<a href="#">MG754234.1</a>
Enterococcus faecalis strain ES09 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1567	1567	73%	0.0	96%	<a href="#">KX364715.1</a>
Bacterium NLAE-zl-G369 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1563	1563	73%	0.0	96%	<a href="#">JX048364.1</a>
Uncultured bacterium clone HRF-f-Cel13 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1563	1563	73%	0.0	96%	<a href="#">JN698647.1</a>
Enterococcus faecalis strain SNNU0263 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1561	1561	73%	0.0	96%	<a href="#">KX752884.1</a>
Enterococcus faecalis strain 1 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1559	1559	73%	0.0	96%	<a href="#">MH327494.1</a>
Enterococcus faecium strain CAU8625 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1559	1559	73%	0.0	96%	<a href="#">MF108117.1</a>
Enterococcus faecalis strain CAU170 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1559	1559	73%	0.0	96%	<a href="#">MF582810.1</a>
Enterococcus faecalis strain CAU2945 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1559	1559	73%	0.0	96%	<a href="#">MF428839.1</a>
Enterococcus faecalis strain CAU6383 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1559	1559	73%	0.0	96%	<a href="#">MF425319.1</a>
Enterococcus faecium strain CAU6443 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1559	1559	73%	0.0	96%	<a href="#">MF425222.1</a>
Enterococcus faecalis strain CAU9297 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1559	1559	73%	0.0	96%	<a href="#">MF425218.1</a>
Enterococcus faecium strain CAU6819 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1559	1559	73%	0.0	96%	<a href="#">MF425195.1</a>
Enterococcus faecalis strain CAU9281 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1559	1559	73%	0.0	96%	<a href="#">MF424870.1</a>
Enterococcus faecalis strain CAU7924 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1559	1559	73%	0.0	96%	<a href="#">MF424810.1</a>
Enterococcus faecalis strain CAU6209 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1559	1559	73%	0.0	96%	<a href="#">MF424679.1</a>
Enterococcus faecalis strain CAU2304 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1559	1559	73%	0.0	96%	<a href="#">MF424517.1</a>
Enterococcus faecium strain CAU6406 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1559	1559	73%	0.0	96%	<a href="#">MF424331.1</a>
Enterococcus faecalis strain CAU133 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1559	1559	73%	0.0	96%	<a href="#">MF424281.1</a>
Enterococcus faecalis strain CGLBL115 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1559	1559	72%	0.0	96%	<a href="#">KF826008.1</a>
Uncultured bacterium clone S43_056 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1559	1559	73%	0.0	96%	<a href="#">KC873228.1</a>
Enterococcus faecalis strain BWKU48 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1559	1559	73%	0.0	96%	<a href="#">KC707579.1</a>
Unidentified marine bacterioplankton clone E307B_1_65 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1559	1559	73%	0.0	96%	<a href="#">KC002604.1</a>
Uncultured organism clone ELU0150-T457-S-NIPCRAMgANa_000493 small subunit ribosomal RNA gene, partial sequence	1559	1559	73%	0.0	96%	<a href="#">HQ802279.1</a>

file:///F:/rina/NCBI%20Blast%20Nucleotide%20Sequence%20(1360%20letters).htm

2/13

6/11/2018

NCBI Blast:Nucleotide Sequence (1360 letters)

Description	Max score	Total score	Query cover	E value	Ident	Accession
Uncultured organism clone ELU0150-T457-S-NIPCRAMgANa_000211 small subunit ribosomal RNA gene, partial sequence	1559	1559	73%	0.0	96%	<a href="#">HQ801997.1</a>
Uncultured bacterium clone HH_asi35b08 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1559	1559	73%	0.0	96%	<a href="#">EU459263.1</a>
Enterococcus faecalis gene for 16S rRNA, partial sequence, strain: SLE1	1559	1559	73%	0.0	96%	<a href="#">AB272354.1</a>
Enterococcus faecalis gene for 16S ribosomal RNA, partial sequence, strain: qz168	1557	1557	79%	0.0	93%	<a href="#">AB761304.1</a>
Uncultured bacterium clone nby292a03c1 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1557	1557	73%	0.0	96%	<a href="#">HM808920.1</a>
Uncultured bacterium clone S43_005 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1555	1555	73%	0.0	95%	<a href="#">KC873178.1</a>
Unidentified marine bacterioplankton clone E307B_1_07 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1555	1555	73%	0.0	95%	<a href="#">KC002553.1</a>
Bacterium NLAE-zl-H532 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1555	1555	73%	0.0	95%	<a href="#">JX006775.1</a>
Bacterium NLAE-zl-H357 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1555	1555	73%	0.0	95%	<a href="#">JX006571.1</a>
Enterococcus faecalis strain CVCC A31 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1555	1555	73%	0.0	95%	<a href="#">GQ202631.1</a>
Enterococcus faecalis strain 5 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1554	1554	73%	0.0	95%	<a href="#">MH327498.1</a>
Enterococcus faecium strain CAU5977 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1554	1554	73%	0.0	95%	<a href="#">MF424844.1</a>
Enterococcus faecium strain CAU6413 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1554	1554	73%	0.0	95%	<a href="#">MF424566.1</a>
Enterococcus faecalis strain CAU1042 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1554	1554	73%	0.0	95%	<a href="#">MF423945.1</a>
Enterococcus faecalis strain L1A1M8 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1554	1554	73%	0.0	95%	<a href="#">KX373544.1</a>
Enterococcus faecalis strain SNNU0264 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1554	1554	73%	0.0	95%	<a href="#">KX752885.1</a>
Enterococcus faecalis strain B8.3.2 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1554	1554	73%	0.0	95%	<a href="#">KJ725225.1</a>
Enterococcus faecalis partial 16S rRNA gene, isolate OCAT41	1554	1554	73%	0.0	95%	<a href="#">HG799973.1</a>
Enterococcus faecalis partial 16S rRNA gene, isolate BS28-29	1554	1554	73%	0.0	95%	<a href="#">HG798521.1</a>
Enterococcus faecalis strain OS21 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1554	1554	73%	0.0	95%	<a href="#">JX536109.1</a>
Bacterium NLAE-zl-H322 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1554	1554	73%	0.0	95%	<a href="#">JX006537.1</a>
Bacterium NLAE-zl-G478 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1554	1554	76%	0.0	94%	<a href="#">JX048465.1</a>
Uncultured organism clone ELU0166-T394-S-NIPCRAMgANa_000490 small subunit ribosomal RNA gene, partial sequence	1554	1554	73%	0.0	95%	<a href="#">HQ811505.1</a>
Uncultured organism clone ELU0156-T284-S-NIPCRAMgANa_000195 small subunit ribosomal RNA gene, partial sequence	1554	1554	73%	0.0	95%	<a href="#">HQ805677.1</a>
Uncultured organism clone ELU0150-T457-S-NIPCRAMgANa_000189 small subunit ribosomal RNA gene, partial sequence	1554	1554	73%	0.0	95%	<a href="#">HQ801975.1</a>
Uncultured bacterium clone nby279a10c1 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1554	1554	73%	0.0	95%	<a href="#">HM814368.1</a>

file:///F:/r/na/NCBI%20Blast%20Nucleotide%20Sequence%20(1360%20letters).htm

3/13

6/7/2018

NCBI Blast:Nucleotide Sequence (1360 letters)

Description	Max score	Total score	Query cover	E value	Ident	Accession
Enterococcus faecalis strain FB102 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1554	1554	73%	0.0	95%	<a href="#">GQ449688.2</a>
Enterococcus faecalis strain Feb-67 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1552	1552	73%	0.0	95%	<a href="#">MH385355.1</a>
Enterococcus faecalis strain A9-1 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1552	1552	73%	0.0	95%	<a href="#">MH385354.1</a>
Enterococcus faecalis strain A4-1 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1552	1552	73%	0.0	95%	<a href="#">MH385352.1</a>
Enterococcus faecalis strain A3-1 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1552	1552	73%	0.0	95%	<a href="#">MH385351.1</a>
Enterococcus faecalis strain 10 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1552	1552	73%	0.0	95%	<a href="#">MH327503.1</a>
Enterococcus faecalis strain Ef-X26 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1552	1552	73%	0.0	95%	<a href="#">MH298553.1</a>
Enterococcus faecalis strain Ef-X24 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1552	1552	73%	0.0	95%	<a href="#">MH298552.1</a>
Enterococcus faecalis strain Ef-X22 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1552	1552	73%	0.0	95%	<a href="#">MH298551.1</a>
Enterococcus faecalis strain HASOB12b 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1552	1552	73%	0.0	95%	<a href="#">MH291406.1</a>
Enterococcus faecalis KUB3007 DNA, complete genome	1552	6209	73%	0.0	95%	<a href="#">AP018543.1</a>
Enterococcus faecalis KUB3006 DNA, complete genome	1552	6209	73%	0.0	95%	<a href="#">AP018538.1</a>
Enterococcus faecalis strain UTD-3 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1552	1552	73%	0.0	95%	<a href="#">MH281954.1</a>
Enterococcus faecalis strain UTD-2 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1552	1552	73%	0.0	95%	<a href="#">MH281949.1</a>
Enterococcus faecalis strain UTD-1 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1552	1552	73%	0.0	95%	<a href="#">MH281945.1</a>
Enterococcus faecalis strain DMF4 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1552	1552	73%	0.0	95%	<a href="#">MF380368.1</a>
Enterococcus faecalis strain FC7654 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1552	1552	73%	0.0	95%	<a href="#">MH244226.1</a>
Enterococcus faecalis strain 49 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1552	1552	73%	0.0	95%	<a href="#">MH236349.1</a>
Enterococcus faecalis strain 44 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1552	1552	73%	0.0	95%	<a href="#">MH236344.1</a>
Enterococcus faecalis strain 34 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1552	1552	73%	0.0	95%	<a href="#">MH236335.1</a>
Enterococcus faecalis strain 32 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1552	1552	73%	0.0	95%	<a href="#">MH236333.1</a>
Enterococcus faecalis strain 29 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1552	1552	73%	0.0	95%	<a href="#">MH236330.1</a>
Enterococcus faecalis strain 28 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1552	1552	73%	0.0	95%	<a href="#">MH236329.1</a>
Enterococcus faecalis strain 27 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1552	1552	73%	0.0	95%	<a href="#">MH236328.1</a>
Enterococcus faecalis strain 20 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1552	1552	73%	0.0	95%	<a href="#">MH236321.1</a>
Enterococcus faecalis strain 15 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1552	1552	73%	0.0	95%	<a href="#">MH236316.1</a>
Enterococcus faecalis strain 14 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1552	1552	73%	0.0	95%	<a href="#">MH236315.1</a>
Enterococcus faecalis strain 13 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1552	1552	73%	0.0	95%	<a href="#">MH236314.1</a>
Enterococcus faecalis strain 10 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1552	1552	73%	0.0	95%	<a href="#">MH236311.1</a>
Enterococcus faecalis strain 9 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1552	1552	73%	0.0	95%	<a href="#">MH236310.1</a>

file:///F:/rina/NCBI%20Blast%20Nucleotide%20Sequence%20(1360%20letters).htm

4/13

6/7/2018

NCBI Blast:Nucleotide Sequence (1360 letters)

Description	Max score	Total score	Query cover	E value	Ident	Accession
Enterococcus faecalis strain 8 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1552	1552	73%	0.0	95%	<a href="#">MH236309.1</a>
Enterococcus faecalis strain 7 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1552	1552	73%	0.0	95%	<a href="#">MH236308.1</a>
Enterococcus faecalis strain 3 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1552	1552	73%	0.0	95%	<a href="#">MH236304.1</a>
Enterococcus faecalis strain S533-1 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1552	1552	73%	0.0	95%	<a href="#">MH179309.1</a>
Enterococcus faecalis strain 38CB2 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1552	1552	73%	0.0	95%	<a href="#">MH158266.1</a>
Enterococcus faecalis strain 20CB2 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1552	1552	73%	0.0	95%	<a href="#">MH158264.1</a>
Enterococcus faecalis strain FDAARGOS_324 chromosome, complete genome	1552	6203	73%	0.0	95%	<a href="#">CP028285.1</a>
Enterococcus faecalis strain ACD47-2 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1552	1552	73%	0.0	95%	<a href="#">MH127511.1</a>
Enterococcus faecalis strain HCD42-1 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1552	1552	73%	0.0	95%	<a href="#">MH111684.1</a>
Enterococcus faecalis strain HCD41-4 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1552	1552	73%	0.0	95%	<a href="#">MH111683.1</a>
Enterococcus faecalis strain HCD40-6 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1552	1552	73%	0.0	95%	<a href="#">MH111678.1</a>
Enterococcus faecalis strain HCD38-7 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1552	1552	73%	0.0	95%	<a href="#">MH111668.1</a>
Enterococcus faecalis strain HCD38-5 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1552	1552	73%	0.0	95%	<a href="#">MH111666.1</a>
Enterococcus faecalis strain HCD38-4 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1552	1552	73%	0.0	95%	<a href="#">MH111665.1</a>
Enterococcus faecalis strain HCD38-3 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1552	1552	73%	0.0	95%	<a href="#">MH111664.1</a>
Enterococcus faecalis strain HCD34-6 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1552	1552	73%	0.0	95%	<a href="#">MH111642.1</a>
Unidentified marine bacterioplankton clone E307B_1_96 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1550	1550	73%	0.0	95%	<a href="#">KC002626.1</a>
Enterococcus faecalis strain 8CB1 16S ribosomal RNA gene, partial sequence	1544	1544	73%	0.0	95%	<a href="#">MH158261.1</a>

**Alignments**

Enterococcus faecalis partial 16S rRNA gene, isolate BS28-28  
Sequence ID: **HG798520.1** Length: 1350 Number of Matches: 1

See 1 more title(s)  
Range 1: 184 to 1201

Score	Expect	Identities	Gaps	Strand	Frame
1589 bits(860)	0.0()	984/1039(95%)	28/1039(2%)	Plus/Minus	
Features:					
Query 10	CGCGGGCGTCTGATCGCGGATTA	ACTAGCGATTCCGGCTCATGCA	GGCGAGTTGCAGCC	69	
Sbjct 1201	CGC-GGCCTGCTGATCGCGGATTA	CTAGCGATTCCGGCTCATGCA	GGCGAGTTGCAGCC	1143	
Query 70	TGCAATCCGAAC TGAGAGAAGCTT	AAGAGATTGCATGACCTCGCGGT	CTAGCGACTCG	129	
Sbjct 1142	TGCAATCCGAAC TGAGAGAAGCTT	AAGAGATTGCATGACCTCGCGGT	CTAGCGACTCG	1083	
Query 130	TTGACTTCCCA TTGACACGTTGTAG	CCAGGTCATAAGGGGCATGATGAT	TGACG	189	
Sbjct 1082	TTGACTTCCCA TTGACACGTTGTAG	CCAGGTCATAAGGGGCATGATGAT	TGACG	1023	
Query 190	TCATCCCCACCTTCTCCGGTTGT	CACGGCAGTCTCGCTAGAGTGCCCA	AAATGA	249	
Sbjct 1022	TCATCCCCACCTTCTCCGGTTGT	CACGGCAGTCTCGCTAGAGTGCCCA	AAATGA	963	
Query 250	TGGCAACTAACAAATAAGGGTTGC	GCTCGTTGCGGGACTTAACCAACAT	CTCAGCACAG	309	


### Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian

#### Sampel Isolat D



#### Proses Ekstraksi DNA











**Amplifikasi DNA**





### Elektroforesis





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
MAKASSAR



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Satrina. Lahir di Je'nepono pada tanggal 27 April 1996. Penulis akrab disapa "Rina" adalah anak tunggal dari pasangan suami istri Muhammad Yusuf dan Nurbaya. Pendidikan Penulis dimulai pada tahun 2002-2008 di SDN 125 KARAMPUANG, Kemudian pada tahun 2008-2011 Penulis melanjutkan pendidikannya di SMP NEGERI 1 SINJAI UTARA, setelah itu pada tahun 2011-2014 Penulis melanjutkan pendidikannya di SMK NEGERI 2 SINJAI dengan jurusan Agribisnis Ternak Ruminansia (ATR). Dengan segala kerja keras, optimis dalam menuntut ilmu dan melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi lagi, penerimaan mahasiswa baru 2014, melalui jalur ujian UM-PTAIN dan diterima pada Fakultas Sains dan Teknologi, Jurusan Ilmu Peternakan.