

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang***

Sumber daya manusia yang sehat (SDM) dan berkualitas merupakan modal utama atau investasi dalam pembangunan kesehatan. Ukuran kualitas sumber daya manusia dapat dilihat pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sedangkan ukuran kesejahteraan masyarakat antara lain dapat dilihat pada tingkat kemiskinan dan status gizi masyarakat (Depkes RI dalam Gultom, 2010).

Peningkatan sumber daya manusia sebaiknya dilakukan sedini mungkin terutama sejak anak masih dalam kandungan sampai berumur lima tahun. Oleh sebab itu perbaikan gizi terutama ditujukan terhadap ibu hamil, ibu nifas, bayi di bawah lima tahun (BALITA) untuk mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas dalam arti mampu untuk produktif baik sosial maupun ekonomi (BPS dalam Rowa 2003).

Keberhasilan pembangunan suatu bangsa ditentukan oleh ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu sumber daya manusia yang memiliki fisik yang tangguh, mental yang kuat, kesehatan yang prima, serta cerdas. Bukti empiris menunjukkan bahwa hal ini sangat ditentukan oleh status gizi yang baik, dan status gizi yang baik ditentukan oleh jumlah asupan pangan yang dikonsumsi. Masalah gizi kurang dan sangat kurang dipengaruhi langsung oleh faktor konsumsi pangan dan penyakit infeksi. Secara tidak langsung dipengaruhi oleh pola asuh, ketersediaan pangan, faktor sosial-ekonomi, budaya dan politik

(Unicef, dalam BPPN 2007). Apabila gizi kurang dan gizi sangat kurang terus terjadi dapat menjadi faktor penghambat dalam pembangunan nasional (BPPN, 2007).

Masalah gizi sangat kurang sering luput dari penglihatan atau pengamatan biasa dan seringkali tidak cepat ditanggulangi, padahal dapat memunculkan masalah besar. Selain gizi sangat kurang, secara bersamaan Indonesia juga mulai menghadapi masalah gizi lebih dengan kecenderungan yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Dengan kata lain saat ini Indonesia tengah menghadapi masalah gizi ganda. Secara perlahan kekurangan gizi akan berdampak pada tingginya angka kematian ibu, bayi, dan balita, serta rendahnya umur harapan hidup. Selain itu, dampak kekurangan gizi terlihat juga pada rendahnya partisipasi sekolah, rendahnya pendidikan, serta lambatnya pertumbuhan ekonomi (BPPN, 2007).

Dari hasil hasil sensus penduduk dan riskesdas tahun 2010 diketahui bahwa sekitar 4,7 juta balita di Indonesia menderita gizi kurang dan 1,3 juta lainnya mengalami gizi sangat kurang. Dalam sensus tersebut, tercatat jumlah balita di Indonesia sebanyak 26,7 juta dimana dari jumlah tersebut, 17,9 persen atau 4,7 juta balita menderita gizi kurang dan 5,4 persen atau 1,3 juta balita menderita gizi sangat kurang (Windiarto, 2013).

Badan dunia UNICEF menemukan bahwa di banyak negara berkembang termasuk Indonesia ditemukan banyak balita yang jatuh sakit, terhambat perkembangannya bahkan meninggal dunia karena masalah gangguan gizi. Padahal, masih menurut UNICEF, 1000 hari pertama dari kehidupan seorang anak

adalah masa yang paling menentukan bagi proses tumbuh kembang si anak kelak. Sehingga pada sekitar 3 tahun pertama inilah seorang anak sangat membutuhkan asupan gizi yang cukup danimbang untuk menjamin kesehatannya secara memadai (Hanifa, 2013).

Menurut Linda dan Dian (2011) bahwa masalah gizi memiliki dimensi luas, tidak hanya masalah kesehatan tetapi juga masalah sosial, ekonomi, budaya, pola asuh, pendidikan, dan lingkungan. Santoso dalam Alauddin (2012) mengatakan bahwa pengasuhan merupakan faktor yang sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan dan perkembangan anak berusia di bawah lima tahun. Pengasuhan kesehatan dan makanan pada tahun-tahun pertama kehidupan sangatlah penting untuk perkembangan balita. Kekurangan gizi pada masa ini dapat menimbulkan gangguan tumbuh kembang secara fisik, mental, sosial dan intelektual yang sifatnya menetap dan terus dibawa sampai balita menjadi dewasa.

Data nasional hingga 2008 menunjukkan bahwa balita yang mengalami masalah gangguan gizi di Indonesia masih menembus angka 4 juta jiwa dengan sekitar 700 ribu diantaranya mengalami kasus gizi sangat kurang (Hanifa, 2013).

Pada kasus gizi sangat kurang di Sulawesi Selatan pada tahun 2008 dengan adanya gejala klinis terbagi atas 3 jenis, yaitu marasmus, kwashiorkor, dan gabungan marasmik-kwashiorkor. Jumlah kasus gizi sangat kurang berdasarkan ke tiga jenis tersebut di Sulsel pada tahun 2008 sebanyak 95 kasus (Dinkes, 2012).

Di kota Makassar, khususnya di wilayah kerja Puskesmas Mangasa didapati bahwa terdapat kasus gizi sangat kurang dan gizi kurang yang cukup tinggi. Data yang diperoleh berdasarkan penilaian status gizi pada bulan Juni

tahun 2013 terdapat 38 balita gizi sangat kurang dan 201 balita gizi kurang, terkhusus di Kelurahan Mangasa yang merupakan Wilayah kerja Puskesmas Mangasa terdapat 38 balita gizi sangat kurang (Dinkes, 2012).

Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai gambaran pola asuh ibu terhadap balita gizi sangat kurang di Kelurahan Mangasa Kota Makassar.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran pola asuh ibu terhadap balita gizi sangat kurang di Kelurahan Mangasa Kota Makassar Tahun 2013.

## **C. Defenisi Operasional dan Kriteria Objektif**

### **1. Pola Asuh**

Pola asuh adalah praktek dirumah tangga untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan balita yang diwujudkan dengan praktek pemberian makan, praktek kebersihan, dan perawatan kesehatan balita.

Kriteria Objektif:

- Baik : Bila ketiga variable dipraktekkan dengan baik oleh ibu ketika mengasuh balita
- Tidak Baik : Bila salasatu atau lebih variable tidak dipraktekkan dengan baik oleh ibu ketika mengasuh balita

## 2. **Praktek Pemberian Makanan**

Perhatikan/dukungan ibu terhadap balita dalam praktek pemberian makanan adalah gambaran mengenai praktek pemberian ASI dan MP-ASI dan sikap ibu dalam memberikan makanan.

Kriteria Objektif :

Diukur berdasarkan jawaban dari kuesioner yang terdiri 10 pertanyaan. Dikategorikan menjadi :

- Baik : Apabila semua jawaban benar
- Tidak Baik : Apabila salah satu atau lebih jawaban salah

## 3. **Praktek Kebersihan/Hygiene Perorangan**

Praktek kebersihan/hygiene perorangan adalah perlakuan ibu terhadap balita dalam hal mendidik balita dalam praktek perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) yang meliputi praktek hygiene perorangan balita dan ibu, perilaku cuci tangan, mandi dan kebersihan lingkungan rumah.

Kriteria Objektif:

Diukur berdasarkan jawaban dari kuesioner yang terdiri dari 9 pertanyaan.

Dikategorikan menjadi :

- Baik : Apabila semua jawaban benar
- Tidak Baik : Apabila semua jawaban benar

#### 4. Peraktek Perawatan Kesehatan

Perawatan kesehatan balita adalah peraktek yang dijalankan oleh ibu dengan cara memperhatikan kesehatan, pemberian imunisasi serta upaya ibu dalam hal mencari pengobatan terhadap balita apabila sakit.

Kriteria Objektif :

Diukur berdasarkan jawaban dari kuesioner yang terdiri dari 6 pertanyaan.

Dikategorikan menjadi :

- Baik : Apabila semua jawaban benar
- Tidak Baik : Apabila semua jawaban benar

#### D. *Kajian Pustaka*

Sejalan dengan rumusan masalah, penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan pola asu ibu terhadap balita gizi sangat kurang, yakni peraktek pemberian makanan, kebersihan dan perawatan kesehatan balita, khususnya balita gizi sangat kurang yang terdapat di kelurahan mangasa kota Makassar tahun 2013. karena penelitian ini menggambarkan suatu pola asuh, maka pada bagian ini disajikan kajian teori tentang praktek pemberian makanan pada balita, kebersihan balita, perawatan kesehatan balita yang merupakan indikator penentuan dari pola asuh ibu terhadap balita gizi sangat kurang di kelurahan mangasa kota Makassar.

##### 1. Pemberian Makanan

Syakur (2012) mengatakan bahwa pengenalan makanan tambahan bayi dilakukan ketika usia si bayi mencapai 5-6 bulan. makanan ini sering

di sebut makanan pendamping ASI. Makanan tambahan berguna sebagai asupan nutrisi selain susu yang bias di minum oleh bayi.

Pritasari (2013) mendefinisikan bahwa pemberian makanan tambahan adalah masa saat bayi mengalami perpindahan menu dari hanya minum susu beralih ke mino yang mengikutsertakan makanan padat. Ini adalah bagaian yang menyenangkan dan sangat penting dalam perkembangan bayi. Susu akan terus menyuplai zat gizi yang di butuhkan bayio sampai saat tertentu, namun saat bayi ibu semakin aktif, makanan padat menjadi semakin berperan sebagai menu sehat,dan seimbang.

Pritasari melanjutkan bahwa pemberian makanan tambahan pada bayi tidak bisa dilakukan denagan tergesa-gesa- ini adalah proses yang berkembang secara perlahan dimana ibu mengalihkan menu bayi dari cairan ke makanan lumat, kemudian kemakanan yang lebih padat dan akhirnya berupa potongan.

## **2. Praktek Kebersihan/Hygiene Perorangan**

Pengertian kesehatan menurut UU no.23 tahun 1992 adalah keadaan sejahtera dari badan,jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Kuntasari (2013) mengemukakan bahwa kebersihan adalah salah satu factor kunci untuk menjaga kesahatan manusia, sayangnya, faktor kebersihan ini jarang menjadi prioritas nilai yang ditanamkan sejak dini di tengah –tengah keluarga kita. Padahal tradisi bersih saat usia

dewasa, sangat ditentukan oleh kebersihan sangat kecil dan tradisi menjaga kebersihan di tengah-tengah keluarga kita.

Memperkenalkan konsep kebersihan dapat dilakukan sejak dini artinya sejak bayi baru lahir sudah diperkenalkan dengan konsep hidup bersih. Orang tua, selalu berusaha menjaga kebersihan tubuh dan pakaian si bayi. Dengan demikian, lambat laun anak bayi tersebut akan akrab dengan konsep bersih dan merasa risih jika lingkungannya kotor. Selanjutnya, di usia belita seorang anak yang sudah dapat berkomunikasi dengan baik dan mungkin sedikit banyak sudah dapat diberikan berbagai pemahaman dengan argumentasi, maka konsep kebersihan tadi bisa diajarkan dengan komunikasi saat bermain dll.

### **3. Perawatan Kesehatan**

Wahid (2013) menjelaskan bahwa dalam perawatan anak balita diperlukan pengetahuan yang jelas tentang pilar-pilar penting yang erat hubungannya dengan balita yaitu, nutrisi dan makanan anak, kecerdasan anak, dan psikologi anak.

### **4. Pola Asuh**

Indriyani (2013) mengemukakan bahwa berdasarkan studi positif deviance yang pernah dilakukan propesor soekirman, ahli gizi dari institute pertanian Bogor (IPB), diperoleh kesimpulan bahwa pola asuh anak berpengaruh secara signifikan terhadap timbulnya kasus gizi buruk. Anak yang di asuh sendiri oleh ibunya dengan kasih sayang, mengerti tentang pentingnya air susu ibu (ASI) pos pelayanan terpadu

,dan kebersihan, meski dalam kondisi miskin, namun anaknya tetap sehat.

Berdasarkan kajian teori diatas dapat disimpulkan bahwa pola asuh ibu yang dalam penelitian ini meliputi praktek pemberian makanan, kebersihan, dan perawatan kesehatan balita sangat berpengaruh terhadap status gizi balita yang akan dibahas pada bab-bab selanjutnya.

## **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Umum**

Untuk mengetahui gambaran pola asuh ibu terhadap gizi sangat kurang di Kelurahan Mangasa kota Makassar tahun 2013.

### **2. Tujuan khusus**

- a. Untuk mengetahui gambaran pola asuh ibu berdasarkan praktek pemberian makanan balita gizi sangat kurang di kelurahan mangasa kota Makassar tahun 2013.
- b. Untuk mengetahui gambaran pola asuh ibu berdasarkan praktek kebersihan/hygiene di kelurahan mangasa kota Makassar tahun 2013.
- c. Untuk mengetahui gambaran pola asuh ibu berdasarkan perawatan kesehatan balita gizi sangat kurang di kelurahan mangasa kota Makassar tahun 2013.
- d. Untuk mengetahui gambaran pola asuh ibu terhadap balita gizi sangat kurang di kelurahan mangasa kota Makassar 2013.

***Kegunaan penelitian***

1. Bagi pihak puskesmas atau instansi kesehatan, dapat menjadi masukan dan informasi mengenai status gizi balita yang ada di kelurahan magasa kota Makassar tahun 2013.
2. Bagi ibu, memberikan masukan dan informasi mengenai pola asuh dan status gizi balita.
3. Bagi kalangan praktisi kesehatan, penelitian ini sebagai rujukan sehingga bisa digunakan untuk mengetahui kondisi balita yang mengalami gizi sangat kurang dan bagaimana pola asuh yang di terapkan oleh ibu tersebut di kelurahan magasa kota Makassar.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### ***A. Pola Asuh***

Anak terus berkembang baik secara fisik maupun secara psikis untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan anak dapat terpenuhi bila orang tua dalam memberi pengasuhan dapat mengerti, memahami, menerima dan memperlakukan anak sesuai dengan tingkat perkembangan psikis anak, disamping menyediakan fasilitas bagi pertumbuhan fisiknya. Hubungan orang tua dengan anak ditentukan oleh sikap, perasaan dan keinginan terhadap anaknya. Sikap tersebut diwujudkan dalam pola asuh orang tua di dalam keluarga (Direktorat PADU dalam Inadiar, 2010).

Depkes dalam Rowa (2003) mengatakan bahwa kemampuan ibu untuk mengambil keputusan yang berdampak luas pada kehidupan seluruh anggota keluarga dan akan menjadi dasar penyediaan pola pengasuhan yang tepat dan bermutu pada anak termasuk asuhan nutrisi.

Pola asuh adalah praktek di rumah tangga yang diwujudkan dengan tersedianya pangan dan perawatan kesehatan serta sumber lainnya untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan anak. (Dewi, 2010).

Jus'at, dkk dalam Rowa (2003) mengatakan bahwa pola pengasuhan anak akan berkaitan dengan keadaan gizi anak dan usaha ibu merangsang anak untuk makan tentunya turut menentukan volume makan pada anak.

Khomsan (2013) mengatakan bahwa ada hubungan positif antara pola asuh yang dilakukan orang tua terhadap status gizi anaknya. Tercakup di dalam pola asuh ini adalah pola asuh makan maupun pola asuh dalam perawatan balita. Makna hubungan ini adalah pentingnya orang tua memberikan pola asuh yang baik kepada anaknya agar asupan gizi menjadi lebih baik dan dampaknya adalah anak semakin baik status gizinya.

Pengasuhan yang baik sangat penting untuk dapat menjamin tumbuh kembang anak yang optimal. Misalnya pada keluarga miskin, yang ketersediaan pangan di rumah tangga belum mencukupi, namun ibu yang mengasuh anaknya dapat memanfaatkan sumber-sumber yang tak terbatas untuk dapat menjamin tumbuh kembang anak yang optimal. Sebagai contoh, menyusui anak adalah praktek memberikan makanan. Kesehatan dan pengasuhan yang terjadi bersamaan. Perilaku ibu seperti cara memelihara kebersihan rumah, hygiene makanan, kebersihan perorangan dan praktek psikososial adalah faktor-faktor penting yang berpengaruh terhadap proses tumbuh kembang anak. Demikian pula faktor lingkungan seperti ketersediaan air bersih di dalam rumah, bahan pangan yang tersedia untuk makanan sehari-hari dan pengetahuan ibu atau pengasuhan lainnya. Latar belakang pendidikan ibu, serta keadaan fisik dan mental, dan kemampuan ibu mempraktekan pengetahuan yang dimiliki dalam kehidupan sehari-hari, serta hubungan emosional anggota keluarga lainnya, tetangga dan masyarakat, semuanya berakumulasi dalam membentuk kualitas anak (Fajriani, 2011).

Orang tua juga berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan spritual anaknya. Sesuai dengan firman Allah swt dalam Q.S. Luqman ayat/31:16.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰتٰنَا الْاٰيٰتِ الْاَرْضِيَّةِ وَالسَّمٰوٰتِيَّةِ اَوْ صَخْرَةً فِى فِتْنٰنٍ حَرَدَلٍ مِّنْ حَبِّةٍ مِّثْقَالِ تٰكٍ اِنْ اِنَّهَا يَبْنٰى

خَيْرٌ لِّط

Terjemahnya :

(Lukman berkata): "Wahai anakku! Sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasannya). Sesungguhnya Allah Maha halus lagi Maha mengetahui" (Depag, 2010).

Pola asuh kesehatan yang dilakukan terhadap balita perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh karena ia belum sanggup untuk merawat dirinya sendiri, kondisi fisik masih lemah, kepekaan terhadap serangan penyakit juga tinggi. Perawatan kesehatan balita akan mempengaruhi tingkat morbiditasnya. Balita yang tidak terawat baik fisik maupun makanannya akan mudah terserang penyakit (Rahayu, 2006).

Engle *et. al* dalam Lubis (2008) mengemukakan bahwa pola asuh meliputi 6 hal yaitu : (1) perhatian/dukungan ibu terhadap balita, (2) pemberian ASI atau makanan pendamping pada balita, (3) rangsangan psikososial terhadap balita, (4) persiapan dan penyimpanan makanan, (5) praktek kebersihan atau higiene dan sanitasi lingkungan dan (6) perawatan balita dalam keadaan sakit seperti pencari pelayanan kesehatan. Pemberian ASI dan makanan pendamping pada balita serta persiapan dan penyimpanan makanan tercakup dalam praktek pemberian makan.

## 1. Pangan dan Gizi

Menurut BPPN (2007), pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan dan minuman.

Pangan adalah termasuk pembangun tubuh yang mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan, terutama pada tahun-tahun pertama kehidupan pada saat anak sedang mengalami pertumbuhan yang sangat pesat terutama pertumbuhan otak. Keberhasilan perkembangan anak ditentukan oleh keberhasilan pertumbuhan dan perkembangan otak (Tanuwidjaya dalam Inadiar, 2010).

Konsumsi makanan sangat berpengaruh terhadap status gizi seseorang karena tujuan akhir dari konsumsi dan penggunaan makanan oleh tubuh adalah tercapainya status gizi yang optimal. Jadi makanan yang dikonsumsi harus selalu diperhatikan nilai gizinya dan tidak lupa memerhatikan halal atau tidaknya makanan tersebut tentunya didukung dengan pengetahuan tentang gizi (Dewi, 2010).

Dalam ajaran Islam, konsumsi makanan tidak hanya diperhatikan dari segi kehalalannya saja, namun juga baik untuk tubuh kita. Sebagaimana dalam firman Allah swt dalam Q.S. Al-baqarah/2:168.

مُبِينٌ عَدُوٌّ لَكُمْ إِنَّهُ الشَّيْطَانُ خُطُوَاتٍ تَتَّبِعُوا وَلَا طَيِّبًا حَلَلًا إِلَّا رِضْفِي مِمَّا كَلُوا النَّاسُ يُتَائِيهَا

Terjemahnya :

*“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”* (Depag, 2005)

Makanan yang halal disini berarti makanan yang tidak haram, yakni memakannya tidak dilarang oleh agama. Namun demikian, tidak semua makanan yang halal otomatis baik, misalnya ada makanan yang halal, tetapi tidak bergizi, dan ketika itu ia menjadi kurang baik. Yang diperintahkan dalam ayat di atas adalah yang halal lagi baik (Shihab, 2009).

Menurut Tafsir Ibnu Katsir (2009) dalam ayat ini Allah menyatakan bahwa semua makanan yang di bumi halal dan baik, lezat yang tidak memiliki bahaya bagi tubuh atau akal pikiran dan urat saraf, dan melarang manusia mengikuti jejak bisikan setan yang sengaja akan menyesatkan manusia dari tuntunan Allah swt. Sehingga setan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah swt dan menghalalkan apa yang diharamkan Allah swt.

#### a. Pola konsumsi pangan

Pola konsumsi pangan adalah susunan makanan yang biasa dimakan mencakup jenis dan jumlah bahan makanan yang dikonsumsi/dimakan seseorang atau kelompok orang penduduk dalam frekuensi dan jangka waktu tertentu (BPPN, 2007). Menurut Riyadi dalam Rahayu (2006), aspek-aspek yang berhubungan dengan kebiasaan makan diantaranya adalah:

frekuensi makan, frekuensi menurut jenis makan yang dikonsumsi maupun cara memperoleh makanan.

Menurut Suhardjo, Hardinsyah dan Riyadi dalam Rahayu (2006) pola makan di suatu negara atau daerah tertentu dapat dipengaruhi oleh kelangkaan pangan dan kebiasaan bekerja dari keluarga, selain itu perkembangan dari pangan setempat dapat mempengaruhi jumlah macam makanan dan jenis serta banyaknya bahan pangan dalam pola makan masyarakat.

Kekurangan berat yang berlangsung pada anak yang sedang tumbuh merupakan masalah serius. Kondisi ini mencerminkan kebiasaan makan yang buruk (Arisman, 2008).

Salah satu bentuk kebiasaan makan yang buruk adalah tidak seimbang porsi antara asupan nutrisi makro dan mikro yang dikonsumsi. Sebagai contoh seorang ibu yang hanya memberi makan nasi dengan porsi yang besar dan lauk atau sayur seadanya tanpa memikirkan terpenuhinya kebutuhan dan keseimbangan gizi dari sang anak tentu dapat berdampak buruk bagi tubuh si anak.

Mengubah pola konsumsi pangan dari dominan karbohidrat menuju ke keseimbangan gizi (cukup pangan hewani, kacang-kacangan, sayuran dan buah) memerlukan waktu. Akses pangan di kalangan masyarakat harus mudah, yang berarti masyarakat harus mempunyai cukup daya beli (Khomsan, 2013).

Makanan yang berfungsi untuk mendukung pertumbuhan anak adalah pangan sumber protein (terutama), selain makanan sumber karbohidrat, mineral dan lainnya. Makanan berkualitas dengan kandungan protein tinggi (terutama pangan hewani) seringkali dikonsumsi kurang oleh anak-anak karena terbatasnya daya beli masyarakat. Pangan hewani seperti susu, daging, telur, dan ikan di beberapa komunitas masih dianggap pangan mewah sehingga kecukupan konsumsinya belum menjadi prioritas. Oleh karena itu pengentasan persoalan gizi tidak bisa terlepas dari program-program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga masyarakat mampu membeli pangan yang bergizi (Khomsan, 2011).

Persoalan gizi mungkin pula disebabkan oleh rendahnya pengetahuan gizi ibu (pengasuh anak) sehingga hal ini berdampak pada kurang bermutunya makanan yang diberikan untuk anak. (Khomsan, 2013)

#### b. Konsumsi dan tingkat kecukupan pangan

Konsumsi pangan dan zat gizi seseorang sangat ditentukan oleh kualitas dan kuantitas makanan yang dikonsumsi. Makanan yang baik adalah makanan yang mengandung semua zat gizi yang penting dalam jumlah yang cukup dan seimbang untuk memenuhi kebutuhan tubuh (Hardinsyah dan Briawan dalam Rahayu, 2006).

BPPN (2007) menyebutkan bahwa konsumsi pangan adalah jumlah makanan dan minuman yang dimakan atau diminum penduduk/seseorang dalam satuan gram per kapita per hari. Menurut Rahayu (2006) ada tiga faktor

yang mempengaruhi konsumsi pangan yaitu jenis dan banyaknya pangan yang diproduksi dan tersedia, tingkat pendapatan dan pengetahuan gizi.

Semakin beragam bahan pangan yang dikonsumsi maka akan semakin beragam pula zat gizi yang diperoleh sehingga dapat meningkatkan mutu gizinya. Konsumsi pangan merupakan faktor utama dalam memenuhi kebutuhan zat gizi. Pada gilirannya zat gizi tersebut menyediakan tenaga bagi tubuh, mengatur proses metabolisme dalam tubuh, memperbaiki jaringan tubuh serta pertumbuhan (Harper *et al.* dalam Rahayu, 2006).

Menurut Suhardjo dalam Rahayu (2006), kecukupan adalah cukup tidaknya konsumsi makanan yang ditentukan dengan menganalisis kandungan gizinya sedangkan tingkat kecukupan pangan adalah cukup atau tidaknya konsumsi makanan yang ditentukan dengan menganalisis kandungan gizinya, kemudian dibandingkan dengan standar yang dianjurkan untuk mencapai suatu tingkat gizi dan kesehatan yang optimal.

Dalam menyiapkan makanan harus dapat mencukupi kebutuhan gizi balita. Pengaturan makan yaitu pengaturan makanan harus di sesuaikan dengan usia balita selain untuk mendapatkan gizi, pengaturan makanan juga baik untuk pemeliharaan, pemulihan, pertumbuhan, perkembangan serta aktifitas fisiknya. Makin bertambah usia anak makin bertambah pula akan kebutuhan makanannya, secara kualitas dan kuantitas. (Fajriani, 2011)

c. Pola makanan sehat balita (pemberian makan balita)

Penanaman pola makan yang beraneka ragam makanan harus dilakukan sejak bayi, saat bayi masih makan nasi tim, yaitu ketika usia baru

enam bulan ke atas, ibu harus tahu dan mampu menerapkan pola makanan sehat (Widjaja dalam Husin, 2008).

Masa balita merupakan masa yang penting karena masa ini merupakan pertumbuhan dasar yang akan mempengaruhi dan menentukan perkembangan anak selanjutnya (Diasmarani, 2011).

Kelompok balita merupakan salah satu kelompok yang rawan gizi dan rawan penyakit serta paling banyak menderita KEP. Beberapa kondisi yang dapat menyebabkan rawan gizi dan kesehatan antara lain :

1. Balita baru berada dalam masa transisi dari makanan bayi ke makanan dewasa.
2. Balita mempunyai ibu yang bekerja sehingga pengasuhan menjadi kurang maksimal.
3. Balita sudah mulai main di tanah, lingkungan yang kotor sehingga memungkinkan untuk terjadi infeksi seperti kecacingan.
4. Balita belum bisa memilih makanannya, perilaku orang tua yang didasari pengetahuan sangat penting (Notoatmodjo dalam Fajriani, 2011)

Masalah gizi anak secara garis besar merupakan dampak dari ketidakseimbangan antara asupan dan keluaran zat gizi (*Nutritional imbalance*) yaitu asupan yang melebihi keluaran atau sebaliknya, disamping kesalahan dalam memilih bahan makanan untuk disantap. Buah dari ketergantungan ini utamanya berupa penyakit kronis, berat badan lebih dan kurang, pica, karies dentis, serta alergi (Arisman, 2008).

Pada usia anak 3 sampai 5 tahun, kemampuan makan telah sama seperti orang dewasa namun membutuhkan tekstur makanan yang lebih lembut. Prinsipnya sang anak sudah bisa diperkenalkan pada berbagai jenis makanan dan diperbolehkan makan apa saja yang sama seperti orang dewasa konsumsi. Hanya saja, perlu ditakar asupan jumlah protein hewani atau nabati agar dalam proporsi yang lebih banyak. Hal tersebut dikarenakan kebutuhan protein akan mendukung pemenuhan kecukupan gizi anak. Disamping itu, sebaiknya tetap konsumsi susu 3-4 kali sehari, hindari makanan yang mengandung natrium tinggi dan sebaiknya menu selalu bervariasi agar anak tidak bosan dan mengenal berbagai jenis makanan sejak kecil (Hayati, 2013).

Usia tumbuh kembang membutuhkan nutrisi terbaik karena menjadi periode emas pertumbuhan serta perkembangan anak. Oleh karena itu, maka perhatian atas asupan makanan yang dibutuhkan menjadi sebuah hal yang perlu diutamakan (Hayati, 2013).

Diet yang tepat menjamin masa depan yang sehat dan cerah untuk balita. Makanan yang tepat dan nutrisi yang seimbang akan membentuk dan mengembangkan gigi yang kuat, tulang, otot dan jaringan sehat pada kelompok usia ini. Sebuah diet yang baik juga akan membantu untuk membangun sistem kekebalan tubuh balita. Sebuah studi oleh Journal of American Association Dietetic menyatakan bahwa anak-anak dalam kelompok usia 1 sampai 2 tahun mendapatkan kalori 30 persen lebih dari yang dibutuhkan. Karena kehidupan preferensi makan panjang ditetapkan selama

tiga tahun pertama, diet seimbang pada tahap awal sangat diperlukan (Bari, 2013).

Menyiapkan makanan yang sehat untuk bayi dan balita bukan hanya penting untuk kesehatannya tapi juga kecerdasannya. Bayi dan balita yang terbiasa mengonsumsi makanan sehat, nilai IQ-nya lebih tinggi saat mereka berusia 8 tahun. Peneliti dari Universitas Adelaide, Australia, mengungkapkan, anak-anak yang sering mengonsumsi junk food nilai IQ-nya dua poin lebih rendah (Anna, 2013).

Zat gizi yang dibutuhkan balita adalah :

1. Karbohidrat merupakan sumber energi utama yang terdiri dari dua jenis yaitu karbohidrat sederhana (gula pasir dan gula merah) sedangkan karbohidrat kompleks (tepung, beras, jagung, gandum)
2. Protein untuk pertumbuhan, terdapat pada ikan, susu, telur, kacang-kacangan, tahu, dan tempe.
3. Lemak terdapat pada margarine, mentega, minyak goreng, lemak hewan atau lemak tumbuhan.
4. Vitamin adalah zat-zat organik yang kompleks yang dibutuhkan dalam jumlah yang sangat kecil dan pada umumnya dapat dibentuk oleh tubuh.
  - a) Vitamin A untuk pertumbuhan tulang, mata, dan kulit yaitu mencegah kelainan bawaan, vitaminterdapat dalam susu, keju, mentega, kuning telur, minyak ikan, sayuran dan buah-buahan segar (wortel, papaya, mangga, daun singkong, dan daun ubi jalar).

- b) Vitamin B untuk menjaga system susunan saraf agar berfungsi normal, mencegah penyakit beri-beri dan anemia, vitamin ini terdapat di dalam nasi, roti, susu, daging, dan tempe.
  - c) Vitamin C berguna untuk pembentukan integritas jaringan dan peningkatan penyerapan zat besi, untuk menjaga kesehatan gusi. Jenis vitamin C banyak terdapat pada mangga, jeruk, pisang, dan nangka.
5. Mineral berguna untuk menumbuhkan dan memperkuat jaringan serta mengatur keseimbangan cairan tubuh
- a) Zat besi berguna dalam pertumbuhan sel-sel darah merah yang dibutuhkan untuk pertumbuhan, zat ini terdapat dalam daging, ikan, dan hati ayam.
  - b) Kalsium berguna untuk pertumbuhan tulang dan gigi, zat ini terdapat dalam susu sapi.
  - c) Yodium berguna untuk menyokong susunan saraf pusat berkaitan dengan daya fikir dan mencegah kecacatan fisik dan mental. Zat ini terdapat dalam rumput laut dan *sea food*. (Widjaja, dalam Husin, 2008)

Tujuan pemberian makanan pada balita adalah:

1. Untuk mendapat gizi yang diperlukan tubuh dan digunakan oleh tubuh.
2. Untuk pertumbuhan dan pengaturan faal tubuh.
3. Zat gizi berperan dalam memelihara dan memulihkan kesehatan serta untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari.

4. Untuk mencegah terjadinya berbagai gangguan gizi pada balita diperlukan adanya perilaku penunjang dari para orang tua, atau pengasuhan dalam keluarga.
5. Selalu memberikan makanan bergizi yang seimbang kepada balita (Suharjo, dalam Husin, 2008)

## 2. Pola Asuhan Gizi

Pengasuhan yang baik sangat penting untuk dapat menjamin tumbuh kembang anak yang optimal. Sebagai contoh yaitu menyusui anak adalah praktek pemberian makanan, kesehatan dan pengasuhan yang terjadi secara bersamaan. (Dewi, 2010)

Untuk mencapai tumbuh kembang optimal, di dalam Global Strategy for Infant and Young Child Feeding, WHO/UNICEF merekomendasikan empat hal penting yang harus dilakukan yaitu; pertama memberikan air susu ibu kepada bayi segera dalam waktu 30 menit setelah bayi lahir, kedua memberikan hanya air susu ibu (ASI) saja atau pemberian ASI secara eksklusif sejak lahir sampai bayi berusia 6 bulan, ketiga memberikan makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI) sejak bayi berusia 6 bulan sampai 24 bulan, dan keempat meneruskan pemberian ASI sampai anak berusia 24 bulan atau lebih. Rekomendasi tersebut menekankan, secara sosial budaya MP-ASI hendaknya dibuat dari bahan pangan yang murah dan mudah diperoleh di daerah setempat (*indigenous food*) (Depkes RI, 2006).

Beberapa faktor yang mempengaruhi pola asuhan gizi pada balita menurut UNICEF dalam Dewi (2010) adalah:

- a. Perawatan terhadap balita, hal ini akan mempengaruhi kemampuan ibu dalam mengasuh balitanya. Perawatan terhadap ibu disini berupa perawatan terhadap kesehatan fisik dan mental ibu, dukungan dari orang lain di masyarakat, beban kerja dan waktu yang tersedia dalam mengasuh.
- b. Kebiasaan dalam penyediaan makanan yaitu merupakan kebiasaan ibu yang berhubungan dengan proses pengolahan dan penyimpanan makanan.
- c. Kebiasaan dalam pemberian makanan merupakan kebiasaan makan yang sering dihubungkan dengan asuhan gizi anak, seperti memberikan ASI yang cukup, menentukan kapan anak akan diberikan makanan tambahan sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan gizi balita yang kuat.
- d. Rangsangan Psikososial. Hal ini sering dikaitkan dengan kemampuan orang tua untuk memberi perhatian, kasih sayang dan keterlibatan dalam pemberian nutrisi. Perilaku sosial ini akan berdampak pada status gizi balita serta perkembangan sosial balita dan emosional balita.
- e. Perilaku kebersihan orang tua dalam masalah hygiene perorangan dimana hal ini akan mempengaruhi risiko terjadinya infeksi.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif menjelaskan bahwa pola pemberian makan terbaik untuk Bayi sejak lahir sampai anak berumur 2 (dua) tahun meliputi: (a) memberikan ASI kepada bayi segera dalam waktu 1

(satu) jam setelah lahir; (b) memberikan hanya ASI saja sejak lahir sampai umur 6 (enam) bulan. Hampir semua ibu dapat dengan sukses menyusui diukur dari permulaan pemberian ASI dalam jam pertama kehidupan bayi. Menyusui menurunkan risiko infeksi akut seperti diare, pnemonia, infeksi telinga, haemophilus influenza, meningitis dan infeksi saluran kemih. Menyusui juga melindungi bayi dari penyakit kronis masa depan seperti diabetes tipe 1. Menyusui selama masa bayi berhubungan dengan penurunan tekanan darah dan kolesterol serum total, berhubungan dengan prevalensi diabetes tipe 2 yang lebih rendah, serta kelebihan berat badan dan obesitas pada masa remaja dan dewasa.

Menyusui menunda kembalinya kesuburan seorang wanita dan mengurangi risiko perdarahan pasca melahirkan, kanker payudara, pra menopause dan kanker ovarium; (c) memberikan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) yang tepat sejak genap umur 6 (enam) bulan; dan (d) meneruskan pemberian ASI sampai anak berumur 2 (dua) tahun. Penerapan pola pemberian makan ini akan meningkatkan status gizi bayi dan anak serta mempengaruhi derajat kesehatan selanjutnya.

#### **a) Pemberian Kolostrum**

Selama 72 jam setelah kelahiran, payudara menghasilkan cairan encer dan kuning yang disebut kolostrum, cairan yang terdiri atas air, protein dan mineral. Kolostrum mengandung antibodi yang melindungi bayi terhadap berbagai infeksi saluran pencernaan dan pernapasan (Naulanifa, 2013).

Produksi kolostrum untuk setiap ibu tidak sama, karena tergantung dari reaksi yang disebabkan oleh hisapan bayi. Warna kolostrum yang kekuningan berbeda dengan ASI biasanya menyebabkan para ibu enggan memberikan kolostrum pada bayinya, bahkan sengaja membuangnya (Arisman, dalam Dewi 2010).

Sebagai cairan dari ASI yang pertama kali keluar, jumlah kolostrum memang sedikit, namun sesuai dengan kebutuhan bayi yang baru lahir (Putri, 2013).

Pada hari pertama kolostrum mungkin hanya diperoleh 30 cc. Namun, dalam setiap tetesnya terdapat berjuta-juta satuan zat antibodi. SIgA adalah antibodi yang hanya terdapat dalam ASI. Kandungan SIgA dalam kolostrum pada hari pertama adalah 800 gr/100 cc. Selanjutnya mulai berkurang menjadi 600 gr/100 cc pada hari kedua, 400 gr/100 cc pada hari ketiga, dan 200 gr/100 cc pada hari keempat (Wikia, 2013).

Manfaat Kolostrum :

1. Kolostrum mengandung zat kekebalan terutama IgA untuk melindungi bayi dari berbagai penyakit infeksi terutama diare.
2. Jumlah kolostrum yang diproduksi bervariasi tergantung dari hisapan bayi pada hari-hari pertama kelahiran. Walaupun sedikit namun cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi. Oleh karena itu kolostrum harus diberikan pada bayi.

3. Kolostrum mengandung protein, vitamin A yang tinggi dan mengandung karbohidrat dan lemak rendah, sehingga sesuai dengan kebutuhan gizi bayi pada hari-hari pertama kelahiran.
4. Membantu mengeluarkan mekonium yaitu kotoran bayi yang pertama berwarna hitam kehijauan (Depkes RI, 2001)

#### **b) Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif**

ASI adalah makan bernutrisi dan berenergi tinggi, yang mudah untuk dicerna. ASI memiliki kandungan yang dapat membantu menyerapan nutrisi. Pada bulan-bulan awal, saat bayi dalam kondisi yang paling rentan, ASI eksklusif membantu melindunginya bayi dari diare, sudden infant death syndrome/SIDS – sindrom kematian tiba-tiba pada bayi, infeksi telinga dan penyakit infeksi lain yang biasa terjadi (Lina, 2013).

Keseimbangan zat-zat gizi dalam air susu ibu berada pada tingkat terbaik dan air susunya memiliki bentuk paling baik bagi tubuh bayi yang baru lahir. Pada saat yang sama, ASI juga sangat kaya akan nutrisi yang mempercepat pertumbuhan sel-sel otak dan perkembangan sistem saraf (Fitriyani, 2012)

Pengertian Air Susu Ibu (ASI) dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.

Manfaat Air Susu Ibu Eksklusif :

1. ASI adalah satu-satunya makanan dan minuman yang dibutuhkan oleh bayi hingga ia berusia enam bulan. ASI adalah makan bernutrisi dan

berenergi tinggi, yang mudah untuk dicerna. ASI memiliki kandungan yang dapat membantu menyerapan nutrisi. Riset medis mengatakan bahwa ASI eksklusif membuat bayi berkembang dengan baik pada 6 bulan pertama bahkan pada usia lebih dari 6 bulan.

2. Menunda pemberian makanan padat memberikan perlindungan yang lebih baik pada bayi terhadap berbagai penyakit. ASI memiliki kandungan 50+ faktor imunitas yang sudah dikenal, dan mungkin lebih banyak lagi yang masih tidak diketahui. Satu studi memperlihatkan bayi yang diberikan ASI eksklusif selama 4 bulan+ mengalami infeksi telinga 40% lebih sedikit daripada bayi yang diberi ASI ditambah makanan tambahan lain. Probabilitas terjadinya penyakit pernapasan selama masa kanak-kanak secara signifikan berkurang bila bayi diberikan ASI eksklusif setidaknya selama 15 minggu dan makanan pada tidak diberikan selama periode ini (Wilson, dalam Lina 2013).
3. Menunda pemberian makanan padat memberikan kesempatan pada sistem pencernaan bayi untuk berkembang menjadi lebih matang. Pada umumnya bayi siap untuk makan makanan padat, baik secara pertumbuhan maupun secara psikologis, pada usia 6 – 9 bulan. Bila makanan padat sudah mulai diberikan sebelum system pencernaan bayi siap untuk menerimanya, maka makanan tersebut tidak dapat dicerna dengan baik dan dapat menyebabkan reaksi yang tidak menyenangkan (gangguan pencernaan, timbulnya gas, konstipasi, dan lain-lain).

4. Menunda pemberian makanan padat memberikan kesempatan pada bayi agar sistem yang dibutuhkan untuk mencerna makanan padat dapat berkembang dengan baik.
5. Menunda pemberian makanan padat mengurangi resiko alergi makanan. Berbagai catatan menunjukkan bahwa memperpanjang pemberian ASI eksklusif mengakibatkan rendahnya angka insiden terjadinya alergi makanan. Sejak lahir sampai usia antara empat sampai enam bulan, bayi memiliki apa yang biasa disebut sebagai “usus yang terbuka”. Ini berarti bahwa jarak yang ada di antara sel-sel pada usus kecil akan membuat makromolekul yang utuh, termasuk protein dan bakteri patogen, dapat masuk ke dalam aliran darah. Hal ini menguntungkan bagi bayi yang mendapatkan ASI karena zat antibodi yang terdapat di dalam ASI dapat masuk langsung melalui aliran darah bayi, tetapi hal ini juga berarti bahwa protein-protein lain dari makanan selain ASI (yang mungkin dapat menyebabkan bayi menderita alergi) dan bakteri patogen yang bisa menyebabkan berbagai penyakit bisa masuk juga. Dalam 4-6 bulan pertama usia bayi, saat usus masih “terbuka”, antibodi (sIgA) dari ASI melapisi organ pencernaan bayi dan menyediakan kekebalan pasif, mengurangi terjadinya penyakit dan reaksi alergi sebelum penutupan usus terjadi. Bayi mulai memproduksi antibodi sendiri pada usia sekitar 6 bulan, dan penutupan usus biasanya terjadi pada saat yang sama.
6. Menunda pemberian makanan padat membantu melindungi bayi dari anemia karena kekurangan zat besi. Pengenalan suplemen zat besi dan

makanan yang mengandung zat besi, terutama pada usia enam bulan pertama, mengurangi efisiensi penyerapan zat besi pada bayi. Bayi yang sehat dan lahir cukup bulan yang diberi ASI eksklusif selama 6-9 bulan menunjukkan kecukupan kandungan hemoglobin dan zat besi yang normal.

7. Menunda pemberian makanan padat membantu melindungi bayi dari resiko terjadinya obesitas di masa datang.
8. Menunda pemberian makanan padat membantu para ibu untuk menjaga kesediaan ASI mereka. Berbagai studi menunjukkan bahwa pada bayi makanan padat akan menggantikan porsi susu dalam menyusu – makanan tersebut tidak menambah total asupan pada bayi.
9. Menunda makanan padat membantu memberi jarak pada kelahiran bayi. Pemberian ASI biasanya sangat efektif dalam mencegah kehamilan terutama bila bayi anda mendapatkan ASI eksklusif dan semua kebutuhan nutrisinya dapat dipenuhi melalui ASI..
10. Menunda pemberian makanan padat membuat pemberiannya menjadi lebih mudah. Bayi yang mulai makan makanan padat pada usia yang lebih besar dapat makan sendiri dan lebih kecil kecenderungannya untuk mengalami alergi terhadap makanan (Lina, 2013)

ASI eksklusif adalah intervensi yang paling efektif untuk mencegah kematian anak, namun menurut Survei Demografi Kesehatan tingkat pemberian ASI eksklusif telah menurun selama dekade terakhir. Hari ini, hanya sepertiga penduduk Indonesia secara eksklusif menyusui anak-anak

mereka pada enam bulan pertama. Ada banyak hambatan untuk menyusui di Indonesia, termasuk anggota keluarga dan dokter yang tidak mendukung. Beberapa ibu juga takut menyusui akan menyakitkan dan tidak praktis, tapi salah satu kendala terbesar adalah kesalahpahaman dari istilah 'eksklusif' (Unicef, 2013).

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian air Susu Ibu Eksklusif menjelaskan bahwa beberapa kendala dalam hal pemberian ASI Eksklusif karena ibu tidak percaya diri bahwa dirinya mampu menyusui dengan baik sehingga mencukupi seluruh kebutuhan gizi bayi. Hal ini antara lain disebabkan karena kurangnya pengetahuan ibu, kurangnya dukungan keluarga serta rendahnya kesadaran masyarakat tentang manfaat pemberian ASI Eksklusif. Selain itu kurangnya dukungan Tenaga Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan produsen makanan bayi untuk keberhasilan ibu dalam menyusui bayinya (PP No. 33 Tahun 2012).

Melalui penerapan perilaku Keluarga Sadar Gizi, keluarga didorong untuk memberikan ASI eksklusif pada bayi sejak lahir sampai berusia 6 bulan dan memberikan MP-ASI yang cukup dan bermutu kepada bayi dan anak usia 6-24 bulan (Depkes RI, 2006).

Untuk mencapai pemanfaatan pemberian ASI Eksklusif secara optimal, Tenaga Kesehatan dan penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberikan informasi dan edukasi ASI Eksklusif kepada ibu atau anggota Keluarga dari Bayi yang bersangkutan sejak pemeriksaan

kehamilan sampai dengan periode pemberian ASI Eksklusif selesai. (PP No. 33 Tahun 2012)

**c) Pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI)**

Untuk tumbuh kembang optimal, anak membutuhkan asupan gizi yang cukup. Bagi bayi usia 0-6 bulan, pemberian ASI saja sudah cukup, namun bagi bayi diatas 6 bulan diperlukan mak anan selain ASI yaitu berupa makanan pendamping ASI (MP-ASI). MP-ASI (Makanan Pendamping Air Susu Ibu) adalah makanan atau minuman yang mengandung zat gizi, diberikan kepada bayi atau anak usia 6-24 bulan guna memenuhi kebutuhan gizi selain dari ASI (Depkes RI, 2006).

Persyaratan dalam pembuatan MP- ASI yang perlu diperhatikan :

1. Bahan makanan mudah diperoleh
2. Mudah diolah
3. Harga terjangkau
4. Dapat diterima sasaran dengan baik
5. Kandungan zat gizi memenuhi kecukupan gizi sasaran
6. Mutu protein dapat memacu pertumbuhan fisik (*Protein Efficiency Ratio*/PER lebih besar atau sama dengan 70% mutu *casein*, setara dengan > 1,75)
7. Jenis MP-ASI disesuaikan dengan umur sasaran.
8. Bebas dari kuman penyakit, pengawet, pewarna, dan racun
9. Memenuhi nilai sosial, ekonomi, budaya, dan agama (Depkes RI, 2006).

Evaluasi pada bukti-bukti yang telah ada menunjukkan bahwa pada tingkat populasi dasar, pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan adalah cara yang paling optimal dalam pemberian makan kepada bayi. Setelah 6 bulan, biasanya bayi membutuhkan lebih banyak zat besi dan seng daripada yang tersedia didalam ASI yang mana pada titik inilah nutrisi tambahan bisa diperoleh dari sedikit porsi makanan padat (Lina, 2013).

**Tabel 2.1**  
**Pengukuran Makanan Balita**

<b>Umur (Bulan)</b>	<b>Jenis/Bentuk Makanan</b>	<b>Porsi Per Hari</b>	<b>Frekuensi</b>
0-6 bulan	ASI	Disesuaikan dengan kebutuhan ASI diberikan setiap anak menangis siang atau malam hari makin sering makin baik	Min 6 kali
6-9 bulan	ASI MP-ASI Makanan Lunak	Disesuaikan dengan kebutuhan Usia 6 bulan: 6 sendok makan (setiap kenaikan usia anak 1 bulan porsi ditambah 1 sdm)	Min 6 kali  2 kali
9-12 bulan	ASI Makanan Lembik Makanan Selingan	Disesuaikan dengan kebutuhan 1 piring ukuran sedang 1 piring ukuran sedang	Min 6 kali 4-5 kali 1 kali
1-2 tahun	ASI Makanan Keluarga Makanan Selingan	Disesuaikan dengan kebutuhan $\frac{1}{2}$ porsi orang dewasa $\frac{1}{2}$ porsi orang dewasa	3 kali 2 kali
>24 bulan	Makanan Keluarga Makanan Selingan	Disesuaikan dengan kebutuhan Disesuaikan dengan kebutuhan	3 kali 2 kali

Sumber: Depkes RI dalam Husin (2008)

Pada keluarga miskin, pendapatan yang rendah menimbulkan keterbatasan pangan di rumah tangga yang berlanjut kepada rendahnya jumlah dan mutu MP-ASI yang diberikan kepada bayi dan anak (Depkes RI, 2006).

Program perbaikan gizi yang bertujuan meningkatkan jumlah dan mutu MP-ASI, selama ini telah dilakukan, diantaranya pemberian MP-ASI kepada bayi dan anak usia 6 – 24 bulan dari keluarga miskin. Secara umum terdapat dua jenis MP-ASI yaitu hasil pengolahan pabrik atau disebut dengan MP-ASI pabrikan dan yang diolah di rumah tangga atau disebut dengan MP-ASI lokal.

Pemberian MP-ASI lokal memiliki beberapa dampak positif, antara lain; ibu lebih memahami dan lebih terampil dalam membuat MP-ASI dari bahan pangan lokal sesuai dengan kebiasaan dan sosial budaya setempat, sehingga ibu dapat melanjutkan pemberian MP-ASI lokal secara mandiri; meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat serta memperkuat kelembagaan seperti PKK dan Posyandu; memiliki potensi meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penjualan hasil pertanian; dan sebagai sarana dalam pendidikan atau penyuluhan gizi (Depkes RI, 2006).

### **3. Praktek Kebersihan**

Kebersihan adalah faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap kesehatan, hal ini terlihat dari banyaknya orang yang mendapat penyakit karena tidak memperhatikan faktor kebersihan (Depkes RI, dalam Rahayu, 2006). Menurut Atmojo diacu dalam Firlie dalam Rahayu (2006), beberapa penyakit tertentu misalnya penyakit kulit bakterial dan jamur berhubungan erat dengan kebersihan perorangan (*personal hygiene*).

Kebersihan perorangan maupun kebersihan lingkungan memegang peranan penting bagi tumbuh kembang anak. Kebersihan perorangan yang

kurang akan memudahkan terjadinya penyakit-penyakit kulit dan saluran pencernaan seperti diare dan cacingan. Sedangkan kebersihan lingkungan erat hubungannya dengan penyakit saluran pernafasan, saluran pencernaan, serta penyakit akibat nyamuk (Widaninggar, dalam Lubis, 2008).

Ruang lingkup kebersihan pribadi meliputi kebersihan kulit, rambut, mata, kuku, hidung, telinga, mulut dan gigi, tangan dan kaki, pakaian, serta kebersihan sesudah buang air besar dan buang air kecil (Depkes dalam Rahayu, 2006).

Sulistijani dalam Lubis (2008) mengatakan bahwa lingkungan yang sehat perlu diupayakan dan dibiasakan tetapi tidak dilakukan sekaligus, harus perlahan-lahan dan terus menerus. Lingkungan sehat terkait dengan keadaan bersih, rapi dan teratur. Oleh karena itu, anak perlu dilatih untuk mengembangkan sifat-sifat sehat seperti berikut :

1. Mandi 2 kali sehari.
2. Cuci tangan sebelum dan sesudah makan.
3. Makan teratur 3 kali sehari.
4. Menyikat gigi sebelum tidur.
5. Buang air kecil pada tempatnya/WC.

Agama Islam sangat menganjurkan kebersihan bagi umatnya. Hal ini dapat kita lihat dalam salah satu hadits Rasulullah saw yang menekankan tentang pentingnya kebersihan.

عَنْ عَبْدِ بْنِ أَبِي قَاصِمٍ قَالَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  
 إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبِينَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبِينَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبِينَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبِينَ  
 (رواه الترمذي)

Terjemahnya :

*“Diriwayatkan dari Sa’ad bin Abi Waqas dari ayahnya, dari Rasulullah saw. : Sesungguhnya Allah swt itu suci yang menyukai hal-hal yang suci, Dia Maha Bersih yang menyukai kebersihan, Dia Mahamulia yang menyukai kemuliaan, Dia Mahaindah yang menyukai keindahan, karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu” (HR. Tirmidzi)”*

Dalam hadits di atas dapat disimpulkan bahwa kebersihan, kesucian, dan keindahan merupakan sesuatu yang disukai oleh Allah swt. Jika kita melakukan sesuatu yang disukai oleh Allah swt, tentu mendapatkan nilai di hadapan-Nya, yakni berpahala. Dengan kata lain, kotor, jorok, sampah berserakan, lingkungan yang semrawut dan tidak indah itu tidak disukai oleh Allah swt. Sebagai hamba yang taat, tentu kita terdorong untuk melakukan hal-hal yang disukai oleh Allah swt.

Untuk mewujudkan kebersihan dan keindahan tersebut dapat dimulai dari diri kita sendiri, di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun di lingkungan sekolah. Bentuknya juga sangat bermacam-macam, mulai dari membersihkan diri setiap hari, membersihkan kelas, menata ruang kelas sehingga tampak indah dan nyaman. Bila kita dapat mewujudkan kebersihan dan keindahan, maka kehidupan kita pasti terasa lebih nyaman (Sanusi, 2013).

Defisiensi gizi sering dihubungkan dengan infeksi. Infeksi bisa berhubungan dengan gangguan gizi melalui beberapa cara yaitu mempengaruhi nafsu makan, dapat juga menyebabkan kehilangan bahan makanan karena diare (muntah) atau mempengaruhi metabolisme makanan dan banyak cara lain lagi (Santoso dan Anne, 2004).

Secara umum, defisiensi gizi sering merupakan awal dari gangguan sistem kekebalan. Gizi kurang dan infeksi, kedua-duanya dapat bermula dari kemiskinan dan lingkungan yang tidak sehat dengan sanitasi buruk. Selain itu juga diketahui bahwa infeksi menghambat reaksi imunologis yang normal dengan menghabiskan sumber-sumber energi di tubuh. Infeksi memperburuk taraf gizi dan sebaliknya, gangguan gizi memperburuk kemampuan anak untuk mengatasi penyakit infeksi. Kuman-kuman yang kurang berbahaya bagi anak-anak dengan gizi baik bias menyebabkan kematian pada anak-anak dengan gizi sangat kurang (Santoso dan Anne, 2004).

Kerentanan anak terhadap penyakit infeksi disebabkan salah satunya adalah masih lemahnya daya tahan tubuh mereka karena tubuh mereka masih dalam tahap pertumbuhan sehingga belum mampu menangkal serangan penyakit dari luar dengan baik.

#### **4. Perawatan Kesehatan**

Lima tahun pertama kehidupan, pertumbuhan mental dan intelektual berkembang pesat. Masa ini merupakan masa keemasan atau golden period dimana terbentuk dasar-dasar kemampuan keindraan, berfikir, berbicara serta pertumbuhan mental intelektual yang intensif dan awal pertumbuhan moral.

Pada masa ini stimulasi sangat penting untuk mengoptimalkan fungsi-fungsi organ tubuh dan rangsangan pengembangan otak. Upaya deteksi dini gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak usia dini menjadi sangat penting agar dapat dikoreksi sedini mungkin dan atau mencegah gangguan ke arah yang lebih berat (PPWS KIA, 2009).

Perawatan adalah kasih sayang yang diberikan ibu kepada anak untuk membantu pertumbuhan, menggendong, memeluk dan berbicara kepada anak akan merangsang pertumbuhan dan meningkatkan perkembangan perasaan anak. Rasa aman pada anak akan tumbuh apabila ia selalu berada dengan ibunya dan memperoleh air susu ibu sesuai dengan kebutuhan dan apabila sakit ibu selalu menyimpan obat dan membawa ke rumah sakit atau pelayanan kesehatan (Depkes RI, dalam Fajriani, 2011).

Masa bayi dan balita sangat rentan terhadap penyakit seperti flu, diare atau penyakit infeksi lainnya. Jika anak sering menderita sakit dapat menghambat atau mengganggu proses tumbuh kembang anak. Ada beberapa penyebab seorang anak mudah terserang penyakit adalah :

1. Apabila kecukupan gizi terganggu karena anak sulit makan dan nafsu makan menurun. Akibatnya daya tahan tubuh menurun sehingga anak menjadi rentan terhadap penyakit.
2. Lingkungan yang kurang mendukung sehingga perlu diciptakan lingkungan dan perilaku yang sehat.
3. Jika orang tua lalai dalam memperhatikan proses tumbuh kembang anak oleh karena itu perlu memantau dan menstimulasi tumbuh kembang bayi

dan anak secara teratur sesuai dengan tahapan usianya dan segera memeriksakan kedokter jika anak menderita sakit (Lubis, 2008).

Pelayanan kesehatan bayi adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang diberikan oleh tenaga kesehatan kepada bayi sedikitnya 4 kali, selama periode 29 hari sampai dengan 11 bulan setelah lahir. (PPWS KIA, 2009)

Pelayanan kesehatan tersebut meliputi :

1. Pemberian imunisasi dasar lengkap (BCG, Polio 1, 2, 3, 4, DPT/HB 1, 2, 3, Campak) sebelum bayi berusia 1 tahun.
2. Stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang bayi (SDIDTK).
3. Pemberian vitamin A 100.000 IU (6 - 11 bulan)
4. Konseling ASI eksklusif, pemberian makanan pendamping ASI, tanda-tanda sakit dan perawatan kesehatan bayi di rumah menggunakan Buku KIA.
5. Penanganan dan rujukan kasus bila diperlukan. (PPWS KIA, 2009)

## **B. Status Gizi**

### **1. Definisi status gizi**

Status gizi adalah ekspresi dari keadaan keseimbangan dalam bentuk variabel tertentu, atau perwujudan dari *nutriture* dalam bentuk variabel tertentu (Supariasa dkk, 2002).

### **2. Klasifikasi Status Gizi**

Status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi (Almatsier dalam Inadiar, 2010). Status gizi secara umum dapat diklasifikasikan menjadi empat kelompok utama, yaitu:

#### a. Status Gizi Lebih

Status gizi lebih terjadi bila tubuh memperoleh zat-zat gizi dalam jumlah berlebihan, sehingga menimbulkan efek toksis atau membahayakan. Gizi lebih menyebabkan kegemukan atau obesitas. Kelebihan energi yang dikonsumsi disimpan di dalam jaringan dalam bentuk lemak. Kegemukan merupakan salah satu faktor risiko dalam terjadinya berbagai penyakit degeneratif seperti hipertensi atau tekanan darah tinggi, penyakit-penyakit diabetes, jantung koroner, hati, dan kantung empedu (Almatsier dalam Inadiar, 2010).

Budiyanto dalam Inadiar (2010) mendefinisikan status gizi lebih adalah keadaan patologis (tidak sehat) yang disebabkan kebanyakan makan, mengkonsumsi energi lebih banyak daripada yang diperlukan tubuh untuk jangka waktu yang panjang.

#### b. Status Gizi Baik

Status gizi baik atau status gizi optimal terjadi bila tubuh memperoleh cukup zat-zat gizi yang digunakan secara efisien, sehingga memungkinkan pertumbuhan fisik, perkembangan otak, kemampuan kerja, dan kesehatan secara umum pada tingkat setinggi mungkin (Almatsier dalam Inadiar, 2010). Menurut Budiyanto dalam Inadiar (2010) mengatakan bahwa status gizi baik adalah kondisi pada saat asupan gizi seimbang dengan kebutuhan gizi seseorang yang bersangkutan. Kebutuhan gizi seseorang ditentukan oleh kebutuhan gizi basal, kegiatan, dan pada keadaan fisiologis tertentu serta dalam keadaan sehat.

### c. Status Gizi Kurang

Status gizi kurang terjadi bila tubuh kekurangan satu atau lebih zat-zat gizi esensial. Akibat kurang gizi terhadap proses tumbuh bergantung pada zat gizi apa yang kurang. Kekurangan gizi secara umum (makanan kurang dalam kuantitas dan kualitas) menyebabkan gangguan pada proses-proses pertumbuhan, produksi tenaga, pertahanan tubuh, struktur dan fungsi otak, perilaku (Almatsier dalam Inadiar, 2010)

Adapun Budiyanto dalam Inadiar (2010) mengartikan gizi kurang merupakan keadaan tidak sehat (patologis) yang timbul karena tidak cukup makan dengan demikian konsumsi energi dan protein kurang selama jangka waktu tertentu.

### d. Status Gizi Sangat Kurang

Status gizi sangat kurang terjadi apabila hampir semua penyakit gizi kurang diderita seseorang (Apriadi dalam Inadiar, 2010)

Ada 3 Faktor yang mempengaruhi status gizi yaitu :

Menurut Budiyanto dalam Inadiar (2010) faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi seseorang adalah produk pangan (jumlah dan jenis makanan), pembagian makanan atau pangan, akseptabilitas, prasangka buruk pada bahan makanan tertentu, pantangan pada makanan tertentu, kesukaan pada jenis makanan tertentu, keterbatasan ekonomi, kebiasaan makan, selera makan, dan pengetahuan gizi.

Ditinjau dari kecukupan dan ketidakcukupan zat gizi yang masuk ke dalam tubuh yang lebih lanjut akan menentukan status gizi atau tingkat

kesehatan seseorang dipengaruhi banyak faktor (Apriadji dalam Inadiar, 2010)

#### 1. Pekerjaan dan pendapatan orang tua

Pendapatan keluarga mempengaruhi daya beli keluarga akan bahan makanan yang bergizi karena penghasilan/pendapatan menentukan jenis pangan yang akan dibeli (Berg dalam Kholifah dalam Inadiar, 2010). Keluarga dengan pendapatan terbatas besar kemungkinan kurang dapat memenuhi kebutuhan makanannya sejumlah yang diperlukan tubuh. Setidaknya keanekaragaman bahan makanan kurang bisa dijamin. Banyak sebab yang turut berperan dalam menentukan besar-kecilnya pendapatan keluarga. Keterbatasan kesempatan kerja yang bisa segera menghasilkan uang, biasanya pekerjaan di luar usaha tani, juga sangat mempengaruhi besar-kecilnya pendapatan keluarga (Apriadji dalam Inadiar, 2010).

#### 2. Tingkat pendidikan dan pengetahuan gizi

Masalah penting yang menyebabkan adanya kekurangan gizi adalah ketiadaan informasi yang memadai. Sekalipun kurangnya daya beli merupakan halangan utama, tetapi sebagian kekurangan gizi akan bisa diatasi kalau orang mengetahui bagaimana seharusnya memanfaatkan sumber yang dimiliki (Berg dalam Kholifah, 2002). Faktor tingkat pendidikan turut pula menentukan mudah tidaknya seseorang menyerap dan memahami pengetahuan gizi yang mereka peroleh (Apriadji dalam Inadiar, 2010).

Sebagian kejadian gizi sangat kurang dapat dihindari apabila ibu mempunyai cukup pengetahuan tentang cara memelihara gizi dan mengatur

makan anak. Ketidaktahuan baik yang berdiri sendiri maupun yang berkaitan dengan kemiskinan, menimbulkan salah paham tentang cara perawatan bayi dan anak yang benar, juga salah mengerti tentang penggunaan bahan pangan tertentu dan cara mengatur makan anggota keluarga yang sedang sakit (Arisman dalam Inadiar, 2010).

### 3. Jumlah anggota keluarga

Keluarga dengan banyak anak dan jarak kelahiran antar anak yang amat dekat akan menimbulkan lebih banyak masalah. Anak-anak yang lebih kecil seringkali mendapatkan jatah makan yang kurang mencukupi karena kalah dengan kakaknya yang makannya lebih cepat dan dengan porsi suap yang lebih besar pula. Anak yang terlalu banyak selain menyulitkan dalam mengurusnya juga kurang bisa menciptakan suasana tenang di dalam rumah. Lingkungan keluarga yang selalu ribut akan mempengaruhi ketenangan jiwa, dan ini secara tidak langsung akan menurunkan nafsu makan anggota keluarga lain yang terlalu peka terhadap suasana yang kurang menyenangkan (Apriadji dalam Inadiar, 2010)

### 4. Faktor lingkungan

Salah satu faktor yang tidak kalah pentingnya dibandingkan faktor yang lain adalah kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan memang bukanlah faktor yang langsung berpengaruh terhadap status gizi seseorang, tetapi faktor ini justru cukup besar peranannya. Menjaga kebersihan lingkungan yang merupakan tempat hidup cacing dan jasad-jasad renik sangat penting. Jumlah makanan yang mencukupi kandungan zat gizi yang baik

sekalipun tidak akan memperbaiki status gizi seseorang jika orang tersebut cacingan (Apriadi dalam Inadiar, 2010)

### ***C. Penilaian dan Pengukuran Gizi***

Penilaian status gizi bisa dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Penilaian Status Gizi secara langsung. Penilaian status gizi secara langsung dapat dibagi menjadi empat penilaian yaitu antropometri, klinis, biokimia, dan biofisik. Adapun penilaian status gizi secara tidak langsung dapat dibagi menjadi 3 yaitu survey konsumsi makan, statistik vital, faktor ekologi (Supariasa dkk, dalam Inadiar, 2010)

Pada prinsipnya, penilaian status gizi anak serupa dengan penilaian pada periode kehidupan lain. Pemeriksaan yang perlu lebih diperhatikan tentu saja bergantung pada bentuk kelainan yang bertalian dengan kejadian penyakit tertentu. Kurang kalori protein, misalkan lazim menjangkiti anak. (Almatsier, 2008)

#### **1. Penilaian status gizi secara langsung:**

##### **a. Pengukuran Antropometri**

Secara umum artinya ukuran tubuh manusia. Ditinjau dari sudut pandang gizi maka antropometri gizi berhubungan dengan berbagai tingkat umur dan tingkat gizi. Antropometri secara umum digunakan untuk melihat ketidakseimbangan asupan protein dan energi. Keridakseimbangan ini terlihat pada pola pertumbuhan fisik dan proporsi jaringan tubuh seperti lemak, otot, dan jumlah air dalam tubuh (Supariasa dkk, dalam Inadiar, 2010).

Pertumbuhan dipengaruhi oleh determinan biologis yang meliputi jenis kelamin, lingkungan di dalam rahim, jumlah kelahiran, berat lahir pada kehamilan tunggal atau majemuk, ukuran orang tua dan konstitusi genetik, serta faktor lingkungan (termasuk iklim, musim, dan keadaan sosial-ekonomi). Pengaruh lingkungan, terutama gizi, lebih penting ketimbang latar belakang genetik atau faktor biologis lain, terutama pada masa pertumbuhan. Ukuran tubuh tertentu dapat memberikan keterangan mengenai jenis malnutrisi (Almatsier, 2008).

Pengukuran status gizi pada balita dan anak dapat dilakukan menggunakan indeks antropometri sebagai berikut: (Santoso dan Anne, 2004)

1. Indeks berat badan menurut umur (BB/U)
2. Indeks berat badan menurut panjang atau tinggi badan (BB/TB)
3. Indeks gabungan (BB/U, BB/TB, TB/U)
4. Indeks lingkar lengan atas (LILA)
5. Indeks lingkar kepala menurut umur (LK/U)
6. Tebal lipatan lemak di bawah kulit (TLBK)

Kategori status gizi pada berbagai ukuran antropometri untuk balita dan anak terdapat pada tabel berikut

**Tabel 2.2**  
**Kategori dan Ambang Batas Status Gizi Anak Berdasarkan Indeks**

<b>Indeks</b>	<b>Kategori Status Gizi</b>	<b>Ambang Batas (Z-Score)</b>
Berat Badan menurut Umur (BB/U) Anak Umur 0 - 60 Bulan	Gizi Buruk	< -3 SD
	Gizi Kurang	-3 SD sampai dengan <-2 SD
	Gizi Baik	-2 SD sampai dengan 2 SD
	Gizi Lebih	>2 SD
Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) Anak Umur 0 - 60 Bulan	Sangat Pendek	<-3 SD
	Pendek	-3 SD sampai dengan <-2 SD
	Normal	-2 SD sampai dengan 2 SD
	Tinggi	>2 SD
Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB) Atau Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB) Anak Umur 0 - 60 Bulan	Sangat Kurus	<-3 SD
	Kurus	-3 SD sampai dengan <-2 SD
	Normal	-2 SD sampai dengan 2 SD
	Gemuk	>2 SD
Indeks Massa Tubuh menurut Umur (IMT/U) Anak Umur 0 - 60 Bulan	Sangat Kurus	<-3 SD
	Kurus	-3 SD sampai dengan <-2 SD
	Normal	-2 SD sampai dengan 2 SD
	Gemuk	>2 SD
Indeks Massa Tubuh menurut Umur (IMT/U) Anak Umur 5 – 18 Tahun	Sangat Kurus	<-3 SD
	Kurus	-3 SD sampai dengan <-2 SD
	Normal	-2 SD sampai dengan 2 SD
	Gemuk	>1 SD sampai dengan 2 SD
	Obesitas	> 2 SD

Sumber: Kemenkes RI (2010)

Tujuan yang hendak dicapai dalam pemeriksaan antropometris adalah besaran komposisi tubuh yang dapat dijadikan isyarat dini perubahan status gizi. Tujuan ini dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu untuk: (1) penapisan gizi, (2) survei status gizi, dan (3) pemantauan status gizi. Penapisan diarahkan pada orang per orang untuk keperluan khusus. Survei ditujukan untuk memperoleh gambaran status gizi masyarakat pada saat tertentu, serta faktor-faktor yang berkaitan dengan itu. Pemantauan bermanfaat sebagai pemberi gambaran perubahan status gizi dari waktu ke waktu (Almatsier, 2008).

#### b. Pengukuran Klinis

Pemeriksaan klinis adalah metode yang sangat penting untuk menilai status gizi masyarakat. Metode ini didasarkan atas perubahan-perubahan yang terjadi yang dihubungkan dengan ketidakcukupan zat gizi. Hal ini dapat dilihat pada jaringan epitel (*supervicial epithelial tissue*) seperti kulit, mata, rambut, dan mukosa oral atau pada organ-organ yang dekat dengan permukaan tubuh seperti kelenjar tiroid.

Penggunaan metode ini umumnya untuk survei klinis secara cepat (*rapid clinical surveys*). Survei ini dirancang untuk mendeteksi secara cepat tanda-tanda klinis umum dari kekurangan salah satu atau lebih zat gizi. Disamping itu digunakan untuk mengetahui tingkat status gizi seseorang dengan melakukan pemeriksaan fisik yaitu tanda (*sign*) dan gejala (*symptom*) atau riwayat penyakit (Supariasa dkk, dalam Inadiar, 2010)

### c. Pengukuran Biokimia

Penilaian status gizi dengan biokimia adalah pemeriksaan spesimen yang diuji secara laboratorium yang dilakukan pada berbagai macam jaringan tubuh. Jaringan tubuh yang digunakan antara lain: darah, urine, tinja, dan juga beberapa jaringan tubuh seperti hati dan otot. Metode ini digunakan untuk peringatan bahwa kemungkinan akan terjadinya keadaan malnutrisi yang lebih parah lagi (Inadiar, 2010).

Banyak gejala klinis yang kurang spesifik, maka penentuan kimia faali dapat lebih banyak menolong untuk menentukan kekurangan gizi yang spesifik (Supariasa dkk, dalam Inadiar, 2010).

Pengukuran dengan cara biokimia dapat digunakan untuk mendeteksi keadaan defisiensi subklinis yang semakin penting dalam era pengobatan preventif. Metode ini bersifat sangat objektif, bebas dari faktor emosi dan subyektif lain sehingga biasanya digunakan untuk melengkapi cara penilaian status gizi lainnya (Yuniastuti, 2008).

### d. Biofisik

Penentuan status gizi secara biofisik adalah metode psg dengan melihat kemampuan fungsi (khususnya jaringan) dan melihat perubahan struktur jaringan (Inadiar, 2010).

Umumnya dapat digunakan dalam situasi tertentu seperti kejadian buta senja epidemic (*epidemic of night blindness*). Cara yang digunakan adalah tes adaptasi gelap (Supariasa dkk, dalam Inadiar, 2010)

## 2. Penilaian Status Gizi Secara Tidak Langsung

### a. Survei Konsumsi Makan

Survei konsumsi makanan merupakan pengukuran status gizi dengan melihat jumlah dan jenis zat gizi yang dikonsumsi dalam satu satuan tertentu. Survei konsumsi makanan dimaksudkan untuk mengetahui kebiasaan makan dan gambaran tingkat kecukupan bahan makanan dan zat gizi pada tingkat kelompok, rumah tangga, dan perorangan serta faktor yang berpengaruh terhadap konsumsi makanan tersebut (Supariasa dkk, dalam Inadiar, 2010)


### b. Statistik Vital

Penilaian status gizi dengan statistik vital adalah dengan menganalisis data beberapa statistik kesehatan seperti angka kematian berdasarkan umur, angka kesakitan dan kematian akibat penyebab tertentu dan data lainnya yang berhubungan dengan gizi. Penggunaannya dipertimbangkan sebagai bagian dari indikator tidak langsung pengukuran status gizi masyarakat (Supariasa dkk, dalam Inadiar, 2010).


### c. Faktor Ekologi

Malnutrisi merupakan masalah ekologi sebagai hasil interaksi beberapa faktor fisik, biologis dan lingkungan budaya. Pengukuran faktor ekologi dipandang sangat penting untuk mengetahui penyebab malnutrisi di suatu masyarakat sebagai dasar untuk melakukan program intervensi gizi (Supariasa dkk, dalam Inadiar, 2010)

**C. Kerangka Pikir.**



**Keterangan:**



: Variabel yang diteliti



: Variabel yang tidak diteliti

Gambar 2.1  
Pola Pikir Variabel yang Diteliti

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Lokasi Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat *observasional* dengan pendekatan deskriptif, dimana bertujuan untuk memperoleh gambaran pola asuh ibu terhadap balita gizi sangat kurang di Kelurahan Mangasa Kota Makassar.

##### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Mangasa Kota Makassar. Dimana di Kelurahan ini terdapat banyak balita dengan status gizi sangat kurang.

#### **B. Populasi dan Sampel**

##### **1. Populasi**

Populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu yang memiliki balita yang berusia 6-59 bulan yang berada di Kelurahan Mangasa Kota Makassar pada bulan Juni 2013. Jumlah populasi balita pada Kelurahan Mangasa pada bulan Juni tahun 2013 adalah sebanyak 1.574 balita

##### **2. Sampel**

Sampel dalam penelitian ini adalah semua ibu yang memiliki balita gizi sangat kurang yang berusia 6-59 bulan pada bulan Juni 2013 yang

berada di Kelurahan Mangasa Kota Makassar. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 34 balita.

Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*, yaitu balita gizi sangat kurang yang berusia 6-59 bulan yang berada di wilayah Kelurahan Mangasa dijadikan sampel.

### **C. Metode Pengumpulan Data**

1. Data primer diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan responden yang menjadi sampel dengan menggunakan kuesioner yang telah disediakan.
2. Data Sekunder diperoleh melalui berbagai referensi yang relevan dengan pembahasan penulis

### **D. Instrumen Penelitian**

1. Data berat badan balita diperoleh melalui pengukuran dengan menggunakan timbangan injak yang mempunyai kapasitas 25 kg dengan tingkat ketelitian 0,1 kg.
2. Data umur, dengan cara menanyakan umur balita kepada responden.
3. Kuesioner, berupa sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi tentang balita dan pola asuh gizi yang dilakukan ibu terhadap balita.

### **E. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data**

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 17 dan penyajian data di sajikan dalam bentuk tabel distribusi disertai penjelasan.

a. Editing

Dalam tahap ini dilakukan pemeriksaan antara lain kesesuaian jawaban dan kelengkapan pengisian responden.

b. Coding

Setelah semua kuesioner diedit atau disunting, selanjutnya dilakukan pemberian kode, yakni mengubah data berbentuk kalimat atau huruf menjadi data angka atau bilangan. Misalnya jenis kelamin : 1 = laki-laki, 2 = perempuan.

c. Memasukkan Data

Data-data dari hasil penelitian yang diperoleh kemudian dimasukkan ke dalam program komputer.



## BAB V

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Karakteristik Responden

Karakteristik responden dalam penelitian ini adalah umur ibu, pekerjaan ibu, dan pendidikan terakhir ibu.

##### a. Umur Ibu

Tabel 5.1  
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Umur Di Kelurahan Mangasa  
Kota Makassar Tahun 2013

Kelompok Umur	Jumlah (n)	Persen (%)
≤20	6	17.6
21-30	15	44.1
31-40	12	35.4
≥41	1	2.9
<b>Total</b>	<b>34</b>	<b>100.0</b>

Sumber: Data Primer, 2013

Berdasarkan tabel 5.1 menunjukkan bahwa dari 34 responden, distribusi frekuensi responden berdasarkan umur dengan jumlah tertinggi yaitu pada kelompok umur 21-30 tahun sebanyak 15 orang (44.1%) dan yang paling rendah adalah umur  $\geq 41$  tahun yaitu hanya 1 orang (2.9%).

## b. Pekerjaan Ibu

Tabel 5.2  
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pekerjaan Di Kelurahan  
Mangasa Kota Makassar Tahun 2013

<b>Pekerjaan Ibu</b>	<b>Jumlah (n)</b>	<b>Persen (%)</b>
Penjahit	3	8.8
Pegawai Salon	2	5.9
Buruh Bangunan	1	2.9
Cleaning Service	3	8.8
Ibu Rumah Tangga	25	73.5
<b>Total</b>	<b>34</b>	<b>100.0</b>

Sumber: Data Primer, 2013

Berdasarkan tabel 5.2 menunjukkan bahwa dari 34 responden, terdapat jumlah tertinggi pada pekerjaan ibu sebanyak 25 orang (73.5%) yaitu pada ibu rumah tangga dan jumlah terendah pada pekerjaan ibu sebanyak 1 orang (2.9%) yaitu pada buruh bangunan.

## c. Pendidikan Terakhir Ibu

Tabel 5.3  
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir Di  
Kelurahan Mangasa Kota Makassar Tahun 2013

<b>Pendidikan terakhir ibu</b>	<b>Jumlah (n)</b>	<b>Persen (%)</b>
Tidak sekolah	4	11.8
Tamat SD	10	35.3
Tamat SLTP	12	29.4
Tamat SLTA	8	23.5
<b>Total</b>	<b>34</b>	<b>100.0</b>

Sumber: Data Primer, 2013

Berdasarkan tabel 5.3 menunjukkan bahwa dari 34 responden, terdapat pendidikan terakhir ibu dengan jumlah tertinggi yaitu pada tamat SLTP sebanyak 12 orang (29.4%) dan yang paling rendah adalah tidak sekolah sebanyak 4 orang (11.8%).

## 2. Karakteristik Sampel

### Umur Balita

Tabel 5.4  
Distribusi Frekuensi Balita Berdasarkan Umur Di Kelurahan Mangasa  
Kota Makassar  
Tahun 2013

Umur Balita	Jumlah (n)	Persen (%)
6-12 Bulan	2	5.9
13-24 Bulan	14	41.2
25-36 Bulan	8	23.5
37-48 Bulan	7	20.6
49-59 Bulan	3	8.8
<b>Total</b>	<b>34</b>	<b>100.0</b>

Sumber: Data Primer, 2013

Berdasarkan tabel 5.4 menunjukkan bahwa dari 34 Balita, terdapat umur balita dengan jumlah terendah yaitu pada kelompok umur 6-12 bulan sebanyak 2 balita (5.9%) dan yang paling tertinggi pada kelompok umur 13-24 bulan sebanyak 14 balita (41.2%).

## 3. Variabel Penelitian

### a. Praktek Pemberian Makanan

Tabel 5.5  
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Praktek Pemberian  
Makanan Di Kelurahan Mangasa Kota Makassar Tahun 2013

Praktek Pemberian Makanan	Jumlah (n)	Persen (%)
Baik	5	14.7
Tidak Baik	29	85.3
<b>Total</b>	<b>34</b>	<b>100.0</b>

Sumber: Data Primer, 2013

Berdasarkan tabel 5.5 menunjukkan bahwa dari 34 responden, diketahui bahwa praktek pemberian makanan tertinggi pada kategori tidak

baik yaitu berjumlah 29 responden (85.3%) dan yang baik berjumlah 5 responden (14.7%).

#### b. Praktek Kebersihan/Hygiene Perorangan

Tabel 5.6  
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Praktek Kebersihan/Hygiene Perorangan Di Kelurahan Mangasa Kota Makassar Tahun 2013

<b>Praktek Kebersihan/ Hygiene Perorangan</b>	<b>Jumlah (n)</b>	<b>Persen (%)</b>
Baik	7	20.6
Tidak Baik	27	79.4
<b>Total</b>	<b>34</b>	<b>100.0</b>

Sumber: Data Primer, 2013

Berdasarkan tabel 5.6 menunjukkan bahwa dari 34 responden, diketahui bahwa praktek kebersihan/ hygiene perorangan tertinggi pada kategori tidak baik yaitu berjumlah 27 responden (79.4%) dan yang baik berjumlah 7 responden (20.6%)

#### c. Perawatan Kesehatan

Tabel 5.7  
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Perawatan Kesehatan Balita Di Kelurahan Mangasa Kota Makassar Tahun 2013

<b>Perawatan Kesehatan Balita</b>	<b>Jumlah (n)</b>	<b>Persen (%)</b>
Baik	10	29.4
Tidak Baik	24	70.6
<b>Total</b>	<b>34</b>	<b>100.0</b>

Sumber: Data Primer, 2013

Berdasarkan tabel 5.7 menunjukkan bahwa dari 34 responden, diketahui bahwa perawatan kesehatan balita tertinggi pada kategori tidak baik yaitu berjumlah 24 responden (70.6%) dan yang baik berjumlah 10 responden (29.4%)

#### d. Pola Asuh Ibu

Tabel 5.8  
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Praktek Pola Asuh Di  
Kelurahan Mangasa Kota Makassar Tahun 2013

<b>Praktek pola asuh</b>	<b>Jumlah (n)</b>	<b>Persen (%)</b>
Baik	5	14.7
Tidak baik	29	85.3
<b>Total</b>	<b>34</b>	<b>100</b>

*Sumber: Data Primer, 2013*

Berdasarkan tabel 5.8 menunjukkan bahwa dari 34 responden, diketahui bahwa pola asuh ibu tertinggi pada kategori tidak baik yaitu berjumlah 29 responden (85.3%) dan yang baik berjumlah 5 responden (14.7%).

#### B. Pembahasan

##### 1. Praktek Pemberian Makanan

Balita membutuhkan sikap orang tuanya dalam memberi makan. Semasa bayi, anak hanya menelan apa saja yang diberikan ibunya. Sekalipun yang ditelannya tidak cukup dan kurang bergizi. Demikian pula sampai balita mulai disapih. Balita tidak tahu mana makanan terbaik dan mana makanan yang boleh dimakan. Balita masih membutuhkan bimbingan seorang ibu dalam memilih makanan agar pertumbuhannya tidak terganggu. Bentuk perhatian dan dukungan ibu terhadap balita meliputi perhatian ketika makan, mandi dan sakit (Nadesul, 1995).

Praktek pemberian makanan merupakan salah satu elemen penting didalam pola pengasuhan balita yang akan menentukan tumbuh kembang balita. Perilaku ibu dalam memberi makan, cara makan yang sehat,

memberi makanan yang bergizi dan mengontrol besar porsi yang dihabiskan akan meningkatkan status gizi anak (zeitlin, 1990).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian makanan yang berada dalam kategori baik hanya sebagian kecil yaitu (14.7%), sedangkan pada kategori tidak baik dalam memberikan makanan cukup banyak yaitu (85.3%). Hal ini dikarenakan banyak ibu yang tahu tapi kurang memahami dan melaksanakan akan pentingnya cara pemberian makanan yang baik, mulai dari pemberian ASI antara umur 0-24 bulan, pemberian MP-ASI yang mulai diperkenalkan sejak balita berusia 6 bulan, sampai pemberian makanan pokok atau makanan yang teksturnya sudah lebih keras.

Semua orang telah mengakui bahwa ASI tidak perlu diragukan lagi sebagai makanan bayi yang paling baik. Akan tetapi kadang-kadang oleh suatu sebab tertentu ibu harus menambah atau mengganti ASI ini dengan makanan atau minuman lain. Keadaan yang mengharuskan ibu menggantikan ASI kepada bayi atau anaknya antara lain :

- a. ASI tidak keluar.
- b. Ibu meninggal sewaktu melahirkan atau waktu bayi masih memerlukan ASI.
- c. ASI keluar tapi jumlahnya tidak mencukupi kebutuhan bayi.
- d. ASI keluar tapi ibu tidak dapat terus meneruskan menyusui bayinya karena ibu berada diluar rumah (bekerja atau tugas lainnya).

Dengan alasan diatas, maka pemberian susu formula dapat menggantikan kebutuhan gizi bayi yang tidak di peroleh dari ASI (Soenardi, 2000).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ekawati (2009) pada balita di wilayah kerja Puskesmas Galesong Utara Kabupaten Takalar, dimana jumlah pemberian makanan yang baik berjumlah 13 ibu (28.8%) dan yang tidak baik dalam praktek pemberian makanan pada balita berjumlah 32 orang (71.11%).

Permasalahan yang sangat mendasar pada pemberian makan ini yang mengakibatkan banyaknya ibu yang tidak baik dalam pemberian makanan adalah ibu balita tidak memberikan kolostrum ketika bayinya baru dilahirkan, tidak memberikan ASI-eksklusif dikarenakan ada beberapa ibu yang tidak mampu memproduksi ASI sehingga bayinya hanya diberikan susu formula, serta pengetahuan yang kurang tentang pola pemberian ASI dan MP ASI yang baik dan benar. Adapun sedikitnya ibu yang baik dalam pemberian makanan itu dikarenakan mereka tahu dan memberikan yang terbaik untuk balitanya dalam hal pemberian makanan.

Hal ini sejalan dengan penelitian Mery dan Mesri 2012 tentang “Hubungan Pola Pemberian ASI dan MP ASI dengan Gizi Buruk Pada Anak 6-24 Bulan Di Kelurahan Pannampu Makassar”, mengatakan bahwa terdapat hubungan signifikan antara pola pemberian ASI berdasarkan frekuensi menyusui dan lama menyusui sehari dengan kejadian gizi buruk dan merupakan faktor risiko.

Demikian juga dengan pola pemberian MP-ASI (konsumsi kalori) memiliki hubungan yang signifikan dengan kejadian gizi buruk dan merupakan faktor risiko.

Susu formula dibuat sedemikian rupa sehingga kadar gizi yang terkandung persis sama dengan ASI. Kekurangan terletak pada ketiadaan zat anti infeksi. Namun, ketiadaan zat anti infeksi ini setidaknya dapat tergantikan dengan pemberian imunisasi secara teratur (Arisman, 2004).

Hanya saja berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara dilapangan menunjukkan bahwa praktek perawatan kesehatan balita sangat rendah yaitu jumlah ibu yang perawatan kesehatannya baik hanya berjumlah 10 orang (29.4%), sedangkan yang tidak baik sebanyak 24 orang (70.6%). Hal ini ditunjukkan dengan sangat rendahnya frekuensi kunjungan ibu membawa balitanya ke posyandu untuk mendapatkan imunisasi ataupun mendapatkan informasi kesehatan balitanya.

Ketika balita mereka berusia diatas 24 bulan, banyak dari balita mereka tidak diberikan menu makanan yang bervariasi sehingga kebanyakan balita bosan dengan menu makanan yang sama setiap hari. Hal ini dikarenakan status ekonomi yang kurang sehingga tidak mampu memberikan makanan yang beragam kepada balita mereka.

Berdasarkan yang dikemukakan oleh Nadesul (1995), bentuk perhatian/dukungan ibu terhadap anak meliputi perhatian ketika anak makan dan sikap orang tua dalam memberi makan. Dalam penelitian ini menunjukkan sebagian besar ibu menciptakan suasana yang tidak

menyenangkan bagi balita ketika memberi makan. Seperti memaksa memaksa menghabiskan makanan jika balita tidak mau makan.

Hal ini jelas tidak mendukung konsep yang dikembangkan Depkes RI (2009), bahwa interaksi antara ibu dengan bayi akan mendapatkan status gizi yang baik. Anak yang mendapatkan perhatian lebih baik secara fisik dan emosional, misalnya selalu mendapat senyuman, mendapat respon ketika berceloteh, dan mendapat makanan yang seimbang, maka keadaan gizinya akan lebih baik.

Kondisi status gizi buruk tentunya akan berdampak pada anak balita baik sejak masih bayi bahkan sampai anak mencapai usia dewasa. Dampak yang berkepanjangan ini tentunya dapat diatasi sejak dini dengan mengatur pola makan keluarga terkhusus pada balita yang sedang tumbuh.

## **2. Praktek Kebersihan/Hygiene Perorangan**

Kebersihan perorangan yang kurang akan memudahkan terjadinya penyakit-penyakit kulit dan saluran pencernaan seperti diare dan kecacingan. Sedangkan kebersihan lingkungan erat hubungannya dengan penyakit saluran pernafasan, saluran pencernaan, serta penyakit yang ditularkan melalui nyamuk (Soetjningsih 1995).

Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa jumlah responden yang praktek kebersihan/hygiene perorangannya tidak baik mempunyai frekuensi yang lebih banyak yaitu 27 orang (79.4%). Dibandingkan dengan jumlah responden yang praktek kebersihan/hygiene perorangannya baik yaitu berjumlah 7 orang (20.6%). Hal ini berdasarkan

pengamatan dilapangan menunjukkan bahwa sebagian besar orang tua balita gizi sangat kurang masih berada pada tingkat perekonomian yang rendah sehingga mempengaruhi pola hidup bersih dan sehat ibu terhadap balitanya. Walaupun demikian banyak dari para ibu sudah mengetahui dampak dari kurangnya perhatian terhadap personal hygiene, seperti besarnya potensi anak terkena penyakit diare atau kecacingan.

Kondisi perekonomian yang rendah juga menjadi hambatan dalam melakukan praktek kebersihan terhadap balita pada keluarga dengan kondisi perekonomian yang rendah, dimana mereka umumnya tidak memiliki sarana air bersih dan peralatan mandi atau cuci yang cukup untuk dapat melakukan personal hygiene pada balita.

Mendukung penelitian widodo (2005), bahwa akibat rendahnya sanitasi dan hygiene pada pemberian makanan balita memungkinkan terjadinya kontaminasi oleh mikroba, sehingga meningkatkan risiko atau infeksi yang lain pada balita

Demikian juga dengan pendapat Anwar (2008), bahwa pemberian nutrisi tanpa memperhatikan kebersihan akan meningkatkan risiko anak infeksi, seperti diare. Oleh karena itu, perlu diperhatikan perilaku ibu untuk memelihara kebersihan rumah, hygiene makanan, kebersihan perorangan dalam melakukan pengasuhan balita dalam keluarga.

Menurut Widaninggar (2003) menyatakan bahwa lingkungan yang sehat perlu diupayakan dan dibiasakan tetapi tidak dilakukan sekaligus, harus perlahan-lahan dan terus-menerus. Lingkungan sehat terkait dengan

keadaan bersih, rapi dan teratur. Oleh karena itu, anak perlu dilatih untuk mengembangkan sifat-sifat sehat seperti mandi, cuci tangan sebelum makan.

Hal ini sejalan dengan penelitian Alauddin tahun (2012) dimana ibu balita yang tidak menjaga kebersihan/hygiene dengan baik sebanyak 31 ibu (73.8%) dan yang baik sebanyak 11 ibu (26.2%).

Aspek kebersihan memang merupakan aspek yang harus selalu diperhatikan, utamanya bagi kita yang beragama islam. Agama dan ajaran islam menaruh perhatian amat tinggi terhadap aspek kebersihan, baik lahiriah (fisik) maupun batiniah (psikis). Kebersihan lahiriyah itu tidak dapat dipisahkan dengan kebersihan bathiniyah. Oleh karena itu, ketika seorang muslim melaksanakan ibadah tertentu harus membersihkan terlebih dahulu aspek lahiriyahnya. Ajaran Islam yang memiliki aspek aqidah, ibadah, muamalah, akhlak ada kaitan dengan seluruh kebersihan ini (Aburrahman, 2008).

Dalam membangun konsep kebersihan, Islam menetapkan berbagai macam peristilahan tentang kebersihan. Umpamanya, tazkiyah, thaharah, nazhafah, dan fitrah, seperti dalam firman Allah pada Q.S al-Baqarah: 222

الْمُتَطَهِّرِينَ وَحُبُّ التَّوْبَةِ حُبُّ اللَّهِ إِنَّ

*Terjemahnya:*

“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.(Depag RI,2010)”.

Hikmah bertaubat adalah menyucikan diri dari kotoran batin, sedang menyucikan diri dari kotoran lahir adalah mandi atau berwudhu’.

Demikian penyucian jasmani dan rohani digabung oleh penutup ayat ini mengisyaratkan bahwa Allah swt sangat menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyucikan diri dari kotoran (Shihab,2002).

### **3. Perawatan Kesehatan**

Pengasuhan perawatan dasar anak meliputi perawatan terhadap anak sakit dan perawatan pencegahan agar anak tidak jatuh sakit. Untuk itu diperlukan kemampuan ibu untuk mengenali dan merawat anak yang sakit. Termasuk kemampuan mengenali penyakit menjadi progresif yang butuh perawatan lanjut (Bahar, 2002).

Hasil penelitian dapat diketahui bahwa pola asuh ibu berdasarkan perawatan kesehatan lebih banyak pada kategori tidak baik yaitu sebesar (70.6%), sedangkan pada kategori baik sebesar (29.4%). Hal ini dapat dilihat dari perilaku ibu yang kebanyakan tidak langsung membawa anaknya ke pelayanan kesehatan bila anak sakit dan lebih memilih untuk mengobati sendiri balitanya.

Berdasarkan hasil wawancara pada saat penelitian didapati banyaknya jumlah balita yang menderita penyakit diare pada satu bulan terakhir, sehingga walaupun praktek pemberian makananya baik tetapi praktek kebersihan dan perawatn kesehatannya kurang baik, tetap saja akan menghasilkan balita yang menderita gizi buruk.

Hal ini sejalan dengan penelitian Lisnawati pada tahun (2010) dimana ibu balita yang perawatan kesehatan balitanya tidak baik

berjumlah 24 ibu (66.7%) dan yang baik dalam perawatan kesehatan balitanya berjumlah 12 ibu (33.7%).

Soetjiningsih (1995) mengemukakan bahwa kesehatan anak harus mendapat perhatian dari para orang tua yaitu dengan segera membawa anaknya yang sakit ketempat pelayanan kesehatan yang terdekat. Masa Balita sangat rentan terhadap penyakit seperti : flu, diare atau penyakit infeksi lainnya. Salah satu faktor yang mempermudah balita terserang penyakit adalah keadaan lingkungan.

#### **4. Pola Asuh**

Menurut Engel (1997), pola asuh adalah kemampuan keluarga dan masyarakat untuk menyediakan waktu, perhatian dan dukungan dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial dari anak balita yang sedang tumbuh dan anggota keluarga lainnya. Pola asuh responden meliputi perhatian/ dukungan ibu terhadap balita dalam pemberian makanan, praktek kebersihan/ hygiene perorangan, dan perawatan kesehatan balita.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum praktek pola asuh ibu terhadap balitanya kebanyakan masih berada pada kategori tidak baik yang menyebabkan status gizi balita menjadi sangat kurang. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syamsuri 2007, yang mengatakan bahwa pemberian ASI dan perawatan balita yang baik akan menjadi factor protektif terjadinya gizi buruk.

Tingginya angka gizi sangat kurang disebabkan oleh pola asuh ibu atau keluarga yang tidak baik terhadap balita. Diantara penyebab kasus

balita gizi sangat kurang antara lain (1) balita tidak mendapat ASI eksklusif atau mendapat makanan selain ASI sebelum umur 6 bulan; (2) balita disapih sebelum umur 2 tahun; (3) balita tidak mendapat makanan pendamping ASI (MP-ASI) pada umur 6 bulan atau lebih; (4) MP-ASI kurang dan tidak bergizi; (5) setelah umur 6 bulan balita jarang disusui. Pola asuh adalah praktek di rumah tangga yang diwujudkan dengan tersedianya pangan dan perawatan kesehatan serta sumber lainnya untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan anak balita. Pola pengasuhan yang baik sangat perlu untuk diupayakan. Secara umum pola asuh ibu berada pada kategori baik mempunyai status gizi anak yang baik pula.

### ***C. Keterbatasan Peneliti/Penelitian***

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini banyak keterbatasan, diantaranya adalah dalam penelitian ini hanya variabel pola asuh yang diteliti sementara ada variabel lain seperti status ekonomi dan banyak jumlah anggota keluarga yang dapat mempengaruhi status gizi balita di kelurahan Mangasa Kota Makassar.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut


1. Pola asuh ibu terhadap pemberian makanan, terdapat 5 orang (14.7%) yang baik dalam memberikan makanan dan 29 orang (85.3%) yang tidak baik dalam memberikan makanan.
2. Pola asuh ibu terhadap praktek kebersihan/hygiene perorangan, terdapat 7 orang (20.6%) yang baik dalam memperhatikan kebersihan balitanya dan 27 orang (79.4%) yang tidak baik dalam memperhatikan kebersihan balitanya.
3. Pola asuh ibu terhadap perawatan kesehatan balita, terdapat 10 orang (29.4%) yang merawat balitanya dengan baik dan 24 orang (70.6%) yang tidak baik dalam merawat balitanya.
4. Pola asuh ibu terhadap balita gizi sangat kurang di Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate, terdapat 5 ibu yang pola asuhnya baik (14.7%), dan yang tidak baik sebanyak 29 orang (85.3%).

#### **B. Implikasi Penelitian**

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian diatas membuktikan bahwa penyuluhan atau pengetahuan yang diberikan kepada ibu balita tentang pola asuh balita yang baik, tidak cukup dalam menuntaskan permasalahan gizi sangat kurang pada kelurahan Mangasa kota Makassar tahun 2013. Maka disarankan

kepada ibu-ibu yang memiliki balita gizi sangat kurang agar rajin membawa balitanya ke puskesmas/posyandu untuk mendapatkan penyuluhan dan pengetahuan cara pola asuh yang baik kepada balita.

Perlunya penelitian lebih lanjut mengenai faktor resiko gizi sangat kurang, sehingga kedepannya frekuensi kejadian gizi sangat kurang diwilayah tersebut dapat ditekan menjadi bahan rujukan bagi para peneliti selanjutnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Alauddin, "Gambaran Pola Asuh Ibu Anak Balita Gizi Buruk Di Wilayah Kerja Puskesmas Karuwisi Kota Makassar Tahun 2012." Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2012.
- Anna, Lusia Kus. "Makanan Tidak Sehat Turunkan Kecerdasan Bayi." <http://health.kompas.com>. Diakses Pada Tanggal 26 Februari 2013.
- Anwar, H.M. *Peranan Gizi dan Pola Asuh dalam Meningkatkan Kualitas Tumbuh kembang Anak*. Jakarta: jendela Anak Indonesia. 2000.
- Arisman. *Gizi Dasar Kehidupan*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2004.
- Asuh Indonesia – Wikia. "Kolostrum." <http://asuh.wikia.com>. Diakses Pada Tanggal 26 Februari 2013.
- Bari. "Makanan Sehat Untuk Balita (Umur 2 Tahun Khususnya)." <http://dimakanansehat.blogspot.com>. Diakses pada Tanggal 26 Februari 2013.
- BPPN. *Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2006 – 2010*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2007.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: J-ART, 2005.
- \_\_\_\_\_. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid VII. Edisi yang Disempurnakan. Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- Depkes RI. *Keunggulan Asi dan Manfaat Menyusui*. Depkes RI. 2001.
- \_\_\_\_\_. *Modul Pelatihan Revitalisasi Posyandu*. Jakarta: Depkes RI. 2006.
- \_\_\_\_\_. *Pedoman Umum Pemberian Makanan Pendamping Air Susu Ibu (Mp-Asi) Lokal Tahun 2006*. Jakarta: Depkes RI. 2006.
- Dinkes. *Laporan Penderita Gizi Kurang dan Sangat Kurang Puskesmas Mangasa Bulan Desember Tahun 2012*. Makassar: PKM Mangasa, 2012.
- Dewi, Nur Rahma. "Hubungan Pola Asuhan Gizi dengan Status Gizi Balita Usia 6-24 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Tinggimoncong Kab. Gowa." Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2010.

- Fajriani. "Gambaran Pola Asuh Ibu pada Balita Gizi Kurang dan Buruk Usia 12-59 Bulan di Kelurahan Maccini Sombala Wilayah Kerja Puskesmas Tamalate Kota Makassar Tahun 2011." Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2011.
- Fitriyani, Dani "Keajaiban Air Susu Ibu? Nikmat dan Ajib...." <http://www.eramuslim.com>. Diakses Pada Tanggal 25 Februari 2013.
- Gassing, Qadir, ed. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Makalah, Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Makassar: Alauddin Press, 2008.
- Gultom, Parulian D. "Pengaruh Karakteristik Ibu Balita terhadap Partisipasi dalam Penimbangan Balita (D/S) di Posyandu Desa Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan Tahun 2010." Skripsi Sarjana, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara, Medan, 2010.
- Hanifa, Ledia. "Gizi Balita Cermin Masa Depan Kita." <http://kppri.dpr.go.id>. Diakses Pada Tanggal 7 Februari 2013.
- Hayati, Laila. "Makanan Sehat untuk Balita, Apa Saja?." <http://www.republika.co.id>. Diakses Pada Tanggal 26 Februari 2013.
- Husin, Cut Ruhana. "Hubungan Pola Asuh Anak dengan Status Gizi Balita Umur 24-59 Bulan di Wilayah Terkena Tsunami Kabupaten Pidie Propinsi Nangroe Aceh Darussalam Tahun 2008." Tesis, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2008.
- Inadiar, Disha. "Perbedaan Pola Asuh, Asih, Asuh pada Balita Status Gizi Kurang dan Status Gizi Normal (Studi di Wilayah Kerja Puskesmas Peneleh, Surabaya)." Skripsi Sarjana, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Surabaya, 2010.
- Indriyani Sri. "Gizi buruk dan Pola Asuh Anak." <http://suara.merdeka.com>. Diakses pada tanggal 20 Desember 2013.
- Katsier, Ibnu. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier*, jilid 1. Terj. Salim Bahreisy dan Said Bahreisy. Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1988.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak Nomor: 1995/MENKES/SK/XII/2010.
- Khomsan, Ali. "Pengaruh Pola Asuh Orangtua Terhadap Status Gizi Anak." <http://lintascafe.com>. Diakses Pada Tanggal 23 Februari 2013.
- Kuntari Titik. "Mendidik Balita Sadar Kebersihan Sejak Dini." <http://medicine.uii.ac.id>. Diakses Pada Tanggal 20 Desember 2013.

- Lina. "Rekomendasi WHO dan Depkes RI Tentang ASI Eksklusif 6 Bulan." <http://linaazizah.blogspot.com>. Diakses Pada Tanggal 25 Februari 2013.
- Linda, Ony., Dian Kholika Hamal. *Hubungan Pendidikan dan Pekerjaan Orangtua serta Pola Asuh dengan Status Gizi Balita di Kota dan Kabupaten Tangerang, Banten*, Proseding Penelitian Bidang Ilmu Eksakta Prodi Kesehatan Masyarakat FIKES UHAMKA 2011, [www.stkipislambumiayu.ac.id](http://www.stkipislambumiayu.ac.id). Diakses Pada Tanggal 31 Januari 2013.
- Lubis, Ritayani. "Hubungan Pola Asuh Ibu dengan Status Gizi Anak Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat Tahun 2008." Skripsi Sarjana, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara, 2008
- Nadesul, Hendrawan. *Cara Sehat Mengasuh Anak*. Jakarta: Puspa Swara, 1995.
- Naulanifa, Ina. "Pentingnya Kolostrum & Air Susu Ibu." <http://health.okezone.com>. Diakses Pada Tanggal 26 Februari 2013.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.
- PPWS KIA. *Buku Pedoman Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak Edisi Tahun 2009*. 2009.
- Pritasari. "Makanan Pendamping Asi." <http://www.nutriclub.co.id>. Diakses pada tanggal 20 Desember 2013.
- Putri, Gustia Maharta. "Mengenal 'Sejuta' Manfaat Kolostrum." <http://health.okezone.com>. Diakses Pada Tanggal 26 Februari 2013.
- Rahayu, Susilawati. "Pola Asuh dan Status Gizi Anak Balita Keluarga Penerima dan Bukan Penerima Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM)." Skripsi Sarjana, Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2006.
- Rowa, Sitti Saharia. "Perbedaan Pola Asuh Ibu dan Status Gizi Anak Balita yang Lahir Dari Ibu Kurang Energi Kronik (KEK) dan Tidak KEK Waktu Hamil di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan." Tesis, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Jogjakarta, 2003.
- Santoso, Soegeng., Anne Lies Ranti. *Kesehatan dan Gizi*. Jakarta: PT Rineka Cipta dan PT Bina Adiaksara. 2004.

- Sanusi, Sholahudin. "Materi Ajar PAI (Hadits Kebersihan)". <http://sholahudinsanusi.blogspot.com>. Diakses Pada Tanggal 21 Mei 2013.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 1. Jakarta: Lentera Hati. 2009.
- Soenardi, Tuti. *Makanan untuk Tumbuh Kembang Bayi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Soetjningsih. *Tumbuh Kembang Anak*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran, EGC, 1995.
- Supariasa, dkk. *Penilaian Status Gizi*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC. 2002.
- Unicef. "ASI Eksklusif, Artinya ASI, Tanpa Tambahan Apapun." <http://www.unicef.org>. Diakses Pada Tanggal 25 Februari 2013.
- Widaninggar, Widjajanti. *Pola Hidup Sehat dan Segar*. Jakarta: Depdiknas Pusat Pengembangan Kualitas Jasmani, 2003.
- Widodo, Y. "Relationship of Helicobacter pilori Infection with diarrhea and nutritional status among Nutritionally-at-risk Children." *World Journal of Nuclear Medicine*, Vol. 4, No. 3, July 2005.
- Windiarto, Benny "4,7 Juta Balita di Indonesia Mengalami Kurang Gizi." <http://www.lenteramerah.com>. Diakses Pada Tanggal 22 Februari 2013.
- Yuniastuti, Ari. *Gizi dan Kesehatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2008.
- Zeitlin, M.G and Mansour, M. *Positive Deviance in Child Nutrition*. Japan: The United Nations University Press, Tokyo, 1990.