

**EFEKTIFITAS ALGA COKLAT (*Sargassum sp.*) SEBAGAI  
PAKAN KONSENTRAT TERHADAP LINGKAR SCROTUM  
SAPI BALI**



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Peternakan Jurusan Ilmu Peternakan  
pada Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar*

Oleh :

**MUHKLISANI**  
**60700114015**

**JURUSAN ILMU PETERNAKAN  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN  
MAKASSAR  
2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHKLISANI  
NIM : 60700114015  
Tempat/Tgl. Lahir : Bulukumba, 18 Oktober 1996  
Jurusan : Ilmu Peternakan  
Fakultas : Sains dan Teknologi  
Alamat : BTN Graha Surandar 2 Blok B No. 10  
Judul : Efektifitas Alga Coklat (*Sargassum* sp.) Sebagai Pakan Konsentrat terhadap Lingkar Scrotum Sapi Bali

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 20 Agustus 2018

Penyusun,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S



**MUHKLISANI**  
60700114015

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi saudara **MUHKLISANI**, NIM: 60700114015, mahasiswa Jurusan Ilmu Peternakan pada Fakultas Sains dan Teknologi, setelah dengan saksama meneliti dan mengoreksi Skripsi yang bersangkutan dengan judul, “Efektifitas Alga Coklat (*Sargassum* sp.) Sebagai Pakan Konsentrat terhadap Lingkar *Scrotum* Sapi Bali” memandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke *Munaqasyah*.


Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Gowa, 20 Agustus 2018

Pembimbing I

  
Hj. Jumriah Syam, S.Pt., M.Si.  
Nip. 19720727 200003 2 008

Pembimbing II

  
Hj. Irmawaty S.Pt., M.P

Mengotahui  
Ketua Jurusan Ilmu Peternakan

  
Dr. Ir. Basir Paly, M.Si  
Nip. 195907121986031002

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Efektifitas Alga Coklat (*Sargassum* sp.) sebagai Pakan Konsentrat terhadap Lingkar *Scrotum* Sapi Bali” yang disusun oleh **MUHKLISANI, NIM: 60700114015**, mahasiswa Jurusan Ilmu Peternakan pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 06 Agustus 2018, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Peternakan pada Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Samata-Gowa, 20 Agustus 2018 M  
Dzul-Hijjah 1439 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. M.Thahir Maloko, M.HI. (.....)

Sekretaris : drh. Aminah Hajah Thaha, M.Si (.....)

Munaqisy I : Dr. Ir. Basir Paly, M.Si (.....)

Munaqisy II : Dr. Muh. Sabri AR, M. Ag. (.....)

Pembimbing I : Hj. Jumriah Syam, S.Pt., M.Si (.....)

Pembimbing II : Irmawaty, S.Pt., M.P. (.....)

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi  
UII Alauddin Makassar



Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.  
NIP. 1969205 199303 1 001

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Atas berkat dan bimbingannya serta karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Adapun judul dari skripsi ini adalah “ **Efektifitas Alga Coklat (*Sargassum sp.*) Sebagai Pakan Konsentrat terhadap Lingkar *Scrotum Sapi Bali* ” yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.**

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad saw, beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Penulis menyadari bahwa karya ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberi dukungan, doa, semangat, pelajaran dan pengalaman berharga pada penulis sejak penulis menginjak bangku perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini.

Selama penyusunan skripsi, tentunya tidak lepas dari berbagai hambatan dan tantangan, namun berkat petunjuk, bimbingan, arahan, do'a serta dukungan moril dari berbagai pihak maka hambatan dan tantangan tersebut dapat teratasi. Untuk itu, perkenankanlah penulis menghanturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang istimewa kepada Ibunda tercinta **Roslina** dan Ayahanda tercinta **Asrullah** karena mereka saya bisa sampai ketahap ini yang pastinya tidak lepas dari doa dan dukungan tanpa pamrih, penuh kasih sayang membesarkan dan

mendidik penulis sejak kecil hingga menyelesaikan pendidikan seperti saat ini. Terima kasih pula kepada adik-adik penulis **Rhodiatul Azhari, Rahmat Ridho, Azzarah Ramadhani dan Muhammad Zildham** yang memberi semangat selama proses penyusunan skripsi ini.

Terselesaikannya skripsi ini juga tidak lepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Musafir Pabbabari, M.Si** selaku rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. **Bapak Prof. Dr.H. Arifuddin, M.Ag.** selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, , **Dr. Wasilah, S.T, M.T** Selaku wakil dekan 1 bidang akademik Fakultas Sains, **Dr. M. Thahir Maloko, M.Th.I** Selaku wakil dekan 2 bidang administrasi Fakultas Sains dan Teknologi, dan **Dr. Ir. Andi Suarda, M. Si** selaku wakil dekan 3 bidang kemahasiswaan Fakultas Sains dan Teknologi.
3. **Bapak Dr. Ir. Muh. Basir Paly, M.Si** selaku Ketua Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan dan ibu **Astati, S.Pt., M. Si** selaku sekretaris Jurusan Ilmu Peternakan.
4. **Ibunda Hj. Jumriah Syam S.Pt., M.Si.** selaku Dosen Pembimbing pertama, dan **Ibunda Irmawaty S.Pt., M.P** selaku Dosen Pembimbing kedua, atas bimbingan dan panutannya selama ini dan banyak meluangkan

waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis mulai dari penyusunan proposal sampai penyelesaian skripsi ini.

5. **Bapak Dr. Ir. Muh. Basir Paly, M.Si dan Dr. Muh. Sabri AR, M.Ag.** selaku penguji yang telah memberikan saran dan kritikan yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. **Bapak Zhulyadeni S.Pt. dan Ibunda Nurfatimah Jamrah S.pt** beserta keluarga yang telah menyediakan tempat dan membantu proses penelitian.
7. **Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Peternakan** atas bimbingan dalam kegiatan perkuliahan, baik dalam tatap muka maupun arahan-arahan diluar perkuliahan.
8. **Ibu Drh. Aminah Thaja M.Si, Bapak Muh. Arsan Jamili S.Pt., M.Si** dan, **Ibu Hikmawati S.Pt** selaku Laboran Jurusan Ilmu Peternakan yang telah memberikan ilmunya selama menjadi asisten laboratorium sampai dengan proses selesainya penelitian.
9. **Kak Andi Afriana, S.E** selaku Staff Jurusan Ilmu Peternakan yang telah membantu segala persuratan dari proposal hingga skripsi.
10. **Indra** dan Sahabat saya yang tergabung dalam grup princess (**Ilmi, Ute, Eki, Dila, Baya, Eka**), yang selama ini telah hadir dalam suka dan duka mulai dari awal perkuliahan sampai proses selesainya skripsi ini.
11. Tim penelitian *Sargassum* sp. (**Ilmi, Rizal, Rifal, Baya, Dila, Ute**) atas kerja sama dan kerja kerasnya selama proses penelitian berlangsung.

12. Buat teman-teman seangkatanku **Ilmu Peternakan Angkatan 2014** terima kasih atas bantuan, kebersamaan dan canda tawanya yang selama ini terjalin.

13. Senior dan Adik-adik di jurusan Ilmu Peternakan.

14. Teman-teman **KKN Angkatan 58 Desa Mario dan Desa Tumale Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu.**


15. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Makassar, 9 Juli 2018



Muhklisani



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## DAFTAR ISI

	Hal
SAMPUL .....	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
ABSTRAK .....	xiii
ABSTRACK .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Hipotesis.....	4
F. Definisi Operasional.....	5
G. Kajian Terdahulu.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Integrasi Keilmuan Al'Quran.....	8
B. Karakteristik Sapi Bali.....	10
C. Jenis Pakan Ternak.....	13
D. Alga Coklat ( <i>Sargassum</i> sp.).....	24
E. Anatomi dan Fisiologi Organ Reproduksi Sapi Jantan.....	28
F. Faktor yang Mempengaruhi Sistem Reproduksi Sapi Jantan .....	44
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Waktu dan Tempat .....	48
B. Alat dan Bahan.....	48
C. Jenis Penelitian.....	50
D. Parameter yang diukur.....	50
E. Prosedur Kerja.....	50
F. Analisis Data .....	51
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pengaruh Pemberian <i>Sargassum</i> sp. Terhadap Lingkar <i>Scrotum</i> .....	53
B. Integrasi Keilmuan .....	56

BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA .....	60
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## DAFTAR GAMBAR

No	Teks	Hal
1.	Alga Coklat ( <i>Sargassum sp</i> ).....	25
2.	Pengumpulan Bahan Pakan.....	66
3.	Pengangkutan Bahan Pakan .....	66
4.	Pengeringan Bahan Pakan.....	67
5.	Penghalusan Bahan Pakan.....	67
6.	Penimbangan Bahan Pakan.....	68
7.	Pencampuran Bahan Pakan.....	68
8.	Pengukuran Lingkar <i>Scrotum</i> .....	69



## DAFTAR GRAFIK


No	Teks	Hal
1.	Grafik Pertambahan Lingkar <i>Scrotum</i> .....	55



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## DAFTAR TABEL

No	Teks	Hal
1.	Komposisi Pakan Konsentrat.....	49
2.	Hasil Analisis Proksimat Alga Coklat ( <i>Sargassum</i> sp).....	49
3.	Nilai rata-rata Pengaruh Pemberian <i>Sargassum</i> sp Terhadap Lingkar <i>Scrotum</i> Sapi Bali.....	53



## ABSTRAK

**Nama** : Muhklisani  
**Nim** : 60700114015  
**Jurusan** : Ilmu Peternakan  
**Judul** : Efektifitas Alga Coklat (*Sargassum sp.*) Sebagai Pakan Konsentrat Terhadap Lingkar *Scrotum* Sapi Bali

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Alga Coklat (*Sargassum sp.*) sebagai pakan konsentrat terhadap lingkar *Scrotum* Sapi Bali. Penelitian dilaksanakan pada Bulan Desember 2017 sampai dengan Bulan Februari 2018, bertempat di Usaha Peternakan Rakyat di Desa Pajukukang Kecamatan Lumpangan Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan. Jenis penelitian adalah eksperimental, menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan pola 2x5 yaitu 2 perlakuan, perlakuan P<sub>0</sub> (tanpa menggunakan *Sargassum sp.*) dan P<sub>1</sub> (menggunakan *Sargassum sp.*) dengan masing-masing 5 ulangan. Jumlah sapi yang digunakan dengan umur dan berat badan rata-rata yaitu 2 (dua) tahun/ ±150 kg/ekor. Analisis data menggunakan uji t (*t-Test Independent Sample*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian Alga Coklat (*Sargassum sp.*) sebagai pakan konsentrat adalah tidak terdapat perbedaan nyata ( $p > 0.05$ ) terhadap lingkar *Scrotum* Sapi Bali.

*Kata kunci* : Alga Coklat (*Sargassum sp.*), Lingkar *Scrotum*, Pakan Konsentrat, Sapi Bali.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## ABSTRACT

**Nama** : Muhklisani  
**Nim** : 60700114015  
**Jurusan** : Animal Science  
**Judul** : Effectiveness of Chocolate Algae (*Sargassum* sp.) As Feed Concentrate To Scrotum Cow Bali

---

This research aims to know the effectiveness of Brown algae (*Sargassum* sp.) as the feed concentrate against the Scrotum circumference Wallaby. The research was carried out in December 2017 until February 2018, at the Farm in the village of Pajukukang sub-district of Bantaeng Regency of South Sulawesi, Lumpang. This type of research is experimental, using a complete Randomized Design (RAL) with a pattern of 2x5 i.e. two treatments, treatment of P0 (without using the *Sargassum* sp.) and P1 (using the *Sargassum* sp.) with each 5 replicates. The number of cattle that are used with the age and weight of the average that is 2 (two) years/ $\pm$  150 kg/tail. Analysis using t-test (*t-Independent Test Sample*). The results showed that the granting of Brown algae (*Sargassum* sp.) as feed concentrates is there is no real distinction ( $p > 0.05$ ) against the Scrotum circumference Wallaby.

*Key words* : Brown algae (*Sargassum* sp.), feed Concentrates, Scrotum Circumference, Wallaby.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang**

Sapi Bali merupakan *Breed* sapi asli Indonesia mempunyai potensi yang besar, Perkembangan Sapi Bali sangat cepat dibanding dengan *Breed* potong lainnya, hal menyebabkan *Breed* ini lebih diminati oleh petani kecil. Beberapa keunggulan Sapi Bali yaitu tingkat kesuburannya tinggi, persentase karkas tinggi, daya adaptasi yang tinggi terhadap lingkungan dan persentase beranak dapat mencapai 80 persen, Menurut Lukmanul (2012), bahwa beberapa kelebihan yang dimiliki Sapi Bali adalah mempunyai fertilitas dan persentase karkas yang tinggi, kadar lemak daging yang rendah, dan mampu memanfaatkan pakan berkualitas rendah, serta memberikan respon cukup baik dalam perbaikan pakan, selain itu juga terdapat kekurangan yang dimiliki Sapi Bali diantaranya mudah terserang penyakit dan pertumbuhannya lambat, olehnya itu diperlukan strategi pemberian pakan yang tepat untuk memacu pertumbuhannya seperti pemberian pakan konsentrat.

Peternakan di Indonesia saat ini masih mengalami kekurangan pasokan sapi bakalan, karena penambahan populasi tidak seimbang dengan kebutuhan nasional. Menurut Sulaeman (2015), bahwa kuota impor sapi bakalan untuk periode 2016 ditetapkan di kisaran 600.000-700.000 ekor. Untuk itu peran penting pakan dalam pemeliharaan sapi sehingga peternakan sapi bisa mengalami keberhasilan yang tinggi. Pakan memiliki peranan penting bagi ternak, baik untuk

pertumbuhan ternak muda maupun untuk mempertahankan hidup dan menghasilkan produk (susu, anak dan daging) serta tenaga bagi ternak dewasa. jenis pakan yang diberikan pada ternak harus bermutu baik dan dalam jumlah cukup. Pakan yang sering diberikan pada ternak kerja antara lain berupa hijauan dan konsentrat. Menurut Fairuz (2015), menyatakan konsentrat adalah bahan makanan yang memiliki kadar protein dan karbohidrat yang tinggi serta kandungan serat kasar yang rendah dibawah 18% dan konsentrat memiliki fungsi bagi ternak untuk meningkatkan gizi, konsumsi pakan lebih baik dan mempercepat pertumbuhan pada ternak.

*Scrotum* adalah organ reproduksi pada ternak jantan yang mempunyai fungsi vital dalam memproduksi sperma pada ternak jantan. *Scrotum* merupakan kantung yang di dalamnya berisi testis yang berjumlah sepasang, yaitu *Scrotum* kanan dan *Scrotum* kiri, diantara *Scrotum* kanan dan *Scrotum* kiri dibatasi oleh sekat yang berupa jaringan ikat dan otot polos (otot *Dartos*). Otot *Dartos* berfungsi untuk menggerakkan *Scrotum* sehingga dapat mengerut dan mengendur, di dalam *Scrotum* juga terdapat serat-serat otot yang berasal dari penerusan otot lurik dinding perut yang disebut otot *Kremaster*. Otot ini bertindak sebagai pengatur suhu lingkungan testis agar kondisinya stabil. Proses pembentukan sperma (*Spermatogenesis*) membutuhkan suhu yang stabil, yaitu beberapa derajat lebih rendah daripada suhu tubuh. Rendahnya produktivitas dapat disebabkan oleh kualitas dan ketersediaan pakan yang rendah, pakan yang tidak efisien dalam memacu peningkatan produksi dan reproduksi serta sistem reproduksi pada ternak itu sendiri. Menurut Sarwono (2006), pemberian nutrisi pakan yang rendah

menyebabkan penghambatan pertumbuhan pejuantan muda atau penurunan berat badan hewan dewasa, maka terlihat atrofi testes dan penurunan jumlah *Spermatozoa*.

Terdapat banyak jenis rumput laut dan tersebar luas di perairan Indonesia seperti Alga Coklat (*Sargassum* sp.). Menurut Wiqayah (2011), bahwa *Sargassum* sp. merupakan sejenis tumbuhan tingkat rendah jenis alga yang habitatnya dilaut tropis. Ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh *Sargassum* sp. antara lain memiliki pigmen *Fukosantin* (coklat), *Thallus* pipih, licin, batang utama bulat agak kasar, dan *Holdfast* (bagian yang digunakan untuk melekat) berbentuk cakram. Cabang pertama timbul pada bagian pangkal sekitar 1 cm dari *Holdfast*. Menurut Erywan (2012), bahwa *Sargassum* sp. mengandung senyawa-senyawa aktif *Steroid*. *Steroid* merupakan senyawa yang memiliki kerangka dasar *Triterpena asiklik* pada umumnya merupakan hormon (zat pemacu) seperti pada empedu dan reproduksi hewan dan manusia. Selanjutnya menurut Setiawan (2001), bahwa hormon-hormon seks yang dihasilkan terutama dalam testis dan indung telur adalah suatu *Steroid*, hormon jantan disebut *Androgen* sedangkan untuk betina *Estrogen* dan *Progestin*. *Steroid* dapat dijumpai pada hampir semua jaringan hewan. Kandungan *Sargassum* sp. lainnya adalah *Alkaloida*, *Fenol*, dan *Triterpenoid* yang berfungsi sebagai antibakteri, antivirus dan anti jamur, sehingga pemanfaatan *Sargassum* sp. dalam berbagai bidang berkembang pesat sebagai bahan makanan, bahan bakar (*Fuels*), kosmetik, obat-obatan, serta bahan pakan tambahan. Menurut Lestari (2015) bahwa, Alga Coklat (*Sargassum* sp.) memiliki kandungan nutrisi yang tinggi yang dimanfaatkan sebagai pakan pada ikan untuk

meningkatkan laju pertumbuhan dan dapat meningkatkan daya tahan tubuh ikan gurami (*Osphronemus gouramy lac*).

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka, akan dilakukan penelitian tentang "Efektifitas Alga Coklat (*Sargassum sp.*) sebagai pakan konsentrat terhadap lingkaran *Scrotum* Sapi Bali di kabupaten Bantaeng".

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka permasalahan pokok pada penelitian ini adalah bagaimana efektivitas Alga Coklat (*Sargassum sp.*) sebagai pakan konsentrat terhadap lingkaran *Scrotum* Sapi Bali.

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Alga Coklat (*Sargassum sp.*) sebagai pakan konsentrat terhadap lingkaran *Scrotum* Sapi Bali.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Sebagai bahan informasi awal mengenai potensi pemanfaatan Alga Coklat (*Sargassum sp.*) sebagai pakan ternak.
2. Sebagai bahan informasi bagi peneliti lainnya mengenai efektivitas Alga Coklat (*Sargassum sp.*) sebagai pakan konsentrat pada lingkaran *Scrotum* Sapi Bali.

### **E. Hipotesis**

Hipotesis dari penelitian ini adalah diduga bahwa pemberian Alga Coklat (*Sargassum sp.*) sebagai pakan konsentrat dapat mempengaruhi lingkaran *Scrotum* Sapi Bali.

## F. Defenisi Operasional

1. Sapi Bali (*Bos sondaicus*) adalah sapi yang telah mengalami proses domestikasi yang terjadi sebelum 3.500 SM di wilayah Pulau Jawa atau Bali dan Lombok, yang mempunyai daya produktivitas tinggi dan tersebar luas di Indonesia.
2. Alga Coklat (*Sargassum* sp.) merupakan sejenis tumbuhan tingkat rendah jenis alga yang habitatnya dilaut tropis. Karakteristik yang dimiliki oleh *Sargassum* sp. antara lain memiliki pigmen *Fukosantin* (coklat), *Thallus* pipih, licin dan batang utama bulat agak kasar, dapat digunakan sebagai bahan pakan yang bisa diolah dalam bentuk tepung kemudian dicampur dengan bahan pakan yang lain menjadi pakan konsentrat.
3. Lingkar *Scrotum* atau yang sering di sebut lingkaran testis adalah bagian dari sistem reproduksi yang membugkus testis. *Scrotum* berfungsi untuk melindungi dan menyokong testis, mengatur temperatur testis dan *Epididymis* supaya temperatur dalam testis 4-7 °C dibawah temperatur tubuh.
4. Pakan konsentrat adalah campuran dari beberapa bahan pakan yang mudah untuk dicerna karena terbuat dari campuran bahan pakan yang mengandung sumber energi yang melengkapi kekurangan gizi dari hijauan pakan ternak, campuran bahan pakan yang diberikan pada ternak adalah bungkil kelapa 10%, dedak padi 50%, garam 1%, jagung 10%, mineral 1%, molases 3%, *Sargassum* sp. 15% dan tepung kulit coklat 10%.

### G. Kajian Terdahulu

Rahma F.W (2015). “Pengaruh Pemberian Ekstrak *Sargassum* sp. dengan Pelarut Metanol pada Pakan Terhadap Jumlah Eritrosit dan Differensial Leukosit Ikan Lele Dumbo (*Clarias gariepinus*)”. Penelitian bertujuan pemberian ekstrak *Sargassum* sp, mampu meningkatkan jumlah *Eritrosit* dan *Differensial leukosit* (jumlah *Neutrofil*, *Monosit* dan *Limfosit*) pada ikan lele dumbo ( *Clarias gariepinus*) secara optimal sehingga dapat mengoptimalkan kekebalan tubuh ikan. Penelitian menggunakan metode eksperimental dengan rancangan acak lengkap (RAL) yang terdiri dari 4 perlakuan dan 5 ulangan, yaitu 0 (K), 5 (A), 10 (B) dan 15 (C) g ekstrak / kg pakan . Pengambilan darah dilakukan setiap 7 hari sekali selama 21 hari pemberian pakan. *Sargassum* sp. diekstraksi dengan metode maserasi menggunakan pelarut metanol dimana hasil ekstraksi dicampurkan pada pakan. Hasil pengamatan terhadap darah ikan uji adalah penggunaan ekstrak *Sargassum* sp. yang dicampurkan pada pakan dengan dosis 5, 10 dan 15 g/kg pakan selama 21 hari memberikan pengaruh terhadap jumlah *Eritrosit* dan *Prosentase limfosit* darah ikan lele dumbo. Pada dosis C (15 g ekstrak / kg pakan) memberikan nilai *Eritrosit* tertinggi di hari ke-21 yakni  $16.84 \pm 1.56 \times 10^5$  sel/mm<sup>3</sup> dan memberikan *Prosentase limfosit* tertinggi di hari ke-21 dibandingkan perlakuan yang lainnya yaitu  $86.00 \pm 3.81$  %. Hasil uji lanjut perlakuan A, B dan C tidak terlihat perbedaan yang nyata antar perlakuan. Analisis statistik menunjukkan penambahan ekstrak tidak berpengaruh nyata terhadap persentase *Neutrofil* dan *Monosit* dari darah ikan. Penambahan ekstrak *Sargassum* sp.

dengan dosis 15 g ekstrak /kg pakan memberikan efektifitas (respon tanggap kebal ) paling optimal dibandingkan kedua dosis yang lain.

Herliatika (2015), telah meneliti tentang “*Evaluasi Kandungan dan Ketersediaan Mineral Beberapa Jenis Rumput Laut Sebagai Sumber Mineral bagi Ternak Perah*”. Tujuan penelitian yaitu mengevaluasi kandungan dan ketersediaan mineral (Ca, P, Na, K dan Mg) rumput laut secara *In vitro* lebih lanjut penelitian ini ditujukan untuk mengetahui ketersediaan mineral beberapa jenis rumput laut diperairan Indonesia, secara *In vitro* menggunakan rumen dari sapi. Penelitian menggunakan metode eksperimental kandungan dan ketersediaan mineral secara *In vitro*. Rumput laut yang akan digunakan adalah *Sargassum* sp., *Gelidium* sp., *Gracilaria* sp., *Eucheuma cottonii* dan *Eucheuma cottonii* ukuran jumbo. Kandungan mineral rumput laut diuji menggunakan pengabuan basah, sedangkan ketersediaan mineral diukur melalui persen kelarutan dalam rumen pada 6 dan 24 jam dan selama 12 jam dalam HCl. Data kandungan mineral dan kelarutan dalam HCl dianalisis secara deskriptif, sedangkan data kelarutan dalam cairan rumen dianalisis menggunakan ANOVA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rumput laut jenis *Phaeophyta* dan *Rhodophytae* yang sering dibudidayakan di Indonesia berpotensi untuk dijadikan sumber mineral makro, khususnya mineral Mg dan K.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### ***A. Integrasi Keilmuan mengenai Tumbuhan Laut dan Ternak Sapi dalam Al'Quran***

Alam semesta dengan segala isinya diciptakan pasti mengandung manfaat hanya untuk kepentingan makhluk hidup, seperti ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang sapi terdapat pada QS.An-Nur/24:45 yang berbunyi:

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِۦ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ ۗ خَلَقَ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٥﴾

Terjemahnya:

“Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, Maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan dua kaki sedang sebagian (yang lain) berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya, Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu” (Kementerian agama, RI, 2012).

Ayat tersebut menjelaskan tentang berfirman tentang kerajaan yang besar dan kekuasaan Allah swt. yang meliputi segala sesuatu, dia telah menciptakan berbagai ragam makhluk yang berbeda-beda dan dia dia pula telah menciptakan semua jenis hewan dari air, diantara jenis hewan itu ada yang berjalan dengan perutnya seperti ular, ada yang berjalan dengan dua kaki seperti burung, ada pula yang berjalan dengan empat kaki seperti kebanyakan binatang ternak seperti sapi. Allah swt. menciptakan hewan seperti kambing, sapi, burung, termasuk manusia berasal dari air. Dalam ayat lain di jelaskan bahwa manusia diciptakan berasal dari air, air yang dimaksud di sini adalah air mani. Begitu halnya hewan bisa juga Allah swt. Ciptakan dari air mani.

Adapun ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang pentingnya memanfaatkan sumber daya alam, yaitu pada Q.S. Al Baqarah/2 :164 yaitu:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٤﴾

Tejemahnya:

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan” (Kementerian agama, RI, 2012).

Alam semesta dengan segala isinya diciptakan Allah swt. hanya untuk kepentingan makhluk hidup, segala sesuatu yang diciptakan pasti mengandung manfaat. Ayat diatas mengandung penjelasan bahwa semua makhluk ciptaan-Nya tidak diciptakan dengan percuma. Allah swt. tidak menciptakan sesuatu di alam semesta ini dengan sia-sia dan tidak mempunyai hikmah yang mendalam dan tujuan tertentu yang akan membahagiakan umat-Nya di dunia dan akhirat. Sebagaimana perairan darat, perairan laut juga sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Secara umum perairan laut dapat dimanfaatkan sebagai sarana transportasi, usaha perikanan, usaha pertambangan, sumber bahan baku obat-obatan dan kosmetika, sumber energi, rekreasi serta pendidikan dan penelitian. Perairan laut terutama di laut dangkal merupakan tempat yang sangat bagus untuk usaha budi daya rumput laut. Selain sebagai sumber bahan makanan dan minuman, unsur

kimia yang terdapat di dalam rumput laut dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan kosmetika dan obat. *Sargassum* sp. dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak sapi, pengolahan yang dilakukan tersebut yaitu dikeringkan kemudian dihaluskan menjadi tepung dan dijadikan konsentrat, pemanfaatannya secara langsung sebagai pakan ternak sapi mampu memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan dalam tubuh sapi untuk lebih mengoptimalkan kandungan yang ada dalam *Sargassum* sp. tersebut ditambahkan dedak, tongkol jagung, dan mineral agar mendapat hasil yang lebih baik.

### **B. Karakteristik Sapi Bali**

Sapi Bali memiliki ciri-ciri : warna bulunya pada badannya akan berubah sesuai usia dan jenis kelaminnya, sehingga termasuk hewan *Dimorphism-sex*. Pada saat masih “pedet”, bulu badannya berwarna sawo matang sampai kemerahan, setelah dewasa Sapi Bali jantan berwarna lebih gelap bila dibandingkan dengan Sapi Bali betina. Warna bulu Sapi Bali jantan biasanya berubah dari merah bata menjadi coklat tua atau hitam setelah sapi itu mencapai dewasa kelamin sejak umur 1,5 tahun dan menjadi hitam mulus pada umur 3 tahun. Warna hitam dapat berubah menjadi coklat tua atau merah bata apabila sapi itu dikebiri, yang disebabkan pengaruh hormon *Testosteron* (Suatyo, 2013). Sapi Bali merupakan plasma nutfa Indonesia yang penyebarannya sangat luas di Indonesia, adapun beberapa kelebihan yang dimiliki oleh Sapi Bali yaitu kemampuan adaptasi di lingkungan yang memiliki ketersediaan pakan berkualitas rendah dan fertilitas pada Sapi Bali sangatlah baik. Sapi Bali pertama kali di

domestikasi di Propinsi Bali dan sekarang menjadi pusat pemurniaan Sapi Bali dan sangat proteksi bagi masuknya sapi bangsa lain (Feradis, 2010).

Sapi Bali mempunyai ciri-ciri fisik yang seragam, dan hanya mengalami perubahan kecil dibandingkan dengan leluhur liarnya (Banteng). Warna sapi betina dan anak atau muda biasanya coklat muda dengan garis hitam tipis terdapat di sepanjang tengah punggung. Warna sapi jantan adalah coklat ketika muda tetapi kemudian warna ini berubah agak gelap pada umur 12-18 bulan sampai mendekati hitam pada saat dewasa, kecuali sapi jantan yang dikastrasi akan tetap berwarna coklat. Pada kedua jenis kelamin terdapat warna putih pada bagian belakang paha (pantat), bagian bawah (perut), keempat kaki bawah (*White stocking*) sampai di atas kuku, bagian dalam telinga, dan pada pinggiran bibir atas. (Astuti, 2011).

Menurut Toleng (2014), bahwa di samping pola warna yang umum dan standar, pada Sapi Bali juga ditemukan beberapa pola warna yang menyimpang yaitu:

- 1) *Sapi Injin* adalah Sapi Bali yang warna bulu tubuhnya hitam sejak kecil, warna bulu telinga bagian dalam juga hitam, pada yang jantan sekalipun dikebiri tidak terjadi perubahan warna.
- 2) *Sapi Mores* adalah Sapi Bali yang semestinya pada bagian bawah tubuh berwarna putih tetapi ada warna hitam atau merah pada bagian bawah tersebut.
- 3) *Sapi Tutul* adalah Sapi Bali yang bertutul-tutul putih pada bagian tubuhnya.

- 4) Sapi *Bang* adalah Sapi Bali yang kaos putih pada kakinya berwarna merah.
- 5) Sapi *Panjut* adalah Sapi Bali yang ujung ekornya berwarna putih.
- 6) Sapi *Cundang* adalah Sapi Bali yang di dahinya berwarna putih.

Kemampuan reproduksi Sapi Bali adalah terbaik di antara sapi-sapi lokal di Indonesia, karena Sapi Bali bisa beranak setiap tahun. Dengan manajemen yang baik penambahan berat badan harian bisa mencapai 0,7 kg per hari. Keunggulan yang lain bahwa Sapi Bali mudah beradaptasi dengan lingkungan yang baru, sehingga sering disebut ternak perintis (Sutama, 2011). Seleksi Sapi Bali dapat menyebabkan perubahan keragaman genetik, tergantung dari cara seleksi yang digunakan. Seleksi secara langsung mengakibatkan ragam genetik berkurang sampai tercapainya keadaan konstan pada suatu generasi tertentu. Beberapa sifat yang mempunyai nilai ekonomis tinggi meliputi fertilitas, daya hidup, nilai karkas, bobot lahir, bobot sapih, tipe dan konformasi tubuh, bobot dan kualitas bulu (Nuryadi, 2010).

Pemberian pakan pada sapi dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu sistem penggembalaan (*Pasture fattening*), kereman (*Dry lot fattening*), kombinasi cara pertama dan kedua. Pakan yang diberikan berupa hijauan dan konsentrat. Hijauan yang berupa jerami padi, pucuk daun tebu, lamtoro, alfalfa, rumput gajah, rumput benggala atau rumput raja. Hijauan diberikan siang hari setelah pemerahan sebanyak 30-50 kg/ekor/hari. Pakan berupa rumput bagi sapi dewasa umumnya diberikan sebanyak 10% dari bobot badan (BB) dan pakan tambahan sebanyak 1-2% dari BB (Suatyo, 2013).

### **C. Jenis-Jenis Pakan Ternak**

Pakan adalah semua yang bisa dimakan oleh ternak dan tidak mengganggu kesehatannya. Pada umumnya pengertian pakan (*Feed*) digunakan untuk hewan yang meliputi kuantitatif, kualitatif, kontinuitas serta keseimbangan zat pakan yang terkandung di dalamnya (Fairuz, 2015). Menurut Hidayat (2011), bahwa bahan pakan adalah (bahan makanan ternak) adalah segala sesuatu yang dapat diberikan kepada ternak baik yang berupa bahan organik maupun anorganik yang sebagian atau semuanya dapat dicerna tanpa mengganggu kesehatan ternak. Bahan pakan terdiri dari bahan organik dan anorganik. Bahan organik yang terkandung dalam bahan pakan, protein, lemak, serat kasar, bahan ekstrak tanpa nitrogen, sedang bahan anorganik seperti kalsium, fosfor, magnesium, kalium, natrium. Kandungan bahan organik ini dapat diketahui dengan melakukan analisis proximat dan analisis terhadap vitamin dan mineral untuk masing masing komponen vitamin dan mineral yang terkandung didalam bahan yang dilakukan di laboratorium dengan teknik dan alat yang spesifik.

Pakan konsentrat merupakan sumber nutrient yang paling utama bagi ternak. Komponen utama penyusun pakan adalah berupa biji-bijian seperti jagung, biji-bijian umumnya mengandung air, karbohidrat, protein, termasuk enzim, lemak, mineral, dan vitamin sehingga bahan pakan tersebut mudah tercemari jamur. Bahan pakan lainnya yang biasa digunakan sebagai penyusun ransum adalah bungkil kedelai, tepung tulang, dedak, polar putih bungkil kelapa, garam, vitamin, mineral, pemacu pertumbuhan, dan tepung ikan (Amdal, 2013).

Pakan konsentrat dikenal sebagai pakan tambahan yang diberikan pada ternak ruminansia untuk tujuan-tujuan tertentu. Lebih lanjut dikatakan pakan tersebut mengandung zat-zat makan utama diantaranya protein, karbohidrat, dan lemak yang mudah dicerna dan mengandung serat kasar dibawah 18 %. Dibidang usaha peternakan ruminansia, konsentrat sering diberi istilah sebagai pakan penguatkarena dinilai mengandung gizi yang lebih tinggi serta mudah dicerna dibandingkan dengan pakan hijauan (Rismani, 2011).

Berdasarkan kandungan gizinya, konsentrat dibagi dua golongan yaitu konsentrat sebagai sumber energi dan sebagai sumber protein. Konsentrat sebagai sumber protein apabila kandungan protein lebih dari 18%, Total *Digestible nutrition* (TDN) 60%. Ada konsentrat yang berasal dari hewan dan tumbuhan. Berasal dari hewan mengandung protein lebih dari 47%. Mineral Ca lebih dari 1% dan P lebih dari 1,5% serta kandungan serat kasar dibawah 2,5%. Contohnya tepung ikan, tepung susu, tepung daging, tepung darah, tepung bulu dan tepung cacing. Berasal dari tumbuhan, kandungan proteinnya dibawah 47%, mineral Ca dibawah 1% dan P dibawah 1,5% serat kasar lebih dari 2,5%. Contohnya : tepung kedelai, tepung biji kapuk, tepung bunga matahari, bungkil wijen, bungkil kedelai, bungkil kelapa, bungkil kelapa sawit dll. Konsentrat sebagai sumber energi apabila kandungan protein dibawah 18%, TDN 60% dan serat kasarnya lebih dari 10%. Contohnya : dedak, jagung, empok dan polar (Kamal, 2014).

Menurut Budiarsana (2013), bahwa jenis-jenis pakan adalah sebagai berikut:

1) Hijauan Segar

Hijauan segar adalah semua bahan pakan yang diberikan kepada ternak dalam bentuk segar, baik yang dipotong terlebih dahulu (oleh manusia) maupun yang tidak (disengut langsung oleh ternak). Hijauan segar umumnya terdiri atas daun-daunan yang berasal dari rumput-rumputan, tanaman bijibijian/ jenis kacang-kacangan. Rumput-rumputan merupakan hijauan segar yang sangat disukai ternak, mudah diperoleh karena memiliki kemampuan tumbuh tinggi, terutama di daerah tropis meskipun sering dipotong/disengut langsung oleh ternak sehingga menguntungkan para peternak/pengelola ternak. Hijauan banyak mengandung karbohidrat dalam bentuk gula sederhana, pati dan *Fruktosa* yang sangat berperan dalam menghasilkan energi.

Hijauan tersebut meliputi rumput-rumputan yaitu rumput gajah (*Pennisetum purpureum*), rumput benggala (*Penicum maximum*), rumput setaria (*Petaria sphacelata*), rumput brachiaria (*Brachiaria decumbens*), rumput mexico (*Euchlena mexicana*) dan rumput lapangan yang tumbuh secara liar. Kedua yaitu kacang-kacangan meliputi lamtoro (*Leucaena leucocephala*), stylo (*Sty-losantes guyanensis*), centro (*Centrocoma pubescens*), *Pueraria phaseoloides*, *Calopogonium muconoides* dan jenis kacang-kacangan lain. Ketiga yaitu daun-daunan meliputi daun nangka, daun pisang, daun turi, daun petai cina dan lain-lain.

## 2) Jerami dan Hijauan Kering

Termasuk kedalam kelompok ini adalah semua jenis jerami dan hijauan pakan ternak yang sudah dipotong dan dikeringkan. Kandungan serat kasarnya lebih dari 18% (jerami, *Hay* dan kulit biji kacang-kacangan).

## 3) *Silase*

*Silase* adalah hijauan pakan ternak yang disimpan dalam bentuk segar biasanya berasal dari tanaman sebangsa padi-padian dan rumput-rumputan

## 4) Konsentrat (pakan penguat)

Konsentrat adalah suatu bahan pakan yang dipergunakan bersama bahan pakan lain untuk meningkatkan keserasian gizi dari keseluruhan makanan dan dimaksudkan untuk disatukan dan dicampur sebagai suplemen (pelengkap) atau pakan pelengkap, contohnya dedak padi, jagung giling, bungkil kelapa, garam dan mineral.

## 5) *Zat Additif*

*Zat Additif* merupakan zat yang perlu ditambahkan dalam jumlah relatif sedikit yang kadangkala diperlukan untuk melengkapi ransum yang disusun, yang berfungsi sebagai penambah aroma/cita rasa, asam amino/ campuran asam amino dan vitamin mix.

## 6) Ransum

Ransum adalah pakan jadi yang siap diberikan pada ternak yang disusun dari berbagai jenis bahan pakan yang sudah dihitung sebelumnya berdasarkan kebutuhan industri dan energi yang diperlukan, berdasarkan bentuknya ransum dibagi menjadi 3 jenis yaitu *Mash*, pellet, dan *Crumble*.

Tsubo *et al.*, (2005) menyatakan bahwa Konsentrat sumber energi adalah bahan makanan ternak yang tinggi kandungan energi dan rendah kandungan serat kasar (<18%), serta umumnya mengandung protein yang lebih rendah dari 20%.

a. Jagung (*Zea mays*)

Tinggi rendahnya produksi jagung tergantung pada tipe jagung yang dipakai, pemupukan serta cuaca. Jagung merupakan pakan yang sangat baik untuk ternak. Jagung sangat disukai ternak dan pemakaiannya dalam ransum ternak tidak ada pembatasan, kecuali untuk ternak yang akan dipakai sebagai bibit. Pemakaian yang berlebihan untuk ternak ini dapat menyebabkan kelebihan lemak. Jagung tidak mempunyai anti nutrisi dan sifat pencahar. Walaupun demikian pemakaian dalam ransum ternak terutama untuk bibit perlu dibatasi karena penggunaan jagung yang tinggi dapat mengakibatkan sulitnya ternak untuk berproduksi. Disamping itu penggunaannya pada ternak muda yang akan dipakai bibit perlu dibatasi karena selain tidak ekonomis bila dipergunakan tinggi dalam ransum juga karena penggunaan yang terlampau tinggi dapat menyulitkan ternak tersebut untuk berproduksi, beberapa sifat jagung antara lain *Palatable*, serat kasar rendah, nilai kecernaannya tinggi yaitu TDN nya sekitar 80% (Rismani, 2011).

Hasan *et al.*, (1990), menyatakan bahwa Nilai energi jagung digunakan sebagai standar untuk membandingkan dengan energi dan bahan pakan butiran lain. Bila energi jagung diberi 100 ternyata nilai energy butiran yang lain adalah <100. Penggunaan jagung sebagai pakan dapat diberikan ternak dalam keadaan masih dalam bentuk bulir utuh, sudah digiling kasar, digiling kasar bersama

tongkol dan masih dalam keadaan segar bersama tongkolnya. Secara kualitatif kualitas butiran jagung dapat diuji dengan menggunakan bulk density ataupun uji apung. *Bulk density* butiran jagung yang baik adalah 626.6 g/liter, sedangkan untuk jagung giling yang baik berkisar antara 701.8 – 722.9 g/liter. Makin banyak jagung yang mengapung berarti makin banyak jagung yang rusak. Selain itu uji organoleptik seperti tekstur, rasa, warna, dan bau dapat dipakai untuk mengetahui kualitas jagung yang baik.

Jagung merupakan butiran yang mempunyai total nutrien tercerna (TDN) dan net energi (NE) yang tinggi. Kandungan TDN yang tinggi (81.9%) adalah karena :

- (1) jagung sangat kaya akan bahan ekstrak tanpa nitrogen (Beta-N) yang hamper semuanya pati,
- (2) jagung mengandung lemak yang tinggi dibandingkan semua butiran kecuali oat,
- (3) jagung mengandung sangat rendah serat kasar, oleh karena itu mudah dicerna. Kandungan protein jagung rendah dan defisiensi asam amino lisin. Dari butiran yang ada, hanya jagung kuning yang mengandung karoten. Kandungan karoten jagung akan menurun dan atau hilang selama penyimpanan (Tsubo *et al.*, 2005 ).

b. Dedak Padi (*Oriza sativa*)

Dedak padi diperoleh dari penggilingan padi menjadi beras. Banyaknya dedak padi yang dihasilkan tergantung pada cara pengolahan. Sebanyak 14.44% dedak kasar, 26.99% dedak halus, 3% bekatul dan 1 -17% menit dapat

dihasilkan dari berat gabah kering. Dedak padi cukup disenangi ternak. Pemakaian dedak padi dalam ransum ternak umumnya sampai 25% dari campuran konsentrat, walaupun tidak mengandung zat antinutrisi, pembatasan dilakukan karena pemakaian dedak padi dalam jumlah besar dapat menyebabkan susahnya pengosongan saluran pencernaan karena sifat pencahar pada dedak. Tambahan lagi pemakaian dedak padi dalam jumlah besar dalam campuran konsentrat dapat memungkinkan ransum tersebut mudah mengalami ketengikan selama penyimpanan (Winarti, 2010).

Secara kualitatif kualitas dedak padi dapat diuji dengan menggunakan *Bulk density* ataupun uji apung. *Bulk density* dedak padi yang baik adalah 337.2 – 350.7 g/l. Makin banyak dedak padi yang mengapung, makin jelek kualitas dedak padi tersebut. Selain itu uji organoleptik seperti tekstur, rasa, warna, bau dan uji sekam (*Flouroglusinol*) dapat dipakai untuk mengetahui kualitas dedak padi yang baik. Bau tengik merupakan indikasi yang baik untuk dedak yang mengalami kerusakan. Kualitas dedak padi secara kuantitatif dapat dilakukan dilaboratorium dengan menggunakan metode proksimat. Dedak padi yang berkualitas baik mempunyai protein rata-rata dalam bahan kering adalah 12.4%, lemak 13.6% dan serat kasar 11.6%. Dedak padi menyediakan protein yang lebih berkualitas dibandingkan dengan jagung. Dedak padi kaya akan *Thiamin* dan sangat tinggi dalam *Niasin* (Palupi *et al.*, 2010).

c. Limbah Industri Coklat (*Theobroma cacao*)

Limbah industri coklat adalah kulit buah, kulit biji dan Lumpur coklat. Kulit buah merupakan 71% dari buah sedangkan kulit biji coklat sekitar 15%.

Limbah industri coklat merupakan sumber protein yang baik untuk ternak ruminansia karena tidak mudah untuk didegradasi dalam rumen. Namun bahan ini mengandung zat racun. Kulit coklat buah mengandung protein rendah dan serat kasar yang tinggi sehingga penggunaannya terbatas hanya untuk ruminansia. Akan tetapi kulit biji coklat mengandung protein yang cukup tinggi sehingga bisa digunakan untuk semua jenis ternak. Penggunaan kulit buah coklat pada unggas bisa sekitar 10-24%, sedangkan pada ruminansia bisa sekitar 30-40% (Tsubo *et al.*, 2005 ).

#### d. Bungkil kelapa

Ampas kelapa hasil samping pembuatan minyak kelapa murni masih memiliki kandungan protein yang cukup tinggi. Hal ini menyebabkan ampas kelapa berpotensi untuk dimanfaatkan dan diolah sebagai bungkil untuk pakan ternak, Kualitas bungkil kelapa bervariasi tergantung dengan cara pengolahan dan mutu bahan baku. Berdasarkan komposisi kimianya, bungkil kelapa termasuk sumber protein untuk ternak. Hasil analisis proksimat dari bahan pakan bungkil kelapa adalah sebagai berikut: BK 88,5, Abu 6,36, PK 18,58, Lemak 12,55, SK 15,38, Beta-N 37,26, Ca 0,08, dan P 0,52 (Amdal, 2013).

Protein kasar yang terkandung pada ampas kelapa mencapai 23%, dan kandungan seratnya yang mudah dicerna merupakan suatu keuntungan tersendiri untuk menjadikan ampas kelapa sebagai bahan pakan pedet (*Calv*), terutama untuk menstimulasi rumen. Dalam pemakaian bungkil kelapa terutama untuk monogastrik perlu diperhatikan keseimbangan asam aminonya,

karena bungkil kelapa kekurangan asam amino *Lisin* dan *Histidin*. Bungkil kelapa dihasilkan dari limbah pembuatan minyak kelapa. Bungkil kelapa dapat digunakan sebagai salah satu penyusun ransum pakan ternak karena memiliki kandungan protein yang cukup tinggi mencapai 21,5 % dan energi metabolis 1540 - 1745 Kkal/Kg, tetapi bungkil kelapa memiliki kandungan lemak yang cukup tinggi mencapai 15%, sehingga mudah rusak terkontaminasi jamur dan tengik, oleh karena itu penggunaan bungkil kelapa dianjurkan tidak melebihi 20% sebagai penyusun ransum (Kamal, 2014).

Kelemahan dari bungkil kelapa ialah: Mudah rusak oleh jamur dan menimbulkan racun untuk ayam. Miskin *Lysine* dan *Histidine* dan kandungan seratnya cukup tinggi yaitu 15%. Bungkil yang baik diberikan kepada ternak pada campuran konsentrat, Idealnya adalah sebesar 10% dari total konsentrat yang kita berikan. Misalnya untuk seekor sapi berat 300 Kg dibutuhkan konsentrat sebesar 1% dari berat badan yakni 3 Kg / hari. Jadi bungkil yang kita butuhkan untuk seekor sapi 300 Kg adalah 300 gram atau 3 ons dan sisanya adalah dedak atau bekatul (Fairuz, 2015).

e. Mineral

Mineral sangat penting untuk kelangsungan hidup ternak. Hampir semua mineral ditemukan dalam jaringan ternak dan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam proses metabolisme ternak. Metabolisme dan interrelationship diantara mineral sangat bervariasi dan kompleks. Suatu kelebihan atau kekurangan mineral tertentu dapat menyebabkan kekurangan atau kelebihan dari mineral lain. Komposisi mineral pakan bervariasi tidak hanya karena

perbedaan tanaman dan spesies tetapi juga antar tanaman yang sama dengan varietas yang berbeda. Leguminosa dan butir-butiran umumnya mengandung kalsium (Ca) dan magnesium (Mg) lebih banyak dibanding tanaman lain. Banyak perubahan komposisi mineral terjadi dalam masa pertumbuhan tanaman. Perbedaan lingkungan juga sangat mempengaruhi kandungan mineral tanaman seperti jenis dan kondisi tanah, pengaruh pemupukan, komposit tanaman yang di tanam, serta cuaca dan iklim. Kebutuhan mineral pada ternak sangat bervariasi tergantung pada umur ternak, ukuran ternak, jenis kelamin, tipe produksi dan fase produksinya. (Hidayat, 2011).

Mineral yang terkandung di dalam ransum ternak kadarnya relatif rendah, tetapi keberadaannya sangat penting. Hal ini tampak dan adanya penambahan/suplementasi mineral tertentu ke dalam ransum agar terpenuhi sesuai dengan yang dibutuhkan ternak. Namun demikian penambahan mineral tersebut berbeda-beda, diantaranya tergantung pada spesies dan umur ternak, jenis produk dan ternak tersebut dan bahan pakan penyusun ransum, khusus bahan pakan yang berasal dari tanaman, kandungan mineral di dalamnya terutama tergantung dan kesuburan tanah tempat tumbuhnya. Pada lazimnya, mineral-mineral yang perlu mendapat perhatian meliputi garam dapur (NaCl), Ca, P, Mg, dan kadang-kadang S yang merupakan mineral makro. Dan mineral mikro meliputi Cu, Fe, I, Mn, Se, dan Zn yang sering terjadi defisiensi pada ternak serta Co yang mungkin juga dapat terjadi defisiensi pada ternak ruminansia (Rismani, 2011).

Tercukupinya kadar dan keseimbangan antara masing-masing mineral adalah sangat penting, hal ini dikarenakan adanya interelasi diantara mineral tersebut. Adanya kelebihan salah satu mineral dapat mempengaruhi ketersediaan salah satu atau lebih mineral lain. Sebagai contoh kelebihan mineral Ca dapat menyebabkan penurunan ketersediaan mineral P, Mg, dan Zn. Begitu juga sumber mineral harus dapat larut dan mineralnya dapat diabsorpsi yang selanjutnya dapat digunakan oleh ternak. Feri Oksida ( $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ) adalah hampir tidak larut, oleh karena itu  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  jarang digunakan sebagai sumber mineral Fe bagi ternak. Namun bisa terjadi keracunan mineral, bila kadarnya di dalam ransum melebihi batas maksimal (Hidayat, 2011).

#### f. Molases

Molases dapat digunakan sebagai pakan ternak. Keuntungan penggunaan molases untuk pakan ternak adalah kadar karbohidrat tinggi (46-60% sebagai gula), kadar mineral cukup disukai ternak. Molases atau tetes tebu juga mengandung vitamin B kompleks dan unsur-unsur mikro yang penting bagi ternak seperti kobalt, boron, yodium, tembaga, mangan dan seng. Sedangkan kelemahannya adalah kadar kaliumnya yang tinggi dapat menyebabkan diare bila dikonsumsi terlalu banyak (Hasan, 1990).

Menurut Fairuz, (2015) ada beberapa pengertian tentang bahan pakan ternak yaitu:

- (1) Sumber serat yaitu adalah bahan-bahan yang memiliki kandungan serat kasar (SK) > 18% (contoh: limbah pertanian dan kulit biji polong-polongan).

- (2) Sumber energi yaitu bahan-bahan yang memiliki kadar protein kurang dari 20% dan serat kasar kurang dari 18% atau dinding selnya kurang dari 35% (contoh: biji-bijian, kacang-kacangan, buah-buahan, umbi-umbian dan sisa penggilingan).
- (3) Sumber protein yaitu bahan-bahan yang memiliki kandungan protein kasar > 20% (contoh: berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti bungkil, bekatul maupun yang bukan berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti silase ikan).
- (4) Sumber mineral yaitu bahan-bahan yang memiliki kandungan mineral yang cukup tinggi, misalnya makanan berbutir dan umbi-umbian.
- (5) Pakan tambahan yaitu bahan-bahan tertentu yang ditambah kedalam ransum, seperti: obat-obatan, anti biotika, hormon, air dan zat *Flavour*.

#### **D. Alga Coklat (*Sargassum* sp.)**

*Sargassum* sp. tersebar luas di Indonesia, tumbuh di perairan yang terlindung maupun yang berombak besar pada habitat batu, pada daerah intertidal maupun subtidal. Zat yang dapat diekstraksi dari *Sargassum* sp. berupa *Alginat* yaitu suatu garam dari asam alginik yang mengandung ion sodium, kalsium dan barium. Pada umumnya *Sargassum* sp. tumbuh di daerah terumbu karang (*Coral reef*) seperti di Kepulauan Seribu, terutama di daerah rata pasir (Amjaya, 2011). Rumput laut terutama *Phaeophyceae* (*Sargassum* dan *Turbinaria*) tersebar luas di perairan tropis, termasuk Indonesia. *Sargassum* sp. terdiri dari kurang lebih 400 spesies di dunia. (Atmadja, 2012).

Menurut pendapat Wiqayah (2011), bahwa rumput laut jenis *Sargassum* sp. ini umumnya memiliki bentuk *Thallus* silindris atau gepeng. Cabangnya

rimbun menyerupai pohon di darat. Bentuk daun melebar, lonjong atau seperti pedang. Mempunyai gelembung udara (*Bladder*) yang umumnya *Soliter*. Warna *Thallus* umumnya coklat. Berikut ini adalah klasifikasi *Sargassum* sp. :

Kingdom : *Plantae*

Divisi : *Thallophyta*

Kelas : *Phaeophyceae*

Ordo : *Fucales*

Famili : *Sargassaceae*

Genus : *Sargassum*

Spesies : *Sargassum* sp.



Gambar 1. Alga Coklat (*Sargassum* sp.)

Ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh *Sargassum* sp. antara lain *Thallus* pipih, licin, batang utama bulat agak kasar, dan *Holdfast* (bagian yang digunakan untuk melekat) berbentuk cakram. Percabangan berselang-seling secara teratur. Bentuk daun oval dan memanjang berukuran (40x10) mm. Pinggir daun bergerigi jarang, berombak, dan ujung melengkung atau meruncing. *Vesicle* (gelembung

seperti buah) berbentuk lonjong, ujung meruncing berukuran (7x1,5) mm, dan agak pipih. Rumput laut jenis ini mampu tumbuh pada substrat batu karang di daerah berombak (Budhiyanti dkk, 2012). Rumput laut coklat merupakan salah satu rumput laut yang banyak tersebar di wilayah perairan Indonesia. Rumput laut coklat terdiri dari beberapa macam genus. Salah satu genus rumput laut coklat yang banyak terdapat di Sulawesi Selatan yaitu genus *Sargassum* sp. genus ini merupakan rumput laut yang cukup banyak tersebar di berbagai daerah di Sulawesi Selatan, meskipun rumput laut jenis *Sargassum* sp. ini belum banyak dibudidayakan serta dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk keperluan industri. *Sargassum* sp. merupakan bagian dari kelompok rumput laut coklat (*Phaeophyceae*) dan genus terbesar dari famili *Sargassaceae* (Lestari, 2015).

*Sargassum* sp. biasanya dicirikan oleh 3 sifat yaitu adanya pigmen coklat yang menutupi warna hijau, hasil fotosintesis disimpan dalam bentuk laminaran dan algin serta adanya *Flagel*. *Sargassum* sp. di Indonesia yang telah teridentifikasi diantaranya adalah *Sargassum duplicatum*, *S.polycystum*, *S.binder*, *S.crassifolium*, *S.echinocarpum*, *S. mollerii*, *S.gracillimum*, *S.sinereum*, *S.hystri*, *S.siliquosum*, *S.fenitan*, *S.filipendula*, *S.polyceratium*, dan *S.vulgare* yang dapat dibedakan dari bentuk morfologi dengan kadar kandungan bahan utama yang berbeda seperti protein, vitamin C, *Tannin*, *Iodine*, dan *Phaeno* (Wiqayah, 2011). *Sargassum* sp. merupakan salah satu jenis limbah rumput laut yang banyak ditemukan di Indonesia. Keberadaannya dimasyarakat saat ini masih belum mendapat perhatian khusus. Meskipun keberadaan (*Sargassum* sp.) dianggap

mengotori pantai, masyarakat Indonesia khususnya nelayan tradisional memanfaatkannya sebagai pakan ternak, pupuk cair maupun bahan makanan, *Sargassum* sp. mempunyai kandungan nutrisi yang tinggi terutama protein dan mineral. Di samping protein dan mineral, ekstrak *S. duplicatum* mengandung *Alkaloid, Triterpenoid, Steroid, Saponin, Fenol, Flavonoid dan Kuinon* (Putranti, 2013). Lebih lanjut Firdaus (2013) menyatakan, bahwa rumput laut coklat memiliki komponen aktif berupa senyawa *Fenol* yang berpotensi sebagai antioksidan karena mampu memberikan pasangan elektron pada elektron bebas sehingga radikal bebas dapat diredam (Pandey, 2015).

*Sargassum* sp. bernilai ekonomi tinggi rumput laut ini memiliki manfaat yaitu sebagai sumber penghasil *Alginat* yang digunakan sebagai bahan pembuat cangkang kapsul, emulsifier dan stabilizer, yang berguna untuk kosmetik, kandungan koloid alginatnya digunakan sebagai bahan pembuat sabun, shampo dan cat rambut. Limbah rumput laut ini perlu dibudidayakan karena pemanfaatannya masih mengandalkan dari alam sehingga keberadaannya di alam semakin berkurang. Seiring berjalannya waktu pemanfaatan (*Sargassum* sp.) berkembang cukup pesat. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kandungan nutrisi *Sargassum* sp. ini, masyarakat hanya menganggap tumbuhan ini sebagai limbah yang tidak memiliki kegunaan dan menempel pada rumput laut (Moyo, 2013).

### ***E. Anatomi dan Fisiologi Organ Reproduksi Sapi Jantan***

Reproduksi merupakan proses penting bagi semua bentuk kehidupan. Tanpa melakukan reproduksi, tak satu spesies pun didunia ini yang mampu hidup lestari, begitu pula dengan hewan ternak baik betina maupun jantan. Fungsi alamiah seekor hewan jantan adalah menghasilkan sel-sel kelamin jantan atau *Spermatozoa* yang hidup, aktif dan potensial fertil, dan secara sempurna meletakannya ke dalam saluran kelamin betina. Inseminasi buatan hanya memodifiser cara dan tempat peletakan *Spermatozoa* (Maryam, 2012).

Organ reproduksi hewan jantan pada umumnya dapat dibagi atas tiga komponen yaitu organ kelamin primer dinamakan testis atau *Testiculus* disebut juga *Orchis* atau *Didymos* , sekelompok kelenjar-kelenjar kelamin pelengkap yaitu kelenjar-kelenjar *Vesikulares*, prostat dan *Cowper*, dan saluran-saluran yang terdiri dari *Epididymis* dan *Vas deferens* dan alat kelamin luar atau kopulatoris yaitu penis (Sutama, 2011).

#### ***1. Organ Reproduksi Jantan***

Menurut Pendapat Feradis (2010) menyatakan bahwa organ reproduksi ternak jantan adalah sebagai berikut:

##### a) *Testis*

Testis adalah organ reproduksi primer pada ternak jantan, sebagaimana halnya ovarium pada ternak betina. Testis dikatakan sebagai organ primer karena berfungsi menghasilkan gamet jantan. Testis dibungkus oleh kapsul putih mengkilat (*Tunica albuginea*) yang banyak mengandung serabut syaraf dan pembuluh darah yang terlihat berkelok-kelok. Di bawah *Tunica albuginea*

terdapat parenkim yang menjalankan fungsi testis. *Parenkim* membentuk saluran yang berkelok-kelok, secara sentral, septula testis berlanjut dengan jaringan ikat longgar dari *Mediastinum* testis. Jaringan ikat yang mengisi ruang *Intertubular* mengandung pembuluh darah dan *Limfe*, *Fibrosit*, sel-sel mononuklear bebas dan sel *Interstitial endokrin*.

Sel *Leydig* adalah sel diantara sel *Sertoli*. Fungsi sel ini adalah memberikan respon FSH dengan mensintesa dan mensekresi *Testosteron* dalam pola yang tergantung pada dosis. Selain reseptor LH, ditemukan pula reseptor *Prolaktin* dan *Inhibin* di dalam *Sel leydig*. *Prolaktin* dan *Inhibin* memfasilitasi aktivasi stimulasi yang dilakukan oleh LH pada produksi *Testosteron*, namun keduanya tidak bisa melakukannya sendiri.

b) *Epididymis*

*Epididymis* merupakan pipa panjang dan berkelok-kelok yang menghubungkan *Vas eferensia* pada testis dengan *Ductus deferens*. *Epididymis* mempunyai empat fungsi utama, yaitu pengangkutan, penyimpanan, pemasakan, dan pengentalan (konsentrasi) sperma.

*Spermatozoa* di dalam *Epididymis* mengalami beberapa proses pematangan, seperti mendapat kemampuan untuk bergerak. *Epididymis* merupakan saluran reproduksi yang amat penting, karena saluran sangat menentukan kemampuan fertilitas sperma yang dihasilkan. Adapun fungsi pokok *Epididymis* adalah alat transfor, pendewasaan, penimbunan sperma dan sekresi cairan *Epididymis*. Sperma melewati *Epididymis* berkisar antara 9 sampai 13 hari yang dialirkan oleh cairan testis, aktivitas silia epitel dari *Duktus deferens* dan

oleh kontraksi otot dinding saluran *Epididymis*, bagian *Cauda epididymis* memberikan persentase kebuntingan 63% dan lebih tinggi dibanding sperma yang berasal dari bagian *Caput epididymis* yang hanya 33,33% .

c) *Duktus deferens*

*Duktus deferens* meninggalkan ekor *Epididymis* bergerak melalui kanal inguinal yang merupakan bagian dari korda spermatik dan pada cincin inguinal internal memutar kebelakang, memisah dari pembuluh darah dan saraf dari korda. Selanjutnya dua *Duktus deferens* mendekati uretra, bersatu dan kemudian ke kaudal kandung kencing, serta dalam lipatan *Peritonium* yang disebut lipatan *Urogenital (Genital fold)* yang dapat disamakan dengan *Ligamentum* lebar pada betina.

d) *Penis*

Organ kopulasi pada hewan jantan adalah penis, dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu glans atau alat gerak bebas, bagian utama atau badan dan *Krura* atau akar yang melekat pada *Pelvis* yang tertutup oleh otot *Ischiocavernosus*. Struktur internal penis merupakan jaringan *Kavernosus* (jaringan erektil) yang terdiri dari sinus-sinus darah yang dipisahkan oleh lembaran jaringan pengikat yang disebut septa, yang berasal dari *Tunika albuginea*, *Capsula* berserabut di sekitar penis.

e) *Kelenjar-Kelenjar Tambahan*

(1) *Kelenjar Vesicularis*

Pada sapi kelenjar ini sepasang dari luar kelihatan jelas *berlobuli*, letaknya sebidang dengan *ampulla vas deferens* tetapi ada di sebelah lateral, jadi kedua ampula itu diapit oleh kedua kelenjar *vesikularis*. Sekresi kelenjar *vesikularis*

merupakan 50% dari volume total dari suatu ejakulasi yang normal. Jadi kalau pejantan sapi itu ejakulasinya 5 cc maka  $2\frac{1}{2}$  cc berasal dari kelenjar *vesikularis*.

## (2) Kelenjar prostat

Kelenjar prostat pada sapi ada sepasang, bentuknya bulat dan jauh lebih kecil daripada kelenjar *Vesikularis*. Sekresi dari kelenjar ini melalui beberapa muara kecil masuk ke dalam urethra kira-kira pada jarak 19 cm kaudal dari muara kelenjar *Vesikularis*.

Kelenjar prostat merupakan kelenjar *Tubuloalveolar*, berkembang dari epitel urethra *Pelvis*. Secara topografik dibedakan dua bagian, bagian padat kelenjar atau bagian luar (*Corpus prostat*), dan bagian yang menyebar atau bagian dalam (*Pars disseminata prostatae*). Bagian luar menutup bagian dorsalnya saja. *Pars disseminata* terletak dalam *Propia-submukosa urethra pelvis*.

## (3) Kelenjar Cowper

Kelenjar *Bulbouretralis* (kelenjar *Cowper*) terletak *dorsoventral uretra* dalam rongga *Velvis*. Bersifat sebagai kelenjar *Tubulus* majemuk (babi, kucing, dan kambing jantan), atau *Tubuloalveolar* (kuda, sapi dan domba jantan), anjing tidak memilikinya (Bold, 1978).

### f) *Organ Kopulatoris (Penis)*

Ada dua tipe penis *fibroelastic* (sapi, domba, babi). *retractor penis* dan *fibrovascular/cavernosa* (kuda, primata). Bagian-bagian Penis meliputi *corpus Penis*, *musculus retractor Penis*, Uretra, *glans Penis* dan *processus urethralis*.

## 2. *Scrotum*

*Scrotum* adalah organ reproduksi pada ternak jantan yang mempunyai fungsi vital dalam memproduksi sperma pada ternak jantan. *Scrotum* merupakan kantung yang di dalamnya berisi testis yang berjumlah sepasang, yaitu *Scrotum* kanan dan *Scrotum* kiri, diantara *Scrotum* kanan dan *Scrotum* kiri dibatasi oleh sekat yang berupa jaringan ikat dan otot polos (otot *Dartos*). *Scrotum* adalah kantong pembungkus testes (Bold, 1978).

*Scrotum* terdiri atas kulit yang ditutupi bulu-bulu halus, *Tunica dartos* dan *Tunica vaginalis propria*. Melalui pengukuran *Scrotum* dapat diketahui kemampuan produksi sperma seekor pejantan untuk digunakan sebagai salah satu kriteria seleksi pejantan. *Scrotum* dengan otot licinnya, lapisan *Librosa* dan kulit merupakan bagian yang berfungsi menunjang dan melindungi testes dan *Epididymis* dan mempertahankan suhu yang lebih rendah daripada suhu badan yang diperlukan agar *Spermatogenesis* berlangsung secara normal, Fungsi utama *Scrotum* adalah untuk memberikan kepada testis suatu lingkungan yang memiliki suhu 1 sampai 8°C lebih dingin dibandingkan temperatur rongga tubuh. Fungsi ini dapat terlaksana disebabkan adanya pengaturan oleh sistem otot rangkap yang menarik testis mendekati dinding tubuh untuk memanasi testis atau membiarkan testis atau membiarkan testis menjauhi dinding tubuh agar lebih dingin. Dengan kata lain fungsi *Scrotum* yaitu mengatur temperatur testes dan *Epidermis* agar tidak terlalu rendah dengan suhu tubuh (termoregulator testes) didalam testes inilah seekor pejantan memproduksi *Spermatozoa* (Feradis, 2010).

Ukuran *Scrotum* dapat dijadikan indikasi kemampuan pejantan dalam menghasilkan spermatozoa. Lingkar *Scrotum* mencerminkan ukuran dari testis dan menyatakan banyaknya jaringan atau *Tubuli seminiferi* yang berfungsi untuk memproduksi sperma. Penampilan fisik selaput pembungkus testis (*Scrotum*) pada sapi menggambarkan kualitas semen yang dihasilkan oleh pejantan. *Epitel* benih dalam *Tubuli seminiferi (Parenchyma testes)* berkembang melalui pembelahan sel menjadi *Spermatozoa* (Maryam, 2012).

Sel *Spermatogonia* akan melepaskan diri dari sel sekitarnya dan berubah bentuk serta cirinya, setelah beberapa waktu kemudian sel ini melekat pada sel *Sertoli*, kemudian melepaskan diri secara bebas berada di saluran *Tubuli*, masuk kedalam *Rete testes*, kemudian memasuki *Epididymis* dan mengalami proses pematangan. Didalam *Epididymis*, *Spermatozoa* mengalami beberapa proses pematangan, seperti mendapat kemampuan untuk bergerak, *Epididymis* merupakan saluran reproduksi yang amat penting, karena saluran sangat menentukan kemampuan fertilitas sperma yang dihasilkan. Adapun fungsi pokok *Epididymis* adalah alat transfer, pendewasaan, penimbunan sperma dan sekresi cairan *Epididymis*. Sperma melewati *Epididymis* berkisar antara 9-13 hari yang dialirkan oleh cairan testes, aktivitas *Silia epitel* dari *Duktus eferent* dan oleh kontraksi otot dinding saluran *Epididymis*. Bagian *Cauda epididymis* merupakan organ khusus untuk penimbunan sperma, karena sekitar 75% dari total sperma *Epididymis* berada dibagian ini dan kondisi lingkungannya memberikan kemampuan fertilitas yang lebih tinggi dibanding dibagian lain, sperma yang berasal dari bagian *Cauda epididymis* memberikan persentase kebuntingan 63%

dan lebih tinggi dibanding sperma yang berasal dari bagian *Caput epididymis* yang hanya 33,33% (Nuryadi, 2010).

Menurut Toleng (2014), bahwa rata-rata lingkaran *Scrotum* pada Sapi Bali berkisar sekitar 23,2 cm. Ukuran lingkaran *Scrotum* Sapi Bali berdiameter kecil disebabkan karena perbedaan ukuran antara Sapi Bali dengan sapi jenis *Bos taurus*. terdapat korelasi antara ukuran *Scrotum* maksimal dengan ukuran testis sehingga secara cermat dapat dilakukan pendugaan ukuran testis melalui pengukuran skrotum. Melalui pengukuran *Scrotum* dapat diketahui kemampuan produksi sperma seekor pejantan dapat dimanfaatkan sebagai salah satu kriteria seleksi seekor pejantan. Bobot testis atau volumenya dapat diukur secara cermat dengan mengukur lebar dan panjang atau keliling *Scrotum*. Ukuran testis diketahui dengan mengukur lingkaran *Scrotum* pada bagian terbesar dari testis dengan menggunakan pita ukur.

Korelasi sebesar 0,94 antara ukuran *Scrotum* maksimal dengan ukuran testes sehingga secara cermat dapat dilakukan pendugaan ukuran testes melalui pengukuran *Scrotum*, melalui pengukuran *Scrotum* dapat diketahui kemampuan produksi sperma seekor pejantan dapat dimanfaatkan sebagai salah satu kriteria seleksi seekor pejantan (Sutama, 2011).

Menurut pendapat Wijono (2010), bahwa setiap kenaikan 1 cm lingkaran *Scrotum* akan diikuti oleh peningkatan konsentrasi sperma, sperma abnormalitas sekunder dan motilitas sperma, namun terjadi penurunan persentase sperma mati dan persentase sperma abnormalitas primer. Hal ini memberi makna bahwa semakin besar ukuran skrotum Sapi Bali maka jumlah dan mutu sperma

*Epididymis* juga semakin baik. Suatu ukuran testes yang semakin besar, makin besar pula produk sperma dan hormon-hormon kelamin jantan yang diperlukan dalam mengontrol proses *Spermtogenesis* (Suatyo, 2013).

Kondisi dan ukuran testes mempengaruhi kemampuan optimum seekor pejantan dalam menghasilkan sperma normal dan sehat sebanyak 80% dari bobot testes adalah *Tubuli seminiferi* yang merupakan produsen sperma. Semakin besar testes semakin banyak *Tubuli seminiferi*, dan semakin banyak pula jumlah sperma yang dihasilkan, setiap satu gram jaringan testes sapi dewasa mampu menghasilkan sperma sebanyak sembilan juta sperma perhari atau kira-kira enam ribu per menit. Berat testes memiliki korelasi yang tinggi ( $r=0,94$ ) dengan ukuran *Scrotum*. Oleh sebab itu, ukuran lingkaran *Scrotum* pada Sapi Bali dapat digunakan sebagai salah satu kriteria seleksi seekor pejantan Sapi Bali. Lingkaran *Scrotum* berpengaruh secara nyata terhadap karakteristik cairan *Epididymis* dan spermatozoa *Epididymis*, kecuali terhadap abnormalitas sperma sekunder. Berkaitan dengan hasil penelitian maka lingkaran *Scrotum* dapat dimanfaatkan sebagai alat seleksi bibit Sapi Bali (Feradis, 2010).

Korelasi antara ukuran *Scrotum* maksimal dengan ukuran testes sebesar 0,94 sehingga secara cermat dapat dilakukan pendugaan ukuran testes melalui pengukuran *Scrotum*, untuk mengetahui besarnya testes secara tidak langsung adalah dengan mengukur besarnya *Scrotum* dengan mengetahui besarnya *Scrotum* dapat mengasumsikan kualitas sperma, yang meliputi volume, motilitas dan konsentrasi spermatozoa dan melalui pengukuran *Scrotum* dapat diketahui kemampuan produksi sperma seekor pejantan dapat dimanfaatkan sebagai salah

satu kriteria seleksi seekor pejantan. *Scrotum* dengan otot – otot licinnya, lapisan *Fibrosa* dan kulit berfungsi menunjang dan melindungi testes dan *Epididymis* dan mempertahankan suhu yang lebih rendah daripada suhu badan yang diperlukan agar *Spermatogene* berlangsung secara normal (Soereso *et all.*, 2012).

Testes adalah organ reproduksi primer pada jantan. Testis mempunyai fungsi memproduksi gamet jantan (*Spermatozoa*) dan hormon kelamin jantan (*Androgen*). Letak testis berbeda dengan *Ovarium* yang berada di dalam tubuh, Testis terletak di luar tubuh dan terhubung ke tubuh melalui rongga tubuh *Inguinalis*. Testis di bungkus dengan kulit yang disebut *Scrotum*. Bentuk dan besar testis sendiri berbeda pada masing-masing ternak sesuai dengan jenis ternak tersebut. Pada suhu dingin maka *Scrotum* akan mendekati tubuh, sebaliknya jika suhu terlalu panas maka *Scrotum* akan menggantung menjauhi tubuh. Fungsi ini diatur oleh *Musculus cremaster externa*, *Musculus cremaster interna* dan *Tunicia dartos*. *Epididimis* merupakan saluran pertama yang di lewati spermatozoa dari testis yang menghubungkan *Vasa efferentia* pada testis dengan *Ductus deferent* (Wijono, 2010).

Produktivitas ternak merupakan cerminan dari efisiensi reproduksi . Salah satu indikator yang dapat mencerminkan potensi reproduksi pada ternak ruminansia jantan adalah lingkaran *Scrotum* (*Scrotal circum ferece*), pengukuran lingkaran *Scrotum* merupakan bagian terpenting untuk evaluasi atau *Breeding soundness examination* Pengukuran lingkaran *Scrotum* dapat memberikan beberapa keuntungan karena dapat dilakukan berulang-ulang, lingkaran *Scrotum* berkorelasi

positif terhadap produksi sperma, dan juga terhadap kualitas sperma (Batra *et al.*, 2004).

Lingkar *Scrotum* erat hubungannya dengan potensi produksi semen seekor pejantan. Hal ini disebabkan oleh lingkar *Scrotum* berkorelasi positif dengan sel-sel *Epithel seminiferi* dimana *Spermatozoa* dihasilkan, besarnya testes mempunyai hubungan yang positif dengan umur dan berat tubuh kambing, dengan mengetahui besarnya *Scrotum* diharapkan dapat mengasumsikan memiliki kualitas dan kuantitas sperma yang baik (Maryam, 2012).

Ukuran testis berhubungan dengan bobot badan, semakin besar bobot badan maka semakin besar pula ukuran lingkar *Scrotum*. Testes yang besar dapat mempengaruhi jumlah produksi *Testosteron* dan *Spermatozoa* serta memegang peranan penting dalam aktivitas libido. Terdapat hubungan yang nyata antara lingkar *Scrotum* dengan jumlah naik dan jumlah ejakulasi (Sutama, 2011).

Warna dan konsistensi serta pH cairan *Epididymis* berhubungan erat dengan ukuran lingkar *Scrotum* Sapi Bali. Setiap kenaikan 1 cm ukuran lingkar *Scrotum* maka terjadi peningkatan sebesar 0,18 unit skor warna dan konsistensi cairan *Epididymis*, sedangkan konsistensi sperma, persentase sperma mati, sperma abnormal dan motilitas sperma berhubungan erat dengan ukuran lingkar *Scrotum* sapi bali, Setiap kenaikan 1 cm ukuran lingkar *Scrotum* maka konsentrasi sperma mengalami kenaikan sebesar  $0,15 \times 10^9/\text{ml}$ , persentase sperma mati menurun sebesar 0,22%, sperma abnormal primer menurun 0,25% dan skor gelombang massa sperma meningkat 0,18 unit (Nuryadi, 2010).

*Spermatogenesis* adalah proses pembentukan sel *Spermatozoa* yang terjadi di organ kelamin (*Gonad*) jantan, yaitu testis tepatnya di *Tubulus seminiferus*. Sel *Spermatozoa*, disingkat sperma yang bersifat *Haploid* (n) dibentuk di dalam testis melewati sebuah proses kompleks. *Spermatogenesis* mencakup pematangan sel *Epitel germinal* dengan melalui proses pembelahan dan diferensiasi sel. Pematangan sel terjadi di *Tubulus seminiferus* yang kemudian disimpan dalam *Epididimis*. *Tubulus seminiferus* terdiri dari sejumlah besar sel germinal yang disebut *Spermatogonia*. *Spermatogonia* terletak di dua sampai tiga lapis luar sel-sel *Epitel tubulus seminiferus*. *Spermatogonia* berdiferensiasi melalui tahap-tahap perkembangan tertentu untuk membentuk sperma (Sutama, 2011).

Menurut Astuti (2011) bahwa sperma sebagian besar terdiri dari:

- a) *Deoxyribonucleoprotein* yang terdapat dalam nukleus yang merupakan kepala dari sperma. *Nucleoprotein* dalam inti sperma semua spesies, terbentuk oleh asam *Deoxyribonucleus* yang terikat pada protein. Akan tetapi pada spesies-spesies itu *Nucleoprotein* tidak identik satu sama lain, melainkan ada perbedaannya yaitu terutama pada 4 bagian pokok ialah *Adenine*, *Quinine*, *Oxytosine*, dan *Thymine*.
- b) *Muco-polysaccharide* yang terikat pada molekul-molekul protein terdapat di *Acrosome*, yaitu bagian pembungkus kepala. *Polysaccharide* yang terdapat pada *Acrosome* ini mengandung 4 macam gula yaitu : *Fucose*, suatu *Methylpentose*, *Galactose*, *Mannose* dan *Hexosamine*. Keempat unsur gula-gula ini terikat pada protein sehingga member reaksi pada zat warna asam,

yaitu PAS (*Periodic Acid Schiff*). Fungsi dari *Muco-polysaccharide* yang terikat pada molekul protein dalam metabolisme sperma tidak diketahui.

- c) *Plasmogen* atau lemak *Aldehydogen* yang terdapat di bagian leher, badan dan ekor dari sperma, merupakan bahan yang dipergunakan oleh sperma itu untuk respirasi *Endogen*.
- d) Protein yang menyerupai keratin yang merupakan selubung tipis yang meliputi seluruh badan, kepala dan ekor sperma. Protein ini banyak mempunyai ikatan dengan unsure zat tanduk yaitu S (*Sulfur*). Protein ini terutama banyak terdapat pada membran sel – sel dan fibril – fibrilnya, protein yang mengandung banyak *Sulfur* ini bertanggung jawab terhadap sifat elastisitas permukaan sel sperma.
- e) Enzim dan *Co-enzim*. Sperma mengandung bermacam - macam enzim dan *Co-enzim* yang pada umumnya digunakan untuk proses hidrolisis dan oksidasi. Misalnya semua enzim dan *Co-enzim* yang diperlukan dalam siklus *Glikolisis* ada pada sel sperma. Sel sperma juga mengandung *Valuronidase* yang diduga berada dekat sekali ke permukaan sel, sehingga setiap saat dapat dilepaskan ke medium sekitarnya.

Ciri utama *Spermatozoa* adalah motilitas yang digunakan sebagai patokan paling sederhana dalam penilaian kualitas semen. Persentase *Spermatozoa* motil (bergerak progresif) dapat digunakan sebagai ukuran kesanggupan untuk membuahi ovum. *Motilitas* dipengaruhi oleh umur sperma, maturasi sperma, penyimpanan energi (ATP), agen aktif, biofisik dan fisiologik, cairan suspensi dan adanya rangsangan atau hambatan (Feradis, 2010).

Pembelahan *Meiosis* pertama ini timbul sel berukuran lebih kecil yang disebut *Spermatisit* sekunder. *Spermatisit* sekunder sulit diamati dalam sediaan testis karena merupakan sel berumur pendek dan berada dalam tahap interfase yang sangat singkat dan dengan cepat memasuki pembelahan *Meiosis* kedua. Pembelahan *Spermatisit* sekunder menghasilkan *Spermatid*. Karena tidak ada fase-S (sintesis DNA) yang terjadi antara pembelahan *Meiosis* pertama dan kedua pada *Spermatisit*, jumlah DNA per sel berkurang setengah selama pembelahan kedua ini, yang menghasilkan sel *Haploid* (n). Oleh karena itu, proses *Meiosis* menghasilkan sel dengan jumlah kromosom *Haploid* (n). Dengan adanya pembuahan, sel memperoleh kembali jumlah *Diploid* yang normal (Lukmanul, 2012).

Menurut Nuryadi (2010) bahwa proses *Spermatogenesis* terjadi proses - proses dalam istilah sebagai berikut :

- 1) *Spermatositogenesis* adalah tahap awal dari peristiwa pembelahan *Spermatogonium* menjadi spermatisit primer (mitosis), selanjutnya *Spermatisit* melanjutkan pembelahan secara *Meiosis* menjadi *Spermatisit* sekunder dan *Spermatid*. Istilah ini biasa disingkat proses pembelahan sel dari *Spermatogonium* menjadi *Spermatid*.
- 2) *Spermiogenesis* adalah peristiwa perubahan spermatid menjadi sperma yang dewasa. *Spermiogenesis* terjadi di dalam epididimis dan membutuhkan waktu selama 2 hari. Terbagi menjadi tahap pembentukan *Golgi*, *Axon* *ema* dan kondensasi DNA, pembentukan cap *Akrosom*, pembentukan bagian ekor dan Maturasi, reduksi *Sitoplasma Difagosit* oleh Sel *Sertoli*.

3) *Spermiasi* adalah peristiwa pelepasan sperma matur dari sel sertoli ke *Lumen tubulus seminiferus* selanjutnya ke *Epididimidis*. Sperma belum memiliki kemampuan bergerak sendiri (non-motil). Sperma non motil ini ditranspor dalam cairan *Testicular* hasil sekresi sel *Sertoli* dan bergerak menuju *Epididimidis* karena kontraksi otot *Peritubuler*. Sperma baru mampu bergerak dalam saluran epidimis namun pergerakan sperma dalam saluran reproduksi pria bukan karena motilitas sperma sendiri melainkan karena kontraksi peristaltik otot saluran.

Menurut Sutama (2011), bahwa ada dua fase atau tahap spermatogenesis yaitu fase *Spermatocytogenesis* adalah fase pertumbuhan jaringan *Spermatogenik* dengan pembelahan sederhana dan fase *Spermiogenesis* adalah fase terjadinya peristiwa metamorfosis atau perubahan bentuk dari *Spermatid* menjadi *Spermatozoa* muda dan sempurna. Menurut Boyles (1991), bahwa *Spermatogenesis* atau proses pembentukan sperma terjadi di dalam testis, tepatnya pada *Tubulus seminiferus*. *Spermatogenesis* mencakup pematangan sel *Epitel germinal* dengan melalui proses pembelahan dan diferensiasi sel. Hal ini bertujuan untuk membentuk sperma fungsional. Pematangan sel terjadi di *Tubulus seminiferus* yang kemudian disimpan dalam *Epididimidis*. *Tubulus seminiferus* terdiri dari sejumlah besar sel epitel germinal atau sel epitel benih yang disebut *Spermatogonia*. *Spermatogonia* terletak di dua sampai tiga lapisan luar sel-sel *Epitel tubulus seminiferus*. *Spermatogonia* terus-menerus membelah untuk memperbanyak diri. Sebagian dari *Spermatogonia* berdiferensiasi melalui tahap-tahap perkembangan tertentu untuk membentuk sperma.

Pada tahap pertama *Spermatogenesis*, *Spermatogonia* yang bersifat *Diploid* berkumpul di tepi membran *Epitel germinal* yang disebut *Spermatogonia* tipe A. *Spermatogonia* tipe A membelah secara mitosis menjadi *Spermatogonia* tipe B. Kemudian, setelah beberapa kali membelah, sel-sel ini akhirnya menjadi *Spermatosit* primer yang masih bersifat *Diploid*. Setelah beberapa minggu, setiap *Spermatosit* primer membelah secara *Meiosis* membentuk dua buah *Spermatosit* sekunder yang bersifat *Haploid*. *Spermatosit* sekunder kemudian membelah lagi secara meiosis membentuk empat buah *Spermatid*. *Spermatid* merupakan calon sperma yang belum memiliki ekor dan bersifat *Haploid*. Setiap *Spermatid* akan berdiferensiasi menjadi *Spermatozoa* atau sperma. Proses perubahan *Spermatid* menjadi sperma disebut *Spermiasi* (Soeroso *et al.*, 2012).

*Spermatogonium* berubah menjadi *Spermatosit* primer melalui pembelahan *Mitosis*. Selanjutnya, spermatosit primer membelah diri secara mitosis menjadi dua *Spermatosit* sekunder yang *Haploid* dan berukuran sama. *Spermatosit* sekunder mengalami pembelahan *Meiosis* dua menghasilkan empat *Spermatid*. *Spermatid* adalah calon sperma yang belum berekor. *Spermatid* yang telah mempunyai ekor disebut sperma. Pada manusia *Spermatogenesis* berlangsung lebih kurang 16 hari. Selama *Spermatogenesis*, sperma menerima bahan makanan dari sel-sel *Sertoli*. *Sel sertoli* merupakan tipe sel lainnya di dalam *Tubulus seminiferus* (Abdu, 2008).

Menurut Suaty *et al.*, (2013) bahwa proses pembentukan *Spermatozoa* dipengaruhi oleh kerja beberapa hormon, diantaranya:

- a) Kelenjar *Hipofisis* menghasilkan hormon perangsang folikel (*Folicle Stimulating Hormon/ FSH*) dan hormon *Lutein* (*Luteinizing Hormon/ LH*).

- b) LH merangsang sel Leydig untuk menghasilkan hormon *Testosteron*. Pada masa pubertas, *Androgen/ Testosteron* memacu tumbuhnya sifat kelamin sekunder.
- c) FSH merangsang sel Sertoli untuk menghasilkan ABP (*Androgen Binding Protein*) yang akan memacu *Spermatogonium* untuk memulai *Spermatogenesis*.
- d) Hormon pertumbuhan, secara khusus meningkatkan pembelahan awal pada *Spermatogenesis*.

Menurut Astuti (2011), bahwa semua proses *Spermatogenesis* dikontrol oleh sistem *Endokrin*, yaitu oleh hormon *Gonadotropin* seperti hormon FSH, ICGSH dan *Androgen*. Rangkaian kejadian pengendalian hormon terhadap *Spermatogenesis* pada sapi jantan adalah:

- 1) Sapi jantan pada waktu pubertas dicapai hormon FSH mempengaruhi sel Leydig untuk menghasilkan hormon *Androgen* (hormon jantan).
- 2) Androgen membuat *Epitel germinalis* dari *Tubulus seminifrus* bereaksi terhadap FSH.
- 3) FSH menyebabkan dimulainya *Spermatogenesis* dengan adanya pembelahan sel di *Spermatogonia*.
- 4) *Spermatogenesis* diatur oleh FSH, LH dan *Androgen* serta *Estrogen*.
- 5) Androgen terhadap seluruh organ kelamin jantan membantu mempertahankan kondisi yang optimum terhadap spermatogenesis, transportasi spermatozoa dan penempatannya di daerah yang terjadi pembuahan.

## ***F. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sistem Reproduksi Ternak Sapi***

Menurut Utama (2011), bahwa faktor yang mempengaruhi sistem reproduksi pada ternak sapi adalah:

### *1. Genetik*

Salah satu kunci memperoleh keberhasilan dalam usaha peternakan adalah adanya kualitas bibit yang digunakan, bibit mempunyai kualitas yang baik, genetik yang baik, mempunyai ciri fisik yang baik. Dengan bibit yang baik dan berkualitas maka akan meningkatkan produktivitas hasil ternak dari tujuan usaha yang dijalankan, namun bibit bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan usaha peternakan. Untuk menghasilkan bibit-bibit yang baik dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu melakukan Seleksi untuk memilih ternak yang dianggap mempunyai mutu genetik yang baik untuk dikembangbiakkan lebih lanjut serta memilih ternak yang kurang baik untuk disingkirkan dan dipelihara dengan dipisahkan dari bibit yang baik. Seleksi genetik memungkinkan untuk meningkatkan kesehatan secara menyeluruh, yang dapat melawan penyakit-penyakit dan gangguan-gangguan yang spesifik pada reproduksi ternak. Seleksi genetik bagi kesuburan pejantan

Kemunduran dalam fertilitas betina menjadi perhatian utama dari dua bidang, baik para peneliti maupun para peternak, sehingga program perbaikan genetik seharusnya difokuskan untuk mengukur fertilitas betina, seperti tingkat lamanya hari dan tingkat kebuntingan keturunan.

### *2. Lingkungan*

Suhu lingkungan yang terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat mempengaruhi organ reproduksi ternak jantan. Hal ini menyebabkan fungsi skrotum terganggu sehingga terjadi kegagalan pembentukan spermatozoa dan produksi menurun. Pejantan yang ditempatkan pada ruangan yang panas mempunyai tingkat fertilitas yang rendah karena disebabkan memburuknya kualitas semen jika berada pada suhu yang panas spermatozoa yang diproduksi tidak dapat bertahan hidup. Iklim yang ada diberbagai daerah tidaklah sama, melainkan bervariasi tergantung dari faktor-faktor yang tak dapat dikendalikan (tetap) seperti altitude (letak daerah dari ekuator, distribusi daratan dan air, tanah dan topografinya) dan latitude (ketinggian tempat) dan faktor-faktor tidak tetap (variabel) seperti aliran air laut, angin, curah hujan, drainase dan vegetasi.

### 3. Pakan

Makanan ternak juga sangat berpengaruh pada ukuran testis pada ternak jantan. Kekurangan makanan dapat menghambat pertumbuhan terutama pada organ reproduksi yang menghambat terjadinya dewasa kelamin, pada ternak dewasa kekurangan makanan dapat mengakibatkan gangguan fungsi fisiologis baik pada testis maupun pada kelenjar aksesorisnya yang menghambat libido sehingga produksi semen turun. Status gizi / nutrisi seekor ternak dari lahir sampai dewasa dapat berpengaruh terhadap total performans reproduksinya melalui pengaruhnya terhadap umur pada saat pubertas yang akan berdampak terus terhadap reproduksi pada saat dewasa. mengemukakan secara nyata terdapat hubungan antara berat testis dan berat badan, tetapi juga antara berat testis dan body condition score. Karena itu, nyatanya hubungan juga terdapat antara hari

pengeluaran sperma, berat badan, dan body condition score. Bagaimanapun jika sangat kekurangan makanan dapat berpengaruh terhadap kuantitas produksi sel sperma dan hal itu tidak dilihat untuk memodifikasi kualitas semen yang diejakulasi.

Pakan ternak sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tubuh ternak. Berat tubuh sangat berkorelasi positif terhadap pertumbuhan alat reproduksi ternak (berat testis). Pada ternak jantan, pemenuhan kebutuhan pakan sangat mendukung aktivitas reproduksinya, Pada ternak dewasa, kekurangan pakan dapat mengakibatkan gangguan fungsi fisiologis, baik pada testes maupun kelenjar asesorisnya serta dapat menurunkan libido sehingga produksi semen turun, Pada dasarnya, sumber pakan sapi dapat disediakan dalam bentuk hijauan dan konsentrat, dan yang terpenting adalah pakan yang memenuhi kebutuhan protein, karbohidrat, lemak, dan vitamin serta mineral Secara alamiah pakan utama ternak sapi adalah hijauan, yang dapat berupa rumput alam atau lapangan, rumput unggul, leguminosa, limbah pertanian serta tanaman hijauan lainnya. Dalam pemilihan hijauan pakan ternak harus diperhatikan disukai ternak atau tidak, mengandung toxin (racun) atau tidak yang dapat membahayakan perkembangan ternak yang mengkonsumsi. Namun permasalahan yang ada bahwa hijauan di daerah tropis mempunyai kualitas yang kurang baik sehingga untuk memenuhi kebutuhan nutrisi perlu ditambah dengan pemberian pakan konsentrat.

Kekurangan energi yang ekstrim akan menyebabkan terlambatnya masa pubertas pada sapi potong dan dapat menghambat produksi spermatozoa. Pejantan yang diberi ransum berenergi tinggi mempunyai kualitas semen yang lebih rendah

dibanding dengan pejantan yang diberi ransum berenergi sedang. Peningkatan energi ransum dapat mempengaruhi termoregulasi testis dan skrotum melalui pengurangan sejumlah panas yang dapat diradiasikan dari leher skrotum sehingga terjadi peningkatan suhu testis dan skrotum yang berdampak terhadap penurunan produksi sperma dan kualitas sperma.

#### 4. *Umur*

Faktor yang mempengaruhi kualitas semen salah satunya adalah umur pejantan karena perkembangan testis dan spermatogenesis dipengaruhi oleh umur. Pejantan yang terlalu muda (umur kurang dari 1 tahun) atau terlalu tua menghasilkan semen yang sedikit. Pejantan yang berumur 2-7 tahun dapat menghasilkan semen terbaik dengan angka kebuntingan yang tinggi pada betina yang dikawini dibandingkan dengan pejantan umur diluar interval.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Waktu Dan Tempat***

Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan Desember 2017 sampai dengan Februari 2018. Lokasi penelitian bertempat di Usaha Peternakan Rakyat di Desa Pajukukang Kecamatan Lumpangan Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan.

#### ***B. Materi Penelitian***

##### ***1. Alat dan Bahan***

Alat yang digunakan dalam penelitian ini berupa ember, karung, kamera atau handphone, meteran, mikser, mesin penggiling pakan, sekop dan timbangan.

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 10 ekor sapi jantan, dengan berat badan  $\pm 150$  kg, umur 2 tahun, Bungkil kelapa, Dedak Padi, Garam, Jagung, Mineral, Molases, Rumput gajah (*Pennisetum purpureum*), Alga coklat (*Sargassum* sp), Tepung Kulit Coklat.

##### ***2. Pakan***

Pakan yang diberikan dalam penelitian ini adalah pakan hijauan (rumput gajah mini) dan konsentrat. Konsentrat dibuat dari bahan pakan lokal dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 1. Komposisi Pakan Konsentrat yang Diberikan:

Komposisi Pakan (Kg)		
Konsentrat	Komposisi (%)	Komposisi (kg)
Molases	3%	3kg
Dedak Padi	50%	50kg
Tepung Kulit Coklat	10%	10kg
Mineral	1%	1kg
Garam	1%	1kg
Jagung	10%	10kg
<i>Sargassum</i> sp	15 %	15kg
Bungkil kelapa	10%	10kg
Jumlah	100%	100kg

Tabel 2. Hasil Analisis Proksimat Alga Coklat (*Sargassum* sp)

Pakan	Komposisi %					
	Air	Protein Kasar	Lemak Kasar	Serat Kasar	BETN	Abu
<i>Sargassum</i> sp.	17.04	12.45	0.96	12.72	36.93	36.93

Sumber :Laboratorium Kimia Makanan Ternak Jurusan Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin Makassar. 2017.

### **C. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode penelitian yang digunakan adalah eksperimen dengan tujuan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendali.

### **D. Parameter yang diukur**

Parameter yang diukur dalam penelitian ini adalah lingkaran *Scrotum* pada Sapi Bali, dengan cara melingkarkan pita ukur pada bagian terlebar dari *Scrotum* atau tepat pada bagian tengah *Scrotum* atau sisi terluar *Scrotum*, Pengukuran lingkaran *Scrotum* Sapi Bali dilakukan pada pagi hari sekitar jam 08.30 WITA. Pengambilan data lingkaran *Scrotum* dilakukan setiap 10 hari selama 50 hari, sehingga pengukuran dilakukan sebanyak 5 kali selama penelitian.

### **E. Prosedur kerja**

#### **1. Persiapan**

Persiapan yang dilakukan sebelum penelitian dimulai dari:

- a. Penyusunan Formulasi Ransum (Komposisi Pakan).
- b. Pembuatan Konsentrat
  1. Pengumpulan alga coklat (*Sargassum* sp.) diperoleh dari pantai rumput laut di Kabupaten Takalar Desa Punaga.
  2. Pengeringan dilakukan untuk mengurangi kadar air pada Alga Coklat (*Sargassum* sp.)
  3. Setelah itu dilakukan penggilingan dan penghalusan Alga Coklat (*Sargassum* sp.) dan bahan lainnya.
  4. Melakukan penimbangan sesuai dengan formulasi ransum.

5. Pencampuran bahan.

## **2. Pelaksanaan**

a. Pemberian Pakan pada Ternak dengan Perlakuan:

Pemberian pakan konsentrat sebanyak 5,5 Kg/ekor/hari, dengan pemberian dilakukan dua kali dalam sehari yaitu dipagi hari pukul 08:00 sebanyak 2,5 Kg yang bertujuan untuk meningkatkan palatabilitas sapi sebelum diberi hijauan pada sore hari diberikan kembali pada pukul 17:00 sebanyak 3 kg yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas Alga Coklat (*Sargassum* sp.)

b. Pengukuran Lingkar *Scrotum*

Pengukuran lingkar skrotum Sapi Bali dilakukan pada pagi hari sekitar jam 08.30 WITA. Pengambilan data lingkar *Scrotum* dengan pengukuran dilakukan setiap 10 hari. Adapun lama penelitian 50 hari, sehingga pengukuran dilakukan sebanyak 5 kali. Pengukuran dilakukan pada sapi jantan perlakuan P0 (kontrol/ tanpa menggunakan *Sargassum* sp.) dan P1 (menggunakan *Sargassum* sp.).

## **F. Analisis Data**

Pengaruh pemberian *Sargassum* sp. terhadap pertambahan lingkar skrotum menggunakan uji t (*t-Test Independent Sample*). Uji t (*t-Test Independent Sample*) adalah salah satu uji yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan (meyakinkan) dari dua buah mean sampel (dua buah variabel yang dikomparasikan). Data dianalisis dengan uji t (*t-Test Independent Sample*) untuk melihat pengaruh pemberian *Sargassum* sp. terhadap pertambahan lingkar skrotum (LS) Sapi Bali (Amdal, 2013)

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2} \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}}$$

Keterangan:

$\bar{X}_1$  = rata- rata sampel 1

$\bar{X}_2$  = rata- rata sampel 2

$n_1$  = jumlah sampel 1

$n_2$  = jumlah sampel 2

$s_1$  = simpangan baku sampel 1

$s_2$  = simpangan baku sampel 2



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### ***A. Pengaruh Pemberian Alga Coklat (*Sargassum* sp.) terhadap Lingkar Scrotum Sapi Bali***

*Scrotum* merupakan kantung yang didalamnya berisi testis yang berjumlah sepasang, yaitu *Scrotum* kanan dan *Scrotum* kiri, testis di bungkus dengan kulit yang disebut *Scrotum* inilah yang mempunyai fungsi vital dalam memproduksi sperma pada ternak jantan. Hasil pemberian *Sargassum* sp. terhadap lingkar *Scrotum* Sapi Bali dengan pemberian pakan konsentrat dapat dilihat perbedaan ukuran pertambahan lingkar *Scrotum* ke-2 perlakuan pada tabel 3. Sebagai berikut:

Tabel 3. Rata-Rata Perbedaan Pertambahan Ukuran Lingkar *Scrotum* Pada ke-2 Perlakuan

Perlakuan	Lingkar <i>Scrotum</i>					Rata-rata
	Hari ke					
	10	20	30	40	50	
P0	20.2	20.64	21.4	21.82	22.6	21.332
P1	20.4	21	22.06	25.36	28.06	23.376

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2018.


Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa pemberian *Sargassum* sp. pada sapi yang diberi dan tidak diberikan *Sargassum* sp. tidak ada perbedaan nyata pada hari ke 10 sampai hari ke 30, namun pada hari ke 30 cenderung mulai menunjukkan adanya peningkatan pertambahan lingkar *Scrotum* sampai dengan hari ke 50. Hal ini disebabkan karena adanya kandungan senyawa-senyawa aktif *Steroida* di dalam pakan konsentrat dengan penambahan *Sargassum* sp. yang dikonsumsi oleh sapi. Hal ini didukung oleh Merdekawati *et al.*, (2009), bahwa

*Sargassum* sp. mengandung senyawa-senyawa aktif *Steroida*, *Alkaloida*, *Fenol*, dan *Triterpenoid*. Lebih lanjut dinyatakan, bahwa *Steroid* yang terdapat dalam *Sargassum* sp. termasuk dalam kelompok hormon (zat pemacu) yang terdapat pada empedu dan sistem reproduksi pada hewan dan manusia, hormon-hormon seks yang dihasilkan terutama dalam testis dan indung telur adalah suatu *Steroid*, hormon jantan disebut *Androgen* sedangkan untuk betina *Estrogen* dan *Progestin*. *Steroid* dapat dijumpai pada hampir semua jaringan hewan, dengan penambahan *Sargassum* sp. dapat memberikan tambahan nutrisi pada ternak yang bisa meningkatkan produktifitas sapi jantan. Menurut Patra *et al.*, (2008), bahwa ukuran lingkaran *Scrotum* berhubungan dengan *Spermatogenesis*. Waktu yang dibutuhkan untuk *Spermatogenesis* sekitar  $\pm 50$  hari, sehingga makanan atau suplemen yang diberikan akan menunjukkan pengaruh setelah 50 hari. Pada proses *Spermatogenesis* sapi dan nutrisi yang baik menunjukkan bahwa sekresi hormon LH dan *Gonadotrophin* meningkat. *Gonadotrophin* merupakan salah satu hasil sintesa dari protein. *Sargassum* sp. memiliki kandungan protein yang tinggi yaitu sekitar 12,45 %. Hal inilah yang mendasari bahwa sistem *Endokrinologi* dapat berjalan lancar dengan pemberian *Sargassum* sp.

Faktor lain yang menyebabkan pertambahan ukuran lingkaran skrotum pada perlakuan P1 (yang diberikan *Sargassum* sp.) dibandingkan dengan perlakuan P0 (tanpa *Sargassum* sp). adalah kandungan nutrisi pakan konsentrat dengan penambahan *Sargassum* sp. lebih baik. Hal ini didukung oleh Setiawan (2001), bahwa *Sargassum* sp. mengandung yodium, protein, vitamin C dan mineral seperti Ca, K, Mg, Na, Fe, Cu, Zn, S, P dan Mn, sebagai anti bakteri, anti

tumor, sumber *Algin*, *Tannin*, *Fenol* dan *Auksin* yang merupakan zat yang merangsang kesuburan.

Perbedaan pertambahan ukuran lingkaran *Scrotum* ke-2 perlakuan selanjutnya dianalisis menggunakan *Independent t-test*. Hasil analisis menunjukkan bahwa ukuran lingkaran *Scrotum* sapi dengan pemberian *Sargassum* sp. tidak berpengaruh nyata ( $p > 0,05$ ). Hal ini diduga, karena level penambahan *Sargassum* sp. kedalam pakan konsentrat 15%. Meskipun pertambahan ukuran lingkaran *Scrotum* tidak berpengaruh nyata ( $p > 0,05$ ) namun pada grafik 1 menunjukkan trend pertambahan ukuran lingkaran *Scrotum* pada perlakuan P1 (yang diberikan *Sargassum* sp.) lebih tinggi dibandingkan dengan P0 (tanpa diberikan *Sargassum* sp.). Hasil pemberian *Sargassum* sp. terhadap lingkaran *Scrotum* Sapi Bali dengan pemberian pakan konsentrat dapat dilihat pada grafik 1. sebagai berikut:



Grafik 1: Rata-Rata Lingkaran *Scrotum* Sapi Bali Jantan yang Diberikan dan Tanpa Penambahan *Sargassum* sp.

Berdasarkan grafik 1 dari hasil pengukuran lingkaran *Scrotum* Sapi Bali jantan dapat dilihat pengaruh yang diberikan hanya sedikit tetapi memiliki kecenderungan untuk berpengaruh seperti yang dilihat pada perubahan lingkaran *Scrotum* pada sapi perlakuan dengan pemberian *Sargassum* sp. (P1) menunjukkan peningkatan yang baik dibandingkan dengan sapi tanpa pemberian *Sargassum* sp. (P0), selain itu juga penyebab tidak berbeda nyata antara kedua perlakuan yaitu disebabkan oleh umur sapi penelitian yang digunakan masih relatif muda yaitu umur 2-3 tahun dan bobot badan yang masih berkembang, dengan demikian perkembangan testis juga akan mengalami peningkatan seiring dengan penambahan bobot badan. Menurut Ningrum *et al.*, (2008), menyatakan bahwa lingkaran *Scrotum* berhubungan dengan umur dan berat tubuh sapi potong dimana perkembangan *Scrotum* berjalan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan tubuh secara keseluruhan.

#### ***B. Integrasi Keilmuan Pemberian Pakan Konsentrat dengan Penambahan Sargassum sp. pada Sapi Jantan.***

*Sargassum* sp. merupakan salah satu jenis rumput laut coklat (*Phaeophyta*) terbesar di laut tropis, memiliki kandungan nutrisi dalam bobot kering yaitu protein 9,18%, lemak 2,11%, abu 29,15%, serat kasar 10,34% dan karbohidrat 49,22%. Berdasarkan nilai tersebut menunjukkan bahwa *Sargassum* sp. memiliki kandungan karbohidrat yang cukup tinggi sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pakan.

Hal ini sesuai dengan Firman Allah swt. dalam QS Al-Imran /3:191 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Terjemahnya:

“(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan Kami, Tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, lindungilah Kami dari Azab Neraka” (Kementrian Agama RI. 2013).

Ayat tersebut mengandung penjelasan bahwa semua makhluk ciptaan-Nya tidak diciptakan dengan percuma. Allah swt. tidak menciptakan sesuatu di alam semesta ini dengan sia-sia dan tidak mempunyai hikmah yang mendalam dan tujuan tertentu yang akan membahagiakan umat-Nya di dunia dan akhirat. Pemanfaatan limbah pantai ini menunjukkan bahwa segala sesuatu diciptakan tidaklah sia-sia. Limbah pantai, Alga Coklat (*Sargassum* sp.) dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak kambing maupun sapi, pengolahan yang dilakukan pada limbah pantai tersebut yaitu dikeringkan kemudian dihaluskan menjadi tepung dan dijadikan konsentrat, pemanfaatannya secara langsung sebagai pakan ternak sapi mampu memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan dalam tubuh sapi. Untuk lebih mengoptimalkan kandungan yang ada dalam (*Sargassum* sp.) tersebut di tambahkan dedak, tongkol jagung, dan mineral agar mendapat hasil yang lebih baik.

Ternak dapat dibedakan satu sama lain salah satunya dapat dilihat dari warna bulu. Seperti Sapi Bali berwarna merah bata sedangkan sapi FH berwarna hitam putih. Sapi bali jantan dewasa berwarna hitam sedangkan Sapi Bali betina berwarna merah bata. Keberadaan ternak dengan corak warna dan ciri-ciri fisik yang berbeda-beda merupakan sifat alamiah dari Allah swt, hal ini tercantum dalam al-Qur'an surah Fathir ayat 28 yang berbunyi:

وَمِنَ النَّاسِ وَالْأَنْعَامِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا تَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الَّذِينَ عَلِمُوا  
 إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

Terjemahnya:

“Dan demikian (pula) di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya).Diantara hamba-hamba Allah yang takut kepada-Nya, hanyalah para ulama. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun” (Kementerian Agama, RI. 2013).

Ayat tersebut menjelaskan tentang hal-hal yang menunjukkan kesempurnaan dan kekuasaan Allah swt. yang menciptakan binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak, yang bermacam-macam warna dan bentuk fisiknya sekalipun berasal dari jenis, bahkan ada binatang yang memiliki warna yang sangat indah menurut pandangan manusia sebagai makluk atau binatang kesayangan, maha suci Allah swt. telah mencipta alam semesta dengan dengan sebaik-baiknya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Kesimpulan dari penelitian pemberian Alga Coklat (*Sargassum* sp.) sebagai pakan konsentrat terhadap lingkaran *Scrotum* Sapi Bali adalah tidak terdapat perbedaan nyata ( $p > 0.05$ ).

#### ***B. Saran***

Berdasarkan kesimpulan maka disarankan pada penelitian lanjutan Sapi Bali, level penambahan *Sargassum* sp. dalam pakan konsentrat  $> 15\%$  guna memacu pertumbuhan lingkaran *Scrotum*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdu, S.B. 2008. *Effect of Vitamins Deficiencies on the Histological Structure of the Testis of Albino Mice Mus Musculus*. Saudi Journal of Biological Sciences, 15, 269- 278.
- Amdal. 2013. *Ilmu Nutrisi dan Makanan Ternak Ruminan*: Universitas Indonesia. Jakarta. (Online) <http://isjd.pdii.lipi.go.id> diakses pada tanggal 4 november 2017.
- Amkjaya, L. 2011. *Bioteknologi Hasil- Hasil Laut*. : PKSPL IPB. Bogor
- Aslan, L. M. 1991. *Budidaya Rumput Laut*. Yogyakarta: Kanisius. (Online) <http://sargassum.pi.list.co.id>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2017.
- Astuti, 2011. *Pemeliharaan Sapi Potong dan Sapi Perah*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Atmadja, W. S., A. Kadi, Sulistijo dan R. Satari. 2012. *Pengenalan Jenis-Jenis Rumput Laut Indonesia*. Puslitbang Oseanologi LIPI, Jakarta.
- Baton Rouse, Louisiana. Blakely and Bade. 1994. *Ilmu Peternakan, Edisi ke- 4*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Batra, N., Nehru, B. and Bansal, M.P. 2004. *Reproductive Potential of Male Portan Rats Exposed To Various Lev-Els of Lead With Regard To Zinc Status*. British Journal of Nutrition, 91, 387-391. doi: 10. 1079/BJN 2003 1066.
- Bold, 1978. *Introduction To The Algae, Structure and Reproduction*. New Delhi: Prentice Hall Of India.
- Boyles, S. 1991. *The Bull's Scrotum and Testicles*. OSU Extension Beef Specialist. available at <http://beef.OSU.edu/library/scrotum.html>. Accession date 10 March 2007. Diakses 29 desember 2017.
- Budhiyanti, S. A., S. Raharjo, D. W. Marseno and I. Y. B. Lelana. 2012. *Antioxidant Activity of Brown Algae Sargassum Species Extract from The Coastline of Java Island*. American Journal of Agricultural and Biological Sciences, 7 (3) : 337-346.
- Kementrian Agama RI, *Al Qur'anul Kariim dan Terjemahnya*.: PT. Syamil Cipta Media. Hal. 531. Bandung

- Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2015. *Kementrian Pertanian Republik Indonesia*. Jakarta.
- Dellmann. 1992. *Buku Teks Histologi Veteriner II*. Edisi ketiga. Fakultas Peternakan UGM. Yogyakarta
- Budiarsana, I.G.M. 2013. *Analisis Ekonomi Penggemukan Sapi dengan Pemberian Pakan Mengandung By-pass Protein*. Pusat Penelitian Peternakan, Badan Litbang Pertanian, Departemen Pertanian, Bogor.
- Dawes, C. J. 2000. *Marine Botany A Wiley Interscience.*: Publication John Wiley & Sons. New York.
- Erywan. 2012. *Pengaruh Steroid terhadap Reproduksi PKSPL IPB*. . Bogor.
- Fairuz. 2015. *Pemanfaatan Pakan Konsentrat pada Ternak*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Fajarningsih. 2008. *Bioaktivitas Ekstrak Turbinaria Decurrens sebagai Antitumor (Hela dan T47D) Serta Efeknya terhadap Polifera Limfosit*. Jurnal Pascapanen dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan. Vol 3. No 1. hlm 21.
- Feradis, 2010. *Bioteknologi Reproduksi pada Ternak*. Alfabeta, Bandung. (Online) <http://www.reprodc.go.id> diakses pada tanggal 4 november 2017.
- Franson, R. 1992. *Anatomi dan Fisiologi Ternak. Edisi keempat*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta. (Online) <http://www.fisteross.go.id> diakses pada tanggal 12 desember 2017.
- Guntoro. 2002. *Pengaruh Tingkat Pemberian Kosentrat terhadap Daya Cerna Bahan Kering dan Protein Kasar Ransum Pada Sapi Bali Jantan yang Mendapatkan Rumput Raja ( Pennisetum Parpurephoides ).ad- libitum*, Jurnal Agroland 15 ( 4 ) :343- 348.
- Hartadi, Budi Pratomo, dan Joko santoso. 1986. *Tabel-Tabel Dari Komposisi Bahan Makanan Ternak Untuk Indonesia*. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta:
- Hasan, S., A. Ako dan Sudirman. 1990. *Fattening by Feedlot and Pasture Feedlot At Body Weight Gain of Bali Cattle*. Pros. Seminar Nasional Sapi Bali. Fakultas Peternakan Universitas Udayana. Bali:
- Hasnunida. 2007. *Buku Ajar Botani Tumbuhan Rendah*. UNILA. Bandar Lampung.

- Hidayat dan Tris Akbarillah. 2011. *Bahan Makanan Ternak dan Formulasi Ransum*. Lab Nutrisi dan Makanan Ternak. Jurusan Peternakan. UNIB. Bengkulu.
- Jervis, E.D., dkk. 2005. *Avian Brains and A New Understanding of Vertebrate Brain Evolution*. Nature Reviews, Vol.6. New York.
- Kamal, M. 2014. *Bahan Pakan dan Penyusun Ransum*. Fakultas Peternakan Universitas Gajahmada. Yogyakarta.
- Lestari. 2015. *Pemanfaatan Sargassum sp dan Inositol dalam Pakan Terhadap Pertumbuhan dan Daya Tahan Tubuh Ikan Gurami ( Osphoronemus Gouramy Lac )* : Fakultas MIPA Universitas Lampung. Lampung.
- Loveless. 1989. *Prinsip-Prinsip Biologi Tumbuhan untuk Daerah Tropik* .Jakarta: PT Gramedia
- Lukmanul. 2012. *Pemuliaan Ternak Sapi Bali*.: Universitas Indonesia. Jakarta.
- Maryam. 2012. *Histologi Organ Reproduksi Ternak Jantan* : Universitas Brawijaya. Malang.
- Merdekawati, W., Susanto, A. B. dan Limantara, L. 2009. *Kandungan dan Aktivitas Antioksidan Klorofil a dan  $\beta$  Karoten Sargassum sp*. Jurnal Kelautan Nasional, 2 : 144-155
- Moyo. 2013. *Rumput Laut dari Hawaii* : Oriental Publication. Hawaii
- Ningrum AP, Kustono, Hammam M. (2008). *Hubungan Lingkar Skrotum dengan Produksi dan Kualitas Sperma Pejantan Simmental di Balai Inseminasi Buatan Ungaran, Jawa Tengah*. Buletin peternakan vol.32 (2) :85-90 juni 2008.
- Nuryadi. 2010. *Dasar-Dasar Reproduksi Ternak*. Fakultas peternakan universitas Brawijaya, Malang.
- Palupi N, Zakaria F, Prangdimurti E. 2010. *Pengaruh Pengolahan Terhadap Nilai Gizi Pangan*. ENBP Me-L, editor: Departemen Ilmu & Teknologi Pangan Fateta-IPB. Bogor.
- Pandey, N. 2015. *A Textbook of Algae*. Jakarta: Vikas Publishing. (Online) <http://www.algae.com> diakses pada tanggal 5 november 2017.
- Patra, J. K., Rath, S. K., and Jena, K. 2008. *Evaluation of Antioxidant and Antimicrobial Activity of Seaweed (Sargassum sp.) Extract: A Study on*

*Inhibition of Glutathione-S-Transferase Activity. Turkish Journal of Biology.* 32: 119-125.

Pub. House PVT. Ltd., New Delhi. Kerjasama Direktorat Jenderal Peternakan dengan Fakultas Peternakan IPB.1985. *Inventarisasi Potensi dan Pemanfaatan Limbah Industri.* Fakultas Peternakan IPB, Bogor.

Rismani 2011. *Ilmu Makanan Ternak Dasar.* Cetakan Kelima Gajah Mada University Press Yogyakarta. (Online) <http://www.feed.com> diakses pada tanggal 3 januari 2018.

Setiawan. 2001. *Petunjuk Praktikum Taksonomi Tumbuhan (Cryptogamae).* Semarang: UNS. (Online) <http://www.taksonomi.tumbuhan.com> diakses pada tanggal 3 januari 2018.

Soeroso, Y. 2012. *Hubungan Antar Lingkar Skrotum dengan Karakteristik Cairan dan Spermatozoa dalam Cauda Epididymis pada Sapi Bali (The Correlation of Scrotal Circumference, Spermatozoa of Epididymis Caudalis and Dilution Characteristic in Bali Cattle).* Fakultas Pertanian Universitas Tadulako. Palu

Suatyo,P., dan Chaeri, A. 2013. *Histologi Reproduksi Jantan Tikus Putih Setelah Pemberian Propoxur.* Jurnal Inovasi Vol. 3 No. 2, Juli 2009: 99 – 166 <http://isjd.pdii.lipi.go.id> diakses pada tanggal 4 november 2017.

Sulisetjono.2009. *Bahan Serahan Alga : Jurusan Biologi UIN.Malang.*

Sutama. 2011. *Reproduction And Relation To Animal Production In Indonesia.* IPB. Bogor.

Tangendjaja 2006, *Produksi Bahan Kering dan Kecernaan In Sacco Rumput Benggala (Panicum maximum Jacq ) yang di Pupuk Garam Dapur dan Nitrogen,* Jurnal Ilmiah Ilmu – Ilmu Peternakan Februari No XI no 1.

Toleng, 2014. *Interrelationship Of Some Parameters On The Quality Of Bali Bulls Sperms Kept Under Smallholder Farms.*UGM, Yogyakarta,Indonesia.

Tsubo *et al*, 2005 *.Ilmu Nutrisi Ternak Umum.* Gramedia, Jakarta.

Widowati I, Susanto A.B, Stiger-Pouvreau V, Bourgougnon N. 2013. *Potentiality of using spreading Sargassum species from Jepara, Indonesia as an Interesting Source of Antibacterial and Antioxidant Compounds: a Preliminary Study.* 21<sup>st</sup> International Seaweed Symposium. Seaweed Science for Sustainable Prosperity. Bali-Indonesia.

- Wijono. 2010. *Evaluasi Kemampuan Ejakulasi dan Kualitas Semen Sapi Potong Dewasa*. Jalan Pahlawan, Grati Pasuruan.
- Winarno, F.G. 1990. *Teknologi Pengelolaan Alga Laut*: Pustaka Sinar Harapan. Jakarta
- Winarti S. 2010. *Makanan Fungsional*. Yogyakarta; Graha Ilmu. (Online) <http://www.feed.com> diakses pada tanggal 3 januari 2018.
- Wiqayah. 2011. *Kandungan Nutrisi dan Ketersediaan Besi dan Seng Hayati Sargassum sp. di ukur secara in vitro*: Fakultas Biologi UGM. Yogyakarta.



## LAMPIRAN

### Lampiran 1: Hasil Analisis Uji T (*independent t-test*) Pengaruh Alga Coklat (*Sargassum* sp) Sebagai Pakan Konsentrat Terhadap Lingkar *Scrotum* Sapi Bali.

Group Statistics

	Kontr ol	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Perlakuan	1	5	23.3640	3.22299	1.44137
	2	5	21.3280	.95379	.42655

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means		
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)
Perlakuan	Equal variances assumed	10.074	.013	1.354	8	.213
	Equal variances not assumed			1.354	4.695	.237

Independent Samples Test

		t-test for Equality of Means			
		Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
				Lower	Upper
Perlakuan	Equal variances assumed	2.03600	1.50316	-1.43029	5.50229
	Equal variances not assumed	2.03600	1.50316	-1.90464	5.97664

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

**Lampiran 2a: Kegiatan Pelaksanaan Penelitian Pengaruh Alga Coklat (*Sargassum* sp) Sebagai Pakan Konsentrat Terhadap Lingkar *Scrotum* Sapi Bali.**



Gambar 2 a. Pengumpulan bahan Pakan Alga Coklat (*Sargassum* sp)

Gambar 2 b. Pengumpulan Bahan Pakan Kulit coklat



Gambar 3. Pengangkutan Bahan Kulit coklat

**Lanjutan Lampiran 2b: Kegiatan Persiapan Pelaksanaan Penelitian Pengaruh Alga Coklat (*Sargassum* sp) Sebagai Pakan Konsentrat Lingkar *Scrotum* Sapi Bali.**



Gambar 4 a. Pengerinan Bahan Pakan Alga Coklat(*Sargassum* sp)



Gambar 4 b. Pengerinan Bahan Pakan Kulit coklat



Gambar 5 a. Menghaluskan Semua Bahan Pakan



Gambar 5 b. Menghaluskan semua Bahan Pakan

**Lanjutan Lampiran 2c: Kegiatan Persiapan Pelaksanaan Penelitian Pengaruh Alga Coklat (*Sargassum* sp) Sebagai Pakan Konsentrat Terhadap Lingkar *Scrotum* Sapi Bali.**




Gambar 6. Penimbangan Semua Bahan Pakan Konsentrat



Gambar 7. Mencampur Bahan Pakan Konsentrat

**Lanjutan Lampiran 3d: Kegiatan Pengamatan pada Penelitian Pengaruh Alga Coklat (*Sargassum* sp) Sebagai Pakan Konsentrat Terhadap Lingkar *Scrotum* Sapi Bali.**



Gambar 8. Pengukuran Lingkar Scrotum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Muhklisani dilahirkan di Bulukumba pada tanggal 18 Oktober 1996. Anak pertama dari Lima bersaudara, buah hati pasangan Asrullah dan Roslina Peneliti menyelesaikan pendidikan dasar pada tahun 2008 di SDN 222 Dannuang Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba. Kemudian melanjutkan ke sekolah menengah pertama (SMPN)

12 Bulukumba dan lulus pada tahun 2011. Setelah itu Peneliti melanjutkan ke SMA Negeri 9 Bulukumba hingga lulus pada tahun 2014. Peneliti melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi tepatnya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Sains dan Teknologi pada program studi Ilmu Peternakan melalui jalur Seleksi Prestasi Akademik (SPAN-PTKIN). Berkat kerja keras dan kegigihannya peneliti akan menyelesaikan kuliah Strata satu (S1) pada tahun 2018.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R