

**KUALITAS DAN PRODUKSI TELUR BERDASARKAN UMUR
DAN PAKAN YANG DIGUNAKAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Peternakan pada Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

Oleh:

**RIFAID
60700112041**

**JURUSAN ILMU PETERNAKAN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rifaid
NIM : 60700112041
Tempat/Tgl. Lahir : Ntonggu, 12 desember 1993
Jurusan/Prodi : Ilmu Peternakan
Fakultas/Program : Sains dan Teknologi
Alamat : Jln Sahabat 4 (Unhas) Perintis Kemerdekaan
Judul : Kualitas dan Produksi Telur Berdasarkan Umur dan Pakan yang Digunakan.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, Maret 2018

Penyusun,



RIFAID







NIM: 60700112041

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul “Kualiatas dan Produksi Telur Berdasarkan Umur dan Pakan yang Digunakan” yang disusun oleh **RIFAID, NIM: 6070011204** mahasiswa jurusan Ilmu Peternakan pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari selasa, tanggal 27 Maret 2018, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Peternakan pada Jurusan Ilmu Peternakan, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Samata-Gowa, Maret 2018 M
Rajab 1439 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. Ir. A.Suarda, M.Si. (.....)	
Sekretaris	: Mursidin, S.Pt., M.Si. (.....)	
Munaqisy I	: Hj. Irmawaty, S.Pt., M.P. (.....)	
Munaqisy II	: Dr. M. Thahir Maloko, M.Hi. (.....)	
Pembimbing I	: Dr. Ir. H. Muh. Basir Paly, M.Si. (.....)	
Pembimbing II	: Abbas, S.Pt., M.Sc. (.....)	

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar


Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.
NIP. 19691205 199303 1 001


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi saudara rifaid, **Nim: 60700112041**, mahasiswa Jurusan Ilmu Peternakan pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi yang bersangkutan dengan judul **"Kualitas dan Produksi Telur Berdasarkan Umur dan Pakan yang Digunakan"** memandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.


Gowa, Maret 2018

Pembimbing I



Dr. Ir. Muh Basir Paly, M.Si.
NIP. 195907121986031002

Pembimbing II



Abbas, S.Pt. M.Sc

Mengetahui
Ketua Jurusan Ilmu Peternakan



Dr. Ir. Muh Basir Paly, M.Si.
NIP. 195907121986031002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dengan segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya yang telah dianugerahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Kualtas dan Produksi Telur Berdasarkan Umur dan Pakan yang Digunakan”, yang diajukan sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Ilmu Peternakan (S.Pt) pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, beserta sahabat-sahabatnya dan kepada pengikut setianya Insya allah swt. Penulis menyadari bahwa karya ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberi dukungan, do'a semangat, pelajaran dan pengalaman berharga pada penulis sejak penulis menginjak bangku perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini.

Selama penyusunan skripsi, tentunya tidak lepas dari berbagai hambatan dan tantangan, namun berkat petunjuk, bimbingan, arahan, do'a serta dukungan moril dari berbagai pihak maka hambatan dan tantangan tersebut dapat teratasi. Untuk itu, perkenankanlah penulis menghanturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang istimewa kepadak kedua orangtua tercinta, Ibunda Fatimah dan ayah handa Arsyad yang tanpa pamrih, penuh kasih sayang membesarkan dan mendidik penulis sejak kecil hingga menyelesaikan pendidikan seperti saat ini.

Terselesaikannya skripsi ini juga tidak lepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis dengan segala

kerendahan hati dan rasa hormat untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si. selaku rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Arifuddin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Bapak Dr. Ir. H. Muh. Basir Paly, M.Si. sebagai ketua Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Bapak Dr. Ir. H. Muh. Basir Paly. selaku Dosen Pembimbing pertama, dan Bapak Abbas S.Pt., M.Sc. selaku Dosen Pembimbing kedua, atas bimbingan dan mengarahkan penulis mulai dari penyusunan proposal sampai penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Irmawaty, S.Pt M.P. dan Bapak Dr. Muh. Thahir Maloko, M.Hi. selaku penguji yang telah memberikan saran dan kritikan yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Peternakan atas bimbingan dalam kegiatan perkuliahan, baik dalam tatap muka maupun arahan-arahan diluar perkuliahan.
7. Teman-teman senasib seangkatan 2012, dan Adik-adikku Jurusan Ilmu Peternakan Angkatan 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017 yang selalu menyemangati, memotivasi dan memberikan canda tawa kepada penulis.

8. Sahabat-Sahabat KKN Angk. 51 Posko Alatapampang, Kec. Palangga Kab. Goa (Sugi, Tuty, Muklis dan Edi, Bia) yang tidak pernah berhenti mengiringi do'a, motivasi, serta canda tawa sehingga dalam kondisi apapun penulis tetap mampu percaya diri dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Teman teman seperjuangan saya di makassar tanpa terkecuali yang tidak saya sebut satu persatu yang banyak membantu dan memberi masukan kepada penulis dikala suka maupun duka.

Penulis berharap adanya masukan dan saran yang positif demi perbaikan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menambah ilmu pengetahuan tentang peternakan khususnya masalah Kualitas Telur. Semoga segala bantuan dan bimbingan semua pihak dalam penyusunan skripsi ini mendapat imbalan dari Allah swt Amin.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb

Penulis

Rifaid

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGENSAHAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	3
E. Hipotesis.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	4
A. Tinjauan Islam tentang Peternakan Ayam.....	4
B. Tinjauan Islam tentang Ayam Ras Petelur.....	12
C. Klasifikasi Ayam Petelur.....	15
D. Tinjauan Umum tentang Pakan.....	19
E. Produksi Telur.....	22
F. Struktur dan Komposisi Telur.....	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	36
B. Materi Penelitian.....	36
C. Prosedur Kerja atau Desain Penelitian.....	37

D. Variabel yang Diamati pada Penelitian.....	38
E. Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL DAN PENBAHASAN.....	40
A. Kualitas eksternal Telur.....	40
B. Kualitas Interior Telur.....	43
C. Produksi Telur/Hen Day Production(%).....	46
BAB V PENUTUP.....	48
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA.....	49
LAMPIRAN 1.....	52
LAMPIRAN 2.....	64
RIWAYAT HIDUP.....	69

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.	Mutu Telur Berdasarkan Bagian-bagian	29
2.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Berat Telur.....	31
3.	Komposisi Pakan yang di gunakan.....	37
4.	Umur Produksi Ayam.....	37
5.	Dena Rancangan	37
6.	Pengaruh Penggunaan Tiga Kelompok Pakan terhadap Tebal Kerabang Telur Ayam Lohman pada Kelompok Umur yang Berbeda.....	40
7.	Pengaruh Penggunaan Tiga Kelompok Pakan terhadap berat telur <i>ayam lohman</i> pada Kelompok Umur yang Berbeda.....	42
8.	. Pengaruh Penggunaan Tiga Kelompok Pakan terhadap Warna Kuning Telur <i>Ayam Lohman</i> pada Kelompok Umur yang Berbeda.....	43
9	Pengaruh Penggunaan Tiga Kelompok Pakan terhadap Viskositas Telur <i>Ayam Lohman</i> pada Kelompok Umur yang Berbeda.....	45
10	Pengaruh Penggunaan Tiga Kelompok Pakan terhadap Produksi Telur <i>Ayam Lohman</i> pada Kelompok Umur yang Berbeda.....	46

ABSTRAK

Nama : Rifaid
Nim : 60700112041
Jurusan : Ilmu Peternakan
Judul Skripsi : Kualitas Dan Produksi Telur Berdasarkan Umur Dan Pakan Yang Digunakan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat kualitas telur berdasarkan umur ayam dan pemberian pakan dengan komposisi yang berbeda. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September 2017 bertempat di Farm Cahaya Mario Group, Puncak Mario, Sidrap. Materi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : ayam Lohman sebanyak 45 ekor, timbangan digital dengan kepekaan 0,001 g, jangka sorong, timbangan jarum dengan kepekaan 0,1 g, ember, tempat pakan, tempat minum, plastik, piring dan alat kebersihan. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok, yang terdiri dari 3 perlakuan pakan, 3 kelompok umur ayam yang berbeda dan di ulang sebanyak 3 kali. Parameter yang diukur pada penelitian ini terdiri dari kualitas eksternal telur, kualitas interior dan produksi telur. Berdasarkan hasil analisis ragam, kualitas eksternal telur menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan pada kelompok umur yang berbeda terhadap ketebalan kerabang dan tidak menunjukkan adanya pengaruh pada berat telur. Nilai tebal kerabang berkisar antara 0,42 - 0,44. Kualitas interior telur menunjukkan adanya pengaruh pada kelompok umur yang berbeda terhadap warna kuning telur dan terdapat perbedaan pada perlakuan pakan terhadap viskositas telur. Puncak produksi telur selama penelitian di peroleh pada umur 18-29 minggu dan mulai menurun pada umur 50 minggu sampai afkir.

Kata Kunci: Ayam Lohman, Produksi Telur, Viskositas Telur, Warna Kuning Telur

ABSTRACT

Name : Rifaid
Nim : 60700112041
Major : Animal Science
Thesis Title : **Quality And Production Of Egg Based On Age And Used Feed**

This study aims to see the quality of eggs produced based on age and benefits with different compositions. The research was conducted in September 2017 located at Farm Cahaya Mario Group, Puncak Mario, Sidrap. The materials used in this research are : Lohman chicken as much as 45 tail, digital scale with sensitivity 0,001 g, sliding wheel, needle scales with sensitivity 0,1 g, bucket, feeding place, drinking place, plastic, plate and hygiene tool. This study used Randomized Block Design, which consisted of 3 feed treatments, 3 different age groups of chickens and repeated 3 times. The parameters measured in this study consisted of external quality of egg, interior quality and egg production. Based on the analysis of the variety, on the external quality of the eggs showed a significant effect on different age groups on the thickness of the shell and did not show any influence on egg weight. The thickness of the research shell ranged from 0.42 to 0.44. The quality of the egg interior shows the effect on different age groups on the yolk color and there is difference in the feed treatment of the egg viscosity. Peak egg production during the study was obtained at the age of 18-29 weeks and began to decline at the age of 50 weeks to reject.

Keywords: *Egg Production, Egg Viscosity, Egg Yellow Color, Lohman Chicke*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan masyarakat akan hasil ternak seperti daging, susu dan telur semakin meningkat. Hal ini seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, tingkat pendidikan, kesadaran masyarakat akan gizi dan peranan zat-zat makanan khususnya protein bagi kehidupan, serta meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan hasil ternak. Peternakan merupakan subsektor dari pertanian yang berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan protein hewani, sehingga perkembangan sektor peternakan memberikan dampak positif bagi masyarakat untuk peningkatan perbaikan gizi dan dampak positif bagi pelaku ternak yaitu meningkatnya kesejahteraan (Widjaja dan Abdullah, 2003).

Usaha peternakan ayam petelur merupakan salah satu subsektor peternakan yang memberikan kontribusi besar dalam pemenuhan protein hewani masyarakat Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan konsumsi dan permintaan telur sangat tinggi dibanding pangan hewani lainnya.

Ayam petelur merupakan ayam yang sangat efisien untuk menghasilkan telur, dan sangat potensial untuk diusahakan karena mudah untuk dipelihara, cepat berproduksi, dan produksinya berupa telur disukai masyarakat. Menurut Susilorini, Sawitri dan Muharlieni (2009) Ayam petelur adalah ayam yang sangat efisien untuk menghasilkan telur dan mulai bertelur umur \pm 5 bulan dengan jumlah telur sekitar 250 - 300 butir per ekor per tahun.

Telur merupakan sumber protein hewani, bergizi tinggi, disukai masyarakat, mudah didapat, harga terjangkau, dan dapat dibuat berbagai produk seperti roti, kue, telur asin dan lain-lain. Menurut Komala (2008) Kandungan komposisi gizi telur terdiri antara lain : air 73,7 % ; Protein 12,9 % ; Lemak 11,2 % dan Karbohidrat 0,9 %, dan kadar lemak pada putih telur hampir tidak ada. Ditambahkan Sudaryani (2003) bahwa hampir semua lemak di dalam telur terdapat pada kuning telur, yaitu mencapai 32 %, sedangkan pada putih telur kandungan lemaknya sangat sedikit. Maka pengamatan lemak dan kolesterol lebih efektif dilakukan pada kuning telur.

Jagung merupakan bahan pakan utama dalam penyusunan pakan ternak unggas. Karena jagung mempunyai banyak keunggulan dibandingkan dengan bahan pakan lainnya yakni memiliki EM 3370 kkal/g, PK 8,6%, dan beta karoten sebesar 33 mg/kg atau 3,3 mg/100 g. Maka dari itu fluktuasi ketersediaan jagung harus diperhatikan oleh peternak (Widowati, 2007).

Kurangnya pemberian protein dan energi dalam ransum mengakibatkan penurunan produksi telur dan berat telur pada ayam. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemberian protein dan energi yang seimbang sehingga produksi telur dan berat telur pada ayam dapat meningkat. Sehubungan dengan permasalahan diatas maka dilakukan penelitian penggunaan protein atau energi pakan untuk meningkatkan produksi telur.

Kualitas telur konsumsi dapat dilihat dari beberapa faktor diantaranya adalah warna kuning telur dan kandungan gizi di dalam telur (seperti kadar lemak dan kadar kolesterol kuning telur) (Muharlein, 2010). Untuk mendapatkan kualitas telur yang baik, maka pemberian pakan yang sesuai, ayam petelur mampu

menghasilkan kualitas telur yang baik. Sekalian pakan yang digunakan, umur ayam petelur merupakan faktor terpenting dalam menghasilkan kualitas telur yang baik pula.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh pemberian pakan dengan komposisi yang berbeda terhadap kualitas telur yang dihasilkan?
2. Mengapa umur ayam petelur dapat mempengaruhi kualitas telur yang dihasilkan?

C. Tujuan Penelitian

Untuk melihat kualitas telur yang dihasilkan berdasarkan umur ayam dan pemberian pakan dengan komposisi yang berbeda.

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai referensi penunjang untuk mengetahui komposisi pakan yang baik dalam memproduksi telur yang berkualitas serta untuk melihat peningkatan atau penurunan produksi telur ayam.
2. Sebagai bahan pengetahuan dalam dunia peternakan untuk memproduksi telur yang berkualitas tinggi.

E. Hipotesis

Diduga komposisi pakan yang terdiri dari konsentrat, jagung dan katul dengan konsentrasi berbeda yang disesuaikan dengan umur ayam petelur mampu menghasilkan peningkatan kualitas dari telur ayam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Islam tentang Peternakan Ayam

Ilmu peternakan merupakan ilmu terapan yang disebut secara eksplisit di dalam al-Quran. Bahkan beberapa nama ternak dijadikan sebagai nama surat di dalam al-Quran. Ternak merupakan sumber pelajaran yang penting di alam karena terdapat banyak hikmah dalam penciptaannya. Lihatlah bagaimana Allah memberikan kemampuan pada ternak unggas (ayam, itik, burung, angsa dan lain-lain) yang mampu mengubah biji-bijian menjadi daging dan telur. Atau kemampuan yang dimiliki lebah madu dalam mengubah cairan nektar tanaman menjadi madu yang bermanfaat dan berkhasiat obat bagi manusia. Sedemikian besarnya peranan usaha peternakan dalam kehidupan, maka sudah pada tempatnya subsektor ini mendapat perhatian kaum muslimin, termasuk melakukan penelitian dan pengembangan produk peternakan yang bersumber pada al-Quran dan al-Hadis (Rasyaf, 2015).

Melalui pengamatan dan pemanfaatan binatang-binatang ternak itu, maka dapat memperoleh bukti kekuasaan Allah dan karunia-Nya. Kami memberi kamu minum dari sebagian, yakni daging dan telur yang penuh gizi, yang ada dalam perutnya, dan juga selain daging, padanya, yakni pada binatang – binatang ternak itu, secara khusus terdapat juga faedah yang banyak buat kamu seperti daging, telur dan bulunya. Semua itu dapat kamu manfaatkan untuk berbagai tujuan dan sebgaiannya darinya, atas berkat Allah, kamu makan dengan mudah lagi lezat dan bergizi. Diatasnya, yakni diatas punggung binatang – binatang itu, yakni unta dan

juga di atas perahu-perahu kamu dan barang-barang kamu diangkat atas izin Allah menuju tempat – tempat yang jauh (Nazir, 2015). Sebagaimana Firman Allah swt. dalam QS,al-Mu’Minun: 23/21 sebagai berikut:

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۚ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

Terjemahnya;

“Dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu, kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan (juga) pada binatang-binatang ternak itu terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian daripadanya kamu makan (Kementrian Agama, RI, 2012).

Dalam Surah ke 23 (Al-Mu’minun) ayat 21 menjelaskan bahwa ternak memiliki banyak manfaat, seperti daging bahan konsumsi dalam pemenuhan gizi, susunya yang bisa diminum dan bernilai gizi tinggi, hasil ikutan lainnya seperti pupuk kompos, biogas, kulit, tulang dan lain sebagainya. Mahasuci Allah yang telah menciptakan beraneka macam hewan ternak dan beragam produk ternak yang sangat bermanfaat bagi manusia. Jika kita perhatikan makna yang tersirat dalam kutipan surah ke 23 Al-Mu’minun ayat 21 dapat dilihat betapa pentingnya peran hewan ternak dalam kehidupan manusia. Produk utama ternak (susu, daging, telur dan madu) merupakan bahan pangan hewani yang memiliki gizi tinggi dan dibutuhkan manusia untuk hidup sehat, cerdas, kreatif dan produktif. Selain itu, ternak merupakan sumber pendapatan, sebagai tabungan hidup, tenaga kerja pengolahan lahan, transportasi, penghasil biogas, pupuk organik dan sebagai hewan kesayangan (Rasyaf, 2015).

Dalam Ajaran Islam terdapatnya beberapa spesifikasi dalam memakan daging hewan mamalia. Berikut perintah Allah untuk manusia menikmati daging-

daging hewan yang mempunyai nilai spesifikasi kehalalannya. Allah menciptakan manusia dengan segala fasilitas bisa dinikmati. Salah satu contohnya, dengan berlimpahnya bahan makanan baik dari jenis tumbuhan ataupun hewan. Meski banyak hewan yang boleh dimakan oleh manusia, tapi ada juga hewan yang dilarang untuk dikonsumsi. Hukumnya haram apabila hewan tersebut dimakan (Nazir, 2015).

Ada kaidah fiqh yang berbunyi: “Al halalu bayyinun wa alharamu bayyinu” yang berarti “masalah yang halal sudah jelas, begitu juga dengan yang haram”. Hewan-hewan yang boleh atau tidak boleh dimakan sudah dipilih-pilih dengan jelas dalam al-Qur’an dan hadits, sehingga bagi orang-orang yang beriman bersikap hati-hati dalam mengkonsumsi makanan yang diambil dari hewan adalah sebuah keharusan. Meneruskan dari kaidah fiqh lainnya bahwa asal semua perkara dihukumi mubah (boleh) kecuali yang dilarang baik yang tercantum dalam al-Qur’an maupun hadis nabi (Nazir, 2015). Allah swt. berfirman yang tercantum dalam QS Al-Maidah/5:1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ ۖ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي
 ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Terjemahnyan

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya, (Kementrian Agama, RI, 2012).

Banyak pendapat yang telah dikemukakan oleh para Ulama Salaf tentang keutamaan daging dan memakannya. Misalnya, Az-Zuhry berkata memakan daging, menambah 70 macam kekuatan. Manakala Muhammad bin Wasi pula berpendapat memakan daging menambah ketajaman mata. Saidina Ali bin Abi Talib pula pernah berkata: “Makan daginglah (wahai sekalian) kamu. Kerana yang demikian itu menjernihkan (mencerahkan) warna kulit, mengecilkan perut dan memperbaiki tingkah laku”. Selain itu, Ali juga berkata “Barangsiapa yang meninggalkan memakan daging selama 40 hari (berturut-turut), maka akan buruklah tingkah laku (perangainya). Nafi’ pula pernah berkata bahwasanya Ibnu Umar jika dalam bulan Ramadhan, (beliau) tidak pernah lupa untuk memakan daging, demikian juga ketika dalam Musafir (perjalanan jauh dengan tujuan membuat amal kebaikan) (Rasyaf, 2015).

Waktu atau masa merupakan bahan terpenting yang harus di perhatikan oleh manusia atau khalifah di bumi itu, sebab waktu/masa merupakan titipan ALLAH swt, kepada hambanya (manusia), karena dengan penggunaan waktu manusia akan diangkat derajat oleh ALLAH swt. Dalam firman-Nya Allah swt menjelaskan QS al-Ashr;103 sebagai berikut;

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا ﴿٣﴾
بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٤﴾

Terjemahnya;

Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.. (Kementrian Agama, RI, 2012)

Ayat tersebut menjelaskan kepada kalian bahwa manusia itu akan rugi jika ia lalai terhadap waktu. ayat ini secara tegas menjelaskan bahwa bagi manusia yang tidak menghargai waktu untuk hal-hal yang bermanfaat niscaya manusia itu akan rugi. Ayat ini juga merupakan wahyu kesembilan yang diterima oleh nabi Muhammad saw. Sedangkan wahyu yang sebelumnya adalah surat Alam Nashrah.

Imam Syafi'i menilai surat ini sebagai salah satu surat yang paling sempurna petunjuknya, beliau menyatakan; "seandainya ummat Islam memikirkan kandungan surat ini niscaya (petunjuk-petunjuknya) mencukupi mereka." Dalam Al-quran jika kita melihat urutan penulisannya, surat ini terletak pada urutan ke-103, tepatnya setelah surat al-takasur dan sebelum surat al-humazah. Lalu apa kaitan antara surat ini dengan surat sebelumnya? Dalam surat at-takasur, Allah swt memperingatkan manusia yang menjadikan seluruh aktifitasnya hanya berupa perlombaan menumpuk-numpuk harta, serta menghabiskan waktunya hanya untuk maksud tersebut, sehingga mereka lalai akan tujuan utama dari kehidupan ini, yaitu untuk menghambahkan diri kepadanya. Sedangkan pada surat ini (al-Asahr) Allah memperingatkan tentang pentingnya waktu dan bagaimana seharusnya kita isi waktu tersebut supaya lebih bermanfaat dan mendapat ridho Allah tentunya.

Kemudian jika kamu perhatikan surat ini dimulai dengan huruf sumpah (والعصر) yang bermakna "Demi masa". Para ulama sepakat kata (العصر) pada ayat pertama pada surat ini, dengan makna waktu, namun mereka tetap berbeda pendapat tentang waktu yang dimaksud.

Pendapat-pendapat itu antara lain:

1. Waktu atau masa dimana langkah dan gerak tertampung di dalamnya.
2. Waktu tertentu, yakni waktu dimana sholat ashar dapat dilaksanakan.

3. Saat sholat ashar dilaksanakan

4. Waktu atau masa kehadiran Nabi Muhammad saw dalam pentas kehidupan ini.

Apa yang Allah maksudkan, sehingga pada awal surat tersebut Allah bersumpah “Demi waktu”. Menurut Abduh: “telah terjadi kebiasaan orang-orang Arab pada masanya turunnya Al-quran untuk berkumpul dan berbincang-bincang menyangkut berbagai hal, dan tidak jarang dalam perbincangan mereka itu terlontar kata-kata yang mempersalahkan waktu atau masa. “ waktu sial”demikian sering kali ucapan yang terdengar dari mulut mereka bila mereka gagal, atau “waktu keberuntungan” jika mereka berhasil. Hal yang demikian dalam ajaran Islam dilarang, kerana dalam ajaran Islam tidak ada yang namanya “waktu sial” atau “waktu keberuntungan” semua waktu itu sama. Yang berpengaruh adalah kebaikan dan keburukan seseorang dalam berusaha, maupun dalam aktivitas yang mereka kerjakan, dan inilah yang berperan baik (beruntung) atau buruknya (sial) kesudahan suatu pekerjaan, kerana waktu itu bersifat tidak memihak kepada kebaikan maupun kepada keburukan.

Waktu adalah milik Tuhan, di dalamnya Tuhan melaksanakan segala perbuatan-Nya, seperti; menciptakan dunia beserta isinya, memberi rizki makhluk-makhluknya, memuliakan dan menghinakan. Nah, berarti kalau demikian adanya, waktu itu tidak perlu kita kutuk, ataupun kita sebut waktu membawa keberuntungan atau juga kesialan. Janganlah mencerca waktu, kerana Allah adalah pemilik waktu, jika kita menghina waktu berarti sama saja kita telah menghina yang menciptakan waktu tersebut yakni Allah swt.

Di atas telah disinggung bahwa orang yang tidak bisa memanfaatkan waktu secara maksimal maka orang itu akan merugi, kerugian itu mungkin tidak

akan kalian rasakan pada waktu dini, tetapi pasti akan kamu sadarkannya ketika pada waktu tua nantinya. Kita sering menemukan atau mendengarkan orang bilang kalau dia sangat menyesal telah menyia-nyiakan waktu mudahnya dengan hal yang tidak bermanfaat, mari kita jadikan itu semua sebagai contoh untuk kita lebih berhati-hati dalam memanfaatkan waktu. Kerena waktu itu tidak akan pernah kembali. Pada ayat kedua pada surat al-ashr diatas menyebutkan bahwa “manusia berada dalam kerugian”. Kerugian itu seakan-akan menjadi suatu tempat/wadah, dan manusia berada olah wadah tersebut. Yang dimaksud ayat di atas mengandung arti bahwa manusia berada dalam kerugian total, tidak ada satu sisi dari diri dan usahanya yang luput dari kerugian; dan kerugian itu, amat besar bagi mereka, maka timbul pertanyaan mengapa demikian?

Kalau kalian kembali kepada makna ayat pertama “Demi masa” serta kaitannya dengan ayat kedua “sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian” maka kita akan mengetahui bahwa waktu itu merupakan modal utama manusia. Apabila waktu itu tidak diisi dengan kegiatan yang positif, maka waktu itu akan berlalu begitu saja; ia akan hilang meninggalkan kita. Dan ketika itu, jangankan keuntungan yang diperoleh, modal awal saja sudah hilang.

Sayyidina Ali r.a. pernah berkata: Rezeki yang tidak diperoleh hari ini masih dapat diharapkan lebih dari itu diperoleh esok, tetapi waktu yang berlalu hari ini tidak mungkin dapat diharapkan kembali esok hari. (Sayyidina Ali r.a)

Sejalan dengan ungkapan diatas, ada sebuah riwayat yang menyatakan: Tidak terbitnya suatu fajar kecuali seseorang (malaikat) berseru: “wahai putra-putri Adam, aku adalah makhluk baru, aku menjadi saksi atas usaha-usahamu.

Ambillah keuntungan (gunakanlah aku) kerana aku tidak akan kembali lagi hingga hari kemudian.” Kalau demikian, waktu harus dimanfaatkan sebaik mungkin kerana apabila tidak kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat maka kita akan rugi, janganlah sekali-kali kita isi dengan kegiatan yang tidak bermanfaat (negatif), jika hal yang demikian yang selalu kita perhatikan niscaya kita tidak akan merasa rugi (penyesalan) nantinya.

Disinilah terlihat kaitan antara ayat pertama dengan ayat kedua, dan dari sini pula ditemukan sekian banyak hadits Nabi saw. Yang memperingatkan manusia agar mempergunakan waktu dan mengaturnya sebaik mungkin. Dalam suatu riwayat disebutkan: “Dua nikmat yang sering dilupakan (disia-siakan) oleh manusia, yakni; kesehatan dan waktu.”

Di dalam riwayat lain Nabi bersabda: “Bagi yang berakal, selama akalanya belum lagi terkalahkan (gila) berkewajiban mengatur waktu-waktunya. Ada waktu yang digunakan untuk bermunajat (berdialog dengan Tuhannya, ada pula untuk berfikir menyangkut penciptaan langit dan bumi (belajar), ada pula untuk melakukan evaluasi (intropeksi) terhadap dirinya, dan ada pula yang di khususkan untuk diri dan keluarganya guna memenuhi kebutuhan makan dan minumannya.”

(Sayyidina Ali r.a)

Semua manusia diliputi oleh kerugian yang besar dan beraneka ragam, demikian pula ayat kedua menyebutkan. Kemudian pada ayat ketiga dijelaskan bahwa yang tidak akan merugi adalah orang yang memiliki empat sifat yang dijelaskan pada ayat ketiga, yakni; Orang yang beriman, Orang yang beramal shaleh, Orang yang saling berwasiat (menasihat) tentang kebenaran; dan Orang

yang saling berwasiat (menasihati) tentang kesabaran/ketabahan. dalam hadis Hr. Hakim (2702), dalam buku kumpulan hadis riwayat an nasa'i, di bawah ini, yang berbunyi, sebagai berikut;

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إغتتم خمسا قبل خمس؛ حياتك قبل موتك, وصحتك قبل سقمك, وفراغك قبل شغلك, وشبابك قبل هرمك, وغناك قبل فقرك

Terjemahnya;

Dari Ibnu Abbas r.a. berkata Rasulullah saw, bersabda: “memanfaatkan lima keadaan sebelum datangnya lima; masa hidup sebelum datang matimu, masa sehatmu sebelum sakitmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa muda sebelum masa tuamu dan masa kayamu sebelum masa fakirmu” (Abbas r.a.)

Pergunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu masa muda hendaklah dipergunakan sebaik-baiknya untuk mencapai kebaikan, kesuksesan, dan keberhasilan, karena masa mudalah kita mempunyai ambisi, keinginan dan cita-cita yang ingin kita raih, bukan berarti masa tua menghalangi kita untuk tetap berusaha mencapai keinginan kita, tapi tentulah usaha masa tua akan berbeda halnya dengan usaha saat kita masih muda. Maka dari itu masa muda hendaklah diisi dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat hingga tidak menyesal di kemudian hari.

B. Tinjauan Umum Ayam Ras Petelur

Ayam petelur adalah ayam yang ditanakkan khusus untuk menghasilkan telur konsumsi. Jenis ayam petelur dibagi menjadi tipe ayam petelur ringan dan medium. Tipe ayam petelur ringan mempunyai badan yang ramping dan kecil, bulu berwarna putih bersih, dan berjengger merah, berasal dari galur murni *white leghorn*, dan mampu bertelur lebih dari 260 telur per tahun produksi *hen house*. Ayam petelur ringan sensitif terhadap cuaca panas dan keributan, responnya yaitu

produksi akan menurun. Tipe ayam petelur medium memiliki bobot tubuh yang cukup berat, tidak terlalu gemuk, kerabang telur berwarna coklat, dan bersifat dwiguna. Ayam yang dipelihara sebagai penghasil telur konsumsi umumnya tidak memakai pejantan dalam kandangnya karena telur konsumsi tidak perlu dibuahi (Bappenas, 2010)

Produksi ayam dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain bangsa dan strain ayam yang digunakan, kondisi lingkungan di kandang, dan manajemen pakan. Strain adalah kelompok unggas dalam satu bangsa yang diseleksi menurut kriteria yang spesifik, yaitu umur saat dewasa kelamin, daya hidup, produksi telur, kualitas telur, atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut. Macam – macam strain ayam petelur yang dikembangkan dari bangsa Leghorn antara lain Lohmann (LSL, White), Lohmann Brown, Hy-Line W-36 dan W-98, Hy-Line Brown, ISA White dan ISA Brown. Strain ayam petelur berwarna coklat memiliki performa yang lebih unggul daripada strain ayam petelur berwarna putih. Persentase cangkang pada ISA Brown lebih besar daripada ISA White, selain itu bobot telur, *egg mass*, dan efisiensi pakannya juga lebih baik (Yuwanta, 2010).

Sementara peternakan ayam ras didefinisikan dalam Kepres No.22 tahun 1990 sebagai suatu usaha budidaya ayam ras petelur dan ayam ras pedaging, tidak termasuk pembibitan. Tujuan umum suatu peternakan adalah mencukupi kebutuhan masyarakat akan protein dan bahan lain yang berasal dari hewan atau ternak. Ayam petelur adalah ayam-ayam betina dewasa yang dipelihara khusus untuk diambil telurnya. Asal mula ayam unggas adalah berasal dari ayam hutan dan itik liar yang ditangkap dan dipelihara serta dapat bertelur cukup banyak. Tahun demi tahun ayam hutan dari wilayah dunia diseleksi secara ketat oleh para

pakar. Arah seleksi ditujukan pada produksi yang banyak, karena ayam hutan tadi dapat diambil telur dan dagingnya maka arah dari produksi yang banyak dalam seleksi tadi mulai spesifik. Ayam yang terseleksi untuk tujuan produksi daging dikenal dengan ayam broiler, sedangkan untuk produksi telur dikenal dengan ayam petelur. Selain itu, seleksi juga diarahkan pada warna kulit telur hingga kemudian dikenal ayam petelur putih dan ayam petelur coklat. Persilangan dan seleksi itu dilakukan cukup lama hingga menghasilkan ayam petelur seperti yang ada sekarang ini. Dalam setiap kali persilangan, sifat jelek dibuang dan sifat baik dipertahankan (“terus dimurnikan”). Inilah yang kemudian dikenal dengan ayam petelur unggul (Rasyaf, 2004).

Secara umum ayam mengalami tiga tahapan pertumbuhan yaitu periode awal (*starter*) dari DOC sampai umur 6 minggu, periode tumbuh (*grower*) mulai umur 6 minggu sampai 18 minggu dan periode produksi (*layer*) mulai dari umur 18 minggu sampai diafkir. Periode *layer* adalah periode dimana ayam petelur mulai menghasilkan telur sampai masa produksi berakhir. Factor yang menentukan saat bertelur antara lain adalah kedewasaan kelamin ayam yang dipelihara (Rasyaf, 2004).

Usaha ternak ayam ras petelur untuk saat ini dan yang akan datang cukup menjanjikan karena seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, permintaan akan telur semakin bertambah. Untuk skala usaha 500 ekor dapat memperoleh pendapatan sebesar Rp 1.89 juta; skala usaha 1.000 ekor memperoleh pendapatan sebesar Rp 5.16 juta; skala usaha 1.500 ekor pendapatan sebesar Rp 7.48 juta; untuk skala usaha 3.500 diperoleh pendapatan sebesar Rp 16.89 juta. Ayam ras petelur dapat menghasilkan telur antara 250 sampai 280 butir per tahun, bahkan

untuk jenis *Leghorn* dapat mencapai 284-300 butir per tahun (Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidrap, 2012).

C. Klasifikasi Ayam Petelur

Klasifikasi adalah suatu sistem pengelompokan jenis-jenis ternak berdasarkan persamaan dan perbedaan karakteristik. Klasifikasi biologi ayam (*Gallus gallus*) berdasarkan Rasyaf (2003) adalah sebagai berikut Kingdom Animalia Pilum Chordata Kelas *Aves* Ordo *Galliformes* Famili *Phasianidae* Genus *Gallus* Spesies *Gallus gallus*.

Ayam ras petelur adalah ayam dipelihara dengan tujuan untuk menghasilkan banyak telur dan merupakan produk akhir ayam ras dan tidak boleh disilangkan kembali (Sudaryani dan Santosa, 2000). Ayam petelur merupakan ayam-ayam betina dewasa yang dipelihara khusus untuk diambil telurnya. Jenis ayam ini merupakan spesies *Gallus domesticus*. Ayam yang pertama masuk dan mulai ditenakkan di Indonesia adalah ayam ras petelur *white leghorn* yang kurus dan umumnya setelah habis masa produktifnya dijadikan ayam potong.

Ayam petelur terbagi atas tiga jenis ayam yaitu tipe ringan berasal dari bangsa *white leghorn*, tipe medium dari bangsa *rhode island reds*, dan *barred plymouth rock* dan tipe berat dari bangsa *new hampshire*, *white plymouth rock*, dan *cornish* (Amrullah, 2004). Asal mula ayam petelur adalah dari ayam hutan yang telah didomestikasi dan diseleksi sehingga bertelur cukup banyak. Arah seleksi ayam hutan ditujukan pada produksi yang banyak. Namun, karena ayam hutan tadi dapat diambil telur dan dagingnya maka arah dari seleksi tadi mulai spesifik. Ayam yang terseleksi untuk tujuan produksi daging dikenal dengan broiler, sedangkan untuk produksi telur dikenal dengan ayam petelur. Selain itu,

seleksi juga diarahkan pada warna kulit telur hingga kemudian dikenal ayam petelur putih dan ayam petelur cokelat (Rasyaf, 1997).

Ayam petelur adalah ayam yang sangat efisien untuk menghasilkan telur dan mulai bertelur umur \pm 5 bulan dengan jumlah telur sekitar 250--300 butir per ekor per tahun. Bobot telur ayam ras rata-rata 57,9 g dan rata-rata produksi telur hen day 70% (Susilorini *et al.*, 2008). Ayam ras petelur yang beredar di masyarakat ialah final stock penghasil telur. Final stock ialah ayam yang khusus dipelihara untuk menghasilkan telur dan telah melalui berbagai persilangan dan seleksi (Yuwanta, 2004).

Ayam petelur tipe medium mempunyai bobot tubuh yang cukup berat, tetapi beratnya antara berat ayam petelur tipe ringan dengan broiler, sehingga disebut tipe medium. Tubuhnya tidak kurus, tetapi juga tidak terlalu gemuk dan telur yang dihasilkan cukup banyak. Ayam tipe medium disebut juga ayam dwiguna karena mampu memproduksi telur dan daging (Rasyaf, 2003).

Menurut Sudarmono (2003), ayam petelur tipe medium memiliki ciri-ciri: 1) ukuran badan lebih besar dan lebih kokoh daripada ayam tipe ringan, serta berperilaku tenang, 2) timbangan badan lebih berat daripada ayam tipe ringan karena jumlah daging dan lemaknya lebih banyak, 3) otot-otot kaki dan dada lebih tebal, dan 4) produksi telur cukup tinggi dengan kulit telur tebal dan berwarna cokelat.

Rasyaf (2003) menyatakan ayam petelur tipe medium disebut juga ayam tipe dwiguna atau ayam petelur cokelat yang memiliki berat badan antara ayam tipe ringan dan berat. Ayam dwiguna selain dimanfaatkan sebagai ayam petelur juga dimanfaatkan sebagai ayam pedaging bila sudah memasuki masa afkir.

Strain ialah klasifikasi ayam berdasarkan garis keturunan tertentu melalui persilangan dari berbagai kelas, bangsa/varietas sehingga ayam mempunyai bentuk sifat dan tipe produksi tertentu sesuai dengan tujuan produksi (Yuwanta, 2004).

1. Ayam Petelur Strain Isa Brown

Strain ayam isa brown termasuk ke dalam ayam ras petelur tipe medium. Ayam isa brown merupakan strain ayam ras petelur modern. Fase umur ayam petelur dibagi menjadi 4 fase yaitu starter (umur 0--6 minggu), grower (6--14 minggu), pullet (14--20 minggu), layer (21--75 minggu). Setiap fase memerlukan nutrisi yang berbeda sesuai dengan keperluan tubuh untuk mendapatkan performa optimal (Yuwanta, 2004).

Karakteristik ayam strain isa brown memiliki bulu coklat kemerahan. Strain isa brown menghasilkan telur dengan warna kerabang coklat. Strain isa brown mulai berproduksi umur 18--19 minggu, rata-rata berat telur 62,9 g dan bobot badannya 2,01 g.). Keunggulan isa brown yaitu : 1) tingkat keseragaman tinggi; 2) dewasa kelamin yang merata; 3) produksi tinggi; 4) ketahanan tubuh tinggi; dan 5) ketahanan terhadap iklim baik (Rasyaf, 2003).

Ayam petelur strain isa brown Sumber: Isa Brown Commercial Layers (2009) Ayam Isa Brown memiliki periode bertelur pada umur 18--80 minggu, daya hidup 93,2 %, FCR 2,14, puncak produksi mencapai 95 %, jumlah telur 351 butir, rata – rata berat telur 63,1 g / butir. Awal bertelur pada umur 18 minggu dengan berat telur 43 g. Bobot telur ayam isa brown mulai meningkat saat memasuki umur 21 minggu, umur 36 minggu, dan relatif stabil di umur 50 minggu (Isa Brown Commercial Layers, 2009). Periode produksi ayam petelur ini

terdiri dari dua periode yaitu fase I dari umur 22 minggu dengan rata-rata produksi telur 78% dan berat telur 56 g. Fase II umur 42--72 minggu dengan rata-rata produksi telur 72% dan bobot telur 60 g (Scott *et al.*, 1982).

2. Ayam Petelur Strain Lohmann Brown

Lohmann brown adalah ayam tipe petelur yang populer untuk pasar komersial, ayam ini merupakan ayam yang selektif dibiakkan khusus untuk menghasilkan telur, diambil dari jenis rhode island red yang dikembangkan oleh perusahaan asal Jerman bernama Lohmann Tierzuch. Kebanyakan ayam ini memiliki bulu berwarna cokelat seperti karamel, dengan bulu putih di sekitar leher dan di ujung ekor. Ayam ini mulai dapat bertelur pada umur 18 minggu, menghasilkan 1 butir telur per hari, dapat bertelur sampai 300 butir pertahun (Rasyaf, 2003).

Bobot tubuh strain lohman brown pada umur 20 minggu sekitar 1,6--1,7 kg dan pada akhir produksi sekitar 1,9--2,1 kg. Strain ini cukup cepat mencapai dewasa kelamin, yaitu pada umur 18 minggu sehingga 50% produksi dapat dicapai pada umur 140--150 hari. Produksi telur tinggi, yaitu sekitar 305 butir pertahun. berat telur rata-rata 63,5--64,5 g. Konsumsi ransum pada saat produksi sekitar 110-- 120 g/ekor/hari dengan konversi ransum sekitar 2,1--2,2 kg (Rasyaf, 2003). Lohmann brown memiliki karakteristik bulu berwarna cokelat, perutnya lunak, kloaka bulat telur, lebar, basah, terlihat pucat, badan agak memanjang, tubuh penuh, punggung luas, dan bentuk kepala bagus dengan jengger berwarna merah cerah (Yupi, 2011).

D. Tinjauan Umum tentang Pakan

Pakan merupakan kumpulan bahan makanan yang layak dimakan oleh ayam yang telah disusun mengikuti aturan tertentu, Aturan tersebut meliputi nilai kebutuhan gizi bagi ayam dan nilai kandungan gizi dari bahan makanan yang dimakan. Bahan makanan yang tersedia dan terbanyak dimakan oleh bangsa unggas berasal dari biji-bijian, limbah pertanian dan sedikit dari hasil hewani dan perikanan. Strategi yang dianut kini adalah menggunakan bahan makanan yang tidak bersaing dengan kebutuhan manusia. Di samping tidak bersaing dengan kebutuhan manusia, pakan ayam juga harus mudah didapatkan dan harganya harus murah (Rasyaf, 2004).

Pakan merupakan komponen terbesar dalam usaha peternakan ayam dan sangat menentukan keberhasilan suatu proses produksi. Setiap hari ribuan ton pakan diperjual belikan di pasaran untuk memenuhi kebutuhan peternakan. Sampai saat ini peternak masih tergantung pada pakan pabrik, untuk membuat pakan sendiri dinilai tidak efisien dan memerlukan biaya yang besar. Besarnya permintaan pakan tersebut merupakan suatu peluang (Widjaja dan Abdullah, 2003).

Berdasarkan macamnya, pakan ayam petelur dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu chick mash / starter mash, yaitu pakan berbentuk tepung untuk ayam petelur mulai menetas hingga berumur 8 minggu. Grower mash yaitu pakan berbentuk tepung yang diberikan kepada ayam petelur umur 9-20 minggu. Sedangkan Layer mash/ complete layer yaitu pakan berbentuk tepung untuk ayam petelur yang sedang memproduksi atau berumur di atas 20 minggu sampai afkir (Kartadisastra, 1994).

Setiap bahan pakan pada dasarnya mengandung zat-zat nutrisi yang kandungannya berbeda satu sama lain. Pakan terdiri dari air, abu/mineral, protein kasar, lemak, karbohidrat, serat kasar dan bahan kasar yang tidak mengandung nitrogen. Zat-zat makanan tersebut dibutuhkan oleh ternak dalam jumlah tertentu sesuai dengan fungsinya. Di dalam tubuh ayam, zat-zat pakan/nutrisi yang diperlukan tersebut mengalami proses penguraian agar mudah diserap dan digunakan tubuh untuk mencukupi kebutuhannya terhadap hidup pokok dan berproduksi (Kartadisastra, 1994).

Ayam petelur membutuhkan sejumlah unsur gizi untuk hidupnya, misalnya untuk bernapas, peredaran darah, dan bergerak. Di samping itu, unsur gizi juga dibutuhkan untuk produksi telur. Kebutuhan yang pertama itu disebut dengan kebutuhan hidup pokok, sedangkan yang kedua untuk produksi. Sudah tentu untuk kebutuhan hidup pokok yang utama sebab tanpa terpenuhi kebutuhan untuk hidup pokok, maut sudah diambang pintu. Bila ada kelebihan, barulah digunakan untuk kebutuhan produksi telur. Oleh karena itu, untuk ayam petelur yang sedang bertelur, sudah pasti keduanya itu harus terpenuhi sekaligus tetapi jangan berlebih. Di sinilah dipentingkan rekomendasi kebutuhan untuk ayam bertelur. Rekomendasi ini sudah berdasarkan penelitian yang berulang-ulang. Di Indonesia, digunakan kandungan protein 20% untuk masa awal, 15% untuk masa remaja, 18% untuk masa bertelur I dan 15% protein ransum untuk masa produksi II (Rasyaf, 2004).

Dalam pemberian pakan kepada ayam perlu diperhatikan zat-zat yang terkandung di dalamnya. Adapun zat-zat makanan yang diperlukan ayam menurut Rasyaf (2004), digolongkan menjadi 6, yakni:

1. Karbohidrat, diperlukan tubuh ayam sebagai sumber tenaga (*energy*) guna melakukan aktivitas dalam tubuh dan bergerak. Kebutuhan energi untuk ayam starter (umur 0-8 minggu) yaitu berkisar 2700 - 3000 Kcal/kg, grower (umur 9-20 minggu) yaitu berkisar 2600 - 2900 Kcal/kg, dan ayam layer (umur 21-76 minggu) yaitu berkisar 2650 -2950 Kcal/kg. Sumber karbohidrat antara lain jagung, beras, gandum (cantel), dan bulgur.
2. Lemak, seperti halnya karbohidrat merupakan sumber tenaga. Kebutuhan lemak dalam ransum untuk ayam petelur fase starter 4%, fase grower 5%, dan fase layer 5-6%. Sumber lemak antara lain kacang tanah, dedak halus (pabrik), kedelai, bungkil kelapa, tepung ikan, tepung daging.
3. Protein, dibutuhkan untuk keperluan pertumbuhan tulang-tulang, urat, daging, bulu, dan organ lain bagi ternak muda, mengganti jaringan tubuh yang rusak, dan untuk keperluan berproduksi. Kebutuhan protein untuk ayam petelur fase starter 20-22%, fase grower 14-16%, dan fase layer \pm 17%.
4. Mineral, seperti halnya protein digunakan sebagai zat pembangun untuk keperluan pertumbuhan dan berproduksi. Diantara sekian banyak mineral yang perlu diperhatikan adalah kalsium, fosfor, dan garam dapur. Kebutuhan kalsium (Ca) dan Fosfor (P) untuk ayam petelur fase starter 1 % dan 0,70%; fase grower 1% dan 0,60%; sedangkan pada fase layer 2,50-3,50% dan 0,50-0,80%.
5. Vitamin-vitamin, berfungsi sebagai zat pengatur di dalam tubuh, mempertahankan kesehatan tubuh, dan memajukan kesanggupan berproduksi. Vitamin tersebut antara lain Vitamin A, B, D, E, K sedangkan vitamin C tidak perlu diberikan karena dapat dibuat sendiri dalam tubuh ayam.

E.Produksi Telur

Kuantitas dan kualitas pakan yang diberikan sangat menentukan terhadap produksi dan kualitas telur baik secara fisik/eksternal maupun secara kimiawi/internal. Produksi dan kualitas telur akan tercapai secara maksimal apabila kualitas pakan yang diberikan mencukupi sesuai umur dan tatalaksana pemeliharaan dan akan tercapai secara efisien apabila tersedia pakan murah dengan kandungan nutrisi yang dapat memenuhi kebutuhan ayam (Tugiyanti dan Iriyanti, 2012). Pada dasarnya kebutuhan zat gizi yang diperlukan ayam burassama dengan ayam ras lainnya. Namun kebutuhan zat gizi ayam buras lebih rendah dibandingkan dengan kebutuhan ayam ras. Hal ini disebabkan oleh faktor genetiknya. Untuk memproduksi telur atau daging yang tinggi, dalam ransum harus tersedia : protein, energi (karbohidrat dan lemak), vitamin, mineral dan air (Agustina, 2013).

Produksi telur pada ayam dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu kondisi awal ayam pada saat mulai bertelur dan potensi tumbuh ayam dari awal bertelur sampai puncak produksi. Adapun kandungan protein 14% di dalam ransum dinilai kurang cukup untuk mempertahankan produksi telur yang tinggi, bobot telur serta efisiensi penggunaan ransum (Isapoultry, 2006). Produksi telur sangat tergantung pada jumlah konsumsi protein dan asam amino perhari. Kira-kira 80-85% konsumsi asam amino langsung digunakan untuk produksi telur.

Defisiensi asam amino akan mempengaruhi produksi telur (% *hen-day*), ukuran telur, dan peningkatan konversi ransum. Tercukupinya kebutuhan protein ayam dapat mengindikasikan tercukupinya kebutuhan asam-asam amino didalamnya. Ketersediaan berbagai asam amino dalam jumlah yang cukup

didalam ransum ayam mampu mengoptimalkan produksi telur yang dihasilkan (Charoen Pokphand, 2000). Produksi telur dipengaruhi oleh kandungan protein dan fosfor dalam ransum. Perbedaan kandungan protein ransum yang lebih tinggi menghasilkan produksi telur yang lebih tinggi disebabkan oleh kandungan asam amino yang lebih lengkap daripada yang terdapat dalam ransum yang proteinnya lebih rendah (Onwudike dan Oke, 1986).

Produksi telur ayam kampung non seleksi yang hanya mencapai rata-rata 29% dapat ditingkatkan menjadi rata-rata 50% pada generasi ke 6 dengan sifat mengeram yang menurun menjadi 10% telah menjadikan komoditasayam lebih menguntungkan secara ekonomis. Puncak produksi telur mencapai 84% pada umur ayam 31 minggu.obot telur pertama bertelur yang 30 g/butir akan bertambah terus sampai 36 gr/butir pada akhir bulan keduaberproduksi, sudah siap untuk dibuahi dan ditetaskan (Anonim' 2012).

F. Kualitas Telur

Ukuran telur/berat telur dapat diartikan sebagai besar kecilnya telur yang dinyatakan dalam bobot. Secara normal telur ayam mempunyai berat antara 40-80 g/butir (Campbell *et al.*, 2003). Telur ayam kampung memiliki berat 26,27-55,4 g dengan rata-rata 45,46 g telur lebih kecil dari telur ayam ras (Maryuki, 2012). Menurut North dan Bell (1990) faktor-faktor yang mempengaruhi berat telur adalah *strain*, umur pertama bertelur, temperatur lingkungan, ukuran *pullet* pada suatu kelompok. Ukuran ovum, intensitas bertelur dan nutrisi dalam ransum juga mempengaruhi ukuran telur (Campbell *et al.*, 2003).

Ukuran telur merupakan faktor genetik, hal ini berhubungan dengan kemampuan ayam untuk menghasilkan telur besar, medium atau kecil. Berat telur

tidak dipengaruhi oleh peningkatan energi metabolis, tetapi peningkatan kandungan protein 12-18% di dalam ransum dapat meningkatkan bobot telur (North dan Bell, 1990). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Shafer *et al.* (1992), pemberian metionin ransum pada taraf 0,38; 0,46 dan 0,53% menunjukkan bahwa peningkatan bobot telur terjadi pada taraf pemberian metionin yang lebih tinggi.

Umur dewasa kelamin juga mempengaruhi bobot telur. Ayam dara (*pullet*) yang ketika bertelur pertama telurnya besar maka akan besar selama periode produksi telur (North dan Bell, 1990). Yuwanta mengemukakan, beberapa faktor yang berpengaruh terhadap berat telur ayam adalah umur ayam, protein total, cara pemeliharaan, dewasa kelamin, lisin, metionin, treonin, genetik, fosfor, temperatur dan efisiensi. Menurut Amrullah (2003) bahwa ayam petelur yang mengalami masak kelamin dini memiliki ukuran telur yang relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan ayam petelur yang mencapai masak kelamin lebih lambat. Ayam pada awal periode bertelur cenderung menghasilkan telur yang ukurannya lebih kecil dan secara bertahap akan bertambah sejalan dengan makin tuanya umur ayam, tetapi kenaikan ini tidak seragam.

Awalnya meningkat sangat jelas ukurannya untuk kemudian hanya sedikit berubah dan konstan. Intensitas bertelur juga mempengaruhi bobot telur. Telur yang kecil sangat mungkin dihasilkan selama periode peneluran untuk produksi telur yang tinggi. Selama tahun pertama bertelur, bobot dan produksi telur meningkat secara simultan. Telur mempunyai ukuran yang besar pada intensitas bertelur yang rendah (Campbell *et al.*, 2003). Temperatur lingkungan yang tinggi

akan menyebabkan ukuran telur menurun sebagai hasil menurunnya konsumsi nutrisi pada kelompok ayam, terutama energi dan protein (North dan Bell, 1990).

Berat badan mempunyai korelasi yang tinggi terhadap berat telur. Berat yang besar akan menghasilkan telur yang besar pula (North dan Bell, 1990; Campbell *et al.*, 2003). Defisiensi nutrisi dalam ransum akan mengurangi bobot telur. Salah satunya defisiensi vitamin D. Vitamin D berhubungan dengan metabolisme kalsium, sehingga penting dalam pembentukan kerabang (Campbell *et al.*, 2003). Ukuran telur dapat meningkat dengan meningkatnya protein ransum. Peningkatan kandungan protein ransum dari 17-21% atau dengan penambahan lemak 4% dapat meningkatkan bobot telur ayam (Nakajima dan Keshaverz, 1995). Bobot telur dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya genetik, umur saat dewasa kelamin, suhu lingkungan, tipe kandang, pakan, air dan penyakit (Ensminger, 1992). Menurut Anggorodi (1995), faktor yang mempengaruhi besar telur adalah tingkat dewasa kelamin, protein dan asam amino yang cukup dalam ransum. Faktor lain yang mempengaruhi besar telur adalah kandungan kalsium dan fosfor dalam ransum.

Telur merupakan salah satu produk pangan asal hewan yang dapat memberikan kecukupan gizi bagi masyarakat. Telur mengandung zat gizi yang lengkap dan mudah dicerna. Kandungan gizi sebutir telur ayam dengan berat 50 g terdiri dari 0.6 g karbohidrat, 6.3 g protein, 5 g lemak, mineral, dan vitamin (Sudaryani 2003). Telur ayam memiliki kandungan asam amino esensial. Kandungan asam amino pada telur tidak dapat diproduksi oleh tubuh dan dibutuhkan oleh manusia (Yuwanta, 2010).

Kualitas telur dapat digolongkan menjadi dua, yaitu kualitas telur bagian luar dan bagian dalam. Kualitas telur bagian luar meliputi tekstur, bentuk, warna, keutuhan, dan kebersihan kerabang, sedangkan kualitas telur bagian dalam meliputi kekentalan putih dan kuning telur, warna, dan posisi kuning telur serta ada tidaknya bintik darah pada kuning dan putih telur (Sarwono 1994).

Kualitas telur dapat berubah karena adanya perlakuan yang diberikan seperti pemanasan dan penyimpanan. Siregar *et al.* (2012) menyatakan bahwa kualitas telur dapat menurun terutama selama penyimpanan. Penguapan air akan terjadi selama penyimpanan telur yang mengakibatkan penurunan berat telur terutama pada putih telur.

G. Struktur dan Komposisi Telur

Telur merupakan sel telur (ovum) yang tumbuh dari sel induk di dalam indung telur yang (ovarium). Pada dasarnya struktur sebuah telur terdiri atas sel yang hidup yang dikelilingi oleh kuning telur sebagai cadangan makanan terbesar. Kedua komponen tersebut dikelilingi oleh putih telur yang mempunyai kandungan air tinggi, bersifat elastis, dan dapat menyerap guncangan yang mungkin terjadi pada telur tersebut. Ketiga bagian tersebut merupakan bagian dalam dari telur yang dilindungi oleh kerabang telur yang berfungsi untuk mengurangi kerusakan fisik dan biologis (Kurtini *et al.*, 2011).


Telur memiliki struktur yang khusus, karena di dalamnya terkandung zat gizi yang sebetulnya disediakan bagi perkembangan sel telur yang telah dibuahi menjadi seekor anak ayam. Bagian esensial dari telur adalah albumen (putih telur) yang mengandung banyak air dan berfungsi sebagai peredam getaran. Secara bersama-sama albumen dan yolk (kuning telur) merupakan cadangan makanan

yang siap digunakan oleh embrio. Telur dibungkus / dilapisi oleh kerabang yang berfungsi sebagai pelindung terhadap gangguan fisik, tetapi juga mampu berfungsi untuk pertukaran gas untuk respirasi (pernafasan).

Struktur telur secara terperinci dapat dibagi menjadi 9 bagian, yaitu :

1. Kerabang atau kulit telur dengan permukaan agak berbintik-bintik. Kerabang telur merupakan pembungkus telur yang paling tebal, bersifat keras dan kaku. Pada kerabang terdapat pori-pori yang berfungsi untuk pertukaran gas.
2. Selaput atau membran kerabang luar dan dalam yang tipis terpisah pada bagian ujung telur yang tumpul dan membentuk rongga udara.
3. Putih telur bagian luar yang tipis dan encer.
4. Putih telur yang kental yang merupakan kantung albumen.
5. Putih telur bagian dalam yang tipis dan encer.
6. Struktur keruh berserat yang terdapat pada kedua ujung kuning telur yang disebut khalaza dan berfungsi memantapkan posisi kuning telur.
7. Lapisan tipis yang mengelilingi kuning telur dan membran vitelina.
8. Kuning telur, terletak pada bagian pusat dari telur dan terbungkus oleh selaput vitelina.
9. Benih atau blastoderm yang terlihat sebagai bintik kecil pada permukaan kuning telur, tepat di bawah selaput vitelina. Pada telur yang terbuahi, benih ini akan menjadi anak ayam. Struktur fisik telur terdiri dari tiga bagian utama yaitu kerabang telur 8--11%, putih telur 56--61 % dan kuning telur 27--23 % (Kurtini, *et al.*, 2011).

Menurut Abbas (1989), struktur telur dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: bangsa, umur, suhu lingkungan, penyakit, dan kualitas serta kuantitas ransum. Struktur telur dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 3. Struktur Telur
Sumber : <http://id.wikipedia.org/wiki/Telur> (2018)

a. Kualitas Eksternal Telur

Kualitas telur merupakan sekumpulansifat yang dimiliki oleh telur dan mempunyai pengaruh terhadap penilaian atau pemilihan konsumen, sedangkan tingkatan kualitas terhadap sekelompok telur menjadi dasar di dalam grading untuk menentukan kelas (grade) telur (Abbas, 1989). Kualitas telur yang dipengaruhi oleh sifat genetika adalah tekstur dan ketebalan kerabang telur, jumlah pori-pori kerabang telur, adanya noda darah, banyaknya putih telur kental dan komposisi kimia telur (Romanoff dan Romanoff, 1963). Menurut Sirait (1986), faktor-faktor kualitas yang dapat memberikan petunjuk terhadap kesegaran telur adalah susut bobot telur, keadaan diameter rongga udara, keadaan

putih dan kuning telur, bentuk dan warna kuning telur serta tingkat kebersihan kerabang telur. Tabel 1. menunjukkan mutu telur berdasarkan bagian-bagiannya.

Tabel 1. Mutu Telur Berdasarkan bagian-bagian

Kualitas	Kulit Telur	Rongga Udara	Kuning Telur	Putih Telur
AA	Bersih, permukaan tidak retak/pecah Bentuk normal	1/8 in (0,30mm)	Berada di pusat, lapisan kuning jelas, tidak ada kerusakan	Jernih dan kental
A	Permukaan bersih, tidak retak (pecah), bentuk normal	2/8 in (0,60mm)	Berada di pusat, lapisan kuning dan putih masih jelas, tidak ada kerusakan	Jernih, agak kental
B	Bersih, tidak retak, sedikit tidak normal	3/8 in (0,75mm)	Melebar dan bergeser, ada sedikit kerusakan	Jernih, tidak kental (agak kental)
C	Bersih, tidak pecah, isi tidak normal	3/8 in (lebar)	Bergeser dari pusat, melebar dan encer, terkadang ada noda darah	Jernih, encer, terkadang ada noda darah

Sumber : USDA Agriculture Marketing Service, 1954.

1. Berat Telur

Berat telur menjadi salah satu indikator kualitas telur, akan tetapi variasi selera dan kepentingan konsumen juga mempengaruhi permintaan akan berat telur itu sendiri. Produsen dan konsumen umumnya akan lebih menyukai telur dengan berat yang tinggi, akan tetapi berbeda halnya dengan pembibit yang akan memilih telur dengan berat yang ideal untuk ditetaskan (Yuwanta, 2010).

Bobot telur dan ukuran telur berbeda-beda, akan tetapi antara berat dan ukuran telur saling berhubungan (Sarwono, 1994). USDA agriculture marketing service (1970) menyatakan klasifikasi standar bobot telur, yaitu a) ukuran jumbo

(>65 g); b) *extra large* (60--65 g); c) *large* (55--60 g); d) *medium* (50--55 g); e) *small* (45- -50 g); dan f) *peewee*(<45 g).

Anggorodi (1994) mengemukakan bahwa besarnya telur dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk sifat genetik, tingkat dewasa kelamin, umur, obat-obatan, dan makanan sehari-hari. Sifat genetik yang dimaksud adalah faktor genetik merupakan pewarisan sifat dari tetuanya antara lain dewasa kelamin lebih awal, tingginya intensitas peneluran, dan persentase peneluran.

Besarnya telur juga dipengaruhi oleh kualitas *pullet* yang beragam. Kualitas *pullet* yang kurang baik ditandai dengan ciri-ciri memiliki berat badan dan keseragaman *pullet* yang rendah. Keseragaman *pullet* yang rendah ini dapat mengakibatkan ketidakseragaman awal produksi dan tidak seragamnya ukuran telur yang dihasilkan. Ciri lainnya, lamanya mencapai dewasa kelamin sehingga awal produksi menjadi terlambat. Adanya *pullet* yang mempunyai jarak tulang pubis yang sempit juga menjadi ciri yang mengakibatkan ayam tersebut mempunyai ukuran telur yang lebih kecil atau tidak seragam (Medion, 2015).

Bobot dan ukuran telur juga dipengaruhi oleh nutrisi ransum seperti kandungan protein, asam amino, tertentu seperti *methionine* dan *lysine*, energi, lemak total, dan asam lemak esensial seperti asam linoleat. Kebutuhan dari salah satu nutrisi tersebut tidak terpenuhi melalui asupan ransum, maka akan mengurangi bobot telur. Bahkan jika hal tersebut terjadi pada ayam petelur produksi sebelum umur 40 minggu, bisa mengakibatkan pada penurunan jumlah produksi telur (Medion, 2015). Bobot telur tidak terlepas dari pengaruh bobot kuning telur. Persentase kuning telur sekitar 30--32% dari bobot telur. Bobot kuning telur dipengaruhi oleh perkembangan ovarium. Ovarium merupakan

tempat pembentukan kuning telur, apabila pembentukan kuning telur kurang sempurna maka bobot telur kecil. Penyerapan nutrisi pada usus juga akan berpengaruh terhadap pembentukan ovarium sehingga kualitas bobot telur kurang optimal (Tugiyanti, 2012).

Berat telur dipengaruhi oleh tiga faktor utama yakni ternak, pakan dan lingkungan. Faktor yang mempengaruhi berat telur dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Berat Telur

Ternak	Pakan	Lingkungan
Umur ayam	Protein total	Cara pemeliharaan Batrei vs liter
Dewasa Kelamin - Lisin, Saat Peneluran	Metionin, Treonin Asam Lemak Esensial	Pencahayaan Panjang Pencahayaan Pendek
- Genetik	Fosfor	Temperatur

Sumber: Yuwanta, 2010.

2. Tebal Kerabang

Kerabang yang diproduksi pada suhu di atas suhu normal (20-26°C) akan bersifat tipis, lebih ringan dan mudah retak baik telur ayam lokal (Islam *et al.*, 2001 dan Nwachukwu *et al.*, 2006) maupun untuk telur ayam ras petelur (Bell dan Weaver, 2002 dan Yamamoto *et al.*, 2007). Oguntunji dan Alabi (2010) menyebutkan bahwa kerabang telur dipengaruhi oleh sifat genetik, nutrisi di dalam pakan, hormon (Folicle Stimulating Hormon (FSH) dan Leutinizing Hormon (FH)), lingkungan dan manajemen.

Kualitas kerabang telur tergantung dari kemampuan ayam petelur dalam mengabsorpsi kalsium yang ada dalam pakan, kualitas kerabang telur ditentukan

oleh tebal dan struktur kerabang telur. Meningkatnya kekuatan kerabang telur dapat dilakukan dengan meningkatkan kadar kalsium dalam pakan, menurunnya kualitas kerabang telur selaras dengan meningkatnya umur ayam, genetik dan pakan terutama imbangannya Ca dan P (Roland, 1986).

Kualitas kerabang telur dapat ditentukan oleh tebal dan struktur kulitnya. Mineral lainnya yang terkandung dalam kerabang antara lain ion karbonat, fosfat dan magnesium (Yamamoto *et al.*, 2007). Beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas kerabang telur ayam terdiri dari suhu, penanganan telur, penyakit dan umur ternak (Gary dan Richard, 2003). Pembentukan kerabang telur merupakan proses terlama dalam reproduksi sebutir telur. Kerabang telur terbentuk hampir sekitar 21 jam lamanya. Kerabang telur merupakan pertahanan utama bagi telur terhadap kerusakan selama transportasi dan masa penyimpanan, sehingga kualitasnya menjadi salah satu indikator penting dari kualitas telur baik dari segi berat maupun ketebalannya.

Secara umum susunan kerabang telur terdiri dari 2 bagian yakni kerabang tipis (membran) baik membran luar maupun membran dalam yang dibentuk di isthmus dan kerabang telur keras yang terbentuk di uterus (Yuwanta, 2010). Kalsium dari tulang meduler bersifat terbatas, oleh karena itu bila suhu tinggi dan konsumsi pakan menurun maka kalsium yang dibutuhkan untuk pembentukan kerabang akan berkurang dan kerabang telur menjadi tipis dan lembek. Berat dan tebal kerabang juga dipengaruhi juga oleh faktor genetik, umur induk, molting, kesehatan ayam, dan umur dewasa kelamin (Sodak, 2011).

b. Kualitas Internal Telur

Telur ayam ras adalah salah satu sumber pangan protein hewani yang populer dan sangat diminati oleh masyarakat. Hampir seluruh kalangan masyarakat dapat mengonsumsi telur ayam ras untuk memenuhi kebutuhan protein hewani. Hal ini karena telur ayam ras relatif murah dan mudah diperoleh serta dapat memenuhi kebutuhan gizi yang diharapkan (Lestari, 2009).

Telur ayam ras segar adalah telur yang tidak mengalami proses pendinginan dan tidak mengalami penanganan pengawetan serta tidak menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan embrio yang jelas, yolk belum tercampur dengan albumen, utuh, dan bersih (Standar Nasional Indonesia, 1995). Telur tersusun oleh tiga bagian utama yaitu kulit telur (kerabang), bagian cairan bening (albumen), dan bagian cairan yang berwarna kuning (yolk) (Rasyaf, 1990).

Telur ayam ras mempunyai kandungan protein yang tinggi dan susunan protein yang lengkap, akan tetapi lemak yang terkandung di dalamnya juga tinggi. Secara umum telur ayam ras dan telur itik merupakan telur yang paling sering dikonsumsi oleh masyarakat (Sudaryani, 2003).

1. Warna Kuning Telur

Warna kuning telur Warna kuning telur menentukan juga kualitas kuning telur karena umumnya konsumen di Indonesia cenderung lebih menyukai telur dengan warna kuning telur dari kuning hingga kemerahan. Kuning telur berwarna mulai dari kuning pucat sekali sampai orange tua kemerahan (Brown, 2000). Setiap ayam mempunyai kemampuan berbeda untuk merubah pigmen karoten tersebut menjadi warna kuning telur (Castellini *et al.*, 2006).

Kuning telur mempunyai warna yang bervariasi, mulai dari kuning pucat sampai jingga. Kuning telur mengandung zat warna (pigmen) yang umumnya termasuk dalam golongan karotenoid yaitu xantofil, lutein, dan zeasantin serta sedikit betakaroten dan kriptosantin. Warna atau pigmen yang terdapat dalam kuning telur sangat dipengaruhi oleh jenis pigmen yang terdapat dalam ransum yang dikonsumsi (Winarno, 2002).

Satu yolk besar mengandung sekitar 60 kalori dan albumen mengandung sekitar 15 kalori. Satu yolk besar mengandung dua per tiga jumlah kolesterol harian yang dianjurkan yaitu 300 mg. Manfaat kolesterol antara lain membentuk hormon korteks adrenal yang penting bagi metabolisme dan keseimbangan garam dalam tubuh, baik untuk pertumbuhan jaringan otak dan syaraf, pembungkus jaringan syaraf dan melapisi membran sel, membuat vitamin D yang sangat bermanfaat untuk menyerap kalsium tubuh sehingga kesehatan tulang dapat terjaga, serta sebagai bahan baku pembentukan asam garam empedu yang meningkatkan pembuangan lemak. Lemak dalam telur juga terdapat dalam bagian yolk. Satu yolk juga mengandung separuh jumlah choline harian yang dianjurkan. Choline merupakan nutrisi yang penting untuk perkembangan otak dan juga sangat penting untuk wanita hamil dan menyusui untuk memastikan perkembangan otak janin yang sehat (Buckle *et al.*, 2009).

Kualitas kuning telur dilakukan dengan menentukan skor warna kuning telur dengan menggunakan yolk colour fan yang terdiri dari 15 seri warna (Stadelman dan Cotterill, 1977). Kemudian ditambahkan oleh Amrullah (2003) bahwa warna kuning telur yang bagus adalah dengan skor 10 skala Roche Yolk Colour Fan (RYCF).

2. Viskositas Telur / Putih Telur

Putih telur terdapat antara selaput telur dengan kuning telur Putih telur terdiri dari putih telur encer dan putih telur kental. Fungsi putih telur adalah sebagai tempat utama menyimpan makanan dan air dalam telur untuk digunakan secara sempurna selama penetasan (Anonimus, 2009).

Putih telur dilapisi oleh membran yang disebut dengan membrane albumin. Bagian putih telur terdiri dari 4 lapisan yaitu lapisan luar, lapisan tengah, lapisan dalam dan lapisan membran kalazifera (Singh, 1995). Putih telur dari telur yang segar adalah tebal dan diikat kuat oleh kalaza. Telur mutu I, mempunyai putih telur yang bebas dari titik daging atau titik darah (SNI 01-3926-2006).

Putih telur disebut juga albumen merupakan bagian terbesar dalam telur, yaitu 60% dari berat telur. Albumen merupakan sumber utama protein yang juga mengandung niasin dan riboflavin. Albumen atau putih telur terdiri dari beberapa lapisan yang berbeda kekentalannya, yaitu lapisan encer luar, lapisan kental luar, lapisan encer dalam dan *chalaziferous* (Sodak, 2011).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan Agustus sampai Bulan September 2017. Tempat penelitian berada di Farm Cahaya Mario Group. Puncak Mario, Sidrap, milik H.Ali Appas.

B. Materi Penelitian

1. Alat dan Bahan

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah timbangan neraca digital dengan kepekaan 0,001 g untuk menimbang telur, dan jangka sorong untuk mengukur ketebalan kerabang telur. Timbangan neraca jarum berskala dengan kepekaan 0,1 g untuk menimbang ransum, ember, tempat ransum, tempat minum, plastic, piring dan alat kebersihan.

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa ayam sebanyak 45 ekor untuk mengamati kualitas telur, telur sebanyak 4 rak 15 butir, kandang, Pakan ternak, dan air minum untuk ternak.

2. Pakan

Adapun pakan ternak yang digunakan yaitu : konsentrat, jagung, bekatul, dan air.

Tabel 3. Komposisi Pakan yang digunakan

No	Komposisi	Presentase		
		1	2	3
1	Kosentrat	35 %	33 %	32 %
2	Jagung	50 %	45 %	42%
3	Bekatul	15%	22%	26 %
	Total	100 %	100 %	100 %

Tabel 4. Umur Produksi Ayam

No.	Umur Produksi Ayam
A	18 -29 minggu
B	30-49 minggu
C	50 minggu – afkir

Tabel 5. Dena Rancangan

Umur	Perlakuan			Total kelompok
	1 Pakan (18,1%)	2 Pakan (18,7%)	3 Pakan (17,4%)	
A	A 1	A 2	A 3	15
B	B 1	B 2	B 3	15
C	C 1	C 2	C 3	15
Tatal rata-rata perlakuan	15	15	15	45

C. Prosedur Kerja atau Desain Penelitian

Prosedur dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Rancangan penelitian

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK). Pada Rancangan Acak Kelompok (RAK) ini dilakukan uji 3 perlakuan pakan dan 3 kelompok umur.

2. Pembuatan pakan untuk ayam petelur

Pada pembuatan pakan ayam petelur, bahan-bahan yang digunakan yaitu konsentrat, bekatul dan jagung dengan komposisi dapat dilihat pada Tabel 3.

D. Variabel yang Diamati pada Penelitian

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah

1. Kualitas Eksternal Dan Internal Telur, adalah sebagai berikut
 - a. Kualiatas eksternal
 1. Kerabang telur
 2. Berat telur
 - b. Kualitas internal
 1. Warna kuning telur
 2. Viskosita telur
2. Produksi Telur/*Hen Day Production* (%)Produksi telur dihitung setiap hari selama penelitian. Rumus yang digunakan untuk menghitung produksi telur/*hen day* sebagai berikut

$$\text{Hen Day Production} = \frac{\text{Jumlah produksi telur}}{\text{jumlah ayam yang ada}} \times 100\%$$

E. Analisis Data

Data yang diperoleh diolah dengan dianalisis sidik ragam sesuai dengan RAK (Rancangan Acak Kelompok) untuk mengetahui pengaruh perlakuan terhadap peurbahan yang diukur. Perlakuan yang berpengaruh nyata, dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) (Gasper, 1991). Kemudian data diolah dengan bantuan software SPSS versi 16 dengan persamaan:

$$Y_{ij} = \mu + \tau_i + \beta_j + \varepsilon_{ij} \dots\dots\dots$$

Dimana:

Y_{ij} = pengamatan dan perlakuan ke -I dan kelompok ke- j variabel yang di amati

μ = mean populasi (rata-rata umur)

τ_i = pengaruh aditif dari perlakuan ke-I (efek perlakuan ke j)

β_j = pengaruh aditif dari kelompok ke-j (efek perlakuan ke I)

ε_{ij} = pengaruh acak dari perlakuan ke-I dan kelompok ke (Efek unit eks dalam blok ke i kedena perlakuan ke j)

(Dr.ir Vincent Gasparsz, M.Sc.). Tahun 1991

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kualitas eksternal Telur

1. Tebal Kerabang Telur

Pengaruh penggunaan tiga kelompok pakan yang berbeda terhadap tebal kerabang telur ayam *Lohman* pada kelompok umur yang berbeda dapat dilihat pada Tabel 6. di bawah ini:

Tabel 6. Pengaruh Penggunaan Tiga Kelompok Pakan terhadap Tebal Kerabang Telur Ayam Lohman pada Kelompok Umur yang Berbeda

	Pakan 1			Pakan 2			Pakan 3		
	Umur A	Umur B	Umur C	Umur A	Umur B	Umur C	Umur A	Umur B	Umur C
	0.42	0.42	0.43	0.43	0.44	0.43	0.42	0.43	0.44
	0.43	0.43	0.44	0.43	0.43	0.44	0.43	0.43	0.44
	0.42	0.43	0.44	0.42	0.43	0.44	0.42	0.43	0.44
	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.43	0.43	0.44	0.43
	0.42	0.43	0.44	0.42	0.43	0.44	0.42	0.43	0.44
Total	2.11	2.13	2.17	2.12	2.15	2.18	2.12	2.16	2.19
Rata-Rata	0.42	0.43	0.43	0.42	0.43	0.44	0.42	0.43	0.44

Keterangan: A=18-29 minggu; B=30-49 minggu; C=50-afkir.
Sumber: Data Hasil Penelitian, 2017

Hasil analisis statistik menunjukkan terdapat perbedaan terhadap kelompok umur ayam. Nilai tebal kerabang yang diperoleh pada penelitian berkisar antara 0,42 – 0,44 mm. Rata-rata tebal kerabang yang di peroleh pada penelitian tergolong kerabang telur yang tebal. Hal ini di dukung oleh pendapat Yuwanta, (2010) menyatakan bahwa tebal kerabang telur ayam yang baik berkisar antara 0,33 - 0,35 mm. Lebih lanjut di jelaskan bahwa ketebalan kerabang telur

ayam di pengaruhi oleh kandungan kalsium dan fosfor serta umur ayam (Wahyu, 2004).

Kandungan kalsium dan fosfor merupakan faktor yang mempengaruhi pada saat proses pembentukan kerabang telur yang terjadi di dalam uterus, hal ini sesuai dengan pendapat Juliambarwati dkk. (2012) yang menyatakan bahwa, kualitas kerabang telur ditentukan oleh ketebalan dan struktur kerabang, kandungan Ca dan P dalam pakan berperan terhadap kualitas kerabang telur karena dalam pembentukan kerabang telur diperlukan adanya ion-ion karbonat dan ion-ion Ca yang cukup untuk membentuk kerabang telur, semakin tinggi konsumsi kalsium maka kualitas kerabang telur semakin baik.

Kualitas kerabang telur tergantung dari kemampuan ayam petelur dalam mengabsorpsi kalsium yang ada dalam pakan, kualitas kerabang telur ditentukan oleh tebal dan struktur kerabang telur. Meningkatnya kekuatan kerabang telur dapat dilakukan dengan meningkatkan kadar kalsium dalam pakan, menurunnya kualitas kerabang telur selaras dengan meningkatnya umur ayam, genetik dan pakan terutama imbangan Ca dan P (Roland, 1986).

Secara umum susunan kerabang telur terdiri dari 2 bagian yakni kerabang tipis (membran) baik membran luar maupun membran dalam yang dibentuk di isthmus dan kerabang telur keras yang terbentuk di uterus (Yuwanta, 2010). Kalsium dari tulang meduler bersifat terbatas, oleh karena itu bila suhu tinggi dan konsumsi pakan menurun maka kalsium yang dibutuhkan untuk pembentukan kerabang akan berkurang dan kerabang telur menjadi tipis dan lembek. Berat dan tebal kerabang juga dipengaruhi juga oleh faktor genetik, umur induk, molting, kesehatan ayam, dan umur dewasa kelamin (Sodak, 2011).

2. Berat Telur

Pengaruh penggunaan tiga kelompok pakan yang berbeda terhadap berat telur ayam *lohman* pada kelompok umur yang berbeda dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Pengaruh Penggunaan Tiga Kelompok Pakan terhadap berat telur ayam *lohman* pada Kelompok Umur yang Berbeda.

	Pakan 1			Pakan 2			Pakan 3		
	Umur A	Umur B	Umur C	Umur A	Umur B	Umur C	Umur A	Umur B	Umur C
	55	60	55	60	65	70	65	70	65
	65	65	55	65	65	60	65	65	60
	60	60	60	65	55	65	60	65	65
	50	50	65	65	65	50	60	60	55
	65	65	65	50	55	65	65	55	70
Total	295	300	300	305	305	310	315	315	315
Rata-Rata	59	60	60	61	61	62	63	63	63

Keterangan: A=18-29 minggu; B=30-49 minggu; C=50-afkir.

Sumber: Data Hasil Penelitian, 2017

Tabel 7. menunjukkan terdapat kecenderungan perbedaan nilai berat telur ayam *Lohman* pada tingkat kelompok umur yang berbeda, semakin tua umur ayam maka akan semakin besar telur yang di hasilkan. Hal ini di sebabkan oleh umur ayam yang digunakan dalam penelitian ini sangat bervariasi. Silversides *et al.*, (2001) menyatakan bahwa berat telur sangat di pengaruhi oleh kandungan protein pakan, bangsa serta umur ayam.

Berat dan ukuran telur dipengaruhi oleh nutrisi ransum seperti kandungan protein, asam amino, tertentu seperti *methionine* dan *lysine*, energi, lemak total, dan asam lemak esensial seperti asam linoleat. Kebutuhan dari salah satu nutrisi tersebut tidak terpenuhi melalui asupan ransum, maka akan mengurangi bobot telur. Bahkan jika hal tersebut terjadi pada ayam petelur produksi sebelum umur 40 minggu, bisa mengakibatkan pada penurunan jumlah produksi telur (Medion,

2015). Bobot telur tidak terlepas dari pengaruh bobot kuning telur. Persentase kuning telur sekitar 30--32% dari bobot telur. Bobot kuning telur dipengaruhi oleh perkembangan ovarium. Ovarium merupakan tempat pembentukan kuning telur, apabila pembentukan kuning telur kurang sempurna maka bobot telur kecil. Penyerapan nutrisi pada usus juga akan berpengaruh terhadap pembentukan ovarium sehingga kualitas bobot telur kurang optimal (Tugiyanti, 2012).

B. Kualitas Interior Telur

1. Warna Kuning Telur

Pengaruh penggunaan tiga kelompok pakan yang berbeda terhadap warna kuning telur ayam *lohman* pada tingkat umur yang berbeda dapat dilihat pada Tabel 8. di bawah ini

Tabel 8 Pengaruh Penggunaan Tiga Kelompok Pakan terhadap Warna Kuning Telur Ayam *Lohman* pada Kelompok Umur yang Berbeda .

Pakan 1			Pakan 2			Pakan 3		
Umur A	Umur B	Umur C	Umur A	Umur B	Umur C	Umur A	Umur B	Umur C
Kuning	Pucat	Pucat	Kuning	Pucat	Pucat	Kuning	Pucat	Pucat
Kuning	Kuning	Pucat	Pucat	Kuning	Pucat	Kuning	Kuning	Pucat
Kuning	Pucat	Kuning	Pucat	Pucat	Kuning	Pucat	Kuning	Pucat
Pucat	Kuning	Kuning	Kuning	Kuning	Pucat	Pucat	Pucat	Kuning
Kuning	Kuning	Pucat	Kuning	Kuning	Pucat	Pucat	Kuning	Pucat

Keterangan: A=18-29 minggu; B=30-49 minggu; C=50-afkir.
Sumber: Data Hasil Penelitian, 2017

Berdasarkan hasil analisis statistik menunjukkan bahwa perlakuan pakan tidak menunjukkan perbedaan pada perlakuan yang lain tetapi memberikan pengaruh pada kelompok umur ayam yang digunakan.

Tabel di atas menunjukkan bahwa pengaruh perlakuan pakan terhadap warna kuning telur pada kelompok umur yang berbeda cenderung warna kuning pada kelompok umur 18 sampai 29 minggu dan umur 30-49 minggu, dan warna pucat pada kelompok umur 50-afkir. Hal ini disebabkan oleh komposisi pakan pada tabel 3 menunjukkan perbedaan penambahan jagung pada setiap perlakuan pakan.

Perubahan warna kuning telur hasil penelitian disebabkan oleh umur ayam dan kandungan pigmen xantofil pada jagung, perbedaan penambahan pakan jagung akan mempengaruhi warna kuning telur. Semakin tua umur ayam maka akan semakin menurun kemampuan saluran pencernaan menyerap kandungan nutrisi pakan untuk kebutuhan produksi. Xanthofil merupakan zat yang dapat memberikan pengaruh terhadap pigmentasi pewarnaan kuning telur (Argo dkk., 2013). Pigmen pemberi warna kuning telur yang terkandung dalam pakan secara fisiologis diserap oleh alat pencernaan dan disalurkan ke organ yang membutuhkannya (Sahara, 2011).

Setiap ayam mempunyai kemampuan berbeda untuk merubah pigmen karoten tersebut menjadi warna kuning telur (Castellini *et al.*, 2006). Kuning telur mempunyai warna yang bervariasi, mulai dari kuning pucat sampai jingga. Kuning telur mengandung zat warna (pigmen) yang umumnya termasuk dalam golongan karotenoid yaitu xantofil, lutein, dan zeasantin serta sedikit betakaroten dan kriptosantin. Warna atau pigmen yang terdapat dalam kuning telur sangat dipengaruhi oleh jenis pigmen yang terdapat dalam ransum yang dikonsumsi (Winarno, 2002).

2. Viskositas Telur

Berdasarkan hasil analisis statistik menunjukkan bahwa penggunaan tiga kelompok pakan pada kelompok umur yang berbeda terhadap viskositas telur ayam *lohman* memberikan pengaruh yang berbeda. Ditinjau dari kelompok pakan bahwa pakan 1, pakan 2 dan pakan 3 menunjukkan perbedaan yang signifikan.

Pengaruh penggunaan kelompok pakan yang berbeda terhadap viskositas telur ayam *lohman* pada kelompok umur yang berbeda dapat dilihat pada Tabel 9 di bawah ini

Tabel 9 Pengaruh Penggunaan Tiga Kelompok Pakan terhadap Viskositas Telur Ayam *Lohman* pada Kelompok Umur yang Berbeda.

Pakan 1			Pakan 2			Pakan 3		
Umur A	Umur B	Umur C	Umur A	Umur B	Umur C	Umur A	Umur B	Umur C
Kental	Kental	Kental	Kental	Kental	Kental	Kental	Encer	Encer
Encer	Kental	Encer	Kental	Encer	Kental	Encer	Kental	Kental
Kental	Kental	Encer	Encer	Kental	Encer	Kental	Encer	Encer
Kental	Encer	Encer	Encer	Encer	Encer	Encer	Kental	Kental
Encer	Kental	Kental	Kental	Encer	Kental	Encer	Kental	Encer

Keterangan: A=18-29 minggu; B=30-49 minggu; C=50-afkir.

Sumber: Data Hasil Penelitian, 2017

Tabel di atas menunjukkan bahwa perlakuan pakan memberikan pengaruh pada viskositas telur. Sedangkan pada kelompok umur tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Kandungan protein pakan dapat mempengaruhi viskositas telur yang mencerminkan kualitas internal telur, semakin tinggi kandungan protein pakan maka tingkat kekentalan telur akan semakin tinggi pula. Hal ini di dukung oleh Romanoff dan Romanoff (2011)

menyatakan bahwa viskositas telur di pengaruhi oleh kandungan protein pada pakan.

C. *ProduksiTelur/Hen Day Production (%)*

Pengaruh penggunaan tiga kelompok pakan yang berbeda terhadap produksi telur ayam *lohman* pada tingkat umur yang berbeda dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10 Pengaruh Penggunaan Tiga Kelompok Pakan terhadap Produksi Telur Ayam *Lohman* pada Kelompok Umur yang Berbeda.

No	Kandang	Populasi	Feed Intake	Tatal Konsumsi	Umur	Produksi Telur/HD
1	Kandang 1	2753 ekor	115 g	317 kg	A	90 %
2	Kandang 2	2257 ekor	120 g	271 kg	B	92 %
3	Kandang 3	1885 ekor	120 g	226 kg	C	87 %

Keterangan: A=18-29 minggu; B=30-49 minggu; C=50-afkir.

Sumber: Data Hasil Penelitian, 2017

Tabel 10. menunjukkan bahwa berdasarkan hasil pengamatan secara kandang, tidak menunjukan pengaruh yang signifikan terhadap produksi telur pada ayam lohman, dengan *feed intake* yang berbeda-beda. Pengaruh yang signifikan terdapat pada umur ayam antara 18-29 minggu dan puncak produksi telur berada pada umur antara 30-49 minggu dan semakin tua umur ayam petelur, maka semakin menurun pula jumlah produksinya telurnya. Hal ini di dukung oleh North dan Bell, (1990). Kualitas telur menurun terutama berlangsung setelah lewat masa puncak produksi atau setelah memasuki fase produksi II, Produksi telur semakin menurun dengan bertambahnya umur.

Produksi telur pada ayam dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu kondisi awal ayam pada saat mulai bertelur dan potensi tumbuh ayam dari awal bertelur sampai puncak produksi. Adapun kandungan protein 14% di dalam ransum dinilai kurang cukup untuk mempertahankan produksi telur yang tinggi, bobot telur serta efisiensi penggunaan ransum (Isapoultry, 2006). Produksi telur dipengaruhi oleh kandungan protein dan fosfor dalam ransum. Perbedaan kandungan protein ransum yang lebih tinggi menghasilkan produksi telur yang lebih tinggi disebabkan oleh kandungan asam amino yang lebih lengkap daripada yang terdapat dalam ransum yang proteinnya lebih rendah (Onwudike dan Oke, 1986).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas maka dapat di simpulkan bahwa:

1. Penggunaan tiga jenis pakan memberikan pengaruh yang berbeda pada kelompok umur ayam terhadap warna kuning telur. Warna kuning telur cenderung baik pada kelompok umur 18 – 29 minggu dan kelompok umur 30 – 49 minggu.
2. Terdapat perbedaan kelompok umur yang berbeda terhadap ketebalan kerabang telur. Nilai tebal kerabang telur penelitian pada kelompok umur berbeda berkisar antara 0,42 – 0,44.
3. Perlakuan pakan memberikan pengaruh pada viskositas telur. Semakin tinggi kandungan protein pakan, maka akan semakin tinggi pula viskositas telur yang di hasilkan
4. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan perlakuan pakan terhadap berat telur yang di hasilkan. Berat telur cenderung berbeda pada setiap kelompok umur ayam yang digunakan.
5. Puncak produksi telur di peroleh pada umur 30-49 minggu dan mulai menurun pada umur 50-afkir.

B. Saran

Sebaiknya penelitian ini dilakukan menggunakan satu jenis umur ayam guna untuk melihat perbedaan pengaruh dari tiga jenis pakan yang digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, L. 2013. *Potensi Ayam Buras Indonesia*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Amrullah, I. K. 2004. *Nutrisi Ransum Ayam Broiler*. Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Bappenas, 2010. *Ayam Ras*. Kanisius, Yogyakarta
- Campbell, J. R., M. D Kenealy and K. L. Campbell. 2003. *Animal Science, The Biology, Care and Production of Domestic Animals*. 4th Ed. Mc. Graw Hill. New York.
- Castellini, C., F. Perella, C. Mugnai, and A. Dal Bosco. 2006. Welfare, productivity and quality traits of egg in laying hens reared under different rearing systems. *National Journal of Animal Science*. 54 (2) : 147-155.
- Charoen Pokphand. 2000. *Petunjuk Pemeliharaan Petelur 909*. PT. Charoen Pokphan Jaya Farm Indonesia, Tangerang.
- Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidrap, 2012. *Peningkatan Mutu Masyarakat di Bidang Peternakan*.
- Ensminger, M. E. 1992. *Poultry Production*. 9th Ed. Lea and Fabriger, Philadelphia.
- Gary, D. B. and D. M. Richard. 2003. Egg specific gravity-designing a onitoring program. *Poultry Veterinarian*. Poultry Nutrition. University of Florida. Gainesville. www.hammock.ifas.ufl.edu. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2014.
- Gasper, V. 1991. *Metode Perancangan Percobaan*. CV. Armico. Bandung.
- Gunawan dan D.T.H. Sihombing. 2004. Pengaruh Suhu Lingkungan Tinggi Terhadap Kondisi Fisiologis dan Produktivitas Ayam Buras. *Wartazoa* Vol. 14 No. 1.
- <https://muslim.or.id/2535-tafsir-surat-al-ashr-membebaskan-diri-dari-kerugian.html>. Diakses pada tanggal 14 Maret 2018
- Isapoultry. 2006. *Layer Management guide*. [http:// www.isapoultry.com](http://www.isapoultry.com). Dalam skripsi Mokhammad Sefulah.
- Juliambarwati, M., R. Adi dan H. Aqni. 2012. *Pengaruh Penggunaan Tepung Limbah Udang Dalam Ransum Terhadap Kualitas Telur Itik*. *Jurnal Sains Peternakan Indonesia*.

- Komala, I. 2008. *Kandungan Gizi Produk Peternakan*. <http://www.ppiupm.net/index.php>. Diakses tanggal 28 Februari 2018
- Maryuki, A. 2012. *Berat Ideal Ayam Kampung*. <http://www.ternakayamkampung.com> 201207 berat-ideal-ayam kampung.html [11 Juni 2016].
- Muharlieni. 2010. *Meningkatkan Kualitas Telur Melalui Penambahan Teh Hijau Dalam Pakan Ayam Petelur*. Jurusan Produksi ternak. Fakultas peternakan. Universitas Brawijaya. Malang
- Nakajima, S. and Keshavarz, K. 1995. *The Effect of Dietary Manipulations of Energy, Protein, and Fat During the growing and laying periods on early eggs weight and eggs components*. Poultry Science. 74(1):50-60.
- North, M. O and D. D. Bell. 1990. *Commercial Chicken Production Manual*. The 3rd Edition. Chapman and Hall. New York.
- Oguntunji, A.O. and O.M. Alabi. 2010. *Influence of high environmental temperature on egg production and shell quality: a review*. World's Poultry Sci. J. 66: 739-750
- Onwudike, O. C. and O. L. Oke. 1986. *Total Substitution of Leaf Protein in The Ration of Laying Hens*. Poultry Science 65: 1201-1204
- Rasyaf, M. 2004. *Beternak dengan islamiah*. Penebar Swadaya, Jakarta
- Roland, D. A. M. 1986. *Egg shell quality IV. Oyster shell versus limestone and the importance of particle size or Ca source*. World's Poult. Sci. 42 : 166 _ 177.
- Sahara, E. 2011. *Penggunaan Kepala Udang Sebagai Sumber Pigmen dan Katin dalam 7 Pakan Ternak*. Agrinak. Vol.01 No.1:31-35.
- Sarwono B. 1994. *Pengawetan dan Pemanfaatan Telur*. Penebar Swadaya. Jakarta
- Singh, B. 2002. *The potensial of mulberry foliage as a feed supplement in india*. J. Of. FAO. Anim. Prod. and Health Paper. 147: 139-156.
- Siregar, R.F. 2012. *Perubahan Sifat Fungsional Telur Ayam Ras Pasc Pasteurisasi*. Anim Agric J. 1(1):521-528.
- Sodak, J. F. 2011. *Karakteristik fisik dan kimia telur ayam Arab pada dua peternakan di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur*. Skripsi. IPB, Bogor.

- Shafer, B. A and H. Pasternak. 1992. *Increment of egg weight with hen age in various commercial avian species*. *British Poultry science* 34 : 915-924
- Stadelman, W.J. and O.J. Cotteril. 1977. *Eggs Science and Technology*. 4th Ed. The Avy Publishing Company, Inc., Westport, Connecticut.
- Standar Nasional Indonesia nomor 01-3926-2006 *Telur Ayam Konsumsi*. Badan Standar Nasional. Jakarta.
- Sudaryani. T. 2003. *Kualitas telur*. Cetakan ke-4. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Sudaryani dan Samosir. 2000. *Mengatasi permasalahan beternak ayam*. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Susilorini. E, Sawitri. ME, Muharlieni. 2009. *Budi daya 22 Ternak Potensial*. Penebar Swadaya; Jakarta.
- Tugiyanti E., dan Iriyanti N. 2012. *Kualitas Eksternal Telur Ayam Petelur yang Mendapat Ransum dengan Penambahan Tepung Ikan Fermentasi Menggunakan Isolat Produser Antihistamin*. *Jurnal Aplikasi Teknologi Pangan*. Vol. 1 No. 2. Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto.
- Wahju, J. 2004. *Ilmu Nutrisi Unggas*. Gajah Mada University Press: Jogjakarta.
- Widowati. S. 2007. *Struktur. Komposisi. Dan Nutrisi Jagung*. Teknik Produksi dan Pengembangan. BPP Pertanian. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian; Jakarta.
- Winarno, F. G. 2002. *Telur, Komposisi, Penanganan dan Pengolahannya*. M-Brio Press. Bogor.
- Yuwanta, T. 2010. *Telur dan Kualitas Telur*. UGM Press. Yogyakarta.

LAMPIRAN 1

Data Hasil Analisis Statistik

A.1. Tebal Kerabang

Between-Subjects Factors

		Value Label	N
jenis pakan	1	Pakan 1	15
	2	Pakan 2	15
	3	Pakan 3	15
Kelompok	1		15
	2		15
	3		15

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable:tebal_kerabang

Source	Type III Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	.001 ^a	4	.000	10.528	.000
Intercept	8.303	1	8.303	2.6315	.000
Perlakuan	.000	2	6.222-5	1.972	.153
Kelompok	.001	2	.001	19.085	.000
Error	.001	40	3.156-5		
Total	8.306	45			
Corrected Total	.003	44			

a. R Squared = ,513 (Adjusted R Squared = ,464)

Post Hoc Tests

kelompok

Multiple Comparisons

Dependent Variable:tebal_kerabang

	(I) kelompok	(J) kelompok	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
						Lower Bound	Upper Bound
LSD	1	2	-.0060*	.00205	.006	-.0101	-.0019
		3	-.0127*	.00205	.000	-.0168	-.0085
	2	1	.0060*	.00205	.006	.0019	.0101
		3	-.0067*	.00205	.002	-.0108	-.0025
	3	1	.0127*	.00205	.000	.0085	.0168
		2	.0067*	.00205	.002	.0025	.0108

Based on observed means.

The error term is Mean Square(Error) = 3,16E-005.

*. The mean difference is significant at the 0,05 level.

Homogeneous Subsets

tebal_kerabang

	kelompok	N	Subset		
			1	2	3
Duncan ^a	1	15	.4233		
	2	15		.4293	
	3	15			.4360
	Sig.		1.000	1.000	1.000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

Based on observed means.

The error term is Mean Square(Error) = 3,16E-005.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 15,000.

jenis pakan

Multiple Comparisons

Dependent Variable:tebal_kerabang

	(I) jenis pakan	(J) jenis pakan	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
						Lower Bound	Upper Bound
LSD	Pakan 1	Pakan 2	-.0027	.00205	.201	-.0068	.0015
		Pakan 3	-.0040	.00205	.058	-.0081	.0001
	Pakan 2	Pakan 1	.0027	.00205	.201	-.0015	.0068
		Pakan 3	-.0013	.00205	.519	-.0055	.0028
	Pakan 3	Pakan 1	.0040	.00205	.058	-.0001	.0081
		Pakan 2	.0013	.00205	.519	-.0028	.0055

Based on observed means.

The error term is Mean Square(Error) = 3,16E-005.

Homogeneous Subsets

tebal_kerabang

	jenis pakan	N	Subset
			1
Duncan ^a	Pakan 1	15	.4273
	Pakan 2	15	.4300
	Pakan 3	15	.4313
	Sig.		.072

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

Based on observed means.

The error term is Mean Square(Error) = 3,16E-005.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 15,000.

A.2. Berat Telur

Between-Subjects Factors

		Value Label	N
jenis pakan	1	Pakan 1	15
	2	Pakan 2	15
	3	Pakan 3	15
Kelompok	1		15
	2		15
	3		15

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: berat_telur

Source	Type III Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	86.667 ^a	4	21.667	.703	.595
Intercept	169280.000	1	169280.000	5.4903	.000
Perlakuan	83.333	2	41.667	1.351	.270
Kelompok	3.333	2	1.667	.054	.947
Error	1233.333	40	30.833		
Total	170600.000	45			
Corrected Total	1320.000	44			

a. R Squared = ,066 (Adjusted R Squared = -,028)

Post Hoc Tests

kelompok

Multiple Comparisons

Dependent Variable: berat_telur

	(I) kelompok	(J) kelompok	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
						Lower Bound	Upper Bound
LSD	1	2	-.3333	2.02759	.870	-4.4312	3.7646
		3	-.6667	2.02759	.744	-4.7646	3.4312
	2	1	.3333	2.02759	.870	-3.7646	4.4312
		3	-.3333	2.02759	.870	-4.4312	3.7646
	3	1	.6667	2.02759	.744	-3.4312	4.7646
		2	.3333	2.02759	.870	-3.7646	4.4312

Based on observed means.

The error term is Mean Square(Error) = 30,833.

Homogeneous Subsets

berat_telur			
	kelompok	N	Subset
			1
Duncan ^a	1	15	61.0000
	2	15	61.3333
	3	15	61.6667
	Sig.		

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

Based on observed means.

The error term is Mean Square(Error) = 30,833.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 15,000.

jenis pakan

Multiple Comparisons

Dependent Variable:berat_telur

	(I) jenis pakan	(J) jenis pakan	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
						Lower Bound	Upper Bound
LSD	Pakan 1	Pakan 2	-1.6667	2.02759	.416	-5.7646	2.4312
		Pakan 3	-3.3333	2.02759	.108	-7.4312	.7646
	Pakan 2	Pakan 1	1.6667	2.02759	.416	-2.4312	5.7646
		Pakan 3	-1.6667	2.02759	.416	-5.7646	2.4312
	Pakan 3	Pakan 1	3.3333	2.02759	.108	-.7646	7.4312
		Pakan 2	1.6667	2.02759	.416	-2.4312	5.7646

Based on observed means.

The error term is Mean Square(Error) = 30,833.

Homogeneous Subsets

berat_telur

	jenis pakan	N	Subset
			1
Duncan ^a	Pakan 1	15	59.6667
	Pakan 2	15	61.3333
	Pakan 3	15	63.0000
	Sig.		.128

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

Based on observed means.

The error term is Mean Square(Error) = 30,833.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 15,000.

B.1. Warna Kuning Telur

Between-Subjects Factors

		Value Label	N
jenis pakan	1	Pakan 1	15
	2	Pakan 2	15
	3	Pakan 3	15
Kelompok	1		15
	2		15
	3		15

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: warna_telur

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	1.333 ^a	4	.333	1.351	.268
Intercept	105.800	1	105.800	428.919	.000
Perlakuan	.400	2	.200	.811	.452
Kelompok	.933	2	.467	1.892	.164
Error	9.867	40	.247		
Total	117.000	45			
Corrected Total	11.200	44			

a. R Squared = ,119 (Adjusted R Squared = ,031)

Post Hoc Tests

kelompok

Multiple Comparisons

Dependent Variable: warna_telur

	(I) kelompok	(J) kelompok	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
						Lower Bound	Upper Bound
LSD	1	2	-.3333	.18135	.073	-.6999	.0332
		3	-.2667	.18135	.149	-.6332	.0999
	2	1	.3333	.18135	.073	-.0332	.6999
		3	.0667	.18135	.715	-.2999	.4332
	3	1	.2667	.18135	.149	-.0999	.6332
		2	-.0667	.18135	.715	-.4332	.2999

Based on observed means.

The error term is Mean Square(Error) = ,247.

Homogeneous Subsets

warna_telur

	kelompok	N	Subset
			1
Duncan ^a	1	15	1.3333
	3	15	1.6000
	2	15	1.6667
	Sig.		.089

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

Based on observed means.

The error term is Mean Square(Error) = ,247.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 15,000.

jenis pakan

Multiple Comparisons

Dependent Variable: warna_telur

	(I) jenis pakan	(J) jenis pakan	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
						Lower Bound	Upper Bound
LSD	Pakan 1	Pakan 2	-.2000	.18135	.277	-.5665	.1665
		Pakan 3	-.2000	.18135	.277	-.5665	.1665
	Pakan 2	Pakan 1	.2000	.18135	.277	-.1665	.5665
		Pakan 3	.0000	.18135	1.000	-.3665	.3665
	Pakan 3	Pakan 1	.2000	.18135	.277	-.1665	.5665
		Pakan 2	.0000	.18135	1.000	-.3665	.3665

Based on observed means.

The error term is Mean Square(Error) = ,247.

Homogeneous Subsets

warna_telur

	jenis pakan	N	Subset
			1
Duncan ^a	Pakan 1	15	1.4000
	Pakan 3	15	1.6000
	Pakan 2	15	1.6000
	Sig.		.306

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

Based on observed means.

The error term is Mean Square(Error) = ,247.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 15,000.

B.2. Viskositas Telur

Between-Subjects Factors

		Value Label	N
Perlakuan	1	pakan 1	15
	2	pakan 2	15
	3	pakan 3	15
Kelompok	1		15
	2		15
	3		15

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable:viskositas_telur

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	2.356 ^a	4	.589	2.650	.047
Intercept	99.756	1	99.756	448.900	.000
Perlakuan	2.178	2	1.089	4.900	.012
Kelompok	.178	2	.089	.400	.673
Error	8.889	40	.222		
Total	111.000	45			
Corrected Total	11.244	44			

a. R Squared = ,209 (Adjusted R Squared = ,130)

Post Hoc Tests

kelompok

Multiple Comparisons

Dependent Variable:viskositas_telur

	(I) kelompok	(J) kelompok	Mean Difference (I- J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
						Lower Bound	Upper Bound
LSD	1	2	.0000	.17213	1.000	-.3479	.3479
		3	.1333	.17213	.443	-.2146	.4812
	2	1	.0000	.17213	1.000	-.3479	.3479
		3	.1333	.17213	.443	-.2146	.4812
	3	1	-.1333	.17213	.443	-.4812	.2146
		2	-.1333	.17213	.443	-.4812	.2146

Based on observed means.

The error term is Mean Square(Error) = ,222.

Homogeneous Subsets

viskositas_telur

	Kelompok	N	Subset
			1
Duncan ^a	3	15	1.4000
	1	15	1.5333
	2	15	1.5333
	Sig.		.471

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

Based on observed means.

The error term is Mean Square(Error) = ,222.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 15,000.

perlakuan

Multiple Comparisons

Dependent Variable:viskositas_telur

	(I) perlakuan	(J) perlakuan	Mean Difference (I- J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
						Lower Bound	Upper Bound
LSD	pakan 1	pakan 2	-.3333	.17213	.060	-.6812	.0146
		pakan 3	-.5333*	.17213	.004	-.8812	-.1854
	pakan 2	pakan 1	.3333	.17213	.060	-.0146	.6812
		pakan 3	-.2000	.17213	.252	-.5479	.1479
	pakan 3	pakan 1	.5333*	.17213	.004	.1854	.8812
		pakan 2	.2000	.17213	.252	-.1479	.5479

Based on observed means.

The error term is Mean Square(Error) = ,222.

*. The mean difference is significant at the 0,05 level.

Homogeneous Subsets

viskositas_telur

	perlakuan	N	Subset	
			1	2
Duncan ^a	pakan 1	15	1.2000	
	pakan 2	15	1.5333	1.5333
	pakan 3	15		1.7333
	Sig.		.060	.252

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

Based on observed means.

The error term is Mean Square(Error) = ,222.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 15,000.

LAMPIRAN 2


Dokumentasi Kegiatan Penelitian

A. tebal kerabang



Gambar 1: pengukuran tebal tipis kerabang dengan jangkan sorong

B. Kuning telur (kuning/pucat)




Gambar 2: telur kuning




Gambar 3: telur pucat

C. viskositas telur



Gambar 4: kental



Gambar 5: encer

D. berat telur



Gamabar 6: timbangan telur

E. kandang ayam petelur



Gambar7 :kandang B I.B II.B III

F.foto sama pembibing lapangan, pengawas dan adik-adik ppl



Gambar 8: pembibing dan pembantu lapangan.

RIWAYAT HIDUP



Alhamdulillah saya di lahirkan oleh pasangan suami istri yang saling mencintai dengan memberi saya nama yang sangat baik yakni **RIFAID** di Kab. bima Kec. Palibelo (kota bima) lebih tepatnya disebuah Desa Kecil yang dinamai Dengan Desa Ntonggu Pali-Belo (Bima) perbatasan dengan Desa Teke Dan Jalan Poros Yang Menyambukan Ke Kota Bima yang disebut dengan Jln Lintas Ntonggu Oimbo pada tanggal 12 desember 1993 dan biasa di panggil faid hasil buah kasih dari pasangan Arsyad Dengan Fatimah. Pada tahun 2000 Sekolah Dasar (SD) di SD Impres Ntonggu satu dan selesai pada tahun 2006 dan pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP 6 Kota Bima pada tahun 2009 dan pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 2 Kota Bima dan selesai pada tahun 2012 dan pada tahun yang sama penulis pun menjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan mengambil jurusan ilmu peternakan yang di naungi oleh fakultas sains dan teknologi. Dengan masa jenjang pendidikan S1 sampai sekarang.