

**UJI DAYA CERNA SERAT KASAR PADA BROILER YANG  
DIBERIKAN ANTIBIOTIK DAN PROBIOTIK**



**Skripsi**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi  
Universitas Islam Negeri Alauddin  
Makassar**

**Oleh :**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**RAHMAWATI**  
**60700114018**  
ALAUDDIN  
M A K A S S A R

**JURUSAN ILMU PETERNAKAN  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN  
MAKASSAR  
2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmawati  
NIM : 60700114018  
Tempat/Tgl. Lahir : Arjosari/10 November 1995  
Jurusan : Ilmu Peternakan  
Fakultas : Sains dan Teknologi  
Alamat : Jl. Mustafa Dg. Bunga III  
Judul : Uji Daya Cerna Serat Kasar pada Broiler yang Diberikan Antibiotik dan Probiotik

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, Agustus 2018

Penyusun



**Rahmawati**

NIM: 60700114018

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Uji Daya Cerna Serat Kasar pada Broiler yang Diberikan Antibiotik dan Probiotik” yang disusun oleh **RAHMAWATI NIM: 60700114018**, mahasiswa Jurusan Ilmu Peternakan pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 06 Agustus 2018, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Peternakan, Jurusan Ilmu Peternakan.

Samata-Gowa, Agustus 2018  
Dzul Hijjah 1439 H

### DEWAN PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. H. Arifuddin, M. Ag (.....)

Sekretaris : Astati, S.Pt., M.Si (.....)


Munaqisyi I : Dr. Ir. Muh. Basir Paly, M.Si (.....)

Munaqisyi II : Dr. M. Thahir Maloko, M.Hi (.....)

Pembimbing I : Muh. Nur Hidayat, S.Pt, MP (.....)

Pembimbing II : Rasyidah Mappanganro, S.Pt., M.Si (.....)

Diketahui oleh:  
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar,

  
**Prof. Dr. H. Arifuddin, M. Ag.**  
NIP. 19691205199303 1 001


## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi saudara **RAHMAWATI**, Nim: 60700114018, mahasiswa Jurusan Ilmu Peternakan pada Fakultas Sains dan Teknologi, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Skripsi yang bersangkutan dengan judul : “**Uji Daya Cerna Serat Kasar pada Broiler yang Diberikan Antibiotik dan Probiotik**”, memandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *Munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Gowa, Agustus 2018

**Pembimbing I**



**Muh. Nur Hidayat S.Pt., MP.**  
NIP: 19850909200912001

**Pembimbing II**




**Rasyidah Mappanganro S.Pt, M.Si.**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**ALAUDDIN**

M A A S A R

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Ilmu Peternakan



**Dr. Ir. Muh. Basir Paly, M.Si**  
NIP: 19590712 1986031 002

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Atas berkat, rahmat, karunia serta bimbingannya sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini dengan baik. Adapun judul dari skripsi ini adalah “**Uji Daya Cerna Serat Kasar pada Broiler yang diberikan Antibiotik dan Probiotik**” yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Shalawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi panutan serta telah membawa ummat dari kehancuran menuju alam yang terang benderang. Hambatan dan tantangan tidak lepas dari penulisan skripsi ini, namun petunjuk dan bimbingan selalu di berikan oleh berbagai pihak hingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.

Ucapan syukur dan terima kasih kepada kedua orang tua saya **Ayahanda tercinta Busman** dan **Ibunda tercinta Siti Rawiah** yang senantiasa mendoakan, membimbing dan merawat penulis sejak kecil hingga dapat menyelesaikan skripsi seperti sekarang. Tak henti-hentinya ucapan terima kasih kepada kedua orang tua atas semua dukungan yang diberikan baik dukungan materil maupun non materil hingga penulis dapat menyelesaikan kuliah kurang lebih 4 tahun. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada kedua saudara tercinta **Burhanuddin** yang telah banyak membantu agar skripsi ini dapat selesai dengan baik.

Terima kasih tak terhingga kepada Bapak **Muh. Nur Hidayat, S.Pt., M.P** selaku pembimbing I dan kepada Ibu **Rasyida Mappanganro, S.Pt., M.Si** selaku pembimbing II atas didikan, bimbingan serta waktu yang telah diluangkan untuk memberikan petunjuk, arahan dan ilmu mulai dari awal penelitian hingga penyelesaian skripsi.

Ucapan terima kasih sebesar-besarnya penulis haturkan kepada berbagai pihak yang telah membantu dan memberi dorongan kepada penulis:

1. **Bapak Prof. Dr. Musafir Pabbabari, M.Si** selaku rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. **Bapak Prof. Dr.H. Arifuddin, M.Ag.** selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, , **Dr. Wasilah, S.T, M.T** Selaku wakil dekan 1 bidang akademik Fakultas Sains, **Dr. M. Thahir Maloko, M.Th.I** Selaku wakil dekan 2 bidang administrasi Fakultas Sains dan Teknologi, dan **Dr. Ir. Andi Suarda, M. Si** selaku wakil dekan 3 bidang kemahasiswaan Fakultas Sains dan Teknologi.
3. **Bapak Dr. Ir. M. Basir Paly, M.Si** sebagai ketua Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan dan ibu **Astati, S.Pt., M. Si** selaku sekretaris jurusan Ilmu Peternakan.
4. **Bapak Dr. Ir. M. Basir Paly dan Bapak Dr. M. Thahir Maloko, M.Hi** selaku penguji yang telah memberikan saran dan kritikan yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan dan penyusunan skripsi ini.

5. **Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Peternakan** atas bimbingan dalam kegiatan perkuliahan, baik dalam tatap muka maupun arahan-arahan diluar perkuliahan.
6. **Ibu Drh. Aminah Thaja M.Si, Bapak Muh. Arsan Jamili S.Pt., M.Si** dan, **Ibu Hikmawati S.Pt** selaku Laboran Jurusan Ilmu Peternakan yang telah memberikan ilmunya selama menjadi asisten laboratorium sampai dengan proses selesainya penelitian.
7. Kak **Andi Afriana, S.E** selaku Staff Jurusan Ilmu Peternakan yang telah membantu segala persuratan dari proposal hingga skripsi.
8. Sahabat Tercinta “Doi Cuu” **Andi Febri Astuti, Ismawati** dan **Wahyuni** yang menemani dalam susah senang dalam mengerjakan skripsi hingga selesai
9. Tim penelitian “Bacitracin Squad” (**Andi Febri Astuti, Eka Fitriani, Wahyuni, Ismawati, Syarif Hidayatullah, Rustan, dan Sultan Akbar Wahidin**) atas kerja sama, pengorbanan dan kerja kerasnya selama proses penelitian berlangsung.
10. Buat teman-teman seangkatananku Ilmu Peternakan Angkatan 2014 **E14NG** terima kasih atas bantuan, kebersamaan dan canda tawanya yang selama ini terjalin.
11. Tim **SC AN'AM** yang telah membantu dari awal penelitian hingga akhir penelitian.
12. Senior angkatan **2006-2012** dan adik-adik angkatan **2015-2017**.

**Mirnawati, Musrifah Aliyah, Mutmainnah dan Muslina) dan Elang B (Khaerullah, Arfah, M. Arfah, Wandu, Rustan, Syarif Hidayatullah, Sultan Akbar Wahidin, Rahman, Khaedar Ali, M. Salman, Haris, Muslimin, Abu Nidal dan Saharuddin)** terima kasih atas bantuan, kebersamaan dan canda tawanya yang selama ini terjalin.

11. Tim SC AN'AM yang telah membantu dari awal penelitian hingga akhir penelitian.
12. Senior angkatan **2006-2012** dan adik-adik angkatan **2015-2017**.
13. Keluarga besar yang selama ini telah membantu dan tak hentinya memberkan doa selama penyelesaian skripsi
14. Teman-teman **KKN Angkatan 58 Desa Lassang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kab. Takalar** untuk semua dukungan, pengalaman dan masukan-masukannya.
15. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Makassar, Agustus 2018

  
Rahmawati

## ABSTRAK

Nama : Rahmawati  
Nim : 60700114018  
Jurusan : Ilmu Peternakan  
Judul : Uji Daya Cerna Serat Kasar pada Broiler yang diberikan Antibiotik dan Probiotik

---

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian antibiotik *Zink Bacitracin* dan probiotik multi strain pada pakan terhadap daya cerna serat kasar pada broiler. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 4 perlakuan dan 3 ulangan, setiap ulangan terdiri dari 3 ekor broiler sehingga terdapat 36 unit percobaan dengan perlakuan (P) yaitu: P<sub>0</sub> = Ransum basal (kontrol), P<sub>1</sub> = Ransum basal + Probiotik multi strain (*Lactobacillus cesei*, *Saccharomyces cerevisiae* dan *Rhodopseudomonas palustris*) 1,5 ml/hari, (1-35 hari), P<sub>2</sub> = Ransum basal + Antibiotik *Zink Bacitracin* 0,1 g/hari, (1-35 hari) dan P<sub>3</sub> = Ransum basal + Antibiotik *Zink Bacitracin* 0,1 g/hari, (1-21 hari) + Probiotik multi strain (*Lactobacillus cesei*, *Saccharomyces cerevisiae* dan *Rhodopseudomonas palustris*) 1,5 ml/hari, (22-35 hari). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian perlakuan (antibiotik dan probiotik) terhadap daya cerna serat kasar pada broiler diperoleh P<sub>0</sub> (38.75 %), P<sub>1</sub> (65.53%), P<sub>2</sub> (67.88%), P<sub>3</sub> (68.48%). Dapat disimpulkan bahwa penggunaan probiotik dan antibiotic pada level tertentu terhadap daya cerna serat kasar tidak berpengaruh nyata ( $P > 0,05$ ).

**Kata Kunci** : Daya cerna, Serat Kasar, Antibiotik, Probiotik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
M A K A S S A R

## ABSTRAC

Name : Rahmawati  
Nim : 60700114018  
Departmen : Animal Science  
Thesis : Grain Fiber Digestibility Test In Broilers Given Antibiotic and Probiotic

---

The purpose of this study was to determine the effect of antibiotics Zinc Bacitracin and probiotics multi strain on feed on the digestibility of crude fiber in broiler. This study used a Completely Randomized Design (RAL) consisting of 4 treatments and 3 replications, each replication consisted of 3 broilers so that there were 36 experimental units with treatment (P): P0 = Basal ration (control), P1 = Basal ration + Probiotic multi strain (*Lactobacillus cesei*, *Saccharomyces cerevisiae* dan *Rhodopseudomonas palustris*) 1.5 ml / day, (1-35 days), P2 = Basal ration + Antibiotic Zinc Bacitracin 0.1 g / day, (1-35 days) and P3 = Basal ration + Antibiotics Zinc Bacitracin 0.1 g / day, (1-21 days) + Probiotic multi strain (*Lactobacillus cesei*, *Saccharomyces cerevisiae* dan *Rhodopseudomonas palustris*) 1.5 ml / day, (22-35 days). The results showed that treatment (antibiotic and probiotic) on crude fiber in broilers obtained P0 (38.75%), P1 (65.53%), P2 (67.88%), P3 (68.48%). It can be concluded that the use of probiotics and antibiotics at a certain level on the digestibility of crude fiber has no significant effect ( $P < 0.05$ ).

**Keywords:** Digestibility, Coarse Fiber, Antibiotics, Probiotics

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
M A K A S S A R

## DAFTAR ISI

	Halaman
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	x
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Hipotesis .....	5
F. Definisi Operasional.....	5
G. Ruang Lingkup Penelitian .....	6
H. Kajian Terdahulu.....	6
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Integrasi .....	7
1. Tinjauan Al-Qur'an tentang Unggas.....	7
2. Tinjauan Al-Qur'an tentang Mikroorganisme .....	8
3. Hadist tentang Larang Makan secara Berlebihan.....	9
B. Kajian Teoritis.....	10
1. Ayam Broiler.....	10
2. Serat Kasar .....	15
3. Daya Cerna.....	20
4. Probiotik.....	24
5. Antibiotik .....	38
6. Bakteri Asam Laktat .....	42
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Waktu dan Tempat .....	48
B. Alat dan Bahan.....	48
1. Alat .....	48
2. Bahan .....	48
C. Jenis Penelitian.....	49
D. Metode Penelitian.....	49
1. Rancangan Penelitian .....	49
2. Persiapan dan Pemeliharaan Broiler .....	50

3. Proses Perhiungan Daya Cerna Serat Kasar.....	51
E. Parameter yang Diukur .....	52
F. Analisis Data .....	53
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil .....	55
B. Pembahasan Parameter yang Diukur.....	56
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA .....	61
LAMPIRAN.....	68
RIWAYAT HIDUP.....	76



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang***

Ayam pedaging (broiler) merupakan salah satu komoditi unggas yang memberikan kontribusi besar dalam memenuhi kebutuhan protein asal hewani bagi masyarakat Indonesia. Kebutuhan daging ayam setiap tahunnya mengalami peningkatan, karena harganya yang terjangkau oleh semua kalangan masyarakat.. Broiler adalah jenis ternak unggas yang memiliki laju pertumbuhan yang sangat cepat, karena dapat dipanen pada umur 5 minggu. Keunggulan broiler didukung oleh sifat genetik dan keadaan lingkungan yang meliputi makanan, temperatur lingkungan, dan pemeliharaan. Penampilan ayam pedaging yang bagus dapat dicapai dengan sistem peternakan intensif modern yang bercirikan pemakaian bibit unggul, pakan berkualitas, serta perkandangan yang memperhatikan aspek kenyamanan dan kesehatan ternak (Nuraini, 2003).

Daging ayam merupakan salah satu sumber bahan pangan hewani, yang mengandung gizi yang cukup tinggi berupa protein dan energi. Permintaan terhadap pangan hewani ini, cenderung terus-menerus meningkat. Selain itu faktor yang turut mendorong meningkatnya permintaan daging ayam, karena terjadi pergeseran pola konsumsi masyarakat dari bahan pangan sumber protein nabati ke bahan pangan sumber protein ternak. Fenomena ini diperkirakan akan terus-menerus meningkat dan berlanjut di masa depan. Daging yang beredar di pasar setiap harinya tentunya memiliki kualitas yang sangat bervariasi. Beragamnya

kondisi ternak, cara pemeliharaan dan umur potong dari ternak tersebut menyebabkan kualitas dari daging yang dihasilkan menjadi beragam. Dengan beragam kondisi tersebut, pelanggan harus teliti dalam memilih daging yang akan dikonsumsi. Ketersediaan pakan baik kuantitas maupun kualitas merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas daging, sedangkan faktor penting lainnya adalah bibit dan manajemen pemeliharaan (Gordon dan Charles, 2002).

Pakan memegang peran penting karena tinggi atau rendahnya produksi ternak ditentukan oleh pakan. Dalam mengembangkan usaha ternak ayam broiler, pada umumnya peternak memberikan pakan komersial karena pakan komersial telah memenuhi standar kebutuhan zat-zat makanan yang telah ditetapkan. Pakan komersial yang digunakan umumnya campuran dari beberapa jenis bahan baku seperti bahan sumber energi, lemak, vitamin, mineral, antibiotika, dan protein seperti protein hewani dan protein nabati, serta bahan lainnya yang diperlukan (Kartasudjana, 2005).

Laju pertumbuhan pada ayam sangat ditunjang oleh kecukupan nutrisi yang dikonsumsi oleh ayam. Kecukupan nutrisi ini erat hubungannya dengan kandungan gizi pakan serta kemampuan usus dalam menyerap nutrisi yang dikandung pakan tersebut. Ternak unggas dikenal buruk dalam mencerna serat kasar dibanding ternak ruminansia. Hal ini disebabkan saluran pencernaan unggas miskin akan enzim pencernaan selulase yang berfungsi sebagai pencerna serat kasar (Hafsah, 2003).

Pemberian pakan ternak ayam harus juga memperhatikan kandungan zat anti nutrisi yang dikandung pakan. Umumnya tanaman serealia yang menjadi

bagian formulasi dari ransum pakan mengandung asam fitat. Dalam Anggorodi (1995) menyatakan bahwa dedak padi mengandung asam fitat yang cukup tinggi yaitu 2,42%, sehingga sangat diperlukan perhitungan yang matang dalam pencampuran dedak padi kedalam ransum agar tidak menekan pertumbuhan ayam. Kemungkinan yang bisa saja terjadi pada ayam yaitu defisiensi beberapa mineral bervalensi-2 seperti Ca, Zn, Fe, Mn dan lain-lain. Sumandi (2004), menyatakan bahwa defisiensi Zn banyak terjadi pada ternak yang umumnya mengkonsumsi biji-bijian dan serat kasar tinggi dalam jumlah banyak (kecuali ternak ruminansia).

Biaya pakan mencapai 60-70% dari total biaya produksi dan berperan meningkatkan efisiensi protein. Penggunaan bahan pakan lokal menjadi alternatif untuk menekan biaya produksi. Bahan pakan lokal yang digunakan tentunya harus memiliki beberapa fungsi pakan antara lain: memiliki kandungan gizi yang dibutuhkan oleh ternak, murah serta mudah didapat. Kandungan gizi utama yang berperan penting bagi pertumbuhan ayam pedaging adalah protein, energi (karbohidrat dan lemak), vitamin, mineral serta air (Fuller, 2015).

Pembatasan penggunaan antibiotik saat ini menyebabkan meningkatnya upaya penggunaan bahan aditif lain yang dapat digunakan sebagai pengganti antibiotik. Bahan yang dapat menggantikan fungsi antibiotik pada ternak diantaranya yaitu probiotik dan prebiotik. Penggunaan kedua bahan ini dapat dipakai secara terpisah atau dipakai secara bersamaan sebagai sinbiotik. Probiotik dan prebiotik dapat merubah ekosistem mikroba pencernaan sehingga berpengaruh terhadap kesehatan dan kinerja inang. Penggunaan probiotik dan

prebiotik sudah banyak diterapkan di luar negeri karena memberikan hasil yang positif (Soesanto, 2002).

Teknologi pakan yang alami menjadi suatu yang menarik seiring dengan kecenderungan masyarakat negara maju untuk memilih makanan yang berasal dari ternak harus aman, ramah lingkungan serta berasal dari sistem peternakan yang sejahtera bagi ternak.

Berdasarkan pernyataan diatas perlu dilakukannya penelitian mengenai penggunaan bahan pakan adiktif, yaitu penggunaan antibiotik yang dicampur dengan prebiotik pada pakan untuk mengetahui daya cerna serat kasar pada broiler.

#### ***B. Rumusan Masalah***

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengaruh pemberian antibiotik dan probiotik pada pakan terhadap daya cerna serat kasar pada broiler?

#### ***C. Tujuan Penelitian***

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian antibiotik dan probiotik pada pakan terhadap daya cerna serat kasar pada broiler.

#### ***D. Manfaat Penelitian***

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam Meningkatkan kualitas broiler yang akan di produksi, bagi para peneliti maupun orang-orang atau instansi yang menerapkan hasil penelitian tersebut.

2. Pemerintah dapat mengembangkan dan melakukan penyuluhan kepada para peternak untuk meningkatkan pengetahuan bagi peternak sehingga peternak dapat menghasilkan produk yang lebih unggul dan berkualitas

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai data dasar untuk menunjang penelitian lain dan memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### ***E. Hipotesis***

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sukaryana, 2011).

Untuk memperoleh jawaban sementara dari permasalahan di atas maka penulis mencoba untuk mengemukakan hipotesis sementara yakni: pemberian antibiotik dan prebiotik pada ransum yang berpengaruh terhadap daya cerna serat kasar pada feses broiler.

#### ***F. Defenisi Operasional***

1. Broiler atau yang disebut juga ayam ras pedaging adalah jenis ras unggulan hasil persilangan dari bangsa-bangsa ayam yang memiliki daya produktivitas tinggi, terutama dalam memproduksi daging ayam. Ayam broiler yang merupakan hasil perkawinan silang dan sistem berkelanjutan sehingga mutu genetiknya bisa dikatakan baik.

2. Probiotik merupakan mikroorganisme non patogen yang diberikan kepada ternak untuk mengatur keseimbangan mikroba dalam saluran pencernaan, memperbaiki laju pertumbuhan, efisiensi ransum, konversi ransum dan kesehatan

ternak. *Escherichia coli* merupakan salah satu anggota famili *enterobacteriaceae* yang sering menimbulkan penyakit diare.

3. Antibiotik adalah zat kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme hidup secara sintesis kimia dengan konsentrasi rendah mempunyai kemampuan menghambat bahkan membunuh mikroorganisme lain.

4. Feses atau dalam bahasa kasarnya disebut tahi adalah produk buangan saluran pencernaan hewan yang dikeluarkan melalui anus atau kloaka.

### ***G. Ruang Lingkup Penelitian***

Ruang lingkup penelitian ini adalah menganalisis pengaruh antibiotik dan probiotik terhadap daya cerna serat kasar pada broiler.

### ***H. Kajian Terdahulu***

Penelitian Barton dan Hart (2001), penggunaan imbuhan pakan (feed additive) dalam ransum bertujuan untuk meningkatkan daya guna pakan. Penggunaan antibiotik pada ternak di beberapa negara di Eropa seperti golongan virgiamycin, avopracin, bacitracin, tylocin dan spiramycin sudah dilarang karena adanya residu pada hasil ternak yang dapat membahayakan konsumen.

Penelitian Aziz dkk (2013), tentang penggunaan berbagai jenis probiotik dalam ransum ayam Arab yang berpengaruh tidak nyata terhadap konsumsi pakan dan *Income Over Feed Cost*. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penggunaan berbagai jenis probiotik dalam ransum ayam Arab tidak memengaruhi efisiensi konsumsi pakan dan *Income Over Feed Cost* ayam Arab umur 91 minggu.

## BAB II


### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kajian Integrasi

##### 1. Tinjauan Al-Qur'an Tentang Unggas

Hewan ternak adalah hewan yang sengaja di pelihara dan dirawat oleh manusia untuk di ambil manfaatnya. Diantaranya adalah hewan yang dapat di manfaatkan dagingnya yang halal untuk di komsumsi seperti ayam, sapi, kambing, dan unta. Allah SWT menciptakan binatang ternak dengan sebagai manfaat yaitu dapat di ambil dagingnya untuk dikonsumsi, air susunya untuk di minum, bulunya dapat dijadikan wol yang dapat menghangatkan tubuh dan dapat di gunakan sebagai alat transportasi (Kementrian Agama RI, 2012).

Dalam firman-Nya Allah swt. Menjelaskan bahwa QS Al-Mu'minun/23/21-22.



Terjemahnya:

Dan sungguh pada hewan-hewan ternak terdapat suatu pelajaran bagimu. Kami memberi minum kamu dari (air susu) yang ada dalam perutnya, dan padanya juga terdapat banyak manfaat untukmu, dan sebagian darinya kamu makan. Atasnya (hewan-hewan ternak), dan diatas kapal-kapal kamu diangkut. (Kementrian Agama RI, 2012).

Berdasarkan tafsir al-mishbah menjelaskan bahwa “ibroh” (pelajaran) yang dapat di ambildari binatang sungguh banyak, termasuk sifat dagingnya yang berada satu dengan yang lain, ada yang lezat dan bergizi, ada juga yang

berbahanya untuk di makan, keistimewaan dan kemampuannya pun berbeda-beda Allah swt. telah menganugraahkan binatang binatang untuk manusia, antara lain,”sesungguhnya pada binatang-binatang ternak” benar-beenar terdapat ”ibroh” yakni pelajaran bagi manusia. Melalui pengamatan dan pemanfaatan binatang-binatang itu, manusia dapat memperoleh kekuasaan Allah swt. dan karunia-Nya “kami memberi kamu minum dari sebagai”, yakni susu murni yang penuh gizi”yang ada dalam perutnya”,dan juga selain susunya yakni pada binatang-binatang. Ternak itu secara khusus terdapat juga faedah yang banyak untuk manusia seperti daging darinya atas berkat Allah swt. manusia bisa makan dengan mudah dan bergizi (Shihab, 2002).

## 2. Tinjauan Al-Qur'an Tentang Mikroorganisme

Mikroorganisme merupakan salah ciptaan Allah swt. yang bermanfaat. Salah satu produknya adalah probiotik. Probiotik merupakan mikroorganisme yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan efisiensi pakan ternak tanpa mengakibatkan terjadinya proses penyerapan komponen probiotik dalam tubuh ternak (Kroger, 2011).

Dalam firman-Nya Allah swt. menjelaskan bahwa QS Al-nuur 24/45.

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ ۖ فَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ ۖ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ ۗ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٥﴾

Terjemahnya:

Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan dua kaki, sedang sebagian (yang lain) berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendaki. Sungguh, Allah Mahakuasa atas segala sesuatu (Kementrian Agama RI, 2012).

Menurut Shihab (2015), dalam kitabnya yang berjudul tafsir al-misbah menjelaskan bahwa tafsir ayat di atas yaitu; ayat di atas menegaskan bahwa : Dan, disamping bukti-bukti kekuasaan dan limpahan anugerah-Nya, Allah juga telah menciptakan semua jenis hewan dari air yang memancar sebagaimana Dia menciptakan tumbuhan dari air tercurah. Lalu Allah menjadikan hewan-hewan itu beraneka ragam jenis, potensi dan fungsinya, termasuk bakteri.

Ditinjau dari keilmuan sains maka bakteri merupakan salah satu ciptaan Allah yang juga memiliki fungsi. Maksud dari bakteri merupakan hewan dari jenis air karena salah satu habitat yang paling disukai oleh bakteri adalah air. Hal ini berkaitan dengan penggunaan tepung probiotik bagi ternak karena tepung probiotik merupakan pakan tambahan yang berasal dari bakteri. Betapa penciptaan binatang menunjukkan kekuasaan Allah sekaligus kehendak-Nya yang mutlak. Dari satu sisi, bahan penciptaannya sama yaitu air, tetapi air dijadikannya berbeda-beda, lalu dengan perbedaan itu Dia menciptakan makhluk yang memiliki potensi dan fungsi berbeda-beda pula yang sungguh berbeda dengan substansi serta kadar air yang merupakan bahan kejadiannya.

### **3. Hadist tentang Larangan Makan Secara Berlebihan**

Terdapat hadits yang disandarkan kepada Rasulullah saw. mengenai ada seorang muslim dalam makan, yaitu jangan berlebihan makan sampai kenyang yang membuat malas dan merusak kesehatan.

Hadits Rasulullah saw dalam riwayat HR At-Tirmidzi, Ahmad dan Ibnu Majah.

نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع

Artinya:

“Kita (kaum muslimin) adalah kaum yang hanya makan bila lapar dan berhenti makan sebelum kenyang“.

Maknanya dari hadist memang benar sebagaimana dikuatkan dengan hadits dan penjelasan ulama yang lainnya. Rasulullah saw bersabda,

ما ملأ آدمي وعاء شراً من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يُقمن صلبه، فإن كان لا محالة،  
لنفسه لث لطمعه، وثلاث لشرابه، وثلاث

Artinya:

“Tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk dari perut. Cukuplah bagi anak Adam memakan beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya. Namun jika ia harus (melebihinya), hendaknya sepertiga perutnya (diisi) untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk bernafas”.

Ditinjau dari hadist diatas pemberian pakan pada ternak hendaknya tidak berlebihan karena dapat berpengaruh terhadap kesehatan ternak. Pemberian pakan yang tepat sesuai kebutuhan nutrisi pada broiler akan meningkatkan pertumbuhan pada ternak itu sendiri.

## **B. Kajian Teoritis**

### **1. Ayam Broiler**

Broiler adalah strain ayam hibrida modern yang berjenis kelamin jantan dan betina yang dikembangbiakkan oleh perusahaan pembibitan khusus. Kata broiler berasal dari kata kerja ”to broil” (sate) yang sering disama artikan dengan makna bahasa Inggris Amerika yaitu ”to grill” (memanggang). Broiler adalah ayam muda yang berumur 6-9 minggu dengan jenis kelamin yang berbaur dalam

pemeliharaannya. Ciri-ciri broiler mempunyai tekstur kulit dan daging daging yang lembut, serta tulang dada merupakan tulang rawan yang fleksibel (Gordon dan Charles, 2002).

Menurut Gordon dan Charles (2002), ayam broiler adalah strain ayam hidrida modern yang berjenis kelamin jantan dan betina yang dikembangkan oleh perusahaan pembibitan khusus. Ayam broiler merupakan ayam pedaging tipe berat yang lebih muda dan berukuran lebih kecil, dapat tumbuh sangat cepat sehingga dapat dipanen pada umur 4-5 minggu. Pond et al., (2015) menyatakan bahwa broiler merupakan ayam muda yang dapat dipasarkan untuk dikonsumsi masyarakat pada umur 5 sampai 7 minggu baik dalam keadaan utuh atau potongan dalam beberapa bagian produk-produk yang telah diolah.

Kebutuhan nutrisi ayam broiler menurut National Reseach Council (1994), untuk kebutuhan protein umur 0-3 minggu, 3-6 minggu, dan 6-8 minggu berturut turut adalah 21%, 19% dan 18% per kg pakan pada tingkat energi metabolis 2988 kkal/kg dan bahan kering 90%. Kebutuhan nutrisi tiap ayam bergantung pada strain masing-masing (Ensminger, 2005). Ayam broiler umumnya dipanen pada umur sekitar 4-5 minggu dengan bobot badan antara 1,2-1,9 kg/ekor yang bertujuan sebagai sumber daging. Ciri-ciri ayam broiler mempunyai tekstur kulit dan daging yang lembut serta tulang dada yang merupakan tulang rawan yang fleksibel (Kartasudjana, 2005).

Persyaratan mutu bibit ayam broiler atau DOC (*Day Old Chick*) menurut Badan Standar Nasional Indonesia (2005), yaitu berat DOC per ekor minimal 37 gram dengan kondisi fisik sehat, kaki normal, dapat berdiri tegak, tampak segar

dan aktif, tidak dehidrasi, tidak ada kelainan bentuk dan tidak ada cacat fisik, sekitar pusar dan dubur kering serta pusar tertutup, warna bulu seragam sesuai dengan strain, kondisi bulu kering dan berkembang serta jaminan kematian DOC maksimal 2%. Menurut Soesanto (2002), pemilihan DOC dapat dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu keturunan, seleksi berdasarkan observasi penglihatan, dan rabaan atau sentuhan.

Pakan ayam broiler harus mengandung energi yang cukup untuk membantu reaksi-reaksi metabolik, pertumbuhan dan mempertahankan suhu tubuh. Selain itu, ayam membutuhkan protein yang seimbang, forfor, kalsium, mineral, dan vitamin (Wahju, 2004).

Menurut pendapat Abun (2011), klasifikasi ayam broiler yaitu sebagai berikut:

Filum : *Chordata*

Subfilum : *Vertebata*

Kelas : *Aves*

Ordo : *Galliformes*

Keluarga : *Phasianidae*

Genus : *Galus 7*

Spesies : *Gallus domesticus*

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha ayam broiler adalah pakan (feed), pembibitan (breeding), dan tata laksana (manajemen). Pakan memegang peran penting kerana tinggi atau rendahnya produksi ternak ditentukan oleh pakan. Dalam mengembangkan usaha ternak ayam broiler, pada umumnya peternak

memberikan pakan komersial karena pakan komersial telah memenuhi standar kebutuhan zat-zat makanan yang telah ditetapkan. Pakan komersial yang digunakan umumnya campuran dari beberapa jenis bahan baku seperti bahan sumber energi, lemak, vitamin, mineral, antibiotika, dan protein seperti protein hewani dan protein nabati, serta bahan lainnya yang diperlukan. Penggunaan protein dalam pakan diupayakan mendekati kebutuhan optimal untuk produksi dan tidak diberikan secara berlebihan karena harganya relatif mahal. Harga pakan komersial dipasaran adalah Rp. 5.140/kg, sementara harga pakan nabati adalah Rp. 3740/kg (Kartasudjana, 2005).

Kebutuhan nutrisi ayam broiler menurut National Reseach Council (1994), untuk kebutuhan protein umur 0-3 minggu, 3-6 minggu, dan 6-8 minggu berturut turut adalah 21%, 19% dan 18% per kg pakan pada tingkat energi metabolis 2988 kkal/kg dan bahan kering 90%. Kebutuhan nutrisi tiap ayam bergantung pada strain masing-masing (Ensminger, 1990). Kartasudjana (2005) menyatakan bahwa ayam broiler umumnya dipanen pada umur sekitar 4-5 minggu dengan bobot badan antara 1,2-1,9 kg/ekor yang bertujuan sebagai sumber daging. Ciri-ciri ayam broiler mempunyai tekstur kulit dan daging yang lembut serta tulang dada yang merupakan tulang rawan yang fleksibel.

Ayam broiler merupakan ayam yang memiliki ciri khas dengan tingkat pertumbuhan yang cepat sehingga dapat dipasarkan dalam waktu singkat. Ayam broiler sudah dapat dipasarkan dalam umur empat minggu dengan bobot badan sekitar 0,9-1,3 kg bahkan lebih. Ayam broiler jantan dan betina dipasarkan dengan bobot 1,8-2,1 kg dalam bentuk karkas atau potongan komersial karkas dan juga

dijual hidup (Cobb, 2008). Pertambahan bobot badan diperoleh dengan pengukuran kenaikan bobot badan dengan melakukan penimbangan berulang dalam waktu tertentu misalnya tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, atau tiap tahun (Sukaryana *et al.*, 2011).

Kebutuhan nutrisi pakan broiler berdasarkan Standar Nasional Indonesia diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Kebutuhan Nutrisi Pakan Broiler

Nutrisi Pakan	Periode Pemeliharaan	
	Starter	Finisher
Kadar air (%)	Maks. 14.0	Maks. 14.0
Protein Kasar (%)	Min. 19.0	Min. 18.0
Lemak Kasar (%)	Maks. 7.4	Maks. 8.0
Serat Kasar (%)	Maks. 6.0	Maks. 6.0
Abu (%)	Maks. 8.0	Maks. 8.0
Kalsium (P) (%)	0.90-1.20	0.90-1.20
Fosfor (P) (%)	0.60-1.00	0.60-1.00
Energi Metabolisme (EM) (kkal/kg)	Min. 2900	Min. 2900

Sumber: SNI (2006).

Faktor lain yang perlu diperhatikan dalam pemeliharaan antara lain kandang dan pencegahan penyakit. Kandang yang digunakan harus memiliki cukup ventilasi dan memiliki luas sesuai kapasitas broiler. Menurut Kartasudjana dan Suprijatna (2006), kapasitas pemeliharaan yang disarankan adalah sebanyak 11-12 ekor per meter persegi pada lokasi dataran tinggi dan 8-10 ekor per meter persegi pada lokasi dataran rendah.

Menurut Kartasudjana dan Suprijatna (2006), program pencegahan penyakit dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan sanitasi yang baik serta vaksinasi. Program pencegahan penyakit pada ayam broiler, diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2. Program Pencegahan Penyakit dalam Pemeliharaan Ayam Broiler

Umur (hari)	Vaksin/Obat	Teknik Pemberian	Tujuan
1-2	Hidrostress	Hidrostress	Mengurangi stress
1-6	Vaksin ND	Vaksin ND	Mencegah ND
3-5	Obat	Obat	Mencegah CRD, E.coli
6-8	Vitamin	Vitamin	Mengurangi stress
9-11	Terapi	Terapi	Mencegah Coccidiosis
12	Vaksin Gumboro	Vaksin Gumboro	Mencegah Gumboro
12-15	Hidrostress	Hidrostress	Mengurangi stress
16-17	Terapi	Terapi	Mencegah Coccidiosis
18-19	Hidrostress	Hidrostress	Mengurangi stress
21	Vaksin ND	Vaksin ND	Mencegah ND
22-23	Terapi	Terapi	Mencegah Coccidiosis
24-27	Hidrostress	Hidrostress	Mengurangi stress

Sumber: Kartasudjana dan Suprijatna (2006).

## 2. Serat Kasar

Serat kasar merupakan sisa-sisa sel tumbuhan yang tahan terhadap reaksi hidrolisis enzim-enzim saluran pencernaan. Komponen utama penyusun serat kasar adalah berupa karbohidrat. Karena kandungan nutrisi serat kasar tergolong rendah, oleh sebab itu biasanya digunakan sebagai campuran pakan dalam jumlah yang sedikit, sekitar 7% saja. Bahan yang mengandung serat kasar cukup tinggi antara lain: tepung alfafa, kulit kedelai, biji padi kering dan gandum. Sedangkan yang tergolong serat kasar rendah antara lain: beras giling, tepung tulang, jagung dan tepung ikan. Serat merupakan senyawa karbohidrat yang tidak dapat dicerna, fungsi utamanya untuk mengatur kerja usus. Faktor bahan pakan, khususnya serat selain menentukan kecernaan juga menentukan kecepatan aliran pakan

meninggalkan usus. Bahan pakan yang mengandung serat kasar tinggi sukar dicerna sehingga kecepatan alirannya rendah (Susanti dan Marhaeniyanto, 2007).

Serat kasar dapat memperbaiki penyerapan zat-zat makanan oleh usus dengan cara mengurangi populasi sel goblet pada usus dan penurunan jumlah lendir yang dihasilkan. Selain itu, cairan pakan yang berserat akan merangsang pertumbuhan mikroorganisme di dalam saluran pencernaan. Hal ini lebih jauh akan membantu proses metabolisme karbohidrat dan protein sekaligus mengatasi permasalahan fermentasi akibat kecilnya ukuran cecum. Pengaruh lainnya yaitu, serat kasar ternyata dapat membuat dinding saluran pencernaan menjadi lebih tebal dan lebih panjang (Sitompul dan martini, 2005).

Pemberian serat kasar dalam waktu yang lama dengan jumlah yang moderat, berpengaruh positif terhadap penyerapan mineral makanan. Efek ini bervariasi diantara serat kasar yang digunakan. Pemakaian gandum dalam pakan akan meningkatkan retensi sodium dan potasium, namun hal tersebut tidak terjadi jika menggunakan tepung alfafa atau kulit kedelai. Retensi copper akan ditingkatkan oleh pemakaian kulit kedelai dan tidak oleh tepung alfafa maupun kulit gandum. Sedangkan pengaruh ketiga bahan tersebut terhadap retensi besi adalah sama (Wahju, 2004).

Serat kasar pada ayam broiler dapat menurunkan kejadian kanibalisme. Pemberian serat kasar pada pakan dengan tingkat 8%, 13% dan 18% masing masing menunjukkan skor patukan tubuh 0,6, 0,1 dan 0,0, sedangkan persentase patukan pada tubuh masing-masing menunjukkan angka 41,7 dan 0 and/krm. Jumlah serat kasar pada pakan biasanya didasarkan atas feed intake (jumlah pakan

yang dikonsumsi). Sedangkan feed intake sendiri akan dipengaruhi oleh palatabilitas (rasa enak) pakan yang dikonsumsi. Ayam memiliki keterbatasan untuk mencerna serat kasar karena struktur anatomi saluran pencernaannya. Selama kurang lebih 4 jam, pakan berada dalam saluran pencernaan. Oleh karena itu tidak ada kesempatan yang cukup bagi bakteri untuk mencerna serat kasar. Koefisien pencernaan serat kasar pada ayam sekitar 5-20%. Atas dasar tersebut, maka besarnya campuran serat kasar dalam ransum unggas sangat dibatasi, yaitu sekitar 7%. Akan tetapi jika ditingkatkan menjadi 8-10% tidak mempengaruhi produktivitas ayam (Sitompul dan martini, 2005).

Serat kasar terdiri dari selulosa, hemiselulosa dan lignin yang sebagian besar tidak dapat dicerna unggas dan bersifat sebagai pengganjal atau bulky (Wahju, 2004). Serat kasar dapat membantu gerak peristaltik usus, mencegah penggumpalan ransum dan mempercepat laju digesta (Anggorodi, 1995).

Kadar serat kasar yang terlalu tinggi, pencernaan nutrisi akan semakin lama dan nilai energi produktifnya semakin rendah (Tillman *et al.*, 1998). Serat kasar yang tinggi menyebabkan unggas merasa kenyang, sehingga dapat menurunkan konsumsi karena serat kasar bersifat voluminous (Amrullah, 2003). Ransum yang tinggi kandungan serat kasarnya menyebabkan kurang palatable, sehingga menghasilkan konsumsi yang rendah. Pencernaan serat kasar di unggas terjadi pada caecum dengan bantuan mikroorganisme yang disebabkan unggas tidak memiliki enzim selulase yang dapat memecah serat kasar (Wahju, 2004). Pencernaan serat kasar pada unggas yang terjadi di sekum mencapai 20-30% (Suprijatna, 2010).

Peran utama dari serat dalam makanan adalah pada kemampuannya mengikat air, selulosa dan pektin. Dengan adanya serat, membantu mempercepat sisa-sisa makanan melalui saluran pencernaan untuk disekresikan keluar. Tanpa bantuan serat, feses dengan kandungan air rendah akan lebih lama tinggal dalam saluran usus dan mengalami kesukaran melalui usus untuk dapat diekskresikan keluar karena gerakan-gerakan peristaltik usus besar menjadi lebih lamban. Istilah dari serat makanan (dietary fiber) harus dibedakan dengan istilah serat kasar (crude fiber) yang biasa digunakan dalam analisa proksimat bahan pangan. Serat kasar adalah bagian dari pangan yang tidak dapat dihidrolisis oleh bahan-bahan kimia yang digunakan untuk menentukan kadar serat kasar yaitu asam sulfat ( $H_2SO_4$  1,25%) dan natrium hidroksida (NaOH 3,25%). Sedangkan serat makanan adalah bagian dari bahan yang tidak dapat dihidrolisis oleh enzim-enzim pencernaan (Hernawati, 2010).

Serat kasar berperan baik pada ternak baik itu ternak ruminansia maupun monogastrik, tingkat serat kasar dalam ransum sangat berpengaruh terhadap performa dan pertumbuhan ternak. Serat kasar dibutuhkan ternak untuk merangsang gerakan saluran pencernaan, pada ternak ruminansia serat kasar digunakan sebagai sumber energi tetapi pada unggas pemanfaatannya sangat terbatas. Kekurangan serat pada pakan unggas dapat menyebabkan gangguan pencernaan, tetapi jumlah serat kasar berlebihan juga dapat menurunkan kecernaan pakan (Suparjo, 2010).

Kebutuhan serat pakan pada beberapa jenis unggas berbeda-beda tergantung jenisnya, puyuh maksimal 7%, itik maksimal 8 % sedangkan ayam

pedaging maksimal 6% (BSNI, 2006). Banyak penelitian yang telah dilakukan untuk menggambarkan peranan serat kasar dalam ransum terhadap unggas, seperti efek toksikologi, efek probiotik dan efisiensi pakan. Unggas khususnya broiler memiliki kemampuan yang rendah dalam memanfaatkan serat kasar tetapi tetap membutuhkannya dalam jumlah kecil serta dapat mempengaruhi histologi saluran pencernaan (Sitompul dan Martini, 2005).

Efisiensi penggunaan energi metabolis untuk mendeposit lemak, menurun dengan meningkatnya kandungan serat kasar di dalam ransum. Metode ini menggunakan teknik pembunuhan ayam percobaan, melalui koleksi sampel feses dari usus besarnya, sedangkan kandang dan pemilihan sama seperti koleksi sampel untuk menentukan nilai letensi nitrogen dan energi metabolis pakan. Teknik ini menggunakan indikator internal sebagai pembanding yaitu legnin (Maynard dan Loosly, 2005).

Serat kasar merupakan bagian dari karbohidrat dan didefinisikan sebagai fraksi yang tersisa setelah didigesti dengan larutan asam sulfat standar dan sodium hidroksida pada kondisi yang terkontrol (Suparjo, 2010). Serat kasar ditentukan dengan cara mendidihkan sisa makanan dari ekstraksi eter secara bergantian dengan asam dan alkali dengan konsentrasi tertentu; sisa bahan organiknya merupakan serat kasar (Hernawati, 2010).

Serat ataupun senyawa-senyawa yang termasuk dalam serat mempunyai sifat kimia yang tidak larut dalam air, asam atau basa meskipun dengan pemanasan atau hidrolisis (Sitompul dan Martini, 2005). Serat kasar (SK) / Crude

fiber (CF) adalah Bagian karbohidrat yang tidak larut setelah pemasakan berturut-turut (Tim Laboratorium IPB, 2013).

Kandungan nutrisi pakan dapat diketahui dengan menganalisis komponen pakan secara kimia. Teknik analisis yang umum untuk mengetahui kadar nutrisi dalam pakan adalah analisis proksimat. Analisis proksimat merupakan metode analisis untuk mengidentifikasi kandungan nutrisi seperti protein, karbohidrat, lemak, dan serat pada suatu zat makanan dari bahan pakan atau pangan. Dengan analisa proksimat komponen-komponen fraksi serat tidak dapat tergambarkan secara terperinci berdasarkan manfaatnya dan pencernaan pada ternak. Untuk dapat menyempurnakannya, komponen-komponen serat dapat dianalisa secara terperinci dengan menggunakan analisa Van Soest (Suparjo, 2010).

Metode proksimat menggambarkan bahwa analisis dapat dilakukan terhadap kadar air, abu, lemak atau ether ekstrak, nitrogen total, dan kadar serat. Komponen bahan ekstrak tanpa nitrogen adalah hasil pengurangan bahan kering dengan komponen, abu, lemak, nitrogen total, dan serat. Komponen lemak, protein, dan serat sering disebut lemak kasar, protein kasar, dan serat kasar. Metode analisis proksimat menghasilkan komponen nutrisi yang masih campuran (Hernawati, 2010).

### **3. Daya Cerna**

Konsumsi pakan sangat erat kaitannya dengan laju pertumbuhan yang pada akhirnya akan berhubungan dengan besarnya penyerapan kandungan nutrisi dari pakan oleh tubuh. Nutrisi yang tercerna didefinisikan sebagai proporsi yang tidak diekskresikan dalam feses atau diasumsikan dapat diabsorpsi oleh hewan.

Kecernaan dapat diartikan banyaknya atau jumlah proporsional zat-zat makanan yang ditahan atau diserap oleh tubuh. Zat makanan yang terdapat dalam feses dianggap zat makanan yang tidak tercerna dan tidak diperlukan kembali. Kecernaan suatu bahan pakan merupakan pencerminan dari tinggi rendahnya nilai manfaat dari bahan pakan tersebut. Apabila kecernaannya rendah maka nilai manfaatnya rendah pula ataupun sebaliknya apabila kecernaannya tinggi maka nilai manfaatnya tinggi pula (Sukaryana *et al*, 2011).

Menurut pendapat Mc Donald *et al.*, (1995), menyatakan kecernaan atau daya cerna merupakan bagian dari nutrient pakan yang tidak diekskresikan dalam feses dan yang diasumsikan sebagai bagian yang diabsorpsi oleh ternak. Kecernaan pakan dipengaruhi oleh komposisi kimia pakan, dan fraksi pakan berserat berpengaruh besar pada kecernaan. Kecernaan dipengaruhi oleh jumlah serta kandungan nutrient yang dikonsumsi oleh ternak tersebut. Besarnya kecernaan menentukan banyaknya nutrient yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok dan pertumbuhan.

Selain itu, Kecernaan dapat dipengaruhi oleh tingkat pemberian pakan, spesies hewan, kandungan lignin bahan pakan, defisiensi zat makanan, pengolahan bahan pakan, pengaruh gabungan bahan pakan, dan gangguan saluran pencernaan. Daya cerna dipengaruhi juga oleh suhu, laju perjalanan makanan melalui alat pencernaan, bentuk fisik bahan makanan, komposisi ransum, dan pengaruh terhadap perbandingan dari zat makanan lainnya, jenis kelamin, umur dan strain, meskipun tidak konsisten (Sukaryana dkk., 2011).

Kecernaan bahan pakan memiliki hubungan negatif dengan kandungan serat kasar dari bahan pakan tersebut. Semakin rendah serat kasar maka semakin tinggi kecernaan ransum (Despal, 2000). Tillman dkk (2001), menyatakan bahwa kecernaan serat kasar tergantung pada kandungan serat kasar dalam ransum dan jumlah serat kasar yang dikonsumsi. Kadar serat kasar terlalu tinggi dapat mengganggu pencernaan zat lain. Daya cerna serat kasar dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kadar serat dalam pakan, komposisi penyusun serat kasar dan aktivitas mikroorganisme (Maynard et al., 2005).

Berbagai macam cara dapat dilakukan untuk meningkatkan kecernaan bahan pakan ternak, baik sebelum dikonsumsi maupun selama dalam saluran pencernaan, hal ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas ternak. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan probiotik (Hafsah, 2003). Effective Microorganisms-4 (EM-4) adalah salah satu jenis probiotik yang merupakan kultur campuran dari mikroorganisme yang menguntungkan bagi pertumbuhan tanaman dan ternak yang dapat digunakan sebagai inokulan untuk meningkatkan keragaman dan populasi mikroorganisme (Anggorodi, 1995).

Ransum merupakan campuran bahan ransum yang disusun untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ternak selama 24 jam untuk mendapatkan produksi yang optimal (Suprijatna *et al.*, 2005). Komponen nutrisi yang harus diperhatikan untuk pemenuhan kebutuhan ayam Arab antara lain energi metabolis (EM), karbohidrat, protein kasar (PK), serat kasar (SK), lemak kasar (LK), vitamin, mineral dan air (Amrullah, 2003). Nutrisi yang dibutuhkan ternak tergantung pada variasi genetik, umur, bobot badan, aktivitas, kandungan energi ransum dan

temperatur lingkungan (Wahju, 2004). Kecernaan ransum dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk menilai suatu bahan ransum (Abun, 2008). Kecernaan ransum dipengaruhi oleh jenis ternak, jenis bahan ransum, jumlah ransum dan kandungan nutrien (Lubis, 1992). Faktor lain yang mempengaruhi kecernaan adalah suhu, laju perjalanan ransum melalui pencernaan, bentuk fisik dari bahan ransum dan komposisi ransumnya (Anggorodi, 1995).

Pengukuran kecernaan dapat dilakukan secara *in vitro* dan *in vivo*. Pengukuran kecernaan secara *in vitro* dilakukan dengan membuat suasana seperti yang terjadi dalam saluran pencernaan ternak di laboratorium (Williamson dan Payne, 1993). Pengukuran secara *in vivo* terdiri dari 2 periode yaitu periode pendahuluan dan periode total koleksi. Periode pendahuluan digunakan untuk membiasakan ternak dengan ransum perlakuan dan kondisi lingkungan yang baru serta menghilangkan sisa ransum waktu sebelumnya. Periode total koleksi adalah periode pengumpulan ekskreta sampai akhir percobaan yang kemudian dikeringkan dan dianalisis (Tillman et al., 1998). Jalur pengeluaran feses dan urin pada unggas menjadi satu sehingga koleksi feses dan urin dilakukan secara bersamaan sebagai koleksi ekskreta. Pengukuran kecernaan pada unggas dapat ditambahkan suatu indikator ke dalam ransum. Metode indikator merupakan pengukuran kecernaan dengan menggunakan senyawa yang tidak dapat dicerna oleh saluran pencernaan unggas seperti krom oksida, methylene blue, karmine dan barium sulfat yang ditambah ke dalam ransum (Wahju, 2004).

Laju digesta merupakan aliran digesta melalui saluran pencernaan. Laju digesta pada unggas relatif lebih cepat karena saluran pencernaan unggas pendek

(Anggorodi, 1995). Laju digesta dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain jenis ternak, umur ternak, temperatur lingkungan dan serat kasar ransum. Lama ransum berada dalam saluran pencernaan ternak unggas berlangsung  $\pm 4$  jam (Agus, 2007). Komposisi ransum terutama kandungan serat kasar berpengaruh terhadap laju digesta (Amerah *et al.*, 2007). Semakin tinggi kandungan serat kasar akan mempercepat laju digesta, semakin cepat laju digesta maka semakin singkat proses pencernaan dalam saluran pencernaan. Laju ransum terlalu singkat mengakibatkan kurangnya waktu tersedia bagi enzim pencernaan untuk mendegradasi nutrisi secara menyeluruh, sehingga menyebabkan kecernaan protein menurun (Tillman *et al.*, 1998).

#### **4. Probiotik**

Penggunaan aditif pakan alternatif pengganti antibiotik berfungsi untuk mengatasi permasalahan residu pada bahan pangan hewani dan mengurangi resistensi mikroorganisme. Fungsi lainnya adalah meminimalkan respon tanggap kebal yang memproduksi beragam senyawa bersifat toksik yang secara alami dipakai untuk menanggulangi invasi mikroorganisme. Senyawa-senyawa toksik dapat pula mencederai sel-sel yang sehat, sehingga sel otot daging dapat mengalami degradasi (Murwani, 2003).

Probiotik adalah suatu bahan pakan tambahan yang mengandung mikrobia hidup yang digunakan untuk mengatur keseimbangan mikrobia dalam saluran pencernaan. Penggunaan probiotik bukan merupakan hal yang baru dalam dunia peternakan. Fungsi zat aditif ini tidak jauh berbeda dengan fungsi utama antibiotik yaitu mengatur komposisi mikrobia dengan menekan mikroorganisme patogen

dalam saluran pencernaan, meningkatkan tanggap kebal terhadap serangan penyakit dan mempunyai efek nutrisi (Revington, 2002).

Probiotik merupakan sel mikroorganisme (mikroba) hidup maupun hasil metabolitnya yang memiliki banyak manfaat untuk makhluk hidup. Menurut regulasi Uni Eropa (EC Regulation) No.1831/2003 tentang penggunaan bahan aditif pada ternak, probiotik digolongkan sebagai bahan aditif pakan kelompok fungsional 4 (b) sebagai “gut flora stabilizer” (Mikulski et al., 2012). Tamimi (2005), mendefinisikan probiotik sebagai mikroba hidup yang secara aktif dapat meningkatkan kesehatan dengan cara menjaga keseimbangan flora saluran pencernaan. Probiotik dalam ransum ternak dibagi menjadi 3 kelompok utama yaitu bakteri asam laktat, spora dan ragi.

Penggunaan probiotik pada ternak sangat luas. Untuk ternak unggas, manfaat probiotik diantaranya untuk meningkatkan pencernaan pakan, mengurangi jumlah mikroba patogen di saluran pencernaan sehingga dapat menjaga kesehatan ternak, meningkatkan daya tahan tubuh, serta membantu pertumbuhan (Ehrmann et al., 2002). Penambahan mikroba hidup ke dalam pakan dapat merangsang sistem kekebalan tubuh ternak serta meningkatkan daya tahan tubuh non spesifik. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa probiotik dapat memperbaiki konversi pakan, menurunkan kematian serta menghambat menempelnya patogen seperti *Escherichia coli* di usus (Toms dan Powrie, 2001).

a. Jenis-jenis Mikroba Probiotik.

1) *Enterococcus sp.*

Probiotik strain *Enterococcus faecalis* merupakan bakteri dengan karakteristik gram positif dan berbentuk kokus genus bakteri ini kurang dikenal karena hanya memiliki kurang dari 20 spesies. Bakteri gram positif dengan sel berbentuk seperti telur dalam bentuk tunggal, berpasangan atau rantai pendek dan tidak membentuk spora. Strain bakteri yang paling sering digunakan adalah *Enterococcus faecalis*. Pertumbuhan optimal pada suhu 35-37°C dan kebanyakan spesies dapat tumbuh pada suhu 42-45°C. bakteri ini bersifat homofermentatif yang mengubah glukosa seluruhnya menjadi asam laktat. Genus *Enterococcus* termasuk dalam kelompok mikroorganisme dikenal sebagai Bakteri Asam laktat (BAL) (De Vos, et al., 2009).

Stain yang digunakan sebagai probiotik untuk manusia telah terisolasi dari saluran pencernaan manusia dan biasanya termasuk special general *Lactobacillus* dan *Bifidobacterium*. Namun, strain milik spesies BAL lainnya, diantaranya *Enterococci*, telah digunakan di masa lalu sebagai probiotik juga, seperti *E. faecium*, *E. faecalis*, *S. thermophiles*, *Leuconostoc mesenteroides*, *Propionin bacterium freudenreichii*, *Pediococcus acidilactici*, *Spora lactobacillus inulinus*, *Bacillus cereus* dan ragi *Saccharomyces cerevisiae*. Meskipun jenis *E. faecium* dan *E. faecalis* telah diaplikasikan pada manusia, suplemen probiotik, strain *E. faecalis* juga ada dan telah banyak digunakan sebagai suplemen pakan hewan (Fuller, 1989).

Strain *Enterococci* kebanyakan digunakan sebagai nutrisi untuk babi dan unggas. Namun, tersedia pula produk farmasi yang mengandung *Enterococcus* sebagai probiotik bagi manusia dalam terapi klinis. Genus *Enterococcus* memiliki spesies yang berbeda-beda tetapi hanya dua dari mereka yang penting sebagai probiotik yaitu *Enterococcus faecium* diaplikasikan pada manusia dan hewan sementara *Enterococcus faecalis* terutama digunakan sebagai probiotik untuk manusia (Badrinon, 2010). *Enterococci* terdistribusikan secara luas pada lingkungan, terutama pada sistem saluran pencernaan manusia dan hewan. *Enterococci faecalis* sering mendominasi spesies di usus manusia, meski pada beberapa individu dan di beberapa negara *E. faecium* melebihi *E. Faecalis*. Namun, kehadiran umum *E. faecalis* pada banyak produk makanan tidak selalu berhubungan dengan kontaminasi feses (tinja) secara langsung. Pada tahun 1992, Uni Eropa menetapkan tingkat maksimum untuk kehadiran Coliform dan *Escherichia coli*, keduanya dianggap sebagai indikator kebersihan, sementara tidak ada batas yang ditetapkan untuk *Enterococci*.

Selanjutnya, telah ditunjukkan bahwa *Enterococci* memiliki nilai yang kecil sebagai indikator kesehatan dalam industri pengolahan makanan. Meskipun *E. faecalis*, *E. faecium* dan *E. Durans* sering terisolasi dari kotoran manusia, bakteri ini jauh lebih sedikit pada ternak, seperti babi, sapi, dan domba (Fuller, 1989).

2) *Bacillus sp.*

*Bacillus* merupakan bakteri gram positif, berbentuk batang, beberapa spesies bersifat aerob obligat dan bersifat anaerobik fakultatif dan memiliki *endospore* sebagai struktur bertahan saat kondisi lingkungan tidak mendukung (Backman *et al.*, 1994).

Menurut Bergey's Manual of Determinative Bacteriology, 8 th editions dalam Hadioetomo (1985), yang menyatakan bahwa klasifikasi *Bacillus sp.* adalah sebagai berikut:

Kingdom : *Procaryotae*

Divisi : *Bacteria*

Kelas : *Schizomycetes*

Bangsa : *Eubacteriales*

Suku : *Bacillaceae*

Marga : *Bacillus*

Jenis : *Bacillus sp.*

*Bacillus* mempunyai sifat yang lebih menguntungkan dari pada mikroorganisme lain karena dapat bertahan hidup dalam waktu yang lama pada kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan untuk pertumbuhannya (Wong, 1994). Spesies dari jenis *Bacillus* juga berbeda dalam sifat pertumbuhannya. Beberapa bersifat mesofilik misalnya *Bacillus subtilis* yang lainnya bersifat termofilik fakultatif misalnya *Bacillus coagulans* atau termofilik pada *Bacillus stearothermophilus* sering menyebabkan kerusakan pada makanan kaleng.

Sebanyak 22 spesies *Bacillus* telah diidentifikasi diantaranya banyak ditemukan pada makanan. Beberapa kelompok bakteri ini menghasilkan metabolit sekunder yang dapat menekan pertumbuhan patogen. Bakteri *Bacillus* merupakan mikroba flora normal pada saluran pencernaan ayam. Terdapat beberapa jenis bakteri yang bersifat saprofit pada tanah, air, udara dan tumbuhan, seperti *Bacillus cereus* dan *Bacillus subtilis* (Backman *et al.*, 1994).

Jenis-jenis *Bacillus* yang ditemukan pada saluran pencernaan ayam yaitu *Bacillus subtilis*, *Bacillus pumilus*, *Bacillus licheniformis*, *Bacillus clausii*, *Bacillus megaterium*, *Bacillus firmus* dan kelompok *Bacillus cereus* (Backman *et al.*, 1994).

*Bacillus* memiliki beberapa sifat yaitu, bersifat aerob fakultatif sehingga diharapkan mampu hidup dan berkembang dalam usus ternak, berspora sehingga penyimpanannya lebih sederhana, dan tetap viable pada saat proses pembuatan pakan, menghasilkan enzim pencernaan seperti protease dan amilase yang dapat membantu pencernaan, serta memproduksi asam-asam lemak rantai pendek yang mempunyai sifat anti mikroba (Kompiang, 2009).

Genus *Bacillus* digunakan sebagai agen biokontrol secara luas, menghasilkan zat antimikroba berupa *Bakteriosin*. *Bakteriosin* adalah zat antimikroba polipeptida atau protein yang diproduksi oleh mikroorganisme yang bersifat bakterisida. *Bakteriosin* membunuh sel targetnya dengan menyisip pada membran target dan mengakibatkan fungsi membran sel

menjadi tidak stabil sehingga menyebabkan sel lisis. *Bacillus sp.* juga diketahui menghasilkan spora dan enzim kitinase yang mampu menghambat pertumbuhan jamur patogen yaitu *Aspergillus sp.* *Bacillus* juga menghasilkan enzim yang banyak digunakan dalam industri (Kompang, 2009). Widyasti (2003), melaporkan *Bacillus sp.* penghasil enzim  $\alpha$ -amilase yang banyak digunakan dalam industri untuk menghidrolisis ikatan  $\alpha$ -1,4 glikosidik pati, glikogen dan substrat sejenisnya. *Bacillus hermotoglucoosidasius* AF-01 memproduksi parsial protease alkali yang memiliki sifat proteolitik yang cukup tinggi banyak digunakan pada industri detergen dan makanan.

Berdasarkan penelitian Sofyan (2003), jumlah *Bacillus* dalam tembolok mencapai  $3,2 \times 10^8$  coloni forming unit (cfu)/ml, dalam ampela menurun menjadi  $2,8 \times 10^7$  coloni forming unit (cfu)/ml, kemudian dalam usus halus meningkat menjadi  $8,2 \times 10^9$  coloni forming unit (cfu)/ml, dalam cloaca menurun menjadi  $5,7 \times 10^7$  coloni forming unit (cfu)/ml, dan dalam feses menurun lagi menjadi  $2,4 \times 10^4$  coloni forming unit (cfu)/ml. Dari observasi ini dapat diketahui bahwa *Bacillus* mampu berkembang dalam saluran pencernaan ayam sehingga memenuhi salah satu kriteria sebagai probiotik.

### 3) *Lactobacillus sp.*

*Lactobacillus* adalah golongan bakteri penghasil asam laktat, termasuk bakteri gram positif, fakultatif anaerob dan mikroaerofil. Keberadaan bakteri *Lactobacillus* merupakan indikasi lingkungan yang sehat, karena bakteri ini merupakan mikroflora normal dalam lingkungan dan saluran pencernaan

mahluk hidup baik didarat maupun diair. Kemampuan metabolisme *Lactobacillus* untuk menghasilkan asam laktat dan peroksidase merupakan cara efektif bakteri ini dalam menghambat berbagai macam mikroba patogen penyebab penyakit. Sehingga bakteri *Lactobacillus* banyak dimanfaatkan sebagai probiotik yang dapat diaplikasikan langsung pada lingkungan maupun sebagai campuran pada pakan (Hadioetomo, 1985).

Menurut Hadioetomo (1985), yang menyatakan bahwa klasifikasi dari *Lactobacillus* yaitu sebagai berikut:

Kerajaan : *Bacteria*  
Divisi : *Firmicutes*  
Kelas : *Bacilli*  
Ordo : *Lactobacillales*  
Famili : *Lactobacillaceae*  
Genus : *Lactobacillus*

Kebanyakan dari bakteri ini umum dan tidak berbahaya bagi kesehatan. Dalam manusia, bakteri ini dapat ditemukan di dalam vagina dan sistem pencernaan, di mana mereka bersimbiosis dan merupakan sebagian kecil dari flora usus. Banyak spesies dari *Lactobacillus* memiliki kemampuan membusukkan materi tanaman yang sangat baik. Produksi asam laktatnya membuat lingkungannya bersifat asam dan mengganggu pertumbuhan beberapa bakteri merugikan. Beberapa anggota genus ini telah memiliki genom sendiri. *Lactobacillus* termasuk golongan bakteri asam laktat yang

sering dijumpai pada makanan fermentasi, produk olahan ikan, daging, susu, dan buah-buahan (Bidura dan Suastina 2002).

Secara umum manfaat penambahan probiotik adalah membantu sistim pencernaan unggas, agar lebih mudah mencerna dan meningkatkan kapasitas daya cerna sehingga diperoleh zat pakan yang lebih banyak untuk pertumbuhan maupun produksi. Pada dasarnya ada dua tujuan utama dari penggunaan probiotik pada unggas, yaitu untuk manipulasi mikroorganisme saluran pencernaan bagian anterior (crop, gizzard, dan usus halus) dengan menempatkan mikroflora dari strain *Lactobacillus sp.* untuk meningkatkan daya tahan ternak dari infeksi *Salmonella*. Menurut mekanisme kerja probiotik pada saluran pencernaan ternak unggas adalah menetralkan racun, menekan populasi bakteri tertentu yang tidak dikehendaki sebagai anti bakteri atau berkompetisi di dalam saluran pencernaan, dan meningkatkan kekebalan tubuh (Bidura dan Suastina 2002).

Suplementasi probiotik dalam ransum ternyata dapat meningkatkan berat karkas dan persentase daging karkas serta dapat menurunkan jumlah lemak subkutan termasuk kulit. Penggunaan probiotik dalam ransum meningkatkan kandungan lysine analogue dan aminoethyl cysteine dalam saluran pencernaan yang diubah menjadi asam amino lisin dan sistein dan dapat meningkatkan retensi protein yang berperan dalam pembentukan daging (Abun, 2008). Soeharsono (2010), menyatakan bahwa penambahan probiotik dalam ransum yang diberikan pada ternak dapat menurunkan kadar lemak dan kolesterol.

## b. Mekanisme Kerja Probiotik

Mekanisme kerja dari probiotik antara lain adalah menghasilkan asam, Mekanisme kerja probiotik cukup beragam. Mikroba patogen sangat aktif merombak zat-zat yang terdapat pada kolon guna menghasilkan metabolit toksik, karsinogenik, atau metanogenik yang berasal dari bahan beracun, obat-obatan, steroid ataupun metabolit dari bahan pakan. Pada hewan yang peka, metabolit tersebut sering menyebabkan kerusakan mukosa usus, bahkan dapat menyebabkan terbentuknya tumor atau penyakit lain sehingga metabolit toksik tersebut harus dibuang (Abun, 2008).

Menurut Budiansyah (2004), mekanisme kerja dari probiotik ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1) Melekat atau menempel dan berkolonisasi dalam saluran pencernaan

Kemampuan probiotik untuk bertahan hidup dalam saluran pencernaan dan menempel pada sel-sel usus merupakan tahap pertama untuk kolonisasi dan selanjutnya memodifikasi sistem kekebalan hewan inang. Kemampuan menempel yang kuat pada sel-sel usus ini akan menyebabkan mikroba probiotik berkembang dengan baik dan mikroba patogen tereduksi dari sel-sel usus inang sehingga pertumbuhan dari mikroba patogen dapat terhambat.

### 2) Kompetisi untuk memperoleh makanan dan memproduksi zat antimikroba

Mikroba probiotik menghambat organisme patogen dengan berkompetisi untuk mendapatkan sejumlah substrat bahan makanan untuk difermentasi. Substrat makanan tersebut diperlukan agar mikroba probiotik

dapat berkembang dengan baik. Substrat bahan makanan yang mendukung perkembangan mikroba probiotik dalam saluran pencernaan disebut prebiotik. Prebiotik ini adalah terdiri dari bahan-bahan makanan yang pada umumnya banyak mengandung serat.

Sejumlah mikroba probiotik menghasilkan senyawa atau zat-zat yang diperlukan untuk membantu proses pencernaan substrat bahan makanan tertentu dalam saluran pencernaan yaitu enzim. Mikroba probiotik penghasil asam laktat menghasilkan enzim selulase yang membantu proses pencernaan. Enzim ini mampu memecah serat kasar yang merupakan komponen yang sulit dicerna dalam saluran pencernaan unggas. Pakan ternak unggas umumnya mengandung serat kasar tinggi. Penggunaan probiotik menghasilkan enzim selulase mampu memanfaatkan makanan berserat kasar tinggi dalam proses pencernaan sehingga serat kasar dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan jaringan dan peningkatan berat badan ternak unggas.

### 3) Stimulasi mukosa dan meningkatkan sistem kekebalan hewan inang

Kemampuan mikroba probiotik mengeluarkan toksin yang menghambat perkembangan mikroba patogen dalam saluran pencernaan, merupakan suatu kondisi yang dapat meningkatkan kekebalan hewan inang. Toksin-toksin yang dihasilkan tersebut merupakan antibiotika bagi mikroba-mikroba patogen, sehingga penyakit yang ditimbulkan oleh mikroba patogen tersebut berkurang.

Prinsip kerja probiotik yaitu memanfaatkan kemampuan mikroorganisme dalam menguraikan rantai panjang karbohidrat, protein dan lemak. Kemampuan ini diperoleh karena adanya enzim-enzim khusus yang dimiliki mikroorganisme untuk memecah ikatan. Pemecahan molekul kompleks menjadi molekul sederhana mempermudah penyerapan oleh saluran pencernaan manusia maupun hewan. Di sisi lain, mikroorganisme pemecah ini mendapat keuntungan berupa energi dari hasil perombakan molekul kompleks (Medicinus, 2009).

Probiotik memiliki peranan dalam menetralkan toksin yang dihasilkan oleh bakteri-bakteri patogen, serta menghambat pertumbuhan dari bakteri patogen tersebut dengan cara mencegah kolonisasinya pada dinding usus halus. Probiotik mampu mendesak mikroba non-indigenous (patogen) keluar dari ekosistem saluran pencernaan dan mengambil lokasi mikroba patogen tersebut. Selain itu, probiotik juga mampu mempengaruhi aktivitas enzim pada usus halus, mengasimilasi kolesterol, serta meningkatkan pertumbuhan dan kinerja ternak. Bahkan probiotik dapat juga dimanfaatkan untuk mencegah pertumbuhan mikroba lain karena kemampuannya menghasilkan senyawa antibakteri yang disebut sebagai bakteriosin (Fuller, 2015).

Ashayerizadeh et al (2009), menyatakan bahwa *Lactobacillus* merupakan salah satu spesies probiotik yang banyak digunakan pada ayam broiler selain *Streptococcus*, *Bacillus*, *Bifidobacterium*, *Enterococcus*, *Aspergillus*, *Candida*, dan *Saccharomyces*. Zhang et al (2003), menambahkan bahwa *Lactobacillus* yang dinonaktifkan dengan panas dapat memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan imunitas sel tubuh ayam broiler.

Menurut Sari *et al.*, (2013), *Lactobacillus* merupakan mikroba utama yang terdapat dalam saluran pencernaan ayam broiler. Didalam saluran pencernaan, mikroba tersebut mampu menghasilkan asam laktat dan asam asetat yang membuat pH di sekitarnya berkisar antara 4-5. Namun, bakteri asam laktat tersebut mampu tumbuh pada suasana asam tanpa adanya oksigen. Bakteri asam laktat, terutama *Lactobacillus*, sangat bervariasi (lebih dari 150 spesies) dengan aktifitas katabolik yang berbeda. Boguta *et al.*, (2014), mengingat pentingnya peranan bakteri asam laktat ini, isolasi telah dilakukan dari berbagai sumber baik baik dari saluran pencernaan manusia sampai tanah maupun sisa-sisa hasil pembusukan tanaman.

Jenis ragi seperti *Saccharomyces cereviceae* (Sc) adalah probiotik yang telah diproduksi secara komersial. Efek nutrisi Sc sebagai probiotik yaitu dengan dihasilkannya enzim protease dan amilase serta sumber vitamin B. *Saccharomyces cereviceae* selain berfungsi sebagai probiotik juga dapat berperan mengikat Zn anorganik menjadi Zn organik. Mineral seng (Zn) merupakan mineral esensial untuk semua ternak termasuk manusia dan berperan penting dalam proses fisiologi. Mineral seng terdistribusi 75–85% di eritrosit, 12–22% di plasma dan 3% di lekosit. Sepertiga Zn plasma berikatan dengan albumin serum, berikatan dengan globulin dan fraksi kecil dengan kompleks histidin dan sistein (Samadi, 2004).

Meski jumlah bakteri probiotik melimpah dalam saluran pencernaan, probiotik tidak membahayakan, bahkan sebaliknya. Karena probiotik tidak memakan sel-sel dinding pencernaan, baik yang masih hidup maupun sel yang

sudah mati. Probiotik hanya memakan zat makanan yang tidak bisa dicerna seperti inulin. Tidak hanya sekedar tidak mengganggu, keberadaan probiotik ternyata menghadirkan manfaat besar bagi manusia maupun hewan. Pasalnya, probiotik mampu mencegah munculnya infeksi pada saluran pencernaan, terutama yang disebabkan bakteri jahat. Tidak seperti probiotik, bakteri jahat memang potensial merugikan manusia maupun hewan. Ini disebabkan bakteri jahat hidupnya dengan cara memakan sel dinding pencernaan yang mati maupun masih hidup. Akibatnya, dinding saluran pencernaan bisa terinfeksi dan bocor (Samadi, 2004).

Seng berhubungan dengan beberapa sistem enzim, sebagai metaloenzim, aktivator enzim juga dalam struktur biologis, berfungsi sebagai kofaktor lebih dari 100 enzim dalam tubuh yang berperan dalam metabolisme protein, karbohidrat dan lemak. Mineral Zn juga esensial untuk sintesis protein, integritas membran sel, pemeliharaan DNA dan RNA, perbaikan dan pertumbuhan jaringan, penyembuhan luka, produksi prostaglandin, mineralisasi tulang, fungsi tiroid, dan pembekuan darah. Defisiensi Zn menyebabkan kegagalan sintesis DNA (Soesanto, 2002).

Sejumlah mikroba probiotik menghasilkan senyawa atau zat-zat yang diperlukan untuk membantu proses pencernaan substrat bahan makanan tertentu dalam saluran pencernaan yaitu enzim. Mikroba probiotik penghasil asam laktat menghasilkan enzim selulase yang membantu proses pencernaan. Enzim ini mampu memecah serat kasar yang merupakan komponen yang sulit dicerna dalam saluran pencernaan unggas. Pakan ternak unggas umumnya mengandung serat kasar tinggi. Penggunaan probiotik menghasilkan enzim

selulase mampu memanfaatkan makanan berserat kasar tinggi dalam proses pencernaan sehingga serat kasar dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan jaringan dan peningkatan berat badan ternak unggas. Peran probiotik Sc dan mineral Zn dalam pakan secara bersama-sama diharapkan dapat menekan mikroorganisme patogen, meningkatkan laju metabolisme dalam tubuh sehingga dapat meningkatkan utilitas nutrisi untuk pertumbuhan ayam broiler yang lebih baik (Fuller, 2015).

### **5. Antibiotik**

Penggunaan imbuhan pakan (feed additive) dalam ransum bertujuan untuk meningkatkan daya guna pakan. Imbuhan pakan yang sering dipakai selama ini adalah antibiotik yang berfungsi sebagai pemacu pertumbuhan (growth promotor) agar dapat meningkatkan performa dan efisiensi ransum. Penggunaan antibiotik pada ternak di beberapa negara di Eropa seperti golongan virginiamycin, avopracin, bacitracin, tylocin dan spiramycin sudah dilarang karena adanya residu pada hasil ternak yang dapat membahayakan konsumen (Barton dan Hart, 2001).

Antibiotik adalah komponen kimia yang diproduksi secara biologis oleh organisme seperti jamur atau fungi, bakteri dan tumbuhan yang mempunyai sifat bakteristatik atau bakteriosidal (Cheeke, 2003). Antibiotik adalah zat kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme hidup secara sintesis kimia dengan konsentrasi rendah mempunyai kemampuan menghambat bahkan membunuh mikroorganisme lain. Antibiotik adalah komponen kimia yang diproduksi secara biologis oleh tumbuhan atau mikroorganisme terutama fungi, mempunyai sifat bakteristatik atau bakteriosidal (Burton, 2009).

Sejak awal tahun 1950-an antibiotik dalam dosis non therapeutic telah digunakan sebagai bahan aditif dalam ransum ternak untuk meningkatkan tampilan produksi ternak. Antibiotik sangat penting untuk keberlanjutan produksi ternak dan mengontrol infeksi pada ternak yang dapat menyerang pada manusia. Sebaliknya perhatian terhadap penggunaan antibiotic pada ternak semakin meningkat berkaitan dengan meningkatnya resistensi terhadap antibiotik tertentu (Baffoni et al., 2010).

Selain sebagai growth promotor, antibiotik juga digunakan sebagai obat yang diberikan dalam ransum ayam broiler untuk mengatasi masalah kolibasilosis yang disebabkan oleh bakteri *E. coli*. Kolibasilosis dapat terjadi pada semua umur ayam. Pada anak ayam sampai umur 3 minggu, kolibasilosis menyebabkan kematian dengan gejala omphalitis. Ayam yang pernah terinfeksi *E. coli* dapat menjadi pembawa (carrier) sehingga penyakit ini mudah kambuh di kemudian hari. Kolibasilosis dapat menyebabkan kematian yang terjadi selama periode pemeliharaan dan perolehan berat badan saat panen yang rendah. Antibiotik yang biasa digunakan dalam ransum ayam broiler untuk mencegah kolibasilosis adalah bambermycin (Nuraeni, 2003).

Kesadaran masyarakat akan produk peternakan yang aman dan sehat yaitu produk peternakan yang bebas dari residu obat-obatan dan bebas dari patogen menyebabkan perlunya dicari bahan alternatif pengganti obat-obatan tersebut. Ayam broiler merupakan ayam yang ditujukan untuk menghasilkan daging, penggunaan pakan lebih efisien dan dapat tumbuh dengan cepat, sehingga dapat dijual dalam waktu singkat (Ehrmann et al, 2002).

Akhir-akhir ini penggunaan senyawa antibiotik dalam ransum telah menjadi perdebatan sengit oleh para ilmuwan akibat efek buruk yang ditimbulkan tidak hanya bagi ternak berupa resistensi terhadap antibiotik tetapi juga bagi konsumen yang mengkonsumsi produk ternak tersebut melalui residu yang ditinggalkan pada produk daging, susu maupun telur (Samadi, 2004). Munculnya kesadaran konsumen dan pembatasan atau larangan penggunaan antibiotik sebagai pemacu pertumbuhan dalam industri perunggasan maka probiotik telah diintroduksi sebagai salah satu alternatif antibiotik (Kartasudjana, 2005).

Perhatian terhadap resistensi antimikrobia sebenarnya telah lama dilakukan, namun saat ini perhatian tersebut meningkat berkaitan dengan meningkatnya prevalensi infeksi mikrobia yang resisten terhadap antibiotik pada manusia (Revington, 2002).

Produksi ayam broiler tidak terlepas dari penggunaan antibiotik sebagai obat maupun sebagai pemacu pertumbuhan karena ayam broiler sangat rentan terhadap patogen akibat kepadatan kandang tinggi yang menyebabkan ternak menjadi stress, padahal penggunaan antibiotik yang kurang terkontrol akan meninggalkan residu dan menyebabkan mikroba patogen menjadi resisten terhadap antibiotik. Hal ini tentu saja sangat membahayakan kesehatan manusia sebagai konsumen produk peternakan. Selain sebagai growth promotor, antibiotik juga digunakan sebagai obat yang diberikan dalam ransum ayam broiler untuk mengatasi masalah kolibasilosis yang disebabkan oleh bakteri *E. coli*. Kolibasilosis dapat terjadi pada semua umur ayam (Anggorodi, 1995).

Tempat utama aktivitas antibiotika adalah dalam bagian *Gastrointestinal*. Beberapa macam antibiotik yang dapat dicampurkan ke dalam ransum antara lain bacitracin, colistin, oxytetracycline, kitasamycin dan spiramycin. Antibiotik umumnya digunakan sebagai pengobatan terhadap infeksi bakteri, namun demikian penggunaan antibiotik dalam dosis rendah dapat menimbulkan pengaruh pemacu pertumbuhan (growth promotor). Antibiotik dengan dosis rendah juga digunakan untuk meningkatkan performa dan kesehatan saluran pencernaan misalnya bambarmycin atau flavophospholipol, sedangkan antibiotik dengan konsentrasi tinggi digunakan untuk pengobatan suatu penyakit atau beberapa penyakit (Boguta, 2014).

Menurut Revigton (2002), cara kerja antibiotik adalah sebagai berikut: (1) Menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang memproduksi toksin diantaranya menghalangi atau membunuh mikroorganisme yang menimbulkan infeksi subklinis dan yang bersaing dengan induk semang dalam menyediakan nutrien. (2) Meningkatkan kapasitas daya serap usus, hal tersebut berdasarkan pada pengamatan bahwa pemberian antibiotik menyebabkan dinding usus menjadi tipis sehingga daya serap usus akan zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh semakin 22 meningkat. Penggunaan antibiotik memiliki efek antara lain: (1) Antibiotik dapat mencegah penyakit terutama dalam saluran pencernaan. (2) Antibiotik dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang menghasilkan amonia dalam jumlah besar. (3) Antibiotik dapat meningkatkan penyerapan nutrien (kalsium, fosfor dan magnesium) dan menghambat kerusakan nutrien (vitamin dan asam amino) oleh mikroorganisme. (4) Antibiotik dapat

meningkatkan kemampuan absorpsi zat makanan dan meningkatkan efisiensi penggunaan ransum.

Pada anak ayam sampai umur 3 minggu, kolibasilosis menyebabkan kematian dengan gejala omphalitis. Ayam yang pernah terinfeksi *E. coli* dapat menjadi pembawa (carrier) sehingga penyakit ini mudah kambuh di kemudian hari. Kolibasilosis dapat menyebabkan kematian yang terjadi selama periode pemeliharaan dan perolehan berat badan saat panen yang rendah. Antibiotik yang biasa digunakan dalam ransum ayam broiler untuk mencegah kolibasilosis adalah bambermycin. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi penggunaan antibiotik adalah penggunaan prebiotik. Prebiotik merupakan suatu 15 bahan pakan yang tidak dapat dicerna dan memberikan manfaat positif bagi tubuh karena secara selektif menstimulir pertumbuhan dan aktivitas bakteri baik dalam usus besar (Prado, 2008).

#### **6. Bakteri Asam Laktat (BAL)**

Bakteri asam laktat berperan meningkatkan kadar keasaman dalam usus halus (ileinn), oleh karena itu dapat meningkatkan absorpsi kalsium. Kalsium dalam ransum pada anak ayam yang sedang tumbuh sebagian dipergunakan untuk pembentukan tulang, sedangkan pada ayam dewasa dipergunakan untuk kulit telur, pembentukan kulit telur memerlukan pemasukan ion-ion kalsium dan ion-ion karbonat dengan jumlah yang cukup dalam uterus untuk membentuk kalsium karbonat (Anggorodi, 1995).

Pembentukan kulit telur memerlukan ion kalsium yang cukup ke kelenjar kulit telur/kerabang dan adanya ion karbonat dalam cairan kelenjar kerabang

untuk membentuk kalsium karbonat. Pada unggas yang mulai memproduksi telur estrogen dilepaskan dari ovarium dalam jumlah besar dan dapat meningkatkan kadar kalsium dalam darah, kemudian kalsium disimpan dalam sumsum tulang kemudian akan dikeluarkan kembali untuk pembentukan telur. Jumlah kalsium yang disimpan tidak ada hubungannya dengan jumlah kalsium yang diberikan pada unggas selama periode pertumbuhan. Kekurangan kalsium pada hewan unggas akan menyebabkan pertumbuhan terhambat, nafsu makan hilang dan secara bertahap terjadi penurunan produksi baik produksi ayam pedaging maupun produksi telur (Tilman, dkk, 2001).

Phosphor dibutuhkan dalam jumlah besar dan mempunyai fungsi lebih banyak dibandingkan dengan mineral lainnya dalam tubuh unggas antara lain dipergunakan untuk pembentukan tulang, keseimbangan asam-basa tubuh, metabolisme protein, karbohidrat, lemak, pengaturan asam basa, pertumbuhan kerangka, aktivitas vitamin dan enzim serta untuk pengangkutan kalsium dalam pembentukan telur (Sumadi, 2004).

Bakteri asam laktat adalah bakteri yang pada metabolisme karbohidrat dapat membentuk asam laktat. Bakteri ini bersifat gram positif, tidak berspora, katalase negatif, tidak membentuk sitokrom, anaerob tetapi aerotolerans, toleran terhadap asam serta mempunyai kemampuan fermentasi sempurna. Bakteri asam laktat mempunyai enzim ogalactosidase, glycolase dan lactat dehydrogenase (LDH) yang menghasilkan asam laktat dari laktosa (Ooi at al., 2010).

Bakteri Asam Laktat (BAL) merupakan bakteri Gram positif yang berbentuk batang atau bulat, tidak membentuk spora, fermentasi fakultatif

anaeorob, tidak mempunyai sitokrom, tidak memiliki kemampuan untuk mereduksi nitrat dan memanfaatkan laktat, oksidasi negatif, katalase negatif, motilitas negatif dan kemampuan memfermentasi glukosa menjadi asam laktat. Berdasarkan taksonomi, terdapat sekitar 20 genus bakteri yang termasuk BAL. Beberapa BAL yang sering digunakan dalam pengolahan pangan adalah *Aerococcus*, *Bifidobacterium*, *Carnobacterium*, *Enterococcus*, *Lactobacillus*, *Lactococcus*, *Leuconostoc*, *Oenococcus*, *Pediococcus*, *Streptococcus*, *Tetragenococcus*, *Vagococcus*, dan *Weissella* (Carr et al., 2002).

Bakteri probiotik atau bakteri baik adalah Bakteri Asam Laktat (BAL) yang hidup di dalam usus, bersimbiosis dengan mikroflora usus yang mampu melawan bakteri patogen di dalam usus, oleh karena itu pemberian probiotik dapat berpengaruh menguntungkan bagi kesehatan. Sebagian besar jenis bakteri pada probiotik berasal dari *Lactobacillus* atau *Bifidobacterium* (Zhang et al., 2003).

Penambahan probiotik harus memperhatikan konsentrasi antara 10<sup>7</sup>-10<sup>9</sup> cfu/g per hari untuk binatang. Karakterisasi Bakteri Asam Laktat (BAL) yang dapat digolongkan kedalam bakteri probiotik adalah diketahui sebagai materi yang tidak berbahaya, dapat hidup selama dilakukan proses dan penyimpanan, memiliki efek antagonis terhadap bakteri patogen, toleran terhadap asam lambung, getah pankreas dan cairan empedu serta mampu melindungi epitelium inangnya (Velez, 2007).

Genus bakteri yang tergolong kepada bakteri asam laktat adalah *Carnobacterium*, *Enterococcus*, *Lactobacillus*, *Lactococcus*, *Leuconostoc*, *Pediococcus*, *Streptococcus*, *Propionibakterium* yang mempunyai potensi untuk digunakan sebagai probiotik (Nettles dan Barefoot, 2007).

Tabel 3. Beberapa Mikroorganisme yang Berperan Sebagai Probiotik

<b><i>Lactobacillus</i></b>	<b><i>Bifidobacteria</i></b>	<b><i>Enterococcus</i></b>	<b><i>Streptococcus</i></b>
<i>L. acidophilus</i>	<i>B. adolescentis</i>	<i>E. faecalis</i>	<i>S. termhopilus</i>
<i>L. brevis</i>	<i>B. animalis</i>	<i>E. faecium</i>	
<i>L. casei</i>	<i>B. bifidum</i>		
<i>L. curvatus</i>	<i>B. breve</i>		
<i>L. fermentum</i>	<i>B. infantis</i>		
<i>L. gasseri</i>	<i>B. longum</i>		
<i>L. johnsonii</i>	<i>B. thermophilum</i>		
<i>L. reuteri</i>			
<i>L. rhamnosus</i>			
<i>L. salivarius</i>			
<b><i>Propionibacterium</i></b>	<b><i>Yeast</i></b>	<b><i>Other</i></b>	
<i>P. freudenreichii</i>	<i>Kluyveromyces</i>	<i>Leunococcus</i>	
<i>P. freudenreichii</i>	<i>Lactis</i>	<i>Mesenteroides</i>	
<i>Subs. thermanii</i>	<i>Saccharomyces</i>	<i>Pediococcus</i>	
<i>P. jensenii</i>	<i>Boulardii</i>	<i>Acidilactici</i>	
	<i>Saccharomyces</i>		
	<i>Cerevisiae</i>		

Sumber: Baffoni *et al.*, (2010)

Produk fermentasi BAL salah satunya adalah asam organik. Asam organik ini dihasilkan selama proses fermentasi terkait spesies organisme, gabungan kultur

dan kondisi pertumbuhan. Asam organik mampu menurunkan pH dan berfungsi untuk tidak memutus beberapa ikatan molekul sehingga memiliki kemampuan aktivitas mikroba. Penurunan pH mampu menghasilkan Minimum Inhibitory Concentration (MIC), sehingga asam laktat dapat menghambat kerja *Clostridium tyrobutyricum*, *E. coli*, *Enterobacter sp* dan *Propionibacterium freudenreichii sp* (Lindgren dan Dobrogosz, 1990).

Menurut Food and Agriculture Organization/World Health Organization (FAO/WHO) (2001), idealnya strain probiotik seharusnya tidak hanya mampu bertahan melewati saluran pencernaan tetapi juga memiliki kemampuan untuk berkembang biak dalam saluran pencernaan, tahan terhadap cairan lambung dan cairan empedu dalam jalur makanan yang memungkinkan untuk bertahan hidup melintasi saluran pencernaan dan terkena paparan empedu. Selain itu probiotik juga harus mampu menempel pada sel epitel usus, mampu membentuk kolonisasi pada saluran pencernaan, mampu menghasilkan zat anti mikroba (bakteriosin), dan memberikan pengaruh yang menguntungkan inangnya. Syarat lainnya adalah tidak bersifat patogen dan aman jika dikonsumsi. Strain probiotik juga harus tahan dan tetap hidup selama proses pengolahan makanan dan penyimpanan, mudah diaplikasikan pada produk makanan, dan tahan terhadap proses psikokimia pada makanan (Piva *et al.*, 2004).

Karakterisasi bakteri asam laktat yang dapat digolongkan ke dalam bakteri probiotik adalah diketahui sebagai materi yang tidak berbahaya, dapat hidup selama dilakukan proses dan penyimpanan, memiliki efek antagonis

terhadap bakteri patogen, toleran terhadap asam lambung, getah pankreas dan cairan empedu serta mampu melindungi epitelium inangnya (Velez, 2007).




## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil

Hasil dari penelitian selama 35 hari yang mencakup beberapa perlakuan termasuk pemberian antibiotik dan probiotik multi strain (*Lactobacillus cesei*, *Saccharomyces cerevisiae* dan *Rhodopseudomonas palustris*), terhadap daya cerna serat kasar pada broiler yang di sajikan pada Gambar 1 dibawah ini.



Keterangan: P<sub>0</sub> = Ransum basal (kontrol).

P<sub>1</sub> = Ransum basal + Probiotik multi strain (*Lactobacillus cesei*, *Saccharomyces cerevisiae* dan *Rhodopseudomonas palustris*), 1,5 ml/hari, (1-35 hari).

P<sub>2</sub> = Ransum basal + Antibiotik Zink *Bacitracin* 0,1 g/hari, (1-35 hari).

P<sub>3</sub> = Ransum basal + Antibiotik Zink *Bacitracin* 0,1 g/hari, (1-21 hari) + Probiotik multi strain (*Lactobacillus cesei*, *Saccharomyces cerevisiae* dan *Rhodopseudomonas palustris*), 1,5 ml/hari, (22-35 hari).

Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa pemberian perlakuan (antibiotik dan probiotik) tidak berpengaruh nyata ( $P > 0,05$ ) terhadap daya cerna serat kasar pada broiler dengan perlakuan P<sub>0</sub> (38.75%), P<sub>1</sub> (65.53%), P<sub>2</sub> (67.88%) dan P<sub>3</sub> (68.48%).

## **B. Pembahasan**

Daya cerna adalah kemampuan ternak dalam menyerap ransum yang dikonsumsi melalui saluran pencernaan. Daya cerna dapat dikatakan perbandingan ransum yang dikonsumsi dan yang dikeluarkan melalui feses. Kecernaan pakan dapat dipengaruhi beberapa faktor seperti bahan penyusun ransum, tingkat pemberian ransum dan spesies dari ternak. Hal ini sesuai dengan pendapat Mc Donald *et al.*, (1995), menyatakan bahwa kecernaan pakan dipengaruhi oleh komposisi kimia pakan dan fraksi pakan berserat. Yang didukung oleh pendapat Sukaryana dkk (2011), kecernaan dapat dipengaruhi oleh tingkat pemberian pakan, spesies hewan, kandungan lignin bahan pakan, defisiensi zat makanan, pengolahan bahan pakan, pengaruh gabungan bahan pakan, dan gangguan saluran pencernaan. Daya cerna dipengaruhi juga oleh suhu, laju perjalanan makanan melalui alat pencernaan, bentuk fisik bahan makanan, komposisi ransum, dan pengaruh terhadap perbandingan dari zat makanan lainnya, jenis kelamin, umur dan strain, meskipun tidak konsisten.

Daya cerna serat kasar adalah banyaknya kandungan serat kasar yang terdiri dari selulosa, hemiselulosa dan lignin yang dapat dicerna oleh tubuh. Pada Gambar 1 menunjukkan rata-rata tertinggi terdapat pada P3 (68.48%), yang diberikan ransum basal + antibiotik *Zink Bacitracin* 0,1 g/hari, (1-21 hari) + probiotik multi strain (*Lactobacillus cesei*, *Saccharomyces cerevisiae* dan *Rhodopseudomonas palustris*) 1,5 ml/hari, (22-35 hari). Sedangkan nilai rata-rata terendah terdapat pada P0 (38.75%), yang hanya diberikan ransum basal. Hal ini sesuai dengan pendapat Wahyu (1985); Piliang dan Soebagio (1990), menyatakan

nilai pencernaan normal ayam broiler untuk LK adalah 75-80%, PK adalah 70-80% dan SK 70-80%. Yang menunjukkan bahwa dari semua perlakuan tidak menapai standar pencernaan normal pada ayam broiler. Serta didukung dengan pendapat Soeharsono (2007), yang menyatakan pemberian probiotik dapat berdampak positif pada berat badan dan konversi pakan ayam pedaging. Konversi pakan dapat menjadi indikator yang dapat memberikan gambaran terhadap efisiensi penggunaan pakan. Serta pendapat Barton dan Hart (2001), imbuhan pakan yang sering dipakai selama ini adalah antibiotik yang berfungsi sebagai pemacu pertumbuhan (*growth promotor*) agar dapat meningkatkan performa dan efisiensi ransum.

Pengaruh yang tidak nyata pada penggunaan antibiotik dan probiotik pada daya cerna serat kasar dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti penyediaan ransum, bentuk pakan, *breed DOC (Day Old Chick)*, kandungan serat kasar pada pakan, tingkah laku ternak dan dosis pemberian antibiotik dan probiotik. Hal ini sesuai dengan pendapat Donald (2002), menyatakan bahwa tinggi rendahnya pencernaan bahan pakan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain jenis ternak, bentuk pakan, macam bahan pakan dalam ransum, kandungan protein kasar dan cara penyediaan ransum. Pengaruh juga dapat disebabkan oleh konsumsi pakan pada ternak yang rendah karena kurangnya nilai palatabilitas. Hal ini sesuai dengan pendapat Nawawi (2011), yang menyatakan bahwa konsumsi pakan adalah salah satu faktor penting yang mempengaruhi daya cerna untuk memberikan pertumbuhan yang optimal.

Penggunaan dosis pemberian probiotik dapat berpengaruh terhadap daya cerna serat kasar apabila dosis yang diberikan ditingkatkan lagi. Dosis yang diberikan pada perlakuan P0, P1, P2 dan P3 yaitu sebanyak 1,5 ml/ 1 liter air. Hal ini tidak sesuai dengan Dhika (2005), yang dalam penelitiannya menggunakan probiotik dan prebiotik dengan dosis 2 ml dapat meningkatkan daya cerna dan akhirnya dapat meningkatkan penambahan bobot badan ayam pedaging.

Pada penelitian ini menggunakan pakan bentuk mash yang dibuat dan dicampur secara manual. Hal ini tidak sesuai dengan pendapat Nawawi (2011), yang menyatakan bahwa bentuk pakan yang baik untuk broiler yaitu bentuk pellet dan crambel sebab broiler memiliki palatabilitas yang tinggi dalam memilih makanannya sehingga meningkatkan kecernaannya.

Kadar serat kasar yang tinggi dalam pakan menyebabkan kurangnya kecernaan zat lain yang ada pada pakan yang dapat menyebabkan turunnya konsumsi ransum pada broiler. Hal ini sesuai dengan pendapat Tillman *et al.* (2001), yang menyatakan bahwa kecernaan serat kasar tergantung pada kandungan serat kasar dalam ransum dan jumlah serat kasar yang dikonsumsi. Kadar serat kasar terlalu tinggi dapat mengganggu pencernaan zat lain. Daya cerna serat kasar dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kadar serat dalam pakan, komposisi penyusun serat kasar dan aktifitas mikroorganisme (Maynard *et al.*, 2005).

Pengukuran daya cerna pada penelitian ini dilakukan dengan cara memberikan ransum dengan perlakuan yang telah ditentukan selama pemeliharaan kemudian mengambil sampel feses dan melakukan analisis. Hal ini sesuai dengan

pendapat Williamson dan Payne (1993), pengukuran pencernaan dapat dilakukan secara *in vitro* dan *in vivo*. Pengukuran pencernaan secara *in vitro* dilakukan dengan membuat suasana seperti yang terjadi dalam saluran pencernaan ternak di laboratorium. Pengukuran secara *in vivo* terdiri dari 2 periode yaitu periode pendahuluan dan periode total koleksi. Periode pendahuluan digunakan untuk membiasakan ternak dengan ransum perlakuan dan kondisi lingkungan yang baru serta menghilangkan sisa ransum waktu sebelumnya. Periode total koleksi adalah periode pengumpulan ekskreta sampai akhir percobaan yang kemudian dikeringkan dan dianalisis.

Penggunaan antibiotik yang ditambahkan dengan probiotik dilakukan untuk menigatan konsumsi pakan dan mengurangi residu dalam tubuh broiler yang ditimbulkan oleh penggunaan antibiotik. Menurut Direktur Jendral Peternakan dan kesehatan Hewan (2018), menegaskan bahwa tidak adalagi penggunaan antibiotik pada pakan ternak sebagai pemacu pertumbuhan berlaku efektif mulai 1 januari 2018. Hal ini juga menurut pendapat Widodo (2002), yang menunjukkan bahwa antibiotik adalah senyawa kimia murni zat anti mikroba yang mengalami proses penyerapan ketika berlebihan akan menimbulkan residu.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa pemberian antibiotik dan probiotik tidak memberikan berpengaruh yang nyata ( $P > 0,05$ ) terhadap daya cerna serat kasar. Walaupun demikian, pemberian antibiotik dan probiotik dari perlakuan P0 (38.75%), P1 (65.53%), P2 (67.88%), P3 (68.48%), yang cenderung lebih baik adalah P3 (68.48%), yang diberikan ransum basal + antibiotik *Zink Bacitracin* 0,1 g/hari, (1-21 hari) + probiotik multi strain (*Lactobacillus cesei*, *Saccharomyces cerevisiae* dan *Rhodopseudomonas palustris*) multi strain 1,5 ml/hari, (22-35 hari)

#### ***B. Saran***

Berdasarkan kesimpulan diatas maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai jumlah dan level pemberian antibiotik dan probiotik yang tepat agar dapat diketahui konsentrasi yang optimal dalam menurunkan pencernaan serat kasar pada broiler.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abun. 2008. Hubungan Mikroflora Dengan Metabolisme Dalam saluran Pencernaan Unggas dan Monogastrik. *Laporan Penelitian*. Fakultas Peternakan. Universitas Padjajaran.
- Agus, A. 2007. *Membuat Pakan Ternak Secara Mandiri*. Yogyakarta: PT. Aji Parama.
- Amerah, A. M., V. Ravindran, R. G., Lentle and D. G. Thomas. 2007. Feed Particle Size: Implication On The Digestion and Performance of Poultry. *J. World's Poultry. Sci.* 63: 439-453.
- Amrullah, I. K. 1985. *Ilmu Makanan Ternak Unggas*. Jakarta: Kemajuan Mutakhir. Universitas Indonesia Press.
- \_\_\_\_\_. 2003. *Nutrisi Ayam Broiler*. Bogor: Lembaga Satu Gunung budi.
- Anggorodi, H. R. 1995. *Nutrisi Aneka Ternak Unggas*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Association of Official Analytical Chemist (AOAC). 1995. *Official Methods of Analysis of The Association of Official Analytical Chemist*. Published by The Association of Official Analytical Chemist. Inc. Arlington. Virginia. USA.
- Ashayerizadeh, A., N. Dabiri, O. K.H. Mirzadeh, H. Roshanfekar and M. Mamooee. 2009. Effect of Dietary Antibiotic, Probiotic and Prebiotic as Growth Promoters, on Growth Performance, Carcass Characteristics and Hematological Indices of Broiler Chickens. Pakistan: *Journal of Biological Science*. 12: 52- 57.
- Aziz, Safingi. M, Mufti. dan Ning, Iriyanti. 2013. Penggunaan Berbagai Jenis Probiotik dalam Ransum Ayam Arab Terhadap Konsumsi Pakan dan Income Over Feed Cost. *Jurnal Ilmiah Peternakan*. V.1(3): h.970-975
- Badan Standar Nasional. 2005. (SNI 01-4868.1-2005) *Bibit Niaga (Final Stock) Ayam Ras Tipe Pedaging Umur Sehari (DOC)*.
- Badan Standar Nasional Indonesia (SNI)a. 2006. *Pakan Ayam Ras Pedaging (Broiler Starter)*.
- Batrinon, A. 2010. *The Use of Lactic Acid Bacteria in Probiotic Bacteria*. Thei of Athena.

- Backman, P. A., Brannen, P. M. dan Mahaffe, W. F. 1994. Plant Respon and Disease Control Following Seed Inoculation with Bacillus Sp. Didalam: Ryder, M. H., Stephens, P. M., Bowen, G. P. editor. Improving Plant Productivity Wih Rhizosphere Bacteria. *Pruc Third Int Work PGPR Souh*, Australia.
- Barton, M. D. & W. S. Hart. 2001. Public Health Risks: Antibiotic Resistance-Review- Asian-Australia. *J. Anim. Sci.* V.14 (3): h.414-422.
- Baffoni, L. Gaggia, F. Granata, M. Gasbarri, R., Gioia, D., Biavati, B and Santini. 2010. Characterization of Probiotic Strains: An Application As Feed Additives In Poultry Against Campylobacter Jejuni. *Int J Food Microbiol.* V.141 Suppl 1:S98-108.
- Bidura, I.G.N.G. dan Suastina, I.G.P.B. 2002. Pengaruh Suplementasi Ragi Tape dalam Ransum Terhadap Efisiensi Penggunaan Ransum. *Majalah Ilmiah Peternakan.* Vol 5 (1): 06-11.
- Boguta, A.M., Bringel, F., Martinussen, J., and P.R. Jensen. 2014. Screening of Lactic Acid Bacteria for Their Potential as Microbial Cell Factories for Bioconversion of Lignocellulosic Feedstock. *Microbial Cell Factories.* h.13: 97.
- Burton, J.L. 2009. Suplementasi Chromium: Its Benefits to the Bovine Immune System. *Anim Feed Sci Tech* V.53: h.117-133.
- Budiansyah, A. 2004. Pemanfaatan Probiotik dalam Meningkatkan Penampilan Produksi Ternak Unggas. *Tesis.* Bogor: Program Pascasarjana IPB.
- Cheeke, P. R. 2003. *Contemporary Issues in Animal Agriculture.* Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.
- De Vos P., Garrity, Jones, Krieg, Ludwig, Rainey, Scleifer. dan Witman. 2009. *Bergey's Manual of Systematic Bacteria Second Edition.* Springer Dordrecht Heidelberg. London, New York.
- Despal. 2000. Kemampuan Komposisi Kimia dan Kecernaan *In vitro* dalam Mengestimasi Kecernaan *In vivo.* *Media Peternakan.* 23 (3): 84 – 88).
- Dhika, 2005. *Feed Additive pada Unggas.* Pusat Antar Universitas Pangan dan Gizi. Institute Pertanian Bogor: Bogor.
- Donald, 2002. *Sistem Pencernaan Unggas.* Universitas Airlangga Press: Surabaya

- Ehrmann, M.A., P. Kurzak, J. Bauer and R.F. Vogel, 2002. Characterization of Lactobacilli Towards Their Use as Probiotic Adjuncts in Poultry. *Journal of Applied Microbiology*. V. 92: h. 966–975.
- Ensminger, M. E., J.E. Oldfield dan W.W. Heinemann. 1990. *Feed and Nutrition*. 2<sup>nd</sup> Ed The Ensminger Publishing Company. California.
- Ensminger. M. E. 2005. *Poultry Science*. 3rd Edition. Interstate Publisher. Inc., Danville.
- Fuller, R. 1989. History and Development of Probiotics. In: Probiotics, the Scientific Basis. Ed. London. 1-8. Gordon, R.F., and Jordan, F.T.W. 1982. Poultry Diseases. 2<sup>nd</sup> Edition. *The English Language Book Society*, London.
- \_\_\_\_\_. 2015. Probiotics in Man and Animals. *Journal Application Bacteriol.* Vol. 66. No. 1: 365-378
- [FAO/WHO] Food and Agriculture Organization of The United Nations, World Health Organization. 2001. *Joint FAO/WHO Expert Consultation on Evaluation of Health and Nutritional Properties of Probiotics in Food Including Powder Milk with Live Lactic Acid Bacteria*. Amerian Córdoba Park Hotel, Córdoba, Argentina.
- Gordon, S. H. & D.R. Charles. 2002. *Niche and Organic Chicken Products: Heir Technology and Scientific Principles*. Nottingham University Press, Definitions: III-X, UK.
- Hafsah. 2003. Pengaruh Supplementasi Probiotik Starbio Terhadap Rasio Effisiensi Protein Ransum dan Nilai Karkas Ayam Pedaging. *Jurnal Agroland*. V.10 (4): h. 399-404.
- Hadioetomo, R. S. 1985. *Mikrobiologi Dasar-Dasar Praktik*. Jakarta: Gramedia.
- Hernawati. 2010. *Teknik Analisis Nutrisi Pakan, Kecernaan Pakan, dan Evaluasi Energi pada Ternak*. Jurusan Pendidikan Biologi, FPMIPA Universitas Pendidikan Indonesia.
- Kartasudjana, R. 2005. *Manajemen Ternak Unggas*. Bandung: Fakultas Peternakan. Universitas Padjajaran.
- Kartasudjana, R. dan E. Suprijatna. 2006. *Manajemen Ternak Unggas*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. 2012. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Wali

- Kim. 2010. *Metode Untuk Pengukuran Kecernaan Nutrien Pada Unggas*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Kroger, O. 2011. *Doing Discourse Analysis: Methods for Studying Action in Talk and Text*. London: Sage Publications.
- Kompiang, I.P. 2009. Pemanfaatan Mikroorganisme sebagai Probiotik Untuk Meningkatkan Produksi Ternak Unggas di Indonesia. *Jurnal Pengembangan Inovasi*. Pertanian 2 (3) : 177-191.
- Lubis, D. A. 1992. *Ilmu Makanan Ternak*. Jakarta: PT Pembangunan.
- Murwani, R. 2003. Obat Tradisional dalam Kancan Industri Peternakan. *Poultry Indonesia*. Edisi Desember: h.34-35
- Mikulski, D. Jankowski, J. Naczmanski, J. Mikulska, M. and V. Demey. 2012. Effects of Dietary Probiotic (*Pediococcus acidilactici*) Supplementation on Performance, Nutrient Digestibility, Egg traits, Egg Yolk Cholesterol, and Fatty Acid Profile in Laying Hens. *Poultry Science*, V. 91: h. 2691-2700.
- Maynard L. A dan J. K Loosly. 2005. *Animal Nutrition*. Edisi ke-6. Mc. Graw Hill Book Company, New Delhi.
- Mc Donald P. R.A. Edwards and J.F.D. Greenhalgh. 1995. *Animal Nutrition. Fourth Edition*. Longman London
- National Research Council. 1994. *Nutrient Requirements of Poultry*. 9<sup>th</sup> Revised Edition. National Academic Press, Wasington, DC.
- Nawawi. 2011. *Ilmu Ternak Unggas*. Gajah Mada University Press: Yogyakarta.
- Nuraini. 2003. Pengujian Kualitas Protein Ransum yang Memakai Limbah Pemotongan Ayam Broiler. *Jurnal Peternakan dan Lingkungan*. V.5 (2): h. 16-21.
- Pond, W. G., D.C. Church & K. R. Pond. 2015. *Basic Animal Nutrition and Feeding*. 4th Edition. New York: John Wiley and Sons.
- Prado, F. C., J. L. Parada, A. Pandey, and C. R. Soccol. 2008. Trends In Non-Dairy Probiotic Beverages. *Food Res. Int.*41:111-123
- Piva, G. and F. Rossi. 2004. Possible Alternatives to The Use of Antibiotics as Growth Promoters. *New Addit Ives. CIHEAM-Opt Ion Mediterraneennes*. h.83-106.

- Revington, B. 2002. Feeding Poultry in The Post-Antibiotic Era. *Multi-State Poultry Meeting, Saccharomyces Cereviceae As An Antibiotic Alternative*.
- Samadi. 2004. Feed Quality For Food Safety, Kapankah di Indonesia. *J. Inovasi* V. 2 (16): h. 33-35.
- Sukaryana, Y. Atmomarsono, U. Yunianto, VD. Supriyatna, E. 2011. Peningkatan Nilai Kecernaan Protein Kasar dan Lemak Kasar Produk Fermentasi Campuran Bungkil Inti Sawit dan Dedak Padi pada Broiler. *JITP*. V. 1(3): h. 167-172.
- Sitompul, S. dan Martini. 2005. *Penetapan Serat Kasar dalam Pakan Ternak Tanpa Ekstraksi Lemak*. Bandung: Prisiding Temu Teknis Nasional Tenaga Pertanian
- Suparjo, 2010. *Analisis Bahan Pakan Secara Kimiawi: Analisis Proksimat dan Analisis Serat*. Jambi: Fakultas Peternakan.
- Susanti, S. dan Marhaenyanto, E. 2007. Kecernaan, Retensi Nitrogen dan Hubungannya dengan Produksi Susu pada Sapi Peranakan Friesian Holstein (PFH) yang diberi Pakan Pollard dan Bekatul. *Jurnal Protein*. Vol. 15(2): 141-147.
- Suprijatna, E. Atmomarsono dan Kartasudjana. 2005. *Ilmu Dasar Ternak Unggas*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Suprijatna, E. 2010. Strategi Pengembangan Ayam Lokal Berbasis Sumber Daya Lokal dan Berwawasan Lingkungan. *Prosiding Seminar Nasional Unggas Lokal ke IV*. hal: 55 – 79.
- Soesanto, I. R. H. 2002. *Pemilihan Bibit DOC*. Bogor: Fakultas Politeknik Pertanian, Institut Pertanian Bogor.
- Soeharsono. 2010. *Probiotik Basis Ilmiah, Aplikasi dan Aspek Praktis*. Bandung: Widya Padjajaran.
- Sofyan, O. 2003. Kajian Probiotik AB (*Aspergillus niger* dan *Bacillus sp*) sebagai Imbuhan Ransum dan Implikasi Efeknya Terhadap Mikroflora Usus Serta Penampilan Produksi Ayam Petelur. *Disertasi*. Program pascasarjana UNPAD, Bandung.
- Shihab, M. Q. 2002. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- \_\_\_\_\_. 2015. *Tafsir Surah As-Syura Ayat 11*. Jakarta: Lantera Hati.

- Steel, R.G.D 1991. *Prinsip dan Prosedur Statistik: Suatu Pendekatan Biometrik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Tamimi, A.Y. 2005. *Probiotic Dairy Products*. Society of Dairy Technology, Blackwell Publishing. United Kingdom.
- Tillman, A. D., H. Hartadi, S. Reksohadiprodjo, S. Prawirokusuma & S. Lebdosoekojo. 1998. *Ilmu Makanan Ternak Dasar*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- \_\_\_\_\_. 2001. *Ilmu Makanan Ternak Dasar*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Toms, C., and F. Powrie. 2001. Control of Intestinal Inflammation by Regulatory T cells. *Microbes and Infection*. V.3: h.929–935.
- Tim Laboratorium IPB. 2013. *Pengetahuan Bahan Makanan Ternak*. Bogor: CV Nutrisi Sejahtera.
- Wahju, J. 2004. *Ilmu Nutrisi Unggas*. Cetakan ke-4. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Wiradisastra. 2000. *Kecernaan Unggas*. Cetakan IX. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Widyasti, E. 2003. Isolasi Bacillus Sp. Penghasil  $\alpha$ -Amilase Ekstraseluler dan Penentuan Suhu Serta pH Optimum Pertumbuhan. *Skripsi*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Williamson, G. dan W.J.A. Payne. 1993. *Pengantar Peternakan di Daerah Tropis*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Widodo, Eko. 2002. *Pengaruh Penggunaan Tepung Ulat Kandang (Alphitobius diaperinus) dalam Pakan terhadap Penampilan Produksi Ayam Pedaging*. Brawijaya: Universitas Brawijaya.
- Wong, P.T.W. 1994. *Bio-control of Wheat Take-All in the Field Using Soil Bacteria and Fungi*. Didalam: Ryder MH, Stephens PM, Bowen GP, editor. *Improving Plant Productivity with Rhizosphere Bacteria*. Australia: Pruc Third Int Work PGPR South Australia
- Zhang, H.H. Cao, Y.C. Bi, Y.Z. Hu, W.F. and X. Fang. 2003. The Effects of Heat-killed Lactobacillus Preparation on the Immunity of Broiler Chickens. *Veterinary Medicine*. V. 35: h. 14–15. (In Chinese, abstract in English).


## LAMPIRAN

### Lampiran I. Uji SPSS Versi 16 Pengaruh Pemberian Antibiotik dan Probiotik terhadap Daya Cerna Serat Kasar pada Broiler.

ANOVA

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Daya_Cerna_Serat_Kasar	Between Groups	1861.667	3	620.556	3.821	.057
	Within Groups	1299.333	8	162.417		
	Total	3161.000	11			

### Lampiran II. Grafik SPSS



### Lampiran III. Dokumentasi Penelitian



**Ket: Proses Pembersihan Kandang**



**Ket: Proses Pembuatan Sekat-sekat Kandang**



**Ket: Antibiotik dan Probiotik yang digunakan**



**Ket: Vaksin Yang Digunakan**



**Ket: Pencampuran Probiotik di Air Minum**



**Ket: Penimbangan DOC**



**Ket: Pemberian Vaksinasi**



**Ket: Penimbangan pakan**



**Ket: Pencampuran pakan**



**Ket: Pencatatan pertambahan berat badan**



**Ket: Pengambilan sampel feses pada broiler**





**Ket: Uji Analisis Laboratorium**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## RIWAYAT HIDUP



**Rahmawati** Biasa di sapa AmmA lahir di Arjosari 10 November 1995. Lahir dari keluarga yang sederhana, anak pertama dari dua bersaudara yakni dari pasangan suami istri Busman dan St Rawaiah. Sekarang tinggal di Pondok Dilla Jln. Mustafa Dg. Bunga II Romang polong. Penulis pernah belajar di SD. NO. 023 Kebunsari selama 6 Tahun. Dan melanjutkannya di SMPN 03 Bumiayu Kec Wonomulyo Kab. Polewali Mandar. Pada tahun 2011 penulis mengecap pendidikan di SMA Negeri 1 Wonomulyo dan tamat pada tahun 2014. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Jurusan Ilmu Peternakan melalui jalur SPAN\_PTKIN pada tahun 2014.

Penulis bersyukur atas karunia Allah swt. sehingga dapat mengenyam pendidikan yang merupakan bekal untuk masa depan dan juga berharap dapat mengamalkan ilmu yang telah diperoleh dengan sebaik-baiknya dan membahagiakan orang tua serta berusaha menjadi manusia yang berguna bagi agama ,keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Wassalamualaikum wr.wb.....